

**EVALUASI RASIONALITAS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA
PASIEN PNEUMONIA DI RSUD MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURUL MAGFIRAH

70100117052

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Magfirah
NIM : 70100117052
Tempat / Tgl Lahir : Sambabo, 18 April 1999
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl Mustafa Dg Bunga IV
Judul : EVALUASI RASIONALITAS PENGGUNAAN
ANTIBIOTIK PADA PASIEN PNEUMONIA DI RSUD
MAJENE

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 13 Januari 2022

Penulis



Nurul Magfirah
NIM. 70100117052

UNIVERSITAS ISLAM N
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia di RSUD Majene” yang disusun oleh Nurul Magfirah, NIM. 70100117052, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 13 Januari 2022 M yang bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 13 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H


DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.
Sekretaris : Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si.
Pembimbing I : Apt. Mukhriani, S.Si., M.Si.
Pembimbing II : Apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.
Penguji I : Apt. Indah, S.Si., M.Si.
Penguji II : Dra. Audah Mannan, M. Ag.

()
()
()
()
()
()

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,




Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَنُصَلِّيْ بَعْلَوْنُسَلِّمْ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْلَو

أَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah swt. Berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia di RSUD Majene”. Shalawat dan salam kepada junjungan, teladan terbaik umat manusia, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan umat manusia, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari jurang kemaksiatan menuju alam yang lebih mulia, Rasulullah saw. dan karena Nyalah manusia mampu berhijrah dari suatu masa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada suatu masa yang berperadaban.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa pada proses penulisan karya ilmiah ini tidaklah mudah tentunya banyak rintangan yang telah dilalui untuk sampai pada tahap ini, dengan adanya keuletan, kesungguhan dan kerja keraslah yang menjadi pendorong penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yaitu bapak Jasman, S.Pdi dan ibu Nurifah, S.Pd yang senantiasa dan tidak pernah lelah memberikan dukungan, bantuan, kasih sayangnya serta do'a yang selalu mengiringi perjalanan putri tercintanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan

kepada keluarga besar tercinta yang selalu menjadi *support system* dan menjadi tempat berkeluh kesah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes.,Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr. H. M. Faris Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Apt. Asrul Ismail, S.Farm.,M.Sc selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Apt.
4. Apt. Mukhriani, S.Si., M.Si. selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.

5. Apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Apt. Indah, S.Si., M.Si selaku penguji kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Dra. Audah Mannan, M. Ag selaku penguji agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi atas ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.
9. Adik adikku tercinta, Mamat, Zaki, Adel, Hiqra dan yang paling bungsu yaitu Azig, kalian adalah alasan untuk saya tetap berdiri tegak sampai hari ini ditengah terjaan ombak yang setiap hari semakin deras. Kalian yang selalu hadir dalam hati dan pikiran, sehingga disetiap langkah yang saya ambil dipenuhi semangat dan rasa optimis bahwa saya tidak akan pernah menyerah untuk kalian, *guys I love you.*
10. KOVALEN Farmasi Angkatan 2017 (Keluargaku) yang tak henti-hentinya memberi semangat serta senantiasa saling mendukung dan merangkul dalam segala hal. Saya berasal dari daerah yang cukup jauh dari sini jadi tidak ada keluarga yang bisa selalu kebersamai, tapi semua hal yang saya khawatirkan berubah karena kalian. Karena disetiap sedih dan bahagia, kalian selalu ada, *I wanna say thank you cause without you guys I have nothing.*
11. *Last but not least, I wanna thank me, for always being patient, for staying strong, for believing in me, for doing all these hardwork, for never complaining, for just being me at all times, and for always being happy.*

Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun, senantiasa diharapkan. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang

sebesar-besarnya atas jasa-jasa, kebaikan serta bantuan yang diberikan. Akhirnya semoga skripsi ini memberi manfaat bagi semua pembaca. Aamiin.

Gowa, 13 Januari 2021

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	3
C. <i>Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian</i>	3
D. <i>Kajian Pustaka</i>	4
E. <i>Tujuan Penelitian</i>	6
F. <i>Manfaat Penelitian</i>	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. <i>Pneumonia</i>	7
B. <i>Antibiotik</i>	17
C. <i>Rasionalitas Penggunaan Antibiotik</i>	36
D. <i>Tinjauan Islam Terhadap Pengobatan</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
B. <i>Jenis Penelitian</i>	41
C. <i>Lokasi Penelitian</i>	41
D. <i>Populasi Penelitian</i>	41
E. <i>Sampel Penelitian</i>	41
1. <i>Kriteria Inklusi</i>	41

2. Kriteria Eksklusi.....	42
F. <i>Penentuan Besar Sampel</i>	42
G. <i>Metode Pengumpulan Data</i>	42
H. <i>Teknik Pengambilan Sampel</i>	43
I. <i>Instrumen Penelitian</i>	43
J. <i>Variabel Penelitian</i>	43
1. Variabel Dependent.....	43
2. Variabel Independent.....	43
K. <i>Tahap Penelitian</i>	43
L. <i>Analisis Data</i>	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. <i>Hasil dan Pembahasan</i>	46
1. Karakteristik pasien.....	46
2. Karakteristik Antibiotik.....	48
B. <i>Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Menggunakan Metode Gyssens</i>	50
BAB V PENUTUP.....	55
A. <i>Kesimpulan</i>	55
B. <i>Saran</i>	55
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	59
A. Lampiran 1. <i>Ethical Cleanser</i>	59
B. Lampiran 2. Rekam Medik Pasien Pneumonia.....	60
C. Lampiran 3. Tabel Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pasien Pneumonia di RSUD Majene.....	65
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggolongan Antibiotik Penisilin	23
Tabel 2. Farmakokinetik Untuk Beberapa Penisilin	24
Tabel 3. Penggolongan Antibiotik Sefalosporin	26
Tabel 4. Farmakokinetik Untuk Beberapa Penisilin	27
Tabel 5. Penggolongan Antibiotik Aminoglikosid.....	29
Tabel 6. Penggolongan Antibiotik Tetrasiklin	30
Tabel 7. Distribusi Lama Pemberian Antibiotik	47
Tabel 8. Distribusi Jenis Obat Yang Digunakan	48
Tabel 9. Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Menggunakan	49
Tabel 10. Distribusi dosis pada kategori Ila.....	51

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Evaluasi Antibiotik dengan Menggunakan Metode Gyssens 44
- Gambar 2.** Karakteristik pasien pneumonia berdasarkan umur 45
- Gambar 3.** Karakteristik pasien pneumonia berdasarkan jenis kelamin..... 46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekomendasi Etik	59
Lampiran 2. Rekam Medik Pasien Pneumonia	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Nurul Magfirah
NIM : 70100117052
Judul : Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pada Pasien
Pneumonia di RSUD Majene

Pneumonia merupakan infeksi yang menyebabkan terjadinya peradangan pada jaringan paru sehingga kantung paru berisi infeksius atau eksudat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di RSUD Majene berdasarkan kategori gysens periode Januari-Desember 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan secara retrospektif yaitu mengumpulkan data sekunder berupa rekam medik pasien pneumonia, dengan total sampel 42 yang telah memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laki laki lebih banyak terinfeksi pneumonia dengan kelompok usia terbanyak pada anak (0-5 tahun) dengan 12 pasien dan pada usia lansia (>65 tahun) dengan 11 pasien. Hasil evaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik menggunakan metode gysens diperoleh beberapa kategori. Pada ketegori IVa didapatkan 26.2 % atau sebanyak 11 penggunaan antibiotik. Pada kategori IIIb diperoleh 4.8% atau sebanyak 2 penggunaan, pada kategori IIa diperoleh 23.8% atau sebanyak 10 penggunaan, dan pada kategori 0 didapatkan hasil 45.2% atau sebanyak 19 penggunaan. Pada penelitian ini dari kategori yang dinilai bahwa penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di RSUD Majene tidak rasional.

Kata Kunci: Pneumonia, Antibiotik, Rasionalitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Nama : Nurul Magfirah
NIM : 70100117052
Judul : Evaluation of the Rationality of Antibiotic Use in Patients
Pneumonia at Majene Hospital

Pneumonia is an infection that causes inflammation of the lung tissue so that the lung sacs contain infectious or exudate. This study aims to evaluate the rationality of the use of antibiotics in pneumonia patients in Majene Hospital based on the Gyssens category for the period January-December 2020. This type of research is a descriptive study that was carried out retrospectively, namely collecting secondary data in the form of medical records of pneumonia patients, with a total sample of 42 who met inclusion criteria. The results showed that men were more infected with pneumonia with the most age groups in children (0-5 years) and in the elderly (>65 years). The results of the evaluation of the rationality of the use of antibiotics using the Gyssens method were obtained in several categories. In the IVa category, 26.2% or as many as 11 antibiotics were used. In category IIIb obtained 4.8% or 2 uses, in category IIa obtained 23.8% or as many as 10 uses, and in category 0 obtained results of 45.2% or as many as 19 uses. In this study, from the category it was assessed that the use of antibiotics in pneumonia patients at Majene Hospital was irrational.

Key Word: *Pneumonia, Antibiotic, Rasionality*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pneumonia merupakan infeksi yang menyebabkan terjadinya peradangan pada jaringan paru sehingga kantung paru berisi infeksius atau eksudat. Infeksi ini bisa disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit lainnya. Gejala yang paling umum pada pneumonia yaitu demam, sesak napas, dan batuk (Society et al., 2019).

Penyakit ini merupakan penyakit menular yang tidak mengenal usia baik anak-anak maupun orang dewasa, biasanya balita dan lansia sangat rentan terpapar infeksi ini. Data yang dilaporkan dari WHO bahwa salah satu penyumbang angka kematian yang tinggi adalah infeksi saluran pernapasan termasuk didalamnya influenza serta pneumonia. Pneumonia sangat sering didapati pada pasien yang melakukan rawat jalan, dan pada pasien rawat inap angka mortalitasnya mencapai 5 sampai 15% (Maratus Sholihah, Suradi, 2019).

Menurut Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018, prevalensi pneumonia di setiap provinsi yaitu, di Papua 3,6%, Bengkulu 3,4%, Papua Barat 2,9%, Jawa Barat 2,6%, Aceh 2,5%, Kalimantan Utara 2,4%, Sumatera Selatan 2,4%, DKI Jakarta 2,3%, Sulawesi Barat 2,3%, Sumatera Utara 2,1%, Kalimantan Barat 2,1%, Maluku Utara 2,1%, Lampung 2%, Banten 2%, Jambi 1,9%, Maluku 1,9%, Kalimantan Tengah 1,9%, Jawa Timur 1,8%, Kalimantan Timur 1,8%, Sulawesi Utara 1,8%, Gorontalo 1,8%, Sumatera Barat 1,7%, Kepulauan Seribu 1,7%, Kalimantan Selatan 1,6%, Sulawesi Tengah 1,6%, Sulawesi Utara 1,6%, Riau 1,5%, Bangka Belitung 1,4%, NTB 1,4%, Jogjakarta 1,3%, NTT 1,2%, Bali 1%, hal ini mengalami kenaikan di seluruh Indonesia yaitu 2% (Risksedas, 2018).

Terapi awal yang dapat digunakan pada pengobatan pneumonia adalah antibiotik. Antibiotik merupakan obat yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan sel bakteri, antibiotik yang dapat diberikan yaitu antibiotik spektrum sempit misalnya seftriakson atau ampisilin, maupun pemberian antibiotik dengan spektrum luas seperti kuinolon dan sefalosporine (Rusmini, 2016).

Pemberian antibiotik disetiap terapi sangat penting untuk diperhatikan, karena penggunaan yang tidak tepat dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan dan akan memberikan kerugian kepada pasien (Meriyani et al., 2016). Penggunaan antibiotik dengan baik dan memenuhi standar kerasionalan obat akan mengurangi infeksi sehingga memberikan efek terapi bagi pasien. Namun pemberian antibiotik yang tidak rasional dapat memperluas tingginya resistensi antibiotik, hal tersebut dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas juga akan meningkatkan biaya kesehatan yang digunakan oleh pasien (Syamsul et al., 2019).

Penggunaan obat rasional adalah salah satu upaya dari *World Health Organization* (WHO) untuk mengatasi kondisi dimana lebih dari 50% obat dari seluruh dunia diresepkan, diracik, ataupun dijual dengan tidak tepat dan juga pasien menggunakannya dengan tidak tepat. Penggunaan obat rasional terdiri dari tiga indikator diantaranya persepan, pelayanan kepada pasien, serta fasilitas. Peresepan obat pada pasien yang tidak tepat akan menimbulkan beberapa masalah seperti tidak tercapainya efek terapi yang diharapkan, terjadi peningkatan efek samping pada obat, terjadi resistensi antibiotik, terjadinya infeksi dari ketidaksterilan injeksi yang diberikan, dan pemborosan obat. Untuk itu perlu adanya penjaminan mutu dalam proses penggunaan obat-obatan. Dalam hal ini apoteker atau tenaga kefarmasian harus mengambil tanggung jawab dengan

bekerjasama dengan seluruh profesi kesehatan serta pasien agar penggunaan obat rasional sebagai tujuan terapi dapat tercapai (Pulungan et al., 2019).

Upaya yang dapat dilakukan sebagai seorang mahasiswa khususnya mahasiswa farmasi adalah dengan melakukan evaluasi rasionalitas penggunaan obat terkhusus antibiotik, oleh karena itu peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia di RSUD Majene Sulawesi Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia yang berada di RSUD Majene berdasarkan tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosisnya.

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyebabkan terjadinya peradangan pada satu atau kedua kantung udara di paru paru.
- b. Antibiotik adalah golongan obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri.
- c. Rasionalitas penggunaan obat adalah keadaan dimana pada penggunaan obat sudah sesuai atau tepat indikasi, tepat dosis, tepat pasien, serta frekuensi pemberian yang tepat.
- d. Rekam medik adalah berkas yang berisi dokumen atau catatan pasien berupa identitas, anamnesis, diagnosis, dan pengobatan penderita selama mendapatkan perawatan di rumah sakit.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini termasuk jenis penelitian non eksperimental dengan pengambilan data dari data sekunder (rekam medik) secara deskriptif.

D. *Kajian Pustaka*

1. Penelitian dengan judul “Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Tulungagung” yang dilakukan oleh Ilmi et al pada tahun 2020 dengan menggunakan jenis penelitian observasional, dilakukan dengan metode deskriptif, pengambilan data dilakukan secara retrospektif dari lembar rekam medik pasien dengan diagnosa pneumonia dan mendapatkan terapi antibiotik. Penelitian ini mendapatkan 130 sampel yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dari 171 pasien yang ada. Dari penelitian ini didapatkan hasil evaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia yaitu berdasarkan tepat jenis antibiotik mencapai 85,38% dimana terdapat 19 resep yang tidak tepat pemilihan jenis antibiotik. Tepat frekuensi penggunaan antibiotik dan tepat dosis antibiotik mencapai 100%. Tepat lama penggunaan antibiotik mencapai 42,34% dengan 47 pasien dan terdapat 57,66% ketidaktepatan lama penggunaan dengan 64 pasien. Dari hasil tersebut diketahui bahwa penilaian rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia dengan 4 penilaian ketepatan yaitu tepat jenis antibiotik, tepat dosis, tepat frekuensi penggunaan dan tepat lama penggunaan mencapai 81,93%.
2. Penelitian yang berjudul “Penilaian Terhadap Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pada Balita Penderita Pneumonia Puskesmas Bogor Utara” yang dilakukan oleh Lusi Indriani dan Oktaviana Zunnita pada tahun 2018 dengan menggunakan jenis penelitian observasional deskriptif melalui

pendekatan retrospektif, analisis data menggunakan metode Gyssens dengan jumlah sampel yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi adalah 73 sampel. Dari hasil penelitian didapatkan hasil pada kategori V, IV dan IIIa yaitu 0%, sehingga penggunaan antibiotik pada kategori ini adalah rasional. Pada kategori IIIb didapatkan 9,6% dengan 7 resep, kategori IIIc didapatkan 46,6% dengan 34 resep sehingga penggunaan antibiotik pada kategori ini adalah irrasional.

3. Penelitian yang berjudul “Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik untuk Terapi Infeksi Saluran Pernapasan atas di Rumah Sakit Kota Medan” yang dilakukan oleh Siti Fatimah Hanum dan Siska Famela pada tahun 2018 termasuk penelitian analisis deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif pada catatan medis. Kriteria kerasionalan yaitu evaluasi kerasionalan tepat pasien sebesar 100%. Tepat indikasi 100%. Pada evaluasi kerasionalan tepat obat sebesar 100%, tepat cara pemberian 100% serta tepat dosis terdapat 100%.
4. Penelitian yang berjudul “Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Dengan Pendekatan Metode Gyssens Terhadap Luaran Klinis Pasien Balita Penderita Pneumonia di RSUD Kota Bogor” yang dilakukan oleh Naifah Luthfiyah Putri, Hany Yusmaini, Sugeng Wiyono pada tahun 2020 merupakan penelitian deskriptif dengan desain *cross sectional* menggunakan metode gyssens. Sebanyak 77 pasien rawat inap balita yang telah memenuhi kriteri inklusi didapatkan 37 penggunaan antibiotik yang termasuk dalam kategori tidak rasional. Pada kategori I (tidak tepat waktu pemberian) terdapat 10 penggunaan, kategori IIa (tidak tepat dosis) terdapat 21 penggunaan, kategori IIIb (waktu terlalu singkat) didapatkan 6 penggunaan.

5. Penelitian yang berjudul “Evaluasi Rasionalitas dan Efektifitas Penggunaan Antibiotik pada Pasien Pneumonia Pediatrik di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Pusat Jawa Tengah” yang dilakukan oleh Mahardika Putri Bestari dan Hidayah Karuniawati pada tahun 2017 merupakan penelitian studi observasional yang dilakukan dengan retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan dari 90 kasus yang terinklusi diperoleh pada kategori tepat indikasi 100%, tepat pasien 100%, tepat obat 72,2%, tepat dosis 9,23% sehingga disimpulkan bahwa penggunaan antibiotik di RS tersebut tidak rasional.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di RSUD Majene berdasarkan kategori gyssens.

F. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penggunaan antibiotik yang efektif dan rasional pada pasien pneumonia,
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi objek kajian dalam menambah Ilmu pengetahuan kesehatan terkhusus dalam upaya penggunaan antibiotik yang tepat bagi pasien pneumonia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Pneumonia*

1. Defenisi

Pneumonia adalah salah satu bentuk infeksi saluran pernapasan akut yang menyerang paru-paru. Paru-paru terdiri dari kantung kecil yang disebut alveoli, yang terisi udara saat orang sehat bernapas. Ketika seseorang menderita pneumonia, alveoli berisi nanah dan cairan, yang menyebabkan nyeri saat bernapas dan membatasi asupan oksigen (WHO, 2020).

Pneumonia merupakan inflamasi akut jaringan paru yang penyebabnya adalah infeksi dari patogen yang dapat membahayakan jiwa banyak orang terutama pada lansia, pada orang-orang yang memiliki penyakit kronis dan orang-orang yang mengalami penurunan sistem imun (Asih & Effendy, 2004).

Pneumonia didefinisikan sebagai infeksi akut pada parenkim paru oleh satu atau patogen koinfeksi, tetapi tidak termasuk kondisi bronkiolitis yang terdefinisi dengan baik, sebagian besar penderita pneumonia disebabkan oleh virus (Mackenzie, 2016).

2. Penyebab Pneumonia

Sebuah studi besar 10 negara yang dilakukan lebih dari 25 tahun yang lalu mengungkapkan bahwa virus pernapasan terutama *Respiratory Syncytial Virus* (RSV) menjadi penyebab utama pneumonia dengan penyebab bakteri tersering adalah *S. Pneumoniae* dan *H. influenzae*. Penyebab lain yang sering muncul yaitu rhinovirus, virus influenza, metapneumovirus manusia, dan adenovirus. Juga ditemukan penyebab lain seperti fungi dan dari substansi lain seperti makanan,

meningkatnya asam lambung, atau reaksi hipersensitivitas dan efek samping dari suatu obat (Ditri, 2017).

Beberapa penyebab terjadinya infeksi pneumonia pada anak seperti tidak tercukupinya ASI eksklusif yang didapatkan, kelahiran prematur, terjadinya malnutrisi, tidak lengkapnya imunisasi campak yang diberikan, faktor lingkungan lainnya seperti kondisi ekonomi orang tua anak rendah, kepadatan penduduk, tidak terjangkau akses pelayanan kesehatan, polusi udara di dalam rumah yang biasanya disebabkan oleh aktivitas orang tua yang sering merokok, serta seringnya membawa anak ke dapur (Nikmah *et al*, 2018; Dewiningsih, 2018).

3. Patofisiologi

Pneumonia dapat disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, protozoa atau penyebab lainnya seperti hipersensitivitas pada obat. Mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh akan mencapai paru dengan beberapa jalur yaitu (Asih & Effendy, 2004):

- a. Orang yang mengalami infeksi, ketika batuk, bersin atau berbicara, mikroorganisme akan terlepas di udara dan akan dihirup oleh individu lain.
- b. Mikroorganisme dapat pula mencapai paru melalui kontaminasi yang didapatkan pada peralatan terapi pasien
- c. Mikroorganisme yang terdapat pada individu yang memiliki higiene gigi yang buruk juga dapat menjadi patogenik
- d. Penyebaran lain juga dapat terjadi melalui sirkulasi infeksi sistemik atau pada jamur hipodermik yang telah berinteraksi dengan bakteri

Individu dengan kondisi tubuh yang sehat, patogen telah sampai di paru akan dikeluarkan melalui sistem pertahanan tubuh seperti pada saat batuk atau terjadi fagositosis di dalam sel. Pada individu dengan sistem imun yang tidak

baik sel patogen yang masuk ke dalam tubuh akan membelah dan memperbanyak dirinya kemudian mengeluarkan toksin atau racun yang sifatnya merusak. Reaksi yang terjadi pada antigen dan antibodi serta endotoksin yang dikeluarkan dari mikroorganisme dapat merusak dinding mukosa bronkial dan membran alveolus kapiler. Kemudian terjadi peradangan dan edema sehingga mengakibatkan sel acini dan bronkiolus terminalis terisi oleh patogen yang dapat menyebabkan infeksi (Asih & Effendy, 2004).

4. Manifestasi Klinik

Pada pasien pneumonia gejala klinis yang sering muncul adalah sesak napas dan biasanya sesak napas pada pasien onsetnya kurang dari 24 jam. Keluhan umum pasien pneumonia pada anak biasanya demam dengan pengukuran suhu rata-rata $37,6^{\circ}\text{C}$ juga biasanya disertai dengan batuk serta muntah, takikardia, peningkatan frekuensi pernapasan (takipnea), pernapasan cuping hidung (nasal flaring), ronki dan *wheezing* (Monita et al, 2015).

Menurut (Sari et al, 2016) pada kelompok usia yang lebih tua jarang mengeluhkan batuk dan sesak napas, dan pada kelompok dengan usia muda gejala seperti nyeri dada pleuritik dan hemoptisis lebih sering ditemui. Gejala klinis yang muncul seperti penurunan nafsu makan, hilangnya status fungsional dan jatuh biasanya muncul pada penderita pneumonia dengan usia yang lebih tua.

5. Klasifikasi

Menurut (Mulyana et al, 2019) pneumonia dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelas yaitu:

a. Pneumonia Usia Lanjut

Pada pneumonia jenis ini sering dijumpai penyebab utamanya yaitu bakteri *S. Pneumonia* hal ini diungkapkan oleh beberapa peneliti dahulu. Pneumonia

jenis ini biasanya tidak didapati gejala yang jelas. Menurut beberapa peneliti terdahulu bahwa pada populasi ini jarang terjadi demam dan gejala lainnya yang berkaitan dengan pernapasan. Penelitian yang dilakukan oleh Zalacin et al, melaporkan bahwa manifestasi klinis yang muncul pada pneumonia jenis ini yaitu terjadinya perubahan perilaku atau mental, menurunnya kesadaran, terjadi kelelahan, anoreksia dan dehidrasi.

b. Pneumonia Komunitas

Pneumonia komunitas merupakan peradangan atau infeksi akut paru yang biasanya didapatkan di lingkungan masyarakat. Pneumonia ini biasanya ditandai dengan menurunkan kesadaran, meningkatnya nilai ureum, peningkatan frekuensi bernapas diatas 30 kali per menit, tekanan darah pasien biasanya dibawah angka 90/60 mmHg.

c. Pneumonia Nosokomial

Pneumonia jenis ini adalah infeksi yang penyebabnya didapatkan di rumah sakit atau dari alat ventilator yang pasien gunakan. Biasanya pneumonia ini didapatkan setelah pasien dirawat inap selama dua hari.

6. Terapi Pneumonia

Terapi awal yang dapat digunakan pada pengobatan pneumonia adalah antibiotik. Antibiotik merupakan obat yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan sel bakteri, antibiotik yang dapat diberikan yaitu antibiotik spektrum sempit misalnya seftriakson atau ampisilin, maupun pemberian antibiotik dengan spektrum luas seperti kuinolon dan sefalosporine (Rusmini, 2016).

a. Terapi pada anak

Pada kasus pneumonia anak, WHO mengklasifikasikan pneumonia berdasarkan gejala pernapasan anak-anak usia 2 hingga 59 bulan ke dalam empat

kategori. Anak-anak dengan batuk dan pilek yang tidak memiliki tanda-tanda pneumonia diklasifikasikan sebagai “non-pneumonia”, dan pengasuh mereka disarankan untuk perawatan di rumah yang tepat. Anak-anak dengan pernapasan cepat diklasifikasikan sebagai "pneumonia" dan diberi antibiotik oral (pada saat itu kotrimoksazol oral) untuk dibawa pulang selama lima hari. Anak-anak yang mengalami tarikan dada dengan atau tanpa napas cepat diklasifikasikan sebagai “pneumonia berat” dan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pengobatan dengan penisilin suntik. Anak-anak yang memiliki tanda bahaya umum diklasifikasikan sebagai "pneumonia berat atau penyakit yang sangat parah". Anak-anak ini menerima dosis pertama antibiotik oral dan kemudian segera dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk evaluasi lebih lanjut dan pengobatan dengan antibiotik parenteral (WHO, 2014).

Anak-anak dengan pneumonia pernapasan cepat tanpa penarikan dada atau tanda bahaya umum harus diobati dengan amoksisilin oral: setidaknya 40 mg/kg/dosis dua kali sehari (80mg/kg/hari) selama lima hari. Di daerah dengan prevalensi HIV rendah, berikan amoksisilin selama tiga hari. Anak-anak dengan pneumonia pernapasan cepat yang gagal pada pengobatan lini pertama dengan amoksisilin harus memiliki pilihan rujukan ke fasilitas di mana terdapat pengobatan lini kedua yang sesuai.

- 1) Anak-anak usia 2-59 bulan dengan pneumonia tarikan dada harus diobati dengan amoksisilin oral setidaknya 40mg/kg/dosis dua kali sehari atau 80mg/kg/hari selama lima hari.
- 2) Anak-anak berusia 2-59 bulan dengan pneumonia berat harus diobati dengan ampisilin parenteral (atau penisilin) dan gentamisin sebagai pengobatan lini pertama. Ampisilin: 50 mg/kg, atau penisilin benzil: 50.000 unit per kg IM/IV setiap enam jam selama setidaknya lima hari.

Gentamisin: 7,5 mg/kg IM/IV sekali sehari selama minimal lima hari. Ceftriaxone harus digunakan sebagai pengobatan lini kedua pada anak-anak dengan pneumonia berat yang gagal pada pengobatan lini pertama.

- 3) Ampisilin (atau penisilin bila ampisilin tidak tersedia) ditambah gentamisin atau seftriakson direkomendasikan sebagai rejimen antibiotik lini pertama untuk bayi yang terinfeksi dan terpajan HIV dan untuk anak di bawah usia 5 tahun dengan pneumonia yang ditarik ke dalam dada atau pneumonia berat.
- 4) Untuk bayi yang terinfeksi HIV dan terpajan dan untuk anak-anak dengan pneumonia tarikan dada atau pneumonia berat, yang tidak menanggapi pengobatan dengan ampisilin atau penisilin plus gentamisin, ceftriaxone direkomendasikan untuk digunakan sebagai pengobatan lini kedua.

b. Terapi pneumonia pada dewasa

- 1) Untuk orang dewasa rawat jalan yang sehat tanpa komorbiditas yang tercantum di bawah ini atau faktor risiko untuk patogen resisten antibiotik, direkomendasikan:
 - a) Amoksisilin 1 g tiga kali sehari, atau
 - b) Doksisiklin 100 mg dua kali sehari, atau
 - c) Makrolida (azitromisin 500 mg pada hari pertama kemudian 250 mg) setiap hari, atau
 - d) Klaritromisin 500 mg dua kali sehari atau klaritromisin diperpanjang rilis 1.000 mg setiap hari hanya di area dengan resistensi pneumokokus terhadap makrolida
- 2) Untuk pasien dewasa rawat jalan dengan penyakit penyerta seperti jantung kronis, paru-paru, hati, atau penyakit ginjal, diabetes mellitus, alkoholisme, keganasan, atau asplenia direkomendasikan:

a) Terapi kombinasi:

Amoksisilin/klavulanat 500 mg/125 mg tiga kali sehari, atau amoksisilin/ klavulanat 875 mg/125 mg dua kali setiap hari, atau 2.000 mg/125 mg dua kali setiap hari, atau sefalosporin (cefepodoxime 200 mg dua kali sehari atau cefuroxime 500 mg dua kali sehari), dengan;

Makrolida (azitromisin 500 mg pada hari pertama kemudian 250 mg setiap hari, klaritromisin (500 mg dua kali sehari) atau rilitis diperpanjang 1.000 mg sekali setiap hari), atau doksisisiklin 100 mg dua kali sehari

b) Monoterapi

Fluorokuinolon pernapasan (levofloxacin 750 mg setiap hari, moksifloksasin 400 mg setiap hari, atau gemifloxacin 320 mg setiap hari

c) Orang dewasa rawat inap tidak parah kami direkomendasikan

Terapi kombinasi dengan b-laktam (ampisilin/sulbaktam 1,5–3 g setiap 6 jam, sefotaksim 1-2 g setiap 8 jam, ceftriaxone 1-2 g setiap hari, atau ceftaroline 600 mg setiap 12 jam) dan makrolida (azitromisin 500 mg setiap hari atau klaritromisin 500 mg dua kali sehari) atau

Monoterapi dengan fluorokuinolon (levofloxacin 750 mg setiap hari, moksifloksasin 400 mg setiap hari)

Pilihan ketiga untuk orang dewasa yang memiliki kontraindikasi untuk kedua makrolida dan fluorokuinolon adalah terapi kombinasi dengan b-laktam (ampisilin/sulbaktam, sefotaksim, ceftaroline, atau ceftriaxone, dosis sebagai di atas) dan doksisisiklin 100 mg dua kali setiap hari

7. Metode Untuk Mendiagnosis Pneumonia

a. PCR

Metode untuk pengujian virus pada pernapasan meliputi uji kultur, uji antigen cepat, imunofluoresensi, immunoassay enzim uji, dan PCR. PCR lebih sensitif daripada tes kultur, atau tes immunoassay enzim. Kekuatan PCR ini bermanfaat bagi pasien dewasa yang memiliki virus nasofaring dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan pasien anak. Multiplex RT-PCR berguna untuk menguji secara bersamaan berbagai virus pernapasan (Lee et al, 2018).

PCR dapat menguji berbagai sampel organ pernapasan termasuk sampel nasofaring, sputum, aspirasi saluran napas, dan cairan bronchoalveolar lavage. Dalam kebanyakan penelitian tentang pneumonia yang disebabkan oleh virus pernapasan, pengujian virus dilakukan dengan menggunakan sampel dari saluran napas bagian atas. Pada 20-40% pasien dengan community-acquired pneumonia, virus pernapasan dideteksi dengan PCR. Rhinovirus merupakan virus yang paling sering terdeteksi, dan virus pernapasan lainnya seperti influenza, metapneumovirus, RSV, parainfluenza virus, dan coronavirus juga relatif sering terdeteksi (Lee *et al*, 2018).

Namun, hasil positif dari sampel saluran napas atas tidak selalu mengindikasikan adanya infeksi virus, dan hasil PCR positif tidak menunjukkan bahwa pneumonia disebabkan oleh virus pernapasan. Selain itu, meskipun virus pada pernapasan dapat menyebabkan pneumonia sendiri, mereka mungkin merupakan predisposisi faktor pneumonia. Oleh karena itu, kemungkinan bakterial pneumonia tidak dapat diabaikan begitu saja karena pernapasan bakteri terdeteksi dalam tes PCR. Faktanya, virus pernapasan terdeteksi pada 20% pasien yang didiagnosis dengan bakteri pneumonia (Lee *et al*, 2018).

Tidak jelas apakah penggunaan agen antivirus diperlukan atau tidak ketika virus pernapasan selain influenza terdeteksi, dan sulit untuk mendiagnosis pneumonia virus hanya berdasarkan hasil positif. Dengan mempertimbangkan biaya tes dan berbagai faktor, diperlukan tes PCR untuk mendeteksi virus pernapasan ketika pasien diduga menderita pneumonia yang disebabkan oleh virus pernapasan berdasarkan gejala klinis atau temuan radiografi (Lee *et al*, 2018).

b. Legionella, Mycoplasma, Chlamydia PCR

1) Legionella PCR

Dalam tinjauan sistematis baru-baru ini, sensitivitas uji Legionella PCR menggunakan sampel organ pernapasan adalah 97,4%, dan spesifisitasnya adalah 98,6%. Legionella PCR dapat dilakukan dengan menggunakan sampel nasofaring atau usap hidung ketika tidak ada sputum yang dikeluarkan bahkan dalam analisis sputum yang diinduksi, tetapi metode pengujian ini memiliki tingkat diagnosis yang lebih rendah dibandingkan dengan saat sampel sputum digunakan (Lee *et al*, 2018).

2) Mycoplasma PCR

Berbagai tes serologis telah digunakan secara tradisional untuk mendiagnosis Mycoplasma. Tes ini mungkin gagal mendeteksi antibodi pada periode awal setelah infeksi, dan antibodi Ig M reaksi mungkin tidak terjadi pada orang dewasa berusia 40 tahun atau lebih. Mycoplasma PCR yang menggunakan berbagai sampel organ pernapasan memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan uji serologis, dan memiliki sensitivitas yang hampir sama dengan Legionella PCR. Sama seperti Legionella PCR, Mycoplasma PCR memiliki

tingkat diagnosis yang lebih rendah dengan sampel nasofaring dibandingkan dengan sampel dahak (Lee *et al*, 2018).

3) PCR Chlamydomphila

Tes serologis untuk Chlamydomphila memiliki spesifisitas yang lebih rendah dibandingkan dengan PCR, dan dapat melaporkan hasil negatif palsu pada periode awal setelah infeksi seperti halnya dengan infeksi Mycoplasma. Untuk alasan ini, PCR mungkin lebih berguna daripada tes serologis untuk mendiagnosis infeksi Chlamydomphila. Meskipun sensitivitas PCR Chlamydomphila belum diukur secara akurat, PCR Chlamydomphila dilaporkan memiliki spesifisitas yang tinggi (Lee *et al*, 2018).

c. CT

Chest computed tomography (CT) adalah tes yang paling akurat untuk menilai anomali parenkim. Temuan radiografi yang menunjukkan pneumonia dapat diamati bahkan ketika tidak ada anomali yang diamati pada rontgen dada. CT dada lebih akurat daripada rontgen dada dalam mendiagnosis komplikasi seperti pleuritis dan nekrosis paru, diagnosis eksklusif dan diagnosis banding non-infeksi penyakit paru seperti atelektasis, infark paru, tumor, dan penyakit paru interstisial yang mungkin menunjukkan karakteristik sama seperti pneumonia pada sinar-X. Karena temuan CT dapat bervariasi tergantung pada identitas penyebab bakteri pneumonia, CT berguna untuk mengidentifikasi penyebab bakteri. Temuan CT sugestif mikobakteri yang harus dibedakan dari pneumonia umum, dan infeksi paru-paru jamur juga dapat diperoleh (Lee *et al*, 2018).

Namun, karena biaya yang relatif tinggi dan bahaya radiasi dibandingkan dengan sinar-X dada, CT harus dilakukan secara selektif dalam kasus dimana

diferensiasi penyerta penyakit seperti emboli paru diperlukan, diduga infeksi jamur, sulit untuk memeriksa infiltrasi paru-paru pada rontgen dada karena paru-paru lain yang mendasari penyakit, dan sulit untuk memeriksa komplikasi pneumonia karena kurangnya respons terhadap pengobatan pneumonia (Lee *et al*, 2018).

d. USG Dada

USG dada digunakan dalam diagnosis berbagai penyakit paru-paru seperti pneumotoraks, hidrotoraks, dan enema paru, serta pneumonia. Meta-analisis menggunakan data dari 1.172 pasien yang didiagnosis dengan pneumonia, USG dada memiliki sensitivitas dan spesifisitas sangat baik yang masing-masing 94% dan 96%, dalam diagnosis pneumonia. Dibandingkan dengan rontgen dada, USG dada tidak menimbulkan beban paparan radiasi, dapat dilakukan tepat di sebelah pasien, dapat dilakukan pada wanita hamil, dan dapat mendiagnosis konsolidasi paru dan hidrotoraks secara lebih akurat. Hal ini juga berguna untuk mengevaluasi hidrotoraks, yang dapat terjadi sebagai komplikasi pneumonia (Lee *et al*, 2018).

B. Antibiotik

1. Defenisi

Istilah antibiotik pertama kali digunakan pada tahun 1942 oleh Selman Waksman dan rekan-rekannya dalam jurnal untuk menggambarkan setiap zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang antagonis terhadap pertumbuhan mikroorganisme lain dalam pengenceran tinggi. Definisi ini mengecualikan zat yang membunuh bakteri tetapi tidak diproduksi oleh mikroorganisme (hidrogen peroksida). Ini juga mengecualikan senyawa antibakteri sintetis seperti sulfonamida. Dalam penggunaan saat ini, istilah "antibiotik" diterapkan pada obat apa pun yang membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhannya, terlepas dari

apakah obat itu diproduksi oleh mikroorganisme atau tidak (Singh *et al*, 2018).

Antibiotik adalah obat yang diperuntukkan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik yang digunakan dapat bersifat bakterisid atau dengan cara membunuh bakteri maupun bersifat bakteriostatik atau dengan cara mencegah terjadinya perkembangbiakan pada bakteri (P *et al.*, 2014).

Antibiotika adalah suatu substansi kimia yang dibentuk atau diperoleh dari berbagai spesies mikroorganisme, yang dalam konsentrasi rendah mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Antibiotika tersebar di dalam alam dan memegang peranan penting dalam mengatur populasi mikroba dalam tanah, air, limbah, dan kompos. Antibiotika ini memiliki susunan kimia dan cara kerja yang berbeda-beda sehingga masing-masing antibiotika memiliki kuman standar tertentu. Dari sekian banyak antibiotika yang telah berhasil ditemukan, hanya beberapa saja yang cukup tidak toksik untuk dapat dipakai dalam pengobatan (Kemenkes RI, 2017).

Menurut Kemenkes RI, tahun 2017 suatu bahan yang dapat diklasifikasikan menjadi sebuah antibiotik apabila:

- a. Bahan tersebut merupakan produk metabolisme dari alami ataupun sintesis
- b. Bahan tersebut adalah produk sintesis yang dihasilkan sebagai analog struktur suatu antibiotika yang terdapat di alam
- c. Bahan tersebut mengantagonis pertumbuhan atau keselamatan suatu spesies mikroorganisme atau lebih
- d. Bahan tersebut efektif dalam konsentrasi rendah

2. Penggolongan Antibiotik

Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan antibiotik tetapi klasifikasi yang paling umum didasarkan pada struktur molekulnya, cara kerjanya dan spektrum aktivitasnya. Lainnya termasuk rute pemberian (suntikan, oral dan topikal). Antibiotik dalam kelas struktural yang sama umumnya akan menunjukkan pola efektivitas, toksisitas, dan potensi efek samping yang serupa. Penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya dibedakan menjadi (Etebu & Ariekpar, 2020):

a. Penghambatan Sintesis Dinding Sel

Sebagian besar sel bakteri terbungkus oleh lapisan kaku peptidoglikan (PG), yang melindungi sel-sel dalam menghadapi yang tekanan osmotik yang berlaku konsisten dengan lingkungan dan kondisi di mana mereka berada. Untuk tetap hidup, bakteri harus mensintesis peptidoglikan, mereka melakukan ini dengan aktivitas PBPs yang merupakan transglikosilase dan transpeptidase. Kedua enzim ini berperan penting dengan menambahkan pentapeptida disakarida untuk memperpanjang untaian glikan dari molekul peptidoglikan yang ada dan juga untaian ikatan silang dari unit peptidoglikan yang belum matang.

Obat-obatan seperti penisilin, karbapenem dan sefalosporin mampu memblokir ikatan silang unit peptidoglikan dengan menghambat pembentukan ikatan peptida yang dikatalisis oleh PBPs.

Kebanyakan antibiotik termasuk dalam kelas glikopeptida antibiotik (misalnya vankomisin) mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan menghambat sintesis peptidoglikan. Mereka menghambat sintesis peptidoglikan dengan mengikatkan diri pada peptidoglikan unit, serta memblokir transglikosilase dan aktivitas transpeptidase.

b. Kerusakan Struktur Membran Sel Atau Fungsi

Kelas antibiotik yang merusak membran sel bakteri spesifik di setiap kelompok mikroba berdasarkan perbedaan jenis lipid dalam sel membran mereka. Misalnya, Daptomisin mendepolarisasi membran yang bergantung pada kalsium, dan itu mengarah ke penghentian sintesis makromolekul dan gangguan membran sel pada bakteri.

Polimiksin menyebabkan disintegrasi sel bakteri membran dengan mengikat secara efektif bagian lipid dari lipopolisakarida dalam sel bakteri.

c. Penghambatan Sintesis Asam Nukleat

Jalur metabolisme yang menghasilkan sintesis nukleat asam sangat penting; gangguan asam nukleat sintesis bertentangan dengan kelangsungan hidup dan keturunan sel bakteri. Antibiotik mengganggu sintesis asam nukleat dengan memblokir replikasi atau menghentikan transkripsi. Replikasi DNA melibatkan pelepasan tradisional struktur heliks ganda, proses yang difasilitasi oleh enzim helikase.

Kuinolon kelompok antibiotik, misalnya, memang mengganggu fungsi enzim helikase sehingga mengganggu enzim dari memainkan fungsinya sebagai pelepas DNA. Ini tindakan antibiotik dari kuinolon akhirnya memotong proses replikasi dan perbaikan DNA di antara bakteri yang rentan. Antibiotik yang modus aksinya adalah penghambatan asam nukleat sintesis juga menargetkan topoisomerase II dan topoisomerase IV dari bakteri. Mengganggu aktivitas enzim pada bakteri ini mempengaruhi RNA secara negatif polimerase yang pada gilirannya mencegah sintesis RNA.

d. Penghambatan Sintesis Protein

Makhluk hidup termasuk bakteri ditentukan oleh jumlah dan jenis protein yang menyusunnya, dan terus diproduksi. Protein bertanggung jawab atas

komposisi struktural, proses metabolisme dan fisiologis, dan respons terhadap kondisi buruk, di antara peran lainnya. Namun, jenis dan jumlah protein yang dihasilkan oleh suatu bakteri pada waktu tertentu bergantung pada informasi yang terkandung dalam biomolekul asam deoksiribonukleat (DNA) lain yang sangat penting. DNA menentukan jenis protein yang dihasilkan sel bakteri melalui informasi tertentu yang disimpan di dalamnya. Informasi tersebut adalah sekumpulan kode genetik yang disebut kodon, diturunkan ke biomolekul asam ribonukleat (RNA) yang identik, khususnya RNA pembawa pesan (mRNA). Transfer RNA (tRNA), biomolekul serupa juga dibentuk di bawah arahan DNA. Biomolekul ini bersama dengan mRNA bergerak ke ribosom, pabrik untuk sintesis protein dalam sel hidup, tRNA kemudian menguraikan kodon yang terkandung dalam mRNA dan memfasilitasi terjemahan urutan kodon menjadi urutan asam amino yang merupakan blok pembangun protein.

Mengingat pentingnya protein dalam proses metabolisme dan kehidupan semua organisme hidup, apa pun yang mengganggu proses sintesisnya dalam sel bakteri pada akhirnya akan melumpuhkan sel; menghambat pertumbuhannya atau bahkan membunuhnya sama sekali.

Di antara inhibitor ribosom, subkelas aminoglikosida yang diturunkan secara alami adalah satu-satunya yang bersifat bakterisidal. Makrolida, streptogramin, spektinomisin, tetrasiklin, dan kloramfenikol biasanya bersifat bakteriostatik. Namun, beberapa antibiotik penghambat ribosom yang biasanya bersifat bakteriostatik dapat menjadi bakterisidal dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan spesies atau cara pengobatan tertentu. Misalnya, kloramfenikol yang biasanya dikenal sebagai bakteriostatik telah terbukti efektif membunuh *S. pneumoniae* dan *Neisseria meningitidis*, serta *H. influenzae*. Variabilitas spesifik spesies dalam penghambatan ribosom atau kematian sel yang dimediasi

berpotensi terkait dengan perbedaan urutan di antara spesies bakteri di wilayah variabel dari protein ribosom dan RNA yang sangat terkonservasi.

e. Penyumbatan Jalur Metabolisme Utama

Beberapa antibiotik seperti sulfonamida dan trimetoprim telah terbukti meniru substrat yang dibutuhkan untuk metabolisme sel bakteri. Penipuan ini menyebabkan enzim bakteri menempel pada antibiotik bukan pada substratnya. Secara khusus, sulfonamida bertindak seperti tetrahidrofolat yang diperlukan untuk sintesis asam folat dalam sel bakteri. Asam folat sangat penting dalam metabolisme asam nukleat dan asam amino. Karena alasan ini, sulfonamida pada akhirnya mengganggu produksi asam nukleat (DNA dan RNA) dan asam amino, karena mereka meniru substrat yang dibutuhkan untuk metabolisme asam folat.

Menurut (Kesehatan & Indonesia, 2011) penggolongan antibiotik yaitu:

a. Obat yang Menghambat Sintesis atau Merusak Dinding Sel bakteri

1) Antibiotik Beta-Laktam

Antibiotik ini terdiri atas golongan obat yang strukturnya memiliki cincin beta laktam. Anggota kelas antibiotik ini mengandung cincin 3-karbon dan 1-nitrogen yang sangat reaktif. Mereka mengganggu protein yang penting untuk sintesis dinding sel bakteri, dan dalam prosesnya membunuh atau menghambat pertumbuhannya. Enzim bakteri tertentu yang disebut protein pengikat penisilin (PBP) bertanggung jawab untuk menghubungkan unit peptida selama sintesis peptidoglikan. Kelompok antibiotik beta-laktam mampu mengikat diri pada enzim PBP ini, dan dalam prosesnya, mereka mengganggu sintesis peptidoglikan yang mengakibatkan lisis dan kematian sel. Beberapa contoh kelas beta-laktam termasuk Penisilin, Sefalosporin, Monobaktam, dan Karbapenem.

a) Penisilin

Antibiotik pertama, penisilin, yang pertama kali ditemukan dan dilaporkan pada tahun 1929 oleh Alexander Fleming kemudian ditemukan di antara beberapa senyawa antibiotik lain yang disebut penisilin. Penisilin terlibat dalam kelas kelompok senyawa yang beragam, yang sebagian besar diakhiri dengan akhiran -cillin. Mereka adalah senyawa beta-laktam yang mengandung inti cincin 6-animopenicillanic acid dan rantai samping cincin lainnya. Anggota kelas Penisilin termasuk Penisilin G, Penisilin V, Oksasilin (dikloksasilin), Methicillin, Nafcillin, Ampicillin, Amoxicillin, Carbenicilin, Piperacillin, Mezlocillin dan Ticarcillin.

Seperti halnya setiap sistem interaksi biologis di mana sistem kehidupan berusaha melindungi diri dari serangan, bakteri tertentu mampu melawan aktivitas antibiotik dengan mengkodekan enzim. Mengingat hal ini, beberapa antibiotik seperti ampisilin, karbenisilin dan amoksisilin telah dikembangkan secara semi sintetik dengan rantai samping yang berbeda. Rantai samping ini memberikan antibiotik kemampuan untuk menghindari kapasitas degradatif enzim tertentu yang dihasilkan oleh strain bakteri tertentu serta memfasilitasi pergerakan antibiotik melintasi membran luar dinding sel bakteri tersebut. Kemampuan bercabang ganda ini meningkatkan spektrum aktivitasnya melawan bakteri Gram-negatif.

Tabel 1. Antibiotik Golongan Penisilin

Golongan	Contoh	Aktivitas
Penisilin G dan Penisilin V	Penisilin G dan Penisilin V	Sangat aktif terhadap kokus Gram-positif, tetapi cepat dihidrolisis oleh penisilinase atau beta-laktamase, sehingga tidak efektif terhadap <i>S.aureus</i> .
Penisilin yang resisten terhadap beta-laktamase/	Metisilin, nafsilin, oksasilin, kloksasilin, dan	Merupakan obat pilihan utama untuk terapi <i>S.aureus</i> yang memproduksi penisilinase.

penisilinase	Dikloksasilin	Aktivitas antibiotik kurang poten terhadap mikroorganisme yang sensitif terhadap penisilin G.
Aminopenisilin	Ampisilin, amoksisilin	Selain mempunyai aktivitas terhadap bakteri Gram-positif, juga mencakup mikroorganisme Gram-negatif, seperti Haemophilus influenzae, Escherichia coli, dan Proteus mirabilis. Obat-obat ini sering diberikan bersama inhibitor beta-laktamase (asam klavulanat, sulbaktam, tazobaktam) untuk mencegah hidrolisis oleh beta-laktamase yang semakin banyak ditemukan pada bakteri Gram-negatif ini.
Karboksipenisilin	Karbenisilin, tikarsilin	Antibiotik untuk Pseudomonas, Enterobacter, dan Proteus. Aktivitas antibiotik lebih rendah dibanding ampisilin terhadap kokus Gram-positif, dan kurang aktif dibanding piperasilin dalam melawan Pseudomonas. Golongan ini dirusak oleh beta-laktamase.
Uroidepenisilin	Mezlosilin, azlosilin, dan piperasilin	Aktivitas antibiotik terhadap Pseudomonas, Klebsiella, dan Gram-negatif lainnya. Golongan ini dirusak oleh beta-laktamase

Tabel 2. Farmakokinetik Untuk Beberapa Penisilin

Obat	Cara Pemberian	Waktu Paruh (Jam)	Ekskresi Ginjal (%)
Penisilin alami			
Penisilin G dan Penisilin V	Intramuskular. Intravena	0.5	79 – 85
	Oral	0.5	20 – 40
Penisilin yang resisten terhadap betalaktamase	Intramuskular Intravena	0.8 – 1.2	31 – 38

atau penisilinase aminopenisilin			
Nafisilin			
Oksasilin	Intramuskular. Intravena	0.4 – 0.7	39 – 66
Klokasilin	Oral	0.5 – 0.6	49 – 70
Dikloksasilin	Oral	0.6 – 0.8	35 – 90
Aminopenisilin			
Ampisilin	Oral. Intramuskular. Intravena	1.1 – 1.5	40 – 92
Amoksisilin	Oral	1.4 – 2.0	86
Penisilin Anti-pseudomonas			
Karbenisilin	Oral	0.8 – 1.2	85
Mezlosilin	Intramuskular. Intravena	0.9 – 1.7	61 – 69
Piperasilin	Intramuskular. Intravena	0.8 – 1.1	74 – 89
Tikarsilin	Intramuskular. Intravena	1.0 – 1.4	95

b) Sefalosporin

Anggota kelompok antibiotik ini mirip dengan penisilin dalam struktur dan cara kerjanya. Keduanya merupakan bagian dari antibiotik yang paling sering diresepkan dan diberikan. Sefalosporin digunakan dalam pengobatan infeksi bakteri dan penyakit yang timbul dari penghasil Penisilinase, Staphylococci dan Streptococci yang rentan terhadap Methicillin, Proteus mirabilis, beberapa Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Haemophilus influenza, Enterobacter aerogenes dan beberapa Neisseria.

Sefalosporin memiliki berbagai rantai samping yang memungkinkan mereka menempel pada protein pengikat penisilin (PBPs) yang berbeda, untuk menghindari sawar darah otak, menahan kerusakan oleh strain bakteri penghasil penisilinase dan terionisasi untuk memfasilitasi masuknya ke dalam sel bakteri Gram-negatif.

Tabel 3. Penggolongan Antibiotik Sefalosporin

Generasi	Contoh	Aktivitas
I	Sefaleksin, sefalofepim, sefalotriksim, sefalotim, sefazolin, sefradin, sefadroksil	Antibiotik yang efektif terhadap Gram-positif dan memiliki aktivitas sedang terhadap Gram-negatif.
II	Metisilin, nafsilin, oksasilin, kloksasilin, dan dikloksasilin	Aktivitas antibiotik Gram-negatif yang lebih tinggi daripada generasi-I.
III	Ampisilin, amoksisilin	Aktivitas kurang aktif terhadap kokus Gram-positif dibanding generasi-I, tapi lebih aktif terhadap Enterobacteriaceae, termasuk strain yang memproduksi beta-laktamase. Seftazidim dan sefoperazon juga aktif terhadap <i>P.aeruginosa</i> , tapi kurang aktif dibanding generasi- III lainnya terhadap kokus Gram-positif.
IV	Karbenisilin, tikarsilin	Antibiotik untuk <i>Pseudomonas</i> , <i>Enterobacter</i> , dan <i>Proteus</i> . Aktivitas antibiotik lebih rendah dibanding ampisilin terhadap kokus Gram-positif, dan kurang aktif dibanding piperasilin dalam melawan <i>Pseudomonas</i> . Golongan ini dirusak oleh beta-laktamase.
Uroidepenisilin	Mezlosilin, azlosilin, dan piperasilin	Aktivitas lebih luas dibanding generasi-III dan tahan terhadap beta-laktamase.

Tabel 4. Farmakokinetik untuk Beberapa Sefalosporin

Obat	Cara Pemberian	Waktu Paruh (Jam)	Ekskresi Ginjal (%)
Generasi I			
Sefadroksil	Oral	1.2 – 2.5	70 – 90
Sefazolin	Intramuskular.	1.5 – 2.5	70 – 95
	Intravena		
Sefaleksin	Oral	1.0	95
Sefapirin	Intramuskular.	0.6	50 – 70
	Intravena		
Sefradin	Oral	0.7	75 – 100
Generasi II			
Sefaklor	Oral	0.6 – 0.9	60 – 85
Sefamandol	Intramuskular.	0.5 – 1.2	100
	Intravena		
Sefmetazole	Intravena	1.2 – 1.5	85
Sefonisid	Intramuskular.	3.5 – 4.5	95 – 99
	Intravena		
Sefotetan	Intramuskular.	2.8 – 4.6	60 – 91
	Intravena		
Sefoksitin	Intramuskular.	0.7 – 1.0	85
	Intravena		
Sefprozil	Oral	1.2 – 1.4	64
Sefuroksim	Intramuskular.	1.1 – 1.3	95
	Intravena		
Sefuroksim aksetil	Oral	1.1 – 1.3	52
Generasi III			
Sefdinir	Oral	1.7	18
Sefepim	Intramuskular.	2.0	70 – 90

	Intravena		
Sefiksim	Oral	2.3 – 3.7	
Sefoperazone	Intramuskular.	2.0	20 – 30
	Intravena		
Sefotaksim	Intramuskular.	1.0	40 – 60
	Intravena		
Karbapenem			
Imipenimsilastatin	Intramuskular.	1.0	50 – 70
	Intravena		
Meropenem	Intravena	1.0	79
Monobaktam			
Aztreonam		2.0	75
Generasi IV			
Seftazidim	Intramuskular.	1.9	NA
	Intravena		
Sefepim	Intramuskular	2.0	NA

c) Monobaktam

Penemuan antibiotik kelas ini pertama kali dilaporkan oleh Skyes dan rekan kerjanya. Antibiotik diperoleh dari bakteri *Chromobacterium violaceum*. Mereka adalah bagian dari senyawa beta-laktam tetapi tidak seperti kebanyakan beta-laktam lainnya, cincin beta-laktam monobaktam berdiri sendiri dan tidak menyatu dengan cincin lain. Aztreonam adalah satu-satunya antibiotik monobaktam yang tersedia secara komersial, dengan spektrum aktivitas yang sempit. Aztreonam hanya aktif melawan bakteri gram negatif aerobik seperti *Neisseria* dan *Pseudomonas*; digunakan untuk mengobati pneumonia, sepsikemia dan infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh kelompok bakteri ini. Monobaktam tidak efektif melawan bakteri Gram-positif atau anaerob.

Contoh obatnya yaitu aztreonam, pemberiannya secara parenteral dengan waktu paruh 1.7 jam diekskresikan sebagian besar melalui urin.

d) Basitrasin

Merupakan antibiotik dengan kelompok yang tersusun dari antibiotik polipeptida seperti basitrasin A. Basitrasin biasanya terdapat dalam bentuk salep untuk mata dan kulit, juga tersedia secara topikal dalam bentuk bedak. Jarang terjadi hipersensitivitas pada penggunaan basitrasin.

e) Vankomisin

Vankosimin adalah antibiotik sebagai lini ke-tiga yang aktif dalam penghambatan bakteri Gram Positif. Penggunaan vankosimin yaitu secara IV, memiliki waktu paruh yaitu 6 jam. Pengikatan antibiotik ke targetnya terjadi melalui pembentukan 5 ikatan hidrogen dengan tulang punggung peptidik obat.

Vankomisin hanya diindikasikan untuk infeksi yang disebabkan oleh *S.aureus* yang resisten terhadap metisilin (MRSA). Semua basil Gram-negatif dan mikobakteria resisten terhadap vankomisin. Vankomisin diberikan secara intravena, dengan waktu paruh sekitar 6 jam. Efek sampingnya adalah reaksi hipersensitivitas, demam, flushing dan hipotensi (pada infus cepat), serta gangguan pendengaran dan nefrotoksisitas pada dosis tinggi.

b. Obat Penghambat Sintesis Protein

1) Aminoglikosid

Obat pertama yang ditemukan di antara anggota kelas antibiotik ini adalah streptomisin, pertama kali diisolasi pada tahun 1943. Aminoglikosida adalah senyawa yang biasanya terdiri dari 3 gula amino yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik

Aminoglikosida memiliki spektrum aktivitas antibakteri yang luas. Mereka mampu menghambat sintesis protein pada bakteri dengan mengikat salah satu

subunit ribosom dan efektif terhadap aerobik batang Gram-negatif dan bakteri Gram-positif tertentu. Terlepas dari efektivitasnya terhadap beragam infeksi, streptomisin ditemukan sangat beracun. Fitur obat yang tidak menguntungkan ini mengharuskan kebutuhan untuk mencari anggota baru aminoglikosida yang masih efektif melawan bakteri tetapi kurang beracun bagi manusia. Kemudian ditemukan antibiotik seperti Gentamicin, Neomycin, Tobramycin dan Amikacin. Gentamisin kurang beracun dan banyak digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh batang Gram-negatif (*Escherichia*, *Pseudomonas*, *Shigella* dan *Salmonella*).

Tabel 5. Penggolongan dan Farmakokinetik untuk beberapa Aminoglikosid

Obat	Waktu Paruh (Jam)	Kadar Terapeutik ($\mu\text{g/mL}$)	Kadar Toksik ($\mu\text{g/mL}$)
Streptomisin	2 – 3	25	50
Neomisin	3	5 – 10	10
Kanamisin	2.0 – 2.5	8 – 16	35
Gentamisin	1.2 – 5.0	4 – 10	12
Tobramisin	2.0 – 3.0	4 – 8	12oksa
Amikasin	0.8 – 2.8	8 – 16	35
C Netilmisin	2.0 – 2.5	0.5 – 10	16

2) Tetrasiklin

Tetrasiklin ditemukan pada tahun 1945 dari bakteri tanah dari genus *Streptomyces* oleh Benjamin Duggar. Anggota kelas ini memiliki empat (4) cincin hidrokarbon dan mereka dikenal dengan nama dengan akhiran –siklin. Antibiotik yang diperoleh dengan biosintesis dianggap sebagai generasi pertama seperti Tetracycline, Chlortetecycline, Oxytetracycline dan Demeclocycline. Antibiotik lain seperti Doxycycline, Lymecycline, Meclo cycline, Methacycline, Minocycline, dan Rolitetracycline dianggap generasi kedua karena merupakan turunan dari semi-sintesis. Yang diperoleh dari sintesis total seperti Tigecycline dianggap sebagai generasi ketiga.

Target aktivitas antimikroba mereka pada bakteri adalah ribosom. Dengan mengganggu penambahan asam amino pada rantai polipeptida selama sintesis protein di organel bakteri ini. Pasien disarankan untuk mengambil tetrasiklin setidaknya dua jam sebelum atau sesudah makan untuk penyerapan yang lebih baik. Semua tetrasiklin direkomendasikan untuk pasien di atas delapan (8) tahun karena obat tersebut telah terbukti menyebabkan perubahan warna gigi pada pasien di bawah usia ini dapat digunakan untuk mengobati malaria, kaki gajah, parasit amuba dan rickettsia.

Tabel 6. Penggolongan Antibiotik Tetrasiklin

Obat	Cara Pemberian	Waktu Paruh (Jam)	Ekskresi Ginjal (%)
Tetrasiklin HCl	Oral, Intravena	8	25 – 60
Klortetrasiklin HCl	Oral, Intravena	6	40 – 70
Oksitetrasiklin HCl	Oral, Intravena	9	20 – 35
Demoklosiklin HCl	Oral	12	40 – 90
Metasiklin HCl	Oral	13	75 – 90
Doksisiklin	Oral, Intravena	18	25 – 90
Minosiklin HCl	Oral, Intravena	16	70 – 75

3) Kloramfenikol

Antibiotik yang memiliki spektrum yang luas, dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif maupun negatif, dari bakteri aerob maupun anaerob. Kloramfenikol dapat menyebabkan efek samping berupa supresi pada sumsum tulang, pada anak terjadi neutritis serta terjadi pertumbuhan kandida pada saluran pencernaan.

4) Makrolida

Antibiotik pertama yang termasuk dalam kelas ini pertama kali ditemukan dan diisolasi pada tahun 1952 sebagai produk metabolisme dari jamur yang menghuni tanah *Saccharopolyspora erythraea*. Makrolida dicirikan oleh cincin laktosa makrosiklik beranggota 14, 15, atau 16 dengan gula deoksi yang tidak

biasa L-cladinose dan D-desosamin terpasang. Mereka memiliki spektrum aktivitas antibiotik yang lebih luas daripada Penisilin dan sering diberikan kepada pasien yang alergi terhadap penisilin. Makrolida membunuh atau menghambat mikroorganisme dengan secara efektif menghambat sintesis protein bakteri. Mereka melakukannya dengan mengikat ribosom bakteri, dan dalam prosesnya, mencegah penambahan asam amino ke rantai polipeptida selama sintesis protein. Makrolida cenderung menumpuk di dalam tubuh karena hati mampu mendaur ulangnya ke dalam empedu. Mereka juga memiliki kapasitas untuk menyebabkan peradangan.

Merupakan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang bersifat Gram positif. Contoh obat ini yaitu eritromisin, azitromisin, klaritromisin, roksitrimisin.

5) Klindamisin

Merupakan antibiotik penghambat bakteri kokus Gram positif dan juga menghambat beberapa bakteri anaerob namun tidak pada bakteri Gram negatif aerob seperti *Hemophilus*, *Micoplasma* juga *Clamydia*. Antibiotik ini memiliki beberapa efek samping diantaranya diare dan entrokollitis pseudomembranosa.

6) Mupirosin

Merupakan antibiotik yang penggunaannya diperuntukkan untuk penggunaan luar (topikal), bentuk sediaannya yaitu salep dan krim yang aktif terhadap bakteri Gram positif juga sebagian besar bakteri Gram negatif. Antibiotik ini memiliki beberapa efek samping dalam penggunaannya misalnya iritasi pada kulit, mukosa dan juga sensitasi.

7) Spektinomisin

Merupakan antibiotik yang pemberiannya secara IV (intramuskular), apabila pada infeksi gonokokus lini pertama tidak bisa digunakan maka obat ini bisa menjadi lini kedua dari pengobatan tersebut.

c. Penghambat enzim esensial

1) Sulfonamida & Trimetoprin

Sulphonamida dilaporkan sebagai kelompok antibiotik pertama yang digunakan dalam pengobatan terapeutik, dan mereka masih memainkan peran yang sangat penting dalam pengobatan. Sulphonamides menghambat bakteri Gram-positif dan Gram-negatif seperti *Nocardia*, *E. coli*, *Klebsiella*, *Salmonella*, *Shigella* dan *Enterobacter*, *Chlamydia trachomatis* dan beberapa Protozoa, dan secara luas digunakan dalam pengobatan berbagai infeksi termasuk tonsilitis, septikemia, meningitis meningokokus, disentri basiler dan beberapa infeksi saluran kemih. Penelitian telah menunjukkan bahwa Sulphonamides juga mampu menghambat agen sel kanker. Sulfonamida antibakteri asli adalah agen antimikroba sintetis yang mengandung kelompok sulfonamida. Sulphonamida umumnya dianggap bakteriostatik daripada bakterisida.

Namun penelitian lain menunjukkan bahwa sulfonamida dapat menjadi bakterisida jika konsentrasinya cukup tinggi atau jika adanya konsentrasi sulfonamida disertai dengan kondisi lingkungan lain yang tidak menguntungkan bagi bakteri. Kondisi yang tidak menguntungkan tersebut akan mencakup kondisi budaya yang buruk, suhu yang merugikan, antibodi, produk proteolitik beracun, dll.

Meskipun sulfonamid dinilai baik dan efektif dalam mengobati berbagai penyakit dan infeksi, sulfonamid direkomendasikan dan diberikan dengan hati-

hati karena toksisitas dan efek sampingnya, beberapa di antaranya yang meliputi gangguan saluran kemih, anemia hemolitik, porfiria, dan reaksi hipersensitivitas.

d. Penghambat metabolisme asam nukleat

1) Kuinolon

Kelas antibiotik ini pertama kali ditemukan sebagai asam nalidixat oleh para ilmuwan yang terlibat dalam pencarian obat antimalaria. Asam nalidixat ditemukan mampu mengganggu replikasi dan transkripsi DNA pada bakteri. Dua kelompok utama senyawa telah dikembangkan dari molekul dasar: kuinolon dan naphthyridones yang meliputi cinoxacin, norfloxacin, ofloxacin, ciproxacin, temafloxacin, sparfloxacin, asam nalidixat, enoxacin. Struktur umumnya terdiri dari dua cincin tetapi generasi terbaru kuinolon memiliki struktur cincin tambahan yang memungkinkan mereka untuk memperluas spektrum aktivitas antimikroba mereka ke beberapa bakteri, terutama bakteri anaerob yang sampai sekarang resisten terhadap kuinolon.

Modifikasi dalam struktur dasar kuinolon dilaporkan telah meningkatkan bioavailabilitasnya dan meningkatkan spektrum aktivitas dan potensinya, meningkatkan kinerja mereka dalam pengobatan berbagai bentuk penyakit seperti infeksi saluran kemih, sistemik dan pernapasan. Meskipun prestasi penting ini, masih ada masalah keamanan dengan beberapa anggota kelas antibiotik yang telah menyebabkan penarikan grepafloxacin, sparfloxacin, temafloxacin, trovafloxacin dll, semua milik kelas kuinolon, dari pasaran. Meskipun banyak kemajuan sedang dibuat dalam hal *in vitro* studi dan farmakodinamik, pengetahuan tentang dinamika toksisitas di antara beberapa kelas antibiotik ini belum meyakinkan.

Asam Nalidixat, merupakan antibiotik yang sifatnya bakteriostatik terhadap bakteri *Enterobacteriaceae*

Fluorokuinolon, merupakan antibiotik yang diperuntukkan untuk mengatasi infeksi gonokokus, contohnya yaitu norfloksasin, levofloksasin dan yang lainnya

2) Nitrofurantoin

Merupakan antibiotik yang sifatnya bakteristatik terhadap beberapa bakteri Gram positif maupun Gram negatif, contoh obatnya yaitu furozolidin juga nitrofurantoin.

3. Resistensi

Salah satu permasalahan kesehatan saat ini yaitu resistensi terhadap antibiotik karena hal ini memiliki dampak yang cukup luas seperti meningkatnya morbiditas dan mortalitas juga berdampak pada pengeluaran perawatan kesehatan. Resistensi antibiotik muncul kemudian mengalami perkembangan disebabkan oleh tekanan seleksi dimana hal ini dapat dikendalikan dengan cara menggunakan antibiotik tersebut dengan tepat (Kristiani, 2019).

Ada dua faktor yang memiliki peran aktif terhadap berkembangnya resistensi, faktor tersebut adalah kemampuan dari mikroorganisme dalam melakukan transfer, mendapatkan dan mampu meniru gen resisten. Faktor lainnya adalah karena bakteri menekan secara selektif yang merupakan akibat dari penggunaan yang tidak tepat atau secara berlebihan antibiotik yang berspektrum luas (Ppra, 2019).

4. Uji Sensitivitas Antibiotik

Sebelum penggunaan antibiotik, pasien terlebih dahulu dilakukan uji sensitivitas terhadap antibiotik yang akan digunakan oleh pasien. Pengujian hipersensitivitas kulit terhadap obat ataupun antibiotik disebut dengan *skin test*. *Skin test* ini diperlukan untuk mengetahui apakah pasien alergi terhadap antibiotik

tersebut atau tidak. Pemberian *skin test* memiliki beberapa cara yaitu prick test dan pemberian dengan interadermal. Umumnya pada fasilitas kesehatan yang digunakan adalah cara intradermal, yaitu dengan mengambil 0,01 – 0,02 mL antibiotik kemudian diinjeksikan pada lapisan dermis kulit pasien. Dilakukan evaluasi pada area yang telah dilakukan *skin test*, apakah terjadi reaksi hipersensitivitas ataupun tidak (Salman, 2019).

C. Rasionalitas Penggunaan Antibiotik

Menurut World Health Organization (WHO) bahwa masyarakat sering melakukan pengobatan sendiri. Dalam penggunaan obat rasional persyaratannya harus menerima obat tersebut sesuai kebutuhan pasien dosis yang mencukupi persyaratan bagi individu dalam periode waktu yang cukup dan harga yang murah untuk pasien dan masyarakat (Menkes, 2011).

1. Tepat Diagnosis

Tepat diagnosis yaitu penggunaan obat yang tepat indikasi. Apabila tidak menegakkan diagnosa dengan benar dan tepat, maka pemilihan obat akan keliru karena mengacu pada diagnosa. Akibatnya, obat yang diberikan tidak sesuai dengan indikasi dan tidak memberikan efek terapi yang diinginkan.

2. Tepat Pasien

Ketepatan pasien dalam pemilihan obat harus sesuai dengan keadaan pasien secara individu sehingga tidak menimbulkan kontra indikasi.

3. Tepat Pemilihan Obat

Dalam menentukan pemilihan obat terlebih dahulu tegakkan diagnosa yang tepat dan benar sebagai terapi yang akan digunakan. Sehingga, ketepatan

obat harus dinilai berdasarkan kesesuaian obat dengan mempertimbangkan diagnosa yang telah ditegakkan.

4. Tepat Indikasi

Tepat indikasi dinyatakan bahwa setiap obat mempunyai terapi yang spesifik. Sehingga, dalam pemberian obat harus sesuai dengan indikasi pasien dan dilihat dari kondisi pasien, perlu atau tidak diberikan obat tersebut.

5. Tepat Dosis Dan Cara Pemberian

Evaluasi ketepatan dosis dan cara pemberian obat sangat berpengaruh terhadap efek terapi obat. Apabila pemberian dosis yang berlebihan akan sangat berisiko, karena menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Sebaliknya, ketika pemberian dosis yang terlalu kecil maka, akan untuk tercapainya efek terapi yang diinginkan sangat kecil.

D. Tinjauan Islam Terhadap Pengobatan

Di dalam Islam telah dijelaskan tentang pengobatan sebagaimana firman Allah dalam QS Yunus (57):

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

Dalam ayat tersebut bahwa Allah telah memberikan penyembuh bagi suatu penyakit, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis shahih oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُدَنِّيِّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ
 قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُنزِلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Al Mutsanna) telah menceritakan kepada kami (Abu Ahmad Az Zubairi) telah menceritakan kepada kami ('Umar bin Sa'id bin Abu Husain) dia berkata; telah menceritakan kepadaku ('Atha` bin Abu Rabah) dari (Abu Hurairah) radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR. Imam Bukhari, No. 5246)

Adapun sebuah hadist dalam riwayat Imam Muslim, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
 أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ وَهُوَ ابْنُ الْأَخَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Harun bin Ma'ruf) dan (Abu Ath Thahir) serta (Ahmad bin 'Isa) mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Wahb); Telah mengabarkan kepadaku ('Amru) yaitu Ibnu Al Harits dari ('Abdu Rabbih bin Sa'id) dari (Abu Az Zubair) dari (Jabir) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim, No. 4084)

Diriwayatkan dari musnad Imam Ahmad dari shahabat Usamah bin Suraiq, bahwasanya Nabi bersabda: "Aku pernah berada di samping Rasulullah, Lalu datanglah serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?' Beliau menjawab, 'Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab, Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan

meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.' Mereka bertanya, 'Penyakit apa itu?' Beliau menjawab, 'Penyakit tua.'" (HR Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi).

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap penyakit yang Allah turunkan ke muka bumi ini pasti memiliki penawar atau obat atas izin Allah swt. kecuali satu penyakit yaitu tua. Dalam Hadis tersebut juga dijelaskan bahwa suatu penyakit dapat disembuhkan apabila diobati dengan obat yang sesuai. Dihubungkan dengan pengobatan bahwa setiap penyakit memiliki obat yang berbeda, sehingga pemberian obat sangat perlu untuk diperhatikan. Pemberian obat yang tidak sesuai tidak akan memberikan efek terapi yang diinginkan atau bahkan dapat membahayakan pasien. Ketepatan pemberian obat tersebut juga disebut dengan rasionalitas obat.

Rasional penggunaan obat merupakan pokok penting untuk tercapainya kualitas kesehatan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam tercapainya efek terapi yaitu kesesuaian pengobatan, tidak kurang dan tidak lebih dari kadar yang telah ditentukan. Hal yang dilakukan dalam tercapainya terapi obat tidak melebihi kadarnya dan telah dijelaskan dalam QS. surah Al-Qamar Ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”
(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab, sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yang sesuai dengan hikmah. Selanjutnya dalam rangka pengaturan dan kadar yang ditetapkan Allah atas segala sesuatu itu, kita

melihat bahwa setiap makhluk hidup diberi senjata untuk membentengi dirinya dalam melawan serangan musuh-musuhnya atau menghindari bahaya kepunahannya. Senjata itu beraneka ragam dan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ular-ular kecil dilengkapi dengan racun atau kelincahan bergerak, sedang ular-ular besar mempunyai otot yang sangat kuat, tetapi jarang yang memiliki racun. Demikian seterusnya, sampai kepada manusia. Tidak ada satu pun yang Allah ciptakan sia-sia atau tanpa tujuan yang benar dan kesemuanya diberi potensi yang sesuai dan dengan kadar yang cukup untuk melaksanakan fungsinya, semuanya kait berkait, tunjang menunjang dalam satu kesimbangan (Shihab, 2005).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan qadar (ukuran atau aturan). Kadar tersebut dalam dunia pengobatan dapat dikaitkan dengan mengkonsumsi obat harus sesuai dengan kadarnya ataupun aturan-aturan. Jika melebihi dari kadarnya maka, terapi yang diinginkan tidak tercapai dan dapat menimbulkan penyakit komplikasi penyerta dan aturan dalam penggunaan obat terkait interval penggunaan waktu dalam hal mengkonsumsi obat.

BAB III

METODE PENELITIAN

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggambarkan tentang suatu keadaan secara objektif, sistematis, dan akurat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di RSUD Majene, Sulawesi Barat.

D. Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pasien Pneumonia yang ada di PRSUD Majene, Sulawesi Barat periode Januari 2020-Mei 2021.

E. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini seluruh pasien Pneumonia RSUD Majene, Prov. Sulawesi Barat periode Januari 2020-Mei 2021 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu secara acak. Kriteria pasien pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi yang digunakan adalah, sebagai berikut:

- a. Pasien dengan diagnosa pneumonia
- b. Pasien yang mendapatkan terapi antibiotik
- c. Pasien rawat inap periode Januari 2020- Mei 2021
- d. Penggunaan antibiotik tidak kurang dari 3 hari

2. Kriteria Eksklusi

- a. Memiliki penyakit lain yang juga membutuhkan antibiotik
- b. Rekam medik tidak lengkap.
- c. Rekam medik yang robek dan tidak dapat terbaca.

F. Penentuan Besar Sampel

Dalam penelitian ini penentuan besaran sampel menggunakan rumus Slovin, dimana:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Batas toleransi kesalahan (error tolerace), digunakan e = 5%

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan menggunakan rumus Slovin, ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{47}{1+47(5\%)^2}$$

$$n = 42$$

(Dahlan, 2010)

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan secara retrospektif yaitu mengumpulkan data sekunder berupa rekam medik pasien pneumonia. Data yang diperoleh di skringing untuk memilih data sesuai kriteria eksklusi dan inklusi.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekam medik pasien pneumonia yang menggunakan terapi antibiotik periode Januari 2020- Mei 2021.

I. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Non Probability sampling* yaitu *consecutive sampling* artinya sampel yang diambil adalah seluruh subjek yang diamati dan memenuhi kriteria pemilihan sampel yang kemudian dimasukkan dalam sampel sampai besar sampel yang diperlukan terpenuhi (Sastroasmoro dan Ismael, 2008)

J. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependent

Variabel dependent atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah umur, jenis kelamin dan jenis antibiotik yang digunakan.

2. Variabel Independent

Variabel independent atau variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab ataupun mempengaruhi timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel independent dalam penelitian ini adalah penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia.

K. Tahap Penelitian

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Tahap Awal

Tahap ini dilakukan persiapan dalam hal ini permohonan izin penelitian.

2. Tahap Pengumpulan Data


Tahap ini dilakukan proses pengumpulan data mengenai pasien pneumonia di RSUD Majene. Populasi yang diperoleh dari data yang dikumpulkan berupa rekam medik pasien, sehingga akan didapatkan sampel menggunakan teknik sampling acak sederhana dan pencatatan data sesuai dengan kriteria inklusi.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan proses akhir yang terdiri dari tahap pengolahan data dan penyelesaian laporan hasil penelitian.

L. Analisis Data

Analisis data yang digunakan secara analisis dekskriptif menggunakan SPSS *statistic* 26.0 dan menggunakan metode Gyssens dengan kategori yang sesuai, dapat dilihat pada Gambar 1.



BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia yang di rawat di RSUD Majene periode Januari 2020- Mei 2021 diperoleh data pasien sebanyak 42 pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi.

1. Karakteristik pasien

Karakteristik pasien yang diamati pada penelitian ini adalah umur dan jenis kelamin.




Gambar 3. Karakteristik Pasien Pneumonia Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari **Gambar 2**, data distribusi pasien pneumonia berdasarkan usia pasien yang paling banyak berada di kelompok usia 0-5 tahun yaitu 28,6% atau sebanyak 12 pasien dan kelompok usia >65 tahun yaitu 26,2% dengan jumlah 11 pasien, kemudian diikuti berturut-turut kelompok usia 17-25 tahun sebanyak 4,8% (2

pasien), usia 26-35 tahun sebanyak 4.8% (2 pasien), usia 36-45 tahun sebanyak 9.5% (4 pasien), usia 46-55 tahun sebanyak 4.8% (2 pasien) dan usia 56-65 tahun sebanyak 21.4% (9 pasien). Hal tersebut sesuai dengan data profil kesehatan Indonesia pada tahun 2019 bahwa populasi yang rentan terserang pneumonia adalah kelompok usia dibawah 5 tahun dan usia di atas 65 tahun (Kemenkes RI, 2019).

Pada anak-anak yang sistem kekebalannya terganggu berisiko lebih tinggi terkena pneumonia. Sistem kekebalan anak mungkin melemah karena kekurangan gizi atau kekurangan gizi, terutama pada bayi yang tidak diberi ASI eksklusif. Penyakit yang sudah ada sebelumnya, seperti infeksi HIV simptomatik dan campak, juga meningkatkan risiko anak tertular pneumonia. Faktor lingkungan berikut juga meningkatkan kerentanan anak terhadap pneumoni seperti polusi udara dalam ruangan yang disebabkan oleh memasak dan memanaskan dengan bahan bakar biomassa (seperti kayu atau kotoran), tinggal di rumah yang ramai dan asap rokok dari orang tua. Sedangkan pada usia lanjut, seiring dengan bertambahnya usia terjadi penurunan system imunitas pada tubuh sehingga sangat mudah terpapar infeksi (WHO, 2019).



Gambar 3. Karakteristik Pasien Pneumonia Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi jenis kelamin pada **Gambar 3** menunjukkan bahwa persentase jumlah pasien pneumonia pada laki laki yaitu 57.1% (24 pasien), sedangkan pada pasien perempuan sebanyak 42.9% (18 pasien). Laki laki lebih rentan teinfeksi pneumonia dikarenakan aktivitasnya yang lebih sering di luaran rumah dan gaya hidupnya yang sering merokok dapat menyebabkan saluran pernapasannya membengkak juga menyempit sehingga lebih mudah terpapar infeksi (Ilmi *et al*, 2020).

Penelitian yang lainnya juga menghasilkan hal yang serupa dilakukan oleh Putri *et al*, (2020) sebanyak 61% pasien laki laki dan 39% pasien perempuan dari total 77 pasien yang ada. Hal ini juga sesuai dengan data yang dikeluarkan dalam profil kesehatan Indonesia pada tahun 2019, bahwa pasien pneumonia yang tersebar diseluruh provinsi di Indonesia paling banyak adalah pasien laki laki (Kemenkes RI, 2019).

2. Karakteristik Antibiotik

Tabel 7. Distribusi Lama Pemberian Antibiotik

Lama Terapi	Jumlah	%
1-7 hari	41	97.6
> 7 hari	1	2.4
Total	42	100.0

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 41 pasien dari total 42 pasien diberikan antibiotik dengan lama terapi 1-7 hari, dan terapi di atas 7 hari diberikan kepada 1 pasien. Lama terapi antibiotik yang diberikan kepada pasien sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengobatan pada pasien. Data yang diberikan oleh WHO, bahwa lama pemberian antibiotik kepada anak yang mendapatkan perawatan inap diberikan selama 5 hari. Sedangkan data yang didapat dari *American Thoracic Society* (2019) bahwa pada dewasa disarankan pemberian antibiotik selama minimal 5 hari, bahkan jika pasien telah mencapai

stabilitas klinis sebelum 5 hari. Karena kebanyakan pasien akan mencapai klinis stabilitas dalam 48 sampai 72 jam pertama, total durasi terapi 5 hari akan menjadi tepat untuk sebagian besar pasien. Untuk pasien lansia, menurut Gonzales *et al*, bahwa durasi pemberian antibiotik standar adalah 7-10 hari.

Tabel 8. Distribusi Jenis Obat Yang Digunakan

Jenis Obat	Jumlah	%
Infus Moxifloxacin	10	23.8
Inj Cefuroxime	9	21.4
Inj Cefixime	1	2.4
Inj ceftriaxone	4	11.9
Injeksi Azitromicyn	1	2.4
Inj. Ampicilin+ Inj. Gentamicin	9	21.4
Inf Moxifloxacin + Inj Cefuroxime	3	7.1
Inj ceftriaxone + Inj gentamicin	1	2.4
Inf Moxifloxacin + Inj. Ceftriaxone	2	4.8
Inj Cefuroxime + Azitromicyn Tab	1	2.4
Total	42	100.0

Pada penelitian ini, antibiotik yang paling banyak digunakan adalah Infus Moxifloxacin sebanyak 23.8% (10 penggunaan), Injeksi cefuroxime sebanyak 21.4% (9 penggunaan), kemudian diikuti berturut turut kombinasi injeksi ampicillin dan injeksi gentamisin sebanyak 21.4% (9 penggunaan), injeksi ceftriaxone sebanyak 11.9% (5 penggunaan), kombinasi infus moxifloxacin dan injeksi cefuroxime sebanyak 7.1% (3 penggunaan), kombinasi infus moxifloxacin dan injeksi ceftriaxone sebanyak 4.8% (2 penggunaan), serta masing masing 2.4 % atau 1 penggunaan terhadap injeksi cefixime, injeksi azitromicyn, kombinasi injeksi cefuroxime dan azitromicyn tablet.

B. Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Menggunakan Metode

Gyssens

Evaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di penelitian ini menggunakan metode *gyssens*. Dimana pada metode ini yang termasuk dalam pengobatan rasional jika terdapat pada kategori 0, dan tidak rasional jika terdapat pada kategori I-IV.

1. Kategori 0 (penggunaan antibiotika telah sesuai)
2. Kategori I (tidak tepat waktu pemberian)
3. Kategori IIa (tidak tepat dosis penggunaan)
4. Kategori IIb (tidak tepat interval pemberian antibiotik)
5. Kategori IIc (tidak tepat cara atau rute penggunaan)
6. Kategori IIIa (penggunaan yang terlalu lama)
7. Kategori IIIb (penggunaan yang terlalu singkat)
8. Kategori IVa (terdapat antibiotik yang lebih efektif)
9. Kategori IVb (terdapat antibiotik yang kurang toksik)
10. Kategori IVc (terdapat antibiotik yang lebih murah)
11. Kategori IVd (terdapat antibiotik yang spektrumnya lebih sempit)
12. Kategori V (antibiotik tidak diindikasikan)
13. Kategori VI (rekam medik yang tidak lengkap/rusak sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi)

Tabel 9. Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Menggunakan Metode *Gyssens*

Kategori <i>Gyssens</i>	Jumlah	%
Kategori IVa Ada antibiotika lain yang lebih efektif	10	23.81
Kategori IIIb Penggunaan antibiotika terlalu singkat	2	4.76
Kategori IIa Penggunaan antibiotika tidak tepat dosis	11	26.19

Kategori 0 Penggunaan antibiotika tepat/bijak	19	45.24
Total	42	100.0

Evaluasi antibiotik dengan menggunakan metode Gyssens tidak didapatkan hasil pada kategori V dan VI karena seluruh rekam medik pada penelitian ini memiliki data yang lengkap dan juga diindikasikan antibiotik. Sedangkan pada kategori IVa (ada antibiotic yang lebih efektif) diperoleh 23.81 % atau sebanyak 10 penggunaan antibiotik. Pada kategori IIIb (Penggunaan antibiotik terlalu singkat) diperoleh 4.76% atau sebanyak 2 penggunaan, pada kategori IIa diperoleh 26.19% atau sebanyak 10 penggunaan, dan pada kategori 0 didapatkan hasil 45.24% atau sebanyak 19 penggunaan.

Kategori pertama yang didapatkan yaitu IVa, dimana pada kategori ini diperoleh 23.81% (10 penggunaan), antibiotik yang digunakan yaitu cefuroxime serta kombinasi cefuroxime dan azitromicyn. Pasien yang menggunakan antibiotic ini merupakan pasien dewasa. *American Thoracic Society*, tahun 2019 menyebutkan bahwa *first line* pengobatan pneumonia dengan antibiotic dapat diberikan antibiotic β -Laktam yaitu amoxicillin, ampicillin, cefotaxime, seftriaxone atau floroquinolon atau kombinasi antibiotic β -Laktam dan makrolida.

Kategori kedua adalah IIIb, pada kategori ini terdapat 4.76% (2 penggunaan). Penggunaan yang termasuk dalam kategori ini yaitu cefixime selama 3 hari, dimana pasien ini merupakan pasien lansia (71 tahun). Untuk pasien lansia, menurut Gonzales *et al.*, bahwa durasi pemberian antibiotik standar adalah 7-10 hari. Penggunaan yang kedua adalah kombinasi moxifloxacin dan ceftriaxone selama 3 hari dan menurut *American Thoracic Society* tahun 2019 bahwa pada dewasa disarankan pemberian antibiotik selama minimal 5 hari, bahkan jika pasien telah mencapai stabilitas klinis sebelum 5 hari. Karena

kebanyakan pasien akan mencapai klinis stabilitas dalam 48 sampai 72 jam pertama, total durasi terapi 5 hari akan menjadi tepat untuk sebagian besar pasien.

Kategori selanjutnya adalah IIa, pada kategori ini terdapat 23.8% (11 penggunaan. Dimana 9 dari 10 penggunaan antibiotik tersebut merupakan pasien anak (0-5 tahun). Menurut WHO, 2014 bahwa dosis yang diberikan kepada anak untuk ampicillin adalah 50 mg/kg berat badan, dosis gentamicin adalah 7,5 mg/kg berat badan dan ceftriaxone 80-100 mg/kg berat badan anak. Setelah dilakukan perhitungan dosis dengan berat badan anak maka 9 dari penggunaan tersebut tidak sesuai dengan literatur yang digunakan. Dosis yang diberikan pada pasien dengan kategori ini berturut turut adalah kombinasi injeksi ampisilin (1000 mg/6 jam) dan injeksi gentamicin (40 mg/12 jam) dengan berat badan 19,8 kg, injeksi ampisilin (1000 mg/6 jam) dan injeksi gentamicin (40 mg/12 jam) dengan berat badan (20 kg), lebih lanjut dijelaskan dalam **Tabel 9**.

Tabel 10. Distribusi Dosis Pada Kategori IIa

No	Dosis Yang Diberikan	Berat Badan	Rekomendasi Dosis (WHO, 2014)
1	Ampicillin 1000 mg/6 jam Gentamicin 40 mg/12 jam	19,8 kg	Ampicillin 1000 mg/6 jam Gentamicin 150 mg/12 jam
2	Ampicillin 1000 mg/6 jam Gentamicin 40 mg/12 jam	20 kg	Ampicillin 1000 mg/6 jam Gentamicin 150 mg/12 jam
3	Ampicillin 230 mg/6 jam Gentamicin 40 mg/12 jam	9 kg	Ampicillin 450 mg/6 jam Gentamicin 70 mg/12 jam
4	Ampicillin 100 mg/6 jam Gentamicin 10 mg/12 jam	4 kg	Ampicillin 200 mg/6 jam Gentamicin 30 mg/12 jam
5	Ampicillin 125 mg/ 6 jam Gentamicin 12,5 mg/12 jam	5,9 kg	Ampicillin 300 mg/6 jam Gentamicin 45 mg/12 jam
6	Ampicillin 230 mg/ 6 jam Gentamicin 23 mg/12 jam	9,3 kg	Ampicillin 465 mg/6 jam Gentamicin 70 mg/12 jam
7	Ampicillin 150 mg/ 6 jam Gentamicin 15 mg/12 jam	7,5 kg	Ampicillin 375 mg/6 jam Gentamicin 57 mg/12 jam
8	Ampicillin 1190 mg/ 6 jam Gentamicin 30 mg/12 jam	11,9 kg	Ampicillin 595 mg/6 jam Gentamicin 85 mg/12 jam

9	Ampicillin 80 mg/ 6 jam Gentamicin 8 mg/12 jam	5 kg	Ampicillin 250 mg/6 jam Gentamicin 38 mg/12 jam
10	Ceftriaxone 250 mg/ 12 jam	8 kg	Ceftriaxone 650 mg/ 12 jam
11	Ampicillin 80 mg/ 6 jam Gentamicin 8 mg/12 jam	Pasien Dewasa	Ampicillin 250 mg/6 jam Gentamicin 38 mg/12 jam

Penggunaan berikutnya adalah kombinasi injeksi ampicilin (80 mg/6 jam) dan injeksi gentamicin (8mg/12 jam), yang merupakan pasien dewasa dimana dosis yang dianjurkan untuk ampicillin adalah 500-1000 mg.

Pada penelitian ini didapatkan 45.2% atau sebanyak 19 penggunaan antibiotic yang termasuk kedalam kategori 0. Pada kategori ini penggunaan antibiotic dinilai baik atau telah sesuai dengan pedoman ataupun literature yang ada. Penggunaan antibiotik dengan baik dan memenuhi standar kerasionalan obat akan mengurangi infeksi sehingga memberikan efek terapi bagi pasien. Namun pemberian antibiotik yang tidak rasional dapat memperluas tingginya resistensi antibiotik, hal tersebut dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas juga akan meningkatkan biaya kesehatan yang digunakan oleh pasien (Syamsul et al., 2019).

Peresepan obat pada pasien yang tidak tepat akan menimbulkan beberapa masalah seperti tidak tercapainya efek terapi yang diharapkan, terjadi peningkatan efek samping pada obat, terjadi resistensi antibiotik, terjadinya infeksi dari ketidaksterilan injeksi yang diberikan, dan pemborosan obat (Pulungan et al., 2019).

Data penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data retrospektif, sehingga memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa keterbatasannya seperti sampel yang bisa didapatkan sangat terbatas karena banyak data yang rekam mediknya sudah tidak lengkap, ataupun rusak. Data retrospektif ini merupakan data lampau, sehingga peneliti tidak dapat melakukan konfirmasi

kepada pasien yang menjadi sampel penelitian, juga tidak dapat melakukan pencegahan ataupun rekomendai pengobatan yang tepat.

Hasil penelitian yang telah didapatkan bahwa penggunaan antibiotic pada pasien pneumonia di RSUD Majene tidak rasional. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti, tidak tepat pemberian jenis antibiotik, tidak tepat pemberian dosis, tidak tepat pemberian jangka pengobatan. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional tersebut tidak sesuai dengan QS. Al-Qamar Ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”
(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan qadar (ukuran atau aturan). Jika tidak sesuai dari kadarnya maka, terapi yang diinginkan tidak tercapai dan dapat menimbulkan penyakit komplikasi penyerta dan aturan dalam penggunaan obat terkait interval penggunaan waktu dalam hal mengkonsumsi obat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari 42 pasien yang dijadikan sampel penelitian menunjukkan hasil evaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik menggunakan metode gysSENS diperoleh beberapa kategori. Pada kategori IVa (ada antibiotik yang lebih efektif) didapatkan 26.2 % atau sebanyak 11 penggunaan antibiotik. Pada kategori IIIb (Penggunaan antibiotic terlalu singkat) diperoleh 4.8% atau sebanyak 2 penggunaan, pada kategori IIa diperoleh 23.8% atau sebanyak 10 penggunaan, dan pada kategori 0 didapatkan hasil 45.2% atau sebanyak 19 penggunaan. Sehingga penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di RSUD Majene tidak rasional.

B. Saran

Diperlukan pengoptimalan dalam penerapan penggunaan antibiotik yang sesuai dengan standar penggunaan antibiotic agar dapat meningkatkan penggunaan antibiotik secara rasional, sehingga didapatkan efek terapi yang diinginkan pada pasien pneumonia di RSUD Majene.

UNIVERSITAS NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- American Thoracic Society* (2019). Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America: *Am J Respir Crit Care Med* Vol 200, Iss 7, pp e45–e67.
- Asih, Niluh GY & Effendy, C. (2004). *KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH: Klien Dengan Gangguan Sistem Pernapasan: Perpustakaan Nasional*. Jakarta.
- Dewiningsih, Umar. Faktor Lingkungan dan Perilaku Kejadian Pneumonia Balita Usia 12-59 Bulan. HIGEIA. 2018.
- Ditri, E. L. Z. and J. W. (2017). HHS Public Access. *Physiology & Behavior*, 176(1), 139–148.
- Etebu, E., & Ariekpar, I. (2020). *Antibiotics : Classification and mechanisms of action with emphasis on molecular perspectives*. January.
- Gonzales *et al.*, (2014) Guidelines for the management of community-acquired pneumonia in the elderly patient. *Rev Esp Quimioter* 2014;27(1): 69-86
- Hanis, SF., & Famela, S. (2018). *Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Untuk Terapi Infeksi Saluran Pernapasan Atas di Rumah Sakit Kota Medan*.
- Ilmi, T., Yulia, R., & Herawati, F. (2020). *Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Tuluangagung: Jurnal Inovasi Farmasi Indonesia (JAFI)*.
- Indriani, L., & Zunnita, O. (2018). *Penilaian Terhadap Rasionalitas penggunaan Antibiotik Pada Balita Penderita Pneumonia Puuskesmas Bogor Utara*. *Fitofarmaka Jurnal Ilmiah Farmasi*. 8(2).
- Kemendes RI. MIKROBIOLOGI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017.
- Kemendes RI. Profil Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 2015.
- Kesehatan, M., & Indonesia, R. (2011). *Menteri kesehatan republik indonesia*.
- Kristiani, F., Radji, M., & Rianiti, A. (2019). *Evaluasi Penggunaan Antibiotika Secara Kualitatif dan Analisis Efektivitas Biaya pada Pasien Pediatri di RSUP Fatmawati Jakarta*. 6(1), 46–53.
- Mackenzie, Grant. The definition and classification of pneumonia. DOI 10. 2016.

- Maratus Sholihah, Suradi, J. A. (2019). *Akreditasi RISTEKDIKTI Nomor: 2/E/KPT/2015 Tanggal 1 Desember 2015*.
- Menkes, R. (2011). Modul penggunaan obat rasional. *Kementerian Kesehatan RI*, 13–18.
- Meriyani, H., Megawati, F., & Udayani, N. N. W. (2016). *The Effectiveness Of Pneumonia Treatment In Pediatrics At Sanglah tubuh laki-laki dan perempuan berbeda . Organ paru pada perempuan memiliki daya hambat aliran udara yang lebih rendah dan daya hantar aliran udara yang lebih tinggi sehingga sirkulasi uda*. 2(2), 65–69.
- Monita, O., Yani, FF., & Lestari, Y. (2012). *Artikel Penelitian Profil Pasien Pneumonia Komunitas di Bagian Anak RSUP*. 4(1), 218–226.
- Mulyana, R. (2019). *Tinjauan Pustaka Terapi Antibiotika pada Pneumonia Usia Lanjut*. 8(1), 172–177.
- Nikmah *et al*. *Indoor Smoke Exposure and Other Risk Factors of Pneumonia among Children Under Five in Karanganyar, Central Java*. jepublichealth.2018
- P, P. F. P., Pratiwi, D. W., P, D. A. A., & Rosyidah, S. (2014). *Profil Penggunaan Dan Pengetahuan Antibiotik Pada Ibu-Ibu*. 3(1), 12–17.
- Ppra, R. A. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Program Pengendalian (Studi Kasus Di Rsup Dr . Wahidin Sudirohisudo , Makassar) (Case Study In Rsup Dr . Wahidin Sudirohisudo , Makassar)*. 106–116.
- Pulungan, R., Chan, A., & Fransiska, E. (2019). Evaluasi Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Dunia Farmasi*, 3(3), 144–152.
- Riskesdas, K. (2018). Hasil Utama Riset Kesehata Dasar (RISKESDAS). *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–200.
- Rusmini. (2016). Gambaran Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia Dengan Menggunakan Metode Gyssens Di Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Abdul Moeloek Tahun 2015. *Jurnal Medika Malahayati*, 3(2), 61–64.
- Salman, Mohammad & Hutasoit, Gina Andyaka. *Perluah Skin Test Pada Anak Sebelum Pemberian Antibiotik Injeksi*. FK Universitas Tadullako. 2019
- Sari, E., Rumende, M., & Harimurti, K. (2016). *Factors Related to Diagnosis of Community-Acquired Pneumonia in the Elderly Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Diagnosis Pneumonia pada Pasien Usia Lanjut*. 3(4), 183–192.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 13*. Lentera Hati. 2005.
- Society, I., Respirology, O. F., Pusat, P., Profil, M., Indonesia, K., Kesehatan, D.,

Jakarta, D. K. I., & Tiongkok, K. W. (2019). *Press Release “ Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (Pdpi) Outbreak Pneumonia Di Tiongkok. 19, 19–22.*

Sugianto, A., Rahman, S. (2019). *The Effect Of Product Quality, Price, And Promotion On Purchase Decision Of Shinyoku Lights At Cv. Sinar Abadi Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Manajemen, 7(2).*

Syamsul, D., Serbajadi, A., Iv, D., Sunggal, K., Serdang, K. D., & Utara, S. (2019). *Pneumonia Di Puskesmas Induk Kota Binjai The Evaluation Of Rational Antibiotic Use In Non Pneumonia Acute Respiratory InfectionS (ARI) AT MAIN HEALTH CENTRE OF Alamat Korespondensi : Publish By ; Jurnal Dunia Farmasi PENDAHULUAN Penyakit salah satu infe. 3(3), 106–114.*

World Health Organization, Revised WHO classification and treatment of childhood pneumonia at health facilities. 2014.

World Health Organization. Pneumonia. Fact sheet No. 331. August 2019.

LAMPIRAN

A. Lampiran 1. Ethical Cleanser



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63. Telp (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : A.061/KEPK/FKIK/VII/2021
 Judul Penelitian : Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia Di RSUD Majene

Nama Peneliti : Nurul Magfirah
 No. Register :

U	I	N	A	M	3	0	0	7	A	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tuliskan nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A

Gowa, 30/07/2021

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
 NIP. 198007012006042002

B. Lampiran 2. Rekam Medik Pasien Pneumonia

NO	Nama Pasien (Umur)	Jenis Kelamin	Tanggal Masuk/Keluar	Diagnosa	Terapi dan Dosis	Lama Pemberian
1	Andi Den Kievano (5 tahun)	L	9/4/2021 16/4/21	Pneumonia	Inj. Ampicilin (1000 mg/ 6 jam)+ Inj. Gentamicin (40 mg/ 12 jam)	5 hari
2	Andi Den Paradipta (5 tahun)	L	7/4/2021 16/04/2021	Pneumonia	Inj. Ampicilin (1 gr/ 6 jam)+ Inj Gentamicin (40 mg/ 12 jam)	5 hari
3	Dien Alfath	L	23/12/2020 27/12/2020	Pneumonia	Inj. Ampicilin (100 mg/ 6 jam)+ Inj Gentamicin (10 mg/ 12 jam)	3 hari
4	Abdul Rahman (72 tahun)	L	17/01/2021 29/01/2021	Pneumonia CHF	Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)	7 hari
5	Abidah Dania (2 tahun)	P	3/5/2021 8/5/2021	Pneumonia Asma Bronkiale Anemia	Inj. Ampicilin (230 mg/ 6 jam)+ Inj. Gentamicin (23 mg/ 12 jam)	6 hari
6	Alimuddin (57 tahun)	L	23/12/2020 30/12/2020	Pneumonia	Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)	7 hari
7	Amiruddin Haruna (59 tahun)	L	17/12/2020 22/12/2020	Pneumonia CHF	Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)	5 hari
8	Ny. Diha	P	1/4/2021	Pneumonia	Inf. Moxifloxacin (400 mg/	7 hari

	(82 tahun)		8/4/2021	Anemia	24 jam)	
9	Fadillah (42 tahun)	P	3/11/2020 9/11/2020	Pneumonia CHF	Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam)	5 hari
10	Hj. Fahirah Massiara (58 tahun)	P	17/11/2020 25/11/2021	Pneumonia Hipokalemia	Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)	7 hari
11	Fatimah (2 tahun)	P	21/01/2020 1/2/2020	Pneumonia Gizi kurang	Inj. Ampicilin (125 mg/ 6 jam)+ Inj. Gentamicin (12,5 mg/ 12 jam)	7 hari
12	Ganing (85 tahun)	L	28/10/2020 4/11/2020	Pneumonia Anemia CHF	Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)	7 hari
13	Hamsina (28 tahun)	P	12/12/2020 16/12/2020	Pneumonia GERD	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	4 hari
14	Harris (60 tahun)	L	24/4/2021 30/4/2021	Pneumonia	Inf moxifloxacin (400 mg/24 jam)+ Inj. Cefuroxime 750 mg/12 jam	6 hari
15	Hasbullah (41 tahun)	L	16/12/2020 18/12/2020	Pneumonia	Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam)+ Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	3 hari
16	Huduri (61 tahun)	L	13/12/2020 20/12/2020	Pneumonia	Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam)+ Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	3 hari
17	Hj. Junaeda (57 tahun)	P	23/04/2021 26/04/2021	Pneumonia Hipertensi	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	3 hari
18	Kayra Showatul (3 bulan)	P	30/11/2020 3/12/2020	CAP	Inj ceftriaxone (350 mg/ 24 jam)	3 hari
19	M. Ibrahim (1 tahun 5 bulan)	L	23/3/2021 25/03/2021	Pneumonia Dehidrasi	Inj Ceftriaxone (630 mg /24 jam)	3 hari

				sedang		
20	Masud (25 tahun)	L	29/01/2021 2/2/2021	Pneumonia CHF	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	4 hari
21	Muh. Sahid (63 tahun)	L	18/12/2020 22/12/2020	Pneumonia Penyakit Jantung Tiroid	Infus Moxifloxacin (400mg/24 jam)	4 hari
22	M. yusuf (65 tahun)	L	21/01/2020 27/01/2020	Pneumonia CHF	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	3 hari
23	Najamuddin (65 tahun)	L	19/02/2021 26/02/2021	Pneumonia	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	4 hari
24	Najamuddin (57 tahun)	L	5/12/2020 7/12/2020	Pneumonia CHF	Inj. Cefuroxime (750 mg/12jam)	3 hari
25	Nurma (66 tahun)	P	24/12/2020 27/12/2020	Pneumonia CHF	Inf Moxifloxacin (40 mg/ 24 jam)	3 hari
26	Nureaeni (21 tahun)	P	12/12/2020 19/12/2020	Pneumonia Anemia	Inj. Cefuroxime (1 gr/ 12 jam)	5 hari
27	Nursahdih Saleh (32 tahun)	L	19/03/2021 25/03/2021	Pneumonia CHF	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	4 hari
28	Razqa Nuruddin Lukman (1 tahun)	L	27/02/2021 5/3/2021	Pneumonia	Inj. Ampicilin (230 mg/ 6 jam)+ Inj. Gentamicin (23 mg/ 12 jam)	5 hari
29	Sahabuddin (55 tahun)	L	10/12/2020 14/12/2020	Pneumonia CHF Carinoitd	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	3 hari
30	Sanusi (77 tahun)	L	4/1/2021 6/1/2021	Pneumonia Syok Septis	Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam)+ Inj. Ceftriaxone (750 mg/ 12 jam)	3 hari

31	Sidney (1 tahun)	L	13/02/2020 24/02/2020	Pneumonia Anemia Moderate Diare dehidrasi	Inj Ampicillin (150 mg/ 6 jam)+ Inj Gentamicin (15 mg/12 jam) Inj. Ceftriaxone (750 mg/ 12 jam)	7 hari 4 hari
32	Sitti Nur (71 Tahun)	P	1/12/2020 7/12/2020	Pneumonia Atrium Fibrilasi	Inj Ceftriaxone (750 mg/ 12 jam)	7 Hari
33	St.Nur (54 tahun)	P	13/01/2021 19/01/2021	Cerebral Infection Hipokalemia	Azitromicyn (500 mg/24 jam)	5 hari
34	St. wardiah (72 tahun)	P	20/12/2020 26/12/2020	Pneumonia Hipertensi	Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam)	7 hari
35	Sofia (4 tahun)	P	22/03/2021 27/03/2021	Pneumonia	Inj Ceftriaxone (1.190 mg/ 24 jam)+ Inf Gentamicin (30 mg/12 jam)	4 hari
36	Sultan (10 Bulan)	L	11/4/2021 17/04/2021	Pneumonia	Inj Ceftriaxone (250 mg /12 jam) Inj Ceftriaxone (400 mg /12 jam)	3 hari
37	Sulfiyah Ismail (2 bulan)	P	7/10/2020 12/20/2020	Pneumonia	Inj Ampicilin (80 mg/6 jam)+ Inj Gentamicin (8 mg/12 jam)	5 hari
38	Suwaeda (71 tahun)	P	19/10/2020 21/10/2020	General weakness Hipertensi Pneumonia Post GTCSCC	Inj. Cefixime (200 mg/ 12 jam)	3 hari

				Epilepsy		
39	Drs. Syuhabuddin (56 Tahun)	L	20/01/2021 23/01/2021	Pneumonia CHF	Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)+ Inj Ceftriaxone (750 mg/12 jam)	3 hari
40	Tamrin Sirajuddin (74 tahun)	L	17/01/2021 27/01/2021	Pneumonia CHF	Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)	7 hari
41	Yassy Anrianita (43 tahun)	P	13/12/2020 26/12/2020	Pneumonia Hipertensi	Inj Cefuroxime (750 mg/12 jam)+ Azitromicyn Tab (500 mg/ 24 jam)	8 hari
42	Yusuf (64 tahun)	L	11/10/2020 14/10/2020	Active Corona Syndrome Edema Paru Paru Pneumonia	Inj. Ampicilin (80 mg/ 6 jam)+ Inj. Gentamicin (8 mg/ 12 jam)	5 hari

C. Lampiran 3. Tabel Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pasien Pneumonia di RSUD Majene

NO	Antibiotik	Lama Penggunaan	Kategori Gyssens										Keterangan	
			0	I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IIIc	IVa	IVb	IVc		IVd
1	Inj. Ampicilin (1000 mg/ 6 jam)+ Inj. Gentamicin (40 mg/ 12 jam)	5 hari			✓									Pemberian dosis terlalu rendah dengan BB pasien 19,8 kg, Rekomendasi: Ampicillin 1000 mg/6 jam Gentamicin 150 mg/12 jam
2	Inj. Ampicilin (1 gr/ 6 jam)+ Inj Gentamicin (40 mg/ 12 jam)	5 hari			✓									Pemberian dosis terlalu rendah dengan BB pasien 20 kg, Rekomendasi: Ampicillin 1000 mg/6 jam Gentamicin 150 mg/12 jam
3	Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)	7 hari	✓											Penggunaan antibiotik rasional
4	Inj. Ampicilin (100 mg/ 6 jam)+ Inj Gentamicin (10 mg/ 12 jam)	3 hari			✓									Pemberian dosis terlalu rendah dengan BB pasien 4 kg, Rekomendasi: Ampicillin 200 mg/6 jam Gentamicin 30 mg/12 jam
5	Inj. Ampicilin (230 mg/ 6 jam)+ Inj. Gentamicin (23 mg/ 12 jam)	6 hari			✓									Pemberian dosis terlalu rendah dengan BB pasien 9 kg, Rekomendasi: Ampicillin 450 mg/6 jam Gentamicin 68 mg/12 jam

6	Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam)	7 hari	✓															Penggunaan antibiotik rasional
7	Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)	5 hari	✓															Penggunaan antibiotik rasional
8	Inf. Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam)	7 hari	✓															Penggunaan antibiotik rasional
9	Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam)	5 hari	✓															Penggunaan antibiotik rasional
10	Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)	7 hari	✓															Penggunaan antibiotik rasional
11	Inj. Ampicilin (125 mg/ 6 jam)+ Inj. Gentamicin (12,5 mg/ 12 jam)	7 hari			✓													Pemberian dosis terlalu rendah dengan BB pasien 5,9 kg, Rekomendasi: Ampicillin 295 mg/6 jam Gentamicin 45 mg/12 jam
12	Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)	7 hari	✓															Penggunaan antibiotik rasional
13	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	4 hari																<i>American Thoracic Society</i> , tahun 2019 menyebutkan bahwa <i>first line</i> pengobatan pneumonia dengan antibiotic dapat diberikan antibiotic β -Laktam yaitu amoxicillin, ampicillin, cefotaxime, seftriaxone atau floroquinolon atau kombinasi antibiotic β -Laktam dan makrolida
14	Inf moxifloxacin (400 mg/24 jam)+ Inj. Cefuroxime 750 mg/12 jam	6 hari	✓															Penggunaan antibiotik rasional
15	Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)+	3 hari	✓															Penggunaan antibiotik rasional

	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)																		
16	Inf Moxifloxacin (400 mg/24jam)+ Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	3 hari	✓																Penggunaan antibiotik rasional
17	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	3 hari																	<i>American Thoracic Society</i> , tahun 2019 menyebutkan bahwa <i>first line</i> pengobatan pneumonia dengan antibiotic dapat diberikan antibiotic β -Laktam yaitu amoxicillin, ampicillin, cefotaxime, seftriaxone atau floroquinolon atau kombinasi antibiotic β -Laktam dan makrolida
18	Inj ceftriaxone (350 mg/ 24 jam)	3 hari	✓																Penggunaan antibiotik rasional
19	Inj Ceftriaxone (630 mg /24 jam)	3 hari	✓																Penggunaan antibiotik rasional
20	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	4 hari																	<i>American Thoracic Society</i> , tahun 2019 menyebutkan bahwa <i>first line</i> pengobatan pneumonia dengan antibiotic dapat diberikan antibiotic β -Laktam yaitu amoxicillin, ampicillin, cefotaxime, seftriaxone atau floroquinolon atau kombinasi antibiotic β -Laktam dan makrolida
21	Infus Moxifloxacin (400mg/24 jam)	4 hari	✓																Penggunaan antibiotik rasional

22	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	3 hari																			American Thoracic Society, tahun 2019 menyebutkan bahwa <i>first line</i> pengobatan pneumonia dengan antibiotic dapat diberikan antibiotic β -Laktam yaitu amoxicillin, ampicillin, cefotaxime, seftriaxone atau floroquinolon atau kombinasi antibiotic β -Laktam dan makrolida
23	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	4 hari																			American Thoracic Society, tahun 2019 menyebutkan bahwa <i>first line</i> pengobatan pneumonia dengan antibiotic dapat diberikan antibiotic β -Laktam yaitu amoxicillin, ampicillin, cefotaxime, seftriaxone atau floroquinolon atau kombinasi antibiotic β -Laktam dan makrolida
24	Inj. Cefuroxime (750 mg/12jam)	3 hari																			American Thoracic Society, tahun 2019 menyebutkan bahwa <i>first line</i> pengobatan pneumonia dengan antibiotic dapat diberikan antibiotic β -Laktam yaitu amoxicillin, ampicillin, cefotaxime,

													seftriaxone atau floroquinolon atau kombinasi antibiotic β -Laktam dan makrolida
25	Inf Moxifloxacin (40 mg/ 24 jam)	3 hari	✓										Penggunaan antibiotik rasional
26	Inj. Cefuroxime (1 gr/ 12 jam)	5 hari								✓			<i>American Thoracic Society</i> , tahun 2019 menyebutkan bahwa <i>first line</i> pengobatan pneumonia dengan antibiotic dapat diberikan antibiotic β -Laktam yaitu amoxicillin, ampicillin, cefotaxime, seftriaxone atau floroquinolon atau kombinasi antibiotic β -Laktam dan makrolida
27	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	4 hari								✓			<i>American Thoracic Society</i> , tahun 2019 menyebutkan bahwa <i>first line</i> pengobatan pneumonia dengan antibiotic dapat diberikan antibiotic β -Laktam yaitu amoxicillin, ampicillin, cefotaxime, seftriaxone atau floroquinolon atau kombinasi antibiotic β -Laktam dan makrolida
28	Inj. Ampicilin (230 mg/ 6 jam)+ Inj. Gentamicin (23 mg/ 12 jam)	5 hari		✓									Pemberian dosis terlalu rendah dengan BB pasien 9,3 kg,

												Rekomendasi: Ampicillin 465 mg/6 jam Gentamicin 70 mg/12 jam
29	Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam)	3 hari										<i>American Thoracic Society</i> , tahun 2019 menyebutkan bahwa <i>first line</i> pengobatan pneumonia dengan antibiotic dapat diberikan antibiotic β -Laktam yaitu amoxicillin, ampicillin, cefotaxime, seftriaxone atau floroquinolon atau kombinasi antibiotic β -Laktam dan makrolida
30	Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam)+ Inj. Ceftriaxone (750 mg/ 12 jam)	3 hari	✓									Penggunaan antibiotik rasional
31	Inj Ampicillin (150 mg/ 6 jam)+ Inj Gentamicin (15 mg/12 jam)	7 hari			✓							Pemberian dosis terlalu rendah dengan BB pasien 7,5 kg, Rekomendasi: Ampicillin 375 mg/6 jam Gentamicin 57 mg/12 jam
32	Inj Ceftriaxone (750 mg/ 12 jam)	7 Hari	✓									Penggunaan antibiotik rasional
33	Azitromicyn (500 mg/24 jam)	5 hari	✓									Penggunaan antibiotik rasional
34	Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam)	7 hari	✓									Penggunaan antibiotik rasional

35	Inj Ceftriaxone (1.190 mg/ 24 jam)+ Inj Gentamicin (30 mg/12 jam)	4 hari			✓							Pemberian dosis terlalu rendah dengan BB pasien 11,9 kg, Rekomendasi: Inj Ceftriaxone (1.190 mg/ 24 jam) Inj Gentamicin 90 mg/12 jam
36	Inj Ceftriaxone (250 mg /12 jam)	3 hari			✓							Pemberian dosis terlalu rendah dengan BB pasien 8 kg, Rekomendasi: Inj Ceftriaxone (250 mg /12 jam)
37	Inj Ampicilin (80 mg/6 jam)+ Inj Gentamicin (8 mg/12 jam)	5 hari			✓							Pemberian dosis terlalu rendah dengan BB pasien 5 kg, Rekomendasi: Ampicillin 250 mg/6 jam Gentamicin 38 mg/12 jam
38	Inj. Cefixime (200 mg/ 12 jam)	3 hari						✓				Untuk pasien lansia, menurut Gonzales <i>et al.</i> , bahwa durasi pemberian antibiotik standar adalah 7-10 hari
39	Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)+ Inj Ceftriaxone (750 mg/12 jam)	3 hari						✓				Menurut <i>American Thoracic Society</i> tahun 2019 bahwa pada dewasa disarankan pemberian antibiotik selama minimal 5 hari

40	Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam)	7 hari	✓														Penggunaan antibiotik rasional
41	Inj Cefuroxime (750 mg/12 jam)+ Azitromicyn Tab (500 mg/ 24 jam)	8 hari							✓								<i>American Thoracic Society</i> , tahun 2019 menyebutkan bahwa <i>first line</i> pengobatan pneumonia dengan antibiotic dapat diberikan antibiotic β -Laktam yaitu amoxicillin, ampicillin, cefotaxime, seftriaxone atau floroquinolon atau kombinasi antibiotic β -Laktam dan makrolida
42	Inj. Ampicilin (80 mg/ 6 jam)+ Inj. Gentamicin (8 mg/ 12 jam)	5 hari			✓												Pemberian dosis terlalu rendah dengan BB pasien 5 kg, Rekomendasi: Ampicillin 250 mg/6 jam Gentamicin 38 mg/12 jam

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nurul Magfirah, akrab disapa Fira adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 18 April 1999, di Sambabo, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak pertama dari enam bersaudara, dari pasangan bapak Jasman, S.Pd.I dan ibu Nurifah, S.Pd.

Penulis memulai jenjang pendidikannya di SDN 10 Inp. Salutambung, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 4 Malunda. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Majene dan tamat pada tahun 2017. Ditahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di program studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selama berkuliah di UIN Alauddin Makassar penulis pernah aktif dalam lembaga kemahasiswaan, seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Farmasi Periode 2019-2020, Dewan Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) Periode 2020-2021, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FKIK.

“Buah dari penampakan Tuhan adalah persaudaraan sejati”