

**HUBUNGAN KEHAMILAN USIA DINI DENGAN KEJADIAN BERAT
BAYI LAHIR RENDAH DI PUSKESMAS TAMANGAPA DAN
PUSKESMAS JONGAYA KOTA MAKASSAR TAHUN 2020-2021**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter

Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

ANDIEGA RIZQI AMALIA

70600118015

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Ega Rizqi Amalia

NIM : 70600118015

Tempat/Tgl. Lahir : Makassar 19 oktober 1999

Jurusan : Pendidikan Dokter

Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Salobulo

Judul : “Hubungan Kehamilan Usia Dini Dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021”.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Februari 2022

Penyusun

Andi Ega Rizqi Amalia

NIM: 70600118015



PERSETUJUAN UJIAN SEMINAR HASIL

JUDUL : HUBUNGAN KEHAMILAN USIA DINI DENGAN KEJADIAN BERAT BAYI LAHIR RENDAH DI PUSKESMAS TAMANGAPA DAN PUSKESMAS JONGAYA KOTA MAKASSAR TAHUN 2020-2021 TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING UNTUK DIAJUKAN DALAM SEMINAR HASIL MAHASISWA KEDOKTERAN

MAKASSAR, 15 FEBRUARI 2022

PEMBIMBING 1


dr. Henny Fuziah, Sp.PK., M.kes

PEMBIMBING 2


dr. Azizah Nurdin, Sp. OG., M.kes






UNIVERSITAS ISLAM Negeri
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Hubungan Kehamilan Usia Dini dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021" yang disusun oleh Andi Ega Rizqi Amalin, NIM 70600118015, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 7 Februari 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 15 Februari 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes	()
Sekretaris	: dr. Andi Tihardimanto, Sp.JP., M.Kes	()
Pembimbing I	: dr. Heny Fauziah, Sp.PK., M.kes	()
Pembimbing II	: dr. Azizah Nuridin, Sp.OG., M.kes	()
Penguji I	: dr. Abd. Rahman, Sp.B., M.kes.	()
Penguji II	: Dr. Muhammad Sadik Sabry, M.Ag	()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



ALAUDDIN
M A K A S S A R

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga proposal penelitian dengan judul, **”Hubungan Kehamilan Usia Dini Dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021”** dapat terselesaikan. Salam serta shalawat tidak hentinya tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan dunia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam penyelesaian proposal penelitian ini, tidak hanya semata-mata dari usaha penulis sendiri. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang tua yang tercinta, sebagai penyemangat dan sumber inspirasi terbesarku **Ibunda Yusmianti.Tcauga, dan Ayahanda Andi Herman, SE.** Yang telah memberikan cinta kasih, doa restu, bimbingan, dukungan, serta motivasi selama penyusunan proposal penelitian ini.

Demikian juga penulis ucapkan terima kasih yang tulus, rasa hormat, dan penghargaan yang tak terhingga, kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof.Hamdan Juhannis M.A, Ph.D beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Ketua Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. pembimbing I dr.Henny Fauziah, Sp.PK M.kes yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.

5. pembimbing II dr. Azizah Nurdin, Sp.OG,M.kes dan juga sebagai penasehat akademik yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
6. penguji I dr Abd.Rahman, Sp.B., M.Kes yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
7. penguji II Dr. Muhammad sadiq Sabir, M.Ag yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada para sejawat F18RON3KTIN Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
9. Kepada seluruh staff di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar yang telah sabar dan tulus membantu saya selama meneliti.

Makassar,28 Februari 2022

Andi Ega Rizqi Amalia

NIM: 70600118015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VI
BAB I PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. HIPOTESIS.....	7
D. DEFINISI OPERASIONAL RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	8
E. KAJIAN PUSTAKA.....	10
F. TUJUAN PENELITIAN.....	12
G. MANFAAT PENELITIAN.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEHAMILAN USIA DINI.....	14
B. TINJAUAN UMUM TENTANG BERAT BAYI LAHIR RENDAH.....	17
C. HUBUNGAN KEHAMILAN USIA DINI DENGAN KEJADIAN BBLR.....	29
D. KERANGKA BERPIKIR.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. DESAIN PENELITIAN.....	33
B. LOKASI DAN TEMPAT PENELITIAN.....	33
C. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN.....	33
D. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL.....	34
E. CARA PENGUMPULAN DATA.....	34
F. ALUR PENELITIAN.....	35
G. INSTRUMEN PENELITIAN.....	36
H. LANGKAH PENGOLAHAN DATA.....	37
I. ANALISIS DATA.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40

A. HASIL.....	40
B. PEMBAHASAN.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. KESIMPULAN.....	53
B. SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	66



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 DEFINISI OPERASIONAL.....	8
TABEL 1.2 KAJIAN PUSTAKA PENELITIAN.....	10
TABEL 4.1 Karakteristik Responden.....	39
TABEL 4.2 Hubungan Usia dini dengan BBLR.....	40
TABEL 4.3 Hubungan Pendidikan dengan BBLR.....	40
TABEL 4.4 Hubungan Pekerjaan dengan BBLR.....	41
TABEL 4.5 Hubungan Jarak Kehamilan dengan BBLR.....	42
TABEL 4.6 Hubungan Paritas dengan BBLR.....	42
TABEL 4.7 Hubungan Riwayat Abortus dengan BBLR.....	43
TABEL 4.8 Hubungan Anemia dengan BBLR.....	44



DAFTAR SKEMA

Gambar 1.1 Patofisiologi Hubungan Kehamilan Usia Dini dengan Kejadian BBLR.....	27
Gambar 1.2 Kerangka Teori.....	29
Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	30
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

World Health Organization (WHO) mendefinisikan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) merupakan kondisi dimana bayi lahir dengan berat kurang dari 2500 gram. *World Health Organization* (WHO,2018) menuliskan, bahwa prevalensi kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di dunia lebih sering terjadi di Negara berkembang yaitu berkontribusi sebesar 96.5% (WHO,2018). BBLR memiliki dampak yang buruk pada proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada bayi yang berat kurang dari 2500 memiliki resiko tinggi untuk mengalami gangguan perkembangan kognitif seperti retardasi mental (Hartiningrum and Fitriyah, 2019).

Angka kematian bayi berkaitan erat dengan kejadian berat bayi lahir rendah, berdasarkan data dari Kemenkes RI 2020, di tahun 2019 penyebab kematian bayi terbanyak adalah kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dengan kasus sebanyak 35,5%. Dan penyebab kematian lainnya di antaranya asfiksia sebanyak 27,0%, kelainan bawaan 12,5%, sepsis 3,5%, tetanus neonatorium 0,3%, dan lainnya 21,4 % (Kemenkes, 2020).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan pada tahun 2020, 3 angka kejadian BBLR tertinggi di Sulawesi Selatan terdapat di Bulukumba (88,8%), Makassar (78,1%), dan Bone (41,0%) (Dinkes Sulsel 2020). Dari data Dinas Kesehatan kota Makassar pada tahun 2020 jumlah BBLR tertinggi berada di Puskesmas Tamangapa yaitu (12.63%), Puskesmas Daya (11,19%), dan puskesmas Jongaya sebanyak (7,92%) (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2020).

Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) salah satunya berasal dari faktor ibu, seperti usia ibu saat hamil yang terlalu muda atau terlalu tua (<20 tahun dan >35 tahun), status gizi, penyakit yang berhubungan langsung dengan kehamilan, jarak kehamilan, paritas ibu, keadaan

sosial-ekonomi. Faktor ibu merupakan faktor yang paling berpengaruh tinggi dengan kejadian BBLR terutama anemia, usia saat hamil, paritas dan jarak kehamilan dan status gizi (Septiani and Ulfa, 2018).

Usia pada saat kehamilan menjadi salah satu faktor yang berperan dalam kejadian BBLR terkhusus pada usia dini. Kehamilan remaja atau kehamilan pada usia dini merupakan kehamilan pada usia < 20 tahun. Kehamilan pada usia < 20 tahun memiliki risiko medis lebih tinggi yang dapat merugikan bagi kesehatan Ibu maupun janin (Cindrya, 2019).

Dalam reproduksi sehat dikenal bahwa usia baik untuk kehamilan dan persalinan adalah usia produktif yaitu 21-35 tahun, sedangkan usia berisiko untuk kehamilan dan persalinan adalah <20 tahun atau > 35 tahun. Ibu dengan usia < 20 tahun dianggap terlalu muda sehingga baik secara fisik maupun emosional belum cukup matur (Perwiraningtyas, Ariani and Anggraini, 2020).

Berdasarkan data *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) tahun 2020 indonesia termasuk Negara kedua dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di Asia Tenggara setelah Kamboja. Di Indonesia terdapat lebih dari satu juta perempuan dengan usia 20-24 tahun yang perkawinan terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan pernikahan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan. Di Pulau Sulawesi dan Kalimantan memiliki prevalensi perkawinan anak lebih tinggi dari angka nasional. Prevalensi perkawinan anak di Pulau Sulawesi berkisar antara 14 – 19% (Kemen PPN/Bappenas, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menyatakan bahwa batasan usia perkawinan hanya dilakukan pada usia 19 tahun. Namun, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018 sebanyak 22,59 % remaja yang melakukan perkawinan pada usia kurang dari 19 tahun, dan Pada

tahun 2019 meningkat menjadi 23,07%, dan pada tahun 2020 sebanyak 21,84% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2018, sebanyak 15,61% remaja perempuan di Indonesia dengan usia < 20 tahun melahirkan bayi BBLR, dan meningkat pada tahun 2019 yaitu 14,93% remaja perempuan dengan usia < 20 tahun melahirkan bayi BBLR. Dan Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, persentase remaja perempuan dengan usia < 20 tahun yang melahirkan bayi BBLR naik menjadi 15,74% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Dalam agama islam, kehamilan merupakan salah satu bentuk kebesaran Allah SWT dan bukti bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu, al-Qur'an juga telah menyebutkan bahwa wanita yang sedang hamil akan mengalami berbagai kesulitan. Hal ini tertuang dalam ayat Q.S al-Ahqaf (46):15 dan Q.S Luqman (31):14, Allah SWT berfirman :

وَفَصَّلْهُ وَحَمْلُهُ ۗ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ زُهًا ۗ إِنَّكَ أُمُّهُ حَمْلَتْهُ ۗ إِحْسَانًا بِوَالِدَيْهِ الْإِنْسَانَ وَوَصَيْنَا
أَشْكُرَ أَنْ أَوْزَعَنِي رَبِّي قَالَ سَنَةٌ ۖ أَرْبَعِينَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ إِذَا حَتَّى ۗ شَهْرًا ثَلَاثُونَ
فِي لِي وَأَصْلِحْ تَرْضَاهُ صَالِحًا لِّأَعْمَ وَأَنَّ وَالِدِيَّ وَعَلَى عَلَيَّ أَنْعَمْتَ الَّتِي نِعْمَتَكَ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَاِنِّي الْبَيْتُ ثَبْتُ اِنِّي ذُرِّيَّتِي ۗ

Terjemahan :

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah

dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

Dalil serupa juga terdapat pada Q.S Luqman (31):14, Allah SWT berfirman :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahan :

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”.

Kedua ayat di atas Allah SWT menjelaskan sebab wasiat dan pengkhususan kepada ibu sebagai pertolongan dan perhatian lebih. Berdasarkan tafsir Al-munir, ayat di atas menjelaskan ibunya mengandung dalam perutnya dan melahirkannya dengan susah payah. Pada saat mengandung, Ibu menahan derita dengan kepayahan, seperti halnya mengindam, mual, muntah. Pada masa ngidam, ibu bisa merasakan tidak doyan makan, minum, serta merasa jijik akan sesuatu. Dan saat melahirkanpun masih dengan susah payah, menahan rasa sakit ketika melahirkan, lalu menyusui dan mendidiknya (Wahbah az-Zuhaili, 2016). Berdasarkan kitab terjemahan Jalalain kata Wahnun bermakna sesuatu yang melelahkan, dan Qurhun sesuatu yang menyakitkan, menyakitkan namun jika sudah tercapai akan membahagiakan, seperti orang berperan, melahirkan.

Berdasarkan tafsir Al-Misbah Qurais Shihab menjelaskan bahwa beratnya mengandung dan melahirkan yang dialami oleh seorang ibu. Dengan kemajuan dibidang embriologi dapat diketahui secara lahiriah betapa besarnya pengorbanan, kesengsaraan ibu hamil saat mengandung, kesusahan dan kepayahan yang dialami oleh ibu yang sedang hamil. Banyaknya kesulitan yang dialami, mulai dari mengidam, dengan gangguan fisik dan psikis, bahkan melahirkan dengan susah payah setelah masa kehamilan berakhir (Shihab, 2012).

Oleh sebab itu pentingnya seorang calon ibu untuk memiliki pengetahuan terkait kehamilan dan menjaga kesehatan selama kehamilan, seperti memperhatikan faktor-faktor risiko yang dapat memberikan masalah pada kehamilan seperti faktor ibu yaitu hamil pada usia dini. Kehamilan dapat mempengaruhi perubahan fisik ibu hamil yang dimungkinkan dapat mengganggu kesehatan fisik dan metalnya. Ibu yang sedang hamil cenderung merasakan emosi yang tidak stabil. Dia lebih sering mengalami gejala batin, seiring perkembangan fisiknya. Depresi yang di alami selama kehamilan merupakan faktor risiko independen untuk berat bayi lahir rendah dan kelahiran prematur. Tekanan yang dirasakan oleh ibu hamil ini akan berdampak pada janin. Pada ibu hamil yang memiliki usia < 20 tahun memiliki resiko jauh lebih besar mengalami masalah reproduksi dalam kehamilan, karena pada < 20 tahun masih mengalami pertumbuhan fisik, perkembangan seksual, emosi yang labil. Sehingga hal tersebut dapat beresiko menimbulkan masalah dalam kehamilan seperti kejadian berat bayi lahir rendah yang akan berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan bayi yang akan di lahirkan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nuzula, Dasuki and Kurniawati, 2020) di dapatkan kesimpulan bahwa kehamilan usia dini memiliki hubungan bermakna dengan kejadian berat bayi lahir rendah. penelitian (Purba, Rahayujati and Hakimi, 2016) juga menuliskan bahwa proporsi kejadian BBLR lebih besar pada usia remaja (29,9%) dibandingkan

kehamilan usia dewasa (13,7%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Kanada oleh (Ergen *et al.*, 2017) menyebutkan bahwa ibu remaja di Kanada lebih cenderung melahirkan bayi yang prematur, BBLR, dan mengalami lahir mati dari pada ibu dengan usia dewasa. Oleh karena hal-hal yang telah di sebutkan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Hubungan Kehamilan Usia Dini Dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah terdapat hubungan antara kehamilan usia dini dengan kejadian berat bayi lahir rendah?

C. HIPOTESIS

2. Hipotesis Nol (H_0)
 - a. Tidak ada hubungan antara kehamilan usia dini dengan kejadian berat badan lahir rendah.
3. Hipotesis Alternatif (H_a)
 - a. Terdapat hubungan antara kehamilan usia dini dengan kejadian berat badan lahir rendah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR


D. DEFINISI OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

1.1 Definisi Oprasional Variabel

NO	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Kriteria Objektif	Skala
Variabel Independen					
1.	Kehamilan Usia Dini	Kehamilan usia dini (usia muda/remaja) adalah kehamilan yang terjadi pada remaja putri berusia < 20 tahun.	Melihat usia pasien pada rekam medis	Usia Remaja < 20 tahun Usia Dewasa \geq 20 tahun	Nominal
Variabel Dependen					
2.	Berat Bayi Lahir Rendah	Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) merupakan kondisi dimana bayi lahir dengan berat kurang dari 2500 gram	Melihat data rekam medis pasien dengan riwayat BBLR	< 2500gram yaitu bayi dengan berat lahir rendah. \geq 2500 yaitu bayi dengan berat normal.	Ordinal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Menghubungkan antara kehamilan usia dini dengan kejadian berat bayi lahir rendah dengan metode melihat rekam medis pasien yang mengalami berat badan lahir rendah.



E. KAJIAN PUSTAKA

1.2 Kajian Pustaka

NO	Nama Peneliti, dan Tahun penelitian	Judul	Tujuan	Metode	Persamaan	Hasil
1.	Rizka Firdaus Nuzula, Djaswadi Dasuki, Herlin Ftriana Kurniawati, 2020	<i>Hubungan kehamilan pada usia remaja dengan kejadian berat bayi Lahir rendah (bblr) di rsud panembahan senopati</i>	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kehamilan pada usia remaja dengan kejadian BBLR di RSUD Panembahan Senopati	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan <i>case control study</i> dengan pendekatan kohort retrospektif	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang hubungan kehamilan usia dini dengan kejadian BBLR.	kehamilan pada usia remaja dengan umur kurang dari 20 tahun berisiko 1,8 kali melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan dengan melahirkan berat bayi lahir normal.
2.	Edy Marjuang Purba, Theodola Baning Rahayujati, Mohammad Hakimi, 2016	<i>Kehamilan usia remaja dan kejadian bayi berat lahir rendah di kabupaten gunung kidul</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kehamilan usia remaja dengan kejadian BBLR di kabupaten gunungkidul.	Penelitian ini termasuk studi observasional analitik, menggunakan desain kohort retrospektif.	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang hubungan kehamilan usia dini dengan kejadian BBLR.	Proporsi kejadian BBLR lebih besar pada usia remaja (29,9%) dibandingkan kehamilan usia dewasa (13,7%)

3.	Evrin Bostanci Ergen, Cigdem Abide Yayla, Enis Ozkaya, Cetin Kilicci, Ilhan Sanverdi, Canan Kabaca Kocakusak,2017	<i>Maternal-fetal outcome associated with adolescent pregnancy in a tertiary referral center: a cross-sectional study</i>	Penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk membandingkan spesifik komplikasi kehamilan yang berhubungan dengan ibu-janin pada hasil akhir remaja awal-tengah, remaja akhir dan wanita dewasa	Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang hubungan kehamilan usia dini dengan kejadian BBLR.	Ibu remaja di Kanada lebih cenderung melahirkan bayi yang prematur, BBLR, dan mengalami lahir mati dari pada ibu dengan usia dewasa.
4.	Erlyn Evasari, Elsa Nurmala,2017	<i>Hubungan Umur, Paritas dan Status Gizi Ibu dengan Kejadian BBLR.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara masing-masing variabel independent (umur, paritas dan status gizi ibu) dengan variable dependen (BBLR).	Pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan case control, yaitu penelitian (survey).	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti hubungan umur dan status gizi pada ibu hamil.	Terdapat hubungan antara umur, paritas, dan status gizi.

F. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kehamilan usia dini dengan kejadian berat bayi lahir rendah.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui jumlah ibu hamil di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021.
- b. Mengetahui jumlah ibu hamil dengan usia dini di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021.
- c. Mengetahui jumlah ibu hamil dengan BBLR di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021.
- d. Mengetahui hubungan kehamilan usia dini dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021.

G. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman berharga bagi peneliti dalam memperoleh wawasan dalam bidang penelitian dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bidang kesehatan terutama mengenai hubungan kehamilan usia dini dengan kejadian BBLR.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang hubungan kehamilan usia dini dengan kejadian BBLR, Sehingga Masyarakat dapat paham tentang faktor-faktor risiko dari kehamilan pada usia dini, dan kaitannya dengan kejadian BBLR.

3. Bagi Peneliti Lain

Menambah referensi penelitian mengenai ibu dan anak, sehingga bisa menjadi dasar dan acuan untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

4. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, terutama pada penerapannya terkait kasus BBLR.

5. Bagi institusi

Memberikan informasi hasil data tambahan pada bidang kesehatan ibu dan anak, terkhusus mengenai hubungan antara kehamilan usia dini dengan kejadian BBLR.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEHAMILAN USIA DINI

1. Definisi Kehamilan

Kehamilan adalah proses fisiologi normal yang dialami wanita. Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional kehamilan merupakan proses fertilisasi atau penyatuan spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Kehamilan normal berlangsung selama 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender jika dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, trimester pertama berlangsung selama 12 minggu, trimester kedua selama 15 minggu, yaitu (minggu ke 13 sampai ke 27) dan trimester ketiga selama 13 minggu, yaitu (minggu ke 28 sampai ke 40) (Prawirohardjo, 2016).

2. Definisi Kehamilan Usia Dini

Kehamilan usia dini (Remaja) adalah kehamilan pada anak perempuan dengan usia 13-19 tahun. Kehamilan usia dini merupakan kehamilan yang memiliki resiko tinggi, kehamilan pada usia < 20 tahun sangat berkaitan dengan kehamilan yang merugikan seperti pre-eklampsia, anemia, persalinan operatif, endometritis nifas, perdarahan postpartum, berat bayi lahir rendah, persalinan premature, hingga kematian perinatal (Abebe *et al.*, 2020).

3. Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada Usia dini (Remaja)

Pada pertumbuhan dan perkembangan di usia remaja terjadi beberapa perubahan seperti pada pertumbuhan fisik, hormon, dan pertumbuhan tulang. awal pubertas perubahan yang terjadi pada perempuan yaitu pada bentuk badan, dengan bertambahnya lemak pada paha, panggul, bokong, dan

pertumbuhan payudara, perubahan rambut ketiak dan pubis. Pada masa adalah masa peralihan dari pubertas ke dewasa, yaitu pada umur 11- 19/20 tahun. Pada usia ini mulai terbentuk parasaan identitas individu, mulai merasakan ingin kebebasan dari keluarga, dan melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan kepercayaan dari ayah dan ibu. Dalam tumbuh kembang menuju dewasa, berdasarkan kematangan psikososial dan seksual, semua remaja akan mengalami 3 tahapan yaitu: Masa remaja awal (Early adolescence): umur 11-13 tahun, masa remaja pertengahan (Middle adolescence): umur 14-16 tahun, dan masa remaja lanjut (late adolescence): umur 17- 20 tahun. Perkembangan dan pertumbuhan tulang di masa adolesen merupakan puncak pertumbuhan massa tulang. Selama usia belasan tahun, minimal separuh puncak massa tulang dicapai, dimodulasi oleh hormon pertumbuhan, hormon seks seperti estrogen, dan steroid adrenal seperti dehidroepiandrosteron (DHEA) (Prawirohardjo, 2018).

Allah SWT berfirman dalam Q.S: Al-Maidah /6: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahannya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Berdasarkan tafsir Kementrian Agama pada ayat ini menjelaskan bahwa makanlah wahai orang-orang beriman, dari apa yang telah diberika Allah kepadamu, berupa bahan makanan yang berasal dari darat ataupun dari laut, baik protein nabati maupun protein hewani sebagai rezeki yang halal dan baik untuk meningkatkan aktivitas kamu dalam hidup ini, dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

4. Faktor Penyebab Kehamilan Usia Dini

Tingginya angka kehamilan pada usia dini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adalah pengetahuan tentang seksual yang kurang pada umur <20 tahun masih cukup minim, sehingga dapat memberikan resiko bagi aktivitas-aktivitas seksual yang dapat menyebabkan kehamilan usia dini dan memberikan resiko bagi kehamilan, begitupun dengan pergaulan yang negatif yang dapat memberikan dampak yang buruk bagi setiap individu, seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang. Selain dari itu sosial ekonomi yang rendah dan faktor sosiodemografi juga ikut berperan dalam faktor penyebab dari kehamilan usia dini (Meriyani *et al.*, 2016).

5. Resiko Kehamilan Pada Usia Dini

Kehamilan pada usia dini (remaja) merupakan kehamilan yang terjadi pada usia < 20 tahun. Pada Remaja yang hamil sering lalai dalam pemeriksaan prenatal, hal ini disebabkan karena pada usia tersebut masih kurangnya pengetahuan, dan muncul ketakutan akan konsekuensi, akses terbatas, ataupun stigma yang ada di masyarakat. Risiko dari kehamilan usia dini < 20 tahun antara lain berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, lahir mati, dan preeklamsia, serta perasaan isolasi social, tujuan Pendidikan yang tertunda atau diabaikan hingga berdampak depresi pada Ibu (Leftwich, 2017).

6. Upaya pencegahan dan penanggulan pernikahan dan kehamilan pada usia dini.

Dalam upaya pencegahan pernikahan dini yang dapat diterapkan adalah (1) memberdayakan anak dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung lainnya, (2) memberi edukasi kepada orangtua mengenai dampak pernikahan dini, khususnya terhadap kesehatan Ibu dan anak, (3) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak, dan (4)

Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini, khususnya di daerah yang memiliki kasus tinggi untuk pernikahan usia dini. Hasil ini dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat (Bastomi, 2016).

Selain dari itu upaya seperti memberikan edukasi dan sosialisasi kepada tokoh adat dan tokoh agama untuk penundaan pernikahan usia dini di daerah setempat (Hamidiyanti, dkk 2018). Selain itu remaja perlu mendapatkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan sosialisasi dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan ibu dan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan ataupun forum diskusi di sekolah. Kesehatan reproduksi remaja perlu mendapat perhatian khusus, karena secara tidak langsung juga akan berdampak pada tingkat kesehatan ibu dan anak di masa mendatang. Kasus pernikahan usia dini masih terjadi di beberapa etnis di Indonesia. Pernikahan usia dini tersebut berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Kasus perdarahan, keguguran, hingga kesulitan melahirkan terjadi pada ibu hamil usia muda, Kasus kematian bayi akibat lahir prematur dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (Puspasari, 2020).

B. BERAT BAYI LAHIR RENDAH

1. Definisi Berat Bayi Lahir Rendah

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) merupakan salah satu masalah kesehatan di masyarakat, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) didefinisikan sebagai bayi yang lahir dengan berat badan <2500 gram. Bayi dengan Berat Lahir Rendah dapat menyebabkan timbulnya suatu gangguan perkembangan baik secara kognitif maupun motorik yang tidak sesuai, di bandingkan dengan bayi dengan berat badan lahir normal. Bayi dengan BBLR juga

memiliki resiko lebih tinggi dalam mengalami kematian (Hartiningrum and Fitriyah, 2019).

2. Klasifikasi Berat Bayi Lahir Rendah

Berat bayi lahir rendah dapat dikelompokkan berdasarkan 2 cara yaitu berdasarkan harapan hidupnya dan berdasarkan masa gestasinya. Berdasarkan harapan hidupnya terdiri dari BBLR (Berat bayi lahir rendah) dengan berat 1500-2500 gram, BBLSR (Berat bayi lahir sangat rendah) dengan berat 1000-1500 gram, dan BBLER (Berat bayi lahir ekstrim rendah (BBLER) yaitu dengan berat kurang dari 1000 gram. Sedangkan berdasarkan masa gestasinya terdiri dari prematuritas murni dimana masa gestasinya yang kurang dari 37 minggu dan berat badannya sesuai dengan berat badan untuk masa gestasi berat atau biasa disebut neonates kurang bulan sesuai untuk masa kehamilan (NKB-SMK), dan Dismaturitas yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari berat badan seharusnya untuk masa gestasinya (Proverawati and Ismawati, 2020).

3. Etiologi dan Faktor Resiko Berat Bayi Lahir Rendah

Secara umum penyebab dari terjadinya kejadian BBLR merupakan multifaktor. Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan bayi BBLR adalah:

a. Usia Ibu

Saat masa kehamilan usia Ibu mempengaruhi kondisi kehamilan karena berhubungan dengan kematangan organ reproduksi dan kondisi psikologis. Secara biologis wanita dianjurkan mengandung pada usia subur yaitu pada usia 20-35 tahun, sebab pada usia tersebut lebih banyak energi yang dimiliki oleh wanita hamil. Usia yang terlalu muda merupakan faktor risiko hal ini disebabkan karena belum matangnya organ reproduksi

untuk hamil sedangkan pada usia diatas 35 tahun terjadi kemunduran dan penurunan daya tahan tubuh. (Monita, Suhaimi and Ernalia, 2016).

b. Frekuensi ANC

Ibu hamil yang tidak melakukan ANC memiliki 2,65 kali resiko yang lebih tinggi untuk melahirkan BBLR (berat bayi lahir rendah) dibanding dengan yang sering melakukan kunjungan ANC (antenatal care). Secara teori ANC memiliki manfaat untuk memantau perkembangan dan kesehatan Ibu dan janin selama masa kehamilan berlangsung. (Perwiraningtyas, Ariani and Anggraini, 2020).

c. Anemia

Anemia adalah suatu kondisi atau keadaan yang ditandai dengan penurunan kadar hemoglobin (Hb). Anemia pada kehamilan adalah kondisi Ibu dengan kadar hemoglobin dibawah 11 gr% (Sjahrani, 2019). Anemia dalam kehamilan memiliki dampak yang buruk baik bagi Ibu maupun janin, yang akan menyebabkan terganggunya oksigen maupun suplai nutrisi dari Ibu ke janin, sehingga dapat mengakibatkan janin mengalami gangguan penambahan berat badan sehingga terjadi BBLR (Rahmati *et al.*, 2017)

d. Jarak Kehamilan

Jarak kehamilan yang ideal antar kelahiran adalah lebih dari 2 tahun, dengan demikian dapat memberi kesempatan pada tubuh untuk memperbaiki persediannya dan organ-organ reproduksi untuk siap mengandung lagi. Sistem reproduksi yang terganggu akan menghambat perkembangan pertumbuhan dan perkembangan janin. Jarak < 2 tahun dapat beresiko menyebabkan

kematian janin saat dilahirkan, BBLR, kematian di usia bayi ataupun anak bertubuh kecil (Monita, Suhaimi and Ernalia, 2016).

e. Jumlah Paritas

Jumlah Paritas dapat mempengaruhi terjadinya BBLR. Paritas adalah jumlah persalinan Ibu, secara teori BBLR meningkat ketika jumlah paritas meningkat, apabila dilihat dari mortalitas Ibu, jumlah paritas yang aman 2-4 sebaliknya paritas 1 dan >4 memiliki resiko tinggi. Hal ini dikarenakan dapat terjadinya suatu komplikasi yang kemungkinan dialami akan lebih besar. Ketika Ibu yang memiliki jumlah paritas tinggi, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan elastisitas dari uterusnya, sehingga kontraksi uterus akan terganggu sehingga dapat menyebabkan perdarahan saat kehamilan yang berakhir pada kelahiran premature maupun BBLR (Perwiraningtyas, Ariani and Anggraini, 2020).

f. Status gizi

Status Gizi dapat diukur menggunakan IMT (indeks massa tubuh). Ibu yang berat badannya kurang akan beresiko melahirkan bayi BBLR dan premature. Indeks massa tubuh pada Ibu yang kurang menunjukkan bahwa kebutuhan gizi ibu belum terpenuhi, sehingga Ibu akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi janinya (Endah, Theresia and Wahyuningsih, 2017).

g. Ketuban Pecah Dini

Ketuban pecah dini adalah keluarnya cairan dari vagina setelah usai kehamilan 22 minggu. ketuban pecah dini adalah pecahnya selaput ketuban yang dapat terjadi pada kehamilan preterm maupun term. KPD mempunyai resiko melahirkan dengan bayi berat lahir rendah (Nuzula, Dasuki and Kurniawati, 2020).

h. Pendidikan ibu

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Ibu menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Ibu memiliki pengaruh terhadap berat bayi lahir terutama pada Ibu hamil usia remaja (Utami and Huriyati, 2018).

i. Faktor lainnya:

Beberapa faktor lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya BBLR yaitu pada faktor plasenta. Faktor plasenta merupakan faktor yang berhubungan dengan terjadinya kejadian BBLR. Faktor plasenta terdiri dari: Hidramnion, infark, Tumor, plasenta yang lepas, sindrom plasenta yang lepas, sindrom transfuse bayi kembar. Selain faktor plasenta lingkungan juga ikut berperan dalam faktor yang dapat memberikan risiko BBLR seperti bertempat tinggal di dataran tinggi, terkena radiasi, terpapar zat beracun, faktor lainnya adalah pada kebiasaan Ibu seperti seperti merokok, minum alkohol, atau pecandu obat narkotika yang dapat mempengaruhi janin. Pekerjaan Ibu juga memiliki pengaruh bagi faktor resiko terjadinya BBLR. Mempunyai riwayat BBLR sebelumnya juga termasuk faktor terjadinya BBLR. Infeksi menular seksual, HIV/AIDS, TORCH dan hipertensi merupakan faktor resiko terjadinya BBLR (Proverawati and Ismawati, 2020).

4. Manifestasi Klinis Berat Bayi Lahir Rendah

Berat Bayi lahir rendah merupakan berat bayi yang lahir dengan berat <2500 gram. Secara umum gambaran klinis dari bayi BBLR adalah berat badan bayi < 2500 gram, panjang badan < 45 cm, lingkar kepala <33 cm, lingkar dada < 30 cm, kepala bayi lebih besar dari badannya, dan rambut kepala tipis halus. Pada dinding thorax elastis, puting susunya belum

terbentuk, terdapat distensi abdomen, kulit pada bayi BBLR tipis dan transparan, di bagian ekstremitas terkadang ditemukan oedema, rambut lanugo banyak, lemak kurang, dan pergerakan pada bayi masih sangat lemah. Pada bayi laki-laki skrotum kecil, bahkan testis tidak teraba, pada bayi perempuan labia mayor hamper tidak ada, dan klitoris menonjol (Erni Hernawati, S.S.T. and Lia Kamila, S.S.T., 2017).

5. Penatalaksanaan Berat Bayi Lahir Rendah

Penatalaksanaan yang diberikan pada bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu: Mengatur suhu untuk mencegah terjadinya hipotermia, di perlukan suhu yang cukup hangat dan istirahat konsumsi O₂ yang cukup. Bayi yang baru lahir dengan riwayat BBLR dirawat dalam inkubator. Suhu inkubator disesuaikan dengan berat badan bayi pada saat lahir bayi. Bayi yang lahir dengan berat 2100 – 2500 gram suhu inkubatornya pada hari pertama dan hari kedua adalah 34°C, pada hari ke tiga dan ditiap minggunya maka suhu inkubator turun menjadi 33°C. Pengaturan suhu akan berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan bayi. Bayi dalam inkubator menggunakan popok hal ini untuk memudahkan dalam pemantauan keadaan umum pada bayi seperti, warna kulit, pernafasan, kejang dan sebagainya sehingga penyakit dapat dikenali sedini mungkin (Ismayanah, Nurfaizah and Syatirah, 2020).

Pemberian makanan/nutrisi yaitu dalam pemberian makanan dilakukan dengan sedikit demi sedikit. Secara perlahan-lahan dan hati-hati, pemberian makanan dini yaitu ASI atau PASI untuk mengurangi resiko hipoglikemia, dehidrasi, atau hiperbilirubin. Untuk bayi yang daya isapnya baik dan tidak sakit berat dapat minum melalui mulut. Umumnya pada bayi dengan berat <1500gram memerlukan pipa lambung sebagai alat untuk memperoleh minuman hal ini dikarenakan belum adanya koordinasi antara gerakan menghisap dengan menelan. Dianjurkan pada pertama kali minum sebanyak

1 ml larutan glukosa 5% yang steril untuk bayi dengan berat < 1000 gram, 2-4 ml untuk bayi dengan berat antara 1000-1500 gram dan 5-10 ml untuk bayi dengan berat >1500 gram. Jika dengan pemberian makanan kesukaran, pemberian ASI / PASI bisa dilanjutkan dalam waktu 12-48 jam. Untuk mencegah terjadinya penularan infeksi pada bayi diperlukan tingkat hygiene yang tinggi, bayi dengan premature mudah terserang infeksi hal ini dapat disebabkan karena daya tahan tubuh bayi terhadap infeksi kurang antibodi relatif belum terbentuk dan daya fagositosis serta reaksi terhadap peradangan belum baik (Lestari, 2016).

6. Masalah dan Komplikasi Berat Bayi Lahir Rendah

BBLR merupakan berat bayi lahir rendah dimana terdapat berbagai masalah dan komplikasi yang dapat terjadi pada bayi yang lahir dengan berat rendah. Pada jangka pendek dapat terjadi gangguan metabolik yaitu Hipotermia, hipotermia dapat terjadi disebabkan pada suhu yang pada saat di kandungan berbeda dengan suhu lingkungan yang normal, yang umumnya lebih rendah. Perbedaan suhu ini memberi pengaruh pada kehilangan panas tubuh bayi. Hipotermia dapat terjadi karena kemampuan untuk mempertahankan panas dan kesanggupan menambah produksi panas sangat terbatas karena pertumbuhan otot-otot yang belum cukup memadai. Selain hipotermia, komplikasi yang dapat timbul adalah hipoglikemia hipoglikemia dapat terjadi sebanyak 50% pada bayi matur. Glukosa merupakan sumber utama energi selama masa janin. Kecepatan glukosa yang diambil janin tergantung dari kadar gula darah pada ibu sebab terputusnya hubungan plasenta yang menyebabkan terhentinya kadar gula darah (Pantiawati, 2019).

Pada gangguan metabolik masalah pada pemberian ASI juga ikut berperan pada bayi BBLR masalah pemberian ASI dapat terjadi dikarenakan ukuran tubuh bayi yang kecil, sehingga energy dari bayi kurang, dan lemah,

lambungnya juga kecil, dan tidak bias mengisap. Bayi yang bblr biasanya mendapatkan ASI dengan bantuan, membutuhkan pemberian ASI dalam jumlah yang lebih sedikit tapi sering. Masalah jangka pendek lainnya yang dapat terjadi adalah gangguan imunitas dan gangguan pernafasan. Daya tahan tubuh terhadap infeksi pada bayi BBLR berkurang karena rendahnya kadar ig G, maupun gamma globulin. Di karenakan pada system kekebalan tubuh bayi BBLR belum matang, kejang saat dilahirkan dan icterus juga dapat terjadi. Pada gangguan pernafasan yaitu sindroma gangguan pernafasan pada bayi dengan BBLR merupakan perkembangan imatur pada sistem pernafasannya, atau tidak adekuatnya jumlah surfaktan pada kapasitas paru-parunya (Proverawati and Ismawati, 2020).


Selain dari masalah jangka pendek, masalah jangka panjang juga dapat terjadi yaitu adanya gangguan perkembangan pertumbuhan, gangguan bicara dan komunikasi, gangguan neurologi dan kognisi, gangguan belajar, gangguan atensi dan hiperaktif, pada bayi dengan BBLR, proses pertumbuhan dan perkembangan lebih lambat berkaitan dengan maturitas otak, kemampuan bicaranya juga akan lebih lambat dibandingkan dengan berat lahir normal (BLN). Bayi dengan Berat Badan Lahir Sangat Rendah (BBLSR) yang berhasil dalam melewati masa kritisnya beresiko tinggi untuk terjadinya lambat perkembangan. Hal ini juga berlaku untuk kognisi abnormal atau IQ rendah. Pada penelitian menunjukkan bahwa gangguan atensi dan hiperaktif lebih banyak terjadi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Dan lebih banyak pada anak dengan berat lahir < 2041 gram .Dan komplikasi lainnya yang dapat terjadi pada BBLR adalah penyakit paru kronik, gangguan penglihatan dan pendengaran, dan kelainan bawaan seperti kelainan jantung, hipospadia, spina bifida (Proverawati and Ismawati, 2020).

7. Pencegahan Berat Bayi Lahir Rendah

Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian BBLR yaitu dengan memperhatikan asupan nutrisi terutama pada kehamilan trimester ke III, selain dari pada itu mengurangi beban kerja atau aktivitas fisik karena ibu yang tetap melakukan aktivitas fisiknya selama kehamilan sementara asupan makanannya tidak bertambah porsi makannya dibandingkan sebelum kehamilan akan mendapatkan tambahan beban dari bayinya. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, sebaiknya ibu dapat merencanakan persalinan pada kurun umur reproduksi sehat yaitu usia 20-35 tahun , serta meningkatkan pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga agar ibu hamil dapat meningkatkan akses terhadap pemanfaatan pelayanan antenatal dan status gizi ibu selama kehamilan (Pantiawati, 2019).

Pencegahan yang dapat dilakukan selain dari yang disebutkan diatas yang tidak kalah pentingnya adalah dengan Meningkatkan pemeriksaan kehamilan secara berkala minimal dilakukan 4 kali selama kehamilan. Ibu hamil yang diduga berisiko, terutama faktor resiko yang mengarah ke kejadian berat bayi lahir rendah harus cepat dilakukan pemantauan dilayanan kesehatan (Pantiawati, 2019). Asuhan antenatal (ANC) merupakan salah satu cara dalam mengontrol kondisi kesehatan kehamilan ibu dan janin, sehingga dapat mendeteksi kelainan dalam kehamilan secara dini (Irhamnia Sakinah, 2019).

C. HUBUNGAN KEHAMILAN USIA DINI DENGAN KEJADIAN BBLR



Gambar 1.1 Patofisiologi Hubungan kehamilan usia dini dengan kejadian berat bayi lahir rendah.

Ibu hamil dengan usia kurang dari 20 tahun akan mengalami masalah, baik secara fisik maupun secara mental. Secara fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, sehingga dapat menyebabkan kesakitan maupun kematian ibu dan bayinya dan pertumbuhan serta perkembangan fisik ibu terhenti atau terlambat. Sedangkan secara mental ibu belum siap untuk menghadapi perubahan yang terjadi saat hamil, belum siap menjalankan peran sebagai ibu, dan juga belum siap dalam menghadapi permasalahan yang akan terjadi dalam rumah tangga (Srimiyati and Kristina Ajul, 2021)

Jika digabungkan faktor fisik dan mental yang belum matang pada usia remaja, maka akan meningkatkan resiko terjadinya persalinan yang sulit dengan komplikasi medis. Faktor umur pada ibu hamil berkaitan dengan BBLR, semakin muda atau semakin tua umur seorang ibu hamil akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur ibu <20 tahun perlu tambahan gizi yang banyak hal ini di karenakan selain digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi ibu yang hamil pada usia remaja, yaitu masih dalam masa pertumbuhan juga harus berbagi dengan janin yang sedang dikandung (Srimiyati and Kristina Ajul, 2021).

Faktor usia ibu merupakan faktor utama terjadinya kejadian BBLR Usia seorang wanita. Pada usia ibu <20 tahun berisiko melahirkan BBLR karena organ reproduksi ibu belum terlalu matang secara biologis dan juga belum berkembang dengan baik. Organ reproduksi yang belum matang dan sempurna dapat menyebabkan berkurangnya suplai aliran darah ke serviks dan uterus. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kurangnya nutrisi terhadap janin yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang dapat menyebabkan kondisi bayi saat dilahirkan memiliki BBLR (Sujianti, 2018).


D. KERANGKA BERPIKIR

1. Kerangka Teori



Gambar 1.2 Kerangka teori. Sumber : (Manuaba, 2014) (Ismayanah, Nurfaizah and Syatirah, 2020)

2. Kerangka konsep



Gambar 2.1 Kerangka konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan penelitian *analitik observasional* yaitu peneliti hanya melakukan pengamatan langsung terhadap variabel yang diteliti tanpa memberikan perlakuan. Melalui pendekatan *Cross sectional* yaitu suatu penelitian yang menggunakan dinamika kolerasi antara faktor-faktor risiko dimana semua pengukuran variabel.

B. LOKASI DAN TEMPAT PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam jangka waktu bulan oktober - Januari 2022.

C. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi penelitian

Populasi dari penelitian adalah semua ibu yang melahirkan bayi lahir hidup di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar 2 Tahun terakhir sebanyak 370 kasus.

2. Sampel penelitian

Sampel dari penelitian ini adalah semua ibu hamil dengan bayi lahir hidup di Puskesmas Tamangapa dan Jongaya Kota Makassar dengan menggunakan metode *Total Sampling* sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari total populasi sebanyak 370 sampel, yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 330 sampel. Yaitu adanya no rekam medik yang tidak lengkap, dan adanya bayi yang gemelli.

D. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dengan jenis *Total Sampling* dimana penentuan sampel disesuaikan dengan kriteria inklusi dan eksklusi berdasarkan tujuan penelitian.

1. Kriteria Inklusi

- a. Ibu yang melahirkan dengan bayi lahir hidup
- b. Data rekam medik lengkap

2. Kriteria Eksklusi

- a. Kehamilan kembar / Gemelli
- b. Bayi yang mengalami kelainan kongenital
- c. Data rekam medik tidak lengkap

E. CARA PENGUMPULAN DATA

Menggunakan data sekunder yang diperoleh oleh rekam medis pasien yang ada di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar.

F. INSTRUMEN PENELITIAN

1. Rekam Medis


Penelitian ini dilakukan menggunakan rekam medis pasien.

2. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari rekam medik pasien yang terkait dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar



G. ALUR PENELITIAN



H. LANGKAH PENGOLAHAN DATA

1. Penyunting Data (editing)

Peneliti akan memeriksa setiap data rekam medis pasien dengan riwayat BBLR

2. Pengkodean (coding)

Pengkodean data dilakukan dengan memberikan tanda atau kode pada hasil data rekam medik dengan riwayat BBLR yang diambil sesuai dengan kriteria inklusi

3. Entri Data

Entri data dilakukan dengan cara memasukkan setiap data yang di ambil ke dalam program computer untuk membuat distribusi frekuensi sederhana.

4. Tabulasi (Tabulating)

Data dimasukkan dalam bentuk tabel untuk menganalisis data sesuai tujuan penelitian

5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam penelitian, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan cara mencari makna hubungan antara variabel yang telah di teliti dan ditulis dalam bentuk narasi.

I. ANALISIS DATA

1. Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk menjelaskan masing-masing frekuensi distribusi, berupa gambaran karakteristik responden, variabel dependen dan variabel independen.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan menggunakan uji Chi Square untuk menguji hubungan atau pengaruh dari dua variabel kategorik dan mengukur kuatnya hubungan antara kedua variabel.

Rumus uji *Chi Square* :

$$x^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Keterangan :

x^2 : chi square

O: frekuensi observasi

E: frekuensi harapan

J. ETIK PENELITIAN


Etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut surat dengan nomor **B.195/KEPK/FKIK/I/2021** adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai permohonan izin penelitian.

3. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa dirugikan.

Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengambilan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Tamangapa, dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar dari Tahun 2020-2021. Jenis penelitian yang digunakan observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Jumlah populasi seluruh ibu yang melahirkan, pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Total Sampling* dengan jumlah 330 sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Pengumpulan data ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui hubungan kehamilan pada usia dini dengan kejadian berat bayi lahir rendah di beberapa puskesmas kota makassar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji *Chi-Square*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Univariat

Tabel 4.1, Tabel Karakteristik Data Ibu di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021

Karakteristik	N	%
Usia Ibu		
< 20 tahun	113	34,2
≥ 20 tahun	217	65,8
Pendidikan		
Rendah	55	16,7
Tinggi	275	83,3
Pekerjaan		
Bekerja	215	65,2
Tidak bekerja	115	34,8
Jarak Kehamilan		
< 2 tahun	143	43,3
≥ 2 tahun	187	56,7
Paritas		
Nulipara	134	43,3
Primipara	103	31,2
Multipara	93	28,2
Abortus		
Ya	293	88,8
Tidak	37	11,2
Status Anemia		
Ya	96	29,1
Tidak	234	70,9
Berat Badan Lahir		
Normal	158	47,9
BBLR	172	52,1
Total	330	100,0

Sumber : Data Sekunder 2020-2021

Berdasarkan tabel 4.1 Karakteristik data, didapatkan distribusi data usia pada Ibu yakni < 20 tahun sebanyak 113 responden (34,2%), dan > 20 tahun sebanyak 217 responden (65,8%).

Distribusi data riwayat pendidikan pada Ibu dengan pendidikan rendah sebanyak 55 responden (16,7%) dan Ibu dengan pendidikan tinggi sebanyak 275 responden (83,3%).

Distribusi data pekerjaan pada Ibu yakni Ibu bekerja sebanyak 215 responde (65,2%) dan Ibu tidak bekerja sebanyak 275 responden (83,3%).

Distribusi data jarak kehamilan pada Ibu yakni < 2 tahun sebanyak 134 responden (40,6%) dan > 20 tahun sebanyak 187 responden (56,7%).

Distribusi data riwayat paritas pada Ibu yakni *nulipara* sebanyak 134 responden (40,3%), *primipara* sebanyak 103 responden (31,2%) dan *multipara* sebanyak 93 responden (28,2%).

Distribusi data riwayat abortus pada Ibu dengan riwayat tidak abortus sebanyak 293 responden (88,8%) dan riwayat abortus sebanyak 37 responden (11,2%).

Distribusi data status anemia pada Ibu yakni Ibu dengan anemia sebanyak 96 responden (29,1%) dan tidak anemia sebanyak 234 responden (70,9%).

Distribusi data riwayat berat badan lahir pada bayi yakni normal sebanyak 158 responde (47,9%) dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 172 responden (52,1%).

2. Analisis Bivarian

Tabel 4.2 Hubungan Kehamilan Usia Dini dengan kejadian BBLR di puskesmas Tamangapa dan puskesmas Jongaya Kota makassar tahun 2020-2021

Usia	Berat Badan Lahir				Total		P-value
	BBLN		BBLR		n	%	
	N	%	n	%			
<20 tahun	27	8	86	26	113	34	
≥20 tahun	131	40	86	26	217	66	0,000
Total	158	48	172	52	330	100	

Sumber : Data Sekunder 2020-2021

Berdasarkan tabulasi tabel 4.2, didapatkan bahwa Ibu dengan usia < 20 tahun dengan berat badan lahir normal sebanyak 27 responden (8%), berat badan lahir rendah sebanyak 86 responden (26%) sedangkan Ibu dengan usia ≥ 20 tahun dengan berat badan bayi lahir normal sebanyak 131 responden (40%) dan berat badan lahir rendah sebanyak 86 responden (26%).

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* <0,005. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara riwayat usia kehamilan dini dengan kejadian berat badan lahir rendah.

Tabel 4.3 Hubungan Pendidikan dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021.

Pendidikan	Berat Badan Lahir				Total		p-value
	BBLN		BBLR		n	%	
	n	%	n	%			
Rendah	15	5	40	12	55	17	0,001
Tinggi	143	43	132	40	275	83	
Total	158	48	172	52	330	100	

Sumber : Data Sekunder 2020-2021

Berdasarkan tabulasi diatas, didapatkan bahwa Ibu dengan pendidikan rendah dengan berat badan lahir normal sebanyak 15 responden (5%), berat badan lahir rendah sebanyak 40 responden (12%) sedangkan Ibu pendidikan tinggi dengan berat badan bayi lahir normal sebanyak 143 responden (43%) dan berat badan lahir rendah sebanyak 132 responden (40%).

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika $p\text{-value} < 0,005$. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value}$ 0.001 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan Ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah.

Tabel 4.4 Hubungan Pekerjaan dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021

Pekerjaan	Berat badan				Total		p-value
	BBLR		BBLN		N	%	
	n	%	n	%			
Bekerja	113	34	102	31	215	65	0,459
Tidak bekerja	59	18	56	17	115	35	
Total	172	52	158	48	330	100	

Sumber : Data Sekunder 2020-2021

Berdasarkan tabulasi diatas, didapatkan bahwa Ibu bekerja dengan berat badan lahir rendah sebanyak 113 responden (34%), berat badan lahir normal sebanyak 102 responden (31%) sedangkan ibu yang tidak bekerja dengan berat badan bayi lahir rendah sebanyak 59 responden (18%) dan berat badan lahir normal sebanyak 56 responden (17%).

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika $p\text{-value} < 0,005$. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value}$ 0,459 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara pekerjaan ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah.

Tabel 4.5 Hubungan Jarak Kehamilan dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021

Jarak kehamilan	Berat badan Lahir				Total		p-value
	BBLR		BBLN		N	%	
	n	%	n	%			
< 2 tahun	79	24	64	19	143	43	0,321
≥ 2 tahun	93	29	94	28	187	57	
Total	172	53	158	47	330	100	

Sumber : Data Sekunder 2020-2021

Berdasarkan tabulasi diatas, didapatkan bahwa ibu yang jarak kehamilannya < 2 tahun dengan berat badan lahir rendah sebanyak 79 responden (24%), berat badan lahir normal sebanyak 64 responden (19%) sedangkan Ibu yang jarak kehamilannya \geq 2 tahun dengan berat badan bayi lahir rendah sebanyak 93 responden (29%) dan berat badan lahir normal sebanyak 94 responden (28%).

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* <0,005. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.321 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara jarak kehamilan Ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah.

Tabel 4.6 Hubungan jumlah paritas dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021

Paritas	Berat badan				Total		p-value
	BBLR		BBLN		N	%	
	n	%	n	%			
Nulipara	74	22	60	18	134	40	0,641
Primipara	51	15	52	16	103	31	
Multipara	47	14	46	14	93	29	
Total	172	52	158	48	330	100	

Sumber : Data Sekunder 2020-2021

Berdasarkan tabulasi diatas, didapatkan bahwa ibu paritas nulipara dengan berat badan lahir rendah sebanyak 74 responden (22%), berat badan lahir normal sebanyak 60 responden (18%) dan ibu paritas primipara dengan berat badan bayi lahir rendah sebanyak 51 responden (15%) dan berat badan lahir normal sebanyak 52 responden (16%) sedangkan ibu parities multipara dengan berat badan bayi lahir rendah sebanyak 47 responden (14%) dan berat badan lahir normal sebanyak 46 responden (14%).

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika $p\text{-value} < 0,005$. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value}$ 0.641 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara paritas dengan kejadian berat badan lahir rendah.

Tabel 4.7 Hubungan Riwayat Abortus dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021

Riwayat Abortus	Berat badan Lahir				Total		p-value
	BBLR		BBLN		N	%	
	n	%	n	%			
Ya	148	45	145	44	293	89	0,117
Tidak	24	7	13	4	37	11	
Total	172	52	158	48	330	100	

Sumber : Data Sekunder 2020-2021

Berdasarkan tabulasi diatas, didapatkan bahwa riwayat abortus dengan berat badan lahir rendah sebanyak 148 responden (45%), berat badan lahir normal sebanyak 145 responden (44%) sedangkan ibu yang tidak memiliki riwayat abortus dengan berat badan bayi lahir rendah sebanyak 24 responden (7%) dan berat badan lahir normal sebanyak 13 responden (4%).

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika $p\text{-value} < 0,005$. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value}$ 0.117 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara riwayat abortus pada ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah.

Tabel 4. Hubungan Status Anemia dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021

Anemia	Berat Badan Lahir				Total		p-value
	BBLR		BBLN		N	%	
	n	%	N	%			
Ya	66	20	30	9	99	30	0,000
Tidak	106	32	128	39	231	70	
Total	172	52	158	48	330	100	

Sumber : Data Sekunder 2020-2021

Berdasarkan tabulasi diatas, didapatkan bahwa ibu mengalami anemia dengan berat badan lahir rendah sebanyak 66 responden (20%), berat badan lahir normal sebanyak 30 responden (9%) sedangkan ibu yang tidak mengalami anemia dengan berat badan bayi lahir rendah sebanyak 106 responden (32%) dan berat badan lahir normal sebanyak 128 responden (39%).

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika $p\text{-value} < 0,005$. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value}$ 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara status anemia dengan kejadian berat badan lahir rendah.

B. PEMBAHASAN

1. Pembahasan dan Hasil

Hasil dari penelitian ini tentang hubungan antara kehamilan pada usia dini dengan kejadian berat bayi lahir rendah terdapat korelasi yang signifikan jika $p\text{-value} < 0,005$. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value}$ 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara riwayat usia kehamilan dini dengan kejadian berat badan lahir rendah.

Peneliti melakukan pengambilan data sekunder dengan melihat rekam medik pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah sampel 330 yang dihubungkan antara kedua variabel yaitu BBLR dan kehamilan pada usia dini. Setelah itu variabel dihubungkan dengan menggunakan analisis *Chi-Square* untuk melihat adanya hubungan antara kedua variabel. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nuzula, Dasuki and Kurniawati, 2020) pada penelitian ini di dapatkan kesimpulan bahwa kehamilan usia dini memiliki hubungan bermakna dengan kejadian berat bayi lahir rendah. Pada penelitian (Purba, Rahayujati and Hakimi, 2016) juga menuliskan bahwa proporsi kejadian BBLR lebih besar pada usia remaja (29,9%) dibandingkan kehamilan usia dewasa (13,7%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Kanada oleh (Ergen *et al.*, 2017) menyebutkan bahwa ibu remaja di Kanada lebih cenderung melahirkan bayi yang prematur, BBLR, dan mengalami lahir mati dari pada ibu dengan usia dewasa.

Meskipun pada penelitian ini ditemukan hubungan yang signifikan antara kehamilan usia dini dan berat bayi lahir rendah namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Sujianti, 2018) yang menyatakan bahwa hasil dari penelitiannya yaitu tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik antara faktor usia ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Cilacap Tahun 2014. Pada

penelitian yang dilakukan oleh (Sujianti, 2018) menggunakan jenis penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan *case control* dengan jumlah populasi sebanyak 409, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 89 orang untuk kasus BBLR dan 138 untuk kasus kontrol. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hadiwijaya and Kumala, 2019) juga tidak terdapat hubungan bermakna antara usai dengan kejadian berat bayi lahir rendah, sampel yang dilakukan sebanyak 86 orang, terdiri dari 2 kelompok yaitu sebanyak 43 ibu hamil yang berusia < 20 tahun dan 43 Ibu hamil berusia 20-35 tahun. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian *cross sectional* dengan Teknik *consecutive non random sampling*.

Secara teori usia Ibu mempengaruhi terhadap kehamilan karena berhubungan dengan kematangan organ reproduksi dan kondisi psikologis. Secara biologis usia produktif untuk hamil adalah 20-35 tahun, pada usia tersebut di sebut sebagai usia subur, pada usia subur akan lebih banyak energi yang dimiliki oleh wanita hamil. Usia kurang dari 20 merupakan umur yang resiko tinggi terhadap kehamilan dan persalinan. Pada usia muda yang kurang dari 20 tahun alat reproduksi belum matang, dan peredaran darah menuju serviks serta uterus masih belum sempurna sehingga hal ini dapat mengganggu proses pengiriman nutrisi dari Ibu ke janin yang dikandungnya. Di usia remaja (<20 tahun) masih dalam proses pertumbuhan sehingga masih membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhannya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan janin yang tidak sempurna, salah satunya terjadinya kejadian berat bayi lahir rendah. Wanita hamil pada usia kurang dari 20 tahun dapat menjadi penyulit dalam kehamilan di bandingkan dengan usia produktif (Manuaba, 2010).

Selama kehamilan, remaja mengalami perubahan fisiologis yang berbeda dengan orang dewasa sebab pada usia remaja pertumbuhan fisik

mereka belum sempurna. Kondisi yang timbul pada ibu hamil usia dini seperti psikis yang belum siap dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin diantaranya kehamilan remaja yang dapat menimbulkan stress akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Remaja dengan kehamilan yang tidak diinginkan akan mengalami berbagai masalah terutama dalam segi sosial. Tekanan terhadap mental remaja yang hamil akan berdampak pada kehamilannya. Keadaan tersebut akan makin menyulitkan jika ditambah dengan tekanan (stress) psikologi, sosial, ekonomi, sehingga memudahkan terjadinya keguguran dan komplikasi dalam kehamilan lainnya (Rismanieta, Fatmaningrum and Perbowo, 2016).

Kehamilan dengan kondisi yang ideal sangat diperlukan agar menghasilkan reproduksi yang sempurna. Kriteria untuk menentukan kehamilan ideal meliputi kesiapan fisik (bila sudah menyelesaikan pertumbuhan, sekitar usia 20 tahun), kesiapan mental, emosional, dan psikologis yang stabil untuk menjadi orang tua, pada usia di atas 20 tahun, sudah termasuk dalam usia siap, baik dari segi kesiapan organ reproduksi, mental, sosial dan ekonomi. Dapat disimpulkan pada remaja perempuan yang hamil pada usia kurang dari 20 tahun akan meningkatkan risiko kehamilan yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan ibu dan janin, seperti pertumbuhan janin terhambat dan BBLR. Risiko ini berkaitan dengan kebutuhan zat gizi pada masa tumbuh kembang remaja yang sangat dibutuhkan untuk tubuhnya sendiri sehingga nutrisi pada janin berkurang, selain itu juga karena perkembangan fisik yang belum sempurna termasuk organ reproduksi (Purba, Rahayujati and Hakimi, 2016).

Selain dari usia Ibu ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi berat bayi lahir rendah (BBLR) yaitu anemia. Pada penelitian ini di temukan jumlah responden yang anemia yaitu sebanyak 264, dan pada hasil analisis antara hubungan status anemia dengan berat bayi lahir rendah ditemukan

hubungan yang signifikan. Dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika p -value $<0,005$. Pada penelitian ini didapatkan p -value 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara status anemia dengan kejadian berat badan lahir rendah.

Anemia pada kehamilan didefinisikan sebagai konsentrasi hemoglobin <11 gr% pada penelitian yang dilakukan oleh (Liu *et al.*, 2022) menemukan bahwa terdapat hubungan antara anemia dengan kejadian berat bayi lahir rendah, hal ini diakibatkan karena jika terjadi anemia pada kehamilan maka dapat menyebabkan gangguan transfer hemoglobin ke janin melalui plasenta (Syifaurrehman, Yusrawati and Edward, 2016). Pada penurunan kadar hemoglobin akan mendukung perubahan angiogenesis plasenta, sehingga akan membatasi ketersediaan oksigen ke janin yang dapat mengakibatkan potensi pembatasan pertumbuhan intrauterine dan berat badan lahir rendah (Strangget.at.all 2017). Ibu yang memiliki kadar hemoglobin < 11 gr% akan berisiko lebih tinggi memiliki anak lahir dengan berat rendah dibandingkan dengan Ibu yang tidak mengalami anemia Selama kehamilan (Rahman.at.all 2016).

Jumlah Paritas juga mempengaruhi terjadinya kejadian berat bayi lahir rendah (BBLR), ketika Ibu memiliki jumlah paritas tinggi, maka dapat berpengaruh terhadap kemampuan elastisitas uterus. Sehingga pada kontraksi uterus dapat terganggu dan menyebabkan perdarahan saat kehamilan yang berakhir pada kelahiran prematur maupun terjadinya kelahiran berat bayi lahir rendah. Pada penelitian ini di dapatkan *nulipara* sebanyak 134 responden, *primipara* sebanyak 103 responden dan *multipara* sebanyak 93 responden, dan pada hasil analisis antara jumlah paritas dan kejadian berat bayi lahir rendah ditemukan tidak ada hubungan yang signifikan. Dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika p -value $<0,005$. Dan pada penelitian ini didapatkan p -value 0.641 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan

antara paritas dengan kejadian berat badan lahir rendah. Namun pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pinontoan,2015) mengatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah paritas dengan kejadian berat bayi lahir rendah, namun berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh (Nappu,2017) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan kejadian berat bayi lahir rendah. Hal ini sesuai dengan teori bahwa ketika ibu memiliki riwayat paritas tinggi, maka kekuatan otot rahim akan melemah dan terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darah di rahim yang dapat menyebabkan nutrisi yang diteruskan ke janin akan terhambat. Sehingga dapat terjadi gangguan pertumbuhan janin yang akan berdampak pada terjadinya BBLR (Khoiriah, 2017). Jumlah paritas yang aman 2-4 sebaliknya paritas 1 dan >4 memiliki resiko tinggi.

Jarak Kehamilan yang ideal adalah lebih dari 2 tahun, pada jarak tersebut memberi kesempatan untuk tubuh memperbaiki persendiannya dan organ-organ reproduksi yang terganggu. Jarak kehamilan < 2 tahun dapat berisiko kematian janin saat dilahirkan, BBLR, kematian di usia bayi maupun stunting (Monita, Suhaimi and Ernalia, 2016) Pada penelitian ini didapatkan pada ibu yakni < 2 tahun sebanyak 134 responden dan > 20 tahun sebanyak 187 responden. Dari hasil analisis yang dilakukan antara hubungan jarak kehamilan dengan kejadian berat bayi lahir rendah didapatkan tidak terdapat hubungan yang signifikan. Dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* <0,005. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.321 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara jarak kehamilan Ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan,2018) didapatkan hubungan yang signifikan antara jarak kehamilan dengan kejadian berat bayi lahir rendah. Seorang Ibu dengan jarak kehamilan dan bersalin yang terlalu dekat akan meningkatkan resiko terjadinya kejadian

berat bayi lahir rendah. Pada persalinan yang terlalu dekat secara fisik alat-alat reproduksi belum kembali normal sehingga akan memungkinkan akan terjadinya gangguan pada saat kehamilan maupun persalinan (Proverawati,2015).

Riwayat Abortus merupakan salah satu faktor risiko dapat terjadinya berat bayi lahir rendah. Kejadian berat bayi lahir rendah pada ibu yang mempunyai Riwayat abortus mempunyai peluang risiko melahirkan kejadian berat bayi lahir rendah 1,79 kali lebih besar disbanding yang tidak mempunyai Riwayat abortus. (Lestari and Putri, 2019). Pada penelitian ini didapatkan riwayat tidak abortus sebanyak 293 responden dan riwayat abortus sebanyak 37 responden. Dari hasil analisis hubungan Abortus dengan kejadian berat bayi lahir rendah didapatkan hasil tidak terdapat hubungan yang signifikan. Dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* <0,005. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.117 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara riwayat abortus pada ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah. Abortus adalah kehilangan kehamilan pada usia <20 minggu atau janin dengan berat <500 gram. Riwayat kehamilan buruk yaitu pernah keguguran, pernah mengalami persalinan prematur, bayi lahir mati, riwayat persalinan dengan tindakan (ekstraksi vakum, ekstraksi forsep, seksio sesaria), pre-eklampsia/eklampsia, gravida serotinus, kehamilan dengan perdarahan antepartum juga berpengaruh terhadap BBLR (Silitonga,2017)

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi berat bayi lahir rendah (BBLR) adalah Pendidikan dan pekerjaan ibu. Status Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Tingginya Pendidikan masyarakat menjadi penunjang dalam mempermudah dalam menggali informasi yang diterima untuk dapat dimengerti termasuk hal seputar kehamilan usia dini (Windari, 2015) Pada penelitian ini terdapat pendidikan rendah sebanyak 55

responden, dan ibu dengan pendidikan tinggi sebanyak 275 responden. Dari hasil analisis hubungan antara Pendidikan dengan kejadian berat bayi lahir rendah didapatkan hasil yang signifikan. Dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika $p\text{-value} < 0,005$. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value}$ 0.001 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah. Bagi ibu hamil yang bekerja memberikan peluang besar untuk terjadinya persalinan dengan BBLR, hal ini dikarenakan mengerjakan aktivitas fisik yang berlebih (Windari, 2015). Pada penelitian ini didapatkan ibu bekerja sebanyak 215 responden dan ibu tidak bekerja sebanyak 275 responden. Dari hasil analisis hubungan antara pekerjaan dengan kejadian berat bayi lahir rendah didapatkan hasil yang tidak signifikan. dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika $p\text{-value} < 0,005$. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value}$ 0,459 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara pekerjaan ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah.

Allah berfirman dalam QS Ar-Rad (13):8;8.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ
عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

Artinya: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang Sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.

Menurut Tafsir Al-Misbah Jilid 6 ialah membuktikan kekuasaan Allah tentang kandungan. Allah membentuk sperma untuk membuahi ovum yang kemudian akan menempel di dinding rahim yang

membentuk jenis kelamin, berat badan dan bentuk dari janin. Allah juga mengetahui apa yang kurang di dalam rahim yang dapat mengakibatkan janin lahir cacat atau keguguran.

1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan seperti kurangnya ketersediaan data dalam rekam medik sehingga mengharuskan peneliti untuk mencari sampel lain. Kemudian data yang tertulis pada buku registrasi bagian maternal tidak lengkap seperti nomor rekam medik yang tidak dituliskan sehingga rekam medik dari pasien tersebut tidak dapat dicari. Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah banyak faktor yang dapat mempengaruhi variabel peneliti seperti gemelli dan kelainan kongenital, sehingga tidak dimasukkan dalam sampel. Sehingga Total sampel yang bisa diteliti dari jumlah 370 menjadi 330 sesuai kriteria eksklusi dan inklusi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan kehamilan usia dini dengan kejadian berat bayi lahir rendah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ada hubungan antara kehamilan pada usia dini dengan kejadian berat bayi lahir rendah di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar pada tahun 2020-2021.

Pada penelitian ini juga didapatkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Anemia dan Pendidikan terhadap kejadian berat bayi lahir rendah di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021.

Pada tujuan khusus juga didapatkan pada hasil penelitian bahwa:

- a. Jumlah Ibu hamil di puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021 sebanyak 370.
- b. Jumlah Ibu hamil dengan Usia dini di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar sebanyak 86.
- c. Jumlah Ibu hamil dengan BBLR di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar sebanyak 172.
- d. Terdapat hubungan kehamilan pada usia dini dengan kejadian BBLR di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar.

B. SARAN

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat mengembangkan pola berpikir yang ilmiah serta berpikir kritis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama studi serta menambah pengetahuan dan pengalaman membuat skripsi pada bidang kesehatan.

3. Bagi responden

Diharapkan dapat lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat memberi resiko pada kehamilan seperti usia.

4. Bagi tempat penelitian saya

Diharapkan agar bisa rutin melakukan penyuluhan mengenai usia produktif dalam kehamilan dan faktor resiko lain yang dapat menyebabkan terjadinya berat bayi lahir rendah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abebe, A. M. *et al.* (2020) ‘Teenage Pregnancy and Its Adverse Obstetric and Perinatal Outcomes at Lemlem Karl Hospital, Tigray, Ethiopia, 2018’, *BioMed Research International*, 2020, pp. 1–9. doi: 10.1155/2020/3124847.
- Badan Pusat Statistik (2021) *Perkawinan Remaja*.
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Yudisia* Vol. 7 No. 2 Desember 2016, 7, 354–384. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>
- Cindrya, E. (2019) ‘PENGETAHUANTENTANGKEHAMILAN REMAJA PADA ORANGTUA ANAK USIA DINI Di DESA MUARA BURNAI II KABUPATEN OKI SUMATERA SELATAN’, *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1), pp. 66–82. doi: 10.19109/ra.v3i1.3381.
- Dinas Kesehatan Kota Makassar (2020) ‘Data Angka Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah’.
- Endah, M. F., Theresia, M. and Wahyuningsih, H. P. (2017) ‘Hubungan indeks massa tubuh ibu dengan kejadian bayi berat lahir rendah di rsud wonosari gunungkidul’, *Kesehatan Ibu dan Anak*, Volume 11, p. hal. 8-15.
- Ergen, E. B. *et al.* (2017) ‘Maternal-fetal outcome associated with adolescent pregnancy in a tertiary referral center: A cross-sectional study’, *Ginekologia Polska*, 88(12), pp. 674–678. doi: 10.5603/GP.a2017.0120.
- Erni Hernawati, S.S.T., M. M. K. and Lia Kamila, S.S.T., M. K. (2017) *Kegawatdaruratan maternal dan neonatal*. Edited by J. Timur.
- Hadiwijaya, E. and Kumala, A. (2019) ‘Hubungan kehamilan usia remaja dengan kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) di RSUD Ciawi-Kabupaten Bogor periode 2016-2017’, *Tarumanagara Medical Journal*, 1(2), pp. 270–276. Available at: <http://journal.untar.ac.id/index.php/tmj/article/view/3850>.
- Hartiningrum, I. and Fitriyah, N. (2019a) ‘Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di

- Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016', *Jurnal Biometrika*, 7(2), p. 97. doi: 10.20473/jbk.v7i2.2018.97-104.
- Hamidiyanti, B. Y. F., Faiqah, S., Sulanty, A., & Ristrini. (2018). Intervensi Tokoh Agama dan Tokoh Adat Pada Tradisi Menikah Suku Sasak Dalam Rangka Menurunkan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* Vol. 21 No. 3 Juli 2018, 21, 152–162. [https://doi.org/ 10.22435/hsr.v2i3.166](https://doi.org/10.22435/hsr.v2i3.166)
- Irhamnia Sakinah, A. (2019) 'Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Keikutsertaan Ibu Hamil dalam Asuhan Antenatal (ANC) di Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2016', *Alami Journal (Alauddin Islamic Medical Journal)*, 2(1), p. 20. doi: 10.24252/alami.v2i1.9246.
- Ismayanah, I., Nurfaizah, N. and Syatirah, S. (2020) 'Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny "I" Dengan Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Rsud Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 23 Juli - 25 Juli 2019', *Jurnal Midwifery*, 2(2), pp. 60–70. doi: 10.24252/jm.v2i2a2.
- Kemen PPN/Bappenas (2020) 'Pencegahan Perkawinan Anak', *Analisa*, XVI(01), pp. 1–3.
- Kemenkes, R. I. (2020) *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019, Short Textbook of Preventive and Social Medicine*. doi: 10.5005/jp/books/11257_5.
- Khoiriah, A. (2017) 'Hubungan Antara Usia dan Paritas Ibu Bersalin dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang', *Jurnal Kesehatan*, 8(2).
- Leftwich, H. K. (2017) 'A d o l e s c e n t P r e g n a n c y', 64, p. 3955.
- Lestari, R. D. and Putri, N. N. B. K. A. (2019) 'Analisis faktor Penyebab Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir di RS Aura Syifa Kabupaten Kediri', *Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 6(2), pp. 251–262. doi: 10.26699/jnk.v6i2.art.p251-262.
- Lestari, T. (2016) *Asuhan Keperawatan Anak*. cetakan ke. Indonesia: Nuha Medika.
- Liu, X. *et al.* (2022) 'Birth Weight and Small-for-Gestational-Age : A Large'.

- Manuaba (2010) *Penyakit kandungan & Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*. Edited by K. EGC.
- Manuaba, ida ayu chandranita (2014) *Ilmu Kebidanan , Penyakit Kandungan, dan KB*. 2nd edn. Jakarta: EGC.
- Meriyani, D. A. *et al.* (2016) ‘Faktor Risiko Kehamilan Usia Remaja di Bali : Penelitian Case Control Risk Factors for Adolescent Pregnancy in Bali : Case Control Study Pendahuluan Metode Desain penelitian adalah kasus kontrol , yang’, *Public Health and Preventive Medicine Archive*, 4, pp. 201–206.
- Monita, F., Suhaimi, D. and Ernalina, Y. (2016) ‘Hubungan Usia, Jarak Kelahiran, dan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau’, *Jom FK*, 3(1), pp. 1–5. Available at: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFDOK/article/view/7199>.
- Nappu,dkk.2017" HUBUNGAN PARITAS DAN USIA IBU DENGAN KEJADIAN BBLR DI RS BEN MARI MALANG.2017
- Nuzula, R. F., Dasuki, D. and Kurniawati, H. F. (2020) ‘Hubungan Kehamilan pada Usia Remaja dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Panembahan Senopati’, *Jurnal Kesehatan “Samodra Ilmu”*, 11(2), pp. 122–130.
- Pantiawati, I. (2019) ‘Bayi dengan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)’, in *Medical Book*. Nuha Medika.
- Perwiraningtyas, P., Ariani, N. L. and Anggraini, C. Y. (2020) ‘Analisis Faktor Resiko Tingkat Berat Bayi Lahir Rendah’, *Jnc*, 3(3), pp. 212–220.
- Prawirohardjo, S. (2016) ‘Ilmu Kebidanan’, in. PT Bina Pustaka.
- Prawirohardjo, S. (2018) *Ilmu kandungan*. Edisi keti. PT Bina Pustaka.
- Proverawati, A. and Ismawati, C. (2020) ‘Berat Badan Lahir Rendah’, in *Medical Book*.
- Purba, E. M., Rahayujati, T. B. and Hakimi, M. (2016) ‘Kehamilan usia remaja dan kejadian bayi berat lahir rendah di kabupaten Gunungkidul Teenage pregnancy and low birth weight infants in Gunungkidul’, *BKM Journal of*

- Community Medicine and Public Health*, 32(1), pp. 13–20.
- Pinontoan,dkk.2015" Hubungan Umur dan Paritas Ibu dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah".*Jurnal Imiah Bidan Volume 3(1).2015*
- Puspasari,dkk.2020" MASALAH KESEHATAN IBU DAN ANAK PADA PERNIKAHAN USIA DINI DI BEBERAPA ETNIS INDONESIA: DAMPAK DAN PENCEGAHANNYA
- Maternal and Child Health Problems in Early Age Marriage at Several Ethnic Indonesia: The Impact and Prevention".*Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Vol 23(4).*
- Rahmati, S. *et al.* (2017) ‘Maternal anemia during pregnancy and infant low birth weight: A systematic review and meta-analysis’, *International Journal of Reproductive BioMedicine*, 15(3), pp. 125–134. doi: 10.29252/ijrm.15.3.125.
- Rahman.at.all.2016" Maternal Anemia and Risk of Adverse Birth And Health Outcomes in Low-and Middle-icome Countries: Systematic review and meta-analysis. *Am J Clin Nutr.*103(2).2016
- Rismanieta, Y. A., Fatmaningrum, W. and Perbowo, P. (2016) ‘Hubungan Usia Ibu Hamil Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (Bblr) Di Rsud Dr. Soetomo Surabaya Periode Juni-Agustus 2013’, *JUXTA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Universitas Airlangga*, 8(1), pp. 35–40.
- Septiani, M. and Ulfa, M. (2018) ‘Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Peudada Kabupaten Bireuen’, *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 4(2), p. 258. doi: 10.33143/jhtm.v4i2.214.
- Shihab, M. Q. (2012) *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Silitonga, dkk.2018" Faktor Penyebab Kejadian Abortus Spontan Di Rumah Sakit Umum Pusat DR. Mohammad Hoesin Palembang".*Jurnal Ilmu kesehatan Makassar 8(2).2017*
- Sjahriani, T. (2019) ‘1035325 Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil’, *Jurnal Kebidanan : Jurnal Medical Science Ilmu*

- Kesehatan Akademi Kebidanan Budi Mulia Palembang*, 9(2), pp. 161–167.
doi: 10.35325/kebidanan.v9i2.195.
- Srimiyati and Kristina Ajul (2021) ‘Determinan Risiko Terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah’, 3, pp. 334–346.
- Stranget.at.all.2017" Maternal Hemoglobin Concentration and Hematocrit values may affect fetus Development by Influencing Plasenta Angiogenesis".*J Matern Fetal Neonatal Med.*30(2).2017
- Sujianti (2018) ‘Hubungan usia ibu dengan kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Cilacap’, *Kesehatan Al-Irsyad*, XI(1), pp. 62–67.
- Syifaurrehman, M., Yusrawati, Y. and Edward, Z. (2016) ‘Hubungan Anemia dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah pada Kehamilan Aterm di RSUD Achmad Darwis Suliki’, *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(2), pp. 470–474. doi: 10.25077/jka.v5i2.542.
- Utami, K. D. and Huriyati, E. (2018) ‘Faktor Resiko Kehamilan Usia Dini dengan Kejadian BBLR di Kabupaten Bantul’, pp. 131–142.
- Wahbah az-Zuhaili (2016) ‘Tafsir Al-Munir. Aqidah, Syari’ah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk’, p. xi.
- Windari, F. (2015) ‘Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Ibu dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD Muhammadiyah Bantul’, 1(30), pp. 77–87.
- WHO 2018. *World Health Organization (WHO)*



LAMPIRAN

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.195/KEPK/FKIK/I/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Andi Ega Rizqi Amalia
Principal Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Hubungan Kehamilan Usia Dini di Beberapa Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2021"

"The Relationship between teenage pregnancy and the incidence of low birth weight in several health center Makassar 2020-2021"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bijakan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Perjelasan, yang merujuk pada Pedoman CROMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CROMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023.

This declaration of ethics applies during the period January 6th, 2022 until January 6th, 2023.

January 6th, 2022

and Chairperson.


Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 25346/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Wakil Kota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4733/FKIK/PP.00.9/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANDI EGA RIZQI AMALIA**
Nomor Pokok : 70600118015
Program Studi : **Pend. Dokter**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

" HUBUNGAN KEHAMILAN USIA DINI DENGAN KEJADIAN BERAT BAYI LAHIR RENDAH DI BEBERAPA PUSKESMAS KOTA MAKASSAR TAHUN 2020-2021 "

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 11 Januari s/d 11 Februari 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini diandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar
Pada tanggal : 11 Januari 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARD, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tersusun Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peninggal.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 - 3615867 Fax +62411 - 3615867
Email : Kasbano@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 11 Januari 2022

Kepada

**Yth. KEPALA DINAS KESIHATAN
KOTA MAKASSAR**

**Di-
MAKASSAR**

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 00 -JUBKBP/2022

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 6).
- Memperhatikan :** Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 25346/S.01/PTSP/2022, Tanggal 11 Januari 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : **ANDI EGA RIZQI AMALIA**
 NIM / Jurusan : 70600118015 / Pend. Dokter
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN
 Tanggal pelaksanaan: 11 Januari s/d 11 Februari 2022
 Jenis Penelitian : Skripsi
 Alamat : JL. H. M. Yasin Limpo No.26, Samata Gowa
 Judul : "HUBUNGAN KERAMILAN USIA DINI DENGAN KEJADIAN BERAT BAYI LAHIR RENDAH DI BEBERAPA PUSKESMAS KOTA MAKASSAR TAHUN 2020-2021"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidangtubababkesbangpol@msk@gmail.com.

WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL
DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si
 Pangkat : Pembina Tingkat IV.b
 NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul - Sel di Makassar
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan)
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis PTZ Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar
5. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar
6. Mahasiswa yang bersangkutan
7. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710
MAKASSAR

Nomor : 440 /90 /PSDK /XIII/2021
Lamp :
Perihal : Praktek Profesi Bidan

Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Tamangapa

Di -

Tempat

Sehubungan Surat dari program studi Pendidikan Dokter fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar ,maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Andi Ega Rizqi Amala
NIM : 70600118015
Judul : Hubungan kehamilan usia dini dengan kejadian BBLR di puskesmas Kota Makassar

Akan melaksanakan kegiatan Pengambilan data Berupa :

- Data Ibu yang melahirkan bayi BBLR di puskesmas Tamangapa
- Data Ibu yang melahirkan bayi BBLR di Puskesmas Jongaya

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 20 Desember 2021

Pt. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar


Dr. Nurhidah Sirajuddin

Pangkat : Pembina

NIP : 19730112 200604 2 012



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710

M A K A S S A R

Nomor : 440 /90 /PSDK /XII/2021
Lamp :
Perihal : Praktek Profesi Bidan

Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Jongaya

Di-

Tempat

Sehubungan Surat dari program studi Pendidikan Dokter fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar ,maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Andi Ega Rizqi Amalia
NIM : 70600118015
Judul : Hubungan kehamilan usia dini dengan kejadian BBLR di puskesmas Kota Makassar

Akan melaksanakan kegiatan Pengambilan data Berupa :

- Data ibu yang melahirkan bayi BBLR di puskesmas Tamangapa
- Data ibu yang melahirkan bayi BBLR di Puskesmas Jongaya

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 20 Desember 2021



Drs. Nasir Sidah Siraluddin
Pangkat : Pembina
NIP : 19730112 200604 2 012



**DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
PUSKESMAS JONGAYA**

JL. ANDI TONRO NO. 37 TELP. (0411) 867 406
Email : Puskesmasjongaya37@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

No: 016/ PKM-JGY/2022

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar No: 440/90/PSDK/XII/2021, Tanggal 20 Desember 2021, perihal izin penelitian, maka dengan ini Kepala Puskesmas Jongaya menerangkan bahwa :

Nama : Andi Ega Rizqi Amalia
NIM/Jurusan : 70600118015/ Kedokteran
Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN)
Judul : Hubungan Kehamilan Usia Dini dengan Kejadian BBLR di Puskesmas Kota Makassar

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Puskesmas Jongaya yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 13 Januari 2022

Pt. Kepala Puskesmas Jongaya

dr. Rungki Mahesarani

Nip. 19811114 201001 2 004



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMANGAPA

Jl. Tamangapa Raya No.204 Arang Kode Pos : 90235
Telp.0411494214 Call Center : 081245183468, Email : puskesmas_tamangapa@yahoo.com



SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR: 445/013.VPKM-TMP/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : dr. Hj. Sri Zakiah Usman
NIP : 19700521 200212 2 006
Jabatan : Plt. Kepala UPT Puskesmas Tamangapa

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Andi Ega Rizqi Amalia
NIM : 70000118015
Jurusan : Pendidikan Dokter
Institusi : Universitas Islam Negeri Makassar
Judul : "Hubungan Kehamilan Usia Dini dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di Beberapa Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2021"

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada tanggal 10 Oktober s/d 8 Januari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di: Makassar
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

Plt. Kepala UPT Puskesmas Tamangapa



dr. Hj. Sri Zakiah Usman
Pangkat: Pembina Tk. IV/b
NIP. 19700521 200212 2 006







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

```
FREQUENCIES VARIABLES=pekerjaan
/ORDER=ANALYSIS.
```

Frequencies

Notes

Output Created	16-JAN-2022 23:26:16	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	330
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax	FREQUENCIES VARIABLES=pekerjaan /ORDER=ANALYSIS.	
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,02

Statistics

Pekerjaan

N	Valid	330
	Missing	0

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bekerja	215	65.2	65.2	65.2
	Tidak bekerja	115	34.8	34.8	100.0
	Total	330	100.0	100.0	

```
FREQUENCIES VARIABLES=usia pendidikan pekerjaan jrkkehamilan paritas sbortus a
nemla nb
/ORDER=ANALYSIS.
```

Frequencies

Notes

Output Created	16-JAN-2022 23:28:04	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	330
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax	FREQUENCIES VARIABLES=usia pendidikan pekerjaan jrkkhamilan paritas abortus anemia nb /ORDER=ANALYSIS.	
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,02

Statistics

		usia ibu	pendidikan	Pekerjaan	jarak kehamilan	paritas	abortus
N	Valid	330	330	330	330	330	330
	Missing	0	0	0	0	0	0

Statistics

		anemia	BBLR
N	Valid	330	330
	Missing	0	0

Frequency Table

usia ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20 tahun	113	34.2	34.2	34.2
	>20 tahun	217	65.8	65.8	100.0
	Total	330	100.0	100.0	

pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	55	16.7	16.7	16.7
	Tinggi	275	83.3	83.3	100.0
	Total	330	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bekerja	215	65.2	65.2	65.2
	Tidak bekerja	115	34.8	34.8	100.0
	Total	330	100.0	100.0	

jarak kehamilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 2 tahun	143	43.3	43.3	43.3
	≥ 2 tahun	187	56.7	56.7	100.0
	Total	330	100.0	100.0	

paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nullipara	134	40.6	40.6	40.6
	primipara	103	31.2	31.2	71.8
	multipara	93	28.2	28.2	100.0
	Total	330	100.0	100.0	

abortus

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	293	88.8	88.8	88.8
	ya	37	11.2	11.2	100.0
	Total	330	100.0	100.0	

anemia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	96	29.1	29.1	29.1
	tidak	234	70.9	70.9	100.0
	Total	330	100.0	100.0	

BBLR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bblr	172	52.1	52.1	52.1
	bbln	158	47.9	47.9	100.0
	Total	330	100.0	100.0	

Cases Used		Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES=usia1 BY bblr /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ CORR /CELLS=COUNT /COUNT ROUND CELL
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,08
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	131029

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia * BBL	330	100.0%	0	0.0%	330	100.0%

Usia * BBL Crosstabulation

Count		BBL		Total
		BBLR	BBLN	
Usia	<20 tahun	86	27	113
	≥20 tahun	86	131	217
Total		172	158	330

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	39,614 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	38,166	1	.000		
Likelihood Ratio	41,190	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	39,494	1	.000		

N of Valid Cases	330			
------------------	-----	--	--	--

- a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 54.10.
b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Interval by Interval	Pearson's R	.346	.050	6.689	.000 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.346	.050	6.689	.000 ^c
N of Valid Cases		330			

- a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Andi Ega Rizqi Amalia
2. NIM : 70600118015
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Salobulo
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Andi Herman, SE
 - b. Ibu. : Yusmianti, Tcauga

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD 213 Lalongkoda Sengkang
2. SMP : SMPN 1 Sengkang
3. SMA : SMAN 3 Sengkang
4. Tahun 2018 melanjutkan Pendidikan Dokter di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar