

**HUBUNGAN FAKTOR ANAK DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA
BALITA DI PUSKESMAS KASSI-KASSI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

TIARA PUTRI RAMLI

NIM: 70600118041

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tiara Putri Ramli
NIM : 70600118041
Tempat/Tanggal Lahir : W-o0psaw elonge, 02 Januari 2001
Program Studi : Pendidikan Dokter
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Pesona Prima Griya F1.12
Judul : Hubungan Faktor Anak dengan Kejadian
Stunting pada Balita di Puskesmas Kassi-
Kassi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Februari 2022

Tiara Putri Ramli

70600118041


PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

JUDUL : Hubungan Faktor Anak dengan Kejadian Stunting pada Balita di
Puskesmas Kassi-Kassi

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diajukan Dalam Smeinar Hasil Karya
Tulis Ilmiah (KTI) Mahasiswa Kedokteran


Makassar, 16 Februari 2021

PEMBIMBING 1



dr. Darmawansyih, M.Kes

PEMBIMBING 2



dr. Andi Alifia Ayu Delima, M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “Hubungan Faktor Anak dengan Kejadian Stunting pada Balita di Puskesmas Kassi-Kassi” yang disusun oleh Tiara Putri Ramli NIM 70600118041, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 09 Februari 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 16 Februari 2022

14 Rajab 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes (.....)

Sekretaris : dr. Rini Fitriani., M.Kes (.....)

Pembimbing I : dr. Darmawansyih., M.Kes (.....)

Pembimbing II : dr. Andi Alifia Ayu Delima., M.Kes (.....)

Penguji I : dr. Arlina Wiyata Gama., M. Biomed (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Azhar Arsyad., M. A (.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes

NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Hubungan Faktor Anak dengan Kejadian *Stunting* pada Balita di Puskesmas Kassi-Kassi”. Salam dan Shalawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang telah menjadi *rahmatan lil 'alamiin*. Proposal penelitian ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran dari Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

9

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih, rasa hormat dan penghargaan atas semua bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT. Yang dengan izin-Nya lah proposal penelitian ini bisa terselesaikan.
2. Kepada kedua orang tua tercinta dan keluarga yang selama ini telah memberikan dukungan tak terhingga kepada peneliti dalam menjalankan kehidupan dan menyelesaikan studi.
3. Kepada dr. Darmawansyih, M. Kes selaku pembimbing I dan dr. Andi Alifia Ayu Delima, M. Kes selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu

untuk memberikan arahan, masukan serta motivasi kepada penulis sehingga proposal ini bisa terselesaikan.

4. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan jajarannya, dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan segenap dosen yang telah bersedia membagikan ilmunya dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan studi.
5. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta jajarannya.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Teman-teman F18RON3KTIN yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam pembuatan proposal ini.
8. Teman-teman BUNI yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam pembuatan proposal ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa proposal penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu. Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar proposal ini kelak bisa bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi kita semua.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 14 Agustus 2020

Penulis,

Tiara Putri Ramli

70600118041



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	II
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.	
PENGESAHAN SKRIPSI	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XI
LAMPIRAN.....	XII
ABSTRAK.....	XIII
ABSTRAK.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. HIPOTESIS	7
D. DEFINISI OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	8
E. KAJIAN PUSTAKA.....	12
F. TUJUAN PENELITIAN	15
G. MANFAAT PENELITIAN.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. STATUS GIZI.....	17
B. STUNTING.....	21
C. BERAT BADAN LAHIR.....	31
D. STATUS IMUNISASI.....	37

E. RIWAYAT PENYAKIT INFEKSI.....	49
F. INTEGRASI KEISLAMAN TERKAIT STUNTING.....	54
G. KERANGKA TEORI.....	57
57	
H. KERANGKA KONSEP	58
I. KERANGKA KERJA	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. DESAIN PENELITIAN	60
B. LOKASI PENELITIAN.....	60
C. WAKTU PENELITIAN.....	60
D. VARIABEL PENELITIAN	60
E. POPULASI DAN SAMPEL	60
F. CARA PENGUMPULAN DATA	62
G. INSTRUMEN PENELITIAN	63
I. ANALISIS DATA.....	64
J. ETIKA PENELITIAN	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
A. HASIL	66
B. PEMBAHASAN.....	72
C. KETERBATASAN PENELITIAN.....	83
BAB V PENUTUP.....	85
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	8
Tabel 2.1 Antropometri.....	21
Tabel 3.1 Kriteria Penelitian	62
Tabel 4.1 Distribusi Data Berdasarkan Angka Kejadian Stunting Pada Balita di Puskemas Kassi-Kassi.....	66
Tabel 4.2 Distribusi Data Berdasarkan Berat Badan Lahir Pada Balita di Puskemas Kassi-Kassi.....	67
Tabel 4.3 Distribusi Data Berdasarkan Status Imunisasi Pada Balita di Puskemas Kassi-Kassi.....	67
Tabel 4.4 Distribusi Data Berdasarkan Riwayat Infeksi Saluran Nafas Akut (ISPA) Pada Balita di Puskemas Kassi-Kassi	68
Tabel 4.5 Distribusi Data Berdasarkan Riwayat Diare Pada Balita di Puskemas Kassi-Kassi.....	68
Tabel 4.6 Hubungan Berat Badan Lahir Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.....	69
Tabel 4.7 Hubungan Status Imunisasi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.....	70
Tabel 4.8 Hubungan Infeksi Saluran Nafas Akut Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.....	71
Tabel 4.9 Hubungan Riwayat Diare Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.....	72

DAFTAR GAMBAR



LAMPIRAN

Lampiran 1 Inform Consent.....	98
Lampiran 2 Kuesioner Riwayat Penyakit Infeksi.....	99
Lampiran 1 Persuratan.....	101
Lampiran 4 Data penelitian.....	107
Lampiran 5 Pengolahan Data Penelitian.....	122
Lampiran 6 Foto penelitian.....	128



**HUBUNGAN FAKTOR ANAK DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA
BALITA DI PUSKESMAS KASSI-KASSI**

Tiara Putri Ramli

*Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar*

ABSTRAK

Stunting merupakan kondisi kronis dimana keadaan tubuh menjadi sangat pendek dari usia seharusnya yang diukur berdasarkan panjang badan atau tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) dengan nilai pada tabel antropometri <- 2SD. Tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan antara faktor anak (BBL, status imunisasi, Riwayat penyakit infeksi diare dan ISPA) dengan kejadian stunting pada balita di Puskesmas Kassi-Kassi. Desain penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah balita di lingkup kerja Puskesmas Kassi-Kassi sebanyak 1.433 balita dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai dengan kriteria inklusi sehingga didapatkan sampel sebanyak 251 balita. Hasil penelitian ini memiliki jumlah karakteristik balita yang mengalami stunting sebanyak 114 responden (45,4%), balita yang mempunyai BBLR sebanyak 38 responden (15,1%), balita yang tidak memiliki imunisasi lengkap sebanyak 60 responden (23,9%), balita yang mempunyai riwayat penyakit infeksi diare sebanyak 47 responden (18,7 %), dan balita yang memiliki riwayat penyakit ISPA sebanyak 16 responden (6,4%). Dari hasil pengujian *Chi-Square*, didapatkan hubungan antara BBL, status imunisasi, riwayat penyakit infeksi diare dengan kejadian stunting dan tidak didapatkan hubungan antara riwayat penyakit ISPA dengan kejadian stunting pada balita di Puskesmas Kassi-Kassi.

Kata kunci : Stunting, BBL, Status Imunisasi, Diare, ISPA

***THE RELATIONSHIP BETWEEN VARIOUS CHILDREN'S FACTORS AND
THE OCCURRENCES OF STUNTING IN TODDLERS AT KASSI-KASSI
PUBLIC HEALTH CENTER***

Tiara Putri Ramli

Medical Education Program of UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Stunting refers to a chronic condition where children experience impaired growth due to poor nutrition and infection. The toddlers with stunting are likely to have the body length or height of below $<-2SD$ as the standard of body length and height values in the anthropometric table. The major purpose of this study was to investigate the relationship between children's factors (baby's birth weight, immunization status, the history of infectious diarrheal diseases, and acute respiratory infection) and the occurrences of stunting in toddlers. The research was conducted at the Kassi-Kassi Public Health Center. The research method used for this study was analytical observation by using a cross sectional approach. The population in this study was toddler patients at Kassi-Kassi Health Center amounting for 1.433 toddlers. The samples of this research consisted of 251 toddlers which were selected by using purposive sampling technique according to the inclusion criteria. The findings of this study indicated that there were 114 toddlers (45.4%) who experienced stunting due to the aforementioned factors and characteristics. In this research, 38 toddlers (15.1%) were identified to have low birth weight, 60 toddlers (23.9%) were identified to have no immunization record, 47 toddlers (18.7%) were identified to have a history of infectious diarrheal disease, and 16 toddlers (6.4%) were identified to experience acute respiratory infection. Based on the analysis of the Chi-Square test, it could be concluded that there was a relationship between birth weight, immunization status, and the history of infectious diarrheal diseases and the occurrences of stunting. In contrast, there was no relationship between the acute respiratory infection and the occurrences of stunting in toddlers, particularly at Kassi-kassi Public Health Center.

Key words: Stunting, Birth Weight, Immunization Status, Diarrhea, Acute Respiratory Infection



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan gizi masih menjadi tantangan yang nyata di Indonesia. Meskipun perekonomian di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup progresif, namun masih ada beberapa permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah permasalahan kekurangan gizi yang berperan sebagai salah satu masalah yang cukup signifikan. Indonesia menghadapi permasalahan gizi yang cukup tinggi berupa defisiensi zat gizi makro dan mikro serta meningkatnya prevalensi obesitas yang mana kondisi ini disebut dengan ‘Beban Ganda Masalah Gizi’ atau “Double Burden of Malnutrition” (Bappenas, 2019).

Balita (anak usia dibawah 5 tahun) merupakan salah satu kelompok yang rawan akan permasalahan gizi dikarenakan pada masa ini pertumbuhan terjadi sangat cepat seperti pertumbuhan fisik, perkembangan psikomotorik, perkembangan mental dan social (Sulistianingsih & Madi Yanti, 2016). Balita memiliki karakteristik pertumbuhan yaitu pada usia 0-1 tahun berat badan naik dua kali dari berat badan lahir pada usia 5 bulan. Saat memasuki usia 1 tahun maka berat badannya akan naik tiga kali dari berat badan lahir dan pada saat memasuki usia 2 tahun maka berat badan anak akan naik 4 kali dari berat badan lahir. Sehingga periode balita merupakan usia dengan pertumbuhan dan perkembangan berat badan yang cukup pesat dibandingkan usia lainnya. Periode ini tidak akan terulang lagi

di periode usia manapun sehingga hal ini disebut sebagai “*windows of opportunity*” (Alba, et al., 2021).

Permasalahan gizi pada balita bisa memberikan dampak yang serius baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Secara jangka panjang, balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang akan memberikan dampak terhadap balita yaitu tumbuh pendek dari anak seusianya yang disebut stunting (Utami & Mubasyiroh, 2019). Stunting merupakan kondisi kronis dimana keadaan tubuh menjadi sangat pendek dari usia seharusnya yang diukur berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan nilai z-score $<-2SD$ (Sutriyawan, et al., 2020).

Pada tahun 2017, setengah dari populasi balita yang mengalami stunting di dunia berasal dari benua Asia dengan prevelensi sekitar 55% sedangkan sepertiga populasi balita yang mengalami stunting berasal dari benua Afrika dengan prevelensi sekitar 39%. Sehingga pada tahun 2018, WHO menyimpulkan data bahwa sekitar 83,6 juta jiwa balita menderita stunting di benua Asia dengan urutan pertama ialah Timur Leste dengan prevelensi sebesar 50,2%, urutan kedua yaitu India dengan prevalensi sebesar 38,4% dan Indonesia berada di urutan ketiga dengan prevalensi sebesar 36,4% (Khatimah, et al., 2020).

Stunting di Indonesia masih sangat tinggi terkhusus di daerah bagian paling timur dan paling barat Indonesia (Bappenas, 2019). Hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting nasional dengan prevelensi sekitar 30,8%. Data ini menurun apabila dibandingkan dengan hasil

Riskesmas tahun 2013 dengan prevalensi stunting pada balita berkisar 37,2%. Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan urutan ke 3 yang masuk dalam kategori serius setelah Papua dan Maluku (Sukmawati, et al., 2018).

Hasil dari Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting di Sulawesi Selatan sekitar 35% pada tahun 2018 yang mengalami penurunan dibandingkan hasil Riskesdas pada tahun 2013 yaitu 36,8% (Megantari, et al., 2020). Kota Makassar yang memiliki prevalensi stunting dengan persentase sebesar 25,5% memiliki setidaknya 15 kecamatan yang memiliki kasus stunting pada tahun 2019 dengan kasus tertinggi berada pada kecamatan Biringkanaya sebanyak 1193 balita dengan persentasi 16,4%, kasus tertinggi kedua pada kecamatan Rappocini sebanyak 794 balita dengan persentasi sebesar 10,9 % dan kasus tertinggi ketiga pada kecamatan Panakkukang sebanyak 784 balita dengan persentasi 10,8 % (Halimah & Suintin, 2020).

Data terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Makassar memberikan persentase mengenai balita yang menderita stunting di berbagai Puskesmas Kota Makassar dengan prevalensi peringkat pertama di Puskesmas Barrang Lompo sebesar 34,77%, peringkat kedua Puskesmas Kassi Kassi sebesar 22,92%, dan peringkat ketiga Puskesmas Kaluku Bodoa sebesar 18,47% (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021). Berdasarkan pertimbangan data diatas terlihat bahwa prevalensi stunting masih melebihi batas ambang yang ditetapkan WHO, yaitu sebesar 20%. Oleh karena itu sampai saat ini

stunting menjadi permasalahan di dunia, khususnya di Indonesia yang terbukti dengan tinggi badan remaja Indonesia yang masih berada dibawah standar WHO (Megantari, et al., 2020).

Stunting dapat terjadi oleh faktor yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung yang dapat menyebabkan stunting terbagi dua yaitu faktor ibu dan faktor anak. Adapun faktor ibu seperti gizi ibu yang kurang saat mengandung, terbatasnya pelayanan kesehatan untuk ibu selama mengandung (ANC), terbatasnya pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak setelah melahirkan (PNC), kurangnya sosialisasi pembelajaran terkait kesehatan ibu dan anak, teknik pengasuhan yang kurang tepat dan faktor anak seperti adanya riwayat BBLR, status imunisasi yang tidak lengkap, dan adanya riwayat penyakit infeksi. Selain faktor penyebab langsung, stunting juga memiliki faktor penyebab tidak langsung berupa faktor keluarga dan faktor lingkungan seperti status ekonomi yang rendah, rumah yang tidak memiliki air bersih dan jamban yang memadai, kurangnya pengetahuan ibu terkait sanitasi dan hygiene serta masih banyak lagi faktor yang menyebabkan terjadinya stunting (Hardani & Zaurida, 2019).

Stunting dapat menimbulkan gangguan pada perkembangan fisik anak yang bersifat irreversible/tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan kognitif dan motorik serta penurunan performa kerja hingga dewasa. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting akan mengakibatkan prestasi di sekolah menjadi buruk hal ini dapat mengakibatkan rendahnya

tingkat pendidikan yang berakibat pada pendapatan yang rendah saat dewasa nanti. Oleh karena itu stunting pada balita perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan fisik, perkembangan mental dan status kesehatan pada anak. Selain itu stunting pada anak juga berhubungan dengan peningkatan kerentanan anak terhadap suatu penyakit, baik penyakit menular maupun Penyakit Tidak Menular (PTM) serta peningkatan risiko *overweight* dan obesitas yang memiliki efek jangka panjang untuk meningkatkan risiko penyakit degeneratif. Berdasarkan hal-hal tersebut maka stunting pada anak dapat dijadikan sebagai prediktor rendahnya mutu sumber daya manusia di suatu negara yang akan mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi perekonomian negara tersebut, bahkan pada daerah daerah berkembang stunting dapat menjadi salah satu faktor penyebab kematian pada anak (Setiawan, et al., 2018).

Stunting pada balita merupakan dampak dari defisiensi nutrisi semasa “*golden age periode*” yaitu 1000 hari awal kehidupan yaitu 270 hari selama kehamilan dan 730 hari dari kelahiran sampai usia 2 tahun dari pertumbuhan dan perkembangan anak yang akan menentukan kehidupan selanjutnya (Utami & Mubasyiroh, 2019). Kejadian stunting di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang cukup besar sehingga diperlukan adanya upaya pencegahan untuk mengurangi kejadian stunting agar terciptanya generasi di masa depan yang berkualitas, sehat lahir batin, tumbuh kembang secara optimal dan tidak menghasilkan keturunan yang lemah (Hadi, 2017).

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 9 yang berbunyi (Departemen Agama RI, 2012):

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya).

Oleh karena itu, pemerintah kemudian melalui program “Gerakan Seribu Hari Awal Kehidupan” yang dikenal sebagai 1000 HAK yang merupakan program dengan tujuan mempercepat perbaikan gizi untuk memperbaiki kehidupan anak-anak Indonesia di masa mendatang. Dengan tujuan untuk menurunkan prevalensi stunting beserta segala bentuk kekurangan gizi lainnya yang menjadi masalah di Indonesia, maka gerakan ini melibatkan berbagai sektor dan pemangku kebijakan. Adapun Intervensi pada 1000 HAK difokuskan pada 2 jenis intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik merupakan rangkaian berbagai kegiatan yang cukup *cost effective* khususnya untuk mengatasi masalah gizi pendek dan intervensi gizi sensitif merupakan berbagai kegiatan program pembangunan yang memberi pengaruh pada status gizi masyarakat terutama kelompok 1000 HPK, seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, gender, air bersih, sanitasi, serta kesehatan lingkungan (Haris, et al., 2019). Selain itu pemerintah Indonesia

berkomitmen untuk mengurangi stunting dalam program yang memiliki prinsip bahwa semua orang di dunia berhak mendapatkan makanan dan gizi yang baik yang dinamakan *Scaling Up Nutrition (SUN) Movement* (Permana & Wijaya, 2020). Dengan mencegah terjadinya stunting, maka hal juga dapat mencegah terbentuknya generasi yang lemah dan berusaha untuk membentuk generasi umat yang kuat sesuai dalam anjuran Allah SWT dalam An-Nisa ayat 9 (Hadi, 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang terkait stunting, maka perlu dikaji lebih lanjut terkait :

1. Apakah terdapat hubungan antara BBL dengan kejadian Stunting pada Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi ?
2. Apakah terdapat hubungan antara Riwayat Imunisasi dengan kejadian Stunting pada Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi ?
3. Apakah terdapat hubungan antara Riwayat Penyakit Infeksi dengan kejadian Stunting pada Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi ?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)
 - a. Tidak terdapat hubungan antara BBL dengan Kejadian Stunting pada Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.
 - b. Tidak terdapat hubungan antara status imunisasi dengan Kejadian Stunting pada Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.

c. Tidak terdapat hubungan antara riwayat penyakit infeksi dengan Kejadian Stunting pada Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

a. Terdapat hubungan antara BBL dengan Kejadian Stunting pada Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.

b. Terdapat hubungan antara status imunisasi dengan Kejadian Stunting pada Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.

c. Terdapat hubungan antara riwayat penyakit infeksi dengan Kejadian Stunting pada Balita wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Dependen						
1	Stunting	Suatu permasalahan pada gizi balita yang menggambarkan kondisi kronis sehingga menyebabkan terhambatnya	Melakukan pengukuran secara langsung dengan menggunakan alat ukur.	<i>Microtoice</i> dan <i>length board</i>	0 = Stunting, jika rentang (< - 2 SD) 1 = Normal (\geq -2 SD)	Nominal

		pertumbuhan karena malnutrisi dalam jangka waktu yang lama yang dinyatakan dengan indeks TB/U				
Variabel Independen						
2	BBL	Berat badan bayi yang didapatkan saat melakukan penimbangan dalam kurun waktu sesaat setelah lahir – 1 jam pertama setelah lahir	Melihat Berat Badan Lahir di Buku KIA/KMS atau menanyakan secara langsung kepada responden	Buku KIA	0 Ya = BBLR (<2500gram) 1 Tidak = normal (≥2500 gram)	Nominal
3	Status Imunisasi	Lengkapnya status imunisasi dasar seperti BCG 1x,	Melihat daftar Riwayat imunisasi lengkap	Buku KIA	0 = imunisasi dasar tidak lengkap 1 = imunisasi dasar lengkap	Nominal

		DPT 3x, Polio 4x, Hepatitis B 3x, dan Campak 1x di buku KIA/KMS.	di buku KIA/KM S			
4	Riwayat Penyakit Infeksi Diare	Hasil wawancara didapatkan adanya kejadian berulang sebanyak 3 kali dalam kurung waktu tiga bulan pada balita yang menderita penyakit infeksi	Melakukan wawancara dan rekam medik	Kuesioner dan data sekunder	0 = memiliki riwayat diare sebanyak ≥ 3 kali/hari selama minimal 2 hari yang dialami selama 3 bulan secara berturut turut 1 = tidak memiliki riwayat diare sebanyak ≥ 3 kali/hari selama minimal 2 hari yang dialami selama 3 bulan secara berturut turut.	Nominal
5	Riwayat Penyakit ISPA	Hasil wawancara didapatkan adanya	Melakukan wawancara dan	Kuesioner dan data	0 = memiliki riwayat gejala ISPA sebanyak ≥ 3 kali yang	Nominal

		kejadian berulang sebanyak 3 kali dalam kurung waktu tiga bulan pada balita yang menderita penyakit infeksi	rekam medik	sekunder	dialami selama 3 bulan secara berturut turut 1 = tidak memiliki riwayat gejala ISPA sebanyak ≥ 3 kali yang dialami selama 3 bulan secara berturut turut	
--	--	---	-------------	----------	---	--

2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini membahas mengenai hubungan faktor anak (BBL, Status Imunisasi, dan Riwayat Penyakit Infeksi) dengan Kejadian Stunting pada Balita. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer untuk variabel dependen stunting yang dilakukan dengan cara pengukuran tinggi badan dan umur balita, variabel independen status imunisasi yang dilakukan dengan cara melihat buku Kesehatan Ibu dan Anak. Adapula data sekunder untuk variabel independen BBL dan riwayat penyakit infeksi yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara secara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner. Menghubungkan antara stunting dengan beberapa faktor penyebab dari anak seperti BBL, status imunisasi, dan riwayat penyakit infeksi dengan menggunakan metode pengukuran, wawancara dan pengisian kuesioner.

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil
1	(Setiawan, et al., 2018)	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018	Studi analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	74 sampel dipilih secara simple random sampling	Dengan menggunakan analisis multivariat didapatkan adanya hubungan yang bermakna antara berat badan lahir dengan kejadian stunting. Berat badan lahir rendah merupakan salah satu faktor risikou yang paling dominan terhadap kejadian stunting. Hal ini dikarenakan anak yang lahir dengan riwayat berat badan lahir yang rendah mengalami pertumbuhan linier yang lebih lambat daripada anak yang memiliki berat badan lahir yang normal.
2	(Namangboling, et al., 2017)	Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi dan	Analitik observasional dengan	116 sampel dan metode	Dengan menggunakan analisis bivariat menunjukkan bahwa Riwayat penyakit infeksi seperti diare dan ISPA

		Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Anak Usia 7-12 Bulan di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang	desain <i>Case Control</i>	pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>fixed disease sampling</i>	merupakan salah satu faktor dominan yang dapat menyebabkan masalah gizi pada balita.
3	(Haris, et al., 2019)	Determinan Kejadian Stunting dan Underweight pada Balita Suku Anak di Desa Nyogan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019	<i>cross sectional</i>	Jumlah sampel minimal yang dibutuhkan sebanyak 65 balita, namun peneliti hanya memperoleh total balita yang ada sebanyak 45 orang.	Pada penelitian ini belum bisa memberikan bukti adanya hubungan yang signifikan antara status imunisasi dengan kejadian stunting, namun apabila balita tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap maka balita tersebut akan memiliki kecenderungan lebih besar untuk menderita stunting.

4	(Maulidah, et al., 2019)	Faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember	penelitian analitik observasional dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 76 ibu yang memiliki balita dan dipilih dengan cara simple random sampling	Dengan menggunakan analisis uji <i>Chi Square</i> diperoleh nilai $p=0,010$ dengan OR 0,29 dan 95% CI 0,11–0,76. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Riwayat penyakit infeksi dengan kejadian stunting pada balita.
5	(Alba, et al., 2021)	Hubungan Riwayat BBLR Dengan Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sekupang Kota Batam	penelitian observasional analitik dengan rancangan <i>cross sectional</i>	Jumlah responden masing-masing sampel sebanyak 62 responden dengan menggunakan teknik purposiv	Dengan menggunakan analisis <i>Chi Square continuity correction</i> diketahui bahwa nilai $p-value$ sebesar $0.000 < 0.05$ yang diperhatikan dalam kolom Asymp.sig. pada output SPSS, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat hubungan Riwayat BBLR dengan kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Sekupang Kota Batam.

		Tahun 2019		e sampling	
--	--	---------------	--	---------------	--

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui hubungan faktor anak (BBL, status imunisasi, riwayat penyakit infeksi) dengan kejadian stunting pada balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui angka kejadian stunting pada balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.
- b. Untuk mengetahui BBL pada balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Untuk mengetahui riwayat imunisasi pada balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
- d. Untuk mengetahui riwayat penyakit infeksi pada balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini sebagai pembuktian teori tentang hubungan faktor anak dengan kejadian Stunting pada Balita.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu di bidang kesehatan terutama mengenai kesehatan ibu dan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan hasil data tambahan di bidang Kesehatan ibu dan anak, khususnya di bidang stunting yang dapat digunakan untuk menurunkan prevelensi kejadian stunting di Indonesia, terkhusus di Makassar.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai stunting pada balita dan upaya pencegahannya.

c. Bagi Pengetahuan

Penelitian ini dapat menambah bahan bacaan dan acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang kesehatan terkhusus pada penelitian mengenai stunting.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan serta mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dan mengetahui hubungan antara BBL, status imunisasi, dan riwayat penyakit infeksi dengan kejadian stunting pada balita.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Status Gizi

1. Penilaian Status Gizi

Balita merupakan suatu individu yang memiliki rentang usia tertentu. Balita dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan usia yaitu usia bayi (0 sampai 2 tahun), golongan balita (2 sampai 3 tahun) dan usia pra sekolah (> 3 sampai 5 tahun). WHO menggolongkan usia balita dari 0 sampai 60 bulan dan pendapat lain mengatakan bahwa balita berada di usia 1 sampai 5 tahun. Usia balita (1 – 5 tahun) merupakan usia dalam siklus daur kehidupan yang mana terjadi pertumbuhan yang tidak begitu pesat jika dibandingkan dengan masa bayi. Siklus hidup pada masa balita merupakan periode emas dalam proses perkembangan anak yang akan menjadi modal bagi fase kehidupan selanjutnya. Balita memiliki kebutuhan gizi yang harus di penuhi, sebab gangguan gizi yang dialami pada fase ini akan mempengaruhi kualitas kehidupan selanjutnya (Adriani & Wirjatman, 2016). Gizi adalah komponen yang sangat penting pada balita. Gizi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan sejak kecil dikarenakan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengukuran status gizi pada anak ialah menggunakan metode antropometri yaitu dengan melakukan pengukuran dimensi

tubuh dan komposisi tubuh sesuai dengan umur/usia berdasarkan berat badan atau tinggi badan (Saharuddin, 2017).

Pada stunting metode penilaian status gizi yang paling sering digunakan yaitu antropometri. Antropometri dapat diartikan sebagai ukuran tubuh manusia. Antropometri berhubungan dengan dimensi dan komposisi tubuh dengan tingkat umur dan keadaan gizi. Indeks antropometri yang digunakan untuk stunting adalah tinggi badan menurut umur (TB/JU) dengan nilai Z skor < -2 SD (Mardalena, 2017).

2. Antropometri

Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan setiap saatnya, sehingga dilakukanlah pengukuran antropometri. Antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh. Pertumbuhan tubuh pada manusia meliputi penambahan volume, jumlah, ukuran dan fungsi sel, jaringan, organ tingkat individu yang diukur dengan ukuran panjang, berat, umur tulang dan keseimbangan metabolik. Sedangkan perkembangan meliputi bertambahnya fungsi dan struktur tubuh yang lebih kompleks dalam melakukan gerakan kasar, gerakan halus, bicara dan emosi dan tidak dapat diukur. kedua faktor ini dipengaruhi oleh faktor genetic dan faktor lingkungan (Mardalena, 2017).

Pengukuran antropometri dalam menilai status gizi seseorang pada umumnya dengan mengukur panjang badan atau tinggi badan, lingkaran kepala, berat badan, lingkaran lengan atas dan tebal kulit. Pengukuran ini dilakukan guna menilai pertumbuhan dan status gizi pada bayi. Indeks

pengukuran antropometri terdiri dari berat badan menurut umur (BB/U), panjang badan atau tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U), berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan (BB/PB atau BB/TB), indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U). Penilaian stunting dilakukan pengukuran yaitu panjang badan (anak 0-24 bulan) yang diukur telentang atau berbaring dan tingid badan (anak > 24 bulan) diukur dengan cara berdiri menurut umur anak yang dihitung dalam bulan. Pengukuran indeks tinggi badan dilakukan dengan melakukan pengukuran pada seluruh komponen tulang tubuh mulai dari kaki hingga tulang tengkorak kepala. Apabila parameter tinggi badan dinilai dengan umur maka dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui status stunting (Hartiyanti & Triyani, 2014).

Pengukuran antropometri untuk menilai status gizi balita terbagi dua pengukuran, yaitu pengukuran yang bergantung pada umur berupa berat badan terhadap usia (BB/U), tinggi badan terhadap usia(TB/U), lingk kepala terhadap usia (LK/U), dan lingk lengan terhadap usia (LLA/U). pengukuran status gizi ini memiliki kesulitan berupa kurang tepatnya usia anak yang akan diukur dikarenakan tidak semua anak memiliki catatan tanggal. Selanjutnya ialah pengukuran yang tidak bergantung pada umur berupa berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB), lingk lengan atas terhadap tinggi badan (LLA/TB), dan lingk lengan atas, lipatan kulit pada *trisep*, *subkapular*, *abdominal* yang dibandingkan

dengan standar/ baku. Pengukuran antropometri yang tidak bergantung pada usia berupa pengukuran berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB) banyak digunakan sehingga digunakan dalam pedoman pengukuran yang terlihat dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak atau buku KIA yang berfungsi untuk memantau Kesehatan ibu dan anak (Kusuma & Hasanah, 2018).

Metode antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi berupa karbohidrat dan lemak. Melakukan pengukuran dengan menggunakan antropometri memiliki keunggulan dikarekan alat yang digunakan mudah, dapat dilakukan berkali kali dan objektif, dapat dilakukan oleh semua orang, relative murah, hasilnya mudah disimpulkan dan dapat digunakan untuk mengavaluasi gizi anak pada masa lalu (Mardalena, 2017). Selain memiliki keunggulannya, pengukuran dengan menggunakan metode antropometri memiliki kelemahan yaitu membutuhkan data yang harus relevan, dapat memberikan informasi yang kurang akurat dikarenakan kesalahan dari alat ataupun dari pengukurnya. Namun, pengukuran dengan menggunakan metode antropometri ini dapat sangat baik apabila dilakukan pada populasi yang besar karena antropometri ini murah dan tidak menimbulkan rasa sakit pada populasi yang diukur. Adapun kategori dalam melakukan pengukuran antropometri untuk menilai status gizi anak yaitu (Hartiyanti & Triyani, 2014) :

Tabel 2.1 Antropometri

Kategori Indeks Antropometri Status Gizi Anak

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-score)
Berat badan menurut umur (BB/U) Anak (0 – 60 bulan)	Gizi Buruk	< -3 SD
	Gizi Kurang	-3 SD sampai dengan < -2 SD
	Gizi Baik	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gizi Lebih	>2 SD
Panjang badan menurut umur (PB/U) Atau Tinggi badan menurut umur (TB/U) Anak (0 – 60 bulan)	Sangat Pendek	< -3 SD
	Pendek	-3 SD sampai dengan < -2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
Berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) Anak (0 – 60 bulan)	Sangat Kurus	< -3 SD
	Kurus	-3 SD sampai dengan < -2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
Indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U) Anak (0 – 60 bulan)	Gemuk	>2 SD
	Sangat Kurus	< -3 SD
	Kurus	-3 SD sampai dengan < -2 SD
Indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U) Anak (0 – 60 bulan)	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gemuk	>2 SD
	Sangat Kurus	< -3 SD
	Kurus	-3 SD sampai dengan < -2 SD
Indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U) Anak (0 – 60 bulan)	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gemuk	>1 SD Ssampai dengan 2 SD
	Obesitas	>2 SD
	Sangat Kurus	< -3 SD

B. Stunting

1. Definisi

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang merupakan akibat dari kekurangan gizi kronis hingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, kondisi Stunting baru muncul setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting yang dialami anak dapat disebabkan oleh tidak terpaparnya periode 1000 hari pertama kali

perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Stunting dapat pula disebabkan tidak melewati periode emas yang dimulai 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan pertumbuhan anak pada 1000 hari pertama. Pada masa tersebut nutrisi yang diterima bayi saat dalam kandungan dan menerima ASI memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan saat dewasa. Hal ini dapat membuat terhindar dari terjadinya stunting pada anak-anak dan status gizi yang kurang (Yuliana & Bawon Nul Hakim, 2019).

Stunting merupakan istilah yang digunakan untuk anak yang ukuran tubuhnya tidak sesuai dengan usianya (bayi pendek). Stunting adalah keadaan tubuh yang apabila dilakukan pengukuran dengan metode antropometri didapatkan hasil yaitu defisit 2 SD di bawah median panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi referensi internasional. Stunting adalah keadaan dimana TB/U rendah atau keadaan tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya (Yuliana & Bawon Nul Hakim, 2019).

2. Etiologi dan mekanisme

Masalah gizi merupakan masalah yang multidimensi yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor penyebab. Adapun faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting yaitu faktor keluarga dan rumah tangga, faktor makanan tambahan yang tidak adekuat, faktor menyusui, dan faktor infeksi (Supriasa, et al., 2019).

Faktor yang pertama yaitu keluarga dan rumah tangga dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor maternal dan faktor lingkungan rumah. Faktor maternal meliputi nutrisi yang kurang pada saat prekonsepsi, kehamilan dan laktasi, tinggi badan ibu yang rendah, infeksi, kehamilan pada usia remaja, kesehatan mental, Intrauterine Growth Restriction (IUGR), kelahiran preterm, jarak kehamilan yang pendek, dan hipertensi. Faktor lingkungan rumah berupa stimulasi dan aktivitas anak yang tidak adekuat, perawatan yang kurang, sanitasi dan pasukan air yang tidak adekuat, akses dan ketersediaan pangan yang kurang, alokasi makanan dalam rumah tangga yang tidak sesuai, dan edukasi pengasuh yang rendah (Supariasa, et al., 2019).

Faktor kedua penyebab stunting adalah makanan tambahan atau komplementer yang tidak adekuat faktor ini dibagi menjadi tiga, yaitu kualitas makanan yang rendah, cara pemberian yang tidak adekuat, dan keamanan makanan dan minuman. Kualitas makanan yang rendah dapat berupa kualitas mikronutrien yang rendah, keragaman jenis makanan yang dikonsumsi dan sumber makanan hewani yang rendah, makanan yang tidak mengandung nutrisi, dan makanan komplementer yang mengandung energi rendah. Cara pemberian yang tidak adekuat berupa frekuensi pemberian makanan yang rendah, pemberian makanan yang tidak adekuat ketika sakit dan setelah sakit, konsistensi makanan yang terlalu halus, pemberian makan yang rendah dalam kuantitas. Keamanan makanan dan minuman dapat berupa makanan dan minuman yang

terkontaminasi, kebersihan yang rendah, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak aman (Supariasa, et al., 2019).

Faktor ketiga yang dapat menyebabkan stunting adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu) yang salah, karena inisiasi yang terlambat, tidak ASI eksklusif, dan penghentian penyusuan yang terlalu cepat. Faktor keempat adalah infeksi klinis dan sub klinis seperti infeksi pada usus : diare, *environmental enteropathy*, infeksi cacing, infeksi pernafasan, malaria, nafsu makan yang kurang akibat infeksi, dan inflamasi. Selain ke empat faktor penyebab stunting yang telah dibahas di atas, terdapat pula beberapa faktor komunitas dan sosial yang secara tidak langsung dapat menyebabkan stunting, yaitu politik ekonomi, kesehatan, edukasi, sosiokultural, agrikultur dan food system, air, sanitasi dan lingkungan. (Supariasa, et al., 2019)

Dampak dari kekurangan gizi pada awal kehidupan anak akan berlanjut dalam setiap siklus hidup manusia. Wanita usia subur (WUS) dan ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) akan melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR). BBLR ini akan berlanjut menjadi balita gizi kurang (stunting) dan berlanjut ke usia anak sekolah dengan berbagai konsekuensinya. Kelompok ini akan menjadi generasi yang kehilangan masa emas tumbuh kembangnya dari tanpa penanggulangan yang memadai kelompok ini dikuatirkan lost generation. Kekurangan gizi pada hidup manusia perlu diwaspadai dengan seksama, selain dampak terhadap tumbuh kembang anak

kejadian ini biasanya tidak berdiri sendiri tetapi diikuti masalah defisiensi zat gizi mikro (Supariasa, et al., 2019).

3. Ciri-Ciri anak stunting

Stunting merupakan kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan dan digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk melihat malnutrisi kronik pada anak yang dapat didiagnosis melalui indeks antropometrik TB/U. Stunting merupakan pertumbuhan linier yang gagal untuk mencapai potensi genetik sebagai akibat dari pola makan yang buruk dan penyakit (Yuliana & Bawon Nul Hakim, 2019).

Untuk mengetahui kejadian stunting pada anak maka perlu diketahui ciri-ciri anak yang mengalami stunting sehingga jika anak mengalami stunting dapat ditangani sesegera mungkin. Adapun beberapa ciri-ciri stunting antara lain (Rahayu, et al., 2018) :

- a. Tanda-tanda pubertas terhambat.
- b. Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya.
- c. Berat badan rendah untuk anak seusianya.
- d. Anak lebih pendiam dan tidak banyak melakukan *eye contact*.
- e. Pertumbuhan terhambat.
- f. Wajah tampak lebih muda dari usianya.
- g. Pertumbuhan gigi terhambat.

4. Dampak

Dampak yang dapat ditimbulkan oleh stunting pada periode jangka pendek adalah terganggunya perkembangan motorik otak, kecerdasan,

gangguan pada pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Apabila anak mengalami stunting di usia kurang dari 6 bulan, ini akan membuat tubuh anak tersebut menjadi lebih kecil sehingga dapat berdampak langsung ke organ salah satunya otak yang terdapat sel sel saraf yang sangat berkaitan dengan respon anak termasuk melihat, mendengar, dan berpikir selama proses belajar. Gangguan perkembangan kognitif ini bersifat tidak dapat diperbaiki, sehingga tubuh gagal dalam mengejar kegagalan perkembangan otak anak. Sedangkan dampak stunting pada periode jangka panjang adalah terjadinya penurunan kekebalan tubuh sehingga anak lebih mudah sakit sehingga lebih meningkatkan risiko terkena penyakit tak menular dan terjadi peningkatan kesakitan yang dapat meningkatkan risiko tinggi untuk terkena diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas pada masa tua yang berakibat pada kualitas kerja yang tidak kompetitif yang menyebabkan rendahnya produktivitas ekonomi bahkan dapat menyebabkan kematian (Adriani & Wirjatman, 2016).

Selain itu dampak stunting pada periode jangka panjang dapat berupa menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi pendidikan yang dicapai di masa kanak-kanak. Stunting tidak hanya sebatas berdampak terhadap kesehatan, permasalahan kesehatan ini selalu berhubungan dengan kondisi ekonomi. Anak dengan stunting akan berlanjut ke masa dewasa sehingga dapat mengakibatkan terbentuknya kualitas hidup

yang dapat memperburuk disparitas yaitu mengurangi 10% dari total penghasilan karena kemampuan kognitif serta kesehatan yang kurang baik. Hal ini akan berdampak terjadinya kemiskinan antar generasi. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan sebab permasalahan ketertinggalan gizi yang dialami pada waktu ini akan berdampak terhadap masa depan yang akan bersifat persisten dan sulit untuk diperbaiki (Adriani & Wirjatman, 2016).

5. Faktor-Faktor Penyebab

Menurut beberapa penelitian, kejadian stunting pada anak terjadi karena suatu proses kumulatif yang terjadi sejak masa kehamilan, masa kanak-kanak dan sepanjang siklus kehidupan. Stunting pada anak ini merupakan konsekuensi dari berbagai faktor seperti :

a. Faktor Genetik

Faktor genetik orang tua merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting pada balita. Apabila salah satu atau kedua orang tua memiliki perawakan yang pendek dan memiliki gen dalam kromosom yang membawa sifat pendek maka ini dapat menyebabkan terwariskannya gen tersebut dan membuat anak tersebut berperawakan pendek atau stunting (Aridiyah, et al., 2018).

b. Penyakit Infeksi

Infeksi memiliki hubungan dengan kejadian stunting antara lain ialah penyakit ISPA dan diare yang apabila terkena penyakit infeksi akan mempengaruhi proses penyerapan nutrisi sehingga

dapat menyebabkan malnutri. Sebaliknya, apabila seseorang mengalami malnutrisi maka akan berisiko lebih besar akan mengalami penyakit infeksi. Jika sakit infeksi yang dialami berlangsung lama maka akan meningkatkan risiko terjadinya stunting. Permasalahan gizi tidak semata hanya berhubungan dengan asupan gizi yang kurang melainkan riwayat infeksi juga berperan dalam masalah gizi anak yang mengalami penyakit infeksi akan memengaruhi pola makan dan penyerapan gizi yang akan terganggu, sehingga mengakibatkan masalah kekurangan gizi (Indrawani, 2014).

c. Riwayat BBLR

Berat badan lahir sangat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang anak balita. Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram akan mengalami hambatan pada pertumbuhan dan perkembangannya serta kemungkinan terjadi kemunduran fungsi intelektualnya selain itu bayi lebih rentan terkena infeksi dan terjadi hipotermi sehingga ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya stunting (Anisa, 2012).

d. Sanitasi Lingkungan

Lingkungan dapat berhubungan dengan stunting, hal ini berkaitan dengan kejadian infeksi apabila lingkungan tempat tinggal tidak sehat maka hal ini akan memperbesar risiko terjadi penyakit

infeksi yang dapat mengganggu proses penyerapan nutrisi seorang anak, sehingga dapat menghambat pertumbuhan anak. Kondisi kesehatan lingkungan ini dapat dilihat dari *hygiene* dan sanitasi seperti akses jamban sehat, penerapan cuci tangan pakai sabun (CTPS), pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga, akses terhadap sumber air bersih serta pengelolaan air minum (Indrawani, 2014).

e. Faktor Ekonomi

Pendapatan keluarga menjadi faktor yang berhubungan dengan stunting pada balita. Status ekonomi yang rendah berdampak pada ketidakmampuan untuk mendapatkan pangan yang cukup dan berkualitas karena rendahnya kemampuan daya beli. Kondisi ekonomi seperti ini membuat balita stunting sulit mendapatkan asupan zat gizi yang adekuat (Indrawani, 2014).

f. Pendidikan Orang Tua

Pendidikan orang tua sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi dengan adanya tingkat Pendidikan yang tinggi diharapkan agar pemahaman mengenai informasi pemenuhan gizi dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya stunting. Selain itu anak yang terlahir dari orang tua yang memiliki Pendidikan tinggi cenderung lebih mudah untuk menerima edukasi Kesehatan selama kehamilan, seperti nutrisi saat hamil dan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan (Aridiyah, et al., 2018).

g. ASI Eksklusif

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) tanpa menambahkan dan atau menggantikan dengan makanan dan minuman lain yang diberikan kepada bayi sejak baru dilahirkan selama 6 bulan. Menurut UNICEF Anak yang diberikan ASI saja selama enam bulan pertama akan mengalami pertumbuhan yang baik. ASI dapat melindungi bayi dari serangan penyakit infeksi karena ASI mengandung antibodi, protein dan vitamin A. biasanya, bayi yang baru lahir perlu menyusui antara 10 hingga 12 kali sehari, dengan jarak antara 1,5 hingga 2 jam sekali. Jika frekuensi menyusui lebih sering, tidak usah dibatasi. Biarkan bayi menyusui hingga merasa kenyang, karena kebutuhan setiap bayi selalu bervariasi. Atau pada bayi yang baru lahir karena waktunya lebih banyak untuk tidur, upayakan membangunkannya agar ada waktu untuk menyusui. Mulai usia 6 bulan bayi memerlukan makanan tambahan pendamping ASI untuk dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Seseorang balita diberikan makanan pendamping ASI selama 0-6 bulan akan menyebabkan produksi ASI menurun karena bayi tidak mau mengisap lagi akibat perasaan kenyang. Jika diberikan makanan pendamping ASI secara dini itu juga berdampak pada pencernaan bayi. Pada usia 0-6 bulan sistem pencernaan bayi belum sempurna

jiika sudah diberikan makanan pendamping ASI anak cenderung mengalami diare (Kurniasih, 2012).

6. Kelainan *kongenital* yang mempengaruhi tumbuh kembang

Kelainan kongenital adalah kelainan yang terjadi saat pertumbuhan sehingga mempengaruhi struktur, fungsi, atau pun metabolisme pada bayi yang timbul semenjak kehidupan *intrauterus* dan dapat diidentifikasi sebelum lahir, saat lahir dan di kemudian hari (Kalalo, et al., 2019). Beberapa kelainan kongenital seperti penyakit jantung bawaan akan memberikan dampak pada pertumbuhan anak berupa terjadinya gizi buruk yang disebabkan karena meningkatnya kebutuhan energi sehingga laju pernafasan akan meningkat sedangkan asupan kalori akan menurun. Penyakit jantung bawaan ini diperberat karena adanya Riwayat anak lahir dengan berat badan yang rendah (Jalaluddin, et al., 2019). Selain itu kelainan kongenital seperti kecacatan saraf tabung (*neuro tube defect*), bibir sumbing dan *down syndrome* akan memberikan dampak pada tumbuh kembang anak. Beberapa kelainan yang terjadi ini dapat disebabkan karena gangguan metabolisme folat sehingga terjadi *hyperhomocysteinaemia* dan komplikasi yang lebih sering saat mengandung (Yulivantina, et al., 2021).

C. Berat Badan Lahir

1. Definisi

Berat badan lahir merupakan hasil peningkatan/penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh antara tulang, otot, lemak, cairan tubuh,

dan lainnya. Berat lahir pada umumnya sangat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang. Berat badan lahir adalah pengukuran terpenting bayi saat lahir dimana bayi ditimbang dalam kurun waktu 1 (satu) jam setelah lahir yang ditujukan untuk mengetahui apakah berat badan bayi tersebut normal, rendah atau lebih sebagai indikator terbaik untuk mengetahui keadaan gizi dan tumbuh kembang anak. Berat badan bayi yang dilahirkan < 2500 gram atau Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) akan memberikan dampak berupa gagal tumbuh (*growth faltering*). Seseorang bayi yang lahir dengan BBLR akan sulit dalam mengejar ketertinggalan pertumbuhan awal sehingga menyebabkan terjadinya stunting (Winowatan, et al., 2017).

2. Klasifikasi Berat Badan Lahir

Berdasarkan berat badannya, berat bayi lahir diklasifikasikan menjadi :

a. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) diartikan sebagai bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. BBLR merupakan penyebab tertinggi angka kematian bayi, terutama dalam satu bulan pertama kehidupan. Bayi dengan berat badan lahir rendah umumnya mengalami proses hidup jangka panjang yang kurang baik. Apabila tidak meninggal pada awal kelahiran, bayi BBLR memiliki risiko tumbuh dan berkembang lebih lambat dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan normal. Selain gangguan

tumbuh kembang, individu dengan riwayat BBLR mempunyai faktor risiko tinggi untuk terjadinya penyakit degeneratif (Mahayana, et al., 2017).

Berdasarkan klasifikasi masa kehamilan oleh Depkes RI, BBLR dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu BBLR prematur, bayi kecil untuk masa kehamilan (KMK), dan Kombinasi prematur dan bayi kecil masa kehamilan. Menurut *American Academy of Pediatrics* (AAP) sebagai berikut (Gomella, et al., 2013):

1) Berdasarkan masa kehamilan/*Gestational age* yaitu:

- a) *Preterm*/bayi kurang bulan, yaitu masa kehamilan < 37 minggu (≤ 259).
- b) *Late preterm*, yaitu usia kehamilan 34-36 minggu (239-259 hari).
- c) *Early preterm*, yaitu usia kehamilan 22-34 minggu .
- d) *Term*/bayi cukup bulan, yaitu usia kehamilan 37-41 minggu (260-294 hari).
- e) *Post term*/bayi lebih bulan, yaitu usia kehamilan 42 minggu atau lebih (≥ 295 hari).

2) Berdasarkan berat lahir/*Birthweight*:

- a) Berat lahir amat sangat rendah/*Extremely low birthweight* (ELBW), yaitu bayi dengan berat lahir < 1000 gr
- b) Berat lahir sangat rendah/*Very low birthweight* (VLBW), yaitu bayi dengan berat lahir < 1500 gr

c) Berat lahir rendah/*Low birthweight* (LBW), yaitu bayi dengan berat lahir < 2500 gr

3) Berdasarkan berat lahir dan masa kehamilan:

a) Sesuai masa kehamilan/*Appropriate for gestational age* (AGA) adalah berat lahir antara 10 persentil dan 90 persentil untuk usia kehamilan.

b) Kecil masa kehamilan/*Small for gestational age* (SGA)/IUGR adalah berat lahir 2 standar deviasi dibawah berat badan rata-rata untuk masa kehamilan atau dibawah 10 persentil untuk masa kehamilan. IUGR (*Intrauterine Growth Restriction*)/pertumbuhan janin yang terhambat/terganggu adalah kondisi janin yang mengalami gangguan pertumbuhan dalam rahim (intrauterine). Kegagalan dalam pertumbuhan rahim yang optimal disebabkan oleh suatu in utero.

c) Besar masa kehamilan/*Large for Gestational Age* (LGA)

LGA di defenisikan sebagai berat lahir 2 standar deviasi diatas rata- rata berat untuk masa kehamilan atau di atas 90 persentil untuk masa kehamilan. LGA dapat di lihat pada bayi yang ibunya mengalami diabetes, bayi dengan sindrom Beckwith-Wiedemandan sindrom lainnya, bayi lebih bulan (usia kehamilan > 42 minggu), dan bayi dengan hydrops fetalis. Bayi LGA juga berhubungan dengan peningkatan

berat badan ibu saat hamil, multiparitas, jenis kelamin bayi laki-laki, penyakit jantung bawaan, khususnya perubahan pada arteri besar, displasia sel, dan etnik tertentu (hispanik).

b. Bayi Berat Lahir Normal

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan sampai 42 minggu dan berat badan lahir > 2500 - 4000 gram (Prawirohardjo, 2014).

c. Bayi Berat Lahir Lebih

Bayi berat lahir lebih adalah Bayi yang dilahirkan dengan berat lahir lebih > 4000 gram. Bayi dengan berat lahir lebih bisa disebabkan karena adanya pengaruh dari kehamilan posterm, bila terjadi perubahan anatomik pada plasenta maka terjadi penurunan janin, dari penelitian Vorher tampak bahwa sesudah umur kehamilan 36 minggu grafik rata-rata pertumbuhan janin mendatar dan tampak adanya penurunan sesudah 42 minggu. Namun seringkali pula plasenta masih dapat berfungsi dengan baik sehingga berat janin bertambah terus sesuai dengan bertambahnya umur kehamilan. Risiko persalinan bayi dengan berat >4000 gram pada kehamilan posterm meningkat 2-4 kali lebih besar dari kehamilan term. Selain itu faktor risiko bayi berat lahir lebih adalah ibu hamil dengan penyakit diabetes militus, ibu dengan DMG 40% akan melahirkan bayi dengan BB berlebihan pada semua usia kehamilan (Prawirohardjo, 2014).

3. Dampak

Pada bayi yang lahir dengan BBLR, sejak dalam kandungan telah mengalami retardasi pertumbuhan intrauterin dan akan berlanjut sampai usia selanjutnya setelah dilahirkan yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat dari bayi yang dilahirkan normal dan sering gagal menyusul tingkat pertumbuhan yang seharusnya dicapai pada usianya setelah lahir. Hambatan pertumbuhan yang terjadi berkaitan dengan maturitas otak yaitu sebelum usia kehamilan 20 minggu terjadi hambatan pertumbuhan otak seperti pertumbuhan somatik. Penelitian menemukan bahwa pada bayi BBLR kecil masa kehamilan, setelah berusia 2 bulan mengalami gagal tumbuh (*growth faltering*). Gagal tumbuh pada usia dini (2 bulan) menunjukkan risiko untuk mengalami gagal tumbuh pada periode berikutnya. Usia 12 bulan bayi BBLR kecil masa kehamilan tidak mencapai panjang badan yang dicapai oleh anak normal, meskipun anak normal tidak bertumbuh optimal, dengan kata lain kejar tumbuh (*catch up growth*) tidak memadai. Kejar tumbuh pada anak yang lahir BBLR berlangsung hingga usia dua tahun. Gagal tumbuh dan kejar tumbuh yang tidak memadai merupakan suatu keadaan patologis yang menyebabkan kejadian stunting pada balita. Bayi BBLR juga mengalami gangguan saluran pencernaan karena saluran pencernaan belum berfungsi seperti kurang dapat menyerap lemak dan mencerna protein sehingga mengakibatkan kurangnya cadangan zat gizi dalam

tubuh. Akibatnya, pertumbuhan bayi BBLR akan terganggu dan apabila keadaan ini berlanjut dengan pemberian makanan yang tidak mencukupi, sering mengalami infeksi, dan perawatan kesehatan yang tidak baik, dapat menyebabkan anak mengalami stunting (Nasution, et al., 2016).

D. Status Imunisasi

1. Pengertian Imunisasi

Imunisasi secara Bahasa berasal dari kata imun yang berarti kebal (resisten) atau imunitas yang berarti kekebalan. Sehingga imunisasi merupakan suatu upaya memberikan kekebalan tubuh baik secara aktif maupun secara pasif melalui cara buatan yaitu pemberian antigen yang akan menstimulus antibodi atau immunobiologik ke dalam tubuh (Rachmawati, et al., 2019).

Imunisasi adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seorang terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak terpajan pada penyakit tersebut ia tidak menjadi sakit. Program imunisasi nasional terdiri dari imunisasi dasar yang harus diselesaikan sebelum usia satu tahun yaitu, imunisasi Hepatitis B, BCG, DPT-Hb-Hib, Polio dan Campak (Ranuh, et al., 2014).

Imunisasi dasar adalah pemberian imunisasi awal untuk mencapai kadar kekebalan di atas ambang perlindungan. Sedangkan imunisasi lanjutan adalah imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat

kekebalan di atas ambang perlindungan atau untuk memperpanjang masa perlindungan (Mulyani, et al., 2013).

2. Tujuan Imunisasi

Adapun beberapa tujuan dalam melakukan imunisasi antara lain (Ranuh, et al., 2014) :

- a. Mencegah dan menurunkan terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu di dunia.
- b. Mencegah dan menurunkan penyakit-penyakit menular yang berbahaya bagi bayi dan anak.
- c. Mencegah dan menurunkan angka morbiditas dan mortalitas serta dapat mengurangi kecacatan yang disebabkan oleh PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi).
- d. Menurunkan morbiditas, mortalitas dan cacat serta bila mungkin didapat eradikasi suatu penyakit dari suatu daerah atau negeri.
- e. Mengurangi angka penderita suatu penyakit yang sangat membahayakan kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian pada penderitanya. Penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi yaitu campak, polio, difteri, tetanus, batuk rejan, hepatitis B, TBC.

3. Manfaat Imunisasi Dasar

Manfaat imunisasi dasar adalah mengurangi angka penderita suatu penyakit yang sangat membahayakan kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian pada penderitanya. Imunisasi tidak hanya bermanfaat untuk individu seorang anak saja, namun juga memiliki

manfaat lebih luas. Adapun beberapa manfaat nya antara lain (Hafid, et al., 2013) :

- a. Manfaat untuk anak dalam pemberian imunisasi akan memberikan fungsi serta manfaatnya dalam hal untuk melindungi bayi yang kadar imunitas tubuhnya masih sangat rentan dari penyakit yang bisa dan dapat untuk menyebabkan kesakitan kecacatan, ataupun bahkan kematian bayi. Di dalam vaksin sendiri sebenarnya terdapat bakteri bibit penyakit. Tentu saja bukan bakteri yang berbahaya, namun bakteri yang lemah atau yang sudah mati. Dengan memiliki bakteri didalam tubuh, secara alami tubuh akan membentuk pertahanan diri yang disebut antibodi. Antibodi ini akan melumpuhkan bakteri serupa yang akan menimbulkan penyakit. Bakteri akan tinggal lama di dalam tubuh, sehingga ketika nanti bakteri masuk ke dalam tubuh maka antibodi akan tahu cara mengatasinya. Dengan demikian, anak bisa terhindar dari penyakit.
- b. Manfaat untuk keluarga dalam pemberian imunisasi yang tepat, dapat membantu menghilangkan kecemasan orangtua dari risiko sakit yang akan diderita oleh anaknya. Selain itu juga menghemat biaya pengobatan bila anak sakit.
- c. Manfaat untuk negara dalam pemberian imunisasi jika cakupan imunisasi cukup luas, dapat meningkatkan kekebalan komunitas yang bisa mencegah masyarakat terjangkit penyakit infeksi tertentu. Selain itu dapat pula bermanfaat untuk memperbaiki tingkat

kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan bersemangat untuk melanjutkan pembangunan negara.

4. Klasifikasi Imunisasi

Imunitas dibagi dalam dua hal, yaitu aktif dan pasif. Aktif adalah bila tubuh anak ikut menyelenggarakan terbentuknya imunitas, sedangkan pasif adalah apabila tubuh anak tidak bekerja membentuk kekebalan, tetapi hanya menerimanya saja.

a. Imunisasi Aktif

Imunisasi aktif adalah pemberian bibit penyakit yang telah dilemahkan (vaksin) atau dimatikan agar tubuh mengalami reaksi imunologi spesifik yang akan memberikan respon seluler, humoral dan dihasilkan *cell memory* sehingga bila ada penyakit maka tubuh dapat mengenali dan meresponnya (Mulyani & Rinawati, 2013).

b. Imunisasi Pasif

Imunisasi pasif terbagi atas dua, yaitu imunisasi pasif alamiah yang merupakan suatu proses peningkatan kekebalan tubuh dengan cara pemberian zat immunoglobulin yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia (kekebalan yang didapat bayi dari ibu melalui plasenta) dan imunisasi pasif buatan yang merupakan suatu proses peningkatan kekebalan tubuh dengan cara pemberian zat immunoglobulin yang dihasilkan melalui proses infeksi yang dapat berasal dari plasma

manusia atau binatang (serum anti tetanus) (Dewi & Megaputri, 2021).

5. Jenis Imunisasi

Berdasarkan PERMENKES No. 12 Tahun 2017 jenis imunisasi di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu imunisasi program dan imunisasi pilihan.

a. Imunisasi Program

Merupakan imunisasi yang harus diberikan sesuai dengan jenis vaksin, jadwal atau waktu pemberian yang ditetapkan oleh pemerintah dan diwajibkan pada seseorang sebagai bagian dari masyarakat untuk melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitar dari pervakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Dewi & Megaputri, 2021).

1) Imunisasi rutin merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai jadwal yang terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan (Dewi & Megaputri, 2021).

a) Imunisasi dasar merupakan pemberian imunisasi awal untuk mencapai kadar kekebalan di atas ambang perlindungan. Imunisasi dasar terdiri atas imunisasi terhadap penyakit hepatitis B, poliomyelitis, tuberkolosis, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh

Hemophilus Influenza tipe b (Hib); dan campak (Dewi & Megaputri, 2021).

b) Imunisasi Lanjutan adalah ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan di atas ambang perlindungan atau untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Imunisasi lanjutan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melengkapi imunisasi dasar pada bayi yang diberikan kepada anak usia bawah dua tahun (baduta), anak usia sekolah, dan wanita usia subur (WUS) termasuk ibu hamil (Dewi & Megaputri, 2021).

c) Imunisasi tambahan adalah pemberian imunisasi pada kelompok umur tertentu yang berisiko terkena suatu penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu (Dewi & Megaputri, 2021).

2) Imunisasi pilihan merupakan imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu (Hardianti, et al., 2014).

6. Imunisasi Dasar

a. Imunisasi BCG (Bacillus Calmette Guerin)

Imunisasi BCG mengandung *Mycobacterium bovis* hidup yang dilemahkan. Imunisasi BCG tidak mencegah infeksi

tuberkulosis tetapi mengurangi resiko tuberkulosis berat seperti meningitis tuberkulosa dan tuberkulosa primer.

Imunisasi BCG merupakan program wajib dari pemerintah yang diberikan pada bayi baru lahir hingga bayi berusia sebelum 2 bulan. Namun untuk mencapai cakupan yang lebih luas, Kementerian Kesehatan menganjurkan pemberian imunisasi BCG pada umur antara 0-12 bulan. Dosis 0,05 ml untuk bayi kurang dari 1 tahun dan 0,1 ml untuk anak (> 1 tahun). Imunisasi BCG diberikan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas (insertion musculus deltoideus) sesuai anjuran WHO, tidak ditempat lain misal bokong, paha (Ranuh, et al., 2014).

Reaksi lokal yang timbul setelah imunisasi BCG adalah wajar, suatu pembengkakan kecil, merah, lembut biasanya timbul pada daerah bekas suntikan, yang kemudian berubah menjadi vesikel kecil, dan kemudian menjadi sebuah ulkus kecil dalam waktu 2 - 4 minggu. Reaksi ini biasanya hilang dalam 2-5 bulan, dan umumnya pada anak-anak meninggalkan bekas berupa jaringan parut dengan diameter 2-10 mm. Jarang sekali nodus atau ulkus tetap bertahan. Kadang-kadang pembesaran getah bening pada daerah ketiak dapat timbul 2-4 bulan setelah imunisasi. Sangat jarang sekali kelenjar getah bening tersebut menjadi supuratif. Suntikan yang kurang hati-hati dapat menimbulkan abses dan jaringan parut (Ranuh, et al., 2014).

Imunisasi BCG tidak dapat diberikan pada bayi yang mengalami defisiensi sistem kekebalan, terinfeksi HIV asimtomatis maupun simtomatis, adanya penyakit kulit yang berat/ menahun, atau sedang menderita TBC (Dewi & Megaputri, 2021).

b. Imunisasi Hepatitis B

Imunisasi Hepatitis B adalah imunisasi virus rekombinan yang telah dinaktivasikan dan bersifat *non-infecious* yang bersifat wajib bagi bayi dan anak karena pola penularannya bersifat vertikal. Pemberian imunisasi Hepatitis B bertujuan untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit hepatitis B. Imunisasi Hepatitis B disuntikkan dengan dosis 0,5 ml atau 1 (buah) HB PID, pemberian suntikan secara intramuskuler, sebaiknya anterolateral paha dengan pemberian sebanyak 3 dosis, dosis pertama diberikan pada usia 0-7 hari, dosis berikutnya dengan interval minimum 4 minggu (1 bulan) (Ranuh, et al., 2014).

Reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari. Kontra indikasi pemberian imunisasi hepatitis B pada bayi yang menderita infeksi berat yang disertai kejang (Dewi & Megaputri, 2021).

c. Imunisasi DTP-HB-Hib

Imunisasi DPT-Hb-HiB merupakan imunisasi yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap beberapa

penyakit seperti difteri, pertussis, tetanus, hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenzae tipe b secara simultan. Imunisasi DTP-HB-Hib (Vaksin Jerap Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B Rekombinan, Haemophilus influenzae tipe b) berupa suspensi homogen yang mengandung toksoid tetanus dan difteri murni, bakteri pertusis (batuk rejan) inaktif, antigen permukaan hepatitis B (HbsAg) murni yang tidak infeksius, dan komponen Hib sebagai vaksin bakteri sub unit berupa kapsul polisakarida Haemophilus Influenzae tipe b tidak infeksius yang dikonjugasikan kepada protein toksoid tetanus. (Ranuh, et al., 2014).

Imunisasi DTP-HB-Hib diberikan pada usia 2,3,4 bulan dengan interval 4 minggu yang harus disuntikkan secara intramuskular pada anterolateral paha atas, dengan dosis anak 0,5 ml. Kontra indikasi pemberian vaksin DTP-HB-Hib anak yang mempunyai hipersensitif terhadap komponen vaksin tau reaksi berat terhadap dosis vaksin kombinasi sebelumnya atau bentukbentuk reaksi sejenis lainnya merupakan kontraindikasi absolut terhadap dosis berikutnya. Terdapat beberapa kontra indikasi terhadap dosis pertama DTP ; kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelaianan saraf serius lainnya merupakan kontraindikasi terhadap komponen pertusis. Dalam hal ini vaksin tidak boleh diberikan sebagai vaksin kombinasi, tetapi vaksin DT harus diberikan sebagai pengganti DTP, vaksin Hepatitis B dan Hib

diberikan secara terpisah. Vaksin tidak akan membahayakan individu yang sedang atau sebelumnya telah terinfeksi virus hepatitis B (Dewi & Megaputri, 2021).

Efek samping yang dimiliki oleh imunisasi ini adalah jenis dan angka kejadian reaksi simpang yang berat tidak berbeda secara bermakna dengan vaksin DTP, Hepatitis B dan Hib yang diberikan secara terpisah. Untuk DTP, reaksi lokal dan sistemik ringan umum terjadi. Beberapa reaksi lokal sementara seperti bengkak, nyeri dan kemerahan pada lokasi penyuntikan disertai demam dapat timbul dalam sejumlah besar kasus. Kadang-kadang reaksi berat seperti demam tinggi, iritabilitas (rewel), dan menangis dengan nada tinggi dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian (Dewi & Megaputri, 2021).

d. Imunisasi Polio

Imunisasi polio merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit poliomyelitis yang dapat menyebabkan kelumpuhan pada anak. Imunisasi polio terdapat 2 macam yang berisi virus polio 1, 2 dan 3 yaitu Oral Polio Vaccine (OPV) atau biasa disebut vaksin sabin terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1,2, dan 3 yang sudah dilemahkan yang diberi melalui suntikan dan Inactivated Polio Vaccine (IPV) atau biasa disebut vaksin salk terdiri dari virus polio yang telah dimatikan dan diberikan melalui suntikan. Polio- 0 diberikan saat bayi lahir sesuai

pedoman PPI atau pada kunjungan pertama sebagai tambahan untuk mendapatkan cakupan imunisasi yang tinggi. Selanjutnya dapat diberikan vaksin OPV atau IPV. Untuk imunisasi dasar (polio_{2,3,4}) diberikan pada umur 2,4, dan 6 bulan. Interval antara dua imunisasi tidak kurang dari 4 minggu (Dewi & Megaputri, 2021).

Dosis OPV diberikan 2 tetes per-oral, IPV dalam kemasan 0,5 ml diberikan secara intramuskular. Imunisasi IPV dapat diberikan tersendiri atau dalam kemasan kombinasi (DTaP/IPV, DTaP/Hib/IPV). Imunisasi polio ulangan diberikan satu tahun sejak imunisasi polio-4, selanjutnya saat masuk sekolah (5-6 tahun) (Ranuh, et al., 2014).

Kontra indikasi umumnya pada imunisasi adalah vaksinasi harus ditunda pada mereka yang sedang menderita demam, penyakit atau penyakit kronis progresif. Hipersensitif pada saat pemberian vaksin ini sebelumnya. Penyakit demam akibat infeksi akut : tunggu sampai sembuh. Efek samping yang dapat ditimbulkan berupa reaksi lokal pada tempat penyuntikan antara lain nyeri, kemerahan, indurasi dan bengkak bisa terjadi dalam waktu 48 jam setelah penyuntikan dan bisa bertahan selama satu atau dua hari. Kejadian dan tingkat keparahan dari reaksi lokal tergantung pada tempat dan cara penyuntikan serta jumlah dosis yang sebelumnya diterima. Reaksi sistemik yang ditimbulkan demam dengan atau tanpa disertai

myalgia, sakit kepala atau limfadenopati namun hal ini jarang terjadi (Ranuh, et al., 2014).

e. Imunisasi Campak

Imunisasi campak merupakan virus hidup yang dilemahkan untuk mencegah terjadinya penyakit campak pada anak karena termasuk penyakit menula. Dosis pemberian vaksin campak 0,5 ml disuntikkan secara subkutan pada lengan kiri atas, pada usia 9-11 bulan. Vaksin yang sudah dilarutkan harus digunakan sebelum lewat 6 jam (Ranuh, et al., 2014).

Kontra indikasi pemberian imunisasi campak adalah individu yang mengidap penyakit immune deficiency atau individu yang diduga menderita gangguan respon imun karena leukimia, limfoma. Imunisasi ini sebaiknya tidak diberikan bagi orang yang alergi terhadap dosis vaksin campak sebelumnya, wanita hamil karena efek vaksin campak terhadap janin belum diketahui, orang yang alergi terhadap anamisin dan eritromisin, anak yang memiliki kerentanan tinggi terhadap protein telur. Efek samping dari vaksin campak, 15 % pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari yang dapat terjadi 8-12 hari setelah vaksinasi (Dewi & Megaputri, 2021).

E. Riwayat Penyakit Infeksi

1. Definisi Infeksi

Infeksi adalah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan penyakit. Infeksi pada balita merupakan salah satu penyakit serius dengan angka mortalitas yang tinggi. Penyakit infeksi ialah penyakit yang disebabkan oleh masuk dan berkembangnya biaknya mikroorganisme, suatu kelompok luas dari organisme mikroskopik yang terdiri dari satu atau banyak sel seperti bakteri, fungi, dan parasit serta virus. Penyakit infeksi terjadi ketika interaksi dengan mikroba menyebabkan kerusakan pada tubuh host dan kerusakan tersebut menimbulkan berbagai gejala dan tanda klinis. Mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada manusia disebut sebagai mikroorganisme patogen, salah satunya bakteri patogen. (Novard, et al., 2019).

Penyakit infeksi dapat menyebabkan anak kehilangan cairan dan sejumlah zat gizi serta dapat menyerang berbagai sistem organ pada tubuh anak. Kejadian infeksi menyebabkan adanya gangguan pada metabolisme tubuh dan sistem imun karena terjadi peradangan. Selain karena asupan nutrisi tidak adekuat akibat nafsu makan yang berkurang, keterkaitan riwayat infeksi dengan gangguan pertumbuhan berkaitan dengan mekanisme peradangan yang terjadi. Pada saat terjadi peradangan atau inflamasi, protein hsRC (*High-sensitivity C- reactive Protein*) disekresikan oleh tubuh dan berdampak pada resistensi hormon

pertumbuhan GH (Growth Hormone). Mekanisme peradangan dalam tubuh akan menghambat kerja IGF-1 (Insulin Growth Factor-1) yang berperan sebagai mediator antara GH dengan pertumbuhan sel-sel otot dan tulang pada manusia (Himawati & Fitria, 2020).

2. Status Gizi

Gangguan defisiensi gizi dan rawan infeksi merupakan pasangan yang erat, maka perlu ditinjau kaitannya satu sama lain. Infeksi bisa berhubungan dengan gangguan gizi melalui beberapa cara, yaitu memengaruhi nafsu makan, menyebabkan kehilangan bahan makanan karena muntah – muntah/diare, atau memengaruhi metabolisme makanan. Gizi buruk atau infeksi menghambat reaksi imunologis yang normal dengan menghabiskan sumber energi di tubuh. Adapun penyebab utama gizi buruk yakni penyakit infeksi pada anak seperti ISPA, diare, campak, dan rendahnya asupan gizi akibat kurangnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga atau karena pola asuh yang salah (Adriani & Wirjatman, 2016).

Infeksi akan lebih mudah mengakibatkan dampak yang berbahaya bila menyerang seseorang yang kurang gizi. Infeksi menyebabkan terjadinya penghancuran jaringan tubuh, baik untuk bibit penyakit itu sendiri maupun penghancuran untuk memperoleh protein yang diperlukan untuk mempertahankan tubuh. Hadirnya penyakit infeksi dalam tubuh anak akan semakin memburuk jika disertai muntah dan diare. Dalam kondisi ini, dalam tubuh terjadi penurunan imunitas atau

penurunan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Gangguan gizi dan penyakit infeksi sering bekerja bersama-sama dan akan memberikan akibat yang lebih buruk. Kurang gizi memperburuk kemampuan anak mengatasi serangan penyakit infeksi. Kuman yang berbahaya bagi anak gizi baik menjadikan kematian bagi anak gizi kurang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dan penyakit infeksi, yaitu setiap penyakit infeksi akan memperburuk status gizi (Adriani & Wirjatman, 2016).

3. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

Infeksi Saluran Pernafasan Akut atau ISPA adalah penyakit saluran pernafasan akut yang dapat mengenai satu atau beberapa organ pada saluran pernafasan dari hidung sampai alveoli disebabkan oleh agen infeksius seperti bakteri, virus, atau jamur dan dapat ditularkan dari manusia ke manusia (Lestari, et al., 2020). ISPA dengan gejala demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, dan batuk tidak lebih dari 10 hari sejak timbul gejala dan memerlukan perawatan rumah. Ada tiga unsur dalam ISPA yaitu infeksi, saluran pernafasan dan akut. Infeksi ialah masuknya kuman atau mikroorganisme ke tubuh manusia serta berkembang yang akhirnya menimbulkan gejala penyakit. Infeksi akut adalah infeksi yang terjadi selama 14 hari meskipun beberapa penyakit seperti ISPA dapat terjadi infeksi >14 hari.

Penyakit infeksi adalah faktor penyebab langsung terjadinya *stunting*. Adanya penyakit infeksi dapat memperburuk kondisi jika

mengalami kekurangan gizi. Balita yang kurang gizi dapat dengan mudah mengalami penyakit infeksi. Oleh sebab itu penanganan yang baik pada penyakit infeksi dapat membantu perbaikan gizi dengan diimbangi pemenuhan asupan yang sesuai dengan kebutuhan anak balita. Penyakit infeksi dalam tubuh anak dapat mempengaruhi keadaan gizi anak. Sebagai reaksi pertama akibat terdapatnya infeksi ialah berkurangnya nafsu makan anak sehingga tidak mau makan makanan yang diberikan ibunya sehingga berkurangnya asupan zat gizi ke tubuh anak yang dapat menyebabkan stunting (Natalia & Evitasari, 2020).

4. Diare

Diare adalah pengeluaran feses yang konsistensinya lembek sampai cair yang ditandai dengan peningkatan volume dengan frekuensi pengeluaran feses sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari. Diare dapat mengakibatkan demam, sakit perut, penurunan nafsu makan, rasa lelah dan penurunan berat badan. Diare dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit secara mendadak, sehingga dapat terjadi berbagai macam komplikasi yaitu dehidrasi, renjatan hipovolemik, kerusakan organ bahkan sampai koma (Utami & Luthfiana, 2016).

Virus atau bakteri dapat masuk ke dalam tubuh bersama makanan dan minuman. Virus atau bakteri tersebut akan sampai ke sel-sel epitel usus halus dan akan menyebabkan infeksi, sehingga dapat merusak sel-sel epitel tersebut. Sel-sel epitel yang rusak akan digantikan oleh sel-sel epitel yang belum matang sehingga fungsi sel-sel ini masih belum

optimal. Selanjutnya, vili-vili usus halus mengalami atrofi yang mengakibatkan tidak terserapnya cairan dan makanan dengan baik. Cairan dan makanan yang tidak terserap akan terkumpul di usus halus dan tekanan osmotik usus akan meningkat. Hal ini menyebabkan banyak cairan ditarik ke dalam lumen usus. Cairan dan makanan yang tidak diserap tadi akan terdorong keluar melalui anus dan terjadilah diare (Utami & Luthfiana, 2016).

Manifestasi klinis dari diare yaitu mula-mula anak balita menjadi cengeng, gelisah, demam, dan tidak nafsu makan. Tinja akan menjadi cair dan dapat disertai dengan lendir ataupun darah. Warna tinja dapat berubah menjadi kehijau-hijauan karena tercampur dengan empedu. Frekuensi defekasi yang meningkat menyebabkan anus dan daerah sekitarnya menjadi lecet. Tinja semakin lama semakin asam sebagai akibat banyaknya asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak dapat diabsorpsi oleh usus selama diare. Gejala muntah dapat ditemukan sebelum atau sesudah diare. Muntah dapat disebabkan oleh lambung yang meradang atau gangguan keseimbangan asam-basa dan elektrolit (Utami & Luthfiana, 2016).

Diare dapat menimbulkan terjadinya gizi kurang begitu juga sebaliknya. Infeksi memengaruhi status gizi melalui penurunan asupan makanan, penurunan absorpsi makanan di usus, meningkatkan katabolisme, dan mengambil gizi yang diperlukan tubuh untuk sintesis jaringan dan pertumbuhan (20). Di samping itu, gizi kurang bisa

menjadi faktor predisposisi terjadinya infeksi karena menurunkan pertahanan tubuh dan mengganggu fungsi kekebalan tubuh manusia (Angkat, 2018).

F. Integrasi Keislaman terkait Stunting

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 9 yang berbunyi (Departemen Agama RI, 2012):

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya).

Mujahid ra. Menjelaskan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan permintaan Sa'ad bin Abi Waqqash ra., yang suatu saat sedang sakit keras, kepada Rasulullah saw. Kala Rasulullah saw datang menjenguk, Sa'ad ra. Berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Aku boleh mengifakkan dua pertiga dari hartaku?' 'Tidak boleh,' Jawab Rasul saw. 'Separuh, ya Rasul?' 'Tidak, Jawab Rasul saw. Lagi. 'Jika sepertiga, ya Rasul?' 'Rasul saw. Mengizinkan, 'Ya, sepertiga juga sudah banyak. Rasul saw. Lalu bersabda, 'Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada miskin yang meminta-minta kepada manusia.' (HR. Bukhari dan Muslim) (Abu al-Hajjaj muhammad, 1989).

Oleh karena itu, pemerintah kemudian melalui program “Gerakan Seribu Hari Awal Kehidupan” yang dikenal sebagai 1000 HAK yang merupakan program dengan tujuan mempercepat perbaikan gizi untuk memperbaiki kehidupan anak-anak Indonesia di masa mendatang. Dengan tujuan untuk menurunkan prevalensi stunting beserta segala bentuk kekurangan gizi lainnya yang menjadi masalah di Indonesia, maka gerakan ini melibatkan berbagai sektor dan pemangku kebijakan. Adapun Intervensi pada 1000 HAK difokuskan pada 2 jenis intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik merupakan rangkaian berbagai kegiatan yang cukup *cost effective* khususnya untuk mengatasi masalah gizi pendek dan intervensi gizi sensitive merupakan berbagai kegiatan program pembangunan yang memberi pengaruh pada status gizi masyarakat terutama kelompok 1000 HPK, seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, gender, air bersih, sanitasi, serta kesehatan lingkungan (Haris, et al., 2019). Selain itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi stunting dalam program yang memiliki prinsip bahwa semua orang di dunia berhak mendapatkan makanan dan gizi yang baik yang dinamakan *Scaling Up Nutrition (SUN) Movement* (Permana & Wijaya, 2020). Dengan mencegah terjadinya stunting, maka hal juga dapat mencegah terbentuknya generasi yang lemah dan berusaha untuk membentuk generasi umat yang kuat sesuai dalam anjuran Allah SWT dalam An-Nisa ayat 9 (Hadi, 2017).


Muslim bin Hajjaj abu al-hasan al-Qusyairy al-Naisabury, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar binaqul al-adl 'an al-'adl ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam* dalam Dar Ihya al-Turats al-'arabi berkata :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ أُحْرِصَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعْنُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنْ لَوْ تَفَتَّحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ»¹

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Idris dari Rabi'ah bin 'Utsman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala daripada orang mukmin yang lemah.** Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan: 'Seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu'. Tetapi katakanlah: 'Ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata 'law' (seandainya) akan membukakan jalan bagi godaan syetan.'*


G. Kerangka Teori



(Theory The UNICEF Conceptual Framework of Undernutrition, 2013)


Gambar 2.1 Kerangka Teori

H. Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

I. Kerangka Kerja



Gambar 2. 3 Kerangka Kerja

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional yang dilakukan tanpa melakukan intervensi pada subjek penelitian dengan menggunakan pendekatan *cross sectional* untuk mengetahui hubungan faktor anak terhadap kejadian stunting pada balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul Hubungan Faktor Anak dengan Kejadian Stunting pada Balita di Puskesmas Kassi-Kassi ini akan dilakukan di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama dalam kurun waktu bulan 01 Desember-30 Desember 2021.

D. Variabel Penelitian

1. Variabel dependen : Stunting.
2. Variabel independent : Faktor anak berupa BBL, Status Imunisasi, dan Riwayat Penyakit Infeksi.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan sekelompok individu yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik serupa dan

kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita usia 0-59 bulan di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi sebanyak 1.433 anak.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak memenuhi kriteria eksklusi yang diambil dengan teknik purposive sampling. Besar sampel yang akan diambil berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat signifikan (p)

Setelah melakukan pengambilan data awal di Puskesmas Kassi-Kassi, didapatkan jumlah populasi Balita usia 0-59 bulan pada bulan Juni 2021 yaitu 1.433 orang. Maka, jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{1433}{1 + 1433 (0,057^2)}$$

n = 249,9 balita dibulatkan menjadi 250 balita.

Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Kriteria Penelitian

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
1. Balita berusia 0-59 bulan.	1. Balita yang sedang sakit.
2. Balita yang memiliki ibu yang bersedia menjadi responden dan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi.	2. Balita yang menderita kelainan kongenital sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya.
3. Balita yang tinggal di wilayah puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.	3. Responden yang berpindah domisili saat penelitian berlangsung.
4. Balita yang memiliki rekam medik yang lengkap	4. Responden yang sedang menjalani isolasi mandiri Covid-19 saat penelitian berlangsung.

F. Cara Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari objek yang akan diteliti dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung yang didapatkan dari objek yang akan diteliti. Data pada penelitian ini didapatkan dari buku KIA dan rekam medik yang terdapat pada responden dan instansi tempat dilakukannya penelitian yaitu Puskesmas Kassi-Kassi.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data atau mengukur objek suatu variabel penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (rekam medik) berupa buku Kesehatan Ibu dan Anak , kuesioner melalui metode *online* dengan menggunakan *google form* yang didampingi oleh peneliti saat melakukan pengisian dan length board atau microtoice untuk melakukan pengukuran panjang badan/tinggi badan secara langsung.

H. Pengolahan Data

Data yang didapatkan dibuat dalam bentuk presentasi dan tabel distribusi frekuensi dengan pengolahan tabel kemudian dilakukan pengolahan secara sistematis, dan harus melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Seleksi

Bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kategori.

2. Penyuntingan Data (*Editing*)

Dilakukan untuk memeriksa data yang masuk telah didapatkan sebagai usaha untuk melengkapi data yang kurang lengkap.

3. *Pengkodean (Coding)*

Pemberian kode dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengolahan data, juga untuk menjaga kerahasiaan identitas responden.

4. *Tabulasi (Tabulating)*

Tabulasi dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan tujuan dan kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan sehingga mempermudah dalam analisis data.

I. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *Statistical for Social Science* (SPSS) yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang telah diberikan kode serta disusun dan di kelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga mempermudah dalam melakukan analisis data.

1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dengan cara mendeskripsikan variabel dependen dan variabel independen untuk melihat gambaran distribusi frekuesinya dengan membuat tabel distribusi frekuensi dan presentasi dari masing-masing frekuensi.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan dari variabel dependen dan variabel independen dengan menggunakan uji *chi square*.

J. Etika Penelitian

Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam melakukan penelitian ada hal-hal yang berhubungan dengan etika penelitian, yaitu :

1. Membuat surat pengantar yang ditunjukkan kepada pihak atau instansi sebagai permohonan izin untuk melaksanakan penelitian.
2. Sebelum meminta responden untuk mengisi instrumen penelitian, peneliti menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan penelitian, serta meminta persetujuan responden untuk ikut serta dalam penelitian yang akan dilakukan dengan baik dan sopan.
3. Menjamin kerahasiaan identitas subjek atau responden penelitian sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang sedang dilakukan.
4. Tidak memaksa atau melakukan intervensi subjek penelitian pada saat sedang dilakukan pengumpulan data.
5. Diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait sesuai dengan manfaat yang telah disebutkan sebelumnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mulai tanggal 01 Desember 2021 hingga 31 Desember 2021. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 251 sampel. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor anak dengan kejadian Stunting anak usia 0-59 bulan di lokasi penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji *Chi-Square*. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Univariat

Tabel 4.1 Distribusi Data Berdasarkan Angka Kejadian Stunting Pada Balita di Puskemas Kassi-Kassi

Stunting	N	%
Ya	114	45,4
Tidak	137	54,6
Total	251	100

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.1, didapatkan balita di PKM Kassi-Kassi dengan stunting sebanyak 114 responden (45,4%) sedangkan balita tidak stunting sebanyak 137 responden (54,6%).

Tabel 4.2 Distribusi Data Berdasarkan Berat Badan Lahir Pada

Balita di Puskemas Kassi-Kassi

Berat Badan lahir	n	%
Normal	213	84,9
Rendah	38	15,1
Total	251	100

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan balita di PKM Kassi-Kassi dengan berat badan lahir normal sebanyak 213 responden (84,9%) sedangkan balita dengan berat badan lahir rendah sebanyak 38 responden (15,1%).

Tabel 4.3 Distribusi Data Berdasarkan Status Imunisasi Pada

Balita di Puskemas Kassi-Kassi

Imunisasi	n	%
Lengkap	191	76,1
Tidak lengkap	60	23,9
Total	251	100

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.3, didapatkan balita di PKM Kassi-Kassi dengan status imunisasi lengkap sebanyak 191 responden (76,1%) sedangkan status imunisasi tidak lengkap sebanyak 60 responden (23,9%).

Tabel 4.4 Distribusi Data Berdasarkan Riwayat Infeksi Saluran Nafas Akut (ISPA) Pada Balita di Puskesmas Kassi-Kassi

Riwayat Infeksi	n	%
Saluran Nafas Akut		
Ya	16	6,4
Tidak	235	93,6
Total	251	100

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.4, didapatkan balita di PKM Kassi-Kassi dengan Riwayat ISPA sebanyak 16 responden (6,4%) sedangkan tidak memiliki riwayat ISPA sebanyak 235 responden (93,6%).

Tabel 4.5 Distribusi Data Berdasarkan Riwayat Diare Pada Balita di Puskesmas Kassi-Kassi

Riwayat Infeksi	n	%
Diare		
Ya	47	18,7
Tidak	204	81,3
Total	251	100

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.5, didapatkan balita di PKM Kassi-Kassi dengan riwayat diare sebanyak 47 responden (18,7%) sedangkan balita tidak memiliki riwayat diare sebanyak 204 responden (81,3%).

2. Analisis Bivariat

Tabel 4.6 Hubungan Berat Badan Lahir Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.

Parameter (Berat Badan Lahir)	Stunting				Total		p-value
	Ya		Tidak		n	%	
	n	%	n	%			
Normal	80	32	133	53	213	85	0,000
Rendah	34	13	4	2	38	15	
Total	114	45	137	55	251	100	

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabulasi tabel 4.5, didapatkan bahwa balita dengan berat lahir normal yang mengalami stunting sebanyak 80 responden (32%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 133 responden (53%), sedangkan balita dengan berat badan lahir rendah yang mengalami stunting sebanyak 34 responden (13%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 4 responden (2%).

Uji *chi-square* merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* <0,05. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara berat badan lahir dengan kejadian stunting.

Tabel 4.7 Hubungan Status Imunisasi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.

Parameter (Status Imunisasi)	Stunting				Total		p-value
	Ya		Tidak		n	%	
	N	%	n	%			
Lengkap	68	27	123	49	191	76	0,000
Tidak lengkap	46	18	14	6	60	24	
Total	114	45	137	55	251	100	

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabulasi tabel 4.6, didapatkan bahwa balita dengan status imunisasi lengkap yang mengalami stunting sebanyak 68 responden (27%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 123 responden (49%), sedangkan balita dengan status imunisasi tidak lengkap yang mengalami stunting sebanyak 46 responden (18%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 14 responden (6%).

Uji *chi-square* merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* <0,005. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara status imunisasi dengan kejadian stunting.

Tabel 4.8 Hubungan Infeksi Saluran Nafas Akut Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.

Parameter (ISPA)	Stunting				Total		p-value
	Ya		Tidak		N	%	
	N	%	N	%			
Ya	7	2	9	4	16	6	
Tidak	107	43	128	51	235	94	0,551
Total	114	45	137	55	251	100	

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabulasi tabel 4.7, didapatkan bahwa balita dengan riwayat ISPA yang mengalami stunting sebanyak 7 responden (2%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 9 responden (4%), sedangkan balita yang tidak memiliki riwayat ISPA yang mengalami stunting sebanyak 107 responden (43%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 128 responden (51%).

Uji *chi-square* merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* <0,005. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.551 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara riwayat infeksi saluran nafas akut dengan kejadian stunting.

Tabel 4.9 Hubungan Riwayat Diare Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kassi-Kassi.

Parameter (Riwayat Diare)	Stunting				Total		p-value
	Ya		Tidak		N	%	
	n	%	N	%			
Ya	28	11	19	8	47	19	0,023
Tidak	86	34	118	47	204	81	
Total	114	45	137	55	251	100	

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabulasi tabel 4.9, didapatkan bahwa balita dengan riwayat diare yang mengalami stunting sebanyak 28 responden (11%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 19 responden (8%), sedangkan balita yang tidak memiliki riwayat diare yang mengalami stunting sebanyak 86 responden (34%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 118 responden (47%).

Uji *chi-square* merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* <0,05. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.023 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara riwayat diare dengan kejadian stunting.

B. Pembahasan

1. Karakteristik sampel dengan kejadian stunting

Stunting adalah kondisi status gizi balita lebih rendah dari standar sesuai usianya berdasarkan tinggi badan atau panjang badan per umur yang dinilai berdasarkan pengukuran antropometri sebagai acuan yang

tepat dan akurat. Dikatakan stunting apabila hasil pengukuran yang dimasukkan ke dalam antropometri mendapatkan hasil $< - 2$ SD (Ernawati, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkup kerja wilayah Puskesmas Kassi-Kassi dengan total sampel sebanyak 251 balita didapatkan balita di PKM Kassi-Kassi dengan stunting sebanyak 114 responden (45,4%) sedangkan balita tidak stunting sebanyak 137 responden (54,6%).

2. Hubungan berat badan lahir dengan kejadian stunting

Salah satu indikator kesehatan bayi baru lahir adalah berat badan. Berat badan lahir dikategorikan atas berat badan lahir normal (≥ 2500 gram) dan berat badan lahir rendah (< 2500 gram). Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah maka akan berpeluang untuk memiliki ukuran pada antropometri tidak sesuai dengan usianya yang menyebabkan terjadinya kekurangan zat gizi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan, maka tubuh akan menggunakan cadangan zat gizi dalam tubuh. Apabila hal ini berlangsung terus menerus, maka cadangan zat gizi dalam tubuh akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan jaringan, rendahnya tingkat hemoglobin, serum vitamin A dan karoten, serta peningkatan asam laktat dan piruvat (Nainggola & Sitompul, 2019).

Selain itu bayi yang memiliki berat badan lahir rendah cenderung mempunyai saluran pencernaan yang belum bekerja dengan sempurna,

seperti tubuh kurang dalam menyerap lemak dan mencerna protein yang menyebabkan kurangnya cadangan zat gizi dalam tubuh. Apabila kondisi ini diikuti dengan pemberian nutrisi yang tidak mencukupi, bayi sering mengalami infeksi, dan perawatan kesehatan yang kurang baik, maka inilah yang dapat menyebabkan terjadinya stunting.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkup kerja wilayah Puskesmas Kassi-Kassi dengan total sampel sebanyak 251 balita didapatkan balita dengan berat lahir normal yang mengalami stunting sebanyak 80 responden (32%) dan balita dengan berat badan lahir normal yang tidak mengalami stunting sebanyak 133 responden (53%), sedangkan balita dengan berat badan lahir rendah yang mengalami stunting sebanyak 34 responden (13%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 4 responden (2%). Dari data tersebut tampak bahwa jumlah responden yang mengalami stunting memiliki berat badan lahir rendah sebanyak 34 responden (89,4 %) dan memiliki berat badan lahir normal sebanyak 80 responden (37,5 %). Berdasarkan data tersebut balita yang memiliki berat badan lahir rendah memiliki risiko untuk mengalami stunting.

Uji *chi-square* merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* <0,05. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara berat badan lahir dengan kejadian stunting. Penelitian ini sesuai

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adellia Kamilia (2019) di Lampung yang mendapatkan adanya tingkat signifikan hubungan antara berat badan lahir rendah dengan kejadian stunting (Kamilia, 2019). Hal ini didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Beauty Grace Nainggolan dan Monalisa Sitompul (2019) di Bandung Barat yang mendapatkan adanya tingkat signifikan antara hubungan berat badan lahir rendah dengan kejadian stunting pada anak (Nainggola & Sitompul, 2019). Penelitian lain yang dilakukan oleh Yeyen Supriyanto, dkk (2017) di kecamatan Sedayu yang mendapatkan adanya tingkat signifikan hubungan antara berat badan lahir dengan kejadian stunting pada anak usia 6-23 bulan dan memiliki risiko 6 kali lebih besar daripada anak yang memiliki berat badan lahir normal. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Novianti Tysmala Dewi dan Dhedok Widari (2018) di kabupaten Probolinggo yang mendapatkan hubungan antara berat badan lahir rendah baduta dengan stunting (Dewi & Widari, 2018).

3. Hubungan status imunisasi dengan kejadian stunting

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu antigen sehingga apabila di kemudian hari terpapar oleh antigen yang sama maka tubuh telah mengenali antigen tersebut dan mengurangi risiko penyakit yang terjadi. Imunisasi merupakan proses reaksi antara *antibody* dan antigen yang bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan, kecacatan bahkan kematian akibat penyakit yang

dapat dicegah dengan adanya imunisasi (Sukma, et al., 2019). Imunisasi akan memberikan efek kekebalan terhadap tubuh manusia terkhusus pada anak usia dini yang merupakan usia yang rentan untuk terkena suatu penyakit oleh karena itu imunisasi merupakan hal yang sangat penting bagi imunitas anak (Swathma, et al., 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkup kerja wilayah Puskesmas Kassi-Kassi dengan total sampel sebanyak 251 balita didapatkan bahwa balita dengan status imunisasi lengkap yang mengalami stunting sebanyak 68 responden (27%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 123 responden (49%), sedangkan balita dengan status imunisasi tidak lengkap yang mengalami stunting sebanyak 46 responden (18%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 14 responden (6%). Dari data tersebut tampak bahwa jumlah responden yang mengalami stunting memiliki status imunisasi lengkap sebanyak 68 responden (35,6 %) dan memiliki status imunisasi lengkap sebanyak 46 responden (76,6 %). Berdasarkan data tersebut balita yang tidak memiliki status imunisasi lengkap memiliki risiko untuk mengalami stunting.

Uji *chi-square* merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* <0,05. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara status imunisasi dengan kejadian stunting. Penelitian ini sesuai

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dandara Swathma, dkk (2017) di Kendari yang mendapatkan adanya tingkat signifikan balita dengan riwayat imunisasi dasar tidak lengkap mempunyai risiko mengalami stunting 6 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang memiliki imunisasi dasar lengkap (Swathma, et al., 2017). Hal ini didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma Juwita, dkk (2019) di Kabupaten Pidie adanya hubungan yang signifikan antara kelengkapan imunisasi dasar dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Pidie (Sukma, et al., 2019). Penelitian lain yang dilakukan oleh Elpira Asmin dan Mujahidah Rofifah Abdullah (2021) di Ambon yang mendapatkan adanya tingkat signifikan hubungan antara status imunisasi yang tidak lengkap dengan kejadian stunting pada anak usia 9-24 bulan (Asmin & Abdullah, 2021). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Afrinda Graharani Sandra, dkk (2021) di Surakarta yang mendapatkan adanya hubungan antara kelengkapan imunisasi dengan kejadian stunting dengan risiko 3 kali lebih besar daripada anak yang memiliki imunisasi lengkap (Sandra, et al., 2021).

Balita yang tidak melakukan imunisasi sama sekali atau imunisasinya tidak lengkap menyebabkan imunitas balita menjadi lemah dan meningkatkan risiko terjangkitnya suatu penyakit infeksi pada balita tersebut yang menyebabkan mudahnya patogen masuk kedalam tubuh. Apabila hal ini terjadi maka enzim pencernaan akan mengalami gangguan sehingga makanan tidak dapat tercerna dengan

baik dan terjadi gangguan penyerapan gizi yang memperburuk keadaan gizi. Sebagai respon utama tubuh akan menolak makanan yang diberikan oleh ibunya yang disebabkan karena berkurangnya nafsu makan sehingga zat gizi yang masuk kedalam tubuh ikut berkurang. Apabila kondisi ini berlangsung secara terus menerus, maka dapat memberikan dampak akhir berupa gangguan pertumbuhan (Rahmad & Miko, 2017).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aridiyah, dkk (2017) mengatakan bahwa imunisasi yang lengkap belum menjamin balita tersebut terhindar dari suatu penyakit namun dengan melakukan imunisasi diharapkan agar mengurangi risiko balita tersebut untuk terkena suatu penyakit. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi manfaat dan efektivitas dari pemberian imunisasi seperti kualitas vaksin yang diberikan tidak memenuhi standar atau kurang baik. Sehingga balita yang imunisasinya lengkap maupun yang tidak lengkap memiliki peluang yang sama untuk mengalami stunting (Aridiyah, et al., 2017).

4. Hubungan riwayat penyakit infeksi dengan kejadian stunting

a Diare

Diare adalah penyakit infeksi metabolisme yang dampaknya dapat dilihat dengan jangka waktu yang singkat yang ditandai dengan gejala yaitu terjadinya pengeluaran feses/tinja paling sedikit 3 kali dalam satu hari dengan konsistensi feses/tinja yaitu lebih lembek bahkan menjadi cair biasanya disebabkan oleh bakteri

E. Coli yang terkontaminasi di makanan dan air minum atau adanya kontak secara langsung dengan penderita serta kontak langsung dengan hewan yang membawa bakteri tersebut (Sumampouw, 2018).

Nafsu makan pada anak yang menderita penyakit infeksi diare akan menurun sehingga jumlah asupan zat gizi kedalam tubuh akan berkurang yang akan menyebabkan gangguan penyerapan sehingga asupan zat gizi tidak terpenuhi dan terjadi kehilangan zat gizi dalam tubuh yang terjadi secara terus menerus dan berulang. Apabila kondisi ini tidak diimbangi dengan asupan makanan yang sesuai maka hal ini akan mempengaruhi proses pertumbuhan anak (Abidin, et al., 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkup kerja wilayah Puskesmas Kassi-Kassi dengan total sampel sebanyak 251 balita didapatkan bahwa balita dengan riwayat diare yang mengalami stunting sebanyak 28 responden (11%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 19 responden (8%), sedangkan balita yang tidak memiliki riwayat diare yang mengalami stunting sebanyak 86 responden (34%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 118 responden (47%). Dari data tersebut tampak bahwa jumlah responden yang mengalami stunting memiliki riwayat penyakit infeksi diare sebanyak 28 responden (59,5 %) dan tidak memiliki riwayat penyakit infeksi diare sebanyak 86 responden

(42,1 %). Berdasarkan data tersebut balita yang memiliki riwayat penyakit infeksi diare memiliki risiko untuk mengalami stunting.

Uji *chi-square* merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* <0,05. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.023 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara riwayat diare dengan kejadian stunting. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gita Cyntithia (2021) di Lampung yang mendapatkan adanya tingkat signifikan antara balita dengan riwayat penyakit infeksi diare dan mempunyai risiko 3 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang tidak mempunyai riwayat penyakit infeksi diare (Cyintithia, 2021). Hal ini didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Linawati Novikasari, dkk (2021) di wilayah kerja Puskesmas Seputih yang mendapatkan adanya hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit infeksi diare dan mempunyai risiko 5 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang tidak mempunyai riwayat penyakit infeksi diare (Novikasari, et al., 2021). Hal ini didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma Juwita, dkk (2019) di Kabupaten Pidie adanya hubungan yang signifikan antara kelengkapan imunisasi dasar dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Pidie (Sukma, et al., 2019). Penelitian lain yang dilakukan oleh Sri

Harianisa, dkk (2021) di Kabupaten Solok yang mendapatkan adanya tingkat signifikan hubungan antara riwayat penyakit infeksi diare dengan kejadian stunting pada anak usia 6-59 bulan (Harianisa, et al., 2021). Selain itu penelitian yang Rina Hudaya, dkk (2021) di Kabupaten Aceh Tengah yang mendapatkan adanya hubungan riwayat penyakit infeksi diare anak dengan kejadian stunting (Hudaya, et al., 2021).

b Infeksi saluran pernafasan akut

Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah penyakit infeksi yang bersifat akut yang mengenai salah satu atau lebih bagian dari saluran pernafasan mulai dari hidung hingga *alveoli*. ISPA banyak terjadi pada balita karena sistem pertahanan tubuh balita masih dalam tahap perkembangan. Adapun gejala yang dapat ditimbulkan pada balita yang menderita ISPA antara lain batuk, dada terasa sesak, dan nafas pendek serta cepat dalam dua minggu terakhir (Adila, 2021).

Tidak adanya hubungan yang didapatkan pada penelitian ini karena penyakit ISPA yang diderita oleh balita dapat teratasi dengan baik sehingga tidak mempengaruhi asupan nutrisi pada balita selama periode penyakit infeksi tersebut. Selain itu tidak adanya hubungan yang didapatkan pada penelitian ini bukan hanya dipengaruhi oleh frekuensi penyakit infeksi, tetapi juga dipengaruhi oleh durasi dari penyakit infeksi.

Adanya akses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di sekitar lokasi penelitian juga berpotensi untuk menurunkan kerentanan anak terhadap penyakit infeksi. Akses terhadap pelayanan kesehatan dikaitkan dengan penurunan durasi penyakit infeksi jika mencakup manajemen penanganan penyakit infeksi yang baik, seperti meningkatkan skill praktisi kesehatan, sistem rujukan yang efektif dan disertai dengan promosi kesehatan dalam penanganan penyakit infeksi di rumah (Abidin, et al., 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkup kerja wilayah Puskesmas Kassi-Kassi dengan total sampel sebanyak 251 didapatkan bahwa balita dengan riwayat ISPA yang mengalami stunting sebanyak 7 responden (2%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 9 responden (4%), sedangkan balita yang tidak memiliki riwayat ISPA yang mengalami stunting sebanyak 107 responden (43%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 128 responden (51%). Dari data tersebut tampak bahwa jumlah responden yang mengalami stunting memiliki riwayat penyakit ISPA sebanyak 7 responden (43,7 %) dan tidak memiliki riwayat penyakit ISPA sebanyak 107 responden (45,5 %). Berdasarkan data tersebut balita yang memiliki riwayat penyakit ISPA memiliki risiko untuk mengalami stunting.

Uji *chi-square* merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel,

dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika $p\text{-value} < 0,05$. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value}$ 0.551 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara riwayat infeksi saluran nafas akut dengan kejadian stunting. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Abidin, dkk (2021) di Pare-Pare yang mendapatkan tidak terdapat hubungan signifikan antara riwayat penyakit ISPA dengan kejadian stunting di Kota Parepare (Abidin, et al., 2021). Hal ini didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina Swastika Sahitarani (2020) di Kabupaten Bantul yang mendapatkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit stunting tidak berhubungan secara signifikan dengan durasi penyakit ISPA dengan kejadian stunting (Sahitaran, et al., 2020). Penelitian lain yang dilakukan oleh Livia Amelia Halim, dkk (2021) di Kecamatan Tuminting yang mendapatkan tidak adanya tingkat signifikan hubungan bermakna antara riwayat penyakit infeksi ISPA dengan kejadian stunting (Halim, et al., 2021). Selain itu penelitian yang Rina Hudaya, dkk (2021) di Kabupaten Aceh Tengah yang mendapatkan tidak adanya hubungan penyakit ISPA anak dengan kejadian stunting (Hudaya, et al., 2021)

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan kendala dikarenakan penelitian ini dilakukan saat terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan adanya keterbatasan antara peneliti dengan responden yang menyebabkan adanya keterbatasan kunjungan secara langsung. Karena masih dalam pandemi COVID-19 jadwal posyandu sampai saat penelitian telah dilakukan, belum dilaksanakan sehingga hal ini mengharuskan peneliti untuk melakukan penelitian secara *door to door* di lingkup kerja wilayah Puskesmas Kassi-Kassi. Saat melakukan penelitian secara *door to door* di lingkup kerja wilayah Puskesmas Kassi-Kassi peneliti membutuhkan kader dari puskesmas untuk menemani peneliti melakukan penelitian, namun beberapa dari mereka memiliki kesibukan pribadi sehingga tidak bisa menemani untuk melakukan penelitian. Selain itu data yang menjadi patokan peneliti di Puskesmas Kassi-Kassi tidak diperbaharui setiap bulannya sehingga ada beberapa balita yang sudah tamat maupun yang pindah domisili masih tercatat dalam data. Hasil dari penelitian ini bergantung pada kejujuran tiap responden karena menggunakan instrumen berupa kuesioner. Adapun kendala dalam penelitian ini yaitu waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian sangat terbatas oleh jadwal akademik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan yang antara BBL dengan kejadian stunting pada anak usia 0-59 bulan di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Terdapat hubungan yang antara status imunisasi dengan kejadian stunting pada anak usia 0-59 bulan di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Terdapat hubungan yang antara riwayat penyakit infeksi diare dengan kejadian stunting pada anak usia 0-59 bulan di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Tidak terdapat hubungan yang antara riwayat penyakit ISPA dengan kejadian stunting pada anak usia 0-59 bulan di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Sebanyak 114 anak (45,4%) memiliki status gizi stunting dan 137 anak (54,6%) memiliki status gizi normal pada usia 0-59 bulan yang berada di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Sebanyak 38 anak (15,1%) memiliki berat badan lahir rendah dan sebanyak 213 anak (84,9%) memiliki berat badan normal pada usia 0-

59 bulan yang berada di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Sebanyak 60 anak (23,9%) memiliki status imunisasi tidak lengkap sesuai dengan usianya dan sebanyak 191 anak (76,1%) memiliki status imunisasi sesuai dengan usianya pada usia 0-59 bulan yang berada di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Sebanyak 47 responden (18,7%) menderita riwayat penyakit infeksi yaitu diare dalam kurun waktu 3 bulan sedangkan balita tidak memiliki riwayat penyakit infeksi yaitu diare dalam kurun waktu 3 bulan sebanyak 204 responden (81,3%).
9. Sebanyak 16 responden (6,4%) menderita riwayat penyakit infeksi yaitu ISPA dalam kurun waktu 3 bulan sedangkan balita tidak memiliki riwayat penyakit infeksi yaitu ISPA dalam kurun waktu 3 bulan sebanyak 235 responden (93,6%).

B. Saran

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat mengembangkan pola berpikir yang ilmiah serta berpikir kritis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama studi serta menamban pengetahuan dan pengalaman melakukan penelitian di bidang kesehatan. Diharapkan juga agar peneliti selanjutnya terkhusus dibidang ini, agar memiliki rancangan dengan melihat beberapa keterbatasan yang dapat menghambat dalam penelitian ini.

2. Bagi lokasi penelitian saya

Diharapkan agar rutin dalam memperbaharui jumlah balita di setiap bulannya dan memberikan pembelajaran bagi kader dalam mengukur tinggi badan dengan baik dan benar serta memberikan penyuluhan tentang status gizi pada balita.



DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, 2019. . Jakarta Pusat: Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat .
- Sulistianingsih, A. & Madi Yanti, D. A., 2016. Kurangnya Asupan Makan Sebagai Penyebab Kejadian Balita Pendek (Stunting). *Jurnal Dunia Kesehatan*, pp. 5(1), 77123.
- Setiawan, E., Rizanda, M. & Masrul, 2018. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Andalas*, pp. 7.2 : 275-284.
- Khatimah, H., Abbas, H. H., Mahmud, N. U. & Sididi, M., 2020. Karakteristik Kejadian Stunting di Wilayah Kecamatan Mariso.". *Window of Public Health Journal*, pp. 141-147.
- Megantari, S. H., Abbas, H. H. & Ikhtiar, M., 2020. Karakteristik Determinan Kejadian Stunting pada Anak Balita Usia 24-59 Bulan di Kawasan Kumuh Kecamatan Bontoala Kota Makassar.". *Window of Public Health Journal*, pp. 207-219.
- Sukmawati, Hendrayati, Chaerunnimah & Nurhumaira, 2018. Status gizi ibu saat hamil, berat badan lahir bayi dengan stunting pada balita usia 06-36 bulan di Puskesmas Bontoa.". *Media Gizi Pangan 25.1*, pp. 18-24.
- Hardani, M. & Zaurida, R., 2019. Penatalaksanaan Gizi Buruk dan Stunting pada Balita Usia 14 Bulan dengan Pendekatan Kedokteran Keluarga. *Jurnal Medula*, p. 566.
- Sutriyawan, A., Kurnaiwati, R. D., Hanjani, R. & Rahayu, S., 2020. Prevalensi Stunting dan Hubungannya dengan Sosial Ekonomi. *Jurnal Kesehatan*, p. 353.

- Setiawan, E., Machmud, R. & Masrul, 2018. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Andalas*, pp. 276-278.
- Apriluana, G. & Fikawati, S., 2018. Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, pp. 249-252.
- Namangboling, A. D., Murti, B. & Sulaeman, E. S., 2017. Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi dan Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Anak Usia 7-12 Bulan di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. *Sari Pediatri*, pp. 92-95.
- Haris, A., Fitri, A. & Kalsum, U., 2019. Determinan Kejadian Stunting dan Underweight pada Balita Suku Anak di Desa Nyogan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019. *Jurnal Kesmas Jambi*, pp. 43-50.
- Maulidah, W. B., Rohmawati, N. & Sulistiyani, 2019. Faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. *Ilmu Gizi Indonesia*, pp. 89-100.
- Alba, A. D., Suntara, D. A. & Siska, D., 2021. Hubungan Riwayat BBLR Dengan Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sekupang Kota Batam Tahun 2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, pp. 2771-2773.
- Yuliana, W. & Bawon Nul Hakim, 2019. *Stunting Dengan Melibatkan Keluarga*. Sulawesi Selatan: Yayasan Amar Cendikia Indonesia.
- Utami, N. H. & Mubasyiroh, R., 2019. Masalah Gizi Balita dan Hubungannya dengan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. *The Journal of Nutrition and Food Research*, pp. 42(1), 1-10.

- Rahayu, A., F. Y., A. O. P. & L. A., 2018. *Study Giude-Stunting dan Upaya Pencegahannya Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*. Edisi Pertama penyunt. Yogyakarta: CV Mine.
- Rachmawati, S. D., W. B. & A., 2019. *Pedoman Praktis Imunisasi Pada Anak*. Malang: UB Press.
- Ranuh, I. N. G. et al., 2014. *Pedoman Imunisasi Di Indonesia*. Jakarta: IDAI.
- Mulyani, N. S. & M. R., 2013. *Imunisasi untuk Anak*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Hadi, H., 2017. *Prosiding: Stunting dalam Perspektif Islam dan Muhammadiyah*. s.l.:s.n.
- Hafid, Hakim, M. S., Andriyani, A. & Kartika, 2013. *Imunisasi dalam Pandangan Syariat*. Ketiga penyunt. Yogyakarta: Pustaka Muslim.
- Mulyani, N. S. & Rinawati, M., 2013. *Imunisasi Untuk Anak*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Dewi, P. D. P. K. & Megaputri, P. S., 2021. *Askeb Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah*. Sleman: CV Budi Utama.
- Hardianti, D. N., Mulyati, E., Ratnaningsih, E. & Sofiati, F., 2014. *Buku Ajar Imunisasi*. Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Adriani, M. & Wirjatman, B., 2016. *Peranan gizi dalam siklus kehidupan*. Jakarta: Kencana.
- Aridiyah, F., Rohmawati, N. & Ririanty, M., 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan. *E-Journal Pustaka Kesehatan*, Volume 3.
- Indrawani, Y. M., 2014. *Penyakit Kurang Gizi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Anisa, P., 2012. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 25-60 Bulan Di Kelurahan Kalibiru Depok Tahun 2012..* Jakarta: Universitas Indonesia.
- Supariasa, D. I., Bakri, B. & Fajar, I., 2019. *Penilaian Status Gizi*. 2 penyunt. Jakarta: EGC.
- Kurniasih, 2012. *Sehat dan Buger berkat gizi seimbang..* Jakarta: PT Gramedia.
- Novard, M. F. A., Suharti, N. & Rasyid, R., 2019. Gambaran bakteri penyebab infeksi pada anak berdasarkan jenis spesimen dan pola resistensinya di laboratorium RSUP DR. M. Djamil Padang tahun 2014-2016. *Jurnal Kesehatan Andalas*, Volume 8.
- Himawati, H. E. & Fitria, L., 2020. Hubungan Infeksi Saluran Pernapasan Atas dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia di Bawah 5 Tahun di Sampang. *The Indonesian Journal of Public Health*, Volume 15.
- Natalia, L. & Evitasari, D., 2020. Perbedaan Pemberian ASI Eksklusif, Status Sosial Ekonomi, Riwayat Penyakit ISPA Pada Balita Stunting Dan Non Stunting. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 5.
- Utami, N. & Luthfiana, N., 2016. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kejadian Diare pada Anak. *Jurnal Majority*, Volume 5.
- Angkat, A. H., 2018. Penyakit Infeksi dan Praktek Pemberian MP-ASI Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak Usia 12-36 Bulan di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.". *Jurnal Dunia Gizi*, Volume 1.
- Mardalena, I., 2017. *Dasar-Dasar ilmu Gizi Dalam Keperawatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Hartiyanti, Y. & Triyani, 2014. *Penilaian Status Gizi. Dalam Gizi dan kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

- Mahayana, Sresti, S. A., Chundrayetti, E. & Yulistini, 2017. Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di RSUP Dr. M. Djamil Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, Volume 4.
- Gomella, T., Cunningham, M. & Eyal, F., 2013. *neanotology Managemen Procedures, On Cell Problems, Diseases, and Drugs..* s.l.:Medicine and Health Science Book.
- Nasution, D., Nurdiati, D. S. & Huri, E., 2016. Berat badan lahir rendah (BBLR) dengan kejadian stunting pada anak usia 6-24 bulan. *Jurnal gizi klinik Indonesia*, Volume 11.
- Kusuma, R. M. & Hasanah, R. A., 2018. Antropometri Pengukuran status gizi anak usia 24-60 bulan di Kelurahan Bener Kota Yogyakarta. *Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, Volume 13.
- Permana, G. W. & Wijaya, D. S., 2020. Determinan Stunting. *Journal of Holistic and Traditional Medicine*, Volume 5.
- Winowatan, G., Malonda, N. S. & Punuh, M. I., 2017. Hubungan antara berat badan lahir anak dengan kejadian stunting pada anak batita di wilayah kerja puskesmas sonder kabupaten Minahasa. *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*.
- Prawirohardjo, S., 2014. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Kalalo, N. D., Pateda, V. & Salendu, P., 2019. Perbandingan penggunaan metode penyuluhan dengan dan tanpa media leaflet terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang tumbuh kembang balita. *Doctoral dissertation, Faculty of Medicine*.
- Yulivantina, E. V., Mufdlilah & Kurniawati, H. F., 2021. Pelaksanaan Skrining Prakonsepsi pada Calon Pengantin Perempuan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Volume 8.

- Halimah, N. & Suintin, 2020. Proyeksi dan Pemetaan Wilayah Sebaran Balita Stunting Di Kota Makassar Berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG). *PROMOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 10.
- Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021. *Jumlah Balita Stunting 2021*. Makassar: Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Jalaluddin, S., Fardillah, A. & Larasati, I., 2019. Laporan Kasus : Dilemma Tumbuh kejar Nutrisi Pada Anak Dengan Penyakit Jantung Bawaan. *Alami Journal*, Volume 3.
- Saharuddin, 2017. Perbandingan Derajat Status Gizi Anak berdasarkan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif. *Alami Journal*, Volume 1.
- Lestari, A. S. I., Rahim, R. & Sakinah, A. I., 2020. HUBUNGAN SANITASI FISIK RUMAH DENGAN KEJADIAN ISPA PADA BALITA DI TPA TAMANGAPPA ANTANG MAKASSAR TAHUN 2020. *Alami Journal*, Volume 5.
- Kamilia, A., 2019. Berat Badan Lahir Rendah dengan Kejadian Stunting pada Anak. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Volume 10.
- Nainggola, B. G. & Sitompul, M., 2019. HUBUNGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA 1-3 TAHUN. *Journal Nutrix*, Volume 3.
- Swathma, D., Lestari, H. & Ardiansyah, R. T., 2017. ANALISIS FAKTOR RISIKO BBLR, PANJANG BADAN BAYI SAAT LAHIR DAN RIWAYAT IMUNISASI DASAR TERHADAP KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 12-36 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KANDAI KOTA KENDARI TAHUN 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, Volume 1.

- Sukma, J. et al., 2019. Hubungan Jumlah Pendapatan Keluarga dan Kelengkapan Imunisasi Dasar dengan Kejadian Stunting pada Balita di Kabupaten Pidie. *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, Volume 2.
- Rahmad, A. H. A. & Miko, A., 2017. KAJIAN STUNTINGPADA ANAK BALITA BERDASARKAN POLA ASUH DAN PENDAPATAN KELUARGA DI KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Kesmas Indonesia*, Volume 8.
- Cyintithia, G., 2021. HUBUNGAN RIWAYAT PENYAKIT DIARE DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA. *Jurnal Medika Utama*, Volume 3.
- Novikasari, L., Subroto, T. & Setiawati, 2021. HUBUNGAN RIWAYAT PENYAKIT INFEKSI DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA 12-59 BULAN. *JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)*, Volume 7.
- Sumampouw, O. J., 2018. Uji Sensitivitas Antibiotik Terhadap Bakteri Escherichia Coli Penyebab Diare Balita Di Kota Manado.
- Abidin, Wahyuni, S. & Sari, R. W., 2021. "Hubungan Sanitasi Lingkungan Dan Riwayat Penyakit Infeksi Dengan Kejadian Stunting Di Kota Parepare.. *ARKESMAS (Arsip Kesehatan Masyarakat)*, Volume 6.
- Sahitaran, A. S., Paramashanti, B. A. & Sulistiyawati, 2020. KAITAN STUNTING DENGAN FREKUENSI DAN DURASI PENYAKIT INFEKSI PADA ANAK USIA 24-59 BULAN DI KECAMATAN SEDAYU, KABUPATEN BANTUL. *Journal Of Nutrition Collage*, Volume 9.
- Adila, N. T. H., 2021. Hubungan Infeksi Saluran Pernafasan Akut dengan Kejadian Stunting. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Volume 10.

- Ernawati, A., 2020. Gambaran Penyebab Balita Stunting di Desa Lokus Stunting Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, Volume 16.
- Dewi, N. T. & Widari, D., 2018. Hubungan Berat Badan Lahir Rendah dan Penyakit Infeksi dengan Kejadian Stunting pada Baduta di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. *Amerta Nutrition*, Volume 2.
- Asmin, E. & Abdullah, M. R., 2021. ASI Eksklusif dan Imunisasi Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 9-24 Bulan di Puskesmas Rumah Tiga, Ambon. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*.
- Sandra, A. G., Dasuki, M. S., Agustina, T. & Lestari, N., 2021. Asi Tidak Eksklusif Dan Imunisasi Tidak Lengkap Sebagai Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita. *INVOLUSI Jurnal Ilmu Kebidanan*.
- Halim, L. A., Marouw, S. M. & Manoppo, J. I. C., 2021. Hubungan Faktor-faktor Risiko dengan Stunting pada Anak Usia 3-5 Tahun di TK/PAUD Kecamatan Tuminting. *Jurnal Medik dan Rehabilitasi*, Volume 1.
- Harianisa, S., Yani, I. E., Andrafikar & Franchfi, 2021. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI NAGARI TALANG BABUNGO, KABUPATEN SOLOK. *Prosiding Seminar Nasional Stikes Syedza Sainika*, Volume 1.
- Hudaya, R., Lubis, R. & Sudaryati, E., 2021. HUBUNGAN RIWAYAT PENYAKIT INFEKSI DAN PENGASUHAN KELUARGA DENGAN KEJADIAN STUNTING ANAK TK DI KABUPATEN ACEH TENGAH. *Jurnal Health Sains*., Volume 2.

The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a stylized green emblem. It features a central yellow shield with Arabic calligraphy, surrounded by green geometric shapes that form a larger, abstract architectural or floral motif.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1 Inform Consent

LEMBAR PERSETUJUAN INFORM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Alamat :
Agama :
Pekerjaan :

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari manfaat dari penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul :

**“Hubungan Faktor Anak dengan Kejadian Stunting pada Balita di
Puskesmas Kassi-Kassi”**

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini dengan catatan bila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Mengetahui,

Yang menyatakan

Penanggung jawab penelitian

Responden Penelitian

Lampiran 2 Kuesioner Riwayat Penyakit Infeksi

Petunjuk : dibawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang menggambarkan kondisi kesehatan balita selama 3 bulan terakhir. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan kondisi balita ibu.

1. Apakah anak ibu menderita diare/BAB encer dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ?

- a. Ya, berapa kali dalam sehari dan berapa lama.
- b. Tidak

Jawaban : Jika menjawab a dengan frekuensi diare/BAB encer ≥ 3 kali/hari selama minimal 2 hari, maka menderita diare/BAB encer dalam kurun waktu tiga bulan terakhir dan jika menjawab b, maka tidak menderita diare/BAB encer dalam kurun waktu 3 bulan terakhir.

2. Berapa kali dalam kurun waktu tiga bulan terakhir anak ibu terkena diare/BAB encer?

- a. < 3 kali
- b. ≥ 3 kali

Jawaban : Jika menjawab a, maka tidak menderita diare/BAB encer dan jika menjawab b, maka menderita diare/BAB encer.

3. Apakah diare/BAB encer yang terjadi muncul setiap bulan dan berturut-turut dalam kurun waktu 3 bulan terakhir?

- a. Ya
- b. Tidak

Jawaban : Jika menjawab a, maka termasuk kategori menderita diare/BAB encer dan jika menjawab b, maka termasuk kategori tidak menderita diare/BAB encer.

4. Apakah anak ibu menderita gejala batuk dalam kurun waktu tiga bulan terakhir?

- a. Ya, bagaimana gejala yang terjadi dan berapa lama?
- b. Tidak

Jawaban : Jika menjawab iya dengan disertai salah satu atau lebih gejala seperti pilek, demam atau sesak nafas ≤ 2 minggu maka menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

5. Berapa kali dalam kurun waktu tiga bulan terakhir anak ibu menderita infeksi saluran pernafasan Akut (ISPA)?
 - a. < 3 kali
 - b. ≥ 3 kali

Jawaban : Jika menjawab a, maka tidak menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan jika menjawab b, maka menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

6. Apakah gejala infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang terjadi muncul setiap bulan dan berturut-turut dalam kurun waktu 3 bulan terakhir?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jawaban : Jika menjawab a, maka termasuk kategori menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan jika menjawab b, maka termasuk kategori tidak menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA)

Lampiran 3 Persuratan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I J. J. Sultan Alauddin No.63 Makassar
Kampus II J. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : B-2040/Un.06.1/FKIK/PP.09/6/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Gowa, 09 Juni 2021

Yth
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Tiara Putri Ramli
NIM : 70600118041
Jurusan : Pendidikan Dokter
Judul : Hubungan Faktor Anak Dengan Kejadian Stunting Pada Balita
Data : Stunting Dan Populasi Balita

Maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut dapat diberi izin untuk pengambilan data.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gomy Nastitly Handayani

ALAUDDIN
MAKASSAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I J. Sultan Alauddin No.63 Makassar
Kampus II J. H.M. Yasin Limpo No.35 Rontang Pulang-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : B-3638/Un.06.1-FKIK/PP.09/10/2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Pengajuan Kode Etik**

Gowa, 04 Oktober 2021

Yth.

Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar

di-

Tempat

Assalamu alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penelitian mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan/izin kode etik kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Tiara Putri Ramli
NIM : 70600118041
Program Studi : Pendidikan Dokter
Judul Penelitian : Hubungan Faktor Anak Dengan Kejadian Stunting Pada Balita
Di Puskesmas Kassi-Kassi
Dosen Pembimbing : 1. dr. Darmawansyih, M.Kes
2. dr. Andi Alifia Ayu Delima, M.Kes

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam



Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nasrity Handayany



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.E.036/KEPK/FKIK/XI/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Tiara Putri Ramli
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Hubungan Faktor Anak dengan Kejadian Stunting pada Balita di Puskesmas Kassi-Kassi "

" Relationship of Child Factors with Stunting Incidence in Toddlers at Kassi-Kassi Public Health Center"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risk, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2022.

This declaration of ethics applies during the period November 15, 2021 until November 15, 2022.

November 15, 2021
Chairperson.

DR. Dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: J. Sultan Alauddin No.63 Makassar
Kampus II: J. H.M. Yasin Limpo No.26 Homang Palang-Uowa Telp. (0411) 941979 Fax (0411) 8221400

Nomor : B- 3678/Un.06/FKIK/PP.00.9/11/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian** Gowa, 22 November 2021

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Tiara Putri Ramli
N I M : 70600118041
Fakultas/Jurusan : Pendidikan Dokter
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Kompleks Citra Persada Indah Blok E.6

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Hubungan Faktor Anak dengan Kejadian Stunting di Puskesmas Kassi-Kassi".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. dr. Darmawansyih, M.Kes
2. dr. Andi Alifia Ayu Delima, M.Kes

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Puskesmas Kassi-Kassi, terhitung mulai Oktober 2021 s/d Desember 2021.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan,

Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 23669/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-367B/FKIK/PP.00.9/11/2021 tanggal 22 November 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **TIARA PUTRI RAMLI**
Nomor Pokok : 70600118041
Program Studi : **Pend. Dokter**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

*** HUBUNGAN FAKTOR ANAK DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI PUSKESMAS KASSI-KASSI ***

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 22 November s/d 24 Desember 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 24 November 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringkat

SMP/PTSP 24/11/2021



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email: kesbang@makassar.go.id Home page: <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 25 November 2021

Kepada

**Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR**

**Di –
MAKASSAR**

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 670/1144 -B/EK/SP/VI/2021

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor **23669/S.01/PTSP/2021**, Tanggal 24 November 2021 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

- Nama** : **TIARA PUTRI RAMLI**
NIM / Jurusan : 70600118041 / Pend. Dokter
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin
Tanggal pelaksanaan : 25 November s/d 24 Desember 2021
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : J. H. M. Yasin Limpo No. 35, Samata Gowa
Judul : **"HUBUNGAN FAKTOR ANAK DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI PUSKESMAS KASSI-KASSI"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolsms@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.

u.b.
SEKRETARIS.

DR. HARI S.I.P., S.H., M.H., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat II/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala UH/Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip

Lampiran 2 Data Penelitian

NAMA	JENIS KELAMIN	TTL	USIA	BBL	IMUNISASI	TB	RPI DIARE	RPI ISPA	DIAGNOSIS
Muh adam al yusuf	Laki-Laki	23/10/17	49	3200	Lengkap	93	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Nur bilqis	Perempuan	26/03/17	57	3500	Lengkap	96	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Ali	Laki-Laki	23/05/20	18	3400	Lengkap	77	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Irmawati	Perempuan	01/02/21	10	3200	Lengkap	67	Tidak	Tidak	Stunting
Joshua	Laki-Laki	14/04/19	19	2700	Lengkap	78	Tidak	Tidak	Stunting
Rania	Perempuan	15/06/17	54	3100	Lengkap	94	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Ahmad Al-Qarni	Laki-Laki	11/04/20	18	3100	Tidak Lengkap	82	Ya	ya	Tidak Stunting
Fira	Perempuan	06/04/20	18	2800	Lengkap	75	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Bilqis aprilia	Perempuan	16/04/18	42	2100	Lengkap	93	Tidak	Tidak	Stunting
Kina nataraska fadli	Laki-Laki	07/06/20	18	3600	Lengkap	81	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Sofia	Perempuan	16/06/21	6	2800	Lengkap	65	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Katrti	Perempuan	13/04/20	20	3300	Lengkap	82	Ya	Ya	Tidak Stunting
Muh ehsan	Laki-Laki	16/09/20	17	3000	Tidak Lengkap	51	Ya	Ya	Stunting
Ainun	Perempuan	05/05/17	55	3100	Tidak Lengkap	90	Tidak	Tidak	Stunting
Muh al qadri	Laki-Laki	14/06/20	16	2900	Tidak Lengkap	75	Tidak	Tidak	Stunting
Aisyah	Perempuan	06/11/18	37	3200	Tidak Lengkap	81	Tidak	Tidak	Stunting

Aafiah al mahirah	Perempuan	10/06/21	6	2800	Lengkap	62	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Hafiz	Laki-Laki	04/06/19	30	3500	Tidak Lengkap	87	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Adiba	Perempuan	06/11/18	37	3400	Lengkap	95	Tidak	Ya	Tidak Stunting
Keneth	Laki-Laki	18/10/19	26	3250	Lengkap	85	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Muhammad afif ahwal ismail	Laki-Laki	26/01/17	58	3100	Lengkap	101	Tidak	Tidak	Stunting
Kinara	Perempuan	23/01/19	35	3000	Tidak Lengkap	91	Ya	Tidak	Stunting
Ince nurhasirah akbar	Perempuan	01/01/20	23	3500	Lengkap	95	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Aura	Perempuan	20/11/19	36	3000	Lengkap	85	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Siti syakila	Perempuan	27/03/21	9	3100	Lengkap	69	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Ahmad	Laki-Laki	07/07/19	28	2300	Tidak Lengkap	73	Ya	Tidak	Stunting
Aqivah	Perempuan	08/04/20	20	3100	Lengkap	84,5	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Aira	Perempuan	17/01/20	23	2800	Lengkap	85	Tidak	Tidak	Stunting
Sofia	Perempuan	16/02/21	10	2500	Lengkap	71	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Erlita arsyifa aprilia	Perempuan	29/04/17	55	2400	Lengkap	96	Tidak	Tidak	Stunting
Alfarizki	Laki-Laki	24/05/20	18	3000	Tidak Lengkap	80	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Syahwa	Perempuan	22/02/21	9	3400	Lengkap	65	Tidak	Tidak	Stunting
Narel	Laki-Laki	04/03/21	9	3200	Lengkap	77	Tidak	Ya	Tidak Stunting

ALAUDDIN
MAKASSAR

Muhammad surqam	Laki-Laki	17/05/20	18	3100	Tidak Lengkap	76,5	Tidak	Tidak	Stunting
Aqilah katifah	Perempuan	30/09/17	39	3600	Lengkap	93	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Putri	Perempuan	02/05/20	18	3000	Tidak Lengkap	74	Ya	Tidak	Stunting
Areta	Laki-Laki	28/02/21	9	2900	Lengkap	68	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Muhammad fatir	Laki-Laki	21/03/20	21	3000	Lengkap	79	Ya	Tidak	Stunting
Allbiru	Laki-Laki	29/05/20	18	3200	Tidak Lengkap	72	Ya	Tidak	Stunting
Muh. Raja	Laki-Laki	08/03/21	9	3600	Lengkap	72	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Fadlan	Laki-Laki	14/03/21	9	3350	Lengkap	66	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Atta rauf	Laki-Laki	07/01/21	11	3400	Lengkap	69,5	Ya	Ya	Stunting
Nurul suafira	Perempuan	21/10/17	50	3200	Lengkap	101	Ya	Ya	Tidak Stunting
Ikbal	Laki-Laki	23/09/17	50	3650	Lengkap	107	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Muhammad hasan	Laki-Laki	30/06/19	32	3400	Tidak Lengkap	83	Ya	Tidak	Stunting
Ali	Laki-Laki	30/01/18	46	2300	Lengkap	95	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Hafiz	Laki-Laki	21/08/19	28	2200	Lengkap	85	Tidak	Tidak	Stunting
Jingga	Perempuan	05/10/17	50	3000	Lengkap	106	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Siti hasnah	Perempuan	16/06/17	54	2600	Lengkap	104	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Azkaira queenbee	Perempuan	06/12/18	36	3200	Tidak Lengkap	96	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Yazirah	Perempuan	06/07/18	41	3000	Lengkap	92	Tidak	Tidak	Tidak Stunting

Asraf	Laki-Laki	02/08/20	16	3100	Tidak Lengkap	75	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Muh. Arham	Laki-Laki	01/09/19	27	2300	Lengkap	87	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Muh aqsa	Laki-Laki	07/06/19	30	2900	Tidak Lengkap	87	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Khodijah	Perempuan	14/09/19	27	3200	Lengkap	89	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Faizan jasad	Laki-Laki	18/09/19	27	3000	Lengkap	84	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Muh zainal	Laki-Laki	21/01/21	11	3200	Lengkap	71	Tidak	Ya	Tidak Stunting
Annisa putri	Perempuan	20/12/16	59	2300	Tidak Lengkap	98	Tidak	Tidak	Stunting
Magfirah	Perempuan	08/10/20	14	3300	Lengkap	78	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
faliqah	Perempuan	16/01/19	36	2900	Lengkap	95	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Ahmad khalid	Laki-Laki	29/11/20	12	3700	Lengkap	78	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Atiqah basyirah	Perempuan	30/05/18	41	3500	Lengkap	98	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Alesya	Perempuan	30/11/20	12	3000	Lengkap	71	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Arumi	Perempuan	07/08/19	28	3000	Tidak Lengkap	80,5	Tidak	Tidak	Stunting
AnNasya	Perempuan	19/12/17	48	2700	Lengkap	94,5	Tidak	Tidak	Stunting
Gavrel elgio	Laki-Laki	22/08/19	28	2900	Tidak Lengkap	83	Ya	Tidak	Stunting
Mika	Perempuan	26/07/19	29	2400	Lengkap	84	Tidak	Tidak	Stunting
Davia	Perempuan	10/04/18	44	2800	Lengkap	92	Tidak	Tidak	Tidak Stunting

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Andi muhammad aidan	Laki-Laki	19/08/19	28	3000	Lengkap	84	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Andi nur ainun	Perempuan	05/08/17	52	2000	Lengkap	95	Ya	Tidak	Stunting
Muh. Zikki	Laki-Laki	09/05/18	43	3000	Lengkap	94	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Wa ode asura inayah	Perempuan	30/03/19	33	3100	Lengkap	88	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Muhammad ardhan	Laki-Laki	13/12/19	24	2900	Tidak Lengkap	78	Tidak	Tidak	Stunting
Rizka auliya yuniarti	Perempuan	29/06/20	17	3100	Lengkap	72	Tidak	Tidak	Stunting
Muh. Alwi	Laki-Laki	12/01/20	23	2800	Lengkap	81	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Aura	Perempuan	11/02/20	22	2900	Lengkap	75	Tidak	Tidak	Stunting
Muh rasya	Laki-Laki	11/05/19	31	2900	Lengkap	85	Tidak	Tidak	Stunting
Muh rizki	Laki-Laki	22/05/18	43	3000	Lengkap	91	Tidak	Tidak	Stunting
Khalifa muthmainnah	Perempuan	23/06/21	6	3990	Tidak Lengkap	65	Tidak	Ya	Stunting
Inces	Perempuan	28/05/21	7	2950	Tidak Lengkap	59,5	Tidak	Tidak	Stunting
Putra wibowo	Laki-Laki	21/06/21	6	2200	Tidak Lengkap	61	Ya	Tidak	Stunting
Syaki	Laki-Laki	25/05/21	7	3000	Lengkap	70	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Muh. Khalid Ramah	Laki-Laki	01/05/20	29	2495	Lengkap	73	Ya	Tidak	Stunting
Safa	Perempuan	12/01/18	47	2800	Lengkap	93	Tidak	Tidak	Stunting
Kinanti	Perempuan	15/12/20	24	3300	Lengkap	78	Ya	Tidak	Stunting

ALAUDDIN
MAKASSAR

Cantika	Perempuan	01/07/20	17	2500	Lengkap	77	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Natasya Tri	Perempuan	18/05/20	19	2200	Lengkap	75	Tidak	Tidak	Stunting
Al gazali	Laki-Laki	10/05/20	19	3400	Tidak Lengkap	71	Tidak	Tidak	Stunting
Divancha	Perempuan	19/07/20	17	2000	Lengkap	73	Tidak	Tidak	Stunting
Haikal	Laki-Laki	11/11/19	25	3100	Tidak Lengkap	80	Tidak	Tidak	Stunting
Nur almahirah	Perempuan	12/02/21	10	2800	Lengkap	66	Tidak	Tidak	Stunting
Risqiana	Perempuan	08/10/20	14	2400	Lengkap	70	Ya	Tidak	Stunting
Hanan	Laki-Laki	29/06/20	32	2200	Lengkap	80	Tidak	Tidak	Stunting
Khabir	Laki-Laki	25/08/19	30	2800	Tidak Lengkap	85	Tidak	Tidak	Stunting
Suci ramdani	Perempuan	19/05/17	55	2500	Tidak Lengkap	89,5	Tidak	Tidak	Stunting
Muh. Alfajar	Laki-Laki	23/03/17	56	2600	Tidak Lengkap	93	Tidak	Ya	Stunting
Aqilah afifah	Perempuan	14/07/19	29	2800	Tidak Lengkap	80	Tidak	Tidak	Stunting
Nasha	Perempuan	07/09/20	15	3600	Lengkap	76	Ya	Ya	Tidak Stunting
Andika pratama	Laki-Laki	20/03/18	45	2500	Tidak Lengkap	86	Ya	Ya	Stunting
Muhammad Wandu	Laki-Laki	09/03/21	9	3800	tidak pernah	67	Ya	Ya	Stunting
Inayah	Perempuan	02/03/21	9	2400	Lengkap	66	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Ghania	Perempuan	30/07/19	29	3100	Lengkap	89	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Kanza	Perempuan	03/03/20	21	2990	Lengkap	86	Tidak	Tidak	Tidak Stunting

Maulidya	Perempuan	14/11/19	25	3000	Lengkap	80	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
		03/03/20	33	2999	Lengkap	85	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Muh abdul rahman	Laki-Laki	03/08/20	18	3050	Tidak Lengkap	74	Ya	Tidak	Stunting
Al fatih	Laki-Laki	02/05/21	7	3200	Tidak Lengkap	70	Ya	Ya	Tidak Stunting
Muh fahrin	Laki-Laki	27/06/18	42	2400	Lengkap	82	Tidak	Tidak	Stunting
Akram	Laki-Laki	27/02/19	34	3200	Tidak Lengkap	79	Ya	Tidak	Stunting
Aqilah	Perempuan	23/04/17	56	2500	Tidak Lengkap	96	Tidak	Tidak	Stunting
Muh Jinan	Laki-Laki	30/08/19	31	3250	Lengkap	83	Ya	Tidak	Stunting
Azzahra	Perempuan	26/04/19	32	2100	Lengkap	84	Tidak	Tidak	Stunting
Abizar	Laki-Laki	20/03/17	56	3300	Lengkap	98	Tidak	Tidak	Stunting
Aqilah savana	Perempuan	12/04/18	44	3000	Tidak Lengkap	95	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Muh. Zaidan	Laki-Laki	08/11/19	25	3300	Tidak Lengkap	81	Tidak	Tidak	Stunting
Akmar	Laki-Laki	02/12/20	12	4000	Lengkap	76	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Muh fatir fadli	Laki-Laki	21/03/20	21	3000	Lengkap	85	Ya	Tidak	Stunting
Nurul fairuz	Laki-Laki	25/11/17	49	2250	Lengkap	93	Tidak	Tidak	Stunting
Andi azkia rezki	Perempuan	28/08/20	15	2100	Lengkap	73,5	Tidak	Tidak	Stunting
Muh azka ibrahim	Laki-Laki	13/10/18	38	3100	Tidak Lengkap	95	Tidak	Tidak	Stunting
Raivan	Laki-Laki	10/07/18	41	3000	Lengkap	88	Tidak	Tidak	Stunting

ALAUDDIN
MAKASSAR

Fikri	Laki-Laki	27/11/17	49	3300	Lengkap	101	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Safia humairah	Perempuan	23/04/20	20	2100	Lengkap	71	Ya	Tidak	Stunting
Al fatih mulya	Laki-Laki	20/02/20	22	3400	Tidak Lengkap	79	Ya	Tidak	Stunting
Siti aisyah	Perempuan	07/04/19	32	2900	Lengkap	96	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Sunandar	Laki-Laki	27/02/20	22	3300	Lengkap	83	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Sulfatir	Laki-Laki	20/11/18	37	3000	Lengkap	85	Ya	Tidak	Stunting
Safitri	Perempuan	02/06/19	30	2400	Lengkap	83	Ya	Tidak	Stunting
Sunarti	Perempuan	05/09/17	51	3000	Lengkap	99	Ya	Ya	Tidak Stunting
A. Nur Humaera Qaula	Perempuan	18/07/18	41	2790	Lengkap	96	Tidak	Tidak	Stunting
M. Qais	Laki-Laki	10/09/19	27	2650	Lengkap	83	Tidak	Tidak	Stunting
Raesyah	Perempuan	10/07/17	53	2750	Lengkap	92	Tidak	Tidak	Stunting
Aura Auriska	Perempuan	15/01/19	35	3000	Lengkap	85	Tidak	Tidak	Stunting
Arifa	Perempuan	13/07/20	17	2400	Lengkap	70	Tidak	Tidak	Stunting
Ayesha	Perempuan	02/01/20	23	2900	Lengkap	84	Tidak	Tidak	Stunting
Muh alfatih azhar	Laki-Laki	07/09/20	15	2300	Lengkap	74	Tidak	Tidak	Stunting
Adam Malik	Laki-Laki	23/12/17	49	2500	Lengkap	112	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Zakira Nuraisyah	Perempuan	16/02/19	35	3100	Lengkap	91	Tidak	Tidak	Tidak Stunting

ALAUDDIN
MAKASSAR

Nur Azizah	Perempuan	25/12/18	35	2800	Lengkap	98	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Ibrahim Rudi	Laki-Laki	17/03/18	58	2400	Lengkap	93	Tidak	Tidak	Stunting
As Sahra Sabyan	Perempuan	26/04/19	31	2100	Lengkap	88	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Ayunindya	Perempuan	07/04/19	32	2900	Lengkap	99	Tidak	Tidak	Stunting
Muh. Salman	Laki-Laki	14/04/20	21	3100	Lengkap	85	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Suhardin	Laki-Laki	02/02/17	54	3500	Lengkap	103	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Rahmat Sabir	Laki-Laki	12/02/20	22	2700	Lengkap	85,5	Ya	Tidak	Stunting
Aisyah Humaira	Perempuan	21/03/20	21	3000	Lengkap	79	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
St khairunnisa	Perempuan	16/09/17	51	2300	Lengkap	101	Tidak	Tidak	Stunting
Al fatih	Laki-Laki	26/06/17	54	3800	Lengkap	101	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Khalid	Laki-Laki	30/03/19	33	2700	Lengkap	99	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Fauziah	Perempuan	27/04/19	32	3500	Tidak Lengkap	81	Tidak	Tidak	Stunting
Syifa	Perempuan	22/11/19	25	2900	Tidak Lengkap	80	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Naira balqis	Perempuan	25/01/18	47	2800	Lengkap	91,5	Tidak	Tidak	Stunting
Abila	Perempuan	23/04/21	8	2700	Lengkap	65	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Abiza	Perempuan	18/04/19	32	4000	Lengkap	92	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Latifah	Perempuan	24/11/20	13	3400	Lengkap	77	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Muh azka alfatih	Laki-Laki	14/07/18	41	3100	Tidak Lengkap	97	Tidak	Tidak	Stunting

Adiba	Perempuan	20/11/16	58	2750	Tidak Lengkap	106	Tidak	Tidak	Stunting
Kustiwi	Perempuan	12/11/16	58	3000	Lengkap	99	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Fauziah	Perempuan	23/01/19	35	2900	Lengkap	04/04/0 0 00.00	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Ridwan	Laki-Laki	10/07/17	53	3500	Lengkap	101	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Dini Lestari	Perempuan	28/08/18	40	4000	Lengkap	84,5	Ya	Tidak	Stunting
Dani Saputra	Laki-Laki	13/05/17	55	3000	Lengkap	101	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Muh. Hasbi Saputra	Laki-Laki	25/02/18	46	2700	Tidak Lengkap	88	Tidak	Tidak	Stunting
Muh Tajid	Laki-Laki	26/09/17	51	2850	Tidak Lengkap	101, 5	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Zea azkarina	Perempuan	22/10/17	50	3000	Tidak Lengkap	98	Tidak	Tidak	Stunting
Farsana	Perempuan	21/10/20	14	3000	Tidak Lengkap	69	Tidak	Tidak	Stunting
Nur Faiqia Mutia	Perempuan	17/02/19	34	3100	Lengkap	96	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Rezki aulia	Perempuan	11/01/19	35	3000	Tidak Lengkap	82	Tidak	Tidak	Stunting
Adriansyah	Laki-Laki	30/12/16	59	2400	Tidak Lengkap	99	Tidak	Tidak	Stunting
Atofah	Perempuan	22/12/19	24	3000	Tidak Lengkap	84,5	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Nur Azizah Azzahra	Perempuan	18/11/20	13	2400	Lengkap	70	Tidak	Tidak	Stunting
Sugiono	Laki-Laki	20/08/18	40	2800	Tidak Lengkap	89	Tidak	Ya	Stunting
Nur Aisyah	Perempuan	30/12/16	59	3900	Lengkap	103,5	Tidak	Tidak	Stunting

ALAUDDIN
MAKASSAR

Muh. Dirga Rezki Ramadhan	Laki-Laki	31/05/18	43	3800	Lengkap	93	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Kiran	Perempuan	22/10/17	50	2700	Lengkap	102	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Ifran	Laki-Laki	16/06/20	18	3600	Lengkap	74	Tidak	Tidak	Stunting
Nayla	Perempuan	01/06/18	42	3500	Lengkap	98,2	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Kirana	Perempuan	10/07/19	39	2300	Lengkap	84,5	Tidak	Tidak	Stunting
Maulana	Laki-Laki	02/08/19	39	3400	Lengkap	87,5	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Meysa	Perempuan	18/05/20	19	2300	Lengkap	79	Tidak	Tidak	Stunting
Hafidz	Laki-Laki	04/06/19	29	3500	Lengkap	86	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Reinina	Perempuan	17/05/18	43	2600	Lengkap	93,5	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
farhan	Laki-Laki	29/01/17	56	2400	Lengkap	105	Tidak	Tidak	Stunting
M. Faiz	Laki-Laki	19/06/18	41	3500	Lengkap	98	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Adriana	Perempuan	05/10/19	26	2400	Lengkap	75	Tidak	Tidak	Stunting
Rafka	Laki-Laki	12/06/20	17	3000	Tidak Lengkap	60	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Kifaya	Laki-Laki	03/03/20	21	3600	Tidak Lengkap	26	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Bilal	Laki-Laki	03/06/18	42	2400	Lengkap	90	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Nuzaiba Ramadhani	Perempuan	26/05/18	42	2300	Tidak Lengkap	72	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Muh Rasya	Laki-Laki	11/05/19	33	2900	Lengkap	89	Tidak	Tidak	Tidak Stunting

Hanifah	Perempuan	02/02/19	34	3400	Lengkap	87	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Assifa	Perempuan	30/10/18	38	3700	Lengkap	93	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Zahira	Perempuan	28/03/19	33	3000	Lengkap	89	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Bilal	Laki-laki	16/01/19	35	3100	Lengkap	92	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Rayzahra	Perempuan	28/08/19	28	2800	Lengkap	86	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Safrah	Laki-laki	20/02/19	34	3000	Lengkap	92	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Lino	Laki-laki	15/04/19	32	3000	Lengkap	89	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Geva	Laki-laki	06/05/19	31	3000	Lengkap	90	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Idan	Laki-laki	07/11/18	37	3600	Lengkap	93	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Kayyisah	Perempuan	18/04/19	32	2800	Lengkap	90	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Aurora	Perempuan	04/12/18	36	3000	Lengkap	95	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Adzriel	Laki-laki	29/06/19	30	2900	Lengkap	91	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Rauf	Laki-laki	07/01/21	11	3200	Lengkap	71	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Ayuro	Perempuan	14/09/20	15	3150	Lengkap	76	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Adifa	Perempuan	17/09/19	27	3000	Lengkap	88	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Fiki	Laki-laki	26/09/20	15	2600	Lengkap	78	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Fadillah	Perempuan	02/04/18	44	3000	Lengkap	99	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Abdi	Laki-laki	11/06/18	42	2500	Lengkap	99	Tidak	Tidak	Tidak Stunting

ALAUDDIN
MAKASSAR

Rahmat	Laki-laki	26/03/18	45	3900	Lengkap	98	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Azzahra	Perempuan	19/02/18	46	3000	Lengkap	98	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Dani	Laki-laki	28/07/18	41	3000	Lengkap	99	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Eyza	Laki-laki	08/05/18	43	3000	Lengkap	96	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Haenan	Laki-laki	17/02/19	34	4000	Lengkap	91	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Elisa	Perempuan	16/05/20	19	2400	Tidak Lengkap	75	Ya	Tidak	Stunting
Renayrah	Perempuan	22/08/20	16	3200	Lengkap	78	Ya	Tidak	Tidak Stunting
Fakhriyah	Perempuan	29/06/20	18	3050	Lengkap	80	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Raisya	Perempuan	06/04/20	20	3900	Lengkap	80	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Qawiyyah	Laki-laki	30/05/19	31	3100	Lengkap	90	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Akram	Laki-laki	27/02/19	34	2000	Lengkap	85	Tidak	Tidak	Stunting
Fitri	Perempuan	02/05/19	31	3300	Tidak Lengkap	84	Tidak	Tidak	Stunting
Abizar	Laki-laki	23/05/18	43	2800	Lengkap	97	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Tsabita	Perempuan	18/12/19	24	2600	Lengkap	84	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Kwinsah	Perempuan	22/11/18	37	2400	Tidak Lengkap	87	Tidak	Tidak	Stunting
Royyan	Laki-laki	16/06/19	30	2900	Lengkap	85	Tidak	Tidak	Stunting
Khadijah	Perempuan	14/09/19	27	2200	Lengkap	81	Tidak	Tidak	Stunting
Umaira	Perempuan	18/03/19	33	3400	Tidak Lengkap	85	Tidak	Tidak	Stunting

Azhawa	Perempuan	09/12/19	24	2100	Tidak Lengkap	79	Ya	Tidak	Stunting
Kathleen	Perempuan	22/01/19	35	2250	Lengkap	86,5	Tidak	Tidak	Stunting
Asraf	Laki-laki	02/08/20	16	3100	Lengkap	80	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Zainal	Laki-laki	21/01/21	11	3500	Lengkap	72	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Ghaziyah	Perempuan	04/02/21	10	3200	Lengkap	68	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Firmansyiah	Laki-laki	05/05/18	43	3050	Lengkap	101	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Richard	Laki-laki	17/04/20	20	3100	Lengkap	82	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Abdi	Laki-laki	21/10/18	38	3000	Tidak Lengkap	89	Tidak	Tidak	Stunting
Medina	Perempuan	12/12/17	48	2300	Lengkap	102	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Azmya	Perempuan	16/03/18	45	3400	Lengkap	100	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Chaesa	Laki-laki	16/01/18	47	2900	Lengkap	101	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Putri	Perempuan	08/12/18	36	3700	Lengkap	85	Tidak	Tidak	Stunting
Risca	Perempuan	29/06/20	18	4000	Lengkap	75	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Adreena	Perempuan	24/02/20	22	3200	Lengkap	81	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Ardan	Laki-laki	13/12/19	24	4000	Lengkap	78	Tidak	Tidak	Stunting
Azura	Perempuan	30/03/19	33	2100	Lengkap	85	Tidak	Tidak	Stunting
Farid	Laki-laki	18/02/20	22	3600	Lengkap	83	Tidak	Tidak	Stunting
Arsi	Laki-laki	22/04/19	32	2350	Lengkap	86	Tidak	Tidak	Stunting

Fajar	Laki-laki	26/04/19	32	3000	Lengkap	85	Tidak	Tidak	Stunting
Agam	Laki-laki	29/05/19	31	3100	Lengkap	85	Tidak	Tidak	Stunting
Arsya	Laki-laki	21/10/19	26	3500	Lengkap	82	Ya	Tidak	Stunting
Rafit	Laki-laki	27/10/18	38	2600	Lengkap	90	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Rafael	Laki-laki	15/01/18	47	3100	Lengkap	102	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Kamila	Perempuan	10/10/18	38	2900	Lengkap	92	Tidak	Tidak	Tidak Stunting
Ila	Perempuan	01/07/18	41	2600	Lengkap	90	Tidak	Tidak	Stunting

Lampiran 3 Pengolahan Data Penelitian

A. Analisis Univariat

		TB	IMUNI	ISPA	DIARE	BB
N	Valid	251	251	251	251	251
	Missing	0	0	0	0	0

1. Stunting

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak stunting	137	54.6	54.6	54.6
	stunting	114	45.4	45.4	100.0
Total		251	100.0	100.0	

2. BBL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berat Badan Normal	213	84.9	84.9	84.9
	Berat Badan Lahir Rendah	38	15.1	15.1	100.0
Total		251	100.0	100.0	

3. Status Imunisasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lengkap	191	76.1	76.1	76.1
	Tidak Lengkap	60	23.9	23.9	100.0
Total		251	100.0	100.0	

4. Riwayat Penyakit Infeksi

DIARE

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	47	18.7	18.7	18.7
	Tidak	204	81.3	81.3	100.0
Total		251	100.0	100.0	

ISPA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	16	6.4	6.4	6.4
	Tidak	235	93.6	93.6	100.0
Total		251	100.0	100.0	

B. Analisis Bivariat

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
TB * IMUNI	251	100.0%	0	0.0%	251	100.0%
TB * ISPA	251	100.0%	0	0.0%	251	100.0%
TB * DIARE	251	100.0%	0	0.0%	251	100.0%
TB * BB	251	100.0%	0	0.0%	251	100.0%

1. Stunting dengan BBL

Crosstab

Count

		BB		Total
		Berat Badan Normal	Berat Badan Lahir Rendah	
TB	Tidak stunting	133	4	137
	stunting	80	34	114
Total		213	38	251

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	35.059 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	32.996	1	.000		
Likelihood Ratio	38.322	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	34.919	1	.000		
N of Valid Cases	251				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.26.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Interval by Interval Pearson's R	.374	.049	6.358	.000 ^c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation	.374	.049	6.358	.000 ^c
N of Valid Cases	251			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

2. Stunting dengan Status Imunisasi

Crosstab

Count		IMUNI		Total
		Lengkap	Tidak Lengkap	
TB	Tidak stunting	123	14	137
	stunting	68	46	114
Total		191	60	251

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	31.055 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	29.423	1	.000		
Likelihood Ratio	31.939	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	30.934	1	.000		
N of Valid Cases	251				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27.25.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Interval by Interval	Pearson's R	.352	.057	5.930	.000 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.352	.057	5.930	.000 ^c
N of Valid Cases		251			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

3. Stunting dengan Riwayat Penyakit Infeksi

Crosstab

Count

		DIARE		Total
		Ya	Tidak	
TB	Tidak stunting	19	118	137
	stunting	28	86	114
Total		47	204	251

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.675 ^a	1	.031		
Continuity Correction ^b	3.988	1	.046		
Likelihood Ratio	4.864	1	.031		
Fisher's Exact Test				.035	.023
Linear-by-Linear Association	4.866	1	.031		
N of Valid Cases	251				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.35.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Interval by Interval Pearson's R	-.136	.063	-2.174	.031 ^c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation	-.136	.063	-2.174	.031 ^c
N of Valid Cases	251			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Crosstab

Count

		ISPA		Total
		Ya	Tidak	
TB	Tidak stunting	9	128	137
	stunting	7	107	114
Total		16	235	251

ALAUDDIN
MAKASSAR

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.019 ^a	1	.890		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.019	1	.890		
Fisher's Exact Test				1.000	.551
Linear-by-Linear Association	.019	1	.890		
N of Valid Cases	251				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.27.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Interval by Interval Pearson's R	.009	.063	.138	.890 ^c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation	.009	.063	.138	.890 ^c
N of Valid Cases	251			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.



Lampiran 6 Foto Penelitian

Pengukuran secara langsung



Wawancara dengan responden







Lingkungan tempat tinggal responden





Buku KIA responden



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Tiara Putri Ramli
2. NIM : 70600118041
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Perumahan Pesona Prima Griya F1.12
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : H. Ramli Dullah
 - b. Ibu : Hj. Hasnawati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 1 Pembataan
2. SMP : SMPN 2 Tanjung
3. SMA : SMAN 2 Tanjung
4. Tahun 2018 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar