

**PENGGUNAAN KOMBINASI ARANG SEKAM, PAKIS DAN  
PUPUK ORGANIK CAIR PADA TAHAP AKLIMATISASI  
PLANLET KENTANG (*Solanum tuberosum* L. cv. Granola)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**SULASTRI**  
NIM. 60300117018

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulastri  
NIM : 60300117018  
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 17 Mei 1997  
Jurusan/Prodi : Biologi/S1  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Perumahan Citra Bonto Marannu Land, Blok D2, No.4,  
Kabupaten Gowa  
Judul Skripsi : Penggunaan Kombinasi Arang sekam, Pakis dan Pupuk  
Organik Cair Pada Tahap Aklimatisasi Planlet Kentang  
(*Solanum tuberosum* L. cv. Granola)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 09 November 2021  
Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Sulastri  
NIM: 60300117018

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari **Sulastri**, NIM: 603000117018 mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi berjudul, "*Penggunaan Kombinasi Arang sekam, Pakis dan Pupuk Organik Cair Pada Tahap Aklimatisasi Planlet Kentang (*Solanum tuberosum* L. cv. Granola)*", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 09 November 2021

Pembimbing I



Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd  
NIP: 198109122009122008

Pembimbing II









Isna Risdianah Azis, S.Si., M.Sc  
NIP: 198407262019032008

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penggunaan Kombinasi Arang sekam, Pakis dan Pupuk Organik Cair Pada Tahap Aklimatisasi Planlet Kentang (*Solanum tuberosum* L. cv. Granola)" yang disusun oleh Sulastri, NIM: 60300117018, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 M, bertepatan dengan Rabiul Awal 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Sains Dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).


Gowa, 18 Oktober 2021 M  
Rabiul Awal 1443 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd (.....)   
Sekertaris : Devi Armita, S.Si., M.Si (.....)   
Penguji I : Dr. Masriany, S.Si., M.Si (.....)   
Penguji II : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag (.....)   
Pembimbing I : Dr. Hafsan, S.Si., M.Si (.....)   
Pembimbing II: Isna Rasdianah Aziz, S.Si., M.sc (.....) 

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

  
Prof. Dr. H. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd   
NIP. 197104122000031001

## KATA PENGANTAR

*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Penggunaan Kombinasi Arang sekam, Pakis dan Pupuk Organik Cair Pada Tahap Aklimatisasi Planlet Kentang (Solanum tuberosum L. cv. Granola)*” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salam serta shalawat semoga tetap tercurah ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih sangat banyak kekurangan di dalamnya, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya doa dan dukungan dari orang-orang terhebat dalam hidup penulis yaitu orangtua tercinta. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada alm. Ayahanda Naing dan ibunda Rostina, serta adik dan keluarga atas segala doa, semangat, dukungan serta pengorbanan. Semoga kasih sayang Allah swt. tercurah untuk kita semua.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan, petunjuk, arahan dan masukan yang berharga. Penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Ibu Dr. Masriany, S.Si., M.Si, selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, dan Bapak Hasyimuddin S.Si., M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi beserta Dosen Jurusan Biologi yang telah ikhlas membagikan ilmu dan waktunya selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd selaku Pembimbing Akademik dari semester I hingga Semester IX dan Penguji Komprehensif Mikrobiologi, terima kasih yang sebesar besarnya atas segala arahan, bimbingan, waktu serta kesabarannya selama ini menghadapi penulis. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan kesabaran Ibu dengan kebaikan yang lebih besar. Aamiin.
5. Ibu Isna Rasdianah Aziz, S.Si., M.Sc, dan ibu Devi Armita, S.Si., M.Si selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan, arahan, pengertiannya serta kesabarannya selama ini menghadapi penulis mulai dari awal sampai akhir penyusunan skripsi. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah Swt. Aamiin.
6. Ibu Dr. Masriany S.Si., M.Si dan Bapak Prof. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku penguji I dan II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas saran dan kritikan bagi penulis sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
7. Kak Ati selaku Staf Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Terima

kasih yang sebesar-besarnya atas pengertiannya dan kesabarannya dalam menyelesaikan administrasi selama perkuliahan.

8. Seluruh Pegawai dan Staf Laboratorium di PT. Malino Floris. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi waktunya untuk membantu dan membimbing dari awal sampai akhir.
9. Seluruh Pegawai dan Staf Laboratorium di Jurusan. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi waktunya untuk membantu selama perkuliahan sampai saat penelitian.
10. Seluruh Staf akademik, terima kasih yang sebesar- besarnya karena telah membantu dalam penyelesaian administrasi Fakultas Sains dan Teknologi serta kesabaran dalam memberikan pengertian tentang kebenaran informasi dalam lingkup Fakultas Sains dan Teknologi.
11. Andri Mulyani, Nur Salsabilah, dan Andi Ristanti. Rekan yang banyak membantu saya, beliau tempat saya bertanya ketika dalam penelitian saya ada yang kurang saya mengerti dan membantu saya dalam penyelesaian penelitian. Semoga kebaikan dibalas oleh Allah Swt.
12. Sahabat-sahabat saya, Annisa fahni maulidya, Annisa Nur fadillah, Andi Ristanti dan Amariah Nur Nawawi yang menjadi partner dalam penelitian ini tanpa kalian saya tidak akan bisa kuat di perantauan ini. Semoga kita diberi kesuksesan, Aamiin.
13. Angkatan biologi 1N7ERNEURON, yang telah memberikan dukungan dan kenangan yang tak terlupakan selama ini, yang telah berjuang bersama-sama

menyelesaikan skripsi. Semoga semuanya sarjana tepat waktu.

14. Teman-teman Posko KKN UIN Angkatan 63. Terimakasih atas bantuan dan semangatnya, semoga persaudaraan dan tali silaturahmi tetap terjalin sampai kapanpun, sampai berjumpa di masa sukses.

15. Serta seluruh pihak yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan, do'a, semangat, saran dan pemikiran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga jasa baik yang telah mereka berikan dibalas dengan balasan lebih dari Allah Swt. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi titik acuan untuk peneliti lain serta menambah ilmu pengetahuan.

Gowa, September 2021

Penyusun

Sulastr

Nim 60300117018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ILUSTRASI .....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	12
A. Ayat yang Relevan .....	12
B. Tinjauan Umum Kentang ( <i>Solanum tuberosum</i> L. cv. Granola).....	13
C. Tinjauan Umum Media Tanam .....	17
D. Tinjauan Umum POC.....	21
E. Tinjauan Umum Klorofil .....	27
F. Kerangka Berfikir.....	29
G. Hipotesis.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31

B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	31
C. Variabel Penelitian .....	31
D. Definisi Operasional Variabel.....	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
1. Alat.....	33
2. Bahan.....	33
F. Metode Pengumpulan Data.....	33
G. Prosedur kerja.....	35
1. Sterilisasi Alat .....	35
2. Pembuatan POC .....	35
3. Aklimatisasi.....	35
4. Persiapan Media Tanam.....	36
5. Penanaman .....	37
6. Pemeliharaan Tanaman.....	37
7. Pengamatan .....	38
8. Analisis Kadar Klorofil.....	40
H. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Hasil Penelitian .....	43
B. Pembahasan.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. KESIMPULAN .....	62
B. SARAN .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Morfologi Kentang.....	29
-----------------------------------	----



## DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 2.1. Morfologi Kentang.....	16
Gambar 4.1. Planlet Kentang Yang Diberi Perlakuan Media Tanam dan POC .....	44
Gambar 4.2 Grafik Batang Rata-rata Tinggi Tanaman Kentang ( <i>S.tuberosum</i> L. cv. Granola).....	44
Gambar 4.3 Grafik Batang Rata-rata Panjang Daun Tanaman Kentang ( <i>S.tuberosum</i> L. cv. Granola) .....	45
Gambar 4.4 Grafik Batang Rata-rata Jumlah Daun Kentang ( <i>S.tuberosum</i> L. cv. Granola).....	47
Gambar 4.5 Grafik Batang Rata-rata Kandungan Klorofil Daun Tanaman Kentang ( <i>S.tuberosum</i> L. cv. Granola).....	48



## ABSTRAK

**Nama** : Sulastri  
**NIM** : 60300117018  
**Judul Skripsi** : **Penggunaan Kombinasi Arang Sekam, Pakis, dan Pupuk Organik Cair Pada Tahap Aklimatisasi Planlet Kentang (*Solanum tuberosum* L.)**

---

Media tanam merupakan hal yang harus diperhatikan dalam kultivasi tanaman. Arang sekam dan akar pakis diketahui dapat dijadikan media tanam yang efektif digunakan untuk proses peningkatan pertumbuhan tanaman. Tanaman kentang merupakan komoditi hortikultura yang dapat mendatangkan keuntungan di dalam ataupun di luar negeri, dan makanan pokok ke-4 setelah padi, gandum dan jagung. Selain media tanam, pupuk yang digunakan juga menjadi faktor penentu keberhasilan kultivasi tanaman, termasuk kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola.) baik selama proses aklimatisasi maupun saat pemeliharaan lanjut. Pupuk Organik Cair (POC) merupakan jenis pupuk cair yang sangat mudah diproduksi dan terbukti efektif untuk pertumbuhan tanaman serta meningkatkan kandungan klorofil daun. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh formulasi kombinasi media tanam dan (POC) yang efektif bagi pertumbuhan dan hasil tanaman kentang dengan mengukur beberapa parameter pertumbuhan yaitu: tinggi tanaman, luas daun, jumlah daun serta kandungan klorofil daun. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimental dengan rancangan acak lengkap faktorial (RALF). Analisis hasil penelitian dilakukan dengan uji *One Way* ANOVA yang dilanjutkan dengan uji Duncan dan uji korelasi. Penggunaan kombinasi media tanam berupa arang sekam dan akar pakis serta POC berpengaruh nyata terhadap panjang daun (cm) dan jumlah daun (helai) tanaman kentang, namun tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi daun (cm). Perlakuan M5P2 (arang sekam 25%+akar pakis 75%+air 6 ml/l) memberikan hasil terbaik dengan rata-rata tinggi tanaman 7,45 cm, panjang daun terbaik dengan rata-rata 1,65 cm pada perlakuan M1P2 (arang sekam 95%+akar pakis 5%+air 6 ml/l). Pada perlakuan M1P2 (arang sekam 95%+akar pakis 5%+air 6 ml/l) memberikan hasil terbaik untuk parameter jumlah daun sebanyak 12,75 helai. Dan hasil MP2 (Media tanam+POC 6 ml/l) menunjukkan klorofil a, klorofil b serta total kandungan klorofil terbanyak dengan nilai rata-rata berturut-turut 6,6983, 2,2564, 8,1679 dibandingkan dengan perlakuan MP1 (Media tanam+air 6 ml/l) dengan nilai rata-rata 5,4126, 1,7783, 7,1824.

**Kata Kunci:** Media Tanam, POC, Aklimatisasi, dan kentang (*Solanum tuberosum* L.)

## ABSTRACT

**Name** : Sulastri  
**Student ID Number** : 60300117018  
**Title** : **Use of a Combination of Husk Charcoal, Fern, and Liquid Organic Fertilizer in the Acclimatization Stage of Potato Planlets (*Solanum tuberosum* L.)**

---

Planting media is something that must be considered in plant cultivation. Husk charcoal and fern roots are known to be effective growing media used for the process of increasing plant growth. Potatoes are a horticultural commodity that can be profitable at home or abroad, and the 4th staple food after rice, wheat and corn. In addition to the planting medium, the fertilizer used is also a determining factor for plant cultivation success, including, potato (*Solanum tuberosum* L. cv. Granola) both during acclimatization process and during further maintenance. Liquid organic fertilizer (POC) is a liquid fertilizer that is very easy to produce and proven effective for plant growth and increasing leaf chlorophyll content. This study aims to obtain a combination of planting media and POC formulation that are effective for the growth and yield of potato plants by measuring several growth parameters: plant height, leaf length, number of leaves, and leaf chlorophyll content. This study is an experimental quantitative study with a completely randomized design (CRD). Analysis of the study result was carried out with the *One Way* ANOVA test followed by Duncan's test and correlation test. The use of a combination of planting media in the form of husk charcoal and fern root and POC had had a significant effect on leaf length (cm) and number of leaves (strands) of Potato plants but had no significant effect on leaf height (cm). The M5P2 treatment (25% husk charcoal + 75% fern root + 6 ml/l water) gave the best results with an average plant height of 7.45 cm, the best leaf length with an average of 1.65 cm in the M1P2 treatment (husk charcoal). 95%+fern root 5%+water 6 ml/l) the M1P2 treatment (95% husk charcoal + 5% fern root + 6 ml/l water) gave the best results for the parameter number of leaves as much as 12.75 strands. And the results of MP2 (Planting medium + POC 6 ml/l) showed chlorophyll a, chlorophyll b and the highest total chlorophyll content with an average value of 6,6983, 2,2564, 8,1679 compared to the MP1 treatment (Planting medium). + water 6 ml/l) with an average value of 5.4126, 1.7783, 7.1824.

Keywords: Planting Media, POC, Acclimatization, and Potato (*Solanum tuberosum* L.)

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Allah swt. di muka bumi. Tumbuhan menjadi hal yang sangat esensial bagi keberlangsungan hidup manusia. Semua yang diciptakan oleh Allah swt. di dunia ini mempunyai peranan masing-masing untuk menjaga keseimbangan ekosistem, dan menjadi wadah bagi manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Di bumi ini terdapat banyak jenis tumbuhan yang bermacam-macam. Semua tumbuhan mempunyai manfaat bagi manusia karena tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt. yang sia-sia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Thaha/20: 53.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kementerian Agama RI, 2010).

Menurut tafsir al-Jalalain ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan agar kalian bisa hidup di atasnya, dan menjadikan jalan-jalan yang pantas dilalui agar kalian bisa berjalan di atasnya, dan menurunkan air hujan dari langit." Lalu dengan air itu Kami tumbuhkan berbagai jenis tumbuhan berbeda-beda warna, rasa dan aromanya (Asy-Syuyuthi, 2010).

Ayat dan tafsir tersebut menjelaskan tentang dimana Allah swt. menciptakan tumbuhan di bumi ini salah satu tujuannya adalah agar dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Namun problematik saat ini terjadinya ketimpangan antara tumbuhan dan sumber daya manusia (SDA), sehingga dibutuhkan alternatif untuk menjaga hal tersebut. Salah satu solusi terbaik dilakukan proses perbanyak tumbuhan dengan kultur jaringan tanpa menggunakan lahan yang besar. Semua ini telah Allah swt. ciptakan sedemikian rupa dan dengan serapi-rapinya, Maha benar Allah swt. dengan segala Kekuasaan-Nya.

Dalam upaya mencapai keuntungan usaha tani untuk budidaya tanaman tanpa menggunakan lahan yang besar, maka perlu mendapatkan solusi teknis untuk masalah penyediaan tanaman. Diperlukan waktu yang singkat, hemat biaya tanpa harus menggunakan lahan yang besar, sehingga solusi terbaik yaitu menggunakan media tanam yang mampu mengatasi masalah tersebut. Media tanam adalah unsur utama untuk proses pertumbuhan tanaman. Bagi tanaman, media tanam memiliki banyak peran. Media merupakan tempat bertumpu agar tanaman dapat berdiri tegak, yang dalamnya terkandung hara, air, dan udara yang dibutuhkan oleh tanaman (Purwanto, 2012).

Kentang (*Solanum tuberosum* L. cv. Granola) adalah salah satu komoditi hortikultura penting di Indonesia yang diusahakan secara komersial terutama di daerah dataran tinggi. Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) adalah makanan pokok makanan terbesar keempat yang ada di dunia setelah padi, gandum dan jagung. Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) memiliki nilai jual yang cukup tinggi yang dapat

mendatangkan keuntungan bagi pengusaha industri makanan olahan, pedagang, dan petani yang membudidayakannya, sehingga kentang dianggap sebagai komoditas di dalam negeri dan diekspor. Sampai saat ini kebutuhan benih kentang masih tinggi, namun kendalanya persediaan bibit kentang yang masih cukup rendah (Rad et al, 2015).

Media tanam adalah unsur utama untuk proses pertumbuhan tanaman. Jenis media tanam sangat beragam, yang salah satunya adalah media akar pakis dan arang sekam, akar pakis memiliki kriteria yang baik bagi pertumbuhan tanaman diantaranya akar pakis mampu mengikat dan menyimpan air dengan baik, melapuk perlahan serta mengandung unsur hara yang diperlukan bagi tanaman. Sedangkan arang sekam memiliki kemampuan mempertahankan kelembaban sehingga memacu pertumbuhan mikroorganisme yang mampu menyuburkan tanaman. Kedua media tersebut sangat cocok untuk menggantikan tanah sebagai media tanam, perlakuan media tanam berupa akar pakis dan arang sekam dengan perbandingan 1:1 memiliki kemampuan yang sama dalam meningkatkan persentase tumbuh tanaman, tinggi tanaman, jumlah daun, panjang tunas dan diameter batang pada tanaman kentang (*S. tuberosum* L.) varietas granola kembang (Kurniawan, 2016).

Terdapat kesulitan dalam menentukan media tanam yang layak dan sesuai dengan kondisi ekohabitat pada berbagai daerah. Di antaranya dipengaruhi oleh kelembapan dan kecepatan angin. Secara umum media tanam sangat beragam jenisnya seperti humus, pupuk kandang, arang sekam, cocopeat, akar pakis, tanah, pasir dan lain-lain. Beberapa media tanam tersebut memiliki keefektifan dalam meningkatkan

kualitas pertumbuhan tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola), contohnya arang sekam, cocopeat, tanah dan pupuk kandang. Menurut Efriana (2018) hasil media tanam yang baik bagi kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) didapatkan pada perlakuan tanah + arang sekam + pupuk kandang dengan perbandingan (1:1:1), media tanam yang diberikan berpengaruh nyata terhadap panjang akar tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) varietas granola pada akhir pengamatan. Begitu juga pendapat Sani (2015) bahwa cocopeat dengan sekam bakar menunjukkan pengaruh sangat nyata terhadap jumlah pucuk hicup umur 1, 2 dan 3 minggu setelah tanam, jumlah pucuk mati umur 1, 2 dan 3 MST, panjang pucuk umur 1, 2 dan 3 MST, jumlah daun umur 1, 2 dan 3 MST, panjang akar umur 3 MST, serta jumlah pucuk berakar umur 3 MST (Sani, 2015).

Media arang sekam adalah bahan media yang tidak mudah lapuk dan sulit untuk ditumbuhi jamur sehingga miskin hara. Selain itu media akar pakis memiliki kelemahan yaitu dihinggapi semut atau binatang-binatang kecil, oleh karenanya dibutuhkan penambahan pupuk organik cair (POC) yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Menurut Maria (2014) konsentrasi POC yang digunakan 6 ml/l meningkatkan kualitas produk kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola), hal ini ditunjukkan karena adanya perubahan tinggi tanaman pada 6, 8 dan 10 minggu setelah tanam, pemberian pupuk organik cair berpengaruh nyata mempertahankan klorofil daun (durasi daun hijau) yang terlihat pada 50-85 MST. Pupuk organik cair memiliki banyak manfaat, salah satunya dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman. Pupuk organik cair juga berpengaruh terhadap total

produksi perplot 10 dan persentase grade umbi 1-20 g. Penggunaan POC sangat berhubungan erat dengan teori dari Karamina (2016) yang menyatakan bahwa pupuk organik cair lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan pupuk anorganik, penggunaan POC bahan ramah lingkungan yang mengandung mikroorganisme *Streptomyces* dengan dosis 25 ml mampu menghasilkan pertumbuhan yang optimal pada parameter pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah batang kentang (*S. tuberosum* L.) varietas Granola. Pupuk organik cair memberi peluang untuk meningkatkan produksi karena POC akan merangsang pertumbuhan dan menambah jumlah daun yang terbentuk sehingga proses fotosintesis akan menghasilkan lebih banyak fotosintat untuk mendukung proses pembentukan dan pengisian umbi (Marina, 2014).

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian ini untuk memperoleh kombinasi media tanam dan pupuk organik cair (POC) yang efektif bagi pertumbuhan dan hasil tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) dengan mengamati beberapa parameter pertumbuhan yaitu tinggi tanaman, luas daun, jumlah daun serta kandungan klorofil daun. Metode ini digunakan untuk pengupayaan peningkatan produktivitas dan efisiensi kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) dengan penggunaan waktu yang relatif singkat.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang ingin dikaji pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efek penggunaan media tanam terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, luas daun, jumlah daun dan kandungan klorofil daun tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola)?
2. Bagaimana efek penggunaan pupuk organik cair (POC) terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, luas daun, jumlah daun dan kandungan klorofil daun tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola)?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Efek penggunaan perbandingan media tanam arang sekam dan akar pakis terhadap pertumbuhan tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola), merupakan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan tanaman setek dari planlet hasil kultur jaringan.
2. Pupuk organik cair (POC) yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu, hasil sampah organik rumah tangga seperti sisa sayuran (sawi, kol, tomat, daun singkong dan kulit pisang) sebanyak 5 kg, limbah sayuran mempunyai kandungan nitrogen (N) yang dibutuhkan oleh tanaman, karena nitrogen merupakan salah satu unsur untuk pertumbuhan dan pembentukan protein agar tumbuhan dapat tumbuh baik tidak kerdil, serta daun tidak gugur dan kuning (Erickson, 2013), buah (anggur, kulit jeruk, dan apel) sebanyak 1,5 kg, limbah

buah memiliki kandungan karbon (C) yang mempunyai fungsi sebagai penghasil energi (Elmi, 2012), sisa tanaman paitan (*Tithonia diversifolia*) sebanyak 1 kg, limbah tanaman paitan memiliki kandungan kalium (K) dan fosfor (P) yang mempunyai fungsi sebagai pengendali proses fotosintesis dan sumber energi bagi tanaman (Sholihah, 2021), dan urine kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) sebanyak 1 liter, urine kelinci mengandung unsur N, P, dan K masing-masing sebesar lebih tinggi 2,72%, 1,1%, dan 0,5% yang mempunyai potensi membuat media tanam menjadi lebih subur (Sholikhah, 2018). Kemudian dimasukkan ke dalam drum plastik 10 liter dengan penambahan bioaktivator EM<sub>4</sub> (*Effective Microorganisms*). Memiliki potensi untuk melihat perbandingan yang tepat dengan potensi meningkatkan pertumbuhan tanaman meliputi tinggi tanaman, luas daun, serta jumlah daun dan kadar klorofil daun tanaman kentang (*S. tuberosum* L.) (Maria, 2016).

3. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Juli 2021 di Lab. Malino Floris di Malino, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan.

#### **D. Kajian Pustaka**

1. Efriana (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan stek mikro kentang varietas granola (*Solanum tuberosum* L)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui media tanam yang diberikan berpengaruh nyata terhadap panjang akar tanaman kentang varietas granola pada akhir pengamatan. Serta hasil media tanam yang baik

didapatkan pada perlakuan tanah + arang sekam + pupuk kandang dengan perbandingan (1:1:1), sedangkan untuk persentase setek mikro yang hidup, tinggi setek, jumlah tunas dan jumlah helaian daun, memperlihatkan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap perlakuan media tanam yang diberikan.

2. Sudarsono (2014), pada jurnalnya yang berjudul “Pemanfaatan limbah teh, sekam padi, dan arang sekam sebagai media tumbuh bibit trembesi (*Samanea saman*). Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada bulan September 2012 sampai bulan Desember 2012. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan. Perlakuan terdiri atas: tanah 100 %, tanah + limbah teh ( 75% + 25% ), tanah + limbah teh (50 % + 50%), tanah + sekam padi ( 75% + 25%), tanah + sekam padi (50% + 50%) , tanah + arang sekam padi ( 75% + 25%), tanah + arang sekam padi ( 50% + 50%). Setiap perlakuan terdiri atas 5 ulangan yang masing-masing ulangan terdiri dari 5 semai trembesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian limbah teh, sekam padi dan arang sekam sebagai media tumbuh berpengaruh nyata terhadap bobot kering akar, bobot kering tajuk, panjang akar. Komposit media yang baik untuk pertumbuhan bibit trembesi adalah tanah + limbah teh (75 % + 25 %), tanah + sekam padi (50% + 50%), tanah + arang sekam (75% + 25%). Pemanfaatan limbah teh, sekam padi, arang sekam sebagai media tumbuh menghasilkan peningkatan nilai pH pada media tumbuh. Secara umum penambahan bahan organik pada media tumbuh cenderung meningkatkan kandungan hara nitrogen.

Penambahan limbah teh, sekam padi, dan arang sekam sebesar 50% pada media tumbuh meningkatkan kandungan nitrogen pada media tumbuh.

3. Puspadewi (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh konsentrasi pupuk organik cair (POC) dan dosis pupuk N, P, K terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (*Zea mays L. var Rugosa Bonaf*) kultivar Talenta”. Ulasan ini membahas kombinasi konsentrasi pupuk organik cair dengan dosis pupuk N, P, K berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis kultivar Talenta, meliputi tinggi tanaman, diameter batang, luas daun, panjang tongkol, diameter tongkol, bobot tongkol, hasil tanaman, indeks panen dan total padatan terlarut. Berdasarkan pertimbangan dari segi ekologis dan ekonomis, kombinasi 1 kali konsentrasi pupuk organik cair dengan  $\frac{1}{2}$  dosis pupuk N, P, K mampu memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis, serta memiliki produktivitas yang setara dengan perlakuan 1 dosis pupuk N, P, K yaitu sebesar 17,46 ton/ha.
4. Mestika (2015) pada penelitiannya yang berjudul “Respon pertumbuhan dan produksi kedelai (*Glycine max L.*) terhadap konsentrasi dan cara pemberian pupuk organik cair”. Pada pemaparan penelitiannya menunjukkan hasil bahwa perlakuan konsentrasi POC 40 ml cenderung sudah meningkatkan hasil produksi tanaman kedelai pada hampir semua peubah amatan. Cara pemberian POC dengan cara disiram cenderung meningkatkan hasil produksi tanaman kedelai pada semua peubah amatan. Interaksi perlakuan konsentrasi dan cara

pemberian POC cenderung meningkatkan hasil produksi kedelai pada kombinasi perlakuan terbaik konsentrasi 40 ml dan dengan cara disiram.

5. Thoyib (2016), pada penelitiannya yang berjudul “Pembuatan pupuk organik cair dari sampah organik rumah tangga dengan bioaktivator EM4 (*Effective Microorganisms*). Pembuatan pupuk organik cair khususnya dari sampah organik rumah tangga dengan penambahan bioaktivator EM4 (*Effective Microorganisms*) bertujuan untuk menentukan pengaruh waktu pembuatan terhadap kandungan N, P, K, dan C dalam pupuk organik cair, serta menentukan pengaruh bioaktivator EM4 terhadap kandungan N, P, K, dan C dalam pupuk organik cair. Metode pembuatan pupuk organik cair ini yaitu sampah organik rumah tangga seperti sisa sayuran, kulit buah, dan lainnya dipisahkan dari sampah anorganik. Kemudian bioaktivator EM4 disiapkan di dalam sprayer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan pupuk organik cair dengan variasi waktu dan variasi penambahan volume EM4 efektif dalam meningkatkan kadar N, P, dan C. Di mana nilai kandungan N, P terbesar masing-masing pada hari ke 17 sebesar 0,205 %, dan 0,0074 %, sedangkan kadar C terbesar pada hari ke 14 sebesar 0,336 %. Sedangkan pada penambahan volume EM4 kandungan N, P, C terbesarnya terdapat pada penambahan volume EM4 sebesar 15 ml masing-masing senilai 0,191 %, 0,128 % dan 0,382 %. Semakin lama proses pengomposan dan semakin besar penambahan volume EM4 cenderung menurunkan kadar K.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui efek penggunaan kombinasi media tanam terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, luas daun, jumlah daun dan kandungan klorofil daun tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola).
2. Mengetahui efek penggunaan pupuk organik cair (POC) terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, luas daun, jumlah daun dan kandungan klorofil daun tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola).

### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan mampu memberikan khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi ilmiah terkait penggunaan berbagai media dengan arang sekam dan akar pakis serta penggunaan pupuk organik cair (POC) dapat meningkatkan produktivitas kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) dalam rentang waktu yang relatif singkat. Dan pengembangan terbaru sebagai evaluasi bahan-bahan alam terhadap bidang biologi yang berpotensi untuk meningkatkan kualitas tanaman.
2. Memberikan sumbangsih terhadap integrasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang adanya penemuan jalan alternatif cepat dalam pemanfaatan dan pembudidayaan kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola).
3. Memberikan bahan masukan terhadap penentu kebijakan di bidang pembudidayaan tanaman terkait kajian mengenai pengaruh pupuk organik cair

(POC) dan penggunaan perbandingan media tanam pada tahap aklimatisasi kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola), sehingga dapat dimanfaatkan secara luas dan mampu menjadi tambahan literatur bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II TINJAUAN TEORITIS

### ***A. Ayat yang Relevan***

Bumi merupakan wadah bagi makhluk hidup ciptaan Allah swt. kemudian melengkapi bumi dengan beberapa jenis tumbuhan yang menghijau serta laut yang biru beserta seluruh ekosistem di dalamnya, gunung-gunung, batu, air dan udara, semua itu merupakan sumber daya alam karunia Allah swt. Manusia telah dibekali pemahaman untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut, sehingga lebih memudahkan manusia melengkapi kebutuhan untuk keberlangsungan dan kemakmuran hidup. Diciptakannya bumi untuk keperluan hidup manusia ditegaskan Allah swt. sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Hijr/15: 20.

 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَٰ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِيۡنَ

Terjemahnya:

“Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya” (Kementerian Agama RI, 2010).

Menurut tafsir al-Jalalain menyatakan bahwa (Dan Kami menjadikan di bumi) ini berbagai kebutuhan hidup yang baik bagi kalian. Ada bebatuan untuk membangun tempat tinggal, hewan-hewan yang daging, kulit dan bulunya dapat dimanfaatkan, barang-barang tambang yang terdapat di dalam perut bumi, dan sebagainya. Di samping kebutuhan-kebutuhan hidup itu, di bumi ini juga Kami jadikan penghidupan

bagi keluarga dan pengikut yang berada di bawah tanggung jawab kalian. Hanya Allah swt. yang memberi rezeki kepada mereka, juga kepada kalian (Asy-Syuyuthi, 2010).

Ayat tersebut dimaksudkan bahwa Allah swt. menciptakan bumi dipergunakan manusia untuk melengkapi kebutuhan hidupnya, Allah swt. menghamparkan bumi beserta seluruh isinya sebagai sumber kehidupan. Dijadikannya gunung-gunung dengan iklim yang cocok untuk pertanian, laut dijadikan sebagai sumber pencarian sang nelayan. Begitupula dengan sungai-sungai yang mengalir, tumbuh-tumbuhan bahkan hewan diciptakan Allah swt. untuk kesejahteraan umat manusia. Sepantasnya manusia bersyukur dengan semua karunia yang Allah swt. berikan, merawat dan menjaganya sehingga bersih dari segala kotoran dan terhindar dari segala pencemaran dan dapat digunakan sebagai wadah untuk bercocok tanam. Karena pencemaran dan kerusakan tanaman tidak luput dari tangan-tangan manusia yang berusaha mengubah ciptaan-Nya.

### **B. Tinjauan Umum Kentang (*Solanum tuberosum* L. cv. Granola)**

Tanaman kentang (*Solanum tuberosum* L. cv. Granola) merupakan komoditas sayuran yang diprioritaskan dalam pengembangan peningkatan untuk dipasarkan di dalam negeri dan mengekspor. Dalam tahap pengembangan tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) dapat dilakukan dengan dua cara, diantaranya perbanyakan secara tradisional dan perbanyakan secara cepat. Kelebihan perbanyakan secara cepat dapat mempersingkat waktu untuk perbanyakan bibit serta meningkatkan jumlah bibit dengan kualitas yang terjamin. Tentunya dalam upaya pengembangbiakan secara cepat


didapatkan teknik yang cocok, salah satu upaya yang dilakukan yaitu melakukan perbandingan media tanam dan pemberian pupuk organik cair pada tanaman kentang (*S. tuberosum* L.) hasil kultur jaringan. Metode perbanyak kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) dengan melalui kultur jaringan merupakan cara alternatif perbanyak cepat dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas umbi (Kurniawan et al., 2016).

Produksi kentang secara global diperkirakan mencapai angka 370,4 juta ton pada sekitar 17,34 juta hektar lahan panen dan produksi di negara Amerika adalah 45,1 juta ton pada sekitar 1,54 juta hektar lahan panen, dan di negara Eropa 107,26 juta ton pada 4,7 juta hektar lahan panen, di Oseania 1,74 juta ton pada 43,303 ha, di Asia 189,81 juta ton pada 9,30 juta hektar, kemudian di Afrika 26,53 juta ton pada 1,76 juta hektar lahan panen pada tahun 2019. Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) menjadi salah satu tanaman yang paling hemat air dan menghasilkan jumlah kalori terbesar per unit masukan air (Djaman, 2021). Pada negara Australia, kentang mewakili sumber pendapatan yang berharga dan meningkatkan sistem ekonomi bagi pertanian dengan produksi hingga 1,25 juta ton per tahun (Wood, 2017). Kentang dianggap sebagai sayuran bertepung yang memasok sumber karbohidrat, vitamin dan mineral yang baik dalam makanan (Fleiser, 2013).

Kentang (*Solanum tuberosum* L. cv. Granola) dapat dianggap sebagai salah satu tanaman pangan terpenting di antara banyak tanaman pangan negara-negara Afrika. Potensi tanaman ini tercermin dari pertambahan luas produksi, di mana Afrika menunjukkan tingkat pertumbuhan tertinggi dibandingkan negara berkembang lainnya di dunia selama 20 tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan kentang sangat rendah

dibandingkan dengan tanaman lain. Oleh karena itu penting untuk menyelidiki metode meningkatkan jumlah *minituber* yang dihasilkan dari planlet *in-vitro* bebas penyakit. Ada sejumlah prosedur perbanyakan kentang yang saat ini digunakan di seluruh dunia untuk memperbanyak bibit kentang (Carli, 2010).

Ciri-ciri kentang (*Solanum tuberosum* L. cv. Granola) yaitu, termasuk jenis tanaman umbi-umbian yang berumur pendek. Arah tumbuh menyemak dan menjalar, mempunyai batang dengan bentuk segi empat. Batang dan juga daunnya memiliki pigmen hijau kemerahan atau berwarna ungu. Umbinya berasal dari cabang samping yang kemudian masuk ke dalam tanah, memiliki fungsi sebagai tempat penyediaan karbohidrat oleh karenanya mempunyai bentuk seperti membengkak. Umbi tersebut bisa mengeluarkan tunas sehingga nanti membentuk cabang yang baru. Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) mempunyai beberapa jenis serta beragam varietas. Jenis tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) memiliki perbedaan, ukuran, bentuk, daya simpan, komposisi kimia, sifat pengolahan, umur panen, dan warna kulit. Berdasarkan warna kulit dan daging umbi, kentang terdiri dari tiga jenis, diantaranya kentang kuning, kentang putih, dan kentang merah. Kentang kuning memiliki beberapa varietas yaitu varietas 5 Patrones, Katella, Cosima, Cipanas, dan Granola. Kentang putih memiliki varietas Donata, Radosa, dan Sebago. Varietas kentang merah yaitu Red Pontiac, Arka dan Desiree (Aini, 2012).



Gambar 2.1 Morfologi kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) yang meliputi: (a) daun; (b) batang; dan (c) akar (Dokumentasi Pribadi, 2021).

Syarat tumbuh kentang (*Solanum tuberosum* L. cv. Granola) yaitu di daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan yang memiliki ketinggian 1000-3000 mdpl. Pada dataran medium, tanaman kentang dapat ditanam pada ketinggian 300-700 mdpl. Dengan kondisi iklim yang ideal untuk tanaman kentang (*S. tuberosum* L.) yaitu dengan suhu antara 15-20°C., dengan kelembaban udara 80-90% cukup mendapat sinar matahari (moderat) dan curah hujan antara 200-300 mm per bulan atau rata-rata 1000 mm selama pertumbuhan. Lalu suhu tanah yang optimum pada proses pembentukan umbi berkisar antara 15°C sampai 18°C. Kemudian, jika pertumbuhan umbi dengan suhu kurang dari 10°C dan lebih dari 30°C akan sangat terhambat pertumbuhannya (Putro, 2010).

Manfaat yang dimiliki kentang sangat beragam, diantaranya pada kentang terkandung zat-zat yaitu karbohidrat, fosfor, zat besi, protein, lemak nabati dan kalsium

serta mineral-mineral penting lainnya. Hal ini yang menjadikan kentang baik dikonsumsi dalam menu makan sehari-hari, manfaat kentang bagi kesehatan yaitu pencegahan kanker, mengurangi kadar kolesterol, mengurangi resiko batu ginjal, kesehatan tulang, menurunkan tekanan darah tinggi, kesehatan jantung, membangun dan pembentukan sel, dan kesehatan otak dan saraf, sedangkan manfaat kentang untuk perawatan kecantikan yaitu mengobati wajah berjerawat dan mengatasi bengkak sekitar mata serta prospek usaha yang cukup menguntungkan usaha tani kentang sangat membutuhkan pengelolaan usaha yang cukup serius (Tintin, 2019).

Taksonomi tanaman kentang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Regnum:	Plantae
Divisio:	Spermatophyta
Classis:	Dicotyledonae
Ordo:	Tubiflorae
Familia:	Solanaceae
Genus:	Solanum
Spesies:	<i>Solanum tuberosum</i> L. (Gembong, 1994).

### ***C. Tinjauan Umum Media Tanam***

Media tumbuh atau media tanam adalah komponen utama ketika akan bercocok tanam. Media tanam harus dicocokkan sesuai dengan jenis tanaman yang akan ditanam, karena setiap daerah mempunyai perbedaan kelembaban dan kecepatan anginnya.

Secara umum, media tanam harus dapat menjaga kelembaban daerah sekitar akar, menyediakan cukup udara, dan dapat menahan ketersediaan unsur hara (Purwanto, 2012).

Berdasarkan jenis bahan penyusunnya, media tanam dapat dibedakan, yaitu bahan organik dan anorganik. Jenis media tanam yang tergolong kategori bahan organik yaitu berasal dari komponen organisme hidup, contohnya bagian dari tanaman misalnya daun, batang, bunga, buah, serta kulit kayu. Kegunaan bahan organik untuk media tanam jauh lebih unggul karena bahan organik sudah bisa menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman, juga mempunyai pori-pori makro dan mikro seimbang dan sirkulasi udara yang dihasilkan cukup baik, lalu mempunyai daya serap air yang tinggi. Bahan organik ini akan melalui proses pelapukan atau dekomposisi yang disebabkan mikroorganisme. Setelah melewati proses tersebut, akan menghasilkan karbondioksida ( $\text{CO}_2$ ), air ( $\text{H}_2\text{O}$ ), dan mineral. Sehingga diserap tanaman sebagai zat makanan. Tetapi, proses dekomposisi dapat memicu kemunculan bibit penyakit karena melalui proses yang terlalu cepat, sehingga media tanam harus sering diganti untuk menghindari permasalahan tersebut. Beberapa jenis bahan organik yang dapat dijadikan sebagai media tanam di antaranya arang sekam, cacahan pakis, kompos, moss, sabut kelapa, pupuk kandang, dan humus. Sedangkan bahan anorganik yaitu bahan dengan kandungan unsur mineral tinggi yang berasal dari proses pelapukan batuan induk di dalam bumi. Proses pelapukan tersebut diakibatkan oleh berbagai hal, yaitu pelapukan secara fisik, biologi-mekanik, dan kimiawi. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, mineral yang berasal dari pelapukan batuan induk dapat digolongkan menjadi 4 bentuk,

yaitu kerikil atau batu-batuan (berukuran lebih dari 2 mm), pasir (berukuran 50-2 mm), debu (berukuran 2-50 $\mu$ ), dan tanah liat (berukuran kurang dari 2 $\mu$ ). Selain itu, bahan anorganik didapatkan dari bahan-bahan sintetis atau kimia yang dibuat di pabrik. Beberapa media anorganik yang sering dijadikan sebagai media tanam yaitu gel, pasir, kerikil, pecahan batu bata, spons, tanah liat, vermikulit, dan perlit (Rao, 2010).

Metode perbanyakan secara kultur jaringan telah banyak dilakukan untuk memperbanyak bibit tanaman. Aklimatisasi merupakan proses penanaman dan adaptasi/penyesuaian tanaman dari botol steril ke lingkungan luar. Bertujuan sebagai bentuk adaptasi tanaman dari dalam botol menuju keluar lingkungan dengan berbagai kondisi. Media yang digunakan ialah akar pakis dan arang sekam. Tahapan aklimatisasi dalam kultur jaringan merupakan faktor yang sangat penting diperhatikan karena kondisi iklim di rumah plastik sangat berbeda dengan kondisi di dalam botol kultur. Tahapan ini biasanya disebut kritis karena kondisi iklim di rumah kaca atau rumah plastik serta di lapangan memiliki perbedaan dengan kondisi di dalam botol kultur sehingga kesesuaian media tanam dan dosis pupuk yang diberikan pada tahap aklimatisasi harus lebih diperhatikan agar bibit tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Rini, 2019).

Arang sekam mulai banyak diminati masyarakat untuk digunakan sebagai media tanam karena mudah terjangkau, serta memiliki sifat yang mudah mengikat air, ringan dan steril serta tentunya harga relatif murah, mempunyai porositas yang baik. Komposisi kimiawinya terdiri dari SiO<sub>2</sub> dengan kadar 72,28 % dan C sebanyak 31%. Lalu kandungan komposisi lainnya terdiri dari Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>O, MgO, CaO, MnO, dan Cu

dengan jumlah yang kecil. Arang sekam juga dapat digunakan sebagai media budidaya tanaman pada pot karena mempunyai daya ikat terhadap air yang cukup tinggi, sehingga dalam hal penyiraman lebih mengurangi biaya pemeliharaan (Agus, 2016).

Arang sekam mengandung unsur karbon (C) tinggi, sumber kalium (K) untuk mengemburkan media tanam, nitrogen (N), dan mangan (Mn), sehingga untuk menghindari keracunan Mn, pakai pupuk dengan kandungan Mn sedikit. Akar pakis mengandung unsur nitogen (N), karbon (C), hidrogen (H), dan silika yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Arang sekam mempunyai peranan penting sebagai media tanam pengganti tanah. Arang sekam bersifat porous, ringan, tidak kotor dan cukup dapat menahan air (Purwanto, 2012).

Dalam budidaya tanaman, media tanam berperan penting bagi pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Salah satu syarat untuk media tanam yang baik adalah memiliki porositas atau daya serap air yang tinggi. Sebagai contoh, campuran pakis dan pecahan genteng dengan perbandingan 1: 1 pada anggrek memberikan rata-rata jumlah daun yang lebih banyak, jumlah umbi dan jumlah akar dibandingkan perlakuan lainnya. Menurut Sabareeswaran (2018) komposisi media tanam berpengaruh besar terhadap parameter pertumbuhan. Media dengan arang + sabut kelapa dengan perbandingan 1: 1 mencatat kinerja unggul hanya untuk dua parameter, volume akar ( $2,08 \text{ cm}^3$ ) dan jumlah akar per tanaman (18,2). Performa unggul sehubungan dengan parameter akar ini dapat dikaitkan dengan keberadaan sabut kelapa di media, yang

berperan dalam meningkatkan parameter fisik media seperti porositas, kapasitas retensi air (Widyastuti, 2020).

Media tumbuh yang digunakan pada umumnya adalah tanah lapisan atas namun, penggunaan tanah lapisan atas sebagai media pertumbuhan bibit saat ini sangat dibatasi penggunaannya. Pembatasan dilakukan agar tidak terjadi dampak negatif akibat pengambilan tanah lapisan atas secara besar-besaran. Lalu disarankan untuk menggunakan media tanam yang ramah lingkungan, seperti limbah teh, sekam padi dan arang sekam padi sebagai media tumbuh, karena dipercaya dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara, memperbaiki struktur tanah, memperbesar kemampuan tanah menahan air, meningkatkan drainase dan aerasi tanah (Arumugam, 2012).

#### ***D. Tinjauan Umum Pupuk***

Pupuk secara umum diartikan sebagai bahan baik yang bersifat alami maupun buatan yang ditambahkan ke tanah, agar tanah dapat meningkat kesuburannya. Pupuk umumnya memiliki fungsi sebagai penyedia senyawa organik mempunyai tujuan untuk pertumbuhan tanaman (Hamida, 2010).

Pupuk dapat dijabarkan berdasarkan bahan asal, senyawa, fasa, cara penggunaan, reaksi fisiologi, jumlah dan macam hara yang dikandungnya. Adapun jenis-jenis pupuk adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan asal:

1. Pupuk alam. Pupuk ini bisa ditemukan di alam ataupun proses pembuatannya dibuat dengan bahan alam. Contohnya pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk guano, pupuk hijau, serta pupuk batuan.
2. Pupuk buatan. Pupuk jenis ini adalah jenis buatan pabrik. Contohnya, TSP, urea, rustika, serta nitrophoska. Tentunya proses ini pabrik menggantikan sumber daya alam melalui proses fisika ataupun proses kimia (Hamida, 2010).

b. Berdasarkan fasa:

1. Pupuk padat, adalah kelarutan yang banyak macamnya, dari yang mudah larut dalam air hingga yang sukar larut.
2. Pupuk cair, adalah yang bisa larut pada air, kebanyakan pupuk yang satu ini diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke daun. Harganya relatif mahal dikarenakan memiliki kandungan hara yang banyak, baik dalam skala makro atau mikro (Hamida, 2010).

c. Berdasarkan cara penggunaan:

1. Pupuk daun/pupuk organik cair (POC), pupuk jenis ini diaplikasikan pada permukaan daun karena telah dilarutkan dalam air.
2. Pupuk akar atau pupuk tanah, adalah jenis pupuk yang pengaplikasiannya di letakkan di sekitar tanah atau disekeliling tanaman, supaya diserap oleh akar tanaman (Hamida, 2010).

d. Berdasarkan reaksi fisiologi:

1. Pupuk yang mempunyai reaksi fisiologis masam, yaitu pupuk diaplikasikan ke dalam tanah, mengakibatkan tanah tersebut cenderung akan lebih masam (memiliki pH rendah). Contohnya, Za dan urea.
2. Pupuk yang mempunyai reaksi fisiologis basis, adalah jenis pupuk yang ketika diaplikasikan ke dalam tanah menimbulkan kecenderungan pH tanah menjadi tinggi ataupun naik. Contohnya pupuk chili saltpeter, calnitro, kalsium sianida (Hamida, 2010).

e. Berdasarkan jumlah hara yang dikandung:

1. Pupuk yang hanya mengandung satu jenis hara tanaman saja. Contohnya, urea hanya bisa mengandung hara N, TSP hanya bisa untuk unsur hara P saja (meskipun juga mengandung hara Ca)
2. Pupuk majemuk, adalah jenis pupuk yang terdiri dari 2 penggabungan hara tanaman ataupun lebih. Misalnya: NPK, amophoska, dan nitrophoska (Hamida, 2010).

f. Berdasarkan jumlah hara tanaman:

1. Pupuk makro, adalah jenis pupuk yang hanya mengandung hara makro saja. Misalnya NPK serta nitrophoska.
2. Pupuk mikro, adalah jenis yang hanya mengandung hara mikro saja. Misalnya mikrovet, mikroplek, metalik.
3. Pupuk campuran makro dan mikro, contohnya pupuk gandasil, bayfolan, rustika (Hamida, 2010).

g. Berdasarkan senyawa:

1. Pupuk organik, adalah pupuk senyawa organik. Pada umumnya pupuk alam tergolong pupuk organik, seperti pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk guano. Pupuk alam tidak termasuk pupuk organik, contohnya kebanyakan berasal dari batuan sejenis apatit [ $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ]
2. Pupuk anorganik atau mineral adalah pupuk dari senyawa anorganik. Umumnya pupuk buatan tergolong pupuk anorganik (Hamida, 2010).

Pupuk anorganik memiliki kelemahan yang akan berdampak buruk bagi tanaman ketika diaplikasikan secara terus menerus atau berlebihan. Pupuk tersebut apabila dipakai secara terus menerus menjadi tidak efisien serta bisa menimbulkan gangguan secara fisik, kimia dan biologi tanah, akibatnya akan menurunkan produktivitas lahan, dan sangat berpengaruh terhadap efektivitas produksi tanaman serta akan menimbulkan kekacauan pada lingkungan oleh sebab itu para petani lebih dianjurkan mengaplikasikan penggunaan pupuk anorganik bersamaan dengan penggunaan pupuk organik pada usahanya. Pupuk organik disarankan dikarenakan ramah terhadap lingkungan, serta memiliki kandungan bahan penting untuk kepentingan menghasilkan kesuburan tanah baik fisik, kimia dan biologi. Pupuk organik memiliki fungsi untuk sumber hara serta pemantap agregat tanah. Pengaplikasian pupuk organik dengan waktu panjang akan meningkatkan produktivitas lahan serta dapat mencegah degradasi lahan akibat pengaplikasiannya bisa membantu upaya konservasi tanah yang lebih baik. Campuran aplikasi pupuk organik yang dipadukan dengan pupuk anorganik bisa menghasilkan kondisi tanah (sifat fisik, kimia

dan biologi) yang terjaga sehingga menimbulkan efisiensi dalam penggunaan pupuk. Apabila pengaplikasian pupuk organik serta anorganik diberikan sesuai dengan dosis untuk tanaman dapat terpenuhi karena memenuhi kebutuhan hara yang diinginkan. Berdasarkan hal di atas, maka sebagai seorang saintis yang harus memberikan solusi alternatif yang terbaik di masyarakat maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh berbagai konsentrasi pupuk organik cair (POC) dan dosis pupuk N, P, K terhadap pertumbuhan tanaman kentang (*S. tuberosum* L.). Hal yang lebih diharapkan adalah penggunaan pupuk organik dapat menekan atau meminimalkan penggunaan pupuk anorganik (Puspawati et al., 2016).

Penambahan pupuk organik cair diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pupuk organik cair merupakan salah satu jenis pupuk yang banyak beredar di pasaran. Pupuk organik cair kebanyakan diaplikasikan melalui daun atau disebut sebagai pupuk cair foliar yang mengandung hara makro dan mikro esensial (N, P, K, S, Ca, Mg, B, Mo, Cu, Fe, Mn dan bahan organik). Pupuk organik cair selain dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, juga membantu meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan kualitas produk tanaman, mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan sebagai alternatif pengganti pupuk kandang. Pupuk organik cair yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu, hasil sampah organik rumah tangga seperti sisa sayuran (sawi, kol, tomat, daun singkong dan kulit pisang), buah (anggur, kulit jeruk, dan apel), sisa tanaman paitan (*Tithonia diversifolia*) serta kacang-kacangan, dan urine sapi (*Bos taurus*) dengan penambahan bioaktivator EM<sub>4</sub> (*Effective Microorganisms*) bertujuan untuk menentukan pengaruh

waktu pembuatan terhadap kandungan N, P, K, dan C dalam pupuk organik cair, serta menentukan pengaruh bioaktivator EM<sub>4</sub> terhadap kandungan N, P, K, dan C dalam pupuk organik cair. Mikroorganisme yang terdapat dalam EM<sub>4</sub> memberikan pengaruh yang baik terhadap kualitas pupuk organik, sedangkan ketersediaan unsur hara dalam pupuk organik sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu yang diperlukan bakteri untuk mendegradasi sampah (Sopha & Uhan, 2013). Manfaat EM<sub>4</sub> bagi tanaman dan tanah yaitu dapat menjadi penghambat bagi pertumbuhan hama dan penyakit tanaman, membantu meningkatkan kapasitas fotosintesis tanaman dan kualitas bahan organik sebagai pupuk, serta meningkatkan kualitas pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman (Nur et al., 2018).

Kelebihan dari pupuk organik cair ini adalah dapat secara cepat mengatasi defisiensi hara, tidak bermasalah dalam pencucian hara, mampu menyediakan hara secara cepat, pengaplikasiannya lebih mudah jika dibandingkan dengan pengaplikasian pupuk organik padat, unsur hara yang terdapat di dalam pupuk cair mudah diserap tanaman. Pupuk organik cair umumnya tidak merusak tanah dan tanaman walaupun digunakan sesering mungkin. Selain itu, pupuk ini juga memiliki bahan pengikat, sehingga larutan pupuk yang diberikan ke permukaan tanah bisa digunakan tanaman secara langsung. Pupuk Organik Cair (POC) dalam proses pembuatannya memerlukan waktu yang lebih cepat dari pupuk organik padat, dan penerapannya lebih mudah hanya disemprotkan ke tanaman kentang (*S. tuberosum* L.) (Mestika, 2015).

Berdasarkan penelitian Khasanah (2011) merek dan konsentrasi pupuk daun berpengaruh signifikan terhadap jumlah daun, luas daun, jumlah planlet anggrek serta pada pupuk Hyponex dengan konsentrasi 2 g/l berpengaruh pada pertumbuhan planlet.

Pupuk hayati paling baik didefinisikan sebagai produk aktif biologis atau inokulan mikroba yaitu, formulasi yang mengandung satu atau lebih bakteri menguntungkan atau strain jamur dalam bahan pembawa yang mudah digunakan dan ekonomis yang menambah, melestarikan dan memobilisasi unsur hara tanaman di dalam tanah. Dengan kata lain, pupuk hayati adalah zat yang mengandung mikroorganisme hidup yang bila diaplikasikan pada benih, permukaan tanaman, atau tanah mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan ketersediaan nutrisi primer bagi tanaman inang. Menurut Hazra (2016) pupuk organik mengandung senyawa organik yang secara langsung atau melalui pembusukannya meningkatkan kesuburan tanah (Mazid, 2014).

#### ***E. Tinjauan Umum Klorofil***

Klorofil secara istilah diperkenalkan pada tahun 1818 yang berasal dari bahasa chloros yang mempunyai arti hijau dan phyllos yang memiliki arti daun. Klorofil merupakan pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga dan bakteri fotosintetik. Klorofil terletak atau ditemukan di dalam kloroplas, dan salah satu faktor utama yang memiliki pengaruh bagi fotosintesis. Fotosintesis adalah proses perubahan senyawa anorganik ( $\text{CO}_2$  dan  $\text{H}_2\text{O}$ ) menjadi senyawa organik (karbohidrat) dan  $\text{O}_2$  dengan bantuan cahaya matahari. Klorofil disintesis di daun dan berperan untuk menangkap

cahaya matahari yang jumlahnya berbeda untuk tiap spesies. Sintesis klorofil dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cahaya, gula atau karbohidrat, air, temperatur, faktor genetik, unsur-unsur hara seperti N, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, S dan O (Song, 2010).

Dalam proses fotosintesis klorofil mempunyai 3 fungsi utama diantaranya dapat memanfaatkan energi matahari, memicu fiksasi CO<sub>2</sub> penghasil karbohidrat dan menyediakan energi untuk ekosistem secara keseluruhan. Karbohidrat yang dihasilkan dalam fotosintesis diubah menjadi protein, lemak, asam nukleat dan molekul organik lainnya. Klorofil menyerap cahaya yang berupa radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata (visible). Cahaya matahari mengandung semua warna spektrum kasat mata dari merah sampai violet, tetapi tidak semua panjang gelombang diserap dengan baik oleh klorofil. Klorofil dapat menampung cahaya yang diserap oleh pigmen lainnya melalui fotosintesis, sehingga klorofil disebut sebagai pigmen pusat reaksi fotosintesis (Gogahu, 2016).

Tanaman tingkat tinggi memiliki dua macam klorofil yaitu klorofil a (C<sub>55</sub>H<sub>72</sub>O<sub>5</sub>N<sub>4</sub>Mg) dan klorofil b (C<sub>55</sub>H<sub>70</sub>O<sub>6</sub>N<sub>4</sub>Mg), pada klorofil a mempunyai warna hijau tua dan klorofil b berwarna hijau muda. Klorofil a dan klorofil b paling kuat menyerap cahaya di bagian merah dengan panjang gelombang (600- 700 nm), dan paling sedikit menyerap cahaya hijau (500-600 nm). Klorofil a adalah pigmen terpenting yang digunakan dalam proses fotosintesis, berperan penting dalam reorganisasi fotosistem selama adaptasi terhadap kualitas dan intensitas cahaya sedangkan klorofil b adalah pigmen sekunder, hasil biosintesis dari klorofil a. Tugas dari klorofil a adalah menyerap cahaya berbeda dengan klorofil b bertugas

mengumpulkan cahaya dan diteruskan ke klorofil a untuk proses fotosintesis (Sumenda, 2011).

Tabel 2.1. Perbandingan pigmen klorofil a dan klorofil b

Aspek	Klorofil a	Klorofil b
Rumus kimia	$C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$	$C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$
Gugus pengikat	CH <sub>3</sub>	CH
Cahaya yang diserap	cahaya biru violet dan merah	cahaya biru dan orange
Absorpsi maksimum	pada $\lambda$ 673 nm	pada $\lambda$ 455-640 nm


#### F. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Input**



- Kentang (*Solanum tuberosum* L. cv. Granola) adalah salah satu komoditi hortikultura penting di Indonesia yang diusahakan secara komersial terutama di daerah dataran tinggi. Kentang (*S. tuberosum* L.) adalah makanan pokok terbesar keempat yang ada di dunia setelah padi, gandum dan jagung. Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) memiliki nilai jual yang cukup tinggi.
- Akar pakis dan arang sekam termasuk media tanam yang kaya akan unsur hara dan mudah mengikat air. Pupuk organik cair merupakan pupuk yang pengaplikasiannya disemprotkan melalui daun dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah daun, luas daun dan kandungan klorofil daun tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola).



### ***G. Hipotesis***

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat efek penggunaan kombinasi media tanam akar pakis serta arang sekam dan pupuk organik cair (POC) pada tahap aklimatisasi terhadap pertumbuhan planlet kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) hasil kultur jaringan, dengan pemberian konsentrasi media yang berbeda dan penambahan pupuk organik (POC).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menunjukkan hubungan antar variabel. Pendekatan penelitian berupa eksperimental yang menerapkan prinsip-prinsip pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen.

#### ***B. Waktu dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Juli 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium PB. Paguyuban Putra/Malino Floris, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan.

#### ***C. Variabel Penelitian***

Penelitian ini memiliki 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu konsentrasi kombinasi media tanam dan pupuk organik cair (POC), sedangkan variabel terikat yaitu pertumbuhan kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) meliputi tinggi tanaman, panjang daun, dan jumlah daun serta klorofil.

#### ***D. Defenisi Operasional Variabel***

Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kombinasi media tanam yaitu kombinasi penggunaan arang sekam dan akar pakis yang berbeda untuk diamati pengaruhnya terhadap tinggi tanaman,

2. panjang daun, jumlah daun, dan kandungan klorofil daun tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola).
3. Pupuk organik cair (POC) adalah pupuk yang menggunakan hasil sampah organik rumah tangga seperti sisa sayuran (sawi, kol, tomat, daun singkong dan kulit pisang) sebanyak 1,5 kg, buah (anggur, kulit jeruk, dan apel) sebanyak 5 kg, sisa tanaman paitan (*Tithonia diversifolia*) serta kacang-kacangan sebanyak 2,5 kg, dan urine sapi (*Bos taurus*) sebanyak 1 liter kemudian dimasukkan ke dalam drum plastik selanjutnya ditambahkan air sebanyak 10 l, EM4 sebanyak 10 cc. lalu didiamkan selama 14 hari. Lalu diaplikasikan pada tanaman pada minggu kedua setelah tanam dengan penerapan 2 x dalam satu minggu. Pupuk organik cair (POC) diaplikasikan dengan konsentrasi 6 ml/l.
4. Pertumbuhan tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) adalah perubahan yang dapat dilihat dari pertumbuhan tinggi tanaman, luas daun, dan jumlah daun. Adapun kriteria ukuran planlet yang digunakan yaitu 6 cm.

## **E. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)**

### **1. Alat**

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu alat sterilisasi seperti autoklaf, alat pembuatan pupuk organik cair (POC) seperti ember, botol sampel, pengaduk sampah, pisau, gelas ukur 10 ml, timbangan, pipet tetes, penggaris, polybag, *hand sprayer*, nampan, papan kode perlakuan, kode ulangan, plat tanaman sampel, alat analisis kadar klorofil seperti cawan porselin, *centrifuge*, tabung reaksi, rak tabung,

neraca analitik, corong, kertas saring dan spektrofotometer, serta alat tambahan seperti piper klip, kertas tissue, *handscoon*, alat tulis menulis dan kamera.

## 2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola), aquades, larutan fungisida, bioaktivator EM<sub>4</sub> 10 cc, sampah organik rumah tangga, pupuk organik cair (POC), arang sekam dan akar pakis.

### F. Metode Pengumpulan Data

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pengamatan pada objek penelitian. Rancangan yang digunakan adalah RAL (Rancangan Acak Lengkap) Faktorial dengan 2 faktor penelitian dan 4 kali ulangan, sehingga total terdapat 48 unit percobaan. Unit penelitian ini adalah sebagai berikut: Media tanam akar pakis dan arang sekam dapat menggantikan tanah dalam media pertumbuhan serta POC dapat secara cepat mengatasi defisiensi hara, pengaplikasiannya lebih mudah jika dibandingkan dengan pengaplikasian pupuk organik padat.

konsentrasi perbandingan media dan konsentrasi air (Koko, 2020 dengan modifikasi)

M0P1 = arang sekam 100%+air 6 ml

M1P1 = arang sekam 95%+akar pakis 5%+air 6 ml

M2P1 = arang sekam 85%+akar pakis 15%+air 6 ml

M3P1 = arang sekam 75%+akar pakis 25%+air 6 ml

M4P1 = arang sekam 50%+akar pakis 50%+air 6 ml

M5P1 = arang sekam 25%+akar pakis 75%+air 6 ml

konsentrasi perbandingan media dan POC

M0P2 = arang sekam 100%+POC 6 ml

M1P2 = arang sekam 95%+akar pakis 5%+POC 6 ml

M2P2 = arang sekam 85%+akar pakis 15%+POC 6 ml

M3P2 = arang sekam 75%+akar pakis 25%+POC 6 ml

M4P2 = arang sekam 50%+akar pakis 50%+POC 6 ml

M5P2 = arang sekam 25%+akar pakis 75%+POC 6 ml

Masing-masing tahap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 4 x, dan untuk satu polybag terdiri dari satu planlet kentang (*S. tuberosum* L.). Percobaan penelitian dengan Diberi label A, B, C, D sebagai kode ulangan dari masing-masing kombinasi perlakuan, sebagaimana *layout* penelitian berikut:

M3P1A	M3P2A	M4P1B	M4P2B	M5P1C	M5P2C	M1P1D	M1P2D
M3P1A	M3P2A	M0P1B	M0P2B	M2P1C	M2P2C	M3P1D	M3P2D
M2P1A	M2P2A	M2P1B	M2P2B	M4P1C	M4P2C	M4P1D	M4P2D
M4P1A	M4P2A	M1P1B	M1P2B	M0P1C	M0P2C	M2P1D	M2P2D
M3P1A	M3P2A	M5P1B	M5P2B	M5P1C	M5P2C	M0P1D	M0P2D
M0P1A	M0P2A	M1P1B	M1P2B	M5P1C	M5P2C	M1P1D	M1P2D

Gambar 3.1 *Layout* Percobaan

Pemeliharaan, pengamatan serta pengukuran data parameter pertumbuhan kentang dilakukan di *greenhouse*, parameter pertumbuhan tersebut adalah:

1. Tinggi tanaman (cm) diamati setiap minggunya, dari minggu ke-1 hingga minggu ke-4 setelah tanam, yang diukur dari pangkal batang tanaman sampai ujung daun tertinggi dengan menggunakan meteran.
2. Panjang daun, yang diukur dari pangkal daun hingga ujung daun dengan menggunakan penggaris/ meteran. Dihitung pada akhir penelitian yaitu 4 minggu setelah tanam.
3. Jumlah daun (helai) dihitung berdasarkan jumlah daun yang muncul pada akhir penelitian yaitu 4 minggu setelah tanam.
4. Pengujian kandungan klorofil dilakukan pada daun planlet yang tumbuh pada akhir pengamatan.

### ***G. Prosedur Kerja***

Adapun prosedur kerja berdasarkan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Sterilisasi alat

Sebelum melakukan sterilisasi pada alat-alat yang digunakan maka alat-alat seperti botol media, pinset, gunting, pengaduk sampah, botol semprot, pisau, corong, saringan, gelas ukur dicuci sampai bersih kemudian dibungkus menggunakan plastik buah. Setelah itu disiapkan autoklaf dan diisi air secukupnya kemudian memasukkan alat-alat yang sudah dibungkus oleh plastik buah lalu disterilisasi. Selanjutnya, ditunggu hingga tekanan mencapai 17.5 pada suhu 121°C dan tahan selama 60 menit pada tekanan tersebut, setelah itu mematikan autoklaf. Alat yang telah disterilisasi yang

tidak digunakan langsung disimpan pada tempat penyimpanan yang steril agar tidak mudah terkontaminasi.

Menurut Rodinah (2018) mengatakan bahwa sterilisasi perlu dilakukan agar menghindari kontaminasi bakteri pada bahan tanaman yang dikulturkan dengan menggunakan alat besi yang tidak steril.

## 2. Pembuatan pupuk organik cair (POC)

Disiapkan alat dan bahan berupa hasil sampah organik rumah tangga seperti sisa sayuran (sawi, kol, tomat, daun singkong dan kulit pisang) sebanyak 5 kg, buah (anggur, kulit jeruk, dan apel) sebanyak 1,5 kg, sisa tanaman paitan (*Tithonia diversifolia*) sebanyak 1 kg, dan urine kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) sebanyak 1 liter kemudian dimasukkan ke dalam drum plastik 10 liter selanjutnya ditambahkan air sebanyak 15 liter, EM4 sebanyak 15 cc. lalu didiamkan selama 14 hari. Lalu diaplikasikan pada tanaman pada minggu kedua setelah tanam dengan penerapan 2 x dalam satu minggu dan konsentrasi POC yang diterapkan 6 ml/l (Maria, 2014).

## 3. Aklimatisasi

Pada tahap aklimatisasi, yaitu disiapkan tanaman kentang (*S. tuberosum* L.) sebanyak 10 botol yang sudah lengkap seperti akar, batang dan daunnya dengan tinggi tanaman 6 cm, lalu di keluarkan menggunakan scalpel, kemudian dibersihkan daun yang kering serta media yang masih melengket pada planlet dengan cara direndam menggunakan aquades dan air biasa/air mengalir, lalu diaplikasikan pada berbagai media tanam dengan konsentrasi yang telah ditentukan.

Edhi Sandra (2012) menyatakan bahwa langkah awal tahapan aklimatisasi adalah siapkan alat dan bahan. Dikeluarkan planlet dari dalam botol dan disiram dengan air mengalir untuk membersihkan sisa media dan tiriskan serta bersihkan daun yang kering

#### 4. Persiapan media tanam dan air

Pada persiapan media tanam, terlebih dahulu akar pakis disangrai dengan uap panas selama 2 jam hingga menjadi cacahan halus. Lalu setelah itu diangkat lalu didinginkan, disiapkan juga arang sekam kemudian sebelum dimasukkan ke dalam polibag masing-masing bahan media tanam dicampur aduk sesuai dengan konsentrasi perbandingan media tanam diantaranya polybag 1 M0 = arang sekam 100%+air, polybag selanjutnya dengan konsentrasi M1 = arang sekam 95%+akar pakis 5%+air, polybag selanjutnya dengan konsentrasi M2 = arang sekam 85%+akar pakis 15%+air, polybag selanjutnya dengan konsentrasi M3 = arang sekam 75%+akar pakis 25%+air, polybag selanjutnya dengan konsentrasi M4 = arang sekam 50%+akar pakis 50%+air polybag terakhir dengan konsentrasi M5 = arang sekam 25%+ akar pakis 75%+air. Masing-masing diberi ulangan sebanyak 4x.

Rini (2019) menyatakan bahwa media tanam yang terdiri dari akar pakis, arang sekam padi dan kompos kopi dipisahkan dan dimasukkan ke dalam wadah pot. Tapi sebelumnya media harus disterilisasi dengan mengukus dan menggongseng. Media sekam kopi dan sekam padi digongseng selama  $\pm 45$  menit dan akar pakis dikukus selama  $\pm 30$  menit.

## 5. Penanaman

Planlet kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) dikeluarkan dari dalam botol hasil kultur jaringan, planlet kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) direndam pada larutan fungisida dengan waktu 10-15 menit, planlet kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) dibersihkan dari sisa daun yang kering, planlet kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) ditanam di dalam polybag yang terdiri dari media tanam akar pakis dan arang sekam sesuai dengan volume konsentrasinya, kemudian disimpan pada *greenhouse*.

Menurut Edhi (2012) bahwa untuk membuat tanaman menjadi steril agar dapat dijadikan eksplan, dikeluarkan dari botol, kemudian disterilkan menggunakan fungisida dan memotong bagian tanaman yang sudah menguning.

## 6. Pemeliharaan tanaman

Pada tahap pemeliharaan tanaman pada penelitian ini ada tiga jenis pemeliharaan yaitu, penyemprotan POC, penyiraman serta penyiangan. Perlakuan pertama yaitu penyemprotan POC dengan konsentrasi 6 ml/l diaplikasikan dengan cara dimasukkan ke *hand sprayer* lalu disemprotkan ke daun dengan waktu ideal 2 x dalam seminggu, pemupukan diberikan setelah tanaman ditanam sekitar umur 1 minggu. Perlakuan kedua yaitu penyiraman tanaman dilakukan 2 x dalam sehari dengan waktu pagi pukul 06.00-09.00 WIB. Serta pemeliharaan yang terakhir adalah penyiangan dilakukan dengan cara memberantas gulma, agar air menjadi lancar untuk masuk ke guludan.

Hal ini sesuai pernyataan Koko (2020) mengatakan bahwa penyiraman harus dilakukan secara rutin dua atau tiga hari sekali atau bisa bila tanaman tampak kering maka tanaman bisa disemprot lagi.

#### 7. Pengamatan

Pengamatan dilakukan dengan mengamati pertambahan tinggi planlet (cm) dihitung setelah dilakukan pengaplikasi POC dan diukur dari pangkal batang sampai titik tumbuh dengan memakai penggaris. Diamati setiap minggunya. Dari minggu ke-1 hingga minggu ke-4, selanjutnya pengamatan pada pertambahan Panjang daun (cm), diukur pada helaian daun terpanjang dengan menggunakan alat penggaris/meteran. Dihitung pada akhir penelitian yaitu 4 minggu setelah tanam. selanjutnya pengamatan pertambahan jumlah daun yang muncul dihitung setelah akhir penelitian.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Rini (2019) yang mengatakan bahwa tinggi tanaman dapat dilihat ketika diberikan POC dan diukur pada tanaman berumur. Saat tumbuh daun baru, pengamatan dilakukan setiap hari sampai tumbuhnya daun baru. Pertambahan jumlah dan luas daunnya dapat diukur pada minggu ke 2, 4, 6, 8 dan 10.

#### 8. Analisis kadar klorofil

Sampel daun kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) diambil dan diletakkan dalam kantong plastik, kemudian sampel diberi label. Setiap sampel ditimbang menggunakan neraca analitik diusahakan untuk mencapai berat 0,1 gram (100 mg), Sampel yang akan dianalisis, diekstrak terlebih dahulu menggunakan ethanol 96%. Sebanyak 0,1 gram sampel dan 2 mL pelarut dimasukkan ke dalam cawan porselin,

kemudian dihaluskan dengan cara digerus menggunakan alu. Lalu sampel yang telah digerus tersebut dimasukkan ke dalam gelas ukur. Setelah itu, lumpang dan alu yang telah digunakan untuk menghaluskan sampel, dibilas dengan 1,5 mL pelarut sebanyak tiga kali. tujuannya untuk melarutkan sisa-sisa sampel yang masih tertinggal. Pelarut yang digunakan untuk membilas sisa-sisa sampel yang terdapat pada lumpang dan alu tersebut, dimasukkan bersama-sama dengan sampel yang telah dihaluskan dengan pelarut tadi ke dalam gelas ukur. Ekstrak tersebut ditera hingga mencapai volume 8 mL. Lalu ekstrak tersebut dimasukkan ke dalam tabung centrifuge dan disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2.500 rpm. Supernatan yang diperoleh diencerkan menjadi 1 mL ekstrak dilarutkan ke dalam 4 mL ethanol 96% dan dibaca absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis (Shimadzu UV-Vis 1800) pada panjang gelombang 649 nm dan 665 nm. Penghitungan kadar klorofil (mg/L) ditentukan dengan rumus:

Pelarut ethanol 96 % (Wintermans, 1965)

$$\text{Klo. a} = 13,7 D-665 - 5,76 D-649 \text{ (mg/ l)}$$

$$\text{Klo. b} = 25,8 D-649 - 7,60 D-665 \text{ (mg/ l)}$$

$$\text{Total klorofil} = 20,0 D-649 + 6,10 D-665 \text{ (mg/ l)}$$

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kamagi (2017) Sampel diambil dari setiap bagian tersebut dengan cara dipotong dengan menggunakan *one hole punch* sebanyak 10-11 potongan, tergantung pada berat sampel tersebut. Setiap sampel diusahakan untuk mencapai berat 0,1 gram (100 mg). Selanjutnya sampel segera diberi label dan diletakkan dalam kantong plastik, kemudian sampel tersebut dimasukkan ke dalam lemari pendingin.

## H. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 16 dengan uji *One way* ANOVA yang dilanjutkan dengan uji Duncan untuk mengetahui pengaruh kombinasi arang sekam, pakis dan POC terhadap beberapa parameter pertumbuhan tanaman kentang (*S. tuberosum* L.). Data yang akan diuji *One Way* ANOVA harus berdistribusi normal dan homogen. Sehingga sebelum dilakukan pengujian dengan uji ANOVA, harus diuji normalitas *Kalmogorov smirnov* dan uji homogenitas terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengujian dan hasil menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan homogen, maka dapat dilanjutkan dengan uji ANOVA dan Duncan. Kemudian dilanjutkan uji korelasi untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Interpretasi terhadap kuatnya hubungan korelasi berpedoman pada pendapat Sugiyono (2011) yang mengatakan bahwa interval koefisien dan tingkat hubungan 0,00-0,09 hubungan korelasi diabaikan; 0,10-0,29 hubungan korelasi rendah; 0,30-0,49 hubungan korelasi moderat; 0,50-0,70 hubungan korelasi sedang; di atas 0,70 hubungan korelasi sangat kuat. Kemudian data disajikan dalam bentuk tabel dan deskripsi hasil.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Pengamatan parameter penelitian terhadap seluruh *polybag* yang merupakan unit-unit eksperimen dengan kombinasi media tanam dan pupuk organik cair yaitu kombinasi penggunaan arang sekam dan akar pakis dengan pupuk organik cair (POC). Konsentrasi perbandingan media tanam dan konsentrasi POC secara berturut-turut adalah M0 = arang sekam 100%+POC 6 ml; M1 = arang sekam 95%+akar pakis 5%+POC 6 ml; M2 = arang sekam 85%+akar pakis 15%+POC 6 ml; M3 = arang sekam 75%+akar pakis 25%+POC 6 ml; M4 = arang sekam 50%+akar pakis 50%+POC 6 ml; M5 = arang sekam 25%+akar pakis 75%+POC 6 ml. Masing-masing kombinasi perlakuan tersebut diduplikasi menggantikan POC dengan air dengan konsentrasi yang sama. Adapun *layout* pemeliharaan planlet kentang unit eksperimen adalah sebagai berikut:




Gambar 4.1 Planlet Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) diberikan perlakuan perbandingan media tanam arang sekam, pakis dan POC dan konsentrasi perbandingan media dan air (Dokumentasi pribadi, 2021).

Data hasil pengukuran parameter pertumbuhan planlet kentang pada tahap aklimatisasi dengan penggunaan kombinasi arang sekam, pakis dan POC yang telah dilakukan setelah 3 MST, diolah menggunakan SPSS dengan analisis ragam (*Analysis of Variences*).

Hasil analisis sidik ragam diketahui bahwa penggunaan kombinasi arang sekam, pakis dan POC diperoleh hasil yang tidak berbeda nyata pada parameter tinggi tanaman (cm) karena nilai signifikan pada  $P > 0,05$  sehingga tidak dilanjutkan dengan uji lanjut BNT. Namun pada parameter pertumbuhan panjang daun (cm) dan jumlah helai daun tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) mengindikasikan perbedaan yang nyata  $P < 0,05$  sehingga dilanjutkan dengan uji lanjut BNT, dan uji korelasi untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel tersebut.

### 1. Tinggi Tanaman

Hasil pengamatan tinggi tanaman pada planlet Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola). Masa pertumbuhan 3 MST pada beberapa perbandingan konsentrasi media dan POC dapat dilihat pada gambar berikut.




Keterangan: M0P1: Kontrol, M1P1: Arang sekam 95%+ akar pakis 5%+air 6 ml, M2P1: Arang sekam 85%+ akar pakis 15%+ air 6 ml, M3P1: Arang sekam 75%+ akar pakis 25%+ air 6 ml, M4P1: Arang sekam 50%+ akar pakis 50%+ air 6 ml, M5P1: Arang sekam 25%+ akar pakis 75%+ air 6 ml, M0P2: Arang sekam 100%+POC 6 ml, M1P2: Arang sekam 95%+ akar pakis 5%+ POC 6 ml, M2P2: Arang sekam 85%+ akar pakis 15%+ POC 6 ml, M3P2: Arang sekam 75%+ akar pakis 25%+ POC 6 ml, M4P2: Arang sekam 50%+ akar pakis 50%+ POC 6 ml, M5P2: Arang sekam 25%+ akar pakis 75%+ POC 6 ml

Gambar 4.2. Rata-rata tinggi tanaman Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola). Notasi huruf yang sama menunjukkan perbedaan tidak signifikan pada tiap perlakuan

Dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa M5P2 (arang sekam 25%+akar pakis 75%+POC 6 ml) menghasilkan tinggi tanaman tertinggi dengan rata-rata 7,45 cm dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan perlakuan M4P1 (arang sekam 50%+akar pakis 50%+air 6 ml/l) menunjukkan tinggi tanaman terendah dengan rata-rata 6,25 cm. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan uji Anova yang disajikan dalam lampiran 5.

## 2. Panjang Daun

Hasil pengamatan jumlah tunas pada planlet tanaman Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola). Masa pertumbuhan 3 MST setelah penanaman dengan menggunakan beberapa perlakuan media tanam dan konsentrasi POC 6 ml/l serta perlakuan media tanam dan konsentrasi air 6 ml/l dapat dilihat pada gambar 4.3.




Keterangan: M0P1: Kontrol, M1P1: Arang sekam 95%+ akar pakis 5%+air 6 ml, M2P1: Arang sekam 85%+ akar pakis 15%+ air 6 ml, M3P1: Arang sekam 75%+ akar pakis 25%+ air 6 ml, M4P1: Arang sekam 50%+ akar pakis 50%+ air 6 ml, M5P1: Arang sekam 25%+ akar pakis 75%+ air 6 ml, M0P2: Arang sekam 100%+POC 6 ml, M1P2: Arang sekam 95%+ akar pakis 5%+ POC 6 ml, M2P2: Arang sekam 85%+ akar pakis 15%+ POC 6 ml, M3P2: Arang sekam 75%+ akar pakis 25%+ POC 6 ml, M4P2: Arang sekam 50%+ akar pakis 50%+ POC 6 ml, M5P2: Arang sekam 25%+ akar pakis 75%+ POC 6 ml

Gambar 4.3. Rata-rata Panjang daun tanaman Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola). Notasi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan signifikan pada tiap perlakuan

Dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa M1P2 (arang sekam 95%+akar pakis 5%+POC 6 ml) menghasilkan luas daun tertinggi dengan rata-rata 1,65 cm dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan pada perlakuan M4P1 (arang sekam 50%+akar pakis 50%+air 6 ml/l) menunjukkan dengan jumlah rata-rata luas daun yaitu 0,325 cm. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan uji Anova yang disajikan dalam lampiran 6, dilanjutkan uji BNT dan uji korelasi pada lampiran 6.

### 3. Jumlah Daun

Adapun hasil pengamatan jumlah daun planlet tanaman Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola). Pada masa pertumbuhan 3 MST setelah penanaman dengan menggunakan perlakuan media tanam dan konsentrasi POC 6 ml/l serta perlakuan media tanam dan konsentrasi air 6 ml/l dapat dilihat pada gambar 4.4.




Keterangan: M0P1: Kontrol, M1P1: Arang sekam 95%+ akar pakis 5%+air 6 ml, M2P1: Arang sekam 85%+ akar pakis 15%+ air 6 ml, M3P1: Arang sekam 75%+ akar pakis 25%+ air 6 ml, M4P1: Arang sekam 50%+ akar pakis 50%+ air 6 ml, M5P1: Arang sekam 25%+ akar pakis 75%+ air 6 ml, M0P2: Arang sekam 100%+POC 6 ml, M1P2: Arang sekam 95%+ akar pakis 5%+ POC 6 ml, M2P2: Arang sekam 85%+ akar pakis 15%+ POC 6 ml, M3P2: Arang sekam 75%+ akar pakis 25%+ POC 6 ml, M4P2: Arang sekam 50%+ akar pakis 50%+ POC 6 ml, M5P2: Arang sekam 25%+ akar pakis 75%+ POC 6 ml

Gambar 4.4. Rata-rata jumlah daun tanaman Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) Notasi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan signifikan pada tiap perlakuan

Dari gambar 4.4 menunjukkan bahwa M1P2 (arang sekam 95%+akar pakis 5%+POC 6 ml/l) menghasilkan jumlah daun terbanyak dengan rata-rata 12,75 helai daun dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan pada perlakuan M4P1 (arang sekam 50%+akar pakis 50%+air 6 ml/l) dan M5P1 (arang sekam 25%+akar pakis 75%+air 6 ml/l) menunjukkan dengan rata-rata jumlah daun yang sama paling sedikit yaitu 0,75 helai daun. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan uji Anova yang disajikan dalam lampiran 7, dilanjutkan uji BNT dan uji korelasi pada lampiran 7.

#### 4. Analisis Uji Klorofil

Adapun hasil pengamatan kandungan klorofil a, klorofil b dan klorofil total pada planlet tanaman Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola). Pada masa pertumbuhan 3 MST setelah penanaman dengan menggunakan beberapa perlakuan media tanam dan konsentrasi POC 6 ml/l serta perlakuan media tanam dan konsentrasi air 6 ml/l dapat dilihat pada gambar 4.5.



Keterangan: MP1: Media tanam + air 6 ml/l; MP2: Media tanam + POC 6 ml/l

Gambar 4.5. Pengaruh konsentrasi media tanam arang sekam, akar pakis, POC 6 ml/l dan air terhadap kandungan klorofil a, klorofil b dan total klorofil tanaman Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) 3 MST

Dari gambar 4.5 menunjukkan bahwa MP2 (Media tanam+POC 6 ml/l) menghasilkan kandungan klorofil a, klorofil b dan kandungan klorofil terbanyak dibandingkan dengan perlakuan MP1 (Media tanam+air 6 ml/l).

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penggunaan media tanam arang sekam, akar pakis dan POC menunjukkan hasil yang berbeda-beda dengan semua perlakuan, dimana ada 4 parameter pengamatan pertumbuhan yang diukur yaitu tinggi tanaman (cm), luas daun (cm), jumlah daun (helai) dan kandungan klorofil daun tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola).

Perbanyakan tanaman melalui teknik kultur jaringan dilakukan dengan mengisolasi bagian tanaman, lalu ditumbuhkan dalam media aseptik sehingga dapat menghasilkan tanaman baru yang dapat ditanam (aklimatisasi) pada media non-aseptik, proses aklimatisasi merupakan suatu upaya mengkondisikan planlet hasil perbanyakan melalui kultur in vitro ke lingkungan in vivo yang aseptik. Aklimatisasi adalah proses yang penting dalam rangkaian aplikasi teknik kultur jaringan untuk mendukung pengembangan pertanian (Hardiyati, 2017).

Sebelum melakukan proses aklimatisasi media tanam yang akan digunakan sebaiknya yang halus dan lunak, sehingga akar bisa tumbuh optimal. Media aklimatisasi berupa sekam bakar, serbuk pakis, moss atau akar pakis. Prinsipnya, media tersebut harus cukup halus, dapat memegang air dengan baik, serta bebas dari jamur dan penyakit. Media arang sekam dapat mempertahankan kelembaban sehingga memacu pertumbuhan mikroorganisme yang mampu menyuburkan tanah sedangkan akar pakis mampu mengikat dan menyimpan air dengan baik, melapuk perlahan serta mengandung hara. Faktor aklimatisasi sangat dipengaruhi oleh media tanam yang

digunakan, karena tidak semua media tanam dapat menjamin keberhasilan aklimatisasi yang sangat rentan terhadap berbagai faktor penghambat pertumbuhan tanam (Edhi Sandra, 2012).

Kurang termanfaatkannya pupuk organik saat ini menjadi masalah bagi kesuburan tanah dikarenakan masyarakat yang sudah sangat ketergantungan dengan pupuk buatan yang mengandung zat-zat kimia yang tinggi, sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan terutama pencemaran lahan tanaman kentang yang mengakibatkan lahan tanaman tandus dan stress sehingga tanaman sukar berkembang dengan baik, dan juga gangguan terhadap kesehatan. Hal inilah yang menyebabkan semakin rendahnya produksi kentang karena tidak adanya keseimbangan alam antara lahan dan tanaman pertanian. Solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini adalah dengan memanfaatkan bahan organik, kelebihan dari POC dapat secara cepat mengatasi defisiensi hara, mempertahankan klorofil daun, pengaplikasiannya lebih mudah, dan sangat efektif digunakan untuk pertumbuhan tanaman kentang (*S.tuberosum* L. cv. Granola) (Maria, 2014).

### **1. Tinggi Tanaman (cm)**

Tinggi tanaman diukur dari 1-MST hingga 3-MST pengamatan dengan cara mengukur dari bagian pangkal hingga ujung planlet. Data hasil penelitian pada gambar 4.2, dapat dilihat rata-rata tinggi planlet pada minggu terakhir yang tertinggi yaitu 7,45 cm pada perlakuan M5P2 (arang sekam 25%+akar pakis 75%+POC 6 ml/l) dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

Penggunaan media tanam berupa arang sekam 25% dan akar pakis 75% serta pemberian POC 6 ml/l memberi pengaruh sebagaimana yang ada pada tabel 4.2. Hasil penelitian Koko (2020) juga mengemukakan bahwa aplikasi media tanam berupa arang sekam 25% dan akar pakis 75% memberikan respon tanaman yang terbaik. Arang sekam mempunyai sifat yang mudah mengikat air, tidak mudah menggumpal, harganya relatif murah, bahannya mudah didapat, ringan, steril dan mempunyai porositas yang baik. Selain itu, akar pakis mampu mengikat dan menyimpan air dengan baik sehingga dengan ketersediaan nutrisi yang cukup bagi tanaman menghasilkan pula energi yang besar untuk mendorong pemanjangan sel dan merangsang pertumbuhan tinggi planlet.

Uji statistik *One Way* ANOVA dapat dilakukan setelah dipastikan data hasil penelitian berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Oleh karena itu dilakukan uji normalitas *Kalmogorov smirnov* untuk melihat apakah data hasil penelitian terdistribusi normal atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan data memiliki varian yang sama (homogen). Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, maka dapat dilakukan uji *One Way* ANOVA.

Adapun hasil pengamatan pada penelitian ini terhadap parameter tinggi tanaman menurut uji anova menunjukkan perlakuan M5P2: Arang sekam 25%+ akar pakis 75%+ POC 6 ml nilai signifikansi yaitu  $0,350 > 0,05$ , sehingga dapat dikatakan tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman tanaman Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) yang digunakan pada tahap aklimatisasi. Media tanam yang digunakan tersebut cenderung memperlihatkan pertumbuhan yang seragam terhadap tinggi setek

mikro yang dihasilkan, diduga karena media tanam telah mengandung bahan organik yang cukup bagi pertumbuhan setek mikro tanaman kentang. Terutama unsur hara nitrogen (N) yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara menyeluruh, terutama batang dan cabang yang berkaitan erat dengan tinggi tanaman setek mikro. Begitupun dengan uji korelasi didapatkan hasil  $R = 0,203$  jumlah ini menunjukkan hasil yang dibawah dari ambang batas nilai minimum dengan kata lain memberikan hubungan korelasi yang rendah.

Hal ini sejalan dengan teori Kurniawan (2017) mengatakan unsur nitrogen (N) yang terkandung pada media tanam relatif lebih tinggi, sangat bagus apabila media arang sekam 100% dan tanah 100% tersebut digunakan untuk mempercepat pertumbuhan tinggi tanaman.

## **2. Panjang Daun**

Daun pertama pada tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) berupa daun tunggal, daun selanjutnya berupa daun majemuk imparipinnate dengan anak daun primer dan anak daun sekunder. Posisi tangkai daun utama terhadap batang bervariasi. Pada tangkai daun utama terletak helaian anak daun primer dan sekunder yang berbeda-beda. Pada dasarnya, daun majemuk kentang mempunyai tunas ketiak yang dapat berkembang menjadi cabang sekunder dengan sistem percabangan simpodial. Panjang tangkai daun 2,0-4,0 cm.

Dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa M1P2 (arang sekam 95%+akar pakis 5%+POC 6 ml/l) menghasilkan panjang daun tertinggi dengan rata-rata 1,65 cm

dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan pada perlakuan M4P1 (arang sekam 50%+akar pakis 50%+air 6 ml) menunjukkan dengan jumlah rata-rata luas daun yaitu 0,325 cm.

Hal diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sudarsono (2014) yang menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan arang sekam 50%-100% berpotensi memiliki pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan penambahan panjang akar yang dijadikan parameter dengan nilai rata-rata yaitu 18,14 cm.

Uji statistik *One Way* ANOVA dapat dilakukan setelah dipastikan data hasil penelitian berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Oleh karena itu dilakukan uji normalitas *Kalmogorov smirnov* untuk melihat apakah data hasil penelitian terdistribusi normal atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan data memiliki varian yang sama (homogen). Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, maka dapat dilakukan uji *One Way* ANOVA.

Adapun hasil pengamatan pada penelitian ini terhadap parameter panjang daun tanaman menurut uji anova menunjukkan perlakuan M1P2 memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan luas daun dengan nilai signifikansi  $0,012 < 0,05$ , maka dilanjutkan uji BNT. Karena kemampuan arang sekam dalam menjaga sirkulasi udara dan mempertahankan kandungan air juga di dalam media. Menurut Efriana (2018), air dapat membawa unsur-unsur hara berupa ion-ion makanan yang dibutuhkan tanaman ke daerah perakaran bagian atas dan memudahkan pengisapan unsur-unsur hara tersebut pada akar serta penyebarannya melalui batang. Unsur-unsur hara yang

cukup dan seimbang akan merangsang aktifitas fotosintesis dan sintesa karbohidrat, sehingga panjang daun bertambah. Pada uji BNT ini, secara statistik data yang berpengaruh nyata yaitu pada media M4P1, M1P2, dan M5P2. Akan tetapi secara hasil penelitian atau biologis, pengaruh media tanam yang berpengaruh nyata adalah M1P2 hal ini dikarenakan penambahan konsentrasi yang ditambahkan, telah optimal dengan kebutuhan tanaman sehingga dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Adapun pada uji korelasi dengan melihat dan mengetahui seberapa besar pengaruh media tanam dan POC yang diberikan terhadap tanaman kentang didapatkan hasil  $R = 0,028$  jumlah ini menunjukkan hasil yang dibawah dari ambang batas nilai minimum dengan kata lain memberikan hubungan korelasi yang rendah/lemah (Sugiyono, 2011). Hal ini diduga diakibatkan karena pada proses sterilisasi mengakibatkan kandungan-kandungan zat seperti protein rusak, akibat suhu yang terlalu tinggi.

Konsentrasi media tanam pada perlakuan M1P2 yaitu arang sekam 95%+akar pakis 5%+POC 6 ml/l diduga cukup merangsang pertumbuhan pada tanaman kentang secara *in vivo* karena kedua media tersebut mengandung unsur hara nitrogen (N) yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara menyeluruh sehingga dapat mendorong peningkatan luas daun pada eksplan. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Purwanto (2012) yang menyatakan bahwa arang sekam mengandung unsur Karbon (C) tinggi, Sumber Kalium (K) untuk mengemburkan media tanam, Nitrogen (N), dan mangan (Mn), sehingga untuk menghindari keracunan Mn, pakai pupuk dengan

kandungan Mn sedikit, serta batang pakis mengandung unsur Nitrogen (N), Karbon (C), Hidrogen (H), dan Silika yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman secara menyeluruh baik tinggi tanaman dan luas daun serta jumlah daun.

### **3. Jumlah Daun**

Daun pada tanaman Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola) pada bagian tepinya rata, bentuk ujung daun runcing, warna daun hijau, daun menyirip, dengan bentuk ujung runcing, permukaan daun berbulu. Adapun yang di cuplik atau dijadikan sampel pada pengamatan ini adalah, daun yang sudah jelas bentuknya namun masih tergolong muda karena merupakan hasil aklimatisasi 3 MST.

Dari gambar 4.4 menunjukkan bahwa M1P2 (arang sekam 95%+akar pakis 5%+POC 6 ml/l) menghasilkan jumlah daun terbanyak dengan rata-rata 12,75 helai daun dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sudarsono (2014) mengemukakan bahwa unsur hara yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan daun adalah Nitrogen (N). Konsentrasi Nitrogen (N) yang tinggi menghasilkan daun yang lebih besar dan banyak. Karena Nitrogen (N) yang tersimpan merupakan unsur penting dalam protoplasma dan membantu pembentukan daun dan batang pada tanaman cabai merah keriting, maka pada setiap perlakuan tingkat kandungan Nitrogen (N) yang paling tinggi dapat memperoleh tingkat pertumbuhan jumlah daun yang paling optimal. Media tanam yang paling efektif pada media 2 (1 arang sekam: 3 batang pakis) artinya media akar pakis lebih banyak dibandingkan

konsentrasi arang sekam. Hasil penelitiannya daun menunjukkan dengan jumlah rata-rata 3,7 helai daun.

Hal ini berarti, untuk mendorong pertumbuhan jumlah daun eksplan kentang membutuhkan unsur hara, begitu pula dihindarinya kelebihan unsur hara. Hal ini berbanding lurus dengan teori (Trisna, 2013) bahwa zat pengatur tumbuh akan bekerja dengan baik dalam konsentrasi yang tepat, apabila konsentrasi berlebihan atau kekurangan maka akan mempengaruhi pertumbuhan eksplan.

Dari gambar 4.4 menunjukkan pada perlakuan M4P1 (arang sekam 50%+akar pakis 50%+air 6 ml/l) dan M5P1 (arang sekam 25%+akar pakis 75%+air 6 ml/l) menunjukkan dengan rata-rata jumlah daun yang sama paling sedikit yaitu 0,75 helai daun.

Penambahan POC sampah organik rumah tangga seperti sisa sayuran (sawi, kol, tomat, daun singkong dan kulit pisang) sebanyak 5 kg, buah (anggur, kulit jeruk, dan apel) sebanyak 1,5 kg, sisa tanaman paitan (*Tithonia diversifolia*) sebanyak 1 kg, dan urine kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) sebanyak 1 liter pada media tanam baik berupa tanah, akar pakis, arang sekam maupun pasir memberikan efek baik bagi pertumbuhan tanaman kentang (*S. tuberosum* L) secara keseluruhan.

Hal ini sejalan dengan teori Erickson (2014) bahwa hasil sampah organik rumah tangga yang tidak diolah dengan baik akan memberikan efek pencemaran lingkungan. Lalu tanpa disadari bahwa sampah tersebut masih mengandung kadar air yang tinggi serta mengandung bahan-bahan organik berupa karbohidrat, protein, dan lemak yaitu

salah satunya adalah limbah sayuran dan buah-buahan. Langkah alternatif yang dapat dilakukan untuk mengelola kembali limbah sayuran yaitu dengan mencacah limbah sayuran dengan belender lalu difermentasi dengan bantuan EM4 sehingga menjadi pupuk cair organik. Selain sayuran daun tanaman paitan juga mempunyai manfaat di mampu mengurangi polutan dan menurunkan tingkat jerap P, Al dan Fe aktif, Meningkatkan bobot segar tanaman karena mudah terdekomposisi, menyediakan nitrogen dan unsur hara bagi tanaman, melepaskan unsur NPK tersedia dan meningkatkan unsur P pada tanah sehingga mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman (Sholihah, 2021). Selanjutnya urine kelinci memiliki kandungan unsur hara N, P, dan K masing-masing sebesar lebih tinggi 2,72%, 1,1%, dan 0,5% dibandingkan dengan kotoran dan urine ternak lain seperti sapi, kerbau, domba, kuda, babi, bahkan ayam. Peran nitrogen (N) pada tanaman yaitu unsur N diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan bagian vegetatif tanaman, misal daun, batang dan akar serta berperan vital pada saat tanaman melakukan fotosintesa dengan membentuk klorofil alias zat hijau daun (Sholikhah, 2018).

Kelebihan dari POC dapat secara cepat mengatasi defisiensi hara, mempertahankan klorofil daun, pengaplikasiannya lebih mudah, dan sangat efektif digunakan untuk pertumbuhan tanaman kentang (*S.tuberosum* L. cv. Granola). Konsentrasi POC yang digunakan 6 ml/l meningkatkan kualitas produk kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola), hal ini ditunjukkan karena adanya perubahan tinggi tanaman pada 6, 8 dan 10 minggu setelah tanam, pemberian pupuk organik cair

berpengaruh nyata mempertahankan klorofil daun (durasi daun hijau) yang terlihat pada 50-85 MST (Maria, 2014).

Uji statistik *One Way* ANOVA dapat dilakukan setelah dipastikan data hasil penelitian berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Oleh karena itu dilakukan uji normalitas *Kalmogorov smirnov* untuk melihat apakah data hasil penelitian terdistribusi normal atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan data memiliki varian yang sama (homogen). Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, maka dapat dilakukan uji *One Way* ANOVA.

Adapun hasil pengamatan pada penelitian ini terhadap parameter jumlah daun tanaman menurut uji anova menunjukkan perlakuan M1P2 memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan jumlah daun dengan nilai signifikansi  $0,018 < 0,05$ , maka dilanjutkan uji BNT. Pada uji BNT ini, secara statistik data yang berpengaruh nyata yaitu pada media M1P2 hal ini dikarenakan penambahan konsentrasi yang ditambahkan, sudah sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Adapun pada uji korelasi dengan melihat dan mengetahui seberapa besar pengaruh media tanam dan POC yang diberikan terhadap tanaman kentang didapatkan hasil  $R= 0,029$  jumlah ini menunjukkan hasil yang dibawah dari ambang batas nilai minimum dengan kata lain memberikan pengaruh yang rendah/lemah atau hubungan korelasi antar variabel diabaikan (Sugiyono, 2011).

#### 4. Analisis Uji Klorofil

Pengujian kandungan klorofil dilakukan pada daun planlet yang ditumbuhkan setelah 3 MST.

Dari gambar 4.5 menunjukkan bahwa MP2 (Media tanam+POC 6 ml/l) menghasilkan kandungan klorofil a, klorofil b serta total kandungan klorofil terbanyak dengan nilai rata-rata berturut-turut 6,6983, 2,2564, 8,1679 dibandingkan dengan perlakuan MP1 (Media tanam+air 6 ml/l) dengan nilai rata-rata 5,4126, 1,7783, 7,1824.

Hasil penggunaan media tanam berupa arang sekam dan akar pakis serta POC 6 ml/l menunjukkan adanya kandungan klorofil. Secara fisiologi dari data yang ditampilkan diatas memberikan pengaruh terhadap parameter pengamatan diantaranya tinggi tanaman serta dilihat lagi hasil parameter pengamatan yang memiliki panjang daun dan jumlah daun terbanyak yang menggunakan penambahan POC. Secara morfologi penambahan POC dapat mempengaruhi tinggi planlet 7 cm dengan ciri daun berwarna sedikit lebih hijau pekat dan panjang daun bertambah serta batang agak lebih besar dibandingkan dengan ukuran planlet 6 cm batang masih kecil serta daun berwarna hijau muda. Dengan kombinasi media berturut-turut M5P2, M1P2, serta M1P2. Hal ini dikarenakan penambahan atau penggunaan POC memiliki banyak manfaat, salah satunya dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman. Penggunaan POC sangat berhubungan erat dengan teori dari Karamina (2016) yang menyatakan bahwa pupuk organik cair lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan pupuk anorganik,

penggunaan POC bahan ramah lingkungan yang mengandung mikroorganisme streptomycetes dengan dosis 25 ml mampu menghasilkan pertumbuhan yang optimal pada parameter pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah batang kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola). Pupuk organik cair memberi peluang untuk meningkatkan produksi karena POC akan merangsang pertumbuhan dan menambah jumlah daun yang terbentuk sehingga proses fotosintesis akan menghasilkan lebih banyak fotosintat untuk mendukung proses pembentukan dan pengisian umbi.

Dari 4 parameter yang dilakukan yakni pengamatan tinggi tanaman (cm), panjang daun (cm) dan jumlah daun (helai), serta analisis uji klorofil penggunaan media tanam arang sekam, akar pakis dan POC yang berpengaruh nyata dan dikatakan berhasil hanya pada parameter luas daun (cm) dan jumlah daun (helai). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji anova, uji BNT, dan korelasi yang telah dilakukan. Penggunaan media tanam arang sekam, akar pakis dan POC juga memberikan pengaruh, namun tidak terlalu besar. Faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut karena proses aklimatisasi adalah proses adaptasi tanaman dari dalam botol ke lingkungan luar, secara otomatis suhu, ataupun kelembaban udaranya juga berbeda. Hal ini sejalan dengan teori Danu (2011) mengatakan bahwa proses pada tahapan aklimatisasi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal diantaranya suhu, media, kelembaban, intensitas cahaya serta teknik penanaman planlet. Pada analisis uji klorofil didapatkan hasil penggunaan POC terbaik dibandingkan dengan yang hanya menggunakan air.

Keunggulan dari penelitian ini selain murah, media tanam berupa arang sekam dan akar pakis dapat menggantikan tanah sebagai media tumbuh bagi tanaman tanpa menggunakan lahan yang banyak, cukup dengan menggunakan *polybag* dan *green house* serta penggunaan POC dapat relatif lebih mudah digunakan dan efektif bagi pertumbuhan. Bahan ini sangat mudah di temukan baik itu di lingkungan pertanian maupun di masyarakat. Maka diperlukan penelitian lanjutan terkhusus pada ranah kultur jaringan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penggunaan media tanam arang sekam, akar pakis dan pupuk organik cair (POC) berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman Kentang (*S. tuberosum* L. cv. Granola), namun berpengaruh nyata terhadap panjang daun dan jumlah daun. Penggunaan POC pada parameternya juga memberikan pengaruh, namun tidak terlalu besar. Perlakuan M5P2 (arang sekam 25%+akar pakis 75%+POC 6 ml/l) memberikan hasil terbaik dengan rata-rata tinggi tanaman 7,45 cm, panjang daun terbaik dengan rata-rata 1,65 cm pada perlakuan M1P2 (arang sekam 95%+akar pakis 5%+POC 6 ml/l). Serta perlakuan M1P2 (arang sekam 95%+akar pakis 5%+POC 6 ml/l) memberikan hasil terbaik untuk parameter jumlah daun sebanyak 12,75 helai. Dan hasil MP2 (Media tanam+POC 6 ml/l) menunjukkan klorofil a, klorofil b serta total kandungan klorofil terbanyak dengan nilai rata-rata berturut-turut 6,6983, 2,2564, 8,1679 dibandingkan dengan perlakuan MP1 (Media tanam+air 6 ml/l) dengan nilai rata-rata 5,4126, 1,7783, 7,1824.

#### **B. Saran**

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan media tanam arang sekam, akar pakis, dan POC dengan konsentrasi atau variasi yang lebih tinggi agar dapat lebih memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman. Serta ketelitian dalam mengkonversi

konsentrasi media tanam pada media tumbuh tanaman kentang (*S. tuberosum* L. cv.

Granola) agar mendapatkan hasil yang terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, K.H. "Produksi Tepung Kentang". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.
- Arumugam T & Jawaharlal M. "Effect of shade levels and growing media on growth and yield of Dendrobium orchid cultivar Sonia-17". *Journal of Ornamental Horticulture*, 7 no. 1 (2014): p. 107- 110.
- Asy-Syuyuthi, Jalaluddin. "*Tafsir Jalalain Pesantren Persatuan Islam*". Tasikmalaya: Kompilasi CHM, 2010.
- (BPS) Badan Pusat Statistik. "Produksi tanaman kentang", 2021.
- Carli C, Mihovilovich E, Bonierbale M. "Assessment of dormancy and sprouting behaviour of elite and advanced clones Procedures for Standard Evaluation and Data Management of Advanced Potato Clones". *Journal International*, 1 no. 3 (2010): p. 1-17.
- Damanik, M.M.B., Bachtiar, Fauzi, Sarifuddin, & Hamidah, H. "*Kesuburan Tanah dan Pemupukan*". Medan: USU Press, 2011.
- Djaman, K., Irmak, S., Koudahe, K., & Allen, S. "Irrigation management in potato (*Solanum tuberosum* L.) production". *Journal Sustainability*, 13 no. 3 (2021): p. 1-17.
- Danu, "Uji Stek Pucuk Damar (*Agathis loranthifolia* Salisb) pada Berbagai Media Dan Zat Pengatur Tumbuh. *Jurnal Konservasi Alam*. 1 no. 3 (2011): h. 245-252.
- Edhi Sandra. *Steril Adalah Faktor Terpenting Dalam Laboratorium Kultur Jaringan*. Bogor: Esha Garden, 2012.
- Efriana. "Pengaruh Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Setek Mikro Kentang Varietas Granola (*Solanum Tuberosum* L)". *Jurnal Edubiotik*, 3 no. 1 (2018): h. 121.
- Elmi. "Pembuatan Pupuk Organik Cair Menggunakan Biovaktor Biosca dan EM4". *Skripsi*, Pekanbaru: Universities Bung Hatta, 2012.
- Erickson Sarjono Siboro, Edu Surya, & Netti Herlina. "Pembuatan Pupuk Cair Dan Biogas Dari Campuran Limbah Sayuran". *Jurnal Teknik Kimia USU*, 2 no. 3 . (2013): h. 40-43.
- Fleisher, D. H., Wang, Q., Timlin, D. J., Chun, J. A., & Reddy, V. R. "Effects of Carbon Dioxide and Phosphorus Supply on Potato Dry Matter Allocation and Canopy Morphology". *Journal of Plant Nutrition*, 36 no. 4 (2013): p. 23.
- Gembong, T. "*Taksonomi Tumbuhan Obat-obatan*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Gogahu, Y., Ai, N. S., & Siahaan, P. "Konsentrasi Klorofil pada Beberapa Varietas Tanaman Puring (*Codiaeum variegatum* L .)". *Jurnal Mipa Unstrat*, 5 no. 2

(2016): h. 76-80.

Hardiyati, T., Budisantoso, I., Kamsinah, & Suwito, E. "Perbanyak tanaman anggrek menggunakan teknik kultur in vitro". *Buku Teknologi Tepat Guna* (TTG). Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2017.

Hazra, G. "Different Types of Eco-Friendly Fertilizers". *Journal Sustainability in Environment*, 1 no. 1 (2016): p. 54.

Hidayat, Y. S., Efendi, D., & . S. "Karakterisasi Morfologi Beberapa Genotipe Kentang (*Solanum tuberosum*) yang Dibudidayakan di Indonesia". *Jurnal Hortikultura*, 2 no. 1 (2018): h. 28.

Karamina. "Aplikasi Pupuk Organik Cair pada Tanaman Kentang Varietas Granola di Dataran Medium". *Jurnal Kultivasi*, 15 no. 3 (2016): h. 154-157.

Kamagi, L., Pontoh, J., Momuat, L. I., & Kimia, J. "Analisis Kandungan Klorofil Pada Beberapa Posisi Anak Daun Aren ( *Arenga pinnata* ) dengan Spektrofotometer UV- Vis". *Jurnal Mipa Unstrat*, 6 no. 2 (2017): h. 49-54.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. Solo: Tiga Serangkai, 2010.

Khasanah. "Pemanfaatan Pupuk Daun, Air Kelapa, dan Bubur Pisang Sebagai Kombinasi Medium Kultur Jaringan Untuk Mengoptimalkan Planlet Anggrek *Dendrobium kelemense*". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011.

Kurniawan, B., Pertanian, J. B., Pertanian, F., & Brawijaya, U. "Pengaruh Beberapa Macam Media Terhadap Pertumbuhan Setek Planlet Tanaman Kentang (*Solanum tuberosum* L.) Varietas Granola Kembang". *Jurnal Produksi Tanaman*, 2 no. 4 (2016): h. 123-128.

Koko. "Pengaruh Berbagai Media dan Tiamin Terhadap Pertumbuhan Setek Pucuk Kentang (*Solanum tuberosum* L.)". *Jurnal Agrikultural*, 16 no 31 (2020): h. 76-82.

Maria. "Respon Pertumbuhan dan Produksi Bibit G2 Kentang (*Solanum tuberosum* L.) Akibat Perbedaan Bobot Umbi Bibit (G1) dan Konsentrasi Pupuk Organik Cair di Rumah Kasa, *Jurnal Agroteknologi*, 2 no. 3 (2014): h. 1125-1133.

Mazid, M., & Khan, T. A. "Future of Bio-fertilizers in Indian agriculture". *Journal International of Agricultural and Food Research*, 3 no. 3 (2014): p. 10-23.

Media, Sudarsono., Bibit, T., & Samanea, T. "Pemanfaatan Limbah the , sekam padi, dan arang sekam sebagai Media Tumbuh Bibit Trembesi (*Samanea saman*)". *Jurnal Pertanian*. 2 no. 2 (2014): h. 61-70.

Nur, T., Noor, A. R., & Elma, M. "Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Sampah Organik Rumah Tangga dengan Bioaktivator EM4 (*Effective Microorganisms*)". *Jurnal Konversi*, 5 no. 2 (2016): h. 5.

Puspawati, S., Sutari, W., & Kusumiyati, K. "Pengaruh konsentrasi pupuk organik

- cair (POC) dan dosis pupuk N, P, K terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (*Zea mays* L.) var Rugosa Bonaf kultivar talenta". *Jurnal Kultivasi*, 15 no. 3 (2016): h. 208-216.
- Purwanto. "Pengaruh Media Tanam Arang Sekam Dan Batang Pakis Terhadap Pertumbuhan Cabai Merah Keriting (*Capsicum annum* L.) Ditinjau dari Intensitas Penyiraman Air Kelapa". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISMUH, 2012.
- Purwanto, J., Asngad, A., & Suryani, T. "Pengaruh Media Tanam Arang Sekam Dan Batang Pakis Terhadap Pertumbuhan Cabai Merah Keriting (*Capsicum annum* L.) Ditinjau Dari Intensitas Penyiraman Air Kelapa". *Biologi, Sains Lingkungan*, 2, (2012). 642–647.
- Putro. "*Metodologi Penelitian Kuantitatif*". Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Rad, C., Hancu, O., & Takacs, I. "Smart Monitoring of Potato Crop : A Cyber-Physical System Architecture Model in the Field of Precision Agriculture". *Journal Italian*, 2 no. 6 (2015): p. 73–79.
- Rini. "Penggunaan Berbagai Macam Media Tanam dan Pemberian Pupuk Organik Cair pada Tahap Aklimatisasi terhadap Pertumbuhan Planlet Anggrek Bulan (*Phalaenopsis amabilis*) Hasil Kultur Jaringan". *Jurnal Agrikultural Sains dan Teknologi*, 3 no. 1 (2019): h. 103-114.
- Sabareeswaran, V. S., Swarnapriya, R., Kannan, M., & Gold, T. "Standardization of growing media for hardening plantlets of *Dendrobium* var . Thongchai Gold". *Journal of Agroculture and Ecology*, 6 no. 2 (2018). 64–70.
- Sani, B. *Hidroponik*. Jakarta: Penerbit Penerbar Swadaya, 2014.
- Sholihah, A., Abdul Latif, M., Al Ayubi, R., Yusuf Adi Prasetyo, D., Irwansyah, H., Uswatun Hasanah, I., Hasna, R., Aisy, R., Febri Setyo Utami, N., Shakila, A., Zamarudah, Z., & Alief Rahmasari, D. "Pemanfaatan Tanaman Paitan Yang Berlimpah Sebagai Poc (Pupuk Organik Cair) Guna Mendukung Pertanian Ramah Lingkungan". *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1 no. 4 (2021): h. 280-285.
- Sholikhah, U., Magfiroh, I. S., & Fanata, W. I. D. "Pemanfaatan Limbah Urine Kelinci Menjadi Pupuk". *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3 no. 2 (2018): h. 204-208.
- Song, N., & Banyo, Y. "Konsentrasi Klorofil Daun Sebagai Indikator Kekurangan Air Pada Tanaman". *Jurnal Ilmiah Sains*, 11 no. 2 (2010): h. 166-173.
- Subba Rao, N.S. "*Mikroorganisme Tanah dan Pertumbuhan Tanaman*". Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.
- Sudarsono. "Pemanfaatan Limbah teh, sekam padi, dan arang sekam sebagai Media Tumbuh Bibit Trembesi (*Samanea saman*)". *Jurnal Sylva Lestari*, 2 no. 2, (2014): h. 61-70.

- Sumenda, L., Rampe, H. L., & Mantiri, F. R. "Analisis Kandungan Klorofil Daun Mangga (*Mangifera indica* L.) pada Tingkat Perkembangan Daun yang Berbeda 1". *Jur al Biologos*, 1 no. 1 (2011): h. 20-24.
- Sopha, G. A., & Uhan, T. S. "Mustard (*Brassica juncea* L) cultivation". *Journal Agricultural*, 5 no. 1 (2013): p. 39-44.
- Swarinoto, Y. S., & Sugiyono, S. "Pemanfaatan Suhu Udara Dan Kelembapan Udara Dalam Persamaan Regresi Untuk Simulasi Prediksi Total Hujan Bulanan Di Bandar Lampung". *Jurnal Meteorologi dan Geofisika*, 12 no. 3 (2011): h. 271-281.
- Tintin Febrianti, R. A. P. "Pelatihan Manajemen Usaha Petani Kentang Di Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut". *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3 no. 1 (2019): h. 44-51.
- Widyastuti. "Effect of Planting Media On the Growth of Red Betel (*Piper rocatum*) Cutting". *Journal International Citation*, 1 no.3 (2020): p. 1-6.
- Wood, K., Carragher, J., & Davis, R. "Australian consumers' insights into potatoes - Nutritional knowledge, perceptions and beliefs". *Journal Appetite*, 114 no. 1 (2017): p. 169-174.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Tabel Hasil Pengamatan Rata-rata Tinggi Tanaman Kentang dari 1-MST hingga 3-MST

#### Minggu 1

Perlakuan	Ulangan				Rata-rata
	A	B	C	D	
M0P1	8	6,5	6	6	6.666667
M1P1	6	6.5	6	6	6.125
M2P1	6.2	6	6	6	6.05
M3P1	6.5	8	6	6	6.625
M4P1	6	6.2	6.3	6.5	6.25
M5P1	7	6	6	6.3	6.325
M0P2	6	6	6,2	7	6.33333333
M1P2	7	6	6	6	6.25
M2P2	6	6	6	6	6
M3P2	6	6	7	6	6.25
M4P2	6	6	6	6	6
M5P2	6.2	6	6,5	6	6.06666667

#### Minggu 2


Perlakuan	Ulangan				Rata-rata
	A	B	C	D	
M0P1	8	7	6	6	6.725
M1P1	6	8	7	7	7
M2P1	6	7	6	6	6.25
M3P1	6	8	6	6	6.5
M4P1	6	6	6	6	6
M5P1	6	6	6	7	6.25
M0P2	6	6	8	8	7

M1P2	7	6	6	6	6.25
M2P2	7	6	6	6	6.25
M3P2	6	6	8	6	6.5
M4P2	6	6	6	6	6
M5P2	6.5	6	7	6	6.375

### Minggu 3

Perlakuan	Ulangan				Rata-rata	Standar Deviasi
	A	B	C	D		
M0P1	8	7	6	6	6.75	0.8292
M1P1	6	7	7	6	6.5	0.5000
M2P1	6.2	6	6	7	6.3	0.4123
M3P1	6.5	8	6	6	6.625	0.8197
M4P1	6	6.2	6.3	6.5	6.25	0.1139
M5P1	7	6	6	6.3	6.325	0.4085
M0P2	6	7	8	8.5	7.375	0.9601
M1P2	7	7	6	6	6.5	0.5000
M2P2	6.5	6	6.2	7	6.425	0.3767
M3P2	7	6	8	6	6.75	0.8292
M4P2	6.2	6.3	6.4	7	6.475	0.3112
M5P2	6.3	7	8	8.5	7.45	0.8559

### Lampiran 2: Hasil Pengamatan Rata-rata Tinggi Tanaman Minggu 1 MST Sampai 3 MST



**Lampiran 3: Tabel Hasil Pengamatan Rata-rata Panjang Daun Tanaman Kentang pada 3 MST**

Perlakuan	Ulangan				Rata-rata	Standar Deviasi
	A	B	C	D		
M0P1	1.3	1.6	0	0	0.725	0.7327
M1P1	1	1.3	1.5	1.1	1.225	0.2217
M2P1	0	1.2	1.3	0	0.625	0.6260
M3P1	0	1	0	1	0.5	0.5000
M4P1	0	0	1.3	0	0.325	0.5629
M5P1	1	0	1	0	0.5	0.5000
M0P2	1.2	1.1	1.5	1.5	1.325	0.1785
M1P2	1.5	2	1.7	1.4	1.65	0.2291
M2P2	1.5	1.5	1.5	1.3	1.45	0.0866
M3P2	1.5	1.2	1.5	0	1.05	0.6185
M4P2	1.6	0	0	1.3	0.725	0.7327
M5P2	1.5	1.3	2	1.5	1.575	0.2586

**Lampiran 4: Tabel Hasil Pengamatan Rata-rata Jumlah Daun Tanaman Kentang pada 3 MST**

Perlakuan	Ulangan				Rata-rata	Standar Deviasi
	A	B	C	D		
M0P1	7	3	3	0	3.25	2.4875
M1P1	2	1	9	3	3.75	3.1125
M2P1	0	3	4	0	1.75	1.7854
M3P1	0	3	0	2	1.25	1.2990
M4P1	0	0	3	0	0.75	1.2990
M5P1	0	1	2	0	0.75	0.8292
M0P2	6	2	0	5	3.25	2.3848
M1P2	6	30	10	5	12.75	10.1335
M2P2	8	10	4	4	6.5	2.5981
M3P2	9	6	5	0	5	3.2404
M4P2	9	0	5	3	4.25	3.2692
M5P2	4	9	6	7	6.5	1.8028

**Lampiran 5: Hasil analisis sidik ragam rata-rata tinggi tanaman kentang (*Solanum tuberosum* L.**

#### ANOVA

Jumlah					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	6.801	11	.618	1.157	.350
Within Groups	19.238	36	.534		
Total	26.038	47			

### Correlations

		Perlakuan	Jumlah
Perlakuan	Pearson Correlation	1	.187
	Sig. (2-tailed)		.203
	N	48	48
Jumlah	Pearson Correlation	.187	1
	Sig. (2-tailed)	.203	
	N	48	48

**Lampiran 6: Hasil analisis sidik ragam rata-rata luas daun tanaman kentang (*Solanum tuberosum* L.**

### ANOVA

Jumlah					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	9.412	11	.856	2.692	.012
Within Groups	11.442	36	.318		
Total	20.855	47			

**Jumlah**

Duncan

Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
5	4	.3250			
4	4	.5000	.5000		
6	4	.5000	.5000		
3	4	.6250	.6250	.6250	
1	4	.7250	.7250	.7250	.7250
11	4	.7250	.7250	.7250	.7250
10	4	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500
2	4	1.2250	1.2250	1.2250	1.2250
7	4		1.3250	1.3250	1.3250
9	4			1.4500	1.4500
12	4				1.5750
8	4				1.6500
Sig.		.058	.082	.079	.052

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

### Correlations

		Perlakuan	Jumlah
Perlakuan	Pearson Correlation	1	.318*
	Sig. (2-tailed)		.028
	N	48	48
Jumlah	Pearson Correlation	.318*	1
	Sig. (2-tailed)	.028	
	N	48	48

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Lampiran 7: Hasil analisis sidik ragam rata-rata Jumlah daun tanaman kentang (*Solanum tuberosum* L.

#### ANOVA

Jumlah	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	499.229	11	45.384	2.511	.018
Within Groups	650.750	36	18.076		
Total	1149.979	47			

**Jumlah**

Duncan

Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
5	4	.7500	
6	4	.7500	
4	4	1.2500	
3	4	1.7500	
1	4	3.2500	
7	4	3.2500	
2	4	3.7500	
11	4	4.2500	
10	4	5.0000	
9	4	6.5000	6.5000
12	4	6.5000	6.5000
8	4		12.7500
Sig.		.115	.056

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

### Correlations

		Perlakuan	Jumlah
Perlakuan	Pearson Correlation	1	.315*
	Sig. (2-tailed)		.029
	N	48	48
Jumlah	Pearson Correlation	.315*	1
	Sig. (2-tailed)	.029	
	N	48	48

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Lampiran 15: Hasil rata-rata analisis uji klorofil tanaman kentang (*S. tuberosum* L.) 3 MST

Pelarut ethanol 96 % (Wintermans & de Mots: 1965)

RUMUS:

Klo. a = 13,7 D-665 - 5,76 D-649 (mg/ l)

Klo. b = 25,8 D-649 - 7,60 D-665 (mg/ l)

Total klorofil = 20,0 D-649 + 6,10 D-665 (mg/ l)

➤ M0P1A

Klo. a = 13,7 (0.558) - 5,76 (0.240) = 6.2622 mg/l

Klo. b = 25,8 (0.240) - 7,60 (0.558) = 1.9512 mg/l

Total klorofil = 20,0 (0.240) + 6,10 (0.558) = 8.2038

➤ M1P1C Dan M1P1D

Klo. a = 13,7 (0.410) - 5,76 (0.183) = 4.5629 mg/l

Klo. b = 25,8 (0.183) - 7,60 (0.410) = 1.6054 mg/l

Total klorofil = 20,0 (0.183) + 6,10 (0.410) = 6.161 mg/l

➤ M0P2A Dan M0P2D

$$\text{Klo. a} = 13,7 (0.592) - 5,76 (0.264) = 6.5898 \text{ mg/l}$$

$$\text{Klo. b} = 25,8 (0.264) - 7,60 (0.592) = 2.312 \text{ mg/l}$$

$$\text{Total klorofil} = 20,0 (0.264) + 6,10 (0.592) = 8.8912 \text{ mg/l}$$

➤ M1P2B, M1P2C Dan M1P2D

$$\text{Klo. a} = 13,7 (0.662) - 5,76 (0.278) = 6.9201 \text{ mg/l}$$

$$\text{Klo. b} = 25,8 (0.278) - 7,60 (0.662) = 2.4452 \text{ mg/l}$$

$$\text{Total klorofil} = 20,0 (0.278) + 6,10 (0.662) = 9.3542 \text{ mg/l}$$

➤ M3P2A, M1P2B Dan M1P2C

$$\text{Klo. a} = 13,7 (0.559) - 5,76 (0.243) = 6.259 \text{ mg/l}$$

$$\text{Klo. b} = 25,8 (0.243) - 7,60 (0.559) = 2.021 \text{ mg/l}$$

$$\text{Total klorofil} = 20,0 (0.243) + 6,10 (0.559) = 8.2699 \text{ mg/l}$$

➤ M5P2B

$$\text{Klo. a} = 13,7 (0.453) - 5,76 (0.197) = 5.0714 \text{ mg/l}$$

$$\text{Klo. b} = 25,8 (0.197) - 7,60 (0.453) = 1.6398 \text{ mg/l}$$

$$\text{Total klorofil} = 20,0 (0.197) + 6,10 (0.453) = 6.7033 \text{ mg/l}$$

➤ M5P2C

$$\text{Klo. a} = 13,7 (0.453) - 5,76 (0.197) = 5.0714 \text{ mg/l}$$

$$\text{Klo. b} = 25,8 (0.197) - 7,60 (0.453) = 1.6398 \text{ mg/l}$$


$$\text{Total klorofil} = 20,0 (0.197) + 6,10 (0.453) = 6.7033 \text{ mg/l}$$

**Lampiran 16: Tabel Hasil Pengamatan analisis uji klorofil tanaman Kentang (*S. tuberosum* L.) pada 3 MST**

No	Sampel	Ulangan	Kandungan Klorofil		Total Klorofil
		A,B,C,D	Klorofil a	Klorofil b	
1	M0P1	A	6.2622	1.9512	8.2038
2	M1P1	C,D	4.5629	1.6054	6.161
N			<b>5.4126</b>	<b>1.7783</b>	<b>7.1824</b>

3	M0P2	A,D	6.5898	2.312	8.2038
4	M1P2	B,C,D	6.9201	2.4452	6.161
5	M3P2	A,B,C	6.259	2.021	8.2699
6	M5P2	B	5.0714	1.6398	6.7033
7	M5P2	C	8.6512	2.8638	11.5014
<b>N</b>			<b>6.6983</b>	<b>2.2564</b>	<b>8.1679</b>

### Lampiran 17: Alat Dan Bahan Yang Digunakan



G

H


I




J

**Alat Dan Bahan Yang Digunakan:** (A) Cawan Petri; (B) Gelas ukur; (C) Pinset; (D) Pipet tetes; (E) Botol Semprot; (F) Alkohol 90%; (G) POC; (H) Bunsen; (I) *Polybag*; dan (J) EM<sub>4</sub> (*Effective Microorganisms*).

### Lampiran 18: Dokumentasi Pembuatan Media Tanam Arang Sekam Dan Akar Pakis




A



B



C



#### Dokumentasi Pembuatan Media Tanam Arang Sekam Dan Akar Pakis: (A)

Sekam basah dikeringkan; (B) Sekam dibakar; (C) Arang Sekam; (D) Arang sekam dimasukkan ke wadah (E) Akar pakis dikeringkan (F) Akar pakis disangrai; (G) Kedua media dimasukkan ke *polybag*; (H) Menimbang Menimbang berat media sesuai konsentrasi; (I) Media tanam disusun dan siap digunakan.

#### Lampiran 18: Dokumentasi Pembuatan POC



A



B



C




D



E



F



G

H

I

J




**Dokumentasi Pembuatan POC:** (A) Cacahan sawi ; (B) Cacahan Kol; (C) Cacahan tanaman paitan; (D) Cacahan batang pisang; (E) Cacahan kulit pisang (F) Cacahan buah apel; (G) Cacahan buah tomat; (H) POC 10 cc; (I) Urine kelinci; (J) Kumpulan semua bahan dimasukkan ke drum plastik dan ditutup menggunakan plastik lalu disimpan selama 2 minggu.

### Lampiran 19: Dokumentasi Penanaman




**Dokumentasi Penanaman:** (A) Planlet kentang hasil kultur jaringan; (B) Di rendam menggunakan aquades dan air biasa; (C) Di bersihkan sisa daun yang sudah kuning; (D) Di tanam ke polybag sesuai konsentrasi.

### Lampiran 20: Dokumentasi Pemeliharaan Tanaman



**Dokumentasi Pemeliharaan Tanaman:** (A) POC; (B) Pengaplikasian POC; (C) Penyiraman.

### Lampiran 21: Dokumentasi Analisis Uji Klorofil



**Dokumentasi Pemeliharaan Tanaman:** (A) Preparasi Sampel; (B) Skrining; (C) Ekstrak Daun Kentang (*S. tuberosum* L.).

**Lampiran 21: Dokumentasi Hasil Tanaman**



## RIWAYAT HIDUP



**Sulastri**, dilahirkan di Bulukumb pada tanggal 17 Mei 1997. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang berasal dari pasangan Alm. Naing dan Rostina. Sedikit riwayat pendidikan yang telah ditempuh alfi, mahasiswi ini memulai pendidikan formalnya di Taman Kanak – kanak Tadika Lahaddatuk Malaysia pada tahun 2002. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Humana House 77 & 80 Malaysia dan kemudian pindah ke SDN. 93 Marana pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penyusun melanjutkan pendidikan

di MTs 12 Bingkarongo, Kab. Bulukumba dan lulus pada tahun 2013. Di tahun yang sama pula penyusun melanjutkan pendidikannya di MA Syekh Yusuf, Kab. Gowa dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2016 . Saat ini penyusun menempuh pendidikan strata satunya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Biologi fakultas Sains dan Teknologi.

Adapun pengalaman penulis dari tahun masuk sampai menyelesaikan tugas akhirnya yaitu melibatkan diri ke dalam beberapa organisasi, baik itu intra atau extra kampus. Untuk organisasi intra kampus di semester awal selama 1 tahun saya pernah menjadi anggota dari DEMA (Dewan Mahasiswa), HMJ ( Himpunan Mahasiswa Jurusan) Biologi, dan PSM (Paduan Suara Mahasiswa). Di intra kampus, penulis menjadi bagian dari Duta lingkungan Sul-selbar, Icon Muslimah Mall Gtc , salah satu organisasi umum bergerak di bidang yang berkaitan langsung dengan ilmu lingkungan, alam dan juga wanita muslimah. Prestasi yang penulis dapatkan selama perkuliahan baik itu intra atau extra kampus diantaranya ialah intra kampus pernah menjuarai lomba

debat pendidikan yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Runner up 3 Duta lingkungan se- sulsebar, Juara 3 Icon Muslimah Mall Gtc, serta Juara favorit fashion show, sedangkan intra kampus Juara 1 lomba ceramah dan Juara 2 tilawah.