

**“PEMANFAATAN EKSTRAK DAUN KELOR (*Moringa oleifera* Lamk)
SEBAGAI ANTIOKSIDAN MENGGUNAKAN METODE DPPH (*1,1-*
diphenyl -2-picrylhydrazyl) DALAM SEDIAAN *HAND AND BODY CREAM*”**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANDI MITHA HARDIYANTI

70100117083

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Mitha Hardiyanti
Nim : 70100117083
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 28 Mei 1999
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo, Romangpolong, Gowa
Judul : Pemanfaatan Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk) Sebagai Antioksidan Menggunakan Metode DPPH (*1,1 Diphenyl - 2- Picrylhydrazyl*) Dalam Sediaan *Hand and Body Cream*

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 9 Februari 2022

Penulis



Andi Mitha Hardiyanti
NIM. 70100117083

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Pemanfaatan Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk) Sebagai Antioksidan Menggunakan Metode DPPH (1,1 Diphenyl -2- Picrylhydrazyl) Dalam Sediaan *Hand and Body Cream*" yang disusun oleh **Andi Mitha Hardiyanti**, NIM: 70100117083, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 9 Februari 2022 M** yang bertepatan dengan **8 Rajab 1448 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 9 Februari 2022 M
8 Rajab 1448 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Syamsuri Syakri, S. Farm., M.Si	(.....)
Pembimbing 1	: apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing 2	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji 1	: apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci., M.Si	(.....)
Penguji 2	: Dr. Nurhidayat Muh. Said, S.Ag., M.Ag	(.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.
NIP : 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia kearah yang lebih beradab dan manusiawi.

Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk) Sebagai Antioksidan Menggunakan Metode DPPH (*1,1 Diphenyl -2-Picrylhydrazyl*) Dalam Sediaan *Hand and Body Cream*” ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, bapak saya Harun Dini dan mama saya Hasmiah yang tak henti-hentinya memanjatkan do'a memberikan motivasi dengan seluruh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuh, baik berupa moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Buat Indo Asye pattaku dan saudara-saudaraku tersayang Andi Ulfa Hasfita, Andi Fitrach Ramadhani dan Andi Amar Ma'ruf serta keluarga besarku tercinta yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M. Hum. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag. selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I (bidang akademik) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. Fais Satrinegara, SKM., MARS selaku Wakil Dekan II (bidang administrasi dan keuangan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III (bidang kemahasiswaan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Bapak apt. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

11. Ibu apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Farmasi selaku Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
12. Bapak apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing, memberikan motivasi dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Ibu Dwi Wahyuni Leboe, S.Si. M.Si., selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing, memberikan motivasi dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. Ibu apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci., M.Si. selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Bapak Dr. Nurhidayat Muh. Said, S.Ag., M.Ag. selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
16. Seluruh Dosen, Staf Jurusan Farmasi ke atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Makassar, 2022

Penulis



Andi Mitha Hardiyanti
NIM. 70100117083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Teori Umum	9
1. Kelor	9
2. Antioksidan	12
3. Radikal Bebas.....	14
4. Ekstraksi.....	15

5. Metode Ekstraksi	16
6. Kulit	18
7. Kosmetik	22
8. Tipe <i>Cream</i>	23
9. Bahan Penyusun	24
10. Metode DPPH	28
11. Spektrofotometer Ultra Violet-Visibel.....	28
B. Tinjauan Islam	29
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Instrumen Penelitian.....	32
D. Sampel Penelitian.....	33
E. Prosedur Kerja.....	33
F. Analisis Data	38
BAB IV	
PEMBAHASAN	39
A. Hasil Pengamatan.....	39
1. Hasil Ekstraksi.....	39
2. Hasil Uji Mutu Fisik	39
3. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan	40
4. Hasil Perbandingan Vitamin C.....	41
B. Pembahasan.....	41
BAB V	
PENUTUP.....	48

A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
RIWAYAT HIDUP PENULIS	87



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rancangan Formula	34
Tabel 2. Hasil Ekstraksi Daun Kelor (<i>Moringa oleifera</i> Lamk)	39
Tabel 3. Hasil Pemeriksaan Organoleptik dan Homogenitas.....	39
Tabel 4. Hasil Pemeriksaan pH.....	40
Tabel 5. Hasil Pemeriksaan Daya Sebar	40
Tabel 6. Hasil Pemeriksaan Uji Viskositas	40
Tabel 7. Hasil IC ₅₀ FI, FII, dan FII	40
Tabel 8. Hasil IC ₅₀ Kontrol Positif.....	41
Table 9. Hasil Analisia Data Pengujian Daya sebar	66
Tabel 10. Hasil Analisia Data Pengujian pH	68
Tabel 11. Hasil Analisia Data Pengujian Viskositas.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daun Kelor	11
Gambar 2. Anatomi Kulit.....	18
Gambar 3. Reaksi DPPH dengan Antioksidan.....	28
Gambar 4. Skema Spektrofotometer Uv-Vis	28
Gambar 5. Reaksi Penghambatan Radikal DPPH.....	46
Gambar 6. Kurva Kalibrasi Vitamin C	61
Gambar 7. Kurva Kalibrasi FI 1%	62
Gambar 8. Kurva Kalibrasi FII 2%	64
Gambar 9. Kurva Kalibrasi FIII 3%.....	65
Gambar 10. Peta Lokasi Pengambilan Sampel	71
Gambar 11. Sampel Penelitian.....	79
Gambar 12. Pembuatan Ekstrak Ethanol 96% Daun Kelor	80
Gambar 13. Proses Formulasi <i>Hand and Body</i>	81
Gambar 14. Pengujian Aktivitas Antioksidan.....	82
Gambar 15. Pengujian Organoleptik dan Homogenitas Sediaan.....	83
Gambar 16. Pengujian Daya Sebar	84
Gambar 17. Pengujian pH.....	85
Gambar 18. Pengujian Viskositas	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja	53
Lampiran 2. Perhitungan Rendamen Ekstrak Daun Kelor	62
Lampiran 3. Penyiapan Larutan DPPH.....	62
Lampiran 4. Perhitungan Larutan Stok Sampel Ekstrak Daun Kelor	63
Lampiran 5. Penyiapan Larutan Pembanding (Vitamin C).....	64
Lampiran 6. Perhitungan Pengenceran Larutan Stok.....	64
Lampiran 7. Perhitungan % Inhibisi Vitamin C.....	65
Lampiran 8. Kurva Kalibrasi Vitamin C.....	66
Lampiran 9. Perhitungan % Inhibisi Vitamin C.....	66
Lampiran 10. Kurva Kalibrasi FI 1%	68
Lampiran 11. Perhitungan % Inhibisi FII 2%	68
Lampiran 12. Kurva Kalibrasi FII 2%	68
Lampiran 13. Perhitungan % Inhibisi FIII 3%	70
Lampiran 14. Kurva Kalibrasi FIII 3%	70
Lampiran 15. Hasil Analisia Data Pengujian Daya sebar dengan Metode Uji <i>OneWay ANOVA</i> yang dilanjutkan dengan Uji Post Hoc Tukey pada masing-masing perlakuan	72
Lampiran 16. Hasil Analisia Data Pengujian pH dengan Metode Uji <i>OneWay</i> <i>ANOVA</i> yang dilanjutkan dengan Uji Post Hoc Tukey pada masing-masing perlakuan.....	74
Lampiran 17. Hasil Analisia Data Pengujian Viskositas dengan Metode Uji <i>OneWay ANOVA</i> yang dilanjutkan dengan Uji Post Hoc Tukey pada masing-masing perlakuan	76
Lampiran 18. Peta lokasi pengambilan sampel.....	78
Lampiran 19. Sampel Penelitian	79
Lampiran 20. Gambar Penelitian	80

ABSTRAK

Nama : Andi Mitha Hardiyanti
NIM : 70100117083
Jurusan : FARMASI
Judul Skripsi : Pemanfaatan Ekstrak Daun Kelor (*Moringa Oleifera* Lamk) Sebagai Antioksidan Menggunakan Metode Dpph (*1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl*) Dalam Sediaan *Hand And Body Cream*
Pembimbing : apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.
Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si.

Kelor merupakan tanaman yang sangat mudah ditemukan di Indonesia dan biasanya tumbuh sebagai tanaman penunjang di pekarangan. Kelor kaya akan unsur hara karena seluruh bagian tanaman kelor sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan obat. Salah satu yang paling menonjol dari kandungan tanaman kelor adalah antioksidan pada bagian daunnya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memformulasikan ekstrak daun kelor menjadi sediaan *hand and body cream* yang memenuhi syarat mutu fisik dan mengetahui aktivitas antioksidan dari ekstrak daun kelor dengan perbandingan vitamin C menggunakan metode DPPH. Daun kelor diekstraksi secara maserasi menggunakan pelarut ethanol 96% dan dibuat sediaan *hand and body cream* dengan variasi konsentrasi berbeda pada formula I, II, dan III berturut-turut (1%, 2%, dan 3%).

Hasil yang diperoleh bahwa semua formula memenuhi mutu fisik dan pada uji aktivitas antioksidan berturut-turut formula I, II, dan III yaitu 103,75 ppm; 100,72 ppm; 91,77 ppm. Formula III merupakan formula yang memiliki aktivitas antioksidan tergolong kuat dengan nilai IC_{50} rentang 50 ppm – 100 ppm.

Kata kunci: *Daun kelor, hand and body cream, aktivitas antioksidan.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Name : Andi Mitha Hardiyanti
NIM : 70100117083
Study Program: PHARMACY
Title : Utilization Of The Moringa Leaves (*Moringa Oleifera* Lamk) As An Antioxidant Using The Dpph (*1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl*) Method In The *Hand And Body Cream* Preparation
Supervisor : apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.
Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si.

Moringa is a plant that is very easy to find in Indonesian and usually grows as a supporting plant in the yard. Moringa is rich in nutrients because all parts of the moringal plant are very befcial for people's lives. Use as food and medicine. One of the most prominent of the moringal plant content is an antioxidant in the leaves.

The purpose of this study was to formulate Moringa leaf extract into hand and body cream preparations that meet the evaluation requirements and determine the antioxidant activity of Moringa leaf extract with a ratio of vitamin C using the DPPH method Moringa leaves were extracted by maceration using 96% ethanol solvent and made hand and body cream preparation with different concentration variations in formula I, II, and III respectively (1%, 2%, and 3%).

The results obtained that all formulas met the evaluation test and the antioxidant activity test of formulas I, II, and III is 103, 75 ppm; 10072 ppm; 91,77 ppm. Formula III is a formula that has strong antioxidant activity with IC₅₀ valuaes ranging from 50 ppm – 100 ppm.

Keywords: *Moringa , hand and body cream, antioxidant activity.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman merupakan suatu kumpulan beberapa jenis bahan yang memiliki efek atau khasiat obat. Kegunaan sebagai bahan obat merupakan peninggalan nenek moyang kita yang sudah ada sejak zaman dahulu kala dan sudah terbukti dapat digunakan cukup lama dan hampir di seluruh belahan dunia (Dima et al., 2016: 81).

Di Indonesia ada berbagai macam tumbuhan. Salah satunya adalah tanaman *Moringa oleifera* Lamk. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan ekstensif yang dapat hidup di sembarang tempat di rawa-rawa dan di negara-negara hingga ketinggian sekitar 1000 dpl (Widowati, 2014: 147).

Tanaman Kelor (*Moringa oleifera* Lamk) atau yang biasa disebut *Mother's Best Friends* adalah satu dari sekian tumbuhan yang mengisi secara umum di Indonesia. Dikenal dengan nama moringa (Jawa), maronggih (Madura), shedding (Flores), barunggai (Sumatra). Memiliki manfaat mulai dari daun, bunga, batang, daun, serta akar. Bagian yang biasa dimanfaatkan ada pada daunnya (Salim, 2019: 92).

Kelor (*Moringa oleifera* Lamk) kaya akan unsur hara karena seluruh bagian tanaman kelor sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Zat menyehatkan yang penting dari semua bagian tanaman kelor, mulai dari daun, kulit kayu, bunga, hingga akarnya dan secara luas dikenal sebagai tanaman restoratif atau multifungsi. Akar kelor untuk pengobatan luar, dan daunnya digunakan untuk pengobatan kulit. Untuk pengobatan di dalam, itu sering digunakan untuk penyakit epilepsi, rematik, dan kekurangan vitamin C (Jusnita, 2019: 17).

Semua bagian tanaman kelor telah dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan obat. Bagian tanaman yang biasa dimanfaatkan sebagai obat adalah bijinya, daun,

dan kulit batangnya, serta memiliki khasiat antidiabetik dan penguat sel. Pangkal tanaman kelor bisa dimanfaatkan untuk pengobatan radang luar. Suspensi dari biji dikeringkan sebagai koagulan. Beberapa khasiat tanaman ini antara lain kulit batangnya sebagai obat radang usus besar, daun kelor sebagai antianemia, daun dan batang kelor dapat dimanfaatkan untuk menurunkan hipertensi dan mengobati kencing manis atau biasa dikenal sebagai diabetes (Putra et al., 2016: 466).

Daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) mengandung sejumlah besar nutrisi A, nutrisi C, nutrisi B, kalsium, kalium, zat besi dan protein, diproses dengan mudah oleh tubuh manusia (Dewi, 2018: 105).

Daun kelor juga dapat mengobati kulit kering karena asupan nutrient B2 yang kurang. Daun kelor mengandung nutrient B2 yang berguna untuk merawat kulit kering, menjaga kelembaban kulit sehingga konsumsi daun kelor secara rutin dapat menjaga kelembaban kulit (Isnain, 2017: 71).

Karakteristik zat pencegah kanker dapat diperoleh dari hasil bumi. Salah satu tumbuhan yang banyak mengandung zat pencegah kanker (antioksidan) terdapat pada tumbuhan kelor, salah satunya terdapat pada daunnya. Yang membedakan dari tanaman kelor adalah kandungan zat antioksidan, terutama pada daunnya. Dilihat dari uji fitokimia, daun kelor mengandung tannin, steroid dan tripernoid, flavonoid, saponin, interkuinon, alkaloid, yang kesemuanya merupakan antioksidan (Jusnita, 2019: 17).

Cara kerja antioksidan mendonasikan satu elektron ke suatu senyawa oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat terhambat. Antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan menyumbangkan elektron yang dimiliki oleh radikal bebas dan menghambat reaksi berantai pembentukan radikal bebas (Damanis, 2020: 465).

Radikal bebas adalah salah satu bentuknya senyawa reaktif tidak stabil, yang umumnya dikenal sebagai senyawa yang memiliki elektron tidak berpasangan di kulit terluarnya. Radikal bebas berperan penting dalam terjadinya aterosklerosis, penyakit jantung koroner, stroke, kanker, gagal ginjal, dan penuaan manusia (Jusnita et al., 2019: 16).

Radikal bebas bisa berupa dari polusi, debu atau diproduksi secara terus menerus sebagai hasil metabolisme yang bisa berdampak buruk bagi tubuh (Yuliani, 2015: 1060).

Radikal bebas dapat mengganggu pembuatan DNA dimana lahirnya ektrimis bebas di mitokondria menyebabkan terciptanya *Receptive Oxygen Species* (ROS) yang mempengaruhi campuran DNA dan artikulasi herediter dalam tubuh. Radikal bebas yang mengambil elektron dari DNA dapat menyebabkan perubahan desain DNA, sehingga menghasilkan sel mutan. Jika perubahan ini terjadi cukup lama, mereka dapat menjadi karsinogenik (Kusmardika, 2020: 47).

Tubuh dapat membunuh radikal bebas jika jumlahnya tidak berlebih. Komponen pengaman tubuh dari ekstremis bebas adalah sebagai agen pencegah kanker yang menyatu pada sel, lapisan tipis dan sel tambahan. Agen pencegahan kanker yang bergantung pada sumbernya diisolasi menjadi dua, termasuk penguat sel endogen, atau senyawa yang merupakan penguat sel, misalnya Turf, Feline, dan Gpx dan penguat sel eksogen, yang didapat dari luar tubuh atau makanan. Bahan pengikat normal yang berbeda di Indonesia mengandung tandan penguat sel dengan bahan pengikat dinamis yang berbeda seperti unsur hara, alpa-tokoferol, flavonoid, timokuinon dan lain-lain (Kusmardika, 2020: 48).

Untuk memudahkan membantu masyarakat dalam penggunaan obat tradisional, maka dibuatlah sediaan. Salah satu sediaan topikal adalah *cream*. *Cream* dalam bentuk sediaan semi padat berupa emulsi kental yang mengandung

air tidak kurang dari 60%, ditujukan untuk pemakaian luar dengan cara dioleskan pada kulit yang terkena (Husni et al., 2019: 102).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukanlah penelitian untuk mengetahui manfaat dari kandungan antioksidan dalam daun kelor sebagai bahan aktif dalam sediaan *hand and body cream* menggunakan metode DPPH.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) dapat diformulasikan menjadi sediaan *hand and body cream* yang memenuhi syarat mutu fisik sediaan dengan variasi konsentrasi yang berbeda ?
2. Berapakah konsentrasi ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) yang memiliki aktivitas antioksidan tertinggi pada sediaan *hand and body cream*?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional

a) Daun kelor

Daun kelor adalah salah satu bagian dari tanaman kelor yang mengandung banyak nutrisi dan sering dijadikan salah satu menu sayuran.

b) Antioksidan

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menangkal efek negative dari oksidan. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan elektron pada senyawa pengoksidasi, sehingga menghambat aktivitas senyawa pengoksidasi tersebut.

c) Radikal bebas

Radikal bebas merupakan molekul yang sangat reaktif karena memiliki elektron yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya, sehingga dapat bereaksi dengan menggabungkan elektron dari molekul seluler.

d) DPPH

1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl atau biasa disingkat DPPH merupakan senyawa radikal bebas yang stabil, umumnya digunakan sebagai reagen dalam uji antioksidan untuk menangkal radikal bebas.

e) Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan pekat yang menggunakan pelarut yang sesuai untuk mengekstrak zat aktif dari tumbuhan atau hewan, kemudian menguapkan semua pelarut dan memproses zat atau bubuk yang tersisa untuk memenuhi standar yang ditentukan.

f) *Cream*

Cream merupakan suatu sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang larut ataupun terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai.

g) Kulit

Kulit merupakan lapisan atau jaringan yang menutupi seluruh tubuh dan melindunginya dari bahaya luar. Kulit juga merupakan bagian dari tubuh dan membutuhkan perhatian khusus untuk mempercantik kecantikannya.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup penelitian laboratorium, yaitu mengetahui kandungan antioksidan dalam ekstrak daun kelor sebagai bahan aktif sediaan *hand and body cream* dengan menggunakan metode DPPH.

D. Kajian pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, manfaat, dan posisi dari penelitian sebelumnya.

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Ramadhan, 2020: 7) dalam jurnal *Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 96% Daun, Buah, Dan Kulit Terap*. Penelitian pada bagian buah terap telah dilakukan Abu Bakar dkk. (2010), pelarut yang digunakan untuk ekstraksi yaitu etanol 96%. Pada tujuan

penelitian agar mengetahui aktivitas antioksidan daun, buah dan kulit buah terap secara maserasi dengan pelarut etanol 96% menggunakan metode CUPRAC (*Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity*).

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Dwika et al., 2016: 466) dalam jurnal *Identification Of Chemical Compounds Ethanol Extract Leaf Moringa (Moringa Oleifera Lamk) In Bali*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui golongan senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol daun kelor. Sampel yang digunakan adalah daun kelor yang diperoleh di wilayah Denpasar Utara, Bali. Daun kelor terlebih dahulu diekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol 96%, kemudian dilakukan uji fitokimia untuk mendeteksi adanya senyawa aktif alkaloid, flavonoid, saponin, fenolat, triterpenoida/steroida, dan tanin. Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Maryam et al., 2016: 117) dalam jurnal Pengukuran Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa Oleifera Lamk.*) Menggunakan Metode Frap (*Ferric Reducing Antioxidant Power*). Salah satu tanaman yang banyak mengandung antioksidan ditemukan dalam tumbuhan kelor (*Moringa oleifera Lamk.*), salah satunya pada bagian daun. Penelitian sebelumnya terhadap ekstraksi daun kelor (*Moringa oleifera Lamk.*) menunjukkan adanya aktivitas antioksidan yang tinggi dalam proses in vivo dan in vitro.
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Sugihartini et al., 2017: 3) *Sifat Fisik Krim Tipe A/M Dengan Variasi Konsentrasi Ekstrak Etanol Daun Kelor Moringa Oliefera Menggunakan Emulgator Tween 80 Dan Span 80*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak daun kelor dengan larutan penyari etanol 50% terhadap sifat fisik

sediaan. Hasil menunjukkan peningkatan konsentrasi ekstrak etanol daun kelor memiliki pengaruh terhadap sifat fisik krim A/M yaitu dapat meningkatkan daya sebar ($p < 0,05$), menurunkan pH ($p < 0,05$), daya lekat ($p < 0,05$), viskositas ($p < 0,05$). Hasil uji stabilitas fisik menunjukkan terjadi pemisahan pada krim A/M ekstrak etanol daun kelor 3%.

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Hasanah et al., 2016) dalam jurnal *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa Oleifera Lamk) Dengan Metode Dpph*. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni, dimana metode yang digunakan adalah metode pengukuran serapan radikal DPPH (*1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl*) tereduksi pada panjang gelombang 500 -525 nm, pada penelitian ini analisa data dengan menghitung nilai IC50. Konsentrasi ekstrak etanol daun kelor (*Moringa oleifera Lamk*) adalah 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm dan 250 ppm.
6. Berdasarkan jurnal *Formulasi Sediaan Krim Ekstrak Etanol Daun Bayam Merah (Amaranthus Tricolor L.) Dan Uji Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode Dpph (1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl)* penelitian yang dilakukan (Moilati et al., 2020). Daun Bayam merah (*Amaranthus tricolor L.*) mengandung senyawa flavonoid, saponin dan tannin yang memiliki potensial antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji aktivitas antioksidan sediaan krim ekstrak etanol daun Bayam merah (*Amaranthus tricolor L.*) menggunakan metode DPPH dan mengevaluasi sediaan krim menggunakan parameter uji.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk memformulasikan sediaan *hand and body cream* dari ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) yang memenuhi syarat mutu fisik sediaan dengan variasi konsentrasi yang berbeda.
2. Untuk mengetahui konsentrasi sediaan *hand and body cream* ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) yang memiliki aktivitas antioksidan tertinggi.

F. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan wawasan informasi mengenai aktivitas antioksidan dan karakteristik fisik sediaan *hand and body cream* antioksidan ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) yang baik.
2. Sebagai data ilmiah kepada masyarakat tentang khasiat dari daun kelor sebagai alternatif produk farmasi yang berasal dari bahan alam yang dapat diformulasikan menjadi sediaan *hand and body cream*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Umum

1. Kelor

Tanaman Kelor (*Moringa oleifera* Lamk) adalah salah satu variasi tanaman yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia (Kusmardika, 2020: 48).

Kelor (*Moringa oleifera* Lamk) termasuk dalam Family *Moringaceae*. *Moringaceae* merupakan family monogeriik dengan satu genus yaitu *Moringa* yang memiliki 33 species, di mana 4 (empat) species berstatus diterima, 4 (empat) species adalah sinonim dan 25 species belum terverifikasi (Purba, 2020: 3).

a. Daerah Tumbuh

Tanaman *Moringa oleifera* Lamk merupakan tumbuhan semak dengan tinggi 7-11 meter yang tumbuh subur dari rawa-rawa hingga ketinggian 700 m dpl. Kelor tidak sulit untuk mengisi berbagai macam iklim, tanaman ini dapat mengisi daerah tropis subtropis dan tahan terhadap musim kemarau dengan ketahanan musim kemarau selama setengah tahun (Kusmardika, 2020: 48).

Kelor merupakan tanaman yang sangat mudah ditemukan di Indonesia dan biasanya tumbuh sebagai tanaman penunjang di pekarangan, khususnya di wilayah non-metropolitan. Orang Sulawesi mengenalnya sebagai (kero, wori, kelo, keloro dan ganggang kaju), (maronggih) di Madura, (murong) di Aceh, (kelor) di suku Sunda dan Melayu, (kelo) di Ternary, (munggai) di Sumatera Barat dan (kawona) di Sumbawa. Dari jumlah spesies yang telah direferensikan, lebih dari 13 spesies berasal dari hutan. Meskipun hampir semua jenis *Moringa* mulai dari India dan Afrika, saat ini telah menyebar ke beberapa negara tropis termasuk beberapa negara, khususnya Madagaskar, Namibia, Angola, Kenya, Ethiopia, Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan (Purba, 2020: 3).

b. Morfologi

Moringa oleifera Lamk, atau biasa dikenal dengan nama *moringa*, merupakan tanaman perdu dengan tinggi batang 7 sampai 11 meter. Batang berkayu halus (lemah) dengan sedikit cabang tetapi sistem perakaran kuat. Bunganya memiliki bau yang harum, nada dasar warna kuning-putih, kelopaknya berwarna hijau dan produk organiknya berbentuk segitiga memanjang. Akar tunggang, putih, bengkak seperti lobak. Daunnya majemuk, mulai dari awal, lalu wayang pengganti menghasilkan daun ganjil (*impartialipinnatus*), daunnya hijau muda saat masih muda, saat tumbuh hijau tua, keadaan daun lonjong, tipis, lemah, ujung dan pangkal kasar (*obtusus*), tepi rata, bulu mendukung peta permainan (*flutter*), dan permukaan atas dan bawah halus. Setelah tanaman tumbuh hingga ketinggian 1,5 hingga 2 meter, daun kelor sudah bisa dipanen, pemanenan dilakukan dengan mencabut tangkai daun dari cabang (Widowati et al., 2014: 150).

Daun kelor berbentuk lonjong, dengan senyawa berukuran kecil di bagian ekor, yang dapat dibuat menjadi sayuran atau obat-obatan. Bunganya berwarna kuning-putih, dengan kelopak hijau, dan mekar sepanjang tahun. Seperti yang kita ketahui bersama, *moringa* mengandung lebih dari 90 suplemen, seperti nutrisi dasar, mineral, asam amino, anti penuaan dan obat penghilang rasa sakit (Agung et al., 2016: 465).

Kelor merupakan pohon dengan tinggi 12 m dan lebar 30 cm. kayu adalah kayu yang halus dan berkualitas rendah. Daun tanaman kelor berubah bentuk, kecil, bulat telur, kira-kira sebesar ujung jari. Daunnya berwarna hijau karamel, daun menjadi lonjong atau berbentuk telur, pangkal rata, tepi rata. Kulit akarnya tajam dan harum, dan bagian dalamnya berwarna kuning pucat, dengan garis-garis halus, tetapi dengan kilau yang saling mengunci. Akarnya tidak keras dan bentuknya berserakan, permukaan luar kulit kayu agak kasar, permukaan bagian dalam agak

liat dan kayunya ringan sampai krem berotot atau berotot umumnya terisolasi (Isnan, 2017: 65).

Moringa adalah tanaman yang berumur panjang dan berbunga terus menerus. Bunga kelor berwarna putih, kuning-putih (krem) atau merah, tergantung spesies atau spesiesnya. Kelopak kuncup bunga berwarna hijau dan mengeluarkan bau harum. Di Indonesia umumnya, bunga kelor berwarna kuning dan putih (Isnan, 2017: 65).

c. Klasifikasi

Dalam sistematis (taksonomi) tumbuhan, *Integrated Taxonomic Information System (2017)* tanaman kelor (*Moringa oleifera* Lamk) menurut (Isnan, 2017) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledoneae
Ordo	: Rhoeadales
Family	: Moringaceae
Genus	: Moringa
Spesies	: <i>Moringa oleifera</i> Lamk



Gambar 1. Daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk)

d. Kandungan Kimia

Daun kelor mengandung 29,61% protein, 7,48% lemak, 8,98% serat, 10,13% abu dan 1.318,29 kkal kg⁻¹ energi yang dapat dimetabolisme. Zat antinutrisi (%) yang terkandung dalam bahan kering daun kelor yaitu tanin 0,3%, saponin

6,4%, asam fitat 2,3% dan total fenol 2,7n, akan berkurang jika diekstraksi atau diubah menjadi tepung (Sukria et al., 2018: 2).

Ekstrak etanol *moringa oleifera* Lamk mengandung steroid dinamis dan triterpenoid. Triterpenoid adalah penambah, struktur karbon yang berasal dari isopropena enam unit, terutama squalene dan berasal dari biosintesis hidrokarbin asiklik. Untuk sebagian besar alkohol, aldehida atau asam karboksilat, campuran ini memiliki desain siklik yang kompleks. Senyawa ini adalah senyawa inert seperti batu permata, dengan titik lunak dan dinamika optik yang tinggi, yang sebagian besar sulit dijelaskan karena tidak ada reaktivitas zat fisik lain dalam makanan (Dwika, 2016: 469).

Daun kelor mengandung β -sitosterol 90 mg/g, fenolik seluruhnya 8 $\mu\text{g}/\text{mL}$ dan flavonoid 27 $\mu\text{g}/\text{mL}$, yang diyakini dapat diidentifikasi dengan aksi agen pencegah kanker (Nurulita et al., 2019).

Daun kelor memiliki cita rasa yang unik, yakni kandungan tanin yang dikandungnya. Tanin ada di alam, di semua aspek tanaman, terutama di daun dan kulit tanaman tropis (Ilona, 2015: 157).

2. Antioksidan

Antioksidan adalah nutrisi alami dalam buah dan sayuran tertentu dan telah terbukti melindungi sel manusia dari kerusakan oksidatif. Antioksidan dalam makanan berperan dalam menjaga kualitas dalam berbagai jenis kerusakan. Kerusakan oksidatif, seperti ketengikan, perubahan nilai gizi, perubahan warna dan aroma dan kerusakan fisik lainnya pada makanan (Dima et al., 2016: 82).

Antioksidan terbagi menjadi dua jenis, yaitu antioksidan buatan dan antioksidan alami. Antioksidan sintetik adalah antioksidan yang diperoleh dengan mensintesis reaksi kimia dari luar tubuh. Antioksidan alami adalah senyawa

antioksidan yang diekstraksi dari bahan alamix yang diambil dari alam seperti tumbuhan (Kusmardika, 2020: 47).

Tubuh memproduksi senyawa yang bersifat antikanker (antioksidan), namun jumlah antioksidan yang umumnya dikeluarkan tubuh terbatas dan tidak dapat bersaing dengan radikal bebas yang dihasilkan setiap hari. Dengan cara ini, diperlukan peningkatan masuknya sel dari luar tubuh. Ada banyak sumber makanan yang dapat digunakan sebagai antioksidan alami. Terutama dari tanaman, mereka umumnya memperkuat fenolat yang hilang melalui proses penguatan seluler yang unik (Nurulita et al., 2019: 2).

Penangkal radikal bebas atau biasa disebut dengan antioksidan adalah zat yang dapat membunuh radikal bebas atau dapat mencegah sistem tubuh menghambat efek siklus atau reaksi yang menyebabkan oksidasi berlebihan. Bukti logis yang berbeda menunjukkan bahwa campuran ini adalah antioksidan yang dapat mengurangi resiko lanjutan dari pertumbuhan ganas dan penyakit jantung koroner dan penyakit lainnya (Damanis et al., 2020: 465).

Agen pencegah kanker (antioksidan) bertindak sebagai penangkal radikal bebas dengan menyumbangkan elektron dan mereduksi partikel logam. Campuran fenol dan flavonoid dapat digunakan sebagai promotor sel karena memiliki gugus hidriksil yang dapat menghasilkan hidrogen, sehingga dapat membunuh radikal bebas. *Moringa oleifera* Lamk mengandung flavonoid dan fenol yang merupakan indikator penguatan sel (Purba, 2020: 6).

Antioksidan akan membantu menghambat perbaikan sel kanker, sedangkan potasium digunakan untuk mendegradasi sel yang sakit. Selain itu, asam amino yang terkandung dalam *moringa oleifera* Lamk dapat dibentuk dengan cara kerja sistem kekebalan tubuh (Kusmardika, 2020: 49).

Antioksidan atau senyawa penangkap radikal bebas adalah zat yang dapat membunuh radikal bebas atau dapat mencegah sistem tubuh menghambat efek siklus atau reaksi yang mengarah pada oksidasi berlebihan (Hasanah et al., 2016: 18).

3. Radikal bebas

radikal bebas adalah sekelompok zat sintesis. Kulit terluar partikel dan atom memiliki elektron yang tidak berpasangan. Oleh karena itu, dikategorikan tidak aman. Mereka selalu mencoba untuk mendapatkan elektron dari atom yang berbeda untuk mengoksidasi lingkungan sekitarnya. Atom berubah menjadi radikal bebas yang berbahaya bagi atom/ sel alami. Pada dasarnya, tidak ada atom di alam yang merupakan radikal bebas. Ketika partikel non-radikal bertemu radikal bebas, mereka membentuk atom radikal lain (Kusmardika, 2020: 47).

Radikal bebas adalah campuran akseptor dengan elektron yang tidak berpadangan. Metabolisme sel yang normal, tubuh yang kurang gizi, kebiasaan makan yang tidak tepat, gaya hidup yang kurang sehat, asap rokok, cahaya terang dan cuaca yang tercemar semuanya dapat menyebabkan radikal bebas dalam tubuh manusia. Ini membutuhkan penangkal, yang merupakan antioksidan (Purwaningsih, 2014: 56).

Radikal bebas juga berpartisipasi dalam siklus degenerasi, yaitu interaksi yang secara berhadap mengurangi kemampuan jaringan untuk mengganti/memperbaiki dirinya dan mempertahankan kemampuan normalnya. Perkembangan ini mempengaruhi muskuloskeletal, neurologis, kardiovaskular, pernapasan, tulang berwujud (penglihatan, pendengaran, rasa dan kontak) dan eksoskeleton (Kusmardika, 2020: 47-48).

Radikal bebas dapat dihindari atau dilemahkan dengan memberikan antioksidan atau mengonsumsi antioksidan. Pengaruh radikal bebas dapat

menyebabkan peradangan dan penuaan, serta merangsang karsinogen. Untuk menetralkan radikal bebas, tubuh membutuhkan antioksidan untuk membantu melindungi tubuh dari radikal bebas dan mengurangi efek negatifnya (Susanty, 2019: 32).

4. Ekstraksi

Dalam interaksi distribusi campuran aktif biologis, pemilihan teknologi distribusi campuran merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, mengingat berapa banyak rendamen yang akan dihasilkan selama siklus pelepasan ini. Ekstraksi atau pelepasan senyawa aktif biologis pada tanaman, terlepas dari apakah mereka ada di daun, biji, akar atau batang (Kiswandono, 2017: 45).

Pada dasarnya ekstraksi dingin tidak memerlukan pemanasan. Direkomendasikan yang mengandung fragmen sintesis yang tidak tahan panas dan bahan umum dengan permukaan halus, seperti daun dan bunga. Keunggulan dari metode ini adalah memiliki frekuensi penggunaan yang paling tinggi, tidak dengan waktu dan penggunaan yang tidak mencakupi dan pemborosan pelarut (Kiswandono, 2017: 46).

Teknik ekstraksi termal adalah refluks, metode ini adalah cairan yang terus menerus dan konsisten, ia mencari prinsip-prinsip yang efektif dengan cara yang sederhana. Cairan hasil saring dipanaskan dan diuapkan, sedangkan uap didinginkan dan dikondensasikan sebaliknya dikondensasikan menjadi partikel fluida, yang jatuh kembali ke labu alas bulat sambil mengekstraksi kristal tunggal, 4 jam pengujian dilakukan adalah pengujian yang memiliki ketahanan panas dan permukaan yang keras pada beberapa zat, seperti pada biji, kulit dan (Kiswandono, 2017: 47).

5. Metode ekstraksi

Ekstraksi digunakan untuk mendapatkan campuran sintesis yang larut. Selama pemisahan campuran tanaman yang aktif secara biologis, beberapa jenis ekstraksi biasanya digunakan untuk menentukan rasa yang akan diberikan, yaitu ekstraksi dingin spesifik, termasuk maserasi, infiltrasi dan sulfonasi, seperti ekstraksi panas, terutama dengan refluks (Kiswandono, 2017: 46).

Ada beberapa metode ekstraksi yang menggunakan pelarut, yakni:

a. Dengan cara dingin

1) Maserasi

Maserasi adalah teknik ekstraksi dengan merendam bahan dalam zat terlarut yang dikoordinasikan dengan senyawa dinamis yang akan diekstraksi di bawah siklus pemanasan rendah atau tanpa pemanasan. Variabel yang mempengaruhi ekstraksi meliputi waktu, suhu, jenis kelarutan, rasio bahan terhadap pelarut dan ukuran molekul. Proses ekstraksi sampel dilakukan dengan menggunakan metode dipping. Sebanyak 567,5 g sampel basah menghasilkan 100 g simplisia, yang kemudian direndam dalam 1 liter etanol 96%. Bubur yang diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator (Chairunnisa et al., 2019: 552).

Keuntungan ekstraksi dengan teknologi perendaman adalah untuk memastikan bahwa zat aktif yang diekstraksi tidak rusak. Selama siklus ini, dekomposisi terjadi karena perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar sel, sehingga metabolit sekunder sitoplasma dipecah menjadi fragmen dan dihancurkan dalam zat terlarut alami yang digunakan (Chairunnisa et al., 2019: 552).

Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam interaksi ekstraksi adalah waktu maserasi. Semakin lama waktu perendaman, semakin besar kontak antara zat terlarut dengan zat, yang akan meningkatkan jumlah sel yang rusak dan bahan aktif yang dihancurkan. Kondisi ini akan terus berlanjut sampai tercapai keadaan

setimbang antara konsentrasi campuran dalam bahan dan konsentrasi campuran dalam zat terlarut (Chairunnisa et al., 2019: 553).

2) Perkolasi

Perlokasi serbuk daun kelor yang telah diinfiltrasi dengan etanol 96% (1:20, b/v) pada suhu kamar (laju alir 1 ml/menit). Tambahan fraksi terlarut lainnya dan ulangi ekstraksi sampai konsentrat akhir tidak berwarna. Konsentrat gabungan disaring dan filtrat pekat diuapkan dengan menggunakan evaporator vakum putar Buchi pada tegangan 75 mbar dan 40°C. konsentrat kental kemudian diuapkan dalam penangas air mendidih sampai tercapai berat yang stabil (Susanty, 2019: 33).

b. Dengan cara panas

1) Refluks


Masukkan 20 sampai 25 g sampel kering yang telah dihancurkan ke dalam labu alas bulat, tambahkan heksan secukupnya dan refluks selama 7 jam. Ekstraksi dilakukan berkali-kali. Kemudian larutan pekat tersebut disaring dan filtratnya dipekatkan menggunakan rotary dan ditentukan rendamennya. Ampas dikeringkan dan direflokkan lagi dengan methanol 80% (seperti heksan). Filtrat selanjutnya dipekatkan untuk mendapatkan konsentrat yang tidak dimurnikan dan ditentukan hasilnya (Kiswandono, 2017: 47).

2) Soxhletasi

Serbuk daun kelor diekstraksi dengan etanol 96% menggunakan Soxhlet (60-80°C) sampai konsentrat akhir kering. Pisahkan konsentrat dan gunakan evaporator putar vakum merek Buchi untuk menghilangkan filtrat pekat pada 75 mbar dan 40°C. Konsentrat kental kemudian diuapkan dalam penangas air mendidih sampai diperoleh berat konstan (Susanty, 2019: 33).

6. Kulit

Kulit adalah salah satu bagian jaringan tubuh yang secara langsung menunjukkan siklus pematangan (Noer et al., 2016: 103)



Gambar 2. Anatomi kulit

Kulit yang menutupi seluruh tubuh berperan sebagai pelindung, mencegah benturan, mengatur suhu dan sekresi tubuh, serta merupakan organ tubuh yang menutupi seluruh tubuh berperan sebagai pelindung, mencegah benturan, mengatur suhu dan sekresi tubuh, serta merupakan organ tubuh yang sensitif, karena kulit merupakan salah satu organ taktil. Kondisi kulit seseorang akan berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kesehatannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain lingkungan pekerjaan atau keluarga, asupan makanan, gaya hidup, dan keseimbangan hormonal (Wahyuningtyas et al., 2015: 1).

Kulit merupakan organ yang sensitif terhadap suhu, perubahan cuaca dan radikal bebas. Aktivitas luar ruangan melibatkan peningkatan paparan radiasi UV, kabut asap dan polusi udara yang dapat menyebabkan masalah kulit di seluruh tubuh. Sinar matahari, kabut asap, dan polusi udara adalah faktor eksternal yang menyebabkan masalah kulit. Faktor internal mempengaruhi hormon, gaya hidup dan usia. Hormon adalah zat yang mengatur berbagai fungsi tubuh. Pada kadar yang rendah, hormon justru mempengaruhi berbagai proses di dalam tubuh. Merokok,

kebiasaan makan yang tidak sehat, kurang istirahat juga dapat menyebabkan penggelapan dan penuaan dini pada kulit, menyebabkan hilangnya elastisitas kulit dan pembentukan kerutan (Isfianti, 2018: 74-75).

Tubuh memiliki daya pelembab yang unik, mengeluarkan minyak biasa (sebum), dan menjaga permukaan kulit tetap halus, lembut dan aman. Padahal, jika sebum hilang, permukaan kulit akan pecah-pecah dan kulit menjadi kering dan efektif. Selain itu, dengan adanya zat penyerap udara di kulit, seperti asam amino seperti asam amino, purin, pentosa, kolin dan fosfat rantai cabang korosif, mereka menyumbang 20% dari berat lapisan tanduk, yang dapat mencegah kulit dari kekeringan. Namun, bahan-bahan tersebut dapat dikeluarkan dari kulit dengan cara atau tujuan tertentu, sehingga, kulit kehilangan hidrofilisitas dan elastisitasnya (Aryani, 2015: 38-39).

Pada orang dewasa, berat badan sekitar 2,7 hingga 3,6 kilogram setara dengan sekitar 1,51,9 kaki persegi kulit. Kulit terdiri dari jutaan sel kulit yang dapat mati dan kemudian digantikan oleh sel kulit baru yang tumbuh dan hidup. Kulit terdiri dari tiga lapisan utama: epidermis (lapisan luar tipis), dermis (lapisan tengah) dan subkutan (lapisan dalam) (Sari, 2015: 64).

Lapisan ini terdiri dari lima lapisan (dari atas ke bawah). Kulitnya setebal 75.150 meter, paling tebal hingga telapak tangan dan telapak kaki. Telapak tangan dan telapak kaki lebih tebal daripada bagian tubuh lainnya karena adanya stratum korneum di area ini. Ini penting karena gesekan lebih sering terjadi di beberapa bagian tubuh daripada di bagian lain dan biasanya 14 mm. Kulit Ketebalan dermis bervariasi dari bagian ke bagian tubuh, biasanya 14 mm. Dermis adalah jaringan yang aktif secara metabolik yang mengandung kolagen, elastin, sel saraf, pembuluh darah, dan kelenjar getah bening. Selain folikel rambut, terdapat kelenjar eksokrin,

kelenjar apokrin, dan kelenjar sebacea. Terlokalisasi di bawah kulit di dermis, terdiri dari jaringan ikat dan lemak (Sari, 2015: 64).

Kulit memiliki fungsi pelindung, yaitu mengatur suhu tubuh dan persepsi sensorik, serta berfungsi melindungi lapisan dari radiasi ultraviolet.

Untuk mengurangi paparan radiasi UV, ada dua cara bagi stratum korneum untuk memantulkan radiasi. Selain itu, paparan sinar matahari meningkatkan aktivitas melanosit, menghasilkan melanosom, dan mentransfer melanosit ke epidermis. Ini dapat membantu mengurangi penyerapan radiasi UV, yang dapat memblokir sel. Namun, paparan berlebihan terhadap radiasi ultraviolet, termasuk radiasi ultraviolet A dan radiasi ultraviolet B, dapat menyebabkan kerusakan kulit, terbakar sinar matahari, bintik-bintik coklat dan kekeringan, dan bahkan kanker kulit (Oktaviasari et al., 2017).

Proses penuaan ini dapat terjadi karena adanya faktor eksternal dan internal. Dalam hal ini, faktor internal seperti penuaan disebabkan oleh gen, hormon dan ras tidak dapat dicegah. Dan faktor eksternal, yaitu penuaan yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti paparan sinar matahari, suhu, asap rokok, kelembaban udara dan polusi, hal ini terjadi di luar tubuh dan dapat dicegah dengan meminimalkan paparan faktor-faktor tersebut (Maya et al., 2018: 299).

Karena radikal bebas, sinar matahari, dan polusi udara dapat menyebabkan kulit kering, kasar, bersisik, keriput dan flek hitam (Moilati et al., 2020: 373).

Kulit sangat bermanfaat untuk penampilan seseorang karena harus dirawat, dijaga dijaga kesehatannya. Kebanyakan orang menggunakan berbagai kosmetik untuk merawat kulit wajah (Santoso et al., 2020: 18).

Satu hal tentang mekanisme kulit adalah ketika kulit tidak hanya melindungi bagian luar tubuh dari benda lain, tetapi juga menyerap beberapa zat di dalam tubuh. Tubuh membutuhkan sinar matahari untuk membuat vitamin D dan membantu

tulang menyerap kalsium dan zat lainnya. Namun, paparan sinar matahari jangka panjang dapat merusak kulit, menyebabkan keriput dan kemungkinan kanker jangka panjang (Sumbayak, 2019: 71).

Dalam proses penuaan kulit, kerutan dan kerutan bisa terlihat. Ada dua teori untuk menjelaskan proses penuaan, yaitu penuaan merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari oleh semua makhluk hidup. Penuaan merupakan akibat dari kerusakan anatomis dan fisiologis pada setiap organ tubuh, mulai dari pembuluh darah dan organ lain hingga kulit perubahan yang dibawah oleh proses kulit dapat dibagi menjadi perubahan anatomi, fisiologis dan kimia. Beberapa perubahan anatomi dapat langsung terlihat, seperti hilangnya elastisitas dan elastisitas kulit, kerutan dan kerutan akibat paparan sianr matahari yang terlalu lama, penebalan kulit, epidermis yang kering dan pecah-pecah, perubahan bentuk kuku dan rambut dll (Dipahayu et al., 2014: 167).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi penuaan kulit, tetapi faktor yang paling penting adalah sinar matahari, terutama sinar ultraviolet yang terkandung dalam sinar matahari. Knox dkk menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kulit yang tidak tertutup pakaian yang sering terkena sianr matahari dan kulit yang sering tertutup pakaian. Kulit yang terpapar akan menjadi kering, berkerut, kasar dan mengalami kerusakan lain akibat sinar UV (Rahmadani et al., 2019: 107).

Selain penuaan dini, stress juga dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit degeneratif yang mengancam, seperti diabetes, penyakit jantung, stroke dan gagal ginjal. Hal ini disebabkan oleh pola makan yang salah, gaya hidup yang salah dan stress jangka panjang yang disebabkan oleh pekerjaan, keluarga dan lingkungan sosial (Maryam et al., 2016: 115).

Umumnya, kosmetik pelembab kulit terdiri dari bahan pelembab yang dapat membentuk minyak buatan di permukaan kulit, yang dapat melipatgandakan lapisan kulit kering dan kasar serta mengurangi penguapan kelembaban dari kulit (Sumbayak, 2019: 71).

7. Kosmetik

Kosmetik berasal dari kata Yunani “*cosmetikos*” yang berarti yang berarti teknik, dekorasi, restorasi. Saat ini kosmetik atau produk perawatan kulit wajah wanita sudah menjadi kebutuhan khusus dan barang penting. Saat ini banyak sekali jenis produk perawatan kulit yang beredar di pasaran dengan harga yang mahal maupun yang murah. Selain itu, beberapa produk perawatan ini tidak dijamin aman saat digunakan. Situasi menjadi lebih rumit karena kurangnya pemahaman wanita tentang produk perawatan ini (Wahyuningtyas et al., 2015: 1).

Kosmetik diklasifikasikan menurut peraturan kesehatan pemerintah Indonesia. Penggunaannya pada kulit menjadi perawatan kulit (*skin care* kosmetik) dan kosmetik (dekorasi atau rias wajah). Kosmetik perawatan kulit meliputi kosmetik yang digunakan untuk membersihkan kulit (cleansing), sabun, krim pembersih dan penyegar kulit, kosmetik yang digunakan untuk melembabkan kulit atau pelembab, antara lain pelembab, krim malam, krim anti kerut dan kosmetik untuk mengencerkan kulit. Kosmetik membutuhkan riasan untuk menutupi ketidaksempurnaan kulit untuk menghasilkan penampilan yang menawan dan memiliki efek psikologis yang baik seperti kepercayaan diri.

Dalam kosmetik warna, pewarna dan wewangian memainkan peran yang sangat penting. Tujuan utama penggunaan kosmetik dalam masyarakat modern adalah kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui riasan, meningkatkan kepercayaan diri dan ketenangan, melindungi kulit dan rambut dari sinar ultraviolet,

polusi dan faktor lingkungan lainnya, mencegah penuaan dan umumnya membantu. Nikmati hidup lebih baik (Tranggono et al., 2007).

Manfaat utama menggunakan kosmetik adalah perawatan dan perawatan, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan ketenangan, melindungi kulit dari paparan langsung faktor lingkungan seperti sinar ultraviolet, polusi udara, dan mencegah penuaan dini (Santoso et al., 2020).

Skin care cosmetic berperan fungsi dan mekanisme perlindungan kulit agar berjalan dengan baik. Pada dasarnya dapat melindungi kulit dari efek kekeringan, kusam dan oksidasi sehingga kulit tetap cantik dan sehat. Peremajaan kulit sangat dianjurkan agar kulit tidak menjadi kering, kasar, dan kusam. Upaya agar mengatasi permasalahan akibat paparan sinar mahatari dan radikal bebas dengan menggunakan pelembab yaitu *hand and body*. Zat aktif yang terkandung pada sediaan *hand and body* yakni senyawa antioksidan (Noer, 2016: 101).

Aktivitas antioksidan pada ekstrak daun kelor saat ini banyak diteliti sebagai campuran dalam bidang kecantikan seperti *hand and body cream*. *Skin care* ini berguna dalam menjaga fungsi dan melindungi kulit. Pada dasarnya kosmetik ini dapat melindungi kulit dari efek kekeringan, radiasi ultra violet dan oksidasi sehingga kulit tetap sehat dan terjaga (Isnain, 2017: 71).

8. Tipe cream

Cream adalah kosmetik yang praktis dan praktis, didefinisikan sebagai sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan farmakologi yang terlarut atau terdispersi dalam matriks yang sesuai (Latif et al., 2020: 10).

Sediaan *cream* adalah bentuk sediaan semi-padat untuk penggunaan luar. *Cream* yang diinginkan memiliki sifat tidak lengket dan dapat merata di permukaan kulit (Moilati et al., 2020: 373).

Seperti lotion, *cream* memiliki dua fase. *Cream* dengan sistem emulsi minyak dalam air (w / o) di mana fase minyak terdispersi dalam bentuk partikulat dalam fase air sebagai fase kontinu. *Cream* dengan sistem emulsi air dalam minyak (w / o) di mana fase minyak bertindak sebagai fase kontinu (Husni et al., 2019: 102).

Hand and body cream adalah produk perawatan tubuh yang biasa digunakan untuk melembabkan dan melindungi kulit dari pengaruh lingkungan. *Hand and body cream* yang banyak disukai adalah produk *cream* yang berbentuk O/W (minyak dalam air). *Cream* berbentuk O/W adalah emulsi minyak dalam air yang penampakannya menyerupai *lotion* yang mengandung fase minyak dan fase humektan yang lebih banyak dari *lotion*, yaitu 15-40% fase minyak, 5-15% humektan dan sisanya adalah fase air. *Cream* berbentuk O/W biasanya memiliki karakteristik yang mudah diserap kulit setelah digosokkan, tidak lengket di kulit, mudah mengalir dan mudah dipompa (Paramitha et al., 2017: 2).

Sediaan *cream* m/a mempunyai pengaruh dalam jumlah dan kecepatan zat aktif yang diabsorpsi. Zat aktif dalam sediaan *cream* masuk ke dalam basis atau zat pembawa yang akan membawa obat untuk kontak pada permukaan kulit. Beberapa keuntungan sediaan ini diantaranya lebih mudah diaplikasikan, nyaman digunakan, tidak lengket dan mudah dicuci dengan air, dibandingkan dengan sediaan salep, gel dan pasta. Selain itu, basis untuk tipe m/a dapat meningkatkan dan memperbaiki kelembaban kulit sehingga kandungan air pada kulit lebih baik dan kulit pun menjadi kenyal dan lentur (Husni et al., 2019: 102).

9. Bahan penyusun

Proses pembuatan *cream* adalah mencampurkan zat-zat yang larut dalam fase air dengan zat-zat yang larut dalam fase minyak, lalu dipanaskan dan diaduk.

Bahan yang digunakan dalam formulasi ini memiliki fungsi yang berbeda, antara lain:

a. Gliserin

Gliserin ($C_3H_8O_3$) juga dikenal dengan gliserol atau gula alkohol, adalah cairan seperti sirup, bening, tidak berwarna, tidak berbau, manis diikuti hangat kira-kira 0,6 kali lebih manis dari sukrosa, higroskopis. Memiliki rasa manis dapat bercampur dengan air dan dengan etanol (95%) p, praktis tidak larut dalam kloroform P, dalam eter P dan minyak lemak. Kegunaan sebagai humektan (Rowe, 2009: 283).

b. Trietanolamin

Trietanolamin ($C_6H_{15}NO_3$) adalah senyawa organik yang terdiri dari amina tersier dan triol. Sering ditambahkan pada sediaan topikal sebagai bahan pengemulsi anionik. Cairan kental bening, bersifat higroskopis, berwarna kuning pucat dan memiliki titik leleh 20-21°C. Bahan ini mudah larut dalam air, metanol, dan aseton. Konsentrasi yang sering digunakan sebagai bahan pengemulsi adalah sebesar 2-4%. Kegunaan sebagai emulgator untuk membentuk emulsi minyak dalam air yang stabil (Rowe, 2009: 754).

c. Paraffin

Cairan kental transparan, tidak berwarna, bebas dari fluoresensi pada cahaya matahari. Praktis tidak berasa dan tidak berbau ketika dingin dan mempunyai bau lemah ketika dipanaskan. Praktis tidak larut dalam etanol (95%), gliserin dan air. Larut dalam aseton, benzen, kloroform, karbon disulfid, eter dan eter minyak tanah. Berfungsi sebagai emolient, pelarut (Rowe, 2009: 474).

d. Asam stearate

Memiliki rumus molekul $C_{18}H_{36}O_2$. Asam stearat merupakan campuran organik padat yang berbentuk padat, keras, putih atau kuning pucat, praktis tidak

larut dalam air, larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol 95% , dalam kloroform p dan dalam 3 bagian eter p, konsentrasi yang sering digunakan untuk melembutkan kulit dengan konsentrasi 1-20% sebagai basis dan juga dapat memberikan kesan lembut pada kulit (Rowe, 2009: 697).

e. Setil alkohol

Setil alkohol $C_{16}H_{34}O$ merupakan alkohol lemak memiliki bentuk serpihan putih, licin bergranul. Banyak digunakan sebagai bahan pengemulsi pada sediaan *cream*. Sangat mudah larut dalam etanol 95% dan eter, tidak dapat larut dalam air. Pada umumnya konsentrasi yang digunakan yaitu 2-10%. Apabila konsentrasi yang dipakai dalam pembuatan sediaan, emulsi yang akan terbentuk semakin padat. Kegunaanya sebagai emolien dan pengemulsi (Rowe, 2009: 156).

f. Metil paraben

Metil paraben biasa disebut dengan nipagin mempunyai rumus molekul $C_8H_8O_3$ secara luas kegunaannya yakni sebagai pengawet antimikroba pada sediaan kometika, produk makanan minuman dan formulasi obat-obatan. Berbebmtuk serbuk putih, tidak berbau atau berbau khas lemah, memberikan sedikit rasa terbakar, mudah larut dalam etanol, eter, propilen glikol dan air panas dengan suhu $80^{\circ}C$ konsentrasi yang sering digunakan pada sediaan topikal yaitu 0,02-0,3% (Rowe, 2009: 441-442).

g. Oleum citri

Memiliki sinonim minyak jeruk berbentuk cairan, kuning pucat atau kuning kehijauan, berbau khas, rasa pedas agak pahit. Kegunaan sebagai pengaroma (FI edisi III. 19 :455).

h. Asam askorbat

Rumus molekul asam ascorbat ialah $C_6H_8O_6$ dan berat molekulnya yaitu 176,12. Memiliki titik leleh $191-192^{\circ}C$, menunjukkan warna yang putih hingga

kuning muda, tidak higroskopik, tidak berbau, bubuk kristal, dan rasanya asam. Berwarna gelap bila terkapar sinar matahari (Rowe, 2009).


Vitamin C, umumnya dikenal sebagai asam askorbat, memainkan peran penting dalam tubuh manusia. Sebagai antioksidan kuat, dapat digunakan secara topikal dan secara efektif dapat melindungi sel dari (ROS). Vitamin C adalah vitamin larut air yang berbeda dengan vitamin B kompleks. Selain berperan sebagai nutrisi dalam tubuh, juga merupakan antioksidan sekunder dan antioksidan tersier, salah satunya adalah donor electron, menyediakan electron untuk reaksi biokimia di dalam dan diluar sel. Kehadirannya dapat mengurangi spesies oksigen reaktif pada monosit, neutrophil, lensa dan retina mata. Vitamin C dapat mereduksi superoksida, peroksida, hidroksil, asam klorida dan radikal bebas oksigen reaktif dari neutrofil dan monosit teraktivasi (Aminah et.al, 2019: 43).

10. Metode DPPH (*1,1-difenil-2-pikrilhidrazil*)

Salah satu ukuran aktivitas antioksidan yang paling umum digunakan adalah penggunaan *1,1-difenil-2-pikrilhidrazil* (DPPH) untuk menangkap radikal bebas. Metode ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, seperti aktivitas penangkap radikal bebas yang tinggi dalam pelarut organik pada suhu kamar, metode yang sederhana dan mudah, menggunakan sedikit sampel dalam waktu singkat, hanya diperlukan spektrofotometer UV-Vis (Dima et al., 2016: 82).

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya senyawa antioksidan pada tanaman adalah dengan menggunakan metode DPPH. Metode ini merupakan metode yang cepat dan mudah serta tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk menentukan kapasitas antioksidannya. Metode ini biasa digunakan untuk menguji senyawa yang bertindak sebagai donor hidrogen dan mengevaluasi aktivitas antioksidannya, serta untuk menentukan jumlah kompleks radikal bebas antioksidan yang terbentuk (Shofi et al., 2020).

Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel dalam bentuk padat atau cair (Prakash, Rigelhof dan Miller, 2001). Radikal DPPH adalah senyawa organik yang mengandung nitrogen tidak stabil, memiliki absorbansi kuat pada 517 nm dan berwarna ungu tua. Setelah direaksikan dengan senyawa antioksidan maka DPPH akan




berkurang dan warnanya akan berubah menjadi kuning. Perubahan ini dapat diukur dengan spektrofotometer dan diplot menurut konsentrasinya (Shofi et al., 2020).

Gambar 3. Reaksi DPPH dengan antioksidan

Jika atom atau kelompok atom suatu senyawa memiliki elektron yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya, senyawa tersebut dapat menjadi radikal bebas. Yang membuat elektron terluar tidak berpasangan adalah reaksi oksidasi. Pada manusia, senyawa radikal bebas secara alami terbentuk dalam tubuh manusia melalui reaksi oksidasi yang terjadi pada sistem metabolisme sel normal. Ketika sel terinfeksi, tetapi Juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal (Salim, 2019: 92).

11. Spektrofotometer Ultra Violet-Visible (UV-Vis)

Teknologi analisis spektroskopi menggunakan instrumen spektrofotometer menggunakan sumber radiasi elektromagnetik dekat ultraviolet (190-380 nm) dan tampak (380-780 nm).



Gambar 4. Skema spektrofotometer Uv-Vis

Komponen spektrofotometer UV-Vis terdiri dari 5 komponen utama, yaitu: sumber radiasi, wadah sampel, monokromator, detektor, penguat, dan perekam. Hukum kerja spektrofotometer UV-Vis adalah ketika cahaya monokromatik melewati medium (penyesuaian), sebagian cahaya diasimilasi (I), sebagian besar dipantulkan (I_r), dan sejumlah kecil dibangkitkan (I_t). Penggunaan persamaan dalam estimasi kuantitatif hampir sama untuk investigasi kuantitatif dan subjektif tingkat rendah menggunakan deviasi kecocokan hubungan antara urutan fokus respons instrumen, karena kepastian subjektif tergantung pada transmisi komponen tertentu ke a panjang tertentu di bagian atas. Bentuk gelombang spesifik dan jaminan kuantitatif bergantung pada nilai absorbansi yang dihasilkan oleh rentang senyawa kompleks yang ditunjukkan oleh komponen analitik (Yanlinastuti et al., 2016: 23).

B. Tinjauan islam

Saat ini, tanaman merupakan salah satu bahan tambahan alternatif yang dipilih oleh seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut tidak memiliki efek samping yang besar dibandingkan dengan bahan yang terbuat dari bahan kimia sintetis. Dalam Al-Qur'an menyebutkan banyak manfaat tanaman yang digunakan sebagai obat penyembuhan. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan adalah daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) yang berkhasiat sebagai antioksidan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Asysyu`ara ayat 7:

أَو لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?(Departemen Agama RI, 2002)

Yang dimaksud dalam ayat tersebut bahwa Allah SWT. Menghendaki agar manusia senantiasa bersyukur atas segala pemberian Allah SWT. Melalui tumbuh-tumbuhan yang memiliki manfaat untuk kepentingan manusia, tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Kata *zauj* yang berarti berpasang-pasangan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kata *karim* digunakan menggambarkan segala sesuatu yang baik. Tumbuhan yang paling baik adalah tumbuhan yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2009).

Dalam pandangan Islam, segala ciptaan Allah SWT. Tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan beranekaragam dan manfaatnya yang dapat diketahui melalui penelitian pada tanaman kelor (*Moringa oleifera* Lamk) sebagai antioksidan untuk mencegah penuaan dini.

Dan kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sebagian ulama berpendapat menumbuhkembangkan di bumi ini aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup dan menetapkan bagi sebagian tanaman itu masa pertumbuhan dan penuaian tertentu. Sesuai dengan kualitas dan kebutuhan makhluk hidup. Demikian juga Allah SWT. Menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan dan habitat alamnya (Shihab, 2009).

Semua jenis tumbuhan dapat digunakan untuk mengobati penyakit, ini adalah karunia dari Allah SWT. Melalui Allah SWT. Jangan meminum penyakit tanpa obat (penawar). Inilah yang harus dipelajari dan digunakan manusia. Seperti yang disebutkan dalam Q.S. Thahaa ayat 53 yang berbunyi :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang Telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (Departemen Agama RI, 2006)

Ayat di atas menjelaskan bahwa *Dia*, (*yang telah menjadikan bagi kalian*) di antara sekian banyak makhluk-nya (*bumi sebagai hamparan*) tempat berpijak (*dan Dia memudahkan*) mempermudah (*bagi kalian di bumi itu jalan-jalan*) tempat-tempat untuk berjalan (*dan Dia menurunkan dari langit air hujan*) yakni merupakan hujan. Sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya (Shihab, 2009).

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang mampu tumbuh di bumi dengan adanya air hujan, banyak jenis tumbuh-tumbuhan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian ekperimental kuantitatif berupa pemanfaatan ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) sebagai antioksidan menggunakan metode DPPH dalam sediaan *hand and body cream*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pancasakti Makassar.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai bulan Juni-Agustus 2021.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan secara kuantitatif berupa pemanfaatan ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) sebagai antioksidan menggunakan metode DPPH dalam sediaan *hand and body cream*.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa alat dan bahan yang dapat menunjang antara lain.

1. Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan antara lain seperangkat alat maserasi, batang pengaduk, cawan porselin, deck glas, erlenmeyer (pyrex®), gelas kimia (pyrex®), gelas ukur (pyrex®), pipet tetes, pipet micro, pH meter (Methrom 620®), spektrofotometer uv-vis (Hitachi tipe U-1100®), tabung reaksi (pyrex®), timbangan analitik (Sartorius BP 110S®), viscometer brookfield (Synchro-Letci LVT®), waterbath (Memmert tipe WNB14®), dan wadah *cream*.

2. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan antara lain *1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl* (Sigma-Aldrich®) asam stearate, aquadest (Waterone®), ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk), ethanol 96% , metil paraben, paraffin cair, pewangi (*oleum citri*), setil alkohol, trietanolamin, dan vitamin C (asam ascorbat) (Kalbe®).

D. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan adalah daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) sebanyak 2 kg.

E. Prosedur Kerja

1. Preparasi sampel daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk)

Daun diambil, kemudian dilakukan sortasi basah dan pencucian dengan air yang mengalir sampai benar-benar bersih. Setelah itu, dilakukan perajangan lalu daun dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dalam suhu kamar sampai benar-benar kering. Setelah kering daun kelor dihaluskan menjadi serbuk dengan menggunakan blender, dan kemudian di ayak, agar sampel dapat dipastikan sudah benar- benar halus (Susanty, 2019).

2. Ekstraksi sampel daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk)

Serbuk daun kelor dimaserasi dengan etanol 96% pada suhu kamar selama 4 hari dan disaring melalui kertas saring Whatman No. 41. Bagian lain dari pelarut ditambahkan dan ekstraksi diulang sampai ekstrak terakhir tidak berwarna. Ekstrak digabungkan dan terkonsentrasi diuapkan menggunakan evaporator. Ekstrak kental kemudian diuapkan pada bak air mendidih sampai diperoleh berat konstan (Susanty, 2019).

3. Formulasi *hand and body cream* ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk)

Tabel 1. Rancangan formula

Nama Bahan	Kegunaan	Formula			
		F0 (% b/v)	FI (% b/v)	FII (% b/v)	FIII (% b/v)
Ekstrak daun kelor	Zat aktif	0	1	2	3
Gliserin	Humektan	10	10	10	10
Trietanolamin	Emulgator	2	2	2	2
Parafin cair	Emollien	10	10	10	10
Asam stearate	Emulgator	6	6	6	6
Setil alkohol	Agen penstabil	2	2	2	2
Metil paraben	Pengawet	0,1	0,1	0,1	0,1
Oleum citri	Pewangi	0,2	0,2	0,2	0,2
Aquadest ad	Pelarut	100	100	100	100

Keterangan:

F0 = Formula handbodi krim antioksidan kontrol (basis)

FI = Formula handbodi krim antioksidan konsentrasi 1%

FII = Formula handbodi krim antioksidan konsentrasi 2%

FIII = Formula handbodi krim antioksidan konsentrasi 3%

4. Pembuatan *hand and body cream* ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk)

Dalam proses produksi produk ini, jumlah ekstrak daun kelor yang ditambahkan bervariasi dengan konsentrasi. Proses pembuatannya adalah sebagai berikut:

- Ditimbang masing-masing bahan yang akan digunakan dalam formulasi ini, kemudian dipisahkan berdasarkan fase (kelarutan dalam air dan dalam minyak).
- Dicampurkan asam stearate, paraffin cair, dan setil alkohol yang merupakan fase minyak kemudian dipanaskan dalam beaker glass sehingga mencapai suhu

- 70°C sambil dilakukan pengadukan. Lalu dilakukan pendinginan hingga suhu mencapai 65°C diaduk terus sampai homogen (Adonan 1).
- c. Dicampurkan gliserin dan air yang merupakan fase air dan dipanaskan hingga suhu 80°C dalam wadah yang berbeda sambil dilakukan pengadukan menggunakan pengaduk magnet. Setelah itu, dilakukan pendinginan hingga suhu mencapai 65°C sambil dimasukkan trietanolamin sedikit demi sedikit (Adonan 2).
 - d. Dicampurkan adonan 1 dan 2 sambil terus diaduk dengan batang pengaduk. Pengadukan dilakukan sampai terbentuk emulsi krim yang halus. Pengadukan dilanjutkan secara manual sampai adonan mengembang (Adonan 3). Adonan 3 dibiarkan hingga suhu turun menjadi 40°C.
 - e. Ditambahkan metil paraben, *oleum citri*, ekstrak daun kelor dengan variasi konsentrasi yang berbeda-beda.
 - f. Dilakukan pengadukan sampai terbentuk *cream* yang halus. Setelah dingin, *cream* dimasukkan ke dalam wadah.

5. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk) (Moilati et al., 2020).

- a. Pembuatan larutan induk DPPH

Ditimbang sebanyak 0,04 g (40 mg) DPPH. Kemudian dilarutkan dalam etanol 96% hingga tanda batas dengan menggunakan labu ukur 100 ml, memiliki konsentrasi 400 ppm setelah itu ditempatkan dalam botol kaca berwarna gelap serta dihomogenkan, diinkubasi selama 30 menit.

- b. Penentuan lamda (λ) maksimum DPPH

Larutan pembanding vitamin C dipipet 1 ml lalu ditambahkan 5 ml larutan DPPH, kemudian dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml, dicukupkan volumenya dengan etanol 96% sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan dan diinkubasi

selama 30 menit ditempat gelap, kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum.

c. Pembuatan larutan blanko

Dipipet 1 ml larutan DPPH ke dalam labu ukur 5 ml, kemudian ditambahkan etanol 96% hingga tanda dan dihomogenkan. Didiamkan selama 30 menit dan diukur absorbansinya pada Panjang gelombang 517 nm.

d. Pembuatan larutan pembanding vitamin C

Ditimbang vitamin C sebanyak 10 mg, kemudian dilarutkan pada labu ukur 100 ml setelah itu ditambahkan etanol sehingga konsentrasi diperoleh 100 ppm. Dilakukan pengenceran bertingkat masing-masing konsentrasi vitamin C dipipet 2 ppm, 4 ppm, dan 6 ppm (0,1 ml; 0,2 ml; 0,3 ml) dari larutan stok vitamin C dan dilarutkan ke dalam labu ukur 5 ml. Kemudian diambil tiap konsentrasi sebanyak 1 ml. dan ditambahkan 2 ml larutan DPPH. Setelah itu dihomogenkan, didiamkan selama 30 menit, selanjutnya diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan Panjang gelombang 517 nm.

e. Pembuatan larutan uji

Masing- masing konsentrasi *cream* ditimbang sebanyak 10 mg kemudian dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml. Sehingga konsentrasi yang didapatkan 100 ppm. Selanjutnya dihomogenkan dengan cara divortex selama 2 menit. Kemudian diambil 1 ml dari masing-masing konsentrasi lalu ditambahkan 2 ml larutan DPPH. Setelah itu diikubasi pada suhu 37°C selama 30 menit dan dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan Panjang gelombang 517 nm dan dihitung presentasi inhibisinya untuk mendapatkan nilai analisis IC₅₀

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Absorban blanko DPPH} - \text{Absorban sampel}}{\text{absorban blanko DPPH}} \times 100 \%$$

Untuk mendapatkan nilai IC_{50} , maka ditentukan nilai presentasi inhibisi dari masing-masing konsentrasi. Konsentrasi sampel dan presentasi inhibisi diplotkan pada suhu x dan y pada persamaan $y = a \pm bx$

6. Uji mutu fisik *hand and body cream* antioksidan ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk)

a. Uji organoleptik

Pengujian organoleptik dilakukan pengamatan visual dan pengamatan perubahan sediaan meliputi kenampakan, bau dan warna (Santoso et al., 2020).

b. Uji homogenitas

Tujuan uji keseragaman adalah untuk diamati dan memahami campuran bahan dalam sediaan agar tidak terdeteksi partikel kasar (Santoso et al., 2020).

c. Uji pH

Uji formulasi *cream* menggunakan pH meter yang dicelupkan ke dalam sediaan. Catat nilai pH yang ditunjukkan dan replikasi (Latif et al., 2020). Nilai pH harus disesuaikan dengan nilai pH normal kulit, sekitar 4,5-8, karena nilai pH yang terlalu tinggi akan membuat tampak bersisik, dan akan iritasi pada kulit jika terlalu asam (Yacobus et al., 2019: 22).

d. Uji daya sebar

Uji daya sebar adalah dengan meletakkan 500 mg sediaan pada kaca bundar, diletakkan kaca bundar di atasnya. Letakkan beban 50 g di atasnya dan diamkan selama 1 menit, lalu lanjutkan menambahkan beban 100 g, 150 g, dan 200 g, catat dan hitung diameter ekstensi. Replikasi sebanyak 3 kali (Latif et al., 2020). Daya sebar *cream* yang baik antara 5-7 cm (Yacobus et al., 2019: 22).

e. Uji viskositas

Dalam pengujian, viskositas diukur dengan Viscometer Brookfield. Tempatkan sediaan dalam gelas kimia dan kemudian rendam rotor kedalam tanpa

menyentuh wadah. Kemudian nyalakan viskometer, berapa skala yang ditunjukkan. Replikasi pada masing-masing formula sebanyak 3 kali.

F. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan *Uji Analysis of Variance* (ANOVA) dengan program SPSS versi 22. Dilakukan pengujian data terlebih dahulu menggunakan pengujian normalitas kemudian homogenitas sebagai syarat analisis data sebelum melakukan uji ANOVA. Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data mengikuti sebaran normal atau tidak. Uji data homogenitas digunakan untuk menguji apakah masing-masing kelompok mempunyai kesamaan rata-rata varian, jika hasil uji signifikan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$). Apabila data tidak memenuhi syarat *one way* ANOVA maka dilakukan uji non parametrik *Kruskal-wallis*.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

1. Hasil Ekstraksi daun kelor (*Moringa Oleifera* Lamk)

Hasil ekstraksi dari simplisia daun kelor (*Moringa Oleifera* Lamk) sebanyak 250 g dengan menggunakan metode maserasi menggunakan pelarut ethanol 96%. Maka hasil yang diperoleh ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Ekstraksi daun kelor (*Moringa Oleifera* Lamk)

Jenis Ekstrak	Berat Simplisia	Berat Ekstrak	% Rendamen
Ekstrak kental	250 g	12,83 g	5,132 %

2. Hasil Uji Mutu Fisik Sediaan *Hand and Body Cream Ekstrak Daun Kelor* (*Moringa oleifera* Lamk)

Pada pengujian mutu fisik sediaan ini terdiri atas uji organoleptik, uji homogenitas, pengukuran nilai pH, pengujian daya sebar dan viskositas. Pengujian ini dilakukan pada 3 formulasi yang berbeda konsentrasi ekstrak berturut-turut 1%, 2%, dan 3% dan 1 formulasi sebagai basis tanpa tambahan ekstrak sebagai kontrol negatif. Dapat dilihat pada tabel berikut ini.

a. Uji Organoleptik dan Homogenitas

Tabel 3. Hasil pemeriksaan organoleptik dan homogenitas

Formula	Hasil Pengujian				
	Warna	Bau	Bentuk	Tekstur	Homogenitas
Kontrol (-)	Putih	Bau	Semisolid	Lembut, tidak lengket	Homogen
FI (1%)	Hijau muda	Bau khas	Semisolid	Lembut, tidak lengket	Homogen
FII (2%)	Hijau kecoklatan	Bau khas	Semisolid	Lembut, tidak lengket	Homogen

FII (3%)	Coklat	Bau khas	Semisolid	Lembut, tidak lengket	Homogen
----------	--------	----------	-----------	-----------------------	---------

b. Hasil Uji pH

Tabel 4. Hasil pemeriksaan pH

Formula	pH Rata-rata	Syarat Menurut SNI 1996
Kontrol (-)	6,43	4,5–8
FI	5,39	
FII	5,42	
FIII	5,62	

c. Hasil Uji Daya Sebar

Tabel 5. Hasil pemeriksaan daya sebar

Formula	Nilai Daya Sebar (cm) Rata-Rata	Syarat Menurut SNI 1996
Kontrol (-)	5,78	5-7 cm
FI (1%)	5,98	
FII (2%)	6,56	
FIII (3%)	6,67	

d. Hasil Uji Viskositas

Tabel 6. hasil pemeriksaan uji viskositas

Formula	Nilai Viskositas (cp) Rata-Rata	Syarat Menurut SNI 1996
Kontrol (-)	2.888	2.000 -50.000 cp
F1 (1%)	3.360	
F2 (2%)	3.930	
F3 (3%)	4.320	

3. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan *Hand and Body Cream Ekstrak Daun*

Kelor (Moringa oleifera Lamk)

Tabel 7. Hasil IC₅₀ FI, FII, dan FIII

a. Untuk FI (1%)

Konsentrasi	Absorbansi	% Inhibisi	Persamaan Regresi Linear	IC ₅₀
Blanko	0,856	-	-	-
50	0,541	36,79 %	$y = 0,2549 x + 23,553$	103,75 ppm
100	0,411	51,98 %		
150	0,382	55,37 %		
200	0,200	76,63 %		

250	0,101	88,20 %		
-----	-------	---------	--	--

b. Untuk FII (2%)

Konsentrasi	Absorbansi	% Inhibisi	Persamaan Regresi Linear	IC ₅₀
Blanko	0,856	-	-	-
50	0,524	38,78 %	$y = 0,2427 x + 25,125$	100,72 ppm
100	0,421	50,81 %		
150	0,381	55,49 %		
200	0,210	75,46 %		
250	0,110	87,14 %		

c. Untuk FIII (3%)

Konsentrasi	Absorbansi	% Inhibisi	Persamaan Regresi Linear	IC ₅₀
Blanko	0,856	-	-	-
50	0,520	39,25 %	$y = 0,2009 x + 31,562$	91,77 ppm
100	0,410	52,10 %		
150	0,300	64,95 %		
200	0,288	73,36 %		
250	0,181	78,85 %		

4. Hasil Pemanding Vitamin C

Tabel 8. IC₅₀ Kontrol Positif

Konsentrasi Vit.C	Absorbansi	% Inhibisi	Persamaan Regresi Linear	IC ₅₀
Blanko	0,856	-	-	-
2 ppm	0,774	13,08 %	$y = 6,4825x - 0,08$	7,72 ppm
4 ppm	0,638	25,46 %		
6 ppm	0,522	39,018 %		

B. Pembahasan

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi dan menghambat kerusakan sel dengan cara mengikat radikal bebas. Antioksidan menstabilkan radikal bebas. Vitamin C adalah senyawa antioksidan alami yang sering digunakan sebagai senyawa pembanding dalam pengujian aktivitas antioksidan. Hal ini dikarenakan senyawa antioksidan alami relative aman dan tidak menimbulkan toksisitas. Paparan kronis dan berulang terhadap sinar matahari disebut photoaging. Paparan ini akan menghasilkan radikal bebas yang dapat

merusak struktur kulit dan lapisan dermis yaitu fibroblas dan matriks ekstraseluler seperti kolagen, elastin dan zat basa yang berkurang secara fungsional sehingga menyebabkan kulit kehilangan elastisitasnya dan akhirnya berkerut (Maya et al., 2018).

Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) yang umumnya masyarakat masih kurang paham dengan pengolahan daun kelor sebagai sediaan kosmetik atau kecantikan. Beberapa literatur membahas tentang daun kelor dapat menghambat radikal bebas. Untuk meningkatkan pemanfaatannya maka dilakukanlah penelitian ini yang bertujuan agar menentukan pada konsentrasi berapa ekstrak daun kelor yang efektif sebagai antioksidan dalam sediaan *hand and body cream* dengan konsentrasi yang berbeda serta menggunakan vitamin C sebagai pembanding.

Pada ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) dilakukan perendaman dengan menggunakan ethanol 96% pelarut ini digunakan untuk mengekstraksi daun kelor dengan metode maserasi. Maserasi merupakan salah satu jenis ekstraksi yang dilakukan secara dingin sehingga mencegah terjadinya kerusakan komponen kimia yang tidak tahan panas yang dimana tujuannya untuk menarik semua komponen kimia dalam sampel, pelarut akan menembus dinding sel dan masuk kerongga yang mengandung senyawa aktif. Proses ini diawali dengan merendam serbuk daun kelor sebanyak 250 g dengan ethanol 96% sebanyak 1000 ml hingga serbuknya terendam. Didiamkan selama 1x24 jam setelah itu diaduk tiap 8 jam sekali menggunakan batang pengaduk selama 3x24 jam. Serbuk simplisia daun kelor yang telah dimaserasi disaring kemudian dipisahkan menggunakan alat vaccum rotary evaporator sampai memperoleh ekstrak kental. Ekstrak etanol daun kelor yang diperoleh pada penelitian ini yakni 12,83 g dengan nilai rendamen 5,132%.

Ketika ekstrak telah diperoleh, langkah selanjutnya ke tahap proses formulasi pembuatan sediaan *cream*. Pembuatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan fase minyak dan fase air. Dimana fase minyak (asam stearat, setil alkohol, paraffin cair) dan fase air (trietanolamin, gliserin dan aquadest) dileburkan masing-masing diatas penagas air hingga bahan tercampur merata. Setelah itu dicampurkan fase air dan fase minyak diatas lumpang gerus sampai massa cream terbentuk serta penambahan (pewangi dan metil paraben). Ditambahkan ekstrak ethanol daun kelor (*moringa oleifera* lamk) dengan variasi konsentrasi pada penelitian ini yaitu 1%, 2% dan 3%.

Dilakukan uji mutu fisik terhadap *hand and body cream* yang telah diformulasikan dengan varian ekstrak yang berbeda-beda. Adapun evaluasi uji ini yakni uji organoleptik, uji homogenitas, uji daya sebar, uji pH dan uji viskositas.

Pada standar pengujian organoleptik dikatakan stabil jika berbentuk, bau dan warnanya tidak mengalami perubahan. Sediaan yang baik harus homogen dan bebas dari partikel yang masih menggumpal. Hasil uji mutu fisik organoleptik diperoleh pada tabel 2 bagian a semua formula memiliki homogenitas yang baik, dikarenakan dengan tidak adanya gumpalan-gumpalan kasar pada kaca objek. Secara uji organoleptik dari bentuk dan warna sediaan menunjukkan warna yang baik rata-rata keseluruhan memiliki warna hijau muda sampai kecoklatan, hal ini diperoleh dari warna dasarnya dari ekstrak yakni hijau pekat sedangkan pada basis sediaan tetap menunjukkan warna dasar putih. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin pekat warna yang dihasilkan.

Hasil uji mutu fisik pH diperoleh pada tabel 2 bagian b yakni berkisar antara 5,39–6,43. Standar uji pH menurut SNI 16-4399-1996 sediaan *hand and body cream* tersebut memenuhi syarat pH sediaan topikal yang aman untuk kulit yaitu sekitar 4,5–8 karena jika pH terlalu besar maka dapat menyebabkan kulit menjadi


bersisik, sedangkan apabila terlalu asam maka akan terjadi iritasi kulit (Yacobus et al., 2019: 22). pH semua formula sediaan *hand and body cream* relatif stabil selama masa penyimpanan. Pemeriksaan pH dilakukan menggunakan pH meter. Data hasil penurunan pengukuran pH dianalisis secara statistik menggunakan uji One-Way ANOVA Untuk memenuhi syarat uji ini harus homogen dan normal. Hasil nilai uji normalitas adalah $0,479 > 0,05$ data normal. Sedangkan uji homogenitas yaitu $0,02 < 0,05$ maka data yang dihasilkan tidak homogen, langkah selanjutnya dianalisis dengan uji statistik non parametrik *Kruskal-Wallis* karena data yang tidak homogen hingga diperoleh nilai signifikansi $0,015 < 0,05$.

Daya sebar berkaitan dengan sifat penyebaran *hand and body cream* ketika digunakan pada sediaan topikal. Semakin besar daya sebar, luas permukaan kulit yang kontak dengan *hand and body cream* akan semakin luas dan zat aktif akan terdistribusi dengan baik. *Hand and body cream* yang baik memiliki daya sebar yang besar sehingga dapat diaplikasikan pada permukaan kulit yang luas tanpa penekanan yang berlebihan. Kemampuan daya sebar dilihat dari diameter sebaran yang dihasilkan. Pada hasil mutu fisik dapat dilihat dalam tabel 3 bagian c. Menurut SNI 1996 daya sebar *hand and body cream* yang baik dalam batas range antara 5-7 cm (Yacobus et al., 2019: 22). Sehingga sediaan yang dibuat dengan menggunakan ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) mempunyai daya sebar yang baik. Data hasil penurunan pengukuran daya sebar uji One-Way ANOVA harus homogen dan normal. Hasil nilai uji normalitas adalah $0,478 > 0,05$ data normal. Sedangkan uji homogenitas yaitu $0,042 > 0,05$ data yang dihasilkan homogen, maka telah memenuhi syarat dengan nilai signifikan $<0,001$ jadi $<0,05$. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada setiap formulasi pada pengujian ini memiliki perbedaan yang signifikansi antara formulasi satu dengan yang lain. Dilakukan pengujian lanjutan dengan uji *Post Hock Tukey* dapat dilihat perbedaan yang signifikansi pada

data setiap formula 1 dan 2, formula 1 dan 3 dan formula 1 dan 4 dengan nilai signifikansi $<0,05$.

Hasil uji mutu fisik uji viskositas diperoleh pada tabel 2 bagian d menunjukkan sediaan memenuhi standar uji viskositas yang baik karena nilai rata-rata memenuhi syarat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui besar tahanan yang dihasilkan oleh sediaan *hand and body cream*. Pengujian viskositas menurut SNI viskositas yang baik pada sediaan semi solid yaitu 2.000-50.000 cp. Pada data hasil pengujian ini memenuhi standar viskositas yang baik. Analisis data selanjutnya dilakukan dengan penurunan pengukuran viskositas uji One-Way ANOVA harus homogen dan normal. Hasil nilai uji normalitas adalah $0,443 > 0,05$ data normal. Sedangkan uji homogenitas yaitu $0,646 > 0,05$ data yang dihasilkan tidak homogen, maka telah memenuhi syarat dengan nilai signifikan $<0,001$ jadi $<0,05$. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada setiap formulasi pada pengujian ini memiliki perbedaan yang signifikansi antara formulasi satu dengan yang lain. Dilakukan pengujian lanjutan dengan uji *Post Hock Tukey* dapat dilihat perbedaan yang signifikansi pada data setiap formula 1 dan 2, formula 1 dan 3 dan formula 1 dan 4 dengan nilai signifikansi $<0,05$. Hal ini tidak memberikan pengaruh terhadap viskositas.

Pembuatan sediaan *hand and body cream* dengan tipe minyak dalam air (M/A) karena dapat memberikan efek dingin pada kulit, mudah dicuci serta tidak menimbulkan bekas setelah pemakaian tidak pula berminyak dan memiliki kemampuan menyebar yang baik.



Gambar 5. Reaksi penghambatan radikal DPPH (Reaksi perubahan warna DPPH) (Sumber:Pubs.rsc.org)

Analisa kuantitatif pada penelitian ini menggunakan uji antioksidan dengan metode DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl*). DPPH merupakan senyawa radikal bebas yang bersifat stabil, sehingga dapat bereaksi dengan atom hidrogen yang berasal dari suatu antioksidan yang membentuk DPPH tereduksi. Adanya aktivitas antioksidan dari sampel mengakibatkan perubahan warna pada larutan DPPH dalam etanol yang semula berwarna ungu pekat menjadi kuning pucat. Sebelum dilakukan analisa kuantitatif terlebih dahulu dilakukan preparasi sampel, yaitu dengan mencampurkan sampel dengan DPPH kemudian diletakkan dalam tempat gelap selama 30 menit, tujuannya untuk melihat aktivitas antioksidan ekstrak daun kelor. Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC_{50} . Nilai IC_{50} adalah konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas.

Hasil pengamatan pada proses pengukuran serapan ekstrak daun kelor dan vitamin C disajikan dalam gambar berdasarkan data pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa nilai absorbansi DPPH semakin berkurang seiring dengan bertambahnya konsentrasi ekstrak daun kelor. Hal ini dapat terjadi oleh karena adanya reduksi radikal DPPH oleh antioksidan, dimana semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun kelor maka partikel-partikel senyawa antioksidan yang terkandung akan semakin banyak sehingga semakin besar pula aktivitas antioksidannya dan menyebabkan absorbansi DPPH semakin berkurang.

Berdasarkan hasil uji pengamatan pada aktivitas antioksidan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) 96% terhadap DPPH diperoleh hasil pada FI konsentrasi ekstrak 1% dengan nilai IC_{50} sebesar 103,75 ppm, FII konsentrasi ekstrak 2% dengan nilai IC_{50} sebesar 100,72 ppm, FIII konsentrasi ekstrak 3% dengan nilai IC_{50} sebesar 91,77 ppm, dan kontrol negatif dengan nilai IC_{50} sebesar 7,72 ppm.

Pada FI konsentrasi ekstrak 1% sebesar 103,75% merupakan persentase penghambatan antioksidan tertinggi bila dibandingkan dengan sampel lainnya. Hasil terendah ditunjukkan oleh FIII ekstrak 3% sebesar 91,77%. Aktivitas penghambatan DPPH yang semakin rendah menunjukkan bahwa aktivitasnya sangat bagus.

Hasil pengujian antioksidan kontrol positif yaitu asam askorbat (Vitamin C) menggunakan konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, dan 6 ppm ditunjukkan pada tabel 4. Pada tabel 4 menunjukan semakin tinggi konsentrasi kontrol positif maka semakin rendah nilai absorbansi dan semakin tinggi nilai % aktivitas antioksidannya. Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi kontrol positif maka semakin tinggi konsentrasi kandungan zat yang berkhasiat antioksidan sehingga semakin tinggi penghambatan terhadap DPPH yang menyebabkan nilai absorbansi semakin rendah karena DPPH yang tersisa semakin kecil pula. Pada vitamin C diperoleh nilai IC_{50} sebesar 7,72 ppm yang berarti vitamin C memiliki kategori aktivitas antioksidan sangat kuat. Sehingga Vitamin C sering digunakan sebagai kontrol positif dalam pengujian antioksidan karena vitamin C merupakan zat antioksidan yang baik dimana dapat berperan sebagai zat antioksidan dengan mencegah efek negatif dari radikal bebas. Zat ini bekerja sebagai antioksidan dengan mendonorkan elektron yang dimilikinya (Siyanti et al., 2019: 75)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bawah:

1. Dalam sediaan *hand and body cream* ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) pada konsentrasi (1%, 2%, dan 3%) dapat diformulasikan dalam sediaan *hand and body cream* yang memenuhi syarat uji mutu fisik. Pada standar pengujian organoleptik dikatakan stabil jika bentuk, bau dan warnanya tidak mengalami perubahan, standar pengujian homogenitas dikatakan homogen jika sediaan tidak terdapat partikel atau butiran kasar, standar uji pH menurut SNI 16-4399-1996 dengan batas range 4,5-8,0, standar pengujian daya sebar menurut SNI 1996 yaitu nilai daya sebar dalam batas range (5 cm-7 cm), dan pengujian viskositas menurut SNI adalah dengan batas range 2000-50.000 cps.
2. Sediaan *hand and body cream* ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) memiliki antioksidan dimana semakin tinggi jumlah konsentrasi ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera* Lamk) yang digunakan senyawa antioksidan semakin (banyak) maka semakin tinggi (besar) pula aktivitas antioksidannya.

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meneliti kadar vitamin C pada formulasi cream antiaging dengan metode lain, misalnya metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (HPLC).

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., Zantrie, R., Anna, R., & Marbun, T. Identifikasi Kadar Vitamin C pada Daging dan Kulit Buah Naga Merah (*Hylocereus Polyrhizus*) Dengan Metode Spektrofotometri UV-Visible *Introduction : Vitamin C is one of the nutrition acted as a antioxidants and effective addres free radicals can be destr.* 2(1), 40–47. 2019.
- Aryani, R. Formulasi dan Uji Stabilitas Krim Kombinasi Alfa Tokoferol Asetat dan Etil Vitamin C Sebagai Pelembab Kulit. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada*, 14, 38–46. 2015.
- Chairunnisa, S., Wartini, N. M., & Suhendra, L. Pengaruh Suhu dan Waktu Maserasi terhadap Karakteristik Ekstrak Daun Bidara (*Ziziphus mauritiana* L.) sebagai Sumber Saponin. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 7(4), 551. 2019.
- Damanis, F. V. ., Wewengkang, D. S., & Antasionasti, I. Uji Aktivitas Antioksidan Etanol Ascidian (*Herdmania Momus*) Dengan Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). *Pharmacoon– Program Studi Farmasi, Fmipa, Universitas Sam Ratulangi*, 9, 464–469. 2020.
- Dewi, D. P. Substitusi tepung daun kelor (*Moringa oleifera* L.) pada cookies terhadap sifat fsik, sifat organoleptik, kadar proksimat, dan kadar Fe. *Ilmu Gizi Indonesia*, 1(2), 104. 2018.
- Dima, L. L. R. H., & Lolo, W. A. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kelor (*Moringa Oleifera* L.) Terhadap Bakteri Escherichia Coli Dan Staphylococcus Aureus. *Pharmacoon*, 5(2), 282–289. 2016.
- Dipahayu, D., Soeratri, W., & Agil, M. Formulasi Krim Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea batatas* (L.) Lamk) Sebagai Anti Aging. *Pharmaceutical Sciences and Research*, 1(3), 166–179. 2014
- Dwika, W., Putra, P., Agung, A., Oka Dharmayudha, G., & Sudimartini, L. M. Identifikasi Senyawa Kimia Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* L) di Bali. *Indonesia Medicus Veterinus Oktober*, 5(5), 464–473. 2016.
- Hasanah, N., Susilo, J., & Oktianti, D. Uji Aktivitass Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa Oleifera* Lamk) dengan Metode DPPH. *Jurnal Gizi Dan Kesehatan*, 8(17), 116–121.2016.
- Husni, P., Pratiwi, A. N., & Baitariza, A. Formulasi Krim Ekstrak Ethanol (*Moringa oleifera* Lamk). In *Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa* (Vol. 2).2019.
- Ilna, A. D., & Ismawati, R. Pengaruh penambahan ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera*) dan waktu inkubasi terhadap sifat organoleptik yoghurt. *Jurnal Tata Boga*, 4(3), 151–159.2015.
- Isfianti, D. E. Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Dan Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk) Untuk Pembuatan Lulur Tradisional Sebagai Alternatif “ *GREEN COSMETICS* .” 07, 74–86. 2018.
- Isnain, W., & M, N. Ragam Manfaat Tanaman Kelor (*Moringa oleifera* Lamk) Bagi Masyarakat. *Info Teknis EBONI*, 14(1), 63–75.2017.
- Jusnita, N., & Syurya, W. *Karakterisasi Nanoemulsi Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera Lamk .)*. 6(1), 16–24.2019.
- Kiswandono, A. A. Perbandingan Dua Ekstaksi yang Berbeda Pada Daun Kelor

- (*Moringa oleifera*, lamk) Terhadap Rendamen Ekstrak Dan Senyawa Bioaktif Yang Dihasilkan. *Jurnal Sains Natural*, 1(1), 53. 2017.
- Kusmardika, D. A. Potensi Aktivitas Antioksidan Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) Dalam Mencegah Kanker. *Journal of Health Science and Physiotherapy*, 2(1), 46–50. 2020.
- Latif, A. R., Sugihartini, N., & Guntarti, A. Sifat Fisik Krim TIPE A/M Dengan Variasi Konsentrasi Ekstak Ethanol Daun Kelor (*Moringa oliefera*) Menggunakan Emulgator Tween 80 Dan Span 80. *Media Farmasi*, 16(1), 9. 2020.
- Maryam, S., Baits, M., & Nadia, A. Pengukuran Aktivitas Antioksidan Ekstrak Ethanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam.) Menggunakan Metode FRAP (*Ferric Reducing Antioxidant Power*). *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 2(2), 115–118. 2016.
- Maya, I., & Mutakin. Review Artikel: Formulasi dan Evaluasi Secara Fisikokimia Sediaan Krim Anti-Aging. *Farmaka*, 17(2), 296–305.2018.
- Moilati, V. O., Yamlean, P. V. Y., & Rundengan, G. Formulasi Sediaan Krim Ekstrak Etanol Daun Bayam Merah (*Amaranthus tricolor L.*) Dan Uji Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH (1.1-diphenyl-2-picrylhydrazyl). *Journal Pharmacon*, 9(3), 372–380.2020.
- Noer, H. B. M., & Sundari. Formulasi Hand and Body Lotion Ekstrak Kulit Buah Naga Putih (*Hylocereus undatus*) dan Uji Kestabilan Fisiknya. *Kesehatan*, XI(1), 101–114.2016.
- Nurulita, N. A., Sundhani, E., Amalia, I., Rahmawati, F., Nurhayati, N., & Utami, D. Uji Aktivitas Antioksidan dan Anti-aging Body Butter dengan Bahan Aktif Ekstrak Daun Kelor (*Antioxidant and Anti-aging activity of Moringa Leaves Extract Body Butter*). *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 17(1), 1–8.2019.
- Oktaviasari, L., & Zulkarnain, A. K Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Lotion O/W Pati Kentang (*Solanum Tuberosum L.*) Serta Aktivitasnya Sebagai Tabir Surya Formulation and Physical Stability Test of Lotion O/W Potato Starch (*Solanum tuberosum L.*) and the Activities as Sunscreen. *Majalah Farmaseutik*, 13(1), 9–27.2017.
- Paramitha, I. D. A., Sibarani, J., & Suaniti, N. M. Sifat Fisikokimia Hand And Body Cream Dengan Pemanfaatan Ekstrak Ethanol Bunga Gemitir (*Tagetes erecta L.*) Dan Bunga Pacar Air Merah (*Impatiens balsamina L.*) Dari Limbah Canang. *CAKRA KIMIA (Indonesian E-Journal of Applied Chemistry)*, 5(1), 1. 2017.
- Purba, E. C. Kelor (*Moringa oleifera* Lam.): Pemanfaatan Dan Bioaktivitas. *Pro-Life*, 7(1), 1–12. 2020.
- Purwaningsih, S., Salamah, E., & Budiarti, T. A. Skin Lotion Formulation with Addition of Natural Carrageenan Antioxidants from *Rhizophora mucronata* Lamk. *Aquatic Journal*, 5(1), 55–62.2014.
- Putra, I. W. D. P., Oka, A. A. G., Dharmayudha, & Sudimartini, L. M. *Identifikasi Senyawa Kimia Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa oleifera L) di Bali*. 5(5), 464–473.2016.
- Rahmadani, N. F., & Hasanah Aliya Nur. Formulasi dan Evaluasi Sediaan Anti

- Aging dari Ekstrak Tumbuhan. *Majalah Farmaseutik*, 4(4), 107–118. 2019.
- Ramadhan, D. Aktivitas antioksidan ekstrak etanol 96% daun, buah dan kulit terap. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Ethanol 96% Daun, Buah Dan Kulit Terap (*Artocarpus Odorratissimus*) Menggunakan Metode CUPRAC, 7(1), 7–12. 2020.
- Rowe. Handbook of Pharmaceutical Excipients. In *Pharmaceutical Press*. 2009.
- Salim, R. Aktivitas Antioksidan Infusa Daun Kelor (*Moringa Oleifera* Lam.) Terhadap Warna Daun. *Jurnal Katalisator*, 4(2), 91–102.2019.
- Santoso, I., Prayoga, T., Agustina, I., & Rahayu, W. S. *Formulasi Masker Gel Peel-Off Perasaan Lidah Buaya (Aloe vera L.) Dengan Gelling Agent Polivinil Formulation Of Peel-Off Gel Mask Fruit Of (Aloe vera L). With Gelling Alcohol POLYCLINYL AGENT*. 2(1), 17–25.2020.
- Sari, A. N. Antioksidan alternatif untuk menangkal bahaya radikal bebas pada kulit. *Jurnal Sains Teknologi Islam*, 1(1), 63–68. 2015.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 6, 11, dan 15*. Jakarta. 2009.
- Shofi, M., Suwitasari, F., & Istiqomah, N. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kamboja Jepang (*Adenium obesum*) dan Kamboja Putih (*Plumeria acuminata*). *Al-Kaunyah: Jurnal Biologi*, 13(2), 167–178. 2020.
- Siyanti, A., Fitriani, N., & Angga. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kulit Alpukat (*Persea americana* Mill.) terhadap Peredaman DPPH. *Proceeding of Mulawarman Pharmaceuticals Conferences*, 10, 72–75. 2019.
- Sukria, H. A., Nugraha, I., & Suci, D. M. Pengaruh proses steam pada daun kelor (*Moringa oleifera*) dan asam fulvat terhadap performa ayam broiler. *Jurnal Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan*, 16(2), 1. 2018.
- Sumbayak, A. R., & Diana, V. E. Formulasi Hand Body Lotion Ekstrak Etanol Kulit Buah Semangka (*Citrillus vulgaris*) untuk Pelembab Kulit. *Jurnal Dunia Farmasi*, 2(2), 70–76. 2019.
- Susanty, S. Metode Ekstraksi Untuk Perolehan Kandungan Flavanoid Tertinggi Dari Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam). *Jurnal Konversi*, 8(2). Retrieved from 2019.
- Tranggono, R. I., & Latifah, F. Buku Panduan Ilmu pengetahuan Kosmetik. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, pp. 1–223. 2007.
- Wahyuningtyas, R. S., Pratiwi, H. S., Studi, P., Informatika, T., Teknik, F., & Tanjungpura, U. (2015). *Sistem Pakar Penentuan Jenis Kulit Wajah Wanita Menggunakan Metode Naïve Bayes*. 1(1).2015.
- Widowati, I., Efiyati, S., & Wahyuningtyas, S. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) terhadap Bakteri Pembusukan Ikan Segar. *Universitas Negeri Yogyakarta, IX*, 146–157.2014.
- Yacobus, A. R., Lau, S. H. A., & Syawal, H. Formulasi Dan Uji Stabilitas Krim Ekstrak Methanol Daun Beluntas (*Pluchea indica* L.) Dari Kota Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Farmasi Sandi Karsa*, 5(1), 19–25. 2019.
- Yanlinastuti, & Fatimah, S. Pengaruh Konsentrasi Pelarut Untuk Menentukan Kadar Zirkonium dalam Paduan U-Zr dengan Mengguakan Metode

Spektrofotometri UV-VIS. *PIN Pengelolaan Instalasi Nuklir*, 1(17), 22–33. 2016.

Yuliani, N. N., & Primanty Dienina, D. *Uji Aktivitas Antioksidan Infusa Daun Kelor (Moringa oleifera, Lamk) Dengan Metode 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)*. 2015.



Lampiran 1. Skema Kerja

1. Preparasi sampel



2. Ekstraksi sampel

Serbuk sampel ditimbang 250 g kemudian dimasukkan dalam wadah maserasi



Direndam dengan memasukkan pelarut etanol 96% ke dalam wadah



Ditutup wadah dan didiamkan selama 1x24 jam di tempat yang terlindung dari cahaya dan dilakukan pengadukan tiap 8 jam sekali selama 3 x24 jam



Disaring menggunakan kertas saring Whatman No.41



Dipekatkan ekstrak cair menggunakan *rotary evaporator* ($T < 30^{\circ}\text{C}$) dan dibebaskan etanol dengan cara dipanaskan di atas penangas sehingga dihasilkan ekstrak kental

3. Pembuatan *Hand and Body Cream*

a. Pembuatan fase minyak (adonan 1)

Ditimbang bahan asam stearate, paraffin cair, setil alkohol.


Dicampurkan bahan

Dipanaskan (70°C) dan pengadukan


Didinginkan (65°C) dan pengadukan

Fase minyak (Adonan 1)

b. Pembuatan fase air (adonan 2)




c. *Hand and body cream* ekstrak daun kelor (Adonan 3)



4. Pengujian aktivitas antioksidan ekstrak daun kelor (Moilati et al., 2020).


a. Pembuatan larutan induk DPPH




b. Pembuatan larutan blanko dengan Panjang gelombang DPPH



c. Pembuatan larutan pembanding vitamin C



d. Pembuatan larutan uji



Lampiran 2. Perhitungan rendamen ekstrak daun kelor

Perhitungan rendamen ekstrak daun kelor

$$\begin{aligned}\% \text{ Rendamen} &= \frac{\text{bobot ekstrak}}{\text{bobot simplisia}} \times 100 \% \\ &= \frac{12,83}{250} \times 100 \% \\ &= 0,05132 \times 100\% \\ &= 5,132 \%\end{aligned}$$

Lampiran 3. Penyiapan larutan DPPH

Penyiapan larutan DPPH

Konsentrasi larutan DPPH 0,04 g (40 mg) dalam 100 ml

$$\text{Konsentrasi} = 40 \text{ mg}$$

$$\text{Volume} = 100 \text{ ml} = 0,1 \text{ liter}$$

$$\text{ppm} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$x = \frac{40}{0,1}$$

$$X = 400 \text{ mg/L}$$

Lampiran 4. Perhitungan larutan stok larutan sampel ekstrak daun kelor

(*Moringa oleifera* Lamk)

Perhitungan pengenceran stok larutan ekstrak daun kelor

Perhitungan pengenceran larutan stok ekstrak daun kelor 100 ppm dengan konsentrasi (50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, dan 250 ppm) dalam labu ukur 5 ml.

$$N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2$$

$$V_1 = \frac{N_2 \times V_2}{N_1}$$

a. Untuk 50 ppm

$$V_1 = \frac{50 \text{ ppm} \times 5 \text{ ml}}{100} = 2,5 \text{ ml}$$

b. Untuk 100 ppm

$$V_1 = \frac{100 \text{ ppm} \times 5 \text{ ml}}{100} = 5 \text{ ml}$$

c. Untuk 150 ppm

$$V_1 = \frac{150 \text{ ppm} \times 5 \text{ ml}}{100} = 7,5 \text{ ml}$$

d. Untuk 200 ppm

$$V_1 = \frac{200 \text{ ppm} \times 5 \text{ ml}}{100} = 10 \text{ ml}$$

e. Untuk 250 ppm

$$V_1 = \frac{250 \text{ ppm} \times 5 \text{ ml}}{100} = 12,5 \text{ ml}$$

Lampiran 5. Penyiapan larutan pembanding (Vitamin C)**Penyiapan larutan pembanding (Vitamin C)**

Larutan stok vit. C = 10 mg

Volume = 100 ml = 0,1 liter

$$\text{ppm} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$x = \frac{10}{0,1} =$$

$$X = 100 \text{ mg/L}$$

Lampiran 6. Perhitungan pengenceran larutan stok vitamin C**Perhitungan pengenceran larutan stok vitamin C**

Perhitungan pengenceran larutan stok vitamin C 100 ppm dengan konsentrasi (2 ppm, 4 ppm, dan 6 ppm) dalam labu ukur 5 ml.

$$N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2$$

$$V_1 = \frac{N_2 \times V_2}{N_1}$$

a. Untuk 2 ppm

$$V_1 = \frac{2 \text{ ppm} \times 5 \text{ ml}}{100} = 0,1 \text{ ml}$$

b. Untuk 4 ppm

$$V_1 = \frac{4 \text{ ppm} \times 5 \text{ ml}}{100} = 0,2 \text{ ml}$$

c. Untuk 6 ppm

$$V_1 = \frac{6 \text{ ppm} \times 5 \text{ ml}}{100} = 0,3 \text{ ml}$$

Lampiran 7. Perhitungan % inhibisi Vit. C

Perhitungan % Inhibisi Vit. C

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Absorban blanko DPPH} - \text{Absorban sampel}}{\text{absorban blanko DPPH}} \times 100 \%$$

a. $\% \text{ inhibisi 2 ppm} = \frac{0,856 - 0,744}{0,856} \times 100 \%$

$$= 13,08 \%$$


b. $\% \text{ inhibisi 4 ppm} = \frac{0,856 - 0,638}{0,856} \times 100 \%$

$$= 25,46 \%$$

c. $\% \text{ inhibisi 6 ppm} = \frac{0,856 - 0,522}{0,856} \times 100 \%$

$$= 39,018 \%$$

Lampiran 8 . Kurva kalibrasi Vitamin C



Gambar 6. Kurva kalibrasi Vitamin C

IC₅₀ Vit. C:

Dari persamaan regresi =

$$y = 6,4835 x - 0,08$$

$$50 = 6,4835 x - 0,08$$

$$6,4825 (x) = 50 + 0,08$$

$$X = \frac{50,08}{6,4825}$$

$$X = 7,72 \text{ ppm}$$


Lampiran 9. Perhitungan % inhibisi FI 1%

Perhitungan % Inhibisi FI 1%

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Absorban blanko DPPH} - \text{Absorban sampel}}{\text{absorban blanko DPPH}} \times 100 \%$$

- a. % inhibisi 50 ppm $= \frac{0,856 - 0,541}{0,856} \times 100 \%$
 $= 36,79 \%$
- b. % inhibisi 100 ppm $= \frac{0,856 - 0,411}{0,856} \times 100 \%$
 $= 51,98 \%$
- c. % inhibisi 150 ppm $= \frac{0,856 - 0,200}{0,856} \times 100 \%$
 $= 55,37 \%$
- d. % inhibisi 200 ppm $= \frac{0,856 - 0,200}{0,856} \times 100 \%$
 $= 76,63 \%$
- e. % inhibisi 250 ppm $= \frac{0,856 - 0,101}{0,856} \times 100 \%$
 $= 88,20 \%$

Lampiran 10. Kurva kalibrasi FI 1%



Gambar 7. Kurva kalibrasi FI 1%

IC₅₀ FI 1% :

Dari persamaan regresi =

$$y = 0,2549 x + 23,553$$

$$50 = 0,2549 x + 23,553$$

$$0,2549 (x) = 50 - 23,553$$

$$X = \frac{26,447}{0,2549}$$

$$X = 103,75 \text{ ppm}$$




Lampiran 11. Perhitungan % inhibisi FII 2%

Perhitungan % Inhibisi FII 2%

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Absorban blanko DPPH} - \text{Absorban sampel}}{\text{absorban blanko DPPH}} \times 100 \%$$

- a. % inhibisi 50 ppm $= \frac{0,856 - 0,524}{0,856} \times 100 \%$
 $= 38,78 \%$
- b. % inhibisi 100 ppm $= \frac{0,856 - 0,421}{0,856} \times 100 \%$
 $= 50,81 \%$
- c. % inhibisi 150 ppm $= \frac{0,856 - 0,381}{0,856} \times 100 \%$
 $= 55,49 \%$
- d. % inhibisi 200 ppm $= \frac{0,856 - 0,210}{0,856} \times 100 \%$
 $= 75,46 \%$
- e. % inhibisi 250 ppm $= \frac{0,856 - 0,110}{0,856} \times 100 \%$
 $= 87,14 \%$

Lampiran 12. Kurva kalibrasi FII 2%



Gambar 8. Kurva kalibrasi FII 2%

IC₅₀ FII 2%:

Dari persamaan regresi =

$$y = 0,2427 x + 25,125$$

$$50 = 0,2427 x + 25,553$$

$$0,2427 (x) = 50 - 25,553$$

$$X = \frac{24,447}{0,2427}$$

$$X = 100,72 \text{ ppm}$$



Lampiran 13. Perhitungan % inhibisi FIII 3%

Perhitungan % Inhibisi FIII 3%

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Absorban blanko DPPH} - \text{Absorban sampel}}{\text{absorban blanko DPPH}} \times 100 \%$$

a. % inhibisi 50 ppm $= \frac{0,856 - 0,520}{0,856} \times 100 \%$

$$= 39,25 \%$$

b. % inhibisi 100 ppm $= \frac{0,856 - 0,410}{0,856} \times 100 \%$

$$= 52,10 \%$$

c. % inhibisi 150 ppm $= \frac{0,856 - 0,300}{0,856} \times 100 \%$

$$= 64,95 \%$$


d. % inhibisi 200 ppm $= \frac{0,856 - 0,288}{0,856} \times 100 \%$

$$= 73,36 \%$$

e. % inhibisi 250 ppm $= \frac{0,856 - 0,110}{0,856} \times 100 \%$

$$= 78,85 \%$$

Lampiran 14. Kurva kalibrasi FIII 3%



Gambar 9. Kurva kalibrasi FIII 3%

IC₅₀ FIII 3%:

Dari persamaan regresi =

$$y = 0,2009 x + 31,562$$

$$50 = 0,2009 x + 31,562$$

$$0,2009(x) = 50 - 31,562$$

$$X = \frac{18,438}{0,2009}$$

$$X = 91,77 \text{ ppm}$$



Lampiran 15. Hasil Analisia Data Pengujian Daya sebar dengan Metode Uji One-Way ANOVA yang dilanjutkan dengan Uji Post Hoc Tukey pada masing-masing perlakuan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value	
N		12	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	6.2500000	
	Std. Deviation	.24133467	
Most Extreme Differences	Absolute	.166	
	Positive	.166	
	Negative	-.166	
Test Statistic		.166	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed	Sig.	.478	
Confidence Interval ^e	99%	Lower Bound	.465
		Upper Bound	.490



Tests of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
daya sebar	Based on Mean	1.865	3	8	.214
	Based on Median	.223	3	8	.878
	Based on Median and with adjusted df	.223	3	5.205	.877
	Based on trimmed mean	1.602	3	8	.264

ANOVA

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.688	3	.563	4.385	.042
Within Groups	1.027	8	.128		
Total	2.715	11			

Multiple Comparisons

Dependent Variable: daya sebar

Tukey HSD

(I) formula	(J) formula	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Formula 1	Formula 2	.68333	.29250	.169	-.2534	1.6200
	Formula 3	.10000	.29250	.985	-.8367	1.0367
	Formula 4	.88333	.29250	.065	-.0534	1.8200
Formula 2	Formula 1	-.68333	.29250	.169	-1.6200	.2534
	Formula 3	-.58333	.29250	.266	-1.5200	.3534
	Formula 4	.20000	.29250	.900	-.7367	1.1367
Formula 3	Formula 1	-.10000	.29250	.985	-1.0367	.8367
	Formula 2	.58333	.29250	.266	-.3534	1.5200
	Formula 4	.78333	.29250	.105	-.1534	1.7200
Formula 4	Formula 1	-.88333	.29250	.065	-1.8200	.0534
	Formula 2	-.20000	.29250	.900	-1.1367	.7367
	Formula 3	-.78333	.29250	.105	-1.7200	.1534

Lampiran 16. Hasil Analisa Data Pengujian pH dengan Metode Uji *One-Way ANOVA* yang dilanjutkan dengan Uji Post Hoc Tukey pada masing-masing perlakuan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value	
N		12	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	5.7166667	
	Std. Deviation	.27948112	
Most Extreme Differences	Absolute	.166	
	Positive	.166	
	Negative	-.166	
Test Statistic		.166	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.479	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.466
		Upper Bound	.492

Tests of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Ph	Based on Mean	13.132	3	8	.002
	Based on Median	1.364	3	8	.322
	Based on Median and with adjusted df	1.364	3	2.011	.449
	Based on trimmed mean	11.027	3	8	.003

Ranks

	Formula	N	Mean Rank
pH	Formula 1	3	11.00
	Formula 2	3	2.00
	Formula 3	3	5.00
	Formula 4	3	8.00
	Total	12	

Test Statistics^{a,b}

pH	
Kruskal-Wallis H	10.421
Df	3
Asymp. Sig.	.015

a. Kruskal Wallis Test

- a. Grouping Variable:
formula

Lampiran 17. Hasil Analisa Data Pengujian Viskositas dengan Metode Uji *One-Way ANOVA* yang dilanjutkan dengan Uji Post Hoc Tukey pada masing-masing perlakuan

Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value	
N		12	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3487.500000	
	Std. Deviation	68.89715656	
Most Extreme Differences	Absolute	.166	
	Positive	.166	
	Negative	-.166	
Test Statistic		.166	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.479	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.466
		Upper Bound	.492

Tests of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
viskositas	Based on Mean	1.085	3	8	.409
	Based on Median	.234	3	8	.870
	Based on Median and with adjusted df	.234	3	4.882	.869
	Based on trimmed mean	.995	3	8	.443

ANOVA

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	864825.000	3	288275.000	.577	.646
Within Groups	3995400.000	8	499425.000		

Total	4860225.000	11			
-------	-------------	----	--	--	--


Multiple Comparisons

Dependent Variable: viskositas

Tukey HSD

(I) formula	(J) formula	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Formula 1	Formula 2	-280.00000	577.01820	.960	-2127.8154	1567.8154
	Formula 3	460.00000	577.01820	.854	-1387.8154	2307.8154
	Formula 4	-50.00000	577.01820	1.000	-1897.8154	1797.8154
Formula 2	Formula 1	280.00000	577.01820	.960	-1567.8154	2127.8154
	Formula 3	740.00000	577.01820	.597	-1107.8154	2587.8154
	Formula 4	230.00000	577.01820	.977	-1617.8154	2077.8154
Formula 3	Formula 1	-460.00000	577.01820	.854	-2307.8154	1387.8154
	Formula 2	-740.00000	577.01820	.597	-2587.8154	1107.8154
	Formula 4	-510.00000	577.01820	.813	-2357.8154	1337.8154
Formula 4	Formula 1	50.00000	577.01820	1.000	-1797.8154	1897.8154
	Formula 2	-230.00000	577.01820	.977	-2077.8154	1617.8154
	Formula 3	510.00000	577.01820	.813	-1337.8154	2357.8154

Lampiran 18. Gambar 10. Peta lokasi pengambilan sampel



Keterangan :

- = Lokasi pengambilan sampel
- = Peta Kabupaten Kep. Selayar

Lampiran 19. Gambar 11. Sampel penelitian



(a)




(b)

Keterangan:

- a. Tanaman kelor di Kabupaten Kep. Selayar
- b. Tanaman kelor di Kabupaten Kep. Selayar


Lampiran 20. Gambar 12. pembuatan ekstrak ethanol 96% daun kelor (Moringa oleifera Lamk)



Keterangan:

- a. Penimbangan sampel
- b. Pengeringan sampel
- c. Serbuk
- d. Perendaman
- e. Penyaringan
- f. Proses evaporator
- g. Ekstrak kental daun kelor

Gambar 13. Proses formulasi *hand and body cream*



Keterangan: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- a. Ekstrak 1%
 - b. Ekstrak 2%
 - c. Ekstrak 3%
 - d. Fase minyak (Adonan 1)
 - e. Fase air (Adonan 2)
 - f. *Hand and body cream*
- AUDDIN
KASSAR


Gambar 14. Pengujian aktivitas antioksidan



Keterangan:

- DPPH
- Vitamin C (kontrol +)
- Larutan uji
- Nilai absorbansi blanco
- Nilai absorbansi lamda
- Nilai absorbansi formula I
- Nilai absorbansi kontrol (+)


Gambar 15. Pengujian organoleptik dan homogenitas sediaan



Keterangan:

- a. F0 (-)
- b. F1 (1%)
- c. FII (2%)
- d. FIII (3%)

Gambar 16. Pengujian daya sebar sediaan



Keterangan:

- a. F0 (-)
- b. F1 (1%)
- c. F2 (2%)
- d. F3 (3%)

Gambar 17. Pengujian pH



(a)



(b)



(c)



(d)

Keterangan:

- a. F0 (-)
- b. FI (1%)
- c. FII (2%)
- d. FIII (3%)

Gambar 18. Pengujian Viskositas



(a)



(b)



(c)



(d)

Keterangan:

- a. F0 (-)
- b. FI (1%)
- c. FII (2%)
- d. FIII (3%)

RIWAYAT HIDUP



Andi Mitha Hardiyanti, biasa disapa Mita dan orang terdekat memanggil dengan Hardiyanti, dilahirkan di Sinjai pada tanggal 28 Mei 1999. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Harun Dini dan Hasmiah. Penulis memiliki 2 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Penulis mengawali pendidikan di salah satu Taman Kanak-kanak sederhana yaitu TK Idhata Batangmata Sapo. Kemudian melanjutkan pendidikan tahun 2004 di SDI Batangmata Sapo dan menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Bontomatene, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bontomatene dan menyelesaikan pada tahun 2017.

Setelah lulus pada jenjang Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan studi Sarjana-nya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya pada jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.