ANALISIS KADAR FLAVONOID TOTAL HASIL PARTISI LARUT AIR DAUN SEMBUKAN *(Paederia foetida L.)* DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUNUNG DWI LESTARI MAKNUR
NIM. 70100115008

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
SAMATA-GOWA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nunung Dwi Lestari Maknur
NIM	: 70100115008
Tempat/Tgl. Lahir	: Bulukumba, 1 September 1997
Jurusan	: Farmasi
Fakultas	: Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat	: BTN. Bintang village Blok E.18, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa
Judul	: Analisis Kadar Flavonoid Total Hasil Partisi Larut air Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.)* dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, November 2019

Penyusun,

Nunung Dwi Lestari Maknur
NIM: 70100115008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Analisis Kadar Flavonoid Total Hasil Partisi Larut Air Daun Sembukan (*Paederia Foetida* L.) dengan metode Spektrofotometri UV-Vis"** yang disusun oleh **Nunung Dwi Lestari maknur, NIM: 70100115008**, mahasiswi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 12 November 2019 yang bertepatan dengan 15 Rabi'ul Awal 1440 **H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 13 November 2019 M
16 Rabi'ul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, S.PA., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Nurul Muhlisah Maddepungeng, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing I	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Muh. Ikhlas Arsul, S.Farm., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Amrah Muhammad Kasim, M.A.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, S.PA., M.Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بسماللهالرحمنالرحيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Salawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia ke arah yang lebih beradab dan manusiawi.

Skripsi dengan judul "Analisis Kadar Flavanoid Total Fraksi Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.)* dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dan dukungan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran serta petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Terkhusus yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga, penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahku **Makking, S.Pd** dan ibuku **Nurjannah** yang tak henti-hentinya memberikan doa dan motivasi serta dukungan baik dalam bentuk moral terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih saying dan bimbingan beliau, dan buat saudara-saudaraku serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, kasih saying dan bimbingan kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besat cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan.. Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., SP.A., Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
3. Ibu Dr., Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., Apt., M.Si., Wakil Dekan I, Bapak Dr. Fais Satrianegara, SKM., MARS., Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Mukhtar Luthfi, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
4. Bapak A. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt., Ketua Jurusan Farmasi,
5. Ibu Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt., Sekertaris jurusan Farmasi dan pembimbing kedua yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, dan bantuan serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis,
6. Ibu Mukhriani S.Si., M.Si., Apt., Pembimbing pertama yang telah memberikan arahan, motivasi dan bantuannya serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis,
7. Bapak Muh. Ikhlas Arsul, S.Farm., M.Si., Apt., Penguji kompotensi telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta lebih meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini,
8. Ibu Dr. Hj. Amrah Muhammad Kasim, M.A., Penguji agama yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak, Ibu Dosen serta Seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis hingga saat ini,
10. Kakanda Laboran yang senantiasa mendampingi dan mengarahkan selama penelitian dan penyusunan skripsi,

11. Kepada “the daun sembukan” alias fitra (jong) terima kasih banyak atas waktu, semangat, kerja sama, dan pengertiannya dari awal penelitian hingga sekarang.
12. Kepada “the online area squad” Dini Rahmiani, Fitra Insani, Kasturi Syahrir, dan Mutma Inna telah menjadi tempat berbagi yang sekretnya ada di Online Area bawa tangga.
13. Kepada guru besar ku “Fadil, Khofifa, Wardah, dan Afifah” telah membimbing penulis mulai dari penelitian hingga sekarang.
14. Kepada “**Pulv15**” terima kasih banyak atas pengertian dan bantuannya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah swt. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, September 2019

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR LAMPIRAN ix

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

ABSTRAK xii

ABSTRACK xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A.Latar Belakang 1

B.Rumusan Masalah 3

C.Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 3

D.Ruang Lingkup Penelitian 4

E.Kajian Pustaka 4

F.Tujuan Penelitian 5

G.Kegunaan penelitian 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II TINJAUAN TEORITIS 6

A.Uraian Tanaman 6

B.Metode Ekstraksi 8

C.Partisi Ekstrak 15

D.Flavonoid 18

E.Spektrofotometri UV-Vis 27

F.Tinjauan Islam 34

BAB III METODE KERJA 37

A.Jenis dan Lokasi Penelitian 37

B.Pendekatan Penelitian 37

C.Populasi dan Sampel 37

D.Instrumen Penelitian 38

E.Metode Pengumpulan Data 38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 42

A.Hasil 42

B.Pembahasan 43

BAB V PENUTUP 47

A.Kesimpulan 47

B.Saran 47

DAFTAR PUSTAKA 48

RIWAYAT HIDUP 71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Ekstraksi Sampel Daun Sembukan (*Paederia foetida L.)* 52
Lampiran 2. Partisi dengan menggunakan cair-cair..... 53
Lampiran 3. Penetapan Kadar Flavonoid..... 54
Lampiran 4. Hasil Perhitungan 56
Lampiran 5. Pengukuran Standard dan Kurva Kalibrasi 59
Lampiran 6. Gambar Tanaman Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.)*..... 61
Lampiran 7. Berat sampel daun sembukan (*Paederia Foetida L.)* 62
Lampiran 8. Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.)* 63
Lampiran 9. Gambar Pengerjaan Partisi Cair-Cair Ekstrak Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.)*..... 65
Lampiran 10. Penimbangan Hasil Partisi Ekstrak Daun Sembukan (Paederia Foetida L.) 66
Lampiran 11. Gambar Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Flavonoid Hasil Partisi larut Air Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.)*..... 67
Lampiran 12. Proses Penimbangan Bahan Pada Pengujian Flavonoid Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.)*..... 68
Lampiran 13. Hasil Spektrofotometri UV-Vis..... 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil partisi ekstrak etanol daun sembukan (*Paederia Foetida L.)*..... 42

Tabel 2. Hasil uji golongan senyawa Flavonoid hasil partisi larut air 42

Tabel 3. Nilai absorbansi kuarsetin sebagai pembanding pada panjang gelombang 440 nm..... 42

Tabel 4. Kandungan Flavonoid Total Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.)*.... 42

Tabel 5. Hasil pengukuran absorbansi flavonoid..... 59

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.*) 6
Gambar 2. Struktur Khalkon dan dihidrokalkon 21
Gambar 3. Struktur auron 21
Gambar 4. Struktur flavan 22
Gambar 5. struktur flavanon 22
Gambar 6. struktur flavonol 23
Gambar 7. struktur kuersetin 26
Gambar 8. konfigurasi dasar dari Spektrofotometer UV-Vis 30
Gambar 9. Sampel Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.*) 62
Gambar 10. Berat Sampel 63
Gambar 11. Proses pembuatan ekstrak daun sembukan (*Paederia Foetida L.)* ... 64
Gambar 12. Proses partisi cair-cair 65
Gambar 13. Hasil Partisi 66
Gambar 14. Warna merah bata adanya senyawa golongan Flavonoid 67
Gambar 15. Penimbangan Bahan 68
Gambar 16. Hasil Spektrofotometri UV-Vis 70

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

NAMA : NUNUNG DWI LESTARI MAKNUR

NIM : 70100115008

JUDUL : Analisis Kadar Flavanoid Total Hasil Partisi Larut Air Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.*) dengan Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis

---

Telah dilakukan penelitian Analisis Kadar Flavanoid Total Hasil Partisi Larut Air Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.*) dengan Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar flavonoid total yang terkandung dalam hasil partisi larut air daun sembukan (*Paederia Foetida L.).* Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi dengan mengguakan pelarut etanol 96%. Hasil maserasi dipartisi cair-cair dengan menggunakan pelarut n-heksan, pelarut etil asetat, dan pelarut air. Kemudian dilakukan penetapan kadar flavonoid. Hasil partisi larut air menunjukkan adanya senyawa flavonoid di dalam daun sembukan. Selanjutnya dilakukan analisa senyawa menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 440 nm. Dari hasil penelitian diperoleh kadar flavonoid total hasil hasil partisi larut air daun sembukan (*Paederia Foetida L.)* sebesar 0.727%

Kata Kunci : Ekstrak, Partisi, Kadar total, Flavonoid, Spektofotometri UV-Vis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACK

NAMA : NUNUNG DWI LESTARI MAKNUR

NIM : 70100115008

JUDUL : Analisis Kadar Flavanoid Total Hasil Partisi Larut Air Daun Sembukan (Paederia Foetida L.) dengan Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis

---

Research on the Analysis of Total Flavonoid Levels of Water Soluble Partition Results of Healed Leaf (Paederia Foetida L.) Using UV-Vis Spectrophotometry. The purpose of this study was to determine the level of total flavonoids contained in the water-soluble partition of healed leaves (Paederia Foetida L.). Extraction was done by maceration method using maceration method using 96% ethanol solvent. The result of maceration is partitioned liquid-liquid by using n-hexane solvent, ethyl acetate solvent, and water solvent. The results of the water-soluble partition showed the presence of flavonoid compounds in the healed leaf. To determine the level of flavonoid compounds in the water-soluble partition of healed leaves (Paederia Foetida L.), the compound analysis was performed using UV-Vis spectrophotometry. From the research results obtained total flavonoid levels resulting from water-soluble partition healing leaves (Paederia Foetida L.) of 0.727%

Keywords: Extracts, Partitions, Total levels, Flavonoids, UV-Vis spectrophotometry

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu negara yang memiliki populasi flora yang luas dan paling banyak di dunia adalah di Indonesia. Di dalamnya terkandung metabolit primer seperti protein, karbohidrat, dan lemak yang digunakan oleh tumbuhan itu sendiri untuk pertumbuhannya dan metabolit sekunder seperti fenolik, flavonoid, steroid, kumarin, dan alkaloid yang umumnya mempunyai kemampuan bioaktivitas dan berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari gangguan hama penyakit untuk tumbuhan itu sendiri atau lingkungannya. Usaha pencarian senyawa terhadap tumbuhan yang belum banyak diteliti akan lebih menarik dan prospektif karena kemungkinan menemukan banyak manfaat (Susilawati. 2008).

Seiring berkembangnya zaman, pemanfaatan berbagai macam tanaman sebagai obat tradisional memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan (Slikkerver, 2017). Kemudahan dalam memperoleh dan membudidayakan berbagai tanaman obat-obatan tradisional menjadi salah satu alasan masyarakat untuk memanfaatkannya . Salah satu contoh tanaman bahan baku obat tradisional adalah sembukan (*Paederia foetida L*) (Paul et al, 2018).

Tanaman sembukan merupakan suatu tanaman herba tahunan, mengeluarkan bau busuk yang kuat ketika diremas. Batang membelit ke kanan pada batang tumbuhan lain. Daun tunggal, permukaan atas berambut atau gundul dan berwarna coklat kehitaman, permukaan bawah berwarna kelabu kecoklatan dan berambut halus, rapat dan jarang, tulang daun menyirip dengan permukaan bawah lebih menonjol dari pada permukaan atas. Bunga tersusun majemuk malai, agak rapat (BPOM.RI, 2011).

Tanaman sembukan, kesembukan, atau juga sering dikenal dengan "daun kentut" merupakan tanaman yang berasal dari Asia Timur, tetapi tanaman ini

sekarang sudah tersebar di daerah tropis seluruh dunia. Secara ilmiah, tanaman ini disebut sebagai *Paederia scandens*, dan sering juga disebut dengan nama *Paederia foetida*. Keterangan nama *foetida* menunjukkan bahwa tumbuhan berbauh busuk. Salah satu kandungan kimia tanaman sembukan yang berperan penting adalah flavanoid (Nurcahyanti dan Wandra, 2012).

Flavonoid merupakan salah satu metabolit sekunder yang terkandung di dalam tumbuhan. Flavonoid umumnya terdapat pada tumbuhan dibagian daun, akar, buah, bunga, batang dan kulit batang. Flavonoid pada tumbuhan juga dapat berfungsi sebagai melindungi diri dari penyakit dan lingkungan sekitarnya (Hagerman et al, 1998).

Dari hasil studi, Minarti (2017) "Isolasi dan identifikasi senyawa flavanoid pada daun sembukan (*paederia foetida* L.) serta uji aktivitasnya sebagai antioksidan", dan didapatkan hasil yaitu senyawa yang terkandung dalam daun sembukan diduga senyawa flavanoid golongan flavon yang mengandung gugus OH pada C-3, C-3', dan C4' dan isolat flavanoid pada daun sembukan dapat merendam radikan bebas DPPH sampai 21,59% pada konsentrasi 50 ppm. Prasetyo (2018) "Analisis kandungan kimia daun sembukan (*Paederia foetida* L.) dengan menggunakan 2 pelarut yang berbeda yang dimana pelarutnya yaitu etanol dan metanol", dan dapat disimpulkan bahwa pada ekstrak etanol dan metanol daun sembukan mengandung alkaloid, tanin dan flavanoid. sedangkan pada ekstrak etanol dan metanol batang sembukan mengandung alkaloid, saponin, tanin dan flavanoid. Parwanto (2015) "Uji aktivitas antioksidan dan sitotoksisitas fraksi daun kentutan (*paederia foetida* L.)", dan dapat disimpulkan bahwa skrining fitokimia dan kromatografi lapis tipis (KLT) menunjukkan semua fraksi mengandung senyawa alkaloid, flavanoid, polifenol, dan terpenoid.

Saat ini antioksidan menjadi topik yang menarik dan juga merupakan minat yang besar bagi ahli obat, nutrisi, penelitian ilmu kesehatan dan makanan untuk mengetahui kapasitas dan unsur antioksidan pada makanan yang kita konsumsi begitu pula tumbuhan (Windono et al, 2001).

Dari penelitian-penelitian tersebut di atas, sejauh ini yang diteliti adalah kandungan senyawa yang terdapat didalam daun sembukan, dan belum pernah diteliti berapa kandungan flavonoid yang terdapat dalam daun sembukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa kandungan flavanoid yang terdapar dalam daun sembukan (*Paederia foetida* L.) tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan bahwa :

Berapa kadar total flavonoid hasil partisi larut air ekstrak etanol daun sembukan (*Paederia foetida L.*)?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a) Ekstrak etanol daun sembukan adalah sampel yang dibuat dengan mengekstraksi daun sembukan dengan menggunakan pelarut etanol dengan metode maserasi, lalu pelarutnya diuapkan dan didapatkan ekstrak yang kental

b) Flavonoid total adalah jumlah kandungan total flavonoid yang berasal dari daun sembukan yang diukur absorbansinya, dengan metode analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-Vis

c) Spektrofotometri UV-Vis adalah metode yang digunakan untuk menguji sejumlah cahaya yang diabsorbansi pada stiap panjang gelombang di daerah ultraviolet dan tampak.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah penetapan kadar flavonoid total. Pelarut yang digunakan adalah etanol 96% dengan menggunakan standar kuersetin secara spektrofotometri UV-Vis.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan jurnal penelitian oleh Prasetyo (2018) yang berjudul "Analisis kandungan kimia daun sembukan dan batang sembukan (*Paederia foetida* L.*)* dengan menggunakan 2 pelarut yang berbeda", yang dimana didapatkan hasil pada ekstrak etanol dan metanol daun sembukan mengandung alkaloid, tanin, dan flavanoid. sedangkan pada ekstrak etanol dan metanol batang sembukan mengandung alkaloid, saponin, tanin dan flavanoid. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada daun sembukan menggunakan pelarut etanol yang menghasilkan senyawa kimia flavonoid sehingga dapat dijadikan acuan kepada peneliti pelarut yang digunakan pada sampel daun sembukan.

Berdasarkan jurnal penelitian oleh Aminah yang berjudul "penetapan kadar flavonoid total ekstrak etanol kulit buah alpukat (*Persea americana*) dengan metode spektrofotometri UV-Vis", yang dimana didapatlkan hasil bahwa kadar flavanoid total ekstrak etanol kulit kulit buah alpukat (*persea americana*) yaitu 4,0122 mgQE/g ekstrak. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada penetapan kadar flavonoid total menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis sehingga dapat dijadikan acuan kepada peneliti metode yang digunakan pada penetapan kadar flavanoid total.

Berdasarkan jurnal penelitian oleh Rizki yang berjudul “Penetapan kadar flavanoid total dari ekstrak etanolik daun benalu mangga (*Dendrophthoe Pentandra L.*)”, yang dimana didapatkan hasil bahwa kadar flavanoid total daun benalu mangga yaitu 2,48% dihitung terhadap kuersetin atau sebagai kuersetin.

Persaaman dengan penelitian ini adalah untuk menentukan kadar flavanoid total maka digunakan kuersetin sebagai larutan pembanding.

F. Tujuan Penelitian

Menentukan kadar total flavonoid pada hasil partisi larut air ekstrak etanol daun sembukan (*Paederia foetida L.*).

G. Kegunaan penelitian

1. Sebagai sumber data ilmiah atau rujukan bagi peneliti lanjutan tentang kadar total flavonoid hasil partisi larut air daun sembukan (*Paederia foetida L.*).
2. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat tentang kadar flavonoid total yang terdapat pada daun sembukan (*Paederia foetida L.*) .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman

Gambar 1. Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.*)

1. Klasifikasi (Depkes RI, 2001)

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Class	: Dicotyledonae
Subclass	: Rosidae
Ordo	: Rubiales
Family	: Rubiacea
Genus	: Paederia
spesies	: *Paederia foetida L.*

2. Nama Daerah

Daun Kentut (Sumatra), Sembukan, kasembukan, kasembuhan (Jawa), kahitutan (Sunda), bintaos (Madura), guni siki (Maluku), attu-attu (Makassar) (Kustantinah, 2011).

3. Morfologi

Tanaman sembukan (*Paederia foetida L.*) merupakan salah satu tanaman yang secara ptimal belum dimanfaatkan. Nama tanaman ini mungkin sudah banyak di dengar orang tetapi masih belum banyak diketahui manfaatnya. Tanaman sembukan yang sering dikenal sebagai daun sembukan atau daun kentut memiliki berbagai macam khasiat dan kegunaannya (Utami, 2006).

Tanaman sembukan tumbuh subur di tanah berpasir, lempung, dan tanah liat. Tanaman membutuhkan air yang cukup untuk menciptakan kelembaban di tempat hidupnya, dapat tumbuh pada berbagai kondisi tanah baik asam, netral, maupun basa. Sembukan memiliki daun yang berbentuk bulat memanjang berukuran 6 hingga 10 cm, sedangkan lebar daunnya hingga 5 cm, dan pangkal daunnya berbentuk hati atau membulat. Bagian tepi daun rata,ujung runcing, pangkal berlekuk, berambut, pertulangan menyirip, tangkai daun bulat, dan berbuku. Buah sembukan berbentuk bulat dengan diameter sekitar 5 mm. Batangnya masif, beruas, beralur, berdiameter 2-5 mm, akar yang berwarna cokelat dapat tumbuh dari buku-buku batang. Sembukan sangat mudah dibiakkan, yaitu dengan stek batang. Pemeliharaannya juga cukup mudah, menjaga kelembapan, dan pemupukan (Nurcahyanti, 2012)

4. Kandungan

Kandungan yang terdapat pada tanaman sembukan yaitu paederosida, glikosida iridiod, paederolon, paederon, paederin, paederenin, sitosterol, stigmasterol,

alkaloid, flavonoid, protein, asam amino dan minyak menguap (Kustantinah, 2011).

5. Khasiat Tanaman

Paederia Foetida Linn yang sering dikenal sebagai sembukan atau daun kentu memiliki berbagai macam khasiat dan kegunaan. Tanaman ini dapat berfungsi sebagai antirematik, penghilang rasa sakit atau analgesic, peluruh kentut, peluruh kencing (diuretik), peluruh dahak (mukolitik), antibiotic, antiradang, obat batuk dan pereda kejang. Selain itu juga dapat berperan sebagai obat radang usus, bronchitis, tulang paah, keseleo, perut kembung, hepatitis, disentri, luka benturan, dan obat cacing (Utami, 2008).

Sembukan telah lama terdapat di Indonesia. Tanaman ini dapat dipakai sebagai obat masuk angina, sakit perut, bengkak-bengkak serta obat radang mata. Dalam buku Heyne yang ditulis tahun (1927) diuraikan bahwa sejak 1890-an tanaman sembukan digunakan untuk mengobati penyakit kulit (Herpes), disentri, radang usus besar (proktitis) dan radang telinga tengah (Timpanitis) (Agustina, 2012).

B. Metode Ekstraksi

1. Definisi ekstraksi

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai bahan obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh, bagian hewan, atau zat yang dihasilkan oleh hewan yang masih belum berupa zat kimia murni, sedangkan simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bahan bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni (Dirjen POM, 1979).

Ekstrak adalah sedian kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hamper semua pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1979).

Ekstrak tumbuhan obat yang dibuat dari simplisia nabati dapat dipandang sebagai bahan awal, bahan antara ataupun bahan produk jadi. Ekstrak sebagai bahan awal dianalogkan dengan komoditi bahan baku obat yang dengan teknologi fitofarmasi diproses menjadi produk jadi. Ekstrak sebagai bahan antara berarti masih menjadi bahan yang dapat diproses lagi menjadi fraksi-fraksi, isolate senyawa tunggal ataupun tetap sebagai campuran dengan ekstrak lain. Ekstrak sebagai produk jadi berarti ekstrak yang berada dalam sediaan obat jadi siap digunakan oleh penderita (Dirjen POM, 1979).

Proses untuk mendapatkan ektrak disebut ekstraksi, yaitu penyarian zat berkhasiat atau zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut (Dirjen POM, 1979).

Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasii senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui tehnik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan kedalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama (Dirjen POM. 2000).

Ekstraksi juga merupakan proses pemisahan senywa dari matriks atau simplisia dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Metode ekstraksi yang

digunakan juga tergantung pada jenis, sifat fisik dan sifat kimia dari kandungan senyawa yang akan diekstraksi. Proses ekstraksi menggunakan pelarut yang disesuaikan dengan polaritas dari senyawa yang akan di ambil. Simplisia yang akan diambil berupa simplisia segar ataupun simplisia yang telah dikeringkan (Hanan, 2015).

Ekstrak adalah sediaaan yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian hampir semua pelarut diuapkan (Dirjen POM, 2000).

Faktor biologi yang mempengaruhi mutu ekstrak meliputi beberapa hal yaitu:

a. Identitas jenis (Spesies) : jenis tumbuhan dari sudut keragaman hayati dapat dikonfirmasi sampai informasi genetik sebagai faktor internal untuk validasi jenis (spesies).
b. Lokasi tumbuhan asal : lokasi berarti faktor eksternal yaitu lingkungan (tanah dan atmosfer) dimana tumbuhan berinteraksi berupa energi (cuaca, temperatur, cahaya), dan materi (air, senyawa organik, dan senyawa anorganik).
c. Periode pemanenan hasil tumbuhan.
d. Penyimpanan bahan tumbuhan.
e. Umur tumbuhan dan bagian yang digunakan.

Selain kelima faktor tersebut untuk bahan tumbuhan dari hasil budaya ada lagi faktor GAP (*Good Agriculture Practice*) sedangkan untuk bahan dari tumbuhan liar (*will crop*) ada faktor kondisi proses pengeringan yang umumnya dilakukan di lapangan.

Adapun faktor kimia baik untuk bahan dari tumbuhan liar maupun dari tumbuhan obat hasil budidaya meliputi beberapa hal, yaitu:

a. Faktor internal meliputi jenis senyawa aktif, komposisi kualitatif senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, dan kadar total rata-rata senyawa aktif.

b. Faktor eksternal meliputi metode ekstraksi, pelarut yang digunakan, perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran kekerasan, dan kekeringan bahan, kandungan logam berat, kandungan pestisida (Dirjen POM, 2000).

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Sebelum memilih metode, target ekstraksi perlu ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya (Sarker, et all, 2006).

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui
2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme
3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara structural.

2. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk memisahkan dan menarik senyawa yang mempunyai kelarutan yang berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi ini didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel secara osmosis yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara didalam dan diluar sel, mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif didalam dan diluar sel (Dirjen POM, 2000).

Tujuan utama dari ekstraksi berkaitan dengan satu atau lebih dari sifat berikut:

a. Hasil ekstraksi yang tinggi: senyawa target diperoleh secara tuntas dan atau hampir tuntas.

b. Kemurnian yang tinggi (selektivitas): ekstrak yang dihasilkan memiliki bahan pengganggu dan atau bahan yang tidak diinginkan dalam jumlah yang rendah.

c. Sensitivitas yang tinggi: ekstrak yang dihasilkan memungkinkan untuk dikuantifikasi dengan tehnik yang berbeda-bedas dengan menghasilkan linearitas yang tinggi dalam kurva kalibrasi.

d. Batas deteksi rendah (kuantifikasi): komponen dalam ekstrak dapat dideteksi/diukur pada tingkat rendah karena tingkat *noise* (gangguan analisis) yang rendah dapat diperoleh dalam sistem analitis (Haeria, 2014).

3. Metode Ekstraksi

Metode ekstraksi menggunakan pelarut dapat dilakukan secara dingin yaitu maserasi dan perkolasi, dan secara panas yaitu refluks, digesti, soxlet, infus, dan dekok (Dirjen POM, 2000).

Ada beberapa metode ekstraksi menurut Dirjen POM yaitu:

a. Cara dingin

1) Maserasi

Salah satu jenis ekstraksi yang banyak digunakan adalah maserasi. Maserasi merupakan jenis ekstraksi dingin atau tanpa melalui proses pemanaan. Maserasi juga merupakan metode pemisahan senyawa dari simplisia dengan cara merendam simplisia dalam pelarut pada suhu kamar sehingga cepat mengurangi kerusakan metabolit pada simplisia. Proses yang terjadi pada maserasi yaitu pelarut akan memecah dinding sel akibat perbedaan konsentrasi di dalam dan diluar sel sehingga senyawa yang terdapat di dalam sel akan berpindah keluar dari sel dan pelarut akan masuk ke dalam sel sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi didalam dan diluar sel (Hanani, 2015). Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, metanol, etanol-air atau pelarut lainnya. Remaserasi berarti dilakukan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat yang pertama, dan seterusnya. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan.

Metode maserasi dapat dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil karena tidak dilakukannya pemanasan.

Maserasi dapat diklasifikasikan berdasarkan (Dirjen POM, 2000)

1. Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu ntara 40-50°C. cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan

2. Maserasi dengan mesin pengadukan adalah maserasi yang dilakukan dengan menggunakan mesin pngadukan yang berputar terus menerus, waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam.

3. Remaserasi adalah penyarian dimana cairan penyari dibagi menjadi 2. Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertma, sesudah disaring ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua.

4. Maserasi melingkar adalah penyarian yang digunakan dengan cairan penyarian yang selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya.

5. Maserasi melingkar bertingkat adalah metode penyarin yang menggunakan peralatan yang hamper sama dengan maserasi melingkar, tetapi dengan jumlah bejana penambang yang disesuaikan dengan keperluan (lebih banyak).

2) Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi yang dilakukan dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna yang umumnya yang dilakukan pada temperatur ruangan. Prosesnya terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan. Pada metode perkolasi serbuk sampel yang dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator

(wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetas perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau selutuh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu.

b. Cara panas

1) Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin baik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna. Pada metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut kedalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan kembali kedalam labu tersebut.

2) Soxhlet

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang pada umumnya digunakan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Pada metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan dibawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas dan diatur dibawah suhu refluks. Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan

banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih.

3) Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50°C.

4) Infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 86-98°C) selama waktu tertentu (15-20 menit).

5) Dekok

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (≥30°C) dan temperatur sampai titik didih air.

C. Partisi Ekstrak

1. Definisi Partisi

Partisi adalah proses pemisahan untuk memperoleh komponen zat terlarut dari campurannya dalam padatan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Partisi juga dapat didefinisikan sebagai disperse komponen kimia dari ekstrak yang telah dikeringkan dalam suatu pelarut yang sesuai berdasarkan kelarutan dari komponen kimia dan zat-zat yang tidak diinginkan seperti garam-garam yang tidak dapat larut (Najib, 2013).

2. Metode Partisi

a. Partisi cair-cair

Partisi cair-cair adalah proses pemisahan zat terlarut didalam 2 macam zat pelarutyang tidak saling bercampur dan atau dengan kata lain perbandingan konsentrasi zat terlarut dalam pelarut organic, dan pelarut air. Hal tersebut

memungkinkan karena adanya sifat senyawa yang dapat larut air dan ada pula senyawa yang dapat larut pada pelarut organic. Satu komponen dari campuran akan memiliki kelartan dalam kedua lapisan tersebut (biasanya disebut fase) dan setelah beberapa waktu dicapai keseimbangan biasanya dipersingkat oleh pencampuran kdua fase tersebut kedalam corong pisah (Najib, 2013).

b. Partisi cair-padat

Partisi cair padat adalah pemisahan untuk memperoleh komponen zat terlarut dari campurannya dalam padatan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Dapat juga didefinisikan sebagai disperse komponen kimia dari ekstrak yang telah dikeringkan dalam suatu pelarut yang sesuai berdasarkan kelarutan dari komponen kimia dan zat-zat yang tidak diinginkan seperti garam-garam yang tidak dapat larut. Operasi ekstraksi ini (Najib, 2014).

Pelaksanaan partisi cair-padat terdiri dari 2 lngkah yaitu :

a. Kontak antara padatan dan pelarut untuk mendapatkan perpindahan solute kedalam pelarut.
b. Pemisahan larutan yang terbentuk dan padatan sisa.

Bedasarkan metode cair-padat dikenal 4 jenis yaitu :

a. Operasi dengan sistem bertahap banyak dengan aliran sejajar atau aliran silang
b. Operasi secara batch dengan sistem bertahap dengan aliran yang berlawanan
c. Operasi dengan sistem bertahap tunggal
d. Operasi dengan sistem bertahap berlawanan. (Najib, 2013).

3. Tujuan Partisi

a. Partisi cair-cair

Partisi cair-cair adalah proses pemisahan zat terlarut didalam 2 macam zat pelarut yang tidak saling bercampur atau dengan kata lain prbandingan konsentrasi zat terlarut dalam pelarut organic dan pelarut air. Ekstraksi cair-cair biasa juga disebut sebagai metode corong pisah. Jika suatu cairan ditambahkan ke dalam ekstrak yang telah dilarutkan dalam cairan lin yang tidak dapat bercampur dengan yang pertama, akan terbentuk dua lapisan. Satu komponen dari campuran akan memiliki kelarutan dalam kedua lapisan tersebut (biasanya disebut fase) dan setelah beberapa waktu dicapai kesetimbangan konsentrasi dalam kedua lapisan. Waktu yang diperlukan untuk tercapainya kesetimbangan biasanya dipersingkat oleh pencampuran keduanya corong pisah (irjen POM, 2000).

Ekstraksi cair-cair dilakukan dengan cara pemisahan kimia diantara 2 fase pelarut yang tidak saling bercampur. Dimana sebagian komponen larut pada fase pertama, dan sebagian larut pada fase kedua. Lalu kedua fase yang mengandung zat terdispersi dikocok, dan didiamkan sampai terjadi pemisahan sempurna dan terbentuk dua lapisan. Yakni fase cair dan komponen kimia yang terpisah (Sudjadi, 1988).

Tujuan partisi cair-cair adalah untuk memisahkan analit-analit yang dituju dari pengganggu dengan cara melakukan partisi sampel antara 2 pelarut yang tidak saling bercampur. Salah satu fasenya sering kali berupa air dan fase yang lainnya berupa pelarut organic. Senyawa-senyawa yang bersifat polar akan ditemukan didalam fase air, sementara senyawa-senyawa yang bersifat hidrofobik akan masuk pada pelarut organic, begitu pula dengan ekstraksi cair-padat sampel yang digunakan tidak larut air (Tobi, 2001)

b. Partisi cair-padat

Jika suatu cairan ditambahkan ke dalam ektrak yang telah dilarutkan dalam cairan lain yang tidak bercampur dengan yang utama akan terbentuk 2 lapisan. Satu komponen dari campuran akan memiliki kelarutan dalaam kedua lapisan (biasanya disebut fase) dan setelah beberapa waktu mencapai kesetimbangan konsentrasi dalam kedua lapisan. Kelarutan senyawa tidak bermuatan dalam satu fase pada suhu tertentu tergantung pada kemiripan kepolarannya dengan fase cair, menggunakan prinsip "like dissolve like" (Lubis, A.H., 1994).

D. Flavonoid

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder yang paling banyak ditemukan didalam jaringan tanaman. Flavonoid termasuk dalam golongan senyawa fenolik sengan struyktur kimia C_6-C_3-C_6 (Redha. 2010).

Flavonoid juga merupakan senyawa polar dengan gugus hidroksil atau gula sehingga mudah larut dalam pelarut polar dan air (Ilyas, 2013). Flavonoid sebagai antioksidan alami yang bekerja menghambat dan memperlambat proses oksidasi yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas yang melengkapi kekurangan satu electron yang dimiliki radikal bebas yang dapat menimbulkan terjadinya stress oksidatif. Senyawa flavonoid menghambat terbentuknya metabolit reaktif yang dapat berikatan dengan makromolekul jaringan sehingga dapat mencegah kerusakan pada jaringan, karena ketika flavonoid bereaksi dengan radikal bebas maka flavonoid akan mendonorkan proton dan menjadi senyawa radikal (Erni, dkk., 2014)

Manfaat utama flavonoid dalam tubuh manusia adalah sebagai antioksidan yang bisa menghambat proses penuaan dan mencegah berkembangnya sel kanker. Selain itu flavonoid juga berfungsi sebagai:

1. Melindungi struktur sel dalam tubuh
2. Meningkatkan penyerapan dan penggunaan vitamin C dalam tubuh
3. Sebagai obat anti inflamasi
4. Mencegah pengoposan tulang
5. Sebagai antibiotic
6. Sebagai antivirus, bahkan fungsinya sebagai antivirus HIV/AIDS telah diketahui dan dipublikasikan
7. Menghambat pertumbuhan kolestretol jhal LDL dalam darah
8. Mencegah terjadinya athesklerosis, suatu keadaan dimana dinding arteri menjadi lebih tebal
9. Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh
10. Sebagai pencegah terjadinya penyakit
11. Untuk mengbati beberapa macam penyakit

Flavanoid memiliki sifat anti oksidan. Senyawa ini berperan sebagai penangkap radikal bebas karena mengandung gugus hidroksil. Karena sbersifat sebagai reduktor, flavonoid dapat bertindak sebagai donor hidrogen terhadap radikal bebas. Senyawa flavonoid seperti kuersetin, morin: mirsetin, kaenferol, asam malat, dan asam elegat merupakan antioksidan kuat yang dapat melindungi dari kerusakan iksidaftif (Silalahi, 2006).

Kandungan total flavonoid diukur berdasarkan keberadaan kuersetin didalam ekstrak tanaman. Analisis kandungan flavonoid dilakukan dengan penambahan pereaksi $FeCl_3$. Sebagai asam lewis, $AlCl_3$akan membentuk ikatan kompleks dengan gugus hidroksil dari senyawa flavonoid. Perubahan ini diidentifikasi melalui absorbansi pada daerah sinaar tampak melalui spektrofotometer. Semakin banyak kandungan senyawa flavonoid dalam suatu

ekstrak maka secara visual warna kuning yang terbentuk akan semakin pekat (Neldawati, 2013).

Kegunaan flavonoid yaitu sebagai:

1. Pada tanaman

Flavonoid memberikan perlindungan terhadap adanya stres lingkungan, pengatur pertumbuhan tanaman. Perlindungan terhadap radiasi ultraviolet dan daya tarik penyerbuk serangga (Vidak, 2015), virus, jamur, dan bakteri, disamping sebagai pengendali hormon dan enzim inhibitor (Winarti, 2010) . Flavonoid terlibat dalam filtrasi UV, fiksasi simbiosis dan pigmentasi bunga (Gupta, 2015).

Senyawa flavonoid dialam umumnya sangat jarang ditemukan dalaam bentuk aglikonnya. Menurut Harborne bahwa flavonoid dalam tumbuhan sering terdapat sebagai glikosida (flavonoid glikosida) dan jarang sekali ditemukan dalam bentuk tunggal/aglikon flavonoid. Oleh karena itu, untuk menganalisis flavonoid lebih baik untuk menghidrolisis glikosida yang terikat pada flavonoid tersebut sebelum memperhatikan kerumitan glikosida yang mungkin terdapat dalam ekstrak awal (Ridho, 2013).

Flavonoid pada tumbuhan biasanya terdapat dalam bentuk glikosida baik sebagai flavonoid O-glikosida atau flavonoid C-glikosida. Flavonoid O-glikosida merupakan flavonoid yang satu atau lebih gugus hidroksilnya dengan adanya asam. Akibat ikatan ini flavonoid menjadi kurang reaktif dan lebih mudah larut dalam pelarut polar (Hanani, 2015).

Khalkon merupakan flavonoid minor yang jumlahnya terbatas di alam. Khalkon memiliki kerangka unik dan berbeda dengan senyawa flavonoid lainnya yaitu pada struktur karbon tiga (C3) berbentuk rantai terbuka yang menghubungkan cincin A dan cincin B pada cincin heterosiklik C untuk kerangka flavonoid utama. Khalkon merupakan senyawa yang penting karena merupakan

prekursor pembentuk secara langsung dari semua flavonoid lainnya (.Ilyas, 2013). Khalkon merupakan golongan flavonoid yang terdapat bunga kuning, kadang-kadang terdapat dalam jaringan lain dengan cirri khasnya jika ditambahkan ammonia akan menghasilkan warna merah (Harborne, 1987)



Gambar 2. Struktur Khalkon dan dihidrokalkon

Auron merupakan golongaan flavonoid yang memiliki pigmen bunga kuning, kadang-kadang terdapat dalam jaringan lain. Auron memiliki ciri khas yaitu jika ditambahkan ammonia akan menghasilkan warna merah (Harborne, 1987). Auron pada pengujian dengan spektrofotometer UV-Vis memiliki rentangan serapak spektrum pita I yaitu 380-430 dan pita II memiliki kekuatan spektrum yang lemah yaitu 230-270 (Aziz, et all, 2013).



Gambar 3. Struktur auron

Flavan merupakan senyawa flavonoid minor dan merupakan utama dan terdapat senyawa-senyawa flavan tersubstitusi dengan gugus hidroksil yaitu flavanol (Ilyas, 2013). Flavanol merupakan golongan flavonoid yang tersebar dalam ko-pigmen dan warna dalam bunga sianik dan asianik, tersebar luas dalam

daun. Memiliki cirri khas yakni setelah dihidrolisis muncul bercak kuning pada kromatogram forestall (Harbone, 1987)



FLAVAN

Gambar 4. Struktur flavan

Isoflavon merupakan salah satu jenis flavonoid yang tersebar pada tanaman berwarna, sering kali dalam akar, atau pada tumbuhan yang satu suku, Legominose. Ciri khasnya yaitu dapat larut dalam air panas dan bergerak pada kertas dengan pengembang air namun tidak ada warna uji yang kas. Biflavonil merupakan jenis flavonoid yang tersebar pada tanaman berwaarna namun hamper seluruhnya terbatas pada gimnospermae. Biflavonil memiliki cirri khas yaitu pada kromatgram BAA berupa bercak redup dengan Rf tinggi (Harborne, 1987). Selain itu juga terdapat flavonoid jenis biflavonoid yang merupakan flavonoid dinner. Flavonoid yang bias terlihat ialah flavanon dan flavon secara biosintesis mempunyai pola oksigenasi yang sederhana 5, 6, 7, 3', 4' dan terkafang berikatan karbon atau berikatan dengan eter (Geiger, et all, 1988)

Flavanoon adalah jenis golongan flavonoid yang tersebar pada daun dan buah terutama pada buah jeruk memiliki cirri khusus yaitu menghasilkan warna merah kuat dengan penambahan Mg/HCL, kadang sangat pahit (Harborne, 1987).



FLAVANON

Gambar 5. struktur flavanon

Flavanon merupakan salah satu golongan flavonoid yang memiliki cirri khusus yakni setelah terhidrolisis akan menimbullkan bercak coklat redup pada kromatogram forestall (Harborne, 1987). Flavon mudah diurai dengan alkali dan menghasilkan diasilmetan. Flavon stabil terhadap asam kuat dan eter mudah didealkilasi dengan penambahan asam HBr atau dengan $AlCl_3$ dalam pelarut inert (Ilyas, 2013). Glikoflavon merupakan jenis golongan flavonoid yang memiliki cirri khas yaitu mengandung gula yang berikatan melalui ikatan C-C, bergerak dengan pengembang air, tidak seperti flavon biasa (Harborne, 1987).

Flavonoid jenis lainnya yaitu flavanol yang banyak tersebar pada ko-pigmen tanaman berwarna dalam bunga sianik dan asianik tersebar luar dalam daun. Cirri khasnya yairu setelah dihidrolisis timbuk bercak kuning murup pada kromatogram forestall bila disinari dengan sinar UV (Harborne, 1987).



FLAVONOL

Gambar 6. struktur flavonol

2. Pada manusia

Pada manusia berfungsi sebagai stimulan pada jantung, menurunkan kadar gula darah, diuretik, dan sebagai anti jamur, memiliki fungsi sebagai antibakteri, antiinflamasi, antitumor, antialergi, dan mencegah osteoporosis. Flavonoid dapat mencegah penyakit kardiovaskuler dengan cara menurunkan laju oksidasi lemak karena perannya flavonoid sebagai antioksidan (Nurjannah, 2011).

Flavonoid terdapat pada semua bagian tumbuhan daun, kulit batang, akar kayu, kulit tepung sari, nektar, bunga, buah, dan biji. Hanya sedikit saja catatan yang melaporkan adanya flavonoid pada hewan, misalnya pada kelenjar bau

berang-berang, propolis (sekresi lebah) dan didalam sayap kupu-kupu, itupun dengan anggapan bahwa flavonoid tersebut berasal dari tumbuhan yang menjadi makanan hewan tersebut dan tidak dibiosintesis dalam tubuh mereka (Neldawati, 2013).

Flavonoid merupakan senyawa dengan bobot molekul rendah dan memiliki struktur dasar $C_6C_3C_6$ yaitu terdiri atas 2 buah cincin benzene yang dihubungkan dengan 3 karbon. Flavonoid memiliki aktivitas antioksidan didalam tubuh disebut bioflavonoid (Widyastuti, 2012). Lebih dari 4.000 flavonoid telah diakui banyak yang terjadi dalam sayuran, buah-buahan dan minuman seperti the, kopi dan buah minuman.

Seyawa Flavonoid memiliki sifat sebagai pereduksi yang baik, dapat menghambat banyak reaksi oksidasi, baik secara enzimatik maupun non enzimatik. Flavonoid bertindak sebagai penangkal yang baik terhadap radikal hidroksi dan superoksida sehingga dapat melindungi membrane lipid dari reaksi-reaksi yang dapat berefek buruk dan menyebabkan kerusakan sel (Ilyas, 2013). Flavonoid sebagai antioksidan alami bekerja menghambat dan memperlambat proses oksidasi yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas dengan melengkapi kekurangan satu electron yang dapat menimbulkan terjadinya tress oksidatif. Senyawa flavonoid menghambat terbentuknya metabolit reaksi yang dapat berikatan dengan makromolekul jaringan sehingga mencegah kerusakan jaringan, karena ketika flavonoid bereaksi dengan radikal bebas maka flavonoid akan mendonorkan proton dan menjadi senyawa radikal. Tetapi electron tidak berpasangan yang dihasilkan akan di delokalisasi oleh resonansi sehingga membuat senyawa flavonoid radikal memiliki energy yang sangat rendah untuk menjadi radikal yang reaktif (Erni, et all, 2014).

Kadar flavonoid dalam satu tanaman berbeda-beda diantara setiap bagian, dan umur tanaman, jaringan, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Faktor-faktor ini adalah temperatur, nutrisi, ketersediaan air, sinar ultraviolet yang tampak, dan kadar CO_2 pada atmosfer (Neldawati, 2013).

Kandungan flavanoid total diukur berdasarkan keberadaan kuersetin didalam ekstrak tanaman. Analisis kandungan flavonoid dilakukan dengan penambahan pereaksi $FeCl_3$. Sebagai asam lewis, $AlCl_3$ akan membentuk ikatan kompleks dengan gugus hidroksil dari senyawa flavonoid . Perubahan ini diidentifikasi melalui absorbansi pada daerah sinar tampak melalui alat spektrofotometer. Semakin banyak kandungan senyawa flavonoid dalam suatu ekstrak maka secara visual warna kuning yang terbentuk akan semakin pekat (Neldawati, 2013).

1. Sifat kelarutan flavonoid

Flavonoid merupakan senyawa polar , maka umumnya flavonoid cukup larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetil-sulfoksida, dimetilformamida, air, dan lain-lain (Markham, 1988). Adanya gula yang terikat pada flavonoid (bentuk umum yang ditemukan) cenderung menyebabkan flavonoid lebih mudah larut dalam air dan dengan demikian campuran pelarut di atas dengan air merupakan pelarut yang baik untuk glikosida (Markham, 1988).

Kelarutan Flavonoid:

1. Flavonoid polimetil atau polimetoksi larut dalam heksan, petroleum eter (PE), klorofotm, eter, etil asetat, dan etanol. Contoh: sinersetin (nonpolar).
2. Aglikon flavonoid polihidroksi tidak larut dalam heksan, PE dan kloroform; larut dalam eter, etil asetat dan etanol, dan sedikit larut dalam

air. Contoh: kuersetin (semipolar) Gikosida flavonoid tidak larut dalam heksan, PE, kloroform, eter, sedikit larut dalam etil asetat dan etanol,; serta sangat larut dalam air. Contoh: rutin.

Kuersetin adalah senyawa kelompok flavanol terbesar, kuersetin dan glikosidanya berada dalam jumlah sekitar 60-75% dari flavonoid. Kuarsetin juga dipercaya dapat melindungi tubuh dibeberapa penyakit degeneratif dengan cara mencegah terjadinya proses peroksidasi lemak. Kuersetin memperlibatkan kemampuan menegah proses oksidasi dari *Low Density Lipoproteins* (LDL) dengan cara menangkap radikal bebas dan menghelat ion logam transisi. Ketika flavanol kuersetin bereaksi dengan radikal bebas, kuersetin mendonorkan protonnya dan menjadi senyawa radikal (Sutir, 2012). Kuersetin seringkali terdapat dalam jumlah substansial dalam jaringan tanaman, sebagai antioksidan kuat,peredam radikal bebas, penghelat logam, dan mencegah oksidasi dari lipoprotein densitas rendah (Haeria, 2014).



Gambar 7. struktur kuersetin

Dilihat dari struktur kimianya, kuersetin memiliki aktivitas kuat sebagai pemberi hydrogen karena kandungan hidroksilasi yang cukup, yakni 5 gugus OH dan lokasi gugus hidroksilnya terdapat pada sisi aktif (C5, C7, C3’, dan C4’). Kuersetin oleh jumlah ahli kesehatan dipertimbaangkan sebagai fitoestrogen yang memiliki fungsi yang sama dengan estrogen yang diyakini memiliki efek estrogenic untuk mengurangi resiko kanker (Silalahi, 2006).

E. Spektrofotometri UV-Vis

Spektrofotometri merupakan analisa kimia kuantitaif didalam kimia analisis dengan mengukur berapa jauh energi radiasi yang diserap oleh absorbansi terisolasi suatu panjang gelombang,. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang diadsorbansikan atau ditransmisikan. Jadi spektrofotometer digunakan untuk mengukur energi yang relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Khopkar, 2010).

Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu jenis yang sering digunakan dalam analisis kimia dan biologi. Speltrofotometer ini didasarkan pada interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Apabila seberkas radiasi (cahaya) dikenakan pada cuplikan (larutan sampel), maka sebagian dari cahaya diserao oleh molekul-molekul sesuai dengan struktur dari molekul. Setiap senyawa dalam sampel memiliki tingkatan tenaga yang spesifik. Bila cahaya yang mengenaik cuplikan, maka electron-elektron pada tingkatan dasar akan dieksitasi ke tingkatan tereksitasi, dan sebagian energy cahaya yang sesuai diserap dengan panjang gelombang ini. Elektron yang tereksitasikan melepaskan tenaga melali proses radiasi panas dan akan kembali pada tingkatan dasar lagi. Perbedaan energy antara tingkat dasar dengan tingkat tereksitasi yang spesifik untuk tiap-tiap bahan/senyawa menyebabkan frekuensi yang diserap juga berbeda-beda (Sastrohamidjojo, 2001).

Spektrofotometri UV-Visible adalah salah satu tehnik yang paling sering digunakan dalam analisis farmasi. Hal ini melibatkan sebuah pengukuran radiasi ultraviolet dan atau zat yang diserap dalam larutan. Instrumen yang mengukur rasio, intensitas dua berkas cahaya di daerah UV-Visible, atau fungsi dari rasio disebut spektrofotometri Ultraviolet-Visible (Behera, 2012).

Spektrofotometri UV-Vis merupakan metode yang digunakan untuk menguji sejumlah cahaya yang diabsorbansi pada setiap panjang gelombang di daerah UV dan tampak. Dalam instrument ini suatu sinar cahay terpecah sebagian cahaya diarahkan melalui sel transparan yang mengandung suatu larutan senyawa tetapi mengadung pelarut. Ketika radiasi elektromagnetik dalam daerah UV-Vis melewati suatu senyawa yang mengandung ikatan-ikatan rangkap, senagian dari radiasi biasanya diabsorbsi oleh senyawa. Hanya beberapa radiasi yang diabsorbsi tergantung pada panjang gelombang dari radiasi dalam struktur (Mulja, 1995).

Panjang gelombang cahaya UV dan tampak jauh lebih pendek daripada panjang gelombang radiasi infra merah. Satuan yang akan digunakan untuk memeriksa panjang gelombang ini adalah nanometer (1 nm = 10-7 cm). Spektrum Nampak terentang dari sekitar 400 nm (ungu) ke 750 nm (merah), sedangkan spektrum ultraviolet berjangka dari 100 ke 400 nm (Fessenden, 1984).

Spektrofotometer yang sesuai untuk pengukuran di daerah spektrum ultraviolet dan sinar tampak terdiri atau suatu sistem optik dengan kemampuan menghasilkan sinar monokromatis dalam jangkauan panjang gelombang 200-800 nm., Komponen-komponennya meliputi sumber-sumber sinar, monokromator, dan sistem optik (Guanjar I.G,dan Rohman, 2010).

Spektrofotometer memiliki panjang gelombang yang benar-benar terseleksi yang dapat diperoleh dengan bantuan alat pengurai cahaya seperti prisma. Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum dapat yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blangko dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blangko ataupun pembanding (Khopkar, 2010).

Sinar radiasi UV-Vis adalah gelombang antara 180-380 nm untuk UV dan panjang gelombang 380-780 nm untuk Visible. Cahaya yang dapat dilihat oleh

manusia disebut cahaya tampak/visible. Biasanya cahaya terlihat merupakan campuran dari cahaya yang mempunyai berbagai panjang gelombang dari 400 nm hingga 750 nm.

Panjang Gelombang (nm)	Warna	Warna Komplementer
400-435	Violet (ungun)	Hijaun kekuningan
450-480	biru	Kuning
480-490	Biru kehijauan	Jingga
490-500	Hijau kebiruan	Merah
500-560	Hijau	Ungu kemerahan
560-580	Hijau kekuningan	Ungu
580-595	Jingga	Biru kehijauan
595-610	Merah	Hijau kebiruan
610-750	Ungu kemerahan	hujau

Setiap gugus kromofor menyerap cahaya UV pada panjang gelombang yang spesifik tergantung substituen yang diikatnya dan tambahan konjugasi ikatan rangkap pada molekul yang bersangkutan. Analog dengan spektroskopi UV maka spektroskopi Vis adalah untuk analisa senyawa yang berwarna. Secara kuantitatif, maka kedua jenis spektroskopi ini juga dapat digunakan karena jumlah sinar yang diserap sebanding dengan konsentrasi senyawa yang menyerap secara empiris konsentrasi ditentukan dengan persamaan Lambert-Beer (Sitorus, 2010).

Apabila radiasi atau cahaya putih dilewatkan melalui larutan berwarna, maka radiasi dengan panjang gelombang tertentu akan diserap (absorbsi) secara selektif dan radiasi lainnya akan diteruskan (transmisi). Absorbansi adalah perbandingan intensitas sinar yang diserap dengan intensitas sinar datang. Nilai

absorbansi ini akan bergantung pada kadar zat yang terkandung didalamnya, semakin banyak kadar zat yang terkandung dalam suatu sampel maka semakin banyak pula molekul yang akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu sehingga nilai absorbansi semakin besar atau dengan kata lain nilai absorbansi akan berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang terkandung didalam suatu sampel (Neldawati, 2013).

Jika suatu molekul bergerak dari suatu tingkat energi ke tingkat energi yang lebih rendah maka beberapa energy juga akan dilepas. Energi ini dapat hilang sebagai radiasi dan dapat dikatakan telah terjadi emisi radiasi. Jika suatu molekul dikenai suatu radiasi elektromagnetik pada frekuensi yang sesuai sehingga energi molekul tersebut ditingkatkan kelevel yang lebih tinggi, maka akan terjadi peristiwa penyerapan (absorpsi) energi oleh molekul (Neldawati. 2013).

Kerja alat ini adalah sebagai berikut: suatu radiasi kikenakan secara bergantian atau simultan melalui sampel dan blanko yang dapat berupa pelarut atau udara. Sinar yang ditransmisikan oleh sampel dan blanko kemudian diteruskan ke detector, sehingga perbedaan intensitas ini diantara kedua berkas sinar ini dapat memberikan gambaran tentang fraksi radiasi yang diserap oleh sampel. Detector alat ini mampu untuk mengubah informasi radiasi ini menjadi sinyal elektris yang diaplkasikan akan dapat menggerakkan pena pencatat diatas grafik alat ini (Underwood, 2001).

Pada umumnya konfigurasi dasar dari spektrofotometer UV-Vis berupa susunan peralatan adalaah sebagai berikut:



Gambar 8. konfigurasi dasar dari Spektrofotometer UV-Vis

Pada spektrofotometer sinar tampak, pengamatan mata terhadap warna timbul dari penyerapan selektif panjang gelombang tertentu dari sinar masuk oleh objek yang berwarna (Vogel, 1979).

1. Sumber Radiasi

Sumber radiasi yang dipakai pada spektrofotometer adalah lampu deuterium, lampu tungstein, dan lampu merkuri. Sumber-sumber radiasi ultra lembayung yang kebanyakan dipakai adalah lampu hydrogen dan lampu deuterium. Disamping itu sebagai sumber radiasi ultra lembayung yang lain adalah lampu xenon. Kejelekannya lampu xenon tidak memberikan radiasi yang stabil seperti lampu deuterium. Lampu deuterium dapat dipakai pada panjang gelombang 180 nm sampai 370 nm (daerah ultra lembayung dekat) (underwood, 2001).

Lampu tungsein merupakan campuran dari filament tungsein gas iodine (halogen), oleh sebab itu sebagai lampu tungsein-iodin pada panjaang spektrofotometer sebagai ssumber radiasi pada daerah pengukuran sinar tampak dengan rentangan pada panjang gelombang 380-900 nm.

Lampu merkuri adalah suatu lampu yang mengandung uap merkuri tekanan rendah dan biasanya dipakai untuk mengecek, mengkalibrasi panjang gelombang pada spektrofotometer pada daerah ultra lembayung khususnya daerah disekitar panjang 366 nm dan sekaligus mengecek resolusi monokromator.

2. Monokromator

Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromator sumber yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada spektrofotometer biasanya terdiri dari susunan

a. Celah (slit)

Celah monokromator adalah bagian yang pertama dan terakhir dari suatu sistem optic monokromator pada spektrofotometer. Celah monokromator berperan penting dalam hal terbentuknya radiasi monokromator dan resolusi panjang gelombang.

b. Filter optik

Cahaya tampak yang merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 380-780 nm merupakan cahaya putih yang merupakan campuran cahaya dengan berbagai macam panjang gelombang. Filter optik berfungsi untuk menyerap warna komplometer sehingga cahaya tampak yang diteruskan merupakan cahaya yang berwarna sesuai dengan warna filter optik yang dipakai.

Filter optik yang sederhana dan banyak dipakai terdiri dari kaca yang berwarna. Dengan adanya filter optic sebagai bagian monokromator akan dihasilkan pita cahaya yang sangat sempit sehingga kepekaan analisisnya lebih tinggi. Dan lebih dari itu akan didapatkan cahaya hamper monokromatis sehingga akan mengikuti hokum lamber-Beer pada nalisis kuantitatif.

3. Prisma dan kisi (grating)

Prisma dan kisi merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma dan kisi pada prinsipnya mendispersi radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan revolusi yang baik dari radiasi polikromatis.

4. Sel/kuvet

Kuvet atau sel merupakan wadah sampel yang dianalisis. Kuvet ini bentuk biasanya terbuat dari quarts atau leburan silika dan ada dari gelas dengan bentuk tabung empat persegi panjang 1 x 1 cm, dengan tinggi lebih 5 cm. pada pengukuran di daerah ultra lembayung dipakai quarts atau lembayung silika,

sedang kuvet dari gelas tidak dipakai, sebab gelas mengabsorbsi sinar ultra lembayung.

5. Detektor

Detektor mrupakan salah satu bagian dari spektrofotometer yang penting oleh sebab itu detector akan menemukan kualitas dari spektrofotometer adalah merubah signal elektronik.

6. Amplifer

Amplifer dibutuhkan pada saat sinyal listrik elektronik yang dilahirkan setelah melewati detektor untuk menguatkan karena penguat dengan resistensi masukan yang tinggi sehingga rangkaian detektor tidak terserap habis yang menyebabkan keluaran yang cukup besar untuk dpat dideteksi oleh suatu alat pengukur (Underwood, 2001).

Kesalahan-kesalaahan secara sistemik dalam penggunaan spektrofotometer seringkali terjadi, penyebab tarjadinya kesalahan tersebut adalah (Tahir, 2008):

1. Serapan oleh larutan. Kesalahan seperti ini dapat diatasi dengan penggunaan blangko. Blangko adalaah larutan yang berisi matrik selain komponen analisis.

2. Serapan oleh kuvet. Bahan yang biasanya digunakan dalam pembuatan kuvet adalah kuarsa (silika) dan gelas. Kuvet dari baahan kuarsa memberikan kualitas yang lebih baik dibandingkan dari baahan gelas. Kesalahan ini dapat diatasi dengan penggunaan jenis, ukuran dan bahan kuvet yang sama untuk blangko dan sampel.

3. Kesalahan fotometrik normal pada pengukuran absorbansi yang sangat rendah atau sangat tinggi. Hal tersebut dapat diatasi dengan pengaturan konsentrasi, sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan.

Kesalahan dalam penggunaan spektrofotometer UV-Vis dapat diatasi dengan dilakukannya proses kalibrasi. Kalibrasi dilaakukan dengan menggunakan blangko yaitu setting nilai absorbansi = 0 dan nilai transmitasi =100%.

Kadar flavonoid dalam sampel herbal dapat ditentukan dengan berbagai metode. Metode yang diakui oleh Departemen Agama RI adalah spektrofotometri UV yang berdasar pada prinsip kolorimetri. Absorbansi dari warna yang terbentuk diukur dengan spektrometer UV. Kadar kuarsetin dihitung sebagai kadar flavonoid total dalam sampel. Perhitungan ini berdasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menunjukkan hubungan lurus antara absorbans dan kadar analat (Neldawati, 2013).

F. Tinjauan Islam

Kesehatan adalah faktor penting bagi kehidupan manusia. Kalau kita sehat, maka kita bisa berbuat kebaikan dengan memberikan manfaat kepada sesama. Tindakan medis barat hanyalah salah satu usaha manusia untuk meraih kesehatan. Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli dibidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Dan Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan (Shihab, 2009).

Islam telah menetapkan bahwa Allah menumbuhkan segala macam tanaman untuk dimanfaatkan manusia. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Asy-Syu'araa/26: 7

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَمۡ أَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجٖ كَرِيمٍ ٧

Terjemahannya:

> *Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya tumbuhan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik* (Kementerian Agama, 2013).

Allah swt. menyuruh manusia supaya memperhatikan keberagaman dan keindahan disertai seruan agar merenungkan ciptaan-Nya yang amat menekjubkan. Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini tidaklah sia-sia dari yang kecil hingga yang besar. Makhluk hidup (hewan, tumbuhan, dan lain-lain) semuanya dapat dimanfaatkan oleh manusia jika manusia itu berfikir. Allah menjaga semua yang telah Ia ciptakan agar tetap hidup.

Demikian pula firmal Allah dalam Q.S.Al-Nahl/16: 10-11

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَـٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahannya:

Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu , sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman; Zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh yang pada demikian itu benar-benar ada tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berfikir (Kementerian Agama, 2013).

Ayat di atas adalah perincian argumentasi keEsaan Allah SWT. Ayat ini menguraikan tentang tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan pangan dan kebutuhan manusia dan binatang. Tanaman dapat tumbuh hanya karena ditumbuhkan oleh Allah SWT.

Ayat di atas mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka mensyukuri nikmat Allah dan memanfaatkannya dengan baik anugerah-Nya bahwa Dia yang Maha Kuasa itu *lah, yang telah menurunkan dari arah langit,* yakni awan, air hujan untuk kamu manfaatkan. *Sebagiannya menjadi minuman dan sebagian yang lainnya* menyuburkan tumbuh-tumbuhan *yang padanya,* yakni di tempat tumbuhnya, *kamu mengembalakan ternak* kamu sehingga binatang itu

dapat dimakan dan pada gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging, dan bulu (Shihab, 2009).

Demikian pula firmal Allah dalam Q.S.Al-Baqarah/2: 61.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ
أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ
لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ
ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ
ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

Terjemahannya:

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk Kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi Kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.(Kementerian Agama, 2013).

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah swt menciptakan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Salah satu tanaman daun sembukan (*Paederia foetida L.*) dapat digunakan sebagai bahan penelitian dapat diketahui manfaat dari tumbuhan sebagai bahan pengobatan.

BAB III

METODE KERJA

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan cara eksperimen laboratorium.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni - Oktober 2019, Lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium Fitokimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan proses pengolahan sampel daun sembukan (*Paederia foetida L.*) hingga didapatkan ekstrak daun sembukan. Kemudian peneliti menggunakan Laboratorium Kimia untuk melaksanakan uji kadar flavonoid total dengan menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan eksperimen laboratorium.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Daun sembukan (*Paederia foetida*) yang berada di daerah samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi-Selatan.

2. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah daun sembukan (*Paederia foetida)* sebanyak 700 g.

D. Instrumen Penelitian

1. Alat yang digunakan

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu batang pengaduk, cawan porselin, corong, gelas arloji, gelas Erlenmeyer, gelas ukur, kuvet, mikropipet, labu tentukur, pipet tetes, rotavapor, sendok besi, spektrofotometer UV-Vis, timbangan analitik, toples, dan vial.

2. Bahan yang digunakan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu aquadest, $AlCl_3$, daun sembukan, etanol 96%, ethyl asetat, kuarsetin, kalium asetat, n-Heksan .

E. Metode Pengumpulan Data

1. Tehnik pengolahan

a. Pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari jam 09.00 WITA, dan sampel yang diambil adalah daun sembukan yang diperoleh di Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

b. Pengolahan sampel

Sampel daun sembukan (*Paederia foetida*) yang telah diambil 700 g, dibersihkan dari kotoran yang menempel pada sampel, lalu dicuci dengan air mengalir, kemudian dipotong-potong kecil, lalu diangin-anginkan, ditempatkan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah kering, sampel siap untuk diekstraksikan.

c. Ekstraksi sampel

Simplisia daun sembukan ditimbang sebanyak 700 g, dimasukkan ke dalam toples, lalu ditambahkan etanol 96% hingga simplisia terendam seluruhnya. selanjutnya ditutup toples dengan menggunakan alumunium foil dan kemudian ditutup rapat dengan penutupnya. Dibiarkan selama 3 X 24 jam sehingga semua simplisia terekstraksi semua, sambil sesekali diaduk, kemudian disaring dan

dipisahkan ampas dan filtratnya. Selanjutnya ampas dimaserasi kembali dengan menggunakan cairan penyari etanol 96%, kemudian diuapkan di rotavapor pada suhu 60°C hingga diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya ditimbang ekstrak untuk mengetahui % rendamannya.

2. Partisi Dengan Metode Cair-Cair

Sebanyak 30 gram ekstrak etanol daun sembukan, kemudian dilarutkan dengan aquadest scukupnya hingga jernih, kemudian diambil bagian yang larut air dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambahkan n-Heksan, lalu dikocok dan didiamkan ditunggu sampai 15 menit hingga terbentuk dua lapisan dan bagian yang larut hexan diuapkan, dilakukan terus menerus hingga jernih kemudian dilakukan partisi dengan menggunakan pelarut yang berbeda (etil asetat) hingga jernih.

3. Uji Pendahuluan

Identifikasi senyawa Flavonoid

Hasil partisi ditambahkan beberapa tetes HCl Pekat dan 1,5 gram logam magnesium. Adanya flavonoid, diidentifikasi terbentuknya warna merah bata selama 3 menit.

4. Penetapan Kadar Flavanoid

a. Pembuatan larutan standar kuarsetin

Ditimbang sebanyak 25 mg baku standar kuersetin dan dilarutkan dalam 25 ml etanol p.a. sehingga diperoleh konsentrasi 1000 ppm, larutan stok dipipet sebanyak 1 ml dan dicukupkan volumenya sampai 10 ml dengan etanol sehingga diperoleh konsentrasi 100 ppm. Dari larutan standar kuersetin 100 ppm, kemudian dibuat beberapa konsentrasi yaitu 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, dan 12 ppm. Dari masing-masing konsentrasi larutan standar kuersetin dipipet 1 ml. kemudian ditambahkan $AlCl_3$ 1% 0,2 ml dan kalium asetat 1 M. Sampel

diinkubasi selama satu jam pada suhu kamar, dihitung pada panjang gelombang 440 nm.

a. penetapan kadar flavonoid total Hasil Partisi larut air daun sembukan (*Paederia Foetida L.)*

Ditimbang 25 mg hasil partisi larut air, dilarutkan dalam 25 ml etanol p.a,. Dari larutan tersebut dipipet 1 ml kemudian dicukupkan volumenya hingga 10 ml, ditambahkan $AlCl_3$ 1% 0,2 ml dan kalium asetat 1 M, dan ditambahkan 5,6 ml aquadest. sampel diinkubasi selama satu jam pada suhu kamar, dihitung pada panjang gelombang 440 nm.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh merupakan data primer yang didapatkan dari absorbansi larutan pembanding kuersetin, dibuat kurva kalibrasi persamaan regresi linear. Kadar total dari senyawa dihitung dengan dimasukkan kedalam persamaan regresi linear y = ax + b, yang diperoleh dari kurva kalibrasi pembanding dan hasil dinyatakan dalam satuan mg dalam gram

6. Pengoperasian Spektrofotometer UV-Vis

Hubungkan Spektrofotometer kesumber arus, kemudian nyalakan spektrofotometer dengan menekan tombol ON pada main spektrofotometer, kemudian tampilan program akan muncul dan memberitahukan bahwa proses inisiasi sedang berlangsung, tunggu hingga proses selesai ditandai dengan munculnya warna hijau dan tertulis status ready. Selanjutnya biarkan selama 15 menit untuk pemanasan, setelah itu spektrofotometer siap digunakan, lalu atur panjang gelombangnya. Selanjutnya spektrofotometer siap digunakan untuk pengukuran serapan sample pada panjang gelombang tertentu. Kuvet dimasukkan setelah dilap dengan kertas tissue, sisi kuvet yang terang menghadap lubang cahaya dari spektrofotometer. Setelah selesai bekerja, kuvet dikeluarkan dan

dibersihkan dari pelarutnya kemudian dikeringkan, spektrofotometer dimatikan dengan mengklik tombol OFF pada main unit spektrofotometer. Kemudian atur panjang gelombang 440 nm.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Ekstraksi Sampel

Ekstrak etanol daun sembukan = 30 gram

% rendamen = $\frac{30\ \text{gram}}{700\ \text{gram}}$ X 100% = 4,28 %

2. Hasil Partisi

Tabel 1. Hasil partisi ekstrak etanol daun sembukan (*Paederia Foetida L.)*

Sampel	Hasil Partisi	Berat Hasil Pertisi (g)
Ekstrak etanol daun sembukan 30 gram	N-Heksan	17 gram
	Etil Asetat	4 gram
	Larut air	9 gram

3. Hasil Uji Kualitatif

Tabel 2. Hasil uji golongan senyawa Flavonoid hasil partisi larut air

Uji Golongan	Pereaksi	Warna	Kesimpulan
Flavonoid	HCl pekat + logam magnesium	Merah bata	+

4. Hasil Uji Kuantitatif

Tabel 3. Nilai absorbansi kuarsetin sebagai pembanding pada panjang gelombang 440 nm.

Konsentrasi	Absorbansi
4	0.209
6	0.210
8	0.432
10	0.464
12	0.617

Tabel 4. Kandungan Flavonoid Total Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.)*

Berat bahan (g)	absorbansi	Absorbansi rata-rata	Kadar Flavonoid Total (%)
0,025	0,002 0,008 0,009	0,013	0,727%

B. Pembahasan

Pada penelitian ini yang terlebih dahulu dilakukan adalah penyiapan sampel berupa daun sembukan (*Paederia Foetida L.).* Sampel kemudian dibersihkan dari kotoran dan dicuci dengan air mengalir, kemudian dikeringkan tanpa terkena sinar matahari langsung. Setelah itu diserbukkan, kemudian dilakukan beberapa prosedur pengerjaan untuk memperoleh partisi-partisi ekstrak etanol daun sembukan (*Paederia Foetida L.).*

Pada penelitian ini daun sembukan (*Paederia Foetida L.*) yang digunakan diperoleh di Samata Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Kotoran ataupun serangga yang menempel pada daun sembukan (*Paederia Foetida L.)* harus dibersihkan karena dapat mengganggu proses dan hasil ekstraksi. Daun sembukan (*Paederia Foetida L.*) dilakukan dengan mengubah bentuk dengan cara dipotong-potong kecil untuk mempercepat proses pengeringan. Proses pengeringan ini dilakukan karena untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada sampel, sehingga dapat mencegah pembusukan oleh bakteri.

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode maserasi. Pemilihan metode ini didasarkan pada kesederhanaan metode yang digunakan dan kemudahan alat untuk didapatkan. Selain itu, maserasi tidak menggunakan pemanasan sehingga rusaknya senyawa-senyawa yang tidak tahan panas dapat dihindari. Pelarut yang digunakan adalah pelarut etanol 96%. Jika dibandingkan dengan pelarut air lebih unggul karea tidak mudah ditumbuhi kapang dan bakteri (Maro, et all. 2015). Setelah didapatkan ekstrak cair dari

sampel maka ekstrak kemudian dipekatkan menggunakaan *rotary evapavor* dengan suhu 60°C. pemekatan dilakukan bertujuan untuk menguapkan pelarut yang ada pada ekstrak cair sehingga hasil yang didapatkan adalah ekstrak kental dari sembukan.

Ekstrak etanol dari daun sembukan (*Paederia Foetida L.*) yang telah diperoleh kemudian dipartisi. Partisi dilakukan karena didalam ekstrak masih terdiri dari senyawa polar, semi polar dan non polar sehingga untuk mendapatkan ekstrak dengan perbedaan kepolaran yang berbeda dilakukan partisi cair-cair karena metodenya lebih efektif dalam pemisahan suatu senyawa. Pada tahap partisi diperoleh tiga hasil partisi yaitu partisi larut n-Hexan, etil asetat dan metanol. Pemisahan ekstrak ini didasarkan atas perbedaan konstanta dielektrik. Semakin besar konstanta dielektrik suatu senyawa maka kepolarannya akan semakin tinggi. Pelarut polar akan menarik senyawa polar, semi polar, dan non polar. Pelarut semi polar akan menarik senyawa semi polar hingga non polar. Sedangkan senyawa non polar akan menarik senyawa polar (Fidiayani, et al., 2015).

Uji Pendahuluan pada partisi larut air dilakukan untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak hasil partisi daun sembukan (*Paederia Foetida L.).* Golongan senyawa yang akan diidentifikasi yaitu golongan flavonoid yang dilakukan penambahan HCl pekat dan logam magnesium.

Penambahan logam magnesium dan HCl pada identifikasi senyawa flavonoid bertujuan untuk mereduksi inti benzopiron yang terdapat dalam struktur flavonoid sehingga terjadi perubahan warna jingga atau merah. Penambahan HCl mengakibatkan terjadinya reaksi oksidasi reduksi antara logam magnesium sebagai pereduksi dengan senyawa flavonoid.

Analisis kuantitatif senyawa flavonoid total dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kadar flavonoid yang terkandung pada hasil partisi larut air daun sembukan (*Paederia Foetida L.*). Analisis flavonoid dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis karena flavonoid mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi sehingga menunjukkan pita serapan kuat pada daerah spektrum sinar ultraviolet dan spektrum sinar tampak (Harboe, J.B., 1987).

Penetapan kadar total digunakan alat spektrofotometer UV-Vis dengan menggunakan larutan standar sebagai pembanding, kemudian dibuat kurva standar dengan menghubungkan larutan standar dengan absorbansinya, penetapan kadar total dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi linear.

Pada penelitian ini untuk menentukan kadar flavonoid total pada sampel digunakan kuarsetin sebagai larutan standar dengan deret konsentrasi 4, 6, 8, 110, 12 ppm. Digunakan deret konsentrasi karena metode yang dipakai dalam menentukan kadar adalah metode yang menggunakan persamaan kurva baku, untuk membuat kurva baku terlebih dahulu dibuat beberapa deret konsentrasi untuk mendapatkan persamaan linear yang dapat digunakan untuk menghitung persen kadar.

Dari pengukuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi yang digunakan maka semakin tinggi pula absorben yang diperoleh. Hasil baku kuarsetin yang diperoleh antara kadar dan absorbannya, sehingga diperoleh persamaan regresi linear yaitu $y = 0{,}053x + 0{,}041$ dengan nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0,924. Persamaan kurva kalibrasi kuarsetin digunakan sebagai pembanding untuk menentukan konsentrasi senyawa flavonoid total pada hasil partisi larut air.

Pengujian analisis kuantitatif dengan spektrofotometri UV-Vis digunakan larutan blanko sebagai control yang berfungsi sebagai pemblank (mengkali nol-kan) senyawa yang tidak perlu dianalisis (Basset, 1994).

Pada pengukuran senyawa flavonoid total, larutan sampel ditambahkan $AlCl_3$ yang dapat membentuk kompleks, sehingga terjadi persgeseran panjang gelombang kearah *visible* (tampak) yang ditandai dengan larutan menghasilkan warna lebih kuning. Dan penambahan kalium asetat yang bertujuan untuk mempertahankan panjang gelombang pada daerah visible (tampak) (Chang et al, 2002). Perlakuan inkubasi selama 1 jam sebelum pengukuran dimaksudkan agar reaksi berjalan sempurna, sehingga intensitas warna yang dihasilkan lebih maksimal. Sehingga dari hasil penelitian ini diperoleh kadar flavonoid total hasil partisi larut air daun sembukan (Paederia Foetida L.) sebesar 0,727%.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa:

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kadar flavonoid total hasil partisi larut air sebesar 0,727%.

B. Saran

Diharapkan agar peneliti selanjutnya bisa melakukan sampai isolat dan juga hingga sampai formulasi senyawa anti oksidan dari daun sembukan (*Paederia Foetida L.).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, DS. *Aktivitas Antioksidan Dan Komponen Bioaktif Bintang Laut Culcita Sp.* Bogor Agricultural University. 2012.

Aminah, Nurhayati Tomayahu, Zainal Abidin. *Penetapan Kadar Flavanoid Total Ekstrak Etanol Kulit Buah Alpukat (Persea Americana Mill) Dengan menggunakan Spektrofotometri UV-Vis*. Fakultas Farmasi. Universitas Muslim Indonesia.

Aziz, Ashari. *Kajian Terhadap Kenyamanan Ruang Teori Di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Ditinjau Dari Pencahayaan Alami Dan Pencahayaan Campuran,* Jurnal Teknik Sipil. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. 2013.

Basset J, dkk. *Buku Ajar Vogel Kimia Analisis Kuantitatif Anorganik.* Jakarta: EGC. 1994.

Behera, *et al. UV-Vis Spectrophotometric Method Development and Validation of Assay of Paracetamol Tablet Formulation.* J Anal Bional Techniques. 2012.

Depkes RI. *Inventaris tanaman obat Indonesia Jilid II. Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. Jakarta. 2001.

Dirjen POM. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tanaman Tumbuhan Obat.* Jakarta: Depkes RI. 2000.

Erni, dkk. *Pengaruh Pemberian Minyak Mandar Yang Ditambahkan Bubuk Daun Sukun (Artocapus Altilis) Terhadap Kadar Kolesterol Mencit (Mus Muculus).* Jurnal Bionature. 2014.

Fessenden, R.J., *Kimia Organik* Jilid 2. Terjemahan: Hadyana Pujaatmaka Aloyisius. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1986.

Guandjar, I.G, dan Abdul Rohman. *Analisis Obat Secara Spektrofotometri dan Kromatografi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

Gupta, Pranay Kumar, Siddarth Pulapalli, and Srikanth. *Research and Review: Journal of Medicinal Chemistry.* Tulsi: *An Elixir Human Life.* Volume 4 Issue. 2015.

Haeria. *Kimia Produk Alami*. Makassar: Alauddin University Press. 2014.

Hagerman, A.E., Riedl, K.M., Jones, G.A., Sovik, K.N., Rithard, N.T., Hartzfeld P.W. and Riechel, T.L., High Moleculer Weight Plant Polyphenolics (Tannis) as Biological Antioxidants. *Journal Of Agricurtural and food Chemistry.*1998.

Harborne, J.B. *Phytochemical Methods.* Terj. Dr. Kosasi Padmawinata dan Dr. Iwang Soediro, *Metode Fitokimia.* Bandung: ITB. 1987.

Heyne, K. *Tumbuhan Berguna Indonesia Jilid II.* Yayasan sarana Wana Jaya. Jakarta. 1927.

Indriyanti, C.P. *Identifikasi Komponen Minyak Atsiri pada Beberapa Tanaman Dari Indonesia yang Memiliki Bau Tidak Sedap*. Jakarta. Universitas Pendidikan Indonesia. 2013.

Khopkar , S. M. *Konsep Dasar Kimia Analitik.* Jakarta. UI Press. 2010.

Kustantinah. *Acuan Sediaan Herbal*. Jakarta. Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI. 2011.

Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum.* Inar Grafika. Jakarta. 1994.

Minanti Arna Ekawati, I Wayan Suirta, dan Sri Rahayu Santi. *Isolasi dan Identifikasi senyawa Flavanoid Pada Daun Sembukan (Paederia Foetida L.) Serta Uji Aktivitasnya Sebagai Antioksidan*. Bali. Universitas Udayana. 2017.

Mora, Enda dan Armon Fernando, *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia I. Optimasi Ekstraksi Triterpenoid Total Pegagang (Centella Asiatic (Linn) Urban) yang Tumbuh di Riau.* Pekanbaru: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. 2012.

Neldawati, Ratnawulan, Gusnedi. *Analisis Nilai absorbansi Dalam Penentuan Kadar Flavanoid Berbagai Jenis Daun Tanaman Obat.* Padang. Pillar Physics. 2013.

Nurcahyanti, A. D. R. dan J. Wandra. Sembukan : *Kurang Sedap Namun Berkhasiat Hebat*. BioS-Majalah Ilmiah Semipopuler. 2012.

Nurjannah, Laili Izzati, dan Azadatun Abdullah. *Aktivitas Antioksidan dan Komponen BioaktifKerang Pisau.* Bogor: Ilmu Kelautan. 2011.

Parwanto Djoko, Muhammad Agus Wibowo. *Uji Aktivitas Antioksidan dan sitotoksisitas Fraksi Daun Kentutan (Paedeia Foetida L.).* Program Studi Kimia Fakultas MIPA . Universitas Tanjungpura. 2015.

Paul, A., Barman, A.K., & Ray, S. "A Study on Antimicrobial Properties and Medicinal Value of *Adhatoda vasica, Centella asiatica, Paederia foetida, Nyctanthes arbor-tristis, Ocimum tenuiflorum.* International Journal of Current Microbiology and Applied Science. 2018.

Prasetyo Handrianto, Surahmaida. *Analisis Kandungan Kimia Daun dan Batang Sembukan (Paederia Foetida L.) Dengan menggunakan 2 pelarut Yang Berbeda*. Akademik Farmasi Surabaya. 2018.

Redha, Abdi. *FLavanoid: Struktur, Sifat Antioksidatif dan Peranannya dalam Sistem Biologis.* Jurnal Belian Vol. 9 No. 2. 2010).

Ridho, Ery Al, dkk. *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Buah Lakum dengan Metode DPPH (2,2 Difenil-1-Pikrilhidrazi).* Pontianak: Universitas Tanjungpura. 2013.

Sarker SD, Latif Z, & Gray AI, *Natural Products Isolation 2nd Edition.* New Jersey: Humana Press Inc. 2006.

Sastroamidjojo S. *Obat Asli Indonesia.* Jakarta: Penerbit Dian Rakyat. 2001.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati. 2009.

Silalahi, jansen. *Makanan Fungsional*. Yogyakarta. Kanisius. 2006

Sitorus, Marham. *Kimia Organik Umum.* Yogyakarta: Graha Ilmu: 2010.

Sudjadi. *Metode Pemisahan.* Fakultas Farmasi. Universitas Gadjah Mada. 1988.

Susilawati, "Isolasi dan Identifikasi Senyawa Karotenoid dari Cabai Merah (*Capsicum annuum* Linn)". Skripsi. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi UIN. 2008.

Sutir, Fitriadi. *Analisis Kandungan Senyawa Flavanoid Total Dalam Sediaan Cair Kasumba Turate (Curcuma Tinctorius Linn) Secara Spektrofotometri UV-Vis*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2012.

Tahir, Iqmal, dkk. *Kajian Penggunaan Limbah Buah Nenas Lokal (Ananas Comocus Linn) Sebagai Bahan Baku Pembuatan Nata.* Yogyakarta Universitas Gadjah Mada. 2008.

Underwood dan day. *Analisis Kimia Kuantitatif.* Terjemahan Sopyan Lis. Dkk. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2001.

Vidak, Marko, Damjana Rozman and Radovan Komel. *Review Effect Of Flavonoids From Food and Dietary Supplements On Glial and Glioblastoma Multiforne Cells.* Moleculer 2015.

Vogel, *Buku Teks Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimikro Edisi V.* PT Kalman Media Pusaka. Jakarta. 1979.

Widyastuti, Niken. *Pengukuran Aktivitas Antioksidan dengan Metode Cuprac, DPPH, Frap Sria Korelasinya dengan Fenol dn Flavonoid Pada Enam Tanaman.* Tesis Bogor: IPB. 2010.

Winarti, Sri. *Makanan Fungsional*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2010.

Windono, T., S., Yudawati., U., Ermawati, E., Srielita, Erowati, T. *Uji Perendaman Radikal Bebas Terhadap 1,1-diphenyl-2Picrylhydrrazyl*

(DPPH) dari ekstrak Kulit Buah dan Biji Anggur (Vitis Vinifera L.). Probolinggo Biru dan Bali. Artocapus. 2001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1. Ekstraksi Sampel Daun Sembukan (*Paederia foetida L.)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 2. Partisi dengan menggunakan cair-cair



Lampiran 3. Penetapan Kadar Flavonoid

a. Pembuatan Larutan Standar Kuarsetin



b. Penetapan Kadar Flavanoid Total

Lampiran 4. Hasil Perhitungan

A. Persen Rendamen Ekstrak

% Rendamen ekstrak daun sembukan

% Rendamen $= \frac{\text{Bobot ekstrak (gram)}}{\text{Bobot Simplisia}}$ x 100%

$= \frac{30 \text{ gram}}{700 \text{ gram}}$ x 100%

= 4,28%

B. Pembuatan larutan standar

1. Larutan induk kuarsetin 100 ppm yang diencerkan menjadi 4 ppm sebanyak 10 ml.

   M_1 x V_1 = M_2 x V_2

   100 ppm x V_1 = 4 ppm x 10 ml

   $= \frac{40}{100}$

   = 0,4 ml

   Larutan induk 100 ppm diambil 0,5 ml dan diencerkan pada labu takar 10 ml sampai tanda batas.

2. Larutan induk kuarsetin 100 ppm yang diencerkan menjadi 6 ppm sebanyak 10 ml.

   M_1 x V_1 = M_2 x V_2

   100 ppm x V_1 = 6 ppm x 10 ml

   $= \frac{60}{100}$

   = 0,8 ml

   Larutan induk 100 ppm diambil 0,6 ml dan diencerkan pada labu takar 10 ml sampai tanda batas.

3. Larutan induk kuarsetin 100 ppm yang diencerkan menjadi 8 ppm sebanyak 10 ml.

   $M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$

   100 ppm x V_1 = 8 ppm x 10 ml

   $= \frac{80}{100}$

   = 0,8 ml

   Larutan induk 100 ppm diambil 0,8 ml dan diencerkan pada labu takar 10 ml sampai tanda batas.

4. Larutan induk kuarsetin 100 ppm yang diencerkan menjadi 10 ppm sebanyak 10 ml.

   $M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$

   100 ppm x V_1 =10 ppm x 10 ml

   $= \frac{100}{100}$

   = 1 ml

   Larutan induk 100 ppm diambil 1 ml dan diencerkan pada labu takar 10 ml sampai tanda batas.

5. Larutan induk kuarsetin 100 ppm yang diencerkan menjadi 12 ppm sebanyak 10 ml.

   $M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$

   100 ppm x V_1 = 12 ppm x 10 ml

   $= \frac{120}{100}$

   = 1,2 ml

   Larutan induk 100 ppm diambil 1,2 ml dan diencerkan pada labu takar 10 ml sampai tanda batas.

6. $AlCl_3$ dalam 10 ml

$$\frac{10\ g}{100\ ml} = \frac{X}{10\ ml}$$

x = 1 gram

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 5. Pengukuran Standard dan Kurva Kalibrasi

Tabel 5. Hasil pengukuran absorbansi flavonoid

Konsentrasi	Absorbansi
4	0.209
6	0.210
8	0.432
10	0.464
12	0.617

Didapatkan kurva kalibrasi sebagai berikut



Untuk mengukur konsentrasi kadar flavonoid dimasukkan kedalam rumus persamaan linier yang didapatkan dari kurva standar yaitu :

$$Y = 0{,}053x + 0{,}041$$

Berdasarkan hasil pengukuran sampel, didapatkan data konsentrasi kadar flavonoid sebagai berikut :

Replikasi 1

Y = 0,053x + 0,041

0,002 = 0,053x + 0,041

X $=\frac{0,002+0,041}{0,053}$ = 0.775585 ppm ~ mg/L

Kadar Flavonoid $= \frac{konsentrasi\left(\frac{mg}{L}\right) x\ Volume\ akhir}{Berat\ sampel\ (g)}$

$= \frac{0,775585\ x\ 0,041}{0,025}$

= 3.10234 mg/kg

Replikasi 2

Y = 0,053x + 0,041

0,008 = 0,053x + 0,041

X $=\frac{0,008+0,041}{0,053}$ = 0,781585 ppm ~ mg/L

Kadar Flavonoid $= \frac{konsentrasi\left(\frac{mg}{L}\right) x\ Volume\ akhir}{Berat\ sampel\ (g)}$

$= \frac{0,781585\ x\ 0,041}{0,025}$

= 3,12634 mg/kg

Replikasi 3

Y = 0,053x + 0,041

0,009 = 0,053x + 0,041

X $=\frac{0,009+0,041}{0,053}$ = 0,782585 ppm ~ mg/L

Kadar Flavonoid $= \frac{konsentrasi\left(\frac{mg}{L}\right) x\ Volume\ akhir}{Berat\ sampel\ (g)}$

$= \frac{0,782585\ x\ 0,041}{0,025}$

= 3,13034 mg/kg

Rata-rata kadar Flavonoid Total = $\frac{3.10234+\ 3,12634+3,13034}{3}$

Rata-rata kadar flavonoid totalyaitu = 7,272126 mg/kg

= 0.007272 g/g x 100

= 0.727213%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 6. Gambar Tanaman Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.)*

Gambar 9. Sampel Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 7. Berat sampel daun sembukan (*Paederia Foetida L.)*



Gambar 10. Berat Sampel

ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 8. Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.)*

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Gambar 11. Proses pembuatan ekstrak daun sembukan (*Paederia Foetida L.)*

Keterangan : (a) Proses maserasi, (b) Perendaman sampel, (c) penyaringan (d) pemekatan ekstrak dengan menggunakan *rotary evaporator*, (e) ekstrak ketal, (f) penimbangan mangkok kosong, (g) penimbangan ekstrak kental.

Lampiran 9. Gambar Pengerjaan Partisi Cair-Cair Ekstrak Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.*)

(a) (b) (c)

Gambar 12. Proses partisi cair-cair

Keterangan : (a) menggerus ekstrak dengan aquadest sampai homogen, (b) proses partisi siklus pertama, (c) partisi siklus akhir yang sudah jernih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 10. Penimbangan Hasil Partisi Ekstrak Daun Sembukan (Paederia Foetida L.)



(a)

(b)

(c)



(d)

(e)



(f)

Gambar 13. Hasil Partisi

Keterangan : (a) Penimbangan mangkok kosong, (b) Penimbangan hasil partisi larut n-Hexan, (c) Penimbangan mangkok kosong, (d) Penimbangan hasil partisi larut ethyl, (e) Penimbangan mangkok kosong, (f) Hasil partisi larut air.

ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 11. Gambar Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Flavonoid Hasil Partisi larut Air Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.)*

Gambar 14. Warna merah bata adanya senyawa golongan Flavonoid

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 12. Proses Penimbangan Bahan Pada Pengujian Flavonoid Daun Sembukan (*Paederia Foetida L.*)

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 15. Penimbangan Bahan

Keterangan : (a) Penimbangan sampel, (b) Penimbangan Kuersetin, (c) Penimbangan $AlCl_3$, (d) Penimbangan Kalium asetat.

Lampiran 13. Hasil Spektrofotometri UV-Vis



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)



(h)

Gambar 16. Hasil Spektrofotometri UV-Vis

Keterangan : (a) Hasil konsentrasi 4 ppm, (b) Hasil konsentrasi 6 ppm, (c) Hasil konsentrasi 8 ppm, (d) Hasil konsentrasi 10 ppm, (e) Hasil konsentrasi 12 ppm, (f) Absorbansi sampel 1, (g) Absorbansi sampel 2, (h) Absorbansi sampel 3.

RIWAYAT HIDUP

Nunung Dwi Lestari Maknur akrab disapa Nunung, Lahir di Bulukumba pada tanggal 1 September 1997. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Makking, S.Pd dan Nurjannah.

Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar SDN 103 Kalimporo pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 20 Bulukumba pada tahun 2012. Lalu menutup pendidikan sekolah menengahnya di SMK Mulia Asri Bulukumba pada tahun 2015.

Setelah menyelesaikan pendidikan wajibnya, penulis melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Penulis sekarang tengah menempuh pendidikan strata satu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR