

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA
DENGAN GIZI KURANG
(Literatur Review)**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**



OLEH:

**FATMAWATI
NIM:70400117011**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatmawati
Nim : 70400117011
TTL : Simpasai, 10 oktober 1997
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Desa Simpasai kec. Lambu kab. Bima
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Gizi Kurang (*literatur review*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 15 Juni 2021

Penulis

FATMAWATI
NIM: 70400117011

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Fatmawati
Nim : 70400117011
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi Dengan Gizi Kurang (*Literature Review*)

Karya Tulis Ilmiah (KTI) telah di periksa dan di setujui oleh pembimbing untuk di ajakan dalam Seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Semnata, 12 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Anieq Mumthiah, S.Kep.ners, S.S.T., M.Keb
NIP : 19890116 201903 2 009


Nurfaizah Alfa, S. ST., M.Keb
NIP :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Gizi Kurang (Literatur Review)**”. Yang disusun oleh **Fatmawati Nim: 70400117011**, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis, **12 Agustus 2021 M**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, **12 Agustus 2021**
3 Muharram 1443 H

Dewan Penguji

Ketua	: Dr. dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Eridayanti, S.SiT., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Anisa Mumtazah Al Kautsar, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: Nurfaizati Alza, S.ST., M.Keb	(.....)
Penguji I	: dr. Andi Tihardimanto K. S.Ked., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Muhammad Sabir Maidin, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas semua limpahan karunia, rahmat, hidayah dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang sederhana ini dengan judul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita dengan Gizi Kurang”** penulis menyadari dalam karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun bagi penulis diharapkan demi menyempurnakan hasil kerja Tugas akhir ini agar menjadi jauh lebih baik lagi.

Shalawat, salam, dan berkah semoga selalu dicurahkan kepada nabi-Nya, rasul-Nya, kekasih-Nya, dan cahaya-Nya, Muhammad saw, beserta seluruh keluarganya, keturunannya, sahabat-sahabatnya, juga kepada aulia Allah, syuhada, shiddiqin, orang-orang saleh, dan para pengikutnya, dari golongan mu'minin dan mu'minat, muslimin dan muslimat hingga akhir zaman.

Maka itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ibunda dan Bapak tercinta atas segala doa yang tak terhingga. Untuk Bapak Irham Adam yang selalu memberikan semangat dan tidak pernah mengeluh atas kebutuhan anaknda, dan untuk ibunda Ernida yang paling manis, Terimakasih atas segala doa-doamu dengan doamulah anaknda bisa pada titik ini. Kepada kaka ku Zainal Arifin Irham S.Pd, dan Usman Irham S.Pd yang telah memberikan dukungan, semangat dan nasihatnya yang

takterhinga dalam hidup penulis, Kepada Adik ku Muhammad Nuril Anwar, dan Imam Ma'arif Fatullah yang telah menghibur, mendukung dan memberikan semangat dalam hidup penulis, Kepada kaka ipar ku Dizka Indah Mutiara S.Pd dan Thohirah S.Kep.,Ns yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis, Kepada seluruh Keluarga Besar yang selalu memberikan masukan dan dukungannya untuk penulis. Terima kasih untuk selalu menjadi alasan penulis untuk tetap semangat dalam mencari Ilmu.

2. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Kepada Ibu Dr.dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes Sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Kepada Ibu Firdayanti, S.ST.,M.Keb selaku ketua jurusan Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Kepada Ibu Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST.,M..Keb selaku sekretaris prodi kebidanan sekaligus pembimbing 1 yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (*Literatur Review*).
6. Kepada Ibu Nurfaizah Alza, S.ST.,M.Keb selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (*Literatur Review*).

7. Kepada Bapak dr. Andi Tihardimanto Kamaruddin, S.Ked., M.Kes selaku penguji 1 yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (*Literatur Review*).
8. Kepada Bapak Dr. Muhammad Sabir Maidin, M.Ag selaku penguji Agama yang telah senantiasa memberikan saya tambahan Ilmu agama serta memberikan masukan dan saran yang bersifat islamiah pada Karya Tulis Ilmiah sehingga penulis dapat mengetahui hubungan kasus yang penulis angkat dan kaitannya dengan islam.
9. Segenap dosen terkhususnya para dosen Prodi Kebidanan dan para staf akademik Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing penulis selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmia ini berlangsung.
10. Kepada seluruh ~~saudari-saudari seperjuangan~~ku di bangku perkuliahan AVID17AS Kebidanan 2017 dan Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah.

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang penulis susun dalam tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berbagai pihak. Aamiin.

Makassar, Juni 2021

Penulis

FATMAWATI
NIM: 70400117011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	7
E. Metode Penulisan	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum Tentang Balita dan Status Gizi.....	10
B. Tinjauan khusus tentang Gizi Kurang	18
C. Proses Manajemen Kebidanan	36
BAB III TELUSURAN <i>EVIDANCE BASED LEARNING</i>	
A. Matriks Langkah I	40
B. Matriks Langkah II.....	50
C. Matriks Langkah III	60
D. Matriks Langkah IV	72
E. Matriks Langkah V	86
F. Matriks Langkah VI	98
G. Matriks Langkah VII	117

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pembahasan Hasil Telaah Evidence Based Asuhan 7 Langkah
Varney Berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi 128
- B. Implikasi Kebidanan 151

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 154
- B. Saran..... 155



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
LITERATUR REVIEW, JUNI 2021

Nama : Fatmawati
Nim : 70400117011
Pembimbing 1 : Anieq Mumthi'ah Al-Kautzar, S.ST, M.Keb
Pembimbing 2 : Nurfaizah Alza, S.ST, M.Keb
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Gizi Kurang (*Literatur Review*)

Gizi kurang didefinisikan kondisi seseorang yang kekurangan bahan-bahan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh dalam waktu yang cukup lama. Dimana cara menilai gizi kurang dapat dilakukan dengan pengukuran antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Gizi kurang sangat rentang terjadi terhadap anak di usia 1-5 tahun atau balita.

Karya tulis ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan literatur review dengan mengumpulkan berbagai referensi baik dari buku, jurnal nasional maupun jurnal internasional melalui pendekatan 7 langkah Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Dari hasil telaah berbagai sumber diagnosa gizi kurang ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang lengkap dengan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Masalah yang akan terjadi jika gizi kurang dibiarkan akan terjadi gizi buruk, stunting, marasmus, kwasiorkor, infeksi kronik dan kematian. Selain itu berdasarkan kondisi dan kebutuhan balita dimana dilakukan kolaborasi dengan dokter anak dan menjaga asupan gizi agar berat badan balita terjadi peningkatan.

Kesimpulan dari literatur review ini yaitu tergantung dari penyebab gizi kurang serta kondisi pasien, jika dilakukan pendekatan dan tatalaksana yang cepat, tepat dan sesuai maka dari hasil evaluasi didapatkan keadaan balita lebih baik tanpa adanya penyulit serta masalah atau komplikasi yang akan terjadi.

Kata Kunci : Asuhan Kebidanan pada Balita, Gizi Kurang, 7 langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UTN ALAUDDIN MAKASSAR
LITERATURE REVIEW, JUNE 2021

Name : Fatnawati
Reg. Number : 70400117011
Supervisor 1 : Anieq Mumthi'ah Al-Kautzar, S.ST, MKeb
Supervisor 2 : Nurfaizah Alza, S.ST, MKeb
Title : Midwifery Care Management on Malnutrition Infants (A Literature Review)

Malnutrition refers to deficiencies, excesses, or imbalances in a person's intake of energy or nutrients such as protein, carbohydrates, fats, vitamins that are needed by the body. Several ways could be taken in order to measure the nutrition of a person namely anthropometric, clinical, biochemical, and biophysical measurements. Malnutrition has been considered to be common in children aged 1-5 years.

This literature review research aims to carry out research and obtain material resources related to midwifery care management on malnutrition infants. References such as books as well as national and international journals were used as the main resources of the research. This study was conducted by utilising a 7-stage of Varney midwifery care management approach and SOAP documentation procedure.

Based on the various resources related to malnutrition, the findings of this research indicated that the malnutrition diagnosis could be measured by conducting a complete examination in the form of weight and height measurement. Several problems could further occur once infants experience the lack of nutrients. The problems include malnutrition, stunting, marasmus, kwashiorkor, chronic infections, and even death. Therefore, in responding to the case of malnutrition in infants, collaboration of parents with pediatricians is needed so that parents could maintain nutritional intake and increase the weight of their babies.

This evidence-based research concludes that providing additional food for infants is significant as treatments for malnutrition infants. If infants are treated with good and healthy parenting, there will be no complication and problems related to malnutrition that will occur. Therefore, it is also important for parents to be further educated related to health and proper parenting.

Key Words: Treatments on Infants, Malnutrition, a 7-stage of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat interaksi antara asupan energi dan protein serta zat-zat gizi esensial lainnya dengan keadaan kesehatan tubuh. Status gizi adalah kondisi tubuh sebagai akibat penyerapan zat-zat esensial. Status gizi adalah ekspresi dari keseimbangan zat gizi dengan kebutuhan tubuh, yang diwujudkan dalam bentuk variabel tertentu. Ketidakseimbangan (kelebihan atau kekurangan) antara zat gizi dengan kebutuhan tubuh akan menyebabkan kelainan patologi bagi tubuh manusia (Tutik, 2019).

Prevalensi penderita gizi kurang di dunia mencapai 104 juta anak yang gizi kurang dan keadaan gizi kurang menjadi penyebab sepertiga dari seluruh penyebab kematian anak di seluruh dunia. Asia selatan merupakan daerah yang memiliki prevalensi gizi kurang terbesar di dunia, yaitu sebesar 46%, di susul sub Sahara Afrika 28%, Amerika latin/Caribbean 7%, dan yang paling rendah terdapat di Eropa tengah, timur dan *commonwealth of independent states* (CEE/CIS) sebesar 5%. Keadaan gizi kurang pada anak balita juga dapat dijumpai di Negara berkembang, salah satunya termasuk di Negara Indonesia.

Prevalensi gizi kurang pada balita (BB/U < -2SD) di Indonesia, memberikan gambaran yang fluktuatif dari 18,4% di tahun 2007 menurun menjadi 17,9% di tahun 2010 kemudian meningkat lagi menjadi 19,6% sedangkan di tahun 2013 terdiri dari 5,7% gizi buruk dan 13,9% gizi kurang. Sedangkan data survei gizi Indonesia pada tahun 2016 menyebutkan persentase gizi kurang di

Indonesia yang rata-rata 11,1% mengidentifikasi hal itu, Indonesia termasuk Negara dengan kekurangan gizi (>5%). Sedangkan pada tahun 2017 kasus gizi kurang di Indonesia sebesar 18,1% (Ratufelan, 2018).

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 54% kematian balita pada tahun 2002 disebabkan oleh gizi buruk. Menurut data WHO pada tahun 2010 kematian bayi dan balita di dunia disebabkan oleh pneumonia 19%, diare 18%, malaria 8%, dan campak 4%, HIV/AIDS 3%, kondisi neonatal termasuk kelahiran prematur, asfiksia dan infeksi 37%. Dari kematian bayi dan balita tersebut lebih dari 50% menderita atau disebabkan gizi kurang, oleh karena itu dengan menurunkan kejadian gizi kurang berarti dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita secara signifikan (WHO dalam Depkes RI, 2011).

Berdasarkan hasil Riskeddas tahun 2007 dan 2010, bahwa prevalensi gizi buruk balita secara nasional adalah 5,4% (2007) dan 4,9% (2010). Hasil tersebut menunjukkan, bahwa prevalensi gizi buruk balita hanya mengalami penurunan 0,5% selang tahun 2007-2010. Untuk prevalensi gizi kurang tidak mengalami perubahan, yaitu 13,0% tahun 2007 dan tahun 2010 (Litbangkes kementerian Kesehatan RI, 2010). Untuk Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan laporan Riskeddas, bahwa prevalensi gizi buruk balita tahun 2007 sebesar 5,1% dan mengalami peningkatan tahun 2010 sebesar 6,4%. Untuk prevalensi gizi kurang juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 12,5% tahun 2007 dan 18,6% tahun 2010 (Dinas Kesehatan Prop. Sulawesi Selatan, 2010).

Kekurangan gizi pada anak dapat menimbulkan beberapa efek negatif seperti lambatnya pertumbuhan badan, rawan terhadap penyakit, menurunnya

tingkat kecerdasan, dan terganggunya mental anak. Kekurangan gizi yang serius dapat menyebabkan kematian anak. Berbagai penelitian membuktikan lebih dari separuh kematian bayi dan balita disebabkan oleh keadaan gizi yang jelek. Resiko meninggal dari anak yang bergizi buruk 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal. WHO memperkirakan bahwa 54% penyebab kematian bayi dan balita disebabkan oleh keadaan gizi anak yang jelek.

Keadaan demikian disebut *malnutrition* (gizi salah atau kelaianan gizi). Secara umum, bentuk kelainan gizi digolongkan menjadi 2 yaitu *overnutrition* (kelebihan gizi) dan *under nutrition* (kekurangan gizi). *Overnutrition* adalah suatu keadaan tubuh akibat mengonsumsi zat-zat gizi tertentu melebihi kebutuhan tubuh dalam waktu yang relatif lama. *Undernutrition* adalah keadaan tubuh yang disebabkan oleh asupan zat gizi sehari-hari yang kurang sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh (Tutik, 2019).

Stunting (kependekan) pada balita merupakan salah satu bentuk kurang gizi. UNICEF membuat peta zona kekurangan gizi berdasarkan prevalensi gizi kurang, stunting dan wasting terdiri dari zona biru dengan prevalensi <16%, zona hijau dengan rentang prevalensi 16-30%, zona merah muda dengan rentang prevalensi 31-45% dan zona merah hati untuk prevalensi >45%. Zona kurang gizi dapat dilihat pada beberapa negara Asia terutama South Asia Regions dengan prevalensi stunting tertinggi (>45%) yaitu tahun 1980 sebesar 49% dan tahun 2000 sebesar 52%, diikuti dengan African Regions dan South East Asia Regions dengan rentang prevalensi 31-45%. Sedangkan negara Eropa, Jepang, Australia,

AS dan Kanada merupakan negara yang prevalensi gizi kurangnya selalu rendah sejak tahun tersebut yaitu <5% (Gibney, M j; Arab, 2009).

Masalah gizi kurang pada anak balita masih menjadi masalah mendasar di dunia. Berdasarkan data WHO tahun 2013. Keadaan kurang gizi menjadi penyebab sepertiga dari seluruh penyebab kematian anak di seluruh dunia. Badan kesehatan dunia (WHO) memperkirakan bahwa 54% kematian anak di sebabkan oleh keadaan gizi yang kurang.

Indikator status gizi ini berdasarkan indeks BB/U yang memberikan informasi mengenai indikasi masalah tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut kerena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Indikator BB/U yang rendah dapat disebabkan karena pendek (masalah gizi kronik) atau sedang menderita diare atau penyakit infeksi lain (masalah gizi akut). Masalah kesehatan masyarakat dianggap serius bila prevalensi gizi buruk-kurang antara 20,0-29,0 persen dan dianggap prevalensi sangat tinggi bila > 30 persen (WHO, 2010).

Secara Nasional prevalensi berat-kurang berdasarkan hasil riset kesehatan daerah (Riskesdas) tahun 2013 adalah 19,6 persen, terdiri dari 5,7 persen gizi buruk dan 13,9 persen gizi kurang. Jika di bandingkan dengan angka prevalensi nasional tahun 2007 (18,4 %) dan tahun 2010 (17,9 %) terlihat meningkat. Untuk provinsi Sulawesi selatan dan Gizi Buruk+Gizi Kurang (*Undrweinght*) Berdasarkan hasil Riskesdas adalah 17,6% (2007) meningkat menjadi 25% (2010) dan kembali mengalami peningkatan menjadi >25% (2013). Di tahun 2015, berdasarkan hasil PSG di kabupaten/kota se-sulawesi selatan prevalensi balita gizi

kurang sebesar 17,1%. Meskipun capaian kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan (18,4%) namun angka ini sudah menurun secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun masih perlu di tingkatkan upaya-upaya yang lebih optimal dengan meningkatkan status gizi masyarakat khususnya pada kelompok balita.

Data yang terdapat di Puskesmas Jongaya menunjukkan sebanyak 221 balita yang mengalami gizi kurang pada tahun 2018, sementara pada tahun 2019 terdapat 124 balita dengan gizi kurang. Pada pendataan tersebut terdapat perubahan jumlah penderita setiap tahunnya dan semuanya mengalami gizi kurang (Rekam Medik 2019, Puskesmas Jongaya).

Berdasarkan pendahuluan data di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus balita dengan gizi kurang, sehingga penulis menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Gizi Kurang (*Literatur Review*)”.

B. Rumusan Masalah

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini meliputi Manajemen Asuhan Kebidanan pada balita dengan gizi kurang.

1. Apa saja tanda gejala pada balita dengan gizi kurang?
2. Apa saja data pendukung anamnesa balita dengan gizi kurang?
3. Apa saja komplikasi yang dapat timbul pada balita dengan gizi kurang?
4. Bagaimana tindakan segera yang dapat dilakukan bidan serta tindakan kolaborasi yang dilakukan dengan tenaga kesehatan yang lain?
5. Apa saja perencanaan yang dapat dilakukan pada balita gizi kurang?

6. Apa saja implementasi tindakan pada balita dengan gizi kurang?
7. Apa saja evaluasi yang dilakukan pada balita dengan gizi kurang?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum

Mampu menyusun literatur review pada balita dengan manajemen asuhan kebidanan pada balita dengan gizi kurang melalui pendekatan 7 langkah Varney.

2. Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus penulisan literatur review asuhan kebidanan pada balita dengan gizi kurang adalah:

- a. Didapatkannya data subjektif dan data objektif dari tanda dan gejala dari berbagai referensi tentang balita yang mengalami gizi kurang.
- b. Didapatkannya hasil rumusan diagnosis dari berbagai referensi tentang balita yang mengalami gizi kurang.
- c. Didapatkannya informasi komplikasi yang bisa timbul dari berbagai referensi tentang balita yang mengalami gizi kurang.
- d. Didapatkannya informasi dari berbagai referensi tentang kondisi emergency yang dapat terjadi serta penanganannya pada balita yang mengalami gizi kurang.
- e. Didapatkannya simpulan dari berbagai referensi tentang intervensi apa saja penatalaksanaan yang tepat pada balita mengalami gizi kurang.
- f. Didapatkannya penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke implementasi asuhan pada balita mengalami gizi kurang.

- g. Didapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi yang menjadi dasar evaluasi pada balita dengan gizi kurang.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian pada kasus ini yaitu:

1. Manfaat praktis

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir program Diploma kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat ilmiah

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumber informasi, menambah pengetahuan serta sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

3. Manfaat bagi institusi

Diharapkan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi institusi pendidikan dalam penyusunan literatur review selanjutnya.

4. Manfaat bagi penulis

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis dalam penerapan asuhan kebidanan balita gizi kurang tahun 2020. Penulisan ini juga merupakan pengalaman yang berharga karena dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Gizi Kurang.

5. Manfaat bagi pembaca

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Gizi Kurang.

E. Metode penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, metode yang di gunakan adalah Penulis mempelajari buku-buku, literatur, jurnal dan media internet yang berhubungan dengan balita gizi kurang.

F. Sistematika penulisan

HALAMAN JUDUL
 HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI
 HALAMAN PERSETUJUAN KATYA TULIS ILMIAH
 HALAMAN PENGESAHAN
 KATA PENGANTAR
 DAFTAR ISI
 DAFTAR TABEL
 DAFTAR GAMBAR
 DAFTAR SINGKATAN
 DAFTAR ISTILAH
 DAFTAR LAMPIRAN
 ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penulisan
- E. Metode Penulisan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang balita dan status gizi
- B. Tinjauan Khusus Tentang gizi kurang
- C. Proses Manajemen Kebidanan

BAB III TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING

- A. Matriks Langkah I
- B. Matriks Langkah II
- C. Matriks Langkah III
- D. Matriks Langkah IV
- E. Matriks Langkah V
- F. Matriks Langkah VI
- G. Matriks Langkah VII

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pembahasan Hasil Telaah Evidance Based Asuhan 7 langkah Varney Berdasarkan Hasil penelusuran Referensi.
- B. Implikasi Kebidanan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum Tentang Balita dan Status gizi*

Anak merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) yang memerlukan perhatian khusus untuk kecukupan status gizinya sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Apa yang dimakan oleh bayi sejak usia dini merupakan fondasi yang penting bagi kesehatan dan kesejahteraan di masa depan. Balita akan sehat apabila sejak awal kehidupannya sudah diberi makanan sehat dan seimbang sehingga kualitas SDM yang dihasilkan optimal (Winarsih, 2018).

Kekurangan gizi pada masa balita dapat berpengaruh pada perkembangan otak balita sehingga jika tidak ditangani akan mempengaruhi perkembangan mental yang akan mempengaruhi kemampuan berfikir, kemampuan bersosialisasi, kemampuan motorik dan dapat menyebabkan penyimpangan perkembangan pada balita. Perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan status gizi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan balita (Nurhayati & Hidayat, 2019).

Balita merupakan individu yang berumur 0-5 tahun, dengan tingkat plastisitas otak yang masih sangat tinggi sehingga akan lebih terbuka untuk proses pembelajaran dan pengayaan. Sedangkan menurut profil kesehatan (2013), balita merupakan anak yang usianya berumur antara satu hingga lima tahun. Anak balita sebagai masa emas atau *golden age* yaitu insan manusia yang berusia 0-5 tahun (UU No.20 Tahun 2003), meskipun sebagian pakar menyebut anak balita adalah anak dalam rentang usia di mulai dari 2-5 tahun.

Kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, artinya memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan motorik kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Antara lain otak mengalami pengaruh sehingga tidak dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan potensi genetiknya.

Secara psikologis, rentang usia balita dibagi dalam 3 tahapan yaitu masa sebelum lahir, masa bayi dan masa awal kanak-kanak. Pada ketiga tahapan tersebut banyak terjadi perubahan yang mencolok, baik fisik maupun psikologis, karena tekanan budaya dan harapan untuk menguasai tugas-tugas perkembangan tertentu, yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pembagian menurut tahapan tersebut sangat tergantung pada faktor sosial, yaitu tuntutan dan harapan untuk menguasai proses perkembangan yang harus dilampaui anak dari lingkungannya.

Setiap harinya, anak membutuhkan gizi seimbang yang terdiri dari asupan karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Asupan makanan tersebut dapat di peroleh dari makanan yang dikonsumsi yang berguna untuk pertumbuhan otak (intelegensia) dan pertumbuhan fisik.

a. Adapun kebutuhan zat gizi yang diperlukan bayi dan balita, yaitu:

1) Protein

Terdiri dari dua jenis protein, yaitu protein hewani, yang di dapat dari daging hewan (telur, susu, daging) dan protein nabati, yang di dapat dari tumbuh-tumbuhan (tempe, tahu).

2) Karbohidrat

Merupakan sumber tenaga bagi anak dan bayi yang baru dapat asupan makanan dari ASI. Pada anak yang sudah mendapatkan makanan tambahan pendamping ASI, karbohidrat dapat di peroleh dari makanan yang mengandung tepung seperti bubur susu, sereal, roti, nasi tim, atau nasi.

3) Lemak

Fungsi utama lemak adalah untuk memberi energi. Setiap gram lemak jika dioksidasi menghasilkan sekitar 9 kalori. Lemak bertindak sebagai *barier* dari vitamin A, D, E dan K yang larut dalam air memberi rasa pada makanan yang menyenangkan serta memberi perasaan kenyang karena kecepatan pengosongan dari lambung yang dikaitkan dengan kandungan lemaknya.

4) Vitamin

Merupakan sejumlah zat yang terdapat makanan, yang berfungsi untuk mempertahankan fungsi tubuh. Kekurangan vitamin akan menyebabkan tubuh merasa lelah, kurang nafsu makan, kerusakan

pembuluh darah, dan sel saraf serta dapat mengurangi ketajaman penglihatan.

5) Mineral

Mineral memiliki fungsi untuk mengaktifkan metabolisme tubuh.

Beberapa kandungan mineral, antara lain:

- a). Kalsium: susu, tempe, tahu, dan ikan teri.
- b). Fosfor: daging, unggas, ikan, telur dan beras.

b. Kebutuhan nutrisi bagi balita

kebutuhan nutrisi bagi balita merupakan prioritas utama dalam mencukupi kebutuhan gizinya setiap hari. Masa balita merupakan masa transisi di usia 1-2 tahun, dan untuk memenuhi nutrisi balita di mulai dengan makan makanan padat agar balita dapat menerima rasa serta tekstur makanan yang baru ia coba. Pada usia balita, dibutuhkan 1000-1400 kalori perhari, tetapi tergantung dari usia, besar tubuh, serta tingkat aktivitas si kecil. Jumlah rata-rata kebutuhan nutrisi balita yang dibutuhkan setiap harinya:

- 1) Biji padi-padian
- 2) Sayuran
- 3) Buah-buahan
- 4) Susu
- 5) Daging dan kacang-kacangan
- 6) Kalsium
- 7) Zat besi

Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi

Menurut (supariasa IDN & DKK, 2012) masalah gizi pada hakikatnya adalah kesehatan masyarakat, namun penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Penyebab timbulnya masalah gizi adalah multifaktor, oleh karena itu pendekatan penanggulangan harus melibatkan berbagai sektor yang terkait, berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi yaitu:

a. Status sosial

Sosial adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat sedangkan ekonomi adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran hidup. Rendahnya ekonomi keluarga, akan berdampak dengan rendahnya daya beli pada keluarga tersebut. Selain itu rendahnya kualitas dan kuantitas pangan, merupakan penyebab langsung dari kekurangan gizi anak balita. Balita dengan gizi buruk pada umumnya hidup dengan makanan yang kurang bergizi.

b. Pengetahuan

Kurangnya pendidikan dan pengertian yang salah tentang kebutuhan pangan dan nilai pangan adalah umum di jumpai setiap Negara di dunia. Kemiskinan dan kekurangan persediaan pangan yang bergizi merupakan faktor penting dalam masalah kurang gizi (Abu A, 2010).

Rendahnya pendidikan dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dalam keluarga, yang selanjutnya mempengaruhi kuantitas dan kualitas

konsumsi pangan yang merupakan penyebab langsung dari kekurangan gizi pada anak balita (Depkes RI, 2010).

c. Kelengkapan imunisasi

Imunisasi berasal dari kata imun yaitu resisten atau kebal. Imunisasi terhadap suatu penyakit hanya dapat memberi kekebalan terhadap penyakit tersebut sehingga bila balita kelak terpajan antigen yang sama, balita tersebut tidak akan sakit dan untuk menghindari penyakit lain diperlukan imunisasi lain (supartini, 2014). Macam-macam imunisasi antara lain:

- 1) BCG: vaksin untuk mencegah TBC yang di anjurkan di berikan saat berumur 2 bulan sampai 3 bulan dengan dosis 0,05 ml pada bayi kurang dari 1 tahun dan 0,1 ml pada anak disuntikkan secara intrakutan.
- 2) Hepatitis B: salah satu imunisasi yang diwajibkan dengan di berikan sebanyak 3 kali dengan interval 1 bulan antara suntikan pertama dan kedua kemudian 5 bulan antara suntikan kedua dan ketiga. Usia pemberian dianjurkan sekurang-kurangnya 12 jam setelah lahir.
- 3) Polio: imunisasi ini terdiri dari 2 macam yaitu vaksin oral polio dan *inactivated polio vaccine*. Kelebihan dari vaksin oral adalah mudah di berikan dan murah sehingga banyak di gunakan.
- 4) DPT: vaksin yang terdiri dari toksoid difteri dan tetanus yang dimurnikan serta bakteri pertusis yang diinaktivasi.

- 5) Campak: imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit campak pada anak karena termasuk penyakit menular. pemberian yang dianjurkan adalah sebanyak 2 kali yaitu pada usia 9 bulan dan pada usia 6 tahun.
- 6) MMR: di berikan untuk penyakit *measles*, *mumps*, dan *rubella* sebaliknya diberikan pada usia 4 bulan sampai 6 bulan atau 9 bulan sampai 11 bulan yang di lakukan pengulangan pada usia 15 bulan-18 bulan.
- 7) Typhus abdominal: terdapat 3 jenis vaksin yang terdapat di Indonesia yaitu kuman yang dimatikan, kuman yang di lemahkan, dan antigen capsular *vipolysaccharida*.
- 8) Varicella: pemberian vaksin di berikan suntikan tunggal pada usia di atas 12 tahun dan usia 13 tahun di berikan 2 kali suntikan dengan interval 4-8mg.
- 9) Hepatitis A: imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya hepatitis A yang di berikan pada usia di atas 2 tahun.
- 10) HiB: *Haemophilus influenzae tipe b* yang digunakan untuk mencegah terjadinya influenza tipe b dan di berikan sebanyak 3 kali suntikan.

d. Penyakit infeksi

Menurut supartani, (2010) balita yang berada dalam status gizi buruk, umumnya sangat rentan terhadap penyakit. Seperti lingkaran

setan, penyakit-penyakit tersebut justru menambah rendahnya status gizi anak. Penyakit-penyakit tersebut adalah:

- 1) Diare persisten: sebagai berlanjutnya episode diare selama 14 hari atau lebih yang di mulai dari suatu diare cair akut atau berdarah (di sentri).
- 2) Tuberculosis: tuberculosis adalah penyakit yang di sebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yaitu kuman aerob yang dapat hidup terutama di paru atau di berbagai organ tubuh hidup lainnya yang mempunyai tekanan parsial oksigen yang tinggi.
- 3) HIV/AIDS: HIV merupakan singkatan dari 'human immunodeficiencyvirus' HIV merupakan retrovirus yang menyakiti sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia (terutama CD4 positive T-sel dan macrophages-komponen-komponen utama sistem kekebalan sel), dan menghancurkan atau mengganggu fungsinya.
- 4) ASI: beberapa sifat pada ASI yaitu merupakan makanan alam atau natural, ideal, fisiologis, nutrisi yang diberikan selalu dalam keadaan segar dengan suhu yang optimal dan mengandung nutrisi yang lengkap dengan komposisi yang sesuai kebutuhan pertumbuhan bayi. selain ASI mengandung gizi yang cukup lengkap, ASI juga mengandung antibodi atau zat kekebalan yang akan melindungi balita terhadap infeksi.
- 5) Inisiasi Menyusui Dini: pencapaian 6 bulan ASI Eksklusif bergantung pada keberhasilan inisiasi dalam satu jam pertama. ASI Eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, bersamaan dengan pemberian

makanan pendamping ASI dan meneruskan ASI dari 6 bulan sampai 2 tahun, dapat mengurangi sedikitnya 20% kematian anak balita(Kartiningrum, 2015).

Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan sumber daya manusia dan kualitas hidup. Untuk itu program perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi konsumsi pangan, agar terjadi perbaikan status gizi masyarakat. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi dalam tubuh(Supariasa, 2010). Sedangkan menurut Suhardjo, dkk(2003) status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari pemakaian, penyerapan, dan penggunaan makanan.

B. Tinjauan Khusus Gizi Kurang

1. Pengertian gizi kurang

Adapun pengertian gizi kurang atau kurang gizi adalah keadaan kurang zat gizi tingkat sedang yang disebabkan oleh rendahnya asupan energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur (*BB/U*), serta gizi merupakan bagian dari proses kehidupan dan prosetumbuh kembang seseorang, sehingga pemenuhan kebutuhan gizi secara adekuat turut menentukan kualitas tumbuh kembang sebagai sumber manusia di masa datang(Soetjningsih, 2002).

Gizi kurang merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi atau nutrisinya dibawah rata-rata. Gizi kurang adalah kekurangan bahan-bahan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh (Alamsyah, 2017).

Gizi kurang menghambat reaksi imunologis dan berhubungan dengan tingginya prevalensi dan penyakit infeksi. Penyakit infeksi dengan anak-anak dengan kwashiorkor atau marasmus sering di dapat dalam taraf yang berbeda-beda, dan jarang di dapat pada taraf yang sangat berat. Infeksi sendiri mengakibatkan si penderita kehilangan bahan makanan melalui muntah-muntah dan diare. Selain itu juga penghancur jaringan tubuh akan meningkat, karena di pakai untuk pembentukan protein atau enzim-enzim yang di perlukan dalam usaha pertahanan tubuh(Soegeng santoso, 2009).

Istilah gizi berasal dari *giza* (bahasa Arab) yang berarti zat makanan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, gizi sering dikenal dengan istilah *nutrition*. *nutrition* sendiri memiliki banyak arti, seperti bahan makanan, zat gizi, atau sering juga digunakan untuk menyatakan ilmu gizi. Secara luas, gizi diartikan sebagai suatu proses organisme dalam menggunakan makanan yang dikonsumsi melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ tubuh, serta untuk menghasilkan tenaga(Irianto, 2017).

Status gizi adalah status kesehatan yang di hasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrisi (Mary, 2011). status gizi (*Nutrition status*) adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutrisi dalam bentuk variabel tertentu.

Gizi adalah suatu proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal oleh suatu organisme melalui proses digesti, absorpsi, transportasi,

penyimpanan metabolisme dan zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi (Kartiningrum, 2015).

Jadi dapat disimpulkan bahwa gizi kurang adalah pertumbuhan dan perkembangan anak yang tidak stabil atau terpenuhi karena kekurangan nutrisi yang akan diolah oleh tubuh melalui makanan yang dikonsumsi sehari-hari dan tubuh akan lebih sering sakit.

Defisiensi gizi sering dihubungkan dengan infeksi. Infeksi bisa berhubungan dengan gangguan gizi melalui beberapa cara: yaitu mempengaruhi nafsu makan, dapat juga menyebabkan kehilangan bahan makanan karena diare/muntah-muntah atau mempengaruhi metabolisme makanan dan banyak cara lain lagi.

Secara umum, defisien gizi sering merupakan awal dari gangguan sistem kekebalan. Gizi kurang dan infeksi, kedua-duanya dapat bermula dari kemiskinan dan lingkungan yang tidak sehat dengan sanitasi buruk. Selain itu juga diketahui bahwa infeksi menghambat reaksi imunologis yang normal dengan menghabiskan sumber-sumber energi di tubuh (Soegeng santoso, 2009).

2. Faktor risiko yang berpengaruh terhadap gizi kurang

Faktor resikonya yaitu:

- a. pendapatan keluarga

Keluarga dengan pendapatan terbatas mempunyai kemungkinan kurang dapat memenuhi kebutuhan makanan sejumlah yang di

perluan, sehingga keanekaragaman bahan makanan kurang dapat dijamin.

b. frekuensi sakit anak

Anak yang sering sakit akan mempengaruhi pada penurunan nafsu makan anak, sehingga asupan makanan anak akan berkurang. Apabila keadaan penurunan asupan makan terjadi dalam waktu yang cukup lama di sertai dengan kondisi muntah dan diare maka anak juga akan mengalami kehilangan zat gizi dan cairan.

c. pengetahuan ibu

Kurangnya pengetahuan ibu tentang status gizi balita akan berdampak kurangnya asupan makanan pada balita sehingga tidak terpenuhinya zat-zat gizi yang di perlukan balita.

d. frekuensi ke posyandu

Balita yang datang ke posyandu dan menimbang secara teratur akan terpantau status gizi dan kesehatannya sehingga kebutuhan gizi balita akan terpenuhi.

e. jumlah anak

Hubungan antara jumlah anak dengan status gizi karena terjadi persaingan sarana dan prasarana, perbedaan makanan, dan waktu perawatan anak berkurang.

f. jarak kelahiran

Jarak kelahiran yang terlalu dekat akan mempengaruhi status gizi dalam keluarga sehingga akan mempengaruhi pola asuh terdapat anaknya.

g. sumber air minum

Air yang tidak sehat akan mengakibatkan diare pada anak balita dan menurunkan berat badanya, sehingga berpengaruh pada status gizi bersifat akut (Ratufelan, 2018).

3. Tanda dan Gejala dari Gizi Kurang

Beberapa gejala berikut bisa dialami oleh anak yang mengalami gizi kurang yaitu:

- a. Berat badan dan tinggi badan anak berada di bawah kurva pertumbuhan
- b. Nafsu makan menurun
- c. Anak tampak kurus
- d. Wajah seperti orang tua
- e. Kulit keriput
- f. Anak cengeng
- g. Lebi rewel
- h. Pipi dan mata terlihat cekung
- i. Kulit tampak kering
- j. Rambut kusam dan merah dan mudah rontok (Janah, n.d.).

4. Dampak gizi kurang yang sangat di waspadai adalah:

- a. Gagal tumbuh (*growth faltering*), terutama gagal tumbuh kembang otak, anak yang menderita kekurangan gizi tidak saja menurunkan kecerdasan otak, tetapi menyimpan potensi tekanan penyakit degenerative ketika memasuki usia dewasa.
- b. Menurunnya kualitas sumber daya manusia.
- c. Lamanya proses pemulihan dari penyakit. Kurang gizi atau gizi buruk adalah suatu gangguan multisistem yang mengakibatkan ketidakseimbangan kekebalan tubuh dan hambatan penyembuhan luka, sehingga memperburuk pemulihan dari suatu penyakit dan menghambat pertumbuhan si kecil.
- d. Gangguan perilaku. Anak yang kurang gizi biasanya kurang aktif, kurang eksploratif dan cenderung apatis terhadap lingkungannya.
- e. Penurunan IQ, yang menyebabkan gangguan kecerdasan (fungsi kognitif) sehingga membuat rendahnya kemampuan belajar yang berisiko mengakibatkan kegagalan pembelajaran.
- f. Penyakit rawan yang dapat diderita balita yang gizi kurang adalah seperti infeksi (Amelia et al., 2013).

5. Penyebab timbulnya gizi kurang:

- a. Penyebab gizi kurang pada umumnya.
 - 1) Kurang makan makanan yang bergizi dalam waktu yang lama.
 - 2) Menderita penyakit terutama penyakit infeksi seperti TB paru.
 - 3) Mengalami gangguan fungsi saluran pencernaan.

4) Kebersihan lingkungan yang buruk.

b. Penyebab lainnya adalah masalah gizi dibagi menjadi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

1) Individu

Pada tingkat individu keadaan gizi di pengaruhi oleh asupan gizi dan penyakit infeksi. Apabila seseorang tidak mendapat asupan gizi yang cukup akan mengalami kekurangan gizi dan mudah sakit. Dengan demikian, seseorang yang sering sakit akan menyebabkan gangguan nafsu makan dan selanjutnya akan mengakibatkan gizi kurang.

2) Keluarga

Sedangkan ditingkat keluarga dan masyarakat, masalah gizi di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kemampuan keluarga dalam menyediakan pangan bagi anggotanya, pengetahuan dan sikap serta keterampilan keluarga, tersedianya pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, dan pengetahuan keluarga dalam hal kebersihan pribadi dan lingkungan (Depkes RI, 2007).

c. Penyebabnya terdiri dari beberapa tahap yaitu penyebab langsung, tidak langsung, akar masalah, dan pokok masalah.

1) Penyebab langsung yaitu konsumsi makanan anak dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak. Penyebab gizi kurang tidak hanya disebabkan makanan yang kurang tetapi juga karena penyakit infeksi. Anak yang mendapat makanan yang baik tetapi karena sering sakit diare atau demam dapat menderita kurang gizi.

- 2) Adapun penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di kelurga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Faktor-faktor tersebut sangat terkait dengan tingkat pendidikan, pengetahun dan keterampilan keluarga. Pola pengasuha anak dapat berpengaruh terhadap konsumsi makanan anak dan penyakit infeksi yang mungkin di derita anak balita.



Gizi kurang adalah kekurangan bahan-bahan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak dan vitamin yang di butuhkan oleh tubuh. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (persagi) pada tahun 1999, telah merumuskan faktor penyebab gizi kurang seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Faktor Penyebab Gizi Kurang.



sumber: (persagi, 1999)

6. Komplikasi

Adapun komplikasi atau masalah yang terjadi pada gizi kurang yang mendominasi di Indonesia yaitu:

1. Kurang Energy Protein (KEP).

Kurang Energi Protein (KEP) disebabkan oleh kekurangan makan sumber energi secara umum dan kekurangan sumber protein. Pada anak-anak, KEP dapat menghambat pertumbuhan, rentan terhadap penyakit terutama penyakit infeksi dan mengakibatkan rendahnya tingkat kecerdasan. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya KEP, namun selain kemiskinan faktor lain yang berpengaruh adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan pendamping serta tentang pemeliharaan lingkungan yang sehat.

2. Anemia Gizi Besi (AGB)

Masalah anemia gizi di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kekurangan zat besi (AGB). Penyebab AGB adalah kurangnya daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sumber zat besi, terutama dengan ketersediaan biologik tinggi (asal hewan), AGB menyebabkan penurunan kemampuan fisik dan produktif kerja, penurunan kemampuan berfikir dan penurunan antibodi sehingga sangat mudah terserang infeksi.

3. Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI)

Kekurangan iodium umumnya banyak ditemukan di daerah pegunungan dimana tanah kurang mengandung iodium. GAKI

menyebabkan pembesaran kelenjar gondok (tiroid). Pada anak-anak menyebabkan hambatan dalam pertumbuhan jasmani, maupun mental.

4. Kurang Vitamin A (KVA)

KVA merupakan suatu gangguan yang di sebabkan karena kurangnya asupan vitamin A dalam tubuh. KVA dapat mengakibatkan kebutaan, mengurangi daya tahan tubuh sehingga mudah terserang infeksi, yang sering menyebabkan kematian khususnya pada anak-anak. Selain itu KVA dapat menurunkan epitelisme sel-sel kulit. Faktor yang menyebabkan timbulnya KVA adalah kemiskinan dan minim pengetahuan akan gizi (Alamsyah, 2017).

Kurang gizi pada balita akan menyebabkan dampak buruk bagi balita dimanah masa pertumbuhan balita akan terhambat akibat kurangnya asupan gizi yang di peroleh setiap hari, balita akan rentang terhadap penyakit, bahkan tubuh dan perkembangannya tidak sesuai di masa balitanya.

Makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang harus di penuhi, makanan juga sumber energi tubuh, tanpa makan kita tidak mampu melakukan aktivitas, namun dalam islam kita dianjurkan memakan makanan yang tidak berlebih-lebihan dan halal, hal ini di jelaskan dalam QS.AI-nahl/16:114: Allah swt, berfirman.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (Kementerian Agama RI, 2014).

Di sini disebut dua pokok yang terpenting, yaitu halal dan baik yang halal ialah yang tidak di larang oleh agama. Sedangkan memakan daging babi, memakan atau meminum darah, memakan bangkai atau memakan makanan yang disembelih bukan karena Allah. Semuanya itu telah dinyatakan haram. Kemudian di sebut pula makanan yang baik yaitu diterima oleh selera yang tidak menjijikkan. Misalnya sapi yang telah disembelih adalah halal dimakan tetapi kalau tidak dimasak terlebih dahulu, langsung saja dimakan daging mentah itu, mungkin sekali tidak baik, lantaran itu maka kata-kata yang baik atau dalam asal kata *tayyib*, adalah ukuran dari kebiasaan sendiri-sendiri atau kemajuan masyarakat (Hamka, *tafsir Al-Azhar*, jilid V, h. 3977).

Sebagaimana Dalam QS. Al-nahl/16:115: Allah swt, berfirman.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Kementerian Agama RI, 2014).

Maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya, Al-Quran dalam ayat ini mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangannya dalam memakan makanan. Oleh karenanya Allah berdasarkan kebutuhan manusia mengatakan, ” kalian di perkenankan memakan daging, namun tidak setiap daging. Jauhkan diri kalian dari memakan daging yang dicekik, mati (bangkai) dan daging hewan yang tidak disembelih. Begitu juga kalian haram memakan daging hewan yang disembeli tanpa menyebut nama Allah SWT.

Selain syarat-syarat yang telah diisyaratkan oleh Al-Quran, masih ada syarat tentang cara menyembelih dengan menyebutkan beberapa cara yang tidak direstuihnya. Seperti dalam Q. S. Al-Ma'idah/5:3. Allah swt berfirman.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
 ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
 ۗ الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ
 أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
 ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(Kementrian Agama RI, 2014:3).

Binatang yang mati dengan cara-cara dalam Q.S. Al-Ma'idah di atas dapat dikategorikan sebagai makanan yang haram. Karena binatang yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas, dapat dikatakan sebagai bangkai. Karena di Al-Quran sendiri ditegaskan haram hukumnya memakan bangkai.

Berbeda halnya dengan bangkai hewan laut atau sungai yang sudah mati dengan sendirinya, maka bangkai tersebut halal untuk di makan. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 96. Yang di maksud dengan "buruan laut" dalam ayat di atas adalah binatang hidup yang di tangkap atau diperoleh dengan cara seperti memancing, menjaring dan sebagainya, baik itu dari kolam, sungai, danau dan lain-lain. Sedangkan "makanan yang berasal dari laut" adalah bangkai ikan atau hasil tangkapan yang kemudian digarami dan dikeringkan biasanya juga dijadikan persediaan atau bekal oleh para musaffir dan orang yang tinggal jauh dari pantai(Shihab, 2012).

Menurut Jumhur Ulama memperbolehkan memakan ikan yang mengapung di permukaan air, sebab mereka berlandaskan ayat ke 96 dalam surat Al-Ma'idah.

Dan ada hadis yang dapat menguatkan pendapat tersebut yaitu yang artinya: “Dihalalkan untuk kita dua macam bangkai: ikan dan belalang, dan dua darah: hati dan limpa”(H.R.Ahmad).

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa bangkai ikan tidak termasuk dalam keumuman ayat yang mengharamkan bangkai, sebagai yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah di atas. Oleh karena itu bangkai ikan tidak diragukan lagi kehalalannya.

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat AL-Baqarah ayat 168 agar manusia tidak mengikuti langkah setan yang mengonsumsi makanan yang diharamkan, sebab Allah telah memberikan makanan yang halal dan lagi baik di bumi.

Q.S. Al-Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ALAUDDIN
 MAKASSAR
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu(Kementrian Agama RI, 2014).

Abu Huraira dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim, menceritakan Sabda Rasulullah SAW terkait akibat jika umat Islam mengonsumsi makanan yang tidak halal Salah satunya adalah doa yang tak

dikabulkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) (المؤمنون: الآية 51)، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة: الآية 172)، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدْيِي بِالْحَرَامِ فَأَتَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih." (Al-Mu'minin; 51). Dan Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepada kalian." (al-Baqarah: 172). Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: "Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku," namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" (HR Muslim).

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa gizi dalam islam bukan hanya mengharamkan makanan yang berbahaya seperti babi, bangkai dan darah tetapi islam juga memperhatikan makanan yang berkualitas untuk dihidangkan.

Dan adapun hadist lainnya yaitu:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. [رواه البخاري ومسلم]

Artinya:

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a,"saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang di haramkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang di larang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh

ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).

Keluarga yang menyediakan makanan halal dan bergizi berdampak positif bagi kesehatan. Islam telah memberikan gambaran tentang pentingnya kesehatan dan gizi. Beberapa ayat dan surah bahkan secara perinci memberikan penjelasan dan manfaat mengonsumsi makanan bergizi seperti dalam Al-Quran surah Al-an'am ayat 141: Allah SWT berfirman.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ
ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

المُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya:

dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (Kementerian Agama RI, 2014).

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab, ayat ini menyatakan “*makanlah dari buahnya bila ia berbuah*” hanya Allah SWT yang menciptakan Zaitun dan tanaman-tanaman lainnya dalam keadaan yang bermacam-macam rasa, bentuk

dan aromanya. Allah melimpahkan anugerah kepada manusia dengan memberikan makanan untuk kita mengambil manfaatnya(Shihab, 2002).

Menurut penafsiran As-Saadi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Zaitun dengan usianya yang sangat panjang, *makanlah dari buahnya* yakni karena zaitun sangat bermanfaat bagi manusia. Beliau juga mengatakan, zaitun adalah sebaik-baik tanaman karena didalamnya terdapat manfaat(Saa'di, tafsir kalam Al-manan, 2000).

Menurut Al-Bagawi di dalam tafsirnya Zaitun adalah pohon yang tumbuhnya ditanah para nabi dan di kawasan yang suci. Zaitun merupakan pohon dunia, tumbuhnya tidak terhalang dari sinar matahari, zaitun merupakan makanan dan obat bagi manusia.

C. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Asuhan Balita Dengan Gizi Kurang

Menurut Helen Varney (1997), manajemen asuhan kebidanan merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan dan urutan logis dan perilaku yang diharapkan dari pemberi asuhan yang berdasarkan ilmiah, penemuan, dan keterampilan dalam tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien.

1. Proses manajemen asuhan kebidanan

Menurut helen varnay, proses manajemen kebidanan terdiri dari 7 (tujuh) langkah yaitu sebagai berikut:

a. Langkah I: Identifikasi Data Dasar

Pada langkah pertama ini identifikasi dilakukan segera pada balita dengan gizi kurang, semua informasi akurat dan lengkap dikumpul dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data dilakukan, yaitu akan didapatkan data objektif dengan melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhannya, dan pemeriksaan tanda-tanda vital, pada kasus ini memungkinkan pemeriksa BB/U untuk melihat kurang gizi balita.

b. Langkah II: Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data yang telah dikumpulkan diinterpretasi sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumusan masalah dan diagnosa keduanya di gunakan karena masalah tidak dapat diidentifikasi seperti diagnosis tetapi tetap membutuhkan penanganan.

Masalah kurang gizi dapat ditegakkan berdasarkan interpretasi dasar yang di kumpulkan bahwa kurang gizi akan menimbulkan masalah-masalah seperti penyakit infeksi, diare, tifus dll.

c. Langkah III. Antisipasi diagnosa atau Masalah potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial yang berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila

memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Langkah ini sangat penting dalam melakukan asuhan yang aman.

Pada balita dengan kurang gizi perlu untuk melakukan antisipasi terjadinya masalah potensial berupa Badan kurus, Badan pendek, Mudah lelah dan lemah.

d. Langkah IV. Tindakan segera atau kolaborasi

Pada langkah ini Bidan dan dokter melakukan identifikasi yang memungkinkan terjadi untuk melakukan kolaborasi dan tindakan segera bersama tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi pasien.

Pada kondisi kurang gizi secara kondisi medis pada balita dapat menyebabkan kurangnya nafsu makan, kondisi mental, perawatan RS berulang hingga mengakibatkan gangguan menelan, mual, muntah dan diare terus menerus. Faktor fisik seperti kondisi gigi yang buruk, gangguan penciuman dan gangguan pada indera pengecap segera tindakan segera.

e. Langkah V. Rencana asuhan kebidanan atau intervensi

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya dan merupakan lanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diadaptasi. Setiap rencana asuhan harus disertai oleh klien dan bidan agar dapat dilaksanakan dengan efektif.

f. Langkah VI. Implementasi asuhan kebidanan

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun bekerja sama dengan kesehatan lain. Bidan harus melakukan implementasi yang efisien dan akan mengurangi waktu perawatan serta akan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan klien.

Pada langkah keenam ini rencana Asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi oleh klien, atau anggota tim kesehatan yang lain. Jika bidan tidak melakukan sendiri ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya, (Misalnya memastikan agar langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana).

Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter, untuk menangani klien yang mengalami komplikasi maka keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dan asuhan klien.

g. Langkah VII. Evaluasi kebidanan

Pada langkah ini dilakukan evaluasi apakah keefektifitasan asuhan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan telah dilakukan sesuai dengan masalah potensial atau aktual.

BAB III

TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING

A. Matriks Langkah I

Pada langkah pertama ini identifikasi dilakukan segera pada balita dengan gizi kurang, semua informasi akurat dan lengkap dikumpulkan dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Didalam langkah ini akan diperoleh berbagai referensi tentang definisi, tanda dan gejala, serta faktor-faktor penyebabnya. Untuk memperoleh data dilakukan.

Judul: Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Gizi Kurang

No	Judul referensi	Oleh (sebutkan nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Waspadai Gizi Balita Anda	Sri Adiningsih	2010	Waspadai Gizi Balita	Gizi kurang merupakan suatu keadaan dimana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu sehingga tubuh akan memecah cadangan makanan yang berada di bawah lapisan lemak dan lapisan organ tubuh.	-	Penjelasan mudah dimengerti	-
2.	Keperawat	Sodikin	2013	Anak	Gizi Kurang merupakan keadaan	-	Mudah	-

	an Anak Gangguan Pencernaan			Gangguan Pencernaan	kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama.		dibaca dan dipahami	
3.	Waspada Gizi Balita Anda	Sri Adiningsih	2010	Gejala gizi kurang	Balita kurang gizi pada awalnya ditandai oleh adanya gejala sulit makan. Masalah sulitnya peningkatan berat badan anak sesuai dengan laju pertumbuhan umurnya bisa jadi salah satu penyebabnya karena gejala sulit makan. Hal ini dapat dijumpai pada anak laki-laki atau perempuan, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, pada keluarga sosial ekonomi rendah atau tinggi. Selera makan yang rendah bukan hanya karena gangguan penyakit saja tetapi bisa juga diakibatkan jenis dan bentuk makanan balita yang kurang diperhatikan.	-	Penjelasan mudah dimengerti	Tidak ada perbandingan
4.	Faktor	Anita bili,	2020	Faktor	Hasil penelitian menunjukkan	Peneliti	Sampel	Hasil penelitian ini

	resiko kejadian gizi kurang pada anak balita di puskesmas palla kabupaten sumba barat daya	Lewi jutomo, Daniela L, A boeky.		resiko kejadian gizi kurang pada anak	bahwa penyakit infeksi (OR=2,590), pengetahuan gizi ibu (OR=2,615), konsumsi energi (OR = 2,067) dan protein (OR=2,254) merupakan faktor risiko kejadian gizi kurang pada anak balita. Penyakit infeksi, pengetahuan gizi ibu, konsumsi energi dan konsumsi protein berperan penting sebagai faktor risiko kejadian gizi kurang pada balita.	tidak menjelaskan berapa lama penelitiannya	pada tiap kelompok kasus dan kontrol berjumlah 46 orang.	sejalan dengan penelitian lutviana, 2017 dan Lestari, 2019. Dimana dengan konsumsi protein dan konsumsi energi berperan penting sebagai faktor risiko kejadian gizi kurang pada balita
5.	Prevalensi dan determinan kejadian gizi kurang pada balita.	Evi lutviana, irwan budiono	2017	Prevalensi dan determinan kejadian gizi kurang.	Penelitian menunjukan bahwa faktor yang berhubungan dengan status gizi adalah konsumsi energi (p = 0.001), konsumsi protein (p = 0.001), penyakit infeksi (p = 0.001), tingkat pengetahuan (p = 0.002), tingkat pendidikan (p = 0.001), tingkat pendapatan (p = 0.002).	Penelitiannya adalah survei dengan desain belah lintang.	Populasi seluruh balita usia 1-5 tahun dari keluarga nelayan sejumlah 50 balita.	penelitian ini sejalan dengan penelitian bili, 2020 dan Lestari, 2019. Dimana dengan konsumsi protein dan konsumsi energi berperan penting sebagai faktor terjadimya gizi kurang

6.	Faktor yang berhubungan dengan status gizi balita	Ika nopa	2019	Faktor yang berhubungan dengan status gizi balita	Dari penelitian didapati status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur didapati gizi kurang sebanyak 40%. Faktor yang berhubungan dengan status gizi balita pada posyandu Cempaka V Kecamatan Medan Kota adalah riwayat asi eksklusif dengan nilai $p=0.015$ dan riwayat infeksi berulang dengan nilai $p=0.010$.	Peneliti tidak menjelaskan bentuk tabel	Data dikumpulkan dengan pengukuran langsung dan wawancara dengan wali balita. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara univariat dan bivariate dengan SPSS dan chi square sebagai uji hipotesis.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ratufelan, 2018 dan Handayani, 2017 yang mengatakan riwayat infeksi berhubungan dengan status gizi balita.
7.	Hubungan pola makan,	Esra ratufelan, asnia	2018	Faktor yang mempengaruhi	Hasil analisis pola makan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai $pvalue=0,423 \leq$	penelitian adalah analitik	Jumlah sampel penelitian	Penelitian ini sejalan dengan penelitian nopa,

	ekonomi keluarga dan riwayat infeksi dengan kejadian gizi kurang pada balita diwilaya kerja puskesmas benua-benua	zainudin, junaid		ruhi terjadinya gizi kurang pada balita	dari $\alpha=0,05$ sehingga hipotesis nol ditolak dan ada hubungan antara pola makan dengan gizi kurang. Hasil uji <i>chi-square</i> ekonomi keluarga diperoleh nilai $pvalue=0,443 \leq$ dari $\alpha=0,05$ sehingga hipotesis nol ditolak dan ada hubungan ekonomi keluarga dengan kejadian gizi kurang. Hasil uji <i>chi-square</i> riwayat infeksi diperoleh nilai $pvalue=0,003 \leq$ dari $\alpha=0,05$ sehingga hipotesis nol ditolak dan ada hubungan antara riwayat infeksi dengan kejadian gizi kurang pada balita.	observasion al dengan pendekatan <i>cross sectional study</i>	yaitu 55 responden.	2019 dan Handayani, 2017 yang mengatakan riwayat penyakit infeksi berhubungan dengan status gizi balita.
8.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gizi	Delima Nala Ngoma, Apris A. Adu, Dominirsep	2019	faktor yang mempengaruhi kejadian gizi kurang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat dua variabel yang mempengaruhi kejadian gizi kurang. Kedua variabel tersebut adalah pendapatan keluarga dengan nilai <i>p-value</i> 0,01 dengan nilai OR 7,576, dan	sampel yang digunakan hanya 31 kasus dan 31 kontrol.	Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitik.	Penelitian ini sama dengan penelitian Harahap dkk, 2019 dan putri, 2019. Yang menjelaskan pendapatan keluarga

	kurang pada balita di kelurahan oesapa kota kupang	O. Dodo		pada balita	pola asuh ibu dengan nilai <i>p-value</i> 0,01, dengan nilai OR 3,870.			mempengaruhi kejadian gizi kurang.
9.	Determinan status gizi kurang pada balita di puskesmas belawanan kota medan	Duma jerryah harahap, zuraidah nasution, Aida fitria	2019	Determinan status gizi kurang pada balita	Nilai OR infeksi =5,32, riwayat pemberian ASI eksklusif = 6,333, pendapatan keluarga = 9,308, jumlah anggota keluarga = 4,200, pengetahuan ibu tentang kekurangan gizi = 6,333, dan kebiasaan makan merupakan factor penentu pada Exp (b)= 11.400. pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa variable pola asuh makan dan pemeliharaan kesehatan pada balita dan pendapatan keluarga merupakan penentu status gizi kurang pada balita.	Peneliti tidak menjelaskan berapa lama penelitiannya	Peneliti menjelaskan dengan baik dan mudah dipahami	Penelitian ini sama dengan penelitian Ngoma dkk, 2019 dan putri, 2019. Yang mengatakan pendapatan keluarga mempengaruhi status gizi kurang balita.

10.	Pengaruh pendapatan orang tua terhadap status gizi anak usia 4-5 tahun pada masa pademi CIVID -19	Nurul Aziza, Silvie mil.	2021	Pengaruh pendapatan orang tua terhadap status gizi anak.	<p>Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pendapatan orang tua pada masa pandemi COVID-19 terhadap status gizi anak usia 4-5 tahun dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α 0,05 dan berdasarkan uji signifikansi dengan rumus t hitung menunjukkan hasil sebesar 5,359 lebih besar dari tabel sebesar 1,995. Nilai koefisien dua variabel menunjukkan nilai sebesar 0,277 atau 27,7% pendapatan orang tua mempengaruhi status gizi anak pada masa pandemi COVID-19. Pendapatan orang tua di Kecamatan Koja Jakarta Utara yang menurun selama pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan pemenuhan gizi seimbang pada anak setiap hari yang berdampak</p>	Penelitian ini tidak menjelaskan cara penanganan gizi kurang.	Pengambilan sampel menggunakan teknik <i>Random sampling</i> , sehingga responden penelitian ini berjumlah 77 responden.	Penelitian ini menjelaskan terdapat pengaruh pendapatan orang tua yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan pemenuhan gizi pada anak yang berdampak terhadap status gizi balita.
-----	---	--------------------------	------	--	---	---	--	--

					terhadap status gizi anak.			
11.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi pada anak balita.	Reska Handayani	2017	Faktor yang berhubungan dengan status gizi	Penelitian didapatkan (63,8%) anak balita memiliki riwayat penyakit infeksi, (55,0%) pola asuh ibu tidak baik, dan (61,3%) anak balita memiliki status gizi kurang. Setelah dilakukan uji statistik Chi-Square terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit infeksi (p value = 0,001) dan pola asuh (p value = 0,003) dengan status gizi pada anak balita. Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel penyakit infeksi dan pola asuh memiliki hubungan yang bermakna dengan status gizi pada anak balita.	Jenis penelitian deskriptif analitik dengan desain cross sectional.	Populasi dalam penelitian ibu yang mempunyai anak balita sebanyak 80 orang.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian nopa, 2019 dan Ratufelan, 2019 yang mengatakan riwayat penyakit infeksi berhubungan dengan status gizi anak balita.
12.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi	Rona firmana putri, Delmi sulastri, yuni ar lestari	2015	Faktor yang berhubungan dengan status gizi	Berdasarkan analisis bivariat didapatkan pendidikan ibu (p=0,022), pekerjaan ibu (p=0,007), pendapatan keluarga (p=0,012), jumlah anak (p=0,008) dan pola asuh ibu	Jenis penelitian analitik observasional dengan pendekatan	jumlah sampel 227 orang yang terdiri dari anak balita dan ibu	Penelitian ini sama dengan penelitian Ngoma dkk, 2019 dan harahap, 2019. Yang mengatakan pendapatan

	anak balita di wilayah kerja puskesmas nanggalo padang.			anak balita	(p=0,000). Sementara dari analisis multivariate didapatkan pendidikan ibu (p=0,004; OR=2,594; CI95%=1,356-4,963), pekerjaan ibu (p=0,000; OR=74,769; CI95%=24,141-231,577), pendapatan keluarga (p=0,013; OR=3,058; CI95%=1,246-7,4) dan pola asuh ibu (p=0,000; OR=15,862; CI95%=5,973-42,128). Analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anak dan pola asuh ibu dengan status gizi anak balita.	Case-control	balita	keluarga mempengaruhi status gizi kurang balita.
13.	Faktor Perbedaan sosial ekonomi dan pengetahuan gizi ibu	Amelinda calida rahma, siti rahayu nadhiroh.	2016	Sosial ekonomi dan pengetahuan gizi ibu balita gizi	Penelitian menunjukkan ada perbedaan tingkat pengetahuan gizi ibu (p = 0,004) pada balita gizi kurang dan gizi normal. terdapat perbedaan pendidikan ibu (p = 0,189), pekerjaan ibu (p = 0,387), pendapatan keluarga (p	Jumlah sampel penelitian sebesar 19 balita	Pengambilan data menggunakan metode wawancara dengan	Pada penelitian ini terdapat perbedaan tingkat pengetahuan gizi ibu balita gizi kurang dan gizi normal dan

	balita gizi kurang dan gizi normal.			kurang	= 0,189), dan pengeluaran konsumsi ($p = 0,515$) antara balita gizi kurang dan gizi normal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan gizi ibu balita gizi kurang dan gizi normal dan ditemukan perbedaan sosial ekonomi pada kedua kelompok.		kuesioner	ditemukan perbedaan sosial ekonomi pada kedua kelompok.
14.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian status gizi balita di wilayah kerja puskesmas mekar kota kendari	Sri Ayu lestari, Rosmiati Pakkan, Toto Suriyanto S	2019	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian status gizi balita	Penelitian menunjukkan asupan makanan energi dan protein X2 hitung 16,350, $\phi = 0,31$, pola asuh ibu terhadap X2 hitung 9,853, $\phi = 0,01$, dan pendidikan ibu X2 hitung 0,42. ada hubungan asupan makanan energi protein dan pola asuh dengan status gizi balita, dan pendidikan ibu dengan status gizi balita.	Jurnal ini menggunakan penelitian observasi analitik	Jurnal mampu mengetahui faktor apa saja yang paling dominan yang berhubungan dengan gizi kurang.	Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lutviana, 2017 dan bili, 2020. Dimana dengan konsumsi protein dan konsumsi energi berperan penting sebagai faktor risiko kejadian gizi kurang pada balita

15.	Beberapa Faktor Risiko Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Balita 12-59 Bulan di kota Pontianak	Alamsyah dedi	2017	Faktor resiko gizi kurang dan gizi buruk pada balita.	Analisis multivariat menemukan 2 variabel yang berhubungan bermakna dengan prevalensi gizi buruk sedang dan berat pada balita usia 12-59 bulan, yaitu sikap terhadap makanan yang buruk (OR=6,980) dan kesehatan lingkungan yang buruk (OR=5,033), disimpulkan bahwa faktor resiko yang berhubungan dengan prevalensi gizi buruk sedang dan berat adalah sikap ibu yang buruk terhadap makan, kesehatan yang buruk dan lingkungan yang buruk.	Peneliti hanya menggunakan Analisis data yang sudah ada	Sampel sebanyak 80 orang dengan penilaian gizi menggunakan pengukuran antropometri.	Penelitian ini menjelaskan bahwa makanan yang buruk serta lingkungan yang buruk bisa menjadi resiko gizi kurang dan gizi buruk pada balita.
16.	Faktor-faktor yang menyebabkan status gizi kurang pada balita	Berliana irianti	2018	Faktor yang menyebabkan status gizi kurang pada balita	Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 20 responden mayoritas faktor pengetahuan ibu yang memiliki balita dengan status gizi kurang adalah rendah sebanyak 11 orang (55%), dan mayoritas faktor tingkat ekonomi orang tua adalah	Referensi kurang menjelaskan penanganan gizi balita	Peneliti menjelaskan dengan baik faktor penyebab gizi kurang sehingga mudah di	Penelitian ini menjelaskan faktor yang menyebabkan status gizi kurang pada balita yaitu faktor tingkat ekonomi orang tua

	di wilayah kerja puskesmas sail pekan baru				rendah sebanyak 12 orang (60%), dan mayoritas faktor jarak kelahiran yang terlalu rapat sebanyak 12 orang (60%). Faktor-faktor yang menyebabkan status gizi kurang pada balita yaitu faktor tingkat ekonomi orang tua dan jarak kelahiran.		pahami dan dibaca	dan jarak kelahiran.
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------------

B. Matriks Langkah II

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan sehingga mengetahui bahwa pasien menderita gizi kurang.

No	Judul referensi	Oleh (sebutkan nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Buku Ajar Gizi Untuk Kebidanan	Proverawati, AsfuaHS	2009	Tanda dan gejala gizi	Tanda dan Gejala dari gizi kurang adalah nafsu makan menurun, anak tampak kurus, wajah seperti	-	Penjelasan mudah	Tidak ada perbandingan

				kurang	orang tua, kulit keriput, anak cengeng dan rewel, rambut kusam dan merah, rontok.		dimengerti	
2.	Waspada Gizi Balita Anda	Sri Ansiningsi h	2010	Gejala gizi kurang	Balita kurang gizi pada awalnya ditandai oleh adanya gejala sulit makan. Masalah sulitnya peningkatan berat badan anak sesuai dengan laju pertumbuhan umurnya bisa jadi salah satu penyebabnya karena gejala sulit makan. Hal ini dapat dijumpai pada anak laki-laki atau perempuan, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, pada keluarga sosial ekonomi rendah atau tinggi. Selera makan yang rendah bukan hanya karena gangguan penyakit saja tetapi bisa juga diakibatkan jenis dan bentuk makanan balita yang kurang diperhatikan.	Metode penelitian kualitatif	Mudah dibaca dan dipahami	Tidak ada perbandingan
3.	Faktor resiko kejadian gizi kurang pada anak balita di	Anita bili, Lewi jutomo, Daniela L,	2020	Faktor resiko kejadian gizi kurang pada anak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit infeksi (OR=2,590), pengetahuan gizi ibu (OR=2,615), konsumsi energi	Peneliti tidak menjelaskan berapa lama penelitiannya	Sampel pada tiap kelompok kasus dan kontrol	Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lutviana, 2017 dan

	puskesmas palla kabupaten sumba barat daya	A boeky.			(OR = 2,067) dan protein (OR=2,254) merupakan faktor risiko kejadian gizi kurang pada anak balita. Penyakit infeksi, pengetahuan gizi ibu, konsumsi energi dan konsumsi protein berperan penting sebagai faktor risiko kejadian gizi kurang pada balita.		berjumlah 46 orang.	Lestari, 2019. Dimana dengan konsumsi protein dan konsumsi energi berperan penting sebagai faktor risiko kejadian gizi kurang pada balita
3.	Prevalensi dan determinan kejadian gizi kurang pada balita.	Evi lutviana, irwan budiono	2017	Prevalensi dan determinan kejadian gizi kurang.	Penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan status gizi adalah konsumsi energi ($p = 0.001$), konsumsi protein ($p = 0.001$), penyakit infeksi ($p = 0.001$), tingkat pengetahuan ($p = 0.002$), tingkat pendidikan ($p = 0.001$), tingkat pendapatan ($p = 0.002$).	Penelitiannya adalah survei dengan desain belah lintang.	Populasi seluruh balita usia 1-5 tahun dari keluarga nelayan sejumlah 50 balita.	penelitian ini sejalan dengan penelitian bili, 2020 dan Lestari, 2019. Dimana dengan konsumsi protein dan konsumsi energi berperan penting sebagai faktor terjadinya gizi kurang
4.	Faktor yang berhubungan	Ika nopa	2019	Faktor yang berhubungan	Dari penelitian didapati status gizi yang didasarkan pada indeks berat	Peneliti tidak menjelaskan	Data dikumpulkan	Penelitian ini sejalan dengan

	dengan status gizi balita			dengan status gizi balita	badan menurut umur didapati gizi kurang sebanyak 40%. Faktor yang berhubungan dengan status gizi balita pada posyandu Cempaka V Kecamatan Medan Kota adalah riwayat asi eksklusif dengan nilai $p=0.015$ dan riwayat infeksi berulang dengan nilai $p=0.010$.	bentuk tabel	dengan pengukuran langsung dan wawancara dengan wali balita. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara univariat dan bivariate dengan SPSS dan chi square sebagai uji hipotesis.	penelitian Ratufelan, 2018 dan Handayani, 2017 yang mengatakan riwayat infeksi berhubungan dengan status gizi balita.
5.	Hubungan pola makan, ekonomi keluarga dan riwayat infeksi dengan kejadian gizi kurang pada balita	Esra ratufelan, asnia zainudin, junaid	2018	Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang pada balita	Hasil analisis pola makan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai $pvalue=0,423 \leq$ dari $\alpha=0,05$ sehingga hipotesis nol ditolak dan ada hubungan antara pola makan dengan gizi kurang. Hasil uji <i>chi-square</i> ekonomi keluarga diperoleh nilai $pvalue=0,443 \leq$ dari $\alpha=0,05$ sehingga hipotesis nol ditolak dan ada	penelitian adalah analitik observasional dengan pendekatan <i>cross sectional study</i>	Jumlah sampel penelitian yaitu 55 responden.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian nopa, 2019 dan Handayani, 2017 yang mengatakan riwayat penyakit infeksi berhubungan dengan status gizi

	diwilaya kerja puskesmas benu-benua				hubungan ekonomi keluarga dengan kejadian gizi kurang. Hasil uji <i>chi-square</i> riwayat infeksi diperoleh nilai $pvalue=0,003 \leq$ dari $\alpha=0,05$ sehingga hipotesis nol ditolak dan ada hubungan antara riwayat infeksi dengan kejadian gizi kurang pada balita.			balita.
6.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gizi kurang pada balita di kelurahan oesapa kota kupang	Delima Nala Ngoma, Apris A. Adu, Dominirse p O. Dodo	2019	faktor yang mempengaruhi kejadian gizi kurang pada balita	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat dua variabel yang mempengaruhi kejadian gizi kurang. Kedua variabel tersebut adalah pendapatan keluarga dengan nilai <i>p-value</i> 0,01 dengan nilai OR 7,576, dan pola asuh ibu dengan nilai <i>p-value</i> 0,01, dengan nilai OR 3,870.	sampel yang digunakan hanya 31 kasus dan 31 kontrol.	Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitik.	Penelitian ini sama dengan penelitian Harahap dkk, 2019 dan putri, 2019. Yang menjelaskan pendapatan keluarga mempengaruhi kejadian gizi kurang.

7.	Determinan status gizi kurang pada balita di puskesmas belawanan kota medan	Duma jerryah harahap, zuraidah nasution, Aida fitria	2019	Determina status gizi kurang pada balita	Nilai OR infeksi =5,32, riwayat pemberian ASI eksklusif = 6,333, pendapatan keluarga = 9,308, jumlah anggota keluarga = 4,200, pengetahuan ibu tentang kekurangan gizi = 6,333, dan kebiasaan makan merupakan factor penentu pada Exp (b)= 11.400. pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa variable pola asuh makan dan pemeliharaan kesehatan pada balita dan pendapatan keluarga merupakan penentu status gizi kurang pada balita.	Peneliti tidak menjelaskan berapa lama penelitiannya	Peneliti menjelaskan dengan baik dan mudah dipahami	Penelitian ini sama dengan penelitian Ngomadkk, 2019 dan putri, 2019. Yang mengatakan pendapatan keluarga mempengaruhi status gizi kurang balita.
8.	Pengaruh pendapatan orang tua terhadap status gizi anak usia 4-5 tahun pada masa pademi	Nurul Aziza, Silvie mil.	2021	Pengaruh pendapatan orang tua terhadap status gizi anak.	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pendapatan orang tua pada masa pandemi COVID-19 terhadap status gizi anak usia 4-5 tahun dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α 0,05 dan berdasarkan uji signifikansi dengan rumus thitung menunjukkan hasil sebesar	Penelitian ini tidak menjelaskan cara penanganan gizi kurang.	Pengambilan sampel menggunakan teknik <i>Random sampling</i> , sehingga responden penelitian ini berjumlah 77	Penelitian ini menjelaskan terdapat pengaruh pendapatan orang tua yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan pemenuhan gizi

	CIVID -19				5,359 lebih besar dari ttabel sebesar 1,995. Nilai koefisien dua variabel menunjukkan nilai sebesar 0,277 atau 27,7% pendapatan orang tua mempengaruhi status gizi anak pada masa pandemi COVID-19. Pendapatan orang tua di Kecamatan Koja Jakarta Utara yang menurun selama pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan pemenuhan gizi seimbang pada anak setiap hari yang berdampak terhadap status gizi anak.		responden.	pada anak yang berdampak terhadap status gizi balita.
9.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi pada anak balita.	Reska Handayani	2017	Faktor yang berhubungan dengan status gizi	Penelitian didapatkan (63,8%) anak balita memiliki riwayat penyakit infeksi, (55,0%) pola asuh ibu tidak baik, dan (61,3%) anak balita memiliki status gizi kurang. Setelah dilakukan uji statistik Chi-Square terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit infeksi (p value	Jenis penelitian deskriptif analitik dengan desain cross sectional.	Populasi dalam penelitian ibu yang mempunyai anak balita sebanyak 80 orang.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian nopa, 2019 dan Ratufelan, 2019 yang mengatakan riwayat penyakit infeksi berhubungan

					= 0,001) dan pola asuh (p value = 0,003) dengan status gizi pada anak balita. Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel penyakit infeksi dan pola asuh memiliki hubungan yang bermakna dengan status gizi pada anak balita.			dengan status gizi anak balita.
10.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi anak balita di wilayah kerja puskesmas nangalo padang.	Rona firmana putri, Delmi sulastriyu niar lestari	2015	Faktor yang berhubungan dengan status gizi anak balita	Berdasarkan analisis bivariat didapatkan pendidikan ibu (p=0,022), pekerjaan ibu (p=0,007), pendapatan keluarga (p=0,012), jumlah anak (p=0,008) dan pola asuh ibu (p=0,000). Sementara dari analisis multivariate didapatkan pendidikan ibu (p=0,004; OR=2,594; CI95%=1,356-4,963), pekerjaan ibu (p=0,000; OR=74,769; CI95%=24,141-231,577), pendapatan keluarga (p=0,013; OR=3,058; CI95%=1,246-7,4) dan pola asuh ibu (p=0,000; OR=15,862;	Peneliti tidak mencantumkan berapa lama penelitiannya	Jumlah sampel penelitian tiap kelompok yang dipilih secara <i>simple random sampling</i> .	Penelitian ini sama dengan penelitian Ngoma dkk, 2019 dan harahap, 2019. Yang mengatakan pendapatan keluarga mempengaruhi status gizi kurang balita.

					CI95%=5,973-42,128). Analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anak dan pola asuh ibu dengan status gizi anak balita.			
12.	Perbedaan sosial ekonomi dan pengetahuan gizi ibu balita gizi kurang dan gizi normal.	Amelinda calida rahma, siti rahayu nadhiroh.	2016	Sosial ekonomi dan pengetahuan gizi ibu balita gizi kurang	Penelitian menunjukkan ada perbedaan tingkat pengetahuan gizi ibu ($p = 0,004$) pada balita gizi kurang dan gizi normal. Tidak terdapat perbedaan pendidikan ibu ($p = 0,189$), pekerjaan ibu ($p = 0,387$), pendapatan keluarga ($p = 0,189$), dan pengeluaran konsumsi ($p = 0,515$) antara balita gizi kurang dan gizi normal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan gizi ibu balita gizi kurang dan gizi normal tetapi tidak ditemukan perbedaan sosial ekonomi pada kedua kelompok. Oleh karena itu,	Jumlah sampel penelitian sebesar 19 balita	Pengambilan data menggunakan metode wawancara dengan kuesioner	Pada penelitian ini terdapat perbedaan tingkat pengetahuan gizi ibu balita gizi kurang dan gizi normal dan ditemukan perbedaan sosial ekonomi pada kedua kelompok.

					perlu adanya peningkatan pengetahuan gizi dan keterampilan ibu melalui pelatihan.			
13.	Beberapa Faktor Risiko Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Balita 12-59 Bulan di kota Pontianak	Alamsyah dedi	2017	Faktor resiko gizi kurang dan gizi buruk pada balita.	Analisis multivariat menemukan 2 variabel yang berhubungan bermakna dengan prevalensi gizi buruk sedang dan berat pada balita usia 12-59 bulan, yaitu sikap terhadap makanan yang buruk (OR=6,980) dan kesehatan lingkungan yang buruk (OR=5,033), disimpulkan bahwa faktor resiko yang berhubungan dengan prevalensi gizi buruk sedang dan berat adalah sikap ibu yang buruk terhadap makan, kesehatan yang buruk dan lingkungan yang buruk.	Peneliti hanya menggunakan Analisis data yang sudah ada	Sampel sebanyak 80 orang dengan penilaian gizi menggunakan pengukuran antropometri.	Penelitian ini menjelaskan bahwa makanan yang buruk serta lingkungan yang buruk bisa menjadi resiko gizi kurang dan gizi buruk pada balita.

C. Matriks Langkah III

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan. Bidan diharapkan waspada dan bersiap mencegah diagnosis/masalah potensial terjadi. Langkah ini akan menguraikan beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada gizi kurang jika tidak ditangani dengan tepat.

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Makalah marasmus	Shifa novianti	2017	Marasmus terjadi ketika tubuh kekurangan energi (kalori) yang sering terjadi pada balita.	Marasmus yaitu komplikasi dari gizi kurang yang diakibatkan oleh kurangnya protein pada balita ataupun anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan: Faktor: pola makan protein, kepadatan penduduk, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor infeksi.	-	Penjelasan tentang teori marasmus yang sangat lengkap dan mudah di baca	Komplikasi gizi kurang akan berdampak buruk yang terdiri dari tiga jenis yaitu: marasmus, kwashiorkor dan marasmus kwashiorkor jika tidak ditangani secara cepat dan

					<p>Gejala: hilangnya lemak pada subkutan, wajah lonjong, kulit berkeriput, otot-otot lemah dan atrofi, thorax dan tulang tampak jelas, dinding perut hipotonus, dan suhu tubuh yang rendah akibat hilangnya penahanan panas pada tubuh.</p> <p>Pencegahan: pemberian ASI eksklusif yang rutin, pemberian makanan yang tinggi protein/MPASI, Pemberian gizi yang seimbang</p>			tepat.
2.	Komplikasi gizi kurang (kwashiorkor)	Andira	2016	Kwashiorkor	<p>Gizi kurang yang berkepanjangan dan tidak diatasi secara cepat akan berdampak buruk yang mengakibatkan terjadinya kekurangan protein, yang terdiri dari marasmus, kwashiorkor dan marasmus kwashiorkor.</p>	-	-	Tidak ada perbandingan

					Kwashiorkor adalah kondisi kekurangan atau ketiada asupan protein yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membuat sel baru.			
3.	<i>Underweight, Stunting, dan Wasting</i> pada Anak Usia 12-18 Bulan	Rahimah Nur Hanifah, Julistio Djais, Siti N Fatimah	2020	<i>Underweight, Stunting, dan Wasting</i> pada Anak	<p>Dari 99 anak yang diteliti, terdapat 4 anak <i>underweight</i> (4%), 11 anak <i>stunting</i> (11%), dan 5 anak <i>wasting</i> (5%). Ketika data dibagi berdasarkan kebutuhan nutrisi utama anak didapatkan dari MP-ASI.</p> <p>Dapat disimpulkan bahwa malnutrisi pada anak usia 12-18 bulan masih tergolong sedang, namun terdapat peningkatan malnutrisi pada anak usia 15-18 bulan dan perlu adanya sosialisasi dan pelatihan praktik pemberian MP-ASI pada anak.</p>	-	-	Tidak ada perbandingan

4.	kwashiorkor	Bahar Van	2007	Kwashiorkor merupakan salah satu Kekurangan Energi Protein(KEP)	Gejala umum kwashiorkor adalah hipoalbuminemia, edema, penurunan imunitas, dermatitis, anemia, apatis dan terjadi penipisan rambut. Dibandingkan marasmurs, kwashiorkor memiliki tingkat morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi dengan penanganan yang lebih sulit karena penderita kwashiorkor lebih rentan terkena infeksi. Kadar serum albumin dipilih sebagai indikator dalam menentukan kondisi kwashiorkor didasarkan bahwa albumin adalah plasma protein yang paling banyak ada di darah manusia.	-	-	Tidak ada perbandingan
5.	Perkembangan Balita Dengan Metode KPSP	Isnani nurhayati, anas rahmad hidayat	2019	Perkembangan balita dengan metode KPSP terhadap status gizi.	Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan balita sesuai dengan umurnya yaitu berjumlah 68,5%. Status gizi balita menurut BB/U	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif	Populasi penelitian ini adalah seluruh balita yang berjumlah 1.132	Penelitian ini menjelaskan Balita dengan kondisi defisiensi gizi harus lebih

	terhadap Status Gizi Balita di Boyolali				adalah baik. Menurut TB/U dengan status gizi normal 81,5%, menurut BB/TB status gizi normal 71,7%, menurut IMT/U status gizi normal 78,3%. Ada hubungan identifikasi perkembangan dengan metode KPSP terhadap status gizi balita ditunjukkan dengan $p \text{ value} = 0,000 < \alpha = 0,05$. Kesimpulan dimana ada hubungan Identifikasi perkembangan balita dengan metode KPSP terhadap status gizi balita.		balita dan peneliti juga mengatakan sejalan dengan penelitian sebelumnya.	diperhatikan oleh orang tua atau pihak kesehatan
6.	<i>Underweight, Stunting, Wasting</i> dan kaitannya terhadap asupan makan, pengetahuan ibu, dan	Risky Amelia Rhamania, Ratno Adrianto, Reny Noviasy	2020	asupan makan, pengetahuan ibu, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara asupan makanan dengan WAZ ($p=0,000$), HAZ ($P=0,000$) dan WHZ ($p=0,021$), pengetahuan ibu tentang MP-ASI dengan WAZ ($p=0,041$), HAZ ($p=0,010$), dan WHZ	Peneliti tidak mencantumkan berapa lama penelitiannya	Peneliti menjelaskan dengan baik dan mudah dipahami	penelitian ini sejalan dengan penelitian mutika 2018 dan rahma 2016 yang mengatakan pengetahuan ibu sangat berpengaruh

	pemanfaatan pelayanan kesehatan				(p=0,010), pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan WAZ (p=0,007), HAZ (p=0,009), dan WHZ (p=0,006) terdapat hubungan positif yang signifikan antara asupan makan balita, pengetahuan ibu tentang MP-ASI dan pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan status gizi balita.			terhadap gizi kurang
7.	Vitamin D Sebagai Terapi Potensial Anak Gizi Buruk	Lisa Dwi Aryani, M Aldy Riyandry	2019	Vitamin D Sebagai Terapi Potensial Anak	<p>Hasil penelitian ditemukan terdapat pengaruh vitamin D terhadap kenaikan berat badan sebagai hasil kumulatif lemak di jaringan adiposa sehingga cukup potensial sebagai terapi gizi buruk.</p> <p>Keadaan malnutrisi berat dikaitkan dengan adanya defisiensi vitamin D karena tipisnya jaringan adiposa dimana jaringan ini merupakan tempat penyimpanan metabolik aktif vitamin D yaitu</p>	Peneliti tidak mencantumkan berapa lama penelitiannya	Mudah dipahami dan dibaca	Tidak ada perbandingan

					bentuk 25-hidroksivitamin D. pemberian vitamin D sangat membantu meningkatkan berat badan untuk tinggi atau panjang z-score anak-anak malnutrisi berat.			
8.	Penanggulangan Malnutrisi Anak Melalui Pembuatan Stiff Oorid Mango dengan Bahan Baku Lokal Kenya	Muhammad Harianto, Wardani, Sutriso	2014	Malnutrisi Anak	Gizi buruk yang berkepanjangan pada anak-anak dapat menurunkan produktifitas, pertumbuhan fisik, kapasitas kerja, dan kinerja reproduksi pada saat dewasa. Selain itu gizi buruk dapat meningkatkan angka kesakitan, risiko gangguan penyakit kronik pada saat dewasa, dan angka kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). BBLR meningkatkan risiko bayi mengalami gangguan fisik, mental dan kecerdasan.	Peneliti tidak menjelaskan dalam bentuk tabel	-	penelitian ini sejalan dengan penelitian rahma 2016 yang mengatakan ada hubungan gizi kurang dengan pengetahuan ibu balita
9.	Stunting Pada Anak Usia	Abdul Rahman,	2019	Stunting Pada Anak	Berdasarkan hasil wawancara peneliti ditemukan bahwa yang	Peneliti kurang menjelaskan		Stunting pada anak merupakan

	Dini	Anita Rosyan, Ayu Riyanti			mempengaruhi stunting ialah pola makan yang tidak memenuhi gizi seimbang sejak anak lahir sampai usia dua tahun, pemberian ASI eksklusif yang kurang dari 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) terlalu dini (kurang dari enam bulan), pengasuhan orang tua yang kurang tepat, tidak mengenalkan toilet training kepada anak sejak dini, sanitasi lingkungan yang kurang baik.	berapa lama penelitiannya	-	dampak dari defisiensi nutrient selama seribu hari pertama kehidupan, hal ini menimbulkan gangguan perkembangan fisik anakyang <i>irreversible</i> .
10.	The correlation between intake of zinc, iron, and vitamin C with incidences of undernutrition in children	Anggun Novita Sari, Sugeng Maryanto, Purbowati	2020	Hubungan asupan Zink, zat besi dan vitamin C dengan kejadian gizi kurang pada anak usia 6-24 bulan.	Presentase kategori asupan zink kategori kurang yaitu 47,4% baik 37,2%, dan lebih 23,1%. Presentase kategori asupan zat besi dengan kategori kurang yaitu 46,2%, baik 34,6% dan lebih 19,2%. Presentase kategori asupan vitamin C dengan kategori kurang yaitu 43,6%, baik	-	Sampel dalam penelitian ini adalah 78 anak yang didapatkan melalui perhitungan rumus Slovin	Peneliti menjelaskan Terdapat hubungan yang signifikan antara asupan zink, zat besi, dan vitamin C dengan kejadian gizi kurang pada anak.

	aged 6-24 months old at leyanan village east ungaran semarang regency				33,3% dan lebih 23,1%. Ada hubungan yang bermakna antara asupan zink, zat besi dan vitamin C dengan kejadian gizi kurang pada anak dengan nilai ($p=0,03$; $p=0,002$; $p=0,045$).			
11.	Upaya Peningkatan Status Gizi Balita Malnutrisi Akut Berat Melalui Program <i>Home Care</i>	Titih Huriyah, Laksono Trisnantoro, Fitri Haryanti, Madarina Julia	2015	Peningkatan Status Gizi Balita Malnutrisi Akut Berat Melalui Program <i>Home Care</i>	Berdasarkan indikator berat badan menurut tinggi badan, 2,6% balita mengalami malnutrisi akut berat. Penelitian ini menunjukkan setelah program <i>home care</i> , terjadi peningkatan yang signifikan pada status gizi balita ($p<0,05\%$). Pada akhir intervensi, terjadi penurunan kejadian malnutrisi akut berat dari 100% menjadi 56,7% ($p<0,05$).	Penelitian ini tidak mengatakan berapa lama penelitiannya	Sampel yang digunakan sebanyak 56 balita malnutrisi akut di dua wilayah, yaitu 33 balita di Kota dan 23 balita di Kabupaten dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling	penelitian ini mengatakan dengan program <i>home care</i> bisa menurunkan kejadian malnutrisi pada balita

D. Matriks Langkah IV

Pada langkah ini bidan atau dokter mengidentifikasi perlunya segera melakukan konsultasi atau melakukan kolaborasi bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya dengan kondisi klien.

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Konseling tentang pola asuh makan sebagai upaya mengubah pengetahuan ibu yang memiliki balita Gizi Kurang	Lia Kamila, Diani Aliansy, Rozalia Febi Cindy	2018	pola asuh makan sebagai upaya mengubah pengetahuan ibu yang memiliki balita Gizi Kurang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat pengetahuan responden sebelum diberikan konseling cukup dan setelah diberikan intervensi berupa konseling didapatkan hasil bahwa seluruhnya responden memiliki pengetahuan baik. Kesimpulan pada penelitian ini terdapat perbedaan pengetahuan antara sebelum dan sesudah diberikan konseling tentang pola asuh makan pada balita status gizi	peneliti tidak mencantumkan berapa lama penelitiannya	Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah total sampling yaitu sebanyak 34 responden	penelitian ini menjelaskan untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang pola asuh makan pada balita status gizi kurang sebelum dan sesudah diberikan konseling

					kurang.			
2.	Peran Perawat Terhadap Pencegahan Gizi buruk Pada Balita Di Kabupaten Klaten	Sri Partini, Sumantri, Titis Senssusia	2016	Peran Perawat Terhadap Pencegahan Gizi buruk Pada Balita	Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai peran perawat terhadap pencegahan balita gizi buruk didapatkan hasil sebagai berikut peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi, peran perawat sebagai pendidik, konsultan, kolaborator, koordinator dan advokat klien.	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.	Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai peran perawat terhadap pencegahan balita gizi kurang	Peneliti ini menjelaskan pentingnya peran petugas kesehatan khususnya perawat dengan status gizi balita
3.	Kolaborasi Perawat Dan Ahli Gizi Di Posyandu Balita Puskesmas Jetak, Kabupaten	Maria Dyah Kurniasari, Kristiawan Nugroho, Yuni Sofia Ranty	2019	Kolaborasi Perawat Dan Ahli Gizi Di Posyandu Balita	Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya dukungan perawat dalam upaya peningkatan status gizi balita melalui kolaborasi perawat dan ahli gizi untuk meningkatkan layanan kesehatan status gizi balita. Perawat ikut membantu ahli gizi di lapangan dalam hal	Penelitian ini merupakan penelitian survey analitik.	Tehnik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku KIA	Pada penelitian ini menjelaskan Perawat, bidan dan kader turut memberikan dukungan kepada tenaga gizi dalam upaya peningkatan status gizi balita

	Semarang				<p>pemberian pendidikan kesehatan dan pemeriksaan fisik pada balita. Perawat tetap memberikan asuhan keperawatan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perawat turut memberikan dukungan kepada tenaga gizi dalam upaya peningkatan status gizi balita setiap bulan di Posyandu.</p>		dan kohor	<p>setiap bulan dan meningkatkan kecukupan gizi balita dengan melakukan pemeriksaan tanda vital tanda, melihat perubahan nutrisi pada balita melihat turgor, nafsu makan, kemampuan absorpsi bising usus, pengukuran TB dan BB</p>
4.	Peran Perawat Terhadap Pencegahan Gizi Buruk pada Balita	Sumantri, Titis Senssusia	2018	Pencegahan Gizi Buruk pada Balita	<p>Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai peran perawat terhadap pencegahan balita gizi buruk didapatkan hasil sebagai berikut peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi,</p>	Peneliti tidak mencantumkan berapa lama penelitiannya	-	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perawat dalam penanganan masalah gizi buruk pada balita</p>

					peran perawat sebagai pendidik, konsultan, kolaborator, koordinator, dan advokal klien.			
5.	Peran Bidan dalam penanganan masalah gizi pada balita di wilayah kerja puskesmas pargarutan	Hennyati Harahap	2015	Peran Bidan dalam penanganan masalah gizi pada balita	Hasil penelitian ini menjelaskan masalah gizi kurang dan gizi buruk. Bidan berperan dalam menangani masalah gizi dengan cara memberikan makanan tambahan, memantau tumbuh kembang balita, dan melakukan penyuluhan berkaitan dengan penanganan masalah gizi. Bidan meningkatkan mutu pelayanan dan berperan aktif terutama dalam memberikan pendidikan kesehatan yang menyeluruh, memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada ibu berkaitan dengan permasalahan gizi, baik itu nutrisi dan pengobatan masalah gizi yang	peneliti tidak mencantumkan berapa lama penelitiannya dan berapa sampel yang digunakan	Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bidan dalam penanganan masalah gizi pada balita

					dialami balitanya.			
6.	Peran Tim Terapi Gizi (TTG) dalam Mengatasi Malnutrisi Pasien Selama diRawat di Rumah Sakit	Ida Siti Nurparida, Dewi Marhaeni DH, Nita Arisanti	2017	Peran Tim Terapi Gizi (TTG) dalam Mengatasi Malnutrisi	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya TTG di Rumah Sakit terbukti dalam mengatasi malnutrisi dan memberikan manfaat lainnya yaitu mencegah berlanjutnya proses malnutrisi dan dampaknya. Peran TTG dalam mengatasi malnutrisi pasien selamam dirawat di Rumah Sakit tergantung pembagian tugas apa yang diserahkan pada masing-masing anggota tim, dimana kegiatan terapi gizi terdiri dari skrining, anemnesis, pemeriksaan fisik dan tindakan sehingga perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terapi gizi dapat berjalan dengan baik.	Tidak mencantumkan berapa lama penelitiannya	Mudah dipahami dan dibaca	Tidak ada perbandingan
7.	Peran Perawat dan	Angela Dwi Pitri,	2019	Peran Perawat dan Ahli Gizi	Perawat menyatakan perannya sebagai 1) <i>first line</i> dalam	peneliti tidak menjelaskan	Peneliti menjelaskan	-

	Ahli Gizi dalam Pemberian Nutrisi	Suhartini Ismail, Meira Erawati			dukungan nutrisi, 2) memaksimalkan asupan makanan dengan modifikasi lingkungan, 3) Ahli gizi sebagai konselor dan perawat sebagai asesor. Perawat bertanggung jawab agar target nutrisi tercapai meliputi kualitas dan kuantitas. Perannya sebagai first line didefinisikan sebagai manager yang memiliki otonomi untuk mengatur pengelolaan nutrisi yang didukung oleh faktor lingkungan. Ahli gizi berperan sebagai konselor dan berinteraksi dengan perawat yang memiliki peran sebagai asesor. Perawat dan ahli gizi saling berinteraksi dan saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan ahli sebagai bentuk kolaborasi interdisipliner.	berapa lama penelitiannya	dengan baik dan mudah dipahami	
--	-----------------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--------------------------------	--

8.	Hubungan Pengetahuan, Sikap, Dukungan Suami, Kontrol Perilaku, Dan Niat Ibu Dengan Perilaku Kadarsi Ibu Balita Gizi Kurang	Mustafyani Dwi Aulidina, Dan Mahmudiono Trias	2017	Sikap pengetahuan dukungan dan perilaku ibu terhadap balita gizi kurang	<p>Hasil penelitian dari lima indikator KADARZI, keluarga yang menimbang berat badan setiap bulan (74,14%), konsumsi aneka ragam makanan (55,17%), garam beryodium (100,0%), ASI eksklusif (51,72%), dan suplemen gizi (100,0%). Pengetahuan sedang (53,4%) dan kurang (46,6%). Pendapatan keluarga ($p = 0,040$), pengetahuan ibu mengenai KADARZI ($p = 0,033$) dan niat ibu melakukan KADARZI ($p = 0,048$) mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku KADARZI. Sedangkan sikap, dukungan suami, dan kontrol perilaku tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku KADARZI. Pengetahuan dan niat ibu</p>	Tidak menjelaskan berapa lama penelitian	-	Menurut penelitian Trisnawati 2011 tentang Hubungan Persepsi Ibu tentang Posyandu dengan Perilaku Kunjungan Balita Ke Posyandu. Dalam penelitian Jatmika <i>et al</i> 2014 tentang Dukungan Tenaga Kesehatan Untuk Meningkatkan Niat Ibu Hamil Dalam Memberikan ASI Eksklusif
----	--	---	------	---	--	--	---	---

					melakukan KADARZI mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku KADARZI.			
9.	Kolaborasi Perawat dan Ahli Gizi di Posyandu Balita Puskesmas Jetak Semarang	Maria Dyah Kurniasari, Kristiawan P. A Nugroho, Yuni Sofia Yanty	2019	Kolaborasi Perawat dan Ahli Gizi di Posyandu Balita	Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya dukungan perawat dalam upaya peningkatan status gizi balita melalui kolaborasi perawat dan ahli gizi untuk meningkatkan layanan kesehatan status gizi balita. Perawat ikut membantu ahli gizi di lapangan dalam hal pemberian pendidikan kesehatan dan pemeriksaan fisik pada balita. Perawat tetap memberikan asuhan keperawatan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.	Penelitian ini merupakan penelitian survey	Tehnik pengumpulan data menggunakan data sekunder	Pada penelitian ini menjelaskan bahwa perawat dan ahli gizi bisa bekerja sama untuk memperbaiki gizi balita.
10.	Studi Kasus Asuhan Gizi Pada Balita Gizi Kurang	Riza Muliana	2018	Pola asuhan gizi pada balita	Balita gizi kurang dengan z-skor BB/U : -2,51 SD diagnosa gizi kurang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan ibu dan pola asuh orang tua,	Penelitian ini sampel yang digunakan sedikit	Peneliti menjelaskan dengan baik dan mudah dipahami dan	Pola asuh yang kurang baik ditambah dengan pendidikan orang tua yang kurang akan

				<p>kolaborasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pendidikan kesehatan tentang pentingnya gizi balita terhadap pertumbuhan dan perkembangan 2. edukasi pemberian MP-ASI dengan gizi yang seimbang dengan biaya yang terjangkau atau memanfaatkan bahan yang ada disekitar rumah atau hasil olah sendiri serta kebersihan lingkungan. 		dibaca	mempegaruhi statu gizi balita.
--	--	--	--	---	--	--------	--------------------------------

E. Matriks Langkah V

Pada langkah ini dilakukan Perencanaan secara menyeluruh dan rasional terhadap masalah pada balita dengan gizi kurang berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pada Balita Gizi Kurang di Puskesmas Jakenan Kabupaten Pati	Sri Wahyunin gsh ,Mike Indriana Devi	2017	Pemberian makanan tambahan pada balita	Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah program PMT pada balita dalam proses perencanaannya berjalan baik. petugas puskesmas memberikan pelayanan maksimal dan inovatif dalam pemberian makanan tambahan. Sedangkan dalam proses pemantauan juga berjalan sangat baik, karena pihak puskesmas sangat memperhatikan perkembangan balita gizi kurang peran ibu balita dan peran lintas sektor dalam proses peningkatan status gizi. Dari penelitian ini didapatkan simpulan bahwa	Penelitian ini lebih fokus pada pendidikan kesehatan kurang melakukan praktek langsung	Peneliti menjelaskan dengan baik dan mudah di baca dan dipahami	dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dengan program PMT bisa meningkatkan pertumbuhan balita gizi kurang

					evaluasi program pemberian makanan tambahan pada balita kurang gizi berjalan baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi program.			
2.	Program Perbaikan Gizi Balita di Puskesmas Wonosalam 1 Kabupaten Demak	Dinar Aditya, Hartuti Purnaweni	2018	Program Perbaikan Gizi Balita	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan program perbaikan gizi terdapat 5 ketentuan yang digunakan berupa pelaksanaan perbaikan gizi balita melalui pemberian PMT dan vitamin A, pemantauan berat badan balita, kegiatan posyandu dan sosialisasi gizi balita. Ketentuan pelaksanaan program peningkatan balita dari desa sudah tepat dan sesuai. Belum tercapai ketentuan tercapai target. Akurasi lingkungan belum berjalan dengan baik dilihat dari pihak swasta yang belum bergabung dengan pemerintah. Akurasi proses hasilnya benar.</p>	Peneliti tidak mencantumkan beberapa lama penelitiannya	-	Tidak ada perbandingan

3.	Program Penanggulangan Gizi Buruk pada Anak Balita di Puskesmas Jakenan Kabupaten Pati	Aeda Ernawati	2019	Gizi Buruk pada Anak Balita	<p>Hasil penelitian terkait input menunjukkan jumlah petugas gizi di puskesmas jakenan masih kurang. Saranan dan prasaranan sudah cukup, program penanggulangan gizi buruk sudah berjalan, namun masih ada kendala yaitu: petugas gizi yang kurang, pengetahuan dan keterampilan kader posyandu, kesadaran masyarakat tentang masalah gizi rendah. Output program menunjukkan masih banyak balita yang belum meningkat status gizinya karena adanya penyakit bawaan. Upaya perbaikan penanganan gizi buruk dapat dilakukan melalui: 1) penambahan petugas gizi; 2) peningkatan kualitas kader posyandu melalui pelatihan; 3) penanganan gizi buruk melalui program 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak bayi</p>	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.	Peneliti membandingkan dengan penelitian sebelumnya	dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dengan program PMT bisa meningkatkan pertumbuhan balita gizi kurang
----	--	---------------	------	-----------------------------	---	---	---	--

					dalam kandungan.			
4.	kajian penanganan anak gizi buruk dan prospeknya	Arnelia	2015	penanganan anak gizi buruk	<p>hasil penelitian yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam tatalaksana anak gizi buruk. Beberapa studi penanganan rawat jalan termasuk yang dilakukan di Indonesia menunjukkan angka kesembuhan hingga >75 persen. Pendekatan baru ini cukup menjanjikan untuk berhasil dan apabila dilakukan secara bersama sama dengan penanganan rawat inap diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan agar target 100 persen penanganan penderita gizi buruk di Indonesia sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor gizi Departemen Kesehatan dapat dicapai.</p>	tidak dijelaskan berapa lama penelitian	Penelitian ini menjelaskan dengan baik tentang rawat inap untuk gizi buruk	Sesuai protokol WHO tahun 1999, penanganan gizi buruk harus dilakukan melalui rawat inap di RS

5.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Gizi Kurang di Kelurahan Sungai Malang	Reno Affrin	2018	Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Gizi Kurang	Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program perbaikan gizi balita gizi kurang berjalan dengan baik diketahui dari 1) aspek lingkungan di bentuk lingkungan ekonomi masyarakat dan pola asuh keluarga, 2) kelompok sasaran, sebagian pelaksana program belum mengetahui target yang ditetapkan, 3) kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan imunisasi dan pelaksana posyandu, 4) pengelola manajemen dan pengawasan.	Peneliti tidak mencantumkan beberapa lama penlianiannya	Mudah dipahami dan dibaca	Tidak ada perbandingan
6.	Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Nindy Sawitri	2018	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mendeteksi, menanggulangi, dan memantau balita gizi buruk dan gizi kurang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu: pemberian makanan tambahan (PMT balita), pemberian makana tambahan (PMT) KLB gizi buruk, MP-ASI,	Peneliti tidak mencantumkan beberapa lama penlianiannya	Program ini mematau balita gizi buruk dan gizi kurang	Dengan Menyediakan sarana dan prasarana dapat mendukung kegiatan penanganan gizi buruk dam gizi

					pendampingan kasus gizi buruk, pembentukan TFC/PPG (pusat pemantauan gizi), pelatihan keluarga sadar gizi (KADARZI), pemantauan status gizi (PSG), konsling menyusui, KP-ASI, dan pemberian vitamin dan obat-obatan.			kurang
7.	Pengembangan program perbaikan gizi masyarakat di kabupaten Bogor	Miza, Teuku iqbal, lala m hakim, Dedi budiman	2016	perbaikan gizi masyarakat	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua kegiatan yaitu:</p> <p>Kegiatan program gizi harian adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penigkatan pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman lain pada bayi berumur nol sampai 6 bulan 2. Pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin selama 90 	Tidak dijelaskan dalam bentuk tabel	Mudah dibaca dan dipahami	program perbaikan gizi masyarakat sangat berpengaruh pada gizi balita

					<p>hari</p> <p>3. Pemberian PMT pemulihan pada balita keluarga miskin yang ditangani di sarana kesehatan sesuai tatalaksana gizi kegiatan program gizi bulanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan pertumbuhan balita dengan pemeriksaan fisik 2. Evaluasi gizi buruk dan gizi kurang 			
8.	Peranan Pemberian Cookies Kedelai Mocaf Terhadap Peningkatan Berat Badan Balita Gizi Kurang	Muslimah, Hanifa Zakiah, Judiono, Dan Suparman	2019	Pemberian cookies kedelai mocaf untuk peningkatan BB balita	Dari penelitian diketahui bahwa cookies kedelai mocaf dapat membantu meningkatkan asupan energi dan zat gizi balita sehingga terdapat peningkatan berat badan sebesar 0,33 kg. pemberian cookies kedelai mocaf berpengaruh terhadap peningkatan berat badan balita gizi kurang ($p>0,05$).	Penelitian ini tidak mengatakan berapa lama penelitiannya	Mudah dimengerti dan dipahami	golongan PMT-P seperti cookies kedelai mocaf dapat membantu meningkatkan asupan energi dan zat gizi balita sehingga terdapat peningkatan berat badan

								Slamet Widodo, Hadi Riyadi, Ikue Tanziha 2015
9.	Hubungan status gizi dengan perkembangan balita usia 1-3 tahun	Lely Khulafa'ur Rosidah, Suleni Harsiwi	2017	Hubungan status gizi dengan perkembangan balita	<p>Hasil penelitian dari 35 responden didapatkan sebagian besar status gizi balita adalah gizi baik sebanyak 25 responden (71.5%). Sebagian besar perkembangan balita adalah sesuai sebanyak 23 responden (65.7%). Berdasarkan hasil uji statistik <i>Spearman Rank</i> didapatkan t hitung 3,647 dan bila dibandingkan dengan t tabel ($\alpha = 0,025$) adalah 1,960 maka t hitung > t tabel yaitu $3,647 > 1,960$ sehingga H_1 diterima artinya ada hubungan antara status gizi dengan perkembangan balita.</p> <p>Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status gizi akan mempengaruhi perkembangan balita. Dalam pertumbuhan dan perkembangan</p>	Jenis penelitian yang digunakan adalah observasi analitik	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko dan masalah klinis pasien.	Dalam upaya penatalaksanaan penyakit dibutuhkan peran keluarga untuk mencapai tujuan terapi yang maksimal.

					anak memerlukan zat gizi agar proses pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan baik.			
10.	Hubungan Pendidikan Dan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Gizi Kurang Dan Gizi Buruk Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Beruntung Raya Banjarmasin	Fie Khaeriyah, Syamsul Arifin, Lisda Hayati	2020	Pendidikan dan pola asuh ibu dengan kejadian gizi kurang	Hasil penelitian memakai uji <i>chi-square</i> didapatkan nilai $p=0,000$ untuk pendidikan dan $p=0,001$ untuk pola asuh. Kesimpulan terdapat adanya hubungan antara pendidikan dan pola asuh ibu dengan kejadian gizi kurang dan gizi buruk pada balita. Kecukupan gizi anak dapat dipengaruhi usia sehingga semakin beranjak usia anak, maka semakin bertambah jumlah kebutuhan gizi yang diperlukan. Ibu perlu menguasai makanan kesukaan anak dan kebiasaan makan anaknya dalam pola asuh anak.	Dalam penelitian ini tidak mencantumkan berapa lama penelitiannya	pengambilan sampel memakai teknik cluster proportional random sampling sebanyak 50 ibu balita.	Masalah status gizi balita dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu konsumsi makanan, status infeksi, pola asuh, pendidikan ibu dan kesehatan lingkungan.

F. Matriks Langkah VI

Mengidentifikasi pelaksanaan dari semua rencana terkait masalah balita dengan gizi kurang berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Evektifitas Konsumsi Nugget Tempe Kedelai Terhadap Kenaikan Berat Badan Balita Gizi Kurang	Mariyam, Arfiana, Tuti Sukini	2017	Mengonsumsi Nugget Tempe Kedelai Terhadap Kenaikan Berat Badan	Penelitian menunjukkan rata-rata berat badan balita gizi kurang sebelum mengonsumsi nugget tempe kedelai 9,9945 Kg dengan berat badan balita terendah 7,87 Kg dan berat badan balita tertinggi 13,01 Kg, rata-rata berat badan balita gizi kurang sesudah mengonsumsi nugget tempe kedelai 10,1855 Kg dengan berat badan terendah 8 Kg dan berat badan tertinggi 13,25 Kg dengan rata-rata kenaikan berat badan adalah 0,19 Kg. konsumsi nugget	Peneliti tidak mencantumkan berapa lama penelitiannya	Peneliti membandingkan dengan berbagai penelitian sebelumnya	Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Ardiana (2011) yang menunjukkan bahwa sebelum mendapatkan perlakuan tahu-tempe semua balita mengalami gizi buruk

					tempe kedelai terhadap kenaikan berat badan balita gizi kurang dengan nilai p value=0,005.			
2.	Hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi balita	Daini Zulmi	2019	pemberian ASI eksklusif dengan status gizi balita	<p>Hasil analisis univariat bahwa balita yang mengalami gizi kurang dan buruk dijadikan sebagai sampel kasus sebanyak 20 (33,33%) balita dan yang mengalami gizi baik dijadikan kelompok kontrol sebanyak 40 (66,67%) balita, hampir setengahnya (38,33%) balita tidak diberikan ASI eksklusif. Hasil analisis bivariat terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat pemberian ASI eksklusif dengan status gizi balita (p-value= 0,00) OR = 8,04. Tenaga kesehatan diharapkan agar lebih meningkatkan pelayanan dalam memberikan KIE (konseling, informasi dan</p>	Penelitian ini tidak mengatakan berapa lama penelitiannya	Populasi pada penelitian ini adalah 379 balita jumlah sample 60 balita dengan rasio 1:2.	Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Normayanti dan Susanti (2013) dengan p-value 0,003 dan nilai OR 6,667, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara riwayat pemberian ASI Eksklusif dengan status gizi balita karena sebelum usia 6 (enam) bulan, sistem pencernaan bayi belum dapat mencerna makanan

					edukasi) tentang ASI eksklusif, meyakinkan setiap ibu untuk bisa menyusui secara eksklusif sejak masa kehamilan hingga menyusui untuk memberikan ASI eksklusif dan diteruskan sampai 2 tahun yang menjadi tahap awal balita memiliki status gizi yang baik.			atau minuman selain ASI sehingga jika dipaksakan maka berpotensi menderita infeksi terutama pada sistem pencernaan.
3.	Pengaruh suplementasi ikan nila terhadap asupan anak dengan gizi buruk	Darmawansyah, Andi Faradillah, Nadyah	2019	suplementasi ikan nila terhadap asupan anak dengan gizi buruk	Dari hasil penelitian Pengaruh Suplementasi Kapsul Ikan Nila Terhadap Asupan Anak Gizi Buruk didapatkan tidak ada perbedaan bermakna antara asupan energi dan protein Pre dan post dalam kelompok intervensi dan antar kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Walau dari data nampak ada kenaikan angka asupan energi dan protein pre dan post dalam	tidak mencantumkan berapa lama penelitian	Subyek penelitian sebanyak 42 sampel	Asupan dan kecukupan energi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi. Meskipun beberapa penelitian lain mengatakan bahwa: asupan nutrisi yang salah satunya ikan dapat mempengaruhi status gizi sementara status gizi dapat

					kelompok intervensi, namun secara statistik tidak bermakna.			dipengaruhi oleh asupan energi Hendrawati 2017
4.	Pengaruh Pemberian Taburia Terhadap konsumsi Dan Berat Badan Anak Balita Gizi Kurang Usia 6-24 Bulan Di Desa Kembang Kerang Daya	Cok Iwan Jaya Mardawan, Chandra dewi.	2017	Pemberian taburia terhadap konsumsi berat badan balita gizi kurang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian taburia pada anak balita gizi kurang usia 6-24 bulan dapat meningkatkan rata-rata konsumsi energi dan protein serta berat badan secara signifikan ($p < 0,05$). Peningkatan rata-rata konsumsi energi pada kelompok yang diberi taburia sebesar $695,5,9 \pm 74,9$ kalori dan protein sebesar $19,9 \pm 3,09$ gram, sedangkan rata-rata peningkatan berat badan sebesar $0,659 \pm 0,17$ kg.	Tidak dijelaskan berapa lama penelitiannya	Pada penelitian ini menggunakan tabel sehingga mudah dipahami	Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mursalim (2009), dengan pemberian multi-mikronutrien terjadi peningkatan status gizi yang bermakna pada balita gizi kurang dengan parameter berat badan menurut tinggi badan pada usia 6-59 bulan dengan asupan zat gizi makro yang cukup
5.	Pengaruh pendidikan gizi terhadap pengetahuan ibu dan berat	Yohanes Dachi	2018	Pendidikan gizi terhadap pengetahuan ibu dan berat badan	Hasil uji peringkat bertanda Wilcoxon menunjukkan nilai $p = 0,001 < 0,05$ terlihat adanya perbedaan pengetahuan respondent sebelum dan	Penelitian menggunakan desain kuasi eksperimen	Peneliti menjelaskan dengan baik dan mudah	Pendidikan orang tua sangat penting untuk memperbaiki status gizi balita (Yulia & Indonesia, 2018)

	badan (BB) anak gizi kurang usia 12-59 bulan di wilayah kerja puskesmas petumbukan yohanes dachi				<p>sesudah pemberian pendidikan gizi, dan berdasarkan uji paired sampel t test menunjukkan nilai $p=0.001 < 0.05$ yang menunjukkan adanya perbedaan antara BB anak gizi kurang sebelum dan sesudah pemberian pendidikan gizi pada responden.</p> <p>Pendidikan gizi yang diberikan yaitu: Pola makan, pengaruh media dengan pola makan, frekuensi pola makan anak, makanan pendamping ASI.</p>		dibaca	
6.	Determinan status gizi kurang pada balita di puskesmas belawan kota medan	Duma Jerriyah Harahap, Zuraidah Nasution, Aida Fitria	2019	status gizi kurang pada balita	<p>Hasil penelitian Ada hubungan antara Keadaan infeksi (OR 5,320 CI:1,485-19,064), riwayat pemberian ASI eksklusif (OR 6,333 CI:1,751-22,912), pendapatan (OR 9,308 CI:1,778-48,723),</p>	Tidak mencantumkan berapa lama penelitian	Sampel penelitian adalah 48 balita	Penelitian ini sejalan dengan Poppy Fitriyani, Junaiti Sahar dan Wiwin Wiarsih didapatkan sistem pendukung keluarga dan

				<p>jumlah anggota keluarga (OR 4,200 CI:1,228-14,365), pengetahuan ibu tentang gizi (OR 6,333 CI:1,751-22,912) dan kebiasaan makan (OR 7,286 CI:2,034-26,102) dengan status gizi kurang pada balita.</p> <p>Hasil penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam didapatkan bahwa variabel pola asuh dan peran suami merupakan determinan status gizi kurang pada balita. Kebiasaan makan, pola asuh pemberian makan, pemeliharaan kesehatan dan peran suami sebagai determinan status gizi kurang pada balita.</p>			<p>masyarakat yang ditunjukkan berdasarkan jawaban responden bahwa dukungan sosial keluarga dapat dijadikan kekuatan dalam upaya memenuhi kebutuhan nutrisi dengan gizi kurang</p>	
7.	Hubungan Riwayat Pemberian	Yohan Yuanta, Didik	2018	Pemberian ASI dan pola asuh ibu dengan	Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar riwayat pemberian ASI pada balita	penelitian ini hanya mencari hubungan	Jumlah subjek sebanyak 174 balita yang	Pola asuh balita yang kurang baik di Indonesia salah

	ASI Dan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Gizi Kurang Pada Anak Balita	Gunawan Tamtomo, Diffah Hanim		kejadian gizi kurang	adalah ASI eksklusif pada kasus (83,9%) dan kontrol (97,7%). Hasil analisis menunjukkan bahwa riwayat pemberian ASI (OR=0,123;p<0,05), pola asuh pemberian makan (p<0,05) dan pola asuh kesehatan (p<0,05) berhubungan secara signifikan dengan kejadian gizi kurang. Terdapat hubungan antara riwayat pemberian ASI dan pola asuh ibu dengan kejadian gizi kurang.	balita yang diberikan ASI eksklusif dan pola asuh ibu yang baik.	diambil secara <i>Fixed Disease Sampling</i> , melalui wawancara langsung dan observasi	satunya ditunjukkan dengan masih rendahnya dukungan ibu dalam memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak balita.
8.	efektivitas pemberian PMT modif berbasis kearifan lokal terhadap peningkatan status gizi balita gizi	Irwan, Mery Sunarto Kadir, Lia Amalia	2020	pemberian PMT modif berbasis kearifan lokal terhadap peningkatan status gizi balita gizi kurang	Hasil penelitian Sebelum diberikan PMT modifikasi seluruh balita berstatus gizi kurang, rata-rata berat badan balita pada kelompok PMT modifikasi 8,438 kg ± 1,1451 dan pada kelompok PMT Modif 8,725 kg ± 1,2303. Sesudah diberikan intervensi,	Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	sampel sebanyak 30 balita dengan rentang umur 12-59 bulan.	Pemberian makan pada balita bertujuan untuk memasukkan dan memperoleh zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh untuk proses tumbuh kembang. Zat gizi berperan

	kurang dan stunting				<p>pada kelompok PMT modifikasi balita dengan status gizi kurang sebanyak 1 orang (12,5%) dan yang naik status gizinya menjadi gizi baik sebanyak 7 orang (87,5%), terjadi peningkatan berat badan rata-rata menjadi $9,088 \text{ kg} \pm 1,1740$.</p> <p>PMT Modifikasi efektif terhadap peningkatan status gizi balita gizi dimana pada kelompok PMT Modif didapatkan $t \text{ hitung} = 19,858$ dan $\rho = 0,000$ dan pada PMT Modif didapatkan $t \text{ hitung} = 14,967$ dan $\rho = 0,000$.</p>			dalam memelihara dan memulihkan kesehatan anak serta berguna sebagai sumber energi untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari.
9.	Pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap status gizi	Irviani A. Ibrahim, Syarfaini, Nur Muslimah .N	2018	Pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap status gizi kurang balita	Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap status gizi kurang pada anak balita usia 12-36 bulan, maka dapat di	Penelitian ini hanya dilakukan 30 hari	Jumlah sampel sebanyak 36 orang dengan teknik pengambilan	Intervensi PMT mampu memberikan dampak positif pada penambahan berat badan anak balita

	kurang pada anak balita			<p>tarik kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pengaruh pemberian biskuit ubi jalar ungu terhadap status gizi kurang pada anak balita usia 12-36 bulan, 2. Ada pengaruh asupan energi sebelum dan setelah intervensi pada anak balita usia 12-36 bulan 3. Tidak ada pengaruh asupan protein sebelum dan setelah intervensi pada anak balita usia 12-36 bulan. 4. Tidak ada pengaruh asupan vitamin C sebelum dan setelah intervensi pada anak balita usia 12-36 bulan. 5. Ada pengaruh asupan zat besi sebelum dan setelah intervensi pada anak balita usia 12-36 bulan 6. Ada pengaruh berat badan sebelum dan setelah intervensi 		sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> .	
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

					pada anak balita usia 12-36 bulan.			
10.	Pencegahan balita gizi kurang melalui penyuluhan media lembar balik gizi	Deni Era Nugrahaeni	2018	Pencegahan balita gizi kurang melalui penyuluhan media lembar balik gizi	<p>Hasil uji statistika dengan Paired t-test pun juga menunjukkan bahwa nilai p value $(0,000) > \alpha (0,05)$. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peningkatan tingkat pengetahuan dan sikap ibu balita. Ibu dengan tingkat pendidikan yang baik meningkat dari 16 ibu (23,9%) naik menjadi 39 ibu (58,2%). Ibu dengan sikap baik meningkat dari 14 ibu (20,9%) menjadi 36 orang (53,7%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap-sikap ibu balita mengenai gizi balita sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan kesehatan dengan media lembar balik.</p>	Peneliti tidak mencantumkan berapa lama penelitiannya	Populasi penelitian adalah sebanyak 81 ibu balita dan peneliti juga membandingkan dengan penelitian sebelumnya	Salah satu cara untuk meningkatkan derajat kesehatan yaitu dengan memperbaiki status gizi masyarakat terlebih pada balita, apabila balita diberikan asupan gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhannya maka akan menghambat laju pertumbuhan dan perkembangan dari balita tersebut.

11.	Doa dan Zikir Muslim	Tim Redaksi Qultum media	2017	Doa saat sakit	<p>Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw menegaskan “Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga kemungkinan: (yaitu) dikabulkan segera doanya itu, atau dia akan menyimpan baginya di akhirat kelak, atau dia akan menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya.”</p> <p>Para sahabat pun berkata. “Kalau begitu kita memperbanyaknya (berdoa).” Beliau bersabda, “Allah lebih banyak (memberikan pahala)”. (HR. Bukhari, Ahmad, Al-Hakim, Tirmidzi).</p>	Tidak diberikan penjelasan untuk setiap doa hanya terjemahan.	Keunggulan buku ini dilengkapi dengan tata cara doa dan berzikir dalam segala situasi dan kebutuhan doa dan zikir.	Rasulullah saw bersabda “Doa itu bermanfaat terhadap apa yang sudah menimpa atau yang belum menimpa. Oleh karena itu, wahai sekalian hamba Allah, hendaklah kalian berdoa.” (HR. At-Tirmidzi, dan Al-Hakim).
-----	----------------------	--------------------------	------	----------------	--	---	--	--

G. Matriks Langkah VII

Mengevaluasi semua perencanaan dan pelaksanaan pada balita dengan gizi kurang berdasarkan referensi yang telah didapatkan

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Evaluasi Kelas Gizi Terhadap Kejadian Balita Gizi Kurang Di Puskesmas Karang Taliwang Kota Mataram	Angger suradana pasek	2019	Mengevaluasi hasil kelas gizi terhadap gizi kurang	Dari hasil evaluasi diketahui kejadian gizi kurang sebesar 3,5% tahun 2017 dan 2,3% tahun 2018. Sebagian besar gizi kurang disebabkan oleh tingkat pengetahuan gizi yang kurang sehingga mempengaruhi prevalensi gizi kurang dan buruk, mempertahankan status gizi baik, mencegah kekurangan gizi pada anak, merubah perilaku dan kebiasaannya masyarakat dalam mengatasi masalah gizi dilingkungannya.	Peneliti tidak mengatakan berapa lama penelitian	penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu informan utama merupakan petugas gizi puskesmas dan informan pendukung merupakan kepala puskesmas, kader, dan	sebagian besar gizi kurang disebabkan oleh tingkat pengetahuan gizi yang kurang sehingga mempengaruhi pola asuh terhadap balita. Tujuan dari kelas gizi, yaitu

							peserta.	mengurangi prevalensi balita gizi kurang dan buruk, mempertahankan status gizi baik, mencegah kekurangan gizi pada anak, merubah perilaku dan kebiasaannya masyarakat dalam mengatasi masalah gizi di lingkungannya .
2.	Evaluasi Program Pemberian Makanan	Sri wahyunin gsih, miki indriana	2017	Evaluasi Pemberian Makanan Tambahan	Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah program PMT pada balita dalam proses perencanaannya berjalan baik.	Penelitian kualitatif dengan menggunakan	Penelitian mengevaluasi semua kegiatan	Pemberian makanan tambahan merupakan

	Tambahan (PMT) Pada Balita Gizi Kurang	devi		pada balita gizi kurang	petugas puskesmas memberikan pelayanan maksimal dan inovatif dalam pemberian makanan tambahan. Sedangkan dalam proses pemantauan juga berjalan sangat baik, karena pihak puskesmas sangat memperhatikan perkembangan balita gizi kurang peran ibu balita dan peran lintas sektor dalam proses peningkatan status gizi. Dari penelitian ini didapatkan simpulan bahwa evaluasi program pemberian makanan tambahan pada balita kurang gizi berjalan baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi program.	an metode <i>In-Depth Interview</i> (Wawancara Mendalam).	program pemberian makanan tambahan pada balita.	program pemberian zat gizi yang bertujuan memulihkan gizi penderita yang kurang dengan memberikan makanan dengan kandungan gizi yang cukup sehingga kebutuhan gizi penderita dapat terpenuhi, diberikan setiap hari untuk memperbaiki status gizi.
3.	Evaluasi Program	sakinah	2020	Program pemberian	Hasil penelitian yang didapatkan masih ada beberapa kendala pada	Penelitian SDM kader	Pengevaluasian dalam	SDM dalam program hal

	Peberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Pada Balita Kategori Garis Merah Dan Kurus			makanan tambahan pemulihan pada balita	program PMT-P dari input yaitu SDM kader tidak mendapatkan program pelatihan PMT-P, sarana dan prasarana juga masih belum dimiliki, untuk metode juga belum optimal karena yang dimiliki juknis hanya petugas gizi. Dari variabel proses terdapat hambatan di bagian distribusi yaitu ketelambatan ibu balita sasaran untuk mengambil PMT-P bulan selanjutnya, untuk ketepatan sasaran masih belum sesuai juknis PMT-P dan tidak ada pemantauan secara langsung kebalita sasaran yang telah diberikan PMT-P.	yang belum memadai dan belum melakukan pelatihan PMT-P	penelitian ini cukup baik melalui dari kesiapan kader sarana dan prasarana hingga sasaran	yang harus terpenuhi dalam menjalankan program penanggulangan gizi kurang
4.	Evaluasi Program Penanganan Gizi Kurang Melalui Asuhan Community Feeding Center (CFC) Pada	Herman dan Rahman	2016	Program Community Feeding Center	Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap dilaksanakannya program CFC, program CFC mendapatkan dukungan positif dari masyarakat, ibu balita mendapatkan pengetahuan lebih tentang gizi untuk anak balitanya serta ibu balita termotivasi untuk memperbaiki status gizi anak balitanya dengan mengikutsertakan	Metode penelitian kualitatif	Penelitian ini dilaksanakan dengan baik	Pelaksanaan program CFC dilihat dari angka gizi kurang pada anak balita setiap tahunnya mengalami

	Anak Balita Di Puskesmas Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu				anakny.			penurunan dan terjadi peningkatan berat badan anak balita yang mengikuti program CFC.
5.	Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Terhadap Balita Gizi Kurang Dan Buruk	Wihelmus Kopong Doren, Tadeus A. L Reghaleta, dan Dominirse p O. Dodo	2019	Evaluasi program pemberian makanan tambahan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: input jumlah tenaga gizi kurang, puskesmas membutuhkan 1 orang tenaga kesehatan masyarakat, peralatan yang dimiliki masih kurang di bagian labolatorium harus minta pengadaan dari dinas kesehatan kota dan dana untuk pendistribusian PMT-P sudah tersedia, proses dalam perencanaan sudah baik namun pelaksanaan dari pendistribusian PMT-P, output sudah tepat sasaran serta cakupan program juga sudah mencapai indicator capaian yang ditetapkan.	Penelitian ni lebih ke pada pemberian PMT-P	Proses evaluasi program PMT-P Yang Sangat Baik	Keberhasilan suatu program komunitas di kesehatan juga di pengaruhi oleh SDM dan pegetahua yag dimiliki penyulu atap pemberi layanan kesehtan Sakinah, (2020).
6.	Efektifitas	Arum	2020	pemberian	Hasil uji t dua sampel berpasangan	referensi	Sebanyak 38	Penelitian di

	pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan pada status gizi balita	Sekar Rahayunin g Putri, Trias Mahmudiono		makanan tambahan (PMT) pemulihan pada status gizi	menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada status gizi balita indeks BB/TB setelah PMT Pemulihan dan saat penelitian yang ditunjukkan dengan nilai $p=0.430$ ($p>0,05$). Data yang didapat menunjukkan bahwa setelah 5 bulan selesai PMT Pemulihan ada penurunan persentase balita dengan status gizi normal dari 68,4% menjadi 63,2% dan ditemukan balita dengan status gizi sangat kurus sebesar 2,6%. Selain itu diketahui ada penurunan rata-rata <i>z-score</i> balita saat penelitian dengan setelah 3 bulan PMT Pemulihan sebesar 0.13.	yang di gunakan kurang banyak	balita dengan riwayat mendapat PMT Pemulihan dipilih secara acak menggunakan metode <i>simple random sampling</i> .	Kota Semarang memberikan hasil yang serupa bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada perubahan rerata nilai <i>Z-score</i> indeks antropometri BB/TB sebelum dan sesudah PMT Pemulihan
7.	Evaluasi program penanggulangan gizi kurang di wilayah kerja puskesmas poncol kota	Firmansyah Kholiq Pradana Putra Haryadi	2019	Evaluasi program penanggulangan gizi kurang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelacakan balita gizi kurang hanya mencapai 88% terkendala oleh ibu balita gizi kurang yang tidak membawa balitanya ke Posyandu. Penyuluhan dan konseling gizi belum maksimal karena masih	Peneliti tidak mencantumkan berapa lama penelitiannya	Jumlah sampel penelitian sebesar 19 balita tiap kelompok yang dipilih secara <i>simple</i>	Masalah gizi tidak terlepas dari masalah makanan karena masalah gizi timbul sebagai

	semarang				kurangnya pengetahuan ibu mengenai pola asuh balita yang terkena gizi kurang. Capaian pemberian makanan tambahan yang masih dibawah sasaran 100 % yaitu sebesar 50 %. Pemberian Vitamin dan mineral yang terdapat salah sasaran karena terkendala data yang kurang lengkap.	a	<i>random sampling.</i>	akibat kekurangan atau kelebihan kandungan zat gizi dalam makanan.
8.	efektivitas pemberian PMT modif berbasis kearifan local terhadap peningkatan status gizi balita gizi kurang dan stunting	Irwan Mery T, Sunarto Kadir, Lia Amalia	2020	pemberian PMT modif berbasis kearifan local terhadap peningkatan status gizi balita gizi kurang	Hasil penelitian Sebelum diberikan PMT modifikasi seluruh balita berstatus gizi kurang, rata-rata berat badan balita pada kelompok PMT modifikasi 8,438 kg \pm 1,1451 dan pada kelompok PMT Modif 8,725 kg \pm 1,2303. Sesudah diberikan intervensi, pada kelompok PMT modifikasi balita dengan status gizi kurang sebanyak 1 orang (12,5%) dan yang naik status gizinya menjadi gizi baik sebanyak 7 orang (87,5%), terjadi peningkatan berat badan rata-rata menjadi 9,088 kg \pm 1,1740.	Jenis penelitian ini adalah dengan pendekatan analitik dengan menggunakan cross sectional study.	sampel sebanyak 30 balita dengan rentang umur 12-59 bulan.	Pemberian makan pada balita bertujuan untuk memasukkan dan memperoleh zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh untuk proses tumbuh

					PMT Modifikasi efektif terhadap peningkatan status gizi balita gizi dimana pada kelompok PMT Modif didapatkan t hitung = 19,858 dan ρ = 0,000 dan pada PMT Modif didapatkan t hitung = 14,967 dan ρ = 0,000.			kembang.
9.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Pemuliahan (PMT-P) Untuk Penderita Balita Gizi Kurang	Noer Arsyita Aryani	2019	pelaksanaan program pemberian makanan tambahan pemulihan	Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini belum berjalan dengan optimal seperti tahap masukan terdapat kendala yaitu belum memiliki sarana gedung untuk menyimpan paket makanan, kemudian tahap proses meliputi perencanaan seperti perhitungan harian balita, tidak ada kelompok ibu balita, kemudian tahap pemantauan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan terdapat anggota keluarga ikut mengomsumsi, serta tahap pencatatan belum dilaksanakan harian daya terima terhadap makanan yang diberikan cakupan program PMT-P.	Program tidak sesuai sasaran	Memberikan informasi yang lengkap tentang hasil pengevaluasian program pemberian makanan tambahan pemulihan	Evaluasi pelaksanaan program perlu dilaksanakan untuk mengetahui sampai dimana keberhasilann program tersebut ridwan, 2016

10.	Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT - P) pada Balita Gizi Kurang di Kabupaten Tuban	Elya Sugianti	2017	program PMT-P pada balita gizi kurang	Bahan PMT-P juga sudah memadai, namun untuk petunjuk pelaksanaan belum terdistribusikan dengan baik, sarana dan prasarana dan pendanaan belum juga belum terdistribusi dengan baik, sarana prasarana dan pendanaan juga masih kurang. Sementara dari segi proses, proses persiapan seperti pedataan balita dan sosialisasi serta rapat koordinasi sudah berjalan dengan baik, demikian hanya dengan proses penyimpanan dan pengangkutan masih kurang memadai. Sedangkan untuk proses pemantauan, pertimbangan sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi untuk monitoring selama program PMT-P. Namun, untuk proses penyimpanan dan pengangkutan masih kurang memadai.	Peneliti tidak mencantumkan berapa lama penelitiannya	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode purposive	Tepat sasaran dalam pemenuhan gizi dalam perbaikan status gizi pada balita.
-----	--	---------------	------	---------------------------------------	--	---	---	---

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telaah *Evidence Based Learning* Asuhan 7 Langkah Varney Berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan pada balita dengan gizi kurang. Berdasarkan referensi yang telah di temukan. Dalam hal ini pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan asuhan kebidanan dengan 7 langkah varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potesial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium. Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Pada langkah ini, bidan mengumpulkan data dasar awal lengkap.

Pada langkah pertama ini identifikasi dilakukan segera pada balita dengan gizi kurang, semua informasi akurat dan lengkap dikumpulkan dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Didalam langkah ini akan diperoleh

berbagai referensi tentang definisi, tanda dan gejala, serta faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan dari referensi matriks langkah I diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi, tanda dan gejala dan faktor penyebab balita mengalami gizi kurang.

Penelitian ini mengatakan bahwa Penyakit infeksi, pengetahuan gizi ibu, konsumsi energi dan konsumsi protein berperan penting sebagai faktor risiko kejadian gizi kurang pada balita. Gizi kurang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diatas yang mengakibatkan pertumbuhan balita terhambat(bili, dkk 2020).

Pada penelitian ini juga mengatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan status gizi adalah konsumsi energi, konsumsi protein, penyakit infeksi, tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan. Kurangnya bahan-bahan makanan didalam tubuh balita akan berdampak buruk untuk anak(Lutviana, 2017).

Dari penelitian didapatkan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur didapati gizi kurang sebanyak 40%. Faktor yang berhubungan dengan status gizi balita adalah riwayat ASI eksklusif dan riwayat infeksi berulang. ASI eksklusif sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak dimana akan terpenuhi kebutuhannya sejak kecil(Nopa, 2019).

Masalah gizi pada balita disebabkan oleh pola makan yang diberi orang tua tidak sesuai dengan keadaan anak, dengan kurangnya ekonomi keluarga dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan dengan riwayat infeksi yang di alami oleh

anak akan berpengaruh pada kondisinya seperti akan lebih sering sakit dan lamanya penyembuhan pada penyakitnya(Ratufelan, 2018).

Pada penelitian ini mengatakan pendapatan keluarga dan pola asuh ibu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak dimana dengan keluarga yang tidak bisa mencukupi kebutuhan anak untuk pertumbuhannya dan pola asuh ibu yang salah dengan kurangnya pengetahuan yang dimiliki ibu tentang kebutuhan gizi anak(Ngoma dkk, 2019).

Pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa variable pola asuh makanan dan pemeliharaan kesehatan pada balita dan pendapatan keluarga merupakan penentu status gizi kurang pada balita. Pola asuh makanan ialah dengan memberikan makan tepat waktu, makanan yang bervariasi dan bergizi. Pemeliharaan kesehatan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan pendapatan keluarga bisa mempengaruhi pertumbuhan anak dengan terpenuhinya kebutuhannya(Harahap dkk, 2019).

Nilai koefisien dua variabel menunjukkan nilai sebesar 0,277 atau 27,7% pendapatan orang tua mempengaruhi status gizi anak pada masa pandemi COVID-19. Pendapatan orang tua di Kecamatan Koja Jakarta Utara yang menurun selama pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan pemenuhan gizi seimbang pada anak setiap hari yang berdampak terhadap status gizi anak(Aziza, 2021).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel penyakit infeksi dan pola asuh anak seperti pemberian imunisasi dan pola asuh ketika anak sakit memiliki

hubungan yang bermakna dengan status gizi balita dimana akan berdampak untuk kesehatan anak(Handayani, 2017).

Penelitian ini mengatakan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anak dan pola asuh ibu dengan status gizi balita. Faktor pekerjaan ibu merupakan faktor yang paling berhubungan dengan status gizi anak balita dimana dengan kesibukan ibu sehingga tidak terlalu memperhatikan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak balita(Putri, n.d.).

Penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan gizi ibu balita gizi kurang dan gizi normal dan ditemukan perbedaan sosial ekonomi pada kedua kelompok, dimana sosial ekonomi berperan penting untuk perkembangan anak seperti kebutuhan untuk terpenuhinya gizi balita(Rahma, n.d, 2016).

Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan gizi kurang ialah faktor secara langsung adalah makanan yang tidak seimbang dan adanya penyakit infeksi. Kurangnya asupan makanan yang tidak seimbang merupakan salah satu indikasi terjadinya status gizi kurang pada balita sedangkan adanya penyakit infeksi yang merupakan pengaruh yang kurang signifikan, dan faktor secara tidak langsung seperti tingkat pendapatan keluarga, pola asuh anak juga akan berdampak untuk pertumbuhan dan masa depan anak serta status gizi balita(Lestari, 2019).

Dalam penelitian ini terjadinya status gizi kurang pada anak balita yaitu Jarak kelahiran yang terlalu rapat, sosial ekonomi, penyakit infeksi, tingkat

ekonomi orang tua, dan kurangnya pendidikan orang tua yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi gizi kurang pada balita. Dimana dengan jarak kelahiran yang terlalu rapat ibu tidak fokus untuk melihat perkembangan pertumbuhan balita. Status ekonomi yang rendah, kurangnya pendidikan orang tua serta penyakit infeksi balita dan kurangnya pengetahuan serta kemauan ibu untuk melakukan pendekatan terhadap tenaga kesehatan untuk mengetahui pertumbuhan balita dengan baik (Irianti, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa gizi kurang adalah keadaan tubuh yang kekurangan asupan dalam waktu yang cukup lama berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik dari pengukuran antropometri, tinggi badan dan berat badan -2 SD sampai -3 SD berdasarkan ketentuan WHO, serta banyak faktor yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung dipengaruhi oleh penyakit infeksi dan tidak cukupnya asupan gizi yang tidak kualitas dan kuantitas, sedangkan secara langsung dipengaruhi oleh jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, pola asuh anak yang kurang memadai, kurang baiknya sanitasi lingkungan serta rendahnya ketahanan pangan dalam keluarga.

Dari banyaknya hasil penelitian yang dibaca banyak persamaan yang menjelaskan faktor terjadinya gizi kurang pada anak balita, hal ini tindakan Bidan memberikan tambahan edukasi mengenai pentingnya kebersihan rumah serta lingkungan di sekitar dan bahaya gizi kurang bagi balita, serta pendidikan tentang gizi pada anak balita untuk mengurangi terjadinya gizi kurang pada anak balita.

Langkah II: Perumusan Daignosis/Masalah Aktual

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan sehingga mengetahui bahwa pasien mengalami gizi kurang. Dikemukakan setiap referensi yang ditemukan dan disimpulkan perbedaan dan persamaan dari setiap tata diagnosis dari sumber referensi yang satu dengan referensi yang lainnya.

Dari referensi matriks langkah II diatas maka didapatkan tindakan untuk menegakkan diagnosis bahwa penderita mengalami gizi kurang. Diagnosis gizi kurang dapat ditegakkan apabila Berat badan dan tinggi badan anak berada di bawah kurva pertumbuhan.

Penelitian ini mengatakan bahwa Penyakit infeksi, pengetahuan gizi ibu, konsumsi energi dan konsumsi protein berperan penting sebagai faktor risiko kejadian gizi kurang pada balita. Gizi kurang terjadi disebabkan oleh bebrapa faktor diatas yang mengakibatkan pertumbuhan balita terhambat(bili, dkk 2020).

Pada penelitian ini juga mengatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan status gizi adalah konsumsi energi, konsumsi protein, penyakit infeksi, tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan. Kurangnya bahan-bahan makanan didalam tubuh balita akan berdampak buruk untuk anak(Lutviana, 2017).

Dari penelitian didapati status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur didapati gizi kurang sebanyak 40%. Faktor yang

berhubungan dengan status gizi balita adalah riwayat ASI eksklusif dan riwayat infeksi berulang. ASI eksklusif sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak dimana akan terpenuhi kebutuhannya sejak kecil(Nopa, 2019).

Masalah gizi pada balita disebabkan oleh pola makan yang diberi orang tua tidak sesuai dengan keadaan anak, dengan kurangnya ekonomi keluarga dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan dengan riwayat infeksi yang di alami oleh anak akan berpengaruh pada kondisinya seperti akan lebih sering sakit dan lamanya penyembuhan pada penyakitnya(Ratufelan, 2018).

Pada penelitian ini mengatakan pendapatan keluarga dan pola asuh ibu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak dimana dengan keluarga yang tidak bisa mencukupi kebutuhan anak untuk pertumbuhannya dan pola asuh ibu yang salah dengan kurangnya pengetahuan yang dimiliki ibu tentang kebutuhan gizi anak(Ngoma dkk, 2019).

Pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa variable pola asuh makanan dan pemeliharaan kesehatan pada balita dan pendapatan keluarga merupakan penentu status gizi kurang pada balita. Pola asuh makanan ialah dengan memberikan makan tepat waktu, makanan yang bervariasi dan bergizi. Pemeliharaan kesehatan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan pendapatan keluarga bisa mempengaruhi pertumbuhan anak dengan terpenuhinya kebutuhannya(Harahap dkk, 2019).

Nilai koefisien dua variabel menunjukkan nilai sebesar 0,277 atau 27,7% pendapatan orang tua mempengaruhi status gizi anak pada masa pandemi

COVID-19. Pendapatan orang tua di Kecamatan Koja Jakarta Utara yang menurun selama pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan pemenuhan gizi seimbang pada anak setiap hari yang berdampak terhadap status gizi anak(Aziza, 2021).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel penyakit infeksi dan pola asuh anak seperti pemberian imunisasi dan pola asuh ketika anak sakit memiliki hubungan yang bermakna dengan status gizi balita dimana akan berdampak untuk kesehatan anak(Handayani, 2017).

Penelitian ini mengatakan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anak dan pola asuh ibu dengan status gizi balita. Faktor pekerjaan ibu merupakan faktor yang paling berhubungan dengan status gizi anak balita dimana dengan kesibukan ibu sehingga tidak terlalu memperhatikan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak balita(Putri, n.d.).

Penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan gizi ibu balita gizi kurang dan gizi normal dan ditemukan perbedaan sosial ekonomi pada kedua kelompok, dimana sosial ekonomi berperan penting untuk perkembangan anak seperti kebutuhan untuk terpenuhinya gizi balita(Rahma, n.d, 2016).

Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan gizi kurang ialah faktor secara langsung adalah makanan yang tidak seimbang dan adanya penyakit infeksi. Kurangnya asupan makanan yang tidak seimbang merupakan salah satu indikasi terjadinya status gizi kurang pada balita

sedangkan adanya penyakit infeksi yang merupakan pengaruh yang kurang signifikan, dan faktor secara tidak langsung seperti tingkat pendapatan keluarga, polah asuh anak juga akan berdampak untuk pertumbuhan dan masa depan anak serta status gizi balita(Lestari, 2019).

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa gizi kurang pada balita akan berdampak pada pertumbuhan fisik, mental, kecerdasan, penurunan kemampuan berfikir dan berbicara, kurang aktif dan jaringan otot-otot kurang. Yang diakibatkan oleh status ekonomi, pengetahuan masyarakat, pola asuh, kurangnya makanan pendamping ASI, sulitnya petugas kesehatan terdekat, kurangnya pengetahuan ibu dalam memberikan makanan yang sehat dan bergizi.

Langkah III: Perumusan Diagnosis/Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan. Bidan diharapkan waspada dan bersiap mencegah diagnosis/masalah potensial yang terjadi.

Langkah ini akan menguraikan beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada balita dengan gizi kurang jika tidak ditangani dengan tepat. Dari beberapa referensi matriks langkah II diatas maka didapatkan masalah potensial yang dapat terjadi pada penderita gizi kurang adalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus gizi buruk tertinggi di Kabupaten Bireuen dengan diperoleh hasil bahwa terdapat kasus gizi buruk sebanyak 3 kasus

pada tahun 2015, 5 kasus pada tahun 2016, 6 kasus pada tahun 2017 dan 8 kasus menderita penyakit infeksi, baik itu penyakit infeksi yang dibawa sejak dalam kandungan maupun selama proses tumbuh kembang. Penyakit infeksi yang terjadi pada balita gizi buruk akan memperparah kondisi balita dan akan menyulitkan dalam hal penyembuhan dan pemulihan keadaan gizi balita, dimana dalam kasus balita gizi buruk dengan adanya penyakit infeksi maka terlebih dahulu hal yang perlu diselesaikan adalah penyakit infeksinya (Wahyuni dkk, 2019).

Faktor terjadinya gizi kurang pada balita sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor sosia ekonomi, faktor pendidikan ibu, faktor penyakit penyerta, kelengkapan imunisasi, namun didapatkan hasil faktor penyebab kasus gizi buruk yang paling dominan adalah faktor penyakit penyerta, kurangnya asupan nutrisi pada balita akan cepat balita merasakan sakit dan mudah mendapatkan penyakit infeksi (Sari N D, 2016).

Status gizi kurang yang dialami anak balita dikarenakan faktor riwayat penyakit infeksi yang merupakan suatu permasalahan yang serius yang harus dihadapi oleh ibu sendiri, Hal tersebut bahwa adanya riwayat penyakit infeksi yang terdapat pada balita ibu dimana balita pernah mengalami infeksi pada saluran pernafasan yang disebut dengan penyakit ISPA, selain itu pernahnya terjadi infeksi pada pencernaan yang memicu penyakit tuberculosis. Semua penyakit yang pernah dialami oleh balita itu sendiri dikarenakan faktor bakteri yang disebabkan oleh sumber makanan serta sanitasi lingkungan yang tidak higienes. Dengan riwayat penyakit infeksi tersebutlah yang membuat terganggunya status gizi balita yang tidak

mendukung terhadap status gizi yang lebih baik untuk dimiliki oleh balita sendiri (Handayani, 2017).

Kekurangan gizi pada masa balita dapat berpengaruh pada perkembangan otak balita sehingga jika tidak ditangani akan mempengaruhi perkembangan mental yang akan mempengaruhi kemampuan berfikir, kemampuan bersosialisasi, kemampuan motorik, dan dapat menyebabkan penyimpangan perkembangan pada balita. Perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan status gizi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan balita (Nurhayati, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara pengetahuan ibu dengan kejadian gizi kurang ($p < 0,05$; OR 13.75), sementara terdapat hubungan bermakna pula antara berat badan lahir rendah dengan kejadian gizi kurang ($p < 0,05$; OR = 16.0). Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian gizi kurang pada balita diantaranya adalah pengetahuan ibu dan berat badan lahir rendah (Minkhatulmaula dkk, 2020).

Gizi kurang pada balita terjadi akibat beberapa faktor seperti pengetahuan gizi ibu, sosial ekonomi. Dimana pengetahuan ibu tentang gizi balita tidak dipraktikkan dalam pola asuh dan pemberian makanan yang baik serta sehat untuk balita dan perlunya adanya peningkatan pengetahuan gizi dan keterampilan ibu dalam pelatihan gizi anak, dan faktor sosial ekonomi yang meliputi pendidikan, pekerjaan, pendapatan keluarga, serta pengeluaran pangan (Rahma, n.d.).

Penyebab terjadinya status gizi kurang pada balita ada hubungan pengetahuan ibu tentang gizi, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, kebiasaan makan.

Faktor penyebab gizi kurang yang paling dominan yaitu faktor pendapatan keluarga dengan pendatan keluarga yang kurang sehingga kebutuhan mengkonsumsi makanan akan kurang dan tidak seimbang(Mutika, 2018).

Faktor utama penyebab balita menderita gizi buruk dan gizi kurang yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan orang tua. Rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan ibu berpengaruh secara signifikan terhadap resiko balita menderita gizi kurang dan pendidikan sangat berpengaruh pada pengetahuan masyarakat terhadap gizi dan kesehatan. Bila pengetahuan rendah maka pola asuh orang tua terhadap anak menjadi kurang baik, selanjutnya implikasinya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang balita(Saputra, 2016).

Keadaan kurang gizi menjadi penyebab meningkatnya angka kematian dan angka kesakitan anak di seluruh dunia, Asupan pada anak dengan kecukupan asupan zat gizi mikro dalam kategori kurang namun kejadian tidak gizi kurang lebih tinggi, karena kejadian gizi kurang dominan utamanya adalah berat badan, berat badan faktor utamanya adalah zat gizi makro, Zat gizi tersebut yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh dan sebagian besar berperan dalam penyediaan energi seperti karbohidrat, protein, dan lemak dalam tubuh(Sari N. A. dkk, 2020).

Berdasarkan indikator berat badan menurut tinggi badan, 2,6% balita mengalami malnutrisi akut berat. Penelitian ini menunjukkan setelah program *home care*, terjadi peningkatan yang signifikan pada status gizi balita($p < 0,05\%$). Pada akhir intervensi, terjadi penurunan kejadian malnutrisi akut berat dari 100% menjadi 56,7% ($p < 0,05$)(Huriah, 2015).

Marasmus yaitu komplikasi dari gizi kurang yang diakibatkan oleh kurangnya protein pada balita ataupun anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan:

Faktor: pola makan protein, kepadatan penduduk, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor infeksi. Gejala: hilangnya lemak pada subkutan, wajah lonjong, kulit berkeriput, otot-otot lemah dan atropi, thorax dan tulang tampak jelas, dinding perut hipotonus, dan suhu tubuh yang rendah akibat hilangnya penahan panas pada tubuh. Pencegahan: pemberian ASI eksklusif yang rutin, pemberian makanan yang tinggi protein/MPASI, Pemberian gizi yang seimbang(Sifa Nofianti, 2017).

Dari hasil berbagai penelitian bahwa gizi kurang dapat mengakibatkan komplikasi yang berat bagi balita, dan apabila balita tidak menjaga nutrisi dan pola makannya serta kurangnya pendidikan, ekonomi kedua orang tua yang tidak mencukupi serta tidak menjaga balitanya seperti akan mengalami gizi buruk dan diikuti dengan timbulnya marasmus, kwashiorkor, penyakit infeksi.

Langkah IV: Tindakan Emergency/ Kolaborasi

Pada langkah ini bidan atau dokter mengidentifikasi perlunya segera melakukan konsultasi atau melakukan kolaborasi bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya dengan kondisi klien. Dari beberapa referensi diatas maka didapatkan tindakan yang dilakukan pada kondisi gizi kurang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat pengetahuan responden sebelum diberikan konseling cukup dan setelah diberikan intervensi berupa konseling didapatkan hasil bahwa seluruhnya responden memiliki pengetahuan baik. Kesimpulan pada penelitian ini terdapat perbedaan pengetahuan antara sebelum dan

sesudah diberikan konseling tentang pola asuh makan pada balita status gizi kurang(Kamila dkk, 2018).

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai peran perawat terhadap pencegahan balita gizi buruk didapatkan hasil sebagai berikut peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi, peran perawat sebagai pendidik, konsultan, kolaborator, koordinator dan advokat klien(Partini, n.d.).

Penyuluhan dan Pendidikan kesehatan tentang pemberian gizi yang baik dan seimbang di puskesmas dan posyandu seperti edukasi tentang gizi seimbang, pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar tubuh serta pemberian makanan tambahan seperti biscuit, bubur kacang ijo yang dilakukan oleh para petugas puskesmas dalam berkolaborasi antara beberapa tenaga kesehatan. Perlunya pemberian makanan tambahan merupakan kolaborasi dengan tenaga kesehatan dan orang tua balita(Kurniasari, 2019).

Pemberian edukasi tentang pola asuh ibu dengan pemberian ASI eksklusif terhadap balita yang menyusui yang akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, pola asuh balita merupakan tindakan kolaborasi yang baik untuk ibu agar ibu mengetahui bahwa pemberian ASI eksklusif sangat baik untuk pertumbuhan balita(Yuanta dkk, 2018).

Hasil penelitian ini menjelaskan masalah gizi kurang dan gizi buruk. Bidan berperan dalam menangani masalah gizi dengan cara memberikan makanan tambahan, memantau tumbuh kembang balita, dan melakukan penyuluhan berkaitan

dengan penanganan masalah gizi. Bidan meningkatkan mutu pelayanan dan berperan aktif terutama dalam memberikan pendidikan kesehatan yang menyeluruh, memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada ibu berkaitan dengan permasalahan gizi, baik itu nutrisi dan pengobatan masalah gizi yang dialami balitanya(Harahap, 2015).

Untuk dapat menurunkan prevalensi gizi kurang (*underweight*) hingga sesuai dengan target MDG's adalah dengan menangkap dan mengobati balita normal-kurus, karena kondisi kurus bersifat akut, sehingga dapat dilakukan dengan pemberian makanan tambahan hingga berat badannya meningkat menjadi normal sesuai dengan tinggi badannya. Perkiraan pencapaian target MDG's di Provinsi Jambi adalah dengan cara mengurangi atau mengobati semua balita berstatus normal-kurus(Kalsum, n.d.).

Malnutrisi primer yang disebabkan karena masalah ekonomi, rendahnya pengetahuan, dan kurangnya asupan gizi. Malnutrisi sekunder adalah gangguan pencapaian kenaikan berat badan yang bukan disebabkan penyimpangan pemberian asupan gizi pada anak karena adanya gangguan pada fungsi dan sistem tubuh. Melakukan kolaborasi dengan pekerja sosial karena hal ini harus menjadi perhatian serius, baik perhatian pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. Pekerja sosial menyadarkan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan menyadarkan pola hidup sehat. Penyadaran pola hidup sehat membuat masyarakat memilih makanan-makanan yang bergizi dan sehat(Bastari dkk, 2018).

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian ASI yang teratur, pola asuh yang baik, serta pendidikan orang tua yang akan mempengaruhi status gizi balita untuk pertumbuhannya, serta pentingnya menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan. Untuk pemberian ASI yang teratur akan menghasilkan gizi yang baik bagi pertumbuhan balita. Pendidikan orang tua yang baik akan mempengaruhi status gizi yang baik (Aulidina, 2017).

Pengetahuan orang tua dan perbedaan ekonomi mempengaruhi status gizi balita serta rentang terjadi gizi kurang pada balita, untuk mengatasi gizi kurang yang perlu kita lakukan ialah memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua balita dan memberikan gizi yang seimbang seperti makanan pendamping ASI yang murah dan bergizi, perlunya pendidikan terhadap ibu mengenai kesehatan dan gizi yang baik untuk balita (Amelia, 2016).

Dalam penelitian ini mengatakan tindakan yang akan dilakukan pada balita gizi kurang adalah kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan edukasi dan pendidikan kesehatan. Gizi kurang akan seimbang dengan pengetahuan ibu merawat balita, pemberian makanan yang seimbang serta vitamin yang sesuai kebutuhan balita dan pemberian makanan pendamping ASI dan pola asuh yang baik akan mempengaruhi gizi yang baik untuk balita (Muliana R, 2018).

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penanganan serta tindakan untuk menangani gizi kurang di butuhkan kolaborasi antara petugas kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, kesehatan masyarakat, ahli gizi dan farmasi untuk memberikan gizi seimbang untuk balita, tindakan yang harus

dilakukan seperti pemeriksaan fisik untuk mengetahui keadaan balita, pemberian makanan pendamping, pemberian vitamin, edukasi pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang dibutuhkan balita.

Langkah V: Rencana Tindakan

Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Pada langkah ini akan diuraikan beberapa referensi yang mencakup penatalaksanaan pada kasus balita dengan gizi kurang.

Berdasarkan dengan referensi yang didapatkan diatas maka didapatkan beberapa penatalaksanaan pada kasus balita dengan gizi kurang. semua rencana asuhan yang dilakukan tersebut berdasarkan pengetahuan, teori yang berkaitan dan terbaru, Tindakan yang dilakukan yaitu:

Penanganan kekurangan gizi melalui program langsung yaitu pemberian makanan tambahan seperti pemberian vitamin dan mineral, sedangkan program tidak langsung yaitu peningkatan pendapatan keluarga, pengendalian harga pangan, peningkatan program kesehatan, seluruh prgram ini harus dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung agar mengurangi terjadinya gizi kurang, pemberian vitamin merupakan salah satu program di berikan kepada balita dan melakukan pengukuran terhadap balita dan memberikan makanan tambahan pada balita gizi kurang terdapat perbedaan tingkat pengetahuan gizi ibu balita gizi kurang dan gizi

normal dan ditemukan perbedaan sosial ekonomi pada kedua kelompok (Amelia, 2016).

Penelitian ini mengatakan bahwa tingkat pendidikan ibu, ekonomi sangat mempengaruhi status gizi balita yang dimana diperlukan perhatian lebih untuk pendidikan kesehatan, peningkatan pendapatan keluarga, pendidikan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan untuk mencegah adanya kurangnya pemahaman orang tua balita terhadap gizi kurang (Putri F. R, 2015).

Pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang merupakan salah satu bentuk intervensi secara langsung untuk menyediakan jenis makanan yang sehat, program pemberian makanan tambahan ini berkolaborasi dengan dokter, bidan, ahli gizi, dan ibu pasien gizi kurang yang di mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi program gizi kurang (Wahyuningsih, n.d.).

penelitian yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam tatalaksana anak gizi buruk. Beberapa studi penanganan rawat jalan termasuk yang dilakukan di Indonesia menunjukkan angka kesembuhan hingga >75 persen. Pendekatan baru ini cukup menjanjikan untuk berhasil dan apabila dilakukan secara bersama sama dengan penanganan rawat inap diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan agar target 100 persen penanganan penderita gizi buruk di Indonesia sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor gizi Departemen Kesehatan dapat dicapai (Arnelia, 2015).

Penelitian ini mengatakan bahwa ada hubungan pengetahuan sikap dan praktik ibu dalam pemberian ASI dan MP-ASI dengan pertumbuhan baduta usia 6-24

bulan. Disarankan agar petugas kesehatan untuk memberikan inovasi baru pada saat penyuluhan terkait ASI dan MP-ASI kepada ibu baduta (Atikah, 2017).

Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa pengetahuan $p= 0,004$ dengan Exp B=0,041, dan sarana prasarana $p=0,022$ dengan Exp B=0,036, merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kinerja petugas gizi dalam penanganan gizi buruk(Cahyono, 2016).

Program home care adalah pemberian asuhan keperawatan dengan cara melakukan kunjungan ke rumah balita malnutrisi. Program home care dilakukan melalui tiga tahapan pendampingan, yaitu fase pendampingan intensif, fase pendampingan mandiri, dan fase pendampingan penguatan. Program *home care* mengajarkan pada ibu atau pengasuh balita tentang cara pengolahan makanan yang sehat untuk balita, pengobatan sederhana bagi anak yang sakit dengan metode konsultasi, program ini dilakukan melalui tiga tahap pendampingan yaitu pendampingan intensif, pendampingan mandiri, pendampingan penguatan. Perawat melakukan lima tahapan proses keperawatan mulai dari pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, penyusunan rencana keperawatan, pelaksanaan intervensi, dan penyusunan evaluasi(Huriah, 2015)

Makanan pendamping sangat berpengaruh penting dalam perbaikan gizi pada balita gizi kurang, cookies kedelai mocaf dapat membantu meningkatkan asupan energi dan zat gizi balita, perlunya edukasi pendidikan terhadap ibu mengenai pola asuh yang baik dan pemenuhan gizi yang seimbang(Muslimah dkk, 2019).

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status gizi akan mempengaruhi perkembangan balita. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak memerlukan zat gizi agar proses pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan baik(Rosidah, 2017).

Dalam perkembangan anak, Ibu perlu menguasai makanan kesukaan anak dan kebiasaan makan anaknya dalam pola asuh anak yang benar, dan Pendidikan ibu adalah salah satu aspek yang esensial di dalam tumbuh kembang anak, sebab dengan pendidikan yang bagus para ibu bisa menyambut semua berita dari luar lebih perihal upaya merawat anak dengan benar, bagaimana cara memelihara kesehatan anaknya, terdapat adanya hubungan antara pendidikan dan pola asuh ibu dengan kejadian gizi kurang dan gizi buruk pada balita(Khaeriyah, n.d.).

Pembahasan di atas perencanaan tindakan dan faktor yang harus diperhatikan dengan baik dan yang dilakukan dalam menangani kekurangan gizi balita adalah pemberian edukasi dan pendidikan kesehatan kepada ibu balita, program penanggulangan gizi kurang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan status gizi anak balita.

Langkah VI: Implementasi/penatalaksanaan

Gizi kurang merupakan satu kondisi dimana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori.

Berdasarkan dengan referensi diatas maka didapatkan beberapa implementasi yang dapat diberikan pada klien dengan balita dengan gizi kurang yaitu pemeriksaan kepada klien dan menjelaskan hal-hal yang dianggap penting, agar klien dapat mengetahui keadaannya serta penatalaksanaan untuk mencegah munculnya komplikasi.

Mengkunsumsi tempe kedelai terhadap kenaikan berat badan anak balita gizi kurang sangat baik untuk dikonsumsi, konsumsi nugget tempe kedelai terhadap kenaikan berat badan balita gizi kurang dengan nilai p value=0,005, kesamaannya pemenuhan gizi balita sesuai dengan pemberian makanan tambahan terhadap balita, perbedaannya mengkonsumsi makanan tambahan bagi anak balita yang mengalami gizi kurang(Mariyam.dkk, 2017).

Bahwa balita yang mengalami gizi kurang dan buruk dijadikan sebagai sampel kasus sebanyak 20 (33,33%) balita dan yang mengalami gizi baik dijadikan kelompok kontrol sebanyak 40 (66,67%) balita, hampir setengahnya (38,33%) balita tidak diberikan ASI eksklusif. Hasil analisis bivariat terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat pemberian ASI eksklusif dengan status gizi balita (p-value= 0,00) OR = 8,04. Tenaga kesehatan diharapkan agar lebih meningkatkan pelayanan dalam memberikan KIE (konseling, informasi dan edukasi) tentang ASI eksklusif, meyakinkan setiap ibu untuk bisa menyusui secara eksklusif sejak masa kehamilan hingga menyusui untuk memberikan ASI eksklusif dan diteruskan sampai 2 tahun yang menjadi tahap awal balita memiliki status gizi yang baik(Zulmi , 2019).

Dari hasil penelitian Asupan dan kecukupan energi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi. Meskipun beberapa penelitian lain mengatakan bahwa: asupan nutrisi yang salah satunya ikan dapat mempengaruhi status gizi sementara status gizi dapat dipengaruhi oleh asupan energi Hendrawati 2017. Pengaruh Suplementasi Kapsul Ikan Nila Terhadap Asupan Anak Gizi Buruk didapatkan tidak ada perbedaan bermakna antara asupan energi dan protein Pre dan post dalam kelompok intervensi dan antar kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Walau dari data nampak ada kenaikan angka asupan energi dan protein pre dan post dalam kelompok intervensi, namun secara statistik tidak bermakna(Darmawansyih et al, 2019).

Hasil penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam didapatkan bahwa variabel pola asuh dan peran suami merupakan determinan status gizi kurang pada balita. Kebiasaan makan, pola asuh pemberian makan, pemeliharaan kesehatan dan peran suami sebagai determinan status gizi kurang pada balita(Harahap, 2019).

Makanan pendamping pemulihan dan pemenuhan gizi seimbang contoh seperti makanan pendamping seperti biscuit, ubi jalar ungu yang mampu meningkatkan status gizi anak, makanan pendamping merupakan makanan pemulih bagi tubuh balita dan pemenuhan gizi seimbang balita diperlukan bantuan dari keluarga untuk mendidik balita hidup sehat(Ibrahim, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tingkat pengetahuan dan sikap ibu balita. Ibu dengan tingkat pendidikan yang baik meningkat dari 16 ibu (23,9%) naik menjadi 39 ibu (58,2%). Ibu dengan sikap baik meningkat dari 14 ibu (20,9%) menjadi 36 orang (53,7%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap- sikap ibu balita mengenai gizi balita sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan kesehatan dengan media lembar balik(Nugrahaeni, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa makanan pendamping sangat dibutuhkan oleh balita yang kekurangan gizi, dengan makanan pendamping balita bisa memenuhi kebutuhan tubuhnya agar gizinya tetap seimbang, dan dengan polah asuh ibu yang baik, pendidikan kesehatan, pemeriksaan balita, serta pemberian MP-ASI yang baik untuk perkembangan balita.

Langkah VII: Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat di anggap efektif juga memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Adapun kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut efektif sedangkan sebagian belum efektif.

Pada prinsip tahapan evaluasi berdasarkan hasil telaah literatur yang didapatkan adalah pengkajian kembali terhadap klien. Untuk menilai ke efektifan tindakan yang

diberikan dan keberhasilan dapat dilihat dari kondisi balita. Evaluasi yang dilakukan pada kasus balita dengan gizi kurang yaitu antara lain keadaan umum, tanda-tanda vital, tanda-tanda syok, dan tanda-tanda infeksi atau masalah potensial yang kemungkinan akan terjadi.

Sebagian besar gizi kurang disebabkan oleh tingkat pengetahuan gizi yang kurang sehingga mempengaruhi prevalensi balita gizi kurang dan buruk, mempertahankan status gizi baik, mencegah kekurangan gizi pada anak, program pemberian makanan tambahan dan pola asuh keluarga yang menjadi program bagi masyarakat untuk meningkatkan gizi balita, merubah perilaku dan kebiasaannya masyarakat dalam mengatasi masalah gizi dilingkungannya(Pasek, 2019).

Masalah kurang gizi masih tidak menjadi masalah prioritas setiap tahun, akan tetapi program PMT tetap dilaksanakan dan berjalan dengan baik dilingkungan masyarakat, pemantauan program pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang, memberikan motivasi konsling terhadap orang tua balita dan makanan tambahan merupakan salah satu program tenaga kesehatan untuk mengurangi terjadinya gizi kurang pada balita(Wahyuningsih, n.d.).

Program PMT yang dilakukan oleh kader dimana mendapatkan program pelatihan untuk mengoptimalkan dan mengevaluasi untuk tidak ada terjadinya gizi kurang pada balita, program gizi ini terdapat pengetahuan orang tua balita yang dimana perlunya bantuan makanan tambahan untuk balita dan pelatihan ini dapat mengoptimalkan pendidikan terhadap ibu balita(Sakinah, 2020).

Pengevaluasian keefektifan program penanganan gizi kurang melalui asuhan community feeding center (CFC) pada balita yang ditemukan keberhasilan program penanggulangan gizi kurang ini kurang berjalan dengan baik dikarenakan petugas pelaksanaan kurang dan tempat pengelolaan makanan tambahan masih kurang, penanganan gizi dapat dilakukan dengan berjalannya program ini dan dengan adanya petugas keehatan(Herman & Rahma, 2016)

Dari penelitian ini mengatakan bahwa pengevaluasian program harus diperhatikan dengan baik, dan didaera peneliatian ini sudah berjalan baik, kesiapan bahan yang cukup, petugas yang memadai hanya saja sasaran yang kurang lengkap dan tepat, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam mengevaluasi program penangulangan gizi kurang sangat dibutuhkan dana dan bahan, inspraktruktur hingga pada sasaran target yang harus tepat sasaran dan kurangnya sasaran yang tepat untuk pemberian edukasi tentang makanan tambahan dan vitamin untuk balita(Doren et al, 2019).

Dari penelitian ini mengatakan bahwa pengevaluasian program penanggulangan gizi kurang tidak berjalan baik dari segi keuangan dan tenaga pelaksana setelah ditinjau akan tetapi dari segi kejadian gizi kurang di wilayah ini menurun dari tahun ke tahun yang membuat terjadinya keberhasilan dari segi frekuensi, pengaruh pendidikan orang tua balita terhadap memberikan makanan tambahan(Ridwan, 2016).

Penelitian ini mengatakan Data yang didapat menunjukkan bahwa setelah 5 bulan selesai PMT Pemulihan ada penurunan persentase balita dengan status gizi normal dari 68,4% menjadi 63,2% dan ditemukan balita dengan status gizi sangat

kurus sebesar 2,6%. Selain itu diketahui ada penurunan rata-rata *z-score* balita saat penelitian dengan setelah 3 bulan PMT Pemulihan sebesar 0.13(Putri, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelacakan balita gizi kurang hanya mencapai 88% terkendala oleh ibu balita gizi kurang yang tidak membawa balitanya ke Posyandu. Penyuluhan dan konseling gizi belum maksimal karena masih kurangnya pengetahuan ibu mengenai pola asuh balita yang terkena gizi kurang. Capaian pemberian makanan tambahan yang masih dibawah sasaran 100 % yaitu sebesar 50 %. Pemberian Vitamin dan mineral yang terdapat salah sasaran karena terkendala data yang kurang lengkap Masalah gizi tidak terlepas dari masalah makanan karena masalah gizi timbul sebagai akibat kekurangan atau kelebihan kandungan zat gizi dalam makanan(Haryadi, 2019).

Pemberian makan pada balita bertujuan untuk memasukkan dan memperoleh zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh untuk proses tumbuh kembang PMT Modifikasi efektif terhadap peningkatan status gizi balita gizi dimana pada kelompok PMT Modif didapatkan t hitung = 19,858 dan $p = 0,000$ dan pada PMT Modif didapatkan t hitung = 14,967 dan $p = 0,000$ (Irwan dkk, 2020).

Dalam penelitian ini mengatakan bahwa makanan pendamping ASI sangat baik dan efektif dalam memperbaiki gizi kurang balita akan tetapi membutuhkan tenaga yang lebih banyak dan dana yang harus kita siapakan dan lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan sasaaran, pendamping MP-ASI merupakan makanan tambahan yang baik untuk tubuh balita agar kesehatannya tetap simbang dan baiknya suatu gizi tergantung dari pola asuh ibu(Sugianti E, 2017).

Dalam melakukan evaluasi pada balita gizi kurang yang perlu di evaluasi adalah pelangsungan kondisi balita dari hasil pemeriksaan antropometri, setelah diberikan makanan pendamping, pemberian penyuluhan, dan tindakan kolaborasi dengan petugas kesehatan lainnya. Gizi kurang dapat teratasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan yang sehat dan bergizi.

B. Implikasi Kebidanan

Gizi kurang adalah suatu kondisi yang di manah tidak seimbangannya makanan yang diperlukan pada saat masa pertumbuhan dan perkembangan balita dengan meliputi nutrisi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama (WHO, 2013).

Gizi kurang adalah salah satu kondisi dimana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata atau $Z_{score} < -2.0$ s/d $Z_{score} -3.0$, anak dengan gizi kurang ditandai dengan berat badan yang menurun 10% atau lebih dibawah berat badan ideal. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi kurang pada balita diantaranya riwayat penyakit infeksi biasanya mengalami perubahan pola makan, sehingga terjadi ketidak seimbangan antara intake dan kebutuhan gizi tubuh. Jika hal ini terjadi dalam waktu yang cukup lama maka terjadilah gizi buruk.

Adapun masalah potensial yang dapat terjadi pada balita dengan gizi kurang diantaranya kerusakan yang bersifat *irreversibel* (tidak dapat dipulihkan). Kekurangan gizi yang lebih fatal berdampak pada perkembangan otak. Kurang

gizi pada usia balita dapat berpengaruh pada perkembangan mental, yang artinya akan mempengaruhi kemampuan berfikir, bersosialisasi baik verbal maupun non verbal.

Dari literature yang didapatkan maka rencana asuhan yang diberikan pada kasus balita dengan gizi kurang berdasarkan diagnosa yaitu mengajurkan untuk makanan pokok berperan sebagai sumber utama energi berasal dari koarbohidrat, lauk sebagai sumber protein, sayur dan buah sebagai sumber mineral dan vitamin. Buah merupakan sumber utama vitamin C karena pada umumnya dimakan dalam keadaan mentah. Sebagai akibat pemasakan, vitamin C pada sayur sebagian rusak. Karena menu ini terdiri atas empat macam makanan dan ternyata sehat, dalam slogan yang mudah dimengerti disebut “4 sehat 5 sempurna”. Karena susu mengandung protein bernilai biologi tinggi dan zat-zat gizi esensial lain dalam bentuk yang mudah dicerna dan diserap, maka susu terutama dianjurkan sebagai unsur kelima bagi golongan manusia yang dibutuhkan relatif lebih banyak protein, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Meningkatkan intensitas pertemuan penyuluhan pada kelompok ibu dengan balita gizi kurang ditiap Posyandu. Penyuluhan terkait dengan materi pola pengasuhan yang baik, ASI-eksklusif, praktik pemberian makan balita (MP-ASI), dan pengolahan pangan yang beragam dilakukan dengan menggunakan media kreatif.

Untuk menangani masalah gizi kurang, diperlukan kesiapan tenaga kesehatan dan masyarakat secara terpadu di tiap jenjang administrasi, termasuk kesiapan

sarana pelayanan kesehatan, seperti Rumah Sakit, Puskesmas hingga Posyandu. Penderita gizi kurang harus dirawat jalan sesuai anjuran dan pedoman WHO yang kemudian ditindaklanjuti dengan pedoman yang disusun oleh Departemen Kesehatan RI.

Setelah melakukan semua asuhan pada balita dengan gizi kurang, maka perlu dilakukan evaluasi. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu menilai ke efektifan tindakan yang diberikan dan keberhasilan dapat dilihat dari kondisi balita. Evaluasi yang dilakukan pada kasus balita dengan gizi kurang yaitu antara lain keadaan umum, tanda-tanda vital, tanda-tanda syok, dan tanda-tanda infeksi atau masalah potensial yang kemungkin akan terjadi.



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penulisan literatur review pada balita dengan gizi kurang serta menghubungkan dengan teori dan Avidance Based maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan referensi yang dikumpulkan, pendekatan manajemen asuhan kebidanan didapatkan data subjektif dan objektif gizi kurang yaitu nafsu makan menurun, anak lebih rewel, anak tampak kurus, berat badan dan tinggi badan anak berada di bawah kurva pertumbuhan.
2. penghambatan pertumbuhan dan perkembangan pada balita yang akan mengakibatkan terjadinya gizi kurang di sebabkan makanan yang tidak seimbang dan mencukupi, pengetahuan dan pola asuh orang tua sangat berperang penting dalam pemenuhan gizi yang seimbang pada balita karena sumber gizi, energi, nutrisi, protein, yang diperoleh bersumber dari pola asuh orang tua serta ekonomi keluarga sangat berpengaruh dalam status gizi balita.
3. Masalah potensial yang bisa terjadi pada balita dengan gizi kurang berdasarkan hasil referensi yaitu Kejadian gizi kurang apabila tidak diatasi akan menyebabkan dampak yang buruk bagi balita. Dampak yang terjadi antara lain akan berpotensi marasmus, kwasiorkor dan marasmus-kwasiorkor. Dimana marasmus ini adalah kekurangan energi (kalori) pada makanan yang

menyebabkan cadangan protein dalam tubuh terpakai sehingga anak kurus, dengan gejala: wajah seperti orang tua, cengeng, mata tidak bercahaya, tulang rusuk menonjol. Dan adapun kwashiorkor adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein dalam tubuh dengan gejala: wajah sembam atau edema, rambut mudah rontok, otot mengecil, kelainan kulit. Adapun marasmus-kwashiorkor adalah gabungan dari keduanya.

4. Tindakan segera dan kolaborasi dengan dokter serta tenaga kesehatan lainnya dengan memberikan edukasi pendidikan kesehatan, pola asuh yang baik, pemberian makanan pendamping pemulihan untuk balita.
5. Perencanaan pada balita dengan gizi kurang yaitu diberikan asupan gizi serta nutrisi yang dibutuhkan balita dan pendidikan kesehatan pada ibu , pemberian ASI, penilaian status gizi balita.
6. Penatalaksanaan yang dilakukan pada pasien balita dengan gizi kurang yaitu dengan pemberian asupan yang bergizi seperti ubi jalar, nugget tempe kedelai, bubur kacang hijau dan biskuit.
7. Evaluasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P) sangat tepat dalam pemenuhan gizi dalam memperbaiki status gizi pada balita gizi kurang.

B. Saran

Dalam penyusunan *Literatur Review* ini masih terdapat banyak kekurangan dan diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya

mengenai pada balita dengan gizi kurang menggunakan pendekatan 7 langkah varney.

Maka peneliti menyarankan untuk Penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih efektif, dengan melakukan penelitian dengan metode *surveillance* yang bersifat sosial dan tidak mengandalkan data dari rekam medik Rumah Sakit. Selanjutnya peneliti juga mendapatkan hasil penelitian yang langsung observasional pasien yang menderita gizi kurang agar hasilnya lebih efektif dan benar tentang mendiagnosis, pemberian tindakan dan penatalaksanaan untuk pasien tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, D. dkk. (2017). *Beberapa Faktor Risiko Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Balita 12-59 Bulan*. 2(1), 1–8.
- Adiningsih, S. (2010). *Waspada! Gizi Balita Anda*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Amelia. (2011). *Kajian penanganan anak gizi buruk dan prospeknya (management of severe malnutrition and it's prospect: a review)*. 34(1), 1–11.
- Amelia, A. R., Syam, A., & Fatimah, S. (2013). *Hubungan asupan energi dan zat gizi dengan status gizi santri putri yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar Suawesi Selatan tahun 2013*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, hal.1-15.
- Aziza, N., & Silvie, M. (2021). *Pengaruh Pendapatan Orang Tua Terhadap Status Gizi Anak Usia 4-5 tahun pada Masa Pandemi COVID -19*. 1-63.
- Aryani, D, L., & Riyandry, A, M. (2019). *vitamin D sebagai terapi potensial anak gizi buruk*. 1 (1), 61-70.
- Bastari, Z. dkk. (2014). *Penanganan Gizi Buruk dengan Perspektif Person in Environment oleh Pekerja Sosial*. 375–380.
- Bili, A., Jutomo, L., & Boeky, D. (2020). *Faktor Risiko Kejadian Gizi Kurang pada Anak Balita di Puskesmas Palla Kabupaten Sumba Barat Daya*. *Media Kesehatan Masyarakat*, 2 (2), 33-41.
- Devianti, M. dan T. (n.d.). *PENINGKATAN STATUS GIZI BALITA DENGAN GIZI BURUK MELALUI PEMBERIAN FORMULA 100*. 1–8.
- Ernawati, A. (2019). *Analisis Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Pada Anak Balita*. XV(1), 39–50.
- Gibney, M j; Arab, L. (2009). *Gizi kesehatan masyarakat*. EGC Medical Book Store.
- Handayani, R. (2017). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Status Gizi Pada Anak Balita*. 2(120), 217–224.
- Has, D. F. S. dkk. (n.d.). *Pengembangan Potensi Lokal Masyarakat Desa dalam Peningkatan GIZI Balita*.
- Harahap, J. D. dkk. (2019). *Determinan Status Gizi Kurang pada Balita di Puskesmas*

Belawan Kota Medan.9, (2) 1-14

Huriah, T. dkk. (2008). *Upaya Peningkatan Status Gizi Balita Malnutrisi Akut Berat Melalui Program Home Care.*

Ibrahim, I. A. dkk. (2018). *Pengaruh Pemberian Biskuit Ubi Jalar Ungu Terhadap Status Gizi Kurang Pada Anak Balita Usia 12-36 Bulan. 1, 1–15.*

Irianti, B. (2018). *FAKTOR- FAKTOR YANG MENYEBABKAN STATUS GIZI KURANG PADA BALITA. 3(2), 10–13.*

Irianto, D. pekik. (2017). *pedoman gizi lengkap keluarga dan olahragawan (Yeskha (ed.)). CV.ANDI OFFSET.*

Janah, M. (n.d.). *Asuhan Kebidanan Komunitas Pada Keluarga Tn"B" dengan An"N" Usia 4 Tahun dengan Status Gizi Kurang di Desa Gayaman Kec Mojoanyar kabupaten Tenmojokerto.*

Junita, D. dan A. wulansari. (2020). *Media Pendidikan Gizi dalam Mengenali dan Mengatur Makanan Cegah Balita Gizi Kurang. 2, 123–128.*

Kalsum, U. dan A. B. jahari. (n.d.). *Strategi Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang Pada Balita.*

Kartiningrum, E. D. (2015). *Faktor Resiko Kejadian Gizi Kurang Pada Balita di Desa Ganaman Kecamatan Mojoanyar Mojokerto. 7(2), 67–80.*

Khaeriyah, F. dkk. (n.d.). *Hubungan Pendidikan dan Pola Asuh Ibu dengan Kejadian Gizi Kurang dan Gizi Buruk Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Beruntung Raya Banjarmasin. 173–178.*

Khoiriyah, E. dan A. N. (2019). *Hubungan Pengetahuan Ibu Balita Mengenai MP-ASI dengan Status Gizi Balita di Puskesmas Mekar Baru. X(02), 142–150.*

Kirana, chandra. dkk. (n.d.). *Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gizi Buruk Pada Balita dengan Metode Certainty Factor. 8(2), 141–154.*

Kurniasari, maria D. dkk. (2019). *Kolaborasi Perawatan dan Ahli Gizi di Posyandu Balita Puskesmas Jetak, Kabupaten Semarang. 10(1), 123–129.*

Lestari, S. A. dkk. (2019). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Status Gizi Balita. 2(1), 121–133.*

- Limanto, susana. dkk. (2019). *EDUKASI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU BALITA GIZI KURANG*. 3(1).
- Lutviana, E. dan I. B. (2017). *Prevalensi dan Determinan Kejadian Gizi Kurang Pada Balita*. 5(2), 138–144.
- Mardiawan, Cok iwan jaya, D. (n.d.). *Pengaruh Pemberian Taburia Terhadap Konsumsi dan Berat Badan Anak Balita Gizi Kurang Usia 6-24 Bulan*.
- Mariyam.dkk. (2017). *Efektivitas Konsumsi Nugget Tempe Kedelai Terhadap Kenaikan Berat Badan Balita Gizi Kurang*. 6(12), 63–72.
- Miko, A. dan A. H. A.-R. (2017). *Hubungan Berat Badan dan Tinggi Badan Orang Tua dengan Status Gizi Balita di kabupaten Aceh Besar*. 40(1), 21–34.
- Mutika, Wi. dan D. S. (2018). *Analisi Permasalahan Status Gizi Kurang Pada Balita di Puskesmas Teupah Selatan Kabupaten Simeluleu*. 1(3), 127–136.
- Ngoma, D., Adu, A., & Dodo, D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Gizi Kurang pada Balita di Kelurahan Oesapa Kota Kupang. *Media Kesehatan Masyarakat*, 1 (2), 76-84.
- Nopa, I. (2019). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Balita*. 5, 258–262.
- Nugrahaeni, D. E. (2018). *Pencegahan Balita Gizi Kurang Melalui Penyuluhan Media Lembar Batik Gizi*. 113–124. <https://doi.org/10.20473/amnt.v2.i1.2018.113-124>
- Nurhayati, I., & Hidayat, A. R. (2019). *Identifikasi Perkembangan Balita Dengan Metode Kpsp Terhadap Status Gizi Balita Di Boyolali*. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati*, 4(2), 129. <https://doi.org/10.35842/formil.v4i2.269>
- Partini, S. ddk. (n.d.). *Peran Perawat Terhadap Pencegahan Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Klaten*.
- Pasek, A. suradana. (2019). *Evaluasi Kelas Gizi Terhadap Kejadian Balita Gizi Kurang di Puskesmas Karang Taliwang Kota Mataram*. 89–102.
- Putri, R. F. dkk. (n.d.). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang*. 4(1), 254–261.
- Rahma, A. C. dan siti R. N. (n.d.). *Perbedaan Sosial Ekonomi dan Pengetahuan Gizi Ibu Balita Gizi Kurang dan Gizi Normal*.

- Ratufelan, E. dkk. (2018). *Hubungan Pola Makan, Ekonomi Keluarga dan Riwayat infeksi dengan Kejadian Gizi Kurang Pada Balita diwilayah Kerja Puskesmas Benu-Benua*. 3(2), 1–13.
- Saputra, W. dan R. hida N. (2013). *Faktor Demografi dan Resiko Gizi Buruk dan Gizi Kurang*. April 2020. <https://doi.org/10.7454/msk.v16i2.1636>
- Sari, A. N. dkk. (2020). *Hubungan Asupan Zink, Zat Besi, dan Vitamin C dengan Kejadian Gizi Kurang Pada Anak Usia 6-24 Bulan*. 12(27).
- Sari, M. R. N. dan L. Y. R. (2018). *Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Pola Pemberian Makan dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Gapura Kabupaten Sumenep*. 182–188. <https://doi.org/10.20473/amnt.v2.i2.2018.182-188>
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Mishbah* (Cet V). lentera hati.
- Soegeng santoso, A. lies ranti. (2009). *KESEHATAN DAN GIZI*. PT.RINEKA CIPTA.
- Sodikin. (2013). *Keperawatan Anak Gangguan Pencernaan* (1). Jakarta: EGC.
- Soetjningsih. (2002). *Tumbuh Kembang Anak*. EGC Medical Book Store.
- Supariasa, A. (2010). *prinsip dasar ilmu gizi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Susanti, E. M. dkk. (2017). *Implementasi Penatalaksanaan Kasus Gizi Buruk di wilayah Kerja Puskesmas Cilacap Utara I*. 6(505).
- Tim Redaksi Qultummedia. (2017). *Doa & Zikir Muslimah*. Qultummedia.
- Tutik, H. L. H. Y. nur edang sary. (2019). *Pendamping gizi pada balita*. Deppublish publisher.
- Wahyuningsih, S. dan M. indriana D. (n.d.). *Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pada Balita Gizi Kurang*.
- Winarsih. (2018). *Pengantar Ilmu Gizi Dalam Kebidanan*. Pustaka Baru Press.
- Yuanta, Y. dkk. (2018). *Hubungan Riwayat Pemberian Asi dan Pola Asuh Ibu dengan Kejadian Gizi Kurang Pada Anak Balita di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi*.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : Fatmawati
 Nim : 70400117011
 TTL : Simpasai, 10 oktober 1997
 Suku : Nusa Tenggara Barat
 Agama : Islam
 Alamat : Bima

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2005-2010 :SDN 1 Simpasai
2. Tahun 2010-2013 :SMPN 2 Lambu
3. Tahun 2013-2016 :SMAN 2 Lambu
4. Tahun 2017-2021 :Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar