

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI
DENGAN KETUBAN PECAH DINI DISERTAI INFEKSI
INTRAPARTUM SAMPAI 42 HARI MASA NIFAS
(Literatur Review)**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan DIII Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
(UIN) Alauddin Makassar**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

Oleh :

MARYANTI FIDMATAN

NIM : 70400117034

**JURUSAN DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maryanti Fidmatan

Nim : 70400117034

Tempat/ Tanggal lahir : Tual, 17 Maret 2001

Jurusan/ Prodi : D3 Kebidanan

Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Yos Sudarso

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi
dengan Ketuban Pecah Dini Disertai Infeksi Intrapartum
sampai 42 Hari Masa Nifas (LR)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh keyakinan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini adalah benar adanya dan hasil karya kerangka fikiran sendiri. Jika kemudian hari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan bahkan plagita baik sebagian dan seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2021

Penyusun

MARYANTI FIDMATAN

70400117034

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH


Nama : Maryanti Fidmatan
Nim : 70400117034
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi dengan
Ketuban Pecah Dini Disertai Infeksi Intrapartum sampai 42
Hari Masa Nifas (LR)


Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar
Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Gowa-Samata 18 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Zelna Yuni Andryani, S.ST., M. Keb
NIP: 198903282 019032 2 018


Nurfaizah Alza, S.ST., M. Keb
NIP:



PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul **“Manajemen Asuhan kebidanan Intrant Care pada Ibu dengan Ketuban Pecah Dini Disertai Infeksi Intrapartum Sampai 42 Hari Masa Nifas (Literatur Review)”**. Yang disusun oleh **Maryanti Fidmatan Nim: 70400117034**, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 18 Agustus 2021
5 Zulhijah 1442

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Anieq Mumthilah Al Kautzar, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb.	(.....)
Pembimbing II	: Nurfaizah Alza, S.ST., M.Keb.	(.....)
Penguji I	: dr. Darmawansyih, M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Nurkholis A. Gaffar, M.Hum	(.....)

Diketahui oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi tuhan Allah swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat berniat ibadah disisi-Nya. Salam dan taslim semoga teracuhkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menggelarkan permadani keislaman bagi umat manusia di muka bumi terutama bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi Dengan Ketuban Pecah Dini Disertai Infeksi Intrapartm Sampai 42 Hari Masa Nifas”**. Karya ini disusun dalam rangka memenuhi tugas pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Dalam penyusunan Karya Tulis ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Banyak hambatan yang penulis temukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, namun dengan kerja kerass dan tekad yang kuat serta adanya bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil, terutama kedua orangtua tercinta Bapak Sulaiman Fidmatan dan Ibunda Erni Nurlette para inspirasi hidup saya, yang telah memberikan do'a yang bersedia membagi cinta

tanpa pamrih kepada anak-anaknya dan semoga Allah membalasnya dengan surga, *Allahumma amin* .

Penulis juga mengucapkan terima kasih dengan segala ketulusan dan kerendahan hati. Rasa terima kasih tersebut penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Ibunda Dr.dr. Hj. Syatirah Djalaluddin, Sp.A, M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang kami anggap bukan hanya sebagai pimpinan fakultas melainkan juga orang tua kami sendiri.
3. Ibunda Firdayanti S. SiT, M. Keb selaku ketua prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Zelna Yuni Andryani, S.ST.M.Keb, selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktunya demi membimbing serta memberikan saran dan arahan bagi penulis.
5. Ibu Nurfaizah Alza, S.ST.M.Keb, selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu demi membimbing serta memberikan saran dan arahan bagi penulis.
6. Ibu dr. Darmawansyih, M. Kes selaku penguji satu yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

7. Bapak Dr. Nurkhalis A. Gaffar, M.Hum selaku penguji dua yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
8. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama dalam masa studi.
9. Keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, semangat dan memberikan saran dalam pekerjaan karya tulis ini.
10. Teman-teman Jurusan Kebidanan angkatan 2017, yang selama ini saling membantu, menghibur dan menguatkan.

Akhir kata, semoga apa yang terdapat dalam Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.



Samata – Gowa, 2021

Penulis

Maryanti Fidmatan
70400117034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Tujuan Masalah</i>	5
C. <i>Tujuan Penulisan</i>	5
1. Tujuan Umum.....	5
2. Tujuan Khusus.....	5
D. <i>Manfaat Penulisan</i>	6
1. Manfaat institusi.....	6
2. Manfaat Bagi Penulis.....	6
E. <i>Metode Penulisan</i>	7
BAB II Tinjauan Pustaka.....	9
A. <i>Tinjauan Umum tentang Persalinan</i>	9
1. Pengertian Persalinan.....	9
2. Sebab - sebab Mulainya Persalinan.....	9
3. Tahap - tahap Persalinan.....	11

4. Tanda - tanda Persalinan.....	13
5. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Persalinan.....	14
B. <i>Tinjauan Islam tentang Persalinan</i>	15
C. <i>Tinjauan Khusus tentang Ketuban Pecah Dini</i>	20
1. Pengertian.....	20
2. Patofisiologi.....	21
3. Etiologi.....	21
4. Faktor Risiko.....	22
5. Tanda dan Gejala.....	23
6. Komplikasi.....	24
7. Penatalaksanaan.....	24
D. <i>Teori Manajemen Kebidanan Berdasarkan Kasus Persalinan Dengan Ketuban Pecah Dini Disertai Infeksi Intrapartum</i>	26
1. Pengertian Manajemen Kebidanan.....	26
2. Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP.....	35
BAB III TELUSURAN <i>EVIDANCE BASED LEARNING</i>	37
A. Matriks Langkah 1.....	37
B. Matriks Langkah 2.....	48
C. Matriks Langkah 3.....	55
D. Matriks Langkah 4.....	61
E. Matriks Langkah 5.....	67
F. Matriks Langkah 6.....	73
G. Matriks Langkah 7.....	78

BAB IV PEMBAHASAN.....	83
A. Pembahasan Hasil Telah Evidance Based Asuhan 7 Langkah Varney.....	83
1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar.....	83
2. Langkah II : Masalah Aktual.....	89
3. Langkah III : Masalah Potensial.....	94
4. Langkah IV : Tindakan Segera dan Kolaborasi.....	97
5. Langkah V : Perencanaan.....	102
6. Langkah VI : implementasi.....	106
7. Langkah VII : Evaluasi.....	111
B. Implikasi Kebidanan.....	114
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120





ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, 27 OKTOBER 2020

Nama : Maryanti Fidmatan
Nim : 70400117034
Pembimbing I : Zelna Yuni Andriani
Pembimbing II : Nurfaiza Alza

“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi” Dengan Kasus Ketuban Pecah Dini Disertai Infeksi Intrapartum sampai 42 Hari Masa Nifas (Literatur Review)

Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan ketuban yang pecah sebelum ada tanda-tanda persalinan. KPD dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu KPD kurang bulan (< 35 minggu) dan KPD cukup bulan ($35 - 42$ minggu). Namun demikian usia kehamilan preterm lebih beresiko mengalami KPD. Masalah yang sering timbul pada KPD yaitu gangguan pernafasan pada bayi, korioamnionitis, keluarnya tali pusat, hipoplasia paru, tali pusat menubung, prematuritas, distosia, infeksi intrauterine dan kematian janin

Penelitian ini bertujuan untuk memahami asuhan kebidanan pada ibu dengan KPD. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi literatur (*Literatur Review*) dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan tentang asuhan kebidanan intranatal patologi dengan KPD sesuai dengan *evidence based*.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk mendiagnosis Ketuban Pecah Dini (KPD) yaitu dengan cara anamnesa pasien, pemeriksaan spekulum, pemeriksaan dalam, pemeriksaan laboratorium akan diperiksa air ketuban ibu menggunakan tes lakmus, dan pemeriksaan USG. Penatalaksanaan Ketuban Pecah Dini (KPD) dapat dilakukan dengan dengan berbagai metode. Pemberian induksi, seksio sesarea, dan terminasi kehamilan.

Kesimpulan yaitu didapatkannya penatalaksanaan yang tepat dan efektif sesuai *evidence based* serta pentingnya pemberian edukasi pada ibu KPD dengan pemeriksaan kehamilan rutin.

Kata Kunci: KPD, 7 Langkah Varney



ABSTRAK

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, OCTOBER 27, 2020

Name : Maryanti Fidmatan
Reg. Number : 70400117034
Supervisor I : Zelna Yuni Andriani. A
Supervisor II : Nurfaiza Alza

“Midwifery Care Management of Intranatal Pathology with the Case of Premature Rupture of Membranes with Intrapartum Infection up to 42 Days of Postpartum (A Literature Review)”

Premature rupture of membranes (PROM) is a rupture (breaking open) of the membranes before labor begins. Premature rupture of membranes is grouped into 2 types namely the PROM that occurs before 35 weeks of pregnancy and the PROM that occurs around 35 to 42 weeks. PROM occurring before 35 weeks is called as called as preterm premature rupture of membranes. It is considered to riskier. Problems that often arise in preterm PROM are respiratory problems in infants, chorioamnionitis, umbilical cord discharge, pulmonary hypoplasia, obstruction of the umbilical cord, prematurity, dystocia, intrauterine infections, and fetal death.

This research aims to carry out research and obtain material resources related to midwifery care management for mothers with PROM. The methodological approach taken in this study was literature review in which books, articles, and other related documents related to intranatal pathology of PROM were analysed and discussed according to evidence-based research.

Based on the results of the study, the tests carried out to diagnose premature rupture of membranes (PROM) are by means of anamnesis on the patient, speculum examination, internal examination, laboratory examination using the litmus test on mothers, and ultrasound examination. In addition, the treatments on patients with Premature rupture of membranes could be done by using various methods such as induction, cesarean section, and pregnancy termination.

From this research, it could be concluded that appropriate and effective treatments should be given to PROM patients according to evidence-based research. In addition, it is important to provide education to PROM mothers as well as to provide routine antenatal care on them.

Key Words: PROM, 7-stages of Varney

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketuban Pecah Dini (KPD) yaitu keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Bila KPD terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut KPD pada kehamilan premature. Dalam keadaan normal 8-10% perempuan hamil aterm akan mengalami KPD. KPD dalam persalinan secara umum disebabkan oleh kontraksi uterus dan peregangan berulang. Selaput ketuban pecah karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh, bukan karena seluruh selaput ketuban rapuh (Prawirohardjo, 2016: 677-678).

WHO (2014) dalam Rohmawati dkk (2018: 24), kejadian ketuban pecah dini (KPD) atau insiden PROM (*Pre labour rupture of membrane*) berkisar antara 5-10% dari semua kelahiran. KPD preterm terjadi 1% dari semua kehamilan dan 70% kasus KPD terjadi pada kehamilan aterm. Pada 30% kasus KPD merupakan penyebab kelahiran premature.

Sementara itu, menurut penelitian Yaze dan Dewi (2016), insidensi KPD terjadi 10% pada semua kehamilan. Pada kehamilan aterm insidensinya bervariasi 6-19%, sedangkan pada kehamilan preterm insidensinya 2% dari semua kehamilan. Hampir semua KPD pada kehamilan preterm akan lahir sebelum aterm atau persalinan akan terjadi dalam satu minggu setelah selaput ketuban pecah. 70% kasus ketuban pecah dini terjadi pada kehamilan cukup

bulan. Sekitar 85% morbiditas dan mortalitas perinatal disebabkan oleh prematuritas. Ketuban pecah dini berhubungan dengan penyebab kejadian prematuritas dengan insidensi 30-40% (Yaze dan Dewi, 2016: 76).

Dampak yang paling sering terjadi pada KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu adalah *sindrom distress* pernapasan, yang terjadi pada 10-40% bayi baru lahir. Risiko infeksi meningkat pada kejadian KPD. Semua ibu hamil dengan KPD premature sebaiknya dievaluasi untuk kemungkinan terjadinya *korioamnionitis* (radang pada *korion* dan *amnion*). Selain itu kejadian *prolaps* atau keluarnya tali pusat dapat terjadi pada KPD. Hipoplasia paru merupakan komplikasi fatal yang terjadi pada KPD preterm. Kejadiannya mencapai hampir 100% apabila KPD preterm ini terjadi pada usia kehamilan kurang dari 23 minggu. Infeksi *intrauterin*, tali pusat menumbung, prematuritas, dan distosia juga termasuk dalam komplikasi KPD (D dan DWI, 2013: 250).

Korioamnionitis biasanya terjadi akibat bakteri yang turun (*ascending*). Infeksi kadang-kadang terjadi akibat diseminasi mikroorganisme transplacenta (Komalasari, dkk., 2010: 88). *Korioamnionitis* atau infeksi *intrapartum* yaitu keadaan pada perempuan hamil di mana korion, amnion, dan cairan ketuban terkena infeksi bakteri. *Korioamnionitis* merupakan komplikasi paling serius bagi ibu dan janin, bahkan dapat berlanjut menjadi sepsis. Penyebab *korioamnionitis* adalah infeksi bakteri yang terutama berasal dari traktus urogenitalis ibu. Secara spesifik permulaan infeksi berasal dari vagina, anus, atau rektum dan menjalar ke uterus (Prawirohardjo, 2016: 681).

Angka kejadian korioamnionitis 1-2%. Faktor risiko terjadinya *korioamnionitis* yaitu kelahiran *premature* atau ketuban pecah lama (Prawirohardjo, 2016: 681). Insiden yang berkaitan dengan lamanya pecah ketuban yaitu angka infeksi bagi wanita yang melahirkan dalam 24 jam setelah pecah ketuban saat cukup bulan adalah 1,6-29%, bergantung pada ras, faktor sosial ekonomi, perawatan pranatal yang diterima, dan usia gestasi. Pada kehamilan cukup bulan, insiden demam *intrapartum* meningkat pada kelahiran yang lebih dari 24 jam. Jika periode laten melebihi 72 jam, angka mortalitas perinatal meningkat secara signifikan (Komalasari, dkk., 2010: 88).

Menurut data dari Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), menyajikan tentang gangguan atau komplikasi kehamilan yang dialami oleh wanita 15-49 tahun yang memiliki kelahiran dalam 5 tahun terakhir. Komplikasi kehamilan yang terjadi pada wanita dalam 5 tahun terakhir yaitu Perdarahan (5%), bengkak kaki, wajah, tangan atau sakit kepala disertai kejang (3%), muntah dan tidak mau makan (3%), KPD (2%), mules sebelum 9 bulan (2%) (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017: 152).

Di Sulawesi Selatan persentase kelahiran hidup terakhir dalam 5 tahun sebanyak 442 orang yang ibunya mengalami komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan. Komplikasi yang terjadi yaitu, mules sebelum 9 bulan (2.7%), perdarahan (2.7%), demam (0.8%), kejang dan pingsan (0.7%), dan KPD (1.0%). Sementara itu perdarahan merupakan dampak yang bisa ditimbulkan KPD (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017: 320).

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa yaitu angka kejadian ketuban pecah dini pada tahun 2019 sebanyak 120. Pada bulan Januari sebanyak 8 kasus, bulan Februari sebanyak 14 kasus, bulan Maret sebanyak 16 kasus, bulan April sebanyak 0 kasus, bulan Mei sebanyak 11 kasus, bulan Juni sebanyak 20 kasus, bulan Juli sebanyak 10 kasus, bulan Agustus sebanyak 0 kasus, bulan September sebanyak 7 kasus, bulan Oktober sebanyak 15 kasus, bulan November sebanyak 8 kasus, bulan Desember sebanyak 11 kasus (Dinkes, Kabupaten Gowa 2020).

Data yang diperoleh dari Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa menunjukkan jumlah Ketuban Pecah Dini dari tahun 2015 yaitu 38 kasus, pada tahun 2016 yaitu 11 kasus, pada tahun 2017 yaitu 22 kasus, sedangkan pada tahun 2018 yaitu 34 kasus, dan 2019 yaitu 17 kasus (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf, 2020).

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengambil studi kasus dengan judul "Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care Pada Ibu dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) disertai Infeksi Intrapartum sampai 42 hari masa nifas.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana manajemen asuhan kebidanan intranatal patologi dengan ketuban pecah dini disertai infeksi intrapartum berdasarkan penulisan literatur review ?

C. Tujuan

Pada bagian akhir ada tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

Adapun tujuan Penulisan Literatur Review asuhan intranatal ketuban pecah dini disertai infeksi intrapartum sampai 42 hari masa nifas adalah :

1. Tujuan umum :

Mampu menyusun literatur review pada asuhan intranatal patologi dengan ketuban pecah dini disertai infeksi

2. Tujuan khusus

- a. Didapatkannya data subjektif dan data objektif dari tanda dan gejala dari berbagai referensi tentang ibu yang mengalami ketuban pecah dini disertai infeksi intrapartum
- b. Didapatkannya hasil rumusan diagnosis dari berbagai referensi tentang ibu yang mengalami ketuban pecah dini disertai infeksi intrapartum
- c. Didapatkannya informasi komplikasi yang bisa timbul dari berbagai referensi pada ibu yang mengalami ketuban pecah dini disertai infeksi intrapartum
- d. Didapatkannya informasi dari berbagai referensi tentang kondisi emergensi yang dapat terjadi serta penanganan pada ibu yang mengalami ketuban peca
- e. Didapatkannya simpulan dari berbagai referensi tentang intervensi apa saja / penatalaksanaan yang tepat pada ibu yang mengalami ketuban pecah dini disertai infeksi intrapartum

- f. Didapatkannya penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke implementasi asuhan ibu yang mengalami ketuban pecah dini disertai infeksi intrapartum
- g. Didapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi yang menjadi dasar evaluasi pada ibu yang mengalami ketuban pecah dini disertai infeksi intrapartum

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan literatur review sebagai berikut :

1. Manfaat institusi

Sebagai bahan pembelajaran dan sumber pengetahuan untuk penulis beikutnya.

2. Manfaat bagi penulisan

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ketuban pecah dini disertai infeksi intrapartum berdasarkan *Avidence Based*

E. Metode Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam literatur review ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penulisan
- E. Metode Penulisan

F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang persalinan normal

1. Pengertian persalinan
2. Sebab - sebab mulainya persalinan
3. Tahap – tahap persalinan
4. Tanda – tanda persalinan
5. Faktor – faktor yang mempengaruhi persalinan

B. Tinjauan islam tentang persalinan

C. Tinjauan khusus tentang ketuban pecah dini

1. Pengertian ketuban pecah dini
2. Patofisiologi ketuban pecah dini
3. Etiologi ketuban pecah dini
4. Faktor risiko ketuban pecah dini
5. Tanda dan gejala ketuban pecah dini
6. Komplikasi ketuban pecah dini
7. Penatalaksanaan ketuban pecah dini

D. Teori manajemen asuhan kebidanan dengan ketuban pecah dini disertai infeksi intrapartum

BAB III : TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING

- A. Matriks Langkah I
- B. Matriks Langkah II
- C. Matriks Langkah III

- D. Matriks Langkah IV
- E. Matriks langkah V
- F. Matriks Langkah VI
- G. Matriks Laangkah VII

BAB IV : PEMBAHASAN

- A. Perubahan Hasil Telah Evidance Based Asuhan 7 Langkah Varney
Berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi
- B. Implikasi Kebidanan

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan

1. Pengertian Persalinan

Ada beberapa pengertian persalinan, yaitu :

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang dapat hidup ke dunia luar dari rahim melalui jalan lahir atau jalan lain (Diana, dkk., 2019: 1).

2. Sebab-Sebab Mulainya Persalinan

Bagaimana terjadinya persalinan belum diketahui dengan pasti, sehingga menimbulkan beberapa teori yang berkaitan dengan mulainya kekuatan his atau kontraksi yang merupakan awal dari mulai terjadinya persalinan.

Teori tersebut antara lain:

a. Teori Penurunan Kadar Hormon Progesteron

Hormon Progesteron mengakibatkan relaksasi otot-otot rahim, sedangkan hormon estrogen meningkatkan kerentanan otot rahim. Selama kehamilan, terdapat keseimbangan antara progesterone dan estrogen di dalam darah, tetapi akhir kehamilan terjadi penurunan kadar progesteron sehingga timbul his.

b. Teori Oksitosin

Menjelang persalinan terjadi peningkatan reseptor oksitosin dalam otot rahim sehingga mudah terangsang saat disuntikkan oksitosin dan menimbulkan kontraksi.

c. Teori Prostaglandin

Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua menjadi sebab permulaan persalinan. Hal ini juga disokong dengan adanya kadar prostaglandin yang tinggi, baik dalam air ketuban maupun darah perifer ibu hamil sebelum melahirkan atau selama persalinan.

d. Teori Plasenta Menjadi Tua

Plasenta yang menjadi tua seiring bertambahnya usia kehamilan menyebabkan kadar estrogen dan progesteron turun. Hal ini juga mengakibatkan kejang pada pembuluh darah sehingga akan menimbulkan kontraksi.

e. Teori Distensi Rahim

Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan maka otot-otot rahim akan semakin meregang. Rahim yang membesar dan meregang menyebabkan iskemi otot-otot rahim sehingga mengganggu sirkulasi utero plasenta kemudian timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya.

f. Teori Iritasi Mekanik

Di belakang serviks terletak ganglion servikale, bila ganglion ini digeser dan ditekan oleh kepala janin, maka akan timbul kontraksi.

g. Pengaruh Janin

Hypofise dan kelenjar suprarenal janin juga memegang peranan dalam terjadinya persalinan pada janin *anancepalus* kehamilan lebih lama dari biasanya (Mutmainnah, dkk., 2017: 5-6).

3. Tahap-Tahap Persalinan

Tahap-tahap persalinan dibagi menjadi 4 kala yaitu:

a. Kala I (Kala Pembukaan)

Kala I disebut juga kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai dengan pembukaan lengkap (10 cm). Pada permulaan his, kala pembukaan berlangsung tidak begitu kuat sehingga pasien masih dapat berjalan-jalan.

Kala pembukaan dibagi atas 2 fase yaitu :

1) Fase Laten

Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Fase laten berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai dengan pembukaan mencapai ukuran diameter 3 cm.

2) Fase Aktif

Fase ini berlangsung selama 6 jam, dan dibagi atas 3 sub fase:

- a) Fase akselerasi : Dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm.
- b) Fase dilatasi maksimal : Dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm sampai dengan 9 cm.
- c) Fase dilatasi : Pembukaan menjadi lambat sekali, dalam waktu 2 jam pembukaan berubah menjadi pembukaan lengkap.

b. Kala II Atau Pengeluaran Janin

Pada pengeluaran janin, his semakin kuat dengan interval 2 sampai 3 menit dengan durasi 50 sampai 100 detik. Menjelang akhir kala I, ketuban pecah yang ditandai dengan pengeluaran cairan secara mendadak. Ketuban pecah pada pembukaan merupakan pendeteksi lengkap diikuti keinginan mengejan karena *fleksus frankenhauser* tertekan. Kedua kekuatan, his dan mengejan lebih mendorong kepala bayi sehingga kepala bayi membuka pintu, *subocciput* bertindak sebagai hipomoglion berturut-turut dari dahi, muka, dagu yang melewati perineum. Kepala lahir seluruhnya dan diikuti seluruh badan janin. Kala II pada primi berlangsung 2 jam dan pada multi 1 jam.

c. Kala III Atau Pengeluaran Urin

Setelah bayi lahir, kontraksi uterus berhenti sekitar 5 sampai 10 menit. Melalui kelahiran bayi, plasenta sudah mulai terlepas pada lapisan *Nitabisch* karena retraksi otot rahim. Dimulai segera setelah bayi lahir sampai plasenta lahir, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit.

d. Kala IV

Kala IV dimaksudkan untuk melakukan observasi karena perdarahan postpartum paling sering terjadi pada 2 jam pertama. Observasi yang dilakukan adalah tingkat kesadaran, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, pernafasan kontraksi uterus, dan perdarahan (Mutmainnah, dkk., 2017: 7-12).

4. Tanda-Tanda Persalinan

Memasuki proses persalinan terdapat beberapa tanda-tanda yang dirasakan oleh ibu dan dilihat oleh bidan melalui pemeriksaan. Tanda-tanda persalinan tersebut antara lain:

- a. Kekuatan his semakin sering terjadi dan teratur dengan jarak kontraksi yang semakin pendek
- b. Pengeluaran lendir bercampur darah
- c. Dapat disertai dengan ketuban pecah dini
- d. Pada pemeriksaan dalam, dijumpai perubahan servix dan pembukaan sudah ada (Walyani & Purwoasstuti, 2015: 7-11).

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses terjadinya persalinan:

a. Kekuatan (*Power*)

Power adalah kekuatan yang mendorong janin keluar. Kekuatan tersebut meliputi his, kontraksi otot-otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi dari ligamen.

1) His

His adalah gelombang kontraksi ritmis otot polos dinding uterus yang di mulai dari daerah fundus uteri dimana tuba falopi memasuki dinding uterus, awal gelombang tersebut didapat dari "*pacemaker*" yang terdapat dari dinding uterus daerah tersebut.

2) Tenaga mengejan (Walyani & Purwoasstuti, 2015).

b. Faktor Penumpang (*passenger*)

Penumpang dalam persalinan adalah janin dan plasenta. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai janin adalah ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap, dan posisi janin. Sedangkan yang perlu diperhatikan pada plasenta adalah letak, besar dan luasnya.

c. Jalan Lahir (*Passage*)

Jalan lahir terbagi atas dua, yaitu jalan lahir keras dan jalan lahir lunak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari jalan lahir keras

adalah ukuran dan bentuk tulang panggul,. Sedangkan, yang perlu diperhatikan pada jalan lahir lunak adalah segmen bawah uterus yang dapat meregang, serviks, otot dasar panggul, vagina, dan introitus vagina (Sondakh, 2013: 4).

d. Psikis Ibu

Penerimaan klien atas jalannya perawatan antenatal (petunjuk dan persiapan untuk menghadapi persalinan), kemampuan klien untuk bekerja sama dengan penolong, dan adaptasi terhadap rasa nyeri persalinan.

e. Penolong

Meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kesabaran, pengertiannya dalam menghadapi klien baik primipara dan multipara (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 13).

B. Tinjauan Islam Tentang Persalinan

Persalinan adalah suatu proses yang fisiologi, dimana terjadi pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang dapat hidup diluar kandungan dimulai dengan adanya kontraksi uterus, penipisan dan pembukaan serviks, kelahiran bayi dan plasenta melalui jalan lahir atau melalui jalan lain (abdomen), dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan ibu sendiri) (Widiastini, 2018: 1).

Firman Allah dalam QS. Ar- Ra'd/13: 8 sebagai berikut :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدَادُ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِمِقْدَارٍ

Terjemahnya :

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya” (QS. Ar-Ra'd : 8).

Ayat ini menyatakan: Dan sebagaimana *Allah mengetahui janin yang dikandung oleh setiap wanita dalam rahimnya*. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kandungan. Sehingga tidak seorang pun yang telah telah ditetapkan berumur Panjang, kecuali telah ditetapkan Allah lebih dahulu dan tertulis di Lohmahfuz, *tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang* (Shihab, 2002: 672).

Dari ayat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketidaknormalan yang terjadi dalam persalinan sudah diketahui dan ditetapkan oleh Allah swt yang merupakan sebagai tanda kuasa-Nya.

Mengingat akan pengorbanan seorang ibu saat dikandung dan dilahirkan sangatlah membuat kita semakin ingin berbakti kepada orang tua. Seperti firman Allah swt. dalam QS. Luqman/31: 14, sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۙ ١٤

Terjemahnya :

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu” (QS.Luqman/31: 14).

Asbabun Nuzul ayat di atas

Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad saw. Hijrah ke Madinah , semua ayat-ayatnya Makiyah. Ayat 13 dan 14 surat Luqman turun sepaket dengan ayat sebelum dan sesudahnya, yakni ayat 12 dan 15 tentang kisah Luqman. Kisah ini diawali dengan pendahuluan yang termakjub pada ayat ke-12. Pada ayat tersebut dijelaskan profil Luqman yang diberikan hikmah dan dengan hikmah tersebut ia dapat mengajarkan langkah-langkah agar mampu bersyukur. Jika orang bersyukur maka keuntungannya untuk dirinya sendiri, sedangkan siapa yang kufur, Allah swt. pun tidak rugi.

Ayat berikutnya merupakan rincian atau langkah-langkah penanaman hikmah agar menjadi hamba yang bersyukur. Ayat 13 -14 merupakan sisipan atau jumlah *i'tiradiyyah* ditengah kisah Luqman.

Para mufassir sepakat diantaranya Ibnu Katsir, al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili- bahwa ayat ini turun pada kisah Sa'ad bin Abi Waqash dengan ibunya. Dalam kasus tersebut Ibu Sa'ad bin Abi Waqash yang bernama Hamnah binti Abi Sufyan menolak keputusan anaknya untuk masuk Islam. Dan Hamnah mengatakan “Wahai Sa'ad telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah condong (kepada agama Muhammad). Demi Allah swt. aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus, aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad saw. dan kembali kepada agamamu sebelumnya.”

Sa'ad adalah anak lelaki yang paling dicintainya tetapi Sa'ad enggan untuk itu, dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, minum serta tidak berteduh sehingga Sa'ad pun mengkhawatirkannya. Lalu Sa'ad datang menemui Nabi Muhammad saw. dan mengadukan sikap ibunya kepadanya maka turunlah ayat ini.

Diriwayatkan pula oleh Abu Sa'ad bin Abu Bakar al Ghazi berkata bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan berkata bahwa Abu Ya'la telah memberitahu kami dan berkata bahwa Abu Khutsaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa al Hasan bin Musa telah memberitahu kami dan berkata bahwa Zuhair telah memberitahu kami

dan berkata bahwa Samak bin Harb telah memberitahu kami dan berkata bahwa Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqash dari ayahnya berkata, "Ayat ini turun tentang diriku." Lalu dia berkata, "Ibu Sa'ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya sehingga dirinya (Sa'ad) mengingkari agama (Islam). Dia tidak makan dan minum, ibu berada dalam keadaan seperti itu selama tiga hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah swt. : "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya." (HR. Muslim dari Abu Khutsaimah).

Ayat diatas dan ayat berikutnya Allah swt. sisipkan Al-Qur'an untuk menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang tua menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah swt., dan memang, Al-Qur'an sering kali menggandengkan perintah menyembah Allah swt dan berbakti kepada kedua orang tua.

Thahir Ibn 'Asyur berpendapat bahwa jika kita menyatakan bahwa Luqman bukan seorang Nabi, ayat ini adalah sisipan yang sengaja diletakkan setelah wasiat Luqman yang lalu tentang keharusan mengesakan Allah swt dan mensyukuri-Nya. Dengan sisipan ini, Allah swt. menggambarkan bahwa betapa Dia sejak dini telah melimpahkan anugerah kepada hamba-hamba-Nya dengan mewasiatkan anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan demikian, anugerah ini mencakup Luqman sebagai ganjaran atas perhatiannya memulai nasihatnya kepada anaknya agar memperhatikan hak Allah swt., jangan sampai diperseketukan. Disini, Allah swt menunjukkan bahwa Dia bersegera mendahului siapapun untuk memberi anugerah kebajikan terhadap

siapa yang memberi perhatian terhadap hak-Nya. Pendapat ini dikuatkan oleh disandingkannya perintah bersyukur kepada Allah swt. dengan penghormatan kepada kedua orang tua (Shihab, 2009: 299-201).

Kandungan ayat di atas merupakan nasihat Luqman secara langsung atau tidak, yang jelas ayat di atas bagaikan menyatakan: Dan Kami wasiatkan, yakni berpesan dengan amat kukuh, kepada semua manusia menyangkut kedua orang ibu bapaknya, pesan ini disebabkan karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, yakni kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu, dia melahirkannya dengan susah payah, kemudian memelihara dan menyusukannya setiap saat, bahkan di tengah malam ketika saat manusia lain tertidur nyenyak. Demikian hingga tiba masa menyapihnya di dalam dua tahun dihitung sejak hari kelahiran sang anak.

Dan wasiat untuk bersyukur kepada Allah swt. karena Allah swt yang menciptakan kamu dan menyediakan semua sarana kebahagiaan kamu, dan bersyukur pulalah kepada dua orang ibu bapak karena mereka yang dijadikan perantara kehadiran kita di atas bumi ini. Kesyukuran ini mutlak dilakukan karena hanya kepada Allah kita akan kembali dan semua untuk dipertanggung jawabkan (Shihab, 2009: 299-201).

C. Tinjauan Khusus Tentang Ketuban Pecah Dini

1. Pengertian

Ketuban pecah dini (KPD) adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan atau dimulainya tanda inpartu (Kemenkes, 2013: 122)

KPD adalah kelainan kehamilan di mana ketuban yang seharusnya pecah dan keluar karena kontraksi rahim menjelang persalinan justru pecah sebelum saat persalinan tiba (A. M. Pratiwi dan Fatimah, 2019: 167).

KPD adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan atau sebelum inpartu (Nugroho, 2012: 150).

2. Patofisiologi

KPD biasanya terjadi karena berkurangnya kekuatan *membran* atau penambahan tekanan *intrauteri* ataupun oleh sebab kedua-duanya. Kemungkinan tekanan *intrauteri* yang kuat adalah penyebab independen dari KPD dan selaput yang tidak kuat akibat kurangnya jaringan ikat dan vaskularisasi akan mudah pecah dengan mengeluarkan air ketuban (D & Dwi, 2013: 255).

3. Etiologi

Penyebab KPD masih belum diketahui dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Beberapa laporan menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan erat dengan KPD, namun faktor-faktor mana yang lebih berperan sulit diketahui.

Yang menjadi faktor predisposisinya adalah:

- a. Infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban maupun asenderen dari vagina atau infeksi pada cairan ketuban bisa menyebabkan terjadi KPD, servik yang inkompetensia, kanalis servikalis yang selalu terbuka oleh karena kelainan pada servik uteri.
- b. Tekanan intrauterin yang meninggi atau meningkat secara berlebihan (*overdistensi uterus*) misalnya trauma, hidramnion, gamelli.
- c. Kelainan letak, misalnya sungsang, sehingga tidak ada bagian terendah yang menutupi pintu atas panggul (PAP) yang dapat menghalangi tekanan terhadap membran bagian bawah.
- d. Keadaan sosial ekonomi.
- e. Faktor lain :
 - 1) Faktor golongan darah, akibat golongan darah ibu dan anak yang tidak sesuai dapat menimbulkan kelemahan bawaan.
 - 2) Faktor *disproporsi* antar kepala janin dan panggul ibu.
 - 3) Faktor *multi graviditas*, merokok dan perdarahan antepartum.
 - 4) Defisiensi gizi dari tembaga atau asam askorbat (Vitamin C)
(Nugroho, 2012: 150-151).
- f. Fisiologi selaput amnion / ketuban yang abnormal
- g. Infeksi vagina / serviks
- h. Distensi uteri

- i. Stress maternal
- j. Stress fetal
- k. Serviks yang pendek
- l. Prosedur medis (Marmi, dkk, 2016: 104).

4. Faktor Risiko

KPD merupakan salah satu penyebab komplikasi kehamilan yang ditakutkan oleh tenaga medis. KPD berisiko bayi lahir secara prematur. KPD didefinisikan sebagai pecahnya selaput ketuban dibawah 37 minggu usia kehamilan. Peluang KPD dilaporkan sekitar 3% dari populasi wanita hamil. Penyebab sesungguhnya belum diketahui secara pasti, namun ada dugaan bahwa infeksi dan peradangan selaput korion merupakan salah satu penyebab kolagen yang menyusun dinding ketubah pecah. Akibatnya, berisiko meningkatkan kesakitan pada bayi dan ibu, seperti gangguan sistim pernafasan, infeksi serius, prolapse tali pusat plasenta terlepas, bahkan sampai kematian bayi (Andalas, 2014: 16-17).

Sementara itu, umur ibu yang mengalami kejadian KPD banyak terjadi pada umur <20-35> tahun dibandingkan dengan umur 20 tahun dan 35 tahun (Legawati & Riyanti, 2018).

Pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan untuk menentukan apakah cairan tersebut berasal dari ketuban pecah atau bukan adalah dengan melihat langsung menggunakan bantuan *speculum*, alat untuk memeriksa mulut rahim. Bila mungkin, dapat juga diminta ibu hamil untuk batuk, yang berefek keluar cairan ketuban secara tiba-tiba dari mulut rahim. Secara laboratorik,

cairan ketuban tersebut bisa ditentukan dengan tes kertas nitrazin atau lebih dikenal dengan kertas lakmus. Warna kertas lakmus akan berubah menjadi biru bila cairan ketuban dan pemeriksaan dengan cara ini bisa dilakukan sendiri (Andalas, 2014: 16-17).

5. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. Aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes, dengan ciri pucat dan bergaris warna darah. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran. Tetapi, bila anda duduk atau berdiri, kepala janin yang sudah terletak di bawah biasanya “menganjal” atau “menyumbat” keboncoran. Sementara itu, demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut jantung janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi (Nugroho, 2012: 152).

6. Komplikasi

Komplikasi paling sering terjadi pada KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu adalah *sindrom distress* pernapasan/ sindroma gawat nafas bagi bayi, yang terjadi pada 10-40% bayi baru lahir. Risiko infeksi meningkat pada kejadian KPD. Semua ibu hamil dengan KPD prematur sebaiknya dievaluasi untuk kemungkinan terjadinya *korioamnionitis* (radang pada korion dan amnion). Selain itu kejadian *prolapse* atau keluarnya tali pusar dapat terjadi pada KPD (D dan DWI, 2013 : 250).

Infeksi *intrapartum* ascendens dari vagina ke *intrauterine*. Pada ketuban pecah 6 jam, resiko infeksi meningkat 1 kali. Ketuban pecah 24 jam, resiko infeksi meningkat sampai 2 kali lipat (D dan Dwi, 2013: 257).

7. Penatalaksanaan

Adapun penatalaksanaannya:

a. Konservatif

Penanganan secara konservatif yaitu:

- 1) Rawat di rumah sakit.
- 2) Beri antibiotik: bila ketuban pecah > 6 jam berupa: Ampisilin 4x500 mg atau gentamycin 1x 80 mg.
- 3) Umur kehamilan < 32-34 minggu: dirawat selama air ketuban masih keluar atau sampai air ketuban tidak keluar lagi.
- 4) Bila usia kehamilan 32-34 minggu, masih keluar air ketuban, maka usia kehamilan 35 minggu dipertimbangkan untuk terminasi kehamilan (hal ini sangat tergantung pada kemampuan perawatan bayi prematur).
- 5) Nilai tanda-tanda infeksi (suhu, leukosit, tanda-tanda infeksi intra uterine).
- 6) Pada usia kehamilan 32-34 minggu, berikan steroid untuk memacu kematangan paru-paru janin.

b. Aktif

Penanganan secara aktif yaitu:

- 1) Kehamilan > 35 minggu: induksi oksitosin, bila gagal dilakukan seksio sesarea. Cara induksi: 1 ampul syntocinon dalam dektrosa 5 %, dimulai 4 tetes sampai maksimum 40 tetes/ menit.
- 2) Pada keadaan CPD, letak lintang dilakukan secsio sesarea.
- 3) Bila ada tanda infeksi: beri antibiotika dosis tinggi dan persalinan diakhiri (Nugroho, 2012: 155)

D. Teori Manajemen Kebidanan Berdasarkan Kasus Persalinan Dengan Ketuban Pecah Dini Disertai Infeksi Intrapartum

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan dan kerangka berpikir yang digunakan oleh bidan

dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Yulifah & Surachmindari, 2014: 126).

Manajemen kebidanan adalah proses manajemen memberi suatu metode pengaturan/ pengorganisasian pikiran dan tindakan dalam suatu urutan yang logis dan menguntungkan baik pasien maupun ptugas kesehatan (Handajani, 2010: 4).

a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar)

Pada langkah ini, dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap. Pada kasus KPD dengan Infeksi Intrapartum, data yang perlu untuk dikumpulkan data subjektif yang terdiri dari alasan kunjungan, riwayat keluhan utama, riwayat perkawinan, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan lalu, riwayat keluarga, riwayat haid, riwayat obstetrik dan ginekologi, riwayat seksual, riwayat KB (Yulifah dan Surachmindari, 2014 : 127).

Selain itu, data objektif meliputi pemeriksaan umum, pengukuran tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik khusus, pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rontgen, pemeriksaan USG. Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dari sumber yang berkaitan dengan kondisi klien (Yulifah & Surachmindari, 2014: 127-131).

Tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. Aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes, dengan ciri pucat dan bergaris warna darah. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran. Tetapi, bila anda duduk atau berdiri,

kepala janin yang sudah terletak di bawah biasanya “menganjal” atau “menyumbat” kebocoran. Sementara itu, demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut jantung janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi (Nugroho, 2012: 152).

Infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban maupun asenderen dari vagina atau infeksi pada cairan ketuban bisa menyebabkan terjadi KPD, servik yang inkompetensia, kanalis servikalis yang selalu terbuka oleh karena kelainan pada servik uteri. Tekanan intrauterin yang meninggi atau meningkat secara berlebihan (*overdistensi uterus*) misalnya trauma, hidramnion, gamelli. Kelainan letak, misalnya sungsang, sehingga tidak ada bagian terendah yang menutupi pintu atas panggul (PAP) yang dapat menghalangi tekanan terhadap membran bagian bawah. Keadaan sosial ekonomi (Nugroho, 2012: 150-151).

Faktor lain seperti faktor golongan darah, akibat golongan darah ibu dan anak yang tidak sesuai dapat menimbulkan kelemahan bawaan. Faktor *disproporsi* antar kepala janin dan panggul ibu. Faktor *multi graviditas*, merokok dan perdarahan antepartum. Defisiensi gizi dari tembaga atau asam askorbat (Vitamin C) (Nugroho, 2012). Fisiologi selaput amnion / ketuban yang abnormal, infeksi vagina / serviks, distensi uteri, stress

maternal, stress fetal, serviks yang pendek, prosedur medis (Marmi, dkk, 2016: 104).

Faktor risiko yang terjadi KPD yaitu ada dugaan bahwa infeksi dan peradangan selaput korion merupakan penyebab KPD. Akibatnya, berisiko meningkatkan kesakitan pada bayi dan ibu, seperti gangguan sistim pernafasan, infeksi serius, prolapse tali pusat plasenta terlepas, bahkan sampai kematian bayi. Pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan untuk menentukan apakah cairan tersebut berasal dari ketuban pecah atau bukan adalah dengan melihat langsung menggunakan bantuan *speculum*, alat untuk memeriksa mulut rahim (Andalas, 2014: 16-17).

Bila mungkin, dapat juga diminta ibu hamil untuk batuk, yang berefek keluar cairan ketuban secara tiba-tiba dari mulut rahim. Secara laboratorik, cairan ketuban tersebut bisa ditentukan dengan tes kertas nitrazin atau lebih dikenal dengan kertas lakmus. Warna kertas lakmus akan berubah menjadi biru bila cairan ketuban dan pemeriksaan dengan cara ini bisa dilakukan sendiri (Andalas, 2014: 16-17).

b. Langkah II (Interpretasi Data Dasar)

Pada langkah ini dilakukan yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan

diagnosa dan masalah yang spesifik (Yulifah & Surachmindari, 2014: 131-132).

Ibu dapat didiagnosa KPD dengan infeksi apabila : tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. Aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes, dengan ciri pucat dan bergaris warna darah. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran. Tetapi, bila anda duduk atau berdiri, kepala janin yang sudah terletak di bawah biasanya “menganjal” atau “menyumbat” kebocoran. Sementara itu, demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut jantung janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi (Nugroho, 2012: 152).

c. Langkah III (Identifikasi Diagnosa Atau Masalah Potensial)

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis/ masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/ masalah potensial ini benar-benar terjadi. Langkah ini penting sekali dalam melakukan asuhan yang aman (Yulifah dan Surachmindari, 2013: 133).

Tujuan dari langkah ketiga ini adalah untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang dapat muncul. Pada langkah ini, bidan mengidentifikasi diagnosa dan masalah potensial berdasarkan diagnosa dan masalah yang sudah teridentifikasi atau diagnosa dan masalah aktual (Yulifah dan Surachmindari, 2013: 133).

Diagnosa potensial yang mungkin terjadi pada ibu yaitu infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/ masa nifas, *dry labour*/ partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal. Sedangkan masalah potensial yang terjadi pada janin yaitu prematuritas (*respiratory distress syndrome, hypothermia, neonatal feeding problem, retinopathy of prematurity, intraventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis, brain disorder (and risk of cerebral palsy, hyperbilirubinemia, anemia, sepsis), prolaps funiculi*/ penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder (kompresi tali pusat, *prolaps uteri, dry labour*/ partus lama, APGAR score rendah, *ensefalopaty, cerebral palsy, perdarahan intracranial, renal failure, respiratory distress*), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marni, dkk, 2016: 105-106).

Pada langkah ini, bidan dituntut untuk mampu mengantisipasi masalah potensial tidak hanya merumuskan

masalah potensial yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosa potensial tidak terjadi. Dengan demikian, langkah ini benar merupakan langkah yang bersifat antisipasi yang rasional/ logis. Kaji ulang diagnosa atau masalah potensial yang diidentifikasi sudah tepat (Yulifah & Surachmindari, 2014: 133).

d. Langkah IV (Menetapkan Kebutuhan Terhadap Tindakan Segera)

Tindakan segera merupakan tindakan yang dibutuhkan oleh klien dan belum teridentifikasi dalam diagnosa dan masalah yang didapatkan dengan melakukan analisis data. Pada langkah ini, bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Setelah itu mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan/ untuk dikonsultasikan atau ditangani Bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien (Yulifah & Surachmindari, 2014: 134).

Penanganan secara konservatif yaitu:

- 1) Rawat di rumah sakit.
- 2) Beri antibiotik: bila ketuban pecah > 6 jam berupa: Ampisilin 4x500 mg atau gentamycin 1x 80 mg.
- 3) Umur kehamilan < 32-34 minggu: dirawat selama air ketuban masih keluar atau sampai air ketuban tidak keluar lagi.

- 4) Bila usia kehamilan 32-34 minggu, masih keluar air ketuban, maka usia kehamilan 35 minggu dipertimbangkan untuk terminasi kehamilan (hal ini sangat tergantung pada kemampuan perawatan bayi prematur).
- 5) Nilai tanda-tanda infeksi (suhu, leukosit, tanda-tanda infeksi intra uterine).
- 6) Pada usia kehamilan 32-34 minggu, berikan steroid untuk memacu kematangan paru-paru janin.

Penanganan secara aktif yaitu :

- 1) Kehamilan > 35 minggu: induksi oksitosin, bila gagal dilakukan seksio sesarea. Cara induksi: 1 ampul syntocinon dalam dektrosa 5 %, dimulai 4 tetes sampai maksimum 40 tetes/ menit.
 - 2) Pada keadaan CPD, letak lintang dilakukan secsio sesarea.
 - 3) Bila ada tanda infeksi: beri antibiotika dosis tinggi dan persalinan diakhiri (Nugroho, 2012: 155).
- e. Langkah V (Perencanaan)

Perencanaan merupakan rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien yang atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut (Yulifah & Surachmindari, 2014: 134).

Semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh ini harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan

pengetahuan dan teori yang terbaru, serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien (Yulifah & Surachmindari, 2014: 135).

Asuhan yang diberikan pada ibu yaitu observasi KU, TTV, kemajuan persalinan, observasi DJJ dan His tiap 1 jam, lakukan kolaborasi dengan dokter, lakukan inform consent atas tindakan yang akan dilakukan, pasang infus RL 8 tpm + drip oxytocin $1/2$ CC, hadirkan suami atau keluarga untuk memberikan dukungan normal, anjurkan ibu berkemih jika kandung kemih terasa penuh, observasi pengeluaran pervaginaman, jelaskan pada ibu tentang keadaan diri dan janinnya, ajari ibu untuk menarik nafas panjang apabila ada his, minta ibu untuk tidak meneran sebelum pembukaan lengkap, beri ibu dukungan emosional (D dan Dwi, 2013: 275).

f. Langkah VI (Pelaksanaan)

Perencanaan merupakan rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah sebelumnya dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim lainnya (Yulifah & Surachmindari, 2014: 135).

Mengobservasi KU, TTV, kemajuan persalinan mengobservasi Djj dan His 1 tiap 1 jam, lakukan kalaborasi dengan dokter, melakukan inform consent atas tindakan yang akan

dilakukan, memasang infus RL 8 tpm + drip oxytocin $\frac{1}{2}$ CC, menghadirkan suami atau keluarga untuk memberikan dukungan moral, menganjurkan ibu untuk berkemih jika kandung kemih terasa penuh, mengobservasi pengeluaran pervaginam, menjelaskan pada ibu tentang keadaan diri dan janinnya, mengajari ibu untuk menarik nafas panjang saat ada his, minta ibu untuk tidak meneran sebelum pembukaan lengkap, memberi ibu dukungan emosional (D dan Dwi, 2013: 275-276).

g. Langkah VII (Evaluasi)

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang kita berikan kepada pasien, dilakukan evaluasi keefektifan asuhan yang telah diberikan. Hasil yang diharapkan dari manajemen kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD adalah dapat dilakukan partus secara spontan, komplikasi akibat tindakan medik dapat diatasi serta ibu dan janin dalam keadaan baik dan sehat. Evaluasi dilakukan untuk mengkaji ulang aspek asuhan yang efektif dan tidak efektif (Yulifah & Surachmindari, 2014: 135-136).

2. Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP

Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses berpikir sistematis, didokumentasikan dalam bentuk SOAP.

- a. S (Subjektif) menggambarkan pendokumentasikan hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis (langkah I Varney).

- b. O (Objektif) menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji diagnosa lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan (langkah I Varney).
- c. A (Pengkajian/*Assesment*) menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi:
- 1) Diagnosa/ masalah
 - 2) Antisipasi diagnosa/ masalah potensial
 - 3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter/ konsultasi/ kolaborasi dan atau rujukan (langkah II, III dan IV Varney).
- d. P (*Planning*) menggambarkan pendokumentasian tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assessment* (langkah V, VI, dan VII Verney) (Yulifah & Surachmindari, 2014: 136).

BAB III

TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING

A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Mengumpulkan semua referensi yang akurat berkaitan dengan kondisi pasien ibu dengan KPD, sehingga dapat ditentukan intrepetasi yang benar sesuai dengan referensi yang didapatkan.

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi dengan Ketuban Pecah Dini disertai Infeksi Intrapartum

No.	Judul Referensi	Oleh (sebutkan nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
-----	-----------------	----------------------------	-------	--------------	-------	-----------	-----------	--------------

1	Hubungan Umur Ibu Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Di RSUD Ambarawa	Ruth Canaya Br Sihotang, Fitria Primi astuti, Yulia Nur Khayati	2015	Umur ibu yang < 20 tahun, termasuk umur terlalu muda dengan keadaan uterus yang kurang matur untuk melahirkan sehingga rentan mengalami ketuban pecah dini. Sedangkan umur > 35 tahun tergolong umur yang terlalu tua untuk melahirkan khususnya pada ibu primi (tua) dan berisiko tinggi mengalami ketuban pecah dini	Ada hubungan signifikan umur sebagai salah satu faktor terjadinya ketuban pecah dini (KPD).	Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik korelasi dengan menggunakan pendekatan cross sectional. variabel independennya adalah umur dan variabel dependennya adalah kejadian ketuban pecah dini.	Respoden yang digunakan adalah 388 orang.	Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wira Meiriza dan Athica Oviana yaitu Umur ibu yang < 20 tahun termasuk umur terlalu muda dengan keadaan uterus kurang matur untuk melahirkan sedangkan umur > 35 tahun tergolong umur yang terlalu tua untuk melahirkan sehingga rentan mengalami KPD.
---	---	---	------	--	---	---	---	--

2	<p>Hubungan Paritas dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin Di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta.</p>	<p>Ade Dinis Dovega</p>	<p>2011</p>	<p>Faktor resiko yang mempengaruhi kejadian KPD salah satunya yaitu paritas. Dilihat dari kategori paritas, sampel terbanyak yang mengalami KPD mayoritas pada primipara.</p>	<p>Terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan kejadian KPD. mayoritas KPD terjadi pada primipara.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode Cross Sectional dimana cara metode ini terbatas hanya dilakukan pada satu waktu dan semuanya dikumpulkan secara bersamaan.</p>	<p>Sampel dilakukan dengan menggunakan <i>purposive sampling</i> yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria inklusi sampel dipilih dari ibu bersalin dengan kehamilan tunggal, tidak hidramnion presentasi kepala, kondisi panggul normal dan tidak serviks inkompeten.</p>	<p>Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasnia Nur Laili, dkk yaitu salah satu faktor KPD yaitu paritas yang mayoritas terjadi pada KPD.</p>
---	---	-------------------------	-------------	---	--	--	---	---



3	Hubungan Paritas Dan Anemia Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Di RSUD Bangkinang.	Rahma Sri Dewi, Fitria Apriyanti, Elvira Harmia.	2020	Anemia merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya KPD. Pada ibu dengan anemia, kadar hemoglobin sebagai pembawa zat besi dalam darah berkurang, yang mengakibatkan rapuhnya beberapa daerah dari selaput ketuban, sehingga terjadi kebocoran pada daerah tersebut. Sedangkan paritas merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan KPD karena peningkatan paritas yang memungkinkan kerusakan serviks selama proses kelahiran sebelumnya.	Paritas memiliki faktor risiko lebih tinggi terjadinya KPD. Paritas 1 (primipara) dan paritas tinggi (lebih dari 3 atau grandemultipara) mempunyai angka kematian maternal atau memiliki risiko lebih tinggi. Lebih tinggi paritas, lebih tinggi kematian maternal dikarenakan ibu mengalami komplikasi kehamilan seperti terjadinya KPD.	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode Cross Sectional dimana cara metode ini terbatas hanya dilakukan pada satu waktu dan semuanya dikumpulkan secara bersamaan.	Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh data ibu bersalin tahun 2018 sebanyak 233 orang.	Ada hubungan yang signifikan antara paritas dan anemia dengan KPD.
---	--	--	------	---	---	---	--	--

4	Patologi Kebidanan.	Taufan Nugroho	2012	KPD adalah pecahya ketuban sebelum waktunya melahirkan atau sebelum inpartu, pada pembukaan < 4 cm (fase laten). KPD preterm adalah KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu. Sedangkan KPD memanjang adalah KPD yang terjadi lebih dari 12 jam sebelum waktunya melahirkan.	KPD merupakan komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan kurang bulan, dan mempunyai kontribusi yang besar pada angka kematian perinatal pada bayi yang kurang bulan. Pengelolaan KPD pada kehamilan kurang dari 34 minggu sangat kompleks, bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya prematuris dan RDS (respiration distress syndrome), mengurangi resiko infeksi dan korioamnionitis akibat kejadian KPD, keluarnya tali pusar, dan kematian janin.	Buku ini disajikan dengan bahasa yang sulit dimengerti.	Penjelasan setiap materi lengkap mulai dari pengertian, etiologi, tanda dan gejala, diagnosa, pemeriksaan penunjang, komplikasi dan penatalaksanaan.	Penjelasan materi pada buku ini sama dengan penjelasan materi pada buku Nita Norma dan Mustika Dwi yaitu KPD merupakan komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan kurang bulan, dan mempunyai kontribusi yang besar pada angka kematian perinatal pada bayi yang kurang bulan. Namun berbeda pada KPD yang lebih dari 12 jam.
---	---------------------	----------------	------	--	---	---	--	---

5	Hubungan Pola Seksual Ibu Hamil dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD DR. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin	Lisda Handayani, Rizqy Amelia, Eliya Sumarni	2017	<p>Hasil penelitian menunjukkan pola seksual merupakan faktor resiko terjadinya ketuban pecah dini (KPD). Ibu yang memiliki pola seksual tidak tepat berisiko mengalami KPD sebanyak 10 kali. Ibu hamil yang melakukan hubungan seksual saat trimester III dengan frekuensi berlebihan akan berisiko mengalami ketuban pecah dini karena sperma yang dihasilkan setiap kali berhubungan intim mengandung prostaglandin sehingga akan terus merangsang kontraksi, ini dengan demikian semakin sering berhubungan intim maka akan semakin besar kontraksi yang ditimbulkan sehingga berakibat pecahnya ketuban sebelum waktunya.</p>	<p>Ada hubungan yang signifikan antara pola seksual ibu hamil dengan kejadian KPD.</p>	<p>Dari 30 orang ibu bersalin yang mengalami KPD sebagian besar adalah ibu yang pola seksualnya tidak tepat yaitu sebanyak 27 orang.</p>	<p>Populasi adalah seluruh ibu bersalin di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin pada bulan April 2017 yang berjumlah 400 orang.</p>	<p>Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuti Meihartati dan Hairiyah yaitu ibu hamil yang sering melakukan hubungan seksual akan mengalami KPD karena sperma yang dihasilkan setiap kali berhubungan intim mengandung prostaglandin sehingga akan terus merangsang kontraksi.</p>
---	--	--	------	--	--	--	--	--

6	Hubungan Paparan Asap Rokok Terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini di Puskesmas Ringinarum Kabupaten Kendal	Rozikhan, Titik Sapartinah, Ana Sundari	2020	Paparan asap rokok pada ibu hamil sebenarnya justru merugikan kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Berbagai kerugian tersebut akhirnya menyebabkan ibu hamil mengalami KPD karena asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif dan terhirup oleh perokok pasif, sebanyak empat kali lebih banyak mengandung tar dan nikotin, 5 kali lebih banyak mengandung karbon monoksida yaitu merupakan radikal bebas yang dapat menimbulkan kerusakan tubuh.	Terdapat hubungan yang signifikan antara paparan asap rokok dengan KPD.	Teknik pengambilan sampel menggunakan semua anggota populasi.	Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasinya adalah semua ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di RSUD Dr. H Soewondo Kabupaten Kendal	Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muntoha, Suhartono, Nur Endah W yaitu wanita hamil yang terpapar asap rokok seringkali mengalami berbagai macam gangguan selama kehamilan salah satunya KPD. Karena mengandung tar yang merupakan radikal bebas yang dapat menimbulkan kerusakan tubuh.
---	---	---	------	--	---	---	--	---



7	Hubungan antara Riwayat Paparan Asap Rokok dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini pada Ibu Hamil di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal	Muntoha, Suhartono, Nur Endah W	2013	Wanita hamil yang terpapar asap rokok seringkali mengalami berbagai macam gangguan selama kehamilan salah satunya KPD. Hal ini terjadi karena kandungan tar dalam asap rokok merupakan radikal bebas yang akan merusak komponen molekul utama dari sel tubuh dan dapat mengganggu integritas sel, berkurangnya elastisitas membran, termasuk selaput ketuban sehingga rentan mengalami rupture.	Ada hubungan yang bermakna antara riwayat paparan asap rokok dengan KPD.	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode survey analitik yaitu penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi. Kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antara fenomena atau antara faktor resiko dengan faktor efek yang terdiri dari faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini.	Responden yang digunakan yaitu 64 orang. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variable yang paling dominan mempengaruhi kejadian KPD adalah paparan asap rokok dengan nilai p 0,00 atau p value < 0,05, sehingga menggambarkan terdapat interaksi antara riwayat paparan asap rokok dengan kejadian KPD.	Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rozikhan, Titik Sapartinah, Ana Sundari yaitu wanita hamil yang terpapar asap rokok seringkali mengalami berbagai macam gangguan selama kehamilan salah satunya KPD. Karena mengandung tar yang merupakan radikal bebas yang dapat menimbulkan kerusakan tubuh.
---	---	---------------------------------	------	---	--	---	--	---

8	Hubungan Paritas Dengan Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin.	Hasnia Nur Laili, dkk.	2018	Selaput ketuban yang membatasi rongga amnion terdiri atas amnion dan korion yang erat ikatannya. Lapisan ini terdiri atas beberapa sel seperti sel epitel, sel mesenkim, damsel trofoblas yang terikat dalam matriks kolagen. Selaput ketuban berfungsi menghasilkan air ketuban dan melindungi janin terhadap infeksi. Dalam keadaan normal selaput ketuban pecah dalam proses persalinan sedangkan ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan.	Ada hubungan paritas dengan KPD usia kehamilan < 37 minggu dan ≥ 37 minggu, dimana sebagian besar ibu bersalin mengalami KPD pada paritas primipara dan hampir seluruh ibu bersalin mengalami KPD pada usia kehamilan ≥ 37 minggu. Hal ini dapat terjadi karena pada ibu primipara dengan usia kehamilan ≥ 37 minggu, secara fisiologis terjadi pembesaran uterus, kontraksi rahim dan gerakan janin sehingga terjadi perbuahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban inferior mudah rapuh yang diikuti deaskularisasi sehingga dapat menyebabkan ketuban mudah pecah secara spontan sebelum terdapat tanda mulai persalinan.	Ibu bersalin pada paritas primipara lebih banyak mengalami KPD dibandingkan ibu bersalin pada paritas multipara.	Sampel yang digunakan sebanyak 133 orang ibu bersalin yang mengalami KPD pada usia kehamilan < 37 minggu dan ≥ 37.	Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Dinis Dovega yaitu salah satu faktor KPD yaitu paritas yang sebagian besar terjadi KPD pada primipara.
---	---	------------------------	------	---	---	--	--	--

9	Hubungan Umur Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Di Ruang Rawat Inap Kebidanan RSUD Solok.	Wira Meiriza dan Athica Oviana.	2017	Adanya hubungan umur ibu dengan kejadian KPD dikarenakan pada umur dibawah 20 tahun, dari segi biologis fungsi reproduksi seorang wanita belum berkembang dengan sempurna untuk menerima keadaan janin dan segi psikis belum matang dalam menghadapi tuntutan beban moril, mental dan emosional. Sedangkan pada umur diatas 35 tahun dan sering melahirkan, fungsi reproduksi seorang wanita sudah mengalami kemunduran atau degenerasi dibandingkan fungsi reproduksi normal sehingga kemungkinan untuk terjadinya komplikasi pasca persalinan terutama KPD.	Ada hubungan antara faktor resiko umur ibu dengan terjadinya KPD pada ibu inpartu.	Penelitian ini menggunakan data sekunder dan terbatas pada identifikasi pada faktor usia dan paritas ibu dan tidak ada pengontrolan pada faktor lain yang ikut berperan dalam kejadian KPD.	Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang melahirkan di ruang kebidanan pada enam bulan terakhir yaitu sebanyak 668 orang persalinan.	Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruth Canaya Br Sihotang, Fitria Primi astuti, Yulia Nur Khayati yaitu Umur ibu yang < 20 tahun termasuk umur terlalu muda dengan keadaan uterus kurang matur untuk melahirkan sedangkan umur > 35 tahun tergolong umur yang terlalu tua untuk melahirkan sehingga rentan mengalami KPD.
---	--	---------------------------------	------	---	--	---	---	---



10	Hubungan Antara Pola Seksualitas Gravida Dengan Ketuban Pecah Dini.	Tuti Meihartati dan Hairiyah	2017	Ibu hamil yang melakukan hubungan seksual dengan frekuensi berlebihan akan berisiko mengalami ketuban pecah dini karena sperma yang dihasilkan setiap kali berhubungan intim mengandung prostaglandin sehingga akan terus merangsang kontraksi, dengan demikian semakin sering berhubungan intim maka akan semakin besar kontraksi yang ditimbulkan sehingga berakibat pecahnya ketuban sebelum waktunya.	Ada hubungan yang signifikan antara pola seksual dengan terjadinya KPD pada ibu inpartu.	Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan metode cross sectional yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara factor-faktor risiko dengan efek, artinya tiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan, tujuan penelitian ini untuk mengamati hubungan antara faktor risiko dengan akibat yang terjadi berupa penyakit atau keadaan kesehatan tertentu dalam waktu yang bersamaan, ditanya masalahnya (akibat) sekaligus penyebabnya (faktor risiko).	Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang berkunjung dari bulan Juli sampai bulan Agustus berjumlah 564 ibu hamil.	Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisda Handayani, Rizqy Amelia, Eliya Sumarni yaitu ibu hamil yang sering melakukan hubungan seksual akan mengalami KPD karena sperma yang dihasilkan setiap kali berhubungan intim mengandung prostaglandin sehingga akan terus merangsang kontraksi.
----	---	------------------------------	------	---	--	--	--	---

B. Langkah II : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Aktual

Identifikasi diagnosis, masalah dan kebutuhan pasien dengan ketuban pecah dini disertai infeksi intrapartum berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No.	Judul Referensi	Oleh (sebutkan nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Studi pengukuran PH cairan ketuban	Ika Pratiwi dan Sri Rahayu	2018	Pengukuran PH cairan ketuban untuk mengetahui usia kehamilan, kadar surfactant tingkat kematangan janin, komplikasi intrauterine seperti <i>Fetal Distress</i> dan infeksi intrauterine.	Usia kehamilan adalah lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus kirakira 280 (40 minggu dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). Pada umumnya ibu dengan preterm lebih, cenderung mengalami ketuban pecah dini dikarenakan masih lemahnya kekuatan selaput ketuban yang berhubungan dengan perbesaran dan usia uterus, kontraksi rahim dan gerakan janin. Tetapi dari hasil uji statistic yang telah dilakukan, diperoleh hasil ibu dengan usia kehamilan aterm juga mengalami ketuban pecah dini. Hal ini dapat	Sampel yang digunakan jumlahnya sedikit.	Metode penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Retroflektif dengan teknik total sampling.	Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Ikrawanty Ayu W, dkk yaitu pada umumnya ibu dengan preterm lebih, cenderung mengalami ketuban pecah dini dikarenakan masih lemahnya kekuatan selaput ketuban.

					disebabkan oleh Faktor lain seperti pola pekerjaan ibu hamil yang terlalu berat dapat berakibat pada kelelahan dan akan menyebabkan lemahnya korion amnion sehingga timbul ketuban pecah dini.			
2.	Faktor yang Berhubungan Terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSIA Sitti Khadijah I Makassar.	Ikrawanty Ayu W, dkk.	2019	Kejadian ketuban pecah dini pada ibu hamil dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya usia kehamilan, paritas, umur ibu, pekerjaan dimana usia kehamilan merupakan 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari pertama haid terakhir.	Ada hubungan antara usia kehamilan dengan ketuban pecah dini dimana pada umumnya ibu dengan preterm lebih, cenderung mengalami ketuban pecah dini dikarenakan masih lemahnya kekuatan selaput ketuban yang berhubungan dengan perbesaran dan usia uterus, kontraksi rahim dan gerakan janin.	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode Sectional Study dimana metode ini terbatas dan hanya dilakukan pada satu waktu dan satu kali, tidak ada follow up untuk mencari hubungan antara variabel independen (faktor risiko) dan variabel dependen (efek). Semuanya diobservasi pada waktu yang sama.	Responden yang digunakan yaitu 275 orang.	Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Ika Pratiwi dan Sri Rahayu yaitu pada umumnya ibu dengan preterm lebih, cenderung mengalami ketuban pecah dini dikarenakan masih lemahnya kekuatan selaput ketuban.

3.	Asuhan Kebidanan Patologi	Nita Norma D dan Mustika Dwi S	2013	Dalam menegakkan diagnosa KPD dengan cara Anamnesa, inspeksi, pemeriksaan spekulum, pemeriksaan dalam, pemeriksaaan laboratorium dan pemeriksaan USG.	Anamnesa dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengeluaran cairan, berbau, dan belum ada pengeluaran lendir dan darah. Pada pemeriksaan spekulum dapat diketahui apakah keluar cairan atau tidak. Pemeriksaan dalam didapat cairan didalam vagina dan selaput ketuban sudah tidak ada lagi. Sedangkan pada pemeriksaan laboratorium akan diperiksa air ketuban ibu menggunakan tes lakmus. Selanjutnya pemeriksaan USG untuk melihat jumlah air ketuban yang tersisa.	Tidak ada penjelasan materi mengenai umur yang rentan terjadi KPD.	Diagnosa dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang.	Penjelasan materi pada buku ini sama dengan penjelasan materi pada buku Ketut Surya Negara, dkk yaitu diagnosis KPD ditegakkan dengan cara anamnesa pasien merasakan basa pada vagina atau cairan yang keluar, berbau, warna dari cairan dan pemeriksaan USG.
4.	Patologi Kehamilan	Arantika Meidya Pratiwi dan Fatimah	2019	KPD adalah kelainan kehamilan dimana ketuban yang seharusnya pecah dan keluar karena kontraksi rahim menjelang persalinan justru pecah sebelum saat persalinan tiba.	Pecah ketuban dini terjadi ketika air ketuban yang belum siap menuju persalinan pecah yang biasanya terjadi pada usia kehamilan 37 minggu atau sebelumnya.	Penjelasan materi tersebut belum lengkap, tidak ada penjelasan mengenai penegakkan diagnosa dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dan USG.	Materi disertai dengan penjelasan mengenai gejala yang terjadi pada ibu dengan KPD.	Penjelasan materi pada buku ini sama dengan penjelasan materi pada buku Sarwono Prawirohardjo yaitu bila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut ketuban pecah dini pada kehamilan

								premature. Namun berbeda dalam hal pemeriksaan menggunakan tes lakmus.
5.	Asuhan Kebidanan Patologi	A.Retno Murti Suryaningsih dan Ery Fatmawati	2016	Dengan menilai apakah KPD atau tidak, dapat dilakukan dengan cara melihat ada cairan yang keluar berisi mekonium, pemeriksaan inspekulo, pemeriksaan USG, terdapat infeksi genital, dan gejala choriomnionitis.	Tes cairan ketuban dilakukan dengan cara kultur/gram, fetal fibronectin, glukosa, leukosit esterase dan sitokin. Normal pH cairan ketuban 7,0-7,5, dan apabila uji kertas lakmus/nitrazin test berwarna biru(basa) maka cairan tersebut adalah air ketuban.	Tidak ada penjelasan materi mengenai umur yang rentan terjadi KPD.	Diagnosis dilengkapi dengan tes valsava, tes nitrazin, dan tes fern.	Penjelasan materi pada buku ini sama dengan penjelasan materi pada buku Sarwono Prawirohardjo yaitu tes cairan ketuban untuk mengetahui cairan tersebut air ketuban atau tidak.
6.	Patologi Kebidanan	Taufan Nugroho	2012	Menegakkan diagnosis KPD dapat dilakukan dengan anamnesa, inspeksi, pemeriksaan dengan spekulum dan pemeriksaan dalam.	Mendiagnosis KPD dengan cara anamnesa pasien untuk mengetahui penderita merasa basah pada vagina atau mengeluarkan cairan yang banyak secara tiba-tiba, warna dan bau dari cairan tersebut, serta dilakukannya pemeriksaan dalam untuk mengetahui apakah masih didapati cairan dan selaput	Tidak ada penjelasan materi mengenai umur yang rentan terjadi KPD.	Penjelasan materi dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang.	Penjelasan materi pada buku ini sama dengan penjelasan materi pada buku Ketut Surya Negara, dkk yaitu diagnosis KPD dengan cara anamnesa pasien untuk mengetahui

					ketuban atau tidak.			penderita merasa basah pada vagina atau mengeluarkan cairan yang banyak secara tiba-tiba, warna dan bau dari cairan tersebut serta pemeriksaan inspeksi dan pemeriksaan dengan spekulum.
7.	Ilmu Kebidanan	Sarwono Prawirohardjo	2016	Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Bila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut ketuban pecah dini pada kehamilan premature. KPD dapat diketahui dengan menggunakan tes lakmus	Penentuan cairan ketuban dapat dilakukan dengan tes lakmus (<i>Nitrazin test</i>). Dan penentuan usia kehamilan dengan pemeriksaan USG.	Penjelasan materi tersebut belum lengkap tidak ada penegakkan diagnosa dengan cara anamnesa, inspeksi, pemeriksaan dengan spekulum dan pemeriksaan dalam.	Materi disertai dengan penjelasan persalinan KPD pada kehamilan premature.	Penjelasan materi pada buku ini sama dengan penjelasan materi pada buku A.Retno Murti Suryaningsih dan Ery Fatmawati yaitu tes cairan ketuban untuk mengetahui cairan tersebut air ketuban atau tidak.

8.	Buku Ajar Patologi Obstetri Untuk Mahasiswa Kebidanan.	dr. Ida Ayu Chandranita Manuaba, dkk.	2009	Sebagian besar KPD terjadi pada kehamilan aterm lebih dari 37 minggu, sedangkan kurang dari 36 minggu tidak terlalu banyak.	Evaluasi yang dilakukan pada kehamilan dengan KPD meliputi evaluasi terhadap faktor risiko, evaluasi dengan USG, dan melakukan pemeriksaan terhadap tingkat infeksi. Infeksi yang mungkin terjadi dievaluasi dengan amniosentesis, USG, kultur beta-streptokokus, menilai kematangan paru janin, dan percobaan indigokarmin untuk memastikan apakah benar KPD dengan cairan terdapat dalam vagina.	Tidak ada Penjelasan materi mengenai penegakkan diagnosa dengan cara anamnesa, inspeksi, pemeriksaan dengan spekulum dan pemeriksaan dalam.	Penjelasan materi disertai dengan evaluasi kehamilan dengan KPD.	Penjelasan materi pada buku ini sama dengan penjelasan materi pada buku Sarwono Prawirohardjo yaitu KPD dilihat dari usia kehamilan. Namun berbeda dalam hal pemeriksaan pada tingkat infeksi.
9.	Anemia dalam Kehamilan	Reni Yuli Astutik dan Dwi Ertiana	2018	KPD didefinisikan sebagai kebocoran cairan ketuban melalui Ruptured Chorioamniotic membranes yang terjadi sebelum adanya tanda-tanda persalinan di setiap usia kehamilan.	KPD seringkali menimbulkan konsekuensi yang berimbas pada morbiditas dan mortalitas pada ibu maupun bayi, terutama pada kematian perinatal yang cukup tinggi yaitu prematuritas, <i>respiratory distress syndrome</i> , perdarahan intraventrikel, sepsis, hipoplasia paru dan deformitas skeletal.	Tidak ada Penjelasan materi mengenai penegakkan diagnosa dengan cara anamnesa, inspeksi, pemeriksaan dengan spekulum dan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan penunjang dan penatalaksanaan	Penjelasan materi disertai dengan etiologi dan patofisiologi.	Penjelasan materi pada buku ini sama dengan penjelasan materi pada buku Sarwono Prawirohardjo yaitu KPD dilihat dari usia kehamilan dan pecah sebelum ada tanda-tanda persalinan.

10.	Buku Ajar Ketuban Pecah Dini	Ketut Surya Negara, dkk.	2017	Kejadian KPD terjadi pada 10-12% dari semua kehamilan. Pada kehamilan preterm 2-5% laporan lain mendapatkan KPD terjadi pada sekita 6% sampai 8% wanita sebelum usia kehamilan 37 minggu dan secara langsung mendahului 20% sampai 50% dari semua kehaliran premature.	Diagnosis KPD ditegakkan dengan cara anamnesa pasien merasakan basa pada vagina atau cairan yang keluar, berbau, warna dari cairan tersebut. Menentukan usia kehamilan dari HPHT dan USG. Kemudian dari inspeksi didapatkannya pecahnya selaput ketuban dengan adanya cairan ketuban keluar dari vagina. Pemeriksaan dengan spekulum pada KPD akan tampak keluar cairan dari orifisium uteri eksternum, kalau belum juga tampak keluar, fundus uteri ditekan, penderita diminta batuk, mengejan, atau bagian terendah digoyangkan, akan tampak keluar cairan dari ostium uteri dan terkumpul pada fornix anterior.	Penjelasan materi tidak disertai umur seorang ibu yang rentan terjadi KPD.	Penjelasan materi lengkap.	Penjelasan materi pada buku ini sama dengan penjelasan materi pada buku Taufan Nugroho yaitu diagnosis KPD dengan cara anamnesa pasien untuk mengetahui penderita merasa basah pada vagina atau mengeluarkan cairan yang banyak secara tiba-tiba, warna dan bau dari cairan tersebut serta pemeriksaan inspeksi dan pemeriksaan dengan spekulum
-----	------------------------------	--------------------------	------	--	--	--	----------------------------	---

C. Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Potensial

Identifikasi masalah potensial pada ketuban pecah dini berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No.	Judul Referensi	Oleh (sebutkan nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Analisis Ketuban Pecah Dini Terhadap Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Di RSUD Budi Kemuliaan.	Dwi Ratna Prima, Widya Chandra, Irma Sari Lubis.	2018	KPD merupakan komplikasi langsung dalam kehamilan yang mengganggu kesehatan ibu dan juga pertumbuhan janin dalam kandungan sehingga meningkatkan risiko kelahiran BBLR.	Faktor yang mempengaruhi KPD pada BBLR yaitu usia, paritas, pendidikan, usia kehamilan, anemia, dan infeksi.	Peneliti menggunakan metode analitik kuantitatif dengan design cross sectional study.	Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Ibu yang mengalami KPD dengan BBLR di RSUD Budi Kemuliaan selama periode Juni 2018 – November 2018. Besar sampel sebanyak 111 bayi.	Ada hubungan yang signifikan antara usia, paritas, pendidikan, usia kehamilan, anemia, dan infeksi. Sedangkan pekerjaan tidak ada hubungannya dengan BBLR.
2.	Hubungan Ketuban Pecah Dini, Umur Kehamilan Dan Partus Lama Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum.	Violita Eka Febrianti, Septika Yani Veronica, Feri Kameliawati, Yuni Sulistiawati.	2020	Terjadinya masalah pada kehamilan dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan tidak sesuai dengan umur kehamilan pada umumnya, terdapat ibu hamil yang melahirkan dengan umur kehamilan <37 atau >42 minggu namun ada juga ibu hamil yang melahirkan sesuai	Ada hubungan antara KPD, umur kehamilan, dan partus lama dengan asfiksia neonatorum. Faktor utama terjadinya asfiksia neonatorum yaitu partus lama.	Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling.	Penelitian ini yang dijadikan populasi adalah Seluruh bayi sebanyak 1.890 data bayi.	Adanya hubungan antara KPD dengan kejadian asfiksia neonatorum.

				tafsiran kehamilan pada rentan usia 37-42 minggu.				
3.	Hubungan Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir Di RSUD DR. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.	Ria Citra Wulan, Ani Kristianingsih, Sukarni, Eka Tri Wulandari.	2019	Ketuban yang berkurang mengakibatkan tali pusat mengalami penyempitan dan aliran darah yang membawa oksigen ibu ke bayi terhambat sehingga menimbulkan asfiksia neonatorum atau hipoksia pada janin. KPD akan menyebabkan janin mengalami gangguan pada pemenuhan O ₂ sehingga bisa terjadi hipoksia pada janin.	KPD mempengaruhi asfiksia karena terjadinya oligohidramnion yang menekan tali pusat sehingga tali pusat mengalami penyempitan dan aliran darah yang membawa oksigen ibu ke bayi terhambat sehingga menimbulkan asfiksia neonatorum atau hipoksia.	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode case control dimana metode ini rawan recall bias apalagi pada responden yang sulit mengingat kembali riwayat yang telah dialami.	Populasi adalah Seluruh bayi lahir sebanyak 1.321 data bayi.	Ada hubungan KPD dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung didapatkan p-value 0.025 (>0.05).
4.	Hubungan Antara Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Persalinan Prematur Di Ruang VK RSU Haji Surabaya.	Eka Aquarista Wulansari, Siti Alfiah, Titi Maharrani.	2018	Usia ibu yang ≤ 20 tahun, termasuk usia yang terlalu muda dengan keadaan uterus yang kurang matur untuk melahirkan sehingga rentan mengalami ketuban pecah dini. Hal ini memungkinkan adanya faktor lain yang menyebabkan ketuban pecah dini, seperti infeksi, riwayat KPD sebelumnya, serviks inkompeten atau tekanan uterus berlebihan.	Ibu yang mengalami KPD dan persalinan prematur mayoritas dengan umur < 20 tahun dan > 35 tahun atau berada pada usia yang berisiko.	Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional yaitu jenis penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat.	Sampel yang digunakan sebanyak 295 ibu bersalin.	Ada hubungan antara KPD dengan kejadian persalinan prematur.
5.	Determinan Persalinan Sectio Caesarea Pada	Nur Helmi, Zulmeliza Rasyid.	2019	Kejadian SC dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu KPD, hipertensi, BBLR, sumber biaya	Hipertensi merupakan faktor utama kejadian SC. Sedangkan, yang tidak	Penelitian ini menggunakan desain penelitian	Populasi yang digunakan sebanyak 512	Ada hubungan yang signifikan antara hipertensi dan SC.

	Ibu Bersalin Suatu Rumah Sakit di Kota Pekanbaru.			melahirkan.	berhubungan dengan SC yaitu sumber biaya persalinan.	<p>analitik dengan metode cross sectional yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara factor-faktor risiko dengan efek, artinya tiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan, tujuan penelitian ini untuk mengamati hubungan antara faktor risiko dengan akibat yang terjadi berupa penyakit atau keadaan kesehatan tertentu dalam waktu yang bersamaan, ditanya</p>	orang.	
--	---	--	--	-------------	--	---	--------	--



						masalahnya (akibat) sekaligus penyebabnya (faktor risiko).		
6.	Hubungan Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasanuddin Damrah Manna.	Vevi Gusnidarsih, Liya Lugita Sari.	2019	Ibu yang mengalami KPD mempunyai peluang untuk melahirkan bayi asfiksia sebesar 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami KPD. Asfiksia Neonatorum merupakan keadaan bayi baru lahir tidak segera bernafas secara spontan dan teratur setelah dilahirkan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kejadian Asfiksia adalah KPD.	Secara statistik terdapat hubungan antara Ketuban Pecah Dini dengan Asfiksia Neonatorum.	Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional yaitu jenis penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin sebanyak 289 orang.	ada hubungan antara Ketuban Pecah Dini (KPD) dengan kejadian asfiksia Neonatorum.
7.	Hubungan Antara Ketuban Pecah Dini Dengan Nilai Apgar Pada Kehamilan Aterm.	Rico Alexander, Armon Rahimi.	2021	KPD disebabkan oleh karena berkurangnya kekuatan membran atau meningkatnya tekanan intrauterin atau oleh kedua faktor tersebut. Fase laten pada ketuban pecah dini merupakan lamanya waktu sejak ketuban pecah sampai terjadi proses persalinan. Semakin panjang fase laten, semakin besar kemungkinan pengaruh terhadap nilai apgar dan akan semakin besar kemungkinan	KPD yang terjadi lebih dari 12 jam sebelum waktunya melahirkan, yang mempunyai peranan penting terhadap nilai apgar dan timbulnya infeksi pada bayi yang akan berujung menjadi asfiksia neonatorum.	Sampel yang digunakan sebanyak 68 ibu dengan kasus KPD.	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode survey analitik yaitu penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena	Terdapat hubungan antara lama ketuban pecah dini dengan nilai Apgar.

				terjadinya infeksi yang berasal dari traktus urogenital bawah.			keehatan itu terjadi. Kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antara fenomena atau antara faktor resiko dengan faktor efek yang terdiri dari faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian KPD.	
8.	Analisis Hubungan Ketuban Pecah Dini (KPD) dan Paritas dengan Partus Lama.	Yunida Haryanti.	2020	Riwayat kejadian KPD sebelumnya menunjukkan bahwa wanita yang telah melahirkan beberapa kali dan mengalami KPD pada kehamilan berikutnya. Keadaan yang dapat mengganggu kesehatan ibu dan janin dalam kandungan juga dapat meningkatkan resiko kelahiran dengan KPD.	Ibu yang mempunyai paritas berisiko lebih besar untuk mengalami partus lama dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami partus lama.	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling.	Populasi yang digunakan sebanyak 1.383 orang.	Adanya hubungan yang signifikan variabel KPD dan paritas terhadap partus lama ibu melahirkan.
9.	Hubungan antara Durasi Ketuban Pecah Dini dengan APGAR Skor Neonatus.	Novia Anggraeni, Asriani, Rauliy Ramadhani.	2020	KPD merupakan kondisi dimana pecahnya selaput ketuban sebelum adanya tanda persalinan. Durasi KPD menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi bayi baru lahir, semakin lama	Semakin lama periode laten maka akan semakin lama pula kala satu persalinan yang nantinya durasi KPD ini akan mempengaruhi banyaknya pelepasan	Sampel yang digunakan sebanyak 112 orang.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional analitik	Terdapat hubungan antara durasi KPD dengan APGAR skor neonatus.

				<p>perlangsungan KPD maka akan menyebabkan hipoksia pada janin yang nantinya dapat dinilai menggunakan APGAR skor.</p>	<p>cairan amnion yang dapat menyebabkan volume amnion semakin berkurang sehingga terjadinya oligohidramnion, jika terus berlanjut maka akan terjadi kompresi tali pusat yang akan menurunkan suplai oksigen menuju janin, sehingga bayi mengalami hipoksia, kemudian ketika bayi lahir hal ini dapat mempengaruhi APGAR skor.</p>		<p>dengan rancangan cross sectional. Rancangan penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel dependen yaitu APGAR skor neonatus Dengan variabel independen yaitu durasi KPD.</p>	
10.	<p>Hubungan Antara Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli.</p>	<p>Nova Linda Rambe</p>	<p>2018</p>	<p>Ibu yang bersalin dengan KPD berisiko mengalami asfiksia. Hal ini disebabkan karna aliran nutrisi dan O2 tidak cukup, sehingga menyebabkan metabolisme janin menuju metabolisme anaerob dan terjadi penimbunan asam laktat dan piruvat yang merupakan hasil akhir dari metabolisme anaerob. Keadaan ini akan menimbulkan kegawatan janin (fetal distress) intrauteri yang akan berlanjut menjadi asfiksia neonatorum pada bayi baru lahir.</p>	<p>Terdapat hubungan antara KPD dengan kejadian asfiksia neonatorum.</p>	<p>Penelitian menggunakan metode kohort retrospektif yang dimana faktor resiko dan efek atau penyakit sudah terjadi dimasa lampau atau terjadi sebelumnya sebelum dilakukan penelitian.</p>	<p>Subjek penelitian ini adalah ibu bersalin sebanyak 334 orang.</p>	<p>Ada hubungan antara ketuban pecah dini dengan kejadian asfiksia neonatorum.</p>

D. Langkah IV : Identifikasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi

Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan ibu dengan ketuban pecah dini dengan melakukan konsultasi dan kolaborasi berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No.	Judul Referensi	Oleh (sebutkan nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Efektivitas misoprotol per vaginam dan per oral untuk induksi persalinan pada kehamilan aterm ketuban pecah dini.	Hariadi, dkk.	2002	Ketuban pecah dini adalah salah satu indikasi dilakukannya induksi persalinan. Saat ini telah dikenal berbagai jenis induksi persalinan salah satunya ialah misoprostol per vaginam dan per oral. Tetapi pada ketuban pecah dini keefektivannya masih dipertanyakan karena lingkungan vagina mempengaruhi keefektian misoprostol yang diberikan secara vaginal.	Keefektivan induksi misoprostol vaginal sebesar 87,50%. Sedangkan pada induksi per oral sebesar 80,70%. Lama waktu induksi sampai pembukaan lengkap pada kelompok misoprostol vaginal tidak berbeda dengan oral yaitu sebesar 10,00 ± 4,86 jam dan 9,76 ± 4,56 jam.	Penelitian menggunakan metode kohort retrospektif yang dimana faktor resiko dan efek atau penyakit sudah terjadi dimasa lampau atau terjadi sebelumnya sebelum dilakukan penelitian.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil aterm dengan ketuban pecah dini yang dirawat inap periode januari 1999 sampai dengan November 2001.	Induksi misoprostol per vaginal lebih efektif dibandingkan dengan induksi per oral.
2.	Keefektivan Misoprostol Peroral Sebagai Pematangan Serviks Pada Ketuban Pecah Dini	Joserizal Serudji, Erkadius.	2018	Penilaian serviks merupakan hal yang paling berpengaruh dalam keberhasilan induksi persalinan. Sebelum dimulainya induksi persalinan, ada	Bila KPD terjadi pada umur kehamilan aterm maka sebaiknya dilakukan terminasi kehamilan. Pilihan pervaginam maupun bedah seksio sesaria tergantung	Penelitian ini menggunakan metode uji klinik acak terkontrol tanpa pembutaan.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mengalami KPD bulan	Terdapat perbedaan yang signifikan kenaikan skor bishop pada pemberian misoprostol 25

	Kehamilan Aterm Dengan Skor Bishop ≤ 4 Di Padang			prosedur standar yang harus dilakukan untuk menilai serviks, yaitu periksa dalam. Setelah kita lakukan periksa dalam, serviks akan digolongkan ke dalam dua golongan yaitu, matang dan belum matang (ripe dan unripe). Sekitar setengah dari seluruh wanita yang menjalani induksi persalinan didapati serviks yang belum matang sehingga diperlukan tindakan pematangan serviks.	kondisi ibu, janin dan kehamilan. Pematangan serviks dengan misoprostol 25 ug per vaginam setiap 6 jam selama 2 kali pemberian bila skor bishop ≤ 5 atau misoprostol 20-25 ug per oral setiap 2 jam selama 2 kali pemberian.		November 2013 sampai Agustus 2014. Sampel dibagi dua kelompok, Kelompok A, ialah pasien KPD yang diberikan misoprostol 25 ug oral, kelompok B, ialah pasien KPD yang tidak diberikan misoprostol 25 ug oral.	ug peroral dengan yang tidak diberikan pada ketuban pecah dini aterm dengan skor bishop kecil atau sama dengan (\leq) 4.
3.	Gambaran Karakteristik Ibu, Nilai Bishop Dan Cara Terminasi Persalinan Pada Persalinan Kala 1 Dengan Induksi Pada Ketuban Pecah Dini Di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro, Kota Semarang.	Shinta Wurdiana Rhomadona	2019	Manajemen persalinan pada KPD dengan induksi dapat mengurangi risiko morbiditas infeksi pada ibu tanpa meningkatkan persalinan dengan tindakan dan seksio-cesaria, serta lebih sedikit bayi yang pergi ke perawatan intensif neonatal meskipun tidak ada perbedaan yang terlihat pada tingkat infeksi neonatal.	Rentan usia ibu kala 1 pada persalinan dengan induksi antara 22 – 41 tahun dengan rata-rata usia 30,66 tahun. Ibu yang telah mencapai usia kehamilan 42 minggu memiliki skor bishop <5 karena proses pematangan serviks dapat dipengaruhi hormon lain seperti estrogen sehingga pematangan serviks menjadi terhambat untuk terjadi. Sebagian besar ibu melahirkan	Sampel yang digunakan sangat sedikit sekali yaitu 30 orang.	Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu bersalinan kala 1 dengan induksi pada Ketuban Pecah Dini selama bulan Maret – April 2019.	Ibu bersalin kala 1 dengan induksi pada Ketuban Pecah Dini rata rata berusia $30,66 \pm 5,88$, yang memiliki nilai bishop kurang dari 5 yaitu sebanyak 19 orang (63,3%). sebagian besar cara terminasi

					secara spontan yaitu sebesar 56,6%. Sisanya 43,4% melahirkan dengan tindakan SC dan Vakum ekstrasi karena indikasi gagal induksi.			persalinanya dengan spontan atau pervaginam.
4.	Identifikasi Indikasi Induksi Persalinan Pada Ibu Di Ruang Bersalin RS Sufina Aziz.	Elvalini Warnelis Sinaga	2020	Induksi persalinan dilakukan pada serviks yang sudah atau mulai matang (ripe atau favourable), yaitu kondisi serviks sudah lembek, dengan pendataran sekurang-kurangnya 50%, dan pembukaan serviks satu jari.	Indikasi induksi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu inersia uteri, serotinus, KPD, dan <i>Intra Uteri Feath Death</i> (IUFD)	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dimana metode ini orientasinya terbatas pada nilai dan jumlah serta pengambilan data berasal dari nilai tertinggi.	Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu bersalin dengan kejadian induksi persalinan Tahun 2019 sejumlah 193 kasus.	Ibu bersalin yang mendapatkan tindakan induksi persalinan akibat Ketuban Pecah Dini, Serotinus, IUFD dan Inersia lebih banyak diakibatkan oleh pemberian induksi pada saat proses persalinan.
5.	Efektivitas Pemberian Misoprostol Pervaginam Dengan Oksitosin Intravena Terhadap Kemajuan Persalinan Pada Ibu Bersalin Indikasi KPD Di RS Islam Asy-Syifaa Bandar Jaya.	Reni dan Sunarsih.	2017	Misoprostol digunakan untuk induksi persalinan karena kemampuannya dalam pematangan serviks dan memacu kontraksi miometrium. Sedangkan, oksitosin merupakan preparat yang sering digunakan untuk induksi persalinan, tetapi kegagalan induksi dengan oksitosin sering terjadi walaupun	Lebih efektif pemberian misoprostol pervaginam dengan nilai-rata-rata 4,18 dibandingkan dengan pemberian oksitosin intravena dengan nilai rata-rata 3,12 dikarenakan dari faktor paritas ibu sebagian besar multipara dan pasangan usia subur sehingga proses pematangan servik lebih cepat.	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dimana metode ini orientasinya terbatas pada nilai dan jumlah serta pengambilan data berasal dari nilai	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin dengan KPD sebanyak 37 orang.	Induksi persalinan dengan misoprostol pervaginam pada ibu bersalin indikasi KPD nilai minimal (nilai terendah) 2 cm dan nilai maksimal (nilai tertinggi) 7 cm dengan nilai ratarata kemajuan

				komplikasi pada janin dan ibu kurang, karena dapat terkontrol dosisnya.		tertinggi.		persalinan 4,18. Sedangkan, induksi persalinan dengan oksitosin intravena mempunyai nilai minimal (nilai terendah) 1 cm dan nilai maksimal (nilai tertinggi) 5 cm dengan nilai rata-rata kemajuan persalinan 3,12.
6.	Keberhasilan Terapi Konservatif pada Persalinan Preterm Disertai dan Tanpa Disertai Ketuban Pecah Dini di RSD dr. Soebandi, Jember.	Nurul Furqooniyah, dkk.	2019	Persalinan preterm merupakan penyebab terbesar morbiditas dan mortalitas neonatal. Persalinan preterm dapat disertai dengan ketuban pecah dini. Persalinan preterm disertai dan tanpa disertai ketuban pecah dini keduanya diberikan terapi konservatif untuk menunda kelahiran. Pecahnya selaput ketuban menyebabkan perlindungan bagi janin kurang adekuat.	Keberhasilan terapi konservatif pada persalinan preterm disertai ketuban pecah dini ditemukan faktor yang mungkin mendasari keberhasilan terapi yaitu ibu yang rata-rata usia kehamilan paling muda dari 24-28 minggu. Sedangkan, keberhasilan terapi pada persalinan preterm tanpa disertai ketuban pecah dini karena pecahnya selaput ketuban dapat yang memicu kelahiran sehingga tingkat keberhasilan terapi	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode Cross Sectional dimana cara metode ini terbatas hanya dilakukan pada satu waktu dan semuanya dikumpulkan secara bersamaan.	Sampel yang digunakan yaitu semua kasus persalinan preterm tunggal spontan dari periode Januari 2015 - Januari 2017.	Adanya perbedaan signifikan keberhasilan terapi konservatif antara persalinan preterm disertai dan tanpa disertai ketuban pecah dini pada penelitian ini menunjukkan bahwa ketuban pecah dini sebagai penyakit penyerta dari persalinan preterm

					<p>konservatif persalinan preterm tanpa disertai ketuban pecah dini lebih tinggi.</p>			<p>merupakan keadaan yang berisiko karena kemungkinan untuk terjadinya kegagalan pemberian terapi konservatif lebih besar.</p>
7.	<p>Gambaran Karakteristik Ibu Bersalin Dengan Induksi Persalinan di RSUD Cibinong.</p>	<p>Dina Mariana.</p>	<p>2017</p>	<p>Gambaran karakteristik ibu bersalin dengan induksi persalinan meliputi umur ibu, paritas, usia kehamilan, komplikasi persalinan, dan pekerjaan.</p>	<p>Pada umur 20-35 tahun lebih banyak dilakukan induksi persalinan daripada umur <20 - >35. Usia kehamilan 37-42 minggu paling banyak dilakukan induksi dibandingkan dengan usia kehamilan 28-36 minggu. Persalinan anak ke 2-4 lebih banyak dilakukan induksi persalinan daripada persalinan anak 1 dan >4. Sedangkan, pada komplikasi KPD paling banyak dilakukan induksi daripada inersia uteri dan IUFD.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitain deskriptif korelatif dimana metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meneliti variabel terikat dan variabel bebas.</p>	<p>Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin di RSUD Cibinong 2013 sebesar 1125 orang ibu bersalin.</p>	<p>Gambaran karakteristik ibu bersalin persalinan dengan induksi persalinan dipengaruhi oleh umur ibu, paritas, usia kehamilan, komplikasi persalinan dan pekerjaan.</p>
8.	<p>Penggunaan off-Label Misoprostol pada Pasien Obstetri-Ginekologi di Rumah Sakit Swasta Kabupaten Banyumas.</p>	<p>Michelia Prastika Sugiri, Bella Arrista & Didik Setiawan</p>	<p>2021</p>	<p>Misoprostol diindikasikan sebagai obat tukak lambung, tukak duodenum, dan tukak yang disebabkan karena OAINS terutama pada pasien yang beresiko tinggi mengidap komplikasi tukak lambung. Pada penelitian ini Misoprostol dikategorikan sebagai obat off-</p>	<p>Indikasi KPD pada penelitian ini juga menggunakan induksi Misoprostol. Induksi persalinan dengan Misoprostol pada kasus KPD mayoritas memberikan keberhasilan persalinan dengan metode persalinan</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Kekurangan dari metode ini yaitu terbatas dalam memberikan</p>	<p>Populasi yang digunakan sebanyak 422 orang.</p>	<p>Terdapat penggunaan obat off-label pada pasien obstetri dan ginekologi. Off-label indikasi obat Misoprostol antara lain digunakan untuk</p>

				label indikasi karena penggunaannya untuk beberapa indikasi. Mayoritas penggunaan off-label Misoprostol adalah sebagai induksi persalinan.	normal.	informasi tentang pengaruh variabel-variabel yang diteliti.		Missed Abortion, Abortus Incomplete, Blighted Ovum, dan Induksi persalinan pada kasus Serotinus, KPD, dan IUFD.
9.	Pengaruh Pemberian Misoprostol 25 mg Peroral Ambulatoir pada Tenggat Waktu Persalinan Wanita Hamil > 40 Minggu Resiko Rendah.	Mariana Paristiwati Trihastuti, Bangun Trapsila Purwaka.	2015	Prostaglandin adalah obat terbaik yang telah diakui untuk pematangan cervix, dimana satu diantaranya adalah misoprostol (analog prostaglandin E1). Selain efektifitasnya yang tinggi, misoprostol diproduksi dalam bentuk tablet yang penyimpanannya cukup dalam suhu ruang serta mudah pemakaiannya. Misoprostol yang dipasarkan sebagai obat proteksi mukosa gastrointestinal digunakan pada pematangan cervix dan induksi persalinan karena aman, bermanfaat dan tidak mahal.	pemberian misoprostol 25µgr peroral perambulatoir tidak meningkatkan resiko terjadinya seksio sesarea. Sebaliknya, kehamilan lewat waktu (postterm) akan meningkatkan resiko terjadinya seksio sesarea karena kesejahteraan janin yang buruk.	Penelitian ini menggunakan rancang bangun analitik eksperimental dengan desain randomisasi secara acak buta berganda (Double blind Randomized Controlled Trial).	Populasi yang digunakan yaitu seluruh ibu bersalin.	Pemberian misoprostol 25µgr peroral perambulatoir mempersingkat tenggat waktu minum obat hingga bayi lahir, tidak mempengaruhi nilai Apgar bayi, dan tidak meningkatkan angka kejadian seksio sesarea.
10.	Misoprostol Untuk Induksi Persalinan Pada Kehamilan Aterm.	Gede Angga Permana AW, Putera Kemara, I Wayan Megadhana.	2016	Pada keadaan serviks yang belum matang dan kurang mendukung, proses pematangan tentulah sangat perlu dipertimbangkan sebelum melakukan induksi. Misoprostol selain memiliki efek uterotoniknya juga memiliki efek pada serviks yang sangat berguna pada serviks denga	Misoprostol vagina lebih efektif untuk menginduksi persalinan dibandingkan dengan metode konvensional menggunakan oksitosin.	Tidak ada metode penelitian yang digunakan.	Bahasa yang digunakan mudah dimengerti.	penggunaan misoprostol dapat memberikan keuntungan dibandingkan oksitosin, seperti lama induksi yang lebih singkat, kemajuan

	Ibu Bersalin di Rumah Sakit Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintang.			operasi, sectio caesarea secara bermakna memberikan kontribusi sebesar 25% terhadap penurunan AKI di Indonesia.		metode Cross Sectional Study dimana metode ini terbatas dan hanya dilakukan pada satu waktu dan satu kali, tidak ada follow up untuk mencari hubungan antara variabel independen (faktor risiko) dan variabel dependen (efek) semuanya diobservasi pada waktu yang sama.		adalah hipertensi.
3.	Keberhasilan Induksi Persalinan Berdasarkan Paritas.	Fayakun Nur Rohmah.	2021	Sebelum induksi persalinan dilakukan, kesiapan kondisi serviks perlu diperhatikan. Secara kuantitatif kesiapan dengan melihat kematangan serviks menggunakan skor Bishop. Semakin tinggi skor Bishop maka keberhasilan induksi persalinan semakin tinggi.	Ada hubungan antara paritas dengan keberhasilan induksi.	Sampel yang digunakan sebanyak 93 orang.	Desain penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan jenis penelitian observasional analitik yang mencari hubungan antara variabel keberhasilan induksi persalinan dengan paritas ibu.	Mayoritas kegagalan induksi terjadi pada ibu primigravida.

4.	Patologi Kebidanan.	Taufan Nugroho.	2012	Induksi merupakan tindakan atau langkah untuk memulai persalinan yang sebelumnya belum terjadi, bisa secara mekanik maupun kimiawi (farmakologik). Indikasi induksi ialah KPD, hipertensi, DM, korioamnionitis, dan post matur.	Metode induksi mekanik meliputi amniotomi, stripping, insersi foley catheter, laminaria. Sedangkan, induksi kimiawi meliputi misoprostol tablet, dan oksitosin drip.	Bahasa yang digunakan pada buku sulit untuk dimengerti.	Materi dilengkapi dengan langkah-langkah persiapan induksi.	Metode induksi kimiawi untuk induksi dengan menggunakan misoprostol tidak dapat digunakan untuk stimulasi dan tidak boleh digunakan untuk induksi persalinan dengan riwayat operasi sesar (SC).
5.	Asuhan kebidanan patologi.	Nita Norma dan Mustika Dwi.	2013	Pada kasus KPD dengan umur kehamilan yang kurang bulan dan tidak ada tanda-tanda infeksi pengelolaannya bersifat konservatif disertai pemberian antibiotik yang adekuat sebagai profilaksi.	Pengelolaan konservatif dengan pemberian kortikosteroid pada penderita KPD kehamilan kurang bulan agar tercapainya pematangan paru, jika selama melakukan pengelolaan konservatif muncul tanda-tanda infeksi, maka segera dilakukan induksi persalinan tanpa memandang umur kehamilan.	Materi induksi pada buku tersebut kurang lengkap.	Bahasa yang digunakan pada buku tersebut mudah dimengerti.	Induksi persalinan sebagai usaha agar persalinan berlangsung dengan jalan merangsang timbulnya his dapat menimbulkan komplikasi seperti emboli air ketuban, gawat janin sampai mati, dan ruptur uteri.

6.	Buku Pintar Ibu dan Bayi.	Nia Nurdiansyah.	2011	Persalinan dengan induksi dilakukan untuk pemberian stimulasi agar terjadi proses persalinan. Proses ini dilakukan pada ibu hamil indikasi KPD, kehamilan lewat bulan, diabetes, infeksi, dan plasenta bayi keluar terlebih dahulu.	Induksi dilakukan dengan cara pemberian obat-obatan khusus yang berfungsi untuk merangsang keluarnya zat prostaglandin agar terjadi kontraksi pada otot rahim. Pemberian obat-obatan ini bisa dilakukan secara oral, diinfuskan, disemprot pada hidung, atau dimasukkan ke dalam vagina.	Materi pada buku tersebut tidak menjelaskan metode-metode induksi.	Bahasa yang digunakan dalam buku tersebut mudah dimengerti.	Proses induksi menimbulkan rasa sakit yang intens sehingga kondisi ibu dan janin harus selalu dipantau. Resiko dari persalinan induksi yaitu KPD dan gawat janin.
7.	Hubungan Antara Partus Lama, Induksi Oksitosin, Dan Anemia Dengan Kejadian Hemoragik Post Partum Primer Di RSUD Soreang.	Mira Setiani	2018	Stimulasi dengan oksitosin drip dapat merangsang timbulnya kontraksi uterus yang belum berkontraksi dan meningkatkan kekuatan serta frekuensi kontraksi pada uterus yang sudah berkontraksi.	Partus lama terbanyak disebabkan oleh kontraksi uterus yang tidak adekuat, selain faktor kontraksi juga dapat disebabkan oleh faktor janin dan faktor panggul ibu.	Materi tidak lengkap, tidak ada pembahasan mengenai KPD.	Sampel yang digunakan sebanyak 211 orang.	Adapun indikasi induksi persalinan yaitu kpd, kehamilan lewat waktu, oligohidramnion, korioamnionitis, preeklamsi berat, hipertensi akibat kehamilan, intrauterine fetal death (IUFD) dan pertumbuhan janin terhambat.
8.	Identifikasi Ibu Yang Mengalami Induksi Persalinan Di Rumah Sakit Permata Bunda Kota Kendari.	Sri Ekawati	2017	Induksi persalinan (induction of labour) merupakan tindakan merangsang uterus untuk mengawali proses persalinan. Akselerasi persalinan (augmented of labour) merupakan tindakan merangsang uterus pada proses persalinan untuk meningkatkan frekuensi durasi dan kekuatan	Indikasi dari induksi persalinan yaitu umur ibu, umur kehamilan, indikasi ibu dan janin yaitu (KPD, serotinus, oligohidramnion dan inersia uteri).	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Kekurangan dari metode ini yaitu terbatas dalam memberikan informasi tentang	Sampel penelitian adalah semua ibu bersalin dengan induksi Persalinan.	Indikasi terbanyak dilakukannya SC yaitu KPD.S

				kontraksi uterus (his).		pengaruh variabel-variabel yang diteliti.		
9.	Identifikasi Ibu Yang Mengalami Induksi Persalinan Di Rumah Sakit Permata Bunda Kota Kendari.	Sri Ekawati.	2017	Induksi persalinan merupakan tindakan merangsang uterus untuk mengawali proses persalinan. Induksi persalinan dilakukan dengan menggunakan oksitosin sintesis yang pemberiannya dengan oksitosin drip. Indikasi dilakukannya induksi antara lain KPD, serotinus, oligohidramnion, inersia uteri.	Indikasi utama dilakukannya induksi yaitu KPD. Kejadian KPD dapat menimbulkan beberapa masalah bagi ibu maupun janin, misalnya pada ibu menyebabkan infeksi masa nifas, partus lama, perdarahan post partum, bahkan kematian. Resiko pada janin kecacatan dan kematian janin juga tinggi pada ketuban pecah dini preterm.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Kekurangan dari metode ini yaitu terbatas dalam memberikan informasi tentang pengaruh variabel-variabel yang diteliti.	Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu bersalin yang diinduksi.	Indikasi utama dilakukannya induksi yaitu KPD dengan umur ibu rata-rata 20-35 tahun.
10.	Patologi Dan Fisiologi Persalinan.	Eka Nurhayati.	2019	Induksi persalinan adalah upaya memulai persalinan dengan cara-cara buatan sebelum atau sesudah kehamilan cukup bulan dengan jalan merangsang timbulnya his. Indikasi induksi antara lain KPD, kehamilan lewat waktu, oligohidramnion, korioamnionitis, dan hipertensi dalam kehamilan.	Induksi persalinan dapat dilakukan dengan cara pemecahan ketuban, pemberian oksitosin, pemberian obat misoprostol, pemberian hormon prostaglandin, pemasangan laminaria, dan pemasangan balon keteter.	Hanya beberapa materi KPD dalam buku tersebut.	Buku ini disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti.	Proses induksi dilakukan untuk merangsang kontraksi rahim sebelum kontraksi alami terjadi agar proses persalinan cepat terjadi.

E. Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan

Mengidentifikasi pelaksanaan dari semua rencana terkait masalah Ketuban Pecah Dini berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No.	Judul Referensi	Oleh (sebutkan nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Patologi kebidanan	Taufan Nugroho	2012	Penatalaksanaan KPD ada dua cara yaitu secara konservatif dan aktif.	Pada konservatif diberikan antibiotika apabila ketuban pecah > 6 jam. Pada usia kehamilan 32-34 minggu akan dirawat di rumah sakit sampai air ketuban tidak keluar lagi apabila masih keluar air ketuban maka akan dipertimbangkan untuk dilakukan terminasi. Sedangkan penatalaksanaan secara aktif kehamilan > 35 minggu akan dilakukan induksi oksitosin apabila gagal akan dilakukan seksio sesaria.	Buku ini disajikan dengan bahasa yang sulit dimengerti.	Terdapat banyak materi KPD dalam buku tersebut.	Penatalaksanaan dari KPD yaitu secara konservatif diberikan antibiotika dan secara aktif akan dilakukan induksi oksitosin apabila gagal akan dilakukan seksio sesaria.
2.	Asuhan Kebidanan Patologi.	Nita Norma dan Mustika Dwi.	2013	Penatalaksanaan KPD tergantung pada umur kehamilan. Pada umur kehamilan 34 minggu atau lebih atau lebih biasanya paru-paru sudah matang, korioamnionitis yang diikuti dengan sepsi pada janin merupakan sebab utama meningkatnya morbiditas dan mortalitas janin. Pada kehamilan cukup bulan, infeksi	Sekitar 70-80% kehamilan genap bulan akan melahirkan dalam waktu 24 jam setelah kulit ketuban pecah, bila dalam 24 jam setelah kulit ketuban pecah belum ada tanda-tanda persalinan maka dilakukan induksi persalinan dan bila gagal akan dilakukan bedah sesar. Pada kehamilan	Tidak menjelaskan secara detail cara induksi persalinan pada KPD.	Buku ini disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti.	Kegagalan dari induksi persalinan biasanya diselesaikan dengan tindakan bedah sesar. Seperti halnya pada pengelolaan KPD yang cukup bulan. Tindakan

				janin langsung berhubungan dengan lama pecahnya selaput ketuban atau lamanya perode laten.	kurang bulan tidak dijumpai tanda-tanda infeksi pengelolaannya bersifat konservatif disertai pemberian antibiotika yang adekuat sebagai profilaksi.			bedah sesar dilakukan bukan hanya karena infeksi intrauterine tetapi ada indikasi lainnya misal kelainan letak, gawat janin dan partus tak maju.
3.	Asuhan Kebidanan Patologi.	Marmi, dkk.	2016	Penatalaksanaan KPD tergantung pada umur kehamilan dan tanda infeksi intrauterin. Tindakan konservatif (mempertahankan kehamilan) diantaranya pemberian antibiotika dan cegah infeksi (tidak melakukan pemeriksaan dalam), tokolosis, pematangan paru, amnioinfusi, epitalisasi, fetal dan maternal monitoring. Tindakan aktif (terminasi/pengakhiri kehamilan) yaitu dengan section sesarea, ataupun partus pervaginam.	Usia kehamilan < 37 minggu dilakukan penanganan konservatif dengan mempertahankan kehamilan sampai usia kehamilan matur. Untuk usia kehamilan 37 minggu atau lebih lakukan terminasi. Sedangkan KPD dengan infeksi kehamilan < 37 ataupun > 37 minggu berikan antibiotika jika serviks matang lakukan induksi persalinan dengan oksitosin, jika serviks tidak matang lakukan SC.	Hanya beberapa materi KPD dalam buku tersebut.	Buku ini disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti.	Tindakan terminasi dilakukan jika terdapat tanda-tanda korioamnionitis, terdapat tanda-tanda kompresi tali pusat/janin dan pertimbangan antara usia kehamilan, lamanya ketuban pecah dan risiko menunda persalinan.
4.	Ilmu Kebidanan	Sarwono Prawirohardjo	2016	Bila terdapat persalinan dalam kala atif, korioamnionitis, gawat janin, persalinan diterminasi. Bila KPD pada kehamilan prematur, diperlukan penatalaksanaan yang komprehensif. Secara umum penatalaksanaan pasien KPD yang tidak dalam persalinan	Penatalaksanaan secara konservatif jika umur kehamilan < 32-34 minggu, dirawat selama air ketuban masih keluar, atau sampai air ketuban tidak lagi keluar. Jika usia kehamilan 32-37 minggu, tidak ada infeksi, observasi tanda-tanda infeksi	Buku ini menggunakan bahasa yang sulit dimengerti.	Mampu menjelaskan secara detail pada buku tersebut.	Penatalaksanaan pada KPD harus secara tepat dengan cara memastikan diagnosis, umur kehamilan, evaluasi ada tidaknya infeksi

				serta tidak ada infeksi dan gawat janin, penatalaksanaannya bergantung pada usia kehamilan.	dan kesejahteraan janin dan lakukan terminasi pada kehamilan 37 minggu apabila ada infeksi, beri antibiotika dan lakukan induksi. Sedangkan penatalaksanaan aktif kehamilan > 37 minggu, induksi dengan oksitosin bila gagal dilakukan seksio sesarea.			maternal ataupun infeksi janin, apakah dalam keadaan inpartu dan terdapat gawat janin.
5.	Tata Laksana Ibu Bersalin Dengan Ketuban Pecah Dini Di Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi.	Sri Untari dan Tio Setiowati.	2016	KPD merupakan masalah penting dalam obstetri berkaitan dengan penyulit kelahiran prematur dan menyebabkan terjadinya infeksi pada ibu. Akibat terjadinya KPD yaitu dapat menyebabkan kejadian infeksi intrapartum (karioamnionitis) ascendens dari vagina intrauterine dan persalinan preterm.	Penatalaksanaan pasien dengan KPD harus mempertimbangkan adanya infeksi, berat badan janin serta presentasi janin untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil untuk melahirkan bayi dengan selamat.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana karakter peneliti sangat berpengaruh pada hasil penelitian, bisa saja informasi yang sama berujung pada kesimpulan yang berbeda karena karakter peneliti berbeda.	Teknik pengumpulan data menggunakan metode pengamatan secara langsung terhadap klien yang bersalin dengan ketuban pecah dini.	Penatalaksanaan pasien dengan KPD yang akan dilakukan operasi sesar perlu dilakukan persiapan yang dimulai dari pre tindakan, tindakan, serta post tindakan yang tujuannya untuk dapat melakukan asuhan yang tepat agar ibu dan bayi lahir dengan sehat dan selamat.
6.	Hubungan Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Persalinan Seksio	Helti Lestari Sitingjak.	2018	Salah satu faktor indikasi seksio sesarea adalah KPD dan 8-10% perempuan hamil mengalami KPD dan kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko	Dari hasil penelitian ibu yang tidak mengalami KPD lebih banyak dilakukan seksio sesarea dibandingkan ibu yang mengalami KPD.	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan	Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua	Ibu yang mengalami KPD sebelum dilakukan persalinan seksio

	Sesarea Di Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko.			infeksi intrauterin, prolaps tali pusat, gawat janin, dan kompresi tali umbilikal.	Karena seksio sesarea adalah tindakan akhir yang dilakukan pada KPD apabila induksi gagal.	metode kuantitatif dimana metode ini orientasinya terbatas pada nilai dan jumlah serta pengambilan data berasal dari nilai tertinggi.	ibu yang bersalin dengan KPD dan tidak KPD.	sesarea dilakukan penanganan awal terlebih dahulu yaitu dengan pemberian induksi oksitosin, apabila gagal dilakukan seksio sesarea.
7.	Patologi Dan Fisiologi Persalinan.	Eka Nurhayati.	2019	Induksi persalinan adalah upaya memulai persalinan dengan cara-cara buatan sebelum atau sesudah kehamilan cukup bulan dengan jalan merangsang timbulnya his. Indikasi induksi antara lain KPD, kehamilan lewat waktu, oligohidramniom, korioamnionitis, dan hipertensi dalam kehamilan.	Induksi persalinan dapat dilakukan dengan cara pemecahan ketuban, pemberian oksitosin, pemberian obat misoprostol, pemberian hormon prostaglandin, pemasangan laminaria, dan pemasangan balon keteter.	Hanya beberapa materi KPD dalam buku tersebut.	Buku ini disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti.	Proses induksi dilakukan untuk merangsang kontraksi rahim sebelum kontraksi alami terjadi agar proses persalinan cepat terjadi.
8.	Asuhan kebidanan patologi.	Nita Norma dan Mustika Dwi.	2013	Pada kasus KPD dengan umur kehamilan yang kurang bulan dan tidak ada tanda-tanda infeksi pengelolaannya bersifat konservatif disertai pemberian antibiotik yang adekuat sebagai profilaksi.	Induksi dilakukan dengan cara pemberian obat-obatan khusus yang berfungsi untuk merangsang keluarnya zat prostaglandin agar terjadi kontraksi pada otot rahim. Pemberian obat-obatan ini bisa dilakukan secara oral, diinfuskan, disemprot pada hidung, atau dimasukkan ke dalam vagina.	Materi induksi pada buku tersebut kurang lengkap.	Bahasa yang digunakan pada buku tersebut mudah dimengerti.	Induksi persalinan sebagai usaha agar persalinan berlangsung dengan jalan merangsang timbulnya his dapat menimbulkan komplikasi seperti emboli air ketuban, gawat janin sampai mati, dan ruptur

uteri.

								uteri.
9.	Indikasi Seksio Sesarea di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.	Edwin D. Pamilangan, dkk.	2020	Persalinan seksio sesarea adalah proses persalinan dengan sayatan pada dinding perut (laparotomi) dan dinding rahim. Indikasi non medis dipengaruhi oleh usia, pendidikan, sosial budaya, dan sosial ekonomi. Adapun indikasi medis dilakukannya tindakan seksio sesarea yaitu karena partus lama, gawat janin, preeklamsia, eklamsia, plasenta previa, kehamilan kembar, solusio plasenta, panggul sempit, dan indikasi seksio sesarea sebelumnya.	Indikasi yang paling dominan terjadinya seksio sesarea yaitu dari faktor ibu yang paling banyak disebabkan oleh riwayat seksio sesarea sebelumnya. Indikasi janin paling banyak disebabkan oleh gawat janin. Sedangkan indikasi gabungan paling banyak disebabkan oleh preeklamsi berat dan gawat janin.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan waktu secara retrospektif yaitu pengumpulan data yang dimulai dari akibat kemudian diidentifikasi terjadinya faktor resiko pada waktu yang lalu.	Populasi yang digunakan ialah seluruh ibu bersalin dengan seksio tahun 2017 dan 2018.	Pada persalinan seksio sesarea, indikasi ibu terbanyak ialah riwayat seksio sesarea. Indikasi janin terbanyak ialah gawat janin. Dan indikasi gabungan terbanyak ialah preeklamsi berat dan gawat janin.
10.	Buku Pintar Ibu dan Bayi.	Nia Nurdiansyah.	2011	Persalinan dengan induksi dilakukan untuk pemberian stimulasi agar terjadi proses persalinan. Proses ini dilakukan pada ibu hamil indikasi KPD, kehamilan lewat bulan, diabetes, infeksi, dan plasenta bayi keluar terlebih dahulu.	Induksi dilakukan dengan cara pemberian obat-obatan khusus yang berfungsi untuk merangsang keluarnya zat prostaglandin agar terjadi kontraksi pada otot rahim. Pemberian obat-obatan ini bisa dilakukan secara oral, diinfuskan, disemprot pada hidung, atau dimasukkan ke dalam vagina.	Materi pada buku tersebut tidak menjelaskan metode-metode induksi.	Bahasa yang digunakan dalam buku tersebut mudah dimengerti.	Proses induksi menimbulkan rasa sakit yang intens sehingga kondisi ibu dan janin harus selalu dipantau. Resiko dari persalinan induksi yaitu KPD dan gawat janin

F. Langkah VII : Evaluasi

Mengevaluasi semua perencanaan dan pelaksanaan Ketuban Pecah Dini berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No.	Judul Referensi	Oleh (sebutkan nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Patologi Kebidanan.	Taufan Nugroho	2012	Evaluasi tanda-tanda infeksi.	Evaluasi dan nilai tanda-tanda infeksi seperti suhu, lekosit, tanda-tanda infeksi intrauterine dan keadaan umum ibu dengan KPD.	Buku ini menggunakan bahasa yang sulit dimengerti.	Mampu menjelaskan secara detail pada buku tersebut.	Evaluasi air ketuban, tanda-tanda infeksi dan keadaan umum ibu dengan KPD.
2.	Asuhan Kebidanan Patologi.	Nita Norma dan Mustika Dwi.	2013	Evaluasi keadaan umum ibu dan denyut jantung janin.	Memantau keadaan umum ibu, denyut jantung janin (dj), tanda-tanda infeksi dan menghindari pemeriksaan prevaginal.	Buku ini menggunakan bahasa yang sulit dimengerti.	Terdapat banyak materi KPD dalam buku tersebut.	Evaluasi terapi untuk ibu KPD dengan infeksi atau tidak ada gejala infeksi, memantau ddj baik atau tidak terjadi gawat janin, dan keadaan umum ibu
3.	Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Bedah Sesar Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta.	Haafizah Dania, Faridah Baroroh, Moch Saiful Bachri.	2016	Evaluasi penggunaan antibiotik.	Penggunaan antibiotik pada proses bedah sesar diberikan untuk profilaksis dan terapi pascabedah.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan waktu secara retrospektif yaitu pengumpulan	Sampel penelitian adalah semua pasien bedah sesar.	Tepat obat, tepat dosis, dan tepat indikasi adalah ketika obat yang diberikan sesuai dengan pedoman terapi.

						data yang dimulai dari akibat kemudian diidentifikasi terjadinya faktor resiko pada waktu yang lalu.		
4.	Perbandingan Efektivitas Misoprostol Sublingual 25 mcg, Pervaginam 25 mcg Dan Drips Oksitosin 5 IU Untuk Induksi Persalinan.	Esa Lestary, dkk.	2013	Induksi persalinan terjadi antara 10%-20% dari seluruh persalinan dengan berbagai indikasi baik ibu maupun janin, beberapa penelitian menyebutkan misoprostol sublingual lebih efektif dibandingkan misoprostol oral dengan menggunakan prostaglandin menunjukkan hasil yang lebih baik pada pematangan serviks dibanding penggunaan oksitosin.	Lama persalinan pada misoprostol sublingual 25 mcg lebih cepat yaitu $9,9 \pm 1,62$ jam, dibandingkan misoprostol pervaginam 25 mcg $12,63 \pm 3,44$ jam dan drips oksitosin 5 IU intravena $13,87 \pm 3,28$ jam.	Sampel yang digunakan hanya 90 orang.	Populasi penelitian adalah semua ibu hamil aterm dan ibu hamil dengan usia kehamilan 38-42 minggu.	Keefektifan misoprostol sublingual 25 mcg tidak berbeda dibandingkan misoprostol pervaginam 25 mcg dan drips oksitosin 5 IU. Lama waktu induksi sampai pembukaan lengkap pada kelompok misoprostol sublingual 25 mcg lebih cepat dibandingkan misoprostol pervaginam 25 mcg dan drips oksitosin 5 IU intravena.
5.	Perbandingan Efektivitas Misoprostol Dosis 50 mcg	Haafizah Dania, dkk.	2014	Misoprostol yang merupakan suatu analog prostaglandin E1, telah digunakan dalam pematangan serviks pada masa	Keberhasilan induksi pada kelompok misoprostol 50 mcg menurun dibandingkan dengan kelompok	Metode penelitian ini menggunakan metode non	Sampel yang digunakan adalah semua ibu bersalin	Keberhasilan misoprostol 50 mcg menurun dibandingkan

	Dan 100 mcg Terhadap Keberhasilan Kelahiran Induksi Di RSUD Muhammadiyah Yogyakarta.			kehamilan dan induksi persalinan. Namun sampai saat ini dosis dan rute pemberian misoprostol untuk induksi bermacam-macam. Belum ada pedoman tetap mengenai cara pemberian dan dosis misoprostol yang diberikan.	misoprostol 100 mcg, dimana keberhasilan induksi misoprostol 50 mcg sebanyak 56 orang dari 69 orang (81,16%) sedangkan keberhasilan induksi pada kelompok misoprostol 100 mcg sebanyak 39 orang dari 40 orang (97,50%).	eksperimental dengan rancangan historical cohort. Keterbatasan metode ini adalah tidak semua data yang diinginkan terdapat dalam catatan medik dan kemampuan tenaga medis (dokter) tidak sama.	yang melahirkan dengan proses induksi misoprostol.	dengan misoprostol 100 mcg.
6.	Karakteristik Ibu Bersalin Dengan Tindakan Induksi Di RSUD Cibinong.	Arini Kusmintarti dan Yulia Erwita.	2011	Induksi yang digunakan yaitu pemberian oksitosin. Mekanisme kerja bahan ini dalam memudahkan kontraksi otot polos dan meningkatkan reseptor-reseptor pada selaput sel-sel miometrium. Faktor utama ibu yang mengalami induksi yaitu KPD dan inertia uteri.	Karakteristik ibu bersalin dengan tindakan induksi terdapat 68 (31,48%) yang mengalami tindakan induksi dengan klasifikasi KPD dan inertia uteri 68 (31,48%), terdapat 170 (78,7%) yang usia kehamilan > 35 minggu, terdapat 93 (43%) yang memiliki paritas 2 – 3, terdapat 172 (79,6%) yang berusia 21 – 35 tahun, dan terdapat cara induksi dengan infus oksitosin sebanyak 182 (84,2%).	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Kekurangan dari metode ini yaitu terbatas dalam memberikan informasi tentang pengaruh variabel-variabel yang diteliti.	Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu bersalin dengan tindakan induksi.	Karakteristik ibu bersalin dengan tindakan induksi sebagian besar mengalami indikasi induksi KPD dan inertia uteri, kebanyakan ibu berusia produktif, paritas 1 – 3, dengan usia kehamilan aterm, dan cara induksi sebagian besar menggunakan infus oksitosin.

7.	Evaluasi Penggunaan Antibiotik Profilaksis pada Operasi Sesar di Rumah Sakit Swasta Purwokerto.	Much Ilham Novalisa Aji Wibowo, Tyas Dwi Utamiasih, Dina Ratna Juwita.	2019	Evaluasi penggunaan antibiotik profilaksis	Hasil yang didapatkan yaitu penggunaan antibiotik profilaksis 100% sesuai dengan formularium dan PPAPC 2016 yaitu menggunakan antibiotik ceftriaxone.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan waktu secara retrospektif yaitu pengumpulan data yang dimulai dari akibat kemudian diidentifikasi terjadinya faktor resiko pada waktu yang lalu.	Sampel yang digunakan sebanyak 232 sampel.	Penggunaan antibiotik yang rasional diharapkan memberikan dampak positif antara lain mengurangi mortalitas.
8.	Ilmu Kebidanan	Sarwono Prawirohardjo	2016	Pada ibu dengan KPD diperiksa tanda-tanda kemungkinan terjadi infeksi, usia kehamilan, air ketuban berbau dan keruh atau tidak, dan kontraksi yang teratur.	Pengawasan ketat dan evaluasi terhadap ibu KPD dengan kemungkinan terjadi infeksi intrapartum, janin yang mengalami takikardia, dan gangguan lainnya.	Buku ini disajikan dengan bahasa yang sulit dimengerti.	Terdapat banyak materi KPD.	Evaluasi keadaan ibu dengan KPD, TTV dalam batas normal, tidak terjadi infeksi intrapartum pada ibu, dan takikardia pada janin.
9.	Determinan Persalinan Seksio Sesarea Di RSUD Wates Kulon Progo.	Maryani.	2016	Persalinan SC adalah persalinan melalui sayatan pada dinding abdomen dan uterus yang diambil masih utuh dengan berat janin lebih 1000 gr atau umur kehamilan lebih 28 minggu. Faktor persalinan SC yaitu DKP, gawat janin, letak janin, plasenta previa, induksi gagal,	Faktor terbanyak dilakukannya SC yaitu disproporsi kepala janin dari faktor ibu, gawat janin dari faktor janin, induksi gagal dari faktor lainnya.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan waktu secara retrospektif yaitu pengumpulan data yang dimulai	Sampel pada penelitian ini berjumlah 262 responden.	Determinan persalinan SC tertinggi pada faktor ibu yaitu DKP 41,2% (108), faktor janin yaitu gawat janin 21% (55) dan faktor lainnya yaitu induksi

				preeklamsia/eklamsia, riwayat obstetrik, partus lama dan stenosis vagina/Serviks.		dari akibat kemudian diidentifikasi terjadinya faktor resiko pada waktu yang lalu.		gagal 5,3% (14).
10.	Evaluasi Penggunaan dan Efektivitas Antibiotik Profilaksis pada Pasien Bedah Sesar di Rumah Sakit Surakarta	Nurul Mutmainah, Puri Setyati, Niken Handasari	2014	Evaluasi penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah sesar	Antibiotik profilaksis hanya diberikan pada kasus persalinan dengan faktor risiko infeksi seperti kasus KPD dengan lama ketuban pecah melewati 18 jam, febris, adanya koloni kuman Streptococcus Grup Beta, dan persalinan kurang dari 37 minggu.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan waktu secara retrospektif yaitu pengumpulan data yang dimulai dari akibat kemudian diidentifikasi terjadinya faktor resiko pada waktu yang lalu.	Populasi yaitu seluruh ibu bersalin dengan bedah sesar.	Pemberian obat antibiotik menunjukkan terbukti efektif.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telah Evidence Based Asuhan 7 Langkah Varney

Langkah I : Identifikasi data dasar

Referensi 1 : Didapatkan umur ibu yang kurang dari 20 tahun termasuk umur terlalu muda dengan keadaan uterus yang kurang matur untuk melahirkan sehingga rentan mengalami ketuban pecah dini, sedangkan umur lebih dari 35 tahun tergolong umur yang terlalu tua untuk melahirkan khususnya pada ibu primi (tua) dan berisiko tinggi mengalami ketuban pecah dini. Maka persamaanya yaitu umur ibu yang < 20 tahun termasuk umur terlalu muda dengan keadaan uterus kurang matur untuk melahirkan sedangkan umur > 35 tahun tergolong umur yang terlalu tua untuk melahirkan sehingga rentan mengalami KPD. Perbedaannya yaitu pada umur 20-35 tahun resiko mengalami KPD sangat kecil.

Referensi 2: Didapatkan kategori paritas primipara atau seorang perempuan yang telah melahirkan janin satu kali tanpa memandang anak tersebut hidup atau meninggal lebih banyak mengalami kejadian ketuban pecah dini dari pada multipara dan grandemultipara. Maka persamaanya yaitu KPD bisa terjadi pada semua ibu hamil. Perbedaannya yaitu paritas

primipara lebih dominan mengalami KPD dibandingkan multipara dan grandemultipara.

Referensi 3 : Didapatkan Anemia merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya KPD. Pada ibu dengan anemia, kadar hemoglobin sebagai pembawa zat besi dalam darah berkurang, yang mengakibatkan rapuhnya beberapa daerah dari selaput ketuban, sehingga terjadi kebocoran pada daerah tersebut. Sedangkan paritas merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan KPD, karena peningkatan paritas yang memungkinkan kerusakan serviks selama proses kelahiran sebelumnya.

Referensi 4 : Didapatkan KPD merupakan komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan kurang bulan, dan mempunyai kontribusi yang besar pada angka kematian perinatal pada bayi yang kurang bulan. Pengelolaan KPD pada kehamilan kurang dari 34 minggu sangat kompleks, bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya prematuritas dan RDS. Sedangkan pada kehamilan > 35 minggu akan dilakukan induksi oksitison , bila gagal akan dilakukan seksio sesarea. Maka persamaannya yaitu KPD merupakan komplikasi yang terjadi pada kehamilan dan mempunyai kontribusi besar pada angka kematian perinatal pada bayi yang kurang bulan.

Perbedaannya yaitu pengelolaan KPD pada usia kehamilan < 34 minggu lebih kompleks.

Referensi 5 : Didapatkan ibu yang memiliki pola seksual tidak tepat berisiko mengalami KPD sebanyak 10 kali. Ibu hamil yang melakukan hubungan seksual saat trimester III dengan frekuensi berlebihan akan berisiko mengalami ketuban pecah dini karena sperma yang dihasilkan setiap kali berhubungan intim mengandung prostaglandin sehingga akan terus merangsang kontraksi, ini dengan demikian semakin sering berhubungan intim maka akan semakin besar kontraksi yang ditimbulkan sehingga berakibat pecahnya ketuban sebelum waktunya. Maka persamaannya yaitu ibu hamil yang sudah memasuki trimester 3 lebih berisiko mengalami KPD dengan pola seksual yang tidak tepat dan sering dilakukan. Perbedaannya yaitu ibu hamil yang memiliki pola seksual yang tepat berisiko kecil mengalami KPD.

Referensi 6 : Didapatkan asap rokok merupakan polutan bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Asap rokok membuat lebih berbahaya terhadap perokok pasif daripada perokok aktif. Asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif dan terhirup oleh perokok pasif, sebanyak empat kali lebih banyak mengandung tar dan nikotin, 5 kali lebih banyak mengandung karbon monoksida yaitu merupakan radikal

bebas yang dapat menimbulkan kerusakan tubuh. Maka persamaannya yaitu wanita hamil yang terpapar asap rokok seringkali mengalami berbagai macam gangguan selama kehamilan salah satunya KPD. Perbedaannya yaitu ibu hamil yang tidak terpapar asap rokok memiliki peluang sangat sedikit untuk mengalami KPD.

Referensi 7 : Didapatkan asap rokok merupakan polutan bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Asap rokok membuat lebih berbahaya terhadap perokok pasif daripada perokok aktif. Asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif dan terhirup oleh perokok pasif, sebanyak empat kali lebih banyak mengandung tar dan nikotin, 5 kali lebih banyak mengandung karbon monoksida yaitu merupakan radikal bebas yang dapat menimbulkan kerusakan tubuh. Ketuban pecah dini disebabkan karena berkurangnya kekuatan membran atau meningkatnya tekanan intrauterin atau oleh kedua faktor tersebut. Berkurangnya kekuatan membran diantaranya disebabkan oleh rokok. Rokok mengandung nikotin yang dapat mempengaruhi kekuatan membrane ketuban. Persamaannya yaitu ibu hamil yang sering terpapar asap rokok akan mengalami KPD karena berkurangnya kekuatan membran yang disebabkan oleh asap rokok.

Perbedaannya yaitu ibu hamil yang tidak terpapar asap rokok tidak mengalami KPD.

Referensi 8 : Didapatkan hampir seluruh ibu bersalin mengalami ketuban pecah dini terjadi pada usia kehamilan lebih dari 37 minggu. Dimana hampir setengah ibu bersalin mengalami ketuban pecah dini berumur 26-30 tahun. Dimana usia tersebut masih dalam batas aman untuk berlangsungnya kehamilan dan persalinan. Persamanya yaitu KPD dominan terjadi pada ibu hamil usia kehamilan lebih dari 37 minggu dengan umur 26-30 tahun. Perbedaannya yaitu kejadian ketuban pecah dini dapat terjadi karena pada usia kehamilan lebih dari 37 minggu terjadi pembesaran uterus, kontraksi rahim, dan gerakan janin sehingga menyebabkan ketuban mudah pecah.

Referensi 9 : Didapatkan ibu yang memiliki umur beresiko disebabkan karena adanya umur perkawinan yang sangat muda (< 20 tahun) sebagai akibat dari tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah maupun social ekonomi yang rendah, sehingga mereka tidak mengetahui dampak yang lahir dari sebuah perkawinan umur muda. Umur yang beresiko ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu tentang batasan umur reproduksi yang sehat, sehingga dalam umur > 35 tahun mereka tidak berusaha untuk menghentikan kehamilan melalui program keluarga

berencana. Selain itu, juga disebabkan karena umur perkawinan yang terlalu tua sebagai akibat kesibukan bekerja yang membuat mereka kurang memikirkan tentang pernikahan dan menikah dalam umur lanjut. Hal ini berdampak pada masih adanya keinginan untuk memiliki anak pada umur > 35 tahun disebabkan karena belum punya anak sama sekali ataupun karena belum merasa cukup dengan jumlah anak yang ada. Persamaannya yaitu umur ibu yang beresiko mengalami KPD yaitu umur < 20 - > 35 tahun. Perbedaannya yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang batasan umur reproduksi sehat dan tidak mengetahui dampak yang terlahir dari sebuah perkawinan umur muda dan terlalu tua.

Referensi 10 : Didapatkan ketuban pecah dini bisa terjadi karena hubungan seksual yang tidak hati-hati selama masa kehamilan dan juga bisa terjadi bila didalam melakukan hubungan seksual tidak mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin yang sedang dikandung, serta tidak mengetahui posisi yang benar saat melakukan hubungan seksual. Persamaannya yaitu posisi yang kurang tepat pada saat hubungan seksual akan mengalami KPD. Perbedaannya yaitu ibu yang jarang melakukan hubungan seksual dengan polsa seksual yang tepat tidak mengalaami KPD.

Langkah II : Identifikasi Diagnosa Aktual

Referensi 1 : Didapatkan Usia kehamilan adalah lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus kirakira 280 (40 minggu dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). Pada umumnya ibu dengan preterm lebih, cenderung mengalami ketuban pecah dini dikarenakan masih lemahnya kekuatan selaput ketuban yang berhubungan dengan perbesaran dan usia uterus, kontraksi rahim dan gerakan janin. Tetapi dari hasil uji statistic yang telah dilakukan, diperoleh hasil ibu dengan usia kehamilan aterm juga mengalami ketuban pecah dini. Hal ini dapat disebabkan oleh Faktor lain seperti pola pekerjaan ibu hamil yang terlalu berat dapat berakibat pada kelelahan dan akan menyebabkan lemahnya korion amnion sehingga timbul ketuban pecah dini. Persamaannya yaitu pada umumnya ibu dengan preterm lebih, cenderung mengalami ketuban pecah dini dikarenakan masih lemahnya kekuatan selaput ketuban. Perbedaannya pada pekerjaan, ibu hamil yang tidak bekerja sangat sedikit mengalami KPD.

Referensi 2 : Didapatkan pada umumnya ibu dengan preterm lebih, cenderung mengalami ketuban pecah dini dikarenakan masih

lemahnya kekuatan selaput ketuban yang berhubungan dengan perbesaran dan usia uterus, kontraksi rahim dan gerakan janin. Tetapi dari hasil uji statistic yang telah dilakukan, diperoleh hasil ibu dengan usia kehamilan aterm juga mengalami ketuban pecah dini. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor lain seperti pola pekerjaan ibu hamil yang terlalu berat dapat berakibat pada kelelahan dan akan menyebabkan lemahnya korion amnion sehingga timbul ketuban pecah dini. Persamaannya yaitu ibu dengan preterm lebih cenderung mengalami KPD dikarenakan masih lemahnya kekuatan selaput ketuban. Perbedaannya yaitu ibu aterm juga mengalami KPD karena faktor pekerjaan yang terlalu berat dan mengakibatkan kelelahan yang dapat membuat korion amnion melemah sehingga dapat menimbulkan KPD.

Referensi 3 : Didapatkan anamnesa dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengeluaran cairan, berbau, dan belum ada pengeluaran lendir dan darah. Pada pemeriksaan spekulum dapat diketahui apakah keluar cairan atau tidak. Pemeriksaan dalam didapat cairan didalam vagina dan selaput ketuban sudah tidak ada lagi. Sedangkan pada pemeriksaan laboratorium akan diperiksa air ketuban ibu menggunakan tes lakmus. Selanjutnya pemeriksaan USG untuk melihat jumlah air ketuban yang tersisa. Persamaannya yaitu diagnosis KPD

ditegaskan dengan cara anamnesa pasien merasakan basa pada vagina atau cairan yang keluar, berbau, warna dari cairan dan pemeriksaan USG. Namun memiliki perbedaan diagnosa melalui pemeriksaan cairan amnion.

Referensi 4 : Didapatkan pecah ketuban dini terjadi ketika air ketuban yang belum siap menuju persalinan pecah yang biasanya terjadi pada usia kehamilan 37 minggu atau sebelumnya. Air ketuban yang membantu janin tumbuh dan berkembang, jika sudah pecah dan tidak diikuti dengan keluarnya janin atau persalinan, tentu akan membahayakan janin karena tidak memiliki pelindung dan tempat bergerak lagi. Dalam jangka waktu tertentu, hal ini juga akan mengganggu dan mengancam keselamatan ibu hamil selama masa persalinan nantinya. Maka persamaannya yaitu bila KPD terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut ketuban pecah dini pada kehamilan premature. Perbedaannya yaitu dalam hal pemeriksaan menggunakan tes lakmus.

Referensi 5 : Didapatkan tes cairan ketuban dilakukan dengan cara kultur/gram, fetal fibronectin, glukosa, leukosit esterase dan sitokin. Normal pH cairan ketuban 7,0-7,5, dan apabila uji kertas lakmus/nitrazin test berwarna biru(basa) maka cairan tersebut adalah air ketuban. Persamaannya yaitu tes cairan

ketuban untuk mengetahui cairan tersebut air ketuban atau tidak. Perbedaannya yaitu dalam pemeriksaan penunjang.

Referensi 6 : Didapatkan mendiagnosis KPD dengan cara anamnesa pasien untuk mengetahui penderita merasa basah pada vagina atau mengeluarkan cairan yang banyak secara tiba-tiba, warna dan bau dari cairan tersebut, serta dilakukannya pemeriksaan dalam untuk mengetahui apakah masih didapati cairan dan selaput ketuban atau tidak. Persamaannya yaitu diagnosis KPD dengan cara anamnesa pasien untuk mengetahui penderita merasa basah pada vagina atau mengeluarkan cairan yang banyak secara tiba-tiba, warna dan bau dari cairan tersebut serta pemeriksaan inspeksi dan pemeriksaan dengan speculum. Namun memiliki perbedaan diagnosa melalui pemeriksaan penunjang.

Referensi 7 : Didapatkan pecahnya selaput ketuban dengan adanya cairan ketuban keluar dari vagina. Jika tidak ada dapat dicoba dengan menggerakkan sedikit bagian terbawah janin atau meminta pasien batuk atau mengedan. Dapat dilakukan juga dengan menggunakan tes lakmus (*Nitrazen test*) apabila air ketuban akan berubah dari merah menjadi biru. Pemeriksaan USG juga bisa dilakukan untuk menentukan usia kehamilan. Persamaannya yaitu tes cairan ketuban untuk mengetahui

cairan tersebut air ketuban atau tidak. Perbedaannya yaitu dalam hal pemeriksaan penunjang.

Referensi 8 : Didapatkan evaluasi yang dilakukan pada kehamilan dengan KPD meliputi evaluasi terhadap faktor risiko, evaluasi dengan USG, dan melakukan pemeriksaan terhadap tingkat infeksi. Infeksi yang mungkin terjadi dievaluasi dengan amniosentesis, USG, kultur beta-streptokokus, menilai kematangan paru janin, dan percobaan indigokarmin untuk memastikan apakah benar KPD dengan cairan terdapat dalam vagina. Persamaannya yaitu KPD dilihat dari usia kehamilan. Perbedaannya yaitu berbeda dalam hal pemeriksaan pada tingkat infeksi.

Referensi 9 : Didapatkan KPD seringkali menimbulkan konsekuensi yang berimbas pada morbiditas dan mortalitas pada ibu maupun bayi, terutama pada kematian perinatal yang cukup tinggi yaitu prematuritas, respiratory distress syndrome, perdarahan intraventrikel, sepsis, hipoplasia paru dan deformitas skeletal. Persamaannya yaitu KPD dilihat dari usia kehamilan dan pecah sebelum ada tanda-tanda persalinan. Perbedaannya yaitu pada keadaan dan tanda-tanda yang menjadi pendukung diagnosis.

Referensi 10 : Didapatkan diagnosis KPD ditegakkan dengan cara anamnesa pasien merasakan basa pada vagina atau cairan yang keluar,

berbau, warna dari cairan tersebut. Menentukan usia kehamilan dari HPHT dan USG. Kemudian dari inspeksi didapatkannya pecahnya selaput ketuban dengan adanya cairan ketuban keluar dari vagina. Pemeriksaan dengan spekulum pada KPD akan tampak keluar cairan dari orifisium uteri eksternum, kalau belum juga tampak keluar, fundus uteri ditekan, penderita diminta batuk, mengejan, atau bagian terendah digoyangkan, akan tampak keluar cairan dari ostium uteri dan terkumpul pada fornix anterior. Persamaannya yaitu diagnosis KPD dengan cara anamnesa pasien untuk mengetahui penderita merasa basah pada vagina atau mengeluarkan cairan yang banyak secara tiba-tiba, warna dan bau dari cairan tersebut serta pemeriksaan inspeksi dan pemeriksaan dengan spekulum. Perbedaannya yaitu pada pemeriksaan penunjang.

Langkah III : Identifikasi Diagnosa Potensial

Referensi 1 : KPD merupakan komplikasi langsung dalam kehamilan yang mengganggu kesehatan ibu dan juga pertumbuhan janin dalam kandungan sehingga meningkatkan risiko kelahiran BBLR.

Referensi 2 : Didapatkan terjadinya masalah pada kehamilan dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan tidak sesuai dengan umur kehamilan pada umumnya, terdapat ibu hamil yang

melahirkan dengan umur kehamilan <37 atau >42 minggu namun ada juga ibu hamil yang melahirkan sesuai tafsiran kehamilan pada rentan usia 37-42 minggu.

Referensi 3 : Didapatkan KPD mempengaruhi asfiksia karena terjadinya oligohidramnion yang menekan tali pusat sehingga tali pusat mengalami penyempitan dan aliran darah yang membawa oksigen ibu ke bayi terhambat sehingga menimbulkan asfiksia neonatorum atau hipoksia.

Referensi 4 : Didapatkan usia ibu yang ≤ 20 tahun, termasuk usia yang terlalu muda dengan keadaan uterus yang kurang matur untuk melahirkan sehingga rentan mengalami ketuban pecah dini. Hal ini memungkinkan adanya faktor lain yang menyebabkan ketuban pecah dini, seperti infeksi, riwayat KPD sebelumnya, serviks inkompeten atau tekanan uterus berlebihan.

Referensi 5 : Didapatkan SC dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu KPD, hipertensi, BBLR, sumber biaya melahirkan. Hipertensi merupakan faktor utama kejadian SC. Sedangkan, yang tidak berhubungan dengan SC yaitu sumber biaya persalinan.

Referensi 6 : Didapatkan ibu yang mengalami KPD mempunyai peluang untuk melahirkan bayi asfiksia sebesar 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami KPD. Asfiksia Neonatorum merupakan keadaan bayi baru lahir tidak segera bernafas secara spontan dan teratur setelah

dilahirkan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kejadian Asfiksia adalah KPD.

Referensi 7 : Didapatkan terjadinya KPD disebabkan oleh karena berkurangnya kekuatan membran atau meningkatnya tekanan intrauterin atau oleh kedua faktor tersebut. Fase laten pada ketuban pecah dini merupakan lamanya waktu sejak ketuban pecah sampai terjadi proses persalinan. Semakin panjang fase laten, semakin besar kemungkinan pengaruh terhadap nilai apgar dan akan semakin besar kemungkinan terjadinya infeksi yang berasal dari traktus urogenital bawah.

Referensi 8 : Didapatkan Riwayat kejadian KPD sebelumnya menunjukkan bahwa wanita yang telah melahirkan beberapa kali dan mengalami KPD pada kehamilan berikutnya. Keadaan yang dapat mengganggu kesehatan ibu dan janin dalam kandungan juga dapat meningkatkan resiko kelahiran dengan KPD.

Referensi 9 : Didapatkan Semakin lama periode laten maka akan semakin lama pula kala satu persalinan yang nantinya durasi KPD ini akan mempengaruhi banyaknya pelepasan cairan amnion yang dapat menyebabkan volume amnion semakin berkurang sehingga terjadinya oligohidramnion, jika terus berlanjut maka akan terjadi kompresi tali pusat yang akan menurunkan suplei oksigen menuju janin, sehingga bayi mengalami

hipoksia, kemudian ketika bayi lahir hal ini dapat mempengaruhi APGAR skor.

Referensi 10 : Didapatkan ibu yang bersalin dengan KPD berisiko mengalami asfiksia. Hal ini disebabkan karena aliran nutrisi dan O₂ tidak cukup, sehingga menyebabkan metabolisme janin menuju metabolisme anaerob dan terjadi penimbunan asam laktat dan piruvat yang merupakan hasil akhir dari metabolisme anaerob. Keadaan ini akan menimbulkan kegawatan janin (fetal distress) intrauteri yang akan berlanjut menjadi asfiksia neonatorum pada bayi baru lahir.

Langkah IV : Identifikasi Perlunya Tindakan Segera / Kolaborasi

Referensi 1 : Keefektifan induksi misoprostol vaginal sebesar 87,50%. Sedangkan pada induksi per oral sebesar 80,70%. Lama waktu induksi sampai pembukaan lengkap pada kelompok misoprostol vaginal tidak berbeda dengan oral yaitu sebesar $10,00 \pm 4,86$ jam dan $9,76 \pm 4,56$ jam. Persamaannya yaitu induksi misoprostol lebih efektif dibandingkan dengan induksi per oral. Perbedaannya yaitu lama waktu induksi oral lebih cepat dibandingkan dengan induksi pervaginal.

Referensi 2 : Bila KPD terjadi pada umur kehamilan aterm maka sebaiknya dilakukan terminasi kehamilan. Pilihan pervaginam maupun bedah seksio sesaria tergantung kondisi ibu, janin dan kehamilan. Pematangan serviks dengan misoprostol 25 ug per

vaginam setiap 6 jam selama 2 kali pemberian bila skor bishop ≤ 5 atau misoprostol 20-25 ug per oral setiap 2 jam selama 2 kali pemberian. Persamaannya yaitu pematangan serviks menggunakan misoprostol 25 ug prevaginal diberikan setiap 6 jam selama 2 kali sedangkan misoprostol 20-25 ug per oral setiap 2 jam selama 2 kali pemberian. Perbedaannya yaitu tindakan seksio sesarea dilakukan apabila induksi yang dilakukan gagal.

Referensi 3 : Rentan usia ibu kala 1 pada persalinan dengan induksi antara 22 – 41 tahun dengan rata-rata usia 30,66 tahun, sebagian besar ibu kala 1 dengan persalinan induksi memiliki nilai bishop kurang dari 5. Dan mayoritas ibu melahirkan secara spontan. Sisanya melahirkan dengan tindakan SC dan Vakum ekstraksi karena indikasi gagal induksi. Menurut teori, drip oksitosin akan lebih efektif menstimulasi kontraksi uterus apabila serviks telah matang. Pada pasien yang gagal induksi kemudian dilakukan persalinan SC dan Vakum ekstraksi dimungkinkan karena nilai bishop yang < 5 . Persamaannya yaitu drip oksitosin lebih efektif diberikan pada ibu dengan nilai bishop < 5 . Perbedaannya yaitu pasien yang telah diberikan induksi dan gagal akan dilakukan SC dan vakum ekstraksi karena nilai bishop < 5 .

Referensi 4 : Indikasi induksi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu inersia uteri, serotinus, KPD, dan Intra Uteri Feath Death (IUFD). Sebaiknya induksi partus dilakukan pada serviks yang sudah atau mulai matang (ripe atau favourable), yaitu kondisi serviks sudah lembek, dengan pendataran sekurangkurangnya 50%, dan pembukaan serviks satu jari. Persamaannya yaitu ibu bersalin yang mendapatkan tindakan induksi persalinan akibat KPD, Serotinus, IUFD dan Inersia lebih banyak diakibatkan oleh pemberian induksi pada saat proses persalinan. Perbedaannya yaitu induksi dilakukan pada serviks yang sudah atau mulai matang.

Referensi 5 : Lebih efektif pemberian misoprostol pervaginam dengan nilai-rata-rata 4,18 dibandingkan dengan pemberian oksitosin intravena dengan nilai rata-rata 3,12 dikarenakan dari faktor paritas ibu sebagian besar multipara dan pasangan usia subur sehingga proses pematangan servik lebih cepat. Persamaannya yaitu induksi persalinan dengan misoprostol pervaginam pada ibu bersalin indikasi KPD nilai minimal (nilai terendah) 2 cm dan nilai maksimal (nilai tertinggi) 7 cm dengan nilai rata-rata kemajuan persalinan 4,18. Perbedaannya yaitu induksi persalinan dengan oksitosin intravena mempunyai nilai minimal (nilai terendah) 1 cm dan nilai maksimal (nilai

tertinggi) 5 cm dengan nilai rata-rata kemajuan persalinan 3,12.

Referensi 6 : Keberhasilan terapi konservatif pada persalinan preterm disertai ketuban pecah dini ditemukan faktor yang mungkin mendasari keberhasilan terapi yaitu ibu yang rata-rata usia kehamilan paling muda dari 24-28 minggu. Sedangkan, keberhasilan terapi pada persalinan preterm tanpa disertai ketuban pecah dini karena pecahnya selaput ketuban dapat yang memicu kelahiran sehingga tingkat keberhasilan terapi konservatif persalinan preterm tanpa disertai ketuban pecah dini lebih tinggi. Persamaannya yaitu adanya perbedaan signifikan keberhasilan terapi konservatif antara persalinan preterm disertai dan tanpa disertai ketuban pecah dini pada penelitian ini menunjukkan bahwa ketuban pecah dini sebagai penyakit penyerta dari persalinan preterm merupakan keadaan yang berisiko karena kemungkinan untuk terjadinya kegagalan pemberian terapi lebih besar. Perbedaannya yaitu keberhasilan terapi konservatif pada persalinan preterm disertai ketuban pecah dini ditemukan faktor yang mungkin mendasari keberhasilan terapi yaitu ibu yang rata-rata usia kehamilan paling muda dari 24-28 minggu.

Referensi 7 : Pada umur 20-35 tahun lebih banyak dilakukan induksi persalinan daripada umur <20 - >35. Usia kehamilan 37-42

minggu paling banyak dilakukan induksi dibandingkan dengan usia kehamilan 28-36 minggu. Persalinan anak ke 2-4 lebih banyak dilakukan induksi persalinan daripada persalinan anak 1 dan >4. Sedangkan, pada komplikasi KPD paling banyak dilakukan induksi daripada inersia uteri dan IUFD. Persamaannya yaitu gambaran karakteristik ibu bersalin persalinan dengan induksi persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur ibu, paritas, usia kehamilan, komplikasi persalinan dan pekerjaan. Perbedaannya yaitu pada umur 20-35 tahun lebih banyak dilakukan induksi persalinan daripada umur <20 - >35.

Referensi 8 : Misoprostol diindikasikan sebagai obat tukak lambung, tukak duodenum, dan tukak yang disebabkan karena OAINS terutama pada pasien yang beresiko tinggi mengidap komplikasi tukak lambung. Pada penelitian ini Misoprostol dikategorikan sebagai obat off-label indikasi karena penggunaannya untuk beberapa indikasi. Mayoritas penggunaan off-label Misoprostol adalah sebagai induksi persalinan.

Referensi 9 : Prostaglandin adalah obat terbaik yang telah diakui untuk pematangan cervix, dimana satu diantaranya adalah misoprostol (analog prostaglandin E1). Selain efektifitasnya yang tinggi, misoprostol diproduksi dalam bentuk tablet yang

penyimpanannya cukup dalam suhu ruang serta mudah pemakaiannya. Misoprostol yang dipasarkan sebagai obat proteksi mukosa gastrointestinal digunakan pada pematangan cervix dan induksi persalinan karena aman, bermanfaat dan tidak mahal.

Referensi 10 : Pada keadaan serviks yang belum matang dan kurang mendukung, proses pematangan tentulah sangat perlu dipertimbangkan sebelum melakukan induksi. Misoprostol selain memiliki efek uterotoniknya juga memiliki efek pada serviks yang sangat berguna pada serviks dengan skor bishop kurang dari 5.

Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan

Referensi 1 : Ibu yang mengalami KPD sebelum dilakukan persalinan seksio sesarea dilakukan penanganan awal terlebih dahulu yaitu dengan pemberian induksi oksitosin agar ibu bisa melahirkan secara normal. Tetapi jika induksi persalinan gagal barulah tindakan akhir yang dilakukan yaitu persalinan seksio sesarea.

Referensi 2 : Sectio Caesarea saat ini turut berperan dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi sejak berkembangnya teknik operasi, sectio caesarea secara bermakna memberikan kontribusi sebesar 25% terhadap penurunan AKI di Indonesia.

Referensi 3 : Sebelum induksi persalinan dilakukan, kesiapan kondisi serviks perlu diperhatikan. Secara kuantitatif kesiapan dengan melihat kematangan serviks menggunakan skor Bishop. Semakin tinggi skor Bishop maka keberhasilan induksi persalinan semakin tinggi.

Referensi 4 : Perencanaan induksi persalinan pada KPD dilakukan apabila tidak terjadi kemajuan persalinan. Metode yang digunakan yaitu metode induksi mekanik dan metode induksi kimiawi. Pada metode induksi kimiawi untuk induksi dengan menggunakan misoprostol tidak dapat digunakan untuk stimulasi dan tidak boleh digunakan untuk induksi persalinan dengan riwayat operasi sesar (SC). Persamaannya yaitu induksi dilakukan pada ibu apabila tidak terjadi kemajuan persalinan. Perbedaannya yaitu metode induksi kimiawi untuk induksi dengan menggunakan misoprostol tidak dapat digunakan untuk stimulasi dan tidak boleh digunakan untuk induksi persalinan dengan riwayat operasi sesar (SC).

Referensi 5 : Pada pengelolaan konservatif dengan pemberian kortikosteroid pada penderita KPD kehamilan kurang bulan agar tercapainya pematangan paru, jika selama melakukan pengelolaan konservatif muncul tanda-tanda infeksi, maka segera dilakukan induksi persalinan tanpa memandang umur kehamilan. Persamaannya yaitu induksi persalinan dilakukan sebagai

usaha agar persalinan berlangsung dengan jalan merangsang timbulnya his. Perbedaannya yaitu pada KPD kurang bulan diberikan kortikosteroid untuk pematangan paru pada pengelolaan konservatif apabila dalam proses pemberian ditemukan tanda-tanda infeksi maka akan dilakukan induksi persalinan.

Referensi 6 : Induksi dilakukan dengan cara pemberian obat-obatan khusus yang berfungsi untuk merangsang keluarnya zat prostaglandin agar terjadi kontraksi pada otot rahim. Pemberian obat-obatan ini bisa dilakukan secara oral, diinfuskan, disemprot pada hidung, atau dimasukkan ke dalam vagina. Persamaannya yaitu proses induksi menimbulkan rasa sakit yang intens sehingga kondisi ibu dan janin harus selalu dipantau. Perbedaannya yaitu indikasi induksi persalinan mayoritas pada KPD dan gawat janin.

Referensi 7 : Stimulasi dengan oksitosin drip dapat merangsang timbulnya kontraksi uterus yang belum berkontraksi dan meningkatkan kekuatan serta frekuensi kontraksi pada uterus yang sudah berkontraksi.

Referensi 8 : Induksi persalinan (induction of labour) merupakan tindakan merangsang uterus untuk mengawali proses persalinan. Akselerasi persalinan (augmented of labour) merupakan tindakan merangsang uterus pada proses persalinan untuk

meningkatkan frekuensi durasi dan kekuatan kontraksi uterus (his).

Referensi 9 : Induksi persalinan merupakan tindakan merangsang uterus untuk mengawali proses persalinan. Induksi persalinan dilakukan dengan menggunakan oksitosin sintesis yang pemberiannya dengan oksitosin drip. Indikasi utama dilakukannya induksi yaitu KPD. Kejadian KPD dapat menimbulkan beberapa masalah bagi ibu maupun janin, misalnya pada ibu menyebabkan infeksi masa nifas, partus lama, perdarahan post partum, bahkan kematian. Resiko pada janin kecacatan dan kematian janin juga tinggi pada ketuban pecah dini preterm. Persamaannya yaitu induksi persalinan dilakukan untuk merangsang uterus untuk proses persalinan cepat terjadi. Perbedaannya yaitu indikasi utama dilakukannya induksi yaitu KPD dengan umur ibu rata-rata 20-35 tahun.

Referensi 10 : Proses induksi dilakukan untuk merangsang kontraksi rahim sebelum kontraksi alami terjadi agar proses persalinan cepat terjadi. Induksi persalinan dapat dilakukan dengan cara pemecahan ketuban, pemberian oksitosin, pemberian obat misoprostol, pemberian hormon prostaglandin, pemasangan laminaria, dan pemasangan balon keteter. Persamaannya yaitu proses induksi dilakukan untuk merangsang kontraksi rahim sebelum kontraksi alami terjadi agar proses persalinan cepat

terjadi. Perbedaannya yaitu induksi dapat dilakukan dengan berbagai metode.

Dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat telah diberikan penjelasan, ketetapan dan perumpamaan. Dijelaskan dalam Firman Allah dalam QS. Ar- Ra'd/13: 8 sebagai berikut :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِمِقْدَارٍ

Terjemahnya :

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya”.

Dari ayat ini dapat disimpulkan : Dan sebagaimana Allah mengetahui janin yang dikandung oleh setiap wanita dalam rahimnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kandungan. Sehingga tidak seorang pun yang telah ditetapkan berumur Panjang, kecuali telah ditetapkan Allah lebih dahulu dan tertulis di Lohmahfuz, *tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang* (Shihab, 2002: 672).

Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan

Referensi 1 : Penatalaksanaan dari KPD yaitu secara konservatif diberikan antibiotika dan secara aktif akan dilakukan induksi oksitosin. Pada konservatif diberikan antibiotika apabila ketuban pecah > 6 jam. Sedangkan penatalaksanaan secara aktif kehamilan > 35 minggu akan dilakukan induksi oksitosin apabila gagal akan dilakukan seksio sesaria. Persamaannya yaitu penatalaksanaan KPD yaitu secara konservatif diberikan antibiotika. Perbedaannya yaitu pada aktif akan dilakukan induksi oksitosin apabila gagal akan dilakukan seksio sesaria.

Referensi 2 : Penatalaksanaan KPD tergantung pada umur kehamilan. Sekitar 70-80% kehamilan genap bulan akan melahirkan dalam waktu 24 jam setelah kulit ketuban pecah, bila dalam 24 jam setelah kulit ketuban pecah belum ada tanda-tanda persalinan maka dilakukan induksi persalinan dan bila gagal akan dilakukan bedah sesar. Pada kehamilan kurang bulan tidak dijumpai tanda-tanda infeksi pengelolaannya bersifat konservatif disertai pemberian antibiotika yang adekuat sebagai profilaksi. Persamaannya yaitu kegagalan dari induksi persalinan biasanya diselesaikan dengan tindakan bedah sesar. Seperti halnya pada pengelolaan KPD yang cukup bulan. Tindakan bedah sesar dilakukan bukan hanya karena infeksi intrauterine tetapi ada indikasi lainnya misal kelainan letak,

gawat janin dan partus tak maju. Perbedaannya yaitu pada kehamilan kurang bulan dan tidak ada tanda-tanda infeksi akan diberikan antibiotika yang adekuat sebagai profilaksi.

Referensi 3 : Usia kehamilan < 37 minggu dilakukan penanganan konservatif dengan mempertahankan kehamilan sampai usia kehamilan matur. Untuk usia kehamilan 37 minggu atau lebih lakukan terminasi. Sedangkan KPD dengan infeksi kehamilan < 37 ataupun > 37 minggu berikan antibiotika jika serviks matang lakukan induksi persalinan dengan oksitosin, jika serviks tidak matang lakukan SC. Persamaan yaitu tindakan terminasi dilakukan jika terdapat tanda-tanda korioamnionitis, terdapat tanda-tanda kompresi tali pusat/janin dan pertimbangan antara usia kehamilan, lamanya ketuban pecah dan risiko menunda persalinan. Perbedaannya pada KPD < 37 minggu akan dilakukan penanganan konservatif dengan mempertahankan kehamilan sampai usia kehamilan matur apabila tidak ada infeksi.

Referensi 4 : Penatalaksanaan secara konservatif jika umur kehamilan < 32-34 minggu, dirawat selama air ketuban masih keluar, atau sampai air ketuban tidak lagi keluar. Jika usia kehamilan 32-37 minggu, tidak ada infeksi, observasi tanda-tanda infeksi dan kesejahteraan janin dan lakukan terminasi pada kehamilan 37 minggu apabila ada infeksi, beri antibiotika dan lakukan

induksi. Sedangkan penatalaksanaan aktif kehamilan > 37 minggu, induksi dengan oksitosin bila gagal dilakukan seksio sesarea. Persamaannya yaitu penatalaksanaan pada KPD harus secara tepat dengan cara memastikan diagnosis, umur kehamilan, evaluasi ada tidaknya infeksi maternal ataupun infeksi janin, apakah dalam keadaan inpartu dan terdapat gawat janin. Perbedaannya pada referensi ini tidak dilakukan induksi apabila belum terjadi kematangan serviks.

Referensi 5 : Penatalaksanaan pasien dengan KPD yang akan dilakukan operasi sesar perlu dilakukan persiapan yang dimulai dari pre tindakan, tindakan, serta post tindakan yang tujuannya untuk dapat melakukan asuhan yang tepat agar ibu dan bayi lahir dengan sehat dan selamat. Persamaannya yaitu ibu yang akan melakukan operasi sesar perlu melakukan persiapan-persiapan yang tujuannya agar ibu dan bayi lahir dengan sehat dan selamat. Perbedaannya yaitu penatalaksanaan pasien dengan KPD harus mempertimbangkan adanya infeksi, berat badan janin serta presentasi janin untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil untuk melahirkan bayi dengan selamat.

Referensi 6 : Ibu yang mengalami KPD sebelum dilakukan persalinan seksio sesarea dilakukan penanganan awal terlebih dahulu yaitu dengan pemberian induksi oksitosin, apabila gagal dilakukan seksio sesarea. . Karena seksio sesarea adalah

tindakan akhir yang dilakukan pada KPD apabila induksi gagal. Persamaannya yaitu Ibu yang mengalami KPD sebelum dilakukan persalinan seksio sesarea dilakukan penanganan awal terlebih dahulu yaitu dengan pemberian induksi oksitosin, apabila gagal dilakukan seksio sesarea. Perbedaannya yaitu ibu yang mengalami seksio sesarea adalah ibu yang sudah diberikan induksi tapi gagal.

Referensi 7 : Induksi persalinan adalah upaya memulai persalinan dengan cara-cara buatan sebelum atau sesudah kehamilan cukup bulan dengan jalan merangsang timbulnya his. Indikasi induksi antara lain KPD, kehamilan lewat waktu, oligohidramniom, korioamnionitis, dan hipertensi dalam kehamilan.

Referensi 8 : Pada kasus KPD dengan umur kehamilan yang kurang bulan dan tidak ada tanda-tanda infeksi pengelolaanya bersifat konservatif disertai pemberian antibiotik yang adekuat sebagai profilaksi.

Referensi 9 : Indikasi yang paling dominan terjadinya seksio sesarea yaitu dari faktor ibu yang paling banyak disebabkan oleh riwayat seksio sesarea sebelumnya. Indikasi janin paling banyak disebabkan oleh gawat janin. Sedangkan indikasi gabungan paling banyak disebabkan oleh preeklamsi berat dan gawat janin. Persamaannya yaitu Pada persalinan seksio sesarea, indikasi ibu terbanyak ialah riwayat seksio sesarea. Indikasi

janin terbanyak ialah gawat janin. Perbedaannya pada indikasi gabungan terbanyak ialah preeklamsi berat dan gawat janin.

Referensi 10 : Persalinan dengan induksi dilakukan untuk pemberian stimulasi agar terjadi proses persalinan. Proses ini dilakukan pada ibu hamil indikasi KPD, kehamilan lewat bulan, diabetes, infeksi, dan plasenta bayi keluar terlebih dahulu.

Langkah VII : Evaluasi

Referensi 1 : Evaluasi dan nilai tanda-tanda infeksi seperti suhu, lekosit, tanda-tanda infeksi intrauterine dan keadaan umum ibu dengan KPD. Persamaannya yaitu pada KPD di evaluasi tanda-tanda infeksi, suhu, lekosit untuk mengetahui keberhasilan induksi, bila gagal akan dilakukan seksio sesarea. Perbedaannya yaitu pada usia kehamilan 32-34 apabila air ketuban masih keluar akan dirawat sampai air ketuban tidak keluar lagi sedangkan pada usia kehamilan >35 minggu akan diberikan induksi oksitosin apabila gagal akan dilakukan seksio sesarea.

Referensi 2 : Evaluasi terapi untuk ibu KPD dengan infeksi atau tidak ada gejala infeksi, memantau ddj baik atau tidak terjadi gawat janin, dan keadaan umum ibu. Maka dapat disimpulkan yaitu ibu dengan KPD tanpa infeksi atau dengan infeksi harus dipantau agar dapat diberikan terapi yang sesuai dengan kondisi ibu. Persamaan yaitu evaluasi terapi untuk ibu KPD dengan infeksi atau tidak ada gejala infeksi, memantau ddj

baik atau tidak terjadi gawat janin, dan keadaan umum ibu. Perbedaannya yaitu KPD yang kurang bulan apabila akan menempuh cara-cara aktif harus dipastikan tidak akan terjadi RDS, dan cara konservatif untuk pematangan paru harus memantau keadaan janin.

Referensi 3 : Evaluasi Penggunaan antibiotik pada proses bedah sesar diberikan untuk profilaksis dan terapi pascabedah.

Referensi 4 : Evaluasi jenis induksi persalinan yang digunakan pada KPD dengan jenis induksi misoprostol sublingual 25 mcg, misoprostol pervaginam 25 mcg dan drips oksitosin 5 IU. Keefektifan misoprostol sublingual 25 mcg tidak berbeda dibandingkan misoprostol pervaginam 25 mcg dan drips oksitosin 5 IU. Namun berbeda pada lama waktu induksi sampai pembukaan lengkap pada kelompok misoprostol sublingual 25 mcg lebih cepat dibandingkan misoprostol pervaginam 25 mcg dan drips oksitosin 5 IU intravena. Persamaannya yaitu keefektifan misoprostol sublingual 25 mcg tidak berbeda dibandingkan misoprostol pervaginam 25 mcg dan drips oksitosin 5 IU. Namun berbeda pada lama waktu induksi sampai pembukaan lengkap pada kelompok misoprostol sublingual 25 mcg lebih cepat dibandingkan misoprostol pervaginam 25 mcg dan drips oksitosin 5 IU intravena.

Referensi 5 : Evaluasi keberhasilan induksi pada kelompok misoprostol 50 mcg menurun dibandingkan dengan kelompok misoprostol 100 mcg, dimana keberhasilan induksi misoprostol 50 mcg sebanyak 56 orang dari 69 orang (81,16%) sedangkan keberhasilan induksi pada kelompok misoprostol 100 mcg sebanyak 39 orang dari 40 orang (97,50%). Persamaannya yaitu keberhasilan induksi dengan menggunakan misoprostol 50 mcg menurun. Perbedaannya pada misoprostol 100 mcg keberhasilan induksi meningkat.

Referensi 6 : Induksi yang digunakan yaitu pemberian oksitosin Karakteristik ibu bersalin dengan tindakan induksi sebagian besar mengalami indikasi induksi KPD dan inertia uteri, kebanyakan ibu berusia produktif, paritas 1 – 3, dengan usia kehamilan aterm, dan cara induksi sebagian besar menggunakan infus oksitosin. Persamaan yaitu ibu yang mengalami KPD sebelum dilakukan persalinan seksio sesarea dilakukan penanganan awal terlebih dahulu yaitu dengan pemberian induksi oksitosin, apabila gagal dilakukan seksio sesarea. Perbedaannya yaitu ibu yang tidak mengalami KPD lebih banyak dilakukan seksio sesarea dibandingkan ibu yang mengalami KPD.


- Referensi 7 : Evaluasi Hasil yang didapatkan yaitu penggunaan antibiotik profilaksis 100% sesuai dengan formularium dan PPAPC 2016 yaitu menggunakan antibiotik ceftriaxone.
- Referensi 8 : Pengawasan ketat dan evaluasi terhadap ibu yang mengalami KPD dengan kemungkinan terjadi infeksi intrapartum, janin yang mengalami takikardia, dan gangguan lainnya. Maka dapat disimpulkan persamaan dan perbedaannya yaitu evaluasi keadaan ibu dengan KPD, TTV dalam batas normal, tidak terjadi infeksi intrapartum pada ibu, dan takikardia pada janin.
- Referensi 9 : Pada referensi ini evaluasi ibu dengan KPD dan lakukan seksio sesarea. Faktor terbanyak dilakukannya seksio sesarea yaitu DKP dari faktor ibu, gawat janin dari faktor janin, induksi gagal dari faktor lainnya. Persamaannya yaitu determinan persalinan SC tertinggi pada faktor Ibu yaitu DKP. Namun pada faktor janin yaitu gawat janin dan faktor lainnya yaitu induksi gagal. Perbedaannya yaitu seksio sesarea dilakukan karena induksi yang dilakukan gagal.
- Referensi 10 : Antibiotik profilaksis hanya diberikan pada kasus persalinan dengan faktor risiko infeksi seperti kasus KPD dengan lama ketuban pecah melewati 18 jam, febris, adanya koloni kuman Streptococcus Grup Beta, dan persalinan kurang dari 37 minggu.

B. Implikasi Kebidanan

Ketuban pecah dini (KPD) yaitu pecahnya selaput ketuban sebelum waktunya atau sebelum ada tanda” proses persalinan. Sedangkan KPD preterm yaitu KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu. Umur ibu yang rentan terjadi KPD yaitu < 20- >30 tahun. Umur ibu yang < 20 tahun, termasuk umur terlalu muda untuk melahirkan dengan keadaan uterus yang kurang matur sehingga rentan mengalami ketuban pecah dini. Sedangkan umur > 35 tahun tergolong umur yang terlalu tua untuk melahirkan khususnya pada ibu primi (tua) dan berisiko tinggi mengalami ketuban pecah dini. Pada setiap kelahiran dengan KPD, harus ada paling sedikit 2 orang bidan dan dokter Obgyn di kamar bersalin yang tugasnya khusus bertanggung jawab untuk penanganan pertama pada ibu dengan KPD dan dapat melakukan langkah awal penanganan KPD, termasuk pemberian induksi persalinan dengan menggunakan misoprostol dan oksitosin. Ibu yang membutuhkan induksi persalinan adalah ibu yang mengalami ketuban pecah sebelum usia kehamilan 34 minggu dan setelah 34 minggu dengan beberapa faktor yang mengharuskan ibu di induksi dan terdapat infeksi yang membahayakan keselamatan ibu dan janin. Apabila proses induksi yang dilakukan gagal akan dilakukan seksio sesarea.

Ibu dengan KPD memiliki risiko melahirkan bayi prematur. Maka dari itu pengelolaan pada KPD ada 2 cara yaitu secara konservatif dan aktif. Usia kehamilan < 37 minggu dilakukan penanganan konservatif dengan mempertahankan kehamilan sampai usia kehamilan matur. Sedangkan

pengelolaan secara aktif untuk usia kehamilan 37 minggu atau lebih akan dilakukan terminasi. Sedangkan KPD dengan infeksi kehamilan < 37 ataupun > 37 minggu akan di berikan antibiotika jika serviks matang akan di lakukan induksi persalinan dengan oksitosin, jika serviks tidak matang maka akan di lakukan seksio sesarea. Pengelolaan KPD pada kehamilan kurang dari 34 minggu sangat kompleks, bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya prematuris dan RDS (respiration distress syndrome), mengurangi resiko infeksi dan korioamnionitis akibat kejadian KPD, keluarnya tali pusat, dan kematian janin. Sedangkan pada kehamilan > 37 minggu , akan diberikan induksi dengan oksitosin apabila induksi yang diberikan gagal maka akan dilakukan seksio sesarea.



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penulisan literatur review dengan KPD serta menghubungkan dengan teori dan Avidance Based maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu :

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan identifikasi data dasar pada ibu dengan KPD berdasarkan referensi maka didapatkan data dasar dengan usia kehamilan $\pm < 37$ minggu dan terjadi pada kelompok usia $< 20 - > 35$ tahun.
2. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa / masalah aktual pada ibu dengan KPD berdasarkan referensi maka didapatkan diagnosa aktual dilihat dari pemeriksaan antenatal, pemeriksaan fisik, penentuan cairan ketuban dilakukan dengan tes lakmus. (Nitrazin test), dan pemeriksaan ultrasonografi (USG).
3. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa / masalah potensial pada ibu dengan KPD berdasarkan referensi maka didapatkan diagnosa potensial di antisipasi terjadinya gangguan pernafasan bayi, infeksi dan korioamnionitis akibat kejadian KPD, keluarnya tali pusar, dan kematian janin.

4. Telah dilakukan pengidentifikasian tindakan segera dan kolaborasi pada ibu dengan KPD berdasarkan referensi yang didapatkan maka tindakan segera dilakukan untuk mencegah infeksi dan mempercepat persalinan dengan induksi.
5. Telah dilakukan pengidentifikasian rencana asuhan (intervensi) pada ibu dengan KPD berdasarkan referensi maka didapatkan rencana asuhan yaitu perencanaan induksi persalinan serta menilai kondisi ibu dan janin.
6. Telah dilakukan pengidentifikasian tindakan asuhan pada ibu dengan KPD berdasarkan referensi maka didapatkan tindakan asuhan sesuai dengan intervensi yaitu melaksanakan pemberian induksi persalinan, apabila induksi yang diberikan gagal maka akan dilakukan seksio sesarea.
7. Telah dilakukan evaluasi asuhan kebidanan pada ibu dengan KPD berdasarkan referensi maka didapatkan hal-hal yang harus di evaluasi yaitu keberhasilan induksi, tanda-tanda infeksi, denyut jantung janin, tanda-tanda vital, his, dan menghindari pemeriksaan prevaginal.

B. Saran

Melihat besarnya efek yang ditimbulkan dengan adanya masalah persalinan dengan KPD yang akan berdampak pada buruknya keadaan ibu dan janin, maka perlu diberikan tindakan yang tepat dan segera untuk mengantisipasi masalah tersebut. Oleh karena itu, Adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya masalah KPD maka perlu peningkatan kualitas pelayanan ANC dan pertolongan yang cepat dan tepat, sehingga dapat segera di antisipasi kemungkinan masalah lain yang dapat terjadi.
2. Seorang bidan harus dapat menilai dan mengetahui penyulit-penyulit yang dapat terjadi pada persalinan serta memberikan tindakan yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Andalas, H. 2014. *Goresan Tangan Spesialis Kandungan*. Sibuku Media.
- Anggraeni, N., Asriani, dan Rahmadani, R. 2020. *Hubungan antara Durasi Ketuban Pecah Dini dengan APGAR Skor Neonatus*. UMI Medical Journal, 5(2), 1–7. <https://doi.org/10.33096/umj.v5i2.117>
- Alexander, R., dan Rahimi, A. 2021. *Hubungan antara ketuban pecah dini dengan nilai Apgar pada kehamilan aterm*. 03(1), 23–28.
- Astutik, R. Y., dan Ertiana, D. 2018. *Anemia dalam Kehamilan*. CV. PUSTAKA ABADI.
- AW, G. A. P., Kemara, P., dan Megadhana, I. W. 2016. *Misoprostol Untuk Induksi Persalinan Pada Kehamilan Aterm*. 1–16.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2017. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017*. In *Sdki*.
- Dania, H., Baroroh, F., dan Bachri, M. S. 2016. *Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Bedah Sesar Di Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Bantul Yogyakarta*. 13(02), 228–238.
- Dania, H., Wahyono, D., dan Retnowati, S. 2014. *Perbandingan Efektivitas Misoprostol Dosis 50 µg Dan 100 µg Terhadap Keberhasilan Kelahiran Induksi Di RSUD PKU Muhammadiyah Yogyakarta*.
- D, N. N., dan Dwi, M. 2013. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Nuha Medika.
- Diana, S., Mail, E., dan Rufaida, Z. 2019. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Percetakan CV Oase Group.
- Dinkes. 2016. *Profil kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*. Media Kesehatan, 1, 20. [file:///C:/Users/Master com/Downloads/27_Sulsel_2016 \(1\).pdf](file:///C:/Users/Master com/Downloads/27_Sulsel_2016 (1).pdf)
- Dovega, A. D. 2011. *Pecah Dini Pada Ibu Bersalin Di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta*.
- Ekawati, S. 2017. *Identifikasi ibu Yang Mengalami Induksi Persalinan Di Rumah Sakit Permata Bundakota Kendari*.
- Evi Yunitasari, Riska Hediya Putri, A. D. L. 2021. *Hubungan Ketuban Pecah Dini, Umur Kehamilan Dan Partus Lama Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum*. Journal Wellnes, 2(February), 309–313.
- Furqooniyah, N., Hadisubroto, Y., dan Hermansyah, B. 2019. *Keberhasilan Terapi Konservatif pada Persalinan Preterm Disertai dan Tanpa Disertai Ketuban Pecah Dini di RSD dr . Soebandi , Jember*. 7(1), 20–26.

- Gusnidarsih, V., dan Sari, L. L. 2019. *Hubungan Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasanuddin Damrah Manna*. 4(1), 8–13.
- Handajani, S. D. 2010. *Manajemen Asuhan Kebidanan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Handayani, L., Amelia, R., dan Sumarni, E. 2017. *Hubungan Pola Seksual Ibu Hamil dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini (KDP) di RSUD dr. h. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin*. *Dinamika Kesehatan*, 8(1), 33–44.
- Hapsari, D. I., dan Hendraningsih, T. 2018. *Determinan Peningkatan Angka Kejadian Tindakan Sectio Caesarea Pada Ibu Bersalin di Rumah Sakit Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintang*. *Jumantik Jurnal Mahasiswa Dan Penelitian Kesehatan*, 5(1), 1–11.
- Hariadi, Alkaff, Z., dan Siswosudarmo, R. 2002. *Efektivitas Misoprostol Per Vaginam dan Per Oral Untuk Induksi Persalinan Pada Kehamilan Aterm Ketuban Pecah Dini*.
- Haryanti, Y. 2020. *Analisis Hubungan Ketuban Pecah Dini (KPD) dan Paritas dengan Partus Lama*. *Jurnal Dunia Kesmas*, 9(3), 371–377.
- Ida Ayu Chandranita Manuaba, Manuaba, I. B. G. F., dan Manuaba, I. B. G. 2009. *Buku Ajar Patologi Obstetri Untuk Mahasiswa Kebidanan (ke-1)*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Kemendes. 2013. *Kontrasepsi. Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar Dan Rujukan*, 231–256.
- Komalasari, R., Meiliya, E., dan Wahyuningsih, E. 2010. *Buku Saku Kebidanan*. EGC.
- Kusmintarti, A., dan Erwita, Y. 2011. *Karakteristik Ibu Bersalin Dengan Tindakan Induksi Di RSUD Cibinong*. 2, 1–8.
- Laili, H. N., Sudaryanti, L., dan Jihan, A. S. 2018. *Hubungan Paritas Dengan Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin*. *Jurnal of Ners Community*, 09(November), 183–189.
- Legawati dan Riyanti. 2018. *Determinan Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di Ruang Cempaka RSUD DR DORIS SYLVANUS PALANGKARAY*. 06(1), 68–72.
- Lestary, E., Rambulangi, J., dan Farid, R. B. 2013. *Perbandingan Efektivitas Misoprostol Sublingual 25 mcg, Pervaginam 25 mcg Dan Drips Oksitosin 5 IU Untuk Induksi Persalinan*.
- Mariana, D. 2017. *Gambaran Karakteristik Ibu Bersalin Dengan Induksi Persalinan di RSUD Cibinong Periode Januari – Oktober*. 2–4.

- Marmi, Suryaningsih, R. M., dan Fatmawati, E. 2016. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Pustaka Pelajar.
- Maryani. 2016. *Determinan Persalinan Seksio Sesarea di RSUD Wates Kulon Progo*.
- Meihartati, T., dan Hairiyah. 2018. *Hubungan Antara Pola Seksualitas Gravida Dengan Ketuban Pecah Dini*. Jurnal Medika Karya Ilmiah Kesehatan, 3(1), 1–8.
- Meiriza, W., dan Oviana, A. 2017. *Hubungan Paritas dan Riwayat KPD Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di Ruang Rawat Inap Kebidanan RSUD Solok*. 4, 113–118.
- Mutmainnah, A. U., Johan, H. H., dan Llyod, S. S. 2017. *Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru Lahir*. CV Andi Offset.
- Mutmainnah, N., Setyati, P., dan Handasari, N. 2014. *Evaluasi Penggunaan dan Efektivitas Antibiotik Profilaksis pada Pasien Bedah Sesar di Rumah Sakit Surakarta*. Indonesian Journal of Clinical Pharmacy, 3(2), 44–49.
- Negara, K. S., Mulyana, R. S., dan Pangkahila, E. S. 2017. *Buku Ajar Ketuban Pecah Dini*. Penerbit Media Pustaka.
- Nugroho, T. 2012. *Patologi Kebidanan*. Nuha Medika.
- Nurdiansyah, N. 2011. *Buku Pintar Ibu Dan Bayi (ke-1)*. Bukune.
- Nurhayanti, E. 2019. *Patologi Dan Fisiologi Persalinan*. Pustaka Baru Press.
- Nur Helmi, Z. R. 2019. *Determinan Persalinan Sectio Caesarea Pada Ibu Bersalin Suatu Rumah Sakit di Kota Pekanbaru Tahun*. 6(1), 115–120.
- Pamilangan, E. D., Wantania, J. J. E., dan Lumentut, A. M. 2020. *Indikasi Seksio Sesarea di RSUD Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2017 dan 2018*. 8(28), 137–144.
- Pratiwi, A. M., dan Fatimah. 2019. *Patologi Kehamilan*. Pustaka Baru Press.
- Pratiwi, Ika, dan Rahayu, Sri. 2018. *Studi Pengukuran PH Cairan Ketuban*. Midwifery, 6(2), 13–18.
- Prawirohardjo, S. 2016. *Ilmu Kebidanan*. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Prima, D. R., Chandra, W., dan Lubis, I. S. 2018. *Analisis Ketuban Pecah Dini Terhadap Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Budi Kemuliaan*. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 1–15.
- Rambe, N. L. 2018. *Hubungan Antara Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli*. Ilmiah Kebidanan, 4(1), 315–316.
- Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, 2020

- Reni, dan Sunarsih. 2017. *Efektifitas Pemberian Misoprostol Pervaginam Dengan Oksitosin Intravena Terhadap Kemajuan Persalinan Pada Ibu Bersalin Indikasi KPD Di RS Islam Asy-Syifaa Bandar Jaya*. Jurnal Kebidanan, 3(3), 121–126.
- Rhomadona, S. W. 2019. *Gambaran Karakteristik Ibu, Nilai Bishop Dan Cara Terminasi Persalinan Pada Persalinan Kala 1 Dengan Induksi Pada Ketuban Pecah Dini Di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro, Kota Semarang*. 8(1), 22–27.
- Rohmah, F. N. 2021. *Keberhasilan Induksi Persalinan Berdasarkan Paritas*. 935–940.
- Rohmawati, N., dan Fibriani, A. I. 2018. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*. Journal.Unnes.Ac.Id, 2(1), 23–32.
- Rozikhan, Sapartinah, T., dan Sundari, A. 2020. *Hubungan Paparan Asap Rokok Terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini Di Puskesmas Ringinarum Kabupaten Kendal*. Midwifery Care Journal, 1(2), 24–29.
- Serudji, J., dan Erkadius. 2018. *Keefektifan Misoprostol Peroral Sebagai Pematangan Serviks Pada Ketuban Pecah Dini Kehamilan Aterm Dengan Skor Bishop \leq 4 Di Padang*. Journal Obgin Emas, 2(2), 87–91.
- Setiani, M. 2018. *Hubungan Antara Partus Lama, Induksi Oksitosin, Dan Anemia Dengan Kejadian Hemoragik Post Partum Primer Di RSUD Soreang*.
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, Jakarta: Lentera hati, 2009.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : LenteraHati.
- Sihotang, R. C. B., Astuti, F. P., dan Khayati, Y. N. 2015. *Hubungan Umur Ibu Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Di RSUD Ambarawa*. 7(15), 9–15.
- Sinaga, E. W. 2020. *Identifikasi Indikasi Induksi Persalinan Pada Ibu Di Ruang Bersalin Rs Sufina Aziz*. 6(1), 27–30.
- Sitinjak, H. L. 2018. *Hubungan Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Persalinan Seksio Sesarea Di Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko*. Jurnal Kesehatan Dan Sains Terapan STIKES Merangin, 4(May 2017), 29–34.
- Sondakh, J. J. S. 2013. *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Penerbit Erlangga.
- Trihastuti, M. P., dan Purwaka, B. T. 2015. *Pengaruh Pemberian Misoprostol 25 μ g Peroral Ambulatoir pada Tenggat Waktu Persalinan Wanita Hamil $>$ 40 Minggu Resiko Rendah*. Majalah Obstetri & Ginekologi, 23(1), 1.
- Untari, S., dan Setiowati, T. 2016. *Tata Laksana Ibu Bersalin Dengan Ketuban Pecah Dini Di Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi*. 1, 16–20.

- Walyani, E. S., dan Purwoasstuti, T. E. 2015. *Asuhan kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Pustaka Baru Press.
- Wibowo, M. I. N. A., Sugiri, M. P., Arrista, B., dan Setiawan, D. 2021. *Penggunaan Off-Label Misoprostol Pada Pasien Obstetri-Ginekologi Di Rumah Sakit Swasta Kab. Banyumas*. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*. 8(1), 9.
- Wibowo, M. I. N. A., Utamiasih, T. D., dan Juwita, D. R. 2019. *Evaluasi Penggunaan Antibiotik Profilaksis Pada Operasi Sesar di Rumah Sakit Swasta Purwokerto*. *PHARMACY*. Jurnal Farmasi Indonesia (Pharmaceutical Journal of Indonesia), 16(2), 372.
- Widiastini, L. P. 2018. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir*. Penerbit In Media.
- Wiradharma, W., I Md, K., dan I Wyn, D. A. 2016. *Risiko Asfiksia Pada Ketuban Pecah Dini di RSUP Sanglah*. *Sari Pediatri*, 14(5), 316.
- Wulandari, I. A., Z, M. F., dan Octaviani, A. 2019. *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSIA Sitti Khadijah I Makassar*. *Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia*, 3(1), 52–61.
- Wulan, R. C., Kristianingsih, A., dan Wulandari, E. T. 2019. *Hubungan Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir Di RSUD DR. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung*. 2(2), 136–143.
- Wulansari, E. A., Alfiah, S., dan Maharrani, T. 2018. *Hubungan Antara Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Persalinan Prematur di Ruang VK RSUD Haji Surabaya*. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 9(3), 176–180.
- Yaze, I. U., dan Dewi, R. 2016. *Penatalaksanaan Ketuban Pecah Dini pada Perempuan Hamil Usia 37 Tahun*. 4, 76–80.
- Yulifah, R., dan Surachmindari. 2014. *Konsep Kebidanan untuk Pendidikan Kebidanan*. Salemba Medika.