

**PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KELOR  
(*Moringa oleifera*) DENGAN LEVEL YANG BERBEDA  
TERHADAP KUALITAS FISIK BAKSO  
DAGING BROILER**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan  
Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**DEWI TRISNAWATI KASRI**  
**60700117012**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Trisnawati Kasri  
NIM : 60700117012  
Tempat/Tanggal Lahir : Sangkala, 01 Agustus 1999  
Jurusan : Ilmu Peternakan  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Judul : Pengaruh Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera*) dengan Level yang Berbeda terhadap Kualitas Fisik Bakso Daging Broiler

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya Skripsi yang saya tulis adalah asli. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya Skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau *plagiasi* maka skripsi ini dibatalkan dan saya bersedia dikenakan sanksi akademik yang berlaku. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Kajang, 11 Maret 2022

Penyusun,



Dewi Trisnawati Kasri  
Nim. 60700117012

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera*) dengan Level yang Berbeda terhadap Kualitas Fisik Bakso Daging Broiler” yang disusun oleh Dewi Trisnawati Kasri, NIM: 60700117012, Mahasiswa pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* pada hari Senin tanggal 19 Januari 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 01 Februari 2022 M  
29 Jumada Al-Thani 1443 H

### Dewan Penguji

Ketua	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.	(.....)
Munaqisy I	: Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P.	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H.M. Dahlan M, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Amriana Hifizah, S.Pt., M.Anim., St., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Astaty, S.Pt., M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.  
NIP. 1971041200031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Adapun judul Skripsi ini adalah **Pengaruh Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera*) dengan Level yang Berbeda terhadap Kualitas Fisik Bakso Daging Broiler** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salam dan Shalawat senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Bapak saya tercinta **Kaharuddin** dan Ibu saya tercinta **Suriani** karena mereka saya bisa sampai ke tahap ini yang pastinya tidak lepas dari doa dan dukungan tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penyusun dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhanis M.A, Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak **Prof. Mardan, M.Ag.** selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Pengembangan Lembaga, Bapak **Dr. Wahyuddin, M.Hum.** selaku Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Bapak **Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.** selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Bapak **Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.** selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Halifah Mustamin, M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ibu **Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.** selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi, ibu **Dr. Fatmawati Nur Khalik, S.Si., M.Si.** selaku Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Fakultas Sains dan Teknologi, dan Bapak **Muhammad Anshar, S.Pt. M.Si.** selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Bapak **Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.** sebagai Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dan ibu **Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu

Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu **Amriana Hifizah, S.Pt., M.Anim, St., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing pertama dan Ibu **Astati, S.Pt., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing kedua, yang telah mendidik, membimbing ditengah kesibukannya masih bersedia menyisihkan waktu untuk memberi petunjuk dan arahan dari mulai penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Irmawaty, S.Pt., M.P.** dan Bapak **Prof. Dr. H. M. Dahlan M, M.Ag.** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. **Bapak/Ibu Dosen, Laboran dan Staf Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
7. **Bapak/Ibu Civitas Akademik** Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah membantu dalam proses pengurusan administrasi.
8. Buat Saudari dan Saudara **Ilmu Peternakan Angkatan 2017 “K17ANG”** terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawa yang selama ini terjalin.
9. Teman saya **Nurhidayah, Khusnul Khatima, S.Pt., Ayu Ashari, Ilham Hasan Al-Fiqry, S.Pt., A.M.Nur Khaeruddin M, Andi Wahidin Hasrianto dan Muhammad Fathul Khair** yang selama ini telah hadir dalam suka dan duka mulai dari awal perkuliahan sampai proses selesainya skripsi ini.

**10. Teman-teman KKN angkatan 65 Desa Sangkala Kecamatan Kajang  
Kabupaten Bulukumba**

11. Tim penelitian bakso broiler **Andi Dian Arwinda Ihsan** atas waktu dan kerjasamanya selama penelitian berlangsung.
12. Keluarga yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik materil maupun non-materil.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah, penyusun memohon doa dan Rahmat-Nya, semoga segala amal bantuan yang diberikan kepada penyusun mendapatkan pahala dan berkah di sisi-Nya agar kiranya dengan penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Ilahi Rabbi.

Kajang, 11 Maret 2022

Penyusun,




Dewi Trisnawati Kasri

Nim. 60700117012

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Hipotesis.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Kajian Integrasi <i>Al-Quran</i> .....	5
B. Daging Ayam .....	11
C. Bakso.....	16
D. Tepung Daun Kelor.....	20
E. Penilaian Kualitas Fisik .....	25
F. Kajian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	32
B. Materi Penelitian .....	32
C. Jenis Penelitian.....	33
D. Rancangan Penelitian .....	33
E. Prosedur Penelitian.....	34

F. Parameter Yang Diukur.....	37
G. Analisis Data .....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Hasil dan Pembahasan.....	39
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA .....	46
LAMPIRAN.....	52
RIWAYAT HIDUP.....	57



## DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Diagram Alir Pembuatan Bakso Broiler dengan Penambahan Tepung Daun Kelor ( <i>Moringa oleifera</i> ).....	36
2.	Diagram Batang Pengukuran Daya Ikat Air Bakso Broiler dengan Penambahan Tepung Daun Kelor ( <i>Moringa oleifera</i> ).....	40
3.	Diagram Batang Pengukuran Daya Lenting Bakso Broiler dengan Penambahan Tepung Daun Kelor ( <i>Moringa oleifera</i> ).....	41
4.	Diagram Batang Pengukuran Daya Putus Daging Bakso Broiler dengan Penambahan Tepung Daun Kelor ( <i>Moringa oleifera</i> ) .....	43



## DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Komposisi Nutrisi Daging Broiler dalam 100 gram .....	13
2.	Kandungan Asam Amino Daging Ayam .....	14
3.	Komposisi Kimia Bakso .....	17
4.	Syarat Mutu Bakso Daging Berdasarkan SNI-3818-2014 .....	18
5.	Kandungan Nutrisi Daun Kelor .....	22
6.	Kandungan Nutrisi Tepung Daun Kelor .....	24
7.	Komposisi Bahan Pembuatan Bakso dengan Penambahan Tepung Daun Kelor ( <i>Moringa oleifera</i> ) .....	33
8.	Hasil Analisis Kualitas Fisik Bakso Daging Broiler dengan Penambahan Tepung Daun Kelor ( <i>Moringa oleifera</i> ) .....	39
9.	Sidik Ragam Daya Ikat Air .....	52
10.	Sidik Ragam Daya Lenting .....	52
11.	Sidik Ragam Daya Putus Bakso .....	52



## ABSTRAK

**Nama** : Dewi Trisnawati Kasri  
**NIM** : 60700117012  
**Jurusan** : Ilmu Peternakan  
**Judul** : Pengaruh Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera*) dengan Level yang Berbeda terhadap Kualitas Fisik Bakso Daging Broiler

---

Daun kelor dalam bentuk tepung memiliki kandungan protein dan karbohidrat yang tinggi. Kandungan karbohidrat yang tinggi dalam pembuatan bakso berfungsi untuk mengemulsi lemak dan mempunyai kemampuan untuk mengikat air sedangkan kandungan protein yang tinggi dibutuhkan untuk menggantikan protein-protein daging yang hilang selama pemasakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dengan level yang berbeda terhadap kualitas fisik bakso daging broiler. Penelitian bersifat eksperimen, menggunakan Rancangan Acak Lengkap, dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Setiap ulangan menggunakan 3 butir bakso dengan perlakuan yang diberikan ( $P_0$ ): 0% tepung daun kelor (*Moringa oleifera*), ( $P_1$ ): 2,5% tepung daun kelor (*Moringa oleifera*), ( $P_2$ ): 3% tepung daun kelor (*Moringa oleifera*), dan ( $P_3$ ): 3,5% tepung daun kelor (*Moringa oleifera*). Parameter yang diuji adalah Daya Ikat Air (DIA), Daya Lenteng, dan Daya Putus Daging (DPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung daun kelor dalam bakso daging broiler tidak memberikan pengaruh nyata ( $P > 0,05$ ) terhadap Daya Ikat Air (DIA), Daya Putus Daging (DPD) dan Daya Lenteng.

**Kata kunci** : Bakso, Daging Broiler, Daya Ikat Air (DIA), Daya Lenteng, Daya Putus Daging (DPD) dan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera*)

## ABSTRACT

**Name** : Dewi Trisnawati Kasri  
**NIM** : 60700117012  
**Department** : Animal Husbandry  
**Thesis Title** : **Effect of Addition of Moringa Leaf Flour (Moringa oleifera) with Different Levels on the Physical Quality of Broiler Meatballs**

---

*Moringa leaves in the form of flour have a high protein and carbohydrate content. The high carbohydrate content in the manufacture of meatballs serves to emulsify fat and has the ability to bind water, while the high protein content is needed to replace meat proteins lost during cooking. This study aims to determine the effect of the addition of moringa leaf flour (Moringa oleifera) with different levels on the physical quality of broiler meatballs.. The research was experimental, using a completely randomized design, with 4 treatments and 3 replication. Each replication used 3 meatballs with the given treatment (P<sub>0</sub>): 0% moringa leaf flour (Moringa oleifera), (P<sub>1</sub>): 2,5% moringa leaf flour (Moringa oleifera), (P<sub>2</sub>): 3% moringa leaf flour (Moringa oleifera), dan (P<sub>3</sub>): 3,5% moringa leaf flour (Moringa oleifera). Parameters tested were Water Holding Capacity (DIA), Resilience, and Meat Breaking Strength (DPD). The result showed that the addition of moringa leaf flour in broiler meatballs did not significantly affect (P>0,05) on the Water Holding Capacity (DIA), Meat Breaking Strength (DPD), and Resilience.*

**Keywords :** *Broiler Meat, Elasticity, Meatballs, Meat Breaking Strength (DPD), Moringa leaf Flour (Moringa oleifera), and Water Holding Capacity (DIA)*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Daging merupakan salah satu komoditas peternakan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Daging ayam merupakan daging unggas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan merupakan sumber pangan yang memiliki kandungan gizi yang lengkap yaitu sebagai sumber asam amino esensial yang diperlukan tubuh manusia, sehingga baik untuk dikonsumsi (Fadilah dkk., 2007). Selain nilai gizi yang lengkap daging ayam mudah untuk didapatkan dan memiliki harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga daging sapi. produksi daging ayam sangat cepat karena dapat dipanen pada umur lima sampai enam minggu dengan bobot 1,7 sampai dengan 2 kg.

Daging dapat diolah menjadi berbagai jenis produk yang menarik dengan aneka bentuk dan rasa yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpan serta dapat meningkatkan nilai ekonomis tanpa mengurangi nilai gizinya. Salah satu produk olahan daging yang banyak ditemui di pasaran dan digemari masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa adalah bakso. Bakso merupakan olahan makanan yang terbuat dari protein hewani seperti daging ikan, ayam, sapi yang dibumbui dan digiling halus. Penyelesaian bakso yaitu dibentuk bulat dan direbus hingga matang. Kandungan terbanyak dari bakso adalah protein dan karbohidrat (Nurlaela dkk., 2013).

Menurut SNI 01-3818-1995, bakso produk olahan berbentuk bulatan yang diperoleh dari campuran daging ternak dengan komposisi daging lebih dari 50%. bakso daging mempunyai persyaratan yaitu kadar air maksimal 70% abu maksimal 3 %, protein minimal 9, lemak minimal 2%. Perkembangan bakso dari masa ke masa sudah banyak mengalami perkembangan, dari bakso yang original, ditambahkan sayuran sampai yang diisi. Pembuatan bakso ayam ditambahkan dengan bahan-bahan tertentu yang mengandung komposisi kimia yang diharapkan dapat memenuhi gizi seimbang. Selain wortel, tepung sagu, tepung biji nangka dan rumput laut yang ditambahkan dalam pembuatan bakso, ada alternatif lain yang bisa ditambahkan dalam pembuatan bakso yakni daun kelor. Daun kelor mengandung banyak protein, vitamin dan mineral.

Daun kelor merupakan daun majemuk bertangkai panjang, beranak gasal dan berbentuk bulat telur. Daun kelor biasanya digunakan untuk sayur bening, teh, serbuk dan lain-lain. Daun kelor tidak memiliki nilai jual. Padahal daun kelor memiliki banyak kandungan gizi dan terbukti secara ilmiah merupakan sumber gizi berkhasiat obat yang kandungannya melebihi kandungan tanaman lainnya. Daun kelor diyakini memiliki potensi untuk mengatasi kekurangan gizi, kelaparan, serta mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit di seluruh dunia. Kandungan zat besi yang tinggi dalam daun kelor juga dapat mengatasi kekurangan zat besi pada penyakit anemia (Krisnadi, 2013).

Hasil penelitian Ulfa dan Ismawati (2016), menyatakan bahwa protein bakso kelor 16,69% sesuai dengan standar SNI yaitu dengan jumlah minimal 9,0%. Hal ini dikarenakan daun kelor mengandung protein 6,7 gram per 100 g daun kelor

segar. Karbohidrat bakso kelor berjumlah 7,85%, hal ini menunjukkan bahwa bakso kelor dapat dijadikan sumber karbohidrat karena pemakaian tapioka sebanyak 15% dari total daging. Hasil uji bakso kelor memiliki kandungan protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B dan vitamin C yang lebih tinggi dari bakso biasa sehingga baik dijadikan makanan sehat.

Pembuatan bakso biasanya ditambahkan bahan pengisi berupa tepung, ada beberapa jenis tepung yang sering digunakan dalam pembuatan bakso yaitu, tepung tapioka, tepung terigu, tepung beras, tepung jagung, tepung sagu dan tepung daun kelor. Tepung daun kelor mempunyai kandungan nutrisi yang sama dengan tepung sagu, yaitu mengandung protein dan karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat (pati) ini berfungsi untuk mengemulsi lemak dan mempunyai kemampuan mengikat air sedangkan protein yang tinggi dibutuhkan untuk menggantikan protein-protein daging yang hilang selama pemasakan sehingga diharapkan dengan penambahan tepung daun kelor pada adonan akan menghasilkan pengaruh terhadap kualitas bakso.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian tentang pengaruh penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dengan level yang berbeda terhadap kualitas fisik bakso daging broiler

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dengan level yang berbeda memberikan pengaruh terhadap kualitas fisik bakso daging broiler?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dengan level yang berbeda terhadap kualitas fisik bakso daging broiler..

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai cara meningkatkan kualitas bakso boiler dengan penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) serta sebagai referensi bagi penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **E. Hipotesis**

Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga adanya pengaruh penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) terhadap kualitas fisik bakso daging broiler.

HO: Penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dengan level yang berbeda tidak dapat meningkatkan kualitas fisik bakso daging broiler.

H1: Penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dengan level yang berbeda dapat meningkatkan kualitas fisik bakso daging broiler.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Integrasi *Al-Quran***

Bagi umat Islam *Al-Quran* merupakan pedoman hidup yang berisi semua hal baik duniawi maupun akhirat. Tak terkecuali ilmu pengetahuan, semua jenis ilmu pengetahuan telah tercantum dalam kitab suci umat Islam ini. Salah satu ilmu pengetahuan yang ada dalam *Al-Quran* adalah ilmu peternakan. Ilmu peternakan merupakan ilmu terapan yang disebut secara eksplisit di dalam *Al-Quran*. Bahkan beberapa nama hewan ternak dijadikan sebagai nama surat di dalam *Al-Quran*.

Allah swt. tidak hanya menciptakan manusia di muka bumi, namun Allah juga menciptakan hewan dan tumbuhan yang memiliki banyak manfaat untuk kehidupannya. Manusia adalah makhluk hidup yang paling tinggi di muka bumi karena manusia dikaruniai akal dan pikiran oleh Allah swt. sehingga manusia dapat dikatakan sebagai makhluk Allah yang sempurna yang ada di muka bumi ini. Allah juga menciptakan hewan dan tumbuhan untuk diambil manfaatnya oleh manusia, seperti hewan yang dimanfaatkan sebagai makanan yang mengandung sumber protein dan gizi untuk manusia begitu juga dengan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan pokok karena memiliki kandungan senyawa yang baik untuk tubuh. Tumbuhan dapat dikonsumsi secara langsung atau dilakukan pengolahan terlebih dahulu, seperti sumber bahan pangan, bahan bakar (kayu bakar) dan bahan bangunan (Hikmah, 2018).

Buah dan sayuran merupakan makanan wajib untuk dikonsumsi oleh manusia karena mengandung sumber serat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, buah dan sayur juga mengandung jenis mineral seperti Mg, K, Ca dan Fe. Setiap buah dan sayur memiliki kandungan vitamin dan mineral yang berbeda (Astawan, 2020). Semua ciptaan Allah swt. masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Kebanyakan tumbuhan boleh untuk dimakan mulai dari akar, buah, batang hingga daunnya. Dengan begitu tumbuhan adalah kepingan penting untuk keberlangsungan hidup manusia, begitupun untuk hewan juga membutuhkan tumbuhan (Shihab, 1994).

Allah swt. menciptakan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dengan bentuk yang beraneka ragam sebagai tanda kekuasaan-Nya, agar kita dapat mempelajari dan merenungi tentang penciptaan-Nya sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS An-Nuur/24:45.



Terjemahnya:

*“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan dengan perutnya dan sebagian ada yang berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”* (Kementerian Agama RI, 2018).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah menyebutkan kekuasaannya yang Maha Sempurna dan kerajaan-kerajaan-Nya yang Maha Agung dengan menciptakan berbagai jenis makhluk dalam bentuk, rupa, warna dan gerak-gerik yang berbeda dari unsur yang sama yaitu air. Ada yang berjalan dengan perutnya yaitu ular, ada yang berjalan dengan dua kaki yaitu manusia dan burung/ayam, ada yang berjalan dengan empat kaki seperti hewan ternak dan binatang-binatang lainnya. Allah swt. menciptakan dengan kekuasaan-Nya, karena apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki-Nya pasti tidak akan terjadi (Abdurrahim dkk., 2004).

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang baik-baik dan halal. Baik dari segi cara mendapatkan bahkan cara pengolahannya agar tidak membahayakan dan mengganggu sistem organ yang ada dalam tubuh. Buah dan sayur adalah makanan yang dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber vitamin dan mineral yang berperan penting dalam pemenuhan nutrisi dalam tubuh, Untuk itu dianjurkan untuk memilih makanan yang mengandung nilai gizi yang baik agar bisa menunjang pertumbuhan hidup yang sehat, cerdas, kreatif dan produktif. Sebagaimana dengan Firman Allah swt. dalam QS Al-Maa'idah/5:88.

وَلِكُلِّ وَاٰمِرًا مِّنْ رِّزْقِكُمْ اَلَّذِيْ حَلَلَّ طَوَّابًا لِّقَوْمٍ اَتَتْ اَنْ لَّمْ يَمُوتْ مِّنْ وَّجْهٍ ۙ

Terjemahnya:

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah direzekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”* (Kementerian Agama RI, 2018).

Ayat ini berkaitan dengan adanya seorang sahabat Nabi yang melakukan zuhud sehingga mereka mengharamkan barang yang halal seperti tidak makan daging. Menjauhi istrinya, dengan peristiwa itu maka ayat ini turun dan ditujukan kepada orang-orang mu'min. Untuk menuju kehidupan dunia mereka harus memakan semua makanan dengan cara yang halal dan juga baik. Sehingga dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Jadi halal di sini berarti suatu yang diperbolehkan agama, sedangkan tayyiban berarti suatu kekuatan yang bisa untuk jalan ke dunia dan akhirat (Hamka, 1999).

Berdasarkan tafsir Al-misbah ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan mengharamkan apa yang halal. Ditegaskan bahwa adanya perintah memakan yang halal dan dengan demikian, melalui ayat ini yang menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala sesuatu yang halal. "Dan makanlah makanan yang halal", maksudnya adalah bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa "yang Allah telah rezekikan kepada kamu dan bertakwalah kepada Allah" maksudnya adalah dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadap-Nya adalah mu'minin yaitu orang-orang yang mantap keimanannya.

Makhluk Allah swt. yaitu manusia adalah ciptaan-Nya yang paling mulia dibandingkan dengan ciptaan-Nya yang lain. Islam selalu memberi peringatan kepada umatnya bahwa dia hanya salah satu ciptaan Allah swt. yang dibekali akal dan pikiran. Sehingga pikiran tersebut digunakan untuk mengolah apa saja dengan cara pengolahan yang baik dan tidak membahayakan orang lain, karena orang yang

melakukan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain adalah tersebut sifat syetan. Sebagaimana tercantum dalam QS Al-An'am/6:142.

وَمِنْ أُمَّةٍ نَّعَّمْنَا بِهَا وَلَئِنْ لَمْ يَرْكُوبُوا مَا يُؤْتِي اللَّهُ مِنَ الْبَرَكَاتِ لَقَدْ أَبْرَحُوا لِآيَاتِنَا أَنفُسَهُمْ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۚ وَهُمْ لَكَ لِلْحُكْمِ مُخْلِطُونَ ۚ وَإِنَّ لَكُم لَعَذَابًا أَلِيمًا ۖ

إِنَّ هَٰذَا لَآيَةٌ لِّكُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّكُمْ ۚ وَإِنَّ لَكُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّكُمْ لَوْمَةً مَّكِينَةً ۚ

Terjemahnya :

“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (Kementerian Agama RI, 2018).

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa firman Allah swt. yang artinya Allah swt. telah menciptakan binatang ternak yang dapat dijadikan sebagai binatang tunggangan dan ada juga yang dapat disembelih. Menurut suatu pendapat, bahwa yang dimaksudkan dengan *hamullah* adalah unta yang digunakan untuk mengangkut, sedangkan *farasy* adalah binatang yang lebih kecil darinya. Allah swt. memerintahkan umatnya untuk memakan makanan dari rezeki yang baik yaitu buah-buahan, tanaman, dan binatang ternak. Semua itu telah diciptakan Allah swt. dan dijadikan sebagai rizki bagi kalian semua. Allah swt. juga memerintahkan umatnya untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yaitu jalan dan perintahnya, seperti yang telah diikuti oleh orang-orang musyrik yang telah mengharamkan buah-buahan dan tanaman yang diberikan Allah swt. kepada mereka dengan semata-mata mengada-ada terhadap Allah swt. sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi manusia (Abdurrahim dkk., 2004).

*Al-Quran* telah banyak membahas tentang tumbuhan yang memiliki manfaat untuk manusia termasuk daun kelor (*Moringa oleifera*) yang dapat dibuat

menjadi tepung dan sebagai bahan tambahan ke dalam olahan makanan salah

satunya adalah olahan bakso ayam karena dilihat dari kandungan nutrisi daun kelor yang cukup tinggi yang dibutuhkan oleh umat manusia. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang tumbuhan Allah swt. berfirman dalam QS Thaha/20:53.

وَمَا جَعَلْنَا لِرِجَالِكُمُ الْمَشْيَ وَالْحُمْلَى قَلْبًا مِّنْ دُونِهَا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ وَيُخَلِّصَ إِلَيْكُم مِّنْهَا مَطَّاعِينَ

Terjemahnya:

*“(Tuhan) yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam”* (Kementerian Agama RI, 2018).

Pada tafsir Al-Misbah telah dijelaskan bahwa “Allah menurunkan air dari langit, maka kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” merupakan bagian dari hidayah Allah swt. kepada manusia dan hewan guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan bagi kelanjutan hidupnya. Sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Allah swt. memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan agar turun tercurah dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang. Juga dalam firman-Nya “Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan” yang mengisyaratkan bahwa pertumbuhan aneka tumbuhan dengan bermacam-macam jenis bentuk dan rasanya itu merupakan hal-hal yang sungguh menakjubkan lagi membuktikan betapa agung pentiptaan-Nya.

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Dia (yang telah menjadikan bagi kalian) diantara sekian banyak makhluk Allah (bumi sebagai hamparan) mempermudah (bagi kalian di bumi itu jalan) tempat-tempat untuk berjalan (dan

Dia menurunkan dari langit air hujan) yakni merupakan hujan. Allah berfirman menggambarkan apa yang telah disebutkan-Nya itu sebagai nikmat-Nya, kepada nabi Musa dan dianggap sebagai khitab untuk penduduk Mekah. (Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis) bermacam-macam (tumbuhan yang beraneka ragam). Lafal Syatta ini menjadi kata sifat dari lafal Azwaajan, Maksudnya yang berbeda warna dan rasa serta lainnya. Lafal Syatta ini adalah bentuk jamak dari lafal Syatitun, wazannya sama dengan lafal Mardha sebagai jamak dari lafal Mariidhun. Ia berasal dari kata kerja Syatta artinya Tafarraqa atau berbeda-beda.

### **B. Daging Ayam**

Ayam dipelihara terutama untuk digunakan daging dan telurnya dan merupakan sumber protein hewani. Konsumsi daging ayam mencapai hingga 30% dari konsumsi daging dunia. Konsumsi rata-rata per kapita daging ayam di dunia telah meningkat hingga empat kali lipat dari tahun 1960-an (11 kg pada 2003 dibandingkan dengan 3 kg pada tahun 1963) (FAO, 2010).

Daging ayam merupakan bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat karena memiliki kandungan gizi yang tinggi. Namun dapat mengalami kerusakan yang ditandai dengan adanya perubahan fisik serta perubahan kimia pada daging. Untuk memperlambat pertumbuhan mikroba, maka perlu dilakukan pengawetan dan penyimpanan yang baik pada daging segar maupun daging hasil olahan (Millan dan Sirante, 2020).

Basri (2017), menyatakan broiler populer di Indonesia pada tahun 1980-an, dimana penguasa berencana untuk mengelakkan konsumsi daging ruminansia yang

pada saat itu semakin sulit keberadaanya. Hingga saat ini, ayam broiler telah dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai keunggulannya. Broiler dapat dipanen pada umur 5-6 minggu karena waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, oleh karena itu banyak orang yang menjadikan beternak broiler sebagai pekerjaan sampingan.

Tidak hanya waktu panen yang singkat, daging broiler merupakan makanan yang kaya akan protein, mineral, vitamin, lemak serta zat yang lain yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dari waktu ke waktu konsumsi masyarakat terhadap daging ayam terkhususnya broiler terus mengalami peningkatan. Dilihat dari data statistik dari tahun 2012-2014 rata-rata konsumsi daging ayam broiler di Indonesia per kapita per minggu sebesar 0.078 Kg (BPS, 2014).

Broiler merupakan sumber utama daging bergizi dan merupakan sumber protein hewani utama ternak dan produk unggulan. Broiler adalah salah satu jenis ayam yang memiliki kemampuan tumbuh cepat dan menghasilkan daging dalam waktu yang relatif singkat yaitu 4 sampai 7 minggu. Upaya peningkatan kualitas daging adalah salah satu penentu nilai bahan pangan akibat meningkatnya konsumsi daging ayam, khususnya daging broiler yang saat ini menjadi primadona di Indonesia dan preferensi konsumen (Hafid dkk., 2017).

Daging broiler digemari banyak orang karena teksturnya yang elastis, ini berarti bahwa jika ditekan menggunakan jari, daging dengan cepat kembali seperti semula. Jika ditekan daging tidak terlalu lembek dan tidak berair. Daging segar memiliki warna agak kuning, tidak berbau amis, tidak berlendir/kental dan tidak menimbulkan bau busuk (Singgih, 2018).

Daging broiler adalah bahan pangan yang hampir disukai oleh semua orang karena harganya yang relatif murah dan mempunyai kandungan nutrisi tinggi dengan aroma dan rasa yang enak, serta tekstur dagingnya lunak. Komposisi kimia daging ayam terdiri dari air 65,95%, protein 18,6%, lemak 15,06%, dan abu 0,79% (Stadelman *et al.*, 2021). Soeparno (2009), berpendapat bahwa komposisi kimia daging secara umum terdiri dari air sekitar 75%, protein 19%, lemak 2,5%, karbohidrat 1,2%.

Table 1. Komposisi Nutrisi Daging Broiler dalam 100 gram

Kandungan	Jumlah
Protein (g)	22,00
Lemak (g)	60,00
Kalori (kkal)	404,00
Kalsium (g)	13,00
Fosfor (mg)	190,00
Vitamin A (mg)	243,00
Vitamin B1 (g)	0,80
Vitamin B6 (g)	0,16

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2014.

Daging ayam juga termasuk sumber protein yang baik, karena memiliki kandungan asam amino esensial yang lengkap dan dibutuhkan oleh tubuh dalam perbandingan jumlah yang baik sehingga baik untuk dikonsumsi (Winedar dkk., 2015). Menurut Jaya (2011), menyatakan bahwa asam amino yang membentuk rantai panjang ini disebut protein (polipeptida). Asam amino dibedakan menjadi tiga golongan yaitu asam amino esensial, semi esensial, dan non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang diperoleh dari luar tubuh karena sel-sel tubuh tidak dapat mensintesisnya. Asam amino semi esensial adalah asam amino

yang dapat menghemat pemakaian asam amino lainnya. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh manusia dengan bahan baku asam amino lainnya. Kandungan asam amino daging ayam dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2. Kandungan Asam Amino Daging Ayam

<b>Asam Amino</b>	<b>Kandungan (%)</b>
Arginin	1,47
Sistin	0,40
Histidin	0,44
Isoleusin	0,90
Leusin	1,45
Lisin	1,65
Metionin	0,40
Fenilalain	0,88
Threonin	0,88
Triptopan	0,18
Valin	1,47

Sumber: Fadilah dkk., 2007

Daging broiler banyak mengandung nutrisi seperti protein, lemak, mineral, karbohidrat dan vitamin. Kandungan nutrisi yang tinggi pada daging broiler sangat baik untuk perkembangan mikroorganisme yang menyebabkan kebusukan dan kerusakan (Widiyartono dkk., 2016). Untuk itu perlu dilakukan pengolahan daging yang dapat meningkatkan masa simpan tanpa mengurangi kandungan nutrisi yang terkandung dalam daging.

Saat ini masyarakat Indonesia lebih mengenal daging broiler sebagai daging ayam potong yang biasa dikonsumsi karena nilai gizinya yang tinggi atau kandungannya yang memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Broiler mudah didapat,

dagingnya tebal dan teksturnya halus, lebih halus dari ayam kampung dan harganya terjangkau. Namun selain kelebihan, daging broiler juga memiliki kekurangan. Nilai kandungan gizi daging broiler yang cukup tinggi menjadikannya sebagai tempat perkembangbiakan mikroorganisme pembusuk, sehingga kualitas daging akan mengalami penurunan dan daging menjadi mudah rusak (Singgih, 2018).

Daging ayam merupakan salah satu pangan berprotein tinggi dan dapat diolah menjadi bakso karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, kurang menimbulkan alergi, aroma tidak tajam, dapat diproduksi dalam waktu yang lebih singkat dan harganya lebih murah bila dibandingkan dengan daging sapi. Total konsumsi daging unggas mencapai 65,5% dari total produksi daging nasional sebesar 2,07 juta ton (Tani, 2010). Setiap 100 gram daging ayam tanpa kulit mengandung 74,9 gram air, 23,2 gram protein, 1,6 gram lemak, 0,98 gram mineral dan 0,07 gram zat besi serta rendah lemak dan asam lemak tidak jenuh dan protein lebih tinggi dari daging sapi, kambing dan babi, oleh karena itu, berpotensi sebagai sumber nutrisi potensial yang ideal untuk anak kecil, orang paruh baya dan orang lanjut usia, penderita penyakit pembuluh darah jantung dan orang yang lemah pasca sakit (Widati dkk., 2012).

Bahan pangan yang populer di masyarakat yang bisa diolah menjadi berbagai jenis produk yang menarik dan dapat memperpanjang masa simpan dan meningkatkan minat masyarakat untuk mengonsumsi daging broiler, adalah diolah menjadi bakso. Bakso adalah produk olahan daging yang dibuat dengan campuran pati dan bumbu tambahan yang dibentuk bulat dan dimasak hingga matang (BSN, 2014).

### C. Bakso

Bakso merupakan makanan yang bahan utamanya daging, baik daging sapi, ikan, udang, dan ayam. Umumnya berbentuk bulat menyerupai bola kecil sehingga orang barat menyebutnya *meatball*. Tekstur bakso yang kenyal dan memiliki cita rasa yang khas membuat bakso disukai oleh masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa (Sutomo, 2013). Bakso menjadi makanan favorit di kalangan masyarakat karena cita rasa yang enak, harga yang relatif terjangkau dan mengandung nilai gizi yang baik. Jenis bakso yang sering dikonsumsi masyarakat yaitu bakso daging sapi, ayam, udang ataupun ikan (Zulkarnain dkk., 2013).

Olahan makanan yang biasanya terbuat dari daging sapi giling, ayam atau ikan yang kemudian dicampur dengan bumbu untuk meningkatkan cita rasanya adalah Bakso. Tepung tapioka juga ditambahkan sebagai bahan pengisi, lalu bola-bola yang sudah dibentuk dimasukkan kedalam air mendidih. Bakso dicirikan tidak hanya oleh kandungan proteinnya yang tinggi, tetapi juga oleh rasanya yang khas dan enak (Manurung dkk., 2017).

Bakso adalah produk gel dari protein daging, daging sapi, daging ayam, maupun daging ikan. Bakso dibuat dari bahan daging giling, tepung, garam, merica, bawang putih dan es batu dengan bentuk tertentu. Setelah dimasak bakso memiliki tekstur yang kenyal sebagai ciri spesifiknya. Mutu bakso sangat bervariasi, karena perbedaan bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, proporsi daging dengan tepung dan proses pembuatan (Widya dan Murtini, 2017).

Salah satu produk olahan daging yang cukup dikenal dan digemari oleh semua lapisan masyarakat dan dapat dikatakan sebagai sumber pangan yang cukup bergizi (Widati dkk., 2012). Olahan bakso umumnya menggunakan daging mentah dan tepung sebagai bahan bakunya. Daging yang paling banyak digunakan adalah daging sapi, ayam dan ikan, sedangkan tepung yang biasanya dipakai yaitu tepung tapioka (Kusnadi dkk., 2012).

Mutu bakso dipengaruhi oleh komposisi bahan penyusunnya yang tepat dan daging yang digunakan harus baik, segar dan pembuatan bakso sebaiknya dilakukan secara higienis (Wibowo, 2017) Bahan baku juga akan mempengaruhi mutu bakso yang dihasilkan. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi kualitas bakso diantaranya adalah bahan-bahan tambahan yang digunakan serta cara memasaknya (Daniati, 2011).

Table 3. Komposisi Kimia Bakso

<b>Komposisi Kimia</b>	<b>Jumlah (%)</b>
Kadar Air	70
Lemak Maksimum	10
Protein Maksimum	11
Kadar Abu Maksimum	3

Sumber: Standar Nasional Indonesia-SNI 01-3818, 2014.

Menurut Standar Nasional Indonesia (1995), bakso daging adalah produk makanan yang berbentuk bulat atau lainnya yang diperoleh dari campuran daging ternak (kadar daging tidak kurang dari 50%) dan pati (sereal) dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain, serta bahan makanan yang diijinkan. Kualitas bakso ditentukan oleh banyak sedikitnya campuran tepung yang ditambahkan, semakin banyak tepung yang digunakan kualitas bakso semakin rendah.

Table 4. Syarat Mutu Bakso Daging Berdasarkan SNI-3818-2014

No	Kriteria Gizi	Satuan	Persyaratan
1	Keadaan bau		
	Bau	-	Normal khas
	Rasa	-	Gurih
	Warna	-	Normal
	Tekstur	-	Kenyal
2	Air	%b/b	Maks 70,0
3	Abu	%b/b	Maks 3,0
4	Protein	%b/b	Maks 9,0
5	Lemak	%b/b	Maks 2,0
6	Boraks	-	Tidak boleh ada
7	Bahan tambahan makanan	Sesuai dengan	SNI-01-02-1995
8	Cemaran Logam		
	Timbale (Pb)	Mg/kg	Maks 2,0
	Tembaga (Cu)	Mg/kg	Maks 2,0
	Seng (Zn)	Mg/kg	Maks 40,0
	Timah (Sn)	Mg/kg	Maks 40,0
	Raksa (Hg)	Mg/kg	Maks 0,03
9	Cemaran arsen	Mg/kg	Maks 1,0
10	Cemaran mikroba		
	Angka lempeng total	Koloni/g	Maks $1 \times 10^5$
	Bakteri <i>coli from</i>	AMP/g	Maks 10
	<i>Escherichia coli</i>	AMP/g	< 3
	<i>Enterococci</i>	Koloni/g	Maks $1 \times 10^3$
	<i>Clostridium perfringens</i>	Koloni/g	Maks $1 \times 10^2$
	<i>Salmonella</i>		Negatif
11	<i>Staphylococcus aureus</i>	Koloni/g	Maks $1 \times 10^2$

Sumber: Badan Standar Nasional, 2014.

Bakso ayam merupakan bakso yang biasanya dibuat dari daging ayam dengan tambahan bumbu seperti bakso pada umumnya. Membuat bakso menggunakan daging ayam diharapkan memiliki tekstur yang empuk dibanding dengan bakso lain karena serat-serat daging ayam yang lebih kecil. Proses pembuatan bakso dilengkapi dengan bahan pengisi yang banyak mengandung amilosa dalam pati untuk menentukan kualitas bakso. Konsumen umumnya lebih menyukai bakso yang padat, elastis, dan kenyal, tidak terlalu keras atau lunak. Rasa

merupakan kriteria penting dalam menilai suatu produk pangan yang banyak melibatkan indera pengecap yaitu lidah (Daroni dan Eka, 2016).

Pembuatan bakso terdiri dari empat langkah yaitu, penlumatan daging, pembuatan adonan, pembentukan bola bakso, pemasakan dan pengemasan. Pelumatan atau penggilingan dapat dilakukan secara manual atau elektrik. Semakin tinggi kecepatan mesin giling, maka adona yang terbentuk semakin baik. Menambahkan es batu dapat menambah air dan meningkatkan rendemennya. Batu es dapat digunakan sebanyak 10-15% dari berat daging atau 30% berat daging (Wibowo, 1995).

Prosedur pembuatan bakso daging adalah sebagai berikut: 1) pelumatan daging, 2) pembuatan adonan, 3) pembuatan bola bakso dan 4) perebusan. Pelumatan atau penggilingan dapat menggunakan alat tangan atau dengan mesin seperti *meat stirrer*, *mixer* atau *silent cutter*. Untuk mencegah denaturasi protein selama penggilingan, es batu ditambahkan untuk menjaga suhu daging tetap rendah dan membantu membentuk tekstur bakso dan menambah air ke dalam adonan agar tidak kering selama proses pengolahan. Daging giling dicampur dengan tepung sagu dan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan. Pencampuran dilakukan hingga homogen agar kualitas bakso tetap terjaga. Pencetakan bola bakso dapat dilakukan dengan tangan atau mesin. Bakso yang sudah dibentuk direbus dalam air mendidih sampai matang yang ditandai dengan bakso mengapung di atas permukaan air selama 15 menit. Bakso diangkat, ditiriskan dan didinginkan (Syamsul, 2017).

#### **D. Tepung Daun Kelor**

Salah satu tanaman di Indonesia yang diduga memiliki kandungan antioksidan adalah kelor (*Moringa oleifera*). Tanaman kelor telah dikenal selama berabad-abad sebagai tanaman multiguna padat nutrisi dan berkhasiat. Kelor dikenal sebagai The Miracle Tree atau pohon ajaib karena terbukti secara alamiah merupakan sumber gizi berkhasiat yang kandungannya melebihi kandungan tanaman pada umumnya (Toripah *et al.*, 2014).

Kelor merupakan tanaman tropis yang mudah tumbuh di Indonesia dan berbagai daerah tropis di dunia. Pohon kelor memiliki ketinggian 7-11 meter. Tumbuhan ini merupakan pohon yang berakar kuat, batang tegak, mudah rapuh, berwarna putih keabu-abuan, permukaan kasar, kulitnya tipis dan cabang sedikit. Kelor memiliki bunga yang berwarna putih kekuning-kuningan yang keluar sepanjang tahun dan memiliki aroma harum yang khas. Buah kelor berbentuk segitiga dan panjang yang berukuran sekitar 20-60 cm, ketika masih muda berwarna hijau dan coklat ketika tua (Kustiani, 2013).

Daun kelor sangat kaya akan nutrisi diantaranya kalsium, protein, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. selain itu daun kelor juga mengandung berbagai macam asam amino antara lain asam aspartat, asam glutamat, alanine, valin, isoleusin, leusin, lisin, histidine, lisin, venilalanin, triftopan, arginine, methionine dan sistein. Daun kelor juga mengandung antioksidan dan antimikroba tinggi yang disebabkan adanya kandungan asam askorbat, flavonoid, phenolic, dan karatenoid (Aminah dkk., 2015).

Menurut Krisnadi (2015), bahwa klasifikasi ilmiah dari tanaman kelor (*Moringa oleifera*) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae  
Sub Kingdom : Tracheobionta  
Super Divisi : Spermatophyta  
Divisi : Magnoliophyta  
Kelas : Dicotyledoneae  
Ordo : Capparales  
Familia : Moringaceae  
Genus : Moringa  
Spesies : *Moringa oleifera*

Pohon kelor memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia (Handayani, 2013). Pohon kelor merupakan makanan yang bergizi dan dapat digunakan untuk keperluan pengobatan dan industri, dan hampir setiap bagian dari pohon kelor memiliki nilai gizi dan khasiat. Salah satu diantara bagian tersebut adalah daun kelor yang dapat dimanfaatkan sebagai sayuran, direbus, digoreng dan dihaluskan menjadi tepung (Kustiani, 2013). Di Indonesia kelor hanya digunakan sebagai menu sayuran padahal selain dikonsumsi dalam bentuk segar, kelor dapat digunakan dalam bentuk bubuk atau tepung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan fortifikasi untuk mensuplai nutrisi pada berbagai produk pangan seperti nugget, cake, pudding, brownies, bakso dan olahan lainnya.

Daun kelor dapat dijadikan sebagai tepung daun kelor yang bertujuan untuk memberikan daya simpan yang lebih lama dan juga memudahkan untuk menambahkan ke berbagai macam produk pangan (Kustiani dkk., 2017). Sehingga tepung daun kelor dapat digunakan sebagai fortifikan untuk menambah kandungan nutrisi dari bahan pangan (Aminah dkk., 2015). Kandungan nutrisi tepung daun kelor dapat dilihat pada Tabel berikut:

Table 5. Kandungan Nutrisi Daun Kelor

Zat Gizi	Kandungan
Kalori	92
Protein (g)	6,7
Lemak (g)	1,7
Phosphor (mg)	70
Serat (g)	0,9
Karbohidrat (g)	12,5
Kalsium (mg)	440
Vitamin B1 (mg)	0,06
Vitamin B2 (mg)	0,05
Vitamin B3 (mg)	0,8
Vitamin C (mg)	220
Vitamin E (mg)	448

Sumber: Gopalakrishan *et al.*, 2016.

Krisnadi (2015), menyatakan bahwa daun kelor merupakan sumber yang kaya  $\beta$ -karoten, protein, vitamin C, kalsium, kalium, dan serta merupakan sumber antioksidan yang baik karena berbagai jenis senyawa antioksidan terdapat pada daun kelor. Di sisi lain, Einsenbrand (2005), mengemukakan bahwa tepung daun kelor masih memiliki kandungan protein sebanyak 26,67% dalam 100% bahan kering sehingga dapat menjadi bahan pangan sumber protein. Penelitian lain yang

dilakukan oleh Dewi dkk., (2014), menemukan bahwa jumlah protein yang terkandung di dalam daun kelor mencapai 27%.

Tanaman menghasilkan senyawa sekunder yang juga dikenal sebagai metabolit sekunder tanaman yang digunakan untuk perlindungan ekologis dari serangga, mikroorganisme, predator, dan bahkan spesies tanaman lainnya (Hifizah, 2020). Daun kelor mengandung senyawa sekunder antara lain saponin, tannin, dan asam fitat. Saponin memiliki karakteristik berupa buih dan sangat mudah larut dalam air. Saponin mengandung triterpenoid atau steroid aglycone dan satu atau lebih rantai gula dan memiliki rasa yang pahit. Rasa pahit ini dapat dikurangi melalui proses pencucian atau pengeringan daun dengan sinar matahari (Hifizah dkk., 2021).

Daun kelor dapat dijadikan serbuk atau tepung agar lebih awet dan mudah disimpan. Tepung daun kelor dapat ditambahkan sebagai campuran makanan karena merupakan suplemen makanan bergizi atau bisa dikatakan karena tepung daun kelor memiliki nilai gizi yang baik (Kusniati, 2013).

Menurut Zakaria dkk., (2012), menyatakan cara membuat tepung daun kelor yaitu dengan menggunakan daun kelor yang muda yang diambil dari pohonnya yang kurang lebih yang dibawah pucuk sampai dengan tangkai ke tujuh yang masih hijau walaupun daun tua dapat digunakan yang petik belum daun tersebut belum menguning. Selanjutnya daun kelor dirunut dari tangkai daunnya, kemudian ditebar di atas rak jemuran oven atau di atas kawat dan diatur ketebalannya sedemikian rupa, lalu dikeringkan menggunakan oven dengan suhu kurang lebih 45°C selama kurang lebih 24 jam atau sampai daun kelor sudah cukup kering. Daun kelor yang

sudah kering dihaluskan menggunakan blender dan diayak menggunakan ayakan untuk memisahkan batang-batang kecil yang tidak bisa hancur dengan blender dan selanjutnya disimpan dalam wadah plastik yang kedap udara.

Table 6. Kandungan Nutrisi Tepung Daun Kelor

<b>Komponen</b>	<b>Kandungan (%)</b>
Kadar air (%)	7,5
Protein (g)	27,1
Lemak (g)	2,3
Karbohidrat (g)	38,2
Serat (g)	19,2
Kalori (kcal/100g)	205
Kalsium (mg)	2003
Kalium (mg)	1324
Vitamin C (Ascorbid acid) (mg)	17,3
Vitamin A (B Caratene) (mg)	16,3
Vitamin B1 (Thiamin) (mg)	2,64
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg)	20,5
Vitamin E (Tocopherol) (mg)	113

Sumber: Aminah dkk., 2015.

Daun kelor dalam bentuk tepung mengandung beberapa zat hipotensif, antikanker, dan antibacterial antara lain, niazimicin, pterygospermin. Selain itu daun kelor mengandung zat antioksidan antara lain sitosterol dan *Glucopyranoside*. Daun kelor juga merupakan sebagai suplemen nutrisi yang dianggap sebagai suplemen protein dan kalsium. Berbagai penelitian menemukan bahwa pada daun kelor terdapat komposisi vitamin A, B, C, dan kalsium, zat besi dan protein yang tinggi (Sarjono, 2016).

Daun kelor dalam bentuk kering mengandung antinutrisi yaitu tannin 0,3%, saponin 6,4%, asam fitat 2,3%, dan total phenol 2,7% dan akan berkurang jika telah diekstrak menjadi tepung (Astuti dkk., 2018). Zat antinutrisi yang terkandung dalam daun kelor adalah senyawa yang sangat kompleks sehingga sulit untuk dicerna (Richter *et al.*, 2021).

Tepung kelor kaya akan protein, mineral dan vitamin. Kelebihan dari penambahan tepung kelor ini bisa meningkatkan kualitas dari bakso (Aminah dkk., 2015). Karena kelor memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kekenyalan pada bakso.

Tepung daun kelor memiliki kadar air sekitar 7,5%. Tepung daun kelor memiliki kemampuan mengikat air yang dipengaruhi oleh kandungan polisakarida dalam dinding sel tanaman, ikatan intermolekul polisakarida, lignifikasi dinding sel, dan bentuk fisik dari tanaman. Semakin kecil ukuran partikel tanaman maka kemampuan mengikat airnya akan menurun. Daun tanaman yang mengalami proses pengeringan dan penggilingan tidak memiliki kemampuan mengikat air yang cukup tinggi seperti daun-daunan segar (Serena dan Bach, 2018).

#### **E. Penilaian Kualitas Fisik**

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3818-1995) yang berhubungan dengan syarat mutu kandungan gizi bakso terdiri dari kadar air tidak boleh lebih dari 70%. Tekstur bakso ditentukan oleh kadar air, kadar lemak dan jenis karbohidrat. Kandungan air yang tinggi akan menghasilkan bakso dengan tekstur yang lembek, begitu juga dengan kadar lemak yang tinggi akan menghasilkan bakso dengan tekstur yang berlubang (Octaviani, 2002). Kualitas

bakso dapat dilihat dari karakteristik fisik seperti pengukuran ph, daya ikat air, susuk masak dan kekenyalan bakso.

#### 1. Daya Ikat Air (DIA)

Daya ikat air adalah kemampuan daging untuk menahan air yang terdapat dalam jaringan. Semakin tinggi persentase daging pada bakso maka semakin tinggi pula daya ikat air yang dihasilkan. Faktor yang menyebabkan tingginya nilai WHC adalah kandungan air, protein dan kandungan garam. Daya ikat air diukur menggunakan metode Hamm yaitu dengan menimbang sampel sebanyak 0,3 g sampel ditekan selama 5 menit menggunakan beban 35 kg, selanjutnya daerah yang tertutup sampel bakso dan luas daerah basah disekitarnya ditandai dan diukur dengan planimeter untuk memperoleh nilai mgH<sub>2</sub>O. Nilai mgH<sub>2</sub>O digunakan untuk menghitung kadar air bebas, dan nilai daya ikat air diperoleh dari selisih antara kadar air total dan kadar air bebas (Kartikasari, 2020).

Daya ikat air (DIA) daging adalah kemampuan daging untuk mengikat air selama ada pengaruh dari luar misalnya pemotongan daging, penggilingan dan tekanan. Pembentukan gel dengan DIA yang tinggi dipengaruhi oleh konsentrasi kation. Kation berfungsi sebagai aktivator proses pembentukan gel. Daging dengan daya ikat air rendah akan kehilangan banyak cairan, sehingga terjadi kehilangan berat. Semakin kecil nilai daya ikat air, maka susut masak daging semakin besar, sehingga kualitas daging semakin rendah karena banyak komponen-komponen terdegradasi (Soeparno, 2009).

Lama pemasakan dapat mempengaruhi kandungan nutrisi daging. Penurunan daya ikat air disebabkan oleh terjadinya proses denaturasi dan depolimerisasi serta peningkatan solubilitas protein karena tekanan dan lama perebusan menyebabkan terjadinya kerusakan dan perubahan struktur protein otot terutama pada aktin dan miosin. Kerusakan aktin dan miosin menyebabkan penurunan kemampuan protein otot untuk mengikat air (Domiszewski *et al.*, 2011).

Daya ikat air dipengaruhi oleh kadar protein, salah satu fungsi protein adalah mengikat air. Jika protein mengalami denaturasi akibat pemanasan atau perebusan maka kekuatan untuk mengikat air rendah sehingga nilai daya ikat air menurun (Soeparno, 2005). Menurut Wahab dkk., (2013), menyatakan tidak adanya penambahan ion kalium mengakibatkan fraksi protein tidak dapat ditarik untuk menangkap molekul air pada saat perebusan, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan nilai DIA yang dihasilkan cukup bervariasi di antara perlakuan. Penurunan DIA oleh protein daging dapat disebabkan oleh penurunan pH dan denaturasi protein sarkoplasmik, atau ATP (Adenosin Trifosfat) menjadi habis.

Bunnet *et al* (2021), menyatakan bahwa kelor kaya akan senyawa yang mengandung gula sederhana ramnosa dan kelompok yang cukup unik dari senyawa yang disebut *Glucosinolates* dan *Isothiocylates*. Sedangkan menurut Ockreman (2009), menyatakan tepung berpati dapat mengikat air karena mempunyai kemampuan menahan air selama proses pengolahan dan pemanasan.

Kandungan karbohidrat dalam daun kelor segar sebesar 13,4% (Gopalan, 2010). Hal tersebut yang membuktikan bahwa kandungan pati dalam daun kelor cukup tinggi dan dapat meningkatkan daya ikat air sehingga bila pati dipanaskan

akan terjadi ketidakseimbangan secara cepat pada granula pati sampai memecah ikatan molekul dan sisi hidrogen akan mampu mengikat air dalam jumlah banyak (Prada dkk., 2021).

Tepung daun kelor memiliki kemampuan mengikat air yang dipengaruhi oleh kandungan polisakarida dalam dinding sel tanaman, ikatan intermolekul polisakarida, lignifikasi dinding sel, dan bentuk fisik dari tanaman. Semakin kecil ukuran partikel tanaman maka kemampuan mengikat airnya akan menurun (Serena dan Bach, 2018).

## 2. Daya Lenting

Pengukuran daya lenting sangat berpengaruh dengan kekenyalan bakso. Bakso yang memiliki kekenyalan yang tinggi akan memiliki kelentingan yang tinggi, sebaliknya bakso dengan kekenyalan rendah akan memiliki kelentingan yang rendah pula (Riskayanti, 2018).

Daya lenting merupakan salah satu teknik untuk melihat daya pantul bakso ketika dijatuhkan pada suatu permukaan rata dari suatu ketinggian. Untuk menguji kelentingan bakso terlebih dahulu dibuat dalam bentuk bulatan-bulatan seperti bakso. Pengukuran daya lenting dilakukan dengan cara menjatuhkan bakso pada ketinggian 50 cm sebanyak 5 buah dengan menggunakan gelas ukur kaca. Adapun pembagian skalanya yaitu nilai 2,00–3,35 (1/kurang), 3,36–4,50 (2/cukup), 4,51–5,75 (3/baik), 5,76–7,00 (4/terbaik). Pembagian skala bertujuan untuk menghilangkan bias antara jarak pantul dengan tinggi pantulan (Abustam, 2009).

Daya lenting merupakan salah satu teknik untuk melihat daya pantul bakso ketika dijatuhkan pada suatu permukaan rata dari suatu ketinggian. Semakin tinggi

daya pantul yang dihasilkan, maka kekenyalan bakso semakin baik (Syam dkk., 2019). Produk olahan bakso biasanya ditambahkan bahan pengisi seperti tepung yang digunakan untuk industri makanan sebagai pengikat air adonan bakso. Bahan pengisi merupakan material bukan daging yang ditambahkan ke dalam produk olahan daging. Bahan pengisi umumnya memiliki kandungan protein yang rendah dan karbohidrat yang tinggi, sehingga memiliki daya emulsi lemak dan daya pengikat air yang tinggi (Rosita dkk., 2015).

Rendahnya daya ikat air yang disebabkan oleh kandungan air banyak keluar selama pemasakan sehingga gel yang terbentuk kurang kuat dan bakso yang dihasilkan pun kurang kenyal (Komariah dkk., 2019). Menurut Sundari dkk., (2015), bahwa faktor lain yang mempengaruhi kekenyalan bakso yaitu penurunan kadar air akibat peningkatan suhu pada saat perebusan. Dimana kadar air tersebut akan menguap.

Penambahan pasta kelor menyebabkan berkurangnya kemampuan pati menyerap air sehingga mengurangi pembentukan gelatinisasi pati (Prada dkk., 2021). Menurut Hastuti dan Maflahah (2015), juga menyatakan bahwa penambahan daun kelor pada produk akan memiliki tekstur yang keras, semakin banyak penambahan tepung maka semakin banyak air yang akan bereaksi dengan tepung dan membentuk gel. Maka akan menghasilkan tekstur pada produk menjadi keras. Lee dan Lin (2008), juga menyatakan bahwa kandungan serat pangan yang tinggi juga dapat meningkatkan kekerasan.

### 3. Daya Putus Daging (DPD)

Daya putus daging (DPD) merupakan indikator penilaian keempukan dengan menggunakan *CD-Shear force*. Nilai DPD yang rendah mengindikasikan bahwa produk yang diukur memiliki keempukan yang tinggi. Menurut Wahab dkk., (2013), salah satu hal yang memungkinkan menjadi penyebab perlakuan tidak berpengaruh nyata adalah karena produk yang diukur adalah bakso. Produk bakso merupakan produk hasil olahan daging yang telah mengalami proses pendinginan, penggilingan dan pemasakan yang memungkinkan jaringan-jaringan ikat sudah banyak yang mengalami kerusakan. Salah satu komponen utama yang menentukan keempukan adalah jaringan ikat. faktor postmortem yang diantaranya meliputi proses metode chilling, refrigerasi, pelayuan dan pembekuan termasuk faktor lama dan temperatur penyimpanan dan metode pengolahan, termasuk metode pemasakan dan penambahan bahan empuk mempengaruhi keempukan produk.

Wibowo (1995), menyatakan bahwa tingkat keempukan dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu kandungan protein, kadar air, dan kadar lemak dari masing-masing bahan penyusun. Menurut Pandisurya (2012), bahwa keempukan bakso dipengaruhi oleh jumlah tepung yang ditambahkan kedalam adonan bakso. Peningkatan kadar air juga dapat menyebabkan bakso menjadi lembek. Soeparno (2005), juga menyatakan bahwa besar kecilnya daya ikat air dapat mempengaruhi warna (*Color*), tekstur (*Texture*), kekenyalan (*Firmness*), kesan jus (*Juiciness*), dan keempukan (*Tenderness*).

Tepung daun kelor mengandung enzim protease. Enzim protease berkaitan dengan keempukan dan merupakan biokatalisator yang dapat mempercepat terjadinya hidrolisis protein menjadi peptida sehingga menghasilkan daging yang lebih empuk (Murtini dkk., 2003). Menurut Komariah dkk., (2019), menyatakan bahwa kriteria-kriteria daya putus daging yaitu jika dibawah  $3,3 \text{ kg/cm}^2$  sangat empuk,  $3,3-5,0 \text{ kg/cm}^2$  empuk,  $5,0-6,7 \text{ kg/cm}^2$  agak empuk,  $6,7-8,42 \text{ kg/cm}^2$  agak alot, dan  $8,42-10,12$  alot dan diatas  $10,2$  sangat alot.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Riskayanti (2018), *Pengaruh penambahan tepung sukun (Artocarpus communis) terhadap kualitas bakso daging ayam*. Bertujuan untuk mengetahui kualitas bakso daging ayam ditinjau dari uji organoleptik persentase yang optimal dari penambahan tepung sukun pada pembuatan bakso daging ayam. Metode yang digunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Setiap ulangan menggunakan 5 biji bakso dengan Perlakuan (P0): 0% tepung sukun (*Artocarpus communis*), Perlakuan (P1): 25% tepung sukun (*Artocarpus communis*), Perlakuan (P2): 50% tepung sukun (*Artocarpus communis*), Perlakuan (P3): 75% tepung sukun (*Artocarpus communis*). Hasil penelitian yang didapat yaitu terdapat pengaruh penambahan tepung sukun (*Artocarpus cummonis*) dengan level yang berbeda terhadap kualitas bakso organoleptik (aroma, rasa, tekstur dan warna) bakso daging ayam.

Srinovitasari (2018), *Penambahan Rumput Laut Merah (Euchema cottonii) Sebagai Pengenyal Alami Bakso Daging Broiler*. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan rumput laut (*Euchema Cottonii*)

yang dapat dijadikan sebagai bahan pengenyal bakso ayam dan formulasi yang tepat yang dapat digunakan sebagai bahan pengenyal bakso ayam. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 kali ulangan. Setiap perlakuan yakni P0: 0% rumput laut *Eucheuma Cottonii*, P1: 25% rumput laut *Eucheuma Cottonii*, P2: 50% rumput laut *Eucheuma Cottonii*, P3: 75% rumput laut *Eucheuma Cottonii* dan P4: 100% rumput laut *Eucheuma Cottonii*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan rumput laut *Eucheuma Cottonii* terdapat pengaruh terhadap kekenyalan bakso ayam. Kemudian formulasi penambahan rumput laut *Eucheuma Cottonii* yang tepat digunakan sebagai pengenyal bakso ayam adalah 50% berat daging ayam dengan menggunakan formula standar pembuatan bakso.

Cahyaningati dan Sulistiyati (2020), *Pengaruh Penambahan Tepung Daun Kelor (Moringa Oleifera Lamk) Terhadap Kadar B-Karoten Dan Organoleptik Bakso Ikan Patin (Pangasius Pangasius)*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari penambahan tepung daun kelor terhadap kadar  $\beta$ -karoten, organoleptik pada bakso ikan patin. Metode yang digunakan adalah metode RAL (Rancangan Acak Lengkap) sederhana dengan 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu P0: 0% tepung daun kelor, P1: 2,5% tepung daun kelor, P2: 5% tepung daun kelor, P3: 7.5% tepung daun kelor. Hasil penelitian menunjukkan penambahan tepung daun kelor pada bakso ikan patin terdapat pengaruh pada kadar  $\beta$ -karoten dan organoleptik (kenampakan, tekstur, aroma dan rasa).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2021 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### **B. Materi Penelitian**

##### 1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah ayakan, baskom, *blender*, buku catatan, cawan petri, *CD Shear force*, cutter, *filter paper press*, *food processing machine*, *grinder* (mesin penggiling daging), gelas ukur, gunting, kertas grafik, kertas saring, kompor gas, label, mistar 50 cm, panci, piring, *plastik glove*, plastik klip, pulpen, saringan, sendok, talang, talenan, timbangan analitik dan tisu.

##### 2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah daging ayam giling 1000 g, tepung daun kelor (*Moringa oleifera*), tepung tapioka, bawang goreng, bawang putih secukupnya, merica bubuk, garam, gula, es batu, dan penyedap rasa. Komposisi bahan pengisi, bumbu dan es batu dapat dilihat pada Tabel 7.

Table 7. Komposisi Bahan Pembuatan Bakso dengan Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera*)

Bahan Penelitian	Komposisi (gram)	Rasio (%)
Daging Ayam	1000	100
Tepung Daun Kelor	25; 30; 35	2,5; 3; 3,5
Tepung Tapioka	250	25
Bawang Putih	25	2,5
Merica	8	0,8
Masako	10	1
Garam	20	2
Es Batu	150	15
Telur	10	1

Sumber: Data Primer, 2021

### C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yaitu metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

### D. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

P<sub>0</sub>: Adonan bakso daging broiler (Kontrol)

P<sub>1</sub>: Adonan bakso daging broiler + 2,5% tepung daun kelor (*Moringa oleifera*)

P<sub>2</sub>: Adonan bakso daging broiler + 3% tepung daun kelor (*Moringa oleifera*)

P<sub>3</sub>: Adonan bakso daging broiler + 3,5% tepung daun kelor (*Moringa oleifera*)

## E. Prosedur Penelitian

### 1. Tahap Persiapan

Sebelum penelitian ini dilakukan alat dan bahan dipersiapkan terlebih dahulu. Daging broiler yang digunakan sebanyak 1000 gram yang dipisahkan dari tulang dan lemaknya yang kemudian dipotong kecil-kecil bertujuan untuk memudahkan pada saat proses penggilingan menggunakan mesin penggiling sampai halus. Tepung daun kelor dan tepung tapioka ditimbang sesuai dengan persentase yang telah ditentukan dan dipisahkan berdasarkan perlakuan yang akan dilakukan, es batu, telur masing-masing 1 butir, selain itu bahan tambahan untuk memperkaya rasa pada bakso juga disediakan seperti bawang putih, bawang merah, merica, garam.

### 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pembuatan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera*): Daun kelor dipetik dari tangkai yang muda yaitu mulai dari tangkai daun pertama (di bawah pucuk) sampai tangkai keenam yang masih hijau dan segar. Daun yang sudah dipetik dipisahkan antara daun dan tangkainya dan dicuci, kemudian daun kelor di tebar diatas ayakan secara merata kemudian dijemur di tempat yang teduh atau tidak terkena cahaya matahari langsung selama kurang lebih 3 hari, daun kelor yang kering dihancurkan menggunakan blender dan disaring menggunakan saringan kemudian hasil saringan disimpan dalam plastik.
- b. Pembuatan bakso: Daging broiler yang telah digiling, dimasukkan kedalam *Food processing machine* untuk mencampurkan tepung tapioka, bumbu, telur dan es batu yang bertujuan untuk melarutkan bahan-bahan dan bumbu serta

mendistribusikan secara merata bahan tersebut dengan daging. Kemudian ditambahkan tepung daun kelor sebanyak 0%, 2,5%, 3% dan 3,5% setiap perlakuan. Kemudian dicampur kedalam adonan sampai homogen. Setelah bahan telah menjadi adonan kemudian dibentuk menjadi bola-bola bakso dengan menggunakan tangan. Bola-bola bakso tersebut direbus dalam air mendidih selama 15 menit dengan suhu 60-80°C, kemudian diangkat lalu ditiriskan dan didinginkan kemudian dimasukkan dalam plastik klip. Setelah itu dilakukan pengukuran atau pengujian.



Berikut adalah diagram alir pembuatan bakso daging ayam dengan penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*).



Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Bakso Broiler dengan Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera*)

## F. Parameter Yang Diukur

### 1. Daya Ikat Air

Daya Ikat Air (DIA) (%). Analisis DIA menggunakan metode Hamm (Soeparno, 1994). Sampel ditimbang sebanyak 0,3 gram. Sampel dibungkus dengan kertas saring. Sampel yang terbungkus di press di antara 2 plat dengan dengan beban 35 kg selama 5 menit menggunakan alat modifikasi *Filter Paper Press*. Kertas saring diletakkan di bawah kertas kalkir dan area yang terbentuk kemudian dibuat sketsa. Nilai DIA sampel daging dihitung dengan persamaan.

$$\text{Daya Ikat Air (\%)} = \frac{D}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

D: Luas sampel daging

T: Luas area total

Pengukuran Daya Ikat Air menggunakan metode Hamm (Soeparno, 1994), Daya ikat air (WHC) diatas diukur dengan menggunakan metode FPPM (*The Filter Paper Press Method*).

### 2. Daya Lenting

Uji Daya Lenting (cm). Daya lenting menggunakan gelas ukur sebagai tempat tempat lentingan bakso. Pengukuran daya lenting bakso dilakukan dengan cara menjatuhkan bakso pada ketinggian 50 cm. Tinggi pantulan dari masing-masing bakso dikonversi kedalam 4 skor. Skor 1 merupakan daya lenting kurang, skor 2 merupakan daya lenting agak kurang, skor 3 merupakan daya lenting agak baik, skor 4 merupakan daya lenting baik (Abustam dkk., 2009).

### 3. Daya Putus Daging

Sampel uji untuk analisis DPD dibentuk sesuai dengan model lubang (silinder) pada alat pemutus serat daging (*CD-Shear Force*) dengan berat 2 gram. Sampel daging dimasukkan pada lubang dengan arah sejajar pada serat daging. Tuas alat ditarik ke bawah memotong tegak lurus terhadap serat daging. Hasil beban tarikan akan terbaca pada skala dengan satuan kilogram (kg) (Abustam, 2009). Menurut Soeparno (2005), bahwa tingkat keempukan ditentukan dari nilai daya putusnya dalam kg/cm<sup>2</sup>. Keempukan daging dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Daya Putus (A)} = \frac{A_1}{L}$$

Keterangan :

A : Beban Tarikan (Kg/cm<sup>2</sup>)

L : Luas Penampang Sampel ( $\pi \cdot R^2 = 3,14 \times 0,6352 = 1,27 \text{ cm}^2$ )  $\Pi = 3,14$

A : Daya Putus

### G. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara sidik ragam. Apabila perlakuan berpengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji Duncan untuk melihat perbedaan terhadap setiap sampel perlakuan (Steel dan Torrie, 1991).

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

- $Y_{ij}$  : Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dari pemberian probiotik ulangan ke-j.
- $M$  : Nilai rata-rata sesungguhnya
- $A_i$  : Pengaruh perlakuan pada taraf ke-i
- $\epsilon_{ij}$  : Galat  $i = P_0, P_1, P_2$ , (perlakuan);  $j = 1,2,3$  (ulangan)

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil dan Pembahasan

Hasil uji kualitas fisik bakso daging ayam dengan penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dengan level yang berbeda yaitu P0: 0% tanpa tepung daun kelor (*Moringa oleifera*), P1: 2,5% tepung daun kelor (*Moringa oleifera*), P2: 3% tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dan P3: 3,5% tepung daun kelor (*Moringa oleifera*), disajikan pada Tabel 8. sebagai berikut:


Table 8. Hasil Analisis Kualitas Fisik Bakso Daging Broiler dengan Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera*)

Variabel	Perlakuan				Nilai P
	P0	P1	P2	P3	
DIA (%)	13,24	14,17	13,15	11,76	>0,05
Daya Lenting (cm)	3,00	3,00	2,00	2,33	>0,05
DPD (kg/cm <sup>2</sup> )	4,54	4,85	4,25	4,25	>0,05

Sumber: Hasil Analisis, 2021

##### 1. Daya Ikat Air

Hasil penelitian tentang pengaruh penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) pada bakso daging broiler menunjukkan nilai daya ikat air berkisar antara 11,76%-14,17%. Nilai daya ikat air dari yang tertinggi ke terendah adalah P<sub>1</sub>, P<sub>0</sub>, P<sub>2</sub> dan P<sub>3</sub>. Nilai rata-rata yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan penelitian Riskayanti (2018), dengan menggunakan tepung sukun yang memperoleh nilai rata-rata daya ikat air berkisar antara 11,18%-14,89%.



Gambar 2. Diagram Batang Pengukuran Daya Ikat Air Bakso Broiler dengan Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera*)


Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 3.) menunjukkan bahwa penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dengan level yang berbeda pada bakso daging broiler tidak memberikan pengaruh yang nyata ( $P > 0,05$ ) terhadap daya ikat air, hal ini disebabkan oleh senyawa tanin yang terkandung dalam tepung daun kelor dapat menurunkan protein sehingga apabila jumlah tepung daun kelor semakin meningkat maka proporsi protein dalam bakso semakin rendah yang mengakibatkan kadar protein menjadi turun dan daya ikat air juga turun. Hal ini sesuai dengan pendapat Ismarani (2012), yang menyatakan bahwa senyawa tanin adalah senyawa *Astringent* yang memiliki rasa pahit dari gugus polifenolnya yang dapat mengikat dan mengendapkan protein. Deaville *et al* (2010), menambahkan bahwa senyawa polifenol dapat mengendapkan protein karena mampu membentuk ikatan fungsional yang kuat dengan protein sehingga terbentuk ikatan silang.

Kadar protein dapat mempengaruhi daya mengikat air sehingga apabila terjadi pemanasan atau perebusan maka kemampuan untuk mengikat air akan mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soeparno (2005), yang menyatakan bahwa daya ikat air dipengaruhi oleh kadar protein, salah satu fungsi

protein adalah mengikat air. Jika protein mengalami denaturasi akibat pemanasan atau perebusan maka kekuatan untuk mengikat air rendah sehingga nilai daya ikat air menurun.

## 2. Daya Lenting

Hasil penelitian tentang pengaruh penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) pada bakso daging broiler menunjukkan bahwa nilai daya lenting tertinggi terdapat pada perlakuan P<sub>0</sub> dan P<sub>1</sub> dengan penambahan 0% dan 2,5% tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dengan nilai masing-masing adalah 3,00 cm sedangkan nilai rata-rata yang paling rendah terdapat pada perlakuan P<sub>2</sub> dengan penambahan 3% tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) yaitu 2 cm. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata P<sub>1</sub>, P<sub>0</sub>, P<sub>2</sub> dan P<sub>3</sub> berada pada skor 1 yang berarti kekenyalan yang kurang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Abustam (2009), menambahkan bahwa pembagian skala daya lenting yaitu nilai 2,00–3,35 (1/kurang), 3,36–4,50 (2/cukup), 4,51–5,75 (3/baik), 5,76–7,00 (4/terbaik).



Gambar 3. Diagram Batang Pengukuran Daya Lenting Bakso Broiler dengan Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera*)


Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 3.) menunjukkan bahwa penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dengan level yang berbeda pada bakso daging broiler tidak memberikan pengaruh yang nyata ( $P>0,05$ ). Hal ini disebabkan karena daun kelor mengandung serat yang tinggi sehingga dengan meningkatnya proporsi tepung daun kelor maka kandungan serat pada bakso juga bertambah sehingga bakso yang dihasilkan kurang kenyal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Aminah dkk., (2015), yang menyatakan bahwa serat tepung daun kelor adalah 19,2%. Ulfa dan Ismawati (2016), juga menambahkan bahwa penambahan daun kelor mempengaruhi kekenyalan bakso, semakin sedikit jumlah daun kelor maka bakso semakin kenyal. Karena daun kelor mengandung sedikit pati, sehingga daya serap air rendah. Selain itu, kadar serat kelor yang tinggi juga mempengaruhi tekstur bakso, semakin tinggi kadar serat, cenderung bakso relatif keras.

Rendahannya kekenyalan dapat dipengaruhi oleh daya ikat air yang rendah karena banyaknya air yang keluar saat proses pemasakan sehingga gel yang terbentuk kurang kuat. Hal ini sesuai dengan pendapat Komariah dkk., (2019), bahwa rendahnya daya ikat air yang disebabkan oleh kandungan air banyak keluar selama pemasakan sehingga gel yang terbentuk kurang kuat dan bakso yang dihasilkan pun kurang kenyal.

### 3. Daya Putus Daging

Hasil penelitian tentang pengaruh penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) pada bakso daging menunjukkan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada perlakuan P<sub>1</sub> yaitu 4,85 kg/cm<sup>2</sup> sedangkan nilai rata-rata yang paling rendah terdapat

pada perlakuan P<sub>2</sub> dan P<sub>3</sub> dengan nilai masing-masing adalah 4,25 kg/cm<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa bakso yang dihasilkan tergolong empuk karena nilai rata-rata yang diperoleh berkisar antara 4,25-4,85 kg/cm<sup>2</sup>. Hal ini sesuai dengan pendapat Komariah dkk., (2019), yang menyatakan bahwa kriteria-kriteria daya putus daging yaitu jika dibawah 3,3 kg/cm<sup>2</sup> sangat empuk, 3,3-5,0 kg/cm<sup>2</sup> empuk, 5,0-6,7 kg/cm<sup>2</sup> agak empuk, 6,7-8,42 kg/cm<sup>2</sup> agak alot, dan 8,42-10,12 alot dan diatas 10,2 sangat alot.



Gambar 4. Diagram Batang Pengukuran Daya Putus Daging Bakso Broiler dengan Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera*)

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 4.) menunjukkan bahwa penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dengan level yang berbeda pada bakso daging broiler tidak memberikan pengaruh yang nyata ( $P > 0,05$ ). hal ini disebabkan oleh kandungan serat daun kelor tinggi sehingga semakin banyak jumlah tepung daun kelor yang ditambahkan maka tekstur bakso menjadi tidak kompak dan menjadi rapuh sehingga seiring dengan peningkatan tepung daun kelor yang ditambahkan tenaga yang digunakan untuk memotong bakso juga sedikit. Hal ini sesuai dengan pendapat Krisnadi (2013), yang menyatakan bahwa daun kelor memiliki kandungan serat yang lebih banyak dibanding dengan sayuran pada

umumnya yang menyebabkan tekstur bakso lebih rapuh. Amrullah (2017), menambahkan bahwa semakin tinggi nilai daya putus berarti semakin banyak gaya yang diperlukan untuk memutuskan daging, yang berarti daging semakin alot atau tingkat keempukannya rendah begitupun sebaliknya, semakin rendah nilai daya putus maka gaya yang diperlukan untuk memutuskan daging sedikit sehingga tingkat keempukannya baik.

Keempukan juga dipengaruhi oleh nilai daya ikat air, jika nilai daya ikat air tinggi maka nilai keempukan juga tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Hambakodu dan Enawati (2019), yang menyatakan bahwa nilai daya ikat (DIA) daging berhubungan dengan nilai keempukan daging. Daging yang memiliki nilai daya ikat (DIA) yang tinggi maka mempunyai nilai keempukan yang lebih tinggi daripada daging dengan daya ikat air (DIA) yang rendah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dengan level yang berbeda terhadap kualitas fisik bakso daging broiler tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas fisik bakso daging broiler baik Daya Ikat Air (DIA), Daya Lenting dan Daya Putus Daging (DPD).

#### **B. Saran**

Perlunya penelitian lanjut tentang penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dengan level yang lebih rendah dari penelitian ini agar mendapatkan nilai daya ikat air yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abustam, E. 2009. *Karakteristik kualitas daging*. [www.kualitas-daging.html](http://www.kualitas-daging.html) (diakses pada tanggal 14 Juli 2021).
- Aminah, S., Ramdhan, T., dan Yanis, M. 2015. Kandungan Nutrisi dan Sifat Fungsional Tanaman Kelor (*Moringa oleifera*). *Buletin Pertanian Perkotaan*. Vol. 5(2). Hal. 35-44.
- Amrullah, M. 2017. Penambahan Tepung Sagu dengan Level yang Berbeda terhadap Mutu (Organoleptik) Bakso Daging Ayam. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar.
- Astuti, D.A., Ekastuti, D.R., dan Firdaus. 2018. Manfaat Daun Kelor (*Moringa oleifera*) sebagai Pakan Ayam Pedaging. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Usaha Peternakan Berdaya Saing di Lahan Kering*. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Astawan, M. 2020. Konsumsi Nugget. Pusat Dokumentasi Ilmu Ilmiah Nasional LIPI. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. 2014. *Bakso daging*. SNI 7266-2014. Dewan Standardisasi Nasional, Jakarta.
- Basri, S H. 2017. Pengaruh Pemberian Probiotik terhadap Susut Masak, Keempukan dan pH Pada Daging Broiler. *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar Press, Makassar.
- Bunnet, R.N., Melon, F.A., dan Foidl, N. 2021. Profiling glucosinolates and phenolics in vegetative and reproductive tissues of the multi-purpose trees *Moringa a Stenopetala* L. *J. Agri. Food Chem.* Vol. 51 (12). ISSN 3546-3553.
- Daniati, T. 2011. Pembuatan Bakso Ikan Cucut dengan Bahan Tambahan Jenis Tepung yang Berbeda. *Tugas Akhir*. Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Deaville, E.R., Givens, D.I., dan Mueller-Harvey, I. 2010. Chesnut and Mimosa Tannin Silages; Effect in Sheep Differ for Apparent Digestibility, Nitrogen Utilization and Loses. *Anim. Feed Sci. Technol.* 157: 129-138.
- Dewan Standardisasi Nasional. 1995. SNI 01-3818, *Bakso Daging*. Dewan Standardisasi Nasional, Jakarta.


- Dewi, T., Bidura, I. G. N. G., & Candrawati, D. P. M. A. 2014. Pengaruh Pemberian Ekstrak daun Kelor (*Moringa oleifera*) dan Bawan Putih (*Allium sativum*) Melalui Air Minum terhadap Penampilan Broiler Umur 2-6 Minggu. *E-Jurnal Peternakan Tropika*. Vol 2(3), 461-475.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/tropika/article/view/18497> (diakses pada tanggal 14 Juli 2021).
- Domiszewski, Z., Bienkiewicz, G., Plust, D. 2011. Effects of different heat treatments on lipid quality of striped catfish (*Pangasius hypophthalmus*). *Acta Sci. Pol. Technol Aliment*. Vol 10 (3):359-373.
- Einsenbrand. 2005. *Toxicological Evaluation Of Red Mold Rice*. DFG-Senate Commission on Food Safety, New York.
- Fadilah, R., Polana, A., Alam, S., dan Purwanto, E. 2007. *Sukses Beternak Ayam Broiler*. Cetakan Pertama. Pt. Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Food and Agriculture Organization of the United Station (FAO). 2010. *FAO Yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics*. <http://www.fao.org/fishery/publication/yearbook/en> (diakses pada tanggal 15 juli 2021).
- Gopalan, C. 2010. *Nutrition Research in Southeast Asia*. WHO, New Delhi.
- Gopalakrishnan, L., Doriya, K., dan Kumar, D.S. 2016. Moringa oleifera: A Review on Nutritive Importance and Its Medicinal Application. *Food science and human wellness*. 5: 49-56.
- Hafid, H, Mujiyanto, D. Agustina, Inderawati, & Nuraini. 2017. The effect of storage time in the refrigerator to the quality of organoleptic beef. *ADRI International Journal of Biology Education*. WHO. Vol. 1(1): 29-36.
- Hambakubodo, M., da Enawati, L.S. 2019. Kualitas Fisik Daging Kambing Kacang Jantan Muda yang Diberi Rumput Lapang dan Tiga Level Konsentrat. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis*. Vol 6(1). Hal. 57-61.
- Hamka. 1999. *Tafsir Al-Azhar, jilid IV*. Pustaka Nasional PTE. LTD, Singapura.
- Hastuti, S., S. Suryawati dan I. Maflahah. 2015. Pengujian Sensoris nugget ayam fortifikasi daun kelor. *AGROINTEK*. Vol. 9(1). Hal. 71-75.
- Hifizah, A. 2020. Horticultural Harvest Waste as an Alternative Feed wIth Anti-methanogenic Properties for Ruminants: In vitro Evaluation. *Thesis is presented for the degree of The Doctor of Philosophy*. School of Agriculture and Environment. The University of Western Australia, Australia.

- Hifizah, A., Astati., Qurniawan, A. 2021. Manipulasi Pakan Menggunakan Limbah Perkebunan yang Mengandung Metabolit sekunder sebagai Agen Produksi Metana. *JITRO*. Vol. 8(3). Hal. 269-282.
- Hikmah, B. 2018. Manfaat Tumbuhan Bagi Manusia (Studi Sains aas Surah ‘Abasa 24-32). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.
- Kartikasari, L. R., Hertanto, B. S., Pamungkas, A. S. D., Saputri, I. S., dan Nuhriawangsa, A. M. P. 2020. Kualitas Fisik dan Organoleptik Bakso Berbahan Dasar Daging Ayam Broiler yang Diberi Pakan dengan Suplementasi Tepung Purslane (*Portulaca oleracea*). *Jurnal Sains Peternakan* Vol. 18 (1) .1693-8828 eISSN 2548-9321.
- Komariah, Rahayu, S., dan Sarjito. 2019. Sifat Fisik Daging Sapi, Kerbau dan Domba pada Lama Postmortem yang Berbeda. *Buletin peternakan*. Vol. 33 (3). Hal. 183-189.
- Krisnadi, A. D. 2015. *Kelor Super Nutrisi*. Pusat Informasi dan Pengembangan Tanaman Kelor Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat Media Peduli Lingkungan, Blora.
- Krisnadi, A. D. 2013. *Kelor Super Nutrisi*. E-Book Edisi Revisi (diakses pada tanggal 15 juli 2021).
- Kusnadi DC, Bintoro VP, dan Al-Baarri AN. 2012. Daya ikat Air, tingkat kekenyalan dan kadar protein pada bakso kombinasi daging sapi dan daging kelinci. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*. Vol. 1(2):28-31.
- Kustiani, A. 2013. Pengembangan Crekers Sumber Protein dan Mineral dengan Penambahan Tepung daun kelor (*Moringa oleifera*) dan Tepung Badan-Kepala Ikan Lele Dumbo (*Ciarias gariepinus*). *Karya Tulis*. Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Lee, C.C., dan Lin, S.D. 2008. Effect of GABA tea on Quality Characteristics of Chiffon cake. *Cereal Chem*.85:31-38. DOI: 10.1094/CCHEM-85-1-0031.
- Manurung, D. C., U. Pato, E. Rossi. 2017. Karakteristik kimia dan mutu sensori bakso ikan patin dengan penggunaan tepung bonggol pisang dan tapioka. *Jom FAPERTA*. Vol. 4 (1):1-15
- Millan, A., Sirante, S. 2020. Efektivitas Mikrokapsul Oleoresin Fuli Pala (*Myristica fragrans houtt*) sebagai Pengawet Daging Ayam Broiler. Politeknik Malinau. Kalimantan Timur. *Jurnal Teknologi & Industri Hasil Pertanian* Vol. 25 (1).

- Nurlaela, Lutfiyah dan Ismawati, R. 2013. *Potensi Pangan Lokal Kabupaten Sidoarjo*. Reuka Petra Media, Surabaya.
- Ockerman HW. 2009. Chemistry Of meat Tissue. *Animal Science Department Ohio*, United State Of America.
- Octaviani, Y. 2002. Kandungan Gizi dan Palatabilitas Bakso Campuran Daging dan Jantung Sapi. *Skripsi*. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Prada, J.I., Sabtu, B., dan Riwu, A.R. 2021. Pengaruh Penambahan Pasta Daun Kelor (*Moringa oleifera Lam.*) Terhadap Kualitas Fisik Bakso Petelur Afkir. *Jurnal Peternakan Lahan Kering*. Vol. 3 (2). ISSN 2714-7878.
- Richter, N., Siddhuraju, P., Becker. 2021. Evaluation of National Quality of Moringa (*Moringa oleifera Lam.*) Leaves as an Alternative Protein Source for Nile Tilapia (*Oreochromis niloticus I.*). *Department of Aquaculture Systems and Animal Nutrition*. (217). 399-611.
- Riskayanti. 2018. Pengaruh Penambahan Tepung Sukun (*Artocarpus Communis*) terhadap Kualitas Bakso Daging Ayam. *Skripsi*. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Rosita, F., Hafid, H., Aka, R. 2015. Susut Masak dan Kualitas Organoleptik Bakso Daging Sapi dengan Penambahan Tepung Sagu pada Level yang Berbeda. *JITRO* Vol. 2 (1)
- Sarjono, H. T. 2016. *Efek Penggunaan Tepung Daun Kelor (Moringa oleifera, Lam) dalam Pakan terhadap Persentase Karkas, Persentase Deposisi Daging Dada, Persentase Lemak Abdominal Dan Kolesterol Daging Ayam Pedaging*. Fakultas Bioteknologi. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Serena, A. dan Bach, K.K.E. 2018. Chemical and Physicochemical Characterization of co-products from the vegeTable food and agroindustries. *Journal of animal feed science and Technology*. 139:109-124.
- Shihab, M.Q. 1994. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Volume 4 Mizan. Bandung.
- Singgih, W. 2018. *Pembuatan Bakso Ikan dan Bakso Daging*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Soeparno. 1994. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Gadjah Mada Press, Yogyakarta
- Soeparno. 2005. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

- Soeparno. 2009. *Ilmu dan Teknologi Daging. Cetakan ke lima*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Srinovitasari, A. 2018. Penambahan Rumput Laut Merah (*Eucheuma cottonii*) Sebagai Pengenyal Alami Bakso Daging Broiler. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar
- Stadelman, V.M. Olson, G.A. and S. S. Pasch. 2021. *Egg and Poultry Meat Processing*, Ellis Haewood Ltd.
- Standar Nasional Indonesia No. 01-3818. 1995. *Bakso Daging*. Dewan Standarisasi Indonesia, Jakarta.
- Steel, R.G.B dan Torrie, J.H. 1993. *Prinsip dan Prosedur Statistika*. Diterjemahkan Oleh Bambang S. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sulistiyati, T.D., Cahyaningati, O. 2020. Pengaruh Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk) Terhadap Kadar  $\beta$ -karoten dan Organoleptik Ikan Patin (*Pangasius pangasius*). *Journal of Fisheries and Marine Research*, Vol 4(3), Hal 345-351.
- Sutomo, B. 2013. *Sukses Bisnis Bakso*. Kriya Pustaka, Depok.
- Syamsul. 2017. Pengaruh Perbedaan Umur Itik Terhadap Sifat Fungsional Bakso Itik. *Skripsi*. Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Toripah, S. S., Abidjulu, J. and Wehantouw, F. (2014) 'Aktivitas Antioksidan dan Kandungan Total Fenolik Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk)', *Jurnal Pharmacon*, 3(4).
- Ulfa, S. Ismawati R. 2016. Pengaruh Penambahan Jumlah dan Perlakuan Awal Daun Kelor Terhadap Sifat Organoleptik Bakso. *E-Jurnal Boga*. Vol 5(3). Hal. 83-90
- Wahab, A.W., Said, M. I., Abustam, E., Yulianti, F. N. 2013. Karakteristik Fisik Bakso Daging Sapi Bali Lokal yang Difortifikasi dengan Ekstrak Sayuran sebagai Pangan Fungsional. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Sains dan Teknologi*. Volume 4, Tahun 2013, E.1-E.8
- Wibowo, S. 1995. *Pengantar Teknologi Pangan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Wibowo, S. 2017. *Pembuatan Bakso Ikan dan Bakso Daging*. Penebar Swadaya, Jakarta.

- Widati AS, Eny SW, Rulita, Muhammad SZ. 2012. The effect of addition tapioca starch quality of chicken meatball chips whit vacuum frying method. *Jurnal Ilmu-ilmu Peternakan* 21(2), hal. 11-27.
- Widyaningsih, T.W., dan Murtini, E.S. 2017. *Alternatif Pengganti Formalin pada Produk Pangan*. Trubus Angrisarana, Surabaya.
- Winedar, H., Listiyawati, S. dan Sutarno. 2015. Daya Cerna Protein Pakan, Kandungan Protein Daging dan Pertambahan Berat Badan Ayam Broiler Setelah Pemberian Pakan yang difermentasi dengan Effective Microorganisme-4 (EM-4). *Biotechnology*. Vol 3(1). Hal. 1-5.
- Zakaria., Tamrin, A., Lestari, R.S., dan Hartono, R. 2012. Pemanfaatan Tepung Kelor (*Moringa Oleifera*) Dalam Formulasi Pembuatan Makanan Tambahan Untuk Balita Gizi Kurang Media Gizi Pangan. *Jurnal Media Pangan dan Gizi*.
- Zulkarnain, J., Yusuf dan Yuliana. 2013. Pengaruh Perbedaan Komposisi Tepung Tapioka Terhadap Kualitas Bakso Lele. *Journal of Chemical Engineering, Chemistry and Bioengineering*.



**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



UNIVERSITAS ALAUDDIN MAKASSAR  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**LAMPIRAN**

Lampiran 1

Table 9. Sidik Ragam Daya Ikat Air

SK	DB	JK	KT	F.HIT	F. TABEL		NOTASI
					0.05	0.01	
PERLAKUAN		8.85489	4.42744	1.91959	4.25649	8.02151	
N	2	2	6	8	5	7	
GALAT	9	20.758	2.30644				
		29.6128	4				
TOTAL	11	9					

Table 10. Sidik Ragam Daya Lenting

SK	DB	JK	KT	F.HIT	F. TABEL		NOTASI
					0.05	0.01	
PERLAKUAN		2.25	0.75	1.28571	4.06618	7.59099	
N	3	4.66666	3	4	1	2	
GALAT	8	7	0.58333				
		6.91666					
TOTAL	11	7					

Table 11. Sidik Ragam Daya Putus Bakso

SK	DB	JK	KT	F.HIT	F. TABEL		NOTASI
					0.05	0.01	
PERLAKUAN		0.00930	0.00465	0.01660	4.25649	8.02151	
N	2	5	2	9	5	7	
GALAT	9	2.52092	0.28010				
		2.53022	2				
TOTAL	11	5					

Lampiran

Pengeringan daun kelor dan menghaluskan



Gambar 1. Pengeringan Daun Kelor



Gambar 2. Proses menghaluskan daun kelor

Lampiran

Penimbangan dan Penggilingan



Gambar 3. Penimbangan Daging Broiler



Gambar 4. Penggilingan Daging Broiler

Lampiran

Penimbangan tepung daun kelor dan pencampuran adonan



Gambar 5. Proses Penimbangan Tepung Daun Kelor



Gambar 6. Proses Pencampuran Adonan

Lampiran

Proses Pemasakan dan Bakso yang telah masak



Gambar 7. Proses Pemasakan



Gambar 8. Bakso yang telah masak



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN (UIN) MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
JURUSAN ILMU PETERNAKAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 868720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II : Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36, Romang polog-Gowa, (0411) 882862

**SURAT KETERANGAN UJI PLAGIARISME**

Nomor Paper: 1758275269/II/2022

Pengelola Jurnal/karya tulis ilmiah Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	: Dewi Trisnawati Kasri
NIM	: 60700114012
Program	: Strata I (S1)
Jurusan	: Ilmu Peternakan
Pembimbing	: 1. Amriana Hifizah, S.Pt., M.Anim, St., Ph.D. 2. Astati, S.Pt., M.Si


Judul Skripsi:

Pengaruh Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa Olifera*) dengan Level yang Berbeda Terhadap Kualitas Fisik Bakso Daging Broiler


Dinyatakan telah diperiksa/dicek dengan menggunakan Aplikasi pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dengan hasil uji Plagiasi sebesar **16%**. Demikian Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian Skripsi.

Gowa, 15 Februari 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

  
Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P  
NIP. 19750909 200912 1 001

Tim Uji Plagiasi

  
Muh. Arsan Jamili, S.Pt., M.Si.  
NIP. 19891217 201903 1 012

<b>Catatan:</b>	
1-24%	: "Tidak Terindikasi Plagiat"
25-49%	: "Revisi Minor, Konsultasikan dengan Pembimbing"
50-74%	: "Revisi Mayor, Konsultasikan dengan pembimbing"
75-100%	: "Revisi Total"

## Pengaruh\_Penambahan\_Tepung\_Daun\_Kelor\_Moringa\_oleif...

### ORIGINALITY REPORT

<b>16%</b>	<b>15%</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>repositori.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>kumpulantugas466.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>jurnalfkip.unram.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repositori.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>repositori.usm.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

10	<b>zombiedoc.com</b> Internet Source	<1 %
11	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	<1 %
12	<b>Submitted to Universitas Jenderal Soedirman</b> Student Paper	<1 %
13	<b>id.scribd.com</b> Internet Source	<1 %
14	<b>es.scribd.com</b> Internet Source	<1 %
15	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	<1 %
16	<b>Submitted to Politeknik Negeri Banyuwangi</b> Student Paper	<1 %
17	<b>jurnal.untad.ac.id</b> Internet Source	<1 %
18	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b> Internet Source	<1 %
19	<b>usupress.usu.ac.id</b> Internet Source	<1 %
20	<b>Sulasma Sulasma, Yusri Sapsuha, Emy Saelan.</b> "Pengaruh penambahan jenis tepung daun leguminosa yang berbeda terhadap konsumsi, penambahan bobot badan dan	<1 %

konversi ransum ayam broiler", Agrikan:  
Jurnal Agribisnis Perikanan, 2013  
Publication

21	adoc.pub Internet Source	<1 %
22	ejurnal.undana.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
25	agungaelah76.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	esthercream.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	Muh. Hasyim, Hapzah Hapzah. "Daya Terima Kue Baruas dengan Penambahan Tepung Daun Kelor Tua", Jurnal Kesehatan Manarang, 2019 Publication	<1 %
28	Rachmah Fathia Widyaniptria, Noli Novi Dahlia, Dwi Aryanti Nur'utami, CC Nurwitri. "Penambahan Tepung Ikan Lele Dan Tepung Kedelai Pada Biskuit Modified Cassava Flour Untuk Lansia", JURNAL AGROINDUSTRI HALAL, 2020	<1 %

Publication

29	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1%
30	Ninna Rohmawati, Mariska Anggraini, Ruli Bahyu Antika. "Analisis Protein, Kalsium dan Daya Terima Biskuit Ubi Jalar Ungu ( <i>Ipomoea batatas</i> L.) dengan Penambahan Daun Kelor ( <i>Moringa oleifera</i> )", JURNAL NUTRISIA, 2020 Publication	<1%
31	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1%
32	<a href="http://kesalahanquran.wordpress.com">kesalahanquran.wordpress.com</a> Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

### KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Trisnawati Kasri  
 NIM : 60700117012  
 Jurusan : Ilmu Peternakan  
 Judul Skripsi : Pengaruh Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera*) dengan Level yang Berbeda terhadap Kualitas Fisik Bakso Daging Broiler  
 Pembimbing I : Amriana Hifizah, S.Pt., M.Anim., St., Ph.D

No	Hari/Tanggal	Uraian	Paraf	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	Kamis, 1 Juli 2021	Konsultasi judul		
2.	Jumat, 16 Juli 2021	Konsultasi 1: Bab 1, 2 dan 3		
3.	Jumat, 23 Juli 2021	Konsultasi 2 : Bab 1, 2 dan 3		
4.	Kamis, 29 Juli 2021	Konsultasi 3: bab 1, 2 dan 3		
5.	Selasa, 9 Agustus 2021	Seminar Proposal		
6.	Kamis, 18 November 2021	Konsultasi revisi proposal berdasarkan saran-saran penguji serta konsultasi pelaksanaan penelitian		
7.	Kamis, 25 November 2021	Konsultasi Skripsi lengkap		
8.	Jumat, 10 Desember 2021	Seminar Hasil		
9.	Jumat, 24 Desember 2021	Konsultasi revisi hasil penelitian berdasarkan saran-saran penguji		
10.	Rabu, 19 Januari 2022	Ujian Munaqasyah		

Samata, 01/Februari/ 2022

Mengetahui  
Kefuan Jurusan Ilmu Peternakan

**Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P**  
NIP. 19750909 200912 1 001

### KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Trisnawati Kasri  
 NIM : 60700117012  
 Jurusan : Ilmu Peternakan  
 Judul Skripsi : Pengaruh Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera*) dengan Level yang Berbeda terhadap Kualitas Fisik Bakso Daging Broiler  
 Pembimbing II : Astati, S.Pt., M.Si

No	Hari/Tanggal	Uraian	Paraf	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	Kamis, 1 Juli 2021	Konsultasi judul		
2.	Jumat, 16 Juli 2021	Konsultasi 1: Bab 1, 2 dan 3		
3.	Jumat, 23 Juli 2021	Konsultasi 2 : Bab 1, 2 dan 3		
4.	Kamis, 29 Juli 2021	Konsultasi 3: bab 1, 2 dan 3		
5.	Selasa, 9 Agustus 2021	Seminar Proposal		
6.	Sabtu, 13 November 2021	Konsultasi revisi proposal berdasarkan saran-saran penguji serta konsultasi pelaksanaan penelitian		
7.	Senin, 29 November 2021	Konsultasi Skripsi lengkap		
8.	Jumat, 10 Desember 2021	Seminar Hasil		
9.	Jumat, 24 Desember 2021	Konsultasi revisi hasil penelitian berdasarkan saran-saran penguji		
10.	Rabu, 19 Januari 2022	Ujian Munaqasyah		

Samata, 01/Februari/ 2022

Mengetahui  
 Ketuan Jurusan Ilmu Peternakan

**Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P**  
 NIP. 19750909 200912 1 001



ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 2219 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
ATAS NAMA DEWI TRISNAWATI KASRI JURUSAN ILMU PETERNAKAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar tanggal 27 November 2020 tentang Penerbitan SK Pembimbing mahasiswa atas nama Dewi Trisnawati Kasri NIM 60700117012, Untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : "Pengaruh Pemberian Silase Daun Karet Terhadap Palatibilitas Pada Ternak Sapi Bali"
- b. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
- c. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahkan tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 226.D tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

Pemrakarsa	Kasubag. Akademik
Paraf: 	Paraf: 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI ATAS NAMA **DEWI TRISNAWATI KASRI** JURUSAN **ILMU PETERNAKAN** FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk saudara :
1. Amriana Hifizah, S.Pt.,M.Anim. St., Ph.D. sebagai Pembimbing Pertama,
  2. Astiti, S.Pt., M.Si. sebagai Pembimbing Kedua,
- KEDUA : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Gowa  
Pada Tanggal 2 Desember 2020

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

  
MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI

MAKASSAR

## RIWAYAT HIDUP



Dewi Trisnawati Kasri, lahir di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Desa Sangkala Kecamatan Kajang pada tanggal 01 Agustus 1999. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dengan kedua kakaknya bernama Muh. Asikin Kasri dan Muh. Ruslan Adianto dari pasangan Bapak Kaharuddin da Ibu Suriani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam.

Pendidikan awal di TK Pusat Padu Ihlas dan Tamat pada tahun 2005. Selanjutnya bersekolah di SD Negeri 285 Dassa dan tamat pada tahun 2011. Lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 16 Bulukumba dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Negeri 2 Tanete yang sekarang dikenal dengan Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Bulukumba dan tamat pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di Jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar.