

**SUBSTITUSI AMPAS TAHU PADA LEVEL
YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN KELINCI
(*Oryctolagus cuniculus*)**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Peternakan
Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh:
MUH. JIHAD
NIM. 60700115020

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Jihad
Nim : 6070015020
Tempat/Tgl. Lahir : Kampiri/27 Agustus 1996
Jurusan/Prodi : Ilmu Peternakan
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Jln.Inspeksi Kanal II , Kel. Bangkala. Kec.
Maggala.Makassar.
Judul : Substitusi Ampas Tahu pada Level yang berbeda
terhadap Pertumbuhan Kelinci (*Orytolagus Cuniculus*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gowa, 20 Agustus 2021

Penyusun



Muh. Jihad
Nim.6070015020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Muh. Jihad (NIM. 60700115020), Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “**Subtitusi Ampas Tahu pada Level Yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)**”.

Memandang skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah yang dapat disetujui unruk mengajukan permohonan **Ujian Munaqasyah**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut

Gowa, 19 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Jumriah Syam, S. Pt., M. Si.
NIP.197207272000032008

Pembimbing II



Rasyidah Mappanganro, S. Pt., M.Si
NIP.70010047

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Substitusi Ampas Tahu pada Level yang Berbeda terhadap Pertumbuhan Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)" yang disusun oleh **Muh. Jihad**, NIM: 60700115020, Mahasiswa pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 24 Agustus 2021

Dewan Penguji

Ketua	: Dr. Fatmawati Nur, S. Si., M. Si.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muhammad Nur Hidayat, S. Pt., M. P.	(.....)
Munaqisy I	: Amriana Hiffizah, S. Pt., M.Anim.St., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Sohra, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M. Si.	(.....)
Pembimbing II	: Rasyidah Mappanganro, S. Pt., M. Si.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN
Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.
NIP. 1971041 200431001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt karena berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi yang berjudul **Substitusi Ampas Tahu pada Level yang berbeda terhadap Pertumbuhan Kelinci (*Orytolagus cuniculus*)** yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya dan kepada pengikut setianya Insya Allah. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, doa serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi.

Untuk itu, perkenankanlah penulis menghaturkan banyak ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada orang tua penulis, Ayahanda **H. M. Yahya Nawawi** dan Ibunda **Alm. Suwarda**, yang tanpa pamrih, penuh kasih

sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini.

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan., M.Ag. Selaku wakil rektor 1, Bapak Dr. Wahyudin, M.Hum. selaku Wakil rektor 2, Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. selaku wakil rektor 3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Muh Halifah Mustami, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D. selaku wakil dekan 1, Ibu Dr. Fatmawati Nur Khalik, S.Si., M.Si. selaku wakil dekan 2 serta Bapak Dr. Muh Anshar, S.Pt., M.Si. selaku wakil dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Bapak Dr. Muh. Nur Hidayat, M.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Ibu Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Peternakan.
5. Bapak Mursidin S. Pt. M. Si. Selaku dosen pembimbing akademik, atas bimbingan mulai semester awal hingga akhir sehingga penulis mampu menjalani studi akademik dengan baik.
6. Ibu Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Rasyidah Mappangaro, S.Pt., M.Si. selaku dosen pembimbing II, atas bimbingannya selama ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk


membimbing dan mengajarkan penulis mulai dari awal penyusunan proposal hingga dapat menyelesaikan skripsi.

7. Ibu Amriana Hifizah, S. Pt. M.Anim., St., Ph. D. selaku penguji I dan Ibu Dr. Sohra M.Ag. selaku penguji II yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan serta penyusunan skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen, Staf, dan Laboran, jurusan Ilmu Peternakan terimakasih atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik secara langsung (tatap muka) maupun arahan di luar perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Civitas Akademik Fakultas Sains dan Teknologi terima kasih telah membantu saya dalam pengurusan berkas.
10. Kedua orang tua penulis H. M. Yahya Nawawi dan Alm. Suwarda terima kasih yang telah merawat penulis dari kecil hingga sekarang.
11. Saudara Penulis Hasbi Yahya sekeluarga, Muhiddin, dan Mukraman terima kasih atas doa dan dukungannya.
12. Tante Muna sekeluarga yang telah memfasilitasi penelitian penulis mengucapkan banyak terima kasih.
13. Terima kasih kepada Ilham Jaya Abdullah sekeluarga dan Muhammad Sakti Tahir yang telah berperan layaknya seorang kakak yang telah membantu menyelesaikan segala masalah penulis.
14. Sahabat-sahabat penulis Ahmad Amin Sulaeman, Akmal Hidayat SR, Andi Fitrah, Andi Sry Rahayu, Resky Amalia, Mufrihat yang telah berjuang bersama-sama.

15. Teman KKN penulis Nurul Fajar, Rahmat Ramadhan, Nur Qalbi Husain, Nurul Ariska, Sri Wahyuni, dan Siti Nurbina.
16. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan, Ikatan Alumni Madrasah Aliyah Perguruan Islam Ganra, Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng Rayon Ganra, Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng Kooperti UIN Alauddin Makassar atas pengalamannya.

Gowa, 20 Agustus 2021

Penulis



Muh. Jihad

Nim.60700115020



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB 1 Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan penelitian	3
D. Manfaat penelitian	3
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Kajian Al-Qur'an.....	4
B. Teori yang Relavan.....	6
C. Kajian Terdahulu.....	41
Bab III Metode Penelitian	
A. Waktu dan Tempat.....	46
B. Materi Penelitian.....	46
C. Pemeliharaan	47
D. Rancangan penelitian.....	48
E. Parameter Penelitian.....	48
F. Analisis Data	49
Bab IV Hasil dan Pembahasan	
A. Hasil	50
B. Pembahasan	50
Bab V Penutup	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57




DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
1	Konsumsi Pakan Kelinci	13
2.	Kadar Kolesterol daging kelinci dengan daging ternak lainnya	28
3.	Kadar Gizi Kelinci dengan ternak lainnya	28
4.	Kandungan unsur-unsur dalam kotoran dan urine kelinci	30
5.	Estimasi kandungan Nutrisi Kangkung segar per 100 gr	46
6.	Estimasi kandungan Nutrisi Ampas Tahu per 100 gr	47
7.	Estimasi kandungan Nutrisi Kangkung segar dan Ampas Tahu per 100 gr..	47
8.	Rataan Konsumsi pakan, pertumbuhan bobot badan, dan konversi pakan	50



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.	Kelinci Anggora.....	19
2.	Kelinci Rex Harleyquin.....	19
3.	Kelinci Lop.....	20
4.	Kelinci Dutch.....	21
5.	Kelinci Polish	22
6.	Kelinci New Zealand	23
7.	Kelinci Nederland Dwarf.....	23
8.	Kelinci Satin	24
9.	Bagan Proses Pembuatan Tahu.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Uraian	Halaman
1.	Pemeliharaan Kelinci	58
2.	Hasil Uji Statiski (Anova) dan Uji Lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT).....	59



ABSTRAK

Nama : Muh. Jihad
Nim : 60700115620
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul Penelitian : Substitusi Ampas Tahu pada Level yang Berbeda terhadap
Pertumbuhan Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan ampas tahu pada level yang berbeda terhadap pertumbuhan kelinci. Penelitian ini adalah berupa penelitian eksperimen dimana menggunakan 4 perlakuan pakan yaitu P0 (100% Kangkung), P1 (80% Kangkung + 20% Ampas Tahu), P2 (70% Kangkung dan 30%) Ampas Tahu, dan P3 (60% Kangkung + 40% Ampas Tahu) yang diberikan kepada ternak kelinci dengan masing-masing 4 ulangan. Parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu konsumsi pakan, pertumbuhan bobot badan, dan konversi pakan. data dianalisis menggunakan *one-way* ANOVA, jika Hasil menunjukkan pengaruh yang nyata ($P < 0,05$) maka dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT). Hasil dari penelitian ini menunjukkan rata-rata konsumsi pakan tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap tingkat konsumsi pakan kelinci, namun pada rata-rata pertumbuhan bobot badan dan konversi pakan berpengaruh sangat nyata ($P < 0,01$). Perlakuan pakan paling baik diperoleh pada P3 (60% Kangkung + 40% Ampas Tahu) yang menunjukkan pertumbuhan bobot badan tertinggi yaitu $11,73 \pm 1,22$ gram/ekor/hari dengan konversi pakan yang terendah yaitu $12,46 \pm 2,32$ gram/ekor/hari.

Kata Kunci: Ampas tahu, Kangkung, Kelinci, Konversi pakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Muh. Jihad
Nim : 60700115020
Department : Animal Science
Thesis Title : Substitution of Tofu Dregs at Different Levels for Rabbit Growth (*Oryctolagus cuniculus*)

This study aims to determine the effect of feeding at different levels on the growth of rabbits. This research is an experimental study which uses 4 feed treatments, namely P0 (100% Ipomea), P1 (80% Ipomea + 20% Tofu Dregs), P2 (70% Ipomea + 30% Tofu Dregs), and P3 (60% Ipomea + 40 % Tofu Dregs) which was given to rabbits with 4 replications each. The parameters observed in this weight study were feed consumption, body growth, and feed conversion. data were analyzed using one-way ANOVA, if the results showed a significant effect ($P < 0.05$), then proceed with the smallest significant difference test (BNT). The results of this study showed that the average feed consumption had no significant effect ($P > 0.05$) on the rabbit's feed consumption level, but the average body weight growth and feed conversion had a very significant effect ($P < 0.01$). The best feed treatment was obtained at P3 (60% Ipomea + 40% Tofu Dregs) which showed the highest body weight growth of 11.73 ± 1.22 grams/head/day with the lowest feed conversion of 12.46 ± 2.32 grams. /head/day.

Keywords: Tofu dregs, Ipomea, Rabbit, Feed conversion

ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha peternakan kelinci tidak terlalu berkembang pesat seperti usaha peternakan lainnya. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah pengetahuan tentang nilai ekonomi dari peternakan kelinci masih minim. Padahal kelinci berpotensi menyediakan daging yang lebih baik karena pertumbuhan dan reproduksinya cepat.. Kemudian daging kelinci relative rendah akan kolesterol. Kebutuhan pakan kelinci juga tidak bersaing dengan manusia karena tingginya efesiensi penggunaan pakan pada kelinci.

Kelinci memiliki potensi sebagai pemasok daging karena pertumbuhan dan perkembangbiakannya yang tinggi. Kelinci memiliki siklus perkembangbiakan 8 minggu dan dapat melahirkan 8-10 ekor anak serta bobot badannya mampu mencapai 2kg bahkan lebih. Seekor induk kelinci dengan berat 34 kg mampu menghasilkan karkas sebanyak 80kg setiap tahun. (Farel dan Raharjo, 1984)

Kelinci mudah dikembangbiakkan, dapat melahirkan 4-6 anak setiap tahunnya, biaya pemeliharaan yang rendah, tidak memerlukan area perawatan yang luas, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti kotoran dan hasil samping kulit. adalah keuntungan dari. Kelinci juga menghasilkan daging putih. Daging putihnya enak, kaya nutrisi dan kaya protein, namun rendah kalori, lemak dan kolesterol. (Kartadisastra, 2001).

Keunggulan dari kelinci yakni tingkat pertumbuhan yang tinggi, rasio konversi pakan yang efisien, waktu panen yang relatif cepat dan tidak

memerlukan tempat berkembang biak yang luas. Beberapa yang mempengaruhi pertumbuhan kelinci adalah breed, usia, jenis kelamin, bobot sapih, pakan, dan suhu lingkungannya. Daging kelinci merupakan daging yang berwarna putih dengan serat yang halus, lembut, tinggi protein, rendah lemak, kolesterol dan kalori (Hernandes, 2001).

Menurut (Rasyaf 1996), pakan dijadikan faktor terpenting pada produksi ternak. Agar berhasil menghasilkan kelinci, Anda perlu mengonsumsi cukup protein, karbohidrat, lemak, vitamin, air, dan mineral. pakan yang disediakan berkualitas baik dan jernih untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kelinci. Di daerah tropis seperti Indonesia, pakan mungkin tersedia dalam bentuk berbagai kotoran seperti rumput, kacang-kacangan, dedak, singkong, dan ampas tahu yang dapat dijadikan sebagai pakan kelinci. Indonesia kaya akan hijauan dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pakan kelinci yakni berupa legum, rumput, dan limbah seperti onggok, dedak, ampas tahu, dan lain-lain.

Ampas tahu hasil dari limbah industri sayuran dapat dimanfaatkan sebagai pakan pengganti konsentrat kelinci dan banyak dimanfaatkan masyarakat. Residu dari tahu merupakan limbah industri dari produksi tahu dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan untuk kelinci. Daging buah tahu cukup kaya akan nutrisi. Ampas tahu juga kerap dijadikan sebagai pakan dalam upaya penggemukan karena lebih mudah didapatkan dan harga terjangkau.

Berdasarkan uraian di atas dilakukanlah sebuah penelitian tentang :

“Substitusi Ampas Tahu pada Level yang Berbeda terhadap Pertumbuhan Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)”.

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pemberian pakan ampas tahu pada level yang berbeda terhadap pertumbuhan kelinci?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui pengaruh pemberian pakan ampas tahu pada level yang berbeda terhadap pertumbuhan kelinci.

D. Manfaat Penelitian**1. Secara Teoritis**

Memberikan pengetahuan tentang pertumbuhan ternak kelinci berdasarkan kadar ampas tahu.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian masyarakat bisa mencoba kadar ampas tahu yang baik untuk menghasilkan produksi kelinci yang optimal

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan *Al-Qur'an*

1. Kajian *Al-Qur'an* tentang ternak

Maha suci Allah yang Maha Pencipta, tiada ciptaan Allah swt yang tidak mempunyai tujuan. Begitupun ternak sebagai ciptaan Allah swt tentu mempunyai manfaat yang banyak utamanya bagi manusia.

Allah swt berfirman dalam QS Al Mu'minin/23:21

[illegible]

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.(Kementerian Agama RI, 2018).

Jadi, menurut Tafzil Arazhar pada bagian di atas, hujan yang turun dalam jangka waktu tertentu juga hidup pada hewan-hewan sejenis kambing, unta,, kerbau, sapi, domba, dan bilibili. Anda bisa makan daging, minum susu, menggunakan bulu sebagai pakaian, menyamak kulit, dan menggunakannya sebagai kebutuhan seperti sepatu atau sandal. Dan kita juga bisa diangkat dan diangkut di belakang binatang kargo. Kendaraan utamanya adalah kuda, bagal, keledai, dan unta. Hewan ini mampu membawa kita untuk bepergian di suatu tempat. (Hamka, 1981).

Memperhatikan makna yang terungkap dalam kutipan dari Surah Alm, Minun ayat 21, kita dapat melihat betapa pentingnya sapi bagi kehidupan kita.. Semua makanan dari hewan seperti susu, telur, daging, dan madu bergizi dan penting bagi kehidupan manusia. Kemudian ternak dijadikan sumber penghasilan untuk tenaga kerja, tabungan, pengelolaan lahan, pembangkit biogas, alat transportasi, pupuk, maupun hewan peliharaan.

Memberi pakan ternak merupakan kewajiban bagi peternak. Ada banyak hadis tentang hukum memberi pakan ternak, ada sebuah kisah beliau yang diriwayatkan HR Al-Bukhari ; 5997, Muslim : 2318

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاسْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يُلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي. فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقَى فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

Artinya :

Ketika tengah berjalan, seorang laki-laki mengalami kehausan yang sangat. Dia turun ke suatu sumur dan meminum darinya. Tatkala ia keluar tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang sedang kehausan sehingga menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah. Orang itu berkata: “Sungguh anjing ini telah tertimpa (dahaga) seperti yang telah menimpaku.” Ia (turun lagi ke sumur) untuk memenuhi sepatu kulitnya (dengan air) kemudian memegang sepatu itu dengan mulutnya lalu naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah SWT berterima kasih terhadap perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasullullah, apakah kita mendapat pahala (bila berbuat baik) pada binatang?” Beliau bersabda: “Pada setiap yang memiliki hati yang basah maka ada pahala.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Bagi siapa yang mengasihi hewan akan mendapat ampunan, begitupun yang menzalimi hewan akan mendapat azab Allah swt, Rasulullah saw bersabda:

عَذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هَرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَائِشِ الْأَرْضِ


Artinya:

Seorang wanita disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu dia masuk ke neraka, (di mana) dia tidak memberinya makanan dan minuman ketika mengurungnya, dan dia tidak pula melepaskannya sehingga dia bisa memakan serangga yang ada di bumi.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Umar).

2. Kajian Alqur-an tentang Pakan

Allah swt telah memberikan kita banyak kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Allah swt juga telah menyediakan pakan kepada kita untuk diberikan kepada ternak kita.

Allah swt berfirman dalam QS An-Nahl/16:10



Terjemahnya:

“Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. (Kementerian agama RI, 2021)

Dari ayat diatas dapat kita lihat kenikmatan yang Allah swt berikan kepada kita salah satunya air hujan dari langit yang bisa menyuburkan tumbuhan untuk seperti kangkung dan kedelai (hasil samping olahan ampas tahu) yang bisa dijadikan pakan ternak salah satunya kelinci.

B. Teori yang Relevan

1. Kelinci

a. Taksonomi Kelinci

Menurut Damron (2003) taksonomi kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) secara ilmiah adalah

- a. Kingdom : Animal
- b. Pylum : Chordata (memiliki notochord)
- c. Sub phylum : Vertebrata (memiliki tulang belakang)
- d. Kelas : Mammalia (mempunyai kalenjar susu)
- e. Ordo : Logomorpha (gigi seri rahang atasnya 2 pasang)
- f. Famili : Leporidae
- g. Genus : *Oryctolagus*
- h. Spesies : *Oryctolagus cuniculus*

b. Asal-usul Kelinci

Kelinci berasal dari kata Belanda, yakni koninjte yang berarti “anak kelinci”. Ini membuktikan masyarakat nusantara sudah mengenal kelinci pada masa colonial, meskipun di pulau Sumatera memiliki satu spesies kelinci asli Sumatera (*nesulagus netchteri*) yang baru ditemukan pada tahun 1972 (Huda, 2020).

Pertama, kelinci adalah hewan liar yang menghuni Eropa dari Afrika. Penyebaran kelinci dimulai saat manusia mulai bermigrasi ke benua Asia dan Australia. Kelinci diperkenalkan ke Indonesia terkhusus Pulau Jawa sebagai ternak hias oleh Belanda pada tahun 1835 (Hustamin, 2006).

Kelinci liar (*Oryctolagus cuniculus*) tersebar dari Afrika Utara hingga Eropa. Ini adalah habitat alami mereka. Dari wilayah ini, kami diperkenalkan ke Australia, Selandia Baru, Chili pulau-pulau Pasifik dan Atlantik. Ukuran tubuhnya lebih kecil dari kelinci. Kelinci liar dewasa memiliki panjang 4.550 cm dan berat sekitar 3 kg Sarwono (2001).

Kelinci liar ini telah didomestikasi. Kelinci ini adalah satu-satunya *lagomorph* yang telah dijinakkan dan tersebar di seluruh dunia sebagai hewan

peliharaan. Melalui seleksi dan pemuliaan, kelinci-kelinci tersebut menghasilkan keturunan, ukuran varietas, dan manfaat yang berbeda-beda (Sarwono, 2001).

Ada 72 spesies kelinci potong dan kelinci hias yang tersebar di dunia. Kurang lebih 50 diantaranya telah ditemukan di Indonesia. Kelinci telah dibiakkan di Afrika selama berabad-abad dan dikatakan telah dibiakkan sekitar 10 abad yang lalu oleh penduduk Mediterania. Peternakan ini menyebabkan kelinci mengalami penyebaran ke negara-negara bagian Eropa utamanya Belanda, Rusia, Inggris, Prancis, Polandia, dan Jerman. Setelah negara-negara bagian Eropa bermigrasi ke setiap sudut peternakan kelinci di Amerika Serikat, Australia, dan Asia. Kelinci dibawa dari Eropa ke Amerika Serikat pada tahun 1800-an (Masanto dan Ali, 2010).

Kelinci Indonesia dikenal sebagai hewan peliharaan sejak tahun 1912 pada zaman Belanda dan ditenakkan oleh para peternak sejak tahun 1940-an sebagai usaha sampingan pupuk nabati dan produksi ternak. Pada tahun 1950 Bandung mulai mengembangkan peternakan kelinci sebagai sampingan. Pada tahun 1963, peternakan kelinci di sana dukungan bibit unggul dari Jepang, Belanda dan Jerman (Sarwono, 2001).

Ketika Jepang datang pada tahun 1942 dan melanjutkan revolusi dan perang kemerdekaan pada tahun 1950-an, keberadaan kelinci tidak lagi diasuh oleh pemilik tanah. Akhirnya dalam perkembangan selanjutnya, kelinci banyak ditenakkan oleh para petani di daerah pegunungan. Awalnya kelinci ditenakkan oleh warga sekitar perkebunan milik Belanda, kemudian dikembangkan oleh petani lain dan/atau diperdagangkan sebagai pupuk dan sumber daging untuk

sayuran dan tanaman hias. Usahatani yang dijalankan petani masih kecil (Sarwono, 2001).

Selain itu, sekitar tahun 1980 peternakan kelinci disubsidi oleh negara sebagai pemasok daging. Tetapi metode pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat belum berjalan mulus. Hambatannya 56% murni komersial, 22% untuk perbaikan gizi, dan sisanya untuk kesenangan (Sarwono, 2001).

c. *Data Biologis Kelinci*

Menurut Huda (2020) menyatakan bahwa data biologis kelinci ialah:

- 1) Siklus hidup : 5-10 tahun
- 2) siklus produksi : 1-3 tahun
- 3) Lama bunting : 4-5 minggu
- 4) Masa sapih : 6-8 minggu
- 5) Usia dewasa : 4-10 bulan
- 6) Usia kawin : 6-12 bulan
- 7) Calving interval : 7 hari lepas masa sapih
- 8) Siklus kelamin : poliesterus, 5x bunting setiap tahun
- 9) Siklus birahi : ± 14 hari
- 10) Periode estrus : 11-15 hari
- 11) Ovulasi : Saat kawin (9-13 jam setelahnya)
- 12) Fertilitas : 1-2 jam setelah kawin
- 13) Jumlah kelahiran : 4-10 ekor
- 14) Volume darah : 40 ml/kg bobot badannya
- 15) Berat dewasa : Beragam



d. *Ciri-ciri Fisik*

1) Badan

Menurut Priyatma (2011) kelinci memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya yakni sebagai berikut

- a) Kelinci kecil (small dwarf) ukuran rata-ratanya di bawah 1 kg.
- b) kelinci sedang (medium) pada saat dewasa memiliki ukuran bobot badan 1,8-3,3 kg dengan panjang antara 35-55 cm.
- c) kelinci jemis besar (giant) seperti flemish giant, berat normalnya antara 5,6-6,7 kg.

2) Telinga

Beberapa telinga kelinci merenggang keatas dan yang lainnya terkulai. Kelinci memiliki telinga yang berukuran besar dan memiliki banyak pembuluh darah. Sebab itu, jangan memegang bagian telinga kelinci saat ingin membawanya agar mereka tidak merasakan sakit. Kelinci betina memiliki telinga yang lebih besar dari telinga kelinci jantan. Beberapa kelinci menggantung di bawah dagu dan leher (Putra dan Budiana, 2006).

3) Gigi

Gigi kelinci tergolong unik. Gigi kelinci tetap tumbuh hingga masa usianya. Bila pertumbuhan gigi kelinci tidak diperhatikan giginya juga akan makin memanjang, untuk mengontrol pertumbuhan giginya, berilah pakan yang memiliki struktur yang keras misalnya ranting kering, jagung kering dan potongan kayu menjadi wahana buat mengasah kuku dan giginya. Kelinci hayati bebas di alam maka usahakan diberi ruang mobilitas yang memadai. (Putra dan Budiana).

Menurut Sarwono (2001) rumus gigi *Leporidae* yaitu:

$$\begin{array}{cccc} 2 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{array}$$

a) Gigi Rahang atas (8 pasang)

- (1) 2 pasang gigi seri
- (2) 0 pasang gigi taring (tak bertaring)
- (3) 3 pasang graham kecil
- (4) 3 pasang graham besar

b) Gigi Rahang Bawah (7 Pasang)

- (1) 1 pasang gigi seri
- (2) 0 pasang gigi taring (tak bertaring)
- (3) 3 pasang graham kecil
- (4) 3 pasang graham besar
- 4) Kaki

Kaki bagian belakang kelinci lebih kuat dan panjang dari kaki depan. Kaki bagian depan kelinci mempunyai 5 jari kaki dan cakar, dan kaki belakang memiliki 4 jari kaki dan cakar. Kelinci adalah hewan yang melompat, tetapi kelinci pengerat sangat pandai menyelinap ke dalam lubang dan bersembunyi, biasanya melarikan diri dari bahaya, sehingga lompatannya tampak kurang kuat dan kurang gesit. Kelinci sangat setia pada tempat persembunyiannya, karena mereka hanya berkeliaran ± 100 meter dari tempat persembunyiannya dan kembali ke tempat tinggalnya, di samping habitatnya (Sarwono, 2001)

5) Tulang

Seperti hewan lain pada umumnya, kelinci juga termasuk hewan bertulang

belakang atau disebut juga vertebrata. Tubuh kelinci dilengkapi sistem rangka yang berfungsi menopang dan menyangga tubuh, melindungi organ dalam, menempel pada otot, mendukung gerakan dan memberi bentuk pada tubuh. Namun, kelinci tergolong hewan yang memiliki tulang yang cukup lemah (Priyatna, 2019).

Rata-rata, tulang kelinci hanya memiliki berat 8,5% dari total berat badan. Sementara itu bobot tulang kucing sekitar 12%, dan anjing sekitar 16% dari bobot badannya. Karena itu kelinci harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Sebaiknya, hindari memperlakukan kelinci secara kasar dan usahakan kelinci jangan sampai terjatuh dari tempat yang tinggi. Pasalnya, benturan yang keras dapat menyebabkan patahnya tulang punggung dan tulang betis. (Priyatna, 2011).

6) Bulu

Umunya semua jenis kelinci memiliki bulu yang halus dan lembut. Dan tentu saja masing-masing jenis kelinci memiliki karakteristik bulu yang berbeda-beda. Seperti tingkat kehalusan dan kelembutan, ketebalan, tingkat kecemerlangan, dan ukuran panjang bulu (Priyatna, 2011).

Di pasaran ada dua jenis kelinci berdasarkan bulunya yakni kelinci berbulu panjang dan kelinci berbulu pendek. Kelinci berbulu pendek memiliki panjang bulu sekitar 2-4 cm, sedangkan kelinci berbulu panjang seperti angora dan fuzzy lop dapat mencapai 6-7 cm (Priyatna, 2011).

e. Pakan Ternak Kelinci

Menurut Esminger (1991) menyatakan bahwa kelinci membutuhkan bahan kering sebanyak yakni 5,4-6,2% dari bobot badan kelinci per hari.

Untuk meningkatkan bobot ternak kelinci pedaging bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan, total pemberian pakan perlu disesuaikan dengan keseimbangan pakan dan konsentrat. Peternak kelinci secara intensif biasanya diberikan pakan hingga 60-80%, sedangkan pakan konsentrat diberikan hingga 20-40% dari total pakan.(Priyatna, 2011).

Pakan kelinci harus mengandung bahan-bahan gizi dasar yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan seekor kelinci yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral (Hustamin, 2006).

Tabel 1. Komposisi Pakan Kelinci yakni:

Jenis Kelinci	Protein	Lemak	Serat	Abu
Pejantan yang aktif kawin, betina menyusui, betina bunting, anak-anak masa pertumbuhan	14-18%	3-6%	15-20%	5-6%
Pejantan tidak aktif, betina kering, anak-anak mulai dewasa	12-14%	2-4%	20-28%	5-6%

Sumber: James Blakely dan David H. Bade (1992)

Adapun jenis-jenis pakan kelinci yakni:

1) Hijauan

Hijauan adalah pakan utama kelinci yang diberi oleh peternak kelinci secara tradisional. Hijauan yang diberi berupa rumput lapang, limbah sayur (sawi, kangkung wortel, kaisim, wol, daun singkong), dan daun-daunan seperti (turi, lamptoro, kembang sepatu, kacang panjang, kacang tanah, ubi jalar, jagung, pepaya, talas), dan lain-lain (Girisonta, 2005).

Sebaiknya pemberian hijauan pada kelinci tidak dalam bentuk segar, tetapi kita layukan lebih dahulu supaya kadar airnya turun sehingga lebih mudah dicerna. Tujuan dari pelayuan yakni meningkatkan kadar serat kasar, dan mengurangi getah/racun yang bisa menimbulkan mencoret atau kejang pada ternak kelinci (Prasetyo, 2002)

Kelinci lokal mampu mengonsumsi hijauan dari daun-daunan maupun limbah sayur. Kelinci pedaging secara genetik yang berukuran besar mampu mengonsumsi pakan 1,5 kg/perhari. Ini adalah jumlah yang tepat karena sekitar 90% dari pakan terdiri dari air. Ketika diberi makan limbah kubis dan sayuran lainnya, limbah tersebut memiliki kadar air yang tinggi, yang menyebabkan kebocoran urin kelinci yang berlebihan (Sarwono, 2001).

2) Hay

Bahan dari hay berupa rumput gajah, setaria, tebu, maupun rumput lapang yang hampir memiliki bunga. Kelinci juga menyukai pakan dari daun kacang-kacangan yang telah dilayukan, kemudian dikeringkan menjadi hay. Pembuatan dan penyimpanan hay untuk persediaan pakan, lazim digunakan untuk peternak kelinci di negara-negara empat musim. Usaha ini pun dapat ditiru di Indonesia untuk menyediakan bahan pakan yang kontiniu dan stabil nilai gizinya (Girisonta, 2005).

3) Biji-bijian

Biji-bijian berperan sebagai pakan penguat. Pakan ini diutamakan kepada kelinci hamil dan menyusui. Jenis pakan yang diberikan adalah jagung, beras, sorgum, kedelai, gandum, kacang hijau, dan kacang tanah. Biji-bijian ini

ditumbuk atau digiling terlebih dahulu. Biji-bijian dapat diberikan 200-300 gram/ekor/hari (Girisonta, 2005).

Kelinci usia muda yang hanya diberikan pakan berupa hijauan, hingga usia 4 bulan bobotnya cuma sebesar 1,5kg, tapi bila ditambah pakan berupa dedak maupun biji-bijian, berat kelinci mampu mencapai kurang lebih 4 kg pada umur 4 bulan untuk kelinci New Zealand, California dan kelinci potong lainnya (Sarwono, 2001).

4) Ubi-umbian

Ubi jalar, ganyong, singkong, talas maupun umbi-umbian lainnya bisa diberi kepada kelinci sebagai bahan tambahan. Ubi yang memiliki racun yakni sejenis singkong tidak boleh diberi secara mentah, tapi harus diberi perlakuan yakni keringkan maupun direbus terlebih dahulu menjadi gaplek. Gaplek disediakan dalam bentuk telah ditumbuk (Hustamin, 2006).

5) konsentrat

Pakan konsentrat digunakan untuk meningkatkan kandungan gizi dari pakan dan memfasilitasi pasokan pakan. Pakan konsentrat berupa ransum diberi sebagai pakan tambahan dan konsentrat jika pakan utama berupa serat kasar. Konsentrat kelinci dapat berupa dedak padi, bungkil kelapa, ampas tahu, tepung kacang tanah, ampas tapioka, maupun singkong (Prasetyo, 2002).

f. Kandang Ternak Kelinci

1) Syarat Kandang

Syarat utama dalam membangun sebuah kandang adalah sumber air terjangkau, lokasi sejuk (suhu 15-20° C), lembab (60-90%), dan aman dari gangguan predator (Hustamin, 2006).

Menurut Hustamin (2006) syarat utama kandang adalah :

- a) Kandang mendapatkan sinar matahari yang sesuai. Karenanya, sebaik kandang menghadap ke arah timur, sehingga sinar matahari pada pagi hari bisa masuk. Panas dari matahari mampu membunuh kuman penyakit.
- b) Temperature di dalam kandang harus dingin agar kelinci tahan dan produktif. Temperature optimumnya 15-20°C dan kelembaban 60-90%. Jika temperature kandang panas nafsu makan kelinci menurun, kondisi badan menjadi buruk, perkembangbiakan mengendur-endur, bahkan tak subur atau mandul sementara.
- c) Kandang kelinci harus memiliki ventilasi untuk mengatur pertukaran udara dari dalam ke luar kandang maupun dari luar ke dalam kandang. Dengan ventilasi, udara yang kotor, bau, dan lembab dapat segera tergantikan oleh udara dari luar yang bersih. Ventilasi juga membuat kelinci tidak terkena aliran angin langsung yang bisa menurunkan kondisi tubuhnya.
- d) Idealnya kandang kelinci harus jauh dari rumah (minimum 10 meter) agar bau dan kotorannya tidak mengganggu.
- e) Lokasi kandang harus tenang dan terhindar dari berbagai predator, suara hikuk pikuk, serta suara yang keras.

2) Ukuran kandang

Ukuran kandang berdasarkan dari model kandang dan ukuran dari kelinci yang dipelihara. Luas kandang untuk satu ekor kelinci dewasa minimal 0,18 m²/kg bobot badannya. Kandang dengan ukuran panjangnya 90-150 cm, lebarnya 50-75 cm, dan tingginya 50-60 cm untuk seekor kelinci dewasa (Hustamin, 2006)

3) Model kandang

a) Kandang Panggung

Kandang panggung terletak di atas tiang dengan tinggi 60-100cm . lantainya terbuat dari kawat dengan ukuran dari lubang-lubangnya sekitar 2 cm², sehingga fesesnya bisa langsung turun ke bawah (Hustami, 2006).

Menurut Hustamn (2006) ada 3 model kandang panggung yakni sebagai berikut:

(1) Model Individual

Ruangan kandang disekat-sekat dan hanya diisi satu ekor kelinci.

(2) Model bertingkat (baterai)

Tiap kandang cuma diisi seekor kelinci. Jika diisi kelinci betina, kandang baterai digunakan untuk melahirkan maupun mengasuh anaknya. Jika diisi pejantan, kandang ini digunakan untuk mengawini betina. Bisa juga digunakan oleh anak kelinci lepas sapih sebagai tempat pembesaran kelompok.

Jenis kandang baterai ada 3, yaitu *fladetch battery* (berjajar), *tier battery* (bertingkat) dan *pyramidal battery* (susun pyramid).

(3) Model kelompok (postal)

Kandang ini bisa diisi beberapa ekor kelinci, biasanya diisi kelinci jantan, kelinci betina, beserta anak-anaknya, atau kelinci dengan umur dan besarnya yang sama. Kandang kelompok biasa digunakan untuk pembiakan, biasanya diisi 4-6 ekor induk betina. Ukuran ideal kandang kelompok adalah 400 x 200 x 55 cm.

b) Model Kotak

Kandang model kotak tidak berkaki, dapat pindah, dan dapat disimpan di mana saja. Lantainya bisa tanah secara langsung atau kayu yang diatur dengan jarak 2 cm. karena tidak berkaki, maka kebersihannya harus dijaga setiap hari.

c) Model Kandang beralas tanah (*Ranch*)

Modelnya seperti rumah kecil yang dilengkapi pagar keliling dengan fondasi minimum 50 cm di dalam tanah.

g. Tipe-tipe Kelinci

1) Kecil (*Small breeds*)

Bobotnya sekitar 0,9-2 kg dengan dewasa kelamin tergolong cepat yakni 4-6 bulan. Contohnya yaitu dutch, lop dwurf, netherland dwurf, dan lainnya

2) *Medium (Medium breeds)*

Bobotnya sekitar 2-4 kg, dewasa kelamin yakni sekitar 7-8 bulan. Contohnya yaitu California dan Carolina, Champagne d'argent, English spot dan lainnya.

3) Berat (*Giant breeds*)

Bobotnya sekitar 5-8 kg. dewasa kelamin yakni umur sekitar 10-12 bulan. Contohnya chered giant, Flemish giant, flamsereus dan giant chilchilla.

h. Jenis-jenis Kelinci yang Dibudidayakan

1) Angora

Ras Angora adalah ras yang berbulu tebal halus dan kuat. Oleh karena itu, banyak varietas Angora dibiakkan terutama untuk produksi wol.




Gambar 1. Kelinci Angora (Sumber: Sarwono, 2001)

Jenis Angora terbagi dua yaitu angora prancis dan angora inggris.

Angora prancis memiliki buluh lebih lembut, halus, dan pendek dibandingkan dengan angora inggris (Hustamin, 2006).

Bobot badan angora mampu mencapai 2,7 kg. Bulunya berwarna putih, abu-abu, atau coklat. Kelinci angora juga kerap disebut lion. Hal itu disebabkan karena bentuk dari mukanya yang menyerupai singa (*lion*). Kelinci ini memiliki bulu yang lebat dari kepala hingga kaki. Adapun juga jenis lain yaitu angora satin dan angora giant (Hustamin, 2006).

2) Rex



Gambar 2. Kelinci Rex Harleyquin (Sumber: Hustamin, 2006)

Kelinci rex, seperti beludru, mempunyai struktur bulu yang amat halus, tebal, padat, dan berkilau. Bobot badannya hingga 3,6 kg Proporsi tubuhnya bagus, dengan punggung membulat, kaki belakang, kepala lebar, telinga tegak dan

tulang kuat. Kelinci jenis Rex ini pada dasarnya adalah kelinci Mutasui dan sangat rentan terhadap penyakit biasanya disebabkan oleh perkawinan sedarah (Hustamin, 2006).

Rex hadir dalam berbagai warna, tetapi variasi warna di Rex sangat menarik untuk diperhatikan orang. Rex berwarna hitam (*black rex*), putih polos (*white rex*), merah muda ungu (*lilac rex*), biru (*blue rex*), coklat emas (*nutria rex*), merah kuning emas (*orange rex*). Terdiri dari , Hitam kecoklatan (*Havana Rex*), Bintik Hitam (*Dalmation Rex*), Hitam Oranye (*Harley Kin Rex*), Siam (*Sham Sable Rex*), Papillon (Titik Inggris).

3) Lop



Gambar 3. Kelinci Lop (Sumber: Sarwono, 2001)

Varietas lop besar, berat, dan kuat.. Varietas ini mempunyai satu ciri: kuping kendur atau kuping kendur. Lop terdiri atas Lop inggris (*English*), Lop Belanda (*Dutch*), Lop Prancis (*French*), Lop Fuzzy Amerika (*American Fuzzy*), dan Mini Lop (Hustamin, 2006).

English rop adalah konstruksi kokoh yang beratnya mencapai 4 kg. Kulit tebal, kepala lebar, mata hitam dan tajam. Telinganya tipis dan kulitnya dapat diraba (Hustamin, 2006).

Bulu Holland lop tebal tapi pendek. Wajahnya bulat dan hidungnya mancung. Bulu hitam, cokelat, atau putih French Lop yang terbilang pendek, kuat dan membungkuk. Bulunya berwarna hitam dengan hidung yang berbentuk cembung. Tipe ini dicirikan oleh leher rotan. American Fuzzy Lop, sebaliknya, memiliki ciri rambut yang tengkuk (Hustamin, 2006).



Gambar 4. Kelinci Dutch (Sumber: Sarwono, 2001)

4) Dutch

Jenis dari kelinci ini tidak sukar dikenal karena hanya memiliki dua tipe warna tubuhnya yang berbeda, dengan kata lain warna putih dari leher ke punggung hingga kaki depan dan ujung kaki. Bagian belakang dan kepalanya hitam, coklat, atau abu-abu. Ras ini berasal dari belanda. Bobot badannya sekitar 2,5 kg. sifat keibuan dari kelinci ini lebih baik dari jenis kelinci yang lain. Dutch ini menyusui anaknya secara merata dan mau menyusui anak dari kelinci jenis lainnya (Hustamin, 2006).

Kelebihan kelinci dutch yang lainnya adalah jika dijadikan dijadikan indukan, warnanya akan diwariskan secara dominan kepada anak-anaknya, meskipun dikawinkan dengan kelinci jenis lainnya (Hustamin, 2006).

Ciri lain dari dutch adalah moncong ke belakang dan dahi berwarna putih. Serta kaki belakangnya memiliki warna hitam dan ujung kakinya berwarna putih. Selain itu ada juga yang mempunyai tiga jenis warna sekaligus, beberapa berwarna putih dengan campuran warna coklat, hitam, dan abu-abu (*Tricolored dutch*) (Hustamin, 2006).

5) Polish



Gambar 5. Kelinci Polish (Sumber : Sarwono, 2001)

Kelinci polish ini sering juga disebut kelinci pole. Bulunya berwarna hitam, coklat, dan putih. Mata kelinci polish berwarna biru dan merah. Kepala dan bagian belakang bulat dan berbadan penuh 1,5 kg. ras ini dikenal dipenjuru inggris dan amerika (Hustamin, 2006).

Ada dua jenis kelinci polish, yaitu English polis dan American polish. English polis memiliki muka seperti kucing, berperawakan kecil padat, mata berwarna merah, bulu sangat halus, sangat peka, dan gesit. Sementara amerikan polish memiliki bentuk menyerupai dwurf. Kepalanya membulat, tetapi badannya padat (Hustamin, 2006).

6) New Zealand



Gambar 6. Kelinci New Zealand White (Sumber: Hustamin , 2006)

Ras ini terdiri atas New Zealand white, new zealan black, new Zealand red. New Zealand white lebih dominan ditenakkan sebab memiliki bulu putih mulus, tebal, padat dengan mata yang khas berwarna merah (Hustamin, 2006).

New Zealand red berasal dari persilangan golden fawn sport, Flemish giant, dan belian hare. Bulunya berwarna merah bata. Memiliki ciri khas yakni bulu tipis putih dilingkaran matanya seolah-olah kelinci tersebut menggunakan kaca mata dan warna matanya merah kecoklatan. Kelinci new Zealand black memiliki bulu berwarna hitam dengan karakter dan ciri khas yang sama dengan kelinci new Zealand red dan new Zealand white (Hustamin, 2006).

7) Nederland dwarf



Gambar 7. Kelinci Nederland dwarf (Sumber: Hustamin , 2006)

Nederland dwarf adalah kelinci terkecil pada global yg asal menurut Belanda menggunakan bobot mulai 0,9 kg. Struktur tubuh yang pendek, kepala nya bulat, matanya warna merah, dengan telinganya yang tegak. Bulu yang manis menggunakan aneka variasi rona (terdapat 30 tipe rona). Warna yang sangat generik adalah putih, sable, marten, bimalayan, dan agouti. Tetapi yg paling populer merupakan rona putih (Hustamin, 2006).

8) Satin



Gambar 8. Kelinci Satin Coklat (Sumber: Hustamin ,2006)

Kelinci satin biasanya kembangbiakkan untuk dimanfaatkan bulunya. Cirinya, warna bulunya tebal dan mengkilat. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bagi siapapun yang tertarik untuk memelihara hewan peliharaan di rumah. Orang tua memiliki berat hingga 3,35 kg. Tubuhnya yang panjang dengan kepala yang lebar, leher yang pendek dan telinga yang lebar serta seimbang dengan tubuhnya. Kakinya lurus dan kukunya hitam pekat. Variasi satin meliputi putih, krem, hitam, biru, California, merah, chinchilla, coklat, tembaga dan palsu (Hustamin, 2006).

i. Pertumbuhan Kelinci

1) Pengertian pertumbuhan

Pertumbuhan adalah perubahan berat, struktur, dimensi, dan ukuran tubuhnya, maupun perubahan komposisi tubuh, termasuk berubahnya komponen dan organ tubuh (Soeparno, 2009).

Anggorodi (1990) mengatakan bahwa pertumbuhan meliputi berubahnya struktur dan bobot jaringan penyusun misalnya tendon, jantung, tulang, otak, maupun jaringan tubuh yang lain (tidak termasuk jaringan adiposa) dan organ. Mula-mula pertumbuhan berjalan secara perlahan, lama-kelamaan dipercepat, kemudian secara bertahap akan melambat, dan jika sudah mencapai kematangan maka akan berhenti (Tillman et.al., 1998).

Murti (2002) mengatakan bahwa pertumbuhan ternak berubah-ubah pada beberapa tahap perkembangan. Pertumbuhan prenatal terbagi 3 periode: a) zigot, b) embrionik, dan c) janin atau fetal. titik pertumbuhan ternak postnatal (postnatal) memiliki tahapan cepat dan lambat. Sebelum pubertas pertumbuhan relatif cepat dan akan melambat setelah melewati masa pubertas batas antara kedua tahapan tersebut merupakan titik balik atau disebut dengan titik balik (Samplena, 2013).

Pola dari pertumbuhan dari ternak bergantung pada cara manajemennya, Ketersediaan nutrisi, iklim, dan kesehatan. Pertambahan berat badannya dipengaruhi oleh usia, genetik, lingkungan, dan bobot badan pada awal periode penggemukan berhubungan dengan berat badan dewasa (Wodzicka Tomaszewska et al., 1993).

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kelinci

a) Bangsa.

Pertumbuhan adalah perubahan berat, dimensi, bentuk, dan ukuran tubuh, termasuk perubahan komponen tubuh, termasuk berubahnya komposisi (Soeparno, 2009).

Jenis kelinci adalah sekelompok kelinci dengan karakter eksternal yang bisa dikenali dan diidentifikasi yang membuat mereka berbeda dari segi fisik pada kelompok lain namun spesiesnya masih sama. Pada kondisi dan kontrol lokal yang sama, perbedaan breed merupakan faktor yang mempengaruhi penampilan induk kelinci. Breed sapi besar lahir lebih berat, tumbuh lebih cepat dan lebih berat dari breed sapi kecil (Sarwono, 2001).

b) Jenis kelamin

Laju pertumbuhan kelinci juga dipengaruhi oleh jenis kelaminnya, dan adanya androgen biasanya menyebabkan ternak jantan lebih cepat tumbuh dari pada ternak betina dengan usia yang sama. Androgen adalah hormon seks yang mengandung beberapa hormon pengatur dan stimulasi pertumbuhan. Androgen diproduksi oleh sel intertestikular dan kelenjar adrenal, dan salah satu androgen steroid adalah testosteron, yang diproduksi oleh testis. Semakin banyak testosteron yang Anda keluarkan, semakin banyak androgen yang Anda keluarkan. Hormon kelamin jantan ini mempercepat pertumbuhan sapi jantan dari pada ternak betina, utamanya saat munculnya ciri-ciri seksual sekunder pada sapi jantan (Sarwono, 2001).

c) Umur

Pertumbuhan kelinci terbagi atas lima tahap menurut umurnya. Tahap pertama saat penyapihan saat kelinci mencapai 40 hari, tahap kedua saat kelinci mencapai 100 hari, tahap ketiga pada masa remaja, tahap keempat saat umur kelinci mencapai 140 hari keseimbangan hormonalnya, dan tahap kelima adalah 200 hari. Mencapai usia, dewasa (Sarwono, 2001).

j. Manfaat ternak Kelinci

1) Daging

Kualitas daging kelinci lebih bagus dari daging sapi, kambing, dan domba. Postur dagingnya lebih halus menggunakan rona dan stuktur yang serupa daging ayam (Kartadisastra, 1997)..

Sebagai sumber gizi, daging kelinci mempunyai kadar protein yg lebih tinggi dibandingkan daging ternak lainnya misalnya sapi, domba, kambing, ayam, atau babi, & pula kandungan lemak dan kolesterolnya lebih rendah (Kartadisastra, 1997).

Menurut Sarwono (2001), daging kelinci hampir sama dengan daging kambing, tetapi keunggulan daging kelinci adalah kadar protein yang tinggi disertai kadar lemak yang rendah.

Tabel 2. kadar kolesterol dari daging kelinci dengan daging ternak yang lain:

Jenis daging	Kadar Kolesterol (Asam Lemak)	
	Jenuh (%)	Tak Jenuh (%)
Kelinci	39	61\
Ayam	34	66
Itik	30	70
Kambing	61	39
Domba	59	41
Sapi	50	50

Sumber: Food, The Year Book of Agriculture

Tabel 3. Kadar gizi daging kelinci dengan ternak lainnya

Jenis daging	Protein (%)	Lemak (%)	Kadar Air (%)	Kadar Kalori (%)
Kelinci	20,8	10,2	67,9	7,3
Ayam	20,0	11,0	67,6	7,5
Anak sapi	18,8	14,0	66,0	8,4
Kalkun	20,1	28,0	58,3	10,9
Sapi	16,3	22,0	55,0	13,3
Domba	15,7	27,7	55,8	13,1
Babi	11,9	40,0	42,0	18,9

Sumber: Shaver (1981) dan dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ternak

Kandungan protein yang tinggi dan asam lemak tidak jenuh daging kelinci sehingga mampu menjaga ketahanan jaringan tubuh, menciptakan sel-sel, dan mempertinggi kecerdasan otak. Daging kelinci sangat baik untuk pertumbuhan anak, khususnya balita (Sarwono, 2001).

Daging kelinci memiliki serat yang halus dengan cita rasanya yang lezat. Kadar airnya lebih tinggi (67,9%) dari daging sapi (55,0%), ayam (67,6%), dan domba (55,8%). Kemudian memiliki kadar lemak 75 gr/kg yg sebagian akbar pada bentuk nir jenuh. Kadar kolesterolnya 1,39 mg/kg. kandungan natriumnya hanya 399 mg/kg (Sarwono, 2001)

2) Kulit

Kulit kelinci sangat baik digunakan sebagai bahan pembuatan topi, baju, hiasan dinding, tas, sepatu, serta alas atau pelapis perabot rumah tangga (Kartadisastra, 1997).

Berdasarkan strukturnya, kulit kelinci terdiri dari tiga lapisan yaitu: dermis, epidermis, dan vel (Kartadisastra, 1997).

Dermis adalah bagian utama kulit, merupakan jaringan serat yang kuat. Terbuat dari sejenis protein yang disebut collagen. Dermis tersebut bertaut pada bagian yang lain yaitu vel. Sedangkan bagian luarnya dilapisi oleh semacam selaput yang berstruktur keras, elastis, dan kuat yang disebut epidermis. Selaput ini terbuat dari bahan sejenis keratin. Berfungsi sebagai pelindung dermis, serta tempat tumbuh bulu-bulu yang bertaut pada kantong-kantong bulu yang disebut folikel. Ada dua macam folikel yaitu folikel besar dan folikel kecil. Folikel besar berfungsi memproduksi bulu penjaga, yaitu bulu-bulu yang tumbuhnya lebih panjang, kasar, dan tebal. Folikel kecil berfungsi memproduksi bulu-bulu yang lebih pendek, halus, dan lembut, yang disebut regulator (Kartadisastra, 1997).

3) Kotoran dan Urine

Kotoran dan urine kelinci mengandung unsur potensial tinggi, sebagai bahan baku teknik terapan untuk pembuatan kompos, biogas, pupuk tanaman bunga, serta untuk pertumbuhan jamur dan cacing tanah (Kartadisastra, 1997).

Table 4. kandungan unsur-unsur dalam kotoran dan urin kelinci

Unsur	Asal kotoran	
	Kelinci muda(%)	Kelinci dewasa(%)
Bahan kering	55,3-67,5	44,6
Protein	10,0-12,7	17,2
Lemak	1,6-3,0	2,3
Serat kasar	30,9-37,7	32,0
BETN	40,7-43,6	38,9
Fosfor(P)	0,4-1,3	1,1
Kalium(K)	0,4-1,0	0,5
Kalsium(Ca)	0,6-1,7	1,6
Belerang(S)	0,2	0,4
Abu	8,5-8,6	9,6

Sumber: Klause (1985)

k. Potensi kelinci

Karena kelinci adalah ternak yang relatif besar dalam kurun waktu yang singkat, masyarakat setempat diharapkan mengonsumsi protein hewani, serta kelinci musim semi dan satin, terutama Rex dan kelinci satin. Nilai komersial yang tinggi sebagai bahan pakaian yang dapat menggantikan bulu dari hewan liar semakin miskin. Karena sisi menarik dari daging kelinci yaitu kadar protein yang tinggi serta kolesterol rendah, daging kelinci dapat dijadikan sebagai daging yang sehat, tetapi dapat mengembangkan banyak kendala termasuk kesulitan pemasaran. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan hidup (kebiasaan gaya hidup) dan makna psikologis dengan asumsi bahwa kelinci adalah hewan dekoratif dan nikmat untuk mengonsumsi hewan dan daging dekoratif (Kartadisastra, 1995).

Menurut Elraffa (2004), kelinci memiliki kemungkinan sebagai produsen daging yang bagus. Hewan-hewan ini adalah hewan herbivora non-ruminansia dengan perut sederhana (tunggal) dengan pengembangan sepat, seperti mengenali perangkat pencernaan. Kelinci mungkin dapat mengembangkan daging, kulit,

musim semi, hewan percobaan dan produsen perawatan. Kelinci mampu memanfaatkan protein pada hijauan secara yang efisien, jumlah pakan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, reproduksinya cepat, dan menghasilkan kualitas daging yang cukup baik.

Kelinci mempunyai beberapa keunggulan yaitu, kadar lemak yang lebih sedikit, memerlukan banyak area pemeliharaan, dan dapat menyediakan bahan baku dari dapur yang tersisa dan produk sampingan produk pertanian (kulit / bulu), kepala, kepala, ayam, kotoran (*feses*) dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Biaya produksi yang murah, perawatan sederhana, dan 4 hingga 6 tahun kelahiran dapat dilewati setiap tahun, 4 hingga 12 tahun kelahiran (Kartadisastra, 1994).

Peternakan kelinci menjadi salah satu aset penghasilan petani yang amat berharga. Selain sebagai tabungan, kelinci dapat diproduksi dengan produk-produk olahan seperti bentuk makanan cepat saji seperti daging tinggi tombard dan kolesterol rendah dan akar trigo, sobek, panggang, sosis, hamburger dan bangsal kuda. Selanjutnya, sebagai produsen bulu (bulu), itu juga menghasilkan wol sebagai binatang di dunia kedokteran, dan harga penjualan yang relatif tinggi, kotoran, dan hewan favorit dengan urin sebagai tanaman tumbuhan mewah (imajinatif) tanaman dan pupuk bunga (Budiraharjo *et al.*, *et al.* 2009).

Hal yang menarik dari daging kelinci adalah banyak mengandung protein dengan rendahnya kadar kolesterol, sehingga dapat diiklankan sebagai daging yang sehat, tetapi karena daging kelinci belum dijual maka sulit untuk dijual, sehingga banyak hal yang harus dikembangkan. Saya memiliki cacat. Populer di

industri. Hal ini terjadi karena pola makan dan efek psikologi yang menganggap kelinci dijadikan hewan hias atau hewan peliharaan yang tidak layak dikonsumsi dagingnya (Budiraharjo, *et al.* 2009)

Kelinci dapat menghasilkan 50-60% daging per kg berat badannya. Di Malaysia, daging kelinci dihargai hingga Rp 125.000 per kg. Arab Saudi di kisaran Rp 175.000 hingga Rp 225.000 per kg. Indonesia hanya di kisaran Rp 15.000-30.000 per kg (Masanto dan Ali, 2010).

Keunggulan dari daging kelinci dari daging lainnya seperti daging sapi, ayam, kambing, dan domba adalah jauh lebih sedikit lemak dan kolesterol, namun kaya protein. Kelinci memiliki kandungan lemak hanya 8%, dibanding sapi, ayam, kambing dan babi masing-masing memiliki 24%, 12%, 14% dan 21%. Daging kelinci memiliki kandungan kolesterol kurang lebih 164 mg/100 gr, sedangkan daging ayam dan sapi memiliki kandungan kolesterol sekitar 164 mg/100 gr. Kurang lebih 164 mg/100 gr daging domba dan babi mengandung kurang lebih 220-250 mg/100 gr daging. Daging kelinci memiliki kadar protein hingga 21%, sedangkan ternak lainnya cuma 17-20% (Masanto dan Ali, 2010).

Karena kadar protein, lemak dan kolesterolnya, daging kelinci disebut sebagai daging yang sehat dan aman dan semakin diterima di pasaran. Selain diolah menjadi sate, beberapa pengusaha membuat variasi produk daging kelinci seperti: B. Daging cincang, bakso, burger, dendeng, guru, kornet, nugget, sate, sosis. Tujuan diferensiasi produk adalah untuk dikonsumsi oleh setiap langkah kehidupan. Padahal, daging kelinci olahan lebih mahal dari produk lain (seperti chicken nugget). Nugget kelinci bisa mencapai harga Rp 60.000 per kg. Harga

memang tinggi, namun sejauh ini respon konsumen sangat baik (Masanto dan Ali, 2010).

Kelinci menghasilkan banyak daging karena karakteristik profilnya. Kelinci berkembang biak dengan cepat dan melahirkan hingga 412 ekor per kelahiran. Kelinci bisa melahirkan 48 kali dalam setahun. Secara optimal, produksi daging sapi per tahun cuma 35%, kambing 53%, domba 63%, dan babi 1200%. Produksi daging kelinci yang baik dapat mencapai 2900% dengan pengendalian yang intensif. Dengan pengelolaan yang ekstensif, produksi kelinci mampu mencapai 390% setiap tahun. Lebih tinggi dari domba, kambing dan sapi. (Sarwono, 2001).

2. Pakan Kelinci

a. Kangkung

1) Pengertian Kangkung

Kangkung merupakan sayuran yang dapat dibudidayakan baik di air (rawa) maupun di darat. Ada dua jenis utama kangkung, kangkung dan kangkung, tergantung daerah budidaya kangkung. Kangkung tumbuh baik di daerah basah dan berair.

2) Taksonomi Kangkung

Menurut (Rukmana, 1994) kedudukan tanaman kangkung dalam tatanama (sistematika) tumbuhan diklasifikasikan ke dalam :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatopyta
Sub divisi	: Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae
 Family : Convolvulaceae
 Genus : *Ipomoea*
 Spesies : *Ipomea aquatic forsk*

3) Morfologi Tanaman Kangkung

a) Akar

Tanaman kangkung mempunyai akar tunggang dan semua cabang akarnya menyebar ke tanah ke segala arah dengan kedalaman 60-100 cm dan melebar secara datar dengan radius 100 cm-150 cm, utamanya tanaman jenis kangkung air (Rukmana, 1994).

b) Daun

Tangkai daun menempel pada batang, dan ketiak daun memiliki tunas yang mampu tumbuh menjadi cabang yang baru. Daunnya memiliki struktur seperti hati, dengan ujungnya yang lancip atau tumpul dan permukaan atas dengan warnanya hijau muda (Rukmana, 2004).

c) Bunga

Struktur bunga kangkung menyerupai terompet, dan kelopaknya warna keunguan (Rukmana, 1994).

d) Buah dan biji

Kangkung berbentuk lonjong dan terdiri dari tiga spesies. Biji kangkung berbentuk persegi atau bulat, berwarna coklat atau gelap dan mengandung dua biji. Biji kangkung berfungsi sebagai alat reproduksi dan reproduksi (Rukmana, 1994).

4) Kandungan gizi kangkung

Dari segi nutrisi, kangkung per 100 gram setara dengan 31 kkal kalori, 3,0 g protein, 0,3 g lemak, 7,3 g karbohidrat, 29 mg kalsium, 470 mg vitamin A, 0,05 mg vitamin B dan 90,9% air (Setiadi *et al.*, 1996).

b. Ampas Tahu

Proses dibuatnya tahu terbagi dari 2 proses yakni pembuatan susu kedelai, dilanjut dengan koagulasi protein dari susu kedelai, serta dapat dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan (Koswara, 1992).



Proses Pemotongan

↓
Tahu

Gambar 9. Kerangka Proses Pembuatan Tahu (Koswara, 1992)

3. Zat gizi Pakan

Menurut Mansur (2016), Zat Gizi Pakan terbagi atas 7 yakni karbohidrat, protein, lipid, vitamin, air, udara dan mineral.

a. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan zat organik dimana terdiri atas Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O₂) dengan jumlah yang berbeda.

Pada tumbuhan karbohidrat terbentuk dari proses fotosintesis yang didalamnya terjadi reaksi yang bahan dasarnya CO₂ dan H₂O.

Proses terjadinya fotosintesis:



Dalam reaksi fotosintesis, klorofil yang ada pada tanaman menyerap panas dari mentari untuk mengubah CO₂ dan H₂O menjadi karbohidrat.

Karbohidrat terbagi 4 berdasarkan jumlah dari molekulnya:

- (1) Monosakarida, gula sederhana
- (2) Disakarida, terdiri dari 2 molekul gula
- (3) Trisakarida, terdiri dari 3 molekul gula
- (4) Polysakarida, terdiri dari banyak molekul gula

b. Protein

Asal kata dari protein adalah “proteios” yang artinya “pertama” atau “utama”. Protein adalah senyawa organik yang strukturnya terdiri dari karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O₂), nitrogen (N), sulfur (S), dan fosfor (P). Kandungan

utama protein yaitu nitrogen. Rumus menghitung kandungan protein pada bahan adalah 6,25 kali dari kandungan nitrogennya ($N/Kg \times 6,25$).

c. Lemak

Lemak atau lipid yaitu sekumpulan zat-zat yang tidak mampu larut di dalam air namun dapat larut dalam eter, benzena, dan kloroform. Yang masuk ke dalam golongan lipid yaitu lemak, sterol, dan, fosfatida. Tapi bagian terbesar dari zat-zat dalam tubuh ternak adalah lemak. Lemak dan unsur-unsur lipid berperan penting pada tubuh hewan.

Tidak berbeda dengan karbohidrat, lemak juga terdiri atas zat-zat karbon (C), hidrogen (H) dan oksigen (O₂). Yang menjadi perbedaan adalah jumlah karbon dan hidrogennya lebih banyak dari karbohidrat.

Contoh: Sukrosa, C₁₂ H₂₂ O₁₁

Lemak, C₅₇ H₁₁₀ O₆

Lemak atau lipid terbagi atas:

- 1) Lemak sejati atau ikatan asam lemak yang berupa:
 - (a) lemak sederhana: ester asam lemak dengan alkohol seperti: Lilin dan minyak.
 - (1) Lilin: ester asam lemak dan alkohol selain gliserol.
 - (2) Lemak dan minyak: ester dari asam lemak dan gliserol.
 - (b) Lipid campuran atau kompleks: ester berasal dari asam lemak dengan kandungan zat fosfor (P), karbohidrat maupun protein sebagai penambah terhadap alkohol maupun asam lemak.

Contoh:

- (1) Fosfolipid, lipid memiliki kandungan asam fosfat
- (2) Glikolipid, terdiri dari asam lemak, karbohidrat, dan nitrogen

(3)Sulfolipid dan Aminolipid.

(4)Lipoprotein: Lemak yang terikat dengan protein biasa ditemukan pada jaringan tubuh dan darah

2) Pseudo lemak, adalah zat yang larut dalam eter
terdiri atas:

- (a) Vitamin yang larut di dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K
- (b) Hormon yang larut di dalam lemak yakni hasil dari karotin, kelenjar adrenal, dan, kelenjar kelamin.

d. Vitamin

Vitamin terbagi atas 2, yaitu vitamin yang larut di dalam air dan yang larut di dalam lemak:

- 1) Vitamin yang larut di dalam air yaitu vitamin B1, vitamin B2, Niasin, Asam pantotenat, biotin, asam folat, vitamin B6, vitamin B12, dan vitamin C.
- 2) Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, Vitamin E, dan vitamin K.

e. Air

Struktur dari air sangat sederhana, tetapi konsentrasinya adalah yang paling sulit dalam analisis langsung. Air amat berperan penting dalam menentukan nilai pakan, karena berpengaruh pada zat pakan. Karena ini terkait dengan fungsi utama air adalah sebagai pelarut, makanan berair memiliki kadar bahan pakan lain yang lebih rendah. Sebab itu untuk menentukan nilai suatu pakan seharusnya dihitung berdasarkan kandungan bahan kering bahan makanannya, bukan bahan makanan aslinya.

f. Mineral

Mineral berperan penting dalam pakan ternak. Dalam tubuh ternak terdiri atas 3-5% zat-zat mineral. Mineral tidak bisa dibentuk di dalam tubuh ternak, sehingga harus tersedia dalam pakan. Pemberian mineral harus pada jumlah yang cukup. Kekurangan maupun kelebihan kadar pemberian mineral akan mengganggu kesehatan ternak.

Mineral terbagi atas 2 macam, yaitu:

1. Mineral makro terbagi atas fosfor, kalsium, kalium, Chlor, dan natrium
2. Mineral mikro terbagi atas mangan, magnesium, besi, seng, tembaga, selenium, molibdenum, kobalt, Kromium, dan Iodium.

Beberapa unsur mineral yang berperan penting di dalam tubuh serta fungsinya:

1. Kalsium berfungsi:

- a) Esensial pada proses pembekuan darah.
- b) Natrium dan kalium berperan penting pada denyut jantung
- c) Berperan penting dalam pembentukan tulang dan gigi.

Akibat dari kekurangan kalsium yakni:

- a) Osteomalacia, adalah melunaknya tulang pada ternak dewasa..
- b) Milk fever, adalah penyakit pada sapi perah yang baru melahirkan, bisa mengalami kejang otot maupun kelumpuhan.

2. Fosfor berfungsi:

- a) Berperan dalam metabolisme lemak dan karbohidrat.
- b) Berperan dalam aktifitas sel.
- c) Mengatur keseimbangan antara asam dan basa.
- d) Sama halnya kalsium juga berperan dalam pembentukan tulang dan gigi.

Yang akan terjadi pada tubuh jika kekurangan fosfor adalah:

- a) Osetomalicia dan Rakhitis
- b) Reproduksi pada hewan betina menurun.
- c) Sendi dan otot menjadi kaku
- d) Laju pertumbuhan menjadi lambat

3. Khlorida (Cl) Fungsi:

- a) Mengatur pH di dalam darah.
- b) Mengatur tekanan osmosis di dalam darah.
- c) Mengaktifkan enzim amilase dan menyusun asam khlorida dari getah lambung.

Yang akan terjadi pada tubuh jika kekurangan chlor adalah:

- a) Menurunnya nafsu makan
- b) Laju pertumbuhan menjadi lambat
- c) Berat badan menurun
- d) Produksi rendah
- e) Bulu menjadi kasar

4. Natrium

Natrium berfungsi mengatur tekanan osmosis dan mengatur keseimbangan asam dan basa pada metabolisme karbohidrat.

Yang akan terjadi jika tubuh kekurangan natrium adalah:

- a) Laju pertumbuhan melambat.
- b) Kelunakan tulang
- c) Kornea menjadi bertanduk.
- d) Isi dari cairan plasma menurun.

5. Kalium berfungsi

- a) Mengatur tekanan osmosis di dalam darah dan menyeimbangkan kadar asam dan basa.
- b) Mempengaruhi sistem syaraf dan otot.

- c) Berperan penting dalam metabolisme karbohidrat.

Yang akan terjadi jika tubuh kekurangan kalium adalah:

- a) Hipokalemia yaitu lemahnya urat pada daging
- b) Lemah jantung
- c) Tubuli ginjal degenerasi

6. Magnesium berfungsi

- a) Mengaktifkan enzim.
- b) Memperkuat kerangka

Yang akan terjadi jika tubuh kekurangan magnesium adalah:

- a) Anorexia, nafsu makan menurun
- b) Titani rumput pada sapi
- c) Salivasinya berlebihan

C. Kajian Terdahulu

Penelusuran dari berbagai sumber di banyak literatur, jurnal, temuan, dan penelitian sebelumnya menemukan bahwa variabel yang diteliti menarik bagi banyak kelompok. Beberapa di antaranya menjelaskan relevansinya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Hafidz Rasyid (2009) “Performa Produksi Kelinci Lokal Jantan Pada Pemberian Rumput Lapang Dan Berbagai Level Ampas Tahu”. Eksperimen dilakukan untuk mengevaluasi pemanfaatan ampas tahu sebagai konsentrat pakan ternak. Limbah tahu tersebut berasal dari industri tahu lokal di desa. Mengandung protein, energi, mineral, dan serat kasar. Inilah alasan mengapa ampas tahu baik untuk hewan. Kelinci digunakan sebagai hewan percobaan. Empat pakan yang mengandung 20, 40, dan 60% ampas tahu dan satu konsentrat komersial diberikan kepada kelinci. Dua puluh ekor kelinci muda ($789 \pm 0,15$; CV = 10%) digunakan.

Hewan-hewan ini dibagi menjadi empat kelompok. Konsumsi pakan, PBBH, konversi pakan, dan kematian dicatat. Pengaruh pengobatan dipelajari dengan ANOVA. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perlakuan berpengaruh nyata pada pertambahan bobot badan harian dan konversi pakan

2. Eko Marhaeniyanto (2015), Sugeng Rusmiwati, dan Sri Susanti, “Pemanfaatan Daun Kelor Untuk Meningkatkan Produksi Ternak Kelinci New Zealand White”. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Peternakan Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang”. Tujuan penelitian untuk mengetahui suplementasi daun *Moringa oleifera* Lamm (MOL) dalam pakan basal (rumput dan pollard) terhadap asupan pakan, rata-rata pertambahan bobot badan harian dan ukuran serasah kelinci Metode yang digunakan adalah metode eksperimen secara acak. desain blok (RBD) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diuji adalah P0: rumput *Cynodon plectostachyus* + Pollard; P1: rumput *Cynodon plectostachyus* + (Pollard 90% + MOL 10%); P2: rumput *Cynodon plectostachyus* + (Pollard 80% + MOL 20%); P3: rumput *Cynodon plectostachyus* + (Pollard 70% + MOL 30%) Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan bahan kering pakan berkisar antara 98 - 120 g / ekor / hari ($\pm$ 4-5% dari BB berat badan) rata-rata harian gain (g / ekor / hari) P0, P1, P2 dan P3 masing-masing $9,69a \pm 1,77g$, $13,48ab \pm 3,05g$; $18,96b \pm 5,91g$ dan $19,83b \pm 7,21$ dan rata-rata ukuran serasah P0, P1, P2 dan P3 masing-masing adalah $6,25a + 0,95$; $6,75a + 0,50$; $7,50ab + 0,57$; $8,75b + 0,95$ Kesimpulan penelitian bahwa penggunaan daun *Moringa oleifera* Lamm sebagai pakan konsentrat kelinci New Zealand White betina dapat meningkatkan asupan pakan, pertambahan bobot

badan dan menambah ukuran serasah. Saran penggunaan serbuk daun Moringa oleifera Lamm berkisar antara 10 sampai 30% pakan konsentrat kelinci. Kata kunci: pakan, moringa oleifera, protein, rabbit

3. Singgih Aditya Saputro (2016), “Produksi Kelinci Hibrida New Zealand White Dengan Pemberian Hijauan Jagung Pada Media Tanam Yang Berbeda”. Kelinci jenis New zealand white adalah bangsa kelinci yang bertujuan sebagai produksi daging. Hijauan dari jagung bisa ditanam secara vertikultur yang bisa digunakan sebagai pakan berserat tinggi pada kelinci. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui produksi kelinci New zealand white yang diberi pakan hijauan dengan penanaman jagung selama 21 hari dengan teknik tanam yang beragam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 7 Maret – 4 April 2021, lokasinya di Dusun Mattoanging, Desa Salokaraja, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng.

B. Materi Penelitian

Kandang yang dipakai adalah kandang individu. Tiap kandang disediakan tempat pakan. Peralatan yang dipakai adalah alat kebersihan dan timbangan.

Kelinci yang digunakan adalah kelinci jantan lokal yang berumur 3-4 bulan dengan berat 1129-1599 gram sebanyak 16 ekor. Kelinci ini dipelihara selama 4 minggu dengan perlakuan yang berbeda.

Pakan yang diberikan adalah kangkung segar dan ampas tahu.

Tabel 5. Estimasi Kandungan zat gizi kangkung segar per 100 gr

ZaT Gizi	Jumlah
Protein	3
Lemak	0,3
Serat	1
Kalsium	0,73
Phospor	0,50
Kadar Air	89,7

Sumber: Astiawan, 2009

Tabel 6. Estimasi Kandungan Nutrisi Ampas Tahu per 100g

Zat Gizi	Jumlah
Protein Kasar	17
Lemak Kasar	5,62
Serat Kasar	23,4
Kalsium	0,55
Phospor	0,23
Kadar Air	14,08

Sumber: Bahar dan Sudolar, 2018

Tabel 7. Estimasi Kandungan Nutrisi Kangkung segar dan Ampas Tahu yang digunakan

Nutrien	Kandungan Nutrien (gram/100gr)			
	P0	P1	P2	P3
Protein Kasar	3	5,80	7,20	8,60
Lemak Kasar	0,3	1,36	0,21	0,18
Serat Kasar	1	5,48	0,70	0,60
Kalsium	0,73	0,69	0,51	0,44
Phospor	0,5	0,45	0,35	0,30
Kadar Air	89,7	74,58	62,79	53,82

Ket : P0 = Kangkung Segar 100%

P1 = Kangkung segar 80% + Ampas Tahu 20%

P2 = Kangkung segar 70% + Ampas Tahu 30%

P3 = Kangkung segar 60% + Ampas Tahu 40%

C. Pemeliharaan

Kelinci yang dipelihara dalam penelitian berjumlah 16 ekor. Jumlah kandang yaitu 16 dan kelinci dikandangkan secara individu atau 1 ekor 1 kandang. Pemberian pakan pada kelinci sebanyak 2 kali sehari yakni pada pagi pukul 07.00 WITA dan sore pukul 15.00 WITA. air diberikan secara adlibitum. Penimbangan bobot badan dilakukan di awal penelitian kemudian dilanjutkan setiap minggu

hingga 4 minggu pemeliharaan. Jumlah pakan diberikan sebanyak 10% dari bobot badan.

D. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 kali perlakuan dan 4 kali ulangan

Perlakuan yang digunakan adalah:

P0 : 100% Kangkung

P1 : 80% Kangkung + 20% Ampas tahu

P2 : 70% Kangkung + 30% Ampas tahu

P3 : 60% Kangkung + 40% Ampas tahu

E. Parameter Penelitian

1. Konsumsi Pakan

Rumus konsumsi pakan adalah hasil jumlah pakan yang diberi dikurangi sisa pakan (g/ekor/hari) (Rasyid, 2009).

Konsumsi Pakan Segar = Pemberian pakan – sisa dari pakan

2. Pertambahan Bobot Badan

Rumus Pertambahan bobot badan adalah bobot badan akhir dikurang bobot badan awal dibagi lama pemeliharaan (Rasyid, 2009).

$$PBBH = \frac{\text{Bobot Badan Akhir} - \text{Bobot Badan Awal}}{\text{Lama Pemeliharaan}}$$

3. Konversi Pakan

Konversi pakan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi ternak dibagi dengan pertambahan bobot badan ternak dalam kurun waktu yang sama (Rasyid, 2009).

$$\text{Konversi Pakan} = \frac{\text{Konsumsi (gram)}}{\text{PBB (gram)}}$$

F. Analisis Data

Data yang didapatkan, dianalisa dengan menggunakan analisis sidik ragam (analysis of variance), jika terdapat perbedaan yang nyata dilakukan uji lanjut menggunakan uji beda nyata terkecil (BNT) (Steel dan Torrie 1991).



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan penelitian konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, dan konversi pakan kelinci selama 4 Minggu di dusun Mattoanging Desa Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng maka didapatlah hasil dari penelitian tersebut yakni sebagai berikut:

Tabel 8. Rataann konsumsi pakan, pertumbuhan bobot badan, dan konversi pakan selama pemeliharaan kelinci (28 Hari)

Variabel	Perlakuan				Nilai P
	P0	P1	P2	P3	
Konsumsi (gram/ekor/hr)	148,25±16,20	146,06±14,65	145,31±15,14	144±11,81	P>0,05
PBB (gram/ekor/hari)	6,09±0,86 ^a	9,13±0,72 ^b	10,04±1,03 ^b	11,73±1,22 ^c	P<0,01
Konversi Pakan	25,07±6,35 ^a	16,02±1,10 ^b	14,71±3,04 ^b	12,46±2,32 ^b	P<0,01

Ket: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) dan sangat nyata (P<0,01)

B. Pembahasan

1. Konsumsi

Rata-rata konsumsi pakan ternak kelinci selama pemeliharaan dapat kita lihat pada table 4.1 dimana rata-rata konsumsi pakan P0, P1, P2, P3 tidak berpengaruh nyata (P>0,05). Hal ini disebabkan karena pakan yang diberikan tidak memiliki sisa pakan yang bisa ditimbang. Konsumsi pakan P0 yaitu 148,25±16,20, P1 yaitu 146,06±14,65, P2 yaitu 145,31±15,14, P3 yaitu 144±11,81 sesuai dengan pernyataan Esminger (1991) bahwa kebutuhan pakan

kelinci muda dengan bobot 1,8-3,2 kg perhari yakni 120-180 gr. Konsumsi pakan dipengaruhi oleh bobot badan ternak, jenis makanan, umur dan kondisi ternak, kadar energi dalam pakan stress, dan jenis kelamin (Parakassi, 1999).

2. Pertumbuhan Bobot Badan

Pertumbuhan bobot badan P0 yaitu $6,09 \pm 0,86$ gr/hari menunjukkan perbedaan yang sangat nyata ($P < 0,01$) terhadap P1 yaitu $9,13 \pm 0,72$ gr/hari, P2 yaitu $10,04 \pm 1,03$ gr/hari dan P3 yaitu $11,73 \pm 1,22$ gr/hari. Hal ini disebabkan karena asupan protein kasar P0 paling rendah yaitu 4,45%.

Pertumbuhan bobot badan P0 yaitu $6,09 \pm 0,86$ dan P1 yaitu $9,13 \pm 0,72$ berbeda dengan pendapat Lukehfar dan Cheeke (1999) bahwa penampilan dan produksi kelinci pada daerah teropis berkisar 10-20 gram/ekor/hari. Hal ini disebabkan karena asupan protein kasar P0 yaitu 4,45% dan P1 yaitu 8,47 tidak terpenuhi. Hal ini didukung pendapat James Blakely dan David H. Bade (1992) bahwa kebutuhan protein kelinci betina kering, pejantan tak aktif, dan anak-anak mulai dewasa berkisar 12-14%.

Pertumbuhan bobot badan P2 yaitu $10,04 \pm 1,03$ gr/hari sesuai dengan pendapat Lukehfar dan Cheeke (1999) bahwa penampilan dan produksi kelinci pada daerah teropis berkisar 10-20 gram/ekor/hari. Asupan protein kasar P2=10,46% hal ini menyimpang dari pendapat Blakely dan Bade (1992) bahwa kebutuhan protein kelinci betina kering, pejantan tak aktif, dan anak-anak mulai dewasa berkisar 12-14%. Penyimpangan ini disebabkan karena kandungan kadar air kangkung pada table 3.3 berkisar 89,7%, namun peneliti melayukan terlebih dahulu sehingga berat timbangannya turun dan proteinnya meningkat.

Pertumbuhan bobot badan P3 yaitu $11,73 \pm 1,22$ gr/hari sesuai dengan pendapat Lukehfar dan Cheeke (1999) bahwa penampilan dan produksi kelinci pada daerah teropis berkisar 10-20 gram/ekor/hari. Asupan protein kasar P3=12,38% hal ini sesuai pendapat James Blakely dan David H. Bade (1992) bahwa kebutuhan protein kelinci betina kering, pejantan tak aktif, dan anak-anak mulai dewasa berkisar 12-14%.

3. Konversi Pakan

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat Konversi pakan P0 menunjukkan perbedaan yang sangat nyata ($P < 0,01$) pada P1, P2 dan P3. Konversi pakan P0 yaitu $25,07 \pm 6,35$, P1 yaitu $16,02 \pm 1,10$, P2 yaitu $14,71 \pm 3,04$, dan P3 yaitu $12,46 \pm 2,32$. Rataan konversi pakan yang paling rendah adalah P3 yaitu $12,46 \pm 2,32$ namun belum memenuhi standar konversi pakan yang bagus. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Fitriyani (2006) menyatakan bahwa konversi pakan kelinci umur 2-3 bulan berkisar 6,45-10,06. Hal ini kemungkinan disebabkan karena umur kelinci berkisar 3-4 bulan dimana sudah hampir memasuki umur dewasa.

Berdasarkan hasil uji lanjut BNT, menunjukkan bahwa P0 dan P3 berbeda sangat nyata ($P < 0,01$). Dimana P0 nilai konversinya yaitu $25,07 \pm 6,35$ dan P3 nilai konversinya yaitu $12,46 \pm 2,32$. Perlakuan P0 merupakan perlakuan kontrol atau tidak diberi ampas tahu atau hanya diberikan pakan kangkung saja. Kebutuhan nutrient P0 tidak terpenuhi sehingga nilai konversinya sangat tinggi. Hal ini sesuai pendapat Rasyid (2009) bahwa konversi pakan yaitu perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan yang dicapai dalam kurun waktu yang sama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah:

1. Konsumsi pakan paling rendah diperoleh pada perlakuan P3 yaitu dengan perlakuan pakan 60% ampas tahu dan 40% kangkung. Sementara itu konsumsi pakan paling tinggi diperoleh P0 yaitu dengan perlakuan pakan hanya diberi pakan kangkung tanpa diberi pakan ampas tahu.
2. Pertambahan bobot badan terendah diperoleh pada perlakuan P0 dan tertinggi pada perlakuan P3.
3. Konversi pakan terendah diperoleh pada perlakuan P3 dan tertinggi pada perlakuan P0.

B. Saran

Sebaiknya pemberian pakan ampas tahu dan kangkung pada kelinci ditambahkan lagi konsentrat agar dapat menunjang pertambahan bobot badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aak. 1975. *Pemeliharaan Kelinci*. Kanisius. Yogyakarta.
- Almatsier. 2005. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Pt gramedia pustaka. Jakarta.
- Blakely, J dan D. H Bade. 1992. *Ilmu Peternakan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Buckle, K. A., R. A. Edwards. G. H. Fleet. M. Wooton. 1987. *Ilmu Pangan*. Terj. H. Purnomo. Adiono. Penerbit UI. Jakarta
- Budiraharjo, K, Handayani, M dan Setiyawan, H. 2009. *Potensi Ekonomi Usaha Ternak Kelinci dalam Menopang Sumber Penerimaan Keluarga di Kabupaten Semarang*. Tesis. Fakultas Peternakan, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Damron, M. 2003. *Klasifikasi Makhluk Hidup Mamalia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- El-Raffa, A, M. 2004. *Rabbit Production in Hot Climates*. J. 8th World Rabbit Congres.
- Esminger, M. E. 1991. *Animal Science*. 9th Editions. The Interstet Printers. And Publisher. Inc Deville. Illinois. USA.
- Esminger, M. E. J. Olfield and W.W. Heineman. 1990. *Feed and nutrition digestion* 2-ed. Esminger publishing company. California
- Farrel, D.J. dan Y.C.Raharjo. 1984. *Potensi Ternak Kelinci sebagai Penghasil Daging*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Hamka. 1981. *Tafsir Al-Azhar Juzu XVIII Surat Al- mu'minin ayat 1-118, Surat An-nur ayat 1-64, Surat Al-furqan ayat 1-77*. Yayasan Latimojong. Surabaya.
- Hernandez J a, rubio l m S. 2001. *Effect of Breed and sex on Rabbit Carcass Yield and Meat Quality*. Meat science labolatory. Mexico (MX): Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Universidad Nacional Autonoma de Mexico.
- Huda, Miftachul. 2020. *Sukses Beternak Kelinci*. New media
- Hustamin, Rudy. 2006. *Panduan Memelihara Kelinci Hias*. tanggapustaka. Jakarta

- Kartadisastra, H. R. 1994. *Pengelolaan Pakan Ayam*. Kanisius. Yogyakarta
- Kartadisastra, H. R. 1997. *Ternak Kelinci*, Teknologi Pasca Panen. Kanisius. Yogyakarta
- Kartadisastra, H.R. 1994. *Beternak Kelinci Unggul*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Kartasaputra dan martesetyo. 2005. *Ilmu Gizi*, Korelasi Gizi, Kesehatan, dan Produktivitas Kerja. Pt rineka cipta. Jakarta.
- Khotijah, Lilis dan dwi margi suci. 2017. *Panduan Beternak Kelinci*. Penebar swadaya. Jakarta
- Koswara, S. 1992. *Teknologi Pengolahan Kedelai*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Manjung, Endjang. 2016. *Nutrisi dan Makanan Ternak*. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
- Masanto, ryan dan ali agus.2010.*Beternak Kelinci Potong*.pt niaga swadaya.jakarta
- Parakassi. 1999. *Ilmu Nutrisi dan dan Makanan Ternak Ruminansia*. University of Indonesia Press. Jakarta.
- Prasetyo, S. 2002. *Antara Hobi dan Bisnis Ternak Kelinci Bisa Menghasilkan Devisa*. Sinar harapan
- Priyatna, Nuning. 2011. *Brternak dan Bisnis Kelinci Pedaging*. Pt agro media pustaka. jakarta
- Putra, G. M. dan N. S. Budiana. 2006. *Kelinci Hias*. Cetakan ke-1. Penebar Swadaya. Jakarta
- Rasyaf, M., 1996. *Memasarkan Hasil Peternakan*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Rasyid, Hafidz. 2009. *Performa Produksi Kelinci Lokal Jantan pada Pemberian Rumput Lapangan dan berbagai Level Ampas Tahu*. Instut Pertanian Bogor. Bogor.
- Rukmana, Rahmat. 1994. *Bertanam Kangkung*. Kanisius. Yogyakarta.
- Sarwono, B., 2001. *Kelinci Potong dan hias*. Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Setyaningrum, Hesti Dwi dan Cahyo Saparinto. 2011. *Panen Sayur secara Rutin di Lahan Sempit*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Tiilman, A. D., Hartadi, H., Reksohadiprodjo, S., Prawirakusumo, S. dan Lebdosoekojo, S. 1991 Ilmu Makanan Ternak Dasar. Gadjah mada university press fakultas peternakan ugm. Yogyakarta.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Pemeliharaan Kelinci



Lampiran 2: Hasil Uji Statistik (Anova) dan Uji Lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT)

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max
					Lower Bound	Upper Bound		
Konsumsi P0	4	148,2500	16,19928	8,09964	122,4733	174,0267	128,50	162,00
P1	4	146,0625	14,65204	7,32602	122,7478	169,3772	133,00	166,25
P2	4	145,3125	15,13739	7,56870	121,2255	169,3995	137,00	168,00
P3	4	144,0000	11,80572	5,90286	125,2145	162,7855	127,50	155,50
Total	16	145,9063	13,10180	3,27545	138,9248	152,8877	127,50	168,00
PBB P0	4	5,6825	,86017	,43008	4,3138	7,0512	4,90	6,60
P1	4	8,5175	,71867	,35934	7,3739	9,6611	7,90	9,47
P2	4	9,3675	1,03190	,51595	7,7255	11,0095	8,23	10,47
P3	4	10,9475	1,21897	,60949	9,0078	12,8872	9,33	12,10
Total	16	8,6288	2,15842	,53961	7,4786	9,7789	4,90	12,10
Konversi P0	4	26,8575	6,80376	3,40188	16,0312	37,6838	19,47	33,06
P1	4	17,1625	1,17758	,58879	15,2887	19,0363	15,92	18,61
P2	4	15,7575	3,25501	1,62751	10,5781	20,9369	13,16	20,40
P3	4	13,3475	2,48295	1,24147	9,3966	17,2984	10,96	16,66

Total	16	18,2813	6,40507	1,60127	14,8682	21,6943	10,96	33,06
-------	----	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-------

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Konsumsi	Between Groups	38.016	3	12.672	.060	.980
	Within Groups	2536.844	12	211.404		
	Total	2574.859	15			
PBB	Between Groups	58.460	3	19.487	20.474	.000
	Within Groups	11.421	12	.952		
	Total	69.882	15			
Konversi	Between Groups	422.059	3	140.686	8.733	.002
	Within Groups	193.314	12	16.109		
	Total	615.373	15			

ALAUDDIN
MAKASSAR

Multiple Comparisons

Uji Lanjut BNT

Dependent Variable	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Konsumsi	P0	P1	2,18750	10,28114	.835	-20,2132	24,5882
		P2	2,93750	10,28114	.780	-19,4632	25,3382
		P3	4,25000	10,28114	.687	-18,1507	26,6507

	P1	P0	-2,18750	10,28114	.835	-24,5882	20,2132
		P2	,75000	10,28114	.943	-21,6507	23,1507
		P3	2,06250	10,28114	.844	-20,3382	24,4632
	P2	P0	-2,93750	10,28114	.780	-25,3382	19,4632
		P1	-,75000	10,28114	.943	-23,1507	21,6507
		P3	1,31250	10,28114	.901	-21,0882	23,7132
	P3	P0	-4,25000	10,28114	.687	-26,6507	18,1507
		P1	-2,06250	10,28114	.844	-24,4632	20,3382
		P2	-1,31250	10,28114	.901	-23,7132	21,0882
PBB	P0	P1	-2,83500*	,68985	.001	-4,3380	-1,3320
		P2	-3,68500*	,68985	.000	-5,1880	-2,1820
		P3	-5,26500*	,68985	.000	-6,7680	-3,7620
	P1	P0	2,83500*	,68985	.001	1,3320	4,3380
		P2	-,85000	,68985	.241	-2,3530	,6530
		P3	-2,43000*	,68985	.004	-3,9330	-,9270
	P2	P0	3,68500*	,68985	.000	2,1820	5,1880
		P1	,85000	,68985	.241	-,6530	2,3530
		P3	-1,58000*	,68985	.041	-3,0830	-,0770
	P3	P0	5,26500*	,68985	.000	3,7620	6,7680
		P1	2,43000*	,68985	.004	,9270	3,9330
		P2	1,58000*	,68985	.041	,0770	3,0830
Konversi	P0	P1	9,69500*	2,83809	.005	3,5113	15,8787
		P2	11,10000*	2,83809	.002	4,9163	17,2837
		P3	13,51000*	2,83809	.000	7,3263	19,6937
	P1	P0	-9,69500*	2,83809	.005	-15,8787	-3,5113
		P2	1,40500	2,83809	.630	-4,7787	7,5887
		P3	3,81500	2,83809	.204	-2,3687	9,9987
	P2	P0	11,10000*	2,83809	.002	-17,2837	-4,9163
		P1	-1,40500	2,83809	.630	-7,5887	4,7787
		P3	2,41000	2,83809	.412	-3,7737	8,5937
	P3	P0	13,51000*	2,83809	.000	-19,6937	-7,3263
		P1	-3,81500	2,83809	.204	-9,9987	2,3687
		P2	-2,41000	2,83809	.412	-8,5937	3,7737

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN (UIN) MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN ILMU PETERNAKAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36, Romang polog-Gowa, (0411) 882862

SURAT KETERANGAN UJI PLAGIARISME

Nomor Paper: 1794646923/IV/2022

Pengelola Jurnal/karya tulis ilmiah Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:


Nama	: Muh. Jihad
NIM	: 60700115020
Program	: Strata I (S1)
Jurusan	: Ilmu Peternakan
Pembimbing	: 1. Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si 2. Rasyidah Mappanganro, S.Pt, M.Si

Judul Skripsi:

Substitusi Ampas Tahu pada Level yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)


Dinyatakan telah diperiksa/dicek dengan menggunakan Aplikasi pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dengan hasil uji Plagiasi sebesar 21%. Demikian Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian Skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan


Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P
NIP. 19750909 200912 1 001

Gowa, 8 April 2022

Tim Uji Plagiasi


Muh. Arsan Jamili, S.Pt., M.Si.
NIP. 19891217 201903 1 012

Catatan:
1-24% : "Tidak Terindikasi Plagiat"
25-49% : "Revisi Minor, Konsultasikan dengan Pembimbing"
50-74% : "Revisi Mayor, Konsultasikan dengan pembimbing"
75-100% : "Revisi Total"

Substitusi_Ampas_Tahu_pada_Level_yang_Berbeda_terhada...

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dustygerbera.wordpress.com Internet Source	1%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
3	repositori.ub.ac.id Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	nanopdf.com Internet Source	1%
6	docobook.com Internet Source	1%
7	dondon-marina.blogspot.com Internet Source	1%
8	adiidurjana23.blogspot.com Internet Source	1%
9	repositori.ipb.ac.id Internet Source	1%

10	docplayer.info Internet Source	1 %
11	rahmahsari37.blogspot.com Internet Source	1 %
12	rizalfatikhussurur.blogspot.com Internet Source	1 %
13	ejournal.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
14	jakarta.litbang.pertanian.go.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
17	journal.iugaza.edu.ps Internet Source	<1 %
18	eprints.mercubuana-yogya.ac.id Internet Source	<1 %
19	fapet.ub.ac.id Internet Source	<1 %
20	zombiedoc.com Internet Source	<1 %

21	ubb.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
23	etikabisnissoftskill.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	khafidalwi.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	warnet178meulaboh.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	darunnajah.com Internet Source	<1 %
27	jualkelincihias.wordpress.com Internet Source	<1 %
28	ojs.unida.ac.id Internet Source	<1 %
29	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
30	repository.ut.ac.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sinjai Students Paper	<1 %
32	aeiroura.blogspot.com	

Internet Source

<1 %

33

fapet.unisla.ac.id

Internet Source

<1 %

34

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

35

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

36

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

37

www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id

Internet Source

<1 %

38

animallabel.wordpress.com

Internet Source

<1 %

39

talenta.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

40

adoc.pub

Internet Source

<1 %

41

rohmatfapertanian.wordpress.com

Internet Source

<1 %

42

Charles V. Lisnahan, Alfonsus Seran, Gerson Frans Bira. "Pengaruh Suplementasi L-Arginine dalam Pakan terhadap Pertambahan

<1 %

Bobot Badan, Konsumsi Pakan dan Konversi
Pakan Ayam Broiler", JAS, 2021

Publication

43	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
44	zadoco.site Internet Source	<1 %
45	Siti Syamsiah, Edi Purnomo, Uray Gustian. "PENGEMBANGAN ALAT LATIHAN TANGKAPAN PENCAK SILAT", Jurnal Ilmu Keolahragaan, 2020 Publication	<1 %
46	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	<1 %
47	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
48	hamil.co.id Internet Source	<1 %
49	id.scribd.com Internet Source	<1 %
50	puslitbangnak.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
52	text-id.123dok.com Internet Source	

		<1 %
53	www.eprints.uad.ac.id Internet Source	<1 %
54	www.merdeka.com Internet Source	<1 %
55	www.pertanianku.com Internet Source	<1 %
56	Submitted to Politeknik Negeri Jember Student Paper	<1 %
57	jaspers-rebel-angels.blogspot.com Internet Source	<1 %
58	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
59	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
60	www.honestdocs.id Internet Source	<1 %
61	www.jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
62	Sri Pangestuti, Aminudin Umasangadji. "UJI PAKAN LIMBAH BAYAM DALAM RANSUM TERHADAP KONSUMSI PAKAN, PERTAMBAHAN BOBOT BADAN DAN	<1 %

63

Nur Prabewi Prabewi, Junaldi Pangeran Saputra. "Laju Pertumbuhan Dan Tingkat Efisiensi Pemeliharaan Ternak Ayam Kampung Super Terhadap Penambahan Pakan Non Konvensional Growth Rate and Efficiency Rate of Livestock Keeping Chicken Kampung Super Toward Addition Non Conventional Feed", Jurnal Pengembangan Penyuluhan Pertanian, 2017

Publication

<1 %

64

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR


KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muh. Jihad
NIM : 60700115020
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul Skripsi : Substitusi Ampas Tahu pada Level yang Berbeda terhadap
Pertumbuhan Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)
Pembimbing I : Dr. Hj. Jumriah Syam, S. Pt., M. Si.

No.	Hari/Tanggal	Uraian	Paraf	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Kamis 5 Maret 2020	ACC Judul Proposal	k	
2	Selasa 2020 15 September 2020	Bimbingan I Draft Proposal	k	
3	Sabtu 19 September 2020	Bimbingan II Draft Proposal	k	
4	Minggu 20 September 2020	ACC Draft Proposal	k	
5	Selasa 1 Desember 2020	Bimbingan III Revisi Draft Proposal Pasca Seminar Proposal	k	
6	Kamis 9 Agustus 2021	Bimbingan IV Draft Hasil	k	
7	Senin 2 Agustus 2021	ACC Draft Hasil	k	
8	Kamis 19 Agustus 2021	Revisi Draft Hasil Pasca Seminar Hasil	k	
9	Jumat 20 Agustus 2021	ACC Draft Skripsi	k	

Samata, 24 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan


Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.
NIP. 19750909 200912 1 001

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muh. Jihad
NIM : 60700115020
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul Skripsi : Substitusi Ampas Tahu pada Level yang Berbeda terhadap Pertumbuhan Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)
Pembimbing II : Rasyidah Mappanganro S. Pt., M. Si.

No.	Hari/Tanggal	Uraian	Paraf	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Kamis 5 Maret 2020	ACC Judul Proposal		
2	Rabu 12 Agustus 2020	Bimbingan I Draft Proposal		
3	Rabu 12 November 2020	Bimbingan II Draft Proposal		
4	Kamis 13 November 2020	ACC Draft Proposal		
5	Senin 30 November 2020	Bimbingan III Revisi Draft Proposal Pasca Seminar Proposal		
6	Senin 21 Juni 2021	Bimbingan IV Draft Hasil		
7	Kamis 24 Juni 2021	Bimbingan V Draft Hasil		
8	Senin 2 Agustus 2021	ACC Draft Hasil		
9	Kamis 19 Agustus 2021	Bimbing VI Revisi Draft Hasil Pasca Seminar Hasil		
10	Jumat 20 Agustus 2021	ACC Draft Skripsi		

Samata, 24 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., M.P.
NIP. 19750909 200912 1 001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 591 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA MUH. JIHAD JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Jurusan ILMU PETERNAKAN Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar tanggal 5 Maret 2020 tentang Penerbitan SK Pembimbing mahasiswa atas nama MUH. JIHAD NIM 60700115020, Untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : "Pengaruh Pemberian Pakan Terhadap Pertumbuhan Ternak Kelinci (*Oryctolagus Cuniculus*)"
 - Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
 - Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;9
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 226.D tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

Pemrakarsa	Kasubag. Akademik
Paraf : 	Paraf : 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI ATAS NAMA MUH. JIHAD JURUSAN ILMU PETERNAKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- KESATU** : Menetapkan dan menunjuk saudara :
1. Dr. Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si. sebagai Pembimbing Pertama,
2. Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si. sebagai Pembimbing Kedua,
- KEDUA** : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Gowa

Pada Tanggal 10 Maret 2020

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI

RIWAYAT HIDUP



Muh. Jihad lahir pada tanggal 27 Agustus 1996 di Desa Kampiri, Kec. Citta, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan suami istri **H. M. Yahya Nawawi** dan **Alm. Suwarda**. Penulis menjalani pendidikan di TK Mandiri pada tahun 2002-2003. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 80 Paomallimpoe pada tahun 2003-2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Perguruan Islam Ganra pada tahun 2009-2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Perguruan Islam Ganra pada tahun 2012-2015. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di UIN Alauddin Makassar, melalui jalur UM-PTKAIN penulis diterima di Jurusan Ilmu Peternakan di Fakultas Sains dan Teknologi.