

**MODEL REGRESI NONPARAMETRIK DENGAN PENDEKATAN
DERET FOURIER PADA KASUS TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA DI SULAWESI SELATAN**



*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Matematika Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar*

Oleh :

Muhammad Ihsan Salim

60600118012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ihsan Salim

NIM : 60600118012

Jurusan : Matematika

Fakultas : Sains dan Teknologi

Judul Skripsi : Model Regresi Nonparametrik Dengan Pendekatan Deret Fourier Pada Kasus

Tingkat Pengangguran Terbuka

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan data, tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri, kecuali dengan mencantumkan sumber cuplikan pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Samata-Gowa, 17 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,


Muhammad Ihsan Salim


NIM. 60600118012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Model Regresi Nonparametrik dengan Pendekatan Deret Fourier pada Kasus Tingkat Pengangguran Terbuka Di Sulawesi Selatan”, yang disusun oleh Saudara **Muhammad Ihsan Salim**, Nim: **60600118012** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal **07 Februari 2022 M**, bertepatan dengan **05 Rajab 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 07 Februari 2022 M
05 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. (.....) 

Sekretaris : Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd. (.....)

Munaqisy I : Wahidah Alwi, S.Si., M.Si. (.....)

Munaqisy II : Rofia Masrifah, S.Pd. I., M.Pd. I (.....)

Pembimbing I : Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si. (.....)

Pembimbing II : M. Ihsan Nawawi, S.Pd., M.Si. (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.

Nip. 19710412 200003 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak harus menjadi yang terbaik, tapi jadilah yang tercepat

Karena ketika anda lambat, maka orang lain yang cepat yang memperolehnya.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah/2 :286)

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai salah satu bentuk kecintaan ku kepada motivator hidupku ayahanda Mursalim dan ibunda Nurhasanah, serta guru-guru ku yang selama ini membimbingku.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji baginya tuhan semesta alam, yang melimpahkan banyak rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Model Regresi Nonparametrik Dengan Pendekatan Deret Fourier Pada Kasus Tingkat Pengangguran Terbuka Di Sulawesi Selatan**”. Shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, nabi yang telah memperkenalkan addinul islam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin.

Penulis sadar akan banyaknya kendala yang di hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima Kasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak **Mursalim** dan ibu **Nurhasanah** yang telah membesarkan penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang, serta memberikan banyak bantuan tak terhitung baik secara moril maupun materil dalam menopang pendidikan penulis.

Kepada Bapak **Adnan Suddin, S.Pd., M.Si** dan Bapak **M Ichsan Nawawi S.Pd., M.Si** selaku pembimbing pertama dan kedua, terima kasih penulis ucapkan atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk berbagi ilmu kepada penulis. Arahan dan bimbingan dari Bapak merupakan pembelajaran berharga dalam proses

kedepannya. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan selama proses bimbingan.

Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil rektor, beserta staf/pegawai atas bantuannya selama penulis melaksanakan pendidikan di kampus peradaban ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd., Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, dosen pengajar beserta staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Wahidah Alwi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selalu bersedia membimbing dan memberikan solusi serta nasihat yang terarah.
4. Ibu Risnawati Ibrina, S.Si., M.Si., Sekretaris Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam negeri Alauddin Makassar.
5. Segenap Dosen dan Staf Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membekali pengetahuan, bimbingan dan arahan selama ini.

6. Kepala Lab Ibu Dewi serta Laboran Kak Kaprawi S.Si., M.Si, Kak Bangkit Imam, S.Si, yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu sebagai Keluarga besar Asisten Laboratorium Matematika.
7. Semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua dan terutama pengembangan ilmu pengetahuan.

Gowa, Januari 2021

Penulis

Muhammad Ihsan Salim

NIM. 60600118012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SIMBOL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Masalah	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Regresi Nonparametrik	7
B. Deret Fourier	8
C. Pendekatan Regresi Nonparametrik Deret Fourier	9
1. Estimasi Parameter Regresi Deret Fourier	10
2. Pemilihan Titik Osilasi Optimal	16
3. Pemeriksaan Asumsi Residual	17
4. Pengujian Parameter Model Regresi	21
5. Koefisien Determinasi	23
6. MAPE (Mean Absolute Percentage Error).....	24
D. Tingkat Pengangguran Terbuka	24
1. Definisi	24
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Waktu Penelitian.....	28
C. Jenis dan Sumber Data.....	28

D.	Variabel dan Definisi Operasional Variabel	28
E.	Prosedur Analisis	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		31
A.	Deskripsi Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Selatan Beserta Faktor-Faktor Yang Diduga Mempengaruhinya	31
B.	Model Regresi Nonparametrik Deret Fourier	48
1.	Model regresi nonparametrik deret fourier 1, 2, dan 3 titik osilasi.....	48
2.	Pemeriksaan Asumsi Residual.....	52
3.	Pengujian Signifikansi Model Regresi Nonparametrik.....	55
4.	Koefisien Determinasi dan Nilai MAPE	57
5.	Implikasi Hasil Penelitian.....	58
6.	Model Terbaik Tingkat Pengangguran Terbuka Menggunakan Regresi Nonparametrik Deret Fourier	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		63
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran	64
Daftar Pustaka		65

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
4.1	Statistika Deskriptif Variabel TPT, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka Partisipasi SM, Persentase Penduduk Miskin.....	26
4.19	Nilai GCV, R^2 , dan MSE.....	39
4.20	Estimasi Parameter Koefisien Regresi Nonparametrik Deret Fourier pada 3 Titik Knot.....	40
4.23	ANOVA dari uji <i>Glejser</i>	43
4.26	Analisis Ragam Uji Simultan.....	45
4.27	Analisis Ragam Uji Parsial.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota seprovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.....	27
4.3	Plot Skewness dan Kurtosis Data Tingkat Pengangguran Terbuka	27
4.4	Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota seprovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.....	28
4.5	<i>Scatterplot</i> antara TPT (Y) dengan Kepadatan penduduk (X_1).....	29
4.6	Plot Skewness dan Kurtosis Data Kepadatan Penduduk.....	29
4.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota seprovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.....	30
4.8	<i>Scatterplot</i> antara TPT (Y) dengan Laju Ekonomi (X_2).....	31
4.9	Plot Skewness dan Kurtosis Data Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	32
4.10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota seprovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.....	32
4.11	<i>Scatterplot</i> antara TPT (Y) dengan TPAK (X_3).....	33
4.12	Plot Skewness dan Kurtosis Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	34
4.13	Persentase Angka Partisipasi Kasar SM di Kabupaten/Kota seprovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.....	34
4.14	<i>Scatterplot</i> antara TPT (Y) dengan APK SM (X_4).....	35
4.15	Plot Skewness dan Kurtosis Data Angka Partisipasi Kasar SM.....	36
4.16	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota seprovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.....	37
4.17	<i>Scatterplot</i> antara TPT (Y) dengan Persentase Penduduk Miskin (X_5).....	37
4.18	Plot Skewness dan Kurtosis Data Persentase Penduduk Miskin.....	38
4.21	Plot Model Regresi Nonparametrik Deret Fourier Knot 1, 2, dan 3.....	41
4.22	<i>Scatterplot</i> antara Fits dan Residual.....	42
4.24	ACF dari Residual.....	44
4.25	Hasil Uji <i>Kolmogorov Smirnov</i>	45
4.28	Perbandingan Hasil Prediktor dengan Data Aktual.....	49
4.29	plot kurva model regresi deret fourier pada persamaan x_1	50
4.30	plot kurva model regresi deret fourier pada persamaan x_3	51
4.31	plot kurva model regresi deret fourier pada persamaan x_4	52
4.32	plot kurva model regresi deret fourier pada persamaan x_5	53

DAFTAR SIMBOL

X	: Variabel Prediktor
Y	: Variabel Respon
n	: Banyaknya Observasi
β_0	: Intersep
β_i	: Parametr Regresi Ke- i
ε	: Error
$f(x_i)$: Fungsi Regresi Yang Tidak Mengikuti Pola Tertentu
K	: Titik Knot
I	: Matriks Identitas
α	: Taraf Signifikansi
R^2	: Koefisien Determinasi
σ^2	: Variansi
\hat{y}_i	: Y duga

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ihsan Salim
NIM : 60600118012
Judul : Model Regresi Nonparametrik Dengan Pendekatan Deret Fourier Pada Kasus Tingkat Pengangguran Terbuka Di Sulawesi Selatan

Analisis Regresi terbagi menjadi dua dalam mengestimasi kurva regresi, yakni regresi parametrik dan *nonparametrik*. Penelitian awal yang dilakukan terhadap data tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan dan variabel yang diduga mempengaruhinya, cenderung bahwa pola hubungan antara peubah respon dan peubah prediktor tidak memiliki pola tertentu. Ketidakjelasan informasi bentuk kurva regresi dan pola hubungan antara peubah respon dan peubah prediktor menjadi pertimbangan digunakannya regresi *nonparametrik deret fourier*. Pemodelan dilakukan dengan metode *Generalized Cross Validation (GCV)* untuk mencari titik knot optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel prediktor yang memberi pengaruh signifikan terhadap variabel respon, selain itu model regresi nonparametrik deret fourier terbaik ada pada 3 titik knot.

Berikut model regresi deret fourier pada 3 titik knot :

$$\begin{aligned}\hat{Y}_l = & -0.24 + 0,00009x_1 - 0,23\cos\left(\frac{2\pi x_1}{24}\right) + 1,96\cos\left(\frac{4\pi x_1}{24}\right) - 1,49\cos\left(\frac{6\pi x_1}{24}\right) - \\ & 0,28x_2 + 0,01\cos\left(\frac{2\pi x_2}{24}\right) + 0,4\cos\left(\frac{4\pi x_2}{24}\right) - 0,21\cos\left(\frac{6\pi x_2}{24}\right) + \\ & 0,19x_3 - 0,23\cos\left(\frac{2\pi x_3}{24}\right) + 1,65\cos\left(\frac{4\pi x_3}{24}\right) + 2,35\cos\left(\frac{6\pi x_3}{24}\right) + \\ & 0,04x_4 + 1,52\cos\left(\frac{2\pi x_4}{24}\right) + 2,6\cos\left(\frac{4\pi x_4}{24}\right) - 2,72\cos\left(\frac{6\pi x_4}{24}\right) + \\ & 0,41x_5 + 27,05\cos\left(\frac{2\pi x_5}{24}\right) + 16,57\cos\left(\frac{4\pi x_5}{24}\right) + 8,88\cos\left(\frac{6\pi x_5}{24}\right)\end{aligned}$$

Kata Kunci : *TPT, GCV, Deret Fourier, Nonparametrik, Titik Knot*

ABSTRACT

Name : Muhammad Ihsan Salim
NIM : 60600118012
Title : Nonparametric Regression Model Using Fourier Series Approach in the Case of the Open Unemployment Rate in South Sulawesi

Regression analysis is divided into two in estimating the regression curve, namely parametric and nonparametric regression. Preliminary research conducted on data on the unemployment rate and the variables that are thought to influence it, tends to show that the pattern of the relationship between the response variable and the predictor variable does not have a certain pattern. The unclear information on the shape of the regression curve and the pattern of the relationship between the response variables and the predictor variables is a consideration for the use of nonparametric Fourier series regression. The modeling is done using the Generalized Cross Validation (GCV) method to find the optimal knot point. The results of the analysis show that there are no predictor variables that give a significant effect to a response variable. Moreover, the fit model of nonparametric Fourier series regression on 3 knot points.

The following below shows the form of model :

$$\begin{aligned}\hat{Y}_l = & -0.24 + 0,00009x_1 - 0,23\cos\left(\frac{2\pi x_1}{24}\right) + 1,96\cos\left(\frac{4\pi x_1}{24}\right) - 1,49\cos\left(\frac{6\pi x_1}{24}\right) - \\ & 0,28x_2 + 0,01\cos\left(\frac{2\pi x_2}{24}\right) + 0,4\cos\left(\frac{4\pi x_2}{24}\right) - 0,21\cos\left(\frac{6\pi x_2}{24}\right) + \\ & 0,19x_3 - 0,23\cos\left(\frac{2\pi x_3}{24}\right) + 1,65\cos\left(\frac{4\pi x_3}{24}\right) + 2,35\cos\left(\frac{6\pi x_3}{24}\right) + \\ & 0,04x_4 + 1,52\cos\left(\frac{2\pi x_4}{24}\right) + 2,6\cos\left(\frac{4\pi x_4}{24}\right) - 2,72\cos\left(\frac{6\pi x_4}{24}\right) + \\ & 0,41x_5 + 27,05\cos\left(\frac{2\pi x_5}{24}\right) + 16,57\cos\left(\frac{4\pi x_5}{24}\right) + 8,88\cos\left(\frac{6\pi x_5}{24}\right)\end{aligned}$$

Keywords : *TPT, GCV, Fourier Series, Nonparametrik, Knot Point*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Analisis Regresi terbagi menjadi dua dalam mengestimasi kurva regresi, yakni regresi parametrik dan nonparametrik. Bentuk model regresi tergantung pada kurva $f(x_i)$. Jika bentuk kurva $f(x_i)$ diketahui, maka digunakan model regresi parametrik. Bagaimana jika kurva $f(x_i)$ tidak diketahui ?, maka dalam hal ini Regresi nonparametrik merupakan solusinya. Dalam statistik nonparametrik tidak terdapat persyaratan asumsi klasik bentuk sebaran untuk populasinya, sehingga sangat cocok digunakan untuk data yang berdistribusi normal maupun tidak. Sebaliknya regresi parametrik tidak efisien jika menggunakan data yang tidak berdistribusi normal. Pendekatan regresi nonparametrik adalah metode pendugaan model yang digunakan untuk menghindari asumsi-asumsi yang ketat, sehingga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam melakukan pendugaan model.

Pemilihan pendekatan dalam regresi nonparametrik harus sesuai dengan sebaran atau pola data. Sehingga terdapat beberapa pendekatan regresi nonparametrik yang telah dikembangkan diantaranya Spline, Wavelet, Polinomial Lokal, Kernel, dan Fourier. Semua model memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam memodelkan pola. Keunggulan pendekatan regresi nonparametrik dengan deret fourier salah satunya adalah dapat mengatasi data yang memiliki sebaran cosinus dan sinus. Pada pendekatan deret fourier, pola data yang sesuai yaitu pola data yang fluktuatif, dimana pengulangan nilai variabel dependent untuk

variabel independent yang berbeda.¹ Penelitian pertama tentang estimasi fourier di lakukan oleh bilodeau (1992). Kemudian Tcahjono (2008) mengenai estimator Deret Fourier terboboti pada regresi nonparametrik, kesimpulan pada penelitiannya adalah model yang baik untuk data simulasi fungsi polinomial adalah $K \geq 2$ dan fungsi trigonometri $K \geq 4$. Prahutama (2013) model nonparametrik deret fourier kasus TPT di Jawa Timur, kesimpulan pada penelitiannya adalah model terbaik adalah model yang memiliki R^2 yang tinggi dan juga model yang parsimoni. Intaniah dkk (2018) mengenai nonparametrik deret fourier pada debit air citarum, pada penelitiannya dapat disimpulkan bahwa model deret fourier akan semakin baik jika menggunakan variabel yang sedikit tetapi dengan jumlah data observasi yang banyak. Hariksan dkk (2019) tentang nonparametrik deret fourier pada tingkat kemiskinan di Sumatra Utara, kesimpulan pada penelitiannya adalah metode GCV lebih baik digunakan pada pemodelan deret fourier dibandingkan dengan metode CV.

Manusia memiliki banyak keterbatasan yang ada pada dirinya untuk menjelaskan fenomena-fenomena kompleks yang terdapat di dunia nyata, sehingga mereka membutuhkan alat untuk membantu mereka dalam merumuskan hal tersebut. Tujuan dibentuknya sebuah permodelan matematis, tidak lain hanyalah alat untuk memudahkan manusia yang memiliki keterbatasan akal dan pengetahuan untuk memahami permasalahan realitas dan mencari solusinya. Hal ini memiliki

¹ Narita Yuri Adrianingsih dan Andrea Tri Riani Dani “*Pemodelan Dengan Pendekatan Deret Fourier Pada Kasus Tingkat Pengangguran Terbuka Di Nusa Tenggara Timur*” (JURNAL FMIPA UNIMUS, 2020), h 1

kesamaan makna dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Q.S Al-Baqarah/2:32 yang berbunyi :

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

Terjemahnya :

Mereka menjawab, “Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Al-Baidhawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil mengatakan, Surat Al-Baqarah ayat 32 merupakan pengakuan atas kelemahan dan kekurangan malaikat. Malaikat dan manusia merupakan makhluk yang masing-masing diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu Wata'ala. Semua makhluk khususnya manusia pasti memiliki banyak kekurangan terutama dalam segi pengetahuan. Dengan keterbatasan tersebut manusia membutuhkan alat bantu dalam menjalani kehidupannya. Menurut KBBI, Alat adalah sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Alat bantu dalam menginterpretasikan kehidupan nyata dengan variabel-variabel guna mencari solusi adalah dengan permodelan. Salah satu dari banyaknya pendekatan permodelan adalah dengan regresi nonparametrik.

Pemilihan parameter osilasi adalah sesuatu yang penting dalam pemodelan regresi nonparametrik menggunakan deret fourier. Dalam penelitian ini hanya digunakan 1, 2, dan 3 titik osilasi, karena akan dilakukan pengujian signifikansi parameter, jika jumlah parameter yang dihasilkan melebihi data yang akan diteliti maka derajat bebas error akan minus, sehingga tidak dapat dicari nilai F_{tabel} .

Adapun jika jumlah osilasi yang dipilih terlalu sedikit, akan menyebabkan bias yang tinggi pada estimator atau memiliki nilai galat yang tinggi. Sehingga kurva estimasi jauh dari data yang sebenarnya.

Pemilihan titik osilasi optimal dengan metode GCV pada penelitian ini didasari karena GCV memiliki sifat optimal asimtotik jika dibandingkan dengan metode lainnya seperti CV dan UBR. Maksud dari optimal asimtotik dari metode CV dan UBR adalah dalam pembentukan kurva estimasi, hasil titik osilasi dengan metode GCV lebih akurat dibandingkan dengan kedua metode tersebut.

Diketahui ada ketidakjelasan pola hubungan antara peubah respon dan peubah prediktor. Ketidakjelasan informasi bentuk kurva regresi antara peubah respon dan peubah prediktor menjadi pertimbangan digunakannya regresi nonparametrik. Kemudian diketahui bahwa data yang digunakan merupakan data perwilayah. Data perwilayah merupakan data yang memiliki sifat fluktuatif. Hal ini dikarenakan setiap wilayah memiliki kecenderungan perbedaan yang tinggi akan setiap karakteristiknya, Sehingga di duga cocok digunakan pendekatan deret fourier.

Dari penjelasan di atas, maka dilakukanlah penelitian berjudul *Model Regresi Nonparametrik Dengan Pendekatan Deret Fourier Pada Kasus Tingkat Pengangguran Terbuka Di Sulawesi Selatan*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk model regresi nonparametrik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan ?

2. Faktor-faktor apa saja yang signifikan berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah antara lain :

1. Mendapatkan bentuk model faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan dengan menggunakan Regresi Nonparametrik Deret Fourier.
2. Mengetahui faktor-faktor yang signifikan berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Menambah keilmuan dalam penerapan metode Regresi Nonparametrik Deret Fourier.
2. Memberikan informasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan, dengan harapan dijadikan masukan dalam mengambil sebuah kebijakan untuk menekan laju angka pengangguran di Sulawesi Selatan.

E. Batasan Masalah

Berikut batasan masalah yang diberikan pada penelitian ini, yaitu :

1. Menggunakan metode GCV (*Generalized Cross Validation*) dalam Pemilihan titik osilasi yang optimal.

2. Pada Pemodelan, titik osilasi yang akan digunakan adalah 1,2, dan 3 titik osilasi.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan draf penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka dan metode yang digunakan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini dikemukakan metode penelitian yang berisi ruang lingkup kegiatan, waktu penelitian, jenis dan sumber data, dan prosedur penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada Bab ini akan di jabarkan secara sistematis tentang pemodelan deret fourier, pemilihan model terbaik, pengujian estimator, pengujian signifikansi, dan perhitungan keakuratan estimator

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari rumusan masalah pada penelitian ini, serta saran akan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Regresi Nonparametrik

Diberikan pengamatan n dengan variabel respon (Y) dan variabel prediktor (X), dimana bentuk kurva $f(x_i)$ diketahui, maka digunakan regresi linear secara umum sebagai berikut :

$$Y_i = \sum_{j=1}^n \beta_j f_j(x_i) + \varepsilon_i; i = 1, 2, \dots, n. \quad (2.1)$$

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon_i \quad (2.2)$$

Dengan β_0 sebagai intersep, β_1 sebagai koefisien regresi, X sebagai peubah prediktor, ε_i sebagai error, dan Y sebagai peubah respon

Jika bentuk kurva $f(x_i)$ tidak diketahui, maka digunakan model regresi Nonparametrik. Tidak terdapat asumsi didalam fungsi regresi $f(x_i)$ nonparametrik, sehingga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mengestimasi kurva. Fungsi $f(x_i)$ pada umumnya di asumsikan termuat dalam suatu fungsi yang berdimensi tak hingga. ²

Berikut adalah fungsi regresi nonparametrik secara umum :

$$Y_i = f(X_{ij}) + \varepsilon_i; \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, t; \quad (2.3)$$

Dengan,

Y_i = peubah respon ke- i

² Abdy, Muhammad "Tinjauan Singkat Tentang Regresi Parametrik Dan Regresi Nonparametrik", SAINTIFIK, (Vol.5, No. 1, Januari 2019)

X_{ij} = peubah prediktor ke-i

$f(X_{ij})$ = fungsi regresi yang tidak diketahui polanya

ε_i = error yang di asumsikan independen dan identik

B. Deret Fourier

Deret fourier merupakan deret yang tak terhingga dengan suku-sukunya memuat komponen sinus-cosinus, trigonometri, yang konvergen dengan ke suatu fungsi periodik.³

$$s_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) \right)$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx; \quad a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx; \quad n = 0,1,2,3, \dots$$

Jika $f(x)$ merupakan fungsi genap maka $b_n = 0$, sehingga yang muncul hanya suku-suku yang mengandung cosinus (suku-suku dari a_n). Berikut merupakan fungsi genap :

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = 0$$

³ Bambang soedijono, "Modul Matematika : Deret Fourier" MATA4431/Modul 1, h 2

Jika $f(x)$ merupakan fungsi ganjil maka $a_n = 0$, sehingga yang muncul hanya suku-suku yang mengandung sinus (suku-suku dari b_n). Berikut merupakan fungsi ganjil :

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx = 0$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

C. Pendekatan Regresi Nonparametrik Deret Fourier

Jika data yang diteliti polanya tidak diketahui dan cenderung berulang atau periodik maka digunakan estimator regresi nonparametrik deret Fourier. Selain digunakan kombinasi aditif fungsi cosinus dan sinus, juga dapat digunakan fungsi linear dari fungsi sinus atau cosinus. Tujuan mengambil kombinasi fungsi linear dari salah satu fungsi sinus atau cosinus adalah untuk efisiensi estimasi. Dalam estimator deret Fourier, kurva regresi nonparametrik diasumsikan tidak diketahui dan termuat dalam ruang fungsi kontinu $C(0, \pi)$. Berikut adalah bentuk model regresi nonparametrik deret Fourier dengan pendekatan kombinasi fungsi linear dari fungsi cosinus.⁴ :

$$\hat{Y}_i = \frac{1}{2} \beta_0 + \beta_j x_i + \sum_{q=1}^Q \alpha_{qj} \cos \left(q \frac{2\pi x_i}{n} \right) + \varepsilon_i ; \quad \begin{array}{l} j = 1, 2, \dots, n; \\ i = 1, 2, \dots, n; \end{array} \quad (2.4)$$

⁴ Suparti, *Analisis Data Inflasi Indonesia Menggunakan Metode Fourier Dan Wavalet Multiscale Autoregressive*, (Seminar Nasional Variansi, 2018), h 188

1. Estimasi Parameter Regresi Deret Fourier

Ordinary Least Square merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam mengestimasi parameter dalam model regresi nonparametrik. Metode OLS bekerja dengan meminimalkan jumlah kuadrat residual pada estimasi parameter model. Berikut adalah bentuk matriks dari regresi nonparametrik deret fourier :

$$Y = X\beta + \varepsilon \quad (2.5)$$

Model pada persamaan (2.5) dapat dirubah kedalam bentuk matriks sebagai berikut

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & x_{11} & \cos x_{11} & \cos(2x_{11}) & \cdots & \cos(qx_{11}) \\ 1/2 & x_{12} & \cos x_{12} & \cos(2x_{12}) & \cdots & \cos(qx_{12}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/2 & x_{1n} & \cos x_{1n} & \cos(2x_{1n}) & \vdots & \cos(q_{1n}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

Selanjutnya parameter ε dapat diestimasi dengan menggunakan OLS.

Adapun error pada persamaan (2.5) di berikan oleh :

$$\varepsilon_i = Y_i - \left[\frac{1}{2} \beta_0 + \beta_j x_i + \sum_{q=1}^Q \alpha_{qj} \cos \left(q \frac{2\pi x_i}{n} \right) \right] \quad (2.6)$$

$$\varepsilon = Y - X\beta$$

Sehingga jumlah kuadrat error adalah :

$$\begin{aligned} \varepsilon^T \varepsilon &= (Y - X\beta)^T (Y - X\beta) \\ &= Y^T Y - Y^T X\beta - \beta^T X^T Y + \beta^T X^T X\beta \end{aligned} \quad (2.7)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\partial \left[\begin{aligned} &\left\{ \frac{1}{2} \beta_0 Y_1 + x_{11} \beta_1 Y_1 + \beta_2 Y_1 \cos x_{11} + \dots + \beta_n Y_1 \cos(qx_{11}) \right\} + \\ &\left\{ \frac{1}{2} \beta_0 Y_2 + x_{12} \beta_1 Y_2 + \beta_2 Y_2 \cos x_{12} + \dots + \beta_n Y_2 \cos(qx_{12}) \right\} + \dots + \\ &\left\{ \frac{1}{2} \beta_0 Y_n + x_{1n} \beta_1 Y_n + \beta_2 Y_n \cos x_{1n} + \dots + \beta_n Y_n \cos(qx_{1n}) \right\} \end{aligned} \right]}{\partial \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}} \\
&= \frac{d \left[\begin{aligned} &\left\{ \frac{1}{2} \beta_0 Y_1 + x_{11} \beta_1 Y_1 + \beta_2 Y_1 \cos x_{11} + \dots + \beta_n Y_1 \cos(qx_{11}) \right\} + \\ &\left\{ \frac{1}{2} \beta_0 Y_2 + x_{12} \beta_1 Y_2 + \beta_2 Y_2 \cos x_{12} + \dots + \beta_n Y_2 \cos(qx_{12}) \right\} + \dots + \\ &\left\{ \frac{1}{2} \beta_0 Y_n + x_{1n} \beta_1 Y_n + \beta_2 Y_n \cos x_{1n} + \dots + \beta_n Y_n \cos(qx_{1n}) \right\} \end{aligned} \right]}{d \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}} \\
&= \frac{d \left[\begin{aligned} &\left\{ \frac{1}{2} \beta_0 Y_1 + x_{11} \beta_1 Y_1 + \beta_2 Y_1 \cos x_{11} + \dots + \beta_n Y_1 \cos(qx_{11}) \right\} + \\ &\left\{ \frac{1}{2} \beta_0 Y_2 + x_{12} \beta_1 Y_2 + \beta_2 Y_1 \cos x_{12} + \dots + \beta_n Y_2 \cos(qx_{12}) \right\} + \dots + \\ &\left\{ \frac{1}{2} \beta_0 Y_n + x_{1n} \beta_1 Y_n + \beta_2 Y_n \cos x_{1n} + \dots + \beta_n Y_n \cos(qx_{1n}) \right\} \end{aligned} \right]}{d \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}} \\
&= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} Y_1 + \frac{1}{2} Y_2 + \dots + \frac{1}{2} Y_n \\ x_{11} Y_1 + x_{12} Y_2 + \dots + x_{1n} Y_n \\ Y_1 \cos x_{11} + Y_1 \cos x_{11} + \dots + Y_n \cos x_{1n} \\ \vdots \\ Y_1 \cos(qx_{11}) + Y_2 \cos(qx_{12}) + Y_n \cos(qx_{1n}) \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \dots & \frac{1}{2} \\ x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ \cos x_{11} & \cos x_{12} & \dots & \cos x_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cos(qx_{11}) & \cos(qx_{12}) & \dots & \cos(qx_{1n}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Berikut merupakan penurunan pada partisi ketiga :

$$\frac{\partial(\beta^T X^T Y)}{\partial \beta} \quad (2.10)$$

$$\begin{aligned} \beta^T X^T Y &= [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \dots \quad \beta_n] \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \dots & \frac{1}{2} \\ x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ \cos x_{11} & \cos x_{12} & \dots & \cos x_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cos(qx_{11}) & \cos(qx_{12}) & \dots & \cos(qx_{1n}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix} \\ &= [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \dots \quad \beta_n] \begin{bmatrix} Y_1 \frac{1}{2} + Y_2 \frac{1}{2} + \dots + Y_n \frac{1}{2} \\ Y_1 x_{11} + Y_2 x_{12} + \dots + Y_n x_{1n} \\ \dots \\ Y_1 \cos(qx_{11}) + Y_2 \cos(qx_{12}) + \dots + Y_n \cos(qx_{1n}) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \left\{ \beta_0 Y_1 \frac{1}{2} + \beta_0 Y_2 \frac{1}{2} + \dots + \beta_0 Y_n \frac{1}{2} \right\} + \\ \left\{ \beta_1 Y_1 x_{11} + \beta_1 Y_2 x_{12} + \dots + \beta_1 Y_n x_{1n} \right\} + \dots + \\ \left\{ \beta_2 Y_1 \cos(qx_{11}) + \beta_2 Y_2 \cos(qx_{12}) + \dots + \beta_2 Y_n \cos(qx_{1n}) \right\} \end{bmatrix} \\ &= \frac{\partial}{\partial \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} \left\{ \beta_0 Y_1 \frac{1}{2} + \beta_0 Y_2 \frac{1}{2} + \dots + \beta_0 Y_n \frac{1}{2} \right\} + \\ \left\{ \beta_1 Y_1 x_{11} + \beta_1 Y_2 x_{12} + \dots + \beta_1 Y_n x_{1n} \right\} + \dots + \\ \left\{ \beta_2 Y_1 \cos(qx_{11}) + \beta_2 Y_2 \cos(qx_{12}) + \dots + \beta_2 Y_n \cos(qx_{1n}) \right\} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} d \left[\begin{array}{l} \left\{ \beta_0 Y_1 \frac{1}{2} + \beta_0 Y_2 \frac{1}{2} + \dots + \beta_0 Y_n \frac{1}{2} \right\} + \\ \left\{ \beta_1 Y_1 x_{11} + \beta_1 Y_2 x_{12} + \dots + \beta_1 Y_n x_{1n} \right\} + \dots + \\ \left\{ \beta_2 Y_1 \cos(qx_{11}) + \beta_2 Y_2 \cos(qx_{12}) + \dots + \beta_2 Y_n \cos(qx_{1n}) \right\} \end{array} \right] \\ \frac{d\beta_0}{d\beta_1} \\ d \left[\begin{array}{l} \left\{ \beta_0 Y_1 \frac{1}{2} + \beta_0 Y_2 \frac{1}{2} + \dots + \beta_0 Y_n \frac{1}{2} \right\} + \\ \left\{ \beta_1 Y_1 x_{11} + \beta_1 Y_2 x_{12} + \dots + \beta_1 Y_n x_{1n} \right\} + \dots + \\ \left\{ \beta_2 Y_1 \cos(qx_{11}) + \beta_2 Y_2 \cos(qx_{12}) + \dots + \beta_2 Y_n \cos(qx_{1n}) \right\} \end{array} \right] \\ \frac{d\beta_1}{\vdots} \end{bmatrix}$$

$$= \left[Y_1 \frac{1}{2} + Y_2 \frac{1}{2} + \dots + Y_n \frac{1}{2} \quad x_{11}Y_1 + x_{12}Y_2 + \dots + x_{1n}Y_n \quad \dots \quad Y_1 \cos(qx_{11}) + Y_2 \cos(qx_{12}) + Y_n \cos(qx_{1n}) \right]$$

$$= [Y_1 \quad Y_2 \quad \dots \quad Y_n] \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & x_{11} & \cos x_{11} & \dots & \cos(qx_{11}) \\ \frac{1}{2} & x_{12} & \cos x_{12} & \dots & \cos(qx_{12}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{2} & x_{1n} & \cos x_{1n} & \vdots & \cos(q_{1n}) \end{bmatrix}$$

Berikut merupakan penurunan 1 pada partisi Keempat :

$$\frac{\partial(\beta^T X^T X \beta)}{\partial \beta} \tag{2.11}$$

Kita asumsikan $A = X^T X$, jadi :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial(\beta^T A \beta)}{\partial \beta} \\ \beta^T A \beta &= [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \dots \quad \beta_n] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \vdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} \\ &= [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \dots \quad \beta_n] \begin{bmatrix} a_{11}\beta_0 + a_{12}\beta_1 + \dots + a_{1n}\beta_n \\ a_{21}\beta_0 + a_{22}\beta_1 + \dots + a_{2n}\beta_n \\ \vdots \\ a_{n1}\beta_0 + a_{n2}\beta_1 + \dots + a_{nn}\beta_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \{a_{11}\beta_0^2 + a_{12}\beta_1\beta_0 + \dots + a_{1n}\beta_n\beta_0\} + \\ \{a_{21}\beta_0\beta_1 + a_{22}\beta_1^2 + \dots + a_{2n}\beta_n\beta_1\} + \dots + \\ \{a_{n1}\beta_0\beta_n + a_{n2}\beta_1\beta_n + \dots + a_{nn}\beta_n^2\} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\partial \left[\begin{array}{l} \{a_{11}\beta_0^2 + a_{12}\beta_1\beta_0 + \dots + a_{1n}\beta_n\beta_0\} + \\ \{a_{21}\beta_0\beta_1 + a_{22}\beta_1^2 + \dots + a_{1n}\beta_n\beta_1\} + \dots + \\ \{a_{n1}\beta_0\beta_n + a_{n2}\beta_1\beta_n + \dots + a_{nn}\beta_n^2 \} \end{array} \right]}{\partial \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}} \\
&= \frac{\left[\begin{array}{l} d \left[\begin{array}{l} \{a_{11}\beta_0^2 + a_{12}\beta_1\beta_0 + \dots + a_{1n}\beta_n\beta_0\} + \\ \{a_{21}\beta_0\beta_1 + a_{22}\beta_1^2 + \dots + a_{1n}\beta_n\beta_1\} + \dots + \\ \{a_{n1}\beta_0\beta_n + a_{n2}\beta_1\beta_n + \dots + a_{nn}\beta_n^2 \} \end{array} \right]}{d\beta_0} \\ d \left[\begin{array}{l} \{a_{11}\beta_0^2 + a_{12}\beta_1\beta_0 + \dots + a_{1n}\beta_n\beta_0\} + \\ \{a_{21}\beta_0\beta_1 + a_{22}\beta_1^2 + \dots + a_{1n}\beta_n\beta_1\} + \dots + \\ \{a_{n1}\beta_0\beta_n + a_{n2}\beta_1\beta_n + \dots + a_{nn}\beta_n^2 \} \end{array} \right]}{d\beta_1} \\ \vdots \\ d \left[\begin{array}{l} \{a_{11}\beta_0^2 + a_{12}\beta_1\beta_0 + \dots + a_{1n}\beta_n\beta_0\} + \\ \{a_{21}\beta_0\beta_1 + a_{22}\beta_1^2 + \dots + a_{1n}\beta_n\beta_1\} + \dots + \\ \{a_{n1}\beta_0\beta_n + a_{n2}\beta_1\beta_n + \dots + a_{nn}\beta_n^2 \} \end{array} \right]}{d\beta_n} \end{array} \right] \\
&= \left[\begin{array}{l} \{2a_{11}\beta_0 + a_{12}\beta_1 + \dots + a_{1n}\beta_n\} + \{a_{21}\beta_1\} + \dots + \{a_{n1}\beta_n\} \\ \{a_{12}\beta_0\} + \{a_{21}\beta_0\beta_1 + 2a_{22}\beta_1 + \dots + a_{1n}\beta_n\} + \dots + \{a_{n2}\beta_n\} \\ \vdots \\ \{a_{1n}\beta_0\} + \{a_{2n}\beta_1\} + \{a_{2n}\beta_2\} + \dots + \{a_{1n}\beta_1 + a_{1n}\beta_2 + a_{1n}\beta_3 + \dots + 2a_{nn}\beta_n\} \end{array} \right] \\
&= \left[\begin{array}{l} \{2a_{11}\beta_0 + a_{12}\beta_1 + \dots + a_{1n}\beta_n\} \\ \{a_{12}\beta_0\} + +2a_{22}\beta_1 + \dots + a_{2n}\beta_n \\ \vdots \\ \{a_{n1}\beta_1 + a_{n2}\beta_2 + \dots + 2a_{nn}\beta_n\} \end{array} \right] \\
&= 2 \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \vdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} \\
&= 2A\beta \\
&= 2X^T X\beta
\end{aligned}$$

Sehingga :

$$\frac{\partial}{\partial \beta} (Y^T Y - Y^T X\beta - \beta^T X^T Y + \beta^T X^T X\beta) = 0$$

$$0 - X^T Y - X Y^T + 2X^T X\beta = 0$$

$$2X^T X\beta = X^T Y + XY^T$$

$$2X^T X\beta = 2X^T Y$$

$$X^T X\beta = X^T Y$$

$$\beta = \frac{X^T Y}{X^T X}$$

$$\beta = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

2. Pemilihan Titik Osilasi Optimal

Osilasi atau parameter penghalus adalah pengontrol keseimbangan fungsi. Jika osilasi semakin besar, maka kurva estimator fungsi akan semakin smooth, tetapi untuk pendekatan pola data kurang baik. Jika osilasi semakin kecil, maka estimator kurva akan semakin kasar. Oleh karena itu diperlukan nilai osilasi yang sedang sehingga akan menghasilkan kurva estimator yang baik. Untuk menghasilkan parameter penghalus yang optimal, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam regresi nonparametrik deret fourier salah satunya adalah metode *Generalized Cross Validation (GCV)*.⁵

Estimator deret Fourier yang baik sangat bergantung pada pemilihan titik osilasi yang optimal (q). Titik osilasi berfungsi sebagai pengontrol keseimbangan antara kesesuaian kurva dan kemulusan kurva terhadap data. *Generalized Gross Validation (GCV)* adalah cara yang digunakan untuk

⁵ Siti Hariksa Amalia dan Indah Manfaati Nur “*Pemodelan Regresi Nonparametrik Deret Fourier Pada Kasus Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatra Utara*”, (UMS, Semarang, 2019), h 2

menentukan jumlah Osilasi Optimal (q).⁶ penentuan jumlah Osilasi yang optimal cenderung menghasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang cukup tinggi. Rumus GCV dapat dituliskan sebagai berikut :

$$GCV(q_{opt}) = \frac{I n^{-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^T (y_i - \hat{y}_i)}{(n^{-1} 1 - \sum_{i=1}^n \text{trace}[A])^2} \quad (2.12)$$

Dimana,

q_{opt} = Titik Osilasi Optimal

I = Matriks Identitas

n = Banyaknya Pengamatan

A = $X(X^T X)^{-1} X^T$

3. Pemeriksaan Asumsi Residual

Sama halnya dengan pengujian residual regresi parametrik, pengujian residual regresi nonparametrik deret fourier juga menggunakan asumsi IIDN.

a. Asumsi residual identik

Untuk melihat homogenitas dari varians residual digunakan uji identik. Ketika terjadi heterokedastisitas atau varians dari residual tidak homogen, maka asumsi identik tidak terpenuhi. Tujuan mendeteksi adanya kasus heterokedastisitas merupakan upaya untuk mengurangi kerugian

⁶ Andrea Tri Riani Dani, Narita Yuri Adrianingsih, *Pemodelan Regresi Nonparametrik Dengan Estimator Spline Truncated dan Deret Fourier*, (Jambura Journal Of Mathematics, Vol. 3, No. 1 26-36 January 2021)

efisiensi estimator.⁷ Salah satu yang digunakan untuk pengujian asumsi residual identik adalah dengan uji *Glejser* yakni dengan meregresikan nilai mutlak residual dengan variabel prediktor. Hipotesisnya adalah :

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_n^2 = \sigma^2$$

$$H_1: \text{minimal ada satu } \sigma_i \neq \sigma^2, i = 1, 2, \dots, n$$

Dimana n adalah banyaknya variabel prediktor.

Statistik Uji *Glejser* :

$$\text{Statistik Uji} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{e}_i - \bar{e})^2}{\sum_{i=1}^n (e_i - \bar{e}_i)^2} \times 100 \quad (2.13)$$

Dimana,

\hat{e}_i = estimasi residual

\bar{e} = rata-rata residual

e_i = residual ke-i

Keputusannya adalah terima H_0 jika nilai *Statistik Uji* Kurang dari nilai $\chi_{df;\alpha}^2$

b. Asumsi residual independen

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar residual, digunakan Uji independen. Plot *Autocorrelation Function* (ACF) merupakan salah satu

⁷ Eubank & Thomas, Detecting Heterocedasticity in nonparametric Regression, *Journal of the American Statistical Association*, (1993) h 387-392

cara untuk mendeteksi residual bersifat independen atau tidak. Hipotesisnya adalah :

$$H_0: \rho_w = 0 \text{ (residual independen)}$$

$$H_1: \rho_w \neq 0 \text{ (residual tidak independent)}$$

Persamaan ACF adalah sebagai berikut :

$$\rho_w = \frac{\sum_{t=w+1}^n (e_t - \bar{e})(e_{t-w} - \bar{e})}{\sum_{t=1}^n (e_t - \bar{e})^2} \quad (2.14)$$

Interval konfidensi dengan batas signifikan atas dan bawah sebagai berikut:

$$-t_{n-1; \frac{\alpha}{2}} SE(\rho_w) < \rho_w < t_{n-1; \frac{\alpha}{2}} SE(\rho_w) \quad (2.15)$$

$$\text{Dimana } SE(\rho_w) = \sqrt{\frac{1 + 2 \sum_{m=1}^{w-1} \rho_m^2}{n}}$$

e_t = data yang di sortir dari yang terkecil ke yang terbesar

e_{t-w} = error yang sama di atas, tetapi hanya digeser sebanyak k unit

\bar{e} = rata-rata dari error

$w = 1, 2, 3, \dots, n$.

Jika tidak terdapat nilai autokorelasi yang keluar dari batas signifikan, dapat dikatakan bahwa asumsi independen terpenuhi.

c. Asumsi residual berdistribusi normal

Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak, maka digunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Berikut hipotesisnya :

$$H_0: F_0(x) = F(x) \text{ (Residual mengikuti distribusi normal)}$$

$H_1: F_0(x) \neq F(x)$ (Residual tidak mengikuti distribusi normal)

Statistik uji :

$$D = \text{Maks}|F_0(x) - S_n(x)| \quad (2.16)$$

$F_0(x)$ merupakan fungsi distribusi frekuensi kumulatif. $S_n(x) = k/N$ merupakan fungsi peluang kumulatif yang diobservasi dari suatu sampel random dengan N observasi.

Berikut merupakan langkah-langkah untuk perhitungan nilai Kolmogorov-Smirnov :

1. Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, serta menghitung frekuensi.
2. Menentukan nilai frekuensi kumulatif dan nilai kumulatif proporsi.
3. Menghitung nilai Z-score $Z = \frac{x_i - \bar{x}}{sd}$ pada setiap data.
4. Menghitung luas dibawah kurva normal baku.
5. Menentukan luas kurva $F_{(Z)}$ dengan melihat tabel Z negatif dan positif.
6. Menghitung nilai batas atas dengan rumus *kumulatif proporsi* – $F_{(Z)}$.
7. Menghitung nilai batas bawah dengan rumus *batas atas* – *kumulatif proporsi*.
8. Mencari nilai yang tertinggi D pada batas bawah, yang merupakan nilai Kolmogorov-Smirnov hitung.

Keputusan pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah tolak H_0 jika $|D| > K_{S_{df};\alpha}$ dimana nilai Ks berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov.

4. Pengujian Parameter Model Regresi

Pengujian parameter model berfungsi untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon. Terdapat dua tahapan dalam pengujian ini, yakni pengujian secara simultan dengan uji F kemudian dilanjutkan pengujian secara parsial dengan uji t.

a. Pengujian secara Simultan

Uji simultan berfungsi untuk mengetahui apakah suatu parameter model regresi deret fourier telah signifikan atau belum. Uji ini dilakukan secara simultan dengan parameter yang terdapat didalam model. Berikut Hipotesis uji simultan:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$$

$$H_1: \text{Minimal ada satu } \beta_s \neq 0; s = 1, 2, \dots, p$$

Nilai n merupakan jumlah observasi dan nilai p merupakan jumlah parameter dalam model regresi. berikut merupakan perhitungan uji simultan

<i>Sumber</i>	<i>Df</i>	<i>Sum of Square</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F_{hitung}</i>	<i>P-value</i>
Regresi	$p-1$	$\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$	$\frac{SSR}{p-1}$	$\frac{MS_{regresi}}{MS_{error}}$	*
Error	$n-p$	$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$	$\frac{SSE}{n-p}$		

$$\text{Total} = (p-1)+(n-p) \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_i)^2$$

*) $1 - \text{Probabilitas kumulatif } P(F \leq F - \text{hitung})$

Tolak H_0 jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dimana F_{tabel} ($F_{\alpha;(p-1, n-p)}$) atau $p - \text{Value} < \alpha$ memperlihatkan bahwa paling sedikit ada satu parameter yang tidak sama dengan nol.

b. Pengujian secara parsial

Pengujian parsial digunakan untuk menguji apakah suatu parameter secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon, hipotesisnya sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_s = 0$$

$$H_1 : \beta_s \neq 0, s = 1, 2, \dots, p$$

Statistik uji yang digunakan :

$$t_{hitung} = \frac{\hat{\beta}_s}{SE(\hat{\beta}_s)} \quad (2.18)$$

Dengan,

$$SE(\hat{\beta}_s) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_s)} \quad (2.19)$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\beta}_s) &= \text{Var}[(X^T X)^{-1} X^T Y] \\ &= (X^T X)^{-1} X^T \text{Var}(Y) (X^T X)^{-1} X \\ &= (X^T X)^{-1} X^T (\sigma^2 I_n) (X^T X)^{-1} X \\ &= \sigma^2 (X^T X)^{-1} [(X^T X) (X^T X)^{-1}] \\ &= \sigma^2 (X^T X)^{-1} \end{aligned} \quad (2.20)$$

Perlu diketahui bahwa :

$$\text{Var}[AX]=\text{Cov}[AX,AX]=A \text{ Cov}[X,X]A^T=A \text{ Var}[X] A^T$$

Dimana nilai σ^2 merupakan nilai MSE. Tolak H_0 jika $|t_{hitung}|$ lebih besar dari $t_{tabel} = t_{\frac{\alpha}{2},(n-p)}$ atau tolak H_0 jika $p - value < \alpha$.

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran yang penting dalam mengukur tingkat kualitas sebuah model, yang memperlihatkan seberapa bagus model yang didapatkan dalam menjelaskan data.⁸ Dalam menjelaskan variabilitas peubah respon, semakin tinggi nilai R^2 yang didapatkan dari suatu model, maka semakin bagus pula variabel-variabel independen dalam model tersebut. Berikut merupakan rumus R^2 .

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}} \quad (2.21)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_i)^2} \quad (2.22)$$

Ketika pemilihan model juga memperhatikan banyaknya parameter yang akan digunakan pada model. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki sedikit parameter dan memiliki R^2 yang cukup tinggi.⁹

⁸ Widiya Tri Astuti, Mustika Hadijati, Irwansyah, *Model Regresi Nonparametrik Deret Fourier Pada Pola Data Curah Hujan Di Kota Mataram*, (Eigen Mathematics Journal, Volume 1 No 2 Desember 2018) h 26

⁹ Andrea Tri Riani Dani, Narita Yuri Adrianingsih, *Pemodelan Regresi Nonparametrik Dengan Estimator Spline Truncated dan Deret Fourier*, (Jambura Journal Of Mathematics, Vol. 3, No. 1 26-36 January 2021)

6. MAPE (Mean Absolute Percentage Error)

Untuk mengukur tingkat kesalahan dari suatu estimator dapat dilihat pada perhitungan MAPE (Mean Absolute Percentage Error). Semakin kecil nilai MAPE semakin baik hasil prediksi yang diperoleh.

$$MAPE = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{A_i - F_i}{A_i} \right| \right) \times 100\%$$

A_i = Data aktual ke- i

F_i = Hasil prediksi pada data ke- i

n = Banyaknya data

Kriteria MAPE	Kemampuan
MAPE < 10%	Kemampuan prediksi sangat baik
10% ≤ MAPE ≤ 20%	Kemampuan prediksi baik
20% ≤ MAPE ≤ 25%	Kemampuan prediksi kurang baik
MAPE > 50%	Kemampuan prediksi buruk

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

1. Definisi

Pengangguran adalah suatu keadaan seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan kemudian secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terbagi menjadi tiga yakni pengangguran terselubung, pengangguran terbuka, dan setengah menganggur. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang mempersiapkan usaha, yang mencari pekerjaan, yang tidak mencari pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai

bekerja. Pengangguran terselubung adalah seorang yang sudah bekerja tetapi penghasilannya belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang dimaksud setengah pengangguran adalah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, dan masih bersedia menerima pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran di suatu daerah terhadap jumlah angkatan kerja di daerah tersebut.

TPT dapat diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \% \quad (2.23)$$

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran

Ada beberapa faktor yang diduga penyebab pengangguran di masyarakat sebagai berikut :

a. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk merupakan rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Jika jumlah penduduk meningkat maka akan mempengaruhi tingkat pengangguran, karena jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja juga ikut meningkat. Bertambahnya penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan lapangan kerja yang sesuai hanya akan meningkatkan tingkat pengangguran.¹⁰

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

¹⁰ BPS, "Sulawesi Selatan Dalam Angka 2020", h 51

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka lapangan pekerjaan baru juga akan semakin bertambah. Ketika perekonomian berkembang, maka produksi barang dan jasa juga akan meningkat. Jika hal tersebut terjadi maka kebutuhan sektor tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa juga akan meningkat. Dengan kata lain, semakin bertumbuhnya tingkat perekonomian maka akan mengurangi tingkat pengangguran.

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan semakin banyak bagian penduduk usia kerja yang ikut atau berusaha untuk ikut dalam kegiatan memproduksi barang atau jasa dalam runtun waktu tertentu.

d. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan keterampilan, wawasan, dan pengetahuan, agar kesempatan bekerja lebih luas dan mendapatkan upah yang lebih baik. Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi maka juga akan mempunyai keterampilan serta keahlian, sehingga produktivitasnya juga akan meningkat. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin sedikit pula terjadinya pengangguran. Angka Partisipasi Kasar merupakan salah satu indikator pendidikan yang digunakan. Angka Partisipasi Kasar (APK) Merupakan jumlah siswa

sekolah pada jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai jenjang tersebut terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara keseluruhan pada tingkat pendidikan. APK yang rendah menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi sekolah, tanpa melihat ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK lebih dari 100 persen memperlihatkan ada penduduk yang bersekolah belum mencukupi usia atau melebihi usia yang diharuskan. Jumlah pengangguran di suatu wilayah diduga juga dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya APK.

e. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keterbatasan seseorang, keluarga, komunitas, maupun sebuah negara yang berakibat ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan, dimana penegakan keadilan dan hak terancam, serta suramnya masa depan suatu bangsa dan negara.¹¹

Kemiskinan adalah kehidupan seseorang ataupun kelompok masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan atau memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

¹¹ Mudrajad, "Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan" (Yogyakarta UPP AMP YKPN, 2006), h. 18

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan.

B. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah periode bulan September 2021 sampai November 2021.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Publikasi Data Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2020, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel *dependent* (Y) dan variabel *independent* (X). Berikut variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Variabel respon (Y)

Tingkat pengangguran terbuka (Y) yaitu persentase jumlah pengangguran di suatu daerah terhadap jumlah angkatan kerja di daerah tersebut.

2. Variabel prediktor (X)

a. Kepadatan penduduk (X_1)

Jumlah penduduk disuatu daerah dibagi luas daerah tersebut, yang dinyatakan dengan penduduk per km^2 .

b. Laju pertumbuhan ekonomi (X_2)

Perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi atau produktifitas perekonomian dari tahun ke tahunnya.

- c. Tingkat partisipasi angkatan kerja (X_3)

Persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

- d. Angka partisipasi kasar SM (X_4)

Perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah di SM dengan jumlah siswa usia 16-18 tahun.

- e. Persentase penduduk miskin (X_5)

Persentase penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulannya dibawah garis kemiskinan.

Tabel 3.1 Skala Pada Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Skala
Y	Tingkat pengangguran terbuka	Rasio
X_1	Kepadatan penduduk	Rasio
X_2	Laju pertumbuhan ekonomi	Rasio
X_3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Rasio
X_4	Angka partisipasi kasar SM	Rasio
X_5	Persentase penduduk miskin	Rasio

E. Prosedur Analisis

Berikut ini merupakan langkah-langkah analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

1. Membuat statistika deskriptif setiap peubah untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Memodelkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan dengan pendekatan Regresi Nonparametrik Deret Fourier :
 - i. Membuat *scatterplot* antara variabel dependen dengan setiap variabel independen yang dijadikan deteksi awal dalam mengenali pola hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.
 - ii. Melakukan perhitungan dan membuat plot skewness dan kurtosis serta penjelasannya.
 - iii. Melakukan pemodelan regresi nonparametrik deret fourier dengan 1, 2, dan 3 titik osilasi.
 - iv. Menghitung nilai MSE, GCV dan koefisien determinasi untuk setiap model regresi nonparametrik pendekatan deret fourier.
 - v. Memilih nilai osilasi optimal berdasarkan nilai MSE dan nilai GCV yang minim.
 - vi. Menentukan model regresi nonparametrik deret fourier terbaik dengan titik osilasi optimal.
 - vii. Melakukan pengujian asumsi residual.
 - viii. Melakukan beberapa uji terhadap data yang diperoleh dengan pengujian parameter secara simultan dan pengujian secara parsial.
 - ix. Menghitung nilai Koefisien determinasi dan MAPE
 - x. Menginterpretasikan model yang telah diperoleh.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


Pada bab ini akan dilakukan analisis dan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis yang dilakukan meliputi analisis statistika deskriptif dan pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan menggunakan Regresi Nonparametrik Deret Fourier

A. Deskripsi Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Selatan Beserta Faktor-Faktor Yang Diduga Mempengaruhinya

Tabel 4.1 Statistika Deskriptif Variabel TPT, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka Partisipasi SM, Persentase Penduduk Miskin


Variable	Minimum	Maximum	Variance	Mean
y	1,17	10,39	5,01	4,28
X_1	42	8686	3016360,89	652,87
X_2	1,17	10,75	4,28	6,32
X_3	55,39	78,5	28,92	64,21
X_4	72,14	124,68	177,274	104,631
X_5	4,28	14,88	9,22	9,48

Berikut dibawah merupakan penjelasan yang lebih terperinci dari tabel 4.1 mengenai statistika deskriptif Variabel TPT, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka Partisipasi SM, Persentase Penduduk Miskin.



Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020


Berdasarkan Gambar 4.2, diketahui bahwa rata-rata TPT (Y) di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 4,28 persen dengan variansi senilai 5,01. Tingkat Pengangguran Terbuka terbesar yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 10,39 persen yang terjadi di Kota Makassar, sedangkan TPT terkecil terjadi di Kepulauan Selayar yaitu sebesar 1,17 persen.



Gambar 4.3 Pola Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020


Berdasarkan pada gambar 4.3 diketahui bahwa pola data tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan mengalami fluktuatif. Hal ini dikarena

kecendrungan yang tinggi akan perbedaan karakteristik pada setiap kabupatennya. Pola fluktuatif pada data tersebut cocok digunakan pendekatan deret fourier.



Gambar 4.4 Plot Skewness dan Kurtosis Data Tingkat Pengangguran Terbuka


Gambar 4.4 menunjukkan bahwa distribusi data mencedung kekanan atau positif. Nilai skewness sebesar 1,56 dan nilai kurtosis sebesar 5,25. Nilai rasio skewness sebesar 3,31 dan nilai rasio kurtosis sebesar 5,721. Kemudian nilai median dan mean berturut-turut 3,75 dan 4,2. Dengan membagi nilai skewness dengan standar error skewness dan nilai kurtosis dibagi dengan standar error kurtosis didapatkanlah masing-masing nilai skor rasio, jika ke dua nilai skor rasio berada pada interval -1.96 sampai 1.96 maka distribusi data normal untuk α sebesar 5%. Karena hasil tidak memenuhi kriteria data yang berdistribusi normal maka data dapat disimpulkan tidak terdistribusi normal. Dengan tidak normalnya data, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi untuk menggunakan pendekatan parametrik, maka dari itu digunakanlah pendekatan non parametrik.



Gambar 4.5 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020


Pada Gambar 4.5 menunjukkan Rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 652 jiwa/km² dengan varians yang cukup tinggi yaitu sebesar 3016360,89. Daerah yang memiliki kepadatan penduduk terbesar di Sulawesi Selatan terdapat di Kota Makassar yaitu sebesar 8686 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terkecil terdapat di kabupaten Luwu Utara sebesar 42 jiwa/km².

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI




Gambar 4.6 Scatterplot antara TPT (Y) dengan Kepadatan penduduk (X_1)

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa scatterplot antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan kepadatan penduduk (X_1) tidak membentuk suatu kecenderungan pola tertentu. Ketidakjelasan bentuk pola hubungan antara TPT dengan kepadatan penduduk menjadi pertimbangan untuk menggunakan estimasi regresi nonparametrik. Pada gambar 4.5 diketahui terdapat data outlier, data outlier tersebut merupakan kota Parepare, kota Makassar, dan kota Palopo. Adapun adanya data outlier di atas dapat memungkinkan menyebabkan bias pada estimator, maka dari itu untuk melihat adanya bias pada estimator akan dilakukan pengujian asumsi residual.




Gambar 4.7 Pola Data Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Berdasarkan pada Gambar 4.7 diketahui bahwa pola data kepadatan penduduk di Sulawesi Selatan mengalami fluktuatif. Hal ini dikarena kecenderungan yang tinggi akan perbedaan karakteristik pada setiap kabupatennya. Pola fluktuatif pada data tersebut cocok digunakan pendekatan deret fourier.




Gambar 4.8 Plot Skewness dan Kurtosis Data Kepadatan Penduduk

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa distribusi data mencedung kekanan atau positif. Nilai skewness sebesar 4,38 dan nilai kurtosis sebesar 20. Nilai rasio skewness sebesar 9,27 dan nilai rasio kurtosis sebesar 22,63. Kemudian nilai median dan mean berturut-turut 196,5 dan 652. Dengan membagi nilai skewness dengan standar error skewness dan nilai kurtosis dibagi dengan standar error kurtosis didapatkanlah masing-masing nilai skor rasio, jika ke dua nilai skor rasio berada pada interval -1.96 sampai 1.96 maka distribusi data normal untuk α sebesar 5%. Karena hasil tidak memenuhi kriteria data yang berdistribusi normal maka data dapat disimpulkan tidak terdistribusi normal. Dengan tidak normalnya data, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi untuk menggunakan pendekatan parametrik, maka dari itu digunakanlah pendekatan non parametrik.



Gambar 4.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020


Pada Gambar 4.9 menunjukkan Lapangan pekerjaan baru biasanya akan tercipta mengikuti Pertumbuhan ekonomi yang positif. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari laju PDRB terhadap harga konstan. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar -6,32 persen dengan variansi sebesar 4,28. Laju pertumbuhan ekonomi terkecil di Sulawesi Selatan terjadi di Kabupaten Luwu Timur sebesar 1,17 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi di Kabupaten Bantaeng sebesar 10,75 persen.



Gambar 4.10 Scatterplot antara TPT (Y) dengan Laju Ekonomi (X_2)


Gambar 4.10 menunjukkan bahwa scatterplot antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (X_2) tidak membentuk suatu

kecenderungan pola tertentu. Ketidakjelasan bentuk pola hubungan antara TPT dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi pertimbangan untuk menggunakan estimasi regresi nonparametrik. Pada gambar 4.8 diketahui terdapat data outlier, data outlier tersebut merupakan Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Luwu Timur, kota Makassar, dan kota Palopo. Adapun adanya data outlier di atas dapat memungkinkan menyebabkan bias pada estimator, maka dari itu untuk melihat adanya bias pada estimator akan dilakukan pengujian asumsi residual.




Gambar 4.11 Pola Data Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Berdasarkan pada Gambar 4.11 diketahui bahwa pola data laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan mengalami fluktuatif. Hal ini dikarena kecenderungan yang tinggi akan perbedaan karakteristik pada setiap kabupatennya. Pola fluktuatif pada data tersebut cocok digunakan pendekatan deret fourier.




Gambar 4.12 Plot Skewness dan Kurtosis Data Laju Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 4.12 menunjukkan bahwa distribusi data menceng ke kiri atau negatif. Nilai skewness sebesar -0,86 dan nilai kurtosis sebesar 4.5. Nilai rasio skewness sebesar -1,83 dan nilai rasio kurtosis sebesar 4,97. Kemudian nilai median dan mean berturut-turut 6.7 dan 6,3. Dengan membagi nilai skewness dengan standar error skewness dan nilai kurtosis dibagi dengan standar error kurtosis didapatkanlah masing-masing nilai skor rasio, jika ke dua nilai skor rasio berada pada interval -1.96 sampai 1.96 maka distribusi data normal untuk α sebesar 5%. Karena hasil tidak memenuhi kriteria data yang berdistribusi normal maka data dapat disimpulkan tidak terdistribusi normal. Dengan tidak normalnya data, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi untuk menggunakan pendekatan parametrik, maka dari itu digunakanlah pendekatan non parametrik.



Gambar 4.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020


Pada Gambar 4.13 menunjukkan Sulawesi Selatan memiliki rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 64,21 persen dengan variansi sebesar 28,92. Kabupaten Sidrap memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja paling sedikit yaitu sebanyak 55,39 persen. Dan kabupaten Tana Toraja memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja paling tinggi yaitu sebanyak 78,5 persen.



Gambar 4.14 Scatterplot antara TPT (Y) dengan TPAK (X_3)


Gambar 4.14 menunjukkan bahwa scatterplot antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_3) tidak membentuk suatu kecenderungan pola tertentu. Ketidakjelasan bentuk pola hubungan antara TPT dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menjadi pertimbangan untuk menggunakan estimasi regresi nonparametrik. Pada gambar 4.11 diketahui terdapat data outlier, data outlier tersebut merupakan Kabupaten Tanatoraja, kota Makassar, dan kota Palopo. Adapun adanya data outlier di atas dapat memungkinkan

menyebabkan bias pada estimator, maka dari itu untuk melihat adanya bias pada estimator akan dilakukan pengujian asumsi residual.




Gambar 4.15 Pola Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Berdasarkan pada Gambar 4.15 diketahui bahwa pola data tingkat partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan mengalami fluktuatif. Hal ini dikarena kecendrungan yang tinggi akan perbedaan karakteristik pada setiap kabupatennya. Pola fluktuatif pada data tersebut cocok digunakan pendekatan deret fourier.



Gambar 4.16 Plot Skewness dan Kurtosis Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja


Gambar 4.16 menunjukkan bahwa distribusi data menceng kekanan atau positif. Nilai skewness sebesar 0,61 dan nilai kurtosis sebesar 3.3. Nilai rasio skewness sebesar 1,3 dan nilai rasio kurtosis sebesar 3,63. Kemudian nilai median dan mean berturut-turut 63,9 dan 64,2. Dengan membagi nilai skewness dengan standar error skewness dan nilai kurtosis dibagi dengan standar error kurtosis didapatkanlah masing-masing nilai skor rasio, jika ke dua nilai skor rasio berada pada interval -1.96 sampai 1.96 maka distribusi data normal untuk α sebesar 5%. Karena hasil tidak memenuhi kriteria data yang berdistribusi normal maka data dapat disimpulkan tidak terdistribusi normal. Dengan tidak normalnya data, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi untuk menggunakan pendekatan parametrik, maka dari itu digunakanlah pendekatan non parametrik.



Gambar 4.17 Persentase Angka Partisipasi Kasar SM di Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020


Pada Gambar 4.17 menunjukkan Rata-rata Angka Partisipasi Kasar SM (X_4) di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 104,631 persen dengan variansi sebesar 177,274. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada

suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK SM tertinggi di Sulawesi Selatan terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebesar 124,68 persen. Sedangkan APK terendah terjadi di Kabupaten Wajo yaitu sebesar 72,14 persen.




Gambar 4.18 Scatterplot antara TPT (Y) dengan APK SM (X_4)

Gambar 4.18 menunjukkan bahwa scatterplot antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Angka Partisipasi Kasar SM (X_4) tidak membentuk suatu kecenderungan pola tertentu. Ketidakjelasan bentuk pola hubungan antara TPT dengan Angka Partisipasi Kasar SM menjadi pertimbangan untuk menggunakan estimasi regresi nonparametrik. Pada gambar 4.14 diketahui terdapat data outlier, data outlier tersebut merupakan Kabupaten Wajo, kota Makassar, dan kota Palopo. Adapun adanya data outlier di atas dapat memungkinkan menyebabkan bias pada estimator, maka dari itu untuk melihat adanya bias pada estimator akan dilakukan pengujian asumsi residual.



Gambar 4.19 Pola Data Angka Partisipasi Kasar SM di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020


Berdasarkan pada Gambar 4.19 diketahui bahwa pola data Angka Partisipasi Kasar SM di Sulawesi Selatan mengalami fluktuatif. Hal ini dikarena kecendrungan yang tinggi akan perbedaan karakteristik pada setiap kabupatennya. Pola fluktuatif pada data tersebut cocok digunakan pendekatan deret fourier.



Gambar 4.20 Plot Skewness dan Kurtosis Data Angka Partisipasi Kasar SM


Gambar 4.21 menunjukkan bahwa distribusi data menceng ke kiri atau negatif. Nilai skewness sebesar -0,43 dan nilai kurtosis sebesar 2,5. Kemudian median dan mean berturut-turut 124,68 dan $104,38 < 104,63$. Nilai rasio skewness sebesar -0,91 dan nilai rasio kurtosis sebesar 2,76. Dengan membagi nilai skewness

dengan standar error skewness dan nilai kurtosis dibagi dengan standar error kurtosis didapatkanlah masing-masing nilai skor rasio, jika ke dua nilai skor rasio berada pada interval -1.96 sampai 1.96 maka distribusi data normal untuk α sebesar 5%. Karena hasil tidak memenuhi kriteria data yang berdistribusi normal maka data dapat disimpulkan tidak terdistribusi normal. Dengan tidak normalnya data, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi untuk menggunakan pendekatan parametrik, maka dari itu digunakanlah pendekatan non parametrik.




Gambar 4.22 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Pada Gambar 4.22 menunjukkan Rata-rata Persentase Penduduk Miskin (X_5) di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 9,48 persen dengan variansi sebesar 9,22. Kabupaten Jeneponto memiliki Persentase Penduduk Miskin terbesar yakni 14,8 persen. Dan Kota Makassar memiliki Persentase Penduduk Miskin yang terkecil di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 4,28 persen.




Gambar 4.23 Scatterplot antara TPT (Y) dengan Persentase Penduduk Miskin (X_5)

Gambar 4.23 menunjukkan bahwa scatterplot antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Persentase Penduduk Miskin (X_5) tidak membentuk suatu kecenderungan pola tertentu. Ketidajelasan bentuk pola hubungan antara TPT dengan Persentase Penduduk Miskin menjadi pertimbangan untuk menggunakan estimasi regresi nonparametrik. Pada gambar 4.17 diketahui terdapat data outlier, data outlier tersebut merupakan kota Makassar dan kota Palopo. Adapun adanya data outlier di atas dapat memungkinkan menyebabkan bias pada estimator, maka dari itu untuk melihat adanya bias pada estimator akan dilakukan pengujian asumsi residual.



Gambar 4.24 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Berdasarkan pada Gambar 4.24 diketahui bahwa pola data persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan mengalami fluktuatif. Hal ini karena kecendrungan yang tinggi akan perbedaan karakteristik pada setiap kabupatennya. Pola fluktuatif pada data tersebut cocok digunakan pendekatan deret fourier.



Gambar 4.25 Plot Skewness dan Kurtosis Data Persentase Penduduk Miskin

Gambar 4.25 menunjukkan bahwa distribusi data menceng kekanan atau positif. Nilai skewness sebesar 0,135 dan nilai kurtosis sebesar 1.97. Nilai rasio skewness sebesar 0,28 dan nilai rasio kurtosis sebesar 2,15. Kemudian median dan mean berturut-turut 8,8 dan 9,4. Dengan membagi nilai skewness dengan standar error skewness dan nilai kurtosis dibagi dengan standar error kurtosis didapatkanlah masing-masing nilai skor rasio, jika ke dua nilai skor rasio berada pada interval -1.96 sampai 1.96 maka distribusi data normal untuk α sebesar 5%. Karena hasil tidak memenuhi kriteria data yang berdistribusi normal maka data dapat disimpulkan tidak terdistribusi normal. Dengan tidak normalnya data, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi untuk menggunakan pendekatan parametrik, maka dari itu digunakanlah pendekatan non parametrik.

B. Model Regresi Nonparametrik Deret Fourier

Berdasarkan penjelasan pada diskripsi data, diketahui bahwa data mengalami fluktuatif, dikarenakan data perwilayah memiliki kecendrungan yang tinggi akan perbedaan karakteristiknya. Pendekatan regresi deret fourier cocok digunakan pada data yang memiliki pola fluktuatif atau periodik. Berikut merupakan model umum regresi deret fourier :

$$\hat{Y}_i = \frac{1}{2}\beta_0 + \beta_j x_i + \sum_{q=1}^Q \alpha_{qj} \cos\left(q \frac{2\pi x_i}{n}\right) + \varepsilon_i ;$$

1. Model regresi nonparametrik deret fourier 1, 2, dan 3 titik osilasi

Metode yang digunakan untuk memperoleh parameter osilasi yang optimal yaitu *Generalized Cross Validation* (GCV). Nilai GCV yang minimum, R^2 yang maksimum, dan MSE yang minimum merupakan kriteria nilai q optimal yang akan dipilih. Berikut merupakan hasil perhitungan GCV, R^2 , dan MSE pada 1, 2, dan 3 titik osilasi :

Tabel 4.26 Nilai GCV, R^2 , dan MSE


Parameter Osilasi	GCV	R^2	MSE
1	14,03	58,92%	1,973
2	4,11	70,20%	1,399
3	1,52	80,13%	0,953

Berdasarkan Tabel 4.26, diketahui bahwa Model regresi deret fourier dengan tiga titik osilasi memiliki nilai GCV dan MSE yang paling minimum yaitu secara berturut-turut sebesar 1,52 dan 0,953, serta memiliki nilai R^2 yang paling tinggi yaitu sebesar 80,13%. Berikut merupakan model regresi nonparametrik deret fourier pada 1, 2, dan 3 titik osilasi :

Regresi Nonparametrik Deret Fourier untuk $q=1$

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_1 + a_{11} \cos\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) + \beta_2 x_2 + a_{12} \cos\left(\frac{2\pi x_2}{n}\right) + \beta_3 x_3 + a_{13} \cos\left(\frac{2\pi x_3}{n}\right) + \beta_4 x_4 + a_{14} \cos\left(\frac{2\pi x_4}{n}\right) + \beta_5 x_5 + a_{15} \cos\left(\frac{2\pi x_5}{n}\right)$$

$$\hat{y}_i = 0,34 + 0,0005x_1 + 0,36\cos\left(\frac{2\pi x_1}{24}\right) + 0,28x_2 + 1,09\cos\left(\frac{2\pi x_2}{24}\right) - 0,01x_3 - 0,97\cos\left(\frac{2\pi x_3}{24}\right) + 0,02x_4 + 0,06\cos\left(\frac{2\pi x_4}{24}\right) + 0,004x_5 + 1,34\cos\left(\frac{2\pi x_5}{24}\right)$$




Gambar 4.27 Perbandingan estimasi dengan data model 1 titik osilasi

Regresi Nonparametrik Deret Fourier untuk $q=2$

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_1 + a_{11} \cos\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) + a_{21} \cos\left(\frac{4\pi x_1}{n}\right) + \beta_2 x_2 + a_{12} \cos\left(\frac{2\pi x_2}{n}\right) + a_{22} \cos\left(\frac{4\pi x_2}{n}\right) + \beta_3 x_3 + a_{13} \cos\left(\frac{2\pi x_3}{n}\right) + a_{23} \cos\left(\frac{4\pi x_3}{n}\right) + \beta_4 x_4 + a_{14} \cos\left(\frac{2\pi x_4}{n}\right) + a_{24} \cos\left(\frac{4\pi x_4}{n}\right) + \beta_5 x_5 + a_{15} \cos\left(\frac{2\pi x_5}{n}\right) + a_{25} \cos\left(\frac{4\pi x_5}{n}\right)$$

$$\hat{y}_i = -0,75 + 0,0004x_1 + 0,2\cos\left(\frac{2\pi x_1}{24}\right) + 0,65\cos\left(\frac{4\pi x_1}{24}\right) - 0,72x_2 - 3,06\cos\left(\frac{2\pi x_2}{24}\right) + 0,1\cos\left(\frac{4\pi x_2}{24}\right) + 0,05x_3 - 0,53\cos\left(\frac{2\pi x_3}{24}\right) + 1,08\cos\left(\frac{4\pi x_3}{24}\right) + 0,03x_4 + 0,42\cos\left(\frac{2\pi x_4}{24}\right) - 0,07\cos\left(\frac{4\pi x_4}{24}\right) + 0,25x_5 + 2,67\cos\left(\frac{2\pi x_5}{24}\right) - 0,74\cos\left(\frac{4\pi x_5}{24}\right)$$



Gambar 4.28 Perbandingan estimasi dengan data model 2 titik osilasi


Regresi Nonparametrik Deret Fourier untuk $q=3$

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_1 + a_{11}\cos\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) + a_{21}\cos\left(\frac{4\pi x_1}{n}\right) + a_{31}\cos\left(\frac{6\pi x_1}{n}\right) + \beta_2 x_2 + a_{12}\cos\left(\frac{2\pi x_2}{n}\right) + a_{22}\cos\left(\frac{4\pi x_2}{n}\right) + a_{32}\cos\left(\frac{6\pi x_2}{n}\right) + \beta_3 x_3 + a_{13}\cos\left(\frac{2\pi x_3}{n}\right) + a_{23}\cos\left(\frac{4\pi x_3}{n}\right) + a_{33}\cos\left(\frac{6\pi x_3}{n}\right) + \beta_4 x_4 + a_{14}\cos\left(\frac{2\pi x_4}{n}\right) + a_{24}\cos\left(\frac{4\pi x_4}{n}\right) + a_{34}\cos\left(\frac{6\pi x_4}{n}\right) + \beta_5 x_5 + a_{15}\cos\left(\frac{2\pi x_5}{n}\right) + a_{25}\cos\left(\frac{4\pi x_5}{n}\right) + a_{35}\cos\left(\frac{6\pi x_5}{n}\right)$$


Tabel 4.20 Estimasi Parameter Koefisien Regresi Nonparametrik Deret Fourier pada 3 Titik Osilasi

Parameter	Estimator	Parameter	Estimator	Parameter	Estimator
β_0	-0,24246	a_{22}	0,401666	a_{14}	1,520638

β_1	9,74E-05	a_{32}	-0,21157	a_{24}	2,606993
a_{11}	-0,23607	β_3	0,196052	a_{34}	-2,72642
a_{21}	1,963874	a_{13}	-0,23827	β_5	0,418857
a_{31}	-1,49052	a_{23}	1,652599	a_{15}	27,05964
β_2	-0,28404	a_{33}	2,358709	a_{25}	16,57246
a_{12}	0,015537	β_4	0,040456	a_{35}	8,882934



Gambar 4.29 Perbandingan estimasi dengan data model 3 titik osilasi



Gambar 4.30 Plot Regresi Nonparametrik Deret Fourier Osilasi 1, 2, dan 3

Berdasarkan gambar 4.30 dapat diketahui bahwa model tiga titik osilasi memiliki residual atau error, sehingga dilihat dari nilai GCV, R^2 , dan MSE dapat dipastikan bahwa model terbaik adalah model dengan tiga titik osilasi.

2. Pemeriksaan Asumsi Residual

Untuk mengetahui apakah residual yang dihasilkan oleh model regresi telah memenuhi asumsi IIDN, maka dilakukanlah pengujian asumsi residual. Berikut pengujian asumsi residual :

a. Uji Asumsi Identik

Untuk melihat homogenitas dari varians residual digunakan uji identik. Berikut merupakan hipotesisnya :

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_{24}^2 = \sigma^2$$

$$H_1: \text{minimal ada satu } \sigma_i \neq \sigma^2, i = 1, 2, \dots, 24$$

salah satu metode yang digunakan untuk pengujian asumsi residual identik adalah dengan uji *Glejser* yakni dengan meregresikan nilai mutlak residual dengan variabel prediktor. Berikut hasil perhitungan manual menggunakan package di software R untuk uji *Glejser* :

Tabel 4.32 Uji Glejser

<i>Statistik</i>	<i>df</i>	<i>p-value</i>
24,7	23	0,356

Berdasarkan hasil pada tabel 4.32 diketahui nilai statistik uji hasilnya sebesar 24,7 serta *p - value* sebesar 0,356, dengan taraf signifikansi sebesar 5%, maka nilai *p - value* lebih besar dari nilai

α (0,05). Selain itu nilai statistik uji lebih kecil dari nilai $\chi^2_{20;0,05}(31,41)$. Sehingga dapat diputuskan bahwa terima H_0 . Jadi dapat diartikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Hal ini menunjukkan residual memenuhi asumsi identik.

b. Uji Asumsi Independen

Plot *Autocorrelation Function* (ACF) merupakan salah satu cara untuk mendeteksi residual bersifat independen atau tidak. Hipotesisnya adalah :


$$H_0: \rho_w = 0 \text{ (residual independen)}$$

$$H_1: \rho_w \neq 0 \text{ (residual tidak independen)}$$

Dengan melihat plot ACF dari residual maka dapat diketahui apakah residual independen atau tidak. Apabila minimal terdapat satu autokorelasi yang keluar dari lag batas signifikansi maka H_0 ditolak, artinya residual tidak independen.

Berikut hasil perhitungan ACF lag 1 sampai lag 6 secara komputasi dari residual :

Lag	ACF
1	-0,3
2	0,01
3	-0,03
4	0,11
5	-0,29
6	-0,05



Gambar 4.34 ACF dari Residual


Berdasarkan plot ACF residual pada Gambar 4.34 dapat dilihat autokorelasi pada semua lag berada didalam batas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, maka residual telah memenuhi asumsi independen.

c. Uji Asumsi Berdistribusi Normal

Berikut merupakan hipotesis uji *Kolmogorov Smirnov* :

$$H_0: F_0(x) = F(x) \text{ (Residual mengikuti distribusi normal)}$$

$$H_1: F_0(x) \neq F(x) \text{ (Residual tidak mengikuti distribusi normal)}$$



Kolmogorov-Smirnov		
Statistic	Df	Sig.
0,149	24	0.607

Tabel 4.35 Hasil Uji *Kolmogorov Smirnov*

Berdasarkan Tabel 4.35 didapatkan bahwa nilai KS sebesar 0.149 serta $p - value$ dari uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan 0.607, nilai $p - value$ ini lebih besar dari α (0,05). Selain itu nilai statistik KS (0.149) kurang dari KS_{tabel} (0.269). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, artinya residual telah berdistribusi normal.

3. Pengujian Signifikansi Model Regresi Nonparametrik

Berikut dilakukan pengujian signifikansi peubah regresi nonparametrik deret fourier. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi faktor-faktor yang mempengaruhi TPT di Sulawesi Selatan.

a. Pengujian Simultan

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah parameter model regresi deret fourier sudah signifikan atau belum. Berikut pengujian hipotesis untuk menguji signifikansi variabel secara simultan :

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_{20} = 0$$

$$H_1: \text{Minimal ada satu } \beta_s \neq 0; s = 1, 2, \dots, 20.$$

Tabel 4.36 Analisis Ragam Uji Simultan

Sumber	df	Sum of Square	Mean Square	F_{hitung}	P-value
Regresi	20	92,4	4,62	0,6	0,79
Error	3	22,8	7,62		
Total	23	115,29			

Berdasarkan Tabel 4.36 bahwa statistik uji F_{hitung} sebesar 0,6 dengan $p - value$ sebesar 0,79. Jika dibandingkan dengan nilai α sebesar 0,05, maka nilai $p - value > 0,05$. Selain itu nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, dimana nilai F_{tabel} sebesar

8,6609. Sehingga diputuskan gagal tolak H_0 . Dengan ini menunjukkan bahwa semua parameter tidak signifikan terhadap variabel respon.

b. Pengujian Parsial

Pengujian secara simultan dilakukan untuk melihat signifikansi parameter terhadap variabel dependen secara keseluruhan dengan melibatkan seluruh variabel independen. Berikut hipotesis pengujian secara parsial :

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0 \text{ dimana } k = 1, 2, \dots, 20$$

Tabel 4.37 Analisis Ragam Uji Parsial

		Koefisien	t_{hitung}	P-value	Kesimpulan
	β_0	-0,24246	-0,04496	0,966963	Tidak Signifikan
X_1	β_1	-9,74E-05	-0,09239	0,932216	Tidak Signifikan
	β_2	-0,23607	-0,18613	0,86422	Tidak Signifikan
	β_3	1,963874	1,058865	0,367371	Tidak Signifikan
	β_4	-1,49052	-0,65373	0,559923	Tidak Signifikan
X_2	β_5	-0,28404	-0,11301	0,917159	Tidak Signifikan
	β_6	0,015537	0,001226	0,999098	Tidak Signifikan
	β_7	0,401666	0,2103	0,846907	Tidak Signifikan
	β_8	-0,21157	-0,09845	0,927781	Tidak Signifikan
X_3	β_9	0,196052	0,765957	0,499452	Tidak Signifikan
	β_{10}	-0,23827	-0,1275	0,906612	Tidak Signifikan
	β_{11}	1,652599	1,120432	0,344138	Tidak Signifikan
	β_{12}	2,358709	0,687995	0,540879	Tidak Signifikan
X_4	β_{13}	0,040456	0,583064	0,600786	Tidak Signifikan
	β_{14}	1,520638	0,745893	0,509859	Tidak Signifikan
	β_{15}	2,606993	0,919228	0,425767	Tidak Signifikan

	β_{16}	-2,72642	-0,93007	0,420939	Tidak Signifikan
X_5	β_{17}	0,418857	0,70108	0,53374	Tidak Signifikan
	β_{18}	27,05964	1,067337	0,364085	Tidak Signifikan
	β_{19}	16,57246	0,945429	0,414188	Tidak Signifikan
	β_{20}	8,882934	0,989482	0,395374	Tidak Signifikan

Berdasarkan Tabel 4.37 terlihat bahwa dari 21 parameter model regresi nonparametrik deret fourier, semua parameter tidak signifikan. Parameter tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan nilai α sebesar 0,05, karena p – value-nya lebih besar dari α . Selain itu jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (3,182). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepadatan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, TPAK, angka partisipasi kasar SM, dan persentase penduduk miskin, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

4. Koefisien Determinasi dan Nilai MAPE

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan seberapa baik model regresi dalam menjelaskan variabilitas angka TPT di Sulawesi Selatan.

$$R^2 = \frac{SS_{regresi}}{SS_{total}} \times 100\%$$

$$R^2 = \frac{92,4}{115,29} \times 100\%$$

$$=80,15\%$$

Berdasarkan perhitungan yang didapatkan nilai R^2 sebesar 80,15%. Artinya variabel kepadatan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka partisipasi kasar SM, dan persentase

penduduk miskin mampu menjelaskan 80,15% variasi TPT, sedangkan 19,85% sisanya dijelaskan variabel lain.

Untuk mengukur tingkat kesalahan dari suatu estimator dapat dilihat pada perhitungan MAPE (Mean Absolute Percentage Error). Semakin kecil nilai MAPE semakin baik hasil prediksi yang diperoleh.

$$MAPE = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{A_i - F_i}{A_i} \right| \right) \times 100\%$$

Hasil perhitungan MAPE sebesar 18%, karena nilai $10\% \leq MAPE \leq 20\%$, maka dapat disimpulkan kemampuan prediksi baik.

5. Implikasi Hasil Penelitian

Tidak adanya variabel prediktor yang signifikan terhadap variabel respon dikarenakan tingginya variansi pada parameter. Dengan tingginya variansi pada parameter menyebabkan standar errornya juga tinggi. Semakin tinggi standar errornya menyebabkan semakin kecil t_{hitung} yang dihasilkan. Tingginya variansi pada parameter disebabkan oleh data diskrit pada variabel Kepadatan Penduduk (X_1). Berikut merupakan hasil perhitungan pada persamaan 3 titik osilasi variabel Kepadatan Penduduk (X_1).

Tabel 4.38 Hasil Perhitungan 3 titik osilasi variabel Kepadatan Penduduk (X_1) pada estimasi Parameter.

1 Knot	2 Knot	3 Knot
$-2,46 \times 10^{16}$	-1	$-6,3 \times 10^{15}$
0,5	-0,5	-1
$-1,37 \times 10^{14}$	-1	$2,69 \times 10^{14}$
0,258819	-0,86603	-0,70711
0,965926	0,866025	0,707107
0,866025	0,5	$2,5 \times 10^{14}$

-0,86603	0,5	$7,35 \times 10^{15}$
0,866025	0,5	$1,91 \times 10^{14}$
-0,86603	0,5	$-1,8 \times 10^{14}$
0,5	-0,5	-1
0,866025	0,5	$7,35 \times 10^{15}$
0,965926	0,866025	0,707107
-0,70711	$1,47 \times 10^{15}$	0,707107
-0,5	-0,5	1
1	1	1
0,5	-0,5	-1
0,965926	0,866025	0,707107
$-2,94 \times 10^{16}$	-1	$8,82 \times 10^{16}$
$-4,29 \times 10^{16}$	-1	$-4,9 \times 10^{16}$
0,258819	-0,86603	-0,70711
-0,70711	$-5,8 \times 10^{15}$	0,707107
0,866025	0,5	$-3,88 \times 10^{13}$
0,866025	0,5	$-1,81 \times 10^{14}$
0,866025	0,5	$2,69 \times 10^{14}$

Pada tabel diatas dapat dilihat beberapa nilai pada kolom menunjukkan nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan nilai lainnya. Dari nilai ekstrim tersebut menghasilkan parameter-parameter yang nantinya memiliki varians yang besar. Berikut dibawah merupakan contoh perhitungan pada knot pertama observasi ke-1 :

$$\begin{aligned}
 &= \cos\left(\frac{2\pi(150)}{24}\right) \\
 &= \cos\left(\frac{2\pi(150)}{24}\right) \\
 &= -2.455989 \times 10^{16}
 \end{aligned}$$

Selain itu, adanya outlier pada data juga menjadi pengaruh tingginya variansi pada parameter regresi.

6. Model Terbaik Tingkat Pengangguran Terbuka Menggunakan Regresi Nonparametrik Deret Fourier

Persamaan model regresi nonparametrik deret fourier terbaik yang menggunakan titik osilasi optimal yaitu tiga titik osilasi :

$$\begin{aligned} \hat{Y}_t = & -0.24 - 0,00009x_1 - 0,23\cos\left(\frac{2\pi x_1}{24}\right) + 1,96\cos\left(\frac{4\pi x_1}{24}\right) - 1,49\cos\left(\frac{6\pi x_1}{24}\right) - \\ & 0,28x_2 + 0,01\cos\left(\frac{2\pi x_2}{24}\right) + 0,4\cos\left(\frac{4\pi x_2}{24}\right) - 0,21\cos\left(\frac{6\pi x_2}{24}\right) + \\ & 0,19x_3 - 0,23\cos\left(\frac{2\pi x_3}{24}\right) + 1,65\cos\left(\frac{4\pi x_3}{24}\right) + 2,35\cos\left(\frac{6\pi x_3}{24}\right) + \\ & 0,04x_4 + 1,52\cos\left(\frac{2\pi x_4}{24}\right) + 2,6\cos\left(\frac{4\pi x_4}{24}\right) - 2,72\cos\left(\frac{6\pi x_4}{24}\right) + \\ & 0,41x_5 + 27,05\cos\left(\frac{2\pi x_5}{24}\right) + 16,57\cos\left(\frac{4\pi x_5}{24}\right) + 8,88\cos\left(\frac{6\pi x_5}{24}\right) \end{aligned}$$


Berikut merupakan nilai hasil estimasi regresi nonparametrik deret fourier dengan tiga titik osilasi.

\hat{Y}	Y	Error
1,407339	1,17	-0,23734
3,770138	3,31	-0,46014
4,068554	3,98	-0,08855
1,927399	2,12	0,192601
5,472116	4,13	-1,34212
3,445405	4,87	1,424595
2,625127	2,28	-0,34513
3,740538	4,71	0,969462
5,877121	5,41	-0,46712
4,893311	5,79	0,896689
5,050988	3,25	-1,80099

4,361699	3,53	-0,8317
3,406109	3,3	-0,10611
4,031071	4,75	0,718929
3,805728	3,11	-0,69573
2,602127	2,4	-0,20213
3,787989	4,66	0,872011
2,573908	2,74	0,166092
3,567511	3,04	-0,52751
5,102299	4,08	-1,0223
2,12307	3	0,87693
10,45035	10,39	-0,06035
7,209765	6,42	-0,78976
7,462812	10,32	2,857188

Tabel 4.39 Nilai Hasil Estimasi, Data Aktual, dan Error

Hasil estimasi tingkat pengangguran terbuka tertinggi sebesar 10,45%. hasil estimasi TPT tersebut tidak jauh berbeda dengan data aktual TPT tertinggi sebesar 10,39% yang terdapat dikota Makassar dengan error sebesar -0,06. Hasil estimasi tingkat pengangguran terbuka terendah sebesar 1,4%, hasil estimasi TPT tersebut tidak jauh berbeda dengan data aktual TPT terendah sebesar 1,17% yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar Dengan error sebesar -0,23.



Gambar 4.40 Perbandingan Hasil Prediktor dengan Data Aktual

Berdasarkan Gambar 4.28 diatas, dilihat bahwa secara visual grafik antara data prediktor mendekati data aktualnya. Tetapi dari hasil pengujian signifikansi menunjukkan tidak adanya parameter yang signifikan terhadap variabel respon. Tidak signifikansinya model ini dapat di tinjau dari beberapa faktor :

1. Pola data tidak sesuai dengan metode yang digunakan.
2. Tipe data tidak cocok digunakan pada pendekatan metode tersebut.
3. Terjadi kesalahan dalam pengimputan data atau dalam progam.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya.

1. Model regresi nonparametrik yang dihasilkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\hat{Y}_i = & -0.24 - 0,00009x_1 - 0,23\cos\left(\frac{2\pi x_1}{24}\right) + 1,96\cos\left(\frac{4\pi x_1}{24}\right) - 1,49\cos\left(\frac{6\pi x_1}{24}\right) - \\ & 0,28x_2 + 0,01\cos\left(\frac{2\pi x_2}{24}\right) + 0,4\cos\left(\frac{4\pi x_2}{24}\right) - 0,21\cos\left(\frac{6\pi x_2}{24}\right) + \\ & 0,19x_3 - 0,23\cos\left(\frac{2\pi x_3}{24}\right) + 1,65\cos\left(\frac{4\pi x_3}{24}\right) + 2,35\cos\left(\frac{6\pi x_3}{24}\right) + \\ & 0,04x_4 + 1,52\cos\left(\frac{2\pi x_4}{24}\right) + 2,6\cos\left(\frac{4\pi x_4}{24}\right) - 2,72\cos\left(\frac{6\pi x_4}{24}\right) + \\ & 0,41x_5 + 27,05\cos\left(\frac{2\pi x_5}{24}\right) + 16,57\cos\left(\frac{4\pi x_5}{24}\right) + 8,88\cos\left(\frac{6\pi x_5}{24}\right)\end{aligned}$$

Rata-rata TPT (Y) di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 4,28 persen dengan variansi senilai 5,01. Tingkat Pengangguran Terbuka terbesar yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 10,39 persen yang terjadi di Kota Makassar, sedangkan TPT terkecil terjadi di Kepulauan Selayar yaitu sebesar 1,17 persen. Model regresi nonparametrik deret fourier terbaik yang menggunakan titik osilasi optimal yaitu tiga titik osilasi,

dimana nilai GCV sebesar 1,52, nilai R^2 sebesar 80,13%, dan nilai MSE sebesar 0,953.

2. Tidak terdapat variabel prediktor yang memberi pengaruh secara signifikan terhadap variabel respon.

B. Saran

Berikut merupakan saran untuk penelitian berikutnya :

1. Untuk penelitian berikutnya perlu melakukan eksplorasi data agar dapat menentukan metode yang tepat untuk digunakan.
2. Menggunakan pendekatan non parametrik lainnya atau machine learning sebagai perbandingan dalam masalah tingkat signifikansi parameternya pada data TPT di Sulawesi Selatan.



Daftar Pustaka

- Abdy, Muhammad. "Tinjauan Singkat Tentang Regresi Parametrik Dan Regresi Nonparametrik." *SAINTIFIK* (2019).
- Anwar, Syaiful. *Regresi Nonparametrik Spline untuk pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Sulawesi Selatan*. Makassar: FMIPA, Univeritas ITS, 2014.
- Ardiansyah. *Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinnann Di Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: UIN Alauddin, 2019.
- Bilodeau. *Fourier Smoother and Additive Models*. Canada: The Canadian Journal Of Statistic, 1992.
- BPS. *Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan* . Makassar, Agustus 2020.
—. *Sulawesi Selatan Dalam Angka*. Makassar, 2020.
- Erilli, Alp. *Nonparametric Regression Estimation for Data with Equals Value*. Turki: Europen Scientific Journal, 2014.
- Hardle, W. *Applied Nonparametric Regression*. New York: Cambrige Press, 1990.
- Hariksa, Siti and manfaati indah. *Pemodelan Regresi Nonparametrik Deret Fourier Pada Kasus Tingkat Kemiskinan Di Sumatra Utara*. Semarang: UMS, 2019.
- Hazelton, Martin L. *Nonparametric Regression*. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition),, 2015.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*. Departemen Agama RI, n.d.
- Mirah, Ayu. *Pemodelan Regresi Deret Fourier dan Spline Truncated Dalam Regresi Nonparametrik Multivariabel*. Surabaya: ITS Surabaya, 2015.
- Mudrajat. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006.
- Prahutama, Alan. *Model Regresi Nonparametrik Deret Fourier Pada Kasus Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur*. Diponegoro: UNDIP, 2013.
- Riani, Andrea Tri and Narita Yuri. *Pemodelan Regresi Nonparametric Dengan Estimator Spline Truncated dan Deret Fourier*. Jambora Journal Of Math, 2021.

Tri, Widiya, Mustika Hadijati and Irwansyah. *Model Regresi Nonparametrik Deret Fourier Pada Pola Data Curah Hujan Di Kota Mataram*. Mataram: Eighen Mathematics Journal, 2018.

Yuri, Narita; Tri, Andrea. *Pemodelan Dengan Pendekatan Deret Fourier Pada Kasus Tingkat Pengangguran Terbuka Di NTT*. Makassar: FMIPA UNISMUH, 2020.





**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

**SURAT KETERANGAN
VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM**

No : / val / m / 358_2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Muhammad Ihsan Salim
Nim : 60600118012
Judul Karya ilmiah : **“Model Regresi Nonparametrik Dengan Pendekatan Deret fourier pada Kasus Tingkat Pengangguran Terbuka Di Sulawesi Selatan“**

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 02 Februari 2022

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika



Adnan Sauddin, S. Pd., M. S



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

A. Data

Data Tingkat Pengangguran Terbuka Di Sulawesi Selatan Dan Faktor-Faktor Yang Diduga Memengaruhinya

No	Kabupaten/Kota	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅
1	Kepulauan Selayar	1.17	150	7.66	64.81	124.68	12.83
2	Bulukumba	3.31	364	5.49	67.02	100.23	7.62
3	Bantaeng	3.98	474	10.75	71.78	113.11	9.03
4	Jeneponto	2.12	403	5.47	66.41	86.89	14.88
5	Takalar	4.13	527	6.87	63.21	110.69	8.7
6	Gowa	4.87	410	7.46	65.64	91.16	7.53
7	Sinjai	2.28	298	6.12	65.18	113.17	9.14
8	Maros	4.71	218	1.24	62.9	102.84	9.89
9	Pangkajene dan Kepulauan	5.41	302	6.41	61.22	91.1	14.06
10	Barru	5.79	148	7.41	58.55	114.84	8.57
11	Bone	3.25	166	7.01	59.84	93.39	10.06
12	Soppeng	3.53	167	7.69	57.47	95.58	7.25
13	Wajo	3.3	159	4.06	62.38	72.14	6.91
14	Sidrap	4.75	160	4.65	55.39	94.16	4.79
15	Pinrang	3.11	192	6.53	58.2	101.5	8.46
16	Enrekang	2.4	116	5.43	68.95	118.94	12.33
17	Luwu	4.66	121	6.26	64.69	96.52	12.78
18	TanaToraja	2.74	114	7.22	78.5	119.14	12.35
19	Luwu Utara	3.04	42	7.11	70.4	114.53	13.6
20	Luwu Timur	4.08	43	1.17	66.52	122.3	6.98
21	Toraja Utara	3	201	7.56	70.51	105.92	12.41
22	Kota Makassar	10.39	8686	8.79	57.77	94.34	4.28
23	Kota Parepare	6.42	1462	6.65	63.27	116.61	5.26
24	Kota Palopo	10.32	746	6.75	60.49	117.36	7.82



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400**

Keterangan :

Y = Tingkat Pengangguran Terbuka

X_1 = Kepadatan Penduduk

X_2 = Laju Pertumbuhan Ekonomi

X_3 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

X_4 = Angka Partisipasi Kasar SM

X_5 = Persentase Penduduk Miskin



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

B. Program dan Output

Program Barplot Karakteristik TPT di Sulawesi Selatan beserta faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya

```
skripsi<-read.csv("E:\\Data_TPT.csv")
head(skripsi)
barplot(table(skripsi$Kabupaten.Kota), horiz = TRUE, main =
"Kabupaten.Kota", ylab = "Kabupaten.Kota", col = c("blue"))
is.data.frame(skripsi)

library(ggplot2)
ggplot(horiz=TRUE, les=2, data=skripsi,
aes(x=skripsi$Kabupaten.Kota, y=skripsi$Y.TPT)) +
  geom_bar(stat="identity", fill="steelblue")+
  geom_text(aes(label=skripsi$Y.TPT), vjust=0,hjust=-0.3, size=3.5)+
  theme_minimal()+coord_flip()+
  ggtitle("Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)") +
  ylab("TPT") + xlab("Kabupaten")

ggplot(horiz=TRUE, les=2, data=skripsi,
aes(x=skripsi$Kabupaten.Kota, y=skripsi$X1.Kepadatan)) +
  geom_bar(stat="identity", fill="steelblue")+
  geom_text(aes(label=skripsi$X1.Kepadatan), vjust=0,hjust=-0.3,
size=3.5)+
  theme_minimal()+coord_flip()+
  ggtitle("Tingkat Kepadatan Penduduk (X1)") +
  ylab("Kepadatan Penduduk") + xlab("Kabupaten")

ggplot(horiz=TRUE, les=2, data=skripsi,
aes(x=skripsi$Kabupaten.Kota, y=skripsi$X2.Laju)) +
  geom_bar(stat="identity", fill="steelblue")+
  geom_text(aes(label=skripsi$X2.Laju), vjust=0,hjust=-0.3,
size=3.5)+
  theme_minimal()+coord_flip()+
  ggtitle("Laju Pertumbuhan Ekonomi (X2)") +
  ylab("Laju Pertumbuhan Ekonomi") + xlab("Kabupaten")

ggplot(horiz=TRUE, les=2, data=skripsi,
aes(x=skripsi$Kabupaten.Kota, y=skripsi$X3.TPAK)) +
  geom_bar(stat="identity", fill="steelblue")+
  geom_text(aes(label=skripsi$X3.TPAK), vjust=0,hjust=-0.3,
size=3.5)+
  theme_minimal()+coord_flip()+
  ggtitle("Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (X3)") +
  ylab("Tingkat Partisipasi Angkatan kerja") + xlab("Kabupaten")

ggplot(horiz=TRUE, les=2, data=skripsi,
aes(x=skripsi$Kabupaten.Kota, y=skripsi$X4.APKSM)) +
  geom_bar(stat="identity", fill="steelblue")+
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
geom_text(aes(label=skripsi$X4.APKSM), vjust=0,hjust=-0.3,
size=3.5)+
  theme_minimal()+coord_flip()+
  ggtitle("Angka Partisipasi Kasar SM (X4)") +
  ylab("Angka Partisipasi Kasar SM") + xlab("Kabupaten")

ggplot(horiz=TRUE, les=2, data=skripsi,
aes(x=skripsi$Kabupaten.Kota, y=skripsi$X5.Kemiskinan)) +
  geom_bar(stat="identity", fill="steelblue")+
  geom_text(aes(label=skripsi$X5.Kemiskinan), vjust=0,hjust=-0.3,
size=3.5)+
  theme_minimal()+coord_flip()+
  ggtitle("Persentase Penduduk Miskin (X5)") +
  ylab("Persentase Penduduk Miskin") + xlab("Kabupaten")
```

Program Scatterplot Antara Variabel Dependen dan Masing- Masing Variabel Independen. Serta Diagram Skewness dan Kurtosis

```
plot(skripsi$X1.Kepadatan, skripsi$Y.TPT, main = "Scatterplot \n
Dependent Variable TPT"
, xlab = "Kepadatan", ylab = "TPT", pch=19, frame=FALSE)

plot( skripsi$X2.Laju, skripsi$Y.TPT, main = "Scatterplot \n
Dependent Variable TPT"
, xlab = "Laju Ekonomi", ylab = "TPT", pch=19, frame=FALSE)

plot( skripsi$X3.TPAK, skripsi$Y.TPT, main = "Scatterplot \n
Dependent Variable TPT"
, xlab = "TPAK", ylab = "TPT", pch=19, frame=FALSE)

plot( skripsi$X4.APKSM, skripsi$Y.TPT, main = "Scatterplot \n
Dependent Variable TPT"
, xlab = "APK SM", ylab = "TPT", pch=19, frame=FALSE)

plot( skripsi$X5.Kemiskinan, skripsi$Y.TPT, main = "Scatterplot \n
Dependent Variable TPT"
, xlab = "Persentase Penduduk Miskin", ylab = "TPT", pch=19,
frame=FALSE)

#Diagram kurtosis dan skewness
#kurtosis dan skewness
library(ggplot2)
datasim <- data.frame(skripsi$Y.TPT)
ggplot(datasim, aes(x = skripsi$Y.TPT), binwidth = 2) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..), fill = 'blue', alpha = 0.5) +
  geom_density(colour = 'red') + xlab(expression( bold('TPT') )) +
  ylab(expression( bold('Density') ))
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
library(moments)
skewness(skripsi$Y.TPT)
kurtosis(skripsi$Y.TPT)
mean(skripsi$Y.TPT)
modus<-function(x){
  uniqx<-unique(x)
  uniqx[which.max(tabulate(match(x, uniqx)))]
}
modus(skripsi$Y.TPT)
median(skripsi$Y.TPT)

datasim <- data.frame(skripsi$X1.Kepadatan)
ggplot(datasim, aes(x = skripsi$X1.Kepadatan), binwidth = 2) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..), fill = 'blue', alpha = 0.5) +
  geom_density(colour = 'red') + xlab(expression(bold('Kepadatan
Penduduk')))) +
  ylab(expression(bold('Density'))))
library(moments)
skewness(skripsi$X1.Kepadatan)
kurtosis(skripsi$X1.Kepadatan)
mean(skripsi$X1.Kepadatan)
modus<-function(x){
  uniqx<-unique(x)
  uniqx[which.max(tabulate(match(x, uniqx)))]
}
modus(skripsi$X1.Kepadatan)
median(skripsi$X1.Kepadatan)

datasim <- data.frame(skripsi$X2.Laju)
ggplot(datasim, aes(x = skripsi$X2.Laju), binwidth = 2) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..), fill = 'blue', alpha = 0.5) +
  geom_density(colour = 'red') + xlab(expression(bold('Laju
Pertumbuhan Ekonomi')))) +
  ylab(expression(bold('Density'))))
library(moments)
skewness(skripsi$X2.Laju)
kurtosis(skripsi$X2.Laju)
mean(skripsi$X2.Laju)
modus<-function(x){
  uniqx<-unique(x)
  uniqx[which.max(tabulate(match(x, uniqx)))]
}
modus(skripsi$X2.Laju)
median(skripsi$X2.Laju)

datasim <- data.frame(skripsi$X3.TPAK)
ggplot(datasim, aes(x = skripsi$X3.TPAK), binwidth = 2) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..), fill = 'blue', alpha = 0.5) +
  geom_density(colour = 'red') + xlab(expression(bold('TPAK')))) +
  ylab(expression(bold('Density'))))
library(moments)
skewness(skripsi$X3.TPAK)
kurtosis(skripsi$X3.TPAK)
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
mean(skripsi$X3.TPAK)
modus<-function(x){
  uniqx<-unique(x)
  uniqx[which.max(tabulate(match(x, uniqx)))]
}
modus(skripsi$X3.TPAK)
median(skripsi$X3.TPAK)

datasim <- data.frame(skripsi$X4.APKSM)
ggplot(datasim, aes(x = skripsi$X4.APKSM), binwidth = 2) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..), fill = 'blue', alpha = 0.5) +
  geom_density(colour = 'red') + xlab(expression(bold('Angka
Partisipasi Kasar SM')))) +
  ylab(expression(bold('Density'))))
library(moments)
skewness(skripsi$X4.APKSM)
kurtosis(skripsi$X4.APKSM)
mean(skripsi$X4.APKSM)
modus<-function(x){
  uniqx<-unique(x)
  uniqx[which.max(tabulate(match(x, uniqx)))]
}
modus(skripsi$X4.APKSM)
median(skripsi$X4.APKSM)

datasim <- data.frame(skripsi$X5.Kemiskinan)
ggplot(datasim, aes(x = skripsi$X5.Kemiskinan), binwidth = 2) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..), fill = 'blue', alpha = 0.5) +
  geom_density(colour = 'red') +
  xlab(expression(bold('Kemiskinan')))) +
  ylab(expression(bold('Density'))))
library(moments)
skewness(skripsi$X5.Kemiskinan)
kurtosis(skripsi$X5.Kemiskinan)
mean(skripsi$X5.Kemiskinan)
modus<-function(x){
  uniqx<-unique(x)
  uniqx[which.max(tabulate(match(x, uniqx)))]
}
modus(skripsi$X5.Kemiskinan)
median(skripsi$X5.Kemiskinan)
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Program Penentuan Nilai K Optimal

```
data=read.table("e://Data_TPT.txt", header = TRUE)
data
Y=as.matrix(data[,1])
X1=as.matrix(data[,2])
X2=as.matrix(data[,3])
X3=as.matrix(data[,4])
X4=as.matrix(data[,5])
X5=as.matrix(data[,6])
deretfourier<-function(Y, x1, x2, x3, x4, x5, K)
{
  N=length(Y)
  a<-(5*(K+1))+1
  C<-matrix(0, N, a)
  hasil<-matrix(0, K, 2)
  for (k in 1:K)
  {
    for(i in 1:N)
    {
      for(j in 1:k)
      {
        C[i,1]=1
        C[i,2]<-X1[i]
        C[i,2+j]=cos(j*X1[i])
        C[i,3+k]<-X2[i]
        C[i,3+k+j]<-cos(j*X2[i])
        C[i,4+(2*k)]<-X3[i]
        C[i,4+(2*k)+j]<-cos(j*X3[i])
        C[i,5+(3*k)]<-X4[i]
        C[i,5+(3*k)+j]<-cos(j*X4[i])
        C[i,6+(4*k)]<-X5[i]
        C[i,6+(4*k)+j]<-cos(j*X5[i])
      }
    }
    Library(pracma)
    I<-diag(1,N,N)
    A<- C %%% Pinv(t(C) %%% C) %%% t(C)
    Atot=A
    Ytop<-Atot %%% Y
    df<-sum(diag(Atot))
    w<-(1/N)*I
    atas<-t(Y-Ytop) %%% w %%% (Y-Ytop)
    bawah<-((1-df)/N)^2
    GCV<-atas/bawah
    hasil[k,1]<-k
    hasil[k,2]<-GCV
  }
  print(hasil)
  GCV2<-min(hasil[,2])
  s<-1
}
```




TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
repeat{
  if(hasil[s,2]==GCV2)
  {
    kOpt<-hasil[s,1]
    GCVOpt<-GCV2
    break
  }
  else s<-s+1
}
cat("nilai k Optimal adalah \t",kOpt,"\n")
print(C)
}
deretfourier(Y, x1, x2, x3, x4, x5, k<-c(3))
```

Program Estimasi Model

```
data=read.table("e://Data_TPT.txt", header = TRUE)
data
Y=as.matrix(data[,1])
X1=as.matrix(data[,2])
X2=as.matrix(data[,3])
X3=as.matrix(data[,4])
X4=as.matrix(data[,5])
X5=as.matrix(data[,6])
estimasi<-function(Y, x1, x2, x3, x4, x5, kOptimal)
{
  N<-length(Y)
  X<-matrix(0, N, 2)
  k<-kOptimal
  a<-(5*(k+1))+1
  C<-matrix(0, N, a)
  hasil<-matrix(0, k, 2)
  error<-rep(0, N)

  cat("=====")
  cat("\nx\ty\t\tytopi\t\terror")

  cat("\n=====")
  for(i in 1:N)
  {
    for(j in 1:k)
    {
      C[i,1]=1
      C[i,2]<-X1[i]
      C[i,2+j]=cos(j*X1[i])
      C[i,3+k]<-X2[i]
      C[i,3+k+j]<-cos(j*X2[i])
    }
  }
}
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
C[i,4+(2*k)]<-x3[i]
C[i,4+(2*k)+j]<-cos(j*x3[i])
C[i,5+(3*k)]<-x4[i]
C[i,5+(3*k)+j]<-cos(j*x4[i])
C[i,6+(4*k)]<-x5[i]
C[i,6+(4*k)+j]<-cos(j*x5[i])
}
}
Library(pracma)
I<-diag(1, N, N)
A<-C%%Pinv(t(C)%%C)%%t(C)
Atot<-A
ytop<-Atot%%Y
alfa<-rep(0,a)
alfa<-MPL(t(C)%%C)%%t(C)%%Y
error<-Y-ytop
MSE<-sum((error)^2)/N
for(i in 1:N)
{
  cat("\n", "\t", Y[i], "\t", ytop[i], "\t", error[i], "\n")
}

cat("\n=====
=====\n")
cat("\n MSE=", MSE, "\n")
Q<-0
for(i in 1:N)
{
  q<-(ytop[i]-mean(Y))^2
  Q<-Q+q
}
F<-0
for(i in 1:N)
{
  f<-(Y[i]-mean(Y))^2
  F<-F+f
}
R<-Q/F
cat("Nilai Koefisien Determinasi =")
print(R)
print(alfa)
}

dx<-estimasi(Y, x1, x2, x3, x4, x5, koptimal = 3)
write.csv(dx, file="e:/estimasi.csv")
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Program Uji Serentak dan Uji Parsial 3 titik knot

```
uji=function(alpha)
{
  data=read.table("e://Data_TPT.txt", header = TRUE)
  knot=read.table("e://knot.txt", header = TRUE)
  data=as.matrix(data)
  knot=as.matrix(knot)
  ybar=mean(data[,1])
  p=nrow(data)
  q=ncol(data)
  satu=rep(1,p)
  n1=ncol(knot)
  mx=cbind(satu, data[,2], knot[,1], knot[,6], knot[,11], data[,3],
  knot[,2], knot[,7], knot[,12], data[,3], knot[,3], knot[,8],
  knot[,13], data[,4], knot[,4], knot[,9], knot[,14], data[,5],
  knot[,5], knot[,10], knot[,15])
  mx=as.matrix(mx)
  library(pracma)
  B=(pinv(t(mx)%*%mx))%*%t(mx)%*%data[,1]
  cat("=====", "\n")
  cat("Estimasi Parameter", "\n")
  cat("=====", "\n")
  print (B)
  n1=nrow(B)
  yhat=mx%*%B
  res=data[,1]-yhat
  SSE=sum((data[,1]-yhat)^2)
  SSR=sum((yhat-ybar)^2)
  SST=SSE+SSR
  MSE=SSE/(p-n1)
  MSR=SSR/(n1-1)
  Rsq=(SSR/(SSR+SSE))*100
  #uji F (uji serentak)
  Fhit=MSR/MSE
  pvalue=pf(Fhit, (n1-1), (p-n1), lower.tail=FALSE)
  if (pvalue<=alpha)
  {
    cat("-----", "\n")
    cat("Kesimpulan hasil uji serentak", "\n")
    cat("-----", "\n")
    cat("Tolak Ho yakni minimal terdapat 1 prediktor yang
signifikan", "\n")
    cat("", "\n")
  }
  else
  {
    cat("-----", "\n")
    cat("Kesimpulan hasil uji serentak", "\n")
    cat("-----", "\n")
  }
}
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
cat("Gagal Tolak Ho yakni semua prediktor tidak berpengaruh
signifikan","\n")
cat("", "\n")
}
#uji t (uji individu)
thit=rep(NA,n1)
pval=rep(NA,n1)
SE=sqrt(diag(MSE*(pinv(t(mx)%*%mx))))
cat("-----","\n")
cat("Kesimpulan hasil uji individu","\n")
cat("-----","\n")
thit=rep(NA,n1)
pval=rep(NA,n1)
for (i in 1:n1)
{
  thit[i]=B[i,1]/SE[i]
  pval[i]=2*(pt(abs(thit[i]),(p-n1),lower.tail=FALSE))
  if (pval[i]<=alpha) cat("Tolak Ho yakni prediktor signifikan
dengan pvalue",pval[i],"\n") else cat("Gagal tolak Ho yakni
prediktor tidak signifikan dengan pvalue",pval[i],"\n")
}
thit=as.matrix(thit)
cat("====","\n")
cat("nilai t hitung","\n")
cat("====","\n")
print (thit)
cat("Analysis of variance","\n")
cat("====","\n")
cat("Sumber      df      SS      MS      Fhit","\n")
cat("Regresi ",(n1-1)," ",SSR," ",MSR,"",Fhit,"\n")
cat("Error      ",p-n1," ",SSE,"",MSE,"\n")
cat("Total      ",p-1," ",SST,"\n")
cat("====","\n")
cat("s=",sqrt(MSE)," Rsq=",Rsq,"\n")
cat("pvalue(F)=",pvalue,"\n")
write.csv(res,file="E:/output residual.csv")
# write.csv(pval,file="E:/output pvalue.csv")
# write.csv(mx,file="E:/output mx.csv")
write.csv(yhat,file="E:/output yhat.csv")
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Program Uji Asumsi Identik, Uji Independen, dan Uji Asumsi Berdistribusi Normal

```
#Uji Asumsi Identik
x<-read.csv("E:\\output ytop.csv", header = FALSE)
y<-read.csv("E:\\output error.csv", header = FALSE)
plot(y[,1],x[,1],
      col="royalblue", main = "Scatterplot \n Yhat Vs res",
      xlab = "res",
      ylab = "yhat",pch=20
)
Library(skedastic)
Glejser(output3)
#Uji Independen

res<-read.csv("E:\\output error.csv", header = FALSE)
z <- acf(res)
z$acf[2:7]
plot(z$acf[2:7],
      type="h",
      main="Autocorrelation Function for res \n 5% significance
limits",
      xlab="Lag",
      ylab="Autocorrelation",
      ylim=c(-1,1), # this sets the y scale to -0.2 to 0.2
      las=1,
      xaxt="n")
abline(h=0)
# Add labels to the x-axis
x <- c(1:12)
y <- c(1:12)
axis(1, at=x, labels=y)
# Add 5% critical levels
abline(h=c(2/sqrt(17),-2/sqrt(17)),lty=c(2,2), col="red")
#uji Berdistribusi Normal

res<-read.csv("E:\\output error.csv", header = FALSE)
qqnorm(res[,1], pch = 1, frame = FALSE)
qqline(res[,1], col = "steelblue", lwd = 2)
library("car")
qqPlot(res[,1], ylab = "residual")
ks <- function(x, ...){

  m <- mean(x, ...)
  sd <- sd(x, ...)
  ks_test <- ks.test(x, "pnorm", m, sd)
  out <- list(value = ks_test$statistic, p_value = ks_test$p.value)
  return(out)
}
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Program Plot Interpretasi Model dan Plot 1, 2, 3 Knot

```
x1=function(x){0.0009326982*x0.2796409609*cos(x)+1.2611940751*cos(2*x)+1.5910287058*cos(3*x)}
curve(x1, from=0, to=20, n=200, xlab="Y", ylab="X", col="red",lwd=2,
      main="Plot Kurva X1 ")
abline(h = 0, col = 'grey', lwd = 2)

x3=function(x){(-0.0423554567*x)-
1.3813680210*cos(x)+1.5411988899*cos(2*x)-0.2436868230*cos(3*x)}
curve(x3, from=0, to=20, n=200, xlab="Y", ylab="X",
      col="aquamarine3",lwd=2,
      main="Plot Kurva X3 ")
abline(h = 0, col = 'grey', lwd = 2)

x4=function(x){(0.0518280359*x)-1.5919801452*cos(x)-
0.9684525357*cos(2*x)+1.3084829721*cos(3*x)}
curve(x4, from=0, to=20, n=200, xlab="Y", ylab="X",
      col="chartreuse",lwd=2,
      main="Plot Kurva X4 ")
abline(h = 0, col = 'red', lwd = 2)

x5=function(x){(0.0543133432*x)+1.0404724005*cos(x)-
2.1395979912*cos(2*x)+1.1781416439*cos(3*x)}
curve(x5, from=0, to=20, n=200, xlab="Y", ylab="X",
      col="brown1",lwd=2,
      main="Plot Kurva X5 ")
abline(h = 0, col = 'green', lwd = 2)
plot(DataM[1:72,1], DataM[1:72,2], col = "black",
      main = "Residual vs Fitted",
      xlab = "Fitted",
      ylab = "Residual")
abline(h=0, col='black', lwd =1, lty=2, type=3)

lines(lowess(DataM[1:24,1], DataM[1:24,2]), col = "blue", lwd = 3)
lines(lowess(DataM[25:48,1], DataM[25:48,2]), col = "red", lwd = 3)
lines(lowess(DataM[49:72,1], DataM[49:72,2]), col = "green", lwd =
3)

legend("topleft", c("knot 1", "knot 2", "knot 3"),
      lty = c(1,1), cex=0.6,
      col = c("red", "Blue", "Green"))
```

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Ihsan Salim, lahir di Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Mursalim dan ibu Nurhasanah. Penulis berdomisili di Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 3 Langadai pada tahun 2013, lalu melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kelumpang hilir dan lulus pada tahun 2015, kemudian lanjut di MAS DDI Pattojo dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Matematika dengan jalur SNMPTN.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R