


**OPTIMASI MEDIA PERTUMBUHAN *Aspergillus niger* DENGAN
MENGUNAKAN TEPUNG SINGKONG**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Jurusan
Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :

IRMA
NIM. 60300111022

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma
NIM : 60300111022
Tempat/Tgl. Lahir : Paria,07 Juli 1993
Jur/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Griya Patri Abdullah Permai
Judul :Optimasi Media Pertumbuhan *Aspergillus niger* dengan menggunakan tepung singkong

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2015

Penyusun,

Irma

NIM: 60300111022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Optimasi Media Pertumbuhan *Aspergillus niger* dengan Menggunakan Tepung Singkong”, yang disusun oleh Irma, NIM: 60300111022, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 M, bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, Desember 2015 M
Rabiul Awal 1437 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Wasilah, S.T., M.T (.....)

Sekretaris : Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes (.....)

Munaqisy I : Hafsan, S.Si., M.Pd (.....)

Munaqisy II : Eka Sukmawaty S.Si., M.Si (.....)

Munaqisy III : Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed (.....)

Pembimbing I : Fatmawati Nur, S.Si., M.Si (.....)

Pembimbing II: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, A., M. Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji atas kebesaran Sang Khalik yang telah menciptakan alam semesta dalam suatu keteraturan hingga dari lisan terpercik berjuta rasa syukur kehadiran Allah swt karena atas limpahan Rahmat, Hidayat dan Karunia-Nyalah sehingga saya diberikan kekuatan, kesempatan dan kemudahan kepada hamba-Nya untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini yang berjudul “**Optimasi Media Pertumbuhan *Aspergillus niger* dengan menggunakan Tepung Singkong**” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Fakultas Sains Teknologi UIN Alauddin Makassar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga pada umatnya hingga akhir zaman ini yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menuntun manusia dari lembah kebidaban menjadi kebaikan seperti sekarang ini yang menjadi suri tauladan/uswatun hasanah bagi kita semua.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sains pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya, dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan tantangan. Namun berkat kerja keras dan motivasi dari pihak-pihak langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini. Olehnya itu, secara mendalam saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan juga seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin, A., M. Ag selaku Dekan baru Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh jajarannya.
3. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes. selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Baiq Farhatul Wahidah S.Si., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Fatmawati Nur S.Si., M.Si selaku pembimbing I, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, bantuan, waktu luang serta kesabarannya selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.,Si selaku pembimbing II, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, bantuan, waktu luang serta kesabrannya selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Hafsan, S.Si., M.Si., Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si dan Muh.Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ag., M.Ed. selaku Dosen Penguji I, Penguji II dan Penguji III yang selama ini banyak memberikan saran dan kritik yang baik dan bermamfaat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Mustakim S.Si., Zulkarnain S.Si., M.kes dan Kurniati S.Si selaku Laboran Botani, Zoologi dan Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang sangat membantu dalam penelitian ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah megajarkan banyak hal serta pengetahuan yang berlimpah selama kuliah di kampus ini serta seluruh staf Jurusan Bilogi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddiin Makassar.
10. Kepala Perpustakaan beserta jajarannya, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Para keluarga yang ada di pinrang, terutama saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan semangat serta do'a untuk penyusun selama ini.
12. Sahabat-sahabatku (Beby, Nunu, Dhani, Ratih, era) terkhusus buat Ika dan Fika terima kasih sudah membantu walau dalam keadaan lelahpun tetap mengajariku, terima kasih atas dukungannya serta setia menemaniku disaat suka maupun duka selama ini.
13. Teman-teman angkatan 2011 “SINAPSIS” yang telah memberikan dukungan dan kenangan yang tak terlupakan selama ini.

14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberikan do'a, semangat, dukungan, saran dan pemikiran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan rendah hati penulis berharap semoga Allah swt memberikan balasan atas bantuan dan pemikirannya, sebagai akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermamfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi peneliti lain serta menambah khasanah ilmu pengetahuan.



Makassar, Desember 2015

Penulis

IRMA


NIM:60300111022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-5
A. Latar Belakang	1-3
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4-5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7-39
A. Tinjauan Umum <i>Aspergillus niger</i>	7-11
B. Uraian Tentang Singkong (<i>Manihot esculenta</i>)	11-16
C. Uraian Tentang Jagung (<i>Zea Mays</i>)	16-23
D. Uraian Tentang Padi (<i>Oryza Sativa</i>)	23-29
E. Tinjauan Karbohidrat	29-36
F. Ayat yang relevan	36-38
G. Hipotesis.....	38
H. Kerangka Pikir	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40-45
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	40-41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	41-42
D. Variabel Penelitian	42
E. Definisi Operasional Variabel.....	42
F. Metode Pengumpulan Data.....	42

G. Instrumen Penelitian.....	42-43
H. Prosedur Kerja.....	43-45
a. Tahap Pendahuluan	43-44
b. Tahap Penelitian.....	44-45
I. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46-63
A. Hasil Penelitian	46-51
B. Pembahasan.....	51-63
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
KEPUSTAKAAN	65-70
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	71-98
DAFTAR RIWAYAT.....	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Produksi enzim dari <i>Aspergillus niger</i> dan Aplikasinya.....	11
Tabel 2.2. Nilai Kalori berbagai tanaman penghasil karbohidrat	12
Tabel 2.3. Kandungan Unsur-unsur Gizi dan kalori dalam singkong.....	12
Tabel 2.4. Komposisi Kimia dari tepung tapioka	14
Tabel 2.5. Syarat mutu tepung tapioka menurut SNI	15-16
Tabel 2.6. Komposisi Kimia jagung per 100 gram	20
Tabel 2.7. Komposisi kimia biji jagung	21
Tabel 2.8. Komposisi kimia tepung jagung dan terigu per 100 gram	22
Tabel 2.9. Sifat-sifat Padi Indica dan Indo-Yoponica	26
Tabel 4.1. Pengukuran diameter koloni <i>Aspergillus niger</i> pada penambahan tepung Singkong	46
Tabel 4.2. Hasil sidik ragam diameter koloni <i>Aspergillus niger</i> yang ditumbuhkan pada PDA	47
Tabel 4.3. Perhitungan jumlah spora <i>Aspergillus niger</i> pada penambahan tepung Singkong	48-49
Tabel 4.4. Hasil sidik ragam perhitungan jumlah spora <i>Aspergillus niger</i> dengan menggunakan haemocytometer	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Koloni <i>Aspergillus niger</i>	9
Gambar 2.2. Umbi Singkong (<i>Manihot Utilisima</i>)	13
Gambar 2.3. Tanaman jagung (<i>Zea Mays</i>).....	18
Gambar 2.4. Tanaman Padi (<i>Oryza sativa</i>).....	26



DAFTAR GRAFIK

- Grafik 4.1. Grafik perbandingan rata-rata diameter pertumbuhan *Aspergillus niger* pada PDA dengan penambahan tepung singkong..... 50
- Grafik 4.2. Grafik perbandingan rata-rata jumlah spora *Aspergillus niger* pada PDA dengan penambahan tepung singkong 51



ABSTRAK

Nama : Irma
NIM : 60300111022
Judul Skripsi : “Optimasi Media pertumbuhan *Aspergillus niger* dengan menggunakan tepung singkong”

Aspergillus niger merupakan kapang berfilamen dengan banyak manfaat seperti menghasilkan asam sitrat dan berbagai enzim. Dalam pertumbuhannya *A.niger* memerlukan banyak nutrien yang salah satunya adalah karbohidrat. sumber karbohidrat dalam penelitian ini diperoleh dari tepung singkong. Penelitian ini adalah kuantitatif eksperimental dengan 3 kali pengulangan dengan menggunakan tepung singkong dengan 3 konsentrasi yaitu 2, 4 dan 6 gr. *A. niger* diisolasi dari bahan pangan dan ditumbuhkan pada medium *potato dextrose agar* (PDA) selama tujuh hari yang telah dicampur dengan tepung tersebut. Pengukuran diameter koloni dimulai pada hari kedua hingga hari ketujuh dengan perhitungan yang dilakukan pada hari ketujuh dengan menggunakan haemocytometer dengan 5 kamar hitung. Hasil pengukuran diameter koloni dengan rata-rata secara keseluruhan yang paling baik yaitu pada tepung singkong dengan konsentrasi 4 gr dan jumlah spora yang paling banyak dihasilkan yaitu dengan rata-rata secara keseluruhan yaitu pada penggunaan tepung singkong dengan konsentrasi 4 gr. Penambahan tepung dengan konsentrasi yang berbeda menunjukkan hasil yang signifikan atau berpengaruh terhadap laju pertumbuhan *A.niger* hal ini dikarenakan ($P < \alpha 0,05$). Namun pada jumlah spora menunjukkan hasil yang tidak signifikan tidak berpengaruh nyata hal ini dikarenakan ($P > \alpha 0,05$).

Kata kunci : Optimasi, *Aspergillus niger*, Tepung singkong

ABSTRACT

Name : Irma
NIM : 60300111022
Title : "Optimization of *Aspergillus niger* growth media by using cassava flour"

Aspergillus niger is a filamentous fungus with many benefits such as produce citric acid and various enzymes. The growth of *A. niger* requires a lot of nutrients, one of which is a carbohydrate. A source of carbohydrates in this study were obtained from cassava flour. This is an experimental quantitative study with 3 repetitions using cassava flour with 3 concentrations are 2, 4 and 6 gr. *A. niger* isolated from foodstuffs and grown on *potato dextrose agar* medium (PDA) for seven days has been mixed with the flour. Measuring the diameter of the colony starts on the second day until the seventh day with the calculations performed on the seventh day using a haemocytometer count with 5 rooms. Results of measuring the diameter of the colony with an average overall best that is on cassava flour with a concentration of 4 g and the number of spores of the most widely produced, namely with an average overall is on the use of cassava flour with a concentration of 4 g. The addition of flour with different concentrations showed significant results or affect the rate of growth of *A. niger* this is because ($P < \alpha$ 0.05). But the number of spores showed no significant results not significant this is because ($P > 0.05 \alpha$).

Keywords: Optimization, *Aspergillus niger*, cassava flour

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia sekarang ini terus mengalami peningkatan, contohnya kebutuhan akan produk berbasis bioteknologi seperti fermentasi. Berbagai macam proses fermentasi sangat luas penerapannya dan merupakan proses utama di dalam suatu industri atau merupakan proses penunjang untuk menghasilkan suatu produk (Kusuma, 2010).

Mikroorganisme (bakteri, khamir, kapang) telah lama dimanfaatkan oleh manusia mulai dari 8000 tahun yang lalu dalam pembuatan dan produksi makanan dan minuman seperti roti, keju, bir, anggur, dsb. Mikroba mengandung kira-kira 2000-3000 jenis biokatalisator enzim yang mengkatalisis reaksi biokimiawi. Keragaman biokimiawi mikroorganisme membuat makhluk ini berpotensi sebagai sumber berbagai jenis enzim (Suhartono, 1989).

Salah satu jenis kapang yang populer dan banyak digunakan secara komersial dalam suatu produksi yaitu *Aspergillus niger*. Selain karena mudah tumbuh dengan cepat *A. niger* juga merupakan salah satu spesies *Aspergillus* yang tidak menghasilkan mikotoksin sehingga tidak membahayakan (Gras, 2008 dalam Maryanty, 2010).

A. niger mempunyai banyak manfaat seperti memiliki kemampuan untuk memproduksi asam sitrat (Ali *et al.*,2002). Selain itu *Aspergillus* juga merupakan mikroorganisme yang dapat menghasilkan enzim hidrolitik seperti amilase, pektinase, protease dan lipase yang dapat menyebabkan kapang dapat tumbuh pada makanan yang mengandung pati, pektin, protein dan lipid (Fardiaz, 1992).

A. niger memerlukan nutrisi untuk pertumbuhannya. Nutrien berupa unsur-unsur atau senyawa kimia dari lingkungan digunakan sel sebagai konstituen kimia penyusun sel. Secara umum, nutrisi yang diperlukan dalam bentuk karbon, nitrogen, sulfur, kalium, magnesium, natrium, kalsium, nutrisi mikro (besi, mangan, seng, kobalt, molybdenum) dan vitamin (Gandjar dkk, 2006).

Kapang memerlukan nutrient dengan komposisi tertentu untuk tumbuh dan membelah diri. Komposisi nutrisi untuk pertumbuhan mikroba berbeda bagi mikroba yang berbeda. Untuk kapang berfilamen, rata-rata mengandung 10-25% protein, 1-3% asam nukleat, 20-50% lipida (% berat kering). Sejumlah mineral dan unsur hara terdapat didalam tubuh mikroba untuk menjalankan fungsi khusus; K, Ca, Mg, Fe,Co, Zn dan Mo. Dengan sendirinya kandungan kimiawi ini mempengaruhi kebutuhan nutrisi untuk menunjang pengandaan sel dan pertumbuhannya (Suhartono, 1989).

Salah satu unsur yang paling banyak dibutuhkan oleh *A. niger* untuk pertumbuhannya adalah karbohidrat. Sumber karbohidrat banyak terdapat pada beras, jagung dan singkong. Salah satu hasil produk olahan ini yaitu dibuat menjadi tepung tanpa mengurangi kadar karbohidrat yang terkandung di dalamnya. Tepung

ialah produk hasil pertanian atau bahan pangan yang dikeringkan atau dihaluskan seperti tepung beras, tepung maizena, tepung terigu, tapioka dan sagu.

Sumber karbon biasanya merupakan gula sederhana, misalnya dekstrosa. Meskipun demikian untuk tujuan tertentu dapat pula digunakan karbohidrat kompleks sebagai sumber karbon, misalnya selulosa. Meskipun dalam jumlah sedikit, unsur hara seperti natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, besi, mangan, tembaga, seng, klor dan kobalt dapat dikatakan diperlukan oleh organisme. Dengan demikian media biakan pun harus tersusun dari unsur hara tersebut dalam jumlah yang kecil (Fardiaz, 1987).

A.niger dikenal sebagai salah satu mikroorganisme yang memiliki kemampuan tinggi untuk menghasilkan enzim asparaginase. Pengamatan terhadap pengaruh penambahan berbagai jenis tepung pada media pertumbuhan *A. niger* terhadap produksi perlu dilakukan sebagai langkah awal sebelum proses industri (Wuryanti, 2008).

Telah dilakukan pra-eksperimen sebelumnya dengan menggunakan tiga media tepung yaitu tepung beras, tepung jagung dan tepung singkong. Dari ketiga media tepung tersebut diperoleh hasil yang terbaik terhadap laju pertumbuhan dan jumlah spora *A. niger* yaitu pada penambahan tepung singkong. Oleh karena itu pada penelitian ini dilanjutkan penelitian berupa optimasi media pertumbuhan *A. niger* dengan menggunakan tepung singkong.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penambahan tepung singkong terhadap laju pertumbuhan miselium *Aspergillus niger* ?
2. Bagaimana pengaruh penambahan tepung singkong terhadap produksi jumlah spora *Aspergillus niger* ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Isolat *Aspergillus niger* didapatkan dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman yang banyak digunakan pada produk berbasis bioteknologi seperti fermentasi.
2. Tepung Singkong merupakan hasil produksi pertanian yang merupakan produk olahan yang dibeli di toko terdekat.
3. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Botani Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 3 juli 2015.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi yang sangat erat dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sadad dkk (2014),. Pemanfaatan bekatul padi, bekatul jagung dan kulit ari biji kedelai sebagai media pertumbuhan miselium cendawan *Metarhizum anisopliae* yang paling efektif untuk pertumbuhan miselium cendawan *M. Anisopliae* berdasarkan diameter permukaan media yang tertutupi miselium terbesar. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan satu faktor perlakuan yaitu berbagai macam media yang digunakan antara lain media PDA, bekatul padi, bekatul jagung

dan kulit ari biji kedelai. Perlakuan diulang 6 kali sehingga diperoleh 24 unit eksperimen dan penempatannya dilakukan secara acak. Data berupa diameter miselium diuji secara statistik dengan uji anova satu arah, hasilnya signifikan dilanjutkan dengan uji BNT. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perlakuan berbagai media memberikan perbedaan pertumbuhan diameter miselium cendawan *M. Anisopliae*. Media perlakuan yang paling baik dalam menumbuhkan miselium cendawan *M. Anisopliae* yaitu pada media bekatul padi dengan rerata diameter permukaan media yang tertutupi miselium 6,8 cm dimana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perlakuan berbagai media memberikan perbedaan pertumbuhan diameter miselium cendawan *M. Anisopliae* yaitu pada media bekatul padi dengan rerata diameter permukaan media yang tertutupi miselium 6,8 cm.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung singkong terhadap laju pertumbuhan miselium *Aspergillus niger*.
2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan dan tepung singkong terhadap jumlah spora *Aspergillus niger*.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada para peneliti bahwa tepung singkong dapat mengoptimasi pertumbuhan *Aspergillus niger* .
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat dan industri yang bergerak di bidang pangan.
3. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Tinjauan Umum tentang Aspergillus sp*

Aspergillus merupakan salah satu marga tertua jamur (Raper dan Fennel, 1965) membagi *Aspergillus* mejadi delapan belas kelompok yaitu, *Aspergillus clavatus*, *Aspergillus glaucus*, *Aspergillus restrictus*, *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus ochraceus*, *Aspergillus niger*, *Aspergillus candidus*, *Aspergillus flavus*, *Aspergillus wentii*, *Aspergillus cremeus*, *Aspergillus sparsus*, *Aspergillus versicolor*, *Aspergillus nidulans*, *Aspergillus ustus*, *Aspergillus flavipes* dan *Aspergillus terreus*.

Aspergillus niger adalah kapang anggota genus *Aspergillus*, famili Monoliaceae, ordo Monoliales, kelas Deuteromycetes, dan divisi Eumycetes (Hardjo dkk, 1989).

1. **Karakteristik *Aspergillus niger***

Ciri-ciri spesifik *Aspergillus* adalah hifanya bersepta dan miseliumnya bercabang, biasanya tidak bewarna, yang terdapat di permukaan merupakan hifa vegetatif, sedangkan yang muncul diatas permukaan umumnya merupakan hifa fertile, koloni kompak, konidiofora septa, atau nonsepta, muncul dari “*foot cell*” (yaitu miselium yang membengkok dan tebal), konidiofornya membengkak menjadi vesikel pada ujungnya dan membentuk stigmata dimana tumbuh konidia, sterigmata biasanya sederhana, bewarna atau tidak bewarna, konidia membentuk rantai yang


bewarna hijau, coklat atau hitam dan beberapa spesies tumbuh baik pada suhu 37°C atau lebih (Debby *et al.*,2003:11).

A. niger adalah jenis jamur berfilamen, kosmopolitan dan dapat ditemukan diberbagai tempat di alam. Jamur ini disebut sebagai keindahan. Jamur ini memiliki konidia berasal dari kepala spora yang beradiasi dari pusat struktur, menyerupai *Aspergillus*. *Aspergillus* terpisah secara genus, namun memiliki kekerabatan yang dekat dengan spesies *Penicillium* di dalam kingdom fungi (Prakash dan Jha, 2014)

A. niger diisolasi dari tanah, sisa tumbuhan, dan udara di dalam ruangan. *A. niger* tumbuh optimum pada suhu 35-37 °C, dengan suhu minimum 6-8 °C dan suhu maksimum 45-47 °C (Inggrid dan Suharto, 2012:10).

Ketika berusia muda koloni *A. niger* berwarna putih dan berubah menjadi hitam ketika berbentuk konidiospora. Kepala konidia (*Conidiahead*) berwarna hitam, berbentuk bulat (Noverita, 2009).

Koloni *A. niger* berwarna putih sampai kuning pada permukaan bawah koloni yang kemudian berubah warna menjadi coklat gelap hingga hitam setelah terbentuk konidiofor (konidia). Kepala konidia radiat. Tangkai konidia (konidiofor) berdinding halus, hialin, tetapi sering berwarna coklat. Vesikula bulat sampai semi bulat dengan diameter 10-100 µm. Fialid duduk pada metula dengan ukuran 7,0 – 9,5 x 3 – 4 µm. Metula hialin sampai coklat, sering bersekat dengan ukuran 15 – 25 x 4,5 – 6,0 µm. Konidia bulat sampai semi bulat dengan diameter 3,5 – 5 µm dan berwarna coklat dengan ornamen (Noverita, 2009).



Gambar 2.1 Koloni *Aspergillus niger* (Sumber: (Noverita, 2009)).

2. Klasifikasi

Adapun klasifikasi dari *A.niger* adalah sebagai berikut :

Kingdom : Fungi

Divisi : Eumycetes

Kelas : Deuteromycetes

Ordo : Moniliales

Famili : Moniliaceae

Genus : *Aspergillus*

Spesies : *Aspergillus niger* (Food dan Drug of US, 1998).

3. Peranan *Aspergillus niger*

A.niger mempunyai banyak manfaat, seperti memiliki kemampuan untuk memproduksi asam sitrat (Ali *et al.*,2002). Selain itu juga memiliki kemampuan memproduksi enzim amilase, protease, xelulase dan lipase (Suganthi *et al.*, 2011). *A. niger* dan *penicilium digiatum* dimanfaatkan dalam meningkatkan produksi verbenol. Verbenol adalah senyawa makanan yang banyak digunakan pada minuman ringan, sup, daging, sosis, dan es krim (Rao *et al.*, 2003). Pada industri, *A. niger*

dimanfaatkan untuk memproduksi asam oksalat dan asam glukonat (Rymowicz and lenart, 2003).

A. niger mempunyai fungsi utama untuk proses saccharifikasi zat pati beras. Namun beberapa spesies digunakan untuk fermentasi produk-produk tradisional seperti kecap asin, miso (tauco) dan untuk industri fermentasi seperti industri sake (Debby *et al.*, 2003).

A. niger merupakan jamur yang dapat menghasilkan protease. Protease dari cendawan *Aspergillus* memiliki lebih banyak keuntungan daripada protease bakteri dalam pemisahan enzim karena miselium dapat dihapus hanya dengan filtrasi. Protease yang dihasilkan oleh *A. niger* lebih baik karena menghasilkan protease yang lebih tinggi, waktu produksinya lebih singkat dan biayanya relatif murah. Di beberapa negara Asia, genus *Aspergillus* banyak digunakan untuk memproduksi makanan fermentasi tradisional (Indratiningsih *et al.*, 2013).

A. niger dalam pertumbuhannya berhubungan langsung dengan zat makanan yang terdapat dalam substrat, molekul sederhana yang terdapat disekeliling hifa dapat langsung diserap sedangkan molekul yang lebih kompleks harus dipecah dahulu sebelum diserap ke dalam sel, dengan menghasilkan beberapa enzim ekstra seluler seperti protease, amilase, mananase, dan α -glaktosidase. Bahan organik dari substrat digunakan oleh *A. niger* untuk aktivitas transport molekul, pemeliharaan struktur sel dan mobilitas sel. *A. niger* bersifat toleran terhadap aktivitas air rendah, mampu tumbuh pada substrat dengan

potensial osmotik cukup tinggi dan sporulasi pada kelembaban relatif rendah (Rahman, 1989).

Terdapat 23 jenis enzim yang telah diidentifikasi dari *A. niger* dan 20 jenis enzim dari *A. oryzae* (Tauber, 1950). Menurut Reed (1966), enzim-enzim komersial yang dihasilkan dari *A. niger* adalah amilase, glukoamilase, selulase, pektinase, glukosa oksidase dan katalase. Beberapa jenis enzim yang telah diproduksi secara komersial dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2.1 Produksi enzim dari *A. niger* dan Aplikasinya (Sumber: Arima1964).

Enzim	Aplikasi
Amilase tahan asam	Sirup, industri fermentasi alkohol, produksi glukosa, membantu pencernaan, industri tekstil
Glukoamilase	Produksi glukosa
Protease	Industri makanan, membantu pencernaan
Glukosa oksidase	Untuk menghilangkan oksigen atau glukosa dari berbagai makanan, industri telur kering
Naringinase	Menghilangkan rasa pahit dan getir dalam industri sari buah jeruk

B. Uraian Tentang singkong (*Manihot esculenta*)

Ubi kayu merupakan tanaman pangan dan perdagangan (*Cash crop*). Sebagai tanaman perdagangan, ubi kayu menghasilkan starch, gapek, tepung ubi kayu, etanol, gula cair dan lain-lain. Sebagai tanaman pangan, ubi kayu merupakan sumber karbohidrat bagi 500 juta manusia di dunia. Di Indonesia, tanaman ini menempati urutan ketiga setelah padi dan jagung. Sebagai sumber karbohidrat, ubi kayu

merupakan penghasil kalori terbesar dibandingkan dengan tanaman lain (Rama, 2007).

Tabel 2.2 Nilai kalori berbagai tanaman penghasil karbohidrat (Sumber Rama, 2007).

No	Jenis Tanaman	Nilai kalori (Kal/Ha/Hr)
1	Ubi Kayu	250 x 10 ³
2	Jagung	200 x 10 ³
3	Beras	176 x 10 ³
4	Sorgum	114 x 10 ³
5	Gandum	110 x 10 ³

Tanaman singkong (*Manihot esculenta Crantz*) banyak tumbuh di Indonesia, karena tanaman ini mempunyai sifat yaitu mudah tumbuh di daerah tropis, tahan terhadap suhu tinggi, hasil produksi besar dan tidak mudah terserang hama dan penyakit. Umbi singkong merupakan sumber karbohidrat yang sangat tinggi, sehingga mampu menyediakan energi dalam jumlah yang cukup besar dan rendah kadar lemaknya (Hapsari, 2007).

Tabel 2.3 Kandungan Unsur-unsur Gizi dan kalori dalam singkong

No.	Nama Unsur	Kadar Gizi/100 gr Bahan
1.	Energi	146 kal
2.	Karbohidrat	34,7 gr
3.	Protein	1,2 gr
4.	Lemak	0,3 gr
5.	Mineral	1,3 gr
6.	Zat Besi	0,0007 mg
7.	Kalsium	0,003 mg
8.	Fosfor	0,004 mg
9.	Vitamin B	0,006 mg
10.	Vitamin C	0,003 mg
11.	Air	62,5 gr

Sumber : Daftar Analisis Bahan Makanan, Fak. Kedokteran UI, Jakarta;1992.

Umbi singkong dapat dimanfaatkan dalam beberapa bentuk makanan jadi atau setengah jadi (*intermediate*). Pengolahan singkong menjadi tepung dapat meningkatkan nilai tambah dan kegunaan singkong, serta memperpanjang masa simpannya (Hapsari, 2007).



Gambar 2.2 Umbi Singkong (*Manihot Utilisima*) (Sumber: Ani, 2010).

Adapun klasifikasi dari Singkong (*Manihot Utilisima*) sebagai berikut :

Kingdom : Plantae
 Divisi : Magnoliophyta
 Kelas : Dicotyledoneae
 Ordo : Euphorbiales
 Family : Euphorbiaceae
 Genus : Manihot
 Spesies : *Manihot Utilisima* (Rama, 2007).

Tepung singkong terbuat dari potongan ubi kayu yang telah kering kemudian dihaluskan. Selama ini tepung singkong masih terbatas penggunaannya, karena secara umum dibatasi oleh sifat fisik dan kimianya. Pati pre-gelatinisasi adalah pati

yang mengalami proses gelatinisasi dan selanjutnya dikeringkan. Pati ini akan mengalami perubahan sifat fisik dan sifat pati alami (Hapsari, 2007)

Menurut (Padmaja *et. al.*,1996) modifikasi tepung secara pre gelatinisasi dengan perebusan (*parboiling*) dapat memperbaiki karakteristik dari pasta tepung.

Pada dasarnya olahan singkong dalam industri dapat digolongkan menjadi tiga yaitu hasil fermentasi singkong (tape/peuyem), singkong yang dikeringkan (gaplek) dan tepung singkong atau tepung tapioka. Tepung tapioka digunakan dalam industri makanan atau pakan ternak, dekstrin, glukosa (gula). Dekstrin digunakan dalam industri tekstil, industri makanan dan industri kimia seperti etanol dan senyawa organik lainnya (Galih Novianto, 2011).

Tepung tapioka merupakan salah satu produk hasil olahan singkong yang banyak digunakan sebagai bahan baku utama maupun bahan penolong dalam beberapa produk pangan baik di rumah tangga maupun industri (Adi, 2007).

Tabel 2.4 komposisi kimia dari tepung tapioka (Sumber: Grace 1997).

Komposisi	Jumlah
Serat (%)	0,5
Air (%)	15
Karbohidrat (%)	85
Protein (%)	0,5-0,7
Lemak (%)	0,2
Energi (Kalori/100 gram).	307

Tepung tapioka merupakan pati yang diekstrak dari singkong. Dalam memperoleh pati dari singkong (tepung tapioka) harus dipertimbangkan usia atau kematangan dari tanaman singkong. Usia optimum yang telah ditemukan dari hasil percobaan terhadap salah satu varietas singkong yang berasal dari jawa yaitu San Pedro Preto adalah sekitar 18-20 bulan (Adi, 2007).

Tepung tapioka tersusun atas granula-granula pati berukuran 5-35 mikron, memiliki sifat birefringent yang kuat serta tersusun atas 20% amilosa dan 80% amilopektin sehingga mempunyai sifat mudah mengembang (swelling) dalam air panas (Galih Novianto, 2011).

Dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), nilai pH tepung tapioka tidak dipersyaratkan. Namun demikian, beberapa institusi mensyaratkan nilai pH untuk mengetahui mutu tepung tapioka berkaitan dengan proses pengolahan. Salah satu proses pengolahan tepung tapioka yang berkaitan dengan pH adalah pada proses pembentukan pasta. Menurut Winarno (2002), pembentukan gel optimum terjadi pada pH 4-7. Bila pH terlalu tinggi, pembentukan pasta makin cepat tercapai tetapi cepat turun lagi. Sebaliknya, bila pH terlalu rendah, pembentukan pasta menjadi lambat dan viskositasnya akan turun bila proses pemanasan dilanjutkan. The Tapioca Institute of America (TIA) menetapkan standar pH tepung tapioka sekitar 4.5-6.5 (Adi Muhammad, 2007:48).

Tabel 2.5 syarat mutu tepung tapioka menurut SNI 01-3451-1994 (Sumber: Nur azizah, 2013).

No.	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan		
			Mutu I	Mutu II	Mutu III
1	Kadar Air	%	Maks.15.0	Maks. 15.0	Maks.15.0
2	Kadar abu	%	Maks. 0.60	Maks. 0.60	Maks.0.60
3	Serat dan Benda Asing	%	Maks. 0.60	Maks. 0.60	Maks.0.60
4	Derajat Putih (BaSO ₄ =100%)	%	Min. 94.5	Min. 92.0	<92
5	Derajat Asam	Volume NaOH IN/100g	Maks. 3	Maks. 3	Maks. 3

6	Cemaran Logam				
	- Timbal	mg/kg	Maks. 1.0	Maks. 1.0	Maks. 1.0
	- Tembaga	mg/kg	Maks.10.0	Maks.10.0	Maks.10.0
	- Seng	mg/kg	Maks.40.0	Maks.40.0	Maks.40.0
	- Raksa	mg/kg	Maks.0.05	Maks.0.05	Maks.0.05
	- Arsen	mg/kg	Maks. 0.5	Maks. 0.5	Maks. 0.5
7	Cemaran mikroba				
	- Angka Lempeng Total	Koloni/ g	Maks.1.0x10 ⁶	Maks.1.0x10 ⁶	Maks.1.0x10 ⁶
	- E. Coli	Koloni/ g	-	-	-
	- Kapang	Koloni/ g	Maks.1.0x10 ⁴	Maks.1.0x10 ⁴	Maks.1.0x10 ⁴

C.Uraian Jagung (*Zea Mays*)

Jagung sebagai salah satu komoditas pertanian penghasil utama karbohidrat sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dunia. Komoditas ini merupakan bahan pangan sumber karbohidrat yang dapat menggantikan bahan pangan beras. Didaerah pedesaan yang sangat miskin, jagung biasa dijadikan bahan pangan (makanan) sehari-hari sebagai pengganti beras (nasi). Bahkan di beberapa daerah di Indonesia, jagung dijadikan bahan makan pokok. Sehingga jagung sebagai sumber utama karbohidrat memiliki peranan yang penting sebagai cadangan pangan apabila produksi beras menurun sangat drastis dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat (Bambang, 2007).

Jagung merupakan sumber kalori pengganti atau suplemen bagi beras, terutama bagi sebagian masyarakat pedesaan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi. Proporsi penggunaan jagung sebagai bahan pangan cenderung menurun,

tetapi meningkat sebagai pakan dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, jagung dikonsumsi dalam bentuk segar, kering dan dalam bentuk tepung. Alternatif produk yang dapat dikembangkan dari jagung mencakup produk olahan segar, produk primer, produk siap santap, dan produk instan (Suarni, 2005:).

Menurut Koswara (1977) menyatakan bahwa jagung memproduksi karbohidrat lebih banyak daripada sereal lainya. Hal ini disebabkan jagung termasuk tanaman yang sangat efisien dalam penggunaan energi dan tergolong dalam “*C₄dicarboxylic acid pathway*” yang menyimpan energi fotosintan dalam biji.

Jagung merupakan tanaman biji-bijian (Sereal) dan tergolong tanaman semusim (berumur pendek). Tanaman jagung tumbuh tegak dengan ketinggian 1-3 m, bergantung pada varietasnya dan tanaman tidak bercabang. Tanaman ini berasal dari amerika (Bambang, 2007).

1. Klasifikasi tanaman Jagung (*Zea mays*)

Adapun klasifikasi dari jagung (*Zea mays*) adalah sebagai berikut :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Monocotyledone
Ordo	: Gramineae
Famili	: Gramminaceae
Genus	: <i>Zea</i>
Spesies	: <i>Zea mays</i> (Bambang, 2007).

2. Deskripsi dan Morfologi

Tinggi tanaman jagung berkisar antara 90-150 cm. Batang jagung bewarna hijau sampai kekuningan, batang berbuku-buku yang dibatasi oleh ruas-ruas yang jumlahnya antara 10-40 ruas. Ruas bagian atas berbentuk silindris dan bagian bawah berbentuk agak bulat pipih. Pada batang jagung terdapat tunas yang biasanya berkembang menjadi bakal tongkol. Tetapi biasanya bakal tongkol yang berada dibawah tongkol utama tidak berkembang sempurna. Apabila sebelum polinasi tongkol diambil maka tongkol bawahnya yang akan berkembang. Daun terdapat pada buku-buku batang dan terdiri dari kelopak daun, lidah daun (*Ligula*) dan helai daun memanjang yang ujungnya meruncing. Bunga jagung bersifat protandry, di mana bunga jantan disebut malai umumnya tumbuh 1-4 hari sebelum muncul rambut pada bunga betina (Tongkol). Biji jagung tersusun rapi pada tongkol, tongkol jumlahnya satu atau lebih pr tanaman. Biji berkeping tunggal (monokotil). Setiap tongkol terdiri dari beberapa barisan biji, jumlah biji berkisar antara 200-400 butir (Nurmala, 1998:44)



Gambar 2.3 Tanaman Jagung (Sumber: Bambang: 2007)

Di Indonesia, produksi jagung sebagai bahan pangan pokok berada di urutan ketiga setelah padi dan ubikayu. Produksi jagung nasional selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan, yaitu sebesar 11.609.403 (2006), 13.287.527 ton (2007), 15.860.299 ton (2008), 17.041.215 ton (2009) serta 18.327.636 ton pada tahun 2010 (Badan Pusat Statistik, 2012). Produktivitas jagung pada tahun 2008 mencapai 40 – 42.3 kuintal/ha dan sasaran pada tahun 2009 naik menjadi 44.12 kuintal/ha, dengan produksi 18 juta ton (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian 2008). Data tersebut menunjukkan bahwa jagung mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai pangan pokok alternatif (Aini, 2013)

Jagung dapat dijadikan sebagai alternatif makanan pokok karena mempunyai beberapa keunggulan. Dilihat dari nilai gizinya, jagung mempunyai kadar protein lebih tinggi (9,5%) dibandingkan dengan beras (7,4%). Selain itu, kandungan mineral dan vitamin antara beras dan jagung juga hampir sama. Keunggulan jagung dibanding jenis serealia lainnya adalah warna kuning pada jagung. Warna kuning pada jagung dikarenakan kandungan karotenoid. Jagung kuning mengandung karotenoid berkisar antara 6,4-11,3 $\mu\text{g/g}$, 22% diantaranya beta-karoten dan 51% xantofil., Pigmen xantofil yang utama adalah lutein dan zeaxanthin (Koswara, 2009).

Tabel 2.6 komposisi kimia jagung per 100 gram (Sumber: Direktorat Gizi DKRI, 2001).

Komponen	Kadar
Air (%)	72,20
Protein (g)	1,92
Lemak (g)	1,00
Karbohidrat	22,80
Besi (mg)	0,70
Kalsium (mg)	3,00
Vitamin C (mg)	12,00
Vitamin A (IU)	400,00
Fospor	111,00
Niacin (mg)	1,70
Riboflavin (mg)	0,12
Thiamin (mg)	0,25

Jagung memiliki potensi besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, baik sebagai bahan pangan, pakan maupun bahan baku industri. Salah satu bentuk produk dari jagung adalah tepung yang merupakan salah satu bahan setengah jadi untuk bahan baku industri pangan dalam pengolahan lanjut. Tepung jagung instan menjadi alternatif pengolahan berdasarkan pertimbangan tujuan pemakaian, kemudahan dalam transportasi, dan efisiensi penyimpanan. Pembuatan tepung jagung instan dimaksudkan sebagai upaya menambah keanekaragaman pangan serta diversifikasi produk olahan jagung, usaha peningkatan nilai ekonomi dan pengawetan produk jagung serta kepraktisan penggunaan (Windy, 2013).

Biji jagung mengandung pati 54,1-71,7%, sedangkan kandungan gulanya 2,6-12,0%. Karbohidrat pada jagung sebagian besar merupakan komponen pati, sedangkan komponen lainnya adalah pentosa, serat kasar, dekstrin, sukrosa dan gula pereduksi (Suarni, 2005).

Tabel 2.7 Komposisi kimia biji jagung (Sumber: Koswara, 2009)

Komposisi kimia	Jumlah (%)
Air	13,5
Protein	10,0
Lemak/minyak	4,0
Karbohidrat	
- Pati	61,0
- Gula	1,4
- Pentosan	6,0
- Serat kasar	2,3
Abu	1,4

Pati jagung dalam perdagangan disebut tepung maizena. Proses pembuatan pati meliputi perendaman, penggilingan kasar, pemisahan lembaga dan endosperm, pemisahan serat kasar dari pati dan gluten, pemisahan gluten dari pati, dan pengeringan pati (Suarni, 2005).

Pembuatan tepung jagung dilakukan dengan menggunakan metode penggilingan kering. Penggilingan dilakukan dua kali, yaitu penggilingan pertama merupakan penggilingan kasar dengan menggunakan *hammer mill*. Hasil penggilingan kasar adalah grits, kulit, lembaga, dan tip cap. Kulit, lembaga, dan tip cap selanjutnya dipisahkan dengan pengayak. Grits adalah butiran jagung dengan ukuran kira-kira seperti beras. Grits tersebut kemudian dicuci dan direndam dalam air selama 3 jam kemudian ditiriskan. Tujuan perendaman adalah agar grits jagung tidak terlalu keras sehingga lebih mudah halus ketika digiling. Penggilingan kedua dilakukan untuk menggiling grits dengan menggunakan penggilingan halus (*disc mill*). Hasil penggilingan halus ini adalah tepung jagung yang kemudian diayak dengan pengayak 100 mesh (Koawara, 2009).

Tepung jagung yang dihasilkan berwarna kuning. Hal ini disebabkan adanya karoten pada biji jagung. Kandungan karoten total pada jagung sekitar 641 mg/100g. Rendemen tepung jagung berukuran partikel 100 mesh sebesar 54.4 % (Koswara, 2009).

Tepung jagung memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan tepung terigu, tetapi memiliki kandungan serat yang lebih tinggi. Rendahnya lemak pada tepung jagung dapat membuat tepung jagung menjadi lebih awet karena tidak mudah tengik akibat oksidasi lemak. Namun tingginya serat pada jagung menyebabkan tepung jagung memiliki tekstur yang lebih kasar dibandingkan dengan tepung terigu. Untuk memperoleh tepung sehalus terigu maka dibutuhkan pengayakan dengan mesh yang lebih besar namun rendemen yang dihasilkan akan semakin berkurang (Koswara, 2009).

Tabel 2.8 Komposisi kimia tepung jagung dan terigu per 100 gram (%)(Sumber: Koswara, 2009: 18).

Komponen	Tepung Jagung	Tepung Terigu
Air	10,9	12
Abu	0,4	0,5
Protein	5,8	8,9
Lemak	0,9	1,3
Karbohidrat	82,0	77,3
Pati	68,2	-
Serat Makanan	7,8	-

3. Jenis-jenis jagung (*Zea mays*)

Menurut (Nurmala, 1998) jenis biji jagung dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Jagung gigi kuda (*dent corn*) *zea mays indentata*. Bentuk biji seperti gigi kuda dengan bentuk lekukan yang khas pada bagian atas. Warna biji kuning, putih dan merah. Tanaman tegap, tongkol dan biji besar, berumur panjang sehingga kurang disukai oleh petani.
- b. Jagung mutiara (*Flint corn*) *zea mays indurata*. Biji berukuran sedang dengan bagian atas bulat, tidak berlekuk, warna biji merah, putih dan kuning. Tanaman tahan rebah. Umur tanaman ada yang genjah dan ada pula yang dalam. Disenangi petani karena kualitasnya lebih baik dan pengolahannya mudah.
- c. Jagung manis (*sweet corn*) *zea mays sccharota*. Jagung ini mengandung kadar gula yang relatif tinggi oleh karena itu biasanya dipanen muda untuk dibakar atau direbus. Ciri dari jagung ini apabila sudah masak bijinya menjadi keriput.
- d. Jagung berondong (*pop corn*) *zea mays everta*. Bentuk biji agak runcing, kecil dan keras dan apabila dipanggang bijinya meletus dan menjadi berondong yang baik kadar air biji harus di sekitar 14%. Warna biji kuning atau putih. Kurang tegap, tongkolnya kecil.

D. Uraian Padi (*Oryza Sativa*)

Padi (*Oryza sativa*L.) merupakan famili poacea dan genus *Oryza*. Padi jenis lain yaitu *Oryza glaberrima*, merupakan tanaman liar, tetapi bila dibudidayakan tidak dapat menghasilkan beras seperti *Oryza sativa*L. Padi ditanam lebih dari 100

negara dari semua benua kecuali antartika. Padi ditanam pada daerah 53 °LU-40 °LS sampai ketinggian 3000 m di atas permukaan laut (Koswara, 2009)

Tanaman padi (*Oryza sativa*) dapat dibedakan atas tiga ras, yaitu Javanika, Japonika dan Indika. Jenis Indika mempunyai butir padi berbentuk lonjong panjang dengan rasa nasi pera, sedangkan pada jenis Japonika, butirnya pendek bulat, dengan rasa nasi pulen dan lengket. Beras yang ada di Indonesia secara umum dikategorikan atas varietas bulu dengan ciri bentuk butiran agak bulat sampai bulat dan varietas cere dengan ciri bentuk butiran lonjong sampai sedang. *Indica* lebih pendek masa tanamnya, tahan kekurangan air, dipanen sekaligus karena butir padi mudah terlepas dari malainya sehingga mudah tercecet. Sedangkan japonica lebih lama masa tanamnya, tanaman lebih tinggi, dipanen satu per satu karena butir padi melekat kuat pada malainya. (Koswara, 2009).

1. Klasifikasi tanaman padi (*Oryza sativa*)

Adapun klasifikasi tanaman padi (*Oryza sativa*) adalah sebagai berikut:

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Monocotyledone
Ordo	: Poales
Famili	: Poaceae
Genus	: <i>Oryza</i>
Spesies	: <i>Oryza sativa</i> (Gembong, 2013).

2. Deskripsi dan Morfologi

Tanaman padi termasuk golongan tanaman semusim. Bentuk batangnya bulat dan berongga disebut jerami, daunnya memanjang seperti pita yang berdiri pada ruas-ruas batang. Pada ujung batang utama dan batang anakan membentuk tumpun, pada fase generatif akan membentuk malai. Bagian daun dari bawah ke atas terdiri dari pelepah daun, leher daun, daun telinga, lidah daun dan helai daun. Daun bendera adalah daun yang terletak pada tiap batang sebagai daun terakhir (teratas). Dari hasil penelitian daun dominan sekali peranannya pada fase pengisian biji padi (Nurmala, 1998).

Akar serabut yang terletak pada kedalaman tanah 20-30 cm. Malai padi terdiri dari sekumpulan bunga padi (*Spikelet*) yang timbul dari buku paling atas (Nurmala, 199).

Pada waktu berbunga malai berdiri tegak kemudian terkulai bila butir telah terisi dan matang menjadi buah. Kepadatan malai dapat dihitung dari perbandingan antara banyaknya bunga per malai dengan panjang malai. Bunga padi terdiri atas tangkai bunga, kelopak bunga lemma (gabah padi yang besar), palae (gabah padi yang kecil), putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari dan bulu (awu) pada ujung lemma, setelah terjadi penyerbukan akan terbentuk buah yang terjadi dari lembaga dan endosperm, yang disebut caryopsis, buah ini juga kemudian yang akan membentuk biji (Nurmala, 1998).



Gambar 2.4 Tanaman Padi(Sumber:Herlina, 2009).

3. Penggolongan padi

Tanaman padi digolongkan dalam 2 golongan besar yaitu golongan Indica (di indonesia Cere, Cempo) yang dapat tumbuh baik di daerah tropis, yang menurut sejarahnya tanaman padi menyebar ke iklim dingin yang termasuk tanaman hari panjang disebut golongan yaponica. Selanjutnya golongan ini menyebar kedaerah tropis di indonesia dan beradaptasi dengan baik di iklim tropis. Di indonesia padi golongan ini disebut juga golongan sub-yaponica atau indo-yaponica atau disebut padi bulu atau gundil adalah padi khas indonesia.

Tabel 2.9 Sifat-sifat Padi Indica dan Indo-Yoponica (Sumber:Nurmala, 1998:40).

Sifat- sifat	Indica	Sub-Yaponica
Gabah	Tidak berekor	Berekor
Daun	Sempit	Lebar
Warna daun	Hijau muda	Hijau tua
Ukuran gabah	Kecil-sedang	Sedang besar
Kerontokan gabah	Mudah	Sukar
Daya anakan	Tinggi	Sedikit
Kerebahan batang	Mudah	Sukar
Kadar Amylase	Sedang-tinggi	rendah
Rasa	pera	pulen

Beras merupakan makanan pokok hampir 90% penduduk di Indonesia, areal penyebaran tanaman padi hampir terdapat diseluruh Indonesia. Beras mempunyai nilai politis, prestise dan selera yang sukar disubstitusi hingga kini. Selain itu beras mempunyai nilai gizi yang cukup memadai (Nurmala, 1998).

Sumartini (2011) menyatakan bahwa di dalam beras terdapat 2 jenis kompleks amilosa–lipid yaitu amilosa lipid 1 dan amilosa lipid 2. Kompleks amilosa lipid 1 ditandai dengan meleleh pada suhu $< 100^{\circ}\text{C}$ dan hanya menunjukkan sedikit struktur kristal kompak, sedangkan kompleks amilosa lipid 2 meleleh pada suhu $>100^{\circ}\text{C}$, dengan struktur kristal kompak. Makin kompak struktur kristal amilosa 1 semakin sulit.

Proses pengolahan padi menjadi tepung menghasikan tepung beras. Proses ini merupakan usaha pengecilan bentuk (ukuran) dari bentuk asal berupa beras. Proses ini dapat dilakukan secara tradisional ataupun secara mekanis menggunakan mesin penggiling (Khatir, 2011).

Tepung beras merupakan produk pengolahan beras yang paling mudah pembuatannya. Beras digiling dengan penggiling *hammer mill* sehingga menjadi bentuk tepung. Di Indonesia, tepung beras sering dimanfaatkan oleh industri-industri pangan sebagai bahan baku untuk membuat produk makanan (Kusmartanti, 2010).

Tepung beras merupakan tepung yang diperoleh dari hasil proses penggilingan beras. Beras sendiri adalah bagian bulir padi atau gabah yang telah dipisah dari sekam. Sekam (Jawa merang) secara anatomi disebut palea yaitu bagian yang ditutupi dan lemma adalah bagian yang menutupi. Pada salah satu tahap

pemrosesan hasil panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya atau kulit gabah terlepas dari isinya. Bagian isi inilah, yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam. Beras secara biologi merupakan bagian biji padi yang terdiri dari aleuron yang merupakan lapis terluar yang sering kali ikut terbuang dalam proses pemisahan kulit kemudian endosperma yaitu tempat sebagian besar pati dan protein beras berada, dan embrio yang merupakan calon tanaman baru (dalam beras tidak dapat tumbuh lagi, kecuali dengan bantuan teknik kultur jaringan. Sebagaimana bulir sereal lain, bagian terbesar beras didominasi oleh pati (sekitar 80-85%) (Kusmartanti, 2010).

Tepung beras terdiri dari tepung beras pecah kulit dan tepung beras sosoh. Tepung beras banyak digunakan sebagai bahan baku industri seperti bihun dan bakmi, macaroni, aneka snacks, aneka kue kering (*"cookies"*), biskuit, *"crackers"*, makanan bayi, makanan sapihan untuk balita, tepung campuran (*"composite"*) dan sebagainya. Tepung beras juga banyak digunakan dalam pembuatan *"pudding mixture"* atau *"custard"* (Koswara, 2009).

Standar mutu tepung beras ditentukan menurut Standar Industri Indonesia (SII). Syarat mutu tepung beras yang baik adalah : kadar air maksimum 10%, kadar abu maksimum 1%, bebas dari logam berbahaya, serangga, jamur, serta dengan bau dan rasa yang normal. Di Amerika, dikenal dua jenis tepung beras, yaitu tepung beras ketan dan tepung beras biasa. Tepung ketan mempunyai mutu lebih tinggi jika digunakan sebagai pengental susu, puding dan makanan ringan. Proses pembuatan tepung beras dimulai dengan penepungan kering dilanjutkan dengan penepungan

beras basah (beras direndam dalam air semalam, ditiriskan, dan ditepungkan). Alat penepung yang digunakan adalah secara tradisional (alu, lesung, kincir air) dan mesin penepung (*hammer mill* dan *disc mill*) (Koswara,2009).

E. Tinjauan Karbohidrat

Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan yang harganya relatif murah. Semua karbohidrat berasal dari tumbuh tumbuhan. Melalui fotosintesis, klorofil tanaman dengan bantuan sinar matahari mampu membentuk karbohidrat dari karbon dioksida (CO_2) berasal dari udara dan air (H_2O) dari tanah. Karbohidrat yang dihasilkan adalah karbohidrat sederhana glukosa. Di samping itu dihasilkan oksigen (O_2) yang lepas di udara (Almatsier, 2004).

Karbohidrat atau hidrat arang adalah suatu zat gizi yang fungsi utamanya sebagai penghasil energi, dimana setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Walaupun lemak menghasilkan energi lebih besar, namun karbohidrat lebih banyak dikonsumsi sehari-hari sebagai bahan makanan pokok, terutama pada negara sedang berkembang. Di negara sedang berkembang karbohidrat dikonsumsi sekitar 70-80% dari total kalori, bahkan pada daerah-daerah miskin bisa mencapai 90%. Sedangkan pada negara maju karbohidrat dikonsumsi hanya sekitar 40-60%. Hal ini disebabkan sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat lebih murah harganya dibandingkan sumber bahan makanan kaya lemak maupun protein (Hutagalung, 2004).

Sebagai salah satu bahan makanan sumber energi untuk tubuh, karbohidrat tersebar luas di alam, baik dalam jaringan hewan maupun dalam jaringan tanaman. Melalui fotosintesis bagian-bagian tanaman yang mengandung klorofil dapat membentuk karbohidrat. Bahan baku biosintesis karbohidrat melalui fotosintesis adalah karbon dioksida dari udara dan air dalam tanah. Karbohidrat tidak saja sangat penting sebagai sumber energi untuk tubuh, beberapa diantaranya dapat dipakai sebagai bahan baku untuk pembentukan senyawa-senyawa baru yang mempunyai kegunaan khusus. Melalui proses fermentasi amilum atau zat tepung dapat diubah menjadi etil alkohol dan karbondioksida (Sumardjo, 2009).

Produk yang dihasilkan terutama dalam bentuk gula sederhana yang mudah larut dalam air dan mudah diangkut ke seluruh sel sel guna penyediaan energi. Sebagian dari gula sederhana ini kemudian mengalami polimerisasi dan membentuk polisakarida. Ada dua jenis polisakarida tumbuh-tumbuhan yaitu pati dan nonpati. Pati adalah bentuk simpanan karbohidrat berupa polimer glukosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik (ikatan antara gugus hidroksil atom C nomor 1 pada molekul glukosa dengan gugus hidroksil atom C nomor 4 pada molekul glukosa lain dengan melepas 1 mol air) (Almatsier, 2004).

Polisakarida nonpati mirip pati, tapi tidak mengandung ikatan glikosidik, sereal, seperti beras, gandum, dan jagung serta umbi-umbian merupakan sumber pati utama di dunia. Polisakarida nonpati merupakan komponen utama serat makanan (Almatsier, 2004).

1. Susunan Kimia

Semua jenis karbohidrat terdiri atas unsur-unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). Perbandingan anatra hidrogen dan oksigen pada umumnya adalah 2:1 seperti halnya dalam air, oleh karena itu diberi nama karbohidrat. Dalam bentuk sederhana, formula umum karbohidrat adalah $C_6H_{2n}O_n$. Hanya heksosa (6-atom karbon), serta pentosa (5-atom karbon), dan polimernya memegang peranan penting dalam ilmu gizi (Almatsier, 2004).

2. Klasifikasi Karbohidrat

Umumnya karbohidrat diklasifikasikan berdasarkan kompleksitas struktur kimia. Berdasarkan kompleksitasnya, karbohidrat dibedakan atas karbohidrat sederhana, yang lebih di kenal sebagai monosakarida, dan karbohidrat majemuk yang meliputi oligosakarida dan polisakarida. Karbohidrat yang banyak mengandung gugus hidroksil dan mempunyai gugus formil atau gugus aldehida dikenal sebagai polihidroksil aldehida, sedangkan karbohidrat yang banyak mengandung gugus hidroksil dan mempunyai gugus karbonil atau gugus keton dikenal sebagai polihidroksi keton. Selain itu, ada pula yang menghasilkan karbohidrat menjadi karbohidrat yang dapat dicerna dan karbohidrat yang tidak dapat dicerna (Sumardjo, 2009).

Menurut Hutagalung (2004) Penggolongan karbohidrat yang paling sering dipakai dalam ilmu gizi berdasarkan jumlah molekulnya adalah sebagai berikut:

1. Monosakarida

Karbohidrat yang paling sederhana (*simple sugar*), oleh karena tidak bisa lagi dihidrolisa. Monosakarida larut di dalam air dan rasanya manis, sehingga secara umum disebut juga gula. Penamaan kimianya selalu berakhiran -osa. Dalam Ilmu Gizi hanya ada tiga jenis monosakarida yang penting yaitu, glukosa, fruktosa dan galaktosa.

a. Glukosa

Terkadang orang menyebutnya gula anggur ataupun dekstrosa. Banyak dijumpai di alam, terutama pada buah-buahan, sayur-sayuran, madu, sirup jagung dan tetes tebu. Didalam tubuh glukosa didapat dari hasil akhir pemecahan amilum, sukrosa, maltosa dan laktosa. Glukosa dijumpai di dalam aliran darah (disebut kadar gula darah) dan berfungsi sebagai penyedia energi bagi seluruh sel-sel jaringan tubuh. Pada keadaan fisiologis Kadar Gula Darah sekitar 80-120 mg %. Kadar gula darah dapat meningkat melebihi normal disebut hiperglikemia, keadaan ini dijumpai pada penderita Diabetes Mellitus.

b. Fruktosa

Disebut juga gula buah ataupun levulosa. Merupakan jenis sakarida yang paling manis, banyak dijumpai pada mahkota bunga, madu dan hasil hidrolisa dari gula tebu. Di dalam tubuh fruktosa didapat dari hasil pemecahan sukrosa.

c. Galaktosa

Tidak dijumpai dalam bentuk bebas di alam, galaktosa yang ada di dalam tubuh merupakan hasil hidrolisa dari laktosa.

2. Disakarida

Merupakan gabungan antara 2 (dua) monosakarida, pada bahan makanan disakarida terdapat 3 jenis yaitu sukrosa, maltosa dan laktosa.

a. Sukrosa

Adalah gula yang kita gunakan sehari-hari sehingga lebih sering disebut gula meja (*table sugar*) atau gula pasir dan disebut juga gula *invert*. Mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Sumber: tebu (100% mengandung sukrosa), bit, gula nira (50%), jam, jelly.

b. Maltosa

Mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari dua molekul glukosa. Di dalam tubuh maltosa didapat dari hasil pemecahan amilum, lebih mudah di cerna dan rasanya lebih enak dan nikmat. Dengan yodium amilum akan berubah menjadi warna biru.

c. Laktosa

Mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Laktosa kurang larut di dalam air. Sumber hanya terdapat pada susu sehingga disebut juga gula susu.-susu sapi 4-5% susu asi 4-7% Laktosa dapat menimbulkan intolerance (*laktosa*

intolerance) disebabkan kekurangan enzim laktase sehingga kemampuan untuk mencerna laktosa berkurang. Kelainan ini dapat dijumpai pada anak bayi dan orang dewasa, baik untuk sementara maupun secara menetap. Gejala yang sering dijumpai adalah diare, gembung, flatu dan kejang perut. Defisiensi laktase pada bayi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, karena bayi sering diare. Terapi dengan pemberian formula rendah laktosa seperti LLM, Almiron, Isomil, Prosobee dan Nutramigen, dan AI 110 bebas Laktosa. Formula rendah laktosa tidak boleh diberikan terlalu lama (maksimum tiga bulan), karena laktosa diperlukan untuk pertumbuhan bagi sel-sel otak.

3. Polisakarida

Merupakan senyawa karbohidrat kompleks, dapat mengandung lebih dari 60.000 molekul monosakarida yang tersusun membentuk rantai lurus ataupun bercabang. Polisakarida rasanya tawar (tidak manis), tidak seperti monosakarida dan disakarida. Di dalam Ilmu Gizi ada 3 (tiga) jenis yang ada hubungannya yaitu amilum, dekstrin, glikogen dan selulosa.

a. Amilum (zat pati)

Merupakan sumber energi utama bagi orang dewasa diseluruh penduduk dunia, terutama dinegara sedang berkembang oleh karena dikonsumsi sebagai bahan makanan pokok. Disamping bahan pangan kaya akan amilum juga mengandung protein, vitamin, serat dan beberapa zat gizi penting lainnya. Amilum merupakan karbohidrat dalam bentuk simpanan bagi tumbuh-tumbuhan dalam bentuk granul yang dijumpai pada umbi dan

akarnya. Sumber umbi-umbian serealialia dan biji-bijian merupakan sumber amilum yang berlimpah ruah oleh karena mudah didapat untuk dikonsumsi. Jagung, beras dan gandum kandungan amilurnya lebih dari 70%, sedangkan pada kacang-kacangan sekitar 40%. Amilum tidak larut di dalam air dingin, tetapi larut di dalam air panas membentuk cairan yang sangat pekat seperti pasta; peristiwa ini disebut "gelatinisasi".

b. Dekstrin

Merupakan zat antara dalam pemecahan amilum. Molekulnya lebih sederhana lebih mudah larut di dalam air, dengan yodium akan berubah menjadi warna merah.

c. Glikogen

Glikogen merupakan "pati hewani", terbentuk dari ikatan 1000 molekul, larut di dalam air (pati nabati tidak larut dalam air) dan bila bereaksi dengan iodium akan menghasilkan warna merah. Glikogen terdapat pada otot hewan, manusia dan ikan. Pada waktu hewan disembelih, terjadi kekejangan (rigor mortis) dan kemudian glikogen dipecah menjadi asam laktat selama postmortum. Glikogen disimpan di dalam hati dan otot sebagai cadangan energi, yang sewaktu-waktu dapat diubah kembali menjadi glukosa bila dibutuhkan. Sumber : banyak terdapat pada kecambah, serealialia, susu, sirup jagung (26%).

d. Selulosa

Hampir 50% karbohidrat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan adalah selulosa, karena selulosa merupakan bagian yang terpenting dari dinding sel tumbuh-tumbuhan. Selulosa tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia, oleh karena tidak ada enzim untuk memecah selulosa. Meskipun tidak dapat dicerna, selulosa berfungsi sebagai sumber serat yang dapat memperbesar volume dari feses, sehingga akan memperlancar defekasi. Dahulu serat digunakan sebagai indeks dalam menilai kualitas makanan, makin tinggi kandungan serat dalam makanan maka nilai gizi makanan tersebut dipandang semakin buruk. Akan tetapi pada beberapa tahun terakhir ini, para ahli sepakat bahwa serat merupakan komponen penyusun diet manusia yang sangat penting. Tanpa adanya serat, mengakibatkan terjadinya konstipasi (susah buang air besar).

F. Ayat yang Relevan

Ayat Tentang Himbauan Memikirkan Penciptaan Bumi dan Isinya

Dalam ayat ini Allah swt. menyuruh kita untuk memikirkan penciptaan dunia dan isinya lebih lanjut dijelaskan Allah swt. dalam QS Ali Imran/5: 190- 191 yakni sebagai berikut :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
 ۱۹۰ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۱۹۱

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka””(Kementrian Agama RI: *Al-Quran dan Terjemahnya*).

Pada ayat Ali Imran ayat 190 tersebut menjelaskan setiap hal yang terjadi di dunia contohnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam diciptakan dalam waktu yang panjang dan semuanya merupakan ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Hanya manusia yang memiliki akal yang sempurna lagi bersih, yang mengetahui hakikat banyak hal secara jelas dan nyata. Mereka bukan orang-orang tuli dan bisu yang tidak berakal (Abdullah, 201).

Maksud dari ayat 191 diatas ialah bahwa mereka yang tidak putus-putus berdzikir dalam segala keadaan baik berdzikir dengan hati maupun dengan lisan mereka. Mereka yang memahami apa yang terdapat pada keduanya yakni langit dan bumi dari kandungan himah yang menunjukkan keagungan “Al-Khalik” (Allah), kekuasaannya, keluasan ilmu-Nya (Abdullah, 2011).

Sungguh Allah mencela orang yang tidak mengambil pelajaran tentang penciptaan makhluk-Nya yang mana hal itu menunjukkan kepada dzat-Nya, sifat-Nya, Syariat-Nya, kekuasaan-Nya dan tanda-tanda kekuasaan-Nya (Abdullah, 2011).

Allah tidak menciptakan semua yang ada di alam raya dengan sia-sia, tetapi dengan penuh kebenaran agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beramal buruk terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan dan juga memberi balasan orang-orang yang beramal baik dengan balasan yang lebih baik yakni surga. Dengan mengerjakan amal saleh semoga Allah swt. senantiasa memberikan taufik kepada kita (manusia) dan dapat mengantarkan kami ke surga serta menyelamatkan kita dari azab-Nya yang sangat pedih (Abdullah, 2011).


Tafsir di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menganugerahkan kepada manusia akal pikiran untuk memikirkan dan mencari tau tentang semesta raya. Allah swt. menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu dan dalam hal ini menciptakan cendawan yang berupa kapang jenis *Aspergillus niger* yang memiliki banyak mamfaat dalam dunia bioteknologi.

G. Hipotesis


Berdasarkan kajian-kajian teori yang terkait dengan *Aspergillus niger* yang membutuhkan sumber karbon sebagai nutrisinya dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini bahwa penambahan tepung singkong dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan *Aspergillus niger*.

H. Kerangka Pikir


1. INPUT



2. PROSES



3. OUTPUT



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan secara eksperimental, dimana untuk mengetahui pertumbuhan *Aspergillus niger* dilakukan dengan pengamatan diameter koloni dan jumlah sporanya. Penelitian ini menggunakan prinsip Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan (2, 4 dan 6 g) masing-masing menggunakan tepung beras, tepung jagung dan tepung singkong dengan tiga kali ulangan. Adapun layout dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran diameter koloni *Aspergillus niger*

A0B1	A0B1	A1B2
A1B1	A0B2	A1B2
A0B3	A1B2	A0B2
A0B3	A1B1	A0B2
A1B3	A1B3	A1B3
A0B1	A0B3	A1B1

Gambar 3.1 Layout Penelitian

Keterangan:

A0= Kontrol

A1= Tepung Singkong

B1= 2 g

B2= 4 g

B3= 6

2. Perhitungan jumlah spora

A0B2	A0B1	A1B1
A1B3	A0B3	A0B1
A0B3	A1B2	A1B2
A1B2	A1B3	A1B1
A0B1	A0B2	A1B3
A1B1	A0B2	A0B3

Gambar 3.2 Layout Penelitian

Keterangan:

A0= Kontrol

A1= Tepung beras

B1= 2 g

B2= 4 g

B3= 6 g

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Botani dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan eksperimental yang dilakukan di laboratorium yang merupakan metode eksperimen yang mengikuti prosedur dan memenuhi syarat-syarat eksperimen.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah *A.niger* yang diisolasi dari bahan pangan dan diinkubasi selama 7 hari.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah *A.niger* yang ditumbuhkan pada medium PDA dengan penambahan tepung singkong.

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki dua macam variabel yaitu variabel bebas (yang mempengaruhi) dan variabel terikat (yang dipengaruhi). Dalam penelitian ini variabel bebas yaitu medium PDA yang ditambahkan tepung singkong. Sedangkan variabel terikatnya yaitu *A.niger*.

E. Definisi Operasional Variabel

1. *A.niger* adalah jenis jamur mikroskopis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam penelitian ini *Aspergillus* berasal dari biakan murni yang diambil dari Laboratorium Hama dan Penyakit yang kemudian ditumbuhkan pada medium *Potato Dextrose Agar* (PDA) setelah itu diinkubasi selama 7 hari.
2. Tepung adalah hasil olahan yang terbuat dari hasil pertanian yang telah kering kemudian dihaluskan menjadi bubuk seperti tepung singkong.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan pengukuran terhadap diameter koloni *A.niger* dan perhitungan pada jumlah spora *A.niger*.

G. Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan didalam penelitian ini adalah autoklaf, oven, cawan petri, Erlenmeyer, gelas kimia, neraca analitik, spatula, *Laminar Air Flow* (LAF), *hot plate and stirrer*, ose, *coke borer*, lampu spritus, bunsen, mikroskop, pipet tetes, *haemocytometer*, mikro pipet, tip, kaca preparat, botol semprot, kulkas.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kentang, *bacto agar*, *dextrose*, aquades, aluminium foil, plastik silk, alkohol 70%, tepung singkong.

H. Prosedur Kerja

1. Tahap Pendahuluan

Menyiapkan alat-alat gelas yang diperlukan antara lain tabung reaksi, cawan petri, dan labu Erlenmeyer. Selain itu disiapkan juga beberapa kertas pembungkus, plastik silk, penyumbat tabung reaksi dan labu erlenmeyer.

a. Sterilisasi Alat dan Bahan

Alat-alat gelas yang dibersihkan dari sisa medium yang telah dipakai dan ditumbuhi oleh bakteri dengan cara direbus sampai mendidih. Biarkan sampai dingin agar bias dilakukan pencucian alat dengan sabun dan air mengalir sampai bersih.

Alat-alat yang sudah dibersihkan lalu dimasukkan ke dalam oven untuk dikeringkan. Selanjutnya, cawan petri yang sudah dikeringkan dibungkus kertas, kemudian beberapa tabung reaksi dan labu Erlenmeyer di beri sumbat kapas lalu di tutup atau dibungkus dengan plastik tahan panas kemudian dimasukkan kedalam oven dengan suhu 150°C selama 2 jam.

b. Pembuatan Medium *Potato Dextrose Agar* (PDA)

Medium yang akan dipakai adalah *Potato Dextrose Agar* (PDA) pada cawan petri. (Achmad 2009) kentang 200 gr yang telah diiris sebesar potongan dadu direbus dengan 1000 ml aquades sampai kentang lunak dan setelah itu disaring dan ditambahkan 20 gr dekstose dan *bacto agar* sebanyak 15 gr kemudian homogenkan dengan menggunakan hotplate dan stirrer di labu Erlenmeyer setelah itu ditutup dengan sumbat kapas, kertas dan plastik tahan panas, kemudian disterilkan di autoklaf selama 2 jam pada suhu 121°C.

c. Sub kultur *Aspergillus niger*

Mengambil biakan *A. niger* sebanyak satu ose kemudian menginokulasikannya pada medium PDA dan diinkubasi pada suhu 37° C selama 7 hari.

2. Tahap Penelitian

a. Pembuatan medium PDA dengan Penambahan Tepung

Memipet medium PDA yang telah disterilisasi sebanyak 5 mL kedalam 9 cawan petri. Menambahkan tepung tapioca kedalam 3 cawan petri yang berbeda dengan konsentrasi masing-masing 2 gram, 4 gram dan 6 gram. Menghomogenkan dengan spatula steril. Mendinginkan medium hingga padat

b. Penanaman biakan *Aspergillus niger*.

Mengambil biakan *Aspergillus niger* dengan *coke borer* kemudian menginokulasikannya pada medium PDA yang telah ditambahkan tepung dan inkubasi pada suhu 37°C selama 7 hari.

c. Pengamatan pertumbuhan miselium pada *Aspergillus niger*

Mengamati pertumbuhan miselium dan mengukur diameter koloninya dengan menggunakan penggaris (cm) setiap hari selama seminggu. Data rerata diameter koloni *A. niger* dihitung untuk memperoleh kecepatan pertumbuhan miselium (v) menggunakan rumus menurut Lily dan Barnett (1951).

$$v = \frac{\text{Diameter Koloni Akhir} - \text{Diameter Koloni Awal}}{\text{Rentang Jumlah Hari}}$$

d. Menghitung Jumlah Spora

Mengencerkan koloni *A.niger* sebanyak 10 kali pengenceran. Memipet menggunakan mikropipet sebanyak 1 μL pada parit kaca pada alat hitung. Membiarkan sejenak sehingga sel diam di tempat (tidak terkena aliran air dari efek kapilaritas). Meletakkan alat hitung pada meja benda kemudian mencari fokusnya pada perbesaran 40 x 10. Melakukan perhitungan secara kasar dengan paling tidak sebanyak 5 kotak sedang kemudian merata-ratakan hasil perhitungan dengan rumus untuk kotak kecil

$$\text{Jumlah sel/ml} = \text{Jumlah sel} \times 4 \times 10^6$$

I. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pada penelitian ini, teknik pengolahan data adalah dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 20.0. data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode *One way* ANOVA. Jika perlakuan menunjukkan pengaruh nyata, dilanjutkan uji berganda Duncan untuk melihat konsentrasi yang paling efektif, Metode ini digunakan dengan memasukkan data perbandingan antara rata-rata diameter kelompok kontrol negatif (-) dengan kelompok perlakuan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Derajat kepercayaan (P) dalam hal ini yakni sebesar 0,05.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Pengukuran diameter koloni *Aspergillus niger*

Aspergillus niger yang diperoleh ditumbuhkan pada medium PDA yang ditambahkan dengan tepung singkong dengan penambahan tepung masing-masing 2, 4 dan 6 g. Karbohidrat yang terdapat pada tepung tersebut diketahui dapat mempercepat laju pertumbuhan dari *Aspergillus niger* dengan melihat laju pertumbuhannya tiap harinya dengan menghitung diameter koloninya dengan menggunakan penggaris (cm). Adapun hasil pengukuran diameter koloninya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Pengukuran diameter koloni *Aspergillus niger* pada penambahan tepung Singkong

Jenis tepung	Konsentrasi (gram)	Ulangan	Kecepatan Miselium (cm/hari)	Rata-rata (cm/hari)
Tepung Singkong	2	1	0,26	0,16
		2	0,2	
		3	0,02	
	4	1	0,9	1,2
		2	1,3	
		3	1,4	
	6	1	0,14	0,15
		2	0,14	
		3	0,16	
Kontrol		1	0,4	0,49
		2	0,36	
		3	0,7	

Pengukuran diameter koloni *A. niger* dengan penambahan tepung singkong ke dalam medium PDA dimana pada konsentrasi 2 gram rata-rata diameter koloninya sebanyak 3 kali pengulangan selama 7 hari ialah 0,16 cm/hari. Pada konsentrasi 4 gram, rata-rata diameter koloninya sebanyak 3 kali pengulangan selama 7 hari inkubasi adalah 1,2 cm/hari. Pada konsentrasi 6 gram dimana rata-rata diameter koloninya dengan 3 kali pengulangan selama 7 hari inkubasi adalah 0,15 cm/hari. Sedangkan kelompok kontrolnya memiliki rata-rata diameter koloni ialah 0,49 cm/hari.

Berdasarkan hasil perhitungan diameter koloni *A. niger* seperti pada tabel di atas maka hasil yang diperoleh dianalisis sidik ragamnya dengan menggunakan uji ANOVA untuk mengetahui signifikan tidaknya hasil penelitian ini dengan membandingkan tingkat minimal signifikansi ($P < 0,05$) sehingga diperoleh hasil analisis sebagai berikut.

Tabel 4.2 Hasil sidik ragam diameter koloni *Aspergillus niger* yang ditumbuhkan pada PDA dengan penambahan tepung singkong dengan variasi konsentrasi 2, 4 dan 6 g dengan masa inkubasi selama 7 hari

Source	Jumlah Kuadrat	db	Kuadrat tengah	F	(P) Sig.
Corrected Model	2.192 ^a	3	.731	24.300	.000
Intercept	2.789	1	2.789	92.772	.000
A	.000	0	.	.	.
B	2.191	2	1.096	36.441	.000
A * B	.000	0	.	.	.
Error	.241	8	.030		
Corrected Total	2.432	11			

Hasil analisis data pada Tabel 4.2 menggunakan Uji Anova hasil yang diperoleh menunjukkan antar perlakuan terdapat perbedaan yang nyata (signifikan).

Berdasarkan pada Tabel 4.2 menunjukkan ($p < \alpha 0,05$). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan terbukti bahwa dengan adanya penambahan tepung dan adanya konsentrasi yang berbeda 2, 4 dan 6 gr dapat mempercepat laju pertumbuhan dari *A. niger* karena ada pengaruh yang signifikan dari adanya penambahan tepung dengan konsentrasi yang bervariasi terhadap laju pertumbuhan *A. niger* tersebut. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat maka dilakukan uji lanjutan dengan menggunakan *Leas Significant Difference (LSD)* dan *duncan dengan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Microsoft Windows Release 20* dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) untuk pengujian hipotesis ini (Lihat lampiran 4.3,4.4, 45 dan 46)

b. Perhitungan jumlah spora

Diketahui beberapa jenis tepung yang mengandung karbohidrat dapat mempercepat dan menghasilkan jumlah spora yang lebih banyak dimana tepung yang digunakan yaitu tepung singkong dengan penambahan tepung masing-masing sebanyak 2, 4 dan 6 g. Setelah isolat *Aspergillus niger* ditumbuhkan pada medium PDA dan diinkubasi selama 7 hari kemudian dihitung sporanya dengan menggunakan haemocytometer yaitu alat penghitung spora berikut ini adalah hasil pengamatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Perhitungan jumlah spora *Aspergillus niger* pada penambahan tepung Singkong

No	Konsentrasi (gram)	Rata-rata jumlah spora (sel/ml)
1	2	$2,43 \times 10^8$
2	4	$6,0 \times 10^8$
3	6	$4,2 \times 10^8$

4	kontrol	$1,51 \times 10^8$
---	---------	--------------------

Penambahan tepung singkong pada medium pertumbuhan *A. niger* (lihat tabel 4.3) dimana pada konsentrasi 2 gram yakni rata-rata keseluruhan dari 3 kali pengulangan yakni $2,43 \times 10^8$ sel/mL. Konsentrasi 4 gram yakni diperoleh nilai rata-rata keseluruhan dari 3 kali pengulangan dengan 5 kotak hitung ialah $6,0 \times 10^8$ sel/mL. Konsentrasi 6 gram rata-rata keseluruhannya yakni $4,2 \times 10^8$ sel/mL. Sedangkan untuk control memiliki nilai rata-rata keseluruhan yakni $1,51 \times 10^8$ sel/mL.

Berdasarkan hasil perhitungan Jumlah spora *A. niger* seperti pada tabel di atas maka hasil yang diperoleh dianalisis sidik ragamnya dengan menggunakan uji ANOVA untuk mengetahui signifikan tidaknya hasil penelitian ini dengan membandingkan tingkat minimal signifikansi ($P < 0,05$) sehingga diperoleh hasil analisis sebagai berikut.


Tabel 4.4 Hasil sidik ragam perhitungan jumlah spora *Aspergillus niger* dengan menggunakan haemocytometer dengan konsentrasi 2,4 dan 6 pada masa inkubasi selama 7 hari

Source	Jumlah Kuadrat	db	Kuadrat tengah	F	(P) Sig.
Perlakuan	23.292 ^a	3	7.764	2.826	.107
Intercept	138.878	1	138.878	50.547	.000
A	.000	0	.	.	.
B	21.474	2	10.737	3.908	.065
A * B	.000	0	.	.	.
Error	21.980	8	2.747		
Corrected Total	45.272	11			


Hasil analisis data pada Tabel 4.4 menggunakan Uji ANOVA hasil yang diperoleh menunjukkan antar perlakuan tidak terdapat perbedaan yang nyata (tidak

signifikan). Sebagaimana hasil analisis data berdasarkan pada Tabel 4.4 menunjukkan ($P < 0,05$) Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan tidak terbukti bahwa dengan adanya penambahan tepung dapat meningkatkan jumlah spora dari *Aspergillus niger* karena tidak ada pengaruh yang signifikan dari adanya penambahan tepung dengan konsentrasi yang bervariasi terhadap jumlah spora *Aspergillus niger* tersebut.

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan rata-rata diameter pertumbuhan *Aspergillus niger* yang ditumbuhkan pada media PDA yang telah ditambahkan tepung singkong dengan konsentrasi 2, 4 dan 6 gram pada pengamatan berturut-turut selama tujuh hari dan perhitungan jumlah spora pada hari ke tujuh dengan menggunakan haemocytometer dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti yang terlihat pada grafik 4.1 dan 4.2



Grafik 4.1 Grafik perbandingan rata-rata diameter pertumbuhan *Aspergillus niger* pada PDA dengan penambahan tepung singkong



Grafik 4.2. Grafik perbandingan rata-rata jumlah spora *Aspergillus niger* pada PDA dengan penambahan berbagai jenis tepung dengan konsentrasi yang berbeda.

B. Pembahasan

Kapang berbeda dengan bakteri dan khamir karena bersifat makroskopis (dapat dilihat dengan mata secara langsung). Kapang memiliki karakteristik pertumbuhan khas antara lain berbentuk kapas dan biasanya terlihat pada kertas-kertas koran yang basah, kulit-kulit yang sudah usang, dinding basah, buah-buahan yang membusuk dan bahan pangan lain seperti keju dan selai. Koloninya dapat berwarna hitam, putih atau berbagai macam warna. Kapang bersifat aktif (bersifat saprofitik karena dapat mengurai senyawa organik kompleks menjadi lebih sederhana termasuk pembusukan daun-daun dan bahan lain dalam tanah. Sehingga kapang diaplikasikan dalam bidang industri (pengolahan bahan pangan) seperti kecap dan tempe serta dapat menghasilkan enzim. Salah satu contoh kapang yang

menghasilkan beberapa enzim adalah *A. niger*. *A. niger* termasuk genus *Aspergillus*, famili Moniliaceae, ordo Monoliales, kelas Deuteromycetes, dan divisi Eumycetes. *A. niger* memiliki kepala pembawa konidia yang besar, padat, bulat dan berwarna hitam, hitam-coklat atau ungu-coklat. Konidianya besar dan mengandung pigmen (Muchtart, 2013). Untuk meningkatkan pertumbuhan *A. niger* diperlukan beberapa sumber nutrisi yang tepat seperti pati dapat dijadikan sebagai sumber karbon untuk melakukan fermentasi asam sitrat dan menghasilkan energi tetapi terlebih dahulu diubah oleh enzim yang dihasilkannya.

Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya, membutuhkan ketersediaan nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Ada atau tidaknya suplai nutrisi dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba dan dapat menyebabkan kematian. Menurut Waluyo (2005), fungsi utama nutrisi adalah sebagai sumber energi, bahan pembangun sel, dan sebagai aseptor elektron dalam reaksi bioenergetik (reaksi yang menghasilkan energi). Kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan mikroorganisme pada umumnya tersedia didalam bahan makanan, sebagai contoh adalah beras dan jagung. Keduanya merupakan bahan pangan dengan komposisi utama berupa karbohidrat dalam bentuk amilosa dan amilopektin. Karbohidrat merupakan substrat utama untuk pertumbuhan kapang, khususnya sebagai sumber karbon dalam sistem metabolismenya. Tepung mengandung karbohidrat dimana kandungan karbohidrat dari tiap tepung berbeda-beda. Karbohidrat memiliki fungsi utama untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Jenis karbohidrat yang merupakan sumber utama bahan makanan yang umum dikonsumsi oleh manusia adalah pati

(*starch*). Yang termasuk golongan pati adalah semua bahan pangan pokok di Indonesia khususnya dan di ASEAN pada umumnya seperti: beras, jagung, singkong (Huwae, 2014).

Pati adalah salah satu bentuk karbohidrat yang terdapat pada tumbuhan sebagai cadangan makanan. Pada tanaman, pati terdapat pada bagian tertentu, seperti dalam akar, buah dan sebagainya. Pati sagu merupakan butiran atau granula yang berwarna putih mengkilat, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa (Ade, 2013).

Pada penelitian ini *A. niger* yang digunakan merupakan isolat dari Laboratorium Penyakit dan Hama UNHAS. Dimana *A. niger* ditumbuhkan pada medium PDA (*Potato Dextrose Agar*) yang ditambahkan tepung tepung singkong dengan konsentrasi masing-masing tepung 2 g, 4 g dan 6 g. Pengamatan terhadap pertumbuhan *A. niger* ini dilakukan dengan mengukur diameter koloni *A.niger* setiap hari selama seminggu secara visual dan menghitung jumlah spora pada setiap koloni *A. niger* dengan menggunakan Haecytometer. Kontrol yang digunakan adalah kontrol negatif (-) yaitu *A. niger* yang hanya ditumbuhkan pada medium PDA saja.

1. Pengukuran laju pertumbuhan miselium *Aspergillus niger*

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pra-eksperimen dengan pengamatan diameter koloni *Aspergillus niger* dengan dilakukan uji LSD (Lihat lampiran 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6) diperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kontrol (A0) terhadap ketiga media tepung yang digunakan baik pada tepung beras (A1), tepung jagung (A2), dan tepung singkong (A3) begitu pula antar masing-masing perlakuan (A1,A2,A3) tidak memberi hasil yang signifikan terhadap laju

pertumbuhan miselium *A. niger*. Sedangkan pada konsentrasi terhadap laju pertumbuhan miselium yaitu 2 gr (B1), 4 gr (B2) dan 6 gr (B3) diperoleh hasil yang tidak signifikan antar kontrol (A0) terhadap semua konsentrasi (B1,B2 dan B3), namun pada pengujian antar perlakuan yaitu antar B1, B2 dan B3 menunjukkan hasil yang signifikan terhadap laju pertumbuhan miselium *A. niger*. Berdasarkan hasil pra-eksperimen diatas maka diperoleh hasil yang paling baik bagi laju pertumbuhan *A. niger* yaitu pada media PDA dengan penambahan tepung singkong.

Isolat *A. niger* ditumbuhkan pada medium PDA yang kemudian ditambahkan tepung singkong dengan konsentrasi masing-masing 2 g, 4 g dan 6 g yang dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Masing-masing diinkubasi dan diamati selama 7 hari pada suhu 30⁰C. Pengukuran diameter koloni dimulai di hari kedua hingga hari ketujuh dengan menggunakan penggaris dalam satuan cm.

Hasil penelitian mengenai pengaruh penambahan tepung singkong terhadap diameter koloni *A. niger* menunjukkan bahwa pada hari pertama *A. niger* belum tumbuh pada semua konsentrasi. *A. niger* menunjukkan pertumbuhan pada hari kedua inkubasi yang ditandai dengan pertumbuhan miselium yang berwarna putih pada konsentrasi 2 g, 4 g dan 6 g dan terus mengalami pertumbuhan koloni sampai hari ketujuh dengan rata-rata diameter koloni masing-masing ulangan dari konsentrasi 2 g sebesar 0,16 cm/hari, konsentrasi 4 g sebesar 1,2 cm/hari dan konsentrasi 6 g sebesar 0,15 cm/hari. Dari ketiga konsentrasi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan *A. niger* yang paling baik pada medium PDA dengan penambahan tepung singkong sebanyak 4 g. Hal ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Munier (2009) dalam Pasaribu dkk (1998) yang menyatakan bahwa pertumbuhan *A. niger* ditandai dengan pertumbuhan miselium warna putih yang menyebar.

Berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan *A. niger* optimal pada penambahan tepung singkong sebanyak 4 g sebesar 1,2 cm/hari Hal ini sejalan dengan Zulkarnain (2013) yang menyatakan bahwa tepung tapioka (88,01) memiliki kandungan pati yang lebih tinggi dari pada tepung maizena (54,1 g), tepung beras (-25% pati). Jadi, hasil yang diperoleh sesuai teori dimana dengan penambahan tepung tapioka sebanyak 4 g pada medium PDA pertumbuhan *A. niger* menjadi optimal karena lebih banyak mengandung zat pati daripada tepung jagung dan tepung beras dan setelah dilakukan Hasil analisis data menggunakan Uji Anova hasil yang diperoleh menunjukkan antar perlakuan terdapat perbedaan yang nyata (signifikan). Berdasarkan pada Tabel 4.2 menunjukkan ($p < \alpha 0,05$). Dan setelah dilakukan uji lanjutan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan menggunakan *Leas Significant Difference (LSD)* dan *duncan* dengan program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Microsoft Windows Release 20* maka diperoleh hasil yang nyata yaitu signifikan dengan tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$).

Media pertumbuhan *A. niger* harus mengandung makronutrien berupa sumber karbon (C), nitrogen (N), fosfat (P), kalium (K), magnesium (Mg) serta mikronutrien berupa besi (Fe), Seng (Zn) dan Mangan (Mn). Unsur makronutrien dan mikronutrien tersebut mempengaruhi kebutuhan nutrien untuk menunjang

penggandaan sel dan pertumbuhannya (Muchtar, 2013: 27). Fosfat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan sel untuk mensintesa senyawa nukleotida dan senyawa fosfor lain sedangkan Fe dan Zn berfungsi sebagai kofaktor pada beberapa enzim. *A. niger* dapat mengubah gula monosakarida dan disakarida sebagai sumber karbon (C) dengan cepat. Sedangkan polisakarida tidak mudah karena hidrolisis ekstraseluler akan membatasi kecepatan pembentukan produk sebagai sumber energi (Manfaati, 2011).

A. niger dapat tumbuh optimal dalam masa inkubasi tiga atau empat hari. Pertumbuhannya dapat didukung adanya asupan nutrisi tambahan saat proses penanaman seperti nasi, gula dan urea. Nutrisi tambahan diberikan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang dapat diterima *A. niger* selain asupan nutrisi dari medium pertumbuhannya sendiri (Gandjar dan Syamsuridzal, 2006). Menurut Asmaria (2009), pertumbuhan *A. niger* dipengaruhi secara langsung oleh nutrisi yang terkandung di dalam medium pertumbuhannya. Nutrisi-nutrisi tersebut dapat digunakan sesudah *A. niger* mengekskresi enzim-enzim ekstraseluler yang dapat memecah senyawa kompleks dari substrat tersebut menjadi senyawa yang lebih sederhana (Muchtar, 2013). Molekul sederhana berupa gula (monosakarida dan disakarida) dan komponen lain yang larut di sekeliling hifa dapat langsung diserap. Molekul lain yang lebih kompleks seperti selulosa, pati dan protein harus dipecah terlebih dahulu sebelum diserap ke dalam sel. Oleh karena itu, *A. niger* menghasilkan enzim ekstraseluler seperti amilase, glukoamilase, protease, laktase, lipase, amiloglukosida, pektinase, hemiselulase, selulase, katalase dan glukosida.

Enzim ekstraseluler adalah enzim yang dihasilkan sel yang akan ekskresikan melalui dinding sel ke media sekitarnya untuk memecah bahan organik tanpa tergantung pada sel yang melepaskannya. Enzim ini bersifat terinduksi, produksinya akan meningkat jika sesuai dengan substrat disekitarnya tetapi tanpa induksi produksinya akan menurun. Enzim ekstraseluler akan menghidrolisis makro molekul di luar sel menjadi komponen yang lebih larut, sehingga dapat diserap ke dalam sel dengan sistem transport tertentu. Komponen-komponen makro molekul tersebut dapat digunakan sebagai sumber karbon dan energi (Muchtar, 2013).

Pada umumnya pertumbuhan *A. niger* akan diawali dengan fase adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Media pertumbuhan dan lingkungan di sekitar *A. niger* dapat mempengaruhi lamanya fase adaptasi. Bila kondisi lingkungan sama dengan sebelumnya maka waktu adaptasi mungkin tidak diperlukan tetapi jika ketersediaan nutrisi dan kondisinya berbeda dengan sebelumnya, dibutuhkan waktu adaptasi untuk mensintesis enzim-enzim. Kemudian fase selanjutnya yaitu fase log/eksponensial, kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh kandungan nutrisi pada media pertumbuhan dan kondisi lingkungan termasuk suhu dan kelembaban udara (Muchtar, 2013).

Pertumbuhan *A. niger* optimal pada suhu 35-37°C. Penurunan suhu mengindikasikan bahwa aktivitas *A. niger* menurun hingga memasuki fase kematian. Enzim yang dimiliki oleh *A. niger* dapat terdenaturasi pada suhu tertentu, perilaku kimia, dan kondisi ekstrim lainnya. Enzim merupakan suatu protein, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan enzim terdenaturasi. Denaturasi enzim

menyebabkan bagian aktif enzim akan terganggu dan konsentrasi efektif enzim menjadi berkurang dan kecepatan reaksinya pun akan menurun. Hal ini dikarenakan enzim mengalami kerusakan pada suhu yang lebih tinggi. Denaturasi protein merupakan kerusakan pada struktur sekunder protein (berupa ikatan hidrogen yang terbentuk dari ujung-ujung polar dari suatu rantai protein) yang menyebabkan struktur tiga dimensi protein berubah. Hal tersebut menyebabkan terganggunya fungsi protein sebagai katalis, dimana kerja suatu enzim dianalogikan sebagai gembok dan kunci. Jika struktur tiga dimensi berubah tentunya gembok dan kunci tidak cocok lagi, atau dengan kata lain aktivitas katalitik enzim terganggu (Murni dkk, 2011).

2. Perhitungan jumlah spora

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pra-eksperimen sebelumnya dengan pengamatan jumlah spora dari *Aspergillus niger* dengan dilakukan uji LSD (Lihat lampiran 4.9, 4.10, 4.11 dan 4.12) diperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kontrol (C0) terhadap ketiga media tepung yang digunakan baik pada tepung beras (C1), tepung jagung (C2), dan tepung singkong (C3) namun antar perlakuan (C1,C2 dan C3) memberi pengaruh yang signifikan terhadap jumlah spora *A. niger*. Sedangkan pada konsentrasi terhadap jumlah spora yaitu 2 gr (D1), 4 gr (D2) dan 6 gr (D3) diperoleh hasil yang tidak signifikan antar kontrol (D0) terhadap semua konsentrasi (D1, D2 dan D3), namun pada pengujian antar konsentrasi yaitu antar D1, D2 dan D3 menunjukkan hasil yang signifikan terhadap jumlah spora *A. niger*. Berdasarkan hasil pra-eksperimen diatas maka diperoleh hasil yang paling

baik bagi jumlah spora *A. niger* yaitu pada media PDA dengan penambahan tepung singkong.

Isolat *A. niger* yang ditumbuhkan pada medium PDA yang kemudian ditambahkan dengan tepung singkong dengan konsentrasi masing-masing 2 g, 4 g dan 6 g yang dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dan diinkubasi pada suhu 30°C selama 7 hari. Setelah 7 hari dilakukan perhitungan jumlah spora dengan menggunakan haemocytometer.

Prinsip kerja alat haemocytometer adalah untuk menghitung jumlah bakteri keseluruhan (langsung) yang dilakukan secara mikroskopis yaitu dengan menghitung jumlah bakteri dalam satuan isi yang sangat kecil. Jumlah cairan yang terdapat antara *cover glass* dan alat ini mempunyai volume tertentu sehingga satuan isi yang terdapat dalam satu bujur sangkar juga tertentu. Ruang hitung terdiri dari 9 kotak besar dengan luas 1 mm². Satu kotak besar terletak di tengah yang dibagi menjadi 25 kotak sedang dengan panjang 0,2 mm. Kemudian satu kotak sedang dibagi lagi menjadi 16 kotak kecil. Dengan demikian satu kotak besar tersebut berisi 400 kotak kecil. Tebal dari ruang hitung ini adalah 0,1 mm. Sel bakteri yang tersuspensi akan memenuhi volume ruang hitung tersebut sehingga jumlah bakteri per satuan volume dapat diketahui. Jika di dalam satu kotak sedang terdapat sel-sel yang banyak dan saling bertumpuk maka perlu dilakukan pengenceran sehingga sel/mL dikalikan faktor pengenceran. Perhitungan sampel dilakukan minimal 5 kotak sedang (semakin banyak semakin baik).

Hasil penelitian mengenai pengaruh penambahan tepung singkong (terlihat pada tabel 4.3) terhadap jumlah spora yaitu, pada konsentrasi 2 g rata-rata jumlah spora yaitu $2,43 \times 10^8$ sel/mL, konsentrasi 4 g rata-rata jumlah spora yaitu $6,0 \times 10^8$ sel/mL dan konsentrasi 6 g rata-rata jumlah spora yaitu $4,2 \times 10^8$ sel/mL. Dari ketiga konsentrasi tersebut menunjukkan jumlah spora yang paling banyak pada penambahan tepung singkong sebanyak 4 g sedangkan pada kontrol rata-rata jumlah spora yaitu $1,51 \times 10^8$ sel/mL. Jadi, dapat diketahui bahwa jumlah spora *A. niger* tidak dipengaruhi oleh banyaknya penambahan tepung singkong hal ini dikarenakan diantara ketiga konsentrasi yang digunakan yaitu 2, 4 dan 6 gr yang menghasilkan jumlah spora yang paling banyak adalah tepung singkong dengan penambahan tepung sebanyak 4 gr hal ini dikarenakan bahwa *Aspergillus niger* tidak terlalu jenuh jika konsentrasi yang digunakan terlalu rendah dan terlalu tinggi.

Berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat diketahui bahwa jumlah spora *A. niger* optimal dihasilkan pada penambahan tepung singkong sebanyak 4 g yaitu $6,0 \times 10^8$ sel/mL. Jadi, hasil yang diperoleh sesuai teori dimana dengan penambahan tepung tapioka sebanyak 4 g pada medium PDA pertumbuhan *A. niger* menjadi optimal karena lebih banyak mengandung zat pati daripada tepung jagung dan tepung beras. Tetapi bila dibandingkan dengan kontrol (-) dimana jumlah spora yang dihasilkan yaitu $1,51 \times 10^8$ sel/mL menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap pertumbuhan *A. niger* karena jumlah spora yang dihasilkan kelompok perlakuan lebih banyak dan jauh berbeda daripada kontrol (-). Jadi, dapat disimpulkan bahwa penambahan tepung singkong pada medium PDA memiliki efektivitas yang baik terhadap

pertumbuhan *A. niger* yang dapat dilihat dari jumlah spora yang dihasilkan namun berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan Uji Anova hasil yang diperoleh menunjukkan antar perlakuan terdapat perbedaan yang tidak nyata (tidak signifikan). Berdasarkan pada Tabel 4.4 menunjukkan ($p > \alpha 0,05$).

Nutrisi yang dibutuhkan kapang adalah karbohidrat, protein, mineral dan vitamin (termasuk makronutrien dan mikronutrien) (Djarajah, 2001). Tepung beras mengandung energi sebesar 364 kilokalori, protein 7 g, karbohidrat 80 g, lemak 0,5 g, kalsium 5 mg, fosfor 140 mg, dan zat besi 1 mg. Tepung maizena mengandung energi sebesar 343 kilokalori, protein 0,3 g, karbohidrat 85 g, lemak 0 g, kalsium 20 mg, fosfor 30 mg dan zat besi 2 mg. Sedangkan tepung tapioka mengandung energi sebesar 362 kilokalori, protein 0,5 g, karbohidrat 86,9 g, lemak 0,3 g, kalsium 0 mg, fosfor 0 mg, dan zat besi 0 mg. Selain itu di dalam ketiga tepung tersebut juga terkandung vitamin A, vitamin B1 dan vitamin C yang sama.

Karbohidrat merupakan sumber utama karbon, Hidrogen, dan Oksigen, sedangkan protein sebagai sumber utama Nitrogen. Menurut Lilly dan Barnett (1951) menyatakan bahwa unsur-unsur C, H, O, N berperan sebagai unsur penyusun sel, fungsional sel (enzim), dan proses tranfer energy sedangkan vitamin dan mineral dalam tepung berperan dalam pertumbuhan *A. niger* dimana Mineral seperti Mg, K, Ca dan Fe berperan dalam aktivasi enzim dan terlibat dalam reaksi enzimatik, sedangkan vitamin berperan sebagai katalisator. Adanya nutrisi yang tepat dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan *A. niger*, karena kebutuhan nutrisi masing-masing spesies berbeda-beda. Beberapa mikroelemen dapat menghambat

pertumbuhan apabila tersedia dalam jumlah berlebihan antara lain Fe, Cu, dan Zn (Handiyanto dkk, 2013).

A. niger dapat tumbuh cepat dengan menggunakan nutrisi yang ada disekelilingnya. Molekul–molekul sederhana seperti monosakarida yang terlarut disekeliling hifa dapat diserap langsung oleh hifa, tetapi polimer–polimer seperti amilum atau selulosa harus dipecah dulu oleh enzim-enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh *A. niger* menjadi molekul–molekul yang lebih sederhana sebelum diserap ke dalam sel (Wuryanti, 2008).

Pada hari pertama miselium belum tumbuh karena masih dalam proses adaptasi. Fase adaptasi adalah fase penyesuaian mikroba dengan kondisi lingkungan baru di sekelilingnya. Jumlah awal sel yang dipindah ke media baru mempengaruhi cepat lambatnya fase adaptasi. Bila media dan lingkungan pertumbuhan sama dengan media sebelumnya, mungkin tidak diperlukan waktu adaptasi. Pada hari kedua sudah terbentuk miselium kemudian pada hari ketiga juga diikuti dengan terbentuknya spora muda yang berwarna agak kehitaman dan hari keempat spora mulai menua ditandai dengan warnanya lebih hitam (Munier, 1998). Mikroba membelah dengan cepat dan konstan mengikuti kurva logaritmik. Kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh pH, kandungan nutrien, suhu dan kelembaban udara. Pada fase ini kultur paling sensitif terhadap keadaan lingkungan (Wuryanti, 2008). Pembentukan asam sendiri disebabkan oleh aktivitas *A. niger*. Semakin tinggi laju pertumbuhan spora maka semakin banyak asam yang terbentuk (Soetrisnanto, 1998).

A. niger menunjukkan bahwa tepung singkong mempengaruhi pembentukan spora. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan zat gizi, khususnya karbohidrat (pati). Spora akan langsung terbentuk untuk melindungi dirinya dari cekaman kekurangan zat gizi. Dengan demikian, pada perlakuan dengan penambahan tepung pertumbuhan *A. niger* menjadi lebih baik (Erika dkk, 2013).

A. niger berkembang biak secara vegetatif dan generatif melalui pembelahan sel dan spora-spora yang dibentuk didalam askus atau kotak spora. Pada pertumbuhan miselium *A. Niger* di tandai dengan adanya spora yang terbentuk, tumbuhnya spora pada *A. Niger* merupakan langkah awal dalam perumbuhannya. Spora pada suatu cendawan digunakan sebagai alat reproduksinya atau alat perkembangbiakannya, spora yang terbentuk inilah yang akan digunakan pada suatu proses industri. Tujuan tahap peramajaan *A. niger* adalah memperoleh spora yang masih muda untuk dapat menghasilkan produk yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laju pertumbuhan koloni yang paling baik pada *Aspergillus niger* pada penggunaan tepung singkong sebanyak 4 g yaitu sebesar 1,2 cm/haridan menunjukkan pengaruh yang signifikan hal ini dikarenakan $p(0,00) < \alpha(0,05)$.
2. Jumlah spora *A. niger* optimal dihasilkan pada penambahan tepung singkong sebanyak 4 gyaitu $6,0 \times 10^8$ sel/mL dan menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan hal ini dikarenakan $p(0,00) > \alpha(0,05)$.

B. Saran

Pada penelitian ini perlu memperhatikan konsentrasi yang paling maksimal yang memungkinkan suatu cendawan dapat tumbuh dengan baik agar hasil penelitian yang didapatkan lebih akurat lagi karena kemungkinan besar *A. niger* yang ditumbuhkan pada media PDA dengan konsentrasi rendah dan tinggi sangat berpengaruh sehingga mengganggu proses pertumbuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade FY. “ Isolasi dan Identifikasi Jamur –jamur Pendegradasi Amilosa pada Empelur Tanaman Sagu (*Metroxylon sagu Rottb*)”.*Jurnal ilmiah Edu Research*. 2 No 1 (2013): 27-34.
- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2011.
- Aini Nur. “*Teknologi Fermentasi pada Tepung Jagung*”. Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013.
- Ali, S., Haq, I., M. A. Qadeer., Iqbal, J. “Production of Citric Acid by *Aspergillus Niger* Using Cane Molasses In a Stired Fermentor. *Electronic Journal of Biotechnology*. Vol. 5 No. 3 (2002): 259-271.
- Arima, K. 1964. Microbial Enzyme Production. Di dalam M.P. Starr (ed.).*Global impact of Applied Microbiology*. John Willey and Sons, NewYork.
- Almatsier Sunita. “*Prinsip Dasar Ilmu Gizi*”. Jakarta; PT Gramedia Pustaka utama, 2004.
- Asmaria. “Pemamfaatan Tepung Kulit Buah Kakao Terong Belanda Fermentasi (*Aspergillus Niger*) terhadap Kinerja Reproduksi Burung Puyuh”. *Skripsi*. Medan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.
- Azizah Nur. “Pengaruh Suhu Fosforilasi terhadap Sifat Fisikokimia Pati Tapioka Termodifikasi” *Skripsi*. Makassar: Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Buckle K.A, Edwardz R.A, Fleet G.H, M. Wotton. “*Ilmu Pangan*”. Jakarta; Cetakan Pertama. Universitas Indonesia, 2009.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN), 2015b. SNI 01-3451-1994 Tapioka. <http://sisni.bsn.go.id/index>. Di Akses tanggal 7 Agustus 2015. Makassar.
- Cahyono, Ir Bambang . *Mengenal Lebih Dekat Varietas-varietas Unggul Jagung*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Direktorat Gizi Departemen Kesehatan. “*Daftar Komposisi Bahan Makanan*”. Jakarta: Penerbit Bharata. 2001.

- Fardiaz, S. Mikrobiologi Pangan I. Cetakan Pertama. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1992.
- Fardiaz S. Penuntun Praktek Mikrobiologi Pangan. Bogor: Lembaga Sumberdaya Informasi- Institut Pertanian Bogor, 1987
- Food and Drugs. *Code of Federal Regulation*. Washington: US Government Printing Office, 1998.
- Gandjar, I., W. Sjamsuridjal, dan A. Detrasi. "Mikologi Dasar dan Terapan". Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, Indonesia, 2006.
- Grace, M.R. 1977. Cassava Processing. Food and Agriculture Organization of United Nations, Roma.
- Hardjo, SS., N. S. Indrasti, B. Tajuddin. "Pemanfaatan Limbah Industri Pertanian". *Biokonveksi*. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. IPB. Bogor, 1989.
- Herlina Fitri. "Uji Adaptasi beberapa Varietas Padi Ladang (*Oryza sativa L*)". *Skripsi*. Langkat: Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Langkat, 2009.
- Huwae BR. "Analisis Kadar Karbohidrat Tepung Beberapa Jenis Sagu yang dikonsumsi Masyarakat Maluku". *Bioendix*. 1 No 1 (2014): 59-64.
- Handiyanto S, Hastuti US dan Prabaningtyas S. " Pengaruh Medium Air Cucian Beras Terhadap Kecepatan Pertumbuhan Miselium Biakan Murni Jamur Tiram Putih". *Seminar Nasional X Pendidikan Biologi FKIP UNS*, 2013.
- Hapsari Titi, Zainul A dan Nugroho M. "Pengaruh Pre Gelatinisasi terhadap Karakteristik tepung singkong". Fakultas pertanian Universitas Yudharta, Pasuruan Jawa timur, 2007.
- Hutagalung Dr Haloman. "Karbohidrat" *Digitized by USU digital library*. 2004: 13.
- Indratiningsih, Wahyuni E, Ambar P dan Shanti A.S. Identification of aspergillus species using morphological characteristic and the effect of temperature on the protease activity. *International Journal of Biochemistry and Biotechnology* 2, no. 3 (2013): 297-301.

- Koswara, Ir Sutrisno, Msi. *Teknologi Pengolahan Jagung (Teori dan Praktek)*. eBookPangan.com, 2009.
- Kusuma E.F. “Analisa pH Optimum Untuk Perkembangbiakan *Lactobacillus Bulgaricus* Dalam Proses Fermentasi Fruktosa pada Susu Menjadi Asam Laktat”. *Skripsi*. Semarang. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- Kusmartanti Arindyah. “Pengaruh Suhu terhadap Penurunan Kadar Abu Tepung Beras dengan Menggunakan Alat furnace”. *Skripsi*. Semarang.: Fakultas Teknik Univeristas Diponegoro, 2010.
- Khatir R, ratna dan Wardani. “Karakteristik Pengeringan Tepung Beras Menggunakan Alat Pengering Tipe Rak” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, Biologi Edukasi* 3, No 2, (2011):1-4
- Lilly, Virgil Greene and Horace L. Barnett.1951. *Physiology of the Fungi*. New York: McGraw Hill Book Company.
- Munier F.F. “Pertumbuhan *Aspergillus niger* dalam Proses Biofermentasi pada Beberapa Ukuran Cacahan Kulit Buah Kakao”.*Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan veteriner*. 1998: 739-744.
- Murni SW, Siti DK, Tanti D.L dan Petriessia E.M. Produksi, karakterisasi, dan isolasi lipase dari *Aspergillus Niger*. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan” Pengembangan Teknologi Kimia Untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia Yogyakarta*, 2011: 1-7.
- Mamfaati Rintis. “Pengaruh Komposisi Media Fermentasi Terhadap Produksi Asam Sitrat oleh *Aspergillus Niger*”. *Jurnal Fluida*. VII, No 1 (2011): 23-27.
- Muchtar Munira. “Pemanfaatan Kulit Buah Kakao Sebagai Media padat Untuk Memproduksi Enzim Amilase Oleh *Aspergillus niger* dan *Aspergillus oryzae*”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Mulia D.S, Mudah M, Maryanto H, dan Purbomartono C. “Fermentasi Ampas Tahu Dengan *Aspergillus niger* Untuk Meningkatkan Kualitas Bahan Baku Pakan Ikan”. *Prosiding Seminar Hasil* (2014): 336-345.

- Murray, R. K., Granner, D. K., & Rodwell, V. W. Biokimia harper (27 ed.). Jakarta: Buku Kedokteran EGC; 2009.
- Nio Oey Kam. *Daftar Anlisis Bahan Makanan*. Fakultas kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 1992.
- Nurmala, Dr tati S.W., IR. *Serealia Sumber Karbohidrat Utama*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Novianto Galih. Pabrik Tepung Tapioka Dengan Proses Ekstraksi Pra Rencana Pabrik. *Skripsi*. Jawa timur. Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2011.
- Noverita. “Identifikasi Kapang dan Khamir Penyebab Penyakit Manusia pada Sumber Air Minum Penduduk pada Sungai Ciliwung dan Sumber Air Sekitarnya”. *Vis vitalis* 02 No. 2 (September 2009): 12-22.
- Pratomo Ridho. “Pengaruh Macam, Ph, Dan Penggoyangan Media Terhadap Pertumbuhan Cendawan *Rhizoctonia Sp*”. *Skripsi*. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Prihandana, Rama., Dkk. *Bioetanol Ubi Kayu Bahan Bakar Masa Depan*. Jakarta. Agro Media Pustaka, 2007.
- Padmaja, G.; C. Balagopalan; S.N. Moorthy; and V., P., Potty. 1996. Yuca Rava and Yuca Porridge : The Funtional Properties and Quality of Two Novel Cassava Products. Cassava Flour and Starch: Progress in Research and Development p: 323-330.
- Prakash R dan Jha S.N. Basic of The Genus *Aspergillus*. *International journal of Research Botany* 4, no. 2 (2014): h. 26-30.
- Rymowicz, W and Lenart, D. 2003. Oxalic acid production from lipids by a mutant of *Aspergillus niger* at different pH. *Biotechnology letters* vol. 25(12):955-958.
- Rao, S.C.V., Rao R., and Agrawal, R. 2003. Enhanced production of verbenol, a highly valued food flavourant, by an intergeneric fusant strain of *Aspergillus niger* and *penicilium digiatum*. *Biotechnol. Appl. Biochem.* 37:145-147.
- Reed, G. 1966. *Enzyme in Food Processing*, Academic Press. New York.

- Rahman, Ansori. 1989. Teknologi Fermentasi. PAU Pangan dan Gizi. IPB. Bogor.
- Rahman M Adie. Mempelajari Karakteristik Kimia dan Fsik Tepung Tapioka dan Mocal (*Modified Cassava Flour*) Sebagai Penyalut Kacang Pada Produk Kacang Salut. *Skripsi*. Bogor. Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2007.
- Richana Nur dan Suarni. "Teknologi Pengolahan Jagung". *Teknik Produksi dan Pengembangan*. Bogor. 2005: 409.
- Raper KB dan Fennel DI. "Genus *Aspergillus*. Williams dan Wilkins perusahaan. 1965.
- Sadad A, Maharani TA dan Evie R. "Pemamfaatan Bekatul Padi, Bekatul Jagung, dan Kulit Ari Biji Kedelai sebagai Media Pertumbuhan Miselium Cendawan *Metarhizinium anisoplae*" *LenteraBio*.3 No 2 (2014): h 136.
- Suganthi, R., Benazir, J. F., Santhi, R., Ramesh, K.V., Anjana, H., Nitya M., Nidhiya, K. A., Kavitha, G., Lakshmi., R. 2011. Amylase Production By *Aspergillus niger* Under Solid State Fermentation Using Agro industrial Wastes. *International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST)*. Vol 3(2):1756-1763.
- Suhartono, Maggy T. Enzim dan Bioteknologi. IUC-Bank Dunia XVII. Bogor, 1989.
- Sumartini. "Kajian Sifat Fisiko Kimia Formulasi Tepung Komposit Produk Organik". *Seminar nasional PATPI*. Fakultas teknik Universitas Pasundan. Bandung, 2011.
- Soetrisnanto D, Istadi ST, Nugroho MS, Susanto H dan Widayat ST. "Pembuatan Asam Sitrat dari Sagu dengan Cara Fermentasi pada Media Cair". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 1998.
- Tauber, H. 1950. Chemistry and Technology of Enzymes. John Willey and Sonc Inc., New York. Terhadap Produksi Sel *Aspergillus niger*". *Bioma*. Vol. 10 No. 2 (2008): 46-50.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.


Winarno, F.G. Kimia Pangan. PT Gramedia, Jakarta, 2009.

Wuryanti. “Pengaruh Penambahan Biotin Pada Media Pertumbuhan Terhadap Produksi Sel *Aspergillus Niger*”. *Bioma*. 10 No 2 (2008):46-50.

Windi Atmaka, A, S, Bambang. “Kajian Karakteristik Fisikokimia Tepung Instan Beberapa Varietas Jagung” (*Zea mays L.*) *J.Teknologi dan Industri Pangan*, 3 No. 1 (2010): 24.

Zulkarnain Juita. “Pengaruh Perbedaan Komposisi Tepung Tapioka terhadap Kualitas Bakso Lele”. *Skripsi*. Padang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, 2013.

Zubachtirodin Ir, Bambang S, Mulyono SP, Hermawan D. “Teknologi Budidaya Jagung” *Perpustakaan Nasional*, Jakarta :2011.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DIAMETER KOLONI *Aspergillus niger*

Tabel Hasil Penelitian mengenai pengukuran diameter koloni *Aspergillus niger* dengan menggunakan tepung beras

Jenis tepung	Konsentrasi (gram)	Ulangan	Diameter hari ke- (cm)							Rata-rata (cm)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	
Tepung beras	2	1	0	4	4,2	4,5	4,6	4,9	5	3,89
		2	0	2,5	3	4,5	4,6	4,8	4,9	3,47
		3	0	0,8	0,9	0,9	1	1	2	0,94
	Rata-rata									2,77
	4	1	0	4,5	5	5,7	5,7	6	6,3	4,74
		2	0	1,5	1,7	1,8	2	2	2,3	1,61
		3	0	3	3	3,2	3,2	3,2	3,5	2,73
	Rata-rata									3,03
	6	1	0	5,3	5,7	5,8	6	6,2	6,3	5,04
		2	0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,23
		3	0	0,1	4	6	6,7	7	7	4,4
	Rata-rata									3,22
Kontrol		1	0	3	3,8	4	4,6	4,8	5	3,6
		2	0	0,7	1,3	1,7	2	2,3	2,5	2,4
		3	0	3,5	3,7	4	4,5	6,6	7	4,19
		Rata-rata								

Tabel Hasil penelitian mengenai pengukuran diameter koloni *Aspergillus niger* dengan menggunakan tepung jagung

Jenis tepung	Konsentrasi (gram)	Ulangan	Diameter hari ke- (cm)							Rata-rata (cm)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	
Tepung Jagung	2	1	0	3	3,2	3,3	3,7	3,7	3,8	2,96
		2	0	1,2	1,5	1,6	1,8	2,2	2,3	1,51
		3	0	0,9	1	1	1,1	1,1	1,2	0,9
	Rata-rata									1,79
	4	1	0	4,5	4,6	7	7,3	7,8	9	5,74
		2	0	2,9	3,2	3,3	3,5	4	4,2	3,01
		3	0	2	2,7	3	3,5	3,7	4	2,7
	Rata-rata									3,82
	6	1	0	6	6,2	6,6	6,7	6,7	6,9	5,59
		2	0	2,5	2,7	3	3	3,2	3,3	2,53
3		0	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,73	
Rata-rata									2,95	
Kontrol		1	0	3	3,8	4	4,6	4,8	5	3,6
		2	0	0,7	1,3	1,7	2	2,3	2,5	2,4
		3	0	3,5	3,7	4	4,5	6,6	7	4,19
		Rata-rata								

Tabel hasil penelitian mengenai pengukuran diameter koloni *Aspergillus niger* dengan menggunakan tepung singkong

Jenis tepung	Konsentrasi (gram)	Ulangan	Diameter hari ke- (cm)							Rata-rata (cm)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	
Tepung Tapioka	2	1	0	3	3,2	3,7	4	4,2	4,3	3,2
		2	0	3	3,2	3,5	3,5	3,7	4	2,99
		3	0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,67
	Rata-rata									2,29
	4	1	0	4,5	5	6	6,5	7	9	5,43
		2	0	2,5	4	6	7	7,8	9	5,19
		3	0	2	4	6	7	8	9	5,14
	Rata-rata									5,25
	6	1	0	4,5	4,7	4,8	4,9	5	5,2	4,16
		2	0	4,5	4,8	4,9	5	5,2	5,2	4,23
3		0	1,2	1,3	1,3	1,7	1,8	2	1,33	
Rata-rata									3,24	
Kontrol		1	0	3	3,8	4	4,6	4,8	5	3,6
		2	0	0,7	1,3	1,7	2	2,3	2,5	2,4
		3	0	3,5	3,7	4	4,5	6,6	7	4,19
	Rata-rata									3,40

JUMLAH SPORA *Aspergillus niger*

Tabel hasil penelitian mengenai perhitungan jumlah spora *Aspergillus niger* dengan menggunakan tepung beras

Konsentrasi(gram)	pengulangan	Ruang hitung (sel)					Rata -rata
		I	II	III	IV	V	
2	1	35	22	17	36	24	26,8
	2	72	95	82	102	97	89,6
	3	51	48	40	33	56	45,6
Rata-rata							54
4	1	128	137	117	103	99	116,8
	2	23	16	25	25	23	22,4
	3	17	5	12	5	9	9,6
Rata-rata							49,6
6	1	17	15	20	16	9	21,4
	2	6	12	18	9	8	10,6
	3	173	184	193	163	172	117
Rata-rata							49,7
Kontrol	1	24	18	38	44	39	32,6
	2	7	5	15	19	13	11,8
	3	63	77	84	87	34	69
Rata-rata							37,8

Tabel hasil penelitian mengenai perhitungan jumlah spora *Aspergillus niger* dengan menggunakan tepung jagung

Konsentrasi(gram)	pengulangan	Ruang hitung (sel)					Rata -rata
		I	II	III	IV	V	
2	1	10	12	13	15	15	13
	2	9	10	15	18	14	13,2
	3	2	2	2	5	8	3,8
Rata-rata							10
4	1	15	23	76	56	34	40,8
	2	23	34	57	47	87	49,6
	3	57	84	67	94	73	75
Rata-rata							55,1
6	1	11	12	17	20	18	15,6
	2	17	21	19	13	11	16,2
	3	13	22	12	17	9	14,6
Rata-rata							15,5
Kontrol	1	24	18	38	44	39	32,6
	2	7	5	15	19	13	11,8

	3	63	77	84	87	34	69
	Rata-rata						37,8

Tabel hasil penelitian mengenai perhitungan jumlah spora *Aspergillus niger* dengan menggunakan tepung singkong

Konsentrasi(gram)	pengulangan	Ruang hitung (sel)					Rata- rata
		I	II	III	IV	V	
2	1	75	82	93	72	102	84,8
	2	96	78	89	104	110	95,4
	3	6	0	3	0	3	2,4
Rata-rata							60,9
4	1	182	170	163	162	150	169,2
	2	148	158	168	98	112	136,8
	3	150	132	145	163	132	144,4
Rata-rata							150,1
6	1	17	8	14	6	15	12
	2	3	8	4	7	12	6,8
	3	48	4	5	3	3	12,6
Rata-rata							10,5
Kontrol	1	24	18	38	44	39	32,6
	2	7	5	15	19	13	11,8
	3	63	77	84	87	34	69
Rata-rata							37,8

LAMPIRAN 2**Hasil Analisis Data Diameter Koloni *Aspergillus niger***

Rumus untuk menentukan laju pertumbuhan suatu cendawan

$$V = \frac{\text{Dimater akhir} - \text{Diameter Awal}}{\text{Rentang Jumlah Akhir}}$$

Tepung Beras 2 gr

$$\begin{aligned} \text{Ulangan 1} &= \frac{5-4}{5} & \text{Ulangan 2} &= \frac{4,9-2,5}{5} & \text{Ulangan 3} &= \frac{2-0,8}{5} \\ &= 1/5 & &= 2,4/5 & &= 1,2/5 \\ &= 0,2 \text{ cm/hari} & &= 0,48 \text{ c./hari} & &= 0,24 \text{ cm/hari} \end{aligned}$$

Jadi rata-rata yang diperoleh yaitu = 0,31 cm/hari

Tepung Beras 4 gr

$$\begin{aligned} \text{Ulangan 1} &= \frac{6,3-4,5}{5} & \text{Ulangan 2} &= \frac{2,3-1,5}{5} & \text{Ulangan 3} &= \frac{3,5-3}{5} \\ &= 1,8/5 & &= 0,8/5 & &= 0,5/5 \\ &= 0,36 \text{ cm/hari} & &= 0,16 \text{ cm/hari} & &= 0,1 \text{ cm/hari} \end{aligned}$$

Jadi rata-rata yang diperoleh yaitu = 0,21 cm/hari

Tepung beras 6 gr

$$\begin{aligned} \text{Ulangan 1} &= \frac{6,3-5,3}{5} & \text{Ulangan 2} &= \frac{0,4-0,1}{5} & \text{Ulangan 3} &= \frac{7-0,1}{5} \\ &= 1/5 & &= 0,3/5 & &= 6,9/5 \\ &= 0,2 \text{ cm/hari} & &= 0,06 \text{ cm/hari} & &= 1,38 \text{ cm/hari} \end{aligned}$$

Jadi rata-rata yang diperoleh yaitu = 0,55 cm/hari

$$\text{Kontrol 1} = \frac{5-3}{5}$$

$$= \frac{2}{5}$$

$$= 0,4 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Kontrol 2} = \frac{2,5-0,7}{5}$$

$$= \frac{1,8}{5}$$

$$= 0,36 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Kontrol 3} = \frac{7-3,5}{5}$$

$$= \frac{3,5}{5}$$

$$= 0,7 \text{ cm/hari}$$

Jadi rata-rata yang diperoleh = 0,49 cm/hari

Tepung jagung 2 gr

$$\text{Ulangan 1} = \frac{3,8-3}{5}$$

$$= \frac{0,8}{5}$$

$$= 0,16 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Ulangan 2} = \frac{2,3-1,2}{5}$$

$$= \frac{1,1}{5}$$

$$= 0,22 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Ulangan 3} = \frac{1,2-0,9}{5}$$

$$= \frac{0,3}{5}$$

$$= 0,06 \text{ cm/hari}$$

Jadi rata-rata nilai yang diperoleh yaitu = 0,15 cm/hari

Tepung Jagung 4 gr

$$\text{Ulangan 1} = \frac{9-4,5}{5}$$

$$= \frac{4,5}{5}$$

$$= 0,9 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Ulangan 2} = \frac{4,2-2,9}{5}$$

$$= \frac{1,3}{5}$$

$$= 0,26 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Ulangan 3} = \frac{4-2}{5}$$

$$= \frac{2}{5}$$

$$= 0,4 \text{ cm/hari}$$

Jadi rata-rata nilai yang diperoleh yaitu = 0,52 cm/hari

Tepung Jagung 6 gr

$$\text{Ulangan 1} = \frac{6,9-6}{5}$$

$$= \frac{0,9}{5}$$

$$= 0,18 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Ulangan 2} = \frac{3,3-2,5}{5}$$

$$= \frac{0,8}{5}$$

$$= 0,16 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Ulangan 3} = \frac{0,9-0,8}{5}$$

$$= \frac{0,1}{5}$$

$$= 0,02 \text{ cm/hari}$$

Jadi rata-rata nilai yang diperoleh yaitu = 0,12 cm/hari

$$\text{Kontrol 1} = \frac{5-3}{5}$$

$$\text{Kontrol 2} = \frac{2,5-0,7}{5}$$

$$\text{Kontrol 3} = \frac{7-3,5}{5}$$

$$= \frac{2}{5}$$

$$= 0,4 \text{ cm/hari}$$

$$= \frac{1,8}{5}$$

$$= 0,36 \text{ cm/hari}$$

$$= \frac{3,5}{5}$$

$$= 0,7 \text{ cm/hari}$$

Jadi rata-rata yang diperoleh = 0,49 cm/hari

Tepung Singkong 2 gr

$$\text{Ulangan 1} = \frac{4,3-3}{5}$$

$$= \frac{1,3}{5}$$

$$= 0,26 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Ulangan 2} = \frac{4-3}{5}$$

$$= \frac{1}{5}$$

$$= 0,2 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Ulangan 3} = \frac{0,8-0,7}{5}$$

$$= \frac{0,1}{5}$$

$$= 0,02 \text{ cm/hari}$$

Jadi rata-rata nilai yang diperoleh yaitu = 0,16cm/hari

Tepung Singkong 4 gr

$$\text{Ulangan 1} = \frac{9-4,5}{5}$$

$$= \frac{4,5}{5}$$

$$= 0,9 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Ulangan 2} = \frac{9-2,5}{5}$$

$$= \frac{0,5}{5}$$

$$= 1,3 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Ulangan 3} = \frac{9-2}{5}$$

$$= \frac{7}{5}$$

$$= 1,4 \text{ cm/hari}$$

Jadi rata-rata nilai yang diperoleh yaitu = 1,2 cm/hari

Tepung Singkong 6 gr

$$\text{Ulangan 1} = \frac{5,2-4,5}{5}$$

$$= \frac{0,7}{5}$$

$$= 0,14 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Ulangan 2} = \frac{5,2-4,5}{5}$$

$$= \frac{0,7}{5}$$

$$= 0,14 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Ulangan 3} = \frac{2-1,2}{5}$$

$$= \frac{0,8}{5}$$

$$= 0,16 \text{ cm/hari}$$

Jadi rata-rata nilai yang diperoleh yaitu = 0,15 cm/hari

$$\text{Kontrol 1} = \frac{5-3}{5}$$

$$= \frac{2}{5}$$

$$= 0,4 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Kontrol 2} = \frac{2,5-0,7}{5}$$

$$= \frac{1,8}{5}$$

$$= 0,36 \text{ cm/hari}$$

$$\text{Kontrol 3} = \frac{7-3,5}{5}$$

$$= \frac{3,5}{5}$$

$$= 0,7 \text{ cm/hari}$$

Jadi rata-rata yang diperoleh = 0,49 cm/hari

LAMPIRAN 3

Hasil Analisis Data Perhitungan jumlah spora *Aspergillus niger*

Rumus untuk kotak kecil dalam menghitung jumlah spora dengan prinsip haemocytometer

Luas Kotak Sedang

$$= p \times l$$

= $0,2 \times 0,2 = 0,04 \text{ mm}^2$ jadi misalkan di peroleh volume kotak sedang : 20 sel dalam satu kotak sedang

= $0,04 \text{ mm}^2 \times 0,1 \text{ mm}$ maka jumlah sel keseluruhan

$$= 0,0004 \text{ mm}^3 = 20 \times \left(\frac{1}{4}\right) \times 10^5$$

Karena $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3 = 10^6 \text{ sel/ml}$

$$\text{Maka} = 0,0004 \text{ mm}^3$$

$$= 0,00004 \text{ cm}^3$$

$$= 4 \times 10^{-6} \text{ ml}$$

Sel/ml

$$= \text{Jumlah sel} / 4 \times 10^6 \text{ ml}$$

$$= (\text{jumlah sel} / 4) \times 10^6$$

$$= \text{Jumlah sel} \times 2,5 \times 10^5$$

Kotak sedang

$$\text{Jumlah sel/ml} = \text{Jumlah sel} \times 2,5 \times 10^5$$

Dengan perhitungan yang sama maka diperoleh rumus untuk kotak kecil

$$\text{Jumlah sel/ml} = \text{Jumlah sel} \times 4 \times 10^6$$

Sesuai hasil tabel pengamatan maka diperoleh jumlah spora sebagai berikut :

$$\text{Tepung Beras 2 gr} = 54 \times 4 \times 10^6$$

$$= 216 \times 10^6 \text{ sel/ml}$$

$$4 \text{ gr} = 49,6 \times 4 \times 10^6$$

$$= 198,4 \times 10^6 \text{ sel/ml}$$

$$6 \text{ gr} = 49,7 \times 4 \times 10^6$$

$$= 198,8 \times 10^6 \text{ sel/ml}$$

$$\text{Kontrol} = 37,8 \times 4 \times 10^6$$

$$= 151,2 \times 10^6 \text{ sel/ml}$$

$$\text{Tepung Jagung 2 gr} = 10 \times 4 \times 10^6$$

$$= 40 \times 10^6 \text{ sel/ml}$$

$$4 \text{ gr} = 55,1 \times 4 \times 10^6$$

$$= 220,4 \times 10^6 \text{ sel/ml}$$

$$6 \text{ gr} = 15,5 \times 4 \times 10^6$$

$$= 62 \times 10^6 \text{ sel/ml}$$

$$\text{Kontrol} = 37,8 \times 4 \times 10^6$$

$$= 151,2 \times 10^6 \text{ sel/ml}$$

$$\text{Tepung Singkong 2 gr} = 60,9 \times 4 \times 10^6$$

$$= 243,6 \times 10^6 \text{ sel/ml}$$

$$4 \text{ gr} = 150,1 \times 4 \times 10^6$$

$$= 600,4 \times 10^6 \text{ sel/ml}$$

$$6 \text{ gr} = 10,5 \times 4 \times 10^6$$

$$= 42 \times 10^6 \text{ sel/ml}$$

$$\text{Kontrol} = 37,8 \times 4 \times 10^6$$

$$= 151,2 \times 10^6 \text{ sel/ml}$$

Lampiran 4

Laju Pertumbuhan Miselium *Aspergillus niger* tepung singkong

Lampiran 5.1 Tabel hubungan faktor-faktor subjeck

Between-Subjects Factors			
		Value Label	N
FAKTOR A	1.00	FAKTOR A0	3
	2.00	FAKTOR A1	9
FAKTOR B	1.00	FAKTOR B0	3
	2.00	FAKTOR B1	3
	3.00	FAKTOR B2	3
	4.00	FAKTOR B3	3

Lampiran 5.2 Tabel hubungan antara pengaruh subject

Tests of Between-Subjects Effects					
Dependent Variable: DIMETER KOLONI ASPERGILLUS NIGER					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	2.192 ^a	3	.731	24.300	.000
Intercept	2.789	1	2.789	92.772	.000
A	.000	0	.	.	.
B	2.191	2	1.096	36.441	.000
A * B	.000	0	.	.	.
Error	.241	8	.030		
Total	5.412	12			
Corrected Total	2.432	11			

a. R Squared = .901 (Adjusted R Squared = .864)

MAKASSAR

Post Hoc Tests

FAKTOR B

Lampiran 5.3 Tabel Uji Tukey dan LSD

Multiple Comparisons							
Dependent Variable: DIMETER KOLONI ASPERGILLUS NIGER							
	(I) FAKTOR B	(J) FAKTOR B	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Tukey HSD	FAKTOR B0	FAKTOR B1	.3267	.14158	.175	-.1267	.7801
		FAKTOR B2	-.7133*	.14158	.004	-1.1667	-.2599
		FAKTOR B3	.3400	.14158	.154	-.1134	.7934
	FAKTOR B1	FAKTOR B0	-.3267	.14158	.175	-.7801	.1267
		FAKTOR B2	-1.0400*	.14158	.000	-1.4934	-.5866
		FAKTOR B3	.0133	.14158	1.000	-.4401	.4667
	FAKTOR B2	FAKTOR B0	.7133*	.14158	.004	.2599	1.1667
		FAKTOR B1	1.0400*	.14158	.000	.5866	1.4934
		FAKTOR B3	1.0533*	.14158	.000	.5999	1.5067
	FAKTOR B3	FAKTOR B0	-.3400	.14158	.154	-.7934	.1134
		FAKTOR B1	-.0133	.14158	1.000	-.4667	.4401
		FAKTOR B2	-1.0533*	.14158	.000	-1.5067	-.5999
LSD	FAKTOR B0	FAKTOR B1	.3267*	.14158	.050	.0002	.6531
		FAKTOR B2	-.7133*	.14158	.001	-1.0398	-.3869
		FAKTOR B3	.3400*	.14158	.043	.0135	.6665
	FAKTOR B1	FAKTOR B0	-.3267*	.14158	.050	-.6531	-.0002
		FAKTOR B2	-1.0400*	.14158	.000	-1.3665	-.7135
		FAKTOR B3	.0133	.14158	.927	-.3131	.3398
	FAKTOR B2	FAKTOR B0	.7133*	.14158	.001	.3869	1.0398
		FAKTOR B1	1.0400*	.14158	.000	.7135	1.3665
		FAKTOR B3	1.0533*	.14158	.000	.7269	1.3798
FAKTOR B3	FAKTOR B0	-.3400*	.14158	.043	-.6665	-.0135	
	FAKTOR B1	-.0133	.14158	.927	-.3398	.3131	
	FAKTOR B2	-1.0533*	.14158	.000	-1.3798	-.7269	
Based on observed means.							
The error term is Mean Square(Error) = .030.							
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.							


Lampiran 5.4 Tabel Uji Tukey dan Duncan

DIMETER KOLONI ASPERGILLUS NIGER				
	FAKTOR B	N	Subset	
			1	2
TukeyHSD ^{a,b}	FAKTOR B3	3	.1467	
	FAKTOR B1	3	.1600	
	FAKTOR B0	3	.4867	
	FAKTOR B2	3		1.2000
	Sig.		.154	1.000
Duncan ^{a,b}	FAKTOR B3	3	.1467	
	FAKTOR B1	3	.1600	
	FAKTOR B0	3	.4867	
	FAKTOR B2	3		1.2000
	Sig.		.050	1.000
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = .030.				
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.				
b. Alpha = 0.05.				

Lampiran 5

Pertumbuhan *Aspergillus niger* pada tepung beras

Hari ke 2



Hari ke 4



2 gr



4 gr



6 gr

Hari ke- 5



2 gr

4 gr




6 gr

Hari ke- 6



2, 4 dan 6 gr

Hari ke- 7



2, 4 dan 6 gr

Pertumbuhan *Aspergillus niger* pada tepung jagung

Hari ke-2



2 gr



4 gr



6 gr

Hari ke-4



2 gr



4 gr



6 gr

Hari ke-5



2 gr




4 gr



6 gr

Hari ke-6



2,4 dan 6 gr


Hari ke-7



2, 4 dan 6 gr

Pertumbuhan *Aspergillus niger* pada penambahan tepung singkong

Hari ke-2



2 gr

4 gr



6 gr

Hari ke-4



2gr



4 gr




6 gr

Hari ke-5



2 gr



4 gr




6 gr

Hari ke-6



2, 4 dan 6 gr

Hari ke-7



2, 4 dan 6 gr


Kontrol hari ke-2




Hari ke-4




Hari ke-5



Gambar perhitungan spora dengan menggunakan haemocytometer dengan perbesaran 40 x 10




Spora *Aspergillus niger* pada mikroskop trynokuler



Lampiran 6

Proses Pembuatan media PDA (*Potato Dextrose Agar*)



Merebus kentang sampai menghasilkan sari



Bacto agar 15 gr dan dextrose 20 gr



Menghomogenkan rebusan kentang dengan dextrose dan Bacto agar



Menimbang tepung beras, jagung dan singkong masing-masing 2,4 dan 6 g



Tepung beras, jagung dan singkong yang telah ditimbang




Proses penyiapan alat dan bahan yang digunakan




Menuang PDA ke cawan petri




Mencampur dan menghomogenkan tepung dengan PDA



PDA yang telah dicampur degan tepung beras, jagung dan sinkong



Proses inokulasi *Aspergillus niger* ke media PDA yang telah dicampur tepung

Lampiran 7 Skema Alur Penelitian

RIWAYAT HIDUP



Irma (22 Tahun) lahir di Kabupaten Pinrang Kecamatan Duampanua Desa Paria pada tanggal 7 Juli 1993. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan ayahanda tercinta Baharuddin dan Almarhum ibunda tersayang Hj. Zaenab. Penulis memiliki 3 orang saudara (adik) laki-laki bernama Nasrul, Nasbar dan Nasran.

Riwayat Pendidikan penulis adalah sebagai berikut.

1. SDN 36 Paria (1999-2005)
2. SMP Negeri 1 Duampanua (2005-2008)
3. SMA Negeri 1 Duampanua (2008-2011)
4. Pada tahun 2011 penulis resmi terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga sekarang.

Selama kuliah penulis aktif sebagai asisten laboratorium pada praktikum Taksonomi Tumbuhan Rendah dan Fisiologi Tumbuhan. Selain itu penulis juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi (HMJ) sebagai anggota pada kepengurusan tahun 2012-2013 dan sebagai coordinator minat dan bakat pada kepengurusan tahun 2013-2014 serta aktif sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa eSA (Bidang Kesenian) pada tahun 2013-2014. Di samping itu, penulis juga menjadi bendahara umum di organisasi daerah Kerukunan Mahasiswa Pinrang (KMP).