

Irwan, S.Si., M.Si.
Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.

STATISTIKA MULTIVARIAT



STATISTIKA MULTIVARIAT



Irwan, S.Si., M.Si.

Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.



Alauddin University Press
2021

STATISTIKA MULTIVARIAT

©Penulis

Penulis:

Irwan, S.Si., M.Si.

Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.

Editor:

Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si.

Penata Letak & Desain Sampul:

AU Press Team

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia

oleh Penerbit **Alauddin University**

Press November 2021 viii + 157 hlm;

15.5 x 23 cm

ISBN 978-602-328-456-6

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Perpustakaan Nasional;
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Alauddin University Press

Jl. H. M. Yasin Limpo

No. 36, Kab. Gowa,

Sulawesi Selatan

SAMBUTAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR



Alhamdulillah wa Syukurulillah atas segala rahmat Allah SWT beserta salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad SAW, mengiringi aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya sehari-hari.

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan gagasan yang harus selalu diupdate dan diupgrade. Buku adalah salah satu produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-tingginya. Karena dibalik proses lahirnya, ada kerja keras yang menguras waktu, tenaga dan pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan universitas bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan dan transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku terbitan Alauddin University Press ini, diharapkan menjadi sumbangan

berharga bagi desiminasi ilmu pengetahuan di lingkungan kampus peradaban, sekaligus semakin memperkaya bahan bacaan bagi penguatan integrasi keilmuan.

Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan masukan dari para pembaca untuk para penulis akan sangat dinantikan. Karena dengan itu, iklim akademik kampus akan dinamis dengan tradisi diskursif yang hidup.

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program Penerbitan 100 buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2021 ini. Semoga membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan masyarakat secara umum.

Gowa, 17 Agustus 2021

Rektor

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.

PENGANTAR PENULIS



Alhamdulillah, segala puji hanya untuk, dari-Nya segala ilmu dan pengetahuan bersumber, maka kepadanya patut kita bersyukur terhadap nikmat besar yang telah diberikan kepada makhluk-Nya dari jenis manusia berupa akal. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu Wata'ala dari kejelakan yang berasal dari diri kami, dan buruknya amalan. Aku memohon perlindungan kepada Allah 'Azza Wa Jalla, agar terhindar dari mengerjakan amalan-amalan buruk. Dan aku memohon kepada Allah Jalla Wa 'ala untuk dikokoh dalam aqidah islam yang lurus dan juga dikokoh dalam ilmu yang bermanfaat.

Buku disusun dimaksudkan untuk memudahkan mahasiswa dalam referensi tambahan terkait analisis Multivariat. Pembahasan dalam buku ini memadukan antara penurunan rumus-rumus statistika multivariate secara matematika dan penggunaan contoh kasus serta pemanfaatan aplikasi computer menggunakan R programming dalam menyelesaikan setiap kasus yang disajikan.

Penulis

Adnan Sauddin

DAFTAR ISI



SAMBUTAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR	III
PENGANTAR PENULIS	V
DAFTAR ISI	VII
BAB I KONSEP DASAR ANALISIS MULTIVARIAT	1
1. Data Multivariat	1
2. Rata-Rata dan Variansi variabel Acak Univariat	3
3. Kovariansi dan Korelasi Variabel Acak Bivariate.....	4
4. Teknik Grafik.....	8
BAB II GEOMETRI SAMPEL DAN SAMPEL ACAK.....	11
1. Geometri Sample	11
2. Sampel Acak, Nilai Ekspektasi Rata-Rata Sampel dan Matriks Kovarians.	15
3. Rata-Rata Sampel, Kovariansi, dan Korelasi Dalam Operasi Matriks.....	20
4. Nilai Sampel dari Kombinasi Linear Variabel	24
Latihan Soal.....	27
BAB III DISTRIBUSI NORMAL MULTIVARIAT	29
1. Fungsi Padat Normal Multivariat	29
2. Properti Variabel Acak Multivariat Normal.....	35

3.	Distribusi Sampel Multivariate Normal	39
4.	Menilai Asumsi Normalitas Multivariat	44
5.	Mendeteksi Data Pencilan dan Cleaning Data	52
6.	Transformasi Normalitas.....	53
	Latihan Soal.....	54
BAB IV	INFERENSI VEKTOR RATA-RATA	57
1.	Uji μ Saat Σ Diketahui.....	57
2.	Uji μ saat Σ tidak Diketahui.....	60
3.	Hotelling- T^2 dan Uji Likelihood Ratio.....	67
4.	Daerah Kepercayaan dan Perbandingan Simultan Komponen Rata-Rata	69
5.	Inferensi Sample Besar Seputar Vektor Rata-Rata Populasi.	77
6.	Inferensi Seputar Vektor Rata-Rata Untuk Data Missing.....	78
	Latihan Soal.....	82
BAB V	MEMBANDINGKAN BEBERAPA RATA-RATA MULTIVARIAT.....	84
1.	Perbandingan Berpasangan dan Rancangan Pengukuran Berulang.....	84
2.	Membandingkan Vektor Rata-Rata Dua Populasi.....	98
3.	Membandingkan Beberapa Rata-Rata Populasi Multivariat (Manova-Satu Arah).....	109
4.	Interval Kepercayaan Simultan untuk Efek Perlakuan	128
5.	Uji Kesamaan Matriks Kovariansi	131
6.	Multivariat Analisis Variansi Dua-Arah	134
	Latihan Soal.....	147
	DAFTAR PUSTAKA	152
	INDEKS	154
	TENTANG PENULIS	154

BAB I

KONSEP DASAR ANALISIS MULTIVARIAT



1. Data Multivariat

Data multivariate merupakan data hasil pengamatan terhadap $p \geq 1$ variabel sebanyak n kali. Nilai hasil pengamatan dari setiap variabel disebut item atau unit eksperimen. Untuk menjelaskan struktur data multivariat, digunakan symbol x_{ij} yang menyatakan pengamatan ke- i dari variabel ke- j , ditulis:

x_{ij} = Nilai variabel ke- j pada pengamatan ke- i

Hasilnya, untuk n pengamatan dari p variabel dapat disusun dalam bentuk:

	Var 1	Var 2	...	Var j	...	Var p
Item 1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1j}	...	x_{1p}
Item 2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2j}	...	x_{2p}
:	:	:	:	:	...	:
Item i	x_{i1}	x_{i2}	...	x_{ij}	...	x_{ip}
:	:	:	:	:	...	:
Item n	x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nj}	...	x_{np}

Dimana susunan tersebut dapat disederhanakan dalam bentuk array, yang disebut matriks \mathbf{x} berukuran $n \times p$, lihat persamaan (0.1).

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1j} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2j} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{i1} & x_{i2} & \cdots & x_{ij} & \cdots & x_{ip} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nj} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix} \quad (0.1)$$

Array \mathbf{x} memuat semua data hasil pengamatan dari semua variabel. Perhatikan matriks yang ditampilkan pada persamaan (0.1), bahwa:

- Jika kita pandang dari barisnya, maka $\mathbf{x}_i = x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip}$
- Jika kita pandang dari kolomnya, maka $\mathbf{x}_j = x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{nj}$

■ Contoh 1.1.

Pemilihan empat buah nota dari suatu toko dilakukan dalam rangka untuk meneliti penjualan barang tertentu dari toko tersebut. Setiap nota yang disediakan, jumlah barang tertentu tersebut yang terjual dan tujuan dari setiap penjualan. Misalkan variabel pertama adalah total penjualan (dalam Rupiah) dan variabel kedua adalah jumlah barang tertentu yang terjual. Total empat pengamatan dilakukan.

Datanya dapat disusun sebagai berikut:

Variabel 1 (jumlah penjualan-dalam rupiah) : 42 52 48 58

Variabel 2 (Jumlah buku terjual) : 4 5 5 3

Dengan menggunakan notasi yang telah diperkenalkan sebelumnya, maka data tersebut susunannya dalam

$$\begin{array}{cccc} x_{11} = 42 & x_{21} = 52 & x_{31} = 48 & x_{41} = 58 \\ x_{12} = 4 & x_{22} = 5 & x_{32} = 5 & x_{42} = 3 \end{array}$$

Bentuk array \mathbf{x} adalah

2. Rata-Rata dan Variansi variabel Acak Univariat

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 42 & 4 \\ 52 & 5 \\ 48 & 4 \\ 58 & 3 \end{bmatrix}$$

Untuk memudahkan pemahaman terhadap statistika multivariate, berikut akan diberikan uraian yang berkaitan dengan matriks data \mathbf{X} dari sudut pandang statistika univariat.

Pandang elemen-elemen $x_{11}, x_{21}, \dots, x_{n1}$ dari matriks pengamatan \mathbf{x} pada persamaan (0.1), merupakan hasil pengamatan sebanyak n kali dari variabel pertama. Dari data tersebut kita dapat menghitung beberapa nilai statistik berikut:

Rata-Rata Sampel

Rumus umum untuk menghitung rata-rata setiap p variabel dengan n pengamatan adalah jumlah seluruh pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan yang telah dilakukan, ditulis

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij} \quad ; j = 1, 2, \dots, p \quad (0.2)$$

Variansi Sampel

Variansi sampel yang terkait dengan n pengamatan untuk variabel pertama adalah keadaan setiap data terhadap rata-rata dan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$s_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{i1} - \bar{x}_1)^2$$

Dimana \bar{x}_1 merupakan rata-rata sampel dari x_{i1} . Dengan demikian, secara umum variansi untuk p variabel dapat dihitung dengan rumus:

$$s_j^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2 \quad ; j = 1, 2, \dots, p \quad (0.3)$$

Untuk diketahui,

Pertama, kebanyakan penulis mendefinisikan variansi dengan pembagin $n - 1$.

Kedua, notasi s^2 merupakan symbol dari variansi sampel yang dikenal. Untuk hal tersebut data multivariate yang disusun dalam bentuk matriks, bahwa diagonalnya, s_{jj} ,

$$s_j^2 = s_{jj} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(x_{ij} - \bar{x}_j \right)^2 \quad ; j = 1, 2, \dots, p \quad (0.4)$$

Kuadrat dari variansi kita peroleh standar deviasi, yaitu:

$$s_j = \sqrt{s_{jj}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(x_{ij} - \bar{x}_j \right)^2} \quad ; j = 1, 2, \dots, p \quad (0.5)$$

3. Kovariansi dan Korelasi Variabel Acak Bivariate

Kovariansi Sampel

Perhatikan n pasangan pengamatan dari variabel 1 dan 2 berikut

$$\begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_{21} \\ x_{22} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} x_{n1} \\ x_{n2} \end{bmatrix}$$

x_{i1} dan x_{i2} adalah pasangan pengamatan unit pengamatan ke- i ($i = 1, 2, \dots, n$) dari pasangan variabel 1 dan variabel 2. Ukuran yang berkaitan antara variabel 2 dan variabel 1 secara linear menghasilkan kovariansi sampel

$$s_{12} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{i1} - \bar{x}_1)(x_{i2} - \bar{x}_2)$$

Bentuk umum dari kovariansi sampel adalah

$$s_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_i)(x_{ij} - \bar{x}_j) \quad (0.6)$$

Beberapa kondisi dari nilai-nilai variabel untuk kovariansi sampel,

1. Jika nilai pengamatan dari suatu variabel merupakan nilai yang besar dan berkaitan dengan variabel lain dengan nilai yang besar pula, maka nilai kovariansi antara kedua variabel tersebut positif. Demikian halnya jika kedua variabel yang saling berkaitan memiliki nilai yang kecil secara bersama-sama, maka s_{12} hasilnya adalah positif atau nilai kovariansinya adalah positif.
2. Jika nilai dari salah satu variabel yang saling berkaitan memiliki nilai-nilai pengamatan yang besar dan variabel yang lainnya memiliki nilai pengamatan yang kecil, maka nilai dari s_{12} hasilnya adalah negatif atau nilai kovariansinya adalah negatif.
3. Jika tidak ada kaitannya antara nilai bagi kedua variabel, s_{12} , diperkirakan nilainya akan nol atau nilai korelasinya diperkirakan bernilai nol.

Korelasi Sampel

Ukuran yang menjelaskan keterkaitan secara linear antara dua variabel tidak bergantung pada unit pengukuran. Rumusnya dituliskan sebagai berikut:

$$r_{ij} = \frac{s_{ij}}{\sqrt{s_{ii}}\sqrt{s_{jj}}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_i)(x_{ij} - \bar{x}_j)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_i)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}} \quad (0.7)$$

Statistik deskriptif yang telah dijelaskan pada bagian di atas, jika kesemuanya dihitung dari pengamatan yang dilakukan sebanyak n kali pada variabel yang berjumlah p dapat disusun dalam bentuk array.

Perhatikan matrik pengamatan pada persamaan (0.1) dapat disusun ulang dalam bentuk vektor dari variabel p sebagai berikut

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1j} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2j} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{i1} & x_{i2} & \cdots & x_{ij} & \cdots & x_{ip} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nj} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}'_1 \\ \mathbf{x}'_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}'_j \\ \vdots \\ \mathbf{x}'_p \end{bmatrix} \text{ atau } \begin{bmatrix} \mathbf{y}'_1 \\ \mathbf{y}'_2 \\ \vdots \\ \mathbf{y}'_j \\ \vdots \\ \mathbf{y}'_p \end{bmatrix} \quad (0.8)$$

Sehingga nilai statistik deskriptifnya dapat dituliskan sebagai berikut

1. Rata-rata sampel

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{x}}'_1 \\ \bar{\mathbf{x}}'_2 \\ \vdots \\ \bar{\mathbf{x}}'_j \\ \vdots \\ \bar{\mathbf{x}}'_p \end{bmatrix} \quad (0.9)$$

2. Variansi – Kovariansi sampel

$$\mathbf{S}_n = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1p} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{p1} & s_{p2} & \cdots & s_{pp} \end{bmatrix} \quad (0.10)$$

3. Korelasi Sampel

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & r_{12} & \cdots & r_{1p} \\ r_{21} & 1 & \cdots & r_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{p1} & r_{p2} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (0.11)$$

Untuk korelasi sampel, r , memenuhi keadaan berikut:

1. Nilai r berkisar antara 1 dan -1

2. r merupakan ukuran yang menyatakan kekuatan asosiasi linear, maka;
 - a) Jika $r = 0$, hal ini menyatakan tidak ada hubungan antara setiap komponen
 - b) Jika $r < 1$, hubungan negative
 - c) Jika $r > 1$, hubungan positif
3. r_{ij} tidak mengalami perubahan jika pengukuran dari variabel ke- i diubah ke $y_{ij} = ax_{ij} + b$, dan nilai dari variabel ke- j diubah ke $y_{ij} = cx_{ij} + d$, dimana tanda dari a, c bertanda sama.

■ Contoh 1.2

Perhatikan data yang diberikan pada contoh 1.1, setiap invoice menghasilkan empat pasangan, total penjualan (dalam rupiah), dan jumlah buku terjual. Tentukan array dari \bar{x}, s, R .

■ Solusi 1.2.

Karena ada empat invoice, maka terdapat empat pengamatan (pengukuran) pada setiap variabel. Dengan demikian

Rata-rata sampelnya adalah

$$\begin{aligned}\bar{x}_1 &= \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_{i1} = \frac{1}{4} (42 + 52 + 48 + 58) = 50 \\ \bar{x}_2 &= \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_{i2} = \frac{1}{4} (4 + 5 + 4 + 3) = 4 \\ \bar{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 4 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Variansi dan kovariansi sampelnya adalah

$$\begin{aligned}s_{11} &= \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_{i1} - \bar{x}_1)^2 \\ &= \frac{1}{4} \left[(42-50)^2 + (52-50)^2 + (48-50)^2 + (58-50)^2 \right] = 34\end{aligned}$$

$$s_{22} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_{i2} - \bar{x}_2)^2$$

$$= \frac{1}{4} \left[(4-4)^2 + (5-4)^2 + (4-4)^2 + (3-4)^2 \right] = 0.5$$

$$s_{12} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_{i1} - \bar{x}_1) (x_{i2} - \bar{x}_2)$$

$$= \frac{1}{4} \left[(42-50)(4-4) + (52-50)(5-4) + (48-50)(4-4) + (58-50)(3-4) \right] = -1.5$$

$$S_{12} = S_{21}$$

dan

$$s = \begin{bmatrix} 34 & -1.5 \\ -1.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Korelasi sampelnya adalah

$$r_{12} = \frac{s_{12}}{\sqrt{s_{11}}\sqrt{s_{22}}} = \frac{-1.5}{\sqrt{34}\sqrt{0.5}}$$

$$r_{12} = r_{21}$$

atau

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & -0.36 \\ -0.36 & 1 \end{bmatrix}$$

■

4. Teknik Grafik


Memetakan data hasil pengamatan pada koordinat kartesis 2-D diistilahkan dengan kata "Plot". Plot dari suatu pengamatan merupakan hal yang penting sebagai analisis permulaan yang sebaiknya dilakukan untuk melihat pola penyebaran dari sekumpulan data hasil pengamatan pada sejumlah variabel, namun metode tersebut banyak dilupakan. Meskipun tidak mungkin untuk

menggambarkan keseluruhan dari semua pengukuran yang dilakukan terhadap variabel, plot untuk individual variabel dan variabel berpasangan masih sangat berguna dan dapat memberikan banyak informasi.

Untuk melihat pola asosiasi dari sekumpulan data dari hasil pengukuran merupakan cara yang sangat bagus. Perhatikan pasangan hasil pengukuran dari dua variabel berikut:

Variabel x_1	3	4	2	6	8	2	5
Variabel x_2	5	5.5	4	7	10	5	7.5

Data tersebut dapat diplot dalam dua dimensi (setiap sumbu mewakili variabel). Plot yang dihasilkan dalam dua dimensi dikenal dengan diagram pencar atau scatter plot.



Gambar 1. Scatter plot variable x_1 dan x_2

BAB II

GEOMETRI SAMPEL DAN SAMPEL ACAK



1. Geometri Sample

Suatu pengamatan multivariate adalah kumpulan hasil pengamatan pada p variabel yang berbeda yang diambil pada item yang sama. Sebagaimana yang ditampilkan pada bab 1, jika n pengamatan telah dilakukan, maka seluruh data yang diperoleh dapat disusun dalam bentuk matriks berukuran $n \times p$ sebagai berikut:

$$\mathbf{X}_{(n \times p)} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix} \quad (0.12)$$

Setiap baris dari matriks \mathbf{x} menggambarkan pengamatan multivariate (multi variabel). Karena keseluruhan pengukuran kebanyakannya merupakan realitas dari sesuatu, maka hasil pengamatan tersebut dinyatakan sebagai data sampel berukuran n dari suatu “populasi” p – variasi (p variabel).

Terdapat dua cara memandang susunan data matriks \mathbf{x} , **Pertama**; dengan memandang baris-baris dari matriks \mathbf{x} yang merupakan representasi dari n titik dalam ruang dimensi- p , dituliskan sebagai berikut

$$\mathbf{X}_{(n \times p)} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}'_1 \\ \mathbf{x}'_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}'_n \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{Pengamatan } (ke - 1) \\ \\ \\ \leftarrow \text{Pengamatan } (ke - n) \end{array} \quad (0.13)$$

Vektor baris \mathbf{x}'_i merepresentasikan pengamatan ke- i , yang memuat koordinat dari titik pengamatan, memuat titik-titik koordinat.

■ Contoh 3.1 (Menghitung Rata-rata Vektor)

Menghitung vektor rata-rata $\bar{\mathbf{x}}$ dari matriks data


$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Plot data $n = 3$ dalam ruang dimensi- $p = 2$, dan tempatkan $\bar{\mathbf{x}}$ pada diagram tersebut.

Titik pertama, \mathbf{x}_1 , mempunyai koordinat $\mathbf{x}'_1 = [4, 1]$, dengan cara yang sama untuk kedua titik-titik yang lain, yaitu $\mathbf{x}'_2 = [-1, 3]$ dan $\mathbf{x}'_3 = [3, 5]$. Hasilnya

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{4 - 1 + 3}{3} \\ \frac{1 + 3 + 5}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

■



Gambar 2. Plot data matriks \mathbf{X} untuk $n = 3$ pada $p = 2$

Kedua, dengan memandang data sebagai vektor- p dalam ruang dimensi- n , yaitu dengan mengambil elemen-elemen kolom dari matriks data menjadi vektor koordinat. Misalkan

$$\underset{(n \times p)}{\mathbf{X}} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{21} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix} = [\mathbf{y}_1 | \mathbf{y}_2 | \cdots | \mathbf{y}_p] \quad (0.14)$$

Koordinat dari titik pertama $\mathbf{y}'_1 = [x_{11}, x_{21}, \dots, x_{n1}]$ merupakan n pengukuran pada variabel pertama. Secara umum titik ke- i , $\mathbf{y}'_i = [x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ni}]$ ditentukan dengan n -pasangan dari semua pengukuran pada variabel ke- i . Secara geometri, menggambarkan $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_p$ sebagai vektor lebih sesuai dari pada titik, seperti diagram pencar dalam dimensi- p


■ **Contoh 3.2 (Menampilkan data sebagai vektor p dalam dimensi n)**

Plot data berikut sebagai vektor $p = 2$ dalam ruang $n = 3$:

Perhatikan matriks \mathbf{x} berikut

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Dari data tersebut, $\mathbf{y}'_1 = [4, -1, 3]$ dan $\mathbf{y}'_2 = [1, 3, 5]$, gambar vektor dari keduanya ditampilkan dalam gambar berikut



Gambar 3. Plot data matriks \mathbf{X} untuk $n = 3$ pada $p = 2$

Hal yang tidak begitu menguntungkan dalam menampilkan matriks data secara geometri adalah keterbatasan dimensi yang dapat ditampilkan, yaitu terbatas pada tiga dimensi. Sementara itu, pada kenyataannya hampir semua pengamatan dari kejadian real selalu mengikutkan lebih dari 3 variabel atau $n > 3$.

Selanjutnya, bahwa memungkinkan bagi kita untuk memberikan interpretasi secara geometri dari proses mendapatkan rata-rata sampel. Hal tersebut dapat dilakukan dengan:

- Definisikan terlebih dahulu vektor $\mathbf{1}'_n = [1, 1, \dots, 1]$ berukuran $n \times 1$. Dimana Vektor $\mathbf{1}$ tersebut membentuk sudut yang sama terhadap setiap dari n sumbu koordinat,
- Perkalikan vektor $\mathbf{1}$ tersebut dengan $1/\sqrt{n}$, yaitu $(1/\sqrt{n})\mathbf{1}$.
- Karena vektor $\mathbf{1}$ membentuk sudut yang sama terhadap setiap dari n sumbu koordinat, sehingga vektor $(1/\sqrt{n})\mathbf{1}$ mempunyai panjang sama dengan 1 dalam arah sudut yang sama.

Perhatikan vektor $\mathbf{y}'_i = [x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ni}]$, proyeksi \mathbf{y}'_i pada vektor unit $(1 / \sqrt{n})\mathbf{1}$ adalah

$$\mathbf{y}'_i \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \mathbf{1} \right) \frac{1}{\sqrt{n}} \mathbf{1} = \frac{x_{1i} + x_{2i} + \dots + x_{ni}}{n} = \bar{x}_i \mathbf{1} \quad (0.15)$$

Merupakan rata-rata sampel

$$\bar{x}_i = \frac{x_{1i} + x_{2i} + \dots + x_{ni}}{n} = \left(\frac{1}{n} \right) \mathbf{y}'_i \mathbf{1}$$

Berkaitan dengan perkalian vektor $\mathbf{1}$ diperlukan untuk memberikan proyeksi dari \mathbf{y}'_i pada garis ditentukan oleh vektor $\mathbf{1}$.

2. Sampel Acak, Nilai Ekspektasi Rata-Rata Sampel dan Matriks Kovarians.

Dalam rangka mempelajari variabilitas statistik seperti \bar{x} dan S_n dengan tujuan membuat inferensi, kita perlu memuat asumsi seputar variabel teramati yang nilainya disusun dalam bentuk matriks \mathbf{x} .

Sebelum data dikumpulkan tak satupun nilai yang kita ketahui tentang suatu keadaan. Andaikan kita merencanakan akan melakukan pengamatan terhadap p variabel sebanyak n pengamatan, sebelumn melakukan pengamatan atau pengukuran, tak satupun nilai statistic ataupun parameter yang kita ketahui, secara umum dalam masalah tersebut kita harus melakukan prediksi secara tepat. Akibatnya, data yang kita kumpulkan harus benar-benar diperoleh secara adil, biasanya kita kenal dengan dikumpulkan dengan cara acak atau random-yaitu-sehingga setiap variabel yang kita ukur atau diamati kita sebut dengan **Variabel Acak**.

Setiap kumpulan pengamatan atau pengukuran \mathbf{x}_j pada p variabel merupakan vektor acak, yaitu elemen ke- i, j dalam matriks data merupakan variabel acak X_{ij} , dituliskan sampel acak sebagai berikut

$$\mathbf{X}_{(n \times p)} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{21} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}'_1 \\ \mathbf{x}'_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}'_n \end{bmatrix} \quad (0.16)$$

Jika vektor baris $\mathbf{x}'_1, \mathbf{x}'_2, \dots, \mathbf{x}'_n$ pada persamaan (0.16) menggambarkan pengamatan independen dari distribusi gabungan umum dengan fungsi padat $f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_p)$, maka $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ disebut sampel acak dari $f(\mathbf{x})$. Secara matematika, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ merupakan sampel acak jika fungsi padat gabungannya diberikan oleh hasil kali $f(\mathbf{x}_1)f(\mathbf{x}_2)\cdots f(\mathbf{x}_n)$, dimana $f(\mathbf{x}_i) = f(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip})$ merupakan fungsi padat untuk vektor baris ke- j .

Ada dua hal penting yang berkaitan dengan dengan definisi variabel acak

1. Pengukuran p variabel dalam satu percobaan, seperti $\mathbf{x}'_i = [x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip}]$ biasanya akan saling berkorelasi. Dalam keadaan yang berbeda, pengukuran dari beberapa percobaan yang berbeda, akan independen
2. Sifat independen dari pengukuran dari pengukuran ke pengukuran mungkin tidak terpenuhi ketika variabel sama sepanjang waktu.

Teorema 3.1.

Misalkan $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ merupakan sampel acak dari suatu distribusi gabungan yang mempunyai vektor rata-rata $\boldsymbol{\mu}$ dan matriks kovariansi $\boldsymbol{\Sigma}$. Maka $\bar{\mathbf{x}}$ merupakan estimator tak bias dari $\boldsymbol{\mu}$, dan matriks kovariansinya adalah $\frac{1}{n}\boldsymbol{\Sigma}$

Yaitu,

$$1. \quad E(\bar{\mathbf{X}}) = \boldsymbol{\mu} \quad (0.17)$$

$$2. \quad \text{cov}(\bar{\mathbf{X}}) = \frac{1}{n} \Sigma \quad (0.18)$$

Untuk matriks kovariansi \mathbf{S}_n

$$E(\mathbf{S}_n) = \frac{(n-1)}{n} \Sigma = \Sigma - \frac{1}{n} \Sigma$$

selanjutnya

$$3. \quad E\left(\frac{n}{n-1} \mathbf{S}_n\right) = \Sigma \quad (0.19)$$

Sehingga $\left[\frac{n}{n-1}\right] \mathbf{S}_n$ merupakan estimator tak bias dari Σ , dengan

$$(\text{bias}) = E(\mathbf{S}_n) - \Sigma = -\left(\frac{1}{n}\right) \Sigma.$$

Bukti. Theorem 3.1

1. Ekspektasi parameter rata-rata.

Perhatikan bahwa,

- jika kita pandang matriks \mathbf{X} pada persamaan (0.12) sebagai kumpulan variabel dengan n pengamatan (pandang dari barisnya), maka $\bar{\mathbf{X}} = \frac{\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2 + \dots + \mathbf{X}_n}{n}$
- jika kita pandang matriks \mathbf{X} pada persamaan (0.12) sebagai kumpulan pengamatan dari p variabel (pandang dari kolom), maka $\bar{\mathbf{X}} = \frac{\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2 + \dots + \mathbf{X}_p}{p}$

Dimana kedua hal tersebut tidak akan memberikan hasil yang berbeda dari nilai rata-ratanya, yaitu jumlah total pengamatan dari p variabel yang diamati sebanyak n pengamatan pada setiap variabelnya adalah $n \times p$.

Dengan demikian bentuk berikut berlaku

$$\begin{aligned}
E(\bar{\mathbf{X}}) &= E\left(\frac{1}{n}\mathbf{x}_1 + \frac{1}{n}\mathbf{x}_2 + \cdots + \frac{1}{n}\mathbf{x}_n\right) \\
&= E\left(\frac{1}{n}\mathbf{x}_1\right) + E\left(\frac{1}{n}\mathbf{x}_2\right) + \cdots + E\left(\frac{1}{n}\mathbf{x}_n\right) \\
&= \frac{1}{n}E(\mathbf{x}_1) + \frac{1}{n}E(\mathbf{x}_2) + \cdots + \frac{1}{n}E(\mathbf{x}_n) \\
&= \frac{1}{n}\boldsymbol{\mu}_1 + \frac{1}{n}\boldsymbol{\mu}_2 + \cdots + \frac{1}{n}\boldsymbol{\mu}_n \\
&= \boldsymbol{\mu}
\end{aligned}$$

2. Estimasi parameter kovariansi,

$$\begin{aligned}
(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})' &= \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{j=1}^n(\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu})\right)' \\
&= \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu})'
\end{aligned}$$

Sehingga

$$\text{cov}(\bar{\mathbf{X}}) = E(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})' = \frac{1}{n^2}\left(\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n E(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'\right)$$

Untuk $i \neq j$, setiap elemen dalam $E(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'$ adalah sama dengan nol karena elemen-elemen tersebut merupakan kovariansi antara komponen \mathbf{x}_i dan komponen \mathbf{x}_j , dimana kedua adalah independen.

Oleh karena itu,

$$\text{cov}(\bar{\mathbf{X}}) = \frac{1}{n^2}\left(\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n E(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'\right)$$

Akibatnya $\Sigma = E(\mathbf{X}_i - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{X}_i - \boldsymbol{\mu})'$ merupakan matriks kovariansi populasi umum untuk setiap \mathbf{X}_i , diperoleh

$$\begin{aligned} \text{cov}(\bar{\mathbf{X}}) &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \left(E(\mathbf{X}_i - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{X}_i - \boldsymbol{\mu})' \right) \\ &= \frac{1}{n^2} (\Sigma + \Sigma + \dots + \Sigma) \\ &= \frac{1}{n^2} (n\Sigma) = \left(\frac{1}{n} \right) \Sigma \end{aligned}$$

3. Ekspektasi dari s_n ,

Untuk memperoleh nilai estimasi dari s_n , Pertama perhatikan bahwa $(x_{ij} - \bar{x}_i)(x_{ji} - \bar{x}_j)$ merupakan elemen ke- (i, j) dari $(\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{X}_j - \bar{\mathbf{x}})'$,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}})' &= \sum_{i=1}^n (\mathbf{X}_i \mathbf{X}_i' - \mathbf{X}_i \bar{\mathbf{X}}' - \bar{\mathbf{X}} \mathbf{X}_i' + \bar{\mathbf{X}} \bar{\mathbf{X}}') \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i \mathbf{X}_i' - \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i \bar{\mathbf{X}}' - \sum_{i=1}^n \bar{\mathbf{X}} \mathbf{X}_i' + \sum_{i=1}^n \bar{\mathbf{X}} \bar{\mathbf{X}}' \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i \mathbf{X}_i' - n \bar{\mathbf{X}} \bar{\mathbf{X}}' - n \bar{\mathbf{X}} \bar{\mathbf{X}}' + n \bar{\mathbf{X}} \bar{\mathbf{X}}' \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i \mathbf{X}_i' - 2n \bar{\mathbf{X}} \bar{\mathbf{X}}' + n \bar{\mathbf{X}} \bar{\mathbf{X}}' \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i \mathbf{X}_i' - n \bar{\mathbf{X}} \bar{\mathbf{X}}' \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut, nilai ekspektasinya adalah

$$E \left(\sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i \mathbf{X}_i' - n \bar{\mathbf{X}} \bar{\mathbf{X}}' \right) = \sum_{i=1}^n E(\mathbf{X}_i \mathbf{X}_i') - nE(\bar{\mathbf{X}} \bar{\mathbf{X}}')$$

Untuk sembarang vektor acak \mathbf{v} dengan $E(\mathbf{v}) = \boldsymbol{\mu}_v$ dan $\text{cov}(\mathbf{v}) = \boldsymbol{\Sigma}_v$, demikian halnya $E(\mathbf{v}\mathbf{v}') = \boldsymbol{\Sigma}_v + \boldsymbol{\mu}_v\boldsymbol{\mu}_v'$, akibatnya

$$E(\mathbf{X}_i\mathbf{X}_i') = \boldsymbol{\Sigma} + \boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\mu}'$$

dan

$$E(\bar{\mathbf{X}}\bar{\mathbf{X}}') = \frac{1}{n}\boldsymbol{\Sigma} + \boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\mu}'$$

Dengan $\sum_{i=1}^n E(\mathbf{X}_i\mathbf{X}_i') - nE(\bar{\mathbf{X}}\bar{\mathbf{X}}')$, diperoleh

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n E(\mathbf{X}_i\mathbf{X}_i') - nE(\bar{\mathbf{X}}\bar{\mathbf{X}}') &= n\boldsymbol{\Sigma} + \boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\mu}' - n\left(\frac{1}{n}\boldsymbol{\Sigma} + \boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\mu}'\right) \\ &= (n-1)\boldsymbol{\Sigma} \end{aligned}$$

Dan selanjutnya, karena $\mathbf{S}_n = (1/n)\left(\sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i\mathbf{X}_i' - n\bar{\mathbf{X}}\bar{\mathbf{X}}'\right)$, maka

$$\begin{aligned} E(\mathbf{S}_n) &= E\left((1/n)\left(\sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i\mathbf{X}_i' - n\bar{\mathbf{X}}\bar{\mathbf{X}}'\right)\right) \\ &= \frac{1}{n}E\left(\left(\sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i\mathbf{X}_i' - n\bar{\mathbf{X}}\bar{\mathbf{X}}'\right)\right) \\ &= \frac{1}{n}(n-1)\boldsymbol{\Sigma} \\ E(\mathbf{S}_n) &= \frac{(n-1)}{n}\boldsymbol{\Sigma} \end{aligned}$$

■

3. Rata-Rata Sampel, Kovariansi, dan Korelasi Dalam Operasi Matriks

Pada bagian sebelumnya kita telah dijelaskan bagaimana menampilkan data matriks \mathbf{x} dengan menggunakan grafik dan telah kita menghitung statistic deskriptif dari $\bar{\mathbf{x}}$ dan \mathbf{s} . Sebagai tambaha, dan hal ini lebih memudahkan dalam proses komputasi, yaitu kita

dapat menghitung berbagai nilai statistic, \bar{x} dan s secara langsung pada \mathbf{x} dengan menggunakan operasi matriks.

Perhatikan data matriks yang dijelaskan pada bab 1, dari data tersebut

kita punya $\bar{x}_i = \frac{x_{1i} \cdot 1 + x_{2i} \cdot 1 + \dots + x_{ni} \cdot 1}{n} = \frac{1}{n} \mathbf{y}'_i \mathbf{1}$, dengan demikian

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \vdots \\ \bar{x}_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{y}'_1 \mathbf{1}}{n} \\ \frac{\mathbf{y}'_2 \mathbf{1}}{n} \\ \vdots \\ \frac{\mathbf{y}'_p \mathbf{1}}{n} \end{bmatrix} = \frac{1}{n} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{p1} & x_{p2} & \vdots & x_{pn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

atau

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \mathbf{X}' \mathbf{1} \tag{0.20}$$

Yaitu, $\bar{\mathbf{x}}$ dihitung dari transpose data matriks dengan mengalikannya dengan vektor $\mathbf{1}$ dan mengalikan hasilnya dengan $1/n$.

Selanjutnya kita buat matriks rata-rata berukuran $n \times p$ dengan mentranspos persamaan (0.20) dan mengalikannya dengan vektor $\mathbf{1}$ dari sisi sebelah kiri; yaitu

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{x}} &= \frac{1}{n} \mathbf{X}' \mathbf{1} \\ \mathbf{1} \bar{\mathbf{x}}' &= \mathbf{1} \left(\frac{1}{n} \mathbf{X}' \mathbf{1} \right)' \\ &= \frac{1}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}' \mathbf{X} \end{aligned}$$

$$\mathbf{1}\bar{\mathbf{x}}' = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 & \bar{x}_2 & \cdots & \bar{x}_p \\ \bar{x}_1 & \bar{x}_2 & \cdots & \bar{x}_p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{x}_1 & \bar{x}_2 & \cdots & \bar{x}_p \end{bmatrix} \quad (0.21)$$

Lalu pengurangan persamaan (0.21) dari matriks data \mathbf{X} menghasilkan matriks simpangan (residual) berukuran $n \times p$

$$\mathbf{X} - \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}'\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{11} - \bar{x}_1 & x_{12} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{1p} - \bar{x}_p \\ x_{21} - \bar{x}_1 & x_{22} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{2p} - \bar{x}_p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} - \bar{x}_1 & x_{n2} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{np} - \bar{x}_p \end{bmatrix} \quad (0.22)$$

Sekarang, matriks $(n-1)\mathbf{S}$ merupakan jumlah kuadrat dari hasil kali transpose dari persamaan (0.22) dengan matriks dirinya sendiri, yaitu

$$\begin{aligned} (n-1)\mathbf{S} &= \begin{bmatrix} x_{11} - \bar{x}_1 & x_{12} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{1p} - \bar{x}_p \\ x_{21} - \bar{x}_1 & x_{22} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{2p} - \bar{x}_p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} - \bar{x}_1 & x_{n2} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{np} - \bar{x}_p \end{bmatrix} \\ &\quad \times \begin{bmatrix} x_{11} - \bar{x}_1 & x_{12} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{1p} - \bar{x}_p \\ x_{21} - \bar{x}_1 & x_{22} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{2p} - \bar{x}_p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} - \bar{x}_1 & x_{n2} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{np} - \bar{x}_p \end{bmatrix} \\ &= \left(\mathbf{X} - \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}'\mathbf{X} \right)' \left(\mathbf{X} - \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}'\mathbf{X} \right) \\ &= \left(\mathbf{X}'\mathbf{X} - \mathbf{X}'\frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}'\mathbf{X} - \frac{1}{n}\mathbf{X}'\mathbf{1}'\mathbf{1}\mathbf{X} - \frac{1}{n^2}\mathbf{X}'\mathbf{1}'\mathbf{1}\mathbf{1}'\mathbf{X} \right) \\ &= \mathbf{X}' \left(\mathbf{I} - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}' - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}' - \frac{1}{n^2}\mathbf{1}\mathbf{1}'\mathbf{1}\mathbf{1}' \right) \mathbf{X} \\ \mathbf{S} &= \frac{1}{(n-1)} \mathbf{X}' \left(\mathbf{I} - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}' \right) \mathbf{X} \end{aligned}$$

Setelah menghitung \mathbf{S} , dari hasil tersebut kita dapat menghitung secara langsung dari matriks korelasi sampel. \mathbf{R} .

Definisikan matriks standar deviasi sampel $\mathbf{D}^{\frac{1}{2}}$, lalu hitung inversnya,

$$\left(\mathbf{D}^{\frac{1}{2}}\right)^{-1} = \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}. \text{ Misalkan}$$

$$\mathbf{D}_{(p \times p)}^{\frac{1}{2}} = \begin{bmatrix} \sqrt{s_{11}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sqrt{s_{22}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sqrt{s_{pp}} \end{bmatrix} \quad (0.23)$$

Kemudian

$$\mathbf{D}_{(p \times p)}^{-\frac{1}{2}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{s_{11}}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{s_{22}}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{\sqrt{s_{pp}}} \end{bmatrix}$$

karena

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1p} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{p1} & s_{p2} & \cdots & s_{pp} \end{bmatrix}$$

Dan

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \frac{s_{11}}{\sqrt{s_{11}}\sqrt{s_{11}}} & \frac{s_{12}}{\sqrt{s_{11}}\sqrt{s_{22}}} & \cdots & \frac{s_{1p}}{s\sqrt{s_{pp}}} \\ \frac{\sigma_{21}}{\sqrt{s_{22}}\sqrt{s_{11}}} & \frac{\sigma_{22}}{\sqrt{s_{22}}\sqrt{s_{22}}} & \cdots & \frac{\sigma_{2p}}{\sqrt{s_{22}}\sqrt{s_{pp}}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{s_{p1}}{\sqrt{s_{pp}}\sqrt{s_{11}}} & \frac{s_{p2}}{\sqrt{s_{pp}}\sqrt{s_{22}}} & \cdots & \frac{s_{pp}}{\sqrt{s_{pp}}\sqrt{\sigma_{pp}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1p} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{p1} & r_{p2} & \cdots & r_{pp} \end{bmatrix}$$

Kita punya

$$\mathbf{R} = \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{S} \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \quad (0.24)$$

Kalikan kedua ruas dari persamaan (0.24) dengan $\mathbf{D}^{\frac{1}{2}}$, dan perhatikan bahwa $\mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{D}^{\frac{1}{2}} = \mathbf{D}^{\frac{1}{2}} \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} = \mathbf{I}$, sehingga

Dari persamaan (0.24), diperoleh

$$\mathbf{S} = \mathbf{D}^{\frac{1}{2}} \mathbf{R} \mathbf{D}^{\frac{1}{2}} \quad (0.25)$$

4. Nilai Sampel dari Kombinasi Linear Variabel

Kombinasi linear telah diperkenal pada bab 2. Dalam produser multivariabel, bentuk kombinasi linear umum kita tuliskan

$$\mathbf{c}'\mathbf{X} = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_px_p$$

Yang nilai pengamatannya pada percobaan ke i adalah

$$\mathbf{c}'\mathbf{x}_i = c_1x_{i1} + c_2x_{i2} + \dots + c_px_{ip}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (0.26)$$

Dari n pengamatan pada persamaan (0.26) kita dapat menghitung

Rata-rata sample

$$\mathbf{c}'\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \mathbf{c}'(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \dots + \mathbf{x}_n) \quad (0.27)$$

Karena $(\mathbf{c}'\mathbf{x}_i - \mathbf{c}'\bar{\mathbf{x}})^2 = (\mathbf{c}'(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}))^2 = \mathbf{c}'(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{c}$, maka kita dapat menghitung variansi sample

$$\begin{aligned} \text{var Sampel} &= \frac{(\mathbf{c}'\mathbf{x}_1 - \mathbf{c}'\bar{\mathbf{x}})^2 + (\mathbf{c}'\mathbf{x}_2 - \mathbf{c}'\bar{\mathbf{x}})^2 + \dots + (\mathbf{c}'\mathbf{x}_n - \mathbf{c}'\bar{\mathbf{x}})^2}{n-1} \\ &= \frac{\mathbf{c}'(\mathbf{x}_1 - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_1 - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{c} + \dots + \mathbf{c}'(\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{c}}{n-1} \\ &= \frac{\mathbf{c}' \left[(\mathbf{x}_1 - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_1 - \bar{\mathbf{x}})' + \dots + (\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}})' \right] \mathbf{c}}{n-1} \end{aligned}$$

Atau

a. Variansi sampel

$$\mathbf{c}'\mathbf{S}\mathbf{c} \quad (0.28)$$

Selanjutnya, perhatikan kombinasi linear kedua

$$\mathbf{b}'\mathbf{X} = b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_px_p$$

Yang nilai pengamatannya pada percobaan ke- j adalah

$$\mathbf{b}'\mathbf{x}_i = b_1x_{i1} + b_2x_{i2} + \cdots + b_px_{ip} \quad (0.29)$$

Dengan mengikuti persamaan (0.27) dan (0.28) bahwa rata-rata sampel dan variansi sampel dari hasil pengamatan adalah

$$\text{Rata-Rata Sampel dari } \mathbf{b}'\mathbf{X} = \mathbf{b}'\bar{\mathbf{x}}$$

$$\text{Variansi Sampel dari } \mathbf{b}'\mathbf{X} = \mathbf{b}'\mathbf{S}\mathbf{b}$$

Dari data hasil pengamatan tersebut juga dapat dihitung kovariansi, yaitu

$$\mathbf{b}'\mathbf{X} \text{ dan } \mathbf{c}'\mathbf{X} = \mathbf{b}'\mathbf{S}\mathbf{c} \quad (0.30)$$

Teorema 3.2.

Kombinasi linear

$$\mathbf{b}'\mathbf{X} = b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_px_p$$

$$\mathbf{c}'\mathbf{X} = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_px_p$$

Mempunyai rata-rata sampel, variansi sampel, dan kovariansi sampel yang berkaitan dengan $\bar{\mathbf{x}}$ dan \mathbf{s} secara berturut sebagai berikut

$$\mathbf{b}'\mathbf{X} = \mathbf{b}'\bar{\mathbf{x}}$$

$$\mathbf{c}'\mathbf{X} = \mathbf{c}'\bar{\mathbf{x}}$$

$$\mathbf{b}'\mathbf{X} = \mathbf{b}'\mathbf{S}\mathbf{b}$$

$$\mathbf{c}'\mathbf{X} = \mathbf{c}'\mathbf{S}\mathbf{c}$$

$$\mathbf{b}'\mathbf{X} \text{ dan } \mathbf{c}'\mathbf{X} = \mathbf{b}'\mathbf{S}\mathbf{c} \quad (0.31)$$

Contoh 3.2 (Rata-Rata dan Kovariansi untuk Kombinasi Linear)

Perhatikan dua kombinasi linear dan nilai yang diturunkan untuk jumlah pengamatan $n = 3$,

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 4 & 1 & 6 \\ 4 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Perhatikan dua kombinasi linear

$$\mathbf{b}'\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = 2X_1 + 2X_2 - X_3$$

Dan

$$\mathbf{c}'\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = 1X_1 - 1X_2 + 3X_3$$

Rata-rata, variansi dan kovariansi dapat dihitung secara langsung.

Pengamatan pada kedua kombinasi linear tersebut diperoleh dengan menggantikan X_1 , X_2 , dan X_3 dengan nilai-nilai pengamatannya.

Sebagai contoh, pengamatan $n = 3$ pada $\mathbf{b}'\mathbf{X}$ adalah

$$\begin{aligned} \mathbf{b}'\mathbf{x}_1 &= 2x_{11} + 2x_{12} - x_{13} = 2(1) + 2(2) - 1(5) = 1 \\ \mathbf{b}'\mathbf{x}_2 &= 2x_{11} + 2x_{12} - x_{13} = 2(4) + 2(1) - 1(6) = 4 \\ \mathbf{b}'\mathbf{x}_3 &= 2x_{11} + 2x_{12} - x_{13} = 2(4) + 2(0) - 1(4) = 4 \end{aligned}$$

Rata-rata sample, variansi secara dari kombinasi linear tersebut secara berturut-turut adalah

$$\begin{aligned} \mathbf{b}'\bar{\mathbf{x}} &= \frac{(1 + 4 + 4)}{3} = 3 \\ \mathbf{b}'\mathbf{x}\mathbf{b} &= \frac{(1 - 3)^2 + (4 - 3)^2 + (4 - 3)^2}{3 - 1} = 3 \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama, $n = 3$ pengamatan pada $\mathbf{c}'\mathbf{X}$ adalah

$$\begin{aligned} \mathbf{c}'\mathbf{x}_1 &= x_{11} - x_{12} + 3x_{13} = 1(1) - 1(2) + 3(5) = 14 \\ \mathbf{c}'\mathbf{x}_2 &= x_{11} - x_{12} + 3x_{13} = 1(4) - 1(1) + 3(6) = 21 \\ \mathbf{c}'\mathbf{x}_3 &= x_{11} - x_{12} + 3x_{13} = 1(4) - 1(0) + 3(4) = 16 \end{aligned}$$

Dan

$$\begin{aligned} \mathbf{b}'\bar{\mathbf{x}} &= \frac{(14 + 21 + 16)}{3} = 17 \\ \mathbf{b}'\mathbf{xb} &= \frac{(14 - 17)^2 + (21 - 17)^2 + (16 - 17)^2}{3 - 1} = 13 \end{aligned}$$

Dan kovariansi sampel adalah

$$= \frac{(1 - 3)(14 - 7) + (4 - 3)(21 - 17) + (4 - 3)(16 - 17)}{3 - 1} = \frac{9}{2}$$

■

Kombinasi linear dapat dituliskan dalam bentuk umum, yaitu

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 & a_{12}x_2 & \cdots & a_{1p}x_p \\ a_{21}x_1 & a_{22}x_2 & \cdots & a_{2p}x_p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{q1}x_1 & a_{q2}x_2 & \cdots & a_{qp}x_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{q1} & a_{q2} & \cdots & a_{qp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_p \end{bmatrix} = \mathbf{AX} \quad (0.32)$$

Teorem 3.3.

q kombinasi linear \mathbf{AX} dalam persamaan (0.32) mempunyai vektor rata-rata $\mathbf{A}\bar{\mathbf{x}}$ dan matriks kovariansi sampel, $\mathbf{A}\mathbf{S}\mathbf{A}'$.

Latihan Soal

1. Diberikan matriks

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 5 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Gambar diagram pencar dalam dimensi-2. Tempatkan rata-rata sampel pada diagram pencar

Gambarkan data dalam dimensi-3, dan plot vektor deviasi

$$y_1 - \bar{x}_1 \mathbf{1} \text{ dan } y_2 - \bar{x}_2 \mathbf{1}$$

BAB III

DISTRIBUSI NORMAL MULTIVARIAT



1. Fungsi Padat Normal Multivariat


Kebanyakan uji univariat dan interval kepercayaan didasarkan pada distribusi normal univariat. Dengan cara yang sama, mayoritas prosedur multivariate mempunyai distribusi normal multivariate. Untuk memudahkan pemahaman konsep-konsep fungsi padat peluang multivariate, pembahasan dilakukan dari pendekatan univariat.

Padat Normal Univariat

Fungsi padat normal multivariate merupakan bentuk umum dari padat normal univariat untuk dimensi $p \geq 2$. perhatikan fungsi padat peluang normal untuk univariat berikut:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}; \quad -\infty < x < \infty \quad (0.33)$$

Jika x mempunyai fungsi sebagaimana yang ditampilkan pada persamaan (0.33), maka hal tersebut dikatakan bahwa x berdistribusi normal dan dinyatakan dengan $N(\mu, \sigma)$. Jika fungsi ini dibuat grafiknya, maka akan membentuk grafik seperti lonceng (Lihat Gambar 1) yang memperlihatkan luasan area dibawah kurva dalam standar deviasi ± 3 dari rata-rata. Luasan area tersebut merepresentasikan peluang untuk variabel acak X normal, yaitu:



Gambar 1. Kurva Distribusi Normal Baku

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) = 0.68$$

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) = 0.95$$

Aturan penulisan untuk fungsi padat peluang dari variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata μ dan standar deviasi, σ , adalah

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

Dengan demikian, jika dituliskan $X \sim N(10, 4)$ berarti, $\mu = 10$ dan $\sigma = 2$

Padat Normal Multivariat

Perhatikan model eksponen

$$\left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 = (x - \mu)(\sigma^2)^{-1}(x - \mu) \quad (0.34)$$

Pada persamaan (0.33) merupakan kuadrat jarak dari x terhadap μ dalam unit standar deviasi.

Model pada persamaan (0.34) dapat dituliskan dalam bentuk yang lebih umum untuk vektor pengamatan berukuran $p \times 1$ untuk beberapa variabel, yaitu

$$(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \quad (0.35)$$

Dimana, vektor $\boldsymbol{\mu}$ berukuran $p \times 1$ merupakan nilai ekspektasi dari variabel acak \mathbf{x} , dan matriks $\boldsymbol{\Sigma}$ merupakan matriks variansi-kovariansi dari variabel acak \mathbf{X} . Jika diberikan matriks pengamatan

$\mathbf{X} = [X_1, X_1, \dots, X_p]$, maka fungsi pada persamaan (0.33) dapat dituliskan kembali dengan menggunakan vektor rata-rata dan matriks variansi-kovariansi, sebagai berikut:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2}} |\Sigma|^{1/2} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})'} \quad (0.36)$$

Dimana $-\infty < x_i < \infty, i = 1, 2, \dots, p$ dan dinyatakan sebagai fungsi pada peluang berdimensi p ditulis

$$\mathbf{X} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$$

■ Contoh 4.1

Misalkan kita akan menghitung fungsi padat normal dengan $p = 2$ dengan parameternya $\mu_1 = E(X_1)$, $\mu_2 = E(X_2)$, $\sigma_{11} = \text{Var}(X_1)$, $\sigma_{22} = \text{Var}(X_2)$, dan

$$\rho_{12} = \frac{\sigma_{12}}{\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}}} = \text{Kov}(X_1, X_2)$$

■ Solusi 4.1

Berdasarkan teorema..., dari soal kita peroleh matriks kovariansi

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{bmatrix}$$

dengan

$$\Sigma^{-1} = \frac{1}{\sigma_{11}\sigma_{22} - \sigma_{12}^2} \begin{bmatrix} \sigma_{22} & -\sigma_{12} \\ -\sigma_{12} & \sigma_{11} \end{bmatrix}$$

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, koefisien korelasi ρ_{12} dapat dihitung dengan

$$\sigma_{12} = \rho_{12}\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}}$$

Diperoleh $\sigma_{11}\sigma_{22} - \sigma_{12}^2 = \sigma_{11}\sigma_{22}(1 - \rho_{12}^2)$ dan jarak kuadrat menjadi

$$\begin{aligned} & (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \\ &= [x_1 - \mu_1, x_2 - \mu_2] \frac{1}{\sigma_{11}\sigma_{22}(1 - \rho_{12}^2)} \\ & \quad \begin{bmatrix} \sigma_{22} & -\rho_{12}\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}} \\ -\rho_{12}\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}} & \sigma_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - \mu_1 \\ x_2 - \mu_2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{\sigma_{22}(x_1 - \mu_1)^2 + \sigma_{11}(x_2 - \mu_2)^2 - 2\rho_{12}\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}}(x_1 - \mu_1)(x_2 - \mu_2)}{\sigma_{11}\sigma_{22}(1 - \rho_{12}^2)} \\ &= \frac{1}{(1 - \rho_{12}^2)} \left[\left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right)^2 - 2\rho_{12} \left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right) \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right) \right] \end{aligned} \tag{0.37}$$

■

Dari persamaan (0.36) untuk pada dari variabel normal dimensi- p , harus jelas bahwa jalur dari nilai \mathbf{x} menghasilkan konstan yang tinggi untuk pada bentuk ellips. Padat normal multivariate merupakan konstan pada permukaan dimana kuadrat dari jarak $(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})$ adalah konstan.

Jalur-Jalur tersebut disebut bentuk (Kontur-Contour):

$$(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) = c^2 \tag{0.38}$$

Teorema 4.1.

Jika Σ merupakan matriks definit positif, sedemikian hingga Σ^{-1} , maka

$$\Sigma \mathbf{e} = \lambda \mathbf{e} \text{ akibatnya } \Sigma^{-1} \mathbf{e} = \left(\frac{1}{\lambda} \mathbf{e} \right)$$

Sehingga (λ, \mathbf{e}) merupakan pasangan nilai eigen dan vektor eigen untuk Σ yang berkaitan dengan pasangan $\left(\frac{1}{\lambda}, \mathbf{e} \right)$ untuk Σ^{-1} . Σ^{-1} juga merupakan matriks definit positif.

■ Bukti.

Untuk matriks definit positif, Σ , dan $\mathbf{e} \neq 0$ suatu vektor eigen, kita punya

$$\mathbf{e}' \Sigma \mathbf{e} = \mathbf{e}' (\Sigma \mathbf{e}) = \mathbf{e}' (\lambda \mathbf{e}) = \lambda \mathbf{e}' \mathbf{e} = \lambda > 0$$

Dan juga

$$\mathbf{e} = \Sigma^{-1} (\Sigma \mathbf{e}) = \Sigma^{-1} (\lambda \mathbf{e})$$

Atau

$$\mathbf{e} = \lambda \Sigma^{-1} \mathbf{e}$$

Untuk model terakhir dengan $\lambda > 0$, hasilnya

$$\Sigma^{-1} \mathbf{e} = \frac{1}{\lambda} \mathbf{e}$$

Selanjutnya, $\left(\frac{1}{\lambda}, \mathbf{e} \right)$ merupakan pasangan nilai eigen dan vektor eigen untuk matriks Σ^{-1} . Demikian halnya dengan vektor \mathbf{x} berukuran $p \times 1$

$$\mathbf{x}' \Sigma^{-1} \mathbf{x} = \mathbf{x}' \left(\sum_{i=1}^p \left(\frac{1}{\lambda_i} \right) \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i' \right) \mathbf{x}$$

Oleh karena setiap model $\lambda_i^{-1} (\mathbf{x}'\mathbf{e}_i)^2$ non-negatif. Jika $\mathbf{x} = 0$, maka keadaan dari $\mathbf{x}'\mathbf{e}_i = 0$ untuk setiap i . Sehingga, jika $\mathbf{x} \neq 0$, maka

$$\sum_{i=1}^p \frac{1}{\lambda_i} (\mathbf{x}'\mathbf{e}_i)^2 > 0$$

Sehingga Σ^{-1} juga definit positif. ■

■ Contoh 4.4 (Bentuk dari padat normal bivariate)

Kita akan menggambarkan sumbu bentuk padat peluang konstan untuk distribusi normal bivariate dimana $\sigma_{11} = \sigma_{22}$.

Dari persamaan (0.38), sumbu-sumbu tersebut diberikan oleh nilai eigen dan vektor eigen dari Σ .

Persamaan karakteristik $|\Sigma - \lambda\mathbf{I}| = 0$ menjadi

$$0 = \begin{vmatrix} \sigma_{11} - \lambda & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{11} - \lambda \end{vmatrix} = (\sigma_{11} - \lambda)^2 - \sigma_{12}^2 \\ = (\lambda - \sigma_{11} - \sigma_{12})(\lambda - \sigma_{11} + \sigma_{12})$$

Akibatnya, nilai eigen adalah $\lambda_1 = \sigma_{11} + \sigma_{12}$ dan $\lambda_2 = \sigma_{11} - \sigma_{12}$. Vektor eigen \mathbf{x}_1 ditentukan dari

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = (\sigma_{11} + \sigma_{12}) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

atau

$$\begin{aligned} \sigma_{11}x_1 + \sigma_{12}x_2 &= (\sigma_{11} + \sigma_{12})x_1 \\ \sigma_{12}x_1 + \sigma_{11}x_2 &= (\sigma_{11} + \sigma_{12})x_2 \end{aligned}$$

Persamaan terakhir menghasilkan $x_1 = x_2$, dan setelah dinormalkan pasangan nilai eigen dan vektor eigen pertama adalah

$$\lambda_1 = \sigma_{11} + \sigma_{12}; \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Dengan cara yang sama

$$\lambda_2 = \sigma_{11} - \sigma_{12}; \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Ketika kovariansi σ_{12} positif, $\lambda_1 = \sigma_{11} + \sigma_{12}$ merupakan nilai eigen terbesar, dan vektor eigen yang bersesuaian, menyimpan sejauh 45° melalui $\boldsymbol{\mu}' = [\mu_1, \mu_2]$.

Sumbu ellip dari padat konstan untuk distribusi normal bivariate dengan $\sigma_{11} = \sigma_{22}$ ditentukan oleh

$$\pm c\sqrt{\sigma_{11} + \sigma_{22}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \text{ dan } \pm c\sqrt{\sigma_{11} - \sigma_{22}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

■

Kita tunjukkan bahwa persamaan (0.38), $c^2 = \chi_p^2(\alpha)$ merupakan persentil ke- (100α) dari distribusi chi-kuadrat dengan derajat bebas p menghasilkan kontur yang memuat $(1 - \alpha)100\%$,

$$(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \leq \chi_p^2(\alpha) \tag{0.39}$$

Mempunyai peluang $1 - \alpha$

2. Properti Variabel Acak Multivariat Normal

Berikut dijelaskan beberapa aturan dari vektor acak \mathbf{x} berukuran $p \times 1$ dari distribusi normal multivariate $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$:

Sifat linear dari kombinasi linear variabel dalam \mathbf{x}

Teorema 4. 2.

Jika \mathbf{X} berdistribusi $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, maka sembarang kombinasi linear dari variabel $\mathbf{a}'\mathbf{X} = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_px_p$ berdistribusi $N_p(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}, \mathbf{a}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{a})$.

Teorema 4.3.

Jika $\mathbf{a}'\mathbf{X} = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_px_p$ berdistribusi $N_p(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}, \mathbf{a}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{a})$ untuk setiap \mathbf{a} , maka \mathbf{X} berdistribusi $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$.

■ Contoh 4.2. (Distribusi dari kombinasi linear komponen vektor acak normal).

Perhatikan kombinasi linear $\mathbf{a}'\mathbf{X}$ dari vektor acak multivariate normal ditentukan dengan memilih $\mathbf{a}' = [1, 0, 0, \dots, 0]$. Karena itu

$$\mathbf{a}'\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_p \end{bmatrix} = X_1 \text{ Dan } \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_p \end{bmatrix} = \mu_1$$

Sehingga

$$\mathbf{a}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1p} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \dots & \sigma_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{p1} & \sigma_{p1} & \dots & \sigma_{pp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \sigma_{11}$$

Teorema 4.3

Jika $\mathbf{X} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, q kombinasi linear

$$\underset{(q \times p)}{\mathbf{A}} \underset{(p \times 1)}{\mathbf{X}} = \begin{bmatrix} a_{11}X_1 + \dots + a_{1p}X_p \\ a_{21}X_1 + \dots + a_{2p}X_p \\ \vdots \\ a_{q1}X_1 + \dots + a_{qp}X_p \end{bmatrix}$$

Berdistribusi normal $N_q(\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}, \mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A})$

Variabel terstandarkan (Standardized Variabel)

Distribusi Chi-Square

Distribusi chi-square menentukan variabilitas dari variansi sampel, $s^2 = s_{11}$, untuk sampel dari suatu populasi normal univariat. Hal tersebut memainkan peran penting dalam kasus multivariate.

■ **Contoh 4.3 (Distribusi dua kombinasi linear dari komponen vektor acak normal)**

Untuk $\mathbf{X} \sim N_3(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, tentukan distribusi dari

$$\begin{bmatrix} X_1 - X_2 \\ X_2 - X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{X}$$

Dengan teorem 4.3, distribusi dari $\mathbf{A}\mathbf{X}$ adalah normal multivariate dengan rata-rata

$$\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 - \mu_2 \\ \mu_2 - \mu_3 \end{bmatrix}$$

Dan matriks kovariansi

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}' &= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sigma_{11} - \sigma_{12} & \sigma_{12} - \sigma_{22} & \sigma_{13} - \sigma_{23} \\ \sigma_{12} - \sigma_{13} & \sigma_{22} - \sigma_{23} & \sigma_{23} - \sigma_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} \sigma_{11} - 2\sigma_{12} + \sigma_{22} & \sigma_{12} + \sigma_{23} - \sigma_{22} - \sigma_{13} \\ \sigma_{12} + 2\sigma_{23} - \sigma_{22} - \sigma_{13} & \sigma_{22} - 2\sigma_{23} + \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

■

Teorema 4.3

Misalkan $\mathbf{X} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ dengan $|\boldsymbol{\Sigma}| > 0$ Maka

- $(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})$ berdistribusi χ_p^2 , dimana χ_p^2 merupakan distribusi chi-square dengan derajat bebas p
- Distribusi $\mathbf{X} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ menyatakan peluang $1 - \alpha$ pada daerah padat ellips $\left\{ \mathbf{x} : (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \leq \chi_p^2(\alpha) \right\}$ dimana $\chi_p^2(\alpha)$ merupakan persentil ke- 100α dari distribusi χ_p^2 .

Sifat Normal Distribusi Marginal

Sifat Independen

Teorem 4. 3.

Jika \mathbf{X}_1 dan \mathbf{X}_2 independen, maka $\text{kov}(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2) = 0$,

Jika $\begin{bmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \dots \\ \mathbf{X}_2 \end{bmatrix}$ adalah $N_{q_1+q_2} \left(\begin{bmatrix} \mu_1 \\ \dots \\ \mu_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \dots & \Sigma_{12} \\ \dots & \dots & \dots \\ \Sigma_{21} & \dots & \Sigma_{22} \end{bmatrix} \right)$, maka \mathbf{X}_1 dan \mathbf{X}_2 adalah

independen jika dan hanya jika $\Sigma_{12} = 0$

Distribusi Bersyarat

Teorema 4.5

Misalkan $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \dots \\ \mathbf{X}_2 \end{bmatrix}$ berdistribusi $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ dengan $\begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu}_1 \\ \dots \\ \boldsymbol{\mu}_2 \end{bmatrix}$,

$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \dots & \Sigma_{12} \\ \dots & \dots & \dots \\ \Sigma_{21} & \dots & \Sigma_{22} \end{bmatrix}$, dan $|\boldsymbol{\Sigma}| > 0$. Maka distribusi bersyarat dari \mathbf{X}_1 ,

diberikan $\mathbf{X}_2 = \mathbf{x}_2$ adalah normal dan mempunyai

$$\text{Rata-Rata} = \boldsymbol{\mu}_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(\mathbf{x}_2 - \boldsymbol{\mu}_2) \quad \text{Dan Kovariansi} = \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}$$

Perhatikan bahwa, kovariansi tidak bergantung pada nilai \mathbf{x}_2 dari variabel pensyarat

Distribusi Jumlah dua Vektor

3. Distribusi Sampel Multivariate Normal

Pada bagian ini kita akan membahas tentang statistik $\bar{\mathbf{x}}$ dan \mathbf{S}

Estimasi Normal Multivariate

Ketika kita akan melakukan inferensi multivariat normal terhadap populasi berdasarkan data sampel, salah satu metode yang sering digunakan untuk mendapatkan nilai estimasi dari parameter adalah **maksimum likelihood**. Teknik ini cukup sederhana secara konsep, vektor pengamatan x_1, x_2, \dots, x_n yang telah dikumpulkan, dan nilai $\boldsymbol{\mu}$ dan $\boldsymbol{\Sigma}$ yang memaksimumkan pada gabungan dari \mathbf{X} , disebut fungsi likelihood.

Teorema 4.6

Misalkan $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ merupakan sampel acak dari populasi normal dengan rata-rata $\boldsymbol{\mu}$ dan kovariansi $\boldsymbol{\Sigma}$. Maka

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = \bar{\mathbf{x}} \quad (0.40)$$

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' = \frac{(n-1)}{n} \mathbf{S} \quad (0.41)$$

Merupakan estimator maksimum likelihood dari μ dan Σ . Nilai pengamatan, $\bar{\mathbf{x}}$ dan $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})'$ disebut pengestimasi dari μ dan Σ .

Dimana \mathbf{S} adalah matriks kovariansi sampel.

Selanjutnya fungsi likelihood adalah

$$\begin{aligned} L(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}; \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n) &= \prod_{i=1}^n f(\mathbf{x}_i, \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^p |\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})} \\ L(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}; \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n) &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^{np} |\boldsymbol{\Sigma}|^{n/2}} e^{-\frac{1}{2}\sum (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})} \end{aligned} \quad (0.42)$$

Sebelum membahas lebih lanjut estimasi parameter dengan metode likelihood, berikut diberikan teori yang berkaitan dengan trace dari suatu matriks.

Teorema 4.7

Misalkan \mathbf{A} merupakan matriks simetri berukuran $k \times k$ dan \mathbf{x} merupakan vektor berukuran $k \times 1$. Maka

1. $\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x} = tr(\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x}) = tr(\mathbf{A}\mathbf{x}\mathbf{x}')$
2. $tr(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^k \lambda_i$, dimana λ_i merupakan nilai eigen dari \mathbf{A}

Perhatikan eksponen dari persamaan (0.42), yaitu $(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})$, dapat disederhakan menjadi

$$\begin{aligned} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}) &= \text{tr} \left[(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}) \right] \\ &= \text{tr} \left[\boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}) (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})' \right] \end{aligned} \quad (0.43)$$

Selanjutnya

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}) &= \sum_{i=1}^n \text{tr} \left[(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \text{tr} \left[\boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}) (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})' \right] \\ \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}) &= \text{tr} \sum_{i=1}^n \left[\boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}) (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})' \right] \end{aligned} \quad (0.44)$$

Karena trace dari suatu jumlahan matriks adalah sama dengan jumlah trace dari setiap matriks. Kita dapat menambahkan dan

mengurangkan $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_j$ dalam setiap model $(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})$ dalam

$\sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}) (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})'$ yang menghasilkan

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}} + \bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}) (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}} + \bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})' &= -\frac{1}{2} C + D \\ &= -\frac{1}{2} C + nD \end{aligned} \quad (0.45)$$

Dimana $C = \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}) (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})'$ dan $D = \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}) (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})'$

Karena model hasil kali $\sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})'$ dan

$\sum_{i=1}^n (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})'$; keduanya adalah nol Persamaan (0.45) menjadi

$$L(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}; \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^{np} |\boldsymbol{\Sigma}|^{n/2}} e^{-\frac{1}{2}B} \quad (0.46)$$

$$\text{Dimana } B = \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})' + n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})'$$

Karena $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ adalah definit positif, model $-\frac{n}{2}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}) \leq 0$

dan $0 < e^{-\frac{n}{2}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})} \leq 1$, maksimum ketika pangkatnya sama dengan 0. Oleh karena itu L maksimum ketika $\hat{\boldsymbol{\mu}} = \bar{\mathbf{x}}$

Distribusi $\bar{\mathbf{x}}$ dan \mathbf{S}

Untuk distribusi dari $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_j$, dapat dibagi dalam dua kasus,

1. Ketika $\bar{\mathbf{x}}$ didasarkan pada sampel acak $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ dari distribusi normal multivariate $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ maka $\bar{\mathbf{x}} \sim N_p\left(\boldsymbol{\mu}, \frac{\boldsymbol{\Sigma}}{n}\right)$
2. Ketika $\bar{\mathbf{x}}$ didasarkan pada sampel acak $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ dari suatu distribusi nonnormal populasi multivariate dengan vektor rata-rata $\boldsymbol{\mu}$ dan matriks kovariansi $\boldsymbol{\Sigma}$, maka untuk n cukup besar, $\bar{\mathbf{x}}$ mendekati distribusi $\bar{\mathbf{x}} \sim N_p\left(\boldsymbol{\mu}, \frac{\boldsymbol{\Sigma}}{n}\right)$. Formalnya dikenal dengan **teorema limit central multivariate**: Jika $\bar{\mathbf{x}}$ merupakan vektor rata-rata dari sampel acak $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ dari suatu populasi dengan

vektor rata-rata μ dan matriks kovariansi Σ , maka saat $n \rightarrow \infty$, distribusi dari $\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)$ mendekati $N_p(0, \Sigma)$

Terdapat p variansi dalam \mathbf{S} dan $\binom{p}{2}$ kovariansi, untuk total

$$p + \binom{p}{2} = p + \frac{p(p-1)}{2} = \frac{p(p+1)}{2}$$

Entri berbeda. Distribusi gabungan dari $\frac{p(p-1)}{2}$ variabel berbeda dalam $\mathbf{W} = (n-1)\mathbf{S} = \sum_i (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})'$ merupakan distribusi Wishart, dinyatakan dengan

$$W_p(n-1, \Sigma)$$

Dimana $(n-1)$ adalah derajat bebas.

Distribusi Wishart analog dengan distribusi chi-square multivariate, dan penggunaannya sama. Suatu variabel acak χ^2 didefinisikan secara formal sebagai jumlah kuadrat dari standar normal independen (univariat) variabel random:

$$\sum_{i=1}^n z_i^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

Jika μ digantikan dengan \bar{x} , maka

$$\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Dengan cara yang sama, definisi formal dari variabel acak wishart adalah

$$\sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})' \sim W_p(n, \boldsymbol{\Sigma}) \quad (0.47)$$

Dimana $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ secara independen berdistribusi $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$. Ketika $\boldsymbol{\mu}$ digantikan dengan $\bar{\mathbf{x}}$, hasilnya adalah

$$(n-1)\mathbf{S} = \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})' \sim W_p(n-1, \boldsymbol{\Sigma}) \quad (0.48)$$

Berikut ringkasan distribusi sampel:

Misalkan $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ sampel acak berukuran n dari suatu distribusi normal p variabel dengan rata-rata $\boldsymbol{\mu}$ dan matriks kovariansi $\boldsymbol{\Sigma}$. Maka

1. $\bar{\mathbf{X}} \sim N_p\left(\boldsymbol{\mu}, \left(\frac{1}{n}\right)\boldsymbol{\Sigma}\right)$
2. $(n-1)\mathbf{S}$ berdistribusi wishart dengan derajat bebas $n-1$
3. $\bar{\mathbf{X}}$ dan \mathbf{S} independen

4. Menilai Asumsi Normalitas Multivariat

Ketika kita bekerja dengan beberapa variabel, memeriksa kenormalan setiap variabel seharusnya bukan pendekatan yang bagus, karena

1. Variabel saling berkorelasi
2. Normalitas dari setiap variabel tidak menjamin gabungannya normal

Mengevaluasi Normalitas Univariat

Pendekatan secara grafik untuk memerikan normalitas adalah plot $Q-Q$ yang membandingkan kuantil dari sampel dengan kuantil populasi dari normal univariat. Jika titik-titik dekat-dekat dengan garis lurus, tidak ada yang mengindikasikan adanya normalitas.

Misalkan diberikan data hasil pengamatan, x_1, x_2, \dots, x_n untuk satu karakteristik saja, X_i . Misalkan $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ data hasil pengamatan yang telah disusun secara terurut dari yang terkecil. $x_{(i)}$ merupakan quantil data. Ketika nilai $x_{(i)}$ berbeda, secara tepat pengamatan i kurang dari atau sama dengan $x_{(i)}$. Proporsi i/n dari sampel pada $x_{(i)}$ sering diperkirakan dengan $(i - \frac{1}{2})/n$.

Untuk distribusi normal standar, quantil $q_{(i)}$ didefinisikan dengan relasi

$$P\left[Z \leq q_{(i)}\right] = \int_{-\infty}^{q_{(i)}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz = p_{(i)} = \frac{i - \frac{1}{2}}{n} \quad (0.49)$$

$p_{(i)}$ adalah peluang yang diperoleh dari nilai yang kurang dari atau sama dengan $q_{(i)}$ dalam satu pengambilan dari populasi berdistribusi normal.

Idenya adalah untuk melihat pasangan quantil $(q_{(i)}, x_{(i)})$ dengan asosiasi yang sama peluang kumulatif $(i - \frac{1}{2})/n$. Jika data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, pasangan $(q_{(i)}, x_{(i)})$ diperkirakan akan berkaitan secara linear, karena $\sigma q_{(i)} + \mu$ dekat dengan nilai ekspektasi quantil.

■ Contoh 4.4 (Mengkonstruksi QQ-Plot)


Sampel sebanyak $n = 10$ pengamatan, nilainya sebagaimana dalam table berikut:

Pengamatan (terurut)	Level Peluang $\frac{(j - \frac{1}{2})}{n}$	Quantil Standar Normal $q_{(i)}$
$x_{(i)}$		

-1.00	0.05	-1.645
-0.10	0.15	-1.036
0.16	0.25	-0.674
0.41	0.35	-0.385
0.62	0.45	-0.125
0.80	0.55	0.125
1.26	0.65	0.385
1.54	0.75	0.674
1.71	0.85	-1.036
2.30	0.95	-1.645

Sebagai contoh,
$$P(Z \leq 0.385) = \int_{-\infty}^{0.385} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz = 0.65$$

Misalkan kita ingin mengkonstruksi Plot Q-Q dan memberikan interpretasi terhadap apa yang nampak pada grafik tersebut. Plot Q-Q untuk data diatas, dimana plot dari data yang telah diurutkan $x_{(i)}$ dengan quantile normal $q_{(i)}$, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut. Pasangan titik-titik $(q_{(i)}, x_{(i)})$ berada sangat dengan sepanjang garis lurus, dan kita tidak ingin menolak hal yang menyatakan bahwa data tersebut mempunyai distribusi normal-secara khusus dengan ukuran sampel yang kecil $n = 10$.



Gambar 4. Normal Q-Q Plot nilai Ekspektasi v.s Nilai Pengamatan Terstandar


Berikut langkah-langkah membuat plot

1. Urutkan pengamatan asal, $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}$ dan peluang yang bersesuaian $\frac{(1 - \frac{1}{2})}{n}, \frac{(2 - \frac{1}{2})}{n}, \dots, \frac{(n - \frac{1}{2})}{n}$;
2. Hitung quantil standar normal $q_{(1)}, q_{(2)}, \dots, q_{(n)}$; dan
3. Plot pasangan pengamatan $(q_{(1)}, x_{(1)}), (q_{(2)}, x_{(2)}), \dots, (q_{(n)}, x_{(n)})$,

■ Contoh 4.3 (Plot Q-Q untuk Data Radiasi)

Departemen pengontrolan kualitas dari suatu pabrik pembuat microwave oven yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memonitor jumlah radiasi yang dipancarkan ketika pintu oven tertutup. Pengamatan pancaran radiasi melalui pintu tertutup dari $n = 42$ telah diambil secara acak. Datanya sebagaimana ditampilkan pada table 4.2 b berikut

Plot Q-Q dari data radiasi dibuat dengan menggunakan software SPSS V16. Perhatikan hasil plot tersebut, terdapat dua titik yang terletak menyimpang sangat jauh dari titik yang lain dan dari garis lurus, yang demikian disebut sebagai outlier. Maka dari hasil tersebut dapat kita simpulkan data radiasi oven tidak normal.



Garis lurus dari plot Q-Q dapat diukur dengan menghitung koefisien korelasi dari titik-titik dalam plot. Koefisien korelasi untuk plot Q-Q didefinisikan dengan

$$r_Q = \frac{\sum_{i=1}^n (x_{(j)} - \bar{x})(q_{(i)} - \bar{q})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{(j)} - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (q_{(i)} - \bar{q})^2}} \quad (0.50)$$

Secara formal penolakan hipotesis dari normal pada level signifikansi α jika r_Q berada dibawah nilai perkiraan, sebagaimana dalam table berikut

Contoh 4.4 (uji koefisien korelasi untuk Normalitas)

Misalkan kita akan menghitung koefisien korelasi r_Q dari contoh 4.3 dan uji untuk normalitas.

Dari contoh 4.3, diketahui $\bar{x} = 0.770$ dan

$$\sum_{i=1}^{10} (x_{(i)} - \bar{x})q_{(i)} = 8.584, \quad \sum_{i=1}^{10} (x_{(i)} - \bar{x}) = 8.472, \quad \text{dan} \quad \sum_{i=1}^{10} q_{(i)}^2 = 8.795.$$

Karena $\bar{q} = 0$ (selalu),

$$r_Q = \frac{8.584}{\sqrt{8.472}\sqrt{8.795}} = 0.994$$

Uji normalitas pada taraf signifikasni 10% memberikan patokan $r_Q = 0.994$ untuk dibandingkan dengan table ...untuk $n = 10$ dan $\alpha = 0.10$, nilai kritisnya adalah 0.9351. Oleh karena $r_Q = 0.994 > 0.9351$, hipotesis yang menyatakan distribusinya tidak ditolak.

■

a. Mengevaluasi Normalitas Bivariate

Perhatikan himpunan kejadian bivariate \mathbf{x} sehingga

$$(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \leq \chi_2^2 (0.05)$$

Mempunyai peluang 0.05. kita coba mengharapkan secara apa adanya persentase yang sama, 50% dari sampel pengamatan untuk menyimpang dari ellips diberikan oleh

$$\left\{ \text{semua } \mathbf{x} \text{ sehingga } (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}) \leq \chi_2^2 (0.05) \right\}$$

Dimana $\boldsymbol{\mu}$ kita estimasi denga $\bar{\mathbf{x}}$ dan $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ kita estimasi dengan \mathbf{S}^{-1} .

Jika bukan, asumsi normalitas dicurigai

Contoh 4.3 (Pemeriksaan Normalitas Bivariat)

Meskipun bukan berasal dari sample acak, data yang memuat pasangan hasil pengamatan ($x_1 = \text{salse}$ dan $x_2 = \text{profit}$) untuk 10 perusahaan terbesar didunia sebagaimana ditunjukkan pada contoh 4.1. Dari data tersebut, diberikan

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 155.60 \\ 14.70 \end{bmatrix}, \mathbf{S} = \begin{bmatrix} 7476.45 & 303.63 \\ 303.62 & 26.19 \end{bmatrix}$$

Sehingga

$$\begin{aligned} \mathbf{S}^{-1} &= \frac{1}{103,623.12} \begin{bmatrix} 26.19 & -303.63 \\ -303.63 & 7476.45 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.000253 & -0.002930 \\ -0.002930 & 0.072148 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Dari table, diperoleh $\chi_2^2(0.5) = 1.39$. Lalu, sembarang pengamatan

$\mathbf{x}' = [x_1, x_2]$ memenuhi

$$\begin{bmatrix} x_1 - 155.60 \\ x_2 - 14.70 \end{bmatrix}' \begin{bmatrix} 0.000253 & -0.002930 \\ -0.002930 & 0.072148 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - 155.60 \\ x_2 - 14.70 \end{bmatrix} \leq 1.39$$

Jatuh didalam kontur pengamatan 50%. Pengamatan lain jatuh diluar kontur. Pengamatan yang lain selain dari yang disebut diatas jatuh diluar kontur. Pasangan pengamatan pertama,

$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}' = [108.28 \quad 17.05]$. Dalam kasus ini,

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} 108.28 - 155.60 \\ 17.05 - 14.70 \end{bmatrix}' \begin{bmatrix} 0.000253 & -0.002930 \\ -0.002930 & 0.072148 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 108.28 - 155.60 \\ 17.05 - 14.70 \end{bmatrix} \\ &= 1.61 > 1.39 \end{aligned}$$

Dan titik ini jatuh diluar kontur 50%. ■

Metode formal lain yang dapat digunakan untuk menilai gabungan sifat normal dari sekumpulan data adalah dengan memperhatikan jarak kuadrat umum

$$d_j^2 = (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}}), \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (0.51)$$

Dimana x_1, x_2, \dots, x_n adalah sampel pengamatan.

Ketika populasi primernya merupakan multivariate normal dimana n dan $n - p$ lebih besar dari 25 atau 30, setiap dari kuadrat jarak akan cenderung mengikuti variabel random chi-kuadrat. Walaupun jarak-jarak tersebut tidak independent atau secara tepat berdistribusi chi-kuadrat, namun cukup membantu untuk digambarkan plotnya. Plot yang dihasilkan disebut **plot chi-kuadrat** atau **Gamma Plot**, karena distribusi chi-kuadrat merupakan kasus khusus dari distribusi gamma.

Untuk mengkonstruksi plot chi-kuadrat

Langkah-Langkah Mengkonstruksi Plot Chi-Kuarat

1. Urutkan data jarak dalam persamaan (0.51) dimulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar.

$$d_1^2 \leq d_2^2 \leq \dots \leq d_n^2$$

2. Gambarkan pasangan $\left(q_{c.p} \left(\left(j - \frac{1}{2} \right) / n \right), d_j^2 \right)$ dimana

$$q_{c.p} \left(\left(j - \frac{1}{2} \right) / n \right) \text{ merupakan kuantil ke-100} \left(j - \frac{1}{2} \right) / n$$

dari distribusi chi-kuadrat dengan derajat bebas p .


■ Contoh 4.4 (Mengkonstruksi Plot Chi-Kuadrat)

Misalkan kita akan membuat plot chi-kuadrat dari jarak dalam contoh 4.3. Jarak diurutkan dan dihubungkan dengan persentil chi-kuadrat untuk $p = 2$ dan $n = 10$ sebagaimana ditampilkan pada table 4.4 berikut

j	d_j^2	$q_{c.2} \left(\left(j - \frac{1}{2} \right) / 10 \right)$
1	0.30	0.10
2	0.62	0.33
3	1.16	0.58
4	1.30	0.86
5	1.61	1.20
6	1.64	1.60

7	1.71	2.10
8	1.79	2.77
9	3.53	3.79
10	4.38	5.99

Hasil plotnya



Gambar 5. Scatte plot data d v.s q

5. Mendeteksi Data Pencilan dan Cleaning Data

Kebanyakannya kumpulan data memuat satu atau lebih hasil pengamatan yang berbeda keadaannya dari pengamatan yang lainnya atau diistilah dengan **unusual observartion** atau dikenal dengan **Data pencilan (outlier)**. Data yang demikian biasanya berada pada posisi sangat kecil atau sangat dari kumpulan pengamatan. Keadaan data yang demikian sangat berpengaruh dalam analisis statistic.

Langkah-langkah mendeteksi outlier:

Buat dot plot untuk setiap data variabel

1. Buat scatter plot atau diagram pencar untuk setiap pasangan variabel
2. Hitung nilai terstandar (standardized value)

$$z_{jk} = (x_{jk} - \bar{x}_k) / \sqrt{s_{kk}}$$
 untuk $j = 1, 2, \dots, n$ dan setiap kolom $k = 1, 2, \dots, p$. Uji nilai terstandar tersebut untuk nilai terkecil atau terbesar
3. Hitung jarak kuadrat umum $d_j^2 = (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})$. Uji jara-jarak tersebut untuk unusual nilai besar. Dalam

plot chi-kuadrat, titik-titik tersebut akan berada jauh dari titik asal.

Dalam langkah ketiga, harus diinterpretasi relative terhadap ukuran sampel dan jumlah variabel. Terdapat nilai terstandarkan sebanyak $n \times p$. Andaikan terdapat $n = 100$ dan $p = 5$, maka ada 500 nilai. Diharapkan 1 atau 2 dari data-data tersebut melebihi 3 atau kurang dari -3, jika data berasal dari distribusi multivariate hal tersebut berarti normal, dan 3.5 dicurigai sebagai data yang besar. Nilai terstandarkan dihitung berdasarkan rata-rata dan variansi sampel.

6. Transformasi Normalitas

Asumsi dasar setiap teknik statistic adalah sifat normalitas, jika sekumpulan data tidak mengikuti distribusi normal, apa yang harus dilakukan atau langkah apa yang selanjutnya diambil? Alternative pertama adalah menghilangkan data yang menyebabkan tidak normal, namun cara ini tidak dianjurkan karena yang merusak kesimpulan atau melahirkan kesimpulan yang tidak tepat. Alternative kedua adalah membuat data “tidak normal” menjadi nampak “normal” atau hampir normal dengan *transformasi data*.

Transformasi data adalah menampilkan data dalam bentuk yang berbeda. Transformasi yang tepat yang dianjurkan adalah (1) berdasarkan teori atau (2) berdasarkan data itu sendiri atau (3) keduanya. Secara teoritis bahwa data yang dihitung lebih sering cenderung normal dengan mengambil akar kuadrat. Dengan cara yang sama transformasi logit untuk proporsi dan tranformasi z untuk koefisien korelasi menghasilkan kuantitas yang mendekati distribusi normal.

Berikut beberapa bentuk tranformasi

	Skala Asal	Skala Transformasi
1	Count, y	\sqrt{y}
2	Proporsi, \hat{p}	$\text{logit}(\hat{p}) = \frac{1}{2} \log\left(\frac{\hat{p}}{1 - \hat{p}}\right)$

3	Korelasi, r	$Fisher\ z(r) = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1+r}{1-r} \right)$
---	---------------	--

Dalam kebanyakan kasus, pilihan transformasi untuk meningkatkan pendekatan kenormalan data ternyata tidak mudah. Namun, adalah satu satu teknik transformasi yang disebut dengan power transformation yang dianjurkan untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Power transformation terdefiniskan hanya pada variabel positif. Akan tetapi, hal ini bukan merupakan pembatasan, karena satu konstanta dapat ditambahkan ke setiap pengamatan dalam himpunan data jika beberapa nilai adalah negative.

Misalkan x merepresentasikan pengamatan, maka power transformasi merupakan pengurutan oleh parameter λ . suatu nilai diberikan untuk λ yang menyebabkan transformasi tertentu lebih dekat.

Sebuah metode analisis diberikan untuk memilih power transformasi. Box dan Cox melakukan perubahan pada power transformasi

$$x^{(\lambda)} = \begin{cases} \frac{x^\lambda - 1}{\lambda}; & \lambda \neq 0 \\ \ln x; & \lambda = 0 \end{cases} \quad (0.52)$$

Dimana $\lambda > 0$.

Diberikan pengamatan x_1, x_2, \dots, x_n , solute Box-Cox untuk memilih pendekatan power λ adalah solusi yang meminimumkan rumus

$$\ell(\lambda) = -\frac{n}{2} \ln \left[\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(x_j^{(\lambda)} - \overline{x^{(\lambda)}} \right)^2 \right] + (\lambda - 1) \sum_{j=1}^n \ln x_j \quad (0.53)$$

Latihan Soal

4. 1. Perhatikan suatu distribusi normal bivariate dengan $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 3$, $\sigma_{11} = 3$, $\sigma_{22} = 1$ dan $\rho_{12} = -0.8$.
- a. Tuliskan fungsi dari padat normal bivariate

b. Nyatakan jarak statistic kuadrat $(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})$ sebagai suatu fungsi kuadrati dari x_1 dan x_2

4. 2. Misalkan $\mathbf{X} \sim N_3(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ dengan $\boldsymbol{\mu}' = [-3, 1, 4]$ dan

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Mana dari variabel acak berikut yang independent?

a. X_1 dan X_2

b. X_2 dan X_3

c. (X_1, X_2) dan X_3

d. $\frac{X_1 + X_2}{2}$ dan X_3

e. X_2 dan $X_2 - \frac{5}{2}X_1 - X_3$

BAB IV

INFERENSI VEKTOR RATA-RATA



1. Uji μ Saat Σ Diketahui

Pengujian vektor rata-rata dengan asumsi Σ diketahui merupakan pendahuluan untuk mengilustrasikan pengujian multivariate dan untuk memberikan pengantar pemahaman kepada keadaan dimana Σ tidak diketahui. Untuk memudahkan pemahaman, pertama akan diperkenalkan kasus pada univariate, variabel x yang berdistribusi $N(\mu, \sigma)$.

Hipotesis yang akan diuji adalah rata-rata dari x adalah sama dengan suatu nilai rata-rata yang ditentukan atau diberikan, yaitu μ_0 lawan hipotesis alternative yang tidak sama dengan μ_0 , secara statistic dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ Lawan } H_0 : \mu \neq \mu_0$$

Dimana H_0 merupakan hipotesis nol dan H_1 merupakan hipotesis alternative, dua sisi. Jika diberikan data, X_1, X_2, \dots, X_n , yang menyatakan data variabel acak yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal, pendekatan uji statistic yang dapat digunakan adalah

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

yang berdistribusi $N(0,1)$ Jika H_0 benar.

Uji Multivariate untuk $H_0 : \mu = \mu_0 ; \sigma$ Diketahui

Dalam kasus multivariate dimana mempunyai banyak variabel yang diukur pada setiap unit sample, dan kita ingin menguji hipotesis suatu nilai, μ_0 dari setiap variabel, $H_0 : \mu = \mu_0$ Lawan $H_0 : \mu \neq \mu_0$, kita punya

$$H_0 : \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_{01} \\ \mu_{02} \\ \vdots \\ \mu_{0p} \end{pmatrix}, \quad H_1 : \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_p \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} \mu_{01} \\ \mu_{02} \\ \vdots \\ \mu_{0p} \end{pmatrix},$$

Dimana, setiap μ_{0j} merupakan nilai yang ditentukan sebagai nilai target oleh peneliti.

- Kesamaan vektor dalam H_0 mengakibatkan $\mu_j = \mu_{0j}$ untuk setiap $j = 1, 2, \dots, p$
- Sedangkan ketaksamaan vektor dalam H_1 mengakibatkan paling sedikit satu dari $\mu_j \neq \mu_{0j}$, untuk kemudian kita menolak H_0 .

Untuk menguji H_0 , andaikan sampel acak dari n vektor pengamatan, x_1, x_2, \dots, x_n dari populasi yang berdistribusi normal, $N_p(\mu, \Sigma)$,

dengan Σ diketahui, dan menghitung $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i$ dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Uji statistic yang bersesuaian adalah

$$Z^2 = n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \boldsymbol{\Sigma}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0) \quad (0.54)$$

Jika H_0 benar, Z^2 berdistribusi χ_p^2 , oleh karena itu kita tolak H_0 jika $Z^2 > \chi_{\alpha,p}^2$.

■ Contoh 3.1

Dalam Table 3.1, tinggi dan berat dari 20 orang mahasiswa laki-laki. Misalkan diasumsikan bahwa sampel ini berasal dari bivariate normal $N_2(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, dimana

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 20 & 100 \\ 100 & 1000 \end{pmatrix}$$

Andaikan kita ingin menguji $H_0 : \boldsymbol{\mu} = (70, 170)'$. Dari contoh 3.21 $\bar{x}_1 = 71.45$ dan $\bar{x}_2 = 164.7$. Selanjutnya kita punya

$$\begin{aligned} Z^2 &= n(\bar{\mathbf{y}} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\bar{\mathbf{y}} - \boldsymbol{\mu}) \\ &= (20) \begin{pmatrix} 71.45 - 70 \\ 164.7 - 170 \end{pmatrix}' \begin{pmatrix} 20 & 100 \\ 100 & 1000 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 71.45 - 70 \\ 164.7 - 170 \end{pmatrix} \\ &= (20) \begin{pmatrix} 1.45 & -5.3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.1 & -0.01 \\ -0.01 & 0.002 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1.45 \\ -5.3 \end{pmatrix} \\ &= 8.4026 \end{aligned}$$

Gunakan $\alpha = 0.05$, $\chi_{0.05,2}^2 = 5.99$ dan oleh karena itu tolak $H_0 : \boldsymbol{\mu} = (70, 170)'$ karena $Z^2 = 8.4026 > 5.99$

Perhatikan bahwa uji statistic sensitive terhadap struktur kovariansi. Jika $K_{ov}(x_1, x_2)$ negative, y_2 akan cenderung naik ketika y_1 naik, dan gambar ellips akan arahnya akan berubah.



2. Uji μ saat Σ tidak Diketahui

Pada bagian ini akan dibagi pembahasan menjadi dua bagian, yaitu pengujian untuk satu sampel lalu pengujian untuk dua sampel. Ada dua alasan:

1. Prinsip-prinsip umum kebanyakannya lebih mudah mengilustrasikan dalam satu sampel dibanding dua sampel
2. Beberapa test yang banyak digunakan adalah untuk kasus satu sampel.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana menguji hipotesis berkaitan dengan masalah ini, terlebih dahulu kita tinjau kembali masalah univariat yang berkenaan dengan kasus ini.

Andaikan kita telah mengumpulkan data sampel acak, yaitu x_1, x_2, \dots, x_n yang diperoleh dari populasi yang berdistribusi normal, $N(\mu, \sigma^2)$.

Estimator dari μ adalah \bar{x} dan estimator dari σ^2 adalah s^2 , yaitu

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{dan} \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Untuk menguji hipotesis

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{lawan} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Kita gunakan uji t-student dengan rumus

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{s} \quad (0.55)$$

Jika H_0 benar, t berdistribusi t_{n-1} , dimana $n - 1$ merupakan derajat bebas.

Keputusan statistika yang dapat kita ambil adalah, tolak H_0 jika

$$\left| \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{s} \right| \geq t_{\alpha/2; n-1}$$

atau

Tidak tolak H_0 jika

$$\left| \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{s} \right| \leq t_{\alpha/2; n-1}$$

Kedua bentuk diatas ekuivalen dengan interval kepercayaan

$$\left\{ \mu_0 \text{ berada dalam } 100(1 - \alpha)\% \text{ CI } \bar{x} \pm t_{\alpha/2; n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right\}$$

atau

$$\bar{x} - t_{\alpha/2; n-1} \frac{2}{\sqrt{n}} \leq \mu_0 \leq \bar{x} + t_{\alpha/2; n-1} \frac{2}{\sqrt{n}} \leq \mu_0 \quad (0.56)$$

Dimana $t_{\alpha/2; n-1}$ merupakan nilai kritis dari table t .

Bentuk $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ pada persamaan (0.55) merupakan bentuk

karakteristik dari statistic- t , yang merepresentasikan jarak sampel terstandarkan antara \bar{x} dan μ_0 .

Uji Hotelling- T^2 untuk $H_0 : \mu = \mu_0 ; \Sigma$ tidak diketahui

Diberikan hasil pengamatan suatu sampel acak x_1, x_2, \dots, x_n berasal dari populasi yang berdistribusi $N_p(\mu, \Sigma)$, dimana x_i memuat p pengukuran pada unit sampel ke- i .

Dalam rangka pengujian hipotesis

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ lawan } H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Digunakan rumus yang merupakan perluasan dari statistic- t kasus univariat. Dalam bentuk kuadrat, bentuk univariat statistic- t dapat dituliskan

$$t^2 = \frac{n(\bar{x} - \mu_0)^2}{s^2} = n(\bar{x} - \mu_0)(s^2)(\bar{x} - \mu_0). \quad (0.57)$$

Pada persamaan (0.57), gantikan $(\bar{x} - \mu_0)$ dan s^2 dengan $(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})$ dan \mathbf{S} , diperoleh uji statistika

$$T^2 = n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}). \quad (0.58)$$

dimana

$$\underset{(p \times 1)}{\bar{\mathbf{X}}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i, \quad \underset{(p \times p)}{\mathbf{S}} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}})' \text{ dan } \boldsymbol{\mu}_0 = \begin{bmatrix} \mu_{10} \\ \mu_{20} \\ \vdots \\ \mu_{p0} \end{bmatrix}$$

Statistik T^2 disebut *Hotelling's* T^2 .

Bentuk karakteristik dari statistic T^2 adalah

$$T^2 = (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})' \left(\frac{\mathbf{S}}{n} \right)^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}). \quad (0.59)$$

Bentuk karakteristk mempunyai dua fitur:

1. \mathbf{S}/n merupakan matriks kovariansi sampel $\bar{\mathbf{X}}$ dan matriks terstandarkan dalam fungsi jarak
2. Karena $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ berdistribusi $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, demikian halnya dengan $\bar{\mathbf{X}} \sim N_p\left(\boldsymbol{\mu}, \frac{1}{n}\boldsymbol{\Sigma}\right)$, $(n-1)\mathbf{S} \sim W(n-1, \boldsymbol{\Sigma})$ dan $\bar{\mathbf{X}}$ dan \mathbf{S} independen.

Perhatikan persamaan (0.57), statistic- t merepresentasikan jumlah standar deviasi \bar{x} dari μ_0 . Hal yang sama nampak pada statistic T^2 ,

akan tetapi dalam interpretasinya tidak mudah. Jika kita tambahkan variabel, jarak dalam persamaan (0.59) akan meningkat.

Untuk melakukan pengujian hipotesis, kita harus membandingkan nilai hasil perhitungan dari T^2 dengan nilai table. Jika suatu pengujian untuk menolak $H_0 : \mu = \mu_0$, pertanyaan yang harus diajukan adalah, variabel apa atau variabel mana yang memberikan kontribusi lebih untuk suatu penolakan.

Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan uji- T^2 :

1. Jumlah pengamatan terhadap jumlah variabel seharusnya, $n > p$. Untuk kondisi yang lain, akan menghasilkan S yang singular dan akibatnya T^2 tidak dapat dihitung
2. Kasus satu sampel maupun dua sampel, derajat bebas untuk statistic T^2 akan sama, yaitu; $v = n - 1$ untuk satu sampel, dan $v = n_1 + n_2 - 1$ untuk dua sampel.
3. Hipotesis alternative adalah uji dua-sisi. Karena ruang adalah multidimensi. Pengujian satu sisi tidak pertimbangan, semisal $\mu > \mu_0$. Namun demikian, daerah kritisnya tetap satu-sisi (Penolakan untuk nilai T^2 yang besar). Hal ini merupakan karakteristik dari kebanyakan uji multivariate.
4. Dalam kasus univariat, $t_{n-1}^2 = F_{1,n-1}$. Statistic T^2 juga dapat dikonversi ke statistic-F sebagai berikut:

$$\frac{v - p + 1}{vp} T_{p,v}^2 = F_{p,v-p+1} \quad (0.60)$$

Berikut cara membaca table T^2

1. Kolom pertama dari table memuat nilai kuadrat dari table t ; yaitu $T_{\alpha,1,v}^2 = t_{\alpha/2,v}^2$. Untuk $p = 1$ T^2 menjadi t^2 .
2. Baris terakhir memuat nilai kritis χ^2 , yaitu $T_{p,\infty}^2 = \chi_p^2$

■ Contoh 2.

Misalkan matriks data untuk suatu sampel acak berukuran $n = 3$ dari populasi normal bivariate adalah

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 10 & 6 \\ 8 & 3 \end{bmatrix}$$

Uji T^2 untuk $\boldsymbol{\mu}'_0 = [9, 5]$. Apa distribusi sampel dari T^2 dalam contoh ini?

Solusi : Dari soal, kita dapat menghitung

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{6 + 10 + 8}{3} \\ \frac{9 + 6 + 3}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$$

dan

$$s_{11} = \frac{(6 - 8)^2 + (10 - 8)^2 + (8 - 8)^2}{3} = 4$$

$$s_{12} = \frac{(6 - 8)(9 - 6) + (10 - 8)(6 - 6) + (8 - 8)(3 - 6)}{3} = -3$$

$$s_{22} = \frac{(9 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (3 - 6)^2}{3} = 9$$

Dengan demikian $\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}$

Selanjutnya

$$\mathbf{S}^{-1} = \frac{1}{(4)(9) - (-3)(-3)} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{4}{27} \end{bmatrix}$$

Dan, dari persamaan (0.58), $T^2 = n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})$. diperoleh

$$T^2 = 3 \begin{bmatrix} 8 - 9 & 6 - 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{4}{27} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 - 9 \\ 6 - 5 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{2}{9} \\ \frac{1}{27} \end{bmatrix} = \frac{7}{9}$$

Sebelumnya, sampel terpilih, T^2 berdistribusi $\frac{(3-1)2}{(3-2)} F_{2,3-2} = 4F_{2,1}$

■ Contoh 3. (Pengujian Vektor Rata-rata dengan T^2)

Keringat dari 20 wanita sehat telah dianalisis. Tiga komponen, X_1 = rata keringat, X_2 = mengandung sodium, dan X_3 = mengandung potassium, telah diukur, dan hasil. Datanya sebagaimana ditampilkan dalam table 5.1

Individual	X_1	X_2	X_3
1	3.7	48.5	9.3
2	5.7	65.1	8.0
3	3.8	47.2	10.9
4	3.2	53.2	12.0
5	3.1	55.5	9.7
6	4.6	36.1	7.9
7	2.4	24.8	14.0
8	7.2	33.1	7.6
9	6.7	47.4	8.5
10	5.4	54.1	11.3
11	3.9	36.9	12.7
12	4.5	58.8	12.3
13	3.5	27.8	9.8
14	4.5	40.2	8.4
15	1.5	13.5	10.1
16	8.5	56.4	7.1
17	4.5	71.6	8.2
18	6.5	52.8	10.9
19	4.1	44.1	11.2
20	5.5	40.9	9.4

Uji hipotesis

$$H_0 : \boldsymbol{\mu}' = [4, 50, 10] \text{ lawan } H_1 : \boldsymbol{\mu}' \neq [4, 50, 10]$$

Pada level signifikansi $\alpha = 0.01$.

Solusi. Hitung statistik berikut

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 4.640 \\ 45.400 \\ 9.965 \end{bmatrix}, \mathbf{S} = \begin{bmatrix} 2.879 & 10.010 & -1.810 \\ 10.010 & 199.788 & -5.640 \\ -1.810 & -5.640 & 3.628 \end{bmatrix}$$

dan

$$\mathbf{S}^{-1} = \begin{bmatrix} 0.586 & -0.022 & 0.258 \\ -0.022 & 0.006 & -0.002 \\ 0.258 & -0.002 & 0.402 \end{bmatrix}$$

Hitung

$$\begin{aligned} T^2 &= 20 \begin{bmatrix} 4.640 - 4 & 45.400 - 50 & 9.965 - 10 \\ 0.586 & -0.022 & 0.258 \\ -0.022 & 0.006 & -0.002 \\ 0.258 & -0.002 & 0.402 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4.640 - 4 \\ 45.400 - 50 \\ 9.965 - 10 \end{bmatrix} \\ &= 20 \begin{bmatrix} 0.640 & -4.600 & -0.035 \\ 0.467 \\ -0.042 \\ 0.160 \end{bmatrix} \\ &= 9.74 \end{aligned}$$

Bandingkan hasil perhitungan $T^2 = 9.74$ dengan nilai kritis

$$\frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p, 0.01} = \frac{19(3)}{17} F_{3, 17, 0.01} = 3.353(2.44) = 8.18$$

Dari hasil tersebut nampak bahwa, $T^2 = 9.74 > 8.18$, Akibatnya kita tolak H_0 pada level signifikansi 10%.

■

3. Hotelling- T^2 dan Uji Likelihood Ratio

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan statistic T^2 dengan analogi univariat jarak kuadrat t^2 . Terdapat prinsip umum untuk mengkonstruksi prosedur uji yang disebut uji likelihood ratio, dan statistic T^2 dapat diturunkan dari uji likelihood ratio dari $H_0 : \mu = \mu_0$.

Lihat Persamaan (0.61) bahwa maksimum dari likelihood normal multivariate seperti μ dan Σ diberikan oleh

$$\max_{\mu, \Sigma} L(\mu, \Sigma) = \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\hat{\Sigma}|^{n/2}} e^{-np/2} \quad (0.61)$$

dimana

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})' \quad \text{dan} \quad \hat{\mu} = \bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i$$

Merupakan estimasi maksimum likelihood.

Dibawah hipotesis $H_0 : \mu = \mu_0$, fungsi likelihood normal

$$L(\mu_0, \Sigma) = \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\Sigma|^{n/2}} e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \mu_0)' \Sigma^{-1} (\mathbf{x}_i - \mu_0)}$$

Nilai μ_0 merupakan nilai konstans, tapi Σ dapat bervariasi untuk mendapatkan nilai yang "lebih mirip", nilainya dapat diperoleh dengan memaksimalkan fungsi likelihood, $L(\mu_0, \Sigma)$ terhadap Σ .

Langkah berikut, sebagaimana langkah pada persamaan (0.61) eksponen dalam $L(\mu_0, \Sigma)$ dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}
-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_0)' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_0) &= -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \text{tr} \left[\boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_0)' (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_0) \right] \\
&= -\frac{1}{2} \text{tr} \left[\boldsymbol{\Sigma}^{-1} \left(\sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_0)' (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_0) \right) \right]
\end{aligned}$$

Dengan menerapkan Teorema 4.7, kita punya

$$\max_{\boldsymbol{\Sigma}} L(\boldsymbol{\mu}_0, \boldsymbol{\Sigma}) = \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}_0|^{n/2}} e^{-np/2} \quad (0.62)$$

Dengan $\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})'$

Dengan menggunakan (0.61) dan (0.62), kita peroleh bentuk likelihood ratio

$$LR = \Lambda = \frac{\max_{\boldsymbol{\Sigma}} L(\boldsymbol{\mu}_0, \boldsymbol{\Sigma})}{\max_{\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}} L(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})} = \left(\frac{|\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}|}{|\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}_0|} \right)^{n/2} \quad (0.63)$$

Statistic yang ekuivalen dengan persamaan (0.63), $\Lambda^{2/n} = \left(\frac{|\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}|}{|\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}_0|} \right)$

disebut Wilks' Lambda. Jika nilai teramati dari likelihood ratio terlalu kecil, akibatnya hipotesis $H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0$ tidak mungkin sesuai, oleh karena itu hipotesis ditolak. Kasus khusus, Uji likelihood ratio dari $H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0$ lawan $H_1 : \boldsymbol{\mu} \neq \boldsymbol{\mu}_0$ tolak H_0 jika

$$\Lambda = \left(\frac{|\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}|}{|\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}_0|} \right)^{n/2} = \left(\frac{\left| \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})' \right|}{\left| \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_0)(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_0)' \right|} \right)^{n/2} < c_{\alpha} \quad (0.64)$$

Dimana c_{α} merupakan persentil 100α bawah distribusi Λ .

Teorema 1.

Misalkan $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ sampel acak dari suatu populasi berdistribusi normal, $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$. Maka uji pada persamaan (0.58) didasarkan pada T^2 ekuivalen terhadap uji likelihood ratio dari

$$H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0 \text{ lawan } H_1 : \boldsymbol{\mu} \neq \boldsymbol{\mu}_0$$

Karena

$$\Lambda^{2/n} = \left(1 + \frac{T^2}{(n-1)} \right)^{-1}$$



4. Daerah Kepercayaan dan Perbandingan Simultan Komponen Rata-Rata

Untuk melakukan inferensi dari suatu sampel, kita perlu memperluas konsep interval kepercayaan dari masalah univariat ke masalah **daerah kepercayaan multivariate**. Misalkan $\boldsymbol{\theta}$ merupakan vektor parameter populasi yang tidak diketahui dan Θ merupakan himpunan semua nilai yang mungkin dari $\boldsymbol{\theta}$. Daerah kepercayaan merupakan suatu nilai $\boldsymbol{\theta}$ yang mungkin. Daerah ini ditentukan dengan data, dan kita nyatakan $D(\mathbf{X})$, dimana $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n]'$ merupakan data yang disusun secara matriks.

Daerah $D(\mathbf{X})$, dikatakan mempunyai daerah kepercayaan $100(1 - \alpha)\%$,

$$P[D(\mathbf{X}) \text{ benar untuk } \boldsymbol{\theta}] = 1 - \alpha \quad (0.65)$$

Merupakan peluang untuk keadaan $\boldsymbol{\theta}$ benar dimana nilainya tidak diketahui.

Daerah kepercayaan untuk $\boldsymbol{\mu}$ dari populasi berdistribusi dengan jumlah variabel p

$$P \left[n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \leq \frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha) \right] = 1 - \alpha$$

Apapun nilai dari $\boldsymbol{\mu}$ dan $\boldsymbol{\Sigma}$. Dengan kata lain, $\bar{\mathbf{x}}$ akan berada didalam

$$\left[\frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha) \right]^{1/2}$$

Dari $\boldsymbol{\mu}$, dengan peluang dengan syarat bahwa jarak sebagaimana digambarkan dalam model $n\mathbf{S}^{-1}$. Untuk sampel tertentu, $\bar{\mathbf{x}}$ dan \mathbf{s} dapat dihitung, dan ketaksamaan

$$n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \leq \frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha) \quad \text{akan mendefinisikan}$$

daerah $D(\mathbf{x})$ dalam ruang semua nilai parameter yang mungkin. Dalam kasus ini, daerah akan berupa ellipsoid pada titik tengah $\bar{\mathbf{x}}$.

Suatu daerah kepercayaan $100(1 - \alpha)\%$ untuk rata-rata dari distribusi normal berdimensi- p merupakan ellips yang ditentukan oleh semua nilai $\boldsymbol{\mu}$ sehingga

$$n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}) \leq \frac{p(n-1)}{n-p} F_{p, n-p, \alpha} \quad (0.66)$$

Dimana $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i$, $\mathbf{S} = \frac{1}{(n-1)} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})'$ dan

$\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ adalah sampel teramat.

Untuk menentukan apakah sembarang $\boldsymbol{\mu}_0$ menyimpang dari daerah kepercayaan atau tidak, perlu dilakukan jarak kuadrat umum

$$n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0) \text{ dan bandingkan dengan } \frac{p(n-1)}{n-p} F_{p, n-p, \alpha}. \text{ Jika}$$

jarak kuadrat lebih besar dari $\frac{p(n-1)}{n-p} F_{p,n-p,\alpha}$, μ_0 tidak berada dalam daerah kepercayaan.

Untuk $p \geq 4$, kita tidak dapat menggambarkan grafik dari daerah kepercayaan untuk μ . Namun demikian, kita dapat menghitung sumbu dari elips kepercayaan dan yang berkaitan dengan panjangnya. Dengan menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari S .

Panjang dan arah sumbu dari

$$n(\bar{x} - \mu)' S^{-1}(\bar{x} - \mu) \leq \frac{p(n-1)}{n-p} F_{p,n-p,\alpha}$$

Ditentukan dengan

$$\sqrt{\lambda_i} \frac{c}{\sqrt{n}} = \sqrt{\lambda_i} \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p,\alpha}}$$

Unit sepanjang vektor eigen e_i ,

$$\pm \sqrt{\lambda_i} \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p,\alpha}} e_i, \text{ dimana } Se_i = \lambda_i e_i, i = 1, 2, \dots, p \quad (0.67)$$

Contoh 4.3 (mengkonstruksi elips kepercayaan untuk μ)

Data radiasi dari oven microwave pada contoh 4.10 dan 4.17. Misalkan

$$x_1 = \sqrt[4]{\text{Pengukuran radiasi dengan pintu tertutup}}$$

Dan

$$x_2 = \sqrt[4]{\text{Pengukuran radiasi dengan pintu tertutup}}$$

Untuk $n = 42$ pasangan dari pengamatan yang telah ditransformasikan, diperoleh

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0.564 \\ 0.603 \end{bmatrix}, S = \begin{bmatrix} 0.0144 & 0.0117 \\ 0.0117 & 0.0146 \end{bmatrix}, S^{-1} = \begin{bmatrix} 203.018 & -163.391 \\ -169.391 & 200.228 \end{bmatrix}$$

Dengan nilai eigen dan vektor eigen dari S adalah

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 0.026, & \mathbf{e}'_1 &= \begin{bmatrix} 0.704 & 0.710 \end{bmatrix} \\ \lambda_2 &= 0.002, & \mathbf{e}'_2 &= \begin{bmatrix} 0.710 & 0.704 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Elips kepercayaan 95% untuk μ memuat semua nilai (μ_1, μ_2) yang memenuhi

$$\begin{aligned}42 \begin{bmatrix} 0.564 - \mu_1 & 0.603 - \mu_2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 203.018 & -163.391 \\ -163.391 & 200.228 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.564 - \mu_1 \\ 0.603 - \mu_2 \end{bmatrix} \\ \leq \frac{2(41)}{40} F_{2,40,(0.05)}\end{aligned}$$

Atau, karena $F_{2,40,(0.05)} = 3.23$,

$$\begin{aligned}42(203.018)(0.564 - \mu_1)^2 + \\ 42(200.228)(0.603 - \mu_2)^2 \\ - 84(163.391)(0.564 - \mu_1)(0.603 - \mu_2) \leq 6.62\end{aligned}$$

Untuk melihat apakah $\mu' = \begin{bmatrix} 0.562 & 0.589 \end{bmatrix}$ di dalam daerah kepercayaan atau tidak, kita hitung

$$\begin{aligned}42(203.018)(0.564 - 0.562)^2 \\ + 42(200.228)(0.603 - 0.589)^2 \\ - 84(163.391)(0.564 - 0.562) \\ (0.603 - 0.589) = 1.30 \leq 6.62\end{aligned}$$

kita simpulkan bahwa $\mu' = \begin{bmatrix} 0.562 & 0.589 \end{bmatrix}$ berada dalam daerah

kepercayaan. Secara ekuivalen, suatu pengujian dari $H_0 : \mu = \begin{bmatrix} 0.562 \\ 0.589 \end{bmatrix}$

tidak seharusnya ditolak, dengan $H_1 : \mu \neq \begin{bmatrix} 0.562 \\ 0.589 \end{bmatrix}$ pada level signifikansi $\alpha = 0.05$.

Ellipsoid kepercayaan gabungan sebagaimana gambar 5.1. Titik pusat pada $\bar{x}' = [0.564 \quad 0.603]$, dan panjang setengahnya dari sumbu mayor dan minor diberikan oleh

$$\sqrt{\lambda_1} \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p,\alpha}} = \sqrt{0.026} \sqrt{\frac{2(41)}{42(40)}} (3.23) = 0.064$$


Dan

$$\sqrt{\lambda_2} \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p,\alpha}} = \sqrt{0.002} \sqrt{\frac{2(41)}{42(40)}} (3.23) = 0.018$$

Secara berurutan. Sumbu-sumbu yang menyimpang sepanjang $e'_1 = [0.704 \quad 0.710]$ dan $e'_2 = [-0.710 \quad 0.704]$ ketika vektor-vektor tersebut ditempatkan pada grafik dengan \bar{x} sebagai titik asal. Suatu indikasi penyimpangan elip kepercayaan diberikan oleh rasio panjang sumbu mayor dan minor.

Rasio tersebut adalah

$$\frac{2\sqrt{\lambda_1} \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p,\alpha}}}{2\sqrt{\lambda_2} \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p,\alpha}}} = \frac{\sqrt{\lambda_1}}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{0.161}{0.045} = 3.6$$



Prosedur Uji Hipotesis menggunakan Uji Hotelling

1. Kumpulkan Data sampel
2. Hitung nilai statistic uji Hotelling dengan rumus:

$$T^2 = n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}).$$
3. Pilih level uji, α
4. Tentukan nilai Hotelling berdasarkan nilai level uji

$$\frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha)$$
5. Bandingkan Nilai statistic uji hotelling berdasarkan hasil perhitungan dengan nilai hotelling table berdasarkan level uji yang dipilih
6. Keputusan Statistik, Tolak H_0 , jika statistic likelihood ratio, Λ ,

$$\Lambda = \left(\frac{|\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}|}{|\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}_0|} \right)^{n/2} = \left(\frac{\left| \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})' \right|}{\left| \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_0)(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_0)' \right|} \right)^{n/2} < c_\alpha$$

yang berdistribusi

$$n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \leq \frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha)$$

7. Buat Kesimpulan Berdasarkan langkah (5)

a. Perbandingan berganda metode Banferroni

Andaikan bahwa, sebelum mengumpulkan data, pernyataan kepercayaan seputar m kombinasi linear $\mathbf{a}'_1\boldsymbol{\mu}, \mathbf{a}'_2\boldsymbol{\mu}, \dots, \mathbf{a}'_m\boldsymbol{\mu}$ perlu ditetapkan. Misalkan C_i menyatakan pernyataan kepercayaan sekitar nilai dari $\mathbf{a}'_i\boldsymbol{\mu}$ dengan $P[C_i \text{ benar}] = 1 - \alpha_i, i = 1, 2, \dots, m$. Perhatikan,

$$\begin{aligned} P[\text{semua } C_i \text{ benar}] &= 1 - P[\text{Paling sedikit satu } C_i \text{ Salah}] \\ &\geq 1 - \sum_{i=1}^m P(C_i \text{ salah}) \\ &= 1 - \sum_{i=1}^m (1 - P(C_i \text{ benar})) \end{aligned}$$

$$P[\text{semua } C_i \text{ benar}] = 1 - (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m) \tag{0.68}$$

Misalkan kita akan mengembangkan estimasi interval bersama-sama untuk membatasi himpunan yang memuat komponen μ_i dari $\boldsymbol{\mu}$. Informasi yang kurang pada komponen-komponen yang relative penting, pertimbangkan individual interval- t .

$$\bar{x}_i \pm t_{n-1; (\alpha/2)} \sqrt{\frac{s_i}{n}}; i = 1, 2, \dots, m$$

Dimana $\alpha_i = \alpha/m$ Karena $P[\bar{X}_i \pm t_{n-1; (\alpha/2m)} \sqrt{s_{ii}/n} \text{ Memuat } \mu_i] = 1 - \alpha/m, i = 1, 2, \dots, m$, kita punya, Dari persamaan (0.68)

$$\begin{aligned} P[\bar{X}_i \pm t_{n-1; \alpha/m} \sqrt{s_{ii}/n} \text{ memuat } \mu_i, \text{ semua } i] &\geq 1 - \left(\underbrace{\frac{\alpha}{m} + \frac{\alpha}{m} + \dots + \frac{\alpha}{m}}_{m \text{ model}} \right) \\ &= 1 - \alpha \end{aligned}$$

Oleh karena itu, dengan satu level kepercayaan keseluruhan lebih besar daripada atau sama dengan $1 - \alpha$, kita dapat membuat $m = p$ pernyataan:

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 - t_{n-1; \frac{\alpha}{2p}} \sqrt{\frac{s_{11}}{n}} &\leq \mu_1 \leq \bar{x}_1 + t_{n-1; \frac{\alpha}{2p}} \sqrt{\frac{s_{11}}{n}} \\ \vdots & \qquad \qquad \qquad \vdots & \qquad \qquad \qquad \vdots \\ \bar{x}_p - t_{n-1; \frac{\alpha}{2p}} \sqrt{\frac{s_{pp}}{n}} &\leq \mu_p \leq \bar{x}_p + t_{n-1; \frac{\alpha}{2p}} \sqrt{\frac{s_{pp}}{n}} \end{aligned} \tag{0.69}$$

■ Contoh (Mengkonstruksi Interval Kepercayaan simultan Banferoni dan membandingkannya dengan Interval- T^2)

Perhatikan kembali contoh data radiasi oven. Kita membuat interval kepercayaan banferoni simultan 95% untuk rata-rata μ_1 dan μ_2 , dari keempat kaki dari pintu-tertutup dan pintu-terbuka ukuran dengan $\alpha_i = 0.05/2$, $i = 1, 2$.

Gunakan hasil pada contoh...perhatikan bahwa $n = 42$ dan $t_{41} (0.05/2 (2)) = t_{41} (0.0125) = 2.327$ untuk mendapatkan

$$\bar{x}_1 \pm t_{41} (0.0125) \sqrt{\frac{s_{11}}{n}} = 0.564 \pm 2.327 \sqrt{\frac{0.0144}{42}} \text{ atau } 0.521 \leq \mu_1 \leq 0.607$$

$$\bar{x}_2 \pm t_{41} (0.0125) \sqrt{\frac{s_{22}}{n}} = 0.603 \pm 2.327 \sqrt{\frac{0.0146}{42}} \text{ atau } 0.560 \leq \mu_2 \leq 0.646$$

Inteval Banferoni untuk kombinasi linear $\mathbf{a}'\mu$ dan analog dengan interval - T^2 , mempunyai bentuk yang sama:

$$\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} \pm (\text{nilai kritis}) \sqrt{\frac{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}{n}}$$

Akibatnyanya, dalam setiap interval dimana $\alpha_i = \frac{\alpha}{m}$,

$$\frac{\text{panjang interval Banferroni}}{\text{Panjang interval } T^2} = \frac{t_{n-1}(\alpha / 2m)}{\sqrt{\frac{p(n-1)}{n-p} F_{p, n-p}(\alpha)}} \quad (0.70)$$

Tidak bergantung pada besar acak \bar{X} dan s

5. Inferensi Sample Besar Seputar Vektor Rata-Rata Populasi

Ketika sampel diambil mempunyai ukuran yang besar, uji hipotesis dan daerah kepercayaan untuk μ dapat dikonstruksi tanpa asumsi populasi berdistribusi normal.

Hal yang dilanjutkan berkaitan dengan sampel yang berukuran besar mungkin secara partial kehilangan informasi oleh hanya pada penggunaan nilai-nilai statistic seperti \bar{X} dan s .

Semua inferensi seputar μ yang berasal dari sampel yang berukuran besar didasarkan pada distribusi chi-kuadrat, χ^2 , dari persamaan 4-28 diketahui bahwa

$$(\bar{X} - \mu)' (n^{-1}S)^{-1} (\bar{X} - \mu) = n(\bar{X} - \mu)' (S)^{-1} (\bar{X} - \mu)$$

Didekati dengan χ^2 dengan fungsi padat peluang

$$P\left[n(\bar{X} - \mu)' (S)^{-1} (\bar{X} - \mu) \leq \chi_p^2(\alpha)\right] = 1 - \alpha \quad (0.71)$$

Dimana $\chi_p^2(\alpha)$ persentil ke (100α) dari distribusi χ_p^2 .

Teorema 5.11

Misalkan X_1, X_2, \dots, X_n sampel acak dari populasi dengan rata-rata μ dan matriks kovariansi Σ definit positif. Ketika $n - p$ besar, hipotesis $H_0 : \mu = \mu_0$ ditolak pada taraf signifikansi α yang dipilih. Jika pengamatan

$$n(\bar{x} - \mu_0)' S^{-1} (\bar{x} - \mu_0) \chi_p^2(\alpha)$$

Dimana Dimana $\chi_p^2(\alpha)$ persentil ke (100α) dari distribusi χ_p^2 dengan fpp

6. Inferensi Seputar Vektor Rata-Rata Untuk Data Missing

Dalam hal pengamatan yang dilakukan dalam suatu survey atau pengukuran, terkadang ditemukan fakta terjadi data yang tidak terekam atau tersimpan, yang demikian dikenal dengan Data Missing atau Pengamatan Missing.

Pendekatan umum untuk menghitung estimasi dengan maksimum likelihood dari data yang tidak lengkap diperkenalkan oleh Dempster, Laird, dan Robin. Teknik yang mereka perkenalkan disebut Algoritma-EM yang memuat perhitungan secara iterative dalam dua langkah yang disebut dengan prediksi dan estimasi.

1. Langkah prediksi; Diberikan beberapa estimasi $\tilde{\theta}$ dari parameter yang tidak diketahui, prediksi dari pengamatan yang pada statistic sufficient
2. Langkah Estimasi; Gunakan prediksi statistic sufficient untuk menghitung estimasi revisi dari parameter.

Ulangi perhitungan dari satu langkah ke langkah selanjut hingga mendapatkan estimasi revisi yang tidak terlalu berbeda dari estimasi yang diperoleh dari iterasi sebelumnya.

Diberikan pengamatan $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ merupakan sampel acak dari populasi yang berdistribusi normal sebanyak p variabel. Algoritma - EM didasarkan pada statistic data lengkap

$$T_1 = \sum_{j=1}^n \mathbf{x}_j = n\bar{\mathbf{x}} \quad \text{dan} \quad T_2 = \sum_{j=1}^n \mathbf{x}_j \mathbf{x}_j' = (n-1)\mathbf{S} + n\bar{\mathbf{x}}\bar{\mathbf{x}}'$$

Diasumsikan bawah parameter populasi μ dan Σ tidak diketahui dan harus diestimasi

Langkah Prediksi. Untuk setiap vektor \mathbf{x}_j dengan nilai missing, misalkan $\mathbf{x}_j^{(1)}$ menyatakan komponen missing dan $\mathbf{x}_j^{(2)}$ komponen yang ada. Selanjutnya, $\mathbf{x}'_j = \left[\mathbf{x}_j^{(1)}, \mathbf{x}_j^{(2)} \right]$

Diberikan estimasi $\tilde{\boldsymbol{\mu}}$ dan $\tilde{\boldsymbol{\Sigma}}$ dari langkah estimasi, gunakan rata-rata dari syarat distribusi normal dari $\mathbf{x}^{(1)}$, diberikan $\mathbf{x}^{(2)}$ untuk mengestimasi nilai missing.

$$\tilde{\mathbf{x}}_j^{(1)} = E\left(\mathbf{X}_j^{(1)} \mid \mathbf{x}_j^{(2)}; \tilde{\boldsymbol{\mu}}, \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}\right) = \tilde{\boldsymbol{\mu}}^{(1)} + \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{12} \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{22}^{-1} \left(\mathbf{x}_j^{(2)} - \tilde{\boldsymbol{\mu}}^{(2)}\right) \quad (0.72)$$

Estimasi kontribusi dari $\mathbf{x}_j^{(1)}$ pada \mathbf{T}_1

Selanjutnya, kontribusi estimasi dari $\mathbf{x}_j^{(1)}$ pada \mathbf{T}_2

$$\overline{\mathbf{x}_j^{(1)} \mathbf{x}_j^{(1)'}} = E\left(\mathbf{X}_j^{(1)} \mathbf{X}_j^{(1)' } \mid \mathbf{x}_j^{(2)}; \tilde{\boldsymbol{\mu}}, \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}\right) = \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{11} + \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{12} \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{22}^{-1} \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{21} + \tilde{\mathbf{x}}_j^{(1)} \tilde{\mathbf{x}}_j^{(1)'} \quad (0.73)$$

Dan

$$\overline{\mathbf{x}_j^{(1)} \mathbf{x}_j^{(2)'}} = E\left(\mathbf{X}_j^{(1)} \mathbf{X}_j^{(2)'} \mid \mathbf{x}_j^{(2)}; \tilde{\boldsymbol{\mu}}, \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}\right) = \tilde{\mathbf{x}}_j^{(1)} \mathbf{x}_j^{(2)'}$$

Langkah estimasi; Hitung estimasi maksimum likelihood revisi

$$\tilde{\boldsymbol{\mu}} = \frac{\tilde{\mathbf{T}}_1}{n}, \quad \tilde{\boldsymbol{\Sigma}} = \frac{1}{n} \tilde{\mathbf{T}}_2 - \tilde{\boldsymbol{\mu}} \tilde{\boldsymbol{\mu}}' \quad (0.74)$$

Untuk memudahkan pemahaman tentang algoritma-EM, perhatikan contoh berikut

■ Contoh (Ilustrasi Algoritma-EM)

Estimasi rata-rata populasi normal $\boldsymbol{\mu}$ dan matriks kovariansi $\boldsymbol{\Sigma}$ menggunakan data yang tidak lengkap.

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} - & 0 & 3 \\ 7 & 2 & 6 \\ 5 & 1 & 2 \\ - & - & 5 \end{bmatrix}$$

Dari matriks data tersebut, diketahui $n = 4$ dan $p = 3$ dan bagian dari vektor pengamatan \mathbf{x}_1 dan \mathbf{x}_4 missing.

Dari sampel awal, dapat dihitung nilai statistik

$$\tilde{\mu}_1 = \frac{7+5}{2} = 6, \quad \tilde{\mu}_2 = \frac{0+2+1}{3} = 1, \quad \tilde{\mu}_3 = \frac{3+6+2+5}{4} = 4,$$

Selanjutnya hitung estimasi matriks kovariansi. Konstruksi estimasi tersebut menggunakan pembagi n karena algoritma merupakan hasil dari maksimum likelihood,

$$\tilde{\sigma}_{11} = \frac{(6-6)^2 + (7-6)^2 + (5-6)^2 + (6-6)^2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\tilde{\sigma}_{22} = \frac{(0-1)^2 + (2-1)^2 + (1-1)^2 + (1-1)^2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\tilde{\sigma}_{12} = \frac{(6-6)(0-1) + (7-6)(2-1) + (5-6)(1-1) + (6-6)(1-1)}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\tilde{\sigma}_{23} = \frac{3}{4}$$

$$\tilde{\sigma}_{13} = 1$$

Komponen pertama dari vektor \mathbf{x}_1 adalah missing, sehingga kita partisi $\tilde{\boldsymbol{\mu}}$ dan $\tilde{\boldsymbol{\Sigma}}$ sebagai

$$\tilde{\boldsymbol{\mu}} = \begin{bmatrix} \tilde{\mu}_1 \\ \tilde{\mu}_2 \\ \tilde{\mu}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{\mu}^{(1)} \\ \tilde{\mu}^{(2)} \end{bmatrix},$$

$$\tilde{\boldsymbol{\Sigma}} = \begin{bmatrix} \tilde{\sigma}_{11} & \tilde{\sigma}_{12} & \tilde{\sigma}_{13} \\ \tilde{\sigma}_{12} & \tilde{\sigma}_{22} & \tilde{\sigma}_{23} \\ \tilde{\sigma}_{13} & \tilde{\sigma}_{23} & \tilde{\sigma}_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{11} & \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{12} \\ \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{21} & \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{22} \end{bmatrix}$$

dan prediksi

$$\begin{aligned} \tilde{x}_{11} &= \tilde{\mu}_1 + \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{12} \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{12}^{-1} \begin{bmatrix} x_{12} - \tilde{\mu}_2 \\ x_{13} - \tilde{\mu}_3 \end{bmatrix} \\ &= 6 + \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}, 1 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{5}{2} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 - 1 \\ 3 - 4 \end{bmatrix} \\ &= 5.73 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tilde{x}_{11}^2 &= \tilde{\sigma}_{11} - \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{12} \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{12}^{-1} \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{21} + \tilde{x}_{11}^2 \\ &= \frac{1}{2} - \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}, 1 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{5}{2} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + (5.73)^2 \\ &= 32.99 \end{aligned}$$

$$\widehat{x_{11} [x_{12}, x_{13}]} = \tilde{x}_{11} [x_{12}, x_{13}] = 5.73 [0, 3] = [0, 17.18]$$

Untuk dua komponen missing yang lainnya, x_4 partisi $\tilde{\boldsymbol{\mu}}$ dan $\tilde{\boldsymbol{\Sigma}}$ sebagai

$$\tilde{\boldsymbol{\mu}} = \begin{bmatrix} \tilde{\mu}_1 \\ \tilde{\mu}_2 \\ \tilde{\mu}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{\mu}^{(1)} \\ \tilde{\mu}^{(2)} \end{bmatrix}, \quad \tilde{\boldsymbol{\Sigma}} = \begin{bmatrix} \tilde{\sigma}_{11} & \tilde{\sigma}_{12} & \tilde{\sigma}_{13} \\ \tilde{\sigma}_{12} & \tilde{\sigma}_{22} & \tilde{\sigma}_{23} \\ \tilde{\sigma}_{13} & \tilde{\sigma}_{23} & \tilde{\sigma}_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{11} & \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{12} \\ \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{21} & \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{22} \end{bmatrix}$$

dan prediksi

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} x_{41} \\ x_{42} \end{bmatrix} &= E \left(\begin{bmatrix} X_{41} \\ X_{42} \end{bmatrix} \middle| x_{43} = 5; \tilde{\boldsymbol{\mu}}, \tilde{\boldsymbol{\Sigma}} \right) \\
&= \begin{bmatrix} \tilde{\mu}_1 \\ \tilde{\mu}_2 \end{bmatrix} + \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{12} \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{22}^{-1} (x_{43} - \tilde{\mu}_3) \\
&= \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{3}{4} \end{bmatrix} \left(\frac{5}{2} \right)^{-1} (5 - 4) \\
&= \begin{bmatrix} 6.4 \\ 1.3 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Untuk kontribusi pada \mathbf{T}_1 .

Latihan Soal

5. 1. (a) Evaluasi T^2 untuk menguji $H_0 : \boldsymbol{\mu}' = [7 \ 11]$ dengan menggunakan data

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 2 & 12 \\ 8 & 9 \\ 6 & 9 \\ 8 & 10 \end{bmatrix}$$

- (b) tentukan distribusi dari T^2 untuk keadaan (a)
(c) Gunakan (a) dan (b), untuk menguji H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$, Kesimpulan apa yang anda dapat ambil?
5. 2. Gunakan data dalam 5.1. Periksa bahwa T^2 tidak mengalami perubahan jika pengamatan \mathbf{x}_j , $j = 1, 2, 3$ diganti dengan $\mathbf{C}\mathbf{x}_j$, dimana

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Perhatikan bahwa pengamatan

$$\mathbf{C}\mathbf{x}_j = \begin{bmatrix} x_{j1} - x_{j2} \\ x_{j1} + x_{j2} \end{bmatrix}$$

Menghasilkan matriks pengamatan

$$\begin{bmatrix} (6 - 9) & (10 - 6) & (8 - 3) \\ (6 + 9) & (10 + 6) & (8 + 3) \end{bmatrix}'$$

5. 3. (a) gunakan rumus pada persamaan (5-15) untuk mengevaluasi data dalam latihan 5.1
- (b) Gunakan data dalam latihan 5.1 untuk mengevaluasi Γ , juga evaluasi lambda wilk

BAB V

MEMBANDINGKAN BEBERAPA RATA-RATA MULTIVARIAT

1. Perbandingan Berpasangan dan Rancangan Pengukuran Berulang

Perbandingan Berpasangan

Pengukuran dari eksperimen yang berbeda biasanya disimpan dalam himpunan yang berbeda dimaksudkan untuk melihat apakah respon pada setiap himpunan data dari eksperimen-eksperimen tersebut berbeda secara signifikans. Sebagai contoh, Kemanjuran suatu obat herbal baru atau titik jenuh kampanye melalui iklan mungkin saja ditentukan melalui perbandingan pengukuran sebelum “perlakuan” (obat herbal atau iklan) dengan setelah “perlakuan”. Dalam situasi yang lain, dua atau lebih perlakuan dapat dilakukan pada unit eksperimen yang sama, dan respon dapat dibandingkan untuk menilai efek dari perlakuan.

Satu pendekatan yang rasional untuk membandingkan dua perlakuan, atau ada tidaknya efek dari suatu perlakuan, adalah dengan cara melakukan kedua perlakuan pada unit yang identic. Pasangan respon selanjutnya dimungkinkan untuk dianalisis dengan menghitung perbedaan antara keduanya, cara yang demikian dimaksudkan untuk mengeliminasi pengaruh variasi dari unit-ke-unit.

Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan perbandingan berpasangan multivariate, kita ingatkan kembali perbandingan

berpasangan pada kasus univariate untuk memudahkan dalam memahami masalah yang akan didiskusikan.

Misalkan X_{i1} menyatakan respon pada perlakuan 1 (atau respon sebelum perlakuan), dan misalkan X_{i2} menyatakan respon pada perlakuan 2 (atau respon setelah perlakuan) untuk perlakuan ke- i . Pasangan (X_{i1}, X_{i2}) merupakan hasil pengukuran pada unit ke- i . Perbedaan antara keduanya adalah

$$D_i = X_{i1} - X_{i2}, i = 1, 2, \dots, n \quad (0.75)$$

Distribusi dari data perbedaan antara kedua pengamatan diketahui berdistribusi normal, $N(\delta, \sigma_d^2)$ dengan statistik

$$t = \frac{\bar{D} - \delta}{s_d / \sqrt{n}} \quad (0.76)$$

Dimana

$$\bar{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i \quad \text{dan} \quad s_d^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2 \quad (0.77)$$

Berdistribusi t dengan derajat bebas $n - 1$. Dengan suatu konsukuensi, pada uji hipotesis pada level $-\alpha$ dari

$$H_0 : \delta = 0 \quad \text{lawan} \quad H_1 : \delta \neq 0$$

Diuji dengan membandingkan $|t|$ dengan $t_{n-1;(\alpha/2)}$ persentil ke- $100(\alpha/2)$ dari distribusi- t dengan derajat bebas $n - 1$. Interval kepercayaan $100(1 - \alpha)\%$ untuk perbedaan rata-rata $\delta = E(X_{i1} - X_{i2})$ diberikan oleh persamaan berikut

$$\bar{d} - t_{n-1;(\alpha/2)} \frac{s_d}{\sqrt{n}} \leq \delta \leq \bar{d} + t_{n-1;(\alpha/2)} \frac{s_d}{\sqrt{n}} \quad (0.78)$$

■

Rangkuman Prosedur Pengujian Perbandingan rata-rata berpasangan Univariat

Tujuan: Membandingkan dua rata-rata dari satu atau dua populasi

Asumsi

Langkah-Langkah Pengujian:

1. Hitung Selisih dari pengamatan satu dengan pengamatan kedua, gunakan rumus pada persamaan 0.75
2. Hitung statistic dari data selisih antara kedua data, dengan rumus 0.77
3. Rumuskan Hipotesis yang akan diuji; $H_0 : \delta = 0$
4. Hitung Nilai Statistik Uji, gunakan persamaan 0.76
5. Tentukan Nilai kritis, $t_{n-1;(\alpha/2)}$ pada taraf signifikansi yang dipilih, α .
6. Keputusan; Tolak $H_0 : \delta = 0$ jika $|t| > t_{n-1;(\alpha/2)}$

c. Perbandingan Berpasangan Multivariat

Dari kasus univariat untuk perbandingan berpasangan, kasus tersebut dalam diperluas penggunaan ke masalah multivariate. Perbedaannya terletak pada, p respon, dua perlakuan, dan n unit eksperimen. Kita indentifikasi p respon dalam unit ke- i sebagai

$$\begin{aligned} X_{1j1} &= \text{Variabel 1 dibawah perlakuan 1} \\ X_{1j2} &= \text{Variabel 2 dibawah perlakuan 1} \\ &\vdots \\ X_{1jp} &= \text{Variabel p dibawah perlakuan 1} \\ \hline X_{2j1} &= \text{Variabel 1 dibawah perlakuan 2} \\ X_{2j2} &= \text{Variabel 2 dibawah perlakuan 2} \\ &\vdots \\ X_{2jp} &= \text{Variabel p dibawah perlakuan p} \end{aligned}$$

dan p pasangan variabel acak berbeda menjadi

$$\begin{aligned}
D_{i1} &= X_{1j1} - X_{2j1} \\
D_{i2} &= X_{1j2} - X_{2j2} \\
&\vdots \\
D_{ip} &= X_{1jp} - X_{2jp}
\end{aligned} \tag{0.79}$$

Misalkan $\mathbf{D}'_i = [D_{i1}, D_{i2}, \dots, D_{ip}]$, dan asumsikan, untuk $i = 1, 2, \dots, n$, jika

$$E(\mathbf{D}_i) = \boldsymbol{\delta} = \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_p \end{bmatrix} \text{ dan } \text{cov}(\mathbf{D}_i) = \boldsymbol{\Sigma}_d \tag{0.80}$$

Jika $\mathbf{D}_1, \mathbf{D}_2, \dots, \mathbf{D}_n$ merupakan vektor acak yang independen dan berdistribusi normal, $N_p(\boldsymbol{\delta}, \boldsymbol{\Sigma}_d)$, maka inferensi sekitar vektor perbedaan rata-rata $\boldsymbol{\delta}$ dapat didasarkan pada statistic T^2 , yaitu

$$T^2 = n(\bar{\mathbf{D}} - \boldsymbol{\delta})' \mathbf{S}_d^{-1} (\bar{\mathbf{D}} - \boldsymbol{\delta}) \tag{0.81}$$

dimana

$$\bar{\mathbf{D}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbf{D}_j \text{ dan } \mathbf{S}_d = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\mathbf{D}_i - \bar{\mathbf{D}})(\mathbf{D}_i - \bar{\mathbf{D}})' \tag{0.82}$$

Teorema 6.1.

Misalkan selisih $\mathbf{D}_1, \mathbf{D}_2, \dots, \mathbf{D}_n$ merupakan sampel acak dari populasi yang berdistribusi normal, $N_p(\boldsymbol{\delta}, \boldsymbol{\Sigma}_d)$.

Maka

$$T^2 = n(\bar{\mathbf{D}} - \boldsymbol{\delta})' \mathbf{S}_d^{-1} (\bar{\mathbf{D}} - \boldsymbol{\delta})$$

berdistribusi

$$\left[\frac{(n-1)p}{(n-p)} \right] F_{p, n-p}$$

Untuk sembarang nilai δ dan Σ benar. ■

Suatu daerah kepercayaan $100(1-\alpha)$ untuk δ sedemikian hingga

$$(\bar{\mathbf{d}} - \delta)' \mathbf{S}_d^{-1} (\bar{\mathbf{d}} - \delta) \leq \frac{(n-1)p}{n(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha) \quad (0.83)$$

Demikian halnya dengan interval kepercayaan simultan $100(1-\alpha)$ untuk perbedaan rata-rata individual δ_i diberikan oleh

$$\delta_i : \bar{d}_i \pm \sqrt{\frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha)} \sqrt{\frac{s_{d_i}^2}{n}} \quad (0.84)$$

Dimana \bar{d}_i merupakan elemen ke- i dari $\bar{\mathbf{d}}$ dan $s_{d_i}^2$ merupakan elemen diagonal ke- i dari \mathbf{S}_d .

Untuk $n-p$ cukup besar, $\left[\frac{(n-1)p}{(n-p)} \right] F_{p, n-p}(\alpha) = \chi_p^2(\alpha)$ dan asumsi normal tidak dibutuhkan.

Interval kepercayaan simultan $100(1-\alpha)$ metode banferroni untuk selisih individual rata-rata adalah

$$\delta_i : \bar{d}_i \pm t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right) \sqrt{\frac{s_{d_i}^2}{n}} \quad (0.85)$$

Dimana $t_{n-1}(\alpha/2p)$ merupakan persentil ke $100(\alpha/2p)$ dari distribusi t dengan derajat bebas $n-1$.

■ **Contoh 6.1. (Memeriksa perbedaan rata-rata dengan pengamatan berpasangan)**

Suatu perusahaan merencanakan perlakuan air buangan yang diperlukan untuk memonitor buangannya ke sungai dan anak sungai yang sesuai dengan peraturan. Perhatian tentang reliabilitas data dari satu program monitoring diambil untuk diteliti pada dua laboratorium untuk keperluan pengujian. Setengah dari sampel dikirim ke lab 1, dan setengah yang lainnya dikirim ke lab 2. Pengukuran bio-chemical oxygen deman (BOD) dan suspend solid (SS) telah dilakukan, untuk sampel $n = 11$ terpisah, dari kedua lab tersebut. Berikut datanya

Sampel i	Lab 1		Lab 2	
	x_{1j1}	x_{1j1}	x_{1j1}	x_{1j1}
1	6	27	25	15
2	6	23	28	13
3	18	64	36	22
4	8	44	35	29
5	11	30	15	31
6	34	75	44	64
7	28	26	42	30
8	71	124	54	64
9	43	54	34	56
10	33	30	29	20
11	20	14	39	21

Apakah hasil analisis kedua lab sama? Jika berbeda, apa penyebabnya?

Statistik T^2 untuk menguji hipotesis $H_0 : \delta' = [\delta_1, \delta_2] = [0, 0]$ dikonstruksi dari perbedaan pasangan pengamatan:

d_{i1}	-19	-22	-18	-27	-4	-10	-14	17	9	4	-19
d_{i2}	12	10	42	15	-1	11	-4	60	-2	10	-7

Dari selisih tersebut

$$\bar{\mathbf{d}} = \begin{bmatrix} \bar{d}_1 \\ \bar{d}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9.36 \\ 13.27 \end{bmatrix}, \mathbf{S}_d = \begin{bmatrix} 199.26 & 88.38 \\ 88.38 & 418.61 \end{bmatrix}$$

dan

$$T^2 = 11 \begin{bmatrix} -9.36 & 13.27 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.0055 & -0.0012 \\ -0.0012 & 0.0026 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -9.36 \\ 13.27 \end{bmatrix} = 16.6$$

Ambil $\alpha = 0.05$, diperoleh

$$\left[\frac{p(n-1)}{(n-p)} \right] F_{p, n-p}(0.05) = \left[\frac{2(10)}{9} \right] F_{2,9}(0.05) = 9.47$$

Karena $T^2 = 13.6 > 9.47$, karena itu tolak H_0 dan disimpulkan bahwa terdapat selisih yang tidak nol antara pengukuran dari kedua lab tersebut. Hal tersebut menunjukkan, dari inspeksi dari data, bahwa lab 1 cenderung menghasilkan pengukuran BOD yang rendah dan pengukuran SS yang tinggi dibanding dengan lab 2. Interval kepercayaan simultan 95% untuk selisih rata-rata δ_1 dan δ_2 dapat dihitung dengan persamaan 0.83. Interval-interval tersebut adalah

$$\delta_1 : \bar{d}_1 \pm \sqrt{\frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha)} \sqrt{\frac{s_{d_1}^2}{n}} = -9.36 \pm \sqrt{9.47} \sqrt{\frac{199.26}{11}}$$

$$\delta_2 : \bar{d}_2 \pm \sqrt{\frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha)} \sqrt{\frac{s_{d_2}^2}{n}} = 13.27 \pm \sqrt{9.47} \sqrt{\frac{418.61}{11}}$$

Interval kepercayaan simultan 95% termasuk nol, Tolak H_0 pada level signifikansi $\alpha = 0.05$. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil?

■

Dalam contoh 6.1, peneliti secara actual membagi sampel ke dalam dua bagian secara langsung untuk keperluan analisis kimia. Kemudian, kedua laboratorium dimana sampel tersebut akan diteliti kemungkinan bekerja pada kondisi yang tidak sama dapat terjadi,

kompetensi dari laboratorium, teknik pengukuran dan seterusnya akan memberikan pengaruh terhadap hasil analisis.

Rangkuman Prosedur Pengujian Perbandingan rata-rata berpasangan Multivariate

Tujuan: Membandingkan dua rata-rata dari satu atau dua populasi


Asumsi

Langkah-Langkah Pengujian:

1. Hitung Selisih dari pengamatan satu dengan pengamatan kedua, gunakan rumus pada persamaan 0.79
2. Hitung statistic dari data selisih antara kedua data, dengan rumus 0.82
3. Rumuskan Hipotesis yang akan diuji; $H_0 : \delta = 0$
4. Hitung Nilai Statistik Uji, gunakan persamaan 0.81
5. Tentukan Nilai kritis, $t_{n-1;(\alpha/2)}$ pada taraf signifikansi yang dipilih, α .
6. Keputusan; Tolak $H_0 : \delta = 0$ jika $|t| > t_{n-1;(\alpha/2)}$

Akan tetapi, ketika peneliti dapat mengontrol penetapan perlakuan pada unit eksperimen, pasangan unit eksperimen yang tepat dan penetapan pengacakan perlakuan dapat mempertinggi hasil analisis statistic. Artinya, penetapan kelompok unit eksperimen yang identic secara acak dari perlakuan 1 pada suatu unit dan perlakuan 2 pada unit yang lain akan sangat membantu dalam mengeliminasi sumber variasi yang tak terkontrol. Pengacakan yang saling independen harus diterapkan pada setiap pasangan, berikut proses:

Rancangan eksperimen untuk Perbandingan Berpasangan



Untuk perbandingan berpasangan, \bar{d} sebagai rata-rata selisih dan S_d sebagai variansi selisih, dan karena itu T^2 dapat dihitung dari sampel penuh statistik \bar{x} merupakan vektor berukuran $2p \times 1$ dari rata-rata sampel untuk p variabel pada kedua perlakuan, yaitu

$$\bar{x}' = [\bar{x}_{11}, \bar{x}_{12}, \dots, \bar{x}_{1p}, \bar{x}_{21}, \bar{x}_{22}, \dots, \bar{x}_{2p}] \quad (0.86)$$

Dan S merupakan matriks berukuran $2p \times 2p$ dari variansi –kovariansi sampel, susunannya

$$S = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_{11} & \mathbf{S}_{12} \\ \mathbf{S}_{21} & \mathbf{S}_{22} \end{bmatrix} \quad (0.87)$$

$\begin{matrix} (p \times p) & (p \times p) \\ (p \times p) & (p \times p) \end{matrix}$

Dari persamaan 0.87, matriks S_{11} memuat variansi-kovariansi sampel untuk p variabel pada perlakuan pertama. Cara yang sama untuk S_{22} demikian halnya dengan S_{12} dan S_{21} .

Rancangan matriks

$$\mathbf{C}_{(p \times 2p)} = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \dots & 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 & \dots & -1 \end{array} \right] \quad (0.88)$$

\uparrow
 kolom_(p+1)

Membandingkan Percobaan untuk Rancangan Pengukuran Berulang
 Situasi dimana m perlakuan dibandingkan dengan satu variabel respon. Setiap subjek atau unit eksperimen menerima setiap perlakuan sekali sepanjang satu periode waktu.

Pengamatan ke- i adalah

$$\mathbf{X}_i = \begin{bmatrix} X_{i1} \\ X_{i2} \\ \vdots \\ X_{im} \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

Dimana X_{ij} merupakan respon pada perlakuan ke- i pada unit ke j . Pengukuran berulang merupakan fakta bahwa semua perlakuan dilakukan pada setiap unit. Untuk tujuan perbandingan, perhatikan kontras komponen dari $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{E}(X_i)$

$$\begin{bmatrix} \mu_1 - \mu_2 \\ \mu_1 - \mu_3 \\ \vdots \\ \mu_1 - \mu_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_m \end{bmatrix} = \mathbf{C}_1 \boldsymbol{\mu}$$

Atau

$$\begin{bmatrix} \mu_2 - \mu_1 \\ \mu_3 - \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_m - \mu_{m-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_m \end{bmatrix} = \mathbf{C}_2 \boldsymbol{\mu}$$

\mathbf{C}_1 dan \mathbf{C}_2 disebut matriks kontras, karena baris $m - 1$ independen secara linear dan masing-masing adalah vektor kontras

Ketika rata-rata perlakuan adalah sama. Secara umum hipotesis bahwa tidak ada perbedaan dalam perlakuan menjadi $\mathbf{C}\boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$ untuk sembarang kontras.

Pengujian Kesamaan Perlakuan dalam Rancangan Pengukuran Berulang

1. Sampel pengamatan dari populasi yang berasal dari distribusi normal, $N_m(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, dan misalkan \mathbf{C} merupakan matriks kontras. Dengan

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i \quad \text{dan} \quad \mathbf{S} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})' \quad (0.89)$$

2. Hipotesis $H_0 : \mathbf{C}\boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$ lawan $H_1 : \mathbf{C}\boldsymbol{\mu} \neq \mathbf{0}$
3. Taraf Signifikansi, α
4. Statistika Uji

$$T^2 = n(\mathbf{C}\bar{\mathbf{x}})'(\mathbf{CSC}')^{-1}\mathbf{C}\bar{\mathbf{x}}$$

5. Daerah Kepercayaan untuk kontras $\mathbf{C}\boldsymbol{\mu}$ dengan $\boldsymbol{\mu}$ sebagai rata-rata populasi, himpunan semua $\mathbf{C}\boldsymbol{\mu}$, yaitu

$$n(\mathbf{C}\bar{\mathbf{x}} - \mathbf{C}\boldsymbol{\mu})'(\mathbf{CSC}')^{-1}(\mathbf{C}\bar{\mathbf{x}} - \mathbf{C}\boldsymbol{\mu}) \leq G \quad (0.90)$$

Dimana $G = \frac{(n-1)(m-1)}{(n-m+1)} F_{m-1, n-m+1}(\alpha)$ dan $\bar{\mathbf{x}}$ dan \mathbf{S}

sebagaimana yang didefinisikan pada persamaan 0.89.

6. Interval kepercayaan simultan $100(1-\alpha)\%$ untuk satu kontras $\mathbf{c}'\boldsymbol{\mu}$ untuk sembarang vektor kontras,

$$\mathbf{c}'\boldsymbol{\mu} : \mathbf{c}'\bar{\mathbf{x}} \pm \sqrt{\frac{(n-1)(m-1)}{(n-m+1)} F_{m-1, n-m+1}} \sqrt{\frac{\mathbf{c}'\mathbf{S}\mathbf{c}}{n}}$$

0.91

7. Keputusan, Tolak H_0 jika

$$T^2 = n(\mathbf{C}\bar{\mathbf{x}})'(\mathbf{CSC}')^{-1}\mathbf{C}\bar{\mathbf{x}} > G \quad (0.92)$$


Untuk G sebagaimana pada persamaan 0.90.

dimana $F_{m-1, n-m+1}(\alpha)$ merupakan persentil atas $100(1-\alpha)\%$ dari distribusi F dengan $m-1$ dan $n-m+1$ sebagai derajat bebas.

■ Contoh 6.1. Pengembangan bius (anestesi)

dikembangkan pertama kali untuk meneliti efeknya terhadap binatang. Dalam satu penelitian, 19 anjing diberikan pentobarbital. Setiap anjing

selanjutnya di berikan carbon dioxide, CO₂, pada setiap dua level. Selanjutnya ditambahkan halothane (H), kemudian diberikan lagi CO₂. Respon, heartbeats (denyut jantung) permilisecond, diukur atau terdapat empat kombinasi perlakuan:



Perlakuan 1 = CO₂ tekanan tinggi tanpa H

Perlakuan 2 = CO₂ tekanan rendah tanpa H

Perlakuan 3 = CO₂ tekanan tinggi dengan H

Perlakuan 4 = CO₂ tekanan rendah dengan H

Kita akan menganalisis efek anestesi dari tekanan CO₂ Halothane dari rancangan pengukuran berulang

Solusi 6.2. Terdapat 3 kontras perlakuan yang mungkin untuk diperhatikan dalam percobaan ini. Misalkan $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ merupakan rata-rata respon untuk perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3 dan perlakuan 4 yang bersesuaian. Selanjutnya

$$\begin{aligned} (\mu_3 + \mu_4) - (\mu_1 + \mu_2) &= \left(\begin{array}{l} \text{Kontras Halothane mewakili} \\ \text{selisih antara ada dan tidak} \\ \text{adanya halothane} \end{array} \right) \\ (\mu_1 + \mu_3) - (\mu_2 + \mu_4) &= \left(\begin{array}{l} \text{Kontras CO}_2 \text{ mewakili} \\ \text{selisih antara tekanan} \\ \text{tinggi dan rendah} \end{array} \right) \\ (\mu_1 + \mu_4) - (\mu_2 + \mu_3) &= \left(\begin{array}{l} \text{Kontras mewakili pengaruh} \\ \text{halothane pada tekanan CO}_2 \\ \text{"interaksi"} \end{array} \right) \end{aligned}$$

dengan $\mu' = [\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4]$ dengan matriks kontras C adalah

$$C = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Tabel 6.2 Data Tidurnya Anjing

Anjing	Perlakuan			
	1	2	3	4
1	426	609	556	600
2	253	236	392	395
3	359	433	349	357
4	432	431	522	600
5	405	426	513	513
6	324	438	507	539
7	310	312	410	456
8	326	326	350	504
9	375	447	547	548
10	286	286	403	422
11	349	382	473	497
12	429	410	488	547
13	348	377	447	514
14	412	473	472	446
15	347	326	455	468
16	434	458	637	524
17	364	367	432	469
18	320	395	508	531
19	397	556	645	625

Dari Table 6.2, diperoleh

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 368.21 \\ 404.63 \\ 479.26 \\ 502.89 \end{bmatrix} \text{ dan}$$

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 2819.29 & & & \\ 3568.42 & 7962.14 & & \\ 2943.49 & 5303.98 & 6851.32 & \\ 2295.35 & 4065.44 & 4499.63 & 4878.99 \end{bmatrix}$$

Dari matriks kontras dan nilai vektor rata-rata serta matrik variansi, diperoleh

$$\mathbf{C}\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 209.31 \\ -60.05 \\ -12.79 \end{bmatrix}; \mathbf{CSC}' = \begin{bmatrix} 9432.32 & 1098.92 & 927.62 \\ 1098.92 & 5195.84 & 914.54 \\ 927.62 & 914.54 & 7557.44 \end{bmatrix}$$

dan

$$T^2 = n(\mathbf{C}\bar{\mathbf{x}})'(\mathbf{CSC}')^{-1}(\mathbf{C}\bar{\mathbf{x}}) = 10(6.11) = 166$$

Untuk $\alpha=0.05$.

$$\begin{aligned} \frac{(n-1)(m-1)}{(n-m+1)} F_{m-1, n-m+1}(\alpha) &= \frac{18(3)}{16} F_{3,16}(0.05) \\ &= \frac{18(3)}{16}(3.24) \\ &= 10.94 \end{aligned}$$

Untuk $T^2 = 116 > 10.94$, tolak $H_0 : \mathbf{C}\boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$ (tidak ada efek perlakuan)

Untuk melihat apakah kontraks berkaitan dengan penolakan hipotesis null, untuk mengetahui hal tersebut, berikut penjelasannya.

Konstruksi interval kepercayaan simultan pada taraf kepercayaan 95% untuk keseluruhan kontras, Kontras

$$\mathbf{c}'_1 \boldsymbol{\mu} = (\mu_3 + \mu_4) - (\mu_1 + \mu_2) = \text{Pengaruh halothane}$$

Diestimasi dengan interval

$$\begin{aligned} (\bar{x}_3 + \bar{x}_4) - (\bar{x}_1 + \bar{x}_2) &\pm \sqrt{\frac{18(3)}{16} F_{3,16}(0.05)} \sqrt{\frac{\mathbf{c}'_1 \mathbf{S} \mathbf{c}_1}{19}} \\ &= 209.31 \pm \sqrt{10.94} \sqrt{\frac{9432.32}{19}} \\ &= 209.31 \pm 73.70 \end{aligned}$$

Dimana \mathbf{c}'_1 adalah baris pertama dari matriks \mathbf{C} . Dengan cara yang sama untuk kontras yang lain diestimasi dengan

$$(\mu_1 + \mu_3) - (\mu_2 + \mu_4) = \text{Pengaruh halothane CO}_2$$

Diestimasi dengan interval

$$-60.05 \pm \sqrt{10.94} \sqrt{\frac{5195.84}{19}} = -60.05 \pm 54.70$$

$$(\mu_1 + \mu_4) - (\mu_2 + \mu_3) = \text{Interaksi H-CO}_2$$

Diestimasi dengan interval

$$-12.79 \pm \sqrt{10.94} \sqrt{\frac{7557.44}{19}} = -12.79 \pm 65.97$$

Interval kepercayaan pertama, menyatakan ada efek halothane



2. Membandingkan Vektor Rata-Rata Dua Populasi

Statistic- T^2 untuk menguji kesamaan vektor rata-rata dari dua populasi multivariate dapat dikembangkan dari prosedur univariat.

Statistik- T^2 tepat untuk membandingkan respon dari satu himpunan perlakuan (populasi 1) dengan respon lain yang independen (populasi 2). Perbandingan dapat dibuat tanpa secara eksplisit mengontrol variabilitas unit-ke-unit, sebagaimana kasus perbandingan berpasangan.

Perhatikan sampel acak berukuran n_1 dari populasi 1 dan sampel acak berukuran n_2 dari populasi 2. Pengamatan pada p variabel disusun sebagai berikut

Sampel	Ringkasan Statistik
Populasi 1 $\mathbf{x}_{11}, \mathbf{x}_{12}, \dots, \mathbf{x}_{1n_1}$	$\bar{\mathbf{x}}_1 = \frac{1}{n_1} \sum_{j=1}^{n_1} x_{1j} \quad \mathbf{S}_1 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{j=1}^{n_1} (\mathbf{x}_{1j} - \bar{\mathbf{x}}_1)(\mathbf{x}_{1j} - \bar{\mathbf{x}}_1)'$
Populasi 2 $\mathbf{x}_{21}, \mathbf{x}_{22}, \dots, \mathbf{x}_{2n_2}$	$\bar{\mathbf{x}}_2 = \frac{1}{n_2} \sum_{j=1}^{n_2} x_{2j} \quad \mathbf{S}_2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (\mathbf{x}_{2j} - \bar{\mathbf{x}}_2)(\mathbf{x}_{2j} - \bar{\mathbf{x}}_2)'$

Akan dibuat inferensi seputar

$$(\text{vektor rata-rata Pop 1}) - (\text{vektor rata-rata Pop 2}) = \boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2$$

Asumsi berkenaan dengan Struktur Data

1. Sampel $\mathbf{X}_{11}, \mathbf{X}_{12}, \dots, \mathbf{X}_{1n_1}$ adalah sampel acak berukuran n_1 dari populasi p variabel dengan vektor rata-rata $\boldsymbol{\mu}_1$ dan matriks kovariansi $\boldsymbol{\Sigma}_1$.
2. Sampel $\mathbf{X}_{21}, \mathbf{X}_{22}, \dots, \mathbf{X}_{2n_2}$ adalah sampel acak berukuran n_2 dari populasi p variabel dengan vektor rata-rata $\boldsymbol{\mu}_2$ dan matriks kovariansi $\boldsymbol{\Sigma}_2$.
3. $\mathbf{X}_{11}, \mathbf{X}_{12}, \dots, \mathbf{X}_{1n_1}$ dan $\mathbf{X}_{21}, \mathbf{X}_{22}, \dots, \mathbf{X}_{2n_2}$ independen

Asumsi Ketika n_1 dan n_2 Kecil

1. Kedua populasi berdistribusi normal multivariate
2. $\boldsymbol{\Sigma}_1 = \boldsymbol{\Sigma}_2$

Asumsi kedua, bahwa $\boldsymbol{\Sigma}_1 = \boldsymbol{\Sigma}_2$, harus lebih kuat dibanding univariate. Asumsikan pula bahwa beberapa pasangan variansi dan kovariansi sangat dekat kesamaannya.

Ketika $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma$, $\sum_{j=1}^{n_1} (\mathbf{x}_{1j} - \bar{\mathbf{x}}_1)(\mathbf{x}_{1j} - \bar{\mathbf{x}}_1)'$ adalah estimasi dari $(n_1 - 1)\Sigma$ dan $\sum_{j=1}^{n_2} (\mathbf{x}_{2j} - \bar{\mathbf{x}}_2)(\mathbf{x}_{2j} - \bar{\mathbf{x}}_2)'$ merupakan estimasi dari $(n_2 - 1)\Sigma$. Akibatnya, kita dapat menyatukan (pool) informasi dalam kedua sampel dalam rangka mengestimasi kovariansi umum Σ . perhitungannya

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_p &= \frac{\sum_{j=1}^{n_1} (\mathbf{x}_{1j} - \bar{\mathbf{x}}_1)(\mathbf{x}_{1j} - \bar{\mathbf{x}}_1)' + \sum_{j=1}^{n_2} (\mathbf{x}_{2j} - \bar{\mathbf{x}}_2)(\mathbf{x}_{2j} - \bar{\mathbf{x}}_2)'}{n_1 + n_2 - 2} \\ &= \frac{n_1 - 1}{n_1 + n_2 - 2} \mathbf{S}_1 + \frac{n_2 - 1}{n_1 + n_2 - 2} \mathbf{S}_2 \end{aligned} \quad (0.93)$$

Karena $\sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_{1j} - \bar{\mathbf{x}}_1)(\mathbf{x}_{1j} - \bar{\mathbf{x}}_1)'$ mempunyai derajat bebas $n_1 - 1$ dan $\sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_{2j} - \bar{\mathbf{x}}_2)(\mathbf{x}_{2j} - \bar{\mathbf{x}}_2)'$ dengan derajat bebas $n_2 - 1$. Pembagi pada persamaan 0.93 diperoleh dari kombinasi dua derajat bebas.

Untuk menguji hipotesis bahwa $\mu_1 - \mu_2 = \delta_0$,

karena asumsinya adalah independen, maka $\text{cov}(\bar{\mathbf{X}}_1, \bar{\mathbf{X}}_2) = 0$, akibatnya

$$\begin{aligned} \text{cov}(\bar{\mathbf{X}}_1 - \bar{\mathbf{X}}_2) &= \text{cov}(\bar{\mathbf{X}}_1) + \text{cov}(\bar{\mathbf{X}}_2) \\ &= \frac{1}{n_1} \Sigma + \frac{1}{n_2} \Sigma \\ &= \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) \Sigma \end{aligned} \quad (0.94)$$

Karena s_p estimasi dari Σ , nampak bahwa

$$\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) \mathbf{S}_p \text{ merupakan estimasi dari } \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) \Sigma$$

Uji likelihood ratio dari

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0$$

Didasarkan pada kuadrat statistic jarak, T^2 . Tolak H_0 jika

$$T^2 = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \delta_0)' \left[\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) \mathbf{S}_p \right]^{-1} (\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \delta_0) > c^2$$

0.95

Dimana jarak kritis c^2 ditentukan dari distribusi dua-sampel statistic- T^2 .

Teorema 6.1

Jika $\mathbf{X}_{11}, \mathbf{X}_{12}, \dots, \mathbf{X}_{1n_1}$ merupakan sampel acak berukuran n_1 dari populasi berdistribusi normal, $N_p(\mu_1, \Sigma)$ dan sampel acak berukuran n_2 yaitu, $\mathbf{X}_{21}, \mathbf{X}_{22}, \dots, \mathbf{X}_{2n_2}$, independen dari populasi berdistribusi $N_p(\mu_2, \Sigma)$, maka

$$T^2 = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \delta_0)' \left[\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) \mathbf{S}_p \right]^{-1} (\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \delta_0)$$

berdistribusi

$$\frac{(n_1 + n_2 - 2)p}{(n_1 + n_2 - p - 1)} F_{p, n_1 + n_2 - p - 1}$$

akibatnya

$$\begin{aligned}
 & (\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2))' \left[\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) \mathbf{S}_p \right]^{-1} \\
 & (\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2) \leq c^2) = 1 - \alpha
 \end{aligned} \tag{0.96}$$

dimana

$$c^2 = \frac{(n_1 + n_2 - 2)p}{(n_1 + n_2 - p - 1)} F_{p, n_1 + n_2 - p - 1}(\alpha)$$



■ **Contoh 6.3. (Mengkonstruksi Daerah Kepercayaan untuk selisih dua vektor rata-rata.)**

50 buah sabungan batangan dibuat dengan dua cara. Dua karakteristik, $X_1 =$ busa dan $X_2 =$ kelembutan. Ringkasan statistic untuk batang dihasilkan dengan metode 1 dan metode 2 adalah

$$\begin{aligned}
 \bar{x}_1 &= \begin{bmatrix} 8.3 \\ 4.1 \end{bmatrix}, & \mathbf{S}_1 &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \\
 \bar{x}_2 &= \begin{bmatrix} 10.2 \\ 3.9 \end{bmatrix}, & \mathbf{S}_2 &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Menghasil suatu daerah kepercayaan 95% untuk $\mu_1 - \mu_2$.

Pertama, perhatikan bahwa \mathbf{S}_1 dan \mathbf{S}_2 hampir sama, sehingga cukup beralasan untuk digabungkan. Karena itu,

$$\mathbf{S}_p = \frac{49}{98} \mathbf{S}_1 + \frac{49}{98} \mathbf{S}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Demikian halnya

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = \begin{bmatrix} -1.9 \\ 0.2 \end{bmatrix}$$

Sehingga daerah kepercayaan adalah terpusat pada $[-1.9, 0.2]'$. Nilai eigen dan vektor eigen dari S_p diperoleh dari persamaan

$$0 = |S_p - \lambda I| = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 7\lambda + 9$$

Sehingga, $\lambda = (7 \pm \sqrt{49 - 36})/2$. Akibatnya, $\lambda_1 = 5.303$ dan $\lambda_2 = 1.697$, dan vektor eigen yang bersesuaian, e_1 dan e_2 ditentukan dari

$$S_p e_i = \lambda_i e_i, \quad i = 1, 2$$


adalah

$$e_1 = \begin{bmatrix} 0.290 \\ 0.957 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad e_2 = \begin{bmatrix} 0.957 \\ -0.290 \end{bmatrix}$$

$$\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) c^2 = \left(\frac{1}{50} + \frac{1}{50} \right) \frac{(98)(2)}{(97)} F_{2,97}(0.05) = 0.25$$

Karena $F_{2,97}(0.05) = 3.1$, daerah kepercayaan diperluas

$$\sqrt{\lambda_i} \sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) c^2} = \sqrt{\lambda_i} \sqrt{0.25}$$



Unit sepanjang eigen vektor e_i . atau 1.15 unit dalam arah e_1 dan 0.65 unit dalam arah e_2 .



Interval Kepercayaan Simultan

Dimungkinkan untuk menurunkan interval kepercayaan simultan untuk komponen dari vektor $\mu_1 - \mu_2$. Interval kepercayaan tersebut dikembangkan dari mempertimbangkan seluruh kombinasi linear dari perbedaan dalam vektor rata-rata. Asumsinya adalah populasi multivariate berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan kovariansi umum Σ .

Teorema 6.2

Misalkan

$$c^2 = \left[(n_1 + n_2 - 2)p / (n_1 + n_2 - p - 1) \right] F_{p, n_1 + n_2 - p - 1}(\alpha)$$

dengan peluang $1 - \alpha$.

$$\mathbf{a}'(\bar{\mathbf{X}}_1 - \bar{\mathbf{X}}_2) \pm c \sqrt{\mathbf{a}' \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) \mathbf{S}_p \mathbf{a}}$$

Akan meliputi $\mathbf{a}'(\mu_1 - \mu_2)$ untuk semua \mathbf{a} . Untuk suatu $(\mu_{1j} - \mu_{2i})$ akan meliputi

$$(\bar{X}_{1j} - \bar{X}_{2j}) \pm c \sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) S_{i1,p}} \quad \text{untuk } j = 1, 2, \dots, p$$



Keadaan Dua Sampel Ketika $\Sigma_1 \neq \Sigma_2$

Untuk kasus dimana $\Sigma_1 \neq \Sigma_2$, sulit untuk mendapatkan ukuran “jarak” seperti T^2 , yang distribusinya tidak bergantung pada Σ_1, Σ_2 yang tidak diketahui. Uji Bartlett digunakan untuk menguji kesamaan dari Σ_1 dan Σ_2 dalam model variasi yang umum. Hal yang kurang menguntungkan adalah ketika populasinya bukan dari distribusi

normal. Distribusi yang tidak normal dan kovariansi yang tidak sama tidak dapat dipisahkan dengan uji Bartlet.

Suatu metode pengujian kesamaan dua matriks kovariansi yang kurang sensitive terhadap asumsi normal multivariate telah dikemukakan oleh Tiku dan Balakrisnan.

Teorema 6.3.

Misalkan sampel berukuran $n_1 - p$ dan $n_2 - p$ besar. Lalu, suatu ellipsoid kepercayaan dengan pendekatan $100(1 - \alpha)\%$ untuk $\mu_1 - \mu_2$ memenuhi

$$\begin{aligned} & [\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)]' \left[\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 + \frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 \right]^{-1} \\ & [\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)] \leq \chi_p^2(\alpha) \end{aligned}$$

Dimana $\chi_p^2(\alpha)$ adalah persentil ke- (100α) dari distribusi chi-kuadrat dengan derajat bebas p .

Demikian halnya interval kepercayaan simultan $100(1 - \alpha)\%$ untuk semua kombinasi linear $\mathbf{a}'(\mu_1 - \mu_2)$ diberikan oleh

$$\begin{aligned} & \mathbf{a}'(\mu_1 - \mu_2) \text{ dibawah} \\ & \mathbf{a}'(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm \sqrt{\chi_p^2(\alpha)} \sqrt{\mathbf{a}' \left(\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 + \frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 \right) \mathbf{a}} \end{aligned}$$

■

Contoh 6.4. (Prosedur inferensi tentang selisih dalam rata-rata)

Kita akan menganalisis data konsumsi litrik. Pertama hitung

$$\begin{aligned} \frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 + \frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 &= \frac{1}{45} \begin{bmatrix} 13825.3 & 23823.4 \\ 23823.4 & 73107.4 \end{bmatrix} + \frac{1}{55} \begin{bmatrix} 8632.0 & 19616.7 \\ 19616.7 & 55964.5 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 464.17 & 886.08 \\ 886.08 & 2642.15 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Interval kepercayaan simultan 96% untuk kombinasi linear

$$\mathbf{a}'(\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2) = [1, 0] \begin{bmatrix} \mu_{11} - \mu_{21} \\ \mu_{12} - \mu_{22} \end{bmatrix} = \mu_{11} - \mu_{21}$$

dan

$$\mathbf{a}'(\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2) = [0, 1] \begin{bmatrix} \mu_{11} - \mu_{21} \\ \mu_{12} - \mu_{22} \end{bmatrix} = \mu_{12} - \mu_{22}$$

adalah

$$\begin{aligned} \mu_{11} - \mu_{21} &: 74.4 \pm \sqrt{5.99} \sqrt{464.17} && \text{atau} && (21.7, 127.1) \\ \mu_{12} - \mu_{22} &: 201.6 \pm \sqrt{5.99} \sqrt{2642.15} && \text{atau} && (75.8, 327.4) \end{aligned}$$

Untuk menguji hipotesis $H_0 : \boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2 = 0$ gunakan statistic- T^2 , yaitu

$$\begin{aligned} T^2 &= [\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2]' \left[\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 + \frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 \right]^{-1} [\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2] \\ &= \begin{bmatrix} 204.4 - 130.0 \\ 556.6 - 355.0 \end{bmatrix}' \begin{bmatrix} 464.17 & 886.08 \\ 886.08 & 2642.15 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 204.4 - 130.0 \\ 556.6 - 355.0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 74.4 & 201.6 \end{bmatrix} (10^{-4}) \begin{bmatrix} 59.874 & -20.080 \\ -10.080 & 10.519 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 74.4 \\ 201.6 \end{bmatrix} \\ &= 15.66 \end{aligned}$$

Untuk $\alpha = 0.05$, nilai kritisnya adalah $\chi_p^2(0.05) = 5.99$ dan $T^2 = 15.66 > \chi_2^2(0.05) = 5.99$, Keputusannya tolak H_0

Untuk memudahkan pemahaman, perhatikan contoh berikut:

■ **Contoh 6.5 (Aproksimasi Distribusi T^2 untuk $\Sigma_1 \neq \Sigma_2$)**

Diberikan berapa nilai statistic dari suatu data sampel, aproksimasi distribusi T^2 untuk kasus matriks kovariansi tidak sama.

Pertama,

$$\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 = \frac{1}{45} \begin{bmatrix} 13825.2 & 23825.4 \\ 23823.4 & 73107.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 307.227 & 529.409 \\ 529.409 & 1624.609 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 = \frac{1}{55} \begin{bmatrix} 8632.0 & 19616.6 \\ 19616.7 & 55964.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 156.945 & 356.667 \\ 356.667 & 1017.536 \end{bmatrix}$$

dan

$$\left[\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 + \frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 \right]^{-1} = (10^{-4}) \begin{bmatrix} 59.874 & -20.080 \\ -10.080 & 10.519 \end{bmatrix}$$

akibatnya

$$\begin{aligned} \frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 \left[\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 + \frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 \right]^{-1} &= \begin{bmatrix} 307.227 & 529.409 \\ 529.409 & 1624.609 \end{bmatrix} (10^{-4}) \begin{bmatrix} 59.874 & -20.080 \\ -20.080 & 10.519 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.776 & -20.060 \\ -0.092 & 0.646 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 \left[\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 + \frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 \right]^{-1} \right)^2 &= \begin{bmatrix} 0.776 & -20.060 \\ -0.092 & 0.646 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.776 & -20.060 \\ -0.092 & 0.646 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.608 & -0.085 \\ -0.131 & 0.423 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Demikian halnya dengan

$$\begin{aligned} \frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 \left[\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 + \frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 \right]^{-1} &= \begin{bmatrix} 156.945 & 356.667 \\ 356.667 & 1017.536 \end{bmatrix} (10^{-4}) \begin{bmatrix} 59.874 & -20.080 \\ -20.080 & 10.519 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.224 & -0.060 \\ 0.092 & 0.354 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{n_2} \mathbf{S}_1 \left[\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 + \frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 \right]^{-1} \right)^2 &= \begin{bmatrix} 0.224 & -0.060 \\ 0.092 & 0.354 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.224 & -0.060 \\ 0.092 & 0.354 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.055 & 0.035 \\ 0.053 & 0.131 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

selanjutnya

$$\begin{aligned} &\frac{1}{n_1} \left\{ tr \left[\left(\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 \left(\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 + \frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 \right)^{-1} \right)^2 \right] + tr \left[\left(\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 \left(\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 + \frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 \right)^{-1} \right)^2 \right] \right\} \\ &= \frac{1}{45} \{ (0.608 + 0.423) + (0.776 + 0.646) \} = 0.0678 \\ &\frac{1}{n_2} \left\{ tr \left[\left(\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 \left(\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 + \frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 \right)^{-1} \right)^2 \right] + tr \left[\left(\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 \left(\frac{1}{n_1} \mathbf{S}_1 + \frac{1}{n_2} \mathbf{S}_2 \right)^{-1} \right)^2 \right] \right\} \\ &= \frac{1}{55} \{ (0.055 + 0.131) + (0.224 + 0.354) \} = 0.009 \end{aligned}$$

Estimasi derajat bebas v adalah

$$v = \frac{2 + 2^2}{0.0678 + 0.0095} = 77.6$$

Dan nilai kritis untuk $\alpha = 0.05$ adalah

$$\begin{aligned} \frac{vp}{v-p+1} F_{p,v-p+1}(0.05) &= \frac{77.6 \times 2}{77.6 - 2 + 1} F_{2,77.6-2+1}(0.05) \\ &= \frac{155.2}{76.6} 3.12 = 6.32 \end{aligned}$$

Nilai statistic T^2 dari data hasil pengamatan adalah 15.66 sehingga hipotesis ditolak pada level 5%

■

3. Membandingkan Beberapa Rata-Rata Populasi Multivariat (Manova-Satu Arah)

Kenyataan dari kebanyakan penelitian lebih sering kita membandingkan lebih dari dua populasi. Sample acak yang dikumpulkan dari setiap h populasi, disusun sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Populasi 1: } & \mathbf{x}_{11}, \mathbf{x}_{12}, \dots, \mathbf{x}_{1n_1} \\ \text{Populasi 2: } & \mathbf{x}_{21}, \mathbf{x}_{22}, \dots, \mathbf{x}_{2n_2} \\ & \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ \text{Populasi } h: & \mathbf{x}_{h1}, \mathbf{x}_{h2}, \dots, \mathbf{x}_{hn_h} \end{aligned} \quad (0.97)$$

Manova digunakan untuk menyelidiki apakah vektor rata-rata populasi sama atau tidak, jika tidak, komponen rata-rata yang sama yang berbeda secara signifikan

Asumsi Terkait Struktur Data untuk Manova Satu-Arah

1. $\mathbf{x}_{l1}, \mathbf{x}_{l2}, \dots, \mathbf{x}_{ln_l}$ merupakan sampel acak berukuran n_l dari suatu populasi dengan $\boldsymbol{\mu}_l$; $l = 1, 2, \dots, h$
2. Semua populasi mempunyai matriks kovarians $\boldsymbol{\Sigma}$.
3. Setiap populasi merupakan normal multivariate

Asumsi ketiga dapat dikaitkan dengan teorema limit memusat ketika ukuran sampel cukup besar.

Untuk memudahkan pemahaman, berikut akan dijelaskan analisis variansi (Anova) yang berkaitan dengan analisis univariat

Ringkasan ANOVA Univariat

Asumsi dalam kasus univariat

1. $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in_i}$ sampel acak dari populasi yang berdistribusi normal, $N(\mu_i, \sigma)$ berukuran.
2. Sampel acak saling independen.

Meskipun hipotesis nol dari kesamaan rata-rata dapat dituliskan sebagai $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_h$, hal tersebut biasanya berkenaan dengan μ_i sebagai jumlah dari semua komponen rata-rata, seperti μ dan

suatu komponen berkaitan dengan populasi tertentu. Sebagai contoh, kita dapat menuliskan $\mu_i = \mu + (\mu_i - \mu)$ atau $\mu_i = \mu + \tau_i$ dimana $\tau_i = \mu_i - \mu$.

Populasi biasanya berkaitan pada himpunan berbeda dari kondisi eksperimen, dan oleh karena itu tepat untuk melakukan investigasi deviasi τ_i yang berkaitan dengan populasi ke- i (perlakuan).

$$\left(\begin{array}{c} \mu_i \\ \text{Rata-rata} \\ \text{populasi ke-}i \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \mu \\ \text{Rata-rata} \\ \text{keseluruhan} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \tau_i \\ \text{Efek perlakuan} \\ \text{populasi ke-}i \end{array} \right) \quad (0.98)$$

Hipotesis nol adalah

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_h = 0$$

Respon x_{ij} , berdistribusi $N(\mu + \tau_i, \sigma^2)$, dapat dituliskan dalam bentuk

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij} \quad (0.99)$$

Dimana y_{ij} variabel respon, μ rata-rata keseluruhan, τ_i efek perlakuan dan $\varepsilon_{ij} \sim NID(0, \sigma^2)$ variabel acak. Untuk mendefinisikan secara unik parameter dan estimasi kuadrat terkecilnya, konstrain

$$\sum_{i=1}^h n_i \tau_i = 0$$

Dekomposisi dari persamaan 0.99, analisis variansi didasarkan pada data pengamatan,

$$x_{ij} = \bar{x} + (\bar{x}_i - \bar{x}) + (x_{ij} - \bar{x}_i) \quad (0.100)$$

Dimana \bar{x} adalah estimator dari μ , $\hat{\tau}_i = (\bar{x}_i - \bar{x})$ estimator dari τ_i , dan $(x_{ij} - \bar{x}_i)$ estimator dari ε_{ij} .

Dekomposisi jumlah kuadrat dijelaskan sebagai berikut, kurangi kedua sisi dengan \bar{x} dan ambil kuadrat dari persamaan (0.100)

$$\begin{aligned}
(x_{ij} - \bar{x})^2 &= (\bar{x} + (\bar{x}_i - \bar{x}) + (x_{ij} - \bar{x}_i) - \bar{x})^2 \\
(x_{ij} - \bar{x})^2 &= ((\bar{x}_i - \bar{x}) + (x_{ij} - \bar{x}_i))^2 \\
(x_{ij} - \bar{x})^2 &= (\bar{x}_i - \bar{x})^2 + (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 + 2(\bar{x}_i - \bar{x})(x_{ij} - \bar{x}_i)
\end{aligned}$$

Ambil jumlah dari persamaan terakhir untuk i ,

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^j (x_{ij} - \bar{x})^2 &= \sum_{i=1}^n \left\{ (\bar{x}_i - \bar{x})^2 + (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 + 2(\bar{x}_i - \bar{x})(x_{ij} - \bar{x}_i) \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n (\bar{x}_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 + \sum_{i=1}^n 2(\bar{x}_i - \bar{x})(x_{ij} - \bar{x}_i) \\
&= \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 + n(\bar{x}_i - \bar{x})^2
\end{aligned}$$

Lalu ambil jumlah dari persamaan terakhir di atas j

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^m (x_{ij} - \bar{x})^2 &= \sum_{j=1}^m (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 + m(\bar{x}_i - \bar{x})^2 \\
\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_{ij} - \bar{x})^2 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 + \sum_{i=1}^n m(\bar{x}_i - \bar{x})^2
\end{aligned}$$

Persaman terakhir merupakan jumlah kuadrat

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_{ij} - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 + \sum_{i=1}^n m(\bar{x}_i - \bar{x})^2 \quad (0.101)$$

Dimana

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_{ij} - \bar{x})^2$ adalah jumlah kuadrat total terkoreksi,

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$ adalah jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat

antara sampel (SS Between)

$\sum_{i=1}^n m (\bar{x}_i - \bar{x})^2$ adalah jumlah kuadrat respon (jumlah kuadrat antara responde (SS Within)

Atau

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij}^2 = (n_1 + n_2 + \dots + n_n) \bar{x}^2 + \sum_{i=1}^n n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 \quad (0.102)$$

■ Contoh 6.5 (dekomposisi Jumlah kuadrat untuk ANOVA univariat)

Perhatikan sampel independen berikut:

- Populas 1 : 9, 6, 9
- Populasi 2 : 0, 2
- Populasi 3 : 3, 1, 2

Karena itu, statistic dari setiap sampel untuk setiap populasi dapat dihitung yang hasilnya sebagai berikut:

$$\bar{x}_3 = \frac{3+1+2}{3} = 2 \quad \text{dan} \quad \bar{x} = \frac{(9+6+9+0+2+3+1+3)}{8} = 4$$

Diperoleh bahwa

$$\begin{aligned} 3 = x_{31} &= \bar{x} + (\bar{x}_3 - \bar{x}) + (x_{31} - \bar{x}_3) \\ &= 4 + (2 - 4) + (3 - 2) \\ &= 4 + (-2) + 1 \\ 1 = x_{32} &= \bar{x} + (\bar{x}_3 - \bar{x}) + (x_{32} - \bar{x}_3) \\ &= 4 + (2 - 4) + (1 - 2) \\ &= 4 + (-2) + (-1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2 &= x_{33} = \bar{x} + (\bar{x}_3 - \bar{x}) + (x_{33} - \bar{x}_3) \\
 &= 4 + (2 - 4) + (2 - 2) \\
 &= 4 + (-2) + 0
 \end{aligned}$$

dan

$$\bar{x}_1 = \frac{9 + 6 + 9}{3} = 8 \quad \text{dan} \quad \bar{x} = \frac{(9 + 6 + 9 + 0 + 2 + 3 + 1 + 3)}{8} = 4$$

$$\bar{x}_2 = \frac{0 + 2}{2} = 1 \quad \text{dan} \quad \bar{x} = \frac{(9 + 6 + 9 + 0 + 2 + 3 + 1 + 3)}{8} = 4$$

Lakukan hal yang sama untuk setiap pengamatan sebagaimana pada populasi 3. Dengan menerapkannya pada persamaan (0.100), diperoleh array

$$x_{ij} = \bar{x} + (\bar{x}_i - \bar{x}) + (x_{ij} - \bar{x}_i)$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 & 9 \\ 0 & 2 & \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 \\ -3 & -3 & \\ -2 & -2 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{Pengamatan} \\
 (x_{ij})
 \end{array} = \begin{array}{l}
 \text{Rata-Rata} \\
 (\bar{x})
 \end{array} + \begin{array}{l}
 \text{Efek Perlakuan} \\
 (\bar{x}_i - \bar{x})
 \end{array} + \begin{array}{l}
 \text{Residual} \\
 (x_{ij} - \bar{x}_i)
 \end{array}$$

Pertanyaan akan kesamaan dari rata-rata terjawab dengan menilai apakah kontribusi dari array perlakuan relative besar terhadap residual atau tidak. Estimasi

$$\hat{\tau}_i = (\bar{x}_i - \bar{x}) \quad \text{dari} \quad \tau_i \quad \text{selalu} \quad \text{memenuhi} \quad \sum_{i=1}^g n_i \hat{\tau}_i = 0.$$

Dibawah hipotesis H_0 setiap $\hat{\tau}_i$ selalu nol.

Jika kontribusi perlakuan besar, H_0 harus ditolak. Ukuran dari suatu array merupakan besar dengan menyusun baris dari array ke dalam bentuk vektor dan menghitung panjang kuadrat. Besaran tersebut disebut dengan jumlah kuadrat (JK). Untuk pengamatan, kita kontruksi

vektor $\mathbf{y}' = [9, 6, 9, 0, 2, 3, 1, 2]$. Panjang kuadratnya adalah

$$JK_{pmngt} = 9^2 + 6^2 + 9^2 + 0^2 + 2^2 + 3^2 + 1^2 + 2^2 = 216$$

Dengan cara yang sama untuk,

$$JK_{rt} = 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 = 8(4^2) = 128$$

$$\begin{aligned} SS_{prtk} &= 4^2 + 4^2 + 4^2 + (-3)^2 + (-3)^2 + (-2)^2 + (-2)^2 + (-2)^2 \\ &= 3(4^2) + 2(-3)^2 + 3(-2)^2 = 78 \end{aligned}$$

Dan jumlah kuadrat residual (JKR)

$$SS_{JKR} = 1^2 + (-2)^2 + 1^2 + (-1)^2 + 1^2 + 1^2 + (-1)^2 + 0^2 = 10$$

Jumlah kuadrat memenuhi beberapa dekomposisi, (0.100), sebagai pengamatan, akibatnya

$$SS_{pmngt} = SS_{rt} + SS_{tr} + SS_{res}$$

Atau $216=128+78+10$. Pecah menjadi jumlah kuadrat dalam komponene rata-rata, perlakuan dan residual. Suatu analisi variansi dihasilkan dengan membandingkan ukuran relative dari SS_{tr} dan SS_{res} . Jika H_0 benar, hitung variansi dari SS_{tr} dan SS_{res} harusnya di perkirakan sama.

■

Dari persamaan (0.102), menjelaskan kepada kita bahwa array merepresentasikan rata-rata, efek perlakuan, dan residual adalah orthogonal. Array-array tersebut, merupakan sebuah vektor pengamatan, $\mathbf{y}' = [x_{11}, \dots, x_{1n_1}, x_{21}, \dots, x_{nm_n}]$ yang tegak lurus. Akibatnya,

$$SS_{pmngt} - S_{rt} - SS_{tr} = SS_{res}$$

Sebagai ringkasannya, kita punya derajat bebas untuk JK rata-rata adalah 1, JK perlakuan derajat bebasnya adalah n-1, JK untuk residual adalah m-n. jumlah derajat bebas secara keseluruhan adalah n.

Menghitung jumlah kuadrat dan derajat bebas yang berkaitan setiap jumlah kuadrat tersebut diterangkan dalam table berikut:

Tabel ANOVA untuk membandingkan Rara-rata populasi Univariat

Sumber variasi	Jumlah Kuadrat	df
Perlakuan	$SS_{tr} = \sum_{i=1}^n n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2$	$n - 1$
Residual	$SS_{tr} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i)^2$	$\sum_{i=1}^n n_i - n$
Total	$SS_{tot} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$	$\sum_{i=1}^n n_i - 1$

Statistik uji yang digunakan adalah Uji-F

$$F = \left(\frac{SS_{tr}}{(n-1)} \right) \left(\frac{SS_{res}}{\sum_{i=1}^n n_i - g} \right)$$

Dengan taraf signifikansi α . Tolak H_0 jika

$$F_{hit} > F_{n-1, \sum n_i - n}(\alpha)$$

Dimana, $F_{n-1, \sum n_i - n}(\alpha)$ merupakan persentil ke-(100 α) dari uji-F dengan $n - 1$ dan $\sum n_i - n$ sebagai derajat bebas. Hal tersebut sama dengan menolak H_0 untuk nilai SS_{tr}/SS_{res} yang besar atau nilai $1 - SS_{tr}/SS_{res}$ yang besar. Statistik yang tepat untuk multivariate umum menolak H_0 untuk nilai kecil dari perbandingan

$$\frac{1}{1 + SS_{tr}/SS_{res}} = \frac{S_{res}}{SS_{res} + SS_{tr}} \quad (0.103)$$

■ **Contoh 6.6 (Table Anova Univariat dan Uji -F untuk Efek Perlakuan)**

Gunakan nilai dan informasi pada contoh 6.5, Kita punya table ANOVA:

Sumber Variasi	Jumlah Kuadrat	Derajat Bebas
Perlakuan	$SS_{tr} = 78$	$n - 1 = 3-1 = 2$
Residual	$SS_{res} = 10$	$\sum_{i=1}^n n_i - n = (3 + 2 + 3) - 3 = 5$
Total	$SS_{tot} = 88$	$\sum_{i=1}^n n_i - 1 = (3 + 2 + 3) - 1 = 7$

Akibatnya,

$$F = \frac{SS_{tr} / (n - 1)}{SS_{res} / (\sum n_i - n)} = \frac{78/2}{10/5} = 19.5$$

Karena, $F = 19.5 > F_{2,5}(0.01) = 13.27$, tolak $H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 0$ (tidak ada efek perlakuan) pada taraf signifikansi 0.01.



a. Multivariat Analisis Variansi (MANOVA)

Sejalanan dengan reparameterisasi untuk kasus univariat, model MANOVA dapat ditentukan dengan menggunakan hal tersebut:

	Sampel				
	1	2	3	...	k
	x_{11}	x_{21}	x_{31}	...	x_{k1}
	x_{12}	x_{22}	x_{32}	...	x_{k2}
	\vdots	\vdots	\vdots		\vdots
	x_{1n}	x_{2n}	x_{3n}	...	x_{kn}
Total	$x_{.1}$	$x_{.2}$	$x_{.3}$...	$x_{.k}$
Rata-rata	$\bar{x}_{.1}$	$\bar{x}_{.2}$	$\bar{x}_{.3}$...	$\bar{x}_{.k}$

$$\text{Total Sampel ke-}i : \mathbf{y}_i = \sum_{j=1}^n x_{ij}$$

$$\text{Total Keseluruhan} : \mathbf{x}_{..} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n x_{ij}$$

$$\text{Rata-rata sample ke-}i : \bar{\mathbf{x}}_i = \frac{\mathbf{x}_i}{n}$$

$$\text{Rata-rata Keseluruhan} : \bar{\mathbf{x}}_{ij} = \frac{\mathbf{x}_{..}}{kn}$$

Model Manova untuk Membandingkan Vektor Rata-Rata Populasi

$$\mathbf{X}_{ij} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\tau}_i + \boldsymbol{\varepsilon}_{ij} ; j = 1, 2, \dots, m \text{ dan } i = 1, 2, \dots, n \quad 0.104$$

Dimana variabel $\boldsymbol{\varepsilon}_{ij} \sim NID_p(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$. Parameter vektor $\boldsymbol{\mu}$ merupakan rata-rata total, $\boldsymbol{\tau}_i$ merupakan efek perlakuan ke- i dengan $\sum_{i=1}^n n_i \boldsymbol{\tau}_i = \mathbf{0}$.

Dalam model variabel ke- p dalam \mathbf{X}_{ij} menjadi

$$\begin{pmatrix} x_{ij1} \\ x_{ij2} \\ \vdots \\ x_{ijp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tau_{i1} \\ \tau_{i2} \\ \vdots \\ \tau_{ip} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_{ij1} \\ \varepsilon_{ij2} \\ \vdots \\ \varepsilon_{ijp} \end{pmatrix}$$

Sehingga model untuk variabel ke- r dalam setiap vektor \mathbf{y}_{ij} adalah

$$y_{ijr} = \mu_r + \tau_{ir} + \varepsilon_{ijr}$$

Perhatikan model pada persamaan 0.104, setiap komponen dari vektor pengamatan, \mathbf{x}_{ij} sesuai dengan model univariat pada persamaan 0.99. Error untuk komponen \mathbf{x}_{ij} adalah saling berkorelasi, tapi matriks kovariansi $\boldsymbol{\Sigma}$ adalah sama untuk semua populasi.

Vektor pengamatan dimungkin untuk didekomposisi dengan model. yaitu

$$\mathbf{x}_{ij} = \bar{\mathbf{x}} + (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}) + (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i) \quad (0.105)$$

Dimana \mathbf{x}_{ij} merupakan vektor pengamatan ke- i untuk perlakuan ke- j , $\bar{\mathbf{x}}$ estimator rata-rata total sampel, $\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}}$ adalah estimator dari τ , dan $\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i$ merupakan estimator dari parameter residual.

Dekomposisi dari persamaan (0.105) sama dengan kasus univariat. Pertama, perhatikan hasil kali

$$(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})'$$

Dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})' &= (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i + \bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i + \bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})' \\ &= [(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i) + (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})][(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i) + (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})]' \\ &= (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)' + (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})' \\ &\quad + (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)' + (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})' \end{aligned}$$

Ambil jumlahan dari kedua ruas dari persamaan diatas,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})' &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)' \\ &\quad + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})' \\ &\quad + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)' \\ &\quad + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})' \end{aligned}$$

Karena $\sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i) = 0$, maka

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})' &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)' \\
&\quad + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})' \\
\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})' &= \sum_{i=1}^n m(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})' \\
&\quad + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)' \tag{0.106}
\end{aligned}$$

dimana

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})'$ merupakan jumlah kuadrat total dan hasil kali

$\sum_{i=1}^n m(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})'$ merupakan jumlah kuadrat perlakuan dan hasil kali (Between)

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)'$ merupakan jumlah kuadrat residual (within)

Matriks Jumlah kuadrat residual (within) dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}
\mathbf{W} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)' \tag{0.107} \\
&= (n_1 - 1)\mathbf{s}_1 + (n_2 - 1)\mathbf{s}_2 + \dots + (n_n - 1)\mathbf{s}_n
\end{aligned}$$

Dimana \mathbf{s}_n matriks kovariansi sampel untuk sampel ke i .

Uji Wilk

Hipotesis yang akan diuji adalah, hipotesis yang berkaitan dengan tidak ada efek perlakuan, dirumus sebagai berikut

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_n = \mathbf{0}$$

Diuji dengan mempertimbangkan ukuran relative perlakuan dan jumlah kuadrat residual dan hasilkali silang. Secara formal, ringkasan perhitungan uji statistic dalam table MANOVA.

Tabel Manova untuk membandingkan Vektor rata-rata populasi.

Sumber Variansi	Matriks Hasil Kali Silang (SSP)	Jumlah Kuadrat dan	Derajat bebas
Perlakuan	$\mathbf{B} = \sum_{i=1}^n m(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})'$		$n - 1$
Residual			$\mathbf{W} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)'$
Total	$\mathbf{B} + \mathbf{W} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})'$		$\sum_{i=1}^n n_i - 1$

Tolak H_0 jika rasio dari variansi umum terlalu kecil,

$$\Gamma = \frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{B} + \mathbf{W}|} = \frac{\left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)' \right|}{\left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}})' \right|} \quad (0.108)$$

Persamaan (0.108), dikemukakan pertama kalinya oleh Wilks., berkaitan dengan bentuk persamaan (0.103) uji-F dari uji H_0 : tidak ada efek perlakuan dalam kasus univariat. Lambda Wilk mempunyai sifat yang mirip dengan kriteria rasio likelihood. Distribusi eksak dari Γ dapat diturunkan untuk kasus khusus yang ditampilkan dalam table berikut. Untuk kasus lain, sampel berukuran besar, sebagai modifikasi dari Γ , gunakan bartlet dapat digunakan untuk menguji H_0 .

Tabel 6.1 Distribusi Lambda Wilk

Jumlah Variabel	Jumlah Group	Distribusi sampel untuk data multivariate
$p = 1$	$n \geq 2$	$\left(\frac{\sum n_i - n}{n - 1} \right) \left(\frac{1 - \Gamma}{\Gamma} \right) \sim F_{n-1, \sum n_i - n}$
$p = 2$	$n \geq 2$	$\left(\frac{\sum n_i - n - 1}{n - 1} \right) \left(\frac{1 - \sqrt{\Gamma}}{\sqrt{\Gamma}} \right) \sim F_{2(n-1), 1(\sum n_i - n - 1)}$
$p \geq 1$	$n = 2$	$\left(\frac{\sum n_i - p - 1}{p} \right) \left(\frac{1 - \Gamma}{\Gamma} \right) \sim F_{p, \sum n_i - p - 1}$
$p \geq 1$	$n = 3$	$\left(\frac{\sum n_i - p - 1}{p} \right) \left(\frac{1 - \sqrt{\Gamma}}{\sqrt{\Gamma}} \right) \sim F_{2p, 2(\sum n_i - p - 2)}$

Bartlet Menunjukkan bahwa jika H_0 benar dan $\sum n_i = n$ besar,

$$-\left(n - 1 - \frac{(p + n)}{2} \right) \ln \Gamma = -\left(n - 1 - \frac{(p + n)}{2} \right) \ln \left(\frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{B} + \mathbf{W}|} \right) \quad (0.109)$$

Mempunyai disitribusi chi-square dengan derajat bebas $p(n - 1)$.

Akibatnya, untuk $\sum n_i = n$ besar, tolak H_0 pada level signifikansi

$$-\left(n - 1 - \frac{(p + n)}{2} \right) \ln \left(\frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{B} + \mathbf{W}|} \right) > \chi_{p(n-1)}^2(\alpha) \quad 0.110$$

Dimana $\chi_{p(n-1)}^2(\alpha)$ adalah persentil ke- (100α) dari distribusi chi-kuadrat dengan derajat bebas $p(n - 1)$.

Contoh 6.6 (Table Manova dan Lambda Wilks untuk Menguji Kesamaan Tiga Vektor Rata-Rata)

Andaikan bahwa suatu variabel tambahan telah diamati bersama dengan variabel yang ditampilkan pada contoh 6.4 Ukuran sampelnya

adalah $n_1 = 3$, $n_2 = 2$, $n_3 = 3$. Susun pasangan hasil pengamatan x_{ij} dalam bentuk baris, diperoleh

$$\begin{pmatrix} (9) \\ (3) \\ (0) \\ (4) \\ (3) \\ (8) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (6) \\ (2) \\ (2) \\ (0) \\ (1) \\ (9) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (9) \\ (7) \\ (2) \end{pmatrix} \text{ dengan } \bar{x}_1 = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}, \bar{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \bar{x}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix}; \bar{x}_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Pada contoh sebelumnya kita telah menghitung jumlah total rata-rata, efek perlakuan, dan residual dari univariat ANOVA. Yaitu

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 & 9 \\ 0 & 2 & \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 \\ -3 & -3 & \\ -2 & -2 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Pengamatan} = \text{Rata-Rata} + \text{Efek Perlakuan} + \text{Residual}$$

$$\begin{pmatrix} x_{ij} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{x} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \bar{x}_i - \bar{x} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_{ij} - \bar{x}_i \end{pmatrix}$$

dan

$$SS_{pgmt} = SS_{rt} + SS_{tr} + SS_{res}$$

$$216 = 128 + 78 + 10$$

$$\text{Total SS} = SS_{pgmt} - SS_{rt} = 216 - 128 = 88$$

Lakukan perhitungan yang sama pada variabel kedua, hasilnya

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 7 \\ 4 & 0 & 0 \\ 8 & 9 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & \\ 5 & 5 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -3 & -3 & \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 2 & -2 & \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

dan

$$SS_{pgmt} = SS_{rt} + SS_{tr} + SS_{res}$$

$$272 = 200 + 48 + 24$$

$$\text{Total SS} = SS_{pgmt} - SS_{rt} = 272 - 200 = 72$$

Kedua analisis komponen tunggal tersebut harus diperbesar dengan jumlah elemen hasil kali dalam rangka melengkapkan elemen-elemen dalam table MANOVA. Tampilkan baris demi baris dalam array untuk dua variabel, diperoleh hasil kali

$$\text{Rata-rata} : 4(5) + 4(5) + \dots + 4(5) = 8(4)(5) = 160$$

$$\text{Perlakuan} : 3(4)(-1) + 2(-3)(-3) + 3(-2)(-3) = -12$$

$$\text{Residual} : 1(-1) + (-2)(-2) + 1(2) + (-1)(2) + \dots + 0(-1) = 1$$

$$\text{Total} : 9(3) + 6(2) + 9(7) + 0(4) + \dots + 2(7) = 149$$

$$\begin{aligned} \text{Total (terkoreksi) hasil kali} &= (\text{total hasil kali}) - (\text{rata-rata hasil kali}) \\ &= 149 - 160 = -11 \end{aligned}$$

Selanjutnya, table MANOVA:

Sumber Variansi	Matriks Jumlah Kuadrat dan Hasil Kali	Derajat Bebas
Perlakuan	$\begin{bmatrix} 78 & -12 \\ -12 & 48 \end{bmatrix}$	$3 - 1 = 2$
Residual	$\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 24 \end{bmatrix}$	$3 + 2 + 3 - 3 = 5$
Total (Koreksi)	$\begin{bmatrix} 88 & -11 \\ -11 & 72 \end{bmatrix}$	7

Persamaan 0.106 menyatakan bahwa

$$\begin{bmatrix} 88 & -11 \\ -11 & 72 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 78 & -12 \\ -12 & 48 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 24 \end{bmatrix}$$

Gunakan persamaan (0.108) diperoleh

$$\Gamma = \frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{B} + \mathbf{W}|} = \frac{\begin{vmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 24 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 88 & -11 \\ -11 & 72 \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{10(24) - (1)^2}{88(72) - (-11)^2} = \frac{239}{6215} = 0.0385$$

Karena $p = 2$ dan $n = 3$, mengindikasikan bahwa uji eksak (asumsi normal dan matriks kovariansi sama) dari $H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = \mathbf{0}$ (tidak ada efek perlakuan) lawan H_1 : paling sedikit terdapat satu $\tau_i \neq \mathbf{0}$. Untuk melakukan uji, bandingkan uji statistik

$$\left(\frac{1 - \sqrt{\Gamma}}{\sqrt{\Gamma}} \right) \left(\frac{\sum n_i - n - 1}{n - 1} \right) = \left(\frac{1 - \sqrt{0.0385}}{\sqrt{0.0385}} \right) \left(\frac{8 - 3 - 1}{3 - 1} \right) = 8.19$$

Dengan suatu titik persentase dari distribusi- F mempunyai $v_1 = 2(n - 1) = 4$ dan $v_2 = 2(\sum n_i - n - 1) = 8$. Karena $8.19 > F_{4,8}(0.01) = 7.01$, tolak H_0 pada taraf signifikansi dan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam perlakuan

■

■ Contoh 6.7 (Analisis Multivariat Data Perawat Pribadi)

Departemen kesehatan membayar rumah perawat pribadi untuk penyediaan layanan. Departemen kesehatan mengembangkan sekumpulan rumusan untuk tariff dari setiap fasilitas, didasarkan pada factor; level perawatan, upah minimum propinsi, dan upah minimum regional.

Perawat pribadi dapat diklasifikasi pada basis kepemilikan (pribadi, organisasi non-profit, dan pemerintah) dan sertifikasi (Keahlian perawat, intermediasi fasilitas keperdulin (ketersediaan), atau kombinasi dari dua).

Satu tujuan dari penelitian tersebut adalah meneliti efek kepemilikan atau sertifikasi (atau kedua) terhadap biaya. Terdapat empat biaya, Basis hari-per pasien dan diukur dalam jam perpasien perhari, variabelnya adalah X_1 biaya gaji perawat, X_2 biaya makanan, X_3 biaya operational perencanaan dan perawatan, X_4 biaya penjaga rumah dan laundry. Total pengamatan yang telah dilakukan sebanyak $n = 516$ pada setiap dari $p = 4$ variabel biaya.

Ringkasan statistic untuk setiap $g = 3$ diberikan pada table berikut

Kelompok	Jumlah Pengamatan	Vektor rata-rata sampel
$i = 1$ (Pribadi)	$n_1 = 271$	$\bar{x}_1 = \begin{bmatrix} 2.066 \\ 0.480 \\ 0.082 \\ 0.260 \end{bmatrix}$
$i = 2$ (Non-Provit)	$n_2 = 138$	$\bar{x}_2 = \begin{bmatrix} 2.167 \\ 0.596 \\ 0.124 \\ 0.418 \end{bmatrix}$
$i = 3$ (Pemerintah)	$n_3 = 107$	$\bar{x}_3 = \begin{bmatrix} 2.273 \\ 0.521 \\ 0.125 \\ 0.383 \end{bmatrix}$
$\sum_{i=1}^n n_i = 516$		

$$S_1 = \begin{bmatrix} 0.291 & & & & \\ -0.001 & 0.011 & & & \\ 0.002 & 0.000 & 0.001 & & \\ 0.010 & 0.003 & 0.000 & 0.010 & \end{bmatrix}; S_1 = \begin{bmatrix} 0.561 & & & & \\ 0.011 & 0.025 & & & \\ 0.001 & 0.004 & 0.005 & & \\ 0.037 & 0.007 & 0.002 & 0.019 & \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{S}_3 = \begin{bmatrix} 0.261 & & & \\ 0.030 & 0.017 & & \\ 0.003 & -0.000 & 0.004 & \\ 0.018 & 0.006 & 0.001 & 0.013 \end{bmatrix}$$

Karena s_i nampak hampir sama, dihitung gabungannya (pooled)

$$\begin{aligned} \mathbf{W} &= (n_1 - 1)\mathbf{S}_1 + (n_2 - 1)\mathbf{S}_2 + (n_3 - 1)\mathbf{S}_3 \\ &= \begin{bmatrix} 182.962 & & & \\ 4.408 & 8.200 & & \\ 1.695 & 0.633 & 1.484 & \\ 9.581 & 2.428 & 0.394 & 6.538 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

juga

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{n_1\bar{\mathbf{x}}_1 + n_2\bar{\mathbf{x}}_2 + n_3\bar{\mathbf{x}}_3}{n_1 + n_2 + n_3} = \begin{bmatrix} 2.136 \\ 0.519 \\ 0.102 \\ 0.380 \end{bmatrix}$$

dan

$$\mathbf{B} = \sum_{i=1}^3 n_i (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})' = \begin{bmatrix} 3.475 & & & \\ 1.111 & 1.225 & & \\ 0.821 & 0.453 & 0.235 & \\ 0.584 & 0.610 & 0.230 & 0.304 \end{bmatrix}$$

Untuk menguji $H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3$ (tidak ada efek kepemilikan) atau sama, tidak ada perbedaan biaya antara tidak jenis kepemilikan, pribadi, non-profit, pemerintah).

Untuk $g = 3$, dengan menggunakan computer, diperoleh

$$\Gamma = \frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{B} + \mathbf{W}|} = 0.7714$$

dan

$$\left(\frac{\sum n_i - p - 2}{p} \right) \left(\frac{1 - \sqrt{\Gamma}}{\sqrt{\Gamma}} \right) = \left(\frac{516 - 4 - 2}{4} \right) \left(\frac{1 - \sqrt{0.7714}}{\sqrt{0.7714}} \right) = 17.67$$

Misalkan taraf signifikansi $\alpha = 0.01$ sedemikian hingga $F_{2(4), 2(510)}(0.01) = \chi_8^2(0.01)/8 = 2.51$. Karena $17.67 > F_{8, 1020}(0.01) = 2.51$, tolak H_0 pada taraf signifikansi 0.01 dan disimpulkan bahwa rata-rata biaya berbeda, bergantung pada jenis kepemilikan.

■

Uji Roy

Dalam pendekatan gabungan-irisian, kita mencari kombinasi linear $z_{ij} = \mathbf{a}'\mathbf{y}_{ij}$ yang memaksimumkan sebaran dari transformasi rata-rata $\bar{z}_i = \mathbf{a}'\bar{\mathbf{y}}_i$ relative terhadap variasi didalam sebaran sampel dari titik. Kemudian kita mencari vektor yang memaksimumkan

$$F = \frac{n \sum_{i=1}^a (\bar{z}_i - \bar{z}_{..})^2 / (a - 1)}{\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (z_{ij} - \bar{z}_i)^2 / (ab - a)} \quad (0.111)$$

Persamaan 0.111 dapat dituliskan dalam bentuk

$$F = \frac{\mathbf{a}'\mathbf{W}\mathbf{a} / (a - 1)}{\mathbf{a}'\mathbf{B}\mathbf{a} / (ab - a)} = \frac{\mathbf{W}}{(\mathbf{W} + \mathbf{B})} \quad (0.112)$$

Persamaan terakhir maksimum dengan \mathbf{a}_1 , nilai eigen yang berkaitan dengan λ_1 , nilai eigen yang terbesar dari $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{W}$, kita punya

$$\max_a F = \frac{a(b-1)}{a-1} \lambda_1 \quad (0.113)$$

Untuk menguji H_0 yang didasarkan pada λ_1 , Uji akar terbesar Roy, yaitu

$$\theta = \frac{\lambda_1}{1 + \lambda_1} \quad (0.114)$$

Nilai kritis dari θ diberikan dalam table. Tolak H_0 jika $\theta \geq \theta_{\alpha, s, m, N}$

dimana,

$$s = \min(v_W, p), m = \frac{1}{2}(|v_W - p| - 1), N = \frac{1}{2}(v_B - p - 1)$$

4. Interval Kepercayaan Simultan untuk Efek Perlakuan

Ketika hipotesis tentang kesamaan efek perlakuan ditolak, efek-efek mengarah pada bagaimana keadaan dari hipotesis yang ditolak. Perbandingan pairwise, pendekatan Banferroni dapat digunakan untuk mengkonstruksi interval kepercayaan simultan untuk komponen perbedaan $\tau_j - \tau_i$. interval-interval tersebut lebih pendek dibanding seluruh kontras yang diperoleh, dan membutuhkan nilai kritis hanya untuk statistic-t univariat.

Misalkan τ_{ij} komponen ke- i dari τ_j , Karena τ_j diestimasi dengan

$$\hat{\tau}_j = \bar{x}_k - \bar{x}$$

$$\hat{\tau}_{ij} = \bar{x}_{ij} - \bar{x}_j \quad (0.115)$$

Dan $\hat{\tau}_{ij} - \hat{\tau}_{kj} = \bar{x}_{ij} - \bar{x}_{kj}$ adalah selisih antara dua rata-rata sampel independen. Interval kepercayaan untuk dua sampel didasarkan pada statistic-t adalah valid dengan perubahan pada α . Perhatikan bahwa

$$\text{var}(\hat{\tau}_{ki} - \hat{\tau}_{li}) = \text{var}(\bar{X}_{ki} - \bar{X}_{li}) = \left(\frac{1}{n_k} + \frac{1}{n_l} \right) \sigma_{ii}$$

Dimana σ_{ii} elemen diagonal dari Σ . estimasi dari $\text{var}(\bar{X}_{ki} - \bar{X}_{li})$ adalah

$$\widehat{\text{var}}(\bar{X}_{ki} - \bar{X}_{li}) = \left(\frac{1}{n_k} + \frac{1}{n_l} \right) \frac{w_{ii}}{n - g}$$

Dimana w_{ii} elemen diagonal dari \mathbf{W} dan $n = n_1 + n_2 + \dots + n_g$. Terdapat p variabel dan $g(g-1)/2$ pasangan berbeda, sehingga interval-t dua sampel akan dikerjakan dalam nilai kritis $t_{n-g}(\alpha/2m)$, dimana

$$m = \frac{pg(g-1)}{2} \tag{0.116}$$

Adalah jumlah pernyataan kepercayaan simultan.

Teorema 6.5

Misalkan $n = \sum_{k=1}^g n_k$ untuk model pada persamaan..., dengan kepercayaan paling sedikit $(1 - \alpha)$,

$$\tau_{ki} - \tau_{li} \text{ dibawah } \bar{x}_{ki} - \bar{x}_{li} \pm t_{n-g} \left(\frac{\alpha}{pg(g-1)} \right) \sqrt{\frac{w_{ii}}{n-g} \left(\frac{1}{n_k} + \frac{1}{n_l} \right)}$$

Untuk semua komponen $i = 1, 2, \dots, p$ dan perbedaan semua $l < k = 1, \dots, g$ dimana w_{ii} adalah elemen diagonal \mathbf{W}



Contoh berikut menggambarkan bagaimana mengkonstruksi estimasi interval kepercayaan untuk perbedaan berpasangan dalam rata-rata perlakuan menggunakan data perawatan-pribadi sebagaimana disajikan dalam contoh 6.7.

■ **Contoh 6.8 (Interval kepercayaan untuk perbedaan perlakuan-Perawat-Rumah).**

Dari contoh sebelumnya (6.7), bahwa biaya rata-rata untuk perawat rumah yang berbeda, bergantung pada jenis kepemilikan. Gunakan hasil pada contoh 6.7 untuk mengestimasi perbedaan. Suatu perbandingan dari variabel X_3 , biaya rencan operasional dan perawatan tenaga kerja, antara kepemilikan pribadi dan pemerintah dapat dibuat estimasi $\tau_{13} - \tau_{33}$. Dengan menggunakan persamaan (0.105) dan informasi yang ada pada contoh sebelumnya, kita punya

$$\hat{\tau}_1 = (\bar{x}_1 - \bar{x}) = \begin{bmatrix} -0.070 \\ -0.039 \\ -0.020 \\ -0.020 \end{bmatrix}; \hat{\tau}_3 = (\bar{x}_3 - \bar{x}) = \begin{bmatrix} 0.137 \\ 0.002 \\ 0.023 \\ 0.003 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 182.962 & & & & \\ & 4.408 & & & \\ & & 8.200 & & \\ & & & 1.695 & 1.484 \\ & & & & 9.581 & 2.428 & 0.394 & 6.538 \end{bmatrix}$$

Akibatnya,

$$\hat{\tau}_{13} - \hat{\tau}_{33} = -0.020 - 0.023 = 0.043$$

dan $n = 271 + 138 + 107 = 516$ sehingga

$$\sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_3}\right) \frac{w_{33}}{n-g}} = \sqrt{\left(\frac{1}{271} + \frac{1}{107}\right) \frac{1.848}{516-3}} = 0.00614$$

Karena $p = 4$ dan $g = 3$, untuk pernyataan kepercayaan simultan 95% diperlukan $t_{513} (0.05/4(3)2) = 2.87$. pernyataan kepercayaan simultan 95% adalah

$\tau_{13} - \tau_{33}$ dibawah

$$\hat{\tau}_{13} - \hat{\tau}_{33} \pm t_{513} (0.00208) \sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_3}\right) \frac{w_{33}}{n-g}}$$

$$= -0.043 \pm 2.87 (0.00614)$$

$$= -0.043 \pm 0.018$$

Disimpulkan bahwa rata-rata perawatan dan biaya tenaga kerja untuk kepemilikan pemerintah lebih tinggi sekitar 0.025 hingga 0.061 per pasien per hari di banding untuk kepemilikan pribadi. Dengan kepercayaan yang sama, 95%, dikatakan bahwa

$\tau_{13} - \tau_{23}$ dibawah

$$\hat{\tau}_{13} - \hat{\tau}_{23} \pm t_{513} (0.00208) \sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_3}\right) \frac{w_{23}}{n-g}}$$

$$= (-0.058, -0.026)$$

dan

$\tau_{223} - \tau_{33}$ dibawah

$$\hat{\tau}_{23} - \hat{\tau}_{33} \pm t_{513} (0.00208) \sqrt{\left(\frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3}\right) \frac{w_{33}}{n-g}}$$

$$= (-0.021, 0.019)$$

■

5. Uji Kesamaan Matriks Kovariansi

Salah satu asumsi yang dibuat ketika membandingkan dua atau lebih vektor rata-rata multivariate adalah matriks kovariansi dari populasi yang secara pontensial berbeda adalah sama. Sebelum menggabungkan variansi antara sampel untuk membentuk matriks kovariansi gabungan ketika membanding vektor kovariansi, hal tersebut dapat bermanfaat ketika pengujian kesamaan matriks kovariansi. Satu uji yang umum digunakan untuk kesamaan matriks kovariansi adalah Uji Box-M.

dengan g populasi, hipotesis nolnya adalah

$$H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2 = \dots = \Sigma_g = \Sigma \quad (0.117)$$

dimana Σ_l adalah matriks kovariansi untuk populasi ke- l , $l = 1, 2, \dots, g$ dan Σ adalah asumsi awal dari matriks kovariansi. Hipotesis alternatifnya adalah paling sedikit dua diantara matriks kovarians tidak sama.

Andaikan bahwa populasinya berdistribusi normal multivariate, suatu uji likelihood rasio untuk menguji hipotesis diberikan oleh

$$\Upsilon = \prod_l \left(\frac{|\mathbf{S}_l|}{|\mathbf{S}_p|} \right)^{\frac{(n_l-1)}{2}} \quad (0.118)$$

dimana n_l ukuran sampel untuk kelompok ke- l , \mathbf{S}_l adalah matriks kovariansi sampel kelompok ke- l dan \mathbf{S}_p adalah matriks kovariansi gabungan dengan rumus

$$\mathbf{S}_p = \frac{1}{\sum_l (n_l - 1)} - \left\{ (n_1 - 1)\mathbf{S}_1 + (n_2 - 1)\mathbf{S}_2 + \dots + (n_g - 1)\mathbf{S}_g \right\} \quad (0.119)$$

Uji Box didasarkan pada pendekatan χ^2 pada distribusi sampel $-2 \ln \Upsilon$. Penetapan $-2 \ln \Upsilon = M$ (Statistik M-Box) diberikan oleh

$$M = \left[\sum_l (n_l - 1) \right] \ln |\mathbf{S}_p| - \left[\sum_l (n_l - 1) \right] \ln |\mathbf{S}_l| \quad (0.120)$$

Jika hipotesis nol benar, sample individual matriks kovariansi tidak mengekspektasi pada perbedaan yang terlalu besar dan, akibatnya tidak ada perbedaan dari matriks kovariansi matriks gabungan.

Uji Box Untuk kesamaan Matriks kovariansi

Diberikan

$$\mathbf{u} = \left[\sum_l \frac{1}{(n_l - 1)} - \frac{1}{\sum_l (n_l - 1)} \right] \left[\frac{2p^2 + 3p - 1}{6(p + 1)(g - 1)} \right] \quad (0.121)$$

Dimana p adalah jumlah variabel dan g adalah jumlah kelompok. Maka

$$C = (1 - \mathbf{u})M = (1 - u) \left\{ \left[\sum_l (n_l - 1) \right] \ln |\mathbf{S}_p| - \sum_l [(n_l - 1) \ln \mathbf{S}_l] \right\} \quad (0.122)$$

Berdistribusi chi-kuadrat dengan

$$v = g \frac{1}{2} p(p + 1) - \frac{1}{2} p(p + 1) = \frac{1}{2} p(p + 1)(g - 1) \quad (0.123)$$

Sebagai derajat bebas. Pada taraf signifikansi α , tolak H_0 jika

$$C > \chi_{p(p+1)(g-1)/2}^2(\alpha)$$

■ Contoh 6.9. (Pengujian Kesamaan matriks kovariansi-Rumah Perawat)

Dengan menggunakan data dan informasi pada contoh 6.7, 6.78, matriks kovariansi untuk $p = 4$ variabel biaya yang berkaitan dengan $g = 3$ telah dihitung. Andaikan bahwa data normal multivariate, kita akan menguji hipotesis $H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma_3 = \Sigma$.

Gunakan informasi pada contoh 6.8, bahwa $n_1 = 271$, $n_2 = 138$, $n_3 = 107$ dan $|\mathbf{S}_1| = 2.783 \times 10^{-8}$, $|\mathbf{S}_2| = 89.539 \times 10^{-8}$, $|\mathbf{S}_3| = 14.579 \times 10^{-8}$ dan $|\mathbf{S}_p| = 17.397 \times 10^{-8}$. Ambil logaritma asli dari setiap matriks kovarians sampel yang diberikan, -17,397, -13, 926, -15741 dan -15,564 secara berturut-turut.

Selanjutnya hitung

$$\begin{aligned}
u &= \left[\frac{1}{270} + \frac{1}{137} + \frac{1}{106} + \frac{1}{270 + 137 + 106} \right] \left[\frac{2(4^2) + 2(4) - 1}{6(4+1)(3-1)} \right] \\
&= 0.0133 \\
M &= [270 + 137 + 106](-15.564) - \\
&\quad [270(-17.397) + 137(13.926) + 106(-15.741)] \\
&= 289.3
\end{aligned}$$

dan $C = (1 - 0.0133)289.3 = 285.5$. Rujuk C pada table chi-kuadrat dengan $v = 4(4+1)(3-1)/2 = 20$. Hal tersebut menjelaskan kepada kita bahwa H_0 ditolak pada semua level signifikansi. Kesimpulannya, bahwa matriks kovariansi dari variabel biaya berkaitan dengan tiga populasi dari rumah perawat adalah tidak sama.

■

6. Multivariat Analisis Variansi Dua-Arah

Dengan menggunakan pendekatan penjelasan dari MANOVA satu arah, kita juga akan membahas MANOVA dua arah dengan cara yang sama

Model Efek-Tetap Univariat Dua-Arah dengan Interaksi

Kita asumsikan bahwa pengukuran dilakukan pada beberapa level dari dua factor. Misalkan dua eksperimen dengan level-levelnya, factor 1 dan factor 2. Andaikan bahwa terdapat a level pada factor 1 dan b level pada factor dua, dan bahwa pengamatan sebanyak n yang saling independen telah dilakukan pada setiap kombinasi level ab . Pengamatan ke- k pada level i factor 1 dan pengamatan level ke- j pada factor 2 dengan X_{ijk} , model dua-arah univariat adalah

$$X_{ijk} = \mu + \tau_i + \beta_j + \gamma_{ij} + \varepsilon_{ijk} \quad (0.124)$$

Untuk $i = 1, 2, \dots, a$, $j = 1, 2, \dots, b$ dan $k = 1, 2, \dots, n$

Dimana $\sum_{i=1}^a \tau_i = \sum_{j=1}^b \beta_j = \sum_{i=1}^a \gamma_{ij} = \sum_{j=1}^b \gamma_{ij} = 0$ dan $\varepsilon_{ijk} \sim NIID(0, \sigma^2)$. dari model μ merupakan rata-rata keseluruhan, τ_i efek factor 1, β_j efek factor 2 dan γ_{ij} efek factor interaksi factor 1 dan factor 2.

Eskpektasi respon pada level ke i factor 1 dan level ke- j factor 2 adalah

$$\widehat{X}_{ijk} = \hat{\mu} + \hat{\tau}_i + \hat{\beta}_j + \hat{\gamma}_{ij} \quad (0.125)$$

Analogi dengan persamaan (0.125), setiap pengamatan dapat didekomposisi sebagai

$$x_{ijk} = \bar{x} + (\bar{x}_i - \bar{x}) + (\bar{x}_j - \bar{x}) + (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i - \bar{x}_j + \bar{x}) + (x_{ijk} - \bar{x}_{ijk}) \quad (0.126)$$

dimana \bar{x} rata-rata keseluruhan, \bar{x}_i rata-rata level ke- i factor 1, \bar{x}_j rata-rata level ke- j factor 2 dan \bar{x}_{ij} level ke- i factor 1 dan level- j factor 2. Perkurangkan kedua ruang dengan \bar{x} lalu kuadratkan serta jumlah, diperoleh

$$\begin{aligned} (x_{ijk} - \bar{x}) &= \left\{ \bar{x} + (\bar{x}_i - \bar{x}) + (\bar{x}_j - \bar{x}) \right. \\ &\quad \left. + (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i - \bar{x}_j + \bar{x}) + (x_{ijk} - \bar{x}_{ijk}) \right\} - \bar{x} \\ (x_{ijk} - \bar{x}) &= (\bar{x}_i - \bar{x}) + (\bar{x}_j - \bar{x}) + (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i - \bar{x}_j + \bar{x}) \\ &\quad + (x_{ijk} - \bar{x}_{ijk}) \\ (x_{ijk} - \bar{x})^2 &= \left\{ (\bar{x}_i - \bar{x}) + (\bar{x}_j - \bar{x}) + (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i - \bar{x}_j + \bar{x}) \right\}^2 \\ &\quad + (x_{ijk} - \bar{x}_{ijk})^2 \end{aligned}$$

Lalu ambil jumlah dari kuadrat residual

$$\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n \left\{ \begin{aligned} & \left((\bar{x}_i - \bar{x}) + (\bar{x}_j - \bar{x}) \right) \\ & + (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i - \bar{x}_j + \bar{x}) \\ & + (x_{ijk} - \bar{x}_{ijk}) \end{aligned} \right\}^2$$

Karena $\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (\bar{x}_i - \bar{x})(\bar{x}_j - \bar{x}) = 0$ maka

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x})^2 &= \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (\bar{x}_i - \bar{x}) + \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (\bar{x}_j - \bar{x})^2 \\ &+ \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i - \bar{x}_j + \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{ijk})^2 \\ \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x})^2 &= \sum_{i=1}^a bn (\bar{x}_i - \bar{x})^2 + \sum_{j=1}^b an (\bar{x}_j - \bar{x})^2 \\ &+ \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b n (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i - \bar{x}_j + \bar{x})^2 \tag{0.127} \\ &+ \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{ijk})^2 \end{aligned}$$

Atau

$$SS_{tot} = SS_1 + SS_2 + SS_{12} + SS_{res}$$

Derajat bebas yang terkait dengan setiap jumlah pada persamaan (0.127) adalah

$$abn - 1 = (a - 1) + (b - 1) + (a - 1)(b - 1) + ab(n - 1) \tag{0.128}$$

Table Anova dari hasil tersebut adalah:

Table Anova untuk membandingkan efek dua factor dan interaksinya

Sumber Variasi	Jumlah Kuadrat	df	MS	F
Faktor 1	$SS_1 = \sum_{i=1}^a bn(\bar{x}_i - \bar{x})^2$	$(a - 1)$	$SS_1 / (a - 1)$	$\frac{SS_1 / (a - 1)}{SS_{res} / ab(n - 1)}$
Faktor 2	$SS_2 = \sum_{j=1}^b an(\bar{x}_j - \bar{x})^2$	$(b - 1)$	$SS_2 / (b - 1)$	$\frac{SS_2 / (a - 1)}{SS_{res} / ab(n - 1)}$
Interaksi	$SS_{12} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b n(\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i - \bar{x}_j + \bar{x})^2$	$(a - 1)(b - 1)$	$SS_{12} / (a - 1)(b - 1)$	$\frac{SS_{12} / (a - 1)}{SS_{res} / ab(n - 1)}$
Residual	$SS_{res} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{ij})^2$	$ab(n - 1)$	$SS_{res} / ab(n - 1)$	
Total	$SS_{tot} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x})^2$	$abn - 1$	$SS_{tot} / abn - 1$	

Multivariat Model Efek Dua-Arah dengan Interaksi

Analog dengan model efek-tetap dua-arah untuk suatu vektor yang memuat p komponen,

$$\mathbf{X}_{ijk} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\tau}_i + \boldsymbol{\beta}_j + \boldsymbol{\gamma}_{ij} + \boldsymbol{\varepsilon}_{ijk} \quad (0.129)$$

Untuk $i = 1, 2, \dots, a$, $j = 1, 2, \dots, b$ dan $k = 1, 2, \dots, n$

Dimana $\sum_{i=1}^a \boldsymbol{\tau}_i = \sum_{j=1}^b \boldsymbol{\beta}_j = \sum_{i=1}^a \boldsymbol{\gamma}_{ij} = \sum_{j=1}^b \boldsymbol{\gamma}_{ij} = \mathbf{0}$. Semua vektor tersebut

berukuran $p \times 1$, dan $\boldsymbol{\varepsilon}_{ijk} \sim NIID(0, \boldsymbol{\Sigma})$. dari model $\boldsymbol{\mu}$ merupakan rata-rata keseluruhan, $\boldsymbol{\tau}_i$ efek factor 1, $\boldsymbol{\beta}_j$ efek factor 2 dan $\boldsymbol{\gamma}_{ij}$ efek factor interaksi factor 1 dan factor 2.

Eskpektasi respon pada level ke i factor 1 dan level ke- j factor 2 adalah

$$\widehat{\mathbf{X}}_{ijk} = \hat{\boldsymbol{\mu}} + \hat{\boldsymbol{\tau}}_i + \hat{\boldsymbol{\beta}}_j + \hat{\boldsymbol{\gamma}}_{ij} \quad (0.130)$$

Analogi dengan persamaan (0.125), setiap pengamatan dapat didekomposisi sebagai

$$\mathbf{x}_{ijk} = \bar{\mathbf{x}} + (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}}) + (\bar{\mathbf{x}}_j - \bar{\mathbf{x}}) + (\bar{\mathbf{x}}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}}_j + \bar{\mathbf{x}}) + (\mathbf{x}_{ijk} - \bar{\mathbf{x}}_{ijk}) \quad (0.131)$$

Dimana $\bar{\mathbf{x}}$ rata-rata keseluruhan, $\bar{\mathbf{x}}_i$ rata-rata level ke- i factor 1, $\bar{\mathbf{x}}_j$ rata-rata level ke- j factor 2 dan $\bar{\mathbf{x}}_{ij}$ level ke- i factor 1 dan level- j factor 2. Perkurangkan kedua ruang dengan $\bar{\mathbf{x}}$ lalu kuadratkan serta jumlah, diperoleh

$$(\mathbf{x}_{ijk} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{ijk} - \bar{\mathbf{x}})' = \left\{ \begin{array}{l} (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}}) + (\bar{\mathbf{x}}_j - \bar{\mathbf{x}}) + (\bar{\mathbf{x}}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}}_j + \bar{\mathbf{x}}) \\ + (\mathbf{x}_{ijk} - \bar{\mathbf{x}}_{ijk}) \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}}) + (\bar{\mathbf{x}}_j - \bar{\mathbf{x}}) + (\bar{\mathbf{x}}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}}_j + \bar{\mathbf{x}}) \\ + (\mathbf{x}_{ijk} - \bar{\mathbf{x}}_{ijk}) \end{array} \right\}'$$

Lalu ambil jumlah dari kuadrat residual dan Karena

$$\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_j - \bar{\mathbf{x}}) = 0 \text{ maka}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (\mathbf{x}_{ijk} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{ijk} - \bar{\mathbf{x}})' &= \sum_{i=1}^a bn (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})' \\ &\quad + \sum_{j=1}^b an (\bar{\mathbf{x}}_j - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_j - \bar{\mathbf{x}})' \\ &\quad + \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b n (\bar{\mathbf{x}}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}}_j + \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}}_j + \bar{\mathbf{x}})' \\ &\quad + \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (\mathbf{x}_{ijk} - \bar{\mathbf{x}}_{ijk})(\mathbf{x}_{ijk} - \bar{\mathbf{x}}_{ijk})' \end{aligned} \quad (0.132)$$

atau

$$SS_{tot} = SS_1 + SS_2 + SS_{12} + SS_{res}$$

Derajat bebas yang terkait dengan setiap jumlah pada persamaan (0.127) adalah

$$abn - 1 = (a - 1) + (b - 1) + (a - 1)(b - 1) + ab(n - 1) \quad (0.133)$$

Table Anova dari hasil tersebut adalah:

Sumber Variasi	Jumlah Kuadrat	df	MS	F
Faktor 1	$SS_1 = \sum_{i=1}^a bn(\bar{x}_i - \bar{x})^2$	$(a - 1)$	$SS_1 / (a - 1)$	$\frac{SS_1 / (a - 1)}{SS_{res} / ab(n - 1)}$
Faktor 2	$SS_2 = \sum_{j=1}^b an(\bar{x}_j - \bar{x})^2$	$(b - 1)$	$SS_2 / (b - 1)$	$\frac{SS_2 / (a - 1)}{SS_{res} / ab(n - 1)}$
Interaksi	$SS_{12} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b n(\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i - \bar{x}_j + \bar{x})^2$	$(a - 1)(b - 1)$	$\frac{SS_{12}}{(a - 1)(b - 1)}$	$\frac{SS_{12} / (a - 1)}{SS_{res} / ab(n - 1)}$
Residual	$SS_{res} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{ij})^2$	$ab(n - 1)$	$SS_{res} / ab(n - 1)$	
Total	$SS_{tot} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x})^2$	$abn - 1$	$SS_{tot} / abn - 1$	

Uji (likelihood rasio) dari hipotesis

$$H_0 : \gamma_{11} = \gamma_{12} = \dots = \gamma_{ab} = 0 \quad (0.134)$$

Lawan

H_1 : Paling sedikit terdapat satu tidak sama dengan nol

Dilakukan dengan menolak H_0 untuk nilai kecil dari rasio

$$\Gamma = \frac{|SSP_{res}|}{|SSP_{int} + SSP_{res}|} \quad (0.135)$$

Untuk sample besar, Lambda Wilk dapat didekati dengan distribusi chi-kuadrat. Menggunakan Bartlet untuk menaikkan kesuaian dengan chi-kuadrat, tolak H_0 jika

$$-\left[ab(n-1) = \frac{p+1 - (a-1)(b-1)}{2} \right] \ln \Gamma > \chi^2_{(a-1)(b-1)p}(\alpha) \quad (0.136)$$

Dimana Γ diberikan dalam persamaan (0.135) dan $\chi^2_{(a-1)(b-1)p}(\alpha)$ persentil ke (100α) dari distribusi chi-kuadrat dengan derajat bebas $(a-1)(b-1)p$

Dalam model multivariate, pengujian terhadap efek factor utama dilakukan setelah melakukan pengujian terhadap factor interaksi.

■ Contoh 6.10 (Analisis Multivariat dua-arah dari variansi data Pita Film)

Syarat optimum yang ditekan pada pita film telah diuji menggunakan suatu teknologi yang disebut operasi evolusioner. Dalam pembicaraan ini, tiga respon x_1 = tahan arah (basah), x_2 =kehalusan permukaan, x_3 = kedap cahaya, dimana ketiga diukur dalam dua level, rata-rata dan jumlah aditif. Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali pada setiap kombinasi factor. Datanya ditampilkan pada table berikut:

		Faktor 1: Jumlah Aditif					
		Low			High		
		x_1	x_2	x_3	x_1	x_2	x_3
Rata-rata Perubahan Extrude	Low	6.5	9.5	4.4	6.9	9.1	5.7
		6.2	9.9	6.4	7.2	10.0	2.0
		5.8	9.6	3.0	6.9	9.9	3.9
		6.5	9.6	4.1	6.1	9.5	1.9
		6.5	9.2	0.8	6.3	9.4	5.7
	High	6.7	9.1	2.8	7.1	9.2	8.4
		6.6	9.3	4.1	7.0	8.8	5.2
		7.2	8.3	3.8	7.2	9.7	6.9
		7.1	8.4	1.6	7.5	10.1	2.7
		6.8	8.5	3.4	7.6	9.2	1.9

ANOVA: Tear; Gloss; Opacity versus Extrusion; Additive

MANOVA for Extrusion

$s = 1$ $m = 0,5$ $n = 6,0$

Criterion	Test Statistic	F	DF		P
			Num	Denom	
Wilks'	0,38186	7,554	3	14	0,003
Lawley-Hotelling	1,61877	7,554	3	14	0,003
Pillai's	0,61814	7,554	3	14	0,003
Roy's	1,61877				

SSCP Matrix for Extrusion

	Tear	Gloss	Opacity
Tear	1,740	-1,504	0,8555
Gloss	-1,504	1,301	-0,7395
Opacity	0,855	-0,739	0,4205

SSCP Matrix for Error

	Tear	Gloss	Opacity
Tear	1,764	0,0200	-3,070
Gloss	0,020	2,6280	-0,552

Opacity -3,070 -0,5520 64,924

Partial Correlations for the Error SSCP Matrix

	Tear	Gloss	Opacity
Tear	1,00000	0,00929	-0,28687
Gloss	0,00929	1,00000	-0,04226
Opacity	-0,28687	-0,04226	1,00000

EIGEN Analysis for Extrusion

Eigenvalue	1,619	0,00000	0,00000
Proportion	1,000	0,00000	0,00000
Cumulative	1,000	1,00000	1,00000

Eigenvector	1	2	3
Tear	0,6541	0,4315	0,0604
Gloss	-0,3385	0,5163	0,0012
Opacity	0,0359	0,0302	-0,1209

MANOVA for Additive

s = 1 m = 0,5 n = 6,0

Criterion	Test Statistic	F	DF		P
			Num	Denom	
Wilks'	0,52303	4,256	3	14	0,025
Lawley-Hotelling	0,91192	4,256	3	14	0,025
Pillai's	0,47697	4,256	3	14	0,025
Roy's	0,91192				

SSCP Matrix for Additive

	Tear	Gloss	Opacity
Tear	0,7605	0,6825	1,931
Gloss	0,6825	0,6125	1,732
Opacity	1,9305	1,7325	4,901

EIGEN Analysis for Additive

Eigenvalue	0,9119	0,00000	0,00000
------------	--------	---------	---------

Proportion	1,0000	0,00000	0,00000
Cumulative	1,0000	1,00000	1,00000

Eigenvector	1	2	3
Tear	-0,6330	0,4480	-0,1276
Gloss	-0,3214	-0,4992	-0,1694
Opacity	-0,0684	0,0000	0,1102

MANOVA for Extrusion*Additive

s = 1 m = 0,5 n = 6,0

Criterion	Test Statistic	F	DF		P
			Num	Denom	
Wilks'	0,77711	1,339	3	14	0,302
Lawley-Hotelling	0,28683	1,339	3	14	0,302
Pillai's	0,22289	1,339	3	14	0,302
Roy's	0,28683				

SSCP Matrix for Extrusion*Additive

	Tear	Gloss	Opacity
Tear	0,000500	0,01650	0,04450
Gloss	0,016500	0,54450	1,46850
Opacity	0,044500	1,46850	3,96050

EIGEN Analysis for Extrusion*Additive

Eigenvalue	0,2868	0,00000	0,00000
Proportion	1,0000	0,00000	0,00000
Cumulative	1,0000	1,00000	1,00000

Eigenvector	1	2	3
Tear	-0,1364	0,1806	0,7527
Gloss	-0,5376	-0,3028	-0,0228
Opacity	-0,0683	0,1102	-0,0000

Untuk uji interaksi, hitung

$$\Gamma = \frac{|\text{SSP}_{\text{res}}|}{|\text{SSP}_{\text{int}} + \text{SSP}_{\text{res}}|} = \frac{275.7098}{354.7906} = 0.7771$$

Untuk $(a-1)(b-1) = 1$

$$F = \left(\frac{1 - \Gamma}{\Gamma} \right) \frac{(ab(n-1) - p + 1)/2}{(|(a-1)(b-1) - p| + 1)/2}$$

Berdistribusi- F dengan $v_1 = |(a-1)(b-1) - p| + 1$ dan $v_2 = ab(n-1) - p + 1$. Sebagai contoh

$$F = \left(\frac{1 - 0.7771}{0.7771} \right) \frac{(2(2)(4) - 3 + 1)/2}{(|1(1)0.3| + 1)/2} = 1.34$$

$$v_1 = (|1(1) - 3| + 1) = 3$$

$$v_2 = (2(2)(4) - 3 + 1) = 14$$

dan $F_{3,14}(0.05) = 3.34$. Karena $F = 1.34 < F_{3,14}(0.05) = 3.34$, keputusannya adalah tidak tolak hipotesis H_0 atau tidak ada interaksi factor.

Perhatikan bahwa pendekatan statistic chi-kuadrat untuk uji ini adalah sesuai dengan persamaan (0.136), yaitu

$$-\left[ab(n-1) = \frac{p+1 - (a-1)(b-1)}{2} \right] \ln \Gamma$$

$$-\left[2(2)(4) = \frac{(3+1-1(1))}{2} \right] \ln(0.7771)$$

$$= 3.66$$

Karena $\chi_3^2(0.05) = 7.81$, kita dapat mengambil kesimpulan yang sama sebagaimana yang disajikan dalam uji- F .

Untuk menguji efek factor 1 dan factor 2, hitung

$$\Gamma = \frac{|\mathbf{SSP}_{res}|}{\mathbf{SSP}_{fac1} + \mathbf{SSP}_{res}} = \frac{275.7098}{722.0212} = 0.3819$$

dan

$$\Gamma = \frac{|\text{SSP}_{res}|}{\text{SSP}_{fac2} + \text{SSP}_{res}} = \frac{275.7098}{527.1347} = 0.5230$$

Untuk derajat bebas dari kedua factor tersebut adalah $a - 1$ dan $b - 1$,

$$F_1 = \left(\frac{1 - \Gamma}{\Gamma} \right) \frac{(ab(n-1) - p + 1)/2}{(|(a-1) - p| + 1)/2}$$

Berdistribusi F dengan derajat bebas

$$v_1 = (|(a-1) - p| + 1) \text{ dan } v_2 = (ab(n-1) - p + 1)$$

dan

$$F_1 = \left(\frac{1 - \Gamma}{\Gamma} \right) \frac{(ab(n-1) - p + 1)/2}{(|(b-1) - p| + 1)/2}$$

Berdistribusi F dengan derajat bebas

$$v_1 = (|(b-1) - p| + 1) \text{ dan } v_2 = (ab(n-1) - p + 1)$$

Dalam kasus di atas,

$$F_1 = \left(\frac{1 - 0.3819}{0.3819} \right) \frac{(16 - 3 + 1)/2}{(|1 - 3| + 1)/2} = 7.55$$

$$F_2 = \left(\frac{1 - 0.5230}{0.5230} \right) \frac{(16 - 3 + 1)/2}{(|1 - 3| + 1)/2} = 4.26$$

dan

$$v_1 = |1 - 3| + 1 = 3 ; v_2 = (16 - 3 + 1) = 14$$

dari perhitungan sebelumnya, $F_{3,14}(0.05) = 3.34$. Karena $F_1 = 7.55 > F_{3,14}(0.05) = 3.34$. Keputusannya adalah tolak H_0 pada taraf signifikansi 0.05. Dengan cara yang sama

$F_2 = 4.26 > F_{3,14}(0.05) = 3.34$, keputusannya adalah tolak H_0 pada taraf signifikansi 0.05.

Latihan Soal

- 6.1. Konstruksi dan Gambarkan gabugan daerah kepercayaan 95% untuk perbedaan vektor rata-rata menggunakan data pada contoh 6.1. Perhatikan bahwa titik $\delta = \mathbf{0}$ jatuh diluar kontur 95%. Apakah sesuai dengan $H_0 : \delta = \mathbf{0}$ yang dijelaskan dalam contoh 6.1? Jelaskan
- 6.2. Gunakan informasi dalam contoh 6.1. Konstruksi interval kepercayaan simultan Banferroni untuk komponen perbedaan rata-rata vektor δ . Bandingkan panjang tersebut dengan panjang interval pada contoh.
- 6.3. Seorang peneliti memperhatikan tiga indikasi pengukuran kerusakan serangan jantung. Nilai dari indikasi-indikasi tersebut untuk $n = 40$ pasien serangan jantung yang datang ke rumah sakit menghasilkan rangkuman statistic berikut

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 46.1 \\ 57.3 \\ 50.4 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{S} = \begin{bmatrix} 101.3 & 63.0 & 71.0 \\ 63.0 & 80.2 & 55.6 \\ 71.0 & 55.6 & 97.4 \end{bmatrix}$$

- (a) Dari ketiga indikasi tersebut dievaluasi untuk setiap pasien. Uji kesamaan rata-rata indikasi dengan menggunakan persamaan 0.92. dengan $\alpha = 0.05$
 - (b) Buat keputusan dari perbedaan pasangan rata-rata indikasi menggunakan interval kepercayaan simultan 95%.
- 6.4. Gunakan data perlakuan (2) dan perlakuan (3) dalam latihan 6.6 Untuk
 - (a) Hitung S_p
 - (b) Uji hipotesis $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ lakukan untuk dua sampel dengan $\alpha = 0.01$

- (c) Konstruksi interval kepercayaan simultan 95% untuk perbedaan $\mu_{2i} - \mu_{3i}$, untuk $i = 1, 2$
- 6.5. Gunakan ringkasan statistic pada latihan 6.3, untuk menghitung T^2 dan uji hipotesis $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$, dengan asumsi bahwa $\Sigma_1 = \Sigma_2$. Nyatakan $\alpha = 0.05$. Tentukan kombinasi linear dari komponen rata-rata yang memberikan peran lebih dalam penolakan $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$.

- 6.6. Pengamatan pada dua respon telah dilakukan untuk tiga perlakuan. Vektor pengamatan $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ adalah

$$\text{Perlakuan 1: } \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$\text{Perlakuan 2: } \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{Perlakuan 3: } \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

- (a) Pecah pengamatan tersebut menjadi komponen rata-rata, perlakuan, dan residual. Konstruksi array yang berkaitan untuk setiap variabel.
- (b) Gunakan transformasi pada bagian (a), konstruksi table MANOVA satu arah
- (c) Evaluasi lambda wilk, dan gunakan table 6.3 untuk menguji efek perlakuan, untuk $\alpha = 0.01$. Ulangi pengujian dengan menggunakan pendekatan chi-kuadrat dengan Perbaikan Bartlett. Bandingkan kesimpulannya.
- 6.7. MANOVA dua arah tanpa pengulangan). Perhatikan pengamatan pada dua respon, x_1 dan x_2 , sebagaimana ditampilkan dalam bentuk table dua arah

		Faktor 2			
		Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Faktor 1	Level 1	$\begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \\ 12 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$
	Level 2	$\begin{bmatrix} 3 \\ 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$
	Level 3	$\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 \\ -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 \\ -6 \end{bmatrix}$

Dengan tanpa pengulangan, model MANOVA dua-ary adalah

$$\mathbf{X}_{lk} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\tau}_l + \boldsymbol{\beta}_k + \boldsymbol{\varepsilon}_{lk}$$

(a) Dekomposisi pengamatan untuk setiap dua variabel sebagai

$$x_{lk} = \bar{x} + (\bar{x}_l - \bar{x}) + (\bar{x}_{.k} - \bar{x}) + (x_{lk} - \bar{x}_l - \bar{x}_{.k} + \bar{x})$$

(b) Hitung jumlah kuadrat

$$SS_{tot} = SS_{rt} + SS_{f1} + SS_{f2} + SS_{res}$$

Dan hasil kali

$$SCP_{tot} = SCP_{rt} + SCP_{f1} + SCP_{f2} + SCP_{res}$$

Dari dua hal tersebut, susun matriks \mathbf{SSP}_{tot} , \mathbf{SSP}_{f1} , \mathbf{SSP}_{f2} , dan \mathbf{SSP}_{res} dengan derajat bebas $ab - 1$, $a - 1$, $b - 1$, dan $(a - 1)(b - 1)$

(c) Tuangkan seluruh hasil perhitungan pada bagian (b) dalam table MANOVA.

(d) Dari table MANOVA pada bagian (c), uji efek factor 1 dan factor 2 pada taraf signifikansi $\alpha = 0.01$

6. 8. Suatu eksperimen dengan pengamatan berulang dari data pada latihan 6.7 dan hasilnya sebagaimana data berikut

		Faktor 2			
		Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Faktor 1	Level 1	$\begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \\ 12 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$
	Level 2	$\begin{bmatrix} 3 \\ 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$
	Level 3	$\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 \\ -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 \\ -6 \end{bmatrix}$

- (a) Gunakan data tersebut untuk mendekomposisi setiap dari dua pengukuran dalam vektor pengamatan sebagai

$$x_{ik} = \bar{x} + (\bar{x}_i - \bar{x}) + (\bar{x}_{.k} - \bar{x}) + (x_{ik} - \bar{x}_i - \bar{x}_{.k} + \bar{x})$$

- (b) Kombinasikan dengan hasil yang diperoleh pada latihan 6.7 untuk mendapatkan table MANOVA dua arah
- (c) Dari hasil yang diperoleh pada bagian (c), uji factor interaksi, dan jika tidak ada pengaruhnya, lanjutkan dengan uji factor utama 1, dan factor utama 2. Gunakan rasio likelihood dengan $\alpha = 0.05$
- (d) Jika efek utama, tapi bukan efek inteaksi, ada, uji efek utama dengan mengkonstruksi interval kepercayaan simultan Banferroni untuk perbedaan komponene dari parameter factor efek.

6. 9.Merujuk pada latihan 6.7.

- (a) Uji dengan pendekatan chi-kuadrat (ratio likelihood) untuk efek factor 1 dan factor 2 dengan taraf signifikansi $\alpha = 0.05$. Bandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil untuk uji-F . jelaskan perbedaannya

Gunakan persamaan 6.70, konstruksi interval kepercayaan simultan 95% dalam parameter efek factor 1 untuk ketiga pasangan respon. Interpretasi interval tersebut. Ulangi perhitungan untuk parameter efek factor 2.

DAFTAR PUSTAKA



- Chen, Zexun. "Multivariate Gaussian and Student-t process regression for multi-output prediction." *Neural Computing and Applications* 32.8 (2020): 3005-3028.
- Demšar, Janez. "Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets." *Journal of Machine Learning Research* (2006).
- Fletcher, Jonathan. "Model comparison tests of linear factor models in U.K. stock returns." *Finance Research Letters* 28 (2019): 281-291.
- Hahs-Vaughn, Debbie L. *Applied Multivariate Statistical Concepts*. New York, NY : Routledge: TaylorFrancis, 2017.
- Hair, Joseph F, et al. *Multivariate Data Analysis*. Seventh Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, 2012.
- Harris, Richard J. *A Primer of Multivariate Statistics*. Third Edition. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2001.
- Le Maître, Anne. "Multivariate comparison of variance in R." *Methods in Ecology and Evolution* (2019): 1380-1392.
- Markowitz, Jeffrey S. "SpringerBriefs in Public Health." Markowitz, Jeffrey S. *Multivariate Analysis* . New York: Springer, 2018. 71-81.
- Midway, Stephen. "Comparing multiple comparisons: practical guidance for choosing the best multiple comparisons test." *PeerJ* 8 (2020): e10387.

Rencher, Alvin C and William F Christensen. *Method of Multivariate Analysis*. Third Edition. New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2012.

Seber, George A.F. *A Matrix Handbook for Statisticians*. New York: A John Wiley & Sons. Inc, 2007.

Tabachnick, Barbara G and Linda S Fidell. *Using Multivariate Statistics*. Sixth Edition. New Jersey: Pearson, 2013.

Timm, Neil H. *Applied Multivariate Analysis*. New York: Springer, 2002.

Wichern, Dean W and Richard A Johnson. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. Sixth Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007.

INDEKS



- Acak, 3, 4, 15, 35
analisis variansi, 109, 110
bartlet, 120
Berdistribusi, 37, 85, 132,
144, 145
Bivariate, 4, 49
chi-kuadrat, 35, 51, 53, 77,
104, 121, 132, 133, 140,
144, 147, 149
Data, 1, 9, 47, 52, 71, 78
Data multivariate, 1
definit positif, 33, 34, 42, 77
dekomposisi, 111, 114
derajat bebas, 35, 38, 43, 44,
51, 60, 63, 85, 88, 94, 100,
104, 108, 114, 115, 121,
133, 140, 145, 148
Dua-Arah, 134, 137
efek, 84, 95, 97, 98, 110, 114,
116, 117, 119, 120, 121,
123, 124, 126, 128, 134,
136, 137, 140, 144, 147,
148, 149
Efek, 115, 128, 134, 137
eksperimen, 1, 84, 86, 91, 92,
109, 134, 148
factor interaksi, 134, 137, 140,
149
independen, 16, 18, 38, 43,
44, 62, 87, 91, 93, 98, 99,
100, 101, 109, 111, 128,
134
Interaksi, 134, 136, 137, 139
Interval kepercayaan, 85, 88,
90, 94, 98, 103, 105, 128,
129
Interval Kepercayaan, 76, 103,
128
item, 1
jumlah kuadrat, 22, 43, 110,
111, 113, 114, 119, 148
Jumlah kuadrat residual, 119
koefisien korelasi, 31, 48, 53
komponen, 7, 18, 36, 37, 65,
75, 79, 81, 93, 103, 108,
109, 117, 122, 128, 129,
137, 146, 147
Korelasi, 4, 5, 6, 8, 20, 54
korelasi sampel, 6, 22
Kovariansi, 4, 6, 20, 25, 131
Kovarinsi, 4
kuadrat residual, 113, 119,
135, 138
Lambda Wilk, 120, 140
likelihood rasio, 140
Manova, 108, 109, 117, 119,
121
MANOVA, 116, 119, 122, 123,
134, 141, 142, 143, 147,
148, 149

matriks, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14,
 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
 23, 27, 30, 31, 33, 37, 40,
 41, 42, 44, 62, 64, 69, 77,
 79, 80, 83
 Membandingkan, 84, 86, 91,
 92, 98, 108, 117
 Model, 30, 117, 134, 137
 nilai eigen, 33, 34, 35, 40, 71,
 72
 nilai statistik, 3, 80
 Nilai Statistik Uji, 86, 91
 pengamatan, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
 11, 12, 14, 15, 16, 24, 25,
 26, 30, 39, 40, 45, 47, 49,
 50, 51, 52, 54, 58, 61, 63,
 71, 77, 78, 80, 82, 83
 Perbandingan, 69, 75, 84, 86,
 91, 98, 128
 perlakuan, 84, 85, 86, 89, 91,
 92, 93, 94, 95, 97, 98, 109,
 110, 111, 113, 114, 116,
 117, 119, 120, 121, 123,
 124, 128, 129, 146, 147
 persentil, 35, 38, 51, 68, 77,
 78, 85, 88, 94, 104, 115,
 121, 140
 Prosedur Pengujian, 86
 Rancangan Pengukuran
 Berulang, 84, 92, 93
 rata-rata, 3, 12, 14, 15, 16, 21,
 25, 27, 28, 29, 30, 31, 37,
 39, 42, 44, 53, 57, 70, 76,
 77, 79, 85, 86, 87, 88, 89,
 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97,
 98, 99, 101, 103, 105, 108,
 109, 110, 113, 114, 117,
 119, 121, 122, 124, 127,
 128, 129, 130, 131, 134,
 135, 137, 140, 146, 147
 respon, 84, 85, 86, 92, 93, 95,
 98, 110, 111, 134, 137,
 140, 147, 149
 Selisih, 86, 91
 Simultan, 69, 103, 128
 taraf signifikansi, 77, 82, 86,
 91, 115, 116, 124, 127,
 133, 145, 148, 149
 uji Bartlet, 104
 Uji Box, 131, 132
 uji hipotesis, 77, 85, 147
 uji likelihood rasio, 131
 Uji Roy, 127
 Uji Wilk, 119
 ukuran relative, 114, 119
 unit eksperimen., 1
 variable, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11,
 13, 15, 16, 29, 30, 32, 35,
 36, 39, 43, 44, 51, 52, 53,
 54, 55, 57, 58, 63, 69, 78
 Variansi, 3, 6, 7, 25
 Variansi Dua-Arah, 134
 Variansi sampel, 3, 25
 variansi-kovariansi, 30
 variasi, 11, 84, 91, 104, 114,
 127
 vektor, 5, 12, 13, 14, 15, 16,
 20, 21, 27, 28, 30, 33, 34,
 35, 36, 37, 39, 40, 42, 57,
 58, 69, 71, 72, 73, 79, 80
 vektor eigen, 33, 34, 35, 71, 72
 Wilks, 68, 120, 121, 141, 142,
 143

TENTANG PENULIS



Irwan, S.Si., M.Si, lahir di Lisu-Kabupaten Barru pada Tahun 1978 bulan September tanggal 22.

Menyelesaikan Pendidikan magister pada Jurusan Statistika Institut Teknologi Sepuluh Noverber Surabaya pada Tahun 2006, Tahun 2003 menyelesaikan studi pada Jurusan Matematika Universitas Negeri Makassar. Selama mengikuti Pendidikan penulis terlibat pada beberapa organisasi, asisten dosen, tim asisten di Laboratorium Komputer Matematika.

Sejak Tahun 2006, penulis mulai aktif mengajar di Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Univeristas Islam Negeri Makassar hingga sekarang. Mengikuti berbagai pelatihan professional dan juga sebagai trainer-Pelatihan Modul Dasar BTL, LSE, ICT bagi guru SMT/MTS mitra DBE3 USAID Indonesia-2008-2009, fasilitator pada workshop pembelajaran PAKEM dan penggunaan alat peraga matematika bagi guru SD/MI se-kabupaten Bulukumba.

Jabatan Struktural- Ketua Jurusan Matematika, Sekretaris LPM UIN Alauddin Makassar.



Adnan Sauddin, lahir Teomokole pada Tahun 1974 bulan Mei tanggal 17. Suatu daerah kepulauan (Pulau Kabaena) di Kabupaten Bombana. Anak ke-16 dari enambelas bersaudara.

Menyelesaikan Pendidikan magister pada Jurusan Statistika Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada Tahun 2007, Tahun 2000 menyelesaikan studi pada Jurusan Pendidikan Matematika Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Tahun 1998 berubah menjadi UNM). Selama mengikuti Pendidikan penulis terlibat pada beberapa organisasi .

Sejak Tahun 2000, penulis mulai aktif mengajar di Lembaga Pendidikan-STMik Balikpapan-dan berkesempatan mengikuti berbagai pelatihan professional. Pada Tahun 2013 penulis hijrah ke Sulawesi selatan dan terdaftar sebagai pengajar pada Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Makassar hingga sekarang.



Irwan, S.Si., M.Si, lahir di Lisu, Kabupaten Barru pada Tahun 1978 bulan September tanggal 22. Menyelesaikan Pendidikan Magister pada Jurusan Statistika Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada tahun 2006, Tahun 2003 menyelesaikan studi pada Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar. Selama mengikuti Pendidikan penulis terlibat pada beberapa organisasi, asisten dosen, tim asisten di Laboratorium Komputer Matematika.

Sejak tahun 2006, penulis mulai aktif mengajar di Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga sekarang. Mengikuti berbagai pelatihan profesional dan juga sebagai trainer-Pelatihan Modul Dasar BTL, LSE, ICT bagi guru SMT/MTS mitra DBE3 USAID Indonesia-2008-2009, fasilitator pada workshop pembelajaran PAKEM dan penggunaan alat peraga matematika bagi guru SD/MI se-kabupaten Bulukumba. Jabatan Struktural, Ketua Jurusan Matematika, Sekretaris LPM UIN Alauddin Makassar.



Adnan Sauddin, lahir Teomokole pada Tahun 1974 bulan Mei tanggal 17. Suatu daerah kepulauan (Pulau Kabaena) di Kabupaten Bombana. Anak ke-16 dari enam belas bersaudara. Menyelesaikan Pendidikan Magister pada Jurusan Statistika Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada tahun 2007, Tahun 2000 menyelesaikan studi pada Jurusan Pendidikan Matematika Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (tahun 1998 berubah menjadi UNM). Selama mengikuti Pendidikan penulis terlibat pada beberapa organisasi.

Sejak tahun 2000, penulis mulai aktif mengajar di Lembaga Pendidikan -STMIK Balikpapan- dan berkesempatan mengikuti berbagai pelatihan profesional. Pada tahun 2013 penulis hijrah ke Sulawesi Selatan dan terdaftar sebagai pengajar pada Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga sekarang.

