

Buku Perguruan Tinggi



Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia

Berdasarkan Referensi SDKI, SLKI dan SIKI

Dr. Risnah, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes
Musdalifah, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep
A. Adriana Amal, S.Kep. Ns., M.Kep
Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kep
Rasmawati, S.Kep., Ns., M.Kep



Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia

Penulis : - Dr. Risnah, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes
- Musdalifah, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep
- A. Adriana Amal, S.Kep., Ns., M.Kep
- Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kep
- Rasmawati, S.Kep., Ns., M.Kep

Editor : Muhammad Irwan, S.Kep., Ns., M.Kes

Layout : Raffa Najib Fawwazaniq

Desain Cover : Putri Chaniago

Anggota IKAPI, Jakarta

Diterbitkan pertama kali oleh:

CV. Trans Info Media

Jl. Man 6 No. 74 Kramat Jati -- Jakarta Timur

Telp/Fax. (021) 87783328 / Hp : 0813 1164 2419

E-mail : penerbit_tim@yahoo.com / Penerbit.tim@gmail.com

Facebook : transinfomedia -- Twitter : @transinfomedia official

Ig: @transinfomedia official -- LinkedIn : transinfomedia

Blog : www.transinfotim.blogspot.com

Web : www.transinfomedia.com

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari penerbit

Cetakan Pertama: 2022

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Risnah,

Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia
/ Dr. Risnah, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes, Musdalifah, S.Kep., Ns.,
M.Kes., M.Kep, A. Adriana Amal, S.Kep., Ns., M.Kep, Nurhidayah,
S.Kep., Ns., M.Kep, Rasmawati, S.Kep., Ns., M.Kep ; Jakarta: TIM,
2022

Ukuran Buku : 14 x 21 cm; x + 302 hal

ISBN : 978-602-202-338-8

Asuhan Keperawatan

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia

(Berdasarkan Referensi SDKI, SLKI dan SIKI)

Blog : www.transinfotim.blogspot.com
Web : www.transinfomedia.com

NASKAH SIAP CETAK

N
A
S
K
A
H

S
I
A
P

C
E
T
A
K

Asuhan Keperawatan

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia

(Berdasarkan Referensi SDKI, SLKI dan SIKI)

Tim Penulis:

1. Dr. Risnah, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes
2. Musdalifah, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep
3. A. Adriana Amal, S.Kep., Ns., M.Kep
4. Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kep
5. Rasmawati, S.Kep., Ns., M.Kep

Editor:

Muhammad Irwan, S.Kep., Ns., M.Kes

Penerbit: Trans Info Media, Jakarta

Blog : www.transinfotim.blogspot.com

Web : www.transinfomedia.com

T.21112320

NASKAH SIAP CETAK

N
A
S
K
A
H

S
I
A
P

C
E
T
A
K



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur pada Allah SWT untuk semua nikmat yang telah dianugerahkan hingga detik ini. Semoga rasa syukur ini memberikan berkah dan menjadikan kita semua orang-orang yang beriman dan bermanfaat dihadirkan oleh-NYA di dunia ini. Salawat dan salam senantiasa terkirim pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan kita bersama menjalani semua proses dalam kehidupan.

Di kesempatan ini pula, tak lupa kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah berusaha maksimal membantu tim penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan dalam proses penyusunan buku referensi ini dan dengan sabar memberikan saran, masukan serta melakukan editing dan revisi sebagai upaya penyempurnaannya. Semoga buku referensi ini bermanfaat bagi profesi keperawatan dan petu-

gas kesehatan serta seluruh lapisan masyarakat pada umumnya yang insyaallah menjadi amal jariyah untuk kita semua.
Wassalam

Gowa, Desember 2021

Tim Penulis

N A S K A H S I A P C E T A K



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Bab 1 Kebersihan Dan Perawatan Diri.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Kebutuhan Kebersihan dan Perawatan Diri	2
C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Kebersihan dan Perawatan Diri	11
Bab 2 Aktivitas Dan Latihan	17
A. Pendahuluan.....	17
B. Konsep Dasar Kebutuhan Aktivitas dan Latihan.....	20
C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Aktivitas dan Latihan.....	27
Bab 3 Istirahat Dan Tidur	39
A. Pendahuluan.....	39
B. Konsep Dasar Kebutuhan Istirahat dan Tidur	41

C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Istirahat dan Tidur	50
Bab 4 Nutrisi	61
A. Pendahuluan	61
B. Konsep Dasar Kebutuhan Nutrisi	62
C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Nutrisi	67
Bab 5 Eliminasi Urine Dan Fekal	77
A. Pendahuluan	77
B. Konsep Dasar Kebutuhan Eliminasi Urine dan Fekal .	79
C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Eliminasi Urine dan Fekal	90
Bab 6 Oksigenasi / Respirasi	105
A. Pendahuluan	105
B. Konsep Dasar Kebutuhan Oksigenasi / Respirasi.....	107
C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Oksigenasi / Respirasi	112
Bab 7 Keseimbangan Cairan, Elektrolit Dan Asam Basa.	139
A. Pendahuluan	139
B. Konsep Dasar Kebutuhan Cairan, Elektrolit dan Asam Basa	140
C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Cairan, Elektrolit dan Asam Basa	146
Bab 8 Manajemen Nyeri	171
A. Pendahuluan	171
B. Konsep Dasar Kebutuhan Manajemen Nyeri	174

N A S K A H S I A P C E T A K

C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Manajemen Nyeri.....	186
Bab 9 Integritas Kulit Dan Luka	197
A. Integritas Kulit	197
B. Luka	214
C. Konsep Asuhan Keperawatan Integritas Kulit dan Luka	233
Bab 10 Mobilisasi Dan Imobilisasi	255
Konsep Dasar Pemenuhan Kebutuhan Mobilisasi Fisik .	255
Biodata Pengarang	287
Daftar Pustaka	291

NASKAH SIAP CETAK

N
A
S
K
A
H

S
I
A
P

C
E
T
A
K

BAB 1

KEBERSIHAN DAN PERAWATAN DIRI

A. Pendahuluan _____

Kebutuhan dasar adalah unsur penting yang harus diperhatikan oleh manusia sebagai Makhluk Ciptaan Allah yang dibekali dengan pemikiran untuk tetap menjaga keseimbangan hidup, menjaga agar kondisi tubuh tetap dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikologis. Salah satu kebutuhan dasar tersebut adalah kemampuan menjaga kebersihan diri (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

Personal Hygiene sangat penting untuk selalu dijaga selama proses kehidupan kita, Hal ini menjadi sangat penting karena akan berdampak pada kesehatan baik fisik maupun psikologis. *Personal Hygiene* setiap orang sangat dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, status kesehatan, sosial ekonomi dan pengetahuan (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

Seperti halnya yang terdapat pada jurnal yang membahas mengenai *Self-Assesment of Hygiene Practice* menekankan bahwa menjaga kebersihan diri menjadi upaya preventif dalam pencegahan penyakit menular, menjaga kebersihan diri

diperlukan untuk beberapa alasan yaitu, untuk diri sendiri, sosial, kesehatan dan psikologis sebagai cara hidup (Odonkor, Kitcher, Okyere, & Mahami, 2019).

Dalam keadaan sakit terkadang masalah kebersihan kurang mendapat perhatian padahal jika tidak dijaga justru akan mempengaruhi masalah kesehatan umum yang diderita atau dirasakan oleh pasien. Beberapa hal yang bisa terjadi seperti kerusakan kulit, gigi, mukosa mulut, rambut mata, kuku, kelamin, rasa tidak nyaman, penampilan yang kurang menarik dan dapat menimbulkan reaksi emosional (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

Peran perawat sangat dibutuhkan dalam memberikan asuhan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan *personal hygiene*, khususnya bagi pasien yang tidak dapat melakukan perawatan kebersihan diri secara mandiri dan juga meningkatkan pengetahuan kepada pasien tentang pentingnya menjaga kebersihan diri (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

Mengingat pentingnya menjaga kebersihan diri, perlu proses pembelajaran mengenai konsep dasar *personal hygiene* dan Asuhan Keperawatan kebutuhan *personal hygiene* (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

B. Konsep Dasar Kebutuhan Kebersihan dan Perawatan Diri

1. Defenisi *Personal Hygiene*

Personal Hygiene adalah cara yang dilakukan oleh individu untuk melakukan perawatan pada dirinya agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kesehatan. Melakukan *personal hygiene* secara benar dan teratur akan

meningkatkan derajat kesehatan (Potter & Perry, 2012). *Personal Hygiene* adalah tindakan perawatan diri yang dilakukan untuk memelihara kesehatan baik fisik maupun psikologi (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

Pada kondisi tertentu seperti adanya keterbatasan fisik akibat sakit atau kecacatan dan adanya masalah priskologis, perawatan diri seseorang bisa mengalami hambatan. Jadi orang yang sehat akan mampu memenuhi kebersihan diri secara mandiri sedangkan orang yang sakit membutuhkan bantuan perawat dalam pemenuhan kebutuhan dasar kebersihan diri (Potter & Perry, 2012).

2. Tujuan *Personal Hygiene*

Beberapa hal yang menjadi tujuan dari *personal hygiene* antara lain (Rosmalawati & Kasiati, 2016):

- Memberikan rasa nyaman.
- Memelihara kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan.
- Membuat penampilan menjadi menarik secara fisik.
- Meningkatkan citra tubuh karena adanya rasa percaya diri.
- Mencegah agar terhindar dari penyakit baik untuk diri sendiri maupun orang.

3. Faktor yang Mempengaruhi *Personal Hygiene*

Ada banyak kondisi yang dapat mempengaruhi cara seseorang mempertahankan *personal hygiene* antara lain :

- Budaya
Beberapa budaya, biasanya mandi hanya sekali dalam seminggu, ada juga yang mandi setiap hari. Sehingga

budaya yang berbeda akan mempengaruhi cara setiap orang dalam melakukan perawatan diri (Dzاهر, 2017).

b. Status Kesehatan

Banyak pasien di rumah sakit menjadi tergantung dalam memenuhi kebutuhan perawatan diri, seperti mandi, perawatan rambut, perawatan mulut, perawatan kuku, dan kebutuhan ke toilet. Kondisi ini bisa saja disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan pasien dalam menjaga kebersihan diri atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mereka melakukannya secara mandiri sehingga membutuhkan bantuan Perawat dan Keluarga. Pasien pasca operasi dengan kemampuan terbatas, Gips plaster sayatan bedah, menderita masalah punggung, radang sendi atau mobilitas lain tentu akan menjadi hambatan (Johnson, 2017).

c. Status Sosial Ekonomi

Personal hygiene seseorang dapat berubah mengikuti keadaan status ekonomi, misal dalam penggunaan produk perawatan tertentu dalam mencukur, mandi, dan mencuci rambut. Jadi ketika hendak memberikan perawatan diri kepada pasien, hal yang harus dilakukan adalah mengamati atau menanyakan secara rinci tentang praktik kebersihan yang mereka sukai (Dzاهر, 2017).

d. Kondisi Fisik (Kecacatan)

Kecacatan Jasmani dapat mencegah seseorang untuk tetap mempertahankan tingkat kebersihannya. Apabila kecacatan berkembang dari waktu ke waktu, pasien

bisa saja merasa frustrasi karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi (Dzاهر, 2017).

e. Kondisi Psikologis

Masalah kesehatan mental apapun dapat mempengaruhi kemampuan dan motivasi seseorang untuk merawat kebutuhan kebersihannya. Depresi, kecemasan, Skizofrenia, Alzheimer dan lainnya diketahui memiliki potensi untuk mempengaruhi kemampuan seseorang untuk merawat diri sendiri.

Kehilangan ingatan, motivasi, isolasi sosial dan kurangnya harga diri adalah semua faktor yang berkontribusi. Penjaga pasien ini dapat membantu dengan memastikan ada ketentuan yang memadai untuk dapat melakukan tugas-tugas ini. Memastikan bahwa sabun, handuk, dan sejenisnya sudah tersedia dan dapat membantu orang tersebut mengingat untuk mandi (Johnson, 2017).

f. Praktik Sosial

Pendidikan yang buruk dan kurangnya pengetahuan adalah alasan lain mengapa orang memiliki gagasan berbeda tentang kebutuhan kebersihan. Sehingga penting bagi anak kecil untuk memahami dan diajari cara menjaga kebersihan mereka sendiri pada usia sedini mungkin (Johnson, 2017).

g. Citra Tubuh

Citra tubuh adalah penilaian seseorang terhadap penampilan fisiknya, citra tubuh dapat berubah sewaktu-waktu. Kebanyakan kasus di rumah sakit, pasien yang memiliki perubahan citra tubuh akibat kondisi fisik yang terganggu akan mengalami kesulitan dalam

melakukan praktik kebersihan. Keterbatasan dan kecacatan yang mereka miliki membatasi mereka untuk secara pribadi bertanggung jawab atas perawatan kebersihan dirinya secara layak (Dzaher, 2017).

h. Pilihan Pribadi

Kebebasan setiap orang untuk memilih caranya sendiri dalam menjaga kebersihan diri, memilih produk-produk yang ingin digunakan dan memilih waktu perawatan diri (Dzaher, 2017).

4. Macam-Macam *Personal Hygiene*

a. Perawatan Kulit

Kulit merupakan organ aktif yang melapisi tubuh yang terdiri dari epidermis, dermis dan hypodermis. Kulit berfungsi sebagai tempat eksresi, sekresi, pengaturan temperature dan sensasi. Lapisan luar kulit (epidermis), melindungi jaringan dibawahnya terhadap kehilangan cairan, cedera mekanis maupun kimia serta melindungi dari masuknya mikroorganisme sedangkan lapisan kulit bagian dalam dengan struktur yang lebih tebal (dermis) merupakan jaringan ikat kolagen dan serabut saraf, pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar sebacea dan folikel rambut (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

Kelenjar keringat terdiri atas ekrin yang lebih banyak pada dahi, telapak tangan dan kaki sebagai pengendali temperatur saat evaporasi dan apokrin pada area aksila dan genitalia, kelenjar ini berfungsi selama pubertas sehingga biasanya remaja sudah menggunakan antiperspiran. Komposisi bakteri pada kelenjar keringat akan menimbulkan bau badan. Kelenjar sebacea yang

mengeluarkan sebum, minyak ke folikel rambut untuk minyak di kulit dan rambut. Ketika kelenjar ini aktif akan menimbulkan jerawat pada remaja. Dengan kondisi diatas frekuensi mandi dan memakai shampo menjadi penting diperhatikan untuk mengurangi bau badan (Potter & Perry, 2012).

Kulit seringkali terpapar oleh berbagai macam kuman pathogen, bakteri yang tinggal dipermukaan kulit dan mikroorganisme yang lain saat kita melakukan aktivitas, dalam keadaan kulit kotor, menjalani proses pembedahan saat sakit, sehingga dengan mandi secara teratur yaitu 2 kali dalam sehari memakai sabun yang tidak menyebabkan iritasi pada kulit dapat menjaga kulit agar tetap sehat dan terhindar dari kuman (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

b. Perawatan Kaki dan Kuku

Kebersihan kaki dan kuku seringkali terabaikan padahal semestinya menjadi perhatian khusus untuk mencegah agar tidak menimbulkan infeksi, bau dan cedera pada jaringan serta menjadi sarang penyakit. Beberapa kesalahan dalam melakukan perawatan pada kaki dan kuku yaitu kebiasaan menggigit kuku dan cara memotong yang tidak tepat, selain itu penggunaan sepatu yang terlalu sempit dan paparan zat kimia yang tajam sehingga dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada fisik dan emosional. Memotong kuku secara teratur dengan memperhatikan alat pemotong kuku harus bersih, kaki dan kuku dicuci dengan sabun terlebih dahulu, setelah itu menggunakan air hangat untuk proses perendaman kaki dan kuku sebelum dipotong akan memudahkan proses perawatan. Perawatan kuku dapat

dilakukan bersamaan pada saat kita mandi ataupun pada waktu terpisah.

c. Perawatan Rambut

Rambut yang sehat adalah rambut yang terlihat mengkilap, tidak kering, tidak kusut, tidak mudah patah dan tidak berminyak dengan struktur kulit kepala yang bersih bebas kotoran dan ketombe. Berbagai aktivitas yang dilakukan setiap hari baik di dalam ruangan maupun diluar ruangan, kondisi dingin dan kondisi panas serta kurangnya perhatian kepada kebersihan dan pemberian nutrisi pada rambut dapat menyebabkan rambut menjadi tidak sehat, berketombe dan menjadi sarang kutu (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

Rambut pasien dalam berbagai kondisi misal klien imobilisasi akan terlihat kusut sedangkan pada pasien yang mendapat balutan bisa meninggalkan darah atau anti-septik yang mebuat rambut menjadi lengket, jika kondisi memungkinkan dan mendapat izin dari pasien dan keluarga, pasien dapat dicukur. Kondisi sakit juga akan mempengaruhi kemampuan pasien untuk melakukan perawatan rambut sehingga peran perawat dibutuhkan untuk memberikan perawatan rambut agar pasien tetap nyaman. Dalam tatanan pelayanan kesehatan rambut dapat menjadi indikator status kesehatan secara umum dengan memperhatikan pertumbuhan, distribusi dan pola rambut. Beberapa indikasi bisa saja diakibatkan karena adanya perubahan hormonal, stress fisik maupun emosional, penuaan, infeksi, adanya penyakit, serta efek dari pengobatan (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

Cara yang dapat dilakukan pada perawatan rambut yaitu mencuci rambut 2 kali seminggu dengan menggunakan sampho yang cocok, menyikat dan menyisir rambut. Apabila kondisi rambut tidak sehat dan kusut dapat melakukan pemotongan rambut (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

d. Perawatan Gigi dan Mulut

Mulut adalah rongga terbuka yang terdiri dari bibir, gusi, gigi, lidah dan langit-langit. Mulut sebagai tempat masuknya makanan dan minuman serta sebagai sistem pernafasan, membuatnya mudah terpapar oleh mikroorganisme seperti bakteri, maka kebersihan mulut sangat penting untuk mempertahankan kesehatan mulut, bibir, gusi, gigi dan langit-langit (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

Cara membersihkan mulut yaitu dengan menyikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur atau sesuai kebutuhan dengan menggunakan sikat gigi yang halus, lembut dengan bulu yang banyak dan menggunakan pasta gigi dengan cara yang benar sehingga tidak merusak struktur gigi serta mencederai gusi (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

Pada kondisi sakit, dimana pasien tidak mampu untuk melakukan perawatan secara mandiri terhadap mulut dan gigi maka perawat bertanggung jawab untuk membersihkan mulut dan gigi pasien, sedangkan apabila kondisi pasien memungkinkan untuk melakukan secara mandiri, maka perawat perlu mengajarkan cara memelihara kebersihan mulut, mengajarkan teknik yang benar dan memotivasi pasien untuk tetap melakukan

perawatan diri meski dalam keadaan sakit. Kesehatan mulut dan gigi penting untuk memberikan rasa nyaman, mulut yang kotor dapat menurunkan nafsu makan (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

e. Perawatan Mata

Pada khakikatnya dalam kondisi normal tidak ada perawatan khusus untuk mata. Mata yang terdiri dari kelopak mata, bulu mata dan kelenjar lakrimalis sebagai kelenjar pengeluaran air mata, membantu membersihkan dan mencegah masuknya benda asing pada mata. Biasanya seseorang hanya membersihkan kotoran yang menempel pada sudut mata atau pada bulu mata, agar mata tetap sehat dan mencegah infeksi. Dalam kondisi sakit, misalnya pasien pasca operasi dapat mengalami infeksi dengan adanya peningkatan drainase, maka tugas perawat adalah membantu membersihkan kacamata, perawatan lensa kontak atau mata buatan (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

f. Perawatan Hidung

Hidung memiliki beberapa antara lain sebagai indera penciuman, pernafasan, pemantau temperatur dan kelembapan udara serta mencegah masuknya benda asing, untuk itu kebersihan hidung harus diperhatikan. Dalam kondisi adanya akumulasi mucus dalam hidung dapat menyebabkan gangguan pada syaraf kranial yaitu sensai olfaktori yang dapat membedakan bau. Secara tipikal proses perawatan hidung secara sederhana dengan rutin melakukan pembersihan pada hidung (Rosmalawati & Kasiati, 2016).

N A S K A H S I A P C E T A K

g. Perawatan Telinga

Perawatan telinga dilakukan untuk tetap menjaga ketajaman pendengaran. Apabila seseorang tidak melakukan perawatan telinga secara teratur dan tepat akan menyebabkan substansi lilin atau benda asing menutupi kanal telinga bagian luar, yang tentunya akan mengganggu persepsi individu terhadap suara yang dihasilkan. Telinga harus dibersihkan bila ada kotoran yang menyumbat telinga, jangan mengorek-gorek telinga dengan benda tajam dan tidak perlu dilakukan setiap hari karena secara fisiologi kotoran telinga dapat keluar dengan sendirinya (Potter & Perry, 2012).

C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Kebersihan dan Perawatan Diri _____

1. Pengkajian Keperawatan

a. Riwayat keperawatan

- 1) Kebiasaan *personal hygiene* (mandi, *oral care*, perawatan kuku dan kaki, perawatan rambut, mata, hidung, telinga, dan *perineal care*).
- 2) Faktor yang mempengaruhi *personal hygiene*.
- 3) Riwayat masalah membran mukosa, kulit, mulut, hidung, telinga, kuku, kaki, rambut dan perineal.
- 4) Pola kebersihan tubuh.
- 5) Perlengkapan *personal hygiene* yang dipakai.

b. Pemeriksaan fisik

- 1) Catat perubahan-perubahan pada area membran mukosa, kulit, mulut, hidung, telinga, kuku, kaki, rambut dan perineal akibat terapi.

- 2) Lakukan inspeksi dan palpasi, catat adanya lesi dan kondisi lesi.
 - 3) Observasi kondisi membran mukosa, kulit, mulut, hidung, telinga, kuku, kaki, rambut dan perineal: warna, tekstur, kekebalan, turgor dan hidrasi.
 - 4) Kaji masalah-masalah membran mukosa, kulit, mata, mulut, gigi, hidung, telinga, kuku kaki dan tangan, rambut dan perineal.
- c. Kemampuan melakukan *self care*
Kaji tingkat kemampuan klien melakukan *self care*:
0 = mandiri
1 = membutuhkan bantuan alat
3 = membutuhkan bantuan orang lain
3 = membutuhkan bantuan alat dan orang lain
4 = tergantung total
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi *personal hygiene*
- 1) Gambaran diri.
 - 2) Kebiasaan sosial.
 - 3) Status sosial ekonomi.
 - 4) Pengetahuan.
 - 5) Budaya.
 - 6) Kondisi fisik/status kesehatan.
 - 7) Pilihan individu.
 - 8) Praktik spiritual.
 - 9) Tingkat perkembangan (PPNI, 2017).

2. Diagnosis Keperawatan

Masalah 1: Defisit Perawatan Diri

a. Definisi

Tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri.

b. Penyebab

- 1) Gangguan muskuloskeletal.
- 2) Gangguan neurumuskuler.
- 3) Kelemahan.
- 4) Gangguan psikologis dan/atau psikotik.
- 5) Penurunan motivasi/minat.

c. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif :

Menolak melakukan Perawatan Diri

Objektif:

- 1) Tidak mampu mandi/mengenakan pakaian/ke toilet/berhias secara mandiri.
- 2) Minat melakukan perawatan diri kurang.

d. Gejala dan tanda Minor

Subjektif

Tidak tersedia

Objektif

Tidak tersedia

e. Kondisi Klinis Terkait

- 1) Stroke.
- 2) Cedera medula spinalis.

- 3) Defresi.
- 4) Arthritis reumatoid.
- 5) Retardasi mental.
- 6) Delirium.
- 7) Demensia.
- 8) Gangguan amnestik.
- 9) Skizofrenia dan gangguan psikotik lain.
- 10) Fungsi penilaian terganggu (PPNI, 2017).

Masalah 2: Risiko Gangguan Integritas Kulit/Jaringan

a. Definisi

Berisiko mengalami kerusakan kulit (dermis dan/epi-dermis) atau jaringan (membrane mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi dan/ligament)

b. Faktor Risiko

- 1) Perubahan sirkulasi.
- 2) Perubahan status nutrisi (kelebihan/kekurangan).
- 3) Kekurangan/kelebihan volume cairan.
- 4) Penurunan mobilitas.
- 5) Bahan kimia iritatif.
- 6) Suhu lingkungan yang ekstrem.
- 7) Faktor mekanis (misalnya penekanan, gesekan) atau faktor elektrik (elektroditermi, energi listrik bertegangan tinggi).
- 8) Terapi radiasi.
- 9) Kelembapan.
- 10) Proses penuaan.

N A S K A H S I A P C E T A K

- 11) Neuropati.
- 12) Perubahan pigmentasi.
- 13) Perubahan hormonal.
- 14) Penekanan padang tonjolan tulang.
- 15) Kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan/melindungi integritas jaringan.

c. Kondisi Klinis Terkait

- 1) Imobilisasi.
- 2) Gagal jantung Kongestif.
- 3) Diabetes mellitus.
- 4) Gagal ginjal.
- 5) Imunodefisiensi (misalnya AIDS).
- 6) Kateterisasi jantung (PPNI, 2017).

3. Intervensi Keperawatan

Defisit Perawatan Diri

Observasi

- a. Lakukan identifikasi terhadap aktivitas perawatan diri berdasarkan usia klien.
- b. Menentukan tingkat kemandirian klien.
- c. Identifikasi alat-alat yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan.

Terapeutik

- a. Ciptakan lingkungan yang nyaman (misalnya suasana hangat, rileks, privasi).
- b. Siapkan segala keperluan pribadi (misalnya parfum, sikat gigi dan sabun mandi).

- c. Upayakan mendampingi klien dalam melakukan pemenuhan kebutuhan *personal hygiene* sampai klien dapat melakukan secara mandiri.
- d. Berikan pemahaman terhadap kondisi ketergantungan yang dialami oleh klien dalam pemenuhan kebutuhan dasar *personal hygiene*.
- e. Memberikan kesempatan untuk klien memenuhi kebutuhan dasar *personal hygiene* secara mandiri, namun jika tidak dapat melakukan secara mandiri, bantu klien untuk melakukannya.
- f. Atur waktu pelaksanaan perawatan diri secara rutin.

Edukasi

Anjurkan melakukan perawatan diri sesuai tingkat kemampuan klien (PPNI T. P., 2018).



AKTIVITAS DAN LATIHAN

A. Pendahuluan _____

Aktivitas ialah sebuah energi atau keadaan bergerak yang dibutuhkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu tanda orang yang sehat yakni adanya kemampuan seseorang melaksanakan aktivitas seperti berdiri, berjalan dan bekerja. Aktivitas fisik yang kurang memadai dapat menyebabkan berbagai gangguan pada sistem muskuloskeletal seperti atrofi otot, sendi menjadi kaku serta penyebab ketidak efektifan fungsi organ internal lain (Towarto, Wartonah 2007).

Setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk bergerak agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan melindungi diri dari kecelakaan. Kebutuhan aktivitas ialah suatu kondisi tubuh dapat melaksanakan kegiatan dengan bebas (Mubarak Wahit Iqbal, 2007).

Latihan merupakan sebuah gerakan tubuh secara aktif yang dibutuhkan dalam menjaga kinerja otot dan mempertahankan postur tubuh. Pergerakan dan fungsi sendi sehingga

kondisinya dapat setara dengan kekuatan dan fleksibilitas otot dapat dipelihara dengan latihan (Towarto, Wartonah 2007).

Gangguan aktivitas dan latihan ialah keadaan dimana individu mengalami ketidak cukupan energi fisiologis atau psikologis untuk menahan atau memenuhi kebutuhan atau keinginan aktivitas sehari-hari (Susan, Mary, Eleanor, Majorie, 1998).

Defenisi aktivitas ialah situasi aksi energetic atau keadaan bergerak. Secara normal manusia memerlukan kemampuan untuk dapat bergerak. Kehilangan kemampuan bergerak walaupun pada waktu yang singkat memerlukan tindakan-tindakan tertentu yang tepat oleh pasien dan perawat.

Pada kondisi sakit, orang memerlukan waktu yang lama di tempat tidur sehingga mereka mempunyai masalah dalam menjaga aktivitas/gerakan. Perawat perlu membantu pasien untuk menjaga kemampuan bergerak serta untuk mencegah penyulit-penyulit yang dapat timbul akibat keadaan kurang bergerak (*imobil*). Banyak aspek-aspek pergerakan yang perlu diketahui oleh perawat untuk menjaga keseimbangan pergerakan dalam keperawatan antara lain: gerakan setiap persendian, postur tubuh, latihan, dan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu aktivitas.

Keperawatan klinik menghendaki agar dapat perawat menggabungkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di dalam praktik. Salah satu komponen dari ilmu pengetahuan dan keterampilan ialah mekanika tubuh, sebuah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan usaha dalam mengoordinasikan sistem muskuloskeletal dan saraf (Potter & Perry, 2005).

Mekanika tubuh mencakup pengetahuan tentang bagaimana dan mengapa kelompok otot tertentu digunakan untuk menghasilkan dan mempertahankan gerakan dengan aman. Menggunakan mekanika tubuh yang tepat seorang perawat perlu mengetahui tentang pergerakan, termasuk bagaimana mengoordinasikan gerakan tubuh yang meliputi fungsi integrasi dari system skeletal, otot skelet dan sistem saraf. Selain itu, terdapat kelompok otot tertentu yang terutama dipergunakan untuk pergerakan dan kelompok otot lain dalam membentuk postur/bentuk tubuh (Potter & Perry, 2005).

Mobilisasi mempunyai banyak tujuan, seperti mengekspresikan emosi dengan gerakan nonverbal, pertahanan diri, pemenuhan kebutuhan dasar, aktivitas kehidupan sehari-hari dan kegiatan rekreasi. Sebagai upaya mempertahankan mobilisasi fisik secara optimal maka sistem saraf, otot, dan skeletal harus tetap utuh dan berfungsi baik (Potter & Perry, 2005).

Perawat sangat berisiko mengalami cedera tulang belakang karena aktivitas atau pekerjaan yang dilakukannya. Aktivitas tersebut antara lain mengangkat pasien di tempat tidur, membantu pasien turun dari tempat tidur, memindahkan tempat tidur pasien sendirian, mengangkat pasien dan memindahkannya, serta membawa alat yang beratnya melebihi 15 kg. Sehingga apabila mekanik tubuh yang dilakukan tubuh tidak benar dapat mengakibatkan jatuh, tekanan fisik pada tulang belakang serta cedera.

B. Konsep Dasar Kebutuhan Aktivitas dan Latihan

1. Definisi

Defenisi aktivitas ialah suatu aksi energetik atau keadaan bergerak. Kehilangan kemampuan bergerak walaupun pada waktu yang singkat memerlukan tindakan-tindakan tertentu yang tepat baik oleh pasien maupun perawat.

Menjaga keseimbangan pergerakan, banyak aspek-aspek pergerakan yang perlu diketahui oleh perawat dalam keperawatan antara lain : gerakan setiap persendian, postur tubuh, latihan, dan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas (Tarwoto & Wartonah, 2010).

2. Fisiologi Sistem Muskuloskeletal

Sistem muskuloskeletal terdiri dari muskulus, tendon, ligament, tulang, kartilago, persendian, dan bursa. Semua struktur ini bekerja bersama-sama untuk menghasilkan gerakan. Ada tiga jenis otot utama pada manusia, yaitu: otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot rangka yang paling berpengaruh untuk aktivitas atau pergerakan (Mubarak dkk, 2017).

Otot rangka, terdiri dari serabut-serabut yang tersusun dalam berkas yang disebut fasikel, semakin besar otot semakin banyak serabutnya.

- Otot biseps lengan pada lengan atas adalah otot yang besar dan tersusun dari 260.000 serabut.
- Otot kecil, seperti stapedius dalam telinga tengah, hanya terdiri dari 1.500 serabut.

N A S K A H S I A P C E T A K

Mekanisme interaksi aktin dan miosin pada sistem muskuloskeletal yaitu :

Molekul aktin tersusun dari tiga protein

- F-aktin fibrosa terbentuk dari dua rantai globular G-aktin yang berpilin satu sama lain.
- Molekul tropomiosin membentuk filamen yang memanjang melebihi subunit aktin dan melapisi sisi yang berkaitan dengan crossbridge miosin.
- Molekul troponin berkaitan dengan molekul tropomiosin dan menstabilkan posisi penghalang pada molekul tropomiosin.
- Molekul miosin terbentuk dari dua rantai protein berat yang identik dan dua pasang rantai ringan.

Kesimpulannya, apabila aktin berikatan dengan kepala miosin maka terjadi kontraksi otot.

Sistem rangka manusia merupakan rangka dalam atau endoskeleton. Sistem rangka yang tersusun dari beragam jenis tulang tidak dapat bergerak secara aktif. Akan tetapi, aktivitas otot yang melekat pada tulang menyebabkan tulang tersebut ikut bergerak. Oleh sebab itu, rangka (tulang) dikenal sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot dikenal sebagai alat gerak aktif.

Otot akan berkembang jika serabut-serabut otot mengalami pembesaran. Tendon merupakan jaringan ikat fibrosa yang mengaitkan otot dengan periosteum (membrane fibrosa yang menutupi tulang). Tendon menyebabkan tulang bergerak sewaktu otot-otot skelet berkontraksi. Ligamen merupakan jaringan ikat fibrosa yang kuat dan padat yang

mengikat antara satu tulang dengan tulang lain, juga membantu tulang untuk bergerak.

Klasifikasi tulang menurut bentuk dan lokasinya.

a. Menurut bentuknya :

- 1) Tulang panjang (humerus, radius, femur, dan tibia).
- 2) Tulang pendek (karpal dan tarsal).
- 3) Tulang pipih (scapula, tulang rusuk, tulang tengkorak).
- 4) Tulang dengan bentuk tidak teratur (vertebra dan mandibula).

5) Tulang sesamoid (patella).

b. Menurut lokasinya :

- 1) Tulang aksial (tulang wajah, cranial, hyoid, vertebra, tulang rusuk, dan sternum).
- 2) Tulang apendikular (klavikula, scapula, humerus, radius, ulna, metacarpal, tulang pelvis, femur, patella, fibula, dan metatarsal).
- 3) Kartilago merupakan jaringan ikat yang tersusun pada substansi yang kuat dan berfungsi untuk menyokong pada beberapa bagian tubuh, seperti saluran pendengaran, dan bagian invertebrata. Persendian merupakan pertemuan antara dua atau lebih dan setiap persendian mempunyai rentang gerak yang bervaskularisasi. Bursa merupakan kantong cairan synovial yang terletak pada lokasi gesekan di sekitar persendian antara tendon, ligament, dan tulang. Fungsinya untuk mengurangi tekanan pada struktur yang saling bersinggungan.

Pergerakan merupakan rangkaian yang terintegrasi antara sistem muskuloskeletal dan sistem persarafan.

a. Sistem Muskuloskeletal berfungsi sebagai :

- 1) Mendukung dan memberi bentuk jaringan tubuh.
- 2) Melindungi bagian tubuh tertentu seperti hati, ginjal, otak dan paru-paru.
- 3) Tempat melekatnya otot dan tendon.
- 4) Sumber mineral seperti garam dan posfat.
- 5) Tempat produksinya sel darah.

b. Sistem Otot Berfungsi Sebagai :

- 1) Pergerakan.
- 2) Membentuk postur.
- 3) Produksi panas karena adanya kontraksi dan relaksasi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fungsi Sistem Muskuloskeletal

(Mubarak ddk, 2017)

a. Tingkat perkembangan tubuh

Usia akan mempengaruhi tingkat perkembangan neuromuskuler dan tubuh secara proporsional, postur, pergerakan dan refleksi akan berfungsi secara optimal.

b. Kesehatan fisik

Penyakit, cacat tubuh dan immobilisasi akan mempengaruhi pergerakan tubuh.

- c. Keadaan nutrisi
Kurangnya nutrisi dapat menyebabkan kelemahan otot dan obesitas dapat menyebabkan pergerakan menjadi kurang bebas.
- d. Emosi
Rasa aman dan gembira dapat mempengaruhi aktivitas tubuh seseorang. Keresahan dan kesusahan dapat menghilangkan semangat yang kemudian sering dimanifestasikan dengan kurangnya aktivitas.
- e. Kelemahan neorumuskel dan skeletal
Adanya abnormal postur seperti scoliosis, lordosis dan kiposis dapat berpengaruh terhadap pergerakan.
- f. Pekerjaan
Seseorang yang bekerja dikantor kurang melakukan aktivitas bila dibandingkan dengan petani atau buruh.
- g. Status kesehatan
- h. Gaya hidup
- i. Perilaku dan nilai

4. Macam-Macam Gangguan Aktivitas

- a. Fraktur
- b. Gout
- c. Arthritis oleh bakteri
- d. Cidera jaringan lunak/keras (Mubarak dkk,2017)

5. Macam-Macam Aktivitas

Aktivitas fisik

Aktivitas fisik adalah semua pergerakan tubuh yang di hasilkan oleh pergerakan otot skeletal dan menghasilkan pengeluaran energi (Carpersen et al., 1985). Aktivitas fisik secara luas diartikan sebagai olahraga sehari-hari, pekerjaan, aktivitas di waktu luang, dan transportasi aktif (Garber et al., 2011).

Aktivitas fisik terdiri dari:

a. Aktivitas ringan

Aktivitas ringan yaitu aktivitas yang memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernafasan atau ketahanan.

Contoh: berjalan kaki/jalan cepat.

b. Aktivitas sedang

Aktivitas sedang merupakan aktivitas yang membutuhkan tenaga intens atau terus menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan.

Contoh: lari.

c. Aktivitas berat

Aktivitas berat biasanya berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan.

Contoh: berkuda, memanah, berenang, dll.

6. Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas dan Latihan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan latihan antara lain :

- a. Jenis kelamin, status nutrisi, kondisi psikologis.

- b. Gaya hidup. Perubahan gaya hidup dapat mempengaruhi kemampuan aktivitas seseorang karena berdampak pada perilaku kebiasaan sehari-hari.
- c. Proses penyakit/cedera. Proses penyakit dapat mempengaruhi kemampuan aktivitas karena dapat mempengaruhi fungsi sistem tubuh.
 - 1) Penyakit terutama yang menyerang sistem nervosa, sistem muskuloskeletal.
 - 2) Penyakit kardiovaskuler dan pulmonary.
 - 3) Kebudayaan. Kemampuan melakukan aktivitas dapat juga dipengaruhi kebudayaan, contohnya orang yang memiliki budaya sering berjalan jauh memiliki kemampuan aktivitas yang kuat, sebaliknya ada orang yang mengalami gangguan aktivitas (sakit) karena budaya dan adat dilarang beraktivitas.
- d. Tingkat energi. Energi dibutuhkan untuk melakukan aktivitas.
- e. Usia dan status perkembangan. Kemampuan atau kematangan fungsi alat gerak sejalan dengan perkembangan usia. Intoleransi aktivitas/penurunan kekuatan dan stamina, depresi, mood dan cemas.

Kategori tingkat kemampuan aktivitas lainnya adalah sebagai berikut:

Tingkat Aktivitas/ Mobilisasi	Kategori
Tingkat 0	Mampu merawat diri sendiri secara penuh.
Tingkat 1	Memerlukan penggunaan alat.
Tingkat 2	Memerlukan bantuan atau pengawasan orang lain.

Tingkat 3	Memerlukan bantuan, pengawasan orang lain, dan peralatan.
Tingkat 4	Sangat tergantung dan tidak dapat melakukan atau berpartisipasi dalam perawatan.

(Sumber : Potter and Perry,(2017)

C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Aktivitas dan Latihan

1. Pengkajian Keperawatan (Dongoes, 2000)

a. Riwayat Keperawatan

- 1) Riwayat aktivitas dan olahraga.
- 2) Toleransi aktivitas.
- 3) Jenis dan frekuensi olahraga.
- 4) Faktor yang mempengaruhi mobilitas.
- 5) Pengaruh imobilitas.

b. Pemeriksaan Fisik : Data Fokus

1) Kesejajaran tubuh

Mengidentifikasi perubahan postur tubuh akibat pertumbuhan dan perkembangan normal. Pemeriksaan dilakukan dengan cara inspeksi pasien dari lateral, anterior, dan posterior guna mengamati:

- a) Bahu dan pinggul sejajar.
- b) Jari-jari kaki mengarah kedepan.
- c) Tulang belakang lurus, tidak melengkung kesisi yang lain.

2) Cara berjalan

Dilakukan untuk mengidentifikasi mobilitas klien dan risiko cedera akibat jatuh.

- a) Kepela tegak, pandangan lurus, dan tulang belakang lurus.
 - b) Tumit menyentuh tanah terlebih dahulu daripada jari kaki.
 - c) Lengan mengayun kedepan bersamaan dengan ayunan kaki di sisi yang berlawanan.
 - d) Gaya berjalan halus, terkoordinasi.
- 3) Penampilan dan pergerakan sendi
- Pemeriksaan ini meliputi inspeksi, palpasi, serta pengkajian rentang gerak aktif atau rentang gerak pasif. Hal-hal yang dikaji yaitu :
- a) Adanya kemerahan/pembengkakan sendi.
 - b) Deformitas.
 - c) Adanya nyeri tekan.
 - d) Krepitasi.
 - e) Peningkatan temperatur di sekitar sendi.
 - f) Perkembangan otot yang terkait dengan masing-masing sendi.
 - g) Derajat gerak sendi.
- 4) Kemampuan dan keterbatasan gerak
- Hal-hal yang perlu dikaji antara lain :
- a) Bagaimana penyakit klien mempengaruhi kemampuan klien untuk bergerak.
 - b) Adanya hambatan dalam bergerak (terpasang in-fus, gips).
 - c) Keseimbangan dan koordinasi klien.
 - d) Adanya hipotensi ortostatik.
 - e) Kenyamanan klien.

5) Kekuatan dan massa otot

Mengkaji kekuatan dan kemampuan klien untuk bergerak, langkah ini diambil untuk menurunkan risiko tegang otot dan cedera tubuh baik pada klien maupun perawat.

Tingkatan kekuatan otot :

Skala	Kekuatan (%)	Ciri-ciri
0	0	Paralisis total
1	10	Tidak ada gerakan, teraba/terlihat adanya kontraksi
2	25	Gerakan otot penuh menentanggravitasi, dengan sokongan
3	50	Gerakan normal menentang gravitasi
4	75	Gerakan normal penuh menentang gravitasi dengan sedikit tahanan
5	100	Gerakan normal penuh menentang gravitasi dengan tahana penuh

Pemeriksaan penunjang:

1) Pemeriksaan Diagnostik

a) Foto rontgen

Untuk menggambarkan kepadatan tulang, tekstur, erosi, dan perubahan hubungan tulang.

b) CT scan tulang

Mengidentifikasi lokasi dan panjangnya patah tulang di daerah yang sulit untuk dievaluasi (misalnya: asetabulum).

c) MRI

Untuk melihat abnormalitas (tumor, penyempitan jalur jaringan lunak melalui tulang).

2) Pemeriksaan Laboratorium

- a) Pemeriksaan darah dan urine : memberikan informasi mengenai masalah muskuloskeletal primer atau komplikasi yang terjadi (infeksi).
- b) Pemeriksaan Hb: (biasanya lebih rendah bila terjadi perdarahan akibat trauma).

2. Diagnosis Keperawatan

Standar diagnosis keperawatan Indonesia (SDKI) DPP PPNI (2017):

Masalah 1 : Gangguan Mobilitas Fisik

a. Definisi

Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri.

b. Penyebab:

- 1) Kerusakan struktur tulang.
- 2) Perubahan metabolisme.
- 3) Ketidak bugaran fisik.
- 4) Penurunan kendali otot.
- 5) Penurunan masa otot.
- 6) Keterlambatan perkembangan.
- 7) Kekakuan sendi.
- 8) Kontraktur.
- 9) Malnutrisi.
- 10) Nyeri.
- 11) Kecemasan gangguan sensori persepsi.

N A S K A H S I A P C E T A K

c. Gejala dan tanda mayor

- 1) Subjektif :
 - Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas.
- 2) Objektif :
 - Kekuatan otot menurun.
 - Rentang gerak (ROM) menurun.

d. Gejala dan tanda minor

- 1) Subjektif
 - Nyeri saat bergerak.
 - Enggan melakukan pergerakan.
 - Merasa cemas saat bergerak.
- 2) Objektif
 - Sendi kaku.
 - Gerakan tidak terkoordinasi.
 - Gerakan terbatas.
 - Fisik lemah.

e. Kondisi klinis terkait

- 1) Stroke
- 2) Cedera medulla spinalis
- 3) Trauma
- 4) Fraktur
- 5) Osteoarthritis
- 6) Osteomalasia
- 7) Keganasan

Masalah 2: Intoleransi Aktivitas

a. Definisi

Ketidak cukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

b. Penyebab

- 1) Ketidak seimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen.
- 2) Tirah baring.
- 3) Kelemahan.
- 4) Imobilitas.
- 5) Gaya hidup monoton.

c. Gejala dan tanda mayor

- 1) Subjektif : Mengeluh lelah.
- 2) Objektif : Frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat.

d. Gejala dan tanda minor

- 1) Subjektif :
 - Dipsnea setelah beraktivitas.
 - Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas.
 - Merasa lemah.
- 2) Objektif :
 - Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat.
 - Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/ setelah aktivitas.
 - Gambaran EKG menunjukkan iskemia.
 - Sianosis.

e. Kondisi klinis terkait

- 1) Anemia.
- 2) Gagal jantung kongestif.
- 3) Penyakit jantung koroner.
- 4) Penyakit katup jantung.
- 5) Aritmia.
- 6) PPOK.
- 7) Gangguan metabolik.
- 8) Gangguan muskuloskeletal.

3. Intervensi Keperawatan

Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI, 2018 ; SLKI, 2019 &) DPP PPNI.

a. Gangguan Mobilitas Fisik

Manajemen Energi

1) Tujuan dan kriteria hasil

Tujuan :

Mengidentifikasi dan mengelola penggunaan energi untuk mengatasi atau mencegah kelelahan dan mengoptimalkan proses pemulihan.

Kriteria Hasil :

Kemampuan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri, kriteria hasil:

- a) Pergerakan ekstremitas meningkat.
- b) Kekuatan otot meningkat.
- c) Rentang gerak (ROM) meningkat.
- d) Nyeri menurun.
- e) Kecemasan menurun.

- f) Kaku sendi menurun.
- g) Gerakan tidak terkoordinasi menurun.
- h) Gerakan terbatas menurun.
- i) Kelemahan fisik menurun.

2) Intervensi keperawatan dan rasional

Observasi

- a) Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan.
Rasional: Mengetahui penyebab terjadinya kelelahan pada pasien.
- b) Monitor kelelahan fisik dan emosional.
Rasional: Mengetahui koping klien.
- c) Monitor pola dan jam tidur
Rasional: Menghindari kelelahan akibat kurang istirahat.
- d) Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas.
Rasional: Memberikan rasa aman dan nyaman pada klien.

Terapeutik

- a) Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (misalnya: Cahaya, suara, kunjungan).
Rasional: Membantu meningkatkan rentang gerak klien dalam beraktivitas.
- b) Lakukan latihan rentang gerakan pasif-aktif aktifitas (ROM).
Rasional: Memberikan rasa aman dan nyaman kepada klien.

- c) Berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan.
Rasional: Memberikan rasa nyaman pada klien.

Edukasi

- a) Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap.
Rasional: Melatih kekuatan otot dan pergerakan agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi.
- b) Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap.
Rasional: Agar perawat dapat mengidentifikasi rencana tindakan selanjutnya yang akan diberikan.
- c) Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan.
Rasional: Memiliki koping skil bermanfaat untuk mencegah komplikasi kesehatan yang mungkin nanti akan timbul.

b. Intoleransi Aktivitas

Manajemen Energi

1) Tujuan dan Kriteria Hasil

Tujuan :

Mengidentifikasi dan mengelola penggunaan energi untuk mengatasi atau mencegah kelelahan dan mengoptimalkan proses pemulihan.

Kriteria Hasil :

Respon fisiologis terhadap aktivitas yang membutuhkan tenaga dapat meningkat dengan kriteria hasil.

- a) Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat.

- b) Kekuatan tubuh bagian atas meningkat.
- c) Kekuatan tubuh bagian bawah meningkat.
- d) Keluhan lelah menurun.

2) Intervensi keperawatan

Observasi

- a) Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan
Rasional: mengidentifikasi pencetus terjadinya kelelahan dan rencana tindakan berikutnya yang dapat dilakukan.
- b) Monitor kelelahan fisik dan emosional
Rasional: untuk mengetahui koping klien.
- c) Monitor pola dan jam tidur
Rasional: menghindari kelelahan akibat kurang istirahat.
- d) Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas
Rasional: mengetahui kemampuan dan batasan pasien terkait aktivitas yang akan dilakukan.

Terapeutik

- a) Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (misalnya: Cahaya, suara, kunjungan).
Rasional: memberikan rasa aman dan nyaman kepada klien.
- b) Lakukan latihan rentang gerak pasif/aktif (ROM)
Rasional: membantu meningkatkan rentang gerak klien dalam beraktivitas.
- c) Berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan

N A S K A H S I A P C E T A K

Rasional: memberikan rasa nyaman pada klien.

- d) Fasilitasi duduk disisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan.

Rasional: mengurangi risiko jatuh/sakit pada klien.

Edukasi

- a) Anjurkan tirah baring
Rasional: Istirahat yang lebih dan mengurangi aktivitas dapat memulihkan energi kembali.
- b) Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap
Rasional: melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi.
- c) Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang
Rasional: untuk mengidentifikasi rencana tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh perawat.
- d) Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan
Rasional: memiliki kemampuan mengatasi masalah (*coping skill*) bermanfaat untuk mencegah komplikasi kesehatan yang mungkin nanti akan timbul.

Kolaborasi

- Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan.
Rasional: pemberian gizi yang cukup dapat meningkatkan energi klien.



ISTRAHAT DAN TIDUR

A. Pendahuluan _____•

Tidur, istirahat dan semua itu melekat, telah memesonakan manusia sejak jaman dahulu, memiliki konsepsi dan pemahaman berkembang seiring waktu. Definisi mereka selalu halus dan beragam. Sebelumnya dipahami sebagai keadaan pasif dari aktivitas otak, yang dihasilkan dari pengurangan pemahaman dari pada rangsangan sensorik, hari ini dianggap sebagai fenomena aktif, kompleks dan reversibel, dalam hal itu ada atau tidak adanya pengurangan respons terhadap rangsangan lingkungan sehubungan dengan keadaan kewaspadaan. Dengan kata lain, adalah kondisi fisiologis yang terjadi berdasarkan siklus, ditandai dengan periode inersia yang terkait dengan penurunan aktivitas otak, dengan berbagai gerakan terbatas, tidak disengaja, otomatis dan tanpa tujuan (Carskadon dan Dement, 2011). Istirahat tidur didefinisikan sebagai tingkat pengurangan kesadaran yang dapat dibalikkan dengan adanya rangsangan eksternal (CIPE, 2011).

Manusia beraktivitas setiap harinya yang dapat menyerap energi dan pikiran. Kegiatan yang dilakukan mengakibatkan tubuh dapat kehilangan energi. Salah satu cara memulihkan kembali fungsi tubuh adalah dengan beristirahat atau tidur yang cukup (Reefani, 2014). Istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh semua orang, dan dapat mengalami perubahan. Perubahan ini tergantung pada status fisiologis, psikologis, dan lingkungan fisik klien. Kualitas dan kuantitas tidur seseorang dipengaruhi oleh penyakit, lingkungan, gaya hidup, kecemasan, alkohol, obat-obatan, dan diet (Apriyani, 2016).

Manusia rata-rata menghabiskan sekitar 27 tahun tidurnya seumur hidup. Fakta ini sendiri menjelaskan mengapa ahli anatomi saraf dan ahli fisiologi saraf telah mempelajari tidur selama lebih dari seabad. Bidang gangguan tidur mencakup berbagai fenomena; seperti insomnia, rasa kantuk yang berlebihan, *sleep apnea* dan banyak gangguan tidur lainnya. Mereka secara tradisional dibagi menjadi dua kategori besar: *dissomnia* dan *parasomnia*. *Dissomnia* ditandai oleh kelainan dalam jumlah atau kualitas tidur dan siklusnya. Mereka terkait dengan kesulitan memulai atau mempertahankan tidur atau kantuk yang berlebihan (Ohayon, 2011).

Insomnia memiliki tingkat prevalensi berkisar antara 4% dan 26%. Narkolepsi adalah kelainan langka dengan prevalensi rata-rata 0,04% pada populasi umum. Sindrom Sleep Apnea, sering dikaitkan dengan insomnia atau rasa kantuk yang berlebihan, ditemukan pada sekitar 2% hingga 4% dari populasi umum dan memiliki prevalensi lebih tinggi pada pria dibandingkan pada wanita. *Restless legs syndrome* (RLS), tergantung pada bagaimana penilaiannya, bervariasi dari yang rendah 1% di negara-negara Asia hingga 19% tinggi di nega-

ra-negara Eropa Utara. RLS lebih tinggi pada wanita dan meningkat seiring bertambahnya usia. Sayangnya, meski prevalensinya tinggi, gangguan tidur tetap diidentifikasi dengan buruk; kurang dari 20% individu dengan insomnia didiagnosis dan diobati dengan benar. Angka-angka itu bahkan lebih rendah untuk kantuk berlebihan dan RLS dengan kurang dari 10% didiagnosis dan diobati dengan benar (Ohayon, 2011).

B. Konsep Dasar Kebutuhan Istirahat dan Tidur

1. Defenisi

Istirahat merupakan keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah. Istirahat dilakukan tidak hanya dalam kondisi tidak bekerja tetapi juga keadaan yang membutuhkan kenyamanan. Istirahat dapat dilakukan dengan jalan-jalan, nonton tv, dan sebagainya. Kata istirahat sendiri berarti berhenti sejenak untuk melepas lelah, bersantai dan menyegarkan diri. (Kasiati & Rosmalawati, 2016).

Terdapat beberapa karakteristik istirahat, misalnya Narrow (1967), yang dikutip Perry dan Potter 1993 (Hidayat & Uliyah, 2015) menguraikan bahwa ada 6 karakteristik, yaitu:

- Meyakini bahwa semuanya bisa teratasi dengan baik.
- Merasa diterima.
- Memahami kondisi yang sedang terjadi.
- Keluar dari rasa tidak nyaman.

- e. Merasakan kepuasan dari aktivitas yang dilakukan.
- f. Memanfaatkan pertolongan yang ada ketika dibutuhkan.

Terpenuhinya kebutuhan istirahat ditandai dengan dirasakannya karakter-karakter yang ada di atas. Jika pasien masih mengeluhkan adanya gangguan yang menandakan kebutuhan tidurnya belum terpenuhi maka perawat harus melakukan intervensi keperawatan yang dapat membantu pasien dalam pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur seperti mengembangkan perilaku istirahat dan relaksasinya seperti saran modifikasi lingkungan yang mendukung serta penerapan perilaku yang sehat.

Tidur merupakan perubahan status kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Tidur juga dikatakan merupakan keadaan tidak sadar dimana individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensoris yang sesuai atau dapat juga dikatakan sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang relatif, bukan hanya keadaan penuh ketenangan tanpa kegiatan, tetapi lebih merupakan suatu urutan siklus yang berulang, dengan ciri adanya aktivitas yang minimum, memiliki kesadaran yang bervariasi, terdapat perubahan proses fisiologis dan terjadi penurunan respons terhadap rangsangan dari luar.

2. Fisiologi Tidur

Aktivitas tidur diatur oleh mekanisme kerja otak yang secara bergiliran mengaktifasi dan menekan pusat otak agar dapat tidur dan terjaga. *Reticular activating system* (RAS) merupakan bagian dari susunan saraf pusat yang juga merupakan sistem yang berfungsi mengatur kesiapsiagaan dan tidur. Letak pusat pengaturan kesiapsiagaan dan tidur ber-

ada pada mesensefalon dan didekat pons bagian atas. RAS juga dapat memberikan rangsangan berupa suara, penglihatan, perasaan, dan nyeri serta juga dapat menerima stimulasi dari *cortex cereberi* yang berupa stimulus emosi dan proses pikir. Pada saat tertidur, kemungkinan terjadinya sekresi serum serotonin dari sel khusus yang berada pada pons dan batang otak tengah, yaitu bagian *bulbar synchronizing regional* (BSR), sedangkan pada saat terjaga, bergantung pada impuls yang diterima pada pusat otak dan sistem limbik. Selain itu, pada saat terjaga sel neuron pada RAS akan memproduksi zat katekolamin misalnya norepinefrin (Hidayat & Uliyah, 2015).

Pada dasarnya waktu tidur manusia memiliki jam biologis atau bioritme yang diatur oleh RAS dan BSR serta disesuaikan dengan faktor lingkungan. Bentuk bioritme yang paling umum adalah ritme sirkadian yang melengkapi siklus selama 24 jam. Dalam hal ini, kestabilan denyut jantung, tekanan darah, suhu, produksi hormon, metabolisme dan penampilan serta perasaan individu bergantung pada ritme atau irama sirkadiannya. Irama sirkadian mengakibatkan adanya pola tidur dan pola terjaga. Hal ini terjadi karena pola tersebut mengikuti jam biologis manusia dimana pada saat ritme fisiologis paling tinggi mengakibatkan kondisi terjaga dan pada saat ritme fisiologis terendah mengakibatkan kondisi tertidur (Vaughans, 2013).

Dalam prosesnya, tidur dibagi menjadi dua yaitu tidur gelombang lambat atau *non rapid eye movement* (NREM) dan tidur paradoks atau *rapid eye movement* (REM).

N A S K A H S I A P C E T A K

a. Tidur gelombang lambat (NREM)

Jenis tidur ini dikenal dengan tidur dalam, istirahat penuh, atau lebih umum disebut tidur nyenyak. Pada tidur jenis ini, gelombang otak bergerak lebih lambat sehingga menyebabkan tidur tanpa bermimpi. Tidur gelombang lambat disebut juga tidur gelombang delta, dengan ciri-ciri yaitu betul-betul istirahat penuh, tekanan darah menurun, frekuensi napas menurun, pergerakan bola mata melambat, mimpi berkurang dan metabolisme turun. Berikut tahapan tidur gelombang lambat atau NREM:

- 1) Tahap I merupakan tahap transisi antara terjaga dan tidur dengan ciri yaitu rileks, masih sadar dengan lingkungan, merasa mengantuk, bola mata bergerak ke kiri dan ke kanan, denyut nadi dan pernapasan sedikit melambat dapat bangun segera selama tahap ini berlangsung selama lima menit.
- 2) Tahap II merupakan tahap tidur ringan dan aktivitas system dalam tubuh terus melambat dengan ciri yaitu mata menetap, detak jantung dan pernapasan menurun, suhu tubuh menurun, metabolisme menurun, berlangsung pendek dan berakhir 10-15 menit.
- 3) Tahap III merupakan tahap tidur dengan ciri frekuensi nadi dan pernapasan dan proses tubuh lainnya lambat, disebabkan oleh adanya dominasi sistem saraf parasimpatis dan sulit untuk terjaga.
- 4) Tahap IV merupakan tahap tidur dengan ciri kerja jantung dan sistem pernapasan menurun, jarang bergerak dan susah untuk dibangunkan, gerak bola

mata cepat, produksi zat pada lambung berkurang, serta tonus otot menurun.

b. Tidur paradoks (REM)

Tidur paradoks terjadi pada tidur malam dengan durasi 5-20 menit, rata-rata terjadi selama 90 menit. Periode pertama berlangsung setelah 80-100 menit, namun jika kondisi seseorang sangat letih, maka periode awal tidur sangat cepat bahkan jenis tidur ini tidak terjadi. Ciri tidur paradoks adalah sebagai berikut:

- 1) Umumnya disertai mimpi aktif.
- 2) Lebih sulit dibangunkan daripada selama tidur nyenyak gelombang lambat.
- 3) Tonus otot selama tidur nyenyak sangat tertekan, menunjukkan inhibisi kuat proyeksi spinal atas sistem pengaktivasi retikularis.
- 4) Frekuensi denyut jantung dan respirasi menjadi tidak teratur.
- 5) Terjadi gerakan otot tidak teratur pada perifer.
- 6) Mata cepat tertutup dan terbuka, nadi cepat dan irregular, tekanan darah meningkat atau berfluktuasi, sekresi lambung dan metabolisme meningkat.
- 7) Tidur bermanfaat dalam keseimbangan mental, emosi juga berfungsi dalam proses belajar, memori dan adaptasi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Istirahat dan Tidur

Kuantitas dan kualitas tidur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kualitas tidur individu menunjukkan adanya kemam-

puan individu untuk tidur dan memperoleh jumlah istirahat sesuai dengan kebutuhannya (Hidayat & Uliyah, 2015).

Tabel 3.1 Kebutuhan Tidur Manusia

Usia	Tingkat Perkembangan	Jumlah Kebutuhan Tidur
0-1 bulan	<i>Neonatus</i>	14-18 jam/hari
1-18 bulan	<i>Baby</i>	12-14 jam/hari
18 bulan – 3 tahun	<i>Toddler</i>	11-12 jam/hari
3-6 tahun	<i>Preschool</i>	11 jam/hari
6-12 tahun	<i>School Age</i>	10 jam/hari
12-18 tahun	<i>Teenager</i>	8,5 jam/hari
18-40 tahun	<i>Young Adult</i>	7-8 jam/hari
40-60 tahun	<i>Old adult</i>	7 jam/hari
60 tahun ke atas	<i>Elderly</i>	6 jam/hari

a. Penyakit

Perubahan kondisi tubuh dapat mempengaruhi kebutuhan tidur seseorang. Kondisi tubuh yang tidak sehat meningkatkan kebutuhan tidur. Misalnya seseorang yang mengalami penyakit infeksi membutuhkan lebih banyak tidur agar dapat menghemat energi tubuhnya. Kondisi sakit juga dapat menyebabkan pasien mengalami gangguan tidur.

b. Latihan dan kelelahan

Keletihan akibat kegiatan yang padat dapat memerlukan lebih banyak tidur untuk menjaga keseimbangan energi yang telah dikeluarkan. Sehingga orang yang telah beraktivitas akan mengalami lelah. Oleh karena itu orang tersebut akan lebih cepat tidur karena gelombang lambatnnya akan diperpendek.

N A S K A H S I A P C E T A K

c. Stress psikologis

Seseorang yang mengalami tekanan secara psikologis akan mengalami kegelisahan dan sulit untuk tertidur.

d. Obat

Obat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses tidur, antara lain: jenis obat diuretik, antidepressan, golongan narkotik, beta blocker, dan kafein.

e. Nutrisi

Nutrisi juga dapat mempengaruhi proses tidur dimana nutrisi yang adekuat dapat memudahkan individu cepat tertidur dan sebaliknya nutrisi yang tidak adekuat dapat mengakibatkan individu sulit tertidur. Salah satu contohnya adalah kandungan triptofan yang merupakan asam amino dalam protein yang dicerna dapat mempercepat terjadinya proses tidur.

f. Lingkungan

Lingkungan fisik sangat berpengaruh terhadap proses tidur, misalnya pencahayaan, tingkat kebisingan, suhu ruangan, posisi tempat tidur dan kebersihan dari tempat tidur tersebut.

g. Motivasi

Motivasi merupakan suatu dorongan atau keinginan seseorang untuk tidur, yang dapat mempengaruhi proses tidur. Selain itu, adanya keinginan untuk menahan tidak tidur dapat menimbulkan gangguan proses tidur.

Jenis-jenis Gangguan Kebutuhan Istirahat dan Tidur

a. Insomnia

Insomnia merupakan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan tidur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Etiologi dari terjadinya insomnia dapat disebabkan oleh gangguan secara fisik maupun psikis. Ada tiga jenis insomnia yaitu Insomnia insial: Susah untuk mengawali tidur, Insomnia intermiten: Susah untuk tetap tertidur karena seringnya terbangun, dan Insomnia terminal: Bangun terlalu cepat dan susah untuk tidur kembali.

Adapun tindakan yang bisa ditempuh dalam menangani insomnia antara lain dengan mengatur pola tidur-istirahat yang efektif dengan berolahraga secara rutin, tidak tidur di sore hari, melakukan relaksasi sebelum tidur (misalnya: membaca, menikmati musik, dan tidur jika benar-benar mengantuk).

b. Parasomnia

Parasomnia merupakan tindakan yang dapat mengurangi kualitas tidur atau terjadi pada waktu seseorang tertidur. Masalah ini banyak terjadi pada anak-anak. Adapun gejala parasomnia antara lain sering terbangun (misalnya: tidur berjalan, *night terror*), gangguan transisi bangun-tidur mengigau), parasomnia yang terkait dengan tidur REM (misalnya mimpi buruk), dan lainnya.

c. Hipersomnia

Hipersomnia merupakan masalah tidur dengan kriteria tidur berlebihan pada umumnya lebih dari sembilan

jam pada malam hari, disebabkan oleh kemungkinan adanya gangguan psikologis, depresi, kecemasan, masalah pada susunan saraf pusat, ginjal, hati, dan masalah pada proses metabolisme.

d. Narkolepsi

Narkolepsi merupakan kondisi dimana tidur tidak dapat dikendalikan. Misalnya tidur dalam kondisi mengemudi, duduk, dan tiba-tiba tidur pada saat sedang berbincang-bincang.

e. Apnea tidur dan mendengkur

Mendengkur pada umumnya bukanlah suatu masalah tidur tetapi mendengkur yang disertai dengan periode apnea dapat menjadi masalah. Mendengkur sendiri disebabkan oleh adanya yang menghalangi udara di hidung dan mulut pada waktu tidur, biasanya disebabkan oleh adanya adenoid, amandel, atau melemahnya otot di belakang mulut. Terjadinya apnea dalam durasi yang lama dapat menyebabkan kadar oksigen dalam darah menurun dan denyut nadi menjadi irregular.

f. Enuresis

Enuresis merupakan buang air kecil yang tidak disengaja pada waktu tidur (mengompol). Enuresis dibagi menjadi dua jenis: enuresis nokturnal: merupakan mengompol di waktu tidur, dan enuresis diurnal, mengompol saat bangun tidur. Enuresis nokturnal umumnya merupakan gangguan pada tidur NREM.

C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Istirahat dan Tidur

1. Pengkajian Keperawatan

Dalam memberikan layanan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan kebutuhan dasar istirahat dan tidur maka aspek yang perlu dikaji pada klien meliputi pengkajian sebagai berikut (Kasiati & Rosmalawati, 2016).

a. Riwayat tidur

- 1) Pola tidur, seperti pasien bangun dan tidur jam berapa serta pola tidur yang teratur.
- 2) Kebiasaan yang dilakukan klien menjelang tidur, berdoa, mencuci kaki, mendengar musik.
- 3) Gangguan tidur yang sering dialami pasien dan Tindakan yang dilakukan dalam mengatasinya.
- 4) Kebiasaan tidur siang; jam berapa biasanya pasien tidur dan berapa lama?
- 5) Lingkungan tidur, bagaimana pencahayaan, temperature dan kebisingan.
- 6) Peristiwa yang baru dialami klien dalam hidup. Kondisi kehidupan pasien yang dapat menjadi faktor penyebab masalah tidur.

b. Status emosi dan mental klien. Status emosi dan mental mempengaruhi kemampuan pasien untuk istirahat dan tidur. Perawat perlu mengkaji tentang status emosional dan mental pasien, misalnya pasien mengalami ansietas dan sumber dari ansietas tersebut.

c. Perilaku deprivasi tidur yaitu tanda dan gejala fisik dan perilaku yang timbul sebagai efek dari gangguan istirahat tidur, seperti:

- 1) Wajah, misalnya mata panda, mata sembab, konjungtiva kemerahan, atau mata cekung;
- 2) Perilaku yang terkait dengan gangguan istirahat tidur, misalnya apakah klien mudah tersinggung, selalu menguap, kurang fokus atau terlihat bingung;
- 3) Kelelahan, misalnya apakah klien lelah, letih, atau lesu.

d. Gejala Klinis

Gejala klinis yang bisa terjadi: perasaan letih, tidak tenang, emosi, apatis, mata panda, mata bengkak, konjungtiva merah dan mata perih, kurang konsentrasi, dan nyeri kepala.

e. Penyimpangan tidur

Kaji penyimpangan tidur seperti insomnia, somnambulisme, enuresis, narkolepsi, *night terrors*, mendengkur dan lain-lain.

f. Pemeriksaan fisik

- 1) Tingkat energi, seperti kelelahan, keletihan dan merasa lesu.
- 2) Ciri-ciri di wajah, seperti mata sembab, mata sipit dan mata merah.
- 3) Ciri-ciri perilaku, kurang bersemangat, bicara lambat, susah konsentrasi.
- 4) Data penunjang yang menimbulkan adanya masalah potensial seperti kegemukan, septum deviasi, hipotensi, pernapasan dangkal dan dalam.

- g. Pemeriksaan penunjang
 - 1) Elektroecephalogram (EEG).
 - 2) Elektromiogram (EMG).
 - 3) Elektrokardiogram (EOG).

2. Diagnosis Keperawatan

Masalah 1: Kelelahan (PPNI, 2017)

- a. Definisi

Penurunan kapasitas kerja fisik dan mental yang tidak pulih dengan istirahat.
- b. Penyebab
 - 1) Gangguan tidur.
 - 2) Gaya hidup tidak bervariasi.
 - 3) Kondisi fisiologis (misalnya: Kehamilan, penyakit kronis dan lain-lain).
 - 4) Rencana perawatan atau pengobatan jangka panjang.
 - 5) Berduka disfungsi.
 - 6) Stres berlebihan.
 - 7) Depresi.
- c. Gejala dan tanda mayor
 - 1) Subjektif: kelelahan meski telah tidur, kurang berenergi.
 - 2) Objektif: tidak mampu melakukan ADL dengan baik atau tampak lesu.

- d. Gejala dan tanda minor
 - 1) Subjektif: menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak bertanggung jawab, dan gairah seks menurun.
 - 2) Objektif: kebutuhan istirahat meningkat.
- e. Kondisi klinis terkait
 - 1) Anemia.
 - 2) Kanker.
 - 3) Hipotiroidisme/Hipertiroidisme.
 - 4) AIDS.
 - 5) Depresi.
 - 6) Menopause.

Masalah 2: Gangguan pola tidur (PPNI, 2017)

- a. Definisi

Gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal.
- b. Penyebab
 - 1) Faktor lingkungan (misalnya: Temperature, pencahayaan, kebisingan dll).
 - 2) Kurangnya kontrol tidur.
 - 3) Kurangnya kebebasan pribadi.
 - 4) *Restraint* fisik.
 - 5) Tidur sendiri.
 - 6) Asing dengan kondisi kamar tidur.

c. Gejala dan tanda mayor

Subjektif: keluhan susah tidur, sering terbangun, tidur tidak puas, pola tidur berubah, dan istirahat tidak cukup.

d. Gejala dan tanda minor

Subjektif: mengeluh kemampuan beraktivitas menurun.

e. Kondisi klinis terkait

- 1) Nyeri/Kolik.
- 2) Hipertiroidisme.
- 3) Kecemasan.
- 4) Penyakit paru obstruktif kronis.
- 5) Kehamilan.
- 6) Periode pasca partum.
- 7) Kondisi pasca operasi.

3. Intervensi Keperawatan

a. Keletihan

Edukasi aktivitas/Istirahat (PPNI, 2018)

1) Tujuan dan kriteria hasil

a) Tujuan

Mengedukasi pasien terkait pengelolaan istirahat dan tidur setelah beraktivitas.

b) Kriteria hasil (PPNI, 2019)

- Tenaga meningkat.
- Pola istirahat membaik.

2) Intervensi Keperawatan

a) Observasi

Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi

b) Terapeutik

- Siapkan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat.
- Rencanakan pemberian edukasi sesuai kesepakatan.
- Berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya.

c) Edukasi

- Jelaskan perlunya melakukan aktivitas fisik/olahraga secara rutin.
- Anjurkan ikut dalam kegiatan kelompok, bermain atau kegiatan lainnya.
- Anjurkan membuat jadwal aktivitas dan istirahat.
- Ajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat (misalnya : kelelahan, sesak napas saat beraktivitas).
- Ajarkan cara mengidentifikasi target dan jenis kegiatan yang sesuai kemampuan.

d) Kolaborasi

Manajemen energi (PPNI, 2018)

1) Tujuan dan kriteria hasil

a) Tujuan

Mengidentifikasi pengelolaan energi untuk mencegah kelelahan dan mempercepat proses pemulihan.

b) Kriteria hasil (PPNI, 2019)

- Meningkatnya energi pasien.
- Meningkatnya kemampuan aktivitas.
- Keluhan merasakan lelah menurun.

2) Intervensi Keperawatan (PPNI, 2018)

a) Observasi

- Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan.
- Monitor kelelahan fisik dan emosional.
- Monitor pola dan jam tidur.
- Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas.

b) Terapeutik

- Siapkan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (misalnya: Cahaya, suara, kunjungan).
- Lakukan ROM aktif/pasif.
- Berikan kegiatan distraksi yang menyenangkan.
- Fasilitasi duduk disamping tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan.

c) Edukasi

- Anjurkan tirah baring.
- Anjurkan beraktivitas secara bertahap.
- Anjurkan untuk melaporkan kepada perawat jika manifestasi kelelahan tidak berkurang.
- Ajarkan strategi koping dalam menurunkan kelelahan.

d) Kolaborasi

Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan

b. Gangguan Pola Tidur

Dukungan tidur (PPNI, 2018)

1) Tujuan dan kriteria hasil

a) Tujuan

Membantu siklus tidur klien secara teratur

b) Kriteria hasil (PPNI, 2019)

- Keluhan sulit tidur menurun.
- Sering terbangun menurun.
- Perasaan tidak cukup tidur menurun.

2) Intervensi Keperawatan (PPNI, 2018)

a) Observasi

- Identifikasi pola aktivitas dan tidur.
- Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan psikologis).
- Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur (misalnya: Kopi, teh, alkohol).
- Identifikasi obat tidur yang dikonsumsi.

N A S K A H S I A P C E T A K

b) Terapeutik

- Modifikasi lingkungan (misalnya: Pencahayaan, kebisingan, matras dll).
- Batasi waktu tidur siang, jika perlu.
- Fasilitasi menghilangkan stres sebelum tidur.
- Tetapkan jadwal tidur rutin.
- Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (misalnya: Pijat, pengaturan posisi, akupresur).
- Sesuaikan jadwal pemberian obat dan/atau tindakan untuk menunjang siklus tidur terjaga.

c) Edukasi

- Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit.
- Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur.
- Anjurkan menghindari makanan atau minuman yang mengganggu tidur.
- Anjurkan penggunaan obat tidur yang tidak mengandung supresor terhadap tidur REM.
- Ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur (misalnya: Psikologis, gaya hidup, sering berubah shift kerja).
- Ajarkan relaksasi otot autogenik atau cara nonfarmakologi lainnya.

Terapi Musik (PPNI, 2018)

1) Tujuan dan kriteria hasil

a) Tujuan

Membuat klien merasa nyaman dan rileks.

b) Kriteria hasil (PPNI, 2019)

- Keluhan sulit tidur menurun.
- Keluhan istirahat tidak cukup menurun.
- Rileks meningkat.

2) Intervensi Keperawatan (PPNI, 2018)

a) Observasi

- Identifikasi adanya perubahan perilaku atau fisiologis yang akan dicapai (misalnya: Relaksasi, stimulasi, konsentrasi, dll).
- Identifikasi ketertarikan terhadap musik.
- Identifikasi musik yang disukai.

b) Terapeutik

- Pilih musik yang disukai.
- Posisikan dalam posisi yang nyaman.
- Batasi rangsangan eksternal selama terapi dilakukan (misalnya: Lampu, suara, telepon).
- Siapkan perlengkapan terapi musik.
- Atur volume suara yang sesuai.
- Berikan terapi musik sesuai indikasi.
- Lakukan pemberian terapi musik sesuai dengan waktu yang efektif.
- Hindari pemberian terapi musik saat cedera kepala akut.

c) Edukasi

- Jelaskan tujuan dan SOP terapi musik.
- Anjurkan rileks selama mendengarkan musik.



NUTRISI

A. Pendahuluan _____

Nutrisi dan cairan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi manusia, Berbagai penelitian telah dilakukan dan mengemukakan bahwa kekurangan gizi, baik nutrisi maupun cairan dan elektrolit tubuh akan memberikan dampak pada tumbuh kembang seorang anak dan menghambat produktivitas seiring bertambahnya usia seseorang.

Kekurangan nutrisi merupakan masalah klinis yang umum dijumpai di pelayanan kesehatan, utamanya pada pasien dengan kondisi kritis. Perawat memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan nutrisi pasien, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui standar dan kualitas asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Sebuah penelitian yang telah dilakukan mengemukakan bahwa kinerja perawat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas perawatan pemenuhan nutrisi pasien di pelayanan kesehatan (Atefeh Taherkan et,al 2019).

B. Konsep Dasar Kebutuhan Nutrisi _____.

1. Defenisi

Nutrisi berasal dari kata *nutrients* yang berarti bahan gizi. Nutrisi merupakan proses terbentuknya energi dari bahan makanan yang diperlukan untuk pemeliharaan, pembentukan, dan penggantian sel tubuh. Nutrient merupakan zat organik dan anorganik yang terdapat di dalam makanan dan dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, aktivitas, menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, memelihara fungsi-fungsi tubuh, mempercepat penyembuhan, serta membentuk sistem kekebalan tubuh (Kemenkes, 2017).

Menurut Barbara Kozier et al. (2011), nutrisi merupakan jumlah semua interaksi antara suatu organisme dan makanan yang dikonsumsi. Dengan kata lain, nutrisi adalah sesuatu yang dimakan seseorang dan bagaimana tubuh menggunakannya (Munthe, Naomi F.A, 2017).

2. Fisiologi Sistem

Sistem pencernaan (gastrointestinal) berperan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi tubuh, mulai dari mulut sampai dengan usus halus (Jhon Welis, 2013).

Menurut Welis (2006) organ tubuh yang berperan dalam pemenuhan nutrisi adalah (Munthe, Naomi F.A, 2017):

a. Mulut

Mulut adalah bagian awal dari sistem gastrointestinal. Mulut terdiri dari dua bagian, bagian luar disebut vestibula yakni gigi, ruang antargusi, pipi bagian dalam, dan bibir, dan bagian dalam yakni rongga mulut.

b. Faring dan Esofagus

Faring terletak di belakang hidung, mulut, dan laring serta berhubungan langsung dengan esofagus. Esofagus sendiri adalah bagian dari sistem pencernaan yang berfungsi menghantarkan makanan dari faring ke lambung.

c. Lambung

Lambung merupakan bagian dari sistem pencernaan. Lambung adalah sebuah organ berrongga yang ada didalam perut bagian atas, di bawah tulang rusuk. Dinding lambung mempunyai lima lapisan. Dalam proses pencernaan, makanan bergerak dari mulut dari esofagus untuk kemudian menjangkau lambung. Didalam lambung, makanan menjadi cair. Cairan tersebut selanjutnya bergerak masuk ke usus kecil untuk dicerna lebih lanjut.

d. Usus Halus

Panjang usus halus kurang lebih 2,5 meter menyerupai tabung yang berlipat-lipat. Usus halus berfungsi untuk mencerna dan mengabsorbsi zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. Zat makanan yang telah berbentuk partikel halus diabsorbsi di bagian duodenum, seperti zat besi, kalsium, dengan bantuan vitamin A, D, E, K serta empedu dan asam fosfat.

e. Kolon

Kolon terletak setelah usus halus dengan panjang kurang lebih 1,5 meter. Kolon terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kolon asendens, transversum, desenden,

sigmoid, dan rectum. Kolon berfungsi untuk mengabsorpsi air (Munthe, Naomi F.A, 2017).

3. Faktor yang Mempengaruhi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi menurut Gloria (2010), yaitu:

a. Pengetahuan

Kurangnya pengetahuan tentang makanan bergizi akan mempengaruhi pola makan seseorang. Hal ini akibat kurang terpaparnya informasi mengenai zat-zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh.

b. Kebiasaan

Kebiasaan makan terhadap konsumsi makanan tertentu yang dapat merugikan jika dikonsumsi berlebihan ataupun berdampak buruk jika kurang dikonsumsi juga dapat mempengaruhi status gizi seseorang.

c. Kesukaan

Rasa suka berlebihan terhadap jenis makanan tertentu dapat menyebabkan kurangnya konsumsi makanan yang bervariasi. Akibatnya, tubuh tidak memperoleh nutrisi yang cukup yang dibutuhkan untuk proses fisiologis tubuh.

d. Status Ekonomi

Masyarakat dengan status ekonomi rendah terkadang kurang mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan asumsi membutuhkan biaya untuk menyediakan makanan yang bervariasi dan bernilai gizi. Meskipun pada dasarnya, untuk menyediakan makanan dengan

kandungan gizi yang diperlukan oleh tubuh, dapat diperoleh dari bahan makanan sederhana.

e. Usia

Faktor tumbuh kembang memiliki pengaruh terhadap pemenuhan gizi. Pada anak usia 0-10 tahun misalnya, dibutuhkan nutrisi yang cukup untuk kelangsungan proses metabolisme tubuh. Saat berusia di atas 20 tahun, maka energi basal menjadi relatif konstan.

f. Jenis Kelamin

Kebutuhan metabolisme basal pada wanita lebih rendah dibandingkan pada pria. Pada pria kebutuhan *Basal Metabolic Rate* sebesar 1,0 kkal/kg BB/jam, sedangkan pada wanita hanya 0,9 kkal/kg BB/jam.

g. Tinggi dan Berat Badan

Tinggi badan dan berat badan mempengaruhi luas permukaan tubuh. Kebutuhan metabolisme basal tubuh dipengaruhi oleh luas permukaan tubuh seseorang. Hal ini disebabkan karena besarnya pengeluaran panas berbanding lurus dengan luas permukaan tubuh seseorang.

h. Status Kesehatan

Perubahan status kesehatan akan berpengaruh terhadap nafsu makan, misalnya terjadi penurunan nafsu makan (anoreksia), ataupun efek samping dari obat-obatan.

i. Kondisi Psikologis

Kondisi psikologis seperti stres, cemas, tegang akan berpengaruh pada keinginan seseorang untuk meng-

N A S K A H S I A P C E T A K

konsumsi makanan. Selain itu, perilaku diet karena motivasi tertentu juga berpengaruh pada motivasi seseorang untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang.

j. Konsumsi Alkohol dan Obat-obatan

Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat berdampak pada sistem gastrointestinal, berpengaruh pada nafsu makan, dan menyebabkan terjadinya defisiensi nutrisi. Demikian juga halnya dengan konsumsi obat-obatan tertentu yang memiliki efek menurunkan nafsu makan, juga dapat menurunkan absorpsi zat gizi di dalam usus halus (Mubarak, 2010).

4. Macam-macam Gangguan yang Mungkin Terjadi

a. Obesitas

Pada kondisi obesitas, individu mengalami kelebihan berat badan lebih dari 20% berat badan normal. Hal ini terjadi ketika asupan kalori berlebih namun penggunaan kalori rendah (ketidak seimbangan nutrisi).

b. Malnutrisi

Berbeda dengan kondisi pada obesitas, malnutrisi merupakan kondisi kekurangan nutrisi pada tingkat sel akibat dari ketidaksesuaian antara asupan nutrisi dengan kebutuhan tubuh. Ditandai dengan berat badan di bawah normal meskipun asupan makanan mencukupi, kelemahan otot, penurunan energi, kulit tampak pucat, membrane mukosa dan konjungtiva tampak pucat, dan lain-lain.

N A S K A H S I A P C E T A K

c. Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus terjadi karena adanya kekurangan insulin yang menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme karbohidrat, atau penggunaan karbohidrat secara berlebih.

d. Hipertensi

Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah di atas normal yang terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Hipertensi dapat pula disebabkan oleh masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi lainnya seperti obesitas asupan natrium berlebih, dan gaya hidup tidak sehat.

e. Penyakit Jantung Koroner

Penyakit jantung koroner disebabkan oleh adanya peningkatan kadar kolesterol dalam darah, kebiasaan merokok, obesitas, pola makan, gaya hidup yang tidak sehat, dan sebagainya.

f. Kanker

Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien kanker terjadi karena konsumsi lemak yang berlebihan.

C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Nutrisi _____

1. Pengkajian Keperawatan

a. Riwayat Keperawatan

Penggunaan metode ABCD untuk melakukan pengkajian status nutrisi, yaitu:

1) *Anthropometric measurement*

Pengukuran ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pertumbuhan dan melakukan pengkajian tentang ketersediaan energi dan status nutrisi pasien.

Pengukuran antropometri:

- Tinggi badan.
- Berat badan.
- Tebal lipatan kulit, normal pada wanita 16,5 – 18 cm dan pada pria 12,5 – 16,5 cm.
- Lingkar Tubuh.

2) *Biochemical data*

Untuk mengkaji status nutri pasien, diperlukan pemeriksaan laboratorium sebagai pemeriksaan penunjang, meliputi pemeriksaan darah dan urin, seperti pemeriksaan haemoglobin, hematokrit, dan albumin.

- Nilai normal haemoglobin
Pria : 13-16 g/dl
Wanita : 12-14 g/dl
- Nilai normal hematokrit
Pria : 40-48 vol %
Wanita : 37-43 vol%
- Nilai normal albumin
Pria dan wanita : 4-5,2 g/dl

3) *Clinical sign of nutritional status*

Organ	Tanda Normal	Tanda Abnormal
Rambut	Berkilau, licin, kering atau berminyak.	Rontok, tidak tumbuh dengan sempurna, tampak kusam
Kulit	Sedikit lembab, halus, turgor baik	Kering, pecah-pecah, bersisik
Mata	Bersih dan bersinar, konjungtiva merah muda	Konjungtiva pucat, tidak bercahaya
Kardiovaskuler	Denyut nadi dan tekanan darah normal, irama jantung reguler	Denyut nadi dan tekanan darah tidak normal, irama jantung irregular
Otot-otot	Kuat dan berkembang dengan baik	Lembek dan tidak berkembang dengan baik
Gastrointestinal	Nafsu makan baik, BAB normal dan teratur	Anoreksia, sulit menelan, konstipasi, diare
Aktifitas	Bersemangat, tidur normal	Kurang berenergi, kesulitan untuk tidur, lemah
Neurologi	Refleks normal, emosi dan perhatian baik	Refleks kurang, irritable, perhatian tidak fokus, emosi labil

4) *Dietary history*

Umumnya masyarakat pernah melakukan diet tetapi tidak melakukan perubahan kebiasaan. Kebiasaan makan dan pola makan dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, latar belakang budaya, aspek psikologis, dan lain-lain.

Ada beberapa beberapa faktor yang penting untuk dikaji terkait dengan riwayat nutrisi:

Pola diet/makan	Vegetarian, tidak mengkonsumsi ikan laut, dan sebagainya
Pengetahuan tentang nutrisi	Menentukan tingkat pengetahuan klien terkait kebutuhan nutrisi
Kebiasaan makanan	Makan bersama, makan sambal melakukan aktivitas lain, seperti mendengarkan musik atau menonton televisi

Makanan kesukaan	Suka makan lalap, suka sambel, suka coklat, suka roti
Intake cairan	Jumlah cairan tiap hari yang diminum, jenis minuman, jarang minum
Problem diet	Sukar menelan, kesulitan mengunyah
Tingkat aktivitas	Jenis pekerjaan, waktu bekerja siang/malam, perlu makanan tambahan atau tidak
Riwayat kesehatan/ pengonsumsi obat	Adanya riwayat alergi, atau penyakit tertentu seperti diabetes melitus
Refleks normal, emosi dan perhatian baik	Refleks kurang, irritable, perhatian tidak fokus, emosi labil

2. Diagnosis Keperawatan

Masalah 1: Defisit Nutrisi

a. Defenisi

Asupan nutrisi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh.

b. Penyebab

- 1) Ketidakmampuan menelan makanan.
- 2) Ketidakmampuan mencerna makanan.
- 3) Meningkatnya kebutuhan metabolisme tubuh.
- 4) Ketidakmampuan mengabsorbsi nutrien.
- 5) Faktor ekonomi.
- 6) Faktor psikologis.

c. Gejala dan tanda mayor

- 1) Subjektif (tidak tersedia).
- 2) Objektif (penurunan berat badan minimal 10 % di bawah rentang ideal).

N A S K A H S I A P C E T A K

d. Gejala dan tanda minor

1) Subjektif

- a) Merasa cepat kenyang.
- b) Nyeri/kram abdomen.
- c) Penurunan nafsu makan.

2) Objektif

- a) Bising usus hiperaktif.
- b) Otot pengunyah lemah.
- c) Otot menelan lemah.
- d) Membran mukosa pucat.
- e) Sariawan.
- f) Penurunan serum albumin.
- g) Rambut rontok.
- h) Diare.

e. Kondisi klinis terkait

- 1) Parkinson.
- 2) Stroke.
- 3) *Mobius sindroma*.
- 4) *Cerebral palsy*.
- 5) *Cleft lip*.
- 6) *Cleft palate*.
- 7) *Amyotrophic lateral sclerosis*.
- 8) Kerusakan neuromuskular.
- 9) Kanker.
- 10) Luka bakar.
- 11) Infeksi.

12) AIDS.

13) Penyakit Cron's.

Masalah 2: Berat Badan Lebih

a. Defenisi

Akumulasi lemak berlebih atau abnormal yang tidak sesuai dengan usia dan jenis kelamin.

b. Penyebab

- 1) Kurang aktivitas fisik harian.
- 2) Kelebihan konsumsi gula.
- 3) Gangguan kebiasaan makan.
- 4) Kelebihan konsumsi alkohol.
- 5) Penggunaan energi kurang dari asupan.
- 6) Sering mengemil.
- 7) Sering memakan makanan berminyak/berlemak.
- 8) Faktor keturunan (misal distribusi jaringan adiposa, pengeluaran energi, aktivitas lipase, lipoprotein, sintesis lipid, lipolisis).
- 9) Penggunaan makanan formula atau makanan campuran (pada bayi).
- 10) Asupan kalsium rendah (pada anak-anak).
- 11) Berat badan bertambah cepat (selama masa anak-anak, selama masa bayi, termasuk minggu pertama, 4 bulan pertama, dan tahun pertama).
- 12) Pemberian makanan padat pada usia kurang dari 5 bulan sebagai makanan utama.

N A S K A H S I A P C E T A K

c. Gejala dan tanda mayor

1) Subjektif (tidak tersedia)

2) Objektif

a) $IMT > 25 \text{ kg/m}^2$ (pada dewasa) atau berat dan panjang badan lebih dari presentil 95 (pada anak < 2 tahun) atau IMT pada presentil ke 85-95 (pada anak 2-18 tahun).

b) Tebal lipatan kulit trisepts >25 mm.

d. Kondisi klinis terkait

1) Gangguan genetik.

2) Faktor keturunan.

3) Hipotiroid.

4) Diabetes melitus maternal.

3. Intervensi Keperawatan

Masalah 1: Defisit Nutrisi

Luaran Keperawatan : Nutrisi Membaik.

Intervensi:

a. Jelaskan pentingnya konsumsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serta cairan yang adekuat.

Rasional: nutrisi berperan dalam penyediaan sumber energi, pengaturan metabolisme tubuh, dan membangun jaringan tubuh.

b. Konsultasi dengan ahli gizi untuk menentukan jenis makanan dan kebutuhan kalori harian yang tepat bagi klien.

Rasional: Dengan konsultasi, kita dapat menentukan metode diet yang memenuhi asupan kalori dan nutrisi yang optimal.

- c. Diskusikan bersama klien kemungkinan penyebab hilangnya nafsu makan.

Rasional: Faktor-faktor seperti nyeri, kelemahan, penggunaan analgesik, dan imobilitas dapat menyebabkan anorexia.

- d. Anjurkan klien untuk istirahat sebelum makan.

Rasional: Kondisi yang lemah lebih lanjut dapat menurunkan keinginan dan kemampuan klien anorexia untuk makanan.

- e. Tawarkan makanan dalam jumlah sedikit tapi sering.

Rasional: Distribusi total asupan kalori yang merata sepanjang hari membantu mencegah distensi lambung sehingga selera makan mungkin akan meningkat.

- f. Pada kondisi menurunnya nafsu makan, batasi asupan cairan saat makan dan hindari mengkonsumsi cairan satu jam sebelum dan sesudah makan.

Rasional: Pembatasan asupan cairan saat makan membantu mencegah distensi lambung.

- g. Dorong dan Bantu klien untuk menjaga kebersihan mulut yang baik.

Rasional: Kurangnya kebersihan mulut menyebabkan bau tidak sedap dan menurunkan nafsu makan.

- h. Atur diet tinggi kalori tinggi protein saat klien merasa lapar.

Rasional: Menyediakan makanan TKTP saat lapar memungkinkan klien mengkonsumsi kalori dan protein yang adekuat.

Masalah 2: Berat Badan Lebih

Luaran Keperawatan : Berat badan Membaik

Intervensi

- a. Hitung intake makanan dalam 24 jam.

Rasional: untuk mengetahui intake kalori yang masuk ke dalam tubuh.

- b. Buat program olahraga/latihan.

Rasional: untuk meningkatkan kebutuhan energi.

- c. Hindari makan yang mengandung banyak lemak.

Rasional: makanan berlemak menghasilkan banyak tumpukan lemak dalam tubuh.

- d. Berikan pengetahuan kesehatan tentang : Program diet yang benar dan akibat yang mungkin timbul pada kelebihan BB.

Rasional: memberikan informasi dan mengurangi komplikasi.

- e. Kolaborasi dengan ahli diet yang tepat.

Rasional: menentukan makan yang sesuai dengan pasien.



ELIMINASI URINE DAN FEKAL

A. Pendahuluan _____•

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis agar tetap hidup dengan sehat (Tarwoto, 2015). Salah satu kebutuhan fisiologis manusia adalah kebutuhan eliminasi yang bertujuan untuk mengeluarkan produk limbah dari dalam tubuh. Sangat penting untuk menghilangkan produk limbah secara teratur untuk mempertahankan normal fungsi tubuh. Jika ada perubahan dalam pola eliminasi, itu mempengaruhi tubuh. Ketika orang tersebut sakit, penyakit cenderung mengubah kebiasaan eliminasi orang tersebut.

Nocturnal enuresis, inkontinensia urine, inkontinensia fekal, konstipasi merupakan gangguan kebutuhan eliminasi yang sering terjadi. Konstipasi pada anak-anak adalah umum, mempengaruhi antara 0,7 dan 29,6% dari populasi umum di seluruh dunia dan sering dikaitkan dengan inkontinensia fekal. Sedangkan pada populasi orang dewasa *koeksistensi*

konstipasi dan *fecal inkontinensia* (FI) tidak diketahui namun diperkirakan prevalensi keseluruhannya 15% dan 4-9% masing-masing. Damon et al dalam survei terhadap 706 subjek menemukan bahwa 63% responden yang tidak puas melaporkan kesulitan dengan buang air besar, dan 51% merasa bahwa mereka tidak pernah benar-benar mengosongkan dubur mereka. Bharucha et al. juga menunjukkan bahwa perasaan defekasi yang tidak lengkap adalah faktor risiko untuk FI, 26% dari wanita yang dipilih secara acak dengan FI (46/176) memiliki riwayat sembelit kronis, dengan kehadiran *rectocoele* (dari dokumentasi medis) menjadi faktor risiko independen yang kuat. Dalam sampel komunitas Arab dari 596 wanita, 62 di antaranya ditemukan memiliki FI, konstipasi juga ditemukan secara signifikan lebih sering terjadi (Yüce, M., Zoroglu, S. S., Ceylan, M. F., Kandemir, H., & Karabekiroglu, K., 2013).

Gangguan eliminasi lebih banyak dikaitkan dengan tingkat gangguan emosi dan perilaku. Studi epidemiologi menunjukkan hal tersebut 20% hingga 30% dari semua anak yang mengalami *nocturnal enuresis* memiliki perilaku yang relevan secara klinis. Gangguan kormobiditas paling tinggi pada anak-anak dengan *nocturnal enuresis* yaitu *Attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD). Dalam studi retrospektif pasien dengan ADHD mengalami ngompol pada malam hari sebanyak 20,9% dan pada siang hari 6,5%. Dari anak-anak berusia 7 tahun yang ngompol pada malam hari sebanyak 10%, 2-3% ngompol pada siang hari (Nurko, S., & Scott, S. M., 2011).

Perkiraan prevalensi enuresis sangat bervariasi, 1–19 dengan kisaran 3,8% 19 hingga 24%. Perkiraan yang berbeda dapat dipertanggungjawabkan terutama oleh perbedaan definisi enuresis dalam Klasifikasi Penyakit Internasional dan

Masalah Kesehatan Terkait - Edisi Tujuh (ICD-10), 20 DSM-IV, 21 dan Masyarakat Kontinen Anak Internasional (ICCS). 22 DSM-III23 dan ICD-10 membutuhkan frekuensi mengompol dua kali per bulan dalam 3 bulan terakhir untuk anak-anak usia 5 dan 6 tahun dan sekali per bulan dalam 3 bulan terakhir untuk anak-anak usia 7 tahun atau lebih, sedangkan DSM-IV membutuhkan frekuensi mengompol dua kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut atau adanya tekanan klinis yang signifikan. atau gangguan, terlepas dari usia anak. Tingkat yang lebih tinggi dari enuresis diamati dalam studi epidemiologi berbasis populasi yang menerapkan kriteria DSM-III yang kurang ketat 3,4 atau kriteria ICD-10.9,10 Selain kriteria diagnostik yang berbeda, perbedaan dalam rentang usia dan etnis anak-anak dan referensi periode untuk tingkat prevalensi (misal prevalensi titik versus prevalensi 12 bulan), serta perbedaan budaya, juga dapat menjelaskan perkiraan prevalensi yang sangat beragam dari enuresis yang diterbitkan di seluruh dunia (Nurko, S., & Scott, S. M., 2011).

Konsep kebutuhan eliminasi, asuhan keperawatan gangguan kebutuhan eliminasi dan integrasi nilai-nilai islam akan dibahas pada bagian selanjutnya.

B. Konsep Dasar Kebutuhan Eliminasi Urine dan Fekal

1. Definisi Kebutuhan Dasar Elminasi

Pola eliminasi sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sistem perkemihan dan pencernaan bersama-sama berfungsi untuk menghilangkan limbah dari tubuh. Sistem perkemihan menyaring dan mengeluarkan urine dari tubuh, sehingga menjaga keseimbangan cairan, elektrolit,

dan asam-basa. Sedangkan Fungsi usus yang normal bertugas dalam pembuangan rutin limbah yang padat (feses). Selama periode stres dan sakit, klien mengalami perubahan dalam pola eliminasi. Perawat menilai adanya perubahan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan intervensi untuk membantu klien dengan mempertahankan pola eliminasi yang tepat. Peran perawat mencakup mengajar kegiatan perawatan diri klien untuk meningkatkan kemandirian dan kesehatan (DeLaune, 2011).

2. Jenis-Jenis Pola Eliminasi

a. Eliminasi Urine

Eliminasi dari saluran kemih membantu membersihkan tubuh dari produk limbah dan bahan yang melebihi kebutuhan tubuh (Taylor, 2011). Sistem kemih terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal membentuk urine, ureter membawa urine ke kandung kemih, kandung kemih bertindak sebagai reservoir untuk urine, dan uretra adalah jalan bagi urine untuk keluar dari tubuh (DeLaune, 2011). Mekanisme fisiologis yang mengatur eliminasi urin kompleks dan belum sepenuhnya dipahami. Kontinensi pada orang dewasa membutuhkan integritas anatomi sistem perkemihan, kontrol nervus dari otot detrusor, dan mekanisme sfingter yang kompeten. Inkontinensia urine terjadi ketika kelainan satu atau lebih dari faktor-faktor ini menyebabkan hilangnya urine yang tidak terkontrol yang menghasilkan kesulitan sosial, fisiologis, atau kebersihan bagi klien (DeLaune, 2011).

b. Eliminasi Bowel / Fekal

Setiap pasien sangat berbeda pandangan mereka tentang eliminasi bowel, pola buang air besar yang biasa, dan kemudahan mereka berbicara tentang masalah usus. Meskipun kebanyakan orang pernah mengalaminya seperti serangan diare ringan atau sembelit akut, beberapa pasien mengalami perubahan masalah yang parah atau kronis pada eliminasi usus yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit, hidrasi, status gizi, integritas kulit, kenyamanan, dan konsep diri. Apalagi banyak penyakit, tes diagnostik, obat-obatan, dan perawatan bedah dapat mempengaruhi eliminasi usus (Taylor, 2011). Proses eliminasi feses yang normal sepenuhnya belum dipahami. Kontinensi terutama bergantung pada konsistensi tinja (bahan tinja), motilitas usus, kepatuhan dan kontraktibilitas rektum, dan kompetensi sfingter anal (DeLaune, 2011).

3. Anatomi dan Fisiologi

a. Anatomi

Menurut Taylor (2011) Adapun anatominya sebagai berikut:

1) Eliminasi Urine

a) Ginjal dan Ureter

Ginjal terletak di kedua sisi tulang belakang, dibagian belakang peritoneum, di rongga perut bagian atas. Salah satu fungsi ginjal yang lebih signifikan adalah untuk membantu mempertahankan komposisi dan volume cairan tubuh. Setiap 30 menit sekali, volume darah total tubuh melewati ginjal untuk dibuang. Ginjal menyaring

dan mengeluarkan konstituen darah yang tidak diperlukan dan mempertahankan yang masih dibutuhkan. Produk limbah yang dikeluarkan oleh ginjal, mengandung limbah organik, anorganik, dan cairan.

Nefron adalah unit struktural dan fungsional dasar dari ginjal. Ada sekitar 1 juta nefron di setiap ginjal. Setiap nefron terdiri dari sistem arteriol, kapiler, dan tubulus. Nefron menghilangkan produk akhir metabolisme, seperti urea, kreatinin, dan asam urat dari plasma darah dan membentuk urine. Nefron mempertahankan dan mengatur keseimbangan cairan melalui mekanisme reabsorpsi selektif dan sekresi air, elektrolit, dan zat lainnya. Setelah terbentuk, urine dari nefron bermuara di panggul setiap ginjal. Dari setiap ginjal, urine diangkut oleh peristaltik ritmik melalui ureter ke kandung kemih. Ureter masuk ke kandung kemih secara miring. Lipatan membran dalam kandung kemih menutup pintu masuk ke ureter sehingga urine tidak dipaksa menaikkan ureter ke ginjal ketika ada tekanan di dalam kandung kemih.

b) Kandung Kemih

Kandung kemih terdiri dari otot polos yang berfungsi sebagai tempat sementara untuk menampung urine. Kandung kemih ini terdiri dari tiga lapisan jaringan otot: (1) lapisan longitudinal dalam, (2) lapisan melingkar tengah, dan (3) lapisan longitudinal luar. Ketiga lapisan ini disebut otot detrusor. Di dasar kandung kemih, terdapat

jaringan otot yang membentuk sfingter internal, yang menjaga celah antara kandung kemih dan uretra.

Uretra membawa urine dari kandung kemih ke bagian luar tubuh. Otot kandung kemih dipersarafi oleh sistem saraf otonom. Sistem simpatis membawa impuls ke kandung kemih dan impuls motorik ke sfingter internal. Impuls ini menyebabkan otot detrusor rileks dan sfingter internal mengerut, menahan urine dalam kandung kemih. Sistem parasimpatis membawa impuls motorik ke kandung kemih dan impuls penghambat ke sfingter internal. Impuls ini menyebabkan otot detrusor berkontraksi dan sphincter mengendur.

Ketika tekanan menjadi cukup untuk merangsang saraf di dinding kandung kemih (reseptor peregangan), orang tersebut merasakan keinginan untuk mengosongkan kandung kemih.

c) Uretra

Fungsi uretra adalah untuk mengangkut urine dari kandung kemih ke bagian luar tubuh. Anatomi uretra berbeda pada pria dan wanita. Uretra pria berfungsi dalam sistem ekskresi dan sistem reproduksi. Panjangnya sekitar 13,7 hingga 16,2 cm dan terdiri dari tiga bagian: prostat, membran, dan gua kavernosa. Sfingter uretra eksternal terdiri dari otot lurik dan terletak tepat di luar bagian prostat uretra. Sfingter eksternal berada di bawah kendali saraf yang disadari. Sebaliknya, uretra wanita sekitar 3,7 hingga 6,2 cm panjang-

nya. Sfingter eksternal, atau saraf yang disadari terletak di tengah uretra.

2) Eliminasi Bowel / Fekal

Proses eliminasi Bowel sangat berkait dengan sistem gastrointestinal. Sistem gastrointestinal (saluran pencernaan) dimulai di mulut dan berakhir di anus. Panjang usus kecil pada orang dewasa sekitar 22 meter. Usus kecil terutama bertanggung jawab untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi, vitamin, mineral, cairan, dan elektrolit. Chyme pencernaan (campuran makanan yang dicerna sebagian dan sekresi) berjalan melalui usus kecil dengan kombinasi kontraksi segmental dan gelombang peristaltik. Usus kecil bergabung dengan usus besar (usus besar) di katup ileocecal. Katup ini bekerja bersama dengan sphincter ileocecal untuk mengontrol pengosongan isi dari usus kecil menjadi usus besar dan untuk mencegah regurgitasi chyme pencernaan dari usus besar ke kecil (Delaune, 2011).

a) Perut

Perut adalah organ berongga, berbentuk J, berotot yang terletak di bagian kiri atas perut. Perut menyimpan makanan selama makan, mengeluarkan cairan pencernaan, mengocok makanan untuk membantu pencernaan, dan mendorong makanan yang dicerna sebagian, yang disebut chyme, ke usus kecil. Sfingter pilorus, cincin berotot yang mengatur ukuran bukaan di ujung perut, mengontrol pergerakan chyme dari perut ke usus kecil (Taylor, 2011).

b) Usus Halus

Usus kecil sekitar 20 kaki (6 m) panjang dan sekitar 1 inci (2,2 cm) lebar. Usus kecil terdiri dari tiga bagian: yang pertama adalah duodenum, bagian tengah adalah jejunum, dan bagian distal yang terhubung dengan usus besar adalah ileum. Usus kecil mengeluarkan enzim yang mencerna protein dan karbohidrat. Hasil pencernaan dari hati dan pankreas memasuki usus kecil melalui lubang kecil di duodenum. Usus kecil bertanggung jawab untuk pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah.

c) Usus Besar

Koneksi antara ileum usus kecil dan usus besar adalah katup ileocecal, atau ileocolic. Katup ini biasanya mencegah hasil dari usus halus memasuki usus besar sebelum waktunya dan mencegah produk limbah kembali ke usus kecil. Usus besar adalah organ utama dari eliminasi bowel yang terletak dibagian bawah, atau distal, dari saluran pencernaan. Panjang usus besar pada orang dewasa sekitar 5 kaki (1,5 m), Lebar juga bervariasi kurang lebih selebar 2,5 cm. Usus besar terdiri atas tiga yakni colon ascendens, tranvesium, dan descendes yang pada bagian ujungnya terdapat sigmoid yang bermuara ke rektum, Rektum sekitar 12 cm (5 inci) panjangnya, 2,5 cm (1 inci) di antaranya adalah anus.

b. Proses terjadinya Eliminasi

1) Eliminasi Urine

Proses mengosongkan kandung kemih dikenal sebagai proses buang air kecil atau berkemih. Pusat saraf yang mengatu prosesr buang air kecil terletak di otak dan sumsum tulang belakang. Reseptor peregangan di kandung kemih distimulasi saat urine terkumpul. Seseorang dapat merasakan keinginan untuk membatalkan, biasanya ketika kandung kemih mengisi sekitar 150 hingga 250 mL pada orang dewasa. Tekanan di dalam kandung kemih berkali-kali lebih besar selama buang air kecil dari pada saat kandung kemih mengisi. Ketika buang air kecil dimulai, otot detrusor berkontraksi, sfingter internal rileks, dan urine memasuki uretra posterior dan otot-otot perineum dan sfingter eksternal rileks, otot dinding perut sedikit berkontraksi, diafragma lebih rendah, dan terjadi buang air kecil (Taylor, 2011).

2) Eliminasi Bowel / Fekal (Defekasi)

Proses defeksi mengacu pada proses pengosongan usus besar. Dua pusat mengatur refleks untuk buang air besar, satu di medula dan di sumsum tulang belakang. Ketika stimulasi parasimpatis terjadi, sfingter anus interna mengendur dan kolon berkontraksi, memungkinkan massa feses memasuki rektum. Rektum menjadi terisi oleh massa tinja, dan terjadi stimulus utama untuk refleks buang air besar (Taylor, 2011).

Distensi rektal menyebabkan peningkatan tekanan intrarektal, menyebabkan otot meregang dan de-

ngan demikian merangsang refleks buang air besar dan selanjutnya keinginan untuk mengeluarkan. Sfingter anal eksternal, yang berada di bawah kendali yang disadari. Pola eliminasi normal dapat bervariasi secara luas di antara individu. Meski banyak orang dewasa yang melakukan defekasi setiap hari, dan yang lainnya lebih sering atau jarang buang air besar. Sebagian orang hanya buang air besar dua atau tiga kali seminggu atau, dua atau tiga kali sehari. (Taylor, 2011).

4. Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Pola Eliminasi

Menurut DeLaune (2011), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola eliminasi adalah sebagai berikut:

a. Usia

Usia atau tingkat perkembangan klien akan mempengaruhi kontrol atas pola berkemih dan defekasi. Bayi pada awalnya tidak memiliki pola eliminasi. Kontrol atas kandung kemih dan buang air besar dapat dimulai sejak usia 18 bulan tetapi biasanya tidak dikuasai sampai usia 4 tahun. Kontrol eliminasi pada malam hari biasanya lebih lama untuk dicapai, dan anak laki-laki biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembangkan kontrol atas eliminasi daripada anak perempuan. Kontrol eliminasi umumnya konstan sepanjang tahun-tahun dewasa, dengan pengecualian tahap-tahap penyakit dan kehamilan, ketika kehilangan kontrol, urgensi, dan retensi sementara dapat terjadi. Dengan meningkatnya usia, hilangnya tonus otot dan karenanya kontrol kandung kemih dapat berpengaruh pada pola eliminasi.

b. Pola Diet

Asupan cairan dan serat yang adekuat adalah faktor penting bagi kesehatan saluran kemih dan defekasi klien. Asupan cairan yang tidak adekuat merupakan penyebab utama konstipasi, seperti konsumsi makanan yang menyebabkan sembelit seperti produk susu tertentu. Diare dan perut kembung (pelepasan gas dari rektum) adalah akibat langsung dari makanan yang dicerna, dan klien perlu dididik tentang makanan dan cairan yang mempromosikan eliminasi yang sehat dan makanan mana yang dapat menghambatnya.

c. Latihan/aktivitas

Latihan/aktivitas dapat meningkatkan tonus otot, yang mengarah ke kontrol kandung kemih dan sfingter yang lebih baik. Peristaltik juga dibantu oleh aktivitas, sehingga dapat membantu pola eliminasi yang sehat.

d. Pengobatan

Obat-obatan dapat berdampak pada kesehatan dan pola eliminasi klien dan harus dinilai selama wawancara riwayat kesehatan. Klien dengan penyakit jantung, biasanya diresepkan obat diuretik, yang meningkatkan produksi urine. Antidepresan dan antihipertensi dapat menyebabkan retensi urine. Beberapa obat yang tanpa ada resep (OTC), terutama antihistamin, juga dapat menyebabkan retensi urine. Obat-obatan OTC lainnya dirancang secara khusus untuk meningkatkan eliminasi usus atau untuk melunakkan feses; perawat perlu menanyakan tentang semua obat yang diminum untuk memberikan perawatan yang tepat bagi klien yang mengalami perubahan dalam pola eliminasi.

5. Masalah-masalah yang Dapat Terjadi pada Pola Eliminasi

a. Eliminasi Urine

Inkontinensia urine dan retensi urin adalah penyebab paling umum dari perubahan pola eliminasi urine. Inkontinensia urine adalah hilangnya kemampuan untuk mengontrol pengeluaran urine yang dapat berdampak pada masalah sosial atau higienis. Retensi urine adalah ketidakmampuan untuk sepenuhnya mengeluarkan urine dari kandung kemih selama berkemih. Ada dua jenis utama inkontinensia urine, akut dan kronis. Selain itu, inkontinensia urine kronis dapat dibagi lagi menjadi beberapa tipe berbeda. Karena masing-masing memiliki etiologi dan manajemen sendiri.

b. Eliminasi Bowel (Defekasi)

Banyak penyakit dan kondisi yang mempengaruhi fungsi usus. Meskipun banyak perubahan dalam pola eliminasi usus dapat diamati, dan terdapat tiga yang menyebabkan perubahan umum: Konstipasi, diare, dan inkontinensia tinja.

1) Konstipasi

Faktor diet dapat berkontribusi terhadap konstipasi. Dehidrasi menyebabkan pengeringan tinja ketika tubuh meningkatkan reabsorpsi air dan natrium dari usus. Makanan massal yang tidak memadai juga menyebabkan dehidrasi tinja. Penyakit divertikular, masalah umum pada manula, juga mengurangi transit kolon, yang selanjutnya meningkatkan risiko sembelit.

2) Diare

Diare adalah bentuk feses yang cair karena peningkatan frekuensi dan konsistensinya, dan dapat menyebabkan perubahan kebiasaan buang air besar seseorang. Penyebab utama diare termasuk agen infeksi, gangguan malabsorpsi, penyakit radang usus, sindrom usus pendek, efek samping obat, dan penyalahgunaan pencabar atau enema.

3) Infontinensia fekal

Mekanisme utama yang mempengaruhi orang dewasa terhadap inkontinensia fekal adalah disfungsi sfingter anal, gangguan pengiriman tinja ke rektum, gangguan penyimpanan rektum, dan cacat anatomi. Gangguan volume tinja dan konsistensi biasanya tidak cukup untuk menghasilkan inkontinensia fekal pada individu yang normal.

C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Eliminasi Urine dan Fekal

1. Pengkajian Keperawatan (Marilynn, 2000)

a. Riwayat Kesehatan

1) Pola Berkemih

a) *Dribbing*

Urine menetes sedikit demi sedikit.

b) Nokturia

Sering terbangun pada malam hari karena ingin buang air kecil.

c) Anuria

Tidak merasakan keinginan berkemih.

d) Glicosuria

Terdapat kandungan glukosa pada urine.

e) Piuria

Terdapat pus pada urine.

2) Gejala dari perubahan berkemih

a) Frekuensi

Terjadi perubahan jumlah berkemih dalam sehari.

b) Desakan berkemih (Urgensi)

Pasien selalu merasakan tiba-tiba ingin berkemih.

c) *Disuria*

Nyeri saat buang air kecil.

d) *Poliuria*

Pasien merasakan sering buang air kecil.

e) Volume Urine

No.	Usia	Jumlah/Hari
1	1-2 hari	15-600 ml
2	3-10 hari	100-300 ml
3.	10 hari - 2 bulan	250-400 ml
4.	2 bulan - 1 tahun	400-500 ml
5	1-3 tahun	500-600 ml
6	3-5 tahu	600-700 ml
7	5-8 tahun	700-1000 ml
8	8-14 tahun	800-1400 ml
9	14 tahun - dewasa	1500 ml
10	Dewasa tua	Kurang lebih 1550 ml

3) Faktor yang mempengaruhi kebiasaan buang air kecil

a) Diet

Kurangnya asupan cairan dan buah dapat menyebabkan penurunan keluaran urine.

b) *Life style* dan tingkat aktivitas.

c) Stress psikologis

Dapat meningkatkan frekuensi keinginan berkemih.

4) Kondisi Urine

No	Kondisi	Normal	Interpretasi
1	Warna	Kekuningan	Urine berwarna gelap seperti teh merupakan efek obat, sedangkan urine yang berwarna merah dan kuning pekat mengidentifikasi adanya penyakit
2	Bau	Aromatik	Bau menyengat merupakan akibat adanya infeksi/konsumsi obat tertentu
3	Berat Jenis	1,010-1,030	Menunjukkan kondisi normal (cairan dan elektrolit terpenuhi)
4	Kejernihan	Terang dan transparan	Adanya kekeruhan bisa karena adanya mucus
5	pH	pH dalam kondisi asam (4,5-7,5)	Menunjukkan keseimbangan asam basa
6	Protein	Zat protein makro seperti Albumin, hiitrogten, globulin tidak dapat disaring melalui ginjal urine	Menunjuukan kerusakan ginjal
7	Darah	Tidak terlihat jelas	Hematuri dapat muncul karena adanya trauma atau penyakit pada sistem urinaria bagian bawah
8	Glukosa	Sejumlah glukosa yang tidak menetap bersifat tidak berarti	Jika menetap mengindikasikan penyakit diabetes mellitus

N A S K A H S I A P C E T A K

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik untuk pola eliminasi berfokus pada masalah fungsional yang terkait dengan inkontinensia urin atau fekal dan menilai area perineum dan perianal. Evaluasi fungsional dimulai dengan wawancara dan berlanjut hingga pemeriksaan fisik. Status mental dapat dievaluasi dengan mendengarkan respons klien terhadap pertanyaan dan dengan mengamati interaksi dengan orang lain.

Perineum awalnya diperiksa untuk menilai integritas kulit. Di antara klien dengan inkontinensi urine yang parah, bau khas urine mungkin ada, dan kulit mungkin menunjukkan tanda-tanda ruam monilial (makulopapular, ruam merah dengan lesi satelit) atau dermatitis kontak amonia (ruam papula dengan kulit maserasi jenuh). Di antara pasien dengan inkontinensia fekal yang parah, kulit sering gundul, merah, dan menyakitkan saat disentuh, khususnya jika sudah terkena feses yang cair.

c. Pemeriksaan Diagnostik

Jenis pemeriksaan yang biasa dilakukan berupa Urinalisis dengan memeriksa :

- 1) Warna : Jernih Kekuningan.
- 2) Penampilan : Jernih.
- 3) Bau : Beraroma.
- 4) pH : 4,5 – 8,0.
- 5) Berat jenis : 1,005 – 1,030.
- 6) Glukosa : Negatif.

7) Keton : Negatif.

8) Kultur Urine : Kuman pathogen negatif.

2. Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan (SDKI, 2017), Adapun masalah keperawatan yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:

Masalah 1: Gangguan Eliminasi Urine

a. Definisi

Disfungsi eliminasi urine.

b. Penyebab

- 1) Berkurangnya kapasitas vesika urinaria.
- 2) Iritasi pada vesika urinaria.
- 3) Berkurangnya sensitifitas menyadari symptom gangguan pada vesika urinaria.
- 4) Pengaruh tindakan medis dan diagnostik.
- 5) Penurunan kekuatan otot pelvis.
- 6) Ketidakmampuan mengakses toilet.
- 7) Hambatan lingkungan.

c. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif:

- 1) Rasa ingin berkemih.
- 2) Urine menetes.
- 3) Poliuri.
- 4) Nokturia.
- 5) Enuresis.

Objektif:

- 1) Distensi kandung kemih.
- 2) Berkemih tidak tuntas.
- 3) Volume residu urine bertambah.

d. Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

(Tidak tersedia)

Objektif

(Tidak Tersedia)

e. Kondisi Klinis Terkait

- 1) Infeksi pada sistem berkemih.
- 2) Peningkatan glukosa dalam urine.
- 3) Trauma.
- 4) Kanker.
- 5) Cedera/tumor medulla spinalis.
- 6) Stroke .

Masalah 2: Inkontinesia Fekal

a. Definisi

Perubahan kebiasaan buang air besar dari pola normal yang ditandai dengan pengeluaran feses secara involunter.

b. Penyebab

- 1) Kerusakan susunan saraf pusat motoric bawah.
- 2) Penurunan tonus otot.
- 3) Gangguan kognitif.
- 4) Kehilangan fungsi pengendalian sfinter rectum.

- 5) Pasca operasi dan penutupan kolostomi.
- 6) Ketidakmampuan mencapai kamar kecil.
- 7) Diare kronis.
- 8) Stress berlebihan.
- c. Gejala dan Tanda Mayor
 - Subjektif
 - 1) Ketidakmampuan mengontrol pengeluaran feses.
 - 2) Tidak mampu menunda defekasi.
 - Objektif
 - Feses keluar sedikit-sedikit dan sering.
- d. Gejala dan Tanda Minor
 - Subjektif:
 - Tidak tersedia
 - Objektif:
 - 1) Bau feses.
 - 2) Kulit perianal kemerahan.
- e. Kondisi Klinis Terkait
 - 1) Spina bifida.
 - 2) Atresia ani.
 - 3) Penyakit Hirschsprung.

Masalah 3: Inkontinesia Urine Refleks

- a. Definisi
 - Pengeluaran urine yang tidak terkendali pada volume kandung kemih tertentu tercapai.

- b. Penyebab
 - 1) Kerusakan konduksi implus di atas arkus reflex.
 - 2) Kerusaka jaringan
- c. Gejala dan Tanda Mayor
 - Subjektif
 - 1) Tidak mengalami sensasi berkemih.
 - 2) *Dribbling*.
 - 3) Sering buang air kecil.
 - 4) Nokturia.
 - Objektif
 - Volume residu urine meningkat.
- d. Gejala dan Tanda Minor
 - Subjektif
 - (Tidak Tersedia)
 - Objektif
 - (Tidak Tersedia)
- e. Kondisi Klinis Terkait
 - 1) Cedera/tumor/infeksi medulla spinalis.
 - 2) Pembedahah pelvis.
 - 3) Demensia.
 - 4) Sklerosis multipel.

Masalah 4: Kesiapan Meningkatkan Eliminasi Urine

- a. Definisi
 - Pola fungsi sistem perkemihan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan eliminasi yang dapat ditingkatkan.

b. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

Mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan eliminasi urine.

Objektif

- 1) Jumlah urine normal.
- 2) Karakteristik urine normal.

c. Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

(Tidak Tersedia)

Objektif

Asupan cairan cukup

d. Kondisi Klinis Terkait

- 1) Cedera medulla spinalis.
- 2) Sklerosis multiple.
- 3) Kehamilan.
- 4) Trauma pelvis.
- 5) Pembedahan abdomen.
- 6) Penyakit prostat.

Masalah 5: Risiko Konstipasi

a. Definisi

Berisiko mengalami penurunan frekuensi normal defekasi disertai kesulitan dan pengeluaran feses tidak lengkap.

b. Faktor Risiko

- 1) Penurunan motilitas gastrointestinal.
- 2) Pertumbuhan gigi tidak adekuat.
- 3) Ketidak cukupan diet.
- 4) Ketidak cukupan asupan serat.
- 5) Ketidak cukupan intake cairan.
- 6) Aganglionik (misal penyakit Hirschsprung).
- 7) Kelemahan abdomen.

c. Psikologis

- 1) Konfus.
- 2) Depresi.
- 3) Gangguan emosional.

d. Situasional

- 1) Pola makan yang berubah (misalnya jenis makanan, jadwal makan).
- 2) Ketidak dekuatan toileting.
- 3) Aktivitas fisik harian kurang dari yang dianjurkan.
- 4) Penyalagunaan laksatif.
- 5) Efek agar farmakologi.
- 6) Perubahan pola defekasi.
- 7) Kebiasaan menahan dorongan defekasi.
- 8) Perubahan lingkungan.

e. Kondisi Klinis Terkait

- 1) Lesi/cederah pada medula spinalis.
- 2) Spina bifida.
- 3) Stroke.

- 4) Sklerosis multipel.
- 5) Penyakit Parkinson.
- 6) Demensia.
- 7) Hiperparatiroidisme.
- 8) Hipoparatiroidisme.

3. Intervensi Keperawatan

Masalah 1: Gangguan Eliminasi Urine

Manajemen Eliminasi Urine

a. Observasi

- 1) Identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensial urine.
- 2) Identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensial urine.
- 3) Monitor eliminasi urine (misalnya frekuensi, konsistensi, aroma, volume, dan warna).

Rasional: untuk mengetahui tanda, gejala dan faktor penyebab eliminasi urine.

b. Terapeutik

- 1) Catat waktu-waktu dan haluan berkemih.
 - 2) Batasi asupan cairan.
 - 3) Ambil sampel urine tegah (midstream) atau kultur
- Rasional: untuk mengetahui waktu berkemih.

c. Edukasi

- 1) Ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih.
 - 2) Ajarkan minum yang cukup, jika tidak ada kontra-indikasi.
- Rasional: untuk mengetahui tanda dan gejalanya.

N A S K A H S & I A P C E T A K

d. Kolaborasi

Kolaborasi pemberian obat supositoria uretra, jika perlu.

Masalah 2: Inkontinesia Fekal

Latihan Eliminasi Fekal

a. Observasi

- Monitor peristaltik usus secara teratur
- Rasional: mengetahui peristaltik usus.

b. Terapeutik

- 1) Anjurkan waktu yang konsisten untuk buang air besar.
 - 2) Berikan privasi, kenyamanan dan posisi yang meningkatkan proses defekasi.
- Rasional : untuk melatih untuk buang air besar.

c. Edukasi

- 1) Anjurkan mengkonsumsi makanan teratur tertentu, sesuai program atau hasil konsultasi.
 - 2) Anjurkan asupan cairan yang adekuat sesuai kebutuhan.
- Rasional : untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan pasien.

d. Kolaborasi

- Kolaborasi penggunaan supositoria, jika perlu.

Masalah 3: Inkontinesia Urine Refleks

Katerisasi urine

a. Observasi

- Periksa kondisi pasien (misal kesadaran, tanda-tanda vital, daerah perineal, distensi kandung kemih, inkontinensia urine, refluks berkemih).

Rasional : untuk mengetahui kondisi pasien.

b. Terapeutik

- 1) Siapkan peralatan, bahan-bahan dan ruangan tindakan.
- 2) Siapkan pasien: bebaskan pakaian bawah dan posisikan dorsal rekumben (untuk wanita) dan supine (untuk laki-laki).
- 3) Pasang sarung tangan.
- 4) Bersihkan daerah perineal atau prepossium dengan cairan NaCl atau aquades.
- 5) Lakukan insersi kateter urine dengan menerapkan prinsip aseptik.
- 6) Sambungkan kateter urine dengan urine bag.
- 7) Isi balon dengan NaCL 0,9% sesuai anjuran pabrik.
- 8) Fiksasi selang kateter di atas simpisis atau di paha.
- 9) Pastikan kantung urine ditempat lebih rendah dari kandung kemih.
- 10) Berikan label waktu pemasangan

Rasional : mempertahankan kenyamanan pasien selama pemasangan kateter.

c. Edukasi

- 1) Jelaskan tujuan dan prosedur pemasangan kateter urine.
 - 2) Anjurkan menarik napas saat insersi selang kateter.
- Rasional : untuk mengetahui tindakan yang dilakukan.

Masalah 4: Kesiapan Meningkatkan Eliminasi Urine

Manajemen Eliminasi Urine

a. Obsevasi

- 1) Identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensial urine.
- 2) Identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensial urine.
- 3) Monitor eliminasi urine (misalnya frekuensi, konsistensi, aroma, volume, dan warna).

Rasional: untuk mengetahui tanda, gejala dan faktor penyebab eliminasi urine.

b. Terapeutik

- 1) Catat waktu-waktu dan haluran berkemih.
 - 2) Batasi asupan cairan.
 - 3) Ambil sampel urine tengah (midstream) atau kultur.
- Rasional: untuk mengetahui waktu berkemih.

c. Edukasi

- 1) Ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih.
 - 2 Ajarkan minum yang cukup, jika tidak ada kontraindikasi.
- Rasional: untuk mengetahui tanda dan gelanya.

d. Kolaborasi

Kolaborasi pemberian obat supositoria uretra, jika perlu.

Masalah 5: Risiko Konstipasi

Pencegahan Konstipasi

a. Observasi

- 1) Identifikasi faktor risiko konstipasi (mis, asupan serat tidak adekuat, asupan cairan tidak adekuat, aganglionik, kelemahan otot abdomen, aktivitas visik kurang.
- 2) Monitor tanda dan gejala konstipasi (misalnya defekasi kurang 2 kali sehingga, defekasi lama/sulit, feses keras, peristaltik menurun.

b. Terapeutik

- Batasi minum yang mengandung kafein dan alkohol.

c. Edukasi

- 1) Jelaskan penyebab dan faktor risiko konstipasi.
 - 2) Anjurkan minum air putih sesuai dengan kebutuhan (1500-2000 ml/hari).
 - 3) Anjurkan mengkonsumsi makanan berserat (25-30 gram/hari).
- Rasional: untuk pemenuhan nutrisi dan cairan kebutuhan pasien.

d. Kolaborasi

- Kolaborasi dengan ahli gizi.



OKSIGENASI / RESPIRASI

A. Pendahuluan

Kebutuhan respirasi/oksigenasi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat vital dan penting untuk kelangsungan hidup manusia. Oksigen dari hasil respirasi digunakan dalam proses metabolisme sel tubuh agar dapat bertahan hidup. Pemenuhan kebutuhan oksigen akan mengalami gangguan jika terjadi gangguan pada salah satu organ tubuh yang berkaitan dengan sistem respirasi, misalnya terjadi obstruksi saluran pernapasan. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit paru dan individu baru akan menyadari betapa pentingnya oksigen bagi tubuh ketika berada dalam kondisi tersebut (Manurung, 2016).

Kegagalan sistem respirasi dapat membuat pasien berada dalam kondisi kritis. Oleh karena itu, perawat harus mempersiapkan diri dan selalu waspada dengan teknik perawatan yang selalu mengalami perkembangan. Peran perawat dalam menangani pasien gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, misalnya pada kasus tuberculosis paru dilakukan de-

ngan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, salah satunya dengan memutuskan rantai penularan. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan proses keperawatan. Upaya pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada pemberian asuhan keperawatan sebagai upaya kuratif dan rehabilitatif, tetapi lebih kepada upaya pencegahan dan promotif, dimana perawat berperan sebagai *educator* dalam hal ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengawasan pengobatan dan keputusan rantai penularan penyakit dengan gangguan sistem respirasi (Dhyantari, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Berry (2015) mengemukakan bahwa merawat pasien yang sedang menghadapi kondisi kritis adalah suatu tugas berat yang mungkin membutuhkan banyak perawat dan terapis untuk penanganan masalah respirasi, tergantung pada tingkat pengalaman dan kenyamanan mereka dengan penentuan posisi dan peralatan khusus untuk memastikan posisi yang aman. Perawatan juga dilakukan dengan memperhatikan perlindungan dari kerusakan integumen dan penekanan pada area yang menonjol. Pencegahan delirium dan promosi tidur di ICU adalah strategi yang dapat mempengaruhi perawat setiap hari di samping tempat tidur dan mungkin memiliki dampak pada tekanan kejiwaan dari penyakit kritis (Bienvenu, et al., 2017).

Dengan demikian, sangatlah penting untuk memahami mengenai konsep subkategori respirasi ini sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia (oksigenasi). Tidak hanya terkait konsep umum, tetapi juga konsep keperawatan.

B. Konsep Dasar Kebutuhan Oksigenasi / Respirasi

1. Definisi

Respirasi adalah proses terjadinya pertukaran udara antara oksigen dan karbondioksida di dalam tubuh. Proses respirasi menghasilkan oksigen yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Oksigen merupakan unsur yang dibutuhkan untuk melangsungkan metabolisme tubuh.

Ketika terjadi gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian terapi oksigen. Terapi oksigen bertujuan untuk mempertahankan tercukupinya kadar oksigen di dalam tubuh, menurunkan kerja sistem respirasi, serta menurunkan kerja jantung.

2. Fisiologi Sistem

Proses respirasi terdiri dari 2 mekanisme, yaitu :

a. Inspirasi

Proses inspirasi merupakan proses menghirup udara (oksigen) dari luar tubuh masuk ke dalam paru-paru melalui saluran respirasi. Pada saat terjadi proses inspirasi, maka volume dari rongga dada akan menjadi lebih besar, sedangkan besar tekanan rongga dada menjadi lebih kecil.

b. Ekspirasi

Proses ekspirasi sendiri merupakan suatu proses ketika kita menghembuskan udara keluar melalui hidung. Proses ini terjadi relaksasi otot pernapasan sehingga

tidak membutuhkan banyak energi. Pada saat terjadi ekspirasi, maka volume rongga dada akan turun kembali, sedangkan tekanan rongga dada akan naik bila dibandingkan pada saat inspirasi.

Proses respirasi/oksigenasi terdiri atas tiga tahapan, yakni ventilasi, difusi, dan transportasi.

a. Ventilasi

Ventilasi adalah proses pertukaran gas dari dan ke paru-paru. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini :

- 1) Konsentrasi oksigen di udara.
- 2) Kepatenan saluran respirasi.
- 3) kemampuan dada dan alveoli untuk mengembang yang juga disebut dengan compliance paru. Dengan compliance, serta recoil atau kemampuan paru-paru untuk mengeluarkan karbondioksida.

b. Difusi

Difusi merupakan proses pertukaran antara oksigen dan karbondioksida yang terjadi pada alveoli dengan kapiler paru-paru. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- 1) Luas permukaan paru-paru.
- 2) Permeabilitas membran respirasi.
- 3) Perbedaan konsentrasi dan tekanan oksigen.
- 4) Kemampuan oksigen untuk mengikat haemoglobin.

c. Transportasi

Transportasi adalah proses distribusi oksigen dari kapiler darah ke seluruh sel dan jaringan tubuh, serta kar-

bondioksida dari jaringan tubuh ke kapiler paru-paru. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini, antara lain :

- 1) *Cardiac output*, frekuensi nadi.
- 2) Pembuluh darah, hematokrit, eritrosit, dan kadar haemoglobin.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Respirasi/Oksigenasi

a. Faktor Fisiologis

Adapun kondisi fisiologis yang mempengaruhi respirasi, meliputi :

- 1) Menurunnya kapasitas transportasi oksigen.
- 2) Menurunnya konsentrasi oksigen saat inspirasi.

b. Faktor Perkembangan

Perubahan respirasi terjadi saat lahir, dimana paru-paru, pada orang dewasa dada berbentuk bulat, sedangkan pada lanjut usia terjadi perubahan pola napas dan bentuk dada. Bayi mempunyai ukuran dada yang kecil serta saluran napas yang pendek. Dada pada masa bayi dan kanak-kanak berbentuk bulat, pada orang dewasa diasumsikan berbentuk oval, sedangkan pada lansia kembali akan terjadi perubahan pola napas dan bentuk dada.

c. Faktor Lingkungan

Lokasi ketinggian termasuk salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi oksigenasi. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah tekanan oksigen sehingga oksigen yang dapat dihirup oleh individu juga semakin sedikit. Hal inilah yang menyebabkan individu yang berada pada area ketinggian mengalami pening-

katan frekuensi respirasi dan jantung, serta peningkatan kedalaman pernapasan.

Selain itu, suhu panas dan dingin juga berpengaruh terhadap proses respirasi. Pada suhu panas, pembuluh darah perifer akan mengalami dilatasi sehingga darah akan mengalir ke integumen. Peningkatan kehilangan panas dari permukaan tubuh berakibat pada peningkatan *cardiac output* sehingga akan seiring dengan meningkatnya pula kebutuhan oksigen tubuh. Sebaliknya, pada lingkungan dengan suhu yang dingin, pembuluh darah perifer akan mengalami kontriksi, hal ini menyebabkan tekanan darah akan meningkat, menurunkan kerja jantung, sehingga kebutuhan oksigen tubuh menurun.

d. Gaya Hidup

Peningkatan frekuensi dan kedalaman respirasi serta denyut jantung dipengaruhi oleh aktivitas dan latihan fisik. Demikian pula dengan peningkatan suplai oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Kebiasaan merokok dan bekerja di lingkungan yang berdebu juga menjadi faktor pendukung terjadinya gangguan respirasi.

e. Status Kesehatan

Adanya gangguan pada sistem respirasi dan kardiovaskular dapat mengakibatkan terganggunya transportasi oksigen ke sel tubuh. Sebagai salah satu contoh, masalah kardiovaskular pada kondisi anemia, dimana rendahnya kadar haemoglobin akan mempengaruhi transportasi oksigen dan karbondioksida dari dan ke sel-sel di dalam tubuh.

f. Penggunaan Obat-obatan Golongan Narkotika

Konsumsi zat-zat golongan narkotika seperti morfin dapat menyebabkan terjadinya depresi pusat pernapasan di medula. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan frekuensi dan kedalaman respirasi. Oleh karena itu, penggunaan obat-obatan tersebut harus disertai dengan pemantauan frekuensi dan kedalaman respirasi.

4. Macam-Macam Gangguan yang Mungkin Terjadi Pada Sistem Pernapasan

a. Perubahan Pola Napas

Pola napas normal memiliki jarak yang sama dan perbedaan kedalaman yang tidak begitu nampak. Pada kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan untuk bernapas, ini disebut sesak (*dyspnea*), terkadang ditemukan pernapasan cuping hidung karena terjadinya peningkatan usaha inspirasi dan denyut jantung.

b. Obstruksi Jalan Napas

Adanya obstruksi jalan napas dapat terjadi secara total atau parsial di sepanjang saluran respirasi. Obstruksi saluran respirasi bagian atas dapat disebabkan oleh adanya benda asing, lidah jatuh ke belakang pada individu dengan penurunan kesadaran, atau bila terjadi penumpukan secret. Obstruksi saluran respirasi bagian bawah dapat disebabkan karena adanya oklusi baik secara total maupun parsial dari saluran respirasi ke bronkus dan paru-paru.

C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Oksigenasi / Respirasi

1. Pengkajian Keperawatan

Riwayat Keperawatan

a. Identitas

Identitas meliputi biodata pasien, seperti nama, umur, jenis kelamin, alamat, agama, pendidikan, pekerjaan, nomor rekam medik, dan diagnose medis.

b. Riwayat Kesehatan

1) Keluhan utama

Keluhan yang sering ditemukan antara lain batuk, dyspnea, haemoptisis, peningkatan produksi sputum, dan nyeri dada.

2) Riwayat kesehatan saat ini

- Waktu terjadinya keluhan.
- Proses terjadinya.
- Kapan keluhan mulai dirasakan.
- Bagaimana keluhan mulai terjadi.
- Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keluhan yang dialami.

3) Riwayat kesehatan masa lalu

Riwayat merokok, dapat menjadi salah satu penyebab carcinoma paru, emfisema, dan bronchitis kronik. Anamnesa yang dilakukan meliputi:

- Usia pasien pertama kali merokok.
- Rerata jumlah rokok yang dihisap dalam sehari.
- Usia pasien berhenti merokok.

N A S K A H S I A P C E T A K

4) Riwayat pengobatan

5) Alergi

6) Tempat tinggal

7) Riwayat kesehatan keluarga

- Adanya penyakit infeksi tertentu yang dapat ditularkan, seperti tuberculosis.
- Adanya riwayat alergi, seperti asma bronchial, hal ini menunjukkan adanya faktor predisposisi dalam keluarga.
- Pasien dengan riwayat bronchitis kronik yang bertempat tinggal di daerah dengan polusi udara tinggi yang dapat memperberat timbulnya penyakit.
- Genogram.

8) Riwayat kesehatan lingkungan

c. Pemeriksaan Fisik

1) Mata

Konjungtiva pucat (anemia), konjungtiva sianosis (hipoksemia), atau terdapat pethecia pada konjungtiva (emboli lemak atau endocarditis).

2) Hidung

- Pernapasan cuping hidung.
- Deviasi septum.
- Perforasi.

3) Mulut dan Bibir

- Membran mukosa sianosis.
- Bernapas dengan mengerutkan mulut.

4) Leher

Adanya distensi/bendungan pada vena jugularis.

5) Dada

a) Inspeksi

- i. Pasien harus duduk utamanya saat pemeriksaan bagian posterior dada.
- ii. Observasi lateral dekstra, sinistra, anterior, dan posterior.
- iii. Amati adanya skar, lesi, massa, serta kelainan tulang belakang (kifosis, lordosis, dan scoliosis) pada bagian posterior dada.
- iv. Catat frekuensi, irama, kedalaman pernapasan, dan kesimetrisan gerakan dada.
- v. Observasi penggunaan otot bantu pernapasan.
- vi. Observasi durasi ekspirasi dan inspirasi.
- vii. Observasi kelainan bentuk dada.
 - *Pigeon chest* : terdapat peningkatan diameter anterior-posterior.
 - *Funnel chest* : terjadi depresi bagian bawah sternum.
 - *Barrel chest* : diameter anterior-posterior sama dengan diameter transversal.
- viii. Observasi adanya retraksi abnormal selama fase inspirasi pada ruang intercostae, hal ini mengindikasikan terdapat obstruksi saluran respirasi.

b) Palpasi

Palpasi kesimetrisan pergerakan dada, adanya nyeri tekan, dan palpasi tactil vrementus (vibrasi).

c) Perkusi

Kaji resonansi paru-paru dan organ di sekitarnya, serta ekskursi (pengembangan) diafragma.

Ada dua bunyi perkusi pada area dada (thoraks) :

i. Bunyi perkusi normal:

- Resonan (sonor) : umumnya bernada rendah, normal terdengar pada perkusi jaringan paru.
- *Dullness* : terdengar pada area jantung atau paru.
- *Tympani* : terdengar pada area abdomen yang berisi udara.

ii. Bunyi perkusi abnormal

- Hiper resonan : terdengar pada area paru yang berisi udara, lebih rendah dari bunyi resonan.
- *Flatness* : Seperti bunyi perkusi pada area femur, lebih tinggi dari *dullness*.

d) Auskultasi

i. Suara napas normal

- Bronchial, terdengar seperti suara dalam pipa, nyaring, keras, dan hembusannya lembut.
- Vesikuler, terdengar halus dan lembut seperti hembusan angina sepoi-sepoi.
- Bronkovesikuler, perpaduan antara suara napas bronchial dan vesikuler.

ii. Suara napas tambahan

- Wheezing: terdengar nyaring, terus-menerus, dan berirama, disebabkan adanya penyempitan jalan napas.

- Ronchi: disebabkan adanya sekresi kental dan produksi sputum meningkat.
- *Pleural friction rub*: seperti gesekan pleura, disebabkan adanya inflamasi pada pleura, terdengar kasar, berciut, dan nyeri ketika bernapas.
- *Fine crackles*: seperti suara rambut yang bergesekan, suara meletup akibat udara melewati alveoli.
- *Coarse crackles*: disebabkan adanya cairan pada saluran respirasi besar, terdengar lemah, kasar, dan berubah jika pasien batuk.

6) Kulit

- a) Sianosis perifer, akibat terjadinya penurunan darah kapiler karena vasokonstriksi.
- b) Sianosis umum, pada kondisi hipoksemia.
- c) Penurunan turgor kulit, kondisi dehidrasi.
- d) Edema preorbital.

7) Jari dan kuku

- a) Sianosis.
- b) *Clubbing finger*.

Pemeriksaan Diagnostik

- a. Menentukan keadekuatan konduksi jantung
 - 1) Pemeriksaan EKG.
 - 2) *Exercise stress test*.
- b. Menentukan kontraksi miokardium aliran darah
 - 1) Echocardiography.

- 2) Angiografi.
- 3) Kateterisasi jantung.

c. Untuk mengetahui ventilasi dan oksigenasi

- 1) Tes fungsi paru dengan spirometry.
- 2) Oksimetri.
- 3) Pemeriksaan darah lengkap.

d. Mengetahui struktur sistem respirasi

- 1) Bronkioskopi.
- 2) CT scan paru.
- 3) X-ray thoraks.

e. Menentukan adanya infeksi sistem respirasi/sel abnormal

- 1) Kultur swab tenggorokan.
- 2) Specimen sputum.
- 3) Sitologi.

2. Diagnosis Keperawatan

Masalah 1: Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

a. Defenisi

Ketidakmampuan membersihkan obstruksi atau secret pada jalan napas untuk mempertahankan kepatenan jalan napas.

b. Batasan karakteristik

- 1) Gejala dan tanda mayor
 - a) Subjektif
Tidak tersedia.

- b) Objektif
 - i. Batuk tidak efektif.
 - ii. Tidak mampu batuk.
 - iii. Wheezing dan atau ronchi kering, mengi.
 - iv. Adanya meconium pada jalan napas (neonatus).

2) Gejala dan tanda minor

- a) Subjektif
 - i. Dispneu.
 - ii. Kesulitan berbicara.
 - iii. Ortopneu.
- b) Objektif
 - i. Sianosis.
 - ii. Gelisah.
 - iii. Penurunan frekuensi napas.
 - iv. Penurunan bunyi napas.
 - v. Perubahan pola napas.

c. Faktor yang berhubungan

1) Fisiologi

- a) Hipersekresi jalan napas.
- b) Spasme jalan napas.
- c) Disfungsi neuromuskuler.
- d) Adanya benda asing dalam jalan napas.
- e) Adanya jalan napas buatan.
- f) Hyperplasia dinding jalan napas.
- g) Sekresi yang tertahan.

- h) Respon alergi.
- i) Proses infeksi.
- j) Efek pengobatan.

2) Situasional

- a) Perokok aktif.
- b) Perokok pasif.
- c) Terpajan polutan.

Masalah 2: Gangguan Pertukaran Gas

a. Definisi

Kekurangan atau kelebihan oksigen dan/atau eliminasi karbondioksida pada membrane alveolus-kapiler.

b. Batasan karakteristik

1) Gejala dan tanda mayor

- a) Subjektif
 - Dispneu
- b) Objektif
 - i. Peningkatan/penurunan PCO₂.
 - ii. Penurunan PO₂.
 - iii. Peningkatan/penurunan pH arteri.
 - iv. Adanya bunyi napas tambahan.
 - v. Takikardi.

2) Gejala dan tanda minor

- a) Subjektif
 - i. Penglihatan kabur.
 - ii. Pusing.

- b) Objektif
 - i. Gelisah.
 - ii. Sianosis.
 - iii. Diaforesis.
 - iv. Pernapasan cuping hidung.
 - v. Pola napas abnormal (dalam/dangkal, cepat/lambat, regular/irregular).
 - vi. Kesadaran menurun.

c. Faktor yang berhubungan

- 1) Ketidakseimbangan ventilasi-perfusi.
- 2) Perubahan membrane alveolus-kapiler.

Masalah 3 : Pola Napas Tidak Efektif

a. Definisi

Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat.

b. Batasan karakteristik

- 1) Gejala dan tanda mayor
 - a) Subjektif
 - Dispneu.
 - b) Objektif
 - i. Fase Ekspirasi memanjang.
 - ii. Penggunaan otot bantu pernapasan.
 - iii. Pola napas abnormal (misalnya takipneu, bradipneu, hiperventilasi, *kussmaul*, *cheyne-stokes*).

2) Gejala dan tanda minor

- a) Subjektif
 - Ortopneu.
- b) Objektif
 - i. Pernapasan cuping hidung.
 - ii. Pernapasan *purse-lip*.
 - iii. Diameter thoraks anterior-posterior meningkat.
 - iv. Kapasitas vital menurun.
 - v. Ventilasi semenit menurun.
 - vi. Tekanan inspirasi menurun.
 - vii. Tekanan ekspirasi menurun.
 - viii. Perubahan ekskursi dada.

c. Faktor yang berhubungan

- 1) Hambatan upaya napas (misalnya nyeri).
- 2) Depresi pusat pernapasan.
- 3) Deformitas tulang dada.
- 4) Deformitas dinding dada.
- 5) Gangguan neuromuscular.
- 6) Gangguan neurologis (misalnya elektroensefalogram [EEG] positif, cedera kepala, gangguan kejang).
- 7) Imaturitas neurologis.
- 8) Obesitas.
- 9) Penurunan energi.
- 10) Sindrom hipoventilasi.

- 11) Posisi tubuh menghambat ekspansi paru.
- 12) Kerusakan invasi diafragma (kerusakan saraf C5 ke atas).
- 13) Efek pengobatan.
- 14) Cedera pada medulla spinalis.
- 15) Kecemasan.

3. Intervensi Keperawatan

Masalah 1: Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

Luaran utama : Bersihan Jalan Napas

a. Tujuan dan kriteria hasil :

Meningkatnya kemampuan membersihkan secret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten dibuktikan dengan kriteria hasil:

- 1) Meningkatnya kemampuan batuk efektif.
- 2) Menurunnya produksi sputum, mengi, wheezing, mekonium (pada neonatus), dispneu, ortopneu, sulit bicara, sianosis, dan gelisah.
- 3) Membaiknya frekuensi napas dan pola napas.

b. Intervensi keperawatan dan rasional:

1) Latihan batuk efektif

a) Observasi

- i. Identifikasi kemampuan batuk
Rasional: Mengetahui kemampuan batuk efektif pasien.
- ii. Monitor adanya retensi sputum
Rasional: Mengetahui kemampuan pasien mengeluarkan sputum.

iii. Monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas.

Rasional: Mengetahui adanya tanda dan gejala infeksi saluran napas pada pasien.

iv. Monitor *input* dan *output* cairan (misalnya jumlah dan karakteristik).

Rasional: Mengetahui keseimbangan cairan pasien.

b) Terapeutik

i. Atur posisi semi-fowler atau fowler

Rasional: Mempertahankan kenyamanan, meningkatkan ekspansi paru, dan memaksimalkan oksigenasi pasien.

ii. Pasang pernak dan bengkok di pangkuan pasien.

Rasional: Mempermudah klien mengeluarkan sputum.

iii. Buang secret pada tempat sputum

Rasional: Menjaga kebersihan dan memudahkan untuk mengidentifikasi sputum pasien.

c) Edukasi

i. Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif

Rasional: Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan.

ii. Anjurkan Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 detik.

Rasional: Melatih kontraksi dan relaksasi otot abdomen, melancarkan proses ekspirasi pasien sehingga sputum mudah dikeluarkan.

- iii. Anjurkan mengulangi tarik napas dalam hingga 3 kali.

Rasional: Relaksasi otot abdomen.

- iv. Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah Tarik napas dalam yang ke-3.

Rasional: Agar pasien dapat batuk dengan efektif.

d) Kolaborasi

Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran, jika perlu.

Rasional: Memudahkan pengenceran dan pembuangan sekret.

2) Manajemen jalan napas

a) Observasi

- i. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas).

Rasional: Mengetahui pola napas pasien (frekuensi, kedalaman, usaha napas).

- ii. Monitor adanya suara napas tambahan (misalnya *gurgling*, mengi, *wheezing*, ronkhi kering).

Rasional: Mengetahui adanya bunyi napas tambahan pada pasien (misalnya *gurgling*, mengi, *wheezing*, ronkhi kering).

- iii. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma).

Rasional: Mengetahui karakteristik sputum pasien (jumlah, warna, aroma).

b) Terapeutik

- i. Pertahankan kepatenan jalan napas dengan *head-tilt* dan *chin-lift* (*jaw-thrust* jika curiga trauma servikal).

Rasional: Mempertahankan terbukanya jalan napas pasien.

- ii. Posisikan fowler atau semi fowler

Rasional: Mempertahankan kenyamanan, meningkatkan ekspansi paru, dan memaksimalkan oksigenasi pasien.

- iii. Berikan minum hangat

Rasional: Membantu memobilisasi dan mengeluarkan sekret.

- iv. Lakukan fisioterapi dada, jika perlu

Rasional: Meningkatkan drainase dan memudahkan eliminasi sekret yang susah dikeluarkan secara mandiri.

- v. Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik.

Rasional: Untuk menghindari hipoksemi dan tidak terjadi cedera pada jalan napas (nasopharing, oropharing, dan orotracheal) dan mempertahankan kepatenan jalan napas.

- vi. Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal.

Rasional: Untuk menghindari hipoksemia yang diakibatkan tindakan *suction*.

- vii. Keluarkan sumbatan benda padat dengan forsep McGill.

Rasional: Mempertahankan kepatenan jalan napas dan mencegah terjadinya infeksi.

- viii. Berikan Oksigen, jika perlu

Rasional: Meningkatkan pengiriman oksigen ke paru untuk kebutuhan sirkulasi.

c) Edukasi

- i. Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, jika tidak kontraindikasi

Rasional: Agar keseimbangan cairan pasien tetap terjaga sehingga oksigenasi juga membaik.

- ii. Ajarkan teknik batuk efektif.

Rasional: Agar pasien mengetahui teknik batuk efektif.

d) Kolaborasi

Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran atau mukolitik, jika perlu.

Rasional: Memberikan support bantuan pernapasan tambahan dan memudahkan pengenceran serta pembuangan sekret.

3) Pemantauan Respirasi

a) Observasi

- i. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas.

Rasional: Mengetahui frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas pasien.

- ii. Monitor pola napas (seperti bradipneu, takipneu, hiperventilasi, *kussmaul*, *cheyne-stokes*, biot, ataksik).

Rasional: Mengetahui pola napas pasien (seperti bradipneu, takipneu, hiperventilasi, *kussmaul*, *cheyne-stokes*, biot, ataksik).

- iii. Monitor kemampuan batuk efektif

Rasional: Mengetahui kemampuan batuk efektif pasien.

- iv. Monitor adanya produksi sputum

Rasional: Mengetahui adanya produksi sputum pada jalan napas pasien.

- v. Monitor adanya sumbatan jalan napas

Rasional: Mengetahui adanya sumbatan jalan napas pada sistem pernapasan pasien.

- vi. Palpasi kesimetrisan ekspansi paru

Rasional: Mengetahui kesimetrisan ekspansi paru pasien.

- vii. Auskultasi bunyi napas

Rasional: Mengetahui dan mendengar bunyi napas pasien.

- viii. Monitor saturasi oksigen
 - Rasional: Mengetahui adanya perubahan saturasi oksigen pasien.
- ix. Monitor nilai AGD
 - Rasional: Mengetahui adanya perubahan nilai AGD pada pasien.
- x. Monitor hasil x-ray toraks
 - Rasional: Mengetahui adanya perubahan dan atau kelainan pada hasil x-ray toraks pasien.
- b) Terapeutik
 - i. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien.
 - Rasional: Mengetahui perkembangan kondisi pasien.
 - ii. Dokumentasikan hasil pemantauan
 - Rasional: Mengetahui fokus keperawatan dan mengevaluasi hasil keperawatan serta sebagai tanggung gugat perawat.
- c) Edukasi
 - i. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan
 - Rasional: Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan.
 - ii. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu
 - Rasional: Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga mengenai kondisi terkait masalah kesehatannya.
- d) Kolaborasi
 - Tidak ada.

Masalah 2: Gangguan Pertukaran Gas

Luaran utama : Pertukaran Gas

- a. Tujuan dan kriteria hasil :
 - Oksigenasi dan/atau eliminasi karbondioksida pada membrane alveolus-kapiler dalam batas normal dibuktikan dengan kriteria hasil:
 - 1) Meningkatnya tingkat kesadaran.
 - 2) Menurunnya gejala dispneu, suara napas tambahan, pusing, penglihatan kabur, diaphoresis, gelisah, dan pernapasan cuping hidung.
 - 3) Membaiknya PCO₂, PO₂, Takikardi, pH arteri, sianosis, pola napas, dan warna kulit.
- b. Intervensi Keperawatan :
 - 1) Pemantauan respirasi
 - a) Observasi
 - i. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas.
 - Rasional: Mengetahui frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas pasien.
 - ii. Monitor pola napas (seperti bradipneu, takipneu, hiperventilasi, *kussmaul*, *cheyne-stokes*, biot, ataksik).
 - Rasional: Mengetahui pola napas pasien (seperti bradipneu, takipneu, hiperventilasi, *kussmaul*, *cheyne-stokes*, biot, ataksik).
 - iii. Monitor kemampuan batuk efektif
 - Rasional: Mengetahui kemampuan batuk efektif pasien.

- iv. Monitor adanya produksi sputum
Rasional: Mengetahui adanya produksi sputum pada jalan napas pasien.
- v. Monitor adanya sumbatan jalan napas
Rasional: Mengetahui adanya sumbatan jalan napas pada sistem pernapasan pasien.
- vi. Palpasi kesimetrisan ekspansi paru
Rasional: Mengetahui kesimetrisan ekspansi paru pasien.
- vii. Auskultasi bunyi napas
Rasional: Mengetahui kesimetrisan ekspansi paru pasien.
- viii. Monitor saturasi oksigen
Rasional: Mengetahui adanya perubahan saturasi oksigen pasien.
- ix. Monitor nilai AGD
Rasional: Mengetahui adanya perubahan nilai AGD pada pasien.
- x. Monitor hasil x-ray toraks
Rasional: Mengetahui adanya perubahan dan atau kelainan pada hasil x-ray toraks pasien.

b) Terapeutik

- i. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien.
Rasional: Mengetahui perkembangan kondisi pasien.

- ii. Dokumentasikan hasil pemantauan
Rasional: Mengetahui fokus keperawatan dan mengevaluasi hasil keperawatan serta sebagai tanggung gugat perawat.

c) Edukasi

- i. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan
Rasional: Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan.
- ii. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu
Rasional: Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga mengenai kondisi terkait masalah kesehatannya.

d) Kolaborasi

Tidak ada

2) Terapi oksigenasi

a) Observasi

- i. Monitor kecepatan dan aliran oksigen
Rasional: Mengetahui kecepatan dan aliran oksigen pada alat terapi oksigen yang digunakan pasien.
- ii. Monitor posisi alat terapi oksigen
Rasional: Memastikan posisi alat terapi oksigen terpasang dengan benar.
- iii. Monitor aliran oksigen secara periodic dan pastikan fraksi yang diberikan cukup.

Rasional: Mengetahui aliran oksigen secara periodic dan memastikan fraksi yang diberikan cukup.

- iv. Monitor efektifitas terapi oksigen (misalnya oksimetri, Analisa gas darah), jika perlu.

Rasional: Mengetahui efektifitas terapi oksigen yang diberikan kepada pasien (misalnya oksimetri, analisa gas darah).

- v. Monitor kemampuan melepaskan oksigen saat makan.

Rasional: Mengetahui kemampuan pasien dan keluarga melepaskan oksigen saat makan.

- vi. Monitor tanda-tanda hipoventilasi

Rasional: Mengetahui adanya tanda-tanda hipoventilasi pada pasien.

- vii. Monitor tanda dan gejala toksikasi oksigen dan atelectasis.

Rasional: Mengetahui adanya tanda dan gejala toksikasi oksigen dan atelectasis pada pasien.

- viii. Monitor tingkat kecemasan akibat terapi oksigen

Rasional: Mengetahui tingkat kecemasan pasien akibat pemberian terapi oksigen.

- ix. Monitor integritas mukosa hidung akibat pemasangan oksigen.

Rasional: Mengetahui keadaan integritas mukosa hidung akibat pemasangan oksigen.

b) Terapeutik

- i. Bersihkan secret pada mulut, hidung, trakea, jika perlu.

Rasional: Agar tidak terjadi penumpukan secret pada jalan napas yang akan menimbulkan obstruksi.

- ii. Pertahankan kepatenan jalan napas

Rasional: Agar kebutuhan oksigen di jaringan terpenuhi secara adekuat.

- iii. Siapkan dan atur peralatan pemberian oksigen

Rasional: Memberikan terapi oksigen sesuai standar operasional prosedur.

- iv. Berikan oksigen tambahan, jika perlu

Rasional: Mempertahankan dan menjaga kebutuhan oksigenasi pasien agar tetap terpenuhi.

- v. Tetap berikan oksigen saat pasien ditransportasi

Rasional: Mempertahankan dan menjaga kebutuhan oksigenasi pasien agar tetap terpenuhi.

- f) Gunakan perangkat oksigen yang sesuai tingkat mobilitas pasien.

Rasional: Mempertahankan dan menjaga kebutuhan oksigenasi pasien agar tetap terpenuhi.

c) Edukasi

Ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah.

Rasional: Agar pasien dan keluarga dapat menggunakan oksigen secara mandiri ketika kembali ke rumah.

d) Kolaborasi

- i. Kolaborasi penentuan dosis oksigen.

Rasional: Memberikan terapi oksigen yang tepat dan meminimalisir efek samping.

- ii. Kolaborasi penggunaan oksigen saat aktivitas dan/atau tidur.

Rasional: Mempertahankan kebutuhan oksigen yang adekuat.

Masalah 3: Pola Napas Tidak Efektif

Luaran Utama : Pola Napas

a. Tujuan dan kriteria hasil :

Inspirasi dan/atau ekspirasi yang memberikan ventilasi adekuat, dengan kriteria hasil:

- 1) Meningkatnya ventilasi semenit, kapasitas vital, diameter thoraks anterior-posterior, tekanan ekspirasi, tekanan inspirasi.
- 2) Menurunnya tanda dan gejala dispnea, penggunaan otot bantu napas, pemanjangan fase ekspirasi, ortopnea, pernapasan *pursed-tip*, pernapasan cuping hidung.
- 3) Membaiknya frekuensi napas, kedalaman napas, ekskursi dada.

b. Intervensi keperawatan :

- 1) Manajemen jalan napas

a) Observasi

- i. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas).

Rasional: Mengetahui pola napas pasien (frekuensi, kedalaman, usaha napas).

- ii. Monitor bunyi napas tambahan (misalnya *gurgling*, mengi, *wheezing*, ronkhi kering).

Rasional: Mengetahui adanya bunyi napas tambahan pada pasien (misalnya *gurgling*, mengi, *wheezing*, ronkhi kering).

- iii. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma)

Rasional: Mengetahui karakteristik sputum pasien (jumlah, warna, aroma).

c) Terapeutik

- i. Pertahankan kepatenan jalan napas dengan *head-tilt* dan *chin-lift* (*jaw-thrust* jika curiga trauma servikal).

Rasional: Mempertahankan terbukanya jalan napas pasien.

- ii. Posisikan semi-fowler atau fowler

Rasional: Mempertahankan kenyamanan, meningkatkan ekspansi paru, dan memaksimalkan oksigenasi pasien.

- iii. Berikan minum hangat

Rasional: Membantu memobilisasi dan mengeluarkan sekret.

- iv. Lakukan fisioterapi dada, jika perlu

Rasional: Meningkatkan drainase dan memudahkan eliminasi sekret yang susah dikeluarkan secara mandiri.

N
A
S
K
A
H

S
I
A
P

C
E
T
A
K

- v. Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik
Rasional: Untuk menghindari hipoksemi dan tidak terjadi cedera pada jalan napas (nasopharing, oropharing, dan orotracheal) dan mempertahankan kepatenan jalan napas.
- vi. Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal.
Rasional: Untuk menghindari hipoksemia yang diakibatkan tindakan *suction*.
- vii. Keluarkan sumbatan benda padat dengan forsep McGill.
Rasional: Mempertahankan kepatenan jalan napas dan mencegah terjadinya infeksi.
- viii. Berikan Oksigen, jika perlu.
Rasional: Meningkatkan pengiriman oksigen ke paru untuk kebutuhan sirkulasi.
- c) Edukasi
 - i. Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, jika tidak kontraindikasi.
Rasional: Agar keseimbangan cairan pasien tetap terjaga sehingga oksigenasi juga membaik.
 - ii. Ajarkan teknik batuk efektif.
Rasional: Agar pasien mengetahui teknik batuk efektif.
- d) Kolaborasi
Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran atau mukolitik, jika perlu.

Rasional: Memberikan support bantuan pernapasan tambahan dan memudahkan pengenceran serta pembuangan sekret.

2) Pemantaun respirasi

a) Observasi

- i. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas.
Rasional: Mengetahui frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas pasien.
- ii. Monitor pola napas (seperti bradipneu, takipneu, hiperventilasi, *kussmaul*, *cheyne-stokes*, biot, ataksik).
Rasional: Mengetahui pola napas pasien (seperti bradipneu, takipneu, hiperventilasi, *kussmaul*, *cheyne-stokes*, biot, ataksik).
- iii. Monitor kemampuan batuk efektif
Rasional: Mengetahui kemampuan batuk efektif pasien.
- iv. Monitor adanya produksi sputum
Rasional: Mengetahui adanya produksi sputum pada jalan napas pasien.
- v. Monitor adanya sumbatan jalan napas
Rasional: Mengetahui adanya sumbatan jalan napas pada sistem pernapasan pasien.
- vi. Palpasi kesimetrisan ekspansi paru
Rasional: Mengetahui kesimetrisan ekspansi paru pasien.



KESEIMBANGAN CAIRAN, ELEKTROLIT DAN ASAM BASA

A. Pendahuluan

Keseimbangan nutrisi dan cairan tubuh ditentukan oleh intake dan output seseorang. Pasien yang memiliki masalah keperawatan terkait dengan nutrisi dan cairan tubuh, memerlukan perhatian dalam masa perawatannya. Ketidakseimbangan nutrisi maupun cairan tubuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi tubuh atau status kesehatan pasien. Pasien yang dirawat di tempat pelayanan kesehatan, khususnya dengan gangguan sistem gastrointestinal cenderung mengalami gangguan pemenuhan nutrisi maupun cairan dan elektrolit tubuh. Oleh karenanya, perawat memiliki peran yang sangat penting dalam penatalaksanaan masalah nutrisi dan cairan pasien. Perawat diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan yang mampu memberikan jaminan intake energi dan cairan yang cukup dan aman bagi pasien. Dalam teori konservasi Levine, ada empat fokus konsentrasi dalam merawat pasien dengan kekurangan nutrisi, yaitu konservasi energi, konservasi integritas struktural, integritas personal, dan integritas sosial (Herlina, Rustina, dan Syahreni, 2014).

- vii. Auskultasi bunyi napas
Rasional: Mengetahui kesimetrisan ekspansi paru pasien.
- viii. Monitor saturasi oksigen
Rasional: Mengetahui adanya perubahan saturasi oksigen pasien.
- ix. Monitor nilai AGD
Rasional: Mengetahui adanya perubahan nilai AGD pada pasien.
- x. Monitor hasil x-ray toraks
Rasional: Mengetahui adanya perubahan dan atau kelainan pada hasil x-ray toraks pasien.
- b) Terapeutik
 - i. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien.
Rasional: Mengetahui perkembangan kondisi pasien.
 - ii. Dokumentasikan hasil pemantauan
Rasional: Mengetahui fokus keperawatan dan mengevaluasi hasil keperawatan serta sebagai tanggung gugat perawat.
- c) Edukasi
 - i. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan
Rasional: Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan.
 - ii. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu
Rasional: Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga mengenai kondisi terkait masalah kesehatannya.

Untuk dapat memberikan asuhan keperawatan yang maksimal dan profesional, perawat harus mampu melakukan pengkajian secara komprehensif sehingga data-data yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam menentukan masalah keperawatan dan rencana tindakan yang akan dilakukan. Tidak hanya berfokus pada kuratif, tetapi juga melalui pemberian pendidikan kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif. Pendidikan nutrisi dapat diberikan dalam bentuk penyuluhan, baik pada individu maupun masyarakat. Dalam Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia telah dirumuskan diagnosis keperawatan dengan subkategori nutrisi dan cairan. Hal ini diharapkan dapat memudahkan bagi perawat dalam menentukan prioritas masalah keperawatan dan rencana intervensi yang akan dilakukan dengan merujuk pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia.

B. Konsep Dasar Kebutuhan Cairan, Elektrolit dan Asam Basa

1. Defenisi

Secara fisiologis, fungsi homeostatis tubuh berperan dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Cairan tubuh terdiri dari air sebagai pelarut dan zat tertentu sebagai zat terlarut. Elektrolit merupakan zat kimia yang menghasilkan ion apabila berada di dalam larutan. Sama halnya dengan nutrisi, cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh manusia melalui minuman, makanan, maupun cairan intravena. Keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung, apabila salah satu mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi yang lain (Tarwoto & Wartonah, 2010).

Cairan tubuh terdiri dari cairan intra seluler dan cairan ekstra seluler. Cairan intra seluler merupakan cairan yang berada dalam sel, sedangkan cairan ekstra seluler adalah cairan yang berada di luar sel. Sekitar 60% berat tubuh total terdiri atas air. Dari jumlah ini dua pertiga atau 66% adalah cairan intra sel. Cairan berperan penting dalam pembentukan energi, pemeliharaan tekanan osmotik, dan transport zat-zat tubuh dan menembus membrane sel, dan satu pertiganya atau 33% adalah cairan ekstrasel. Sedangkan organ utama pengatur keseimbangan cairan tubuh adalah ginjal (Corwin, 2009).

Menurut Hirarki Maslow kebutuhan cairan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pertama yang harus dipenuhi. Sedangkan menurut Virginia Henderson kebutuhan cairan merupakan kebutuhan yang ke dua setelah bernapas. Masalah ini harus segera diatasi karena kelebihan volume cairan apabila tidak segera ditangani akan menyebabkan beban sirkulasi berlebihan, edema, hipertensi dan gagal jantung kongestif (Herdman, 2015).

Standar kebutuhan cairan dan elektrolit yang dibutuhkan tubuh adalah sebagai berikut (Suwarsa, 2018):

a. Bayi dan Anak

Berat badan:	Kebutuhan air perhari:
Sampai 10 kg	100 ml/kgBB
11-20 kg	1000 ml + 50 ml/KgBB
>20 kg	1500 ml + 20 ml/kgB
Kebutuhan kalium : 2,5 mEq/KgBB/hari	
Kebutuhan natrium : 2-4 mEq/KgBB/hari	

b. Dewasa

Kebutuhan pada orang dewasa yaitu :

- 1) Kebutuhan air : 30-50 ml/KgBB/hari
- 2) Kebutuhan kalium : 1-2 mEq/KgBB/hari
- 3) Kebutuhan natrium : 2-3 mEq/KgBB/hari

2. Fisiologi Kebutuhan Cairan dan Elektrolit

Cairan tubuh dapat dibagi kedalam dua kompartemen, cairan intraseluler (CIS) dan cairan ekstraseluler (CES). Cairan intraseluler adalah kompartemen utama, yaitu 55% dari cairan tubuh, sedangkan CES 45% dari cairan tubuh. Cairan ekstraseluler terdiri dari 3 kompartemen, yaitu cairan intravaskuler yang merupakan 15% dari CES, cairan interstitial yang merupakan 45% dari CES, dan cairan transeluler yang merupakan 40% dari cairan ekstraseluler. Cairan intravaskuler terdiri atas plasma, komponen darah, hormon, dan nutrisi (Suwarsa, 2018).

Cairan dan substansi di dalamnya mengalami perpindahan dari cairan interstisiel ke dalam sel. Namun, tidak semua substansi dan komponennya ikut berpindah sebab adanya pembuluh darah kapiler dan membran sel yang bersifat semipermeabel dan mampu memfilter komponen tersebut. Metode berpindahnya cairan dan elektrolit tubuh terdiri dari beberapa cara, yaitu (Tarwoto & Wartonah, 2010):

a. Difusi

Difusi adalah proses perpindahan partikel di dalam cairan tubuh dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sampai terjadi keseimbangan. Cairan dan elektrolit berdifusi menembus membrane sel dan kecepatannya

dipengaruhi oleh temperatur, ukuran molekul, dan konsentrasi larutan.

b. Osmosis

Osmosis adalah pergerakan pelarut seperti air dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi yang bersifat menarik melalui membran semipermeabel.

c. Transpor aktif

Transpor aktif merupakan pergerakan partikel dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi karena adanya daya aktif tubuh seperti pompa jantung.

d. Filtrasi

Filtrasi merupakan proses perpindahan air dan substansi yang dapat terlarut secara bersamaan sebagai respon terhadap adanya cairan yang memiliki perbedaan tekanan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Fungsi Kebutuhan Cairan dan Elektrolit

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi sistem cairan dan elektrolit dijabarkan di bawah ini (Tarwoto & Wartonah, 2010) (Suwarsa, 2018):

a. Usia

Usia berpengaruh terhadap berat badan, metabolisme, dan luas permukaan tubuh seseorang sehingga juga akan mempengaruhi intake cairan. Usia lanjut lebih sering mengalami gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang biasanya disebabkan adanya gangguan fungsi ginjal ataupun jantung. Infant dan anak-anak cen-

derung lebih mudah mengalami gangguan keseimbangan cairan tubuh dibandingkan dengan usia dewasa.

b. Iklim

Daerah yang memiliki suhu tinggi dan kelembaban udara yang rendah akan mengalami peningkatan dalam kehilangan cairan dan elektrolit tubuh yang dikeluarkan melalui proses evaporasi. Kehilangan cairan dapat mencapai 5 liter per hari bagi seseorang yang beraktivitas pada iklim panas.

c. Diet

Pada kondisi diet, asupan nutrisi menjadi tidak adekuat sehingga tubuh akan membakar lemak dan protein yang menyebabkan terjadinya penurunan serum albumin dan cadangan protein. Hal ini akan menyebabkan terjadinya edema karena serum albumin serta protein lainnya diperlukan untuk proses keseimbangan cairan dalam tubuh.

d. Stress

Stress akan meningkatkan metabolisme sel, pemecahan glikogen otot, dan meningkatnya glukosa darah. Mekanisme ini akan menyebabkan meningkatnya natrium dan retensi air sehingga apabila terjadi dalam waktu yang lama, akan menyebabkan terjadinya peningkatan volume darah.

e. Kondisi sakit

1) Trauma seperti luka bakar akan meningkatkan kehilangan air melalui IWL (*Insensible Water Loss*).

- 2) Kehilangan melalui ginjal (penyakit ginjal) disebabkan oleh diuretik, gagal ginjal kronis, insufisiensi adrenal, dan fase diuretik acute tubular necrosis. Selain itu, penyakit kardiovaskuler juga berpengaruh terhadap proses pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh.
- 3) Pasien dengan kesadaran menurun akan mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan cairan akibat ketidakmampuan untuk memenuhinya secara mandiri.
- 4) Kehilangan melalui saluran cerna disebabkan oleh diare, muntah-muntah, atau tindakan operasi.

f. Tindakan Medis

Beberapa tindakan medis dapat berpengaruh terhadap keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, di antaranya *suction*, *naso gastric tube* (NGT), dan lain-lain.

g. Pengobatan

Pemberian obat-obatan diuretik dan laksatif akan mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh.

h. Proses Pembedahan

Kehilangan banyak darah selama proses pembedahan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan cairan dan elektrolit tubuh.

4. Macam-Macam Gangguan pada Kebutuhan Cairan dan Elektrolit

Berikut beberapa gangguan cairan dan elektrolit yang sering terjadi (Tarwoto & Wartonah, 2010):

a. Hipovolemik

Hipovolemik merupakan suatu kondisi terjadinya kekurangan volume cairan ekstra seluler akibat kehilangan cairan tubuh melalui kulit, gastrointestinal, ginjal, ataupun perdarahan, dimana hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya syok hipovolemik. Gejala yang dirasakan antara lain, lemah, letih, pusing, mual, muntah, anoreksia, rasa haus, konstipasi, oliguri, penurunan tekanan darah, peningkatan denyut jantung dan suhu tubuh, turgor kulit menurun, mukosa mulut kering, dan lidah terasa kering serta kasar. Pada bayi dan anak-anak juga ditandai dengan berkurangnya jumlah air mata.

b. Hipervolemi

Terjadinya kelebihan/peningkatan volume cairan ekstraseluler, dapat disebabkan oleh adanya gangguan fungsi ginjal dengan menurunnya ekskresi air dan natrium, pemberian cairan yang berlebihan, serta terjadi perpindahan cairan interstisial ke plasma. Gejala yang dirasakan berupa sesak napas, peningkatan atau penurunan tekanan darah, asites, nadi teraba kuat, asites, kulit lembab, distensi vena jugularis, adanya bunyi ronchi pada pernapasan.

C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Cairan, Elektrolit dan Asam Basa _____

1. Pengkajian Keperawatan

a. Riwayat Keperawatan

- 1) Intake cairan dan makanan (oral dan parental).

- 2) Tanda dan gejala ketidak seimbangan cairan dan elektrolit.
- 3) Pengobatan tertentu yang mempengaruhi status cairan.
- 4) Proses penyakit yang menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit.
- 5) Status perkembangan (usia atau kondisi sosial).
- 6) Faktor psikologis (perilaku emosional).

b. Pemeriksaan Fisik

- 1) Integumen : turgor kulit, sensasi rasa, edema.
- 2) Kardiovaskuler : tekanan darah, bunyi jantung, distensi vena jugularis, haemoglobin.
- 3) Mata : cekung, air mata kering.
- 4) Neurologi : gangguan sensorik dan motorik, refleks, tingkat kesadaran.
- 5) Gastrointestinal : mukosa bibir, mulut dan lidah, mual, muntah, dan lain-lain.

c. Pengukuran klinik :

1) Berat Badan (BB)

Melakukan pengukuran berat badan pada waktu yang sama setiap hari. Adanya penurunan ataupun peningkatan 1 Kg berat badan, setara dengan pengeluaran atau penambahan 1 liter cairan tubuh.

2) Keadaan umum

Mengukur *vital sign* seperti tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu, dan tingkat kesadaran.

3) Asupan cairan

- a) Cairan oral : NGT dan oral
- b) Cairan parental : termasuk obat-obat intravena.
- c) Makanan yang cenderung mengandung air.
- d) Iritasi kateter.

4) Pengukuran pengeluaran cairan :

- a) Urine : volume, kejernihan/kepekatan.
- b) Feses : jumlah dan konsistensi.
- c) Muntah.
- d) *Tube drainage* dan IWL.

5) Ukuran balance cairan dengan akurat: normalnya kurang lebih 200 cc.

d. Pemeriksaan penunjang

1) Pemeriksaan elektrolit serum

Dilakukan untuk mengetahui kadar kalium, klorida, natrium, dan ion bikarbonat.

2) Pemeriksaan laboratorium darah lengkap

Meliputi pemeriksaan eritrosit, hemoglobin, hematokrit.

- a) Hematokrit naik : terjadi dehidrasi berat dan gejala syok.
- b) Hematokrit turun: terjadi perdarahan akut, masif, dan reaksi hemolitik.
- c) Haemoglobin naik : adanya hemokonsentrasi.
- d) Haemoglobin turun : adanya perdarahan hebat, reaksi hemolitik.

3) pH dan berat jenis urine

Berat jenis menunjukkan kemampuan ginjal untuk mengatur konsentrasi urine. pH urine normal adalah 4,5-8 dan berat jenisnya 1,003-1,030.

4) Analisa gas darah

Melakukan pemeriksaan pH, PO₂, HCO₃⁻, PCO₂, dan saturasi O₂. Nilai normal PCO₂ : 35 – 40 mmHg; PO₂: 80 – 100 mmHg; HCO₃⁻ : 25 – 29 mEq/l. Sedangkan saturasi O₂ adalah perbandingan oksigen dalam darah dengan jumlah oksigen yang dapat dibawa oleh darah, normalnya di arteri (95 – 98 %) dan vena (60 – 85 %).

2. Diagnosis Keperawatan

Masalah 1: Hipervolemia

a. Definisi

Peningkatan volume cairan intravascular, intertisial dan atau intraseluler.

Batasan karakteristik:

1) Gejala dan tanda mayor

- a) Subjektif
 - i. Ortopnea.
 - ii. Dispnea.
 - iii. *Paroxymal nocturnal dyspnea* (PND).

b) Objektif

- i. Edema anasarka dan atau edema perifer.
- ii. Peningkatan berat badan dalam waktu singkat.

iii. Peningkatan *Jugular Venous Pressure* (JVP) dan atau *Central Venous Pressure* (CVP).

2) Gejala dan tanda minor

a) Subjektif

Tidak tersedia

b) Objektif

- i. Distensi Vena jugularis.
- ii. Ada suara napas tambahan.
- iii. Hepatomegali.
- iv. Kadar haemoglobin dan hematokrit menurun.
- v. Oliguria.
- vi. Intake lebih banyak dibandingkan *output*.
- vii. Kongesti paru.

b. Faktor yang berhubungan

- 1) Gangguan mekanisme regulasi.
- 2) Kelebihan asupan cairan.
- 3) Kelebihan asupan natrium.
- 4) Gangguan aliran balik vena.
- 5) Efek samping penggunaan obat tertentu, seperti Kostikosteroid, *chlorpropamide*, *tolbutamide*, *vincristine*, *tryptilines carbamazepine*).

Masalah 2: Hipovolemia

a. Definisi

Menurunnya volume cairan intravascular, interstitial, dan/atau intraseluler

b. Batasan karakteristik

1) Gejala dan tanda mayor

a) Subjektif

b) Objektif

- i. Peningkatan frekuensi nadi.
- ii. Nadi teraba lemah.
- iii. Penurunan tekanan darah.
- iv. Penyempitan tekanan nadi.
- v. Menurunnya turgor kulit
- vi. Membran mukosa kering.
- vii. Penurunan volume urine.
- viii. Peningkatan hematokrit.

2) Gejala dan tanda minor

a) Subjektif

- i. Merasa lemah.
- ii. Mengeluh haus.

b) Objektif

- i. Pengisian vena menurun.
- ii. Perubahan status mental.
- iii. Peningkatan suhu tubuh.
- iv. Peningkatan konsentrasi urine.
- v. Penurunan berat badan secara tiba-tiba.

c. Faktor yang berhubungan

- 1) Kehilangan cairan aktif.
- 2) Kegagalan mekanisme regulasi.
- 3) Peningkatan permeabilitas kapiler.

4) Kurang asupan cairan.

5) Evaporasi.

Masalah 3: Diare

a. Defenisi

Pengeluaran feses dengan frekuensi meningkat, lunak, dan tidak berbentuk.

b. Batasan karakteristik

1) Gejala dan tanda mayor

a) Subjektif

Tidak tersedia

b) Objektif

i. BAB lebih dari tiga kali dalam 24 jam.

ii. Feses lembek atau cair.

2) Gejala dan tanda minor

a) Subjektif

i. *Urgency*.

ii. Nyeri/kram abdomen.

b) Objektif

i. Frekuensi peristaltic meningkat.

ii. Bising usus hiperaktif.

c. Faktor yang berhubungan

1) Fisiologis

a) Inflamasi gastrointestinal.

b) Iritasi gastrointestinal.

c) Proses infeksi.

d) Malabsorpsi.

N A S K A H S I A P C E T A K

2) Psikologis

a) Kecemasan.

b) Tingkat stress tinggi.

3) Situasional

a) Terpapar kontaminan.

b) Terpapar toksin.

c) Penyalahgunaan laksatif.

d) Penyalahgunaan zat.

e) Program pengobatan (Agen tiroid, analgesic, pelunak feses, ferosulfat, antasida, *cimetidine*, dan antibiotic).

f) Perubahan air dan makanan.

g) Bakteri pada air.

3. Intervensi Keperawatan

Masalah 1 : Hipervolemia

Luaran utama : Keseimbangan cairan

a. Tujuan dan Kriteria hasil (*outcomes criteria*):

Ekuilibrium antara volume cairan di ruang intraseluler dan ekstraseluler tubuh meningkat dibuktikan dengan kriteria hasil:

1) Asupan cairan, keluaran urine, kelembaban membrane mukosa, asupan makanan meningkat.

2) Edema, dehidrasi, asites, konfusi menurun.

3) Tekanan darah, denyut nadi radial, tekanan arteri rata-rata, membrane mukosa, mata cekung, turgor kulit, berat badan membaik.

b. Intervensi keperawatan dan rasional:

1) Manajemen Hipervolemia

a) Observasi

- i. Periksa tanda dan gejala hipervolemia (misalnya Ortopnea, dispnea, edema, JVP/CVP meningkat, reflex hepatojugular positif, suara napas tambahan.

Rasional: Mengetahui adanya tanda dan gejala hipervolemia pada pasien.

- ii. Identifikasi penyebab hipervolemia

Rasional: Mengetahui penyebab hipervolemia pada pasien.

- iii. Monitor status hemodinamik (misalnya frekuensi jantung, tekanan darah, MAP, CVP, PAP, PCWP, CO,CI), jika tersedia.

Rasional: Mengetahui status hemodinamik pada pasien.

- iv. Monitor input dan *output* cairan (misalnya jumlah dan karakteristik)

Rasional: Mengetahui keseimbangan cairan pasien.

- v. Monitor tanda hemokonsentrasi (misalnya kadar natrium, BUN, hematokrit, berat jenis urine).

Rasional: Mengetahui adanya tanda hemokonsentrasi pada pasien.

- vi. Monitor tanda peningkatan onkotik plasma (misalnya kadar protein dan albumin meningkat).

Rasional: Mengetahui tanda peningkatan onkotik plasma pada pasien.

- vii. Monitor kecepatan infus secara ketat

Rasional: Memastikan cairan IV yang masuk sesuai kebutuhan pasien.

- viii. Monitor efek samping diuretik

Rasional: Mengetahui adanya efek samping diuretic pada pasien.

b) Terapeutik

- i. Timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama

Rasional: Mengetahui adanya penambahan atau pengurangan berat badan pasien.

- ii. Batasi asupan cairan dan garam

Rasional: Mengurangi asupan cairan dan garam agar keseimbangan cairan kembali normal.

- iii. Tinggikan kepala tempat tidur 30-40°

Rasional: Mempertahankan kenyamanan, meningkatkan ekspansi paru, dan memaksimalkan oksigenasi pasien.

c) Edukasi

- i. Anjurkan melapor jika haluan urine <0,5 mL/kg/jam dalam 6 jam

Rasional: Agar haluan urine pasien tetap terantau sehingga perfusi renal, kecukupan penggantian cairan dan kebutuhan serta status cairan pasien dapat segera ditangani jika terjadi ketidakseimbangan.

- ii. Anjurkan melapor jika BB bertambah >1 kg dalam sehari

Rasional: Agar BB pasien tetap terpantau sehingga, kecukupan penggantian cairan dan kebutuhan serta status cairan pasien dapat segera ditangani jika terjadi ketidakseimbangan.

- iii. Ajarkan cara mengukur dan mencatat asupan dan haluaran cairan

Rasional: Agar pasien dapat mengetahui cara mengukur dan mencatat asupan dan haluaran cairannya secara mandiri.

- iv. Ajarkan cara membatasi cairan

Rasional: Agar pasien dapat mengontrol *intake* dan *output* cairan secara mandiri.

d) Kolaborasi

- i. Kolaborasi pemberian diuretik

Rasional: Membantu mengeluarkan kelebihan garam dan air dalam tubuh melalui urine.

- ii. Kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretik

Rasional: Mengembalikan konsentrasi kalium dalam tubuh.

- iii. Kolaborasi pemberian *Continuous Renal Replacement Therapy* (CRRT), jika perlu

Rasional: Mengatur keseimbangan cairan pasien dan membantu kerja ginjal.

2) Pemantauan cairan

a) Observasi

- i. Monitor frekuensi dan kekuatan nadi

Rasional: Mengetahui frekuensi dan kekuatan nadi pasien.

- ii. Monitor frekuensi napas

Rasional: Mengetahui frekuensi napas pasien.

- iii. Monitor tekanan darah

Rasional: Mengetahui tekanan darah pasien.

- iv. Monitor berat badan

Rasional: Mengetahui berat badan pasien.

- v. Monitor waktu pengisian kapiler

Rasional: Mengetahui waktu pengisian kapiler pasien.

- vi. Monitor elastisitas atau turgor kulit

Rasional: Mengetahui elastisitas atau turgor kulit pasien.

- vii. Monitor jumlah, warna dan berat jenis urine

Rasional: Mengetahui karakteristik urine pasien

- viii. Monitor kadar albumin dan protein total

Rasional: Mengetahui kadar albumin dan protein total pasien.

- ix. Monitor hasil pemeriksaan serum (misalnya osmolaritas serum, hematokrit, natrium, kalium, BUN)

Rasional: Mengetahui hasil pemeriksaan serum pasien.

- x. Monitor *intake* dan *output* cairan
Rasional: Mengetahui *intake* dan *output* cairan pasien
- xi. Monitor tanda-tanda hypovolemia, seperti peningkatan frekuensi nadi, nadi teraba lemah, penurunan tekanan darah, penyempitan tekanan nadi, turgor kulit menurun, membrane mukosa kering, penurunan volume urine, peningkatan hematokrit, haus, lemah, peningkatan konsentrasi urine, dan penurunan berat badan dalam waktu singkat.
Rasional: Mengetahui adanya tanda-tanda hypovolemia pada pasien.
- xii. Identifikasi tanda-tanda hypervolemia (misalnya dispnea, edema perifer, edema anasarca, JVP meningkat, CVP meningkat, reflex hepatojugular positif, berat badan menurun dalam waktu singkat)
Rasional: Mengetahui adanya tanda-tanda hypervolemia pada pasien.
- xiii. Identifikasi faktor risiko ketidakseimbangan cairan (misalnya prosedur pembedahan mayor, trauma/perdarahan, luka bakar, apheresis, obstruksi intestinal, peradangan pankreas, penyakit ginjal dan kelenjar, disfungsi intestinal).
Rasional: Mengetahui faktor risiko ketidakseimbangan cairan pasien.

- b) Terapeutik
 - i. Atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien
Rasional: Mengetahui perkembangan kondisi pasien.
 - ii. Dokumentasikan hasil pemantauan
Rasional: Mengetahui fokus keperawatan dan mengevaluasi hasil keperawatan serta sebagai tanggung gugat perawat.
- c) Edukasi
 - i. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan
Rasional: Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan.
 - ii. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu
Rasional: Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga mengenai kondisi terkait masalah kesehatannya.

Masalah 2 : Hipovolemia

Luaran utama : Status Cairan

- a. Tujuan dan kriteria hasil (*outcomes criteria*):
Kondisi volume cairan intravaskuler, interstitial, dan/atau intraseluler membaik dibuktikan dengan kriteria hasil:
 - 1) Kekuatan nadi, turgor kulit, *output* urine, pengisian vena meningkat.
 - 2) Berat badan, perasaan lemah, keluhan haus, konsentrasi urine menurun.

- 3) Frekuensi nadi, tekanan darah, tekanan nadi, membrane mukosa, kadar ht, intake cairan, status mental, suhu tubuh membaik.

b. Intervensi keperawatan dan rasional:

Manajemen hipovolemia

1) Observasi

- a) Periksa tanda dan gejala hypovolemia (misalnya peningkatan frekuensi nadi, nadi teraba lemah, penurunan tekanan darah, penurunan turgor kulit, tekanan nadi menyempit, membrane mukosa kering, penurunan volume urine, peningkatan hematocrit, haus, dan lemah).

Rasional: Mengetahui adanya tanda dan gejala hypovolemia pada pasien.

- b) Monitor *intake* dan *output* cairan

Rasional: Mengetahui keseimbangan cairan pada pasien.

2) Terapeutik

- a) Hitung kebutuhan cairan

Rasional: Mengetahui kadar cairan yang dibutuhkan pasien secara adekuat.

- c) Berikan posisi modified trendelenburg

Rasional: Agar aliran darah balik ke jantung lebih besar sehingga tekanan darah meningkat.

- d) Berikan asupan cairan oral

Rasional: Agar intake cairan terjaga sehingga keseimbangan cairan kembali normal.

3) Edukasi

- a) Anjurkan memperbanyak asupan cairan oral

Rasional: Untuk mempertahankan keseimbangan cairan.

- b) Anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak

Rasional: Untuk mempertahankan keamanan dan kenyamanan pasien.

4) Kolaborasi

- a) Kolaborasi pemberian cairan IV isotonis (misalnya NaCL, RL)

Rasional: Pemberian cairan IV isotonis (misalnya NaCL, RL) sesuai kebutuhan pasien.

- b) Kolaborasi pemberian cairan IV Hipotonis (misalnya glukosa 2,5%, NaCl 0,4%)

Rasional: Pemberian cairan IV Hipotonis (misalnya glukosa 2,5%, NaCl 0,4% sesuai kebutuhan pasien)

- c) Kolaborasi pemberian cairan koloid (misalnya albumin, plasmanate)

Rasional: Pemberian cairan koloid sesuai kebutuhan pasien.

- d) Kolaborasi pemberian produk darah

Rasional: Pemberian produk darah sesuai kebutuhan pasien.

Manajemen syok hipovolemik

1) Observasi

- a) Manajemen status kardiopulmonal (frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, TD, MAP)
Rasional: Mengetahui status kardiopulmonal pasien.
- b) Monitor status oksigenasi (oksimetri nadi, AGD)
Rasional: Mengetahui status oksigenasi pasien.
- c) Monitor status cairan (masukan dan haluaran, turgor kulit, CRT)
Rasional: Mengetahui status cairan pasien.
- d) Periksa tingkat kesadaran dan respon pupil
Rasional: Mengetahui tingkat kesadaran dan respon pupil.
- e) Periksa seluruh permukaan tubuh terhadap adanya DOTS (*deformity*/deformitas, *open wound*/luka terbuka, *tenderness*/nyeri tekan, *swelling*/bengkak)
Rasional: Mengetahui adanya DOTS (*deformity*/deformitas, *open wound*/luka terbuka, *tenderness*/nyeri tekan, *swelling*/bengkak) pada tubuh pasien.

2) Terapeutik

- a) Pertahankan jalan napas paten
Rasional: Agar aliran oksigen tetap adekuat.
- b) Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen >94%

Rasional: Agar kebutuhan oksigen di jaringan terpenuhi secara adekuat.

- c) Persiapkan intubasi dan ventilasi mekanis, jika perlu
Rasional: Mempertahankan dan menjaga kebutuhan oksigenasi pasien agar tetap terpenuhi.
- d) Lakukan penekanan langsung (*direct pressure*) pada perdarahan eksternal
Rasional: Menghentikan perdarahan/pendarahan.
- e) Berikan posisi syok (*modified trendelenberg*)
Rasional: Meningkatkan aliran darah balik ke jantung sehingga tekanan darah meningkat.
- f) Pasang jalur IV kateter berukuran besar (misalnya nomor 14 atau 16)
Rasional: Memberikan *intake* cairan melalui IV secara adekuat.
- g) Pasang kateter urin untuk menilai produksi urin
Rasional: Mengetahui karakteristik urine untuk menilai status cairan pasien.
- h) Pasang selang nasogastric untuk dekompresi lambung
Rasional: Membantu pemenuhan intake cairan dan nutrisi pasien melalui oral.
- i) Ambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit
Rasional: Mengetahui status cairan dan elektrolit pada pasien dan sebagai bahan evaluasi untuk pemberian tindakan asuhan keperawatan selanjutnya.

3) Kolaborasi

- a) Kolaborasi pemberian infus cairan kristaloid 1-2 L pada dewasa
Rasional: Mempertahankan keseimbangan cairan yang sesuai kebutuhan pasien.
- b) Kolaborasi pemberian infus cairan kristaloid 20 mL/kg/BB pada anak
Rasional: Mempertahankan keseimbangan cairan yang sesuai kebutuhan pada pasien anak.
- c) Kolaborasi pemberian transfusi darah, jika perlu
Rasional: Mempertahankan keseimbangan cairan dan pemberian transfuse darah sesuai kebutuhan pasien.

Masalah 3 : Diare

Luaran Utama : Eliminasi fekal

a. Tujuan dan Kriteria hasil (*outcomes criteria*):

Proses defekasi normal yang disertai dengan pengeluaran feses mudah dan konsistensi, frekuensi serta bentuk feses normal dengan kriteria hasil:

- 1) Kontrol pengeluaran feses meningkat.
- 2) *Urgency*, nyeri abdomen, kram abdomen menurun
- 3) Konsistensi feses, frekuensi defekasi, peristaltic usus membaik.

b. Intervensi keperawatan dan rasional:

Manajemen Diare

1) Observasi

- a) Identifikasi penyebab diare (misalnya inflamasi gastrointestinal, iritasi gastrointestinal, proses

infeksi, malabsorpsi, ansietas, stress, efek obat-obatan, pemberian botol susu)

Rasional: Mengetahui penyebab diare pada pasien.

b) Identifikasi riwayat pemberian makanan

Rasional: Mengetahui adanya jenis makanan yang menyebabkan terjadinya diare pada pasien.

c) Identifikasi gejala invaginasi (misalnya tangisan keras, keputihan pada bayi)

Rasional: Mengetahui adanya gejala invaginasi pada pasien anak.

d) Monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja

Rasional: Mengetahui karakteristik feses pasien dan bahan evaluasi.

e) Monitor tanda dan gejala hypovolemia (misalnya takikardia, nadi teraba lemah, tekanan darah turun, turgor kulit turun, mukosa mulut kering, CRT melambat, BB menurun)

Rasional: Mengetahui adanya tanda dan gejala hypovolemia pada pasien.

f) Monitor iritasi dan ulserasi kulit di daerah perianal

Rasional: Mengetahui adanya iritasi dan ulserasi kulit di daerah perianal.

g) Monitor jumlah pengeluaran diare

Rasional: Mengetahui jumlah pengeluaran diare pada pasien.

- h) Monitor keamanan penyiapan makanan
Rasional: Memastikan pemberian makanan sesuai kebutuhan pasien.
- 2) Terapeutik
 - a) Berikan asupan cairan oral (misalnya larutan garam gula, oralit, pedialyte, renalyte)
Rasional: Mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit pasien.
 - b) Pasang jalur intravena
Rasional: Memberikan terapi cairan melalui IV pada pasien.
 - c) Berikan cairan intravena (misalnya ringer asetat, ringer laktat), jika perlu
Rasional: Mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit pasien.
 - d) Ambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit
Rasional: Mengetahui status cairan dan elektrolit pada pasien dan sebagai bahan evaluasi untuk pemberian tindakan asuhan keperawatan selanjutnya.
 - e) Ambil sampel feses untuk kultur, jika perlu
Rasional: Mengetahui status cairan dan elektrolit pada pasien dan sebagai bahan evaluasi untuk pemberian tindakan asuhan keperawatan selanjutnya.
- 3) Edukasi
 - a) Anjurkan makanan porsi kecil dan sering secara bertahap

N A S K A H S I A P C E T A K

- Rasional: Agar asupan makanan yang dibutuhkan tubuh tetap terjaga.
- b) Anjurkan menghindari makanan pembentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa
Rasional: Menghindari makanan-makanan yang dapat mengakibatkan diare berlanjut.
- c) Anjurkan melanjutkan pemberian ASI
Rasional: Agar Intake pada anak tetap adekuat.
- 4) Kolaborasi
 - a) Kolaborasi pemberian obat antimotilitas (misalnya loperamide, difenoksilat)
Rasional: Pemberian obat antimotilitas (misalnya loperamide, difenoksilat) sesuai kebutuhan pasien.
 - b) Kolaborasi pemberian obat antispasmodic/spasmoditik (misalnya papverin, ekstrak belladonna, mebeverine)
Rasional: Pemberian obat antispasmodic/spasmoditik (misalnya papverin, ekstrak belladonna, mebeverine) sesuai kebutuhan pasien.
 - c) Kolaborasi pemberian obat pengeras feses (misalnya atapulgit, smektit, kaolin-pektin)
Rasional: Pemberian obat pengeras feses (misalnya atapulgit, smektit, kaolin-pektin) sesuai kebutuhan pasien.

Pemantauan Cairan

1) Observasi

a) Monitor frekuensi dan kekuatan nadi

Rasional: Mengetahui frekuensi dan kekuatan nadi pasien.

b) Monitor frekuensi napas

Rasional: Mengetahui frekuensi napas pasien.

c) Monitor tekanan darah

Rasional: Mengetahui tekanan darah pasien.

d) Monitor berat badan

Rasional: Mengetahui berat badan pasien.

e) Monitor waktu pengisian kapiler

Rasional: Mengetahui waktu pengisian kapiler pasien.

f) Monitor elastisitas atau turgor kulit

Rasional: Mengetahui elastisitas atau turgor kulit pasien.

g) Monitor jumlah, warna dan berat jenis urine

Rasional: Mengetahui karakteristik urine pasien.

h) Monitor kadar albumin dan protein total

Rasional: Mengetahui kadar albumin dan protein total pasien.

i) Monitor hasil pemeriksaan serum (misalnya osmolaritas serum, hematokrit, natrium, kalium, BUN)

Rasional: Mengetahui hasil pemeriksaan serum pasien.

j) Monitor *intake* dan *output* cairan

Rasional: Mengetahui *intake* dan *output* cairan pasien.

k) Monitor tanda-tanda hypovolemia (misalnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membrane mukosa kering, volume urine menurun, hematokrit meningkat, haus, lemah, konsentrasi urine meningkat, berat badan menurun dalam waktu singkat)

Rasional: Mengetahui adanya tanda-tanda hypovolemia pada pasien.

l) Identifikasi tanda-tanda hypervolemia (misalnya dispnea, edema perifer, edema anasarca, JVP meningkat, CVP meningkat, reflex hepatojugular positif, berat badan menurun dalam waktu singkat)

Rasional: Mengetahui adanya tanda-tanda hypervolemia pada pasien.

m) Identifikasi faktor risiko ketidakseimbangan cairan (misalnya prosedur pembedahan mayor, trauma/perdarahan, luka bakar, apheresis, obstruksi intestinal, peradangan pancreas, penyakit ginjal dan kelenjar, disfungsi intestinal)

Rasional: Mengetahui factor risiko ketidakseimbangan cairan pasien.

N A S K A H S I A P C E T A K

2) Terapeutik

- a) Atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien

Rasional: Mengetahui perkembangan kondisi pasien.

- b) Dokumentasikan hasil pemantauan

Rasional: Mengetahui fokus keperawatan dan mengevaluasi hasil keperawatan serta sebagai tanggung gugat perawat.

3) Edukasi

- a) Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan

Rasional: Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan.

- b) Informasikan hasil pemantauan, jika perlu

Rasional: Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga.



MANAJEMEN NYERI

A. Pendahuluan _____

Kebutuhan rasa nyaman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Rasa nyaman sebagai suatu kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan akan ketentraman, kepuasan, kelegaan, ketenangan psikologis, serta terbebas dari adanya rasa sakit/nyeri. (Kozier & Erb's, 2015). Gangguan kebutuhan kenyamanan karena adanya nyeri memiliki dampak besar pada pasien. Dampak yang dapat terjadi tidak hanya pada kondisi fisik, melainkan dapat pula berpengaruh terhadap kesehatan mental, kualitas hidup, serta biaya perawatan. Nyeri bersifat subyektif dan dipersepsikan individu berdasarkan pengalamannya. *The International Association for the Study of Pain* dan *World Health Organization* mendefinisikan nyeri sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan baik yang bersifat aktual maupun potensial, atau digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut (IASP, 2012).

Nyeri dianggap sebagai masalah klinis, sosial, dan ekonomi utama dalam komunitas di seluruh dunia (Henschke, Kamper & Maher, 2015). Adanya keluhan nyeri yang dirasakan menyebabkan seseorang mencari perawatan kesehatan dan merupakan salah satu masalah utama yang dialami pasien selama dirawat di rumah sakit. Gejala ini sangat sering dan bervariasi dalam intensitas sesuai dengan patologi yang mendasarinya (Erazo-Muñoz & Colmenares-Mejía, 2018). Studi menunjukkan bahwa 20% lansia dirawat di rumah sakit memiliki rasa sakit sedang hingga berat. (Deng, Patel, Miaskowski, Maravilla, Schear, Garrigues & Ritchie, 2018) dan 10% hingga 50% pasien rawat inap dewasa mengalami nyeri sedang hingga berat, hal tersebut memiliki dampak negatif pada tingkat yang berbeda (Fabbian, De Giorgi, Pala, Mallozzi, Gallerani, & Manfredini, (2014).

Pasien pascabedah memiliki prevalensi nyeri yang lebih besar dibandingkan dengan pasien non-bedah (Erazo-Muñoz, & Colmenares-Mejía, 2018). Data *World Health Organization*, (2015) menunjukkan jumlah pasien nyeri akibat prosedur pembedahan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2011 terdapat 140 juta pasien atau sekitar 1,9% di seluruh dunia, meningkat sebanyak 0,3% pada tahun 2012 menjadi 148 juta pasien atau sekitar 2,1%. Menurut Fabbian, Giorgi, Palam, Menegatti, Gallerani & Manfredini (2014), penyakit yang signifikan menyebabkan nyeri sedang hingga berat adalah kanker, penyakit muskuloskeletal, penyakit empedu, serta penyakit usus. Estimasi prevalensi nyeri kronis di Inggris sekitar 43% atau setara dengan 28 juta jiwa. Prevalensi nyeri kronis terus meningkat sejalan dengan peningkatan usia dan mempengaruhi hingga 62% dari populasi di atas usia 75 tahun (Fayaz, Croft, Langford, Donaldson, & Jones, 2016).

Indonesia sebagai negara berkembang belum memiliki data keseluruhan mengenai keluhan nyeri, namun diperkirakan sekitar 5% dari penduduk Indonesia atau sekitar 12,7 juta jiwa mengalami nyeri akibat kanker (WHO, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Germossa, Hellesø, & Sjetne, (2019) pada 845 pasien menunjukkan gangguan nyeri rata-rata dengan fungsi fisik dan emosional umumnya berkurang setelah dilakukan manajemen nyeri selama perawatan. Perawat dapat melakukan perawatan nyeri menggunakan intervensi keperawatan baik tindakan mandiri maupun tindakan kolaboratif dengan pendekatan farmakologi dan pendekatan non farmakologi (Saifullah, 2015). Pemberian analgesic opioid melalui intravena menunjukkan intensitas nyeri yang lebih rendah dan peningkatan kualitas perawatan dalam manajemen nyeri yang dirasakan oleh pasien (Muntlin, Carlsson, Säfwenberg, & Gunningberg, 2011).

Tindakan menurunkan nyeri dengan pendekatan non-farmakologi dapat dilakukan perawat secara mandiri dengan menggunakan pertimbangan dan keputusannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia (Bagun & Nur'aeni, 2013). Tindakan mandiri keperawatan yang dapat dilakukan berupa pemberian kompres dingin serta beberapa jenis tindakan relaksasi. Indriyani, Hayati, dan Chodidjah, (2013) dalam penelitiannya didapatkan bahwa tindakan melakukan kompres dingin dapat menurunkan tingkat nyeri pada saat melakukan prosedur pemasangan infus pada anak usia sekolah. Tindakan kompres dingin ini juga dapat menurunkan intensitas nyeri pada pasien fraktur (Purnamasari, 2014). Teknik relaksasi dijelaskan oleh Patasik, Tangka, dan Rottie, (2013) dalam penelitiannya yang mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan teknik relaksasi napas dalam dan *guide imagery*

yang dilakukan sesuai SOP dapat menurunkan tingkat nyeri pada pasien *sectio caesaria*. Tindakan lainnya yang dapat dilakukan adalah memberikan massage atau pijatan punggung. Tindakan ini efektif menurunkan skala nyeri kepala pada pasien hipertensi (Purwandari, 2018).

Nyeri secara serius jika tidak ditangani dapat menyebabkan ketidakmampuan dan imobilisasi pada individu, sehingga kondisi tersebut akan merusak kemampuan individu untuk melakukan aktivitas. Nyeri yang tidak hilang dapat meningkatkan morbiditas pasca operasi, memperpanjang pemulihan, dan memperpanjang masa perawatan. Selain itu adanya nyeri yang dirasakan oleh pasien juga dapat mengurangi aktivitas fisik, menurunkan fungsi kekebalan tubuh, serta dapat menyebabkan gangguan tidur sehingga pengetahuan mengenai kebutuhan kenyamanan sangat diperlukan dalam melakukan perawatan terhadap pasien.

B. Konsep Dasar Kebutuhan Manajemen Nyeri

1. Definisi Kebutuhan Dasar Kenyamanan

Kebutuhan dasar kenyamanan sering dikaitkan dengan respons nyeri yang dirasakan pasien yang dapat mempengaruhi status kenyamanan pasien. Persepsi dari rasa nyeri yang timbul juga berbeda antar pasien dengan berbagai ragam penyebab, sehingga membutuhkan kemampuan yang khusus dari perawat untuk mengatasi/meminimalkan nyeri yang dirasakan pasien. Hal terpenting yang harus diketahui yakni keyakinan perawat terhadap rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien adalah hal yang nyata sehingga dibutuhkan manajemen nyeri yang efektif untuk setiap

pasien. Dalam perkembangan dunia kedokteran juga, para peneliti dalam bidang kesehatan bersatu dan mengupayakan jika manajemen nyeri adalah prioritas yang penting dalam sistem perawatan kesehatan (Taylor, 2011).

Nyeri merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dan sulit dipahami dan bersifat universal. Nyeri merupakan bentuk mekanisme pertahanan tubuh manusia yang mengindikasikan orang tersebut mengalami sebuah masalah. Nyeri hadir saat seseorang mengatakan bahwa ia merasakan kesakitan meski tanpa penyebab spesifik penyebab nyeri itu muncul. Seorang perawat harus mampu mengandalkan deskripsi rasa nyeri yang diungkapkan pasien karena merupakan gejala subjektif yang hanya dapat diidentifikasi oleh pasien yang menggambarkannya (Taylor, 2011).

2. Jenis-Jenis Nyeri

Taylor (2011) melakukan pembagian jenis nyeri berdasarkan waktu, lokasi, mode transmisi, dan berdasarkan penyebab. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Waktu

1) Nyeri Akut

Umumnya muncul secara tiba-tiba dan cepat dan dalam bentuk yang bervariasi dengan intensitas dari ringan hingga berat. Nyeri akut bersifat protektif yakni memperingatkan individu terkait kerusakan jaringan atau penyakit organik. Biasanya setelah penyebab mendasar hilang, nyeri akut juga akan menghilang.

2) Nyeri Kronik

Nyeri kronik umumnya bersifat terbatas, intermiten atau persisten tetapi berlangsung melampaui batas periode penyembuhan yang normal. Nyeri kronis merupakan serangan tiba-tiba atau lambat dari intensitas ringan hingga berat dengan akhir yang diantisipasi atau diprediksi dan berlangsung > 3 bulan. Pada nyeri kronis terkadang pasien akan kesulitan menggambarkan rasa nyeri yang dirasakan karena mungkin tidak terlokalisasi dengan baik.

b. Berdasarkan Lokasi Nyeri

1) Nyeri Kulit (nyeri superfisial)

Biasanya melibatkan kulit atau jaringan subkutan. Biasanya terasa tajam, dan sensasi terbakar.

2) Nyeri Somatik

Nyeri yang menyebar yang biasanya berasal dari tendon, ligament, tulang, pembuluh darah, dan saraf. Seperti tekanan yang kuat pada tulang atau kerusakan jaringan yang terjadi pada kasus keseleo yang menyebabkan nyeri somatik yang mendalam.

3) Nyeri Visceral

Nyeri ini kurang terlokalisasi dan berasal dari organ tubuh seperti thorax, cranium dan perut. Nyeri ini dapat terjadi karena organ yang meregang secara tidak normal menyebabkan pelebaran, iskemik dan peradangan.

c. Berdasarkan mode transmisi

Nyeri juga dapat diklasifikasikan berdasarkan mode transmisi. Seperti nyeri dapat berasal dari satu bagian

tubuh tetapi dirasakan di daerah yang jauh dari titik asalnya. Biasanya disebut sebagai nyeri yang dirujuk.

d. Berdasarkan penyebab

Nyeri juga dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya yang sangat bervariasi seperti:

1) Nyeri neuropatik

Nyeri yang terjadi akibat cedera atau fungsi abnormal pada sistem saraf pusat atau sistem saraf perifer. Nyeri neuropatik biasanya berlangsung singkat ataupun lama dan seringkali digambarkan seperti rasa terbakar dan tertusuk-tusuk.

2) Nyeri phantom (nyeri hantu)

Nyeri yang biasa timbul pada pasien yang diamputasi dimana reseptor dan saraf yang sudah tidak ada namun masih dapat dirasakan oleh pasien. Nyeri ini juga biasa disebut sebagai *Phantom Limb Pain* dan tanpa menunjukkan substansi fisiologi maupun patologi. Suatu teori menyatakan jika penggambaran sensorik dari anggota tubuh yang hilang masih tetap tersimpan di dalam otak sehingga menyebabkan nyeri phantom.

3. Pengukuran Derajat dan Skala Nyeri

Hasil pengukuran derajat nyeri yang diperoleh saat melakukan pengukuran secara mandiri dapat dipengaruhi oleh subyektifitas pasien akibat adanya pengaruh faktor fisiologi, psikologis, dan lingkungan. Beberapa kondisi pasien yang tidak memungkinkan dilakukan penilaian secara mandiri seperti pada pasien yang mengalami gangguan kesadaran, gangguan kognitif dan pasien pediatrik

dapat dilakukan cara penilaian nyeri yang lain (Mardana & Arysa, 2017)

Mangku dan Senapathi, (2010) menuliskan cara sederhana untuk menilai nyeri secara kualitatif, meliputi:


- Nyeri ringan dapat diidentifikasi sebagai nyeri yang hilang timbul saat melakukan aktivitas sehari-hari namun tidak dirasakan pada saat tidur.
- Nyeri sedang diidentifikasi dengan tanda mengalami nyeri yang terus menerus hingga mengganggu aktivitas dan hanya hilang saat pasien tidur.
- Nyeri berat adalah nyeri yang dapat dirasakan sepanjang hari yang menyebabkan pasien tidak bisa tidur, atau sering terjaga karena nyeri timbul pada saat pasien tidur.

Pengukuran skala nyeri dapat dilakukan secara mandiri baik melalui penilaian tunggal dengan menggunakan skala pengukuran nyeri maupun penilaian multidimensi menggunakan kuesioner pengukuran nyeri. Penilaian nyeri menggunakan skala tunggal meliputi *visual analog scale* (VAS), *verbal rating scale* (VRS), *numeric rating scale* (NRS), dan *Wong Baker Pain Rating Scale* (Yudianta, 2015).

a. *Visual Analog Scale* (VAS)

Visual Analog Scale merupakan skala penilaian nyeri yang mudah. Rentang nyeri dapat dibuat pada garis sepanjang 10 cm secara vertical atau horizontal dengan memberikan tanda tidak ada nyeri di ujung satu dan diujung lainnya merupakan rasa nyeri yang terparah. Penilaian ini dapat digunakan pada anak usia 8 tahun

ke atas, namun kurang bermanfaat untuk pasien pasca bedah karena memerlukan kemampuan konsentrasi.




Gambar 8.1: *Visual Analog Scale*

Sumber: http://www.indianjpain.org/viewimage.asp?img=IndianJPain_2015_29_1_32_145942_f2.jpg diunduh 2020

b. *Verbal Rating Scale* (VRS)

Verbal Rating Scale merupakan skala penilaian nyeri 0-10 yang dapat digunakan pada pasien pascabedah karena penilaian skala secara verbal sehingga tidak terlalu memerlukan koordinasi visual dan motorik. Skala yang digunakan dapat berupa tidak nyeri, nyeri sedang, dan nyeri berat, atau menggunakan skala penurunan nyeri dengan pernyataan nyeri tidak berkurang, sedikit berkurang, cukup berkurang atau nyeri hilang.




Gambar 8.2: *Verbal Rating Scale*

Sumber: <https://i0.wp.com/images-prod.healthline.com/hlcmsresource/images/3667-pain-scales-verbal-1296x728-body.jpg?w=1155&h=619>

c. Numeric Rating Scale (NRS)

Penilaian nyeri menggunakan NRS dapat dilakukan untuk menilai nyeri akut namun sedikitnya pilihan kata untuk menggambarkan perasaan nyeri menyulitkan penialain tingkat nyeri secara lebih teliti dan terdapat jarak yang sama antar kata yang menggambarkan efek obat anti nyeri.



Gambar 8.3: *Numeric Rating Scale*

Sumber: https://www.physio-pedia.com/images/4/47/NRS_pain.jpg

d. Wong Baker Pain Rating Scale

Wong Baker Pain Rating Scale adalah penilaian nyeri menggunakan analogi ekspresi wajah. Penilaian ini dapat digunakan pada anak usia lebih dari 3 tahun dan usia dewasa yang tidak dapat menggambarkan penilaian nyeri menggunakan angka.



Gambar 8.4: *Wong Baker Pain Rating Scale*

Sumber: <https://pbs.twimg.com/media/CgmUojCVEAAR1ok.jpg>

4. Proses Terjadinya Nyeri

Mekanisme terjadinya nyeri melewati 4 tahap yakni: Transduksi, Transmisi, Persepsi dan Modulasi Nyeri (Lewis, Heitkemper, O'Brien, & Bucher, 2007 dalam Taylor, 2011).

a. Transduksi

Aktivasi reseptor rasa sakit disebut sebagai transduksi melalui rangsangan yang menyakitkan menyebabkan impuls listrik yang bergerak dari perifer ke sumsum tulang belakang di *dorsal horn*. Serat saraf perifer yang mengirimkan rasa sakit disebut *nosiseptor*. Selain itu, ketika ada jaringan yang terluka, dapat melepaskan bahan kimia yang merangsang atau mengaktifkan ujung saraf. Misalnya, sel yang rusak melepaskan histamin, yang merangsang ujung saraf. Zat lain juga dilepaskan yang merangsang *nosiseptor* atau reseptor rasa sakit. Ini termasuk *bradykinin*, *prostaglandin*, dan substansi P:

1) Bradykinin

Merupakan Vasodilator kuat yang meningkatkan permeabilitas kapiler dan menyempitkan otot polos, Ini juga memicu pelepasan histamin dan, dalam kombinasi dengan itu, menghasilkan kemerahan, pembengkakan, dan rasa sakit yang biasanya diamati ketika peradangan muncul.

2) Prostaglandin adalah zat mirip hormon yang mengirim rangsangan nyeri tambahan ke SSP.

3) Substansi P menyensor reseptor pada saraf untuk merasakan sakit dan juga meningkatkan kecepatan saraf.

b. Transmisi

Sensasi nyeri dari tempat cedera atau peradangan melalui jalur ke sumsum tulang belakang dan kemudian ke sistem saraf pusat yang lebih tinggi. Proses keseluruhan dikenal sebagai transmisi.

Impuls sensorik menuju medulla spinalis melalui ganglion akar dorsal ke dorsal horn medula spinalis. Pada titik ini, impuls saraf sensoris bersinapsis dengan neuron motorik, dan impuls tersebut melalui jalur saraf eferen kembali ke lokasi stimulus nyeri sehingga muncul gerakan reflex untuk menghindarkan diri dari penyebab.

c. Persepsi

Persepsi nyeri adalah kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, modulasi, aspek psikologis dan karakteristik individu lainnya. Reseptor nyeri adalah organ tubuh yang berfungsi menerima rangsangan nyeri. Organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung saraf bebas dalam kulit yang bere-spon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial merusak. Reseptor nyeri disebut juga nociseptor. Secara anatomis, reseptor nyeri (Nociseptor) ada yang bermiyelin ada juga yang tidak bermiyelin dari saraf afferent (Tamsuri, 2006 dalam Bahrudin, 2017).

d. Modulasi Nyeri

Proses dimana sensasi rasa sakit terhambat atau dimodifikasi disebut sebagai modulasi. Sensasi rasa sakit tampaknya diatur atau dimodifikasi oleh zat yang disebut neuromodulator. Neuromodulator ini adalah senyawa opioid endogen, yang berasal dari dalam tubuh se-

perti morfin di sumsum tulang belakang dan otak, yang memiliki aktivitas analgesik dan mengubah persepsi nyeri. Senyawa opioid endogen ini diyakini menghasilkan efek analgesiknya dengan mengikat reseptor dan menghalangi pelepasan atau produksi zat yang mentransmisikan rasa sakit. Endorfin dan enkephalin adalah neuromodulator opioid. Endorfin diproduksi di sinapsis saraf di berbagai titik di sepanjang jalur CNS. Mereka adalah bahan kimia penghilang rasa sakit yang kuat. Endorfin dapat dilepaskan ketika tindakan tertentu digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, seperti teknik stimulasi dan relaksasi kulit, dan ketika obat penghilang rasa sakit tertentu digunakan.

5. *Gate Control Theory*

Teorinya menyatakan itu terdapat serat saraf, yang berdiameter kecil, melakukan rangsangan nyeri rangsang ke otak, tetapi serat saraf dengan diameter besar dapat menghambat transmisi impuls nyeri dari sumsum tulang belakang ke otak. Tindakan keperawatan, seperti pijatan atau kompres hangat ke daerah punggung yang sakit dapat merangsang serat saraf besar untuk menutup gerbang, sehingga menghalangi impuls nyeri dari daerah tersebut, (Taylor, 2011).

6. **Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Persepsi Nyeri**

Seseorang mempersepsikan nyeri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya (Mubarak et al, 2015):

a. Budaya

Norma budaya menentukan sebagian besar perilaku, sikap, dan nilai-nilai kita sehari-hari. Oleh karena

itu, wajar jika budaya memengaruhi respons individu terhadap rasa sakit.

b. Tahap perkembangan

Usia dapat mempengaruhi reaksi seseorang terhadap nyeri. Usia dewasa lebih mampu mengekspresikan nyeri dibanding anak-anak, sementara prevalensi nyeri lebih tinggi ada usia lansia. Hal ini disebabkan karena adanya penyakit akut atau kronis yang diderita oleh lansia serta adanya proses degeneratif. Kurangnya kemampuan mengungkapkan nyeri pada anak menyebabkan penanganan nyeri dapat mengalami hambatan.

c. Lingkungan dan dukungan orang terdekat

Lingkungan individu dan ada atau tidak adanya dukungan dari orang terdekat dapat memengaruhi pengalaman rasa sakit. Beberapa penelitian bahwa kondisi lingkungan perawatan terutama lampu, kebisingan, kurang tidur, dan aktivitas konstan dari unit perawatan kritis, dapat menambah pengalaman rasa sakit. Rasa ketidakberdayaan juga dapat menurunkan kemampuan individu untuk mengatasi rasa sakit. Bagi sebagian orang, kehadiran anggota keluarga atau teman yang dicintai sangat berpengaruh penting bagi kondisi psikologi individu.

d. Pengalaman nyeri

Pengalaman nyeri yang pernah dialami sebelumnya atau melihat penderitaan orang terdekat yang mengalami nyeri dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap nyeri. Seseorang yang memiliki pengalaman nyeri dapat merasa lebih terancam dengan dengan kejadian nyeri yang akan dialami berikutnya dibanding-

kan dengan orang yang belum memiliki pengalaman nyeri.

e. Kecemasan

Kecemasan yang dialami seseorang dapat memperberat persepsi nyeri yang dialami dan mengalami penurunan kemampuan untuk melakukan manajemen nyeri.

f. Makna nyeri

Setiap orang dapat memperspesikan nyeri secara berbeda tergantung dari kemampuan seseorang beradaptasi terhadap nyeri dan memaknai nyeri yang dialami.

g. Perhatian

Perhatian yang berlebih atau terus menerus terhadap area nyeri dapat meningkatkan persepsi seseorang terhadap nyeri, sebaliknya dengan melakukan distraksi dapat menurunkan persepsi nyeri.

h. Keletihan

Keletihan yang dialami dapat meningkatkan persepsi nyeri dan menurunkan kemampuan pemilihan koping yang adaptif.

i. Mekanisme koping

Penggunaan mekanisme koping yang adaptif dapat menurunkan persepsi nyeri yang dialami seseorang.

j. Dukungan sosial dan keluarga

Dukungan dari orang-orang yang dicintai dapat meminimalkan kesedihan dan meningkatkan perasaan dicintai sehingga dapat meminimalkan ketakutan yang dialami.

N A S K A H S I A P C E T A K

C. Konsep Asuhan Keperawatan Kebutuhan Manajemen Nyeri

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian pemenuhan kebutuhan nyeri dan kenyamanan meliputi:

a. Keluhan utama

Keluhan utama berupa adanya nyeri atau perasaan tidak nyaman yang menyebabkan pasien mencari pertolongan.

b. Riwayat keperawatan sekarang

Pengkajian ini meliputi pernyataan pasien yang menjelaskan tentang alasan pasien yang menyebabkan terjadi keluhan yang dirasakan saat ini.

c. Riwayat Keperawatan Penyakit yang Pernah Diderita

Penyakit yang berhubungan dengan adanya nyeri meliputi riwayat penyakit sistem kardiovaskular, musculoskeletal, riwayat penyakit sistem pernafasan, dan lain-lain.

d. Pemeriksaan fisik (Data Fokus)

1) Lokasi

Pengkajian lokasi nyeri mencakup 2 dimensi : yakni tingkat nyeri dan posisi atau lokasi nyeri. Tingkat nyeri dapat berupa nyeri dalam atau nyeri superfisial. Nyeri superfisial dapat dengan mudah dan akurat ditunjukkan oleh pasien, sedangkan nyeri visceral atau nyeri yang lebih dalam biasanya dirasakan secara umum. Nyeri berdasarkan lokasi dapat dikategorikan menjadi:

- a) Nyeri terlokalisir, lokasi nyeri ini dapat jelas terlihat pada area asalnya.
- b) Nyeri terproyeksi, berupa nyeri sepanjang saraf atau serabut saraf spesifik.
- c) Nyeri radiasi: penyebaran nyeri sepanjang area asal yang tidak dapat dilokalisasi.
- d) *Referred Pain* atau disebut juga nyeri alih, merupakan nyeri yang dipersepsikan pada area yang jauh.

2) Intensitas

Intensitas nyeri dibagi menjadi nyeri ringan, sedang, dan berat. Perubahan dari intensitas nyeri ke arah yang lebih berat dapat menandakan adanya perubahan kondisi patologis pada pasien.

3) Waktu dan lama nyeri

Pencatatan waktu dan lama nyeri dapat berupa catatan mengenai kapan nyeri mulai timbul, berapa lama, bagaimana timbulnya, interval tanpa nyeri dan kapan nyeri terakhir timbul.

4) Kualitas

Kualitas nyeri dapat digambarkan menggunakan kalimat yang mudah dipahami, misalnya menggambarkan kualitas nyeri abdominal dengan kalimat “nyeri terasa seperti teriris pisau”.

Deskripsi menolong orang mengkomunikasikan kualitas dari nyeri. Anjurkan pasien menggunakan bahasa yang dia ketahui: nyeri kepala mungkin dikatakan “ada yang membentur kepalanya”, nyeri abdominal dikatakan “seperti teriris pisau”.

N A S K A H S I A P C E T A K

5) Skala nyeri

Pengukuran skala nyeri dengan menggunakan beberapa tools pengukuran yang ada seperti VAS, VRS, NRS, *Wong Baker Pain Rating Scale*, dll.

6) Perilaku nonverbal

Beberapa perilaku nonverbal yang dapat kita amati antara lain : ekspresi wajah, gemeretak gigi, mengigit bibir bawah dan lain-lain.

7) Faktor Prepitasi

Beberapa faktor presipitasi yang akan meningkatkan nyeri : lingkungan, suhu ekstrim, kegiatan yang tiba-tiba, stressor fisik dan emosi.

2. Diagnosis Keperawatan

Masalah 1: Nyeri Kronik

a. Definisi

Nyeri kronik merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang dirasakan seseorang berkaitan dengan adanya kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat, berintensitas ringan hingga berat, menetap, yang berlangsung lebih dari 3 bulan (SDKI, 2016).

b. Penyebab

Penyebab terjadinya nyeri kronik dapat berupa adanya kondisi musculoskeletal kronis, kerusakan sistem saraf, penekanan saraf, gangguan fungsi metabolik, riwayat posisi berkerja statis, tekanan emosional, adanya riwayat penganiayaan, penyalahgunaan obat, dan terjadinya gangguan imunitas.

c. Gejala dan tanda mayor

Subjektif: Mengeluh merasakan nyeri, merasa depresi.

Objektif: pasien tampak meringis, gelisah, dan tidak mampu menyelesaikan aktivitas.

d. Gejala dan tanda minor

Subjektif: pasien merasa takut mengalami cedera berulang.

Objektif: bersikap protektif, waspada, anoreksi, pola tidur berubah, fokus menyempit dan terkadang hanya berfokus pada diri sendiri.

e. Kondisi klinis terkait

- 1) Kondisi kronis.
- 2) Infeksi.
- 3) Cedera medulla spinalis.
- 4) Kondisi pasca trauma.
- 5) Tumor.

Masalah 2: Nyeri Akut

a. Definisi

Nyeri akut merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang dirasakan seseorang berkaitan dengan adanya kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat, berintensitas ringan hingga berat, menetap, yang berlangsung kurang dari 3 bulan (SDKI, 2016).

b. Penyebab

Nyeri akut dapat disebabkan oleh agen pencedera fisiologis, kimiawi, maupun agen fisik. Agen pencidera

fisiologis dapat berupa inflamasi, iskemia atau adanya neoplasma; agen kimiawi dapat berupa terbakar atau teritasi bahan kimia iritan; dan agen pencidera fisik dapat berupa adanya amputasi, prosedur operasi, trauma atau latihan fisik yang berlebihan.

c. Gejala dan tanda mayor

Subjektif: Mengeluh nyeri.

Objektif: Tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat dan mengalami kesulitan tidur.

d. Gejala dan tanda minor

Objektif: Tekanan darah meningkat, perubahan pola napas, perubahan nafsu makan, proses berfikir terganggu, menarik diri, mengalami diaphoresis, serta hanya berfokus pada diri sendiri.

e. Kondisi klinis terkait

- 1) Kondisi pembedahan.
- 2) Cedera traumatis.
- 3) Infeksi.
- 4) Sindrom koroner akut.
- 5) Glaucoma.

3. Intervensi Keperawatan

Perencanaan yang dapat dilakukan pada pasien yang mengalami nyeri dapat berupa (SIKI, 2018 ; SLKI, 2019):

Masalah 1: Nyeri Akut

Manajemen Nyeri

**N
A
S
K
A
H

S
I
A
P

C
E
T
A
K**

a. Tujuan dan kriteria hasil

Tujuan : nyeri berkurang, kenyamanan meningkat.

Kriteria Hasil

- 1) Keluhan nyeri menurun.
- 2) Meringis dapat menurun.
- 3) Gelisah dapat menurun.
- 4) Sikap protektif dapat menurun.

b. Intervensi keperawatan dan rasional

1) Observasi

- a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri.

Rasional : mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri dari pasien.

- b) Identifikasi skala nyeri.

Rasional : mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan pasien.

- c) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri.

Rasional : mengetahui hal-hal yang dapat memperberat ataupun memperingan nyeri yang dirasakan pasien.

- d) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup.

Rasional : mengetahui seberapa besar rasa nyeri mempengaruhi kualitas hidup pasien.

2) Terapeutik

- a) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (misalnya: Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam).

Rasional : mengurangi tingkat nyeri pasien/mengalihkan pasien dari rasa nyerinya.

- b) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri.

Rasional : mengurangi risiko faktor yang dapat memperberat nyeri/menimbulkan nyeri.

- c) Fasilitasi istirahat dan tidur

Rasional : mengalihkan dan memenuhi kebutuhan istirahat pasien.

3) Edukasi

- a) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri.

Rasional : memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan pasien.

- b) Jelaskan strategi mengatasi nyeri.

Rasional : membantu pasien mengatasi saat rasa nyeri muncul.

- c) Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri

Rasional : pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, penyebab, lokasi saat nyeri muncul.

- d) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri.

Rasional : memudahkan pasien untuk mengontrol nyeri dengan cara sederhana.

4) Kolaborasi

Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.

Rasional : mengurangi/menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien.

Masalah 2: Nyeri Kronik

Manajemen Nyeri

a. Tujuan dan kriteria hasil

Tujuan: nyeri berkurang

Kriteria Hasil

- 1) Keluhan nyeri menurun.
- 2) Meringis dapat menurun.
- 3) Gelisah dapat menurun.
- 4) Sikap protektif dapat menurun.

b. Intervensi keperawatan dan rasional

1) Observasi

- a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri.

Rasional : mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri dari pasien.

- b) Identifikasi skala nyeri

Rasional : mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan pasien.

- c) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri.

Rasional : mengetahui hal-hal yang dapat memperberat ataupun memperingan nyeri yang dirasakan pasien.

- d) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup.

Rasional : mengetahui seberapa besar rasa nyeri mempengaruhi kualitas hidup pasien.

2) Terapeutik

- a) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (misalnya: Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam).

Rasional : mengurangi tingkat nyeri pasien/mengalihkan pasien dari rasa nyerinya.

- b) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri.

Rasional : mengurangi risiko faktor yang dapat memperberat nyeri/menimbulkan nyeri.

- c) Fasilitasi istirahat dan tidur

Rasional : mengalihkan dan memenuhi kebutuhan istirahat pasien.

3) Edukasi

- a) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri.

Rasional : memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan pasien.

- b) Jelaskan strategi mengatasi nyeri.

Rasional : membantu pasien mengatasi saat rasa nyeri muncul.

- c) Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri.

Rasional : pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, penyebab, lokasi saat nyeri muncul.

- d) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri.

Rasional : memudahkan pasien untuk mengontrol nyeri dengan cara sederhana.

4) Kolaborasi

Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.

Rasional : mengurangi/menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien.


BAB 9

INTEGRITAS KULIT DAN LUKA

A. Integritas Kulit

1. Anatomi Dan Fisiologi Sistem Integumen

Kulit atau integumen dianggap sebagai organ karena terdiri atas dua jaringan yaitu jaringan ikat dan jaringan epitelium. Selain itu, pada kulit juga terdapat organ-organ aksesoris seperti kelenjar, rambut, dan kuku. Kumpulan dari organ inilah yang akan bersatu membentuk satu sistem yang disebut sebagai **sistem integumen**.



Gambar 9.1 Sistem Integumen

Sumber: <https://www.berbagaireviews.com/2018/06/sistem-integumen-pada-manusia-lengkap.html?m=0>

Kulit merupakan organ tubuh paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus organ-organ yang ada didalamnya. Luas kulit pada manusia $\pm$ 2 meter persegi dengan berat 15% dari berat badan seseorang. Kulit yang paling tebal terdapat pada telapak tangan dan kaki dengan ketebalan $\pm$ 60 mm dan kulit paling tipis terdapat pada penis dengan ketebalan $\pm$ 0.5 mm.

Kulit mempunyai daya regenerasi sel yang besar, contohnya pada saat terjadi luka, sel-sel dalam dermis akan melawan infeksi dan jaringan ikat akan mengalami regenerasi epitel yang tumbuh dari tepi luka menutupi jaringan ikat yang mengalami regenerasi sehingga terbentuk jaringan parut yang pada mulanya berwarna kemerahan karena meningkatnya jumlah kapiler dan akhirnya berubah menjadi serabut kolagen keputihan yang terlihat melalui epitel.

Anatomi Sistem Integumen

Sistem integumen merupakan sistem organ yang paling luas. Terdiri atas kulit dan aksesorinya, termasuk rambut, kuku, kelenjar (keringat dan sebaseous), dan reseptor saraf khusus yang berguna untuk stimulasi perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Sistem integumen berfungsi untuk melindungi struktur internal, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, mengatur suhu tubuh, melalui keringat melakukan proses ekskresi, melindungi bahaya sinar matahari, dan menghasilkan vitamin D.

a. Bagian-bagian dari anatomi fisiologi sistem integumen

1) Epidermis

Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Kulit luar ini jika dikumpulkan, maka akan menjadi organ terbesar dari tubuh manusia. Luas permukaannya sekitar 18 meter persegi. Memiliki beberapa lapisan yang mengandung empat jenis sel, yaitu :

a) Stratum korneum.

Lapisan ini terdiri dari banyak lapisan tanduk (keratinasi), gepeng, kering, tidak berinti, inti selnya sudah mati, dan mengandung zat keratin.

b) Stratum lusidum.

Bentuk selnya pipih, bedanya dengan stratum granulosum adalah sel-sel sudah banyak yang kehilangan inti dan butir-butir sel telah menjadi jernih sekali dan tembus sinar. Lapisan ini hanya terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki. Dalam lapisan terlihat seperti suatu pipa yang bening, batas-batas sel sudah tidak begitu terlihat disebut stratum lusidum.

c) Stratum granulosum.

Berbentuk seperti kumparan dengan inti ditengah dan sitoplasma berisi butiran (granula) keratohial atau gabungan keratin dengan hialin. Lapisan ini terdiri dari 2-3 lapis sel pipih. Lapisan ini berfungsi untuk menghalangi benda asing, kuman dan bahan kimia masuk ke dalam tubuh.

d) Stratum spinosum/stratum akantosum.

Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm terdiri dari 5-8 lapisan. Sel-selnya terdiri dari sel yang bentuknya polygonal/banyak sudut dari mempunyai tanduk (spina jika dilihat di bawah mikroskop, sehingga sel-selnya disebut spinosum. Berfungsi untuk menahan gesekan dan tekanan dari luar. Bentuknya tebal dan terdapat di daerah tubuh yang banyak bersentuhan atau menahan beban dan tekanan seperti tumit dan pangkal telapak kaki. Sel-selnya berduri sehingga disebut akan-tosum. Ternyata spina atau tanduk tersebut ada hubungan antara sel yang lain yang disebut *inter-celular bridges* atau jembatan interselular.

e) Stratum Basal/Germinativum.

Sel-selnya terletak dibagian basal/basis sehingga disebut stratum basal. Stratum germinativum menggantikan sel-sel yang di atasnya dan merupakan sel-sel induk. Bentuknya silindris (tabung) dengan inti yang lonjong dan pada bagian dalam terdapat butir-butir yang halus disebut butir melanin warna. Sel tersebut disusun seperti pagar pagar (palisade) dibagian bawah sel tersebut terdapat suatu membran disebut membran basalis, sel-sel basalis dengan membran basalis merupakan batas terbawah dari pada epidermis dengan dermis.

2) Dermis

Lapisan kulit yang berada di bawah epidermis adalah dermis. Kolagen (protein penguat), serat retikuler (serat protein yang berfungsi sebagai penyokong), dan serat elastis (protein yang berperan dalam elastisitas kulit) sebagai penyusun utamanya. Dermis merupakan lapisan kedua dari kulit, batas dengan epidermis dilapisi oleh membrane basalis dan di sebelah bawah berbatasan dengan subkutis tapi batas ini tidak jelas hanya diambil sebagai patokan yakni mulainya terdapat sel lemak.

Dermis terdiri dari 2 lapisan :

a) Bagian atas, Pars Papilaris (*stratum papilar*).

b) Bagian bawah, Retikularis (*stratum retikularis*).

Batas antara pars papilaris dengan pars retikularis adalah bagian bawahnya sampai ke subkutis. Baik pars papilaris maupun pars retikularis terdiri dari serabut-serabut yaitu serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut retikulus.

Serabut ini saling beranyaman dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda. Serabut kolagen, untuk memberikan kekuatan kepada kulit, serabut elastis untuk memberikan kelenturan pada kulit, dan retikulus terdapat terutama disekitar kelenjar dan folikel rambut dan memberikan kekuatan pada alat tersebut.

a) Unsur sel dermis

Fibroblast, makrofag, dan terdapat sel lemak yang berkelompok menjadi unsur utama sel dermis. Selain itu, ada juga sel jaringan ikat berca-

bang dan berpigmen pada lingkungan epidermis yang banyak mengandung pigmen misalnya areola mammae dan sekitar anus.

b) Serat otot

Serat otot polos dijumpai di dalam dermis tersusun membentuk berkas dihubungkan dengan folikel rambut (*muskulus erector fili*) bertebaran diseluruh dermis dalam jumlah yang cukup banyak pada kulit, puting susu, penis, skrotum dan sebagian perineum.

3) Hipodermis

Merupakan jaringan adiposa yang memberikan bantalan antara lapisan kulit dengan struktur internal seperti otot dan tulang. Terdapat pembuluh darah, saraf dan limfe dengan jaringan penyambung yang terisi sel lemak. Jaringan lemak bekerja sebagai penyekat panas dan menyediakan penyangga bagi lapisan kulit di atasnya.

Pembuluh darah kulit terdiri dari Subkutis terdiri dari kumpulan-kumpulan sel-sel lemak dan diantara gerombolan ini berjalan serabut-serabut jaringan ikat dermis. Sel-sel lemak ini bentuknya bulat dengan intinya terdesak ke pinggir, sehingga membentuk seperti cincin.

Lapisan lemak ini disebut perikulus adiposus, yang tebalnya tidak sama pada tiap-tiap tempat dan juga pembagiannya berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Guna perikulus adiposus adalah sebagai Shock breker (pegas) bila tekanan trauma mekanis yang me-

nimpa pada kulit, Isolator panas atau untuk mempertahankan suhu, penimbun kalori, dan tambahan untuk kecantikan tubuh. Di bawah subkutis terdapat selaput otot kemudian baru terdapat otot.

b. Jaringan kulit

Kulit disebut juga integumen atau kutis yang tumbuh dari dua macam jaringan yaitu jaringan epitel yang menumbuhkan lapisan epidermis dan jaringan pengikat (penunjang) yang menumbuhkan lapisan dermis (kulit dalam).

c. Kelenjar-kelenjar kulit

1) Kelenjar sebacea

Kelenjar ini berhubungan dengan folikel rambut yang bermuara dalam sebuah folikel rambut. Tidak berhubungan dengan folikel rambut bermuara langsung ke permukaan kulit seperti yang terdapat pada glans penis, labium minus, dan kelenjar tarsalia pada kelopak mata. Terletak dalam dermis dan tidak terdapat pada kulit telapak kaki dan tangan. Perkembangan dan pertumbuhan kelenjar sebacea terutama terjadi selama pubertas di bawah control hormone, sekresi sebum terjadi terus menerus dan bermanfaat untuk pemeliharaan kesehatan kulit.

2) Kelenjar keringat

Kelenjar keringat adalah kelenjar tubular bergelung yang tidak bercabang, terdapat pada seluruh kulit kecuali pada dasar kuku, batas bibir, glans penis dan gendang telinga. Kelenjar ini paling banyak terdapat pada telapak tangan dan kaki. Bagian sekretorisnya

terletak di dalam dermis atau hypodermis dan bergabung membentuk massa tersendiri.

Duktusnya keluar menuju epidermis dan berjalan berkelok-kelok menyatu dengan epidermis dan berjalan spiral untuk mencapai permukaan kulit. Tempat bermuaranya disebut pori keringat.

3) Kelenjar payudara (*glandula mammae*)

Glandula mammae termasuk kelenjar kulit karena berasal dari lapisan ektodermal yang secara fungsional termasuk sistem reproduksi. Kelenjar ini terletak di atas fascia pektoralis superfisilis yang dihubungkan dengan perantara jaringan ikat longgar dan jaringan lemak. Kelenjar ini melekat erat dengan kulit di atasnya. Disekitar puting susu (*papilla mammae*) terdapat reticulum kutis yang tumbuh dengan baik dan dinamakan ligamentum suspensorium. Ke dalam puting susu bermuara 15-20 duktuli laktiferus.

Disekitar *papilla mammae* terdapat areola mammae yang mengandung kelenjar sebacea *montgomeri* (*glandula areola mammae*) yang berfungsi untuk melindungi dan melicinkan puting susu pada waktu bayi mengisap. Pada wanita yang tidak hamil dan tidak menyusui, alveoli tampak kecil dan padat berisi sel-sel granular. Pada waktu hamil, alveoli akan membesar dan sel-sel membesar.

d. Pigmentasi kulit

Perbedaan warna kulit disebabkan oleh karena perbedaan jumlah dan ukuran melanosom di dalam keratinosit sehingga warna kulit ditentukan oleh faktor warna

kulitnya sendiri. Kandungan karoten (pigmen) darah pada pembuluh darah, dermis memberikan warna kemerahan dan kandungan pigmen melanin memberikan bayangan coklat. Melanin terletak di dalam lapisan basal dan bagian bawah lapisan taju yang dibuat oleh epidermis khusus yaitu melanosit yang bertebaran di antara keratinosit lapis basal dan lapis taju dalam folikel rambut dan jaringan ikat dermis.

Pigmentasi kulit tergantung dari berbagai faktor yaitu keturunan, hormon, dan lingkungan. Faktor genetik mempengaruhi ukuran satuan melanin epidermis. Hormon pemacu melanosit MSH (*melanosit stimulating hormon*) merangsang perpindahan melanosom ke dalam cabang-cabang sitoplasma melanosit dan keratinosit. Faktor lingkungan seperti ultraviolet meningkatkan kegiatan enzim melanosit serta meningkatkan produksi melanin dan penimbunannya di dalam keratinosit sehingga kulit menjadi coklat. Warna kulit dipengaruhi oleh pembuluh darah pada kulit, banyak sedikitnya lemak, dan pigmen kulit yang disebut melanin.

Tetapi secara penyebab maka perbedaan warna kulit terjadi akibat faktor sebagai berikut :

- 1) Melanosit terletak pada stratum basale (lapisan paling dalam epidermis) yang memproduksi pigmen yang memberi warna pada kulit dari coklat sampai hitam. Peningkatan produksi melanin berlangsung jika terpajan sinar matahari. Area tempat terjadinya pigmentasi yang besar adalah puting susu, areola dan area sirkumanal, scrotum, penis dan labia mayora. Sedangkan yang mengandung sedikit pigmen adalah telapak tangan kaki dan telapak tangan.

- 2) Darah terdapat pada pembuluh dermal di bawah lapisan epidermis yang dapat terlihat dari permukaan dan menghasilkan pewarnaan merah muda terutama terlihat pada orang kulit putih.
- 3) Keberadaan dan jumlah pigmen kuning (karotin) hanya ditemukan stratum korneum dan dalam sel lemak dermis dan hypodermis yang menyebabkan beberapa perbedaan pada pewarnaan kulit.

e. Pembuluh darah

Peredaran darah dalam kulit adalah penting sekali oleh karena diperkirakan 1/5 dari darah yang beredar melalui kulit. Disamping itu pembuluh darah pada kulit sangat cepat menyempit/melebar oleh pengaruh atau rangsangan panas, dingin, tekanan sakit, nyeri dan emosi, penyempitan dan pelebaran ini terjadi secara refleks. Terbagi atas;

- 1) Anyaman pembuluh nadi kulit atas atau luar.

Anyaman ini terdapat antara stratum papilaris dan stratum retikularis, dari anyaman ini berjalan arteri-ole pada tiap-tiap papilla kori.

- 2) Anyaman pembuluh darah nadi kulit bawah atau dalam.

Anyaman ini terdapat antar korium dan subkutis, anyaman ini memberikan cabang-cabang pembuluh nadi ke alat-alat tambahan yang terdapat di korium. Dalam hal ini percabangan juga membentuk anyaman pembuluh nadi yang terdapat pada lapisan subkutis. Cabang-cabang ini kemudian akan menjadi pembuluh darah balik/vena yang juga akan membentuk anyaman, yaitu anyaman pembuluh darah balik yang ke dalam.

f. Saraf kulit

Pada kulit terdapat cabang-cabang saraf spinal dan permukaan yang terdiri dari saraf-saraf motorik dan saraf sensorik. Ujung saraf motorik berguna untuk menggerakkan sel-sel otot yang terdapat pada kulit, sedangkan saraf sensorik berguna untuk menerima rangsangan yang terdapat dari luar atau kulit. Pada kulit ujung-ujung, saraf sensorik ini membentuk bermacam-macam kegiatan untuk menerima rangsangan. Ujung-ujung saraf yang bebas untuk menerima rangsangan sakit/nyeri banyak terdapat di epidermis, disini ujung-ujung sarafnya mempunyai bentuk yang khas yang sudah merupakan suatu organ.

g. Pelengkap kulit


- 1) Rambut

Rambut hampir terdapat pada seluruh kulit, kecuali pada bagian telapak tangan, telapak kaki, dan kulit penis. Rambut berfungsi sebagai pendorong proses penguapan pada kulit. Rambut tumbuh dari folikel rambut didalam epidermis, folikel rambut dibatasi oleh epidermis sebelah atas dasarnya terdapat papil tempat rambut, akar berada di dalam folikel pada ujung paling dalam dan bagian sebelah luar disebut batang rambut, pada folikel rambut terdapat musculus arektor pili yang berfungsi untuk menegakkan rambut.

Ada beberapa bentuk rambut yaitu :

- Rambut panjang di kepala, pubis dan jenggot.
- Rambut pendek di lubang hidung, liang telinga dan alis.

- Rambut bulu lanugo di seluruh tubuh.
- Rambut seksual di pubis dan aksila.



Gambar 9.2 Struktur Rambut

Sumber: <https://kependidikan.com/perbedaan-bulu-dan-rambut/>

Struktur rambut terdiri atas :

- Batang rambut adalah bagian yang terlihat pada permukaan kulit.
- Akar rambut adalah bagian rambut yang menembus epidermis dan dermis.
- Folikel rambut adalah selaput yang membungkus rambut di dalam kulit.
- Umbi lapis atau bulb adalah bagian dasar dari folikel rambut.
- Matriks adalah bagian dasar folikel rambut yang membela diri menghasilkan sel-sel rambut yang baru.

N A S K A H S I A P C E T A K

- Musculus arector pili adalah otot yang menegakkan rambut.

2) Kuku

Kuku adalah sel epidermis kulit yang mengalami keratinisasi yang telah berubah tertanam dalam palung kuku menutup garis lekukan pada kulit. Palung kuku mendapat persarafan dan pembuluh darah yang banyak. Kuku berfungsi sebagai pelindung ujung jari tangan dan kaki.

Kuku terdiri atas beberapa bagian yaitu :

- Ujung kuku atas.
- Badan kuku yang merupakan bagian yang besar.
- Akar kuku atau radiak.
- Matriks kuku adalah daerah sel germinal yang merupakan tempat tumbuhnya akar kuku.
- Bantalan kuku di bawah adalah lapisan epidermis tipis.
- Pulpa jari di bawah bantalan kuku dibentuk oleh jaringan ikat vaskular longgar.

3) Kelenjar-kelenjar (Glandula)


a) Glandula Sebacea (Kelenjar Minyak)

Kelenjar sebacea berasal dari rambut yang bermuara pada saluran folikel rambut yang berfungsi untuk melumasi rambut dan kulit. Kantong dari kelenjar minyak berada di dermis dan bentuknya seperti botol, bermuara di folikel rambut. Kelenjar sebacea mengeluarkan sebum, yaitu cairan yang terdiri dari lemak, zat lilin, minyak dan pecahan-pecahan sel yang berfungsi sebagai emolien atau pelembut kulit.

lit dan merupakan suatu barrier terhadap evaporasi. Kelenjar sebacea dapat terinfeksi sehingga menyebabkan furunkel (bisul).

b) Kelenjar Keringat

Kelenjar keringat adalah tube tunggal yang tergulung dan terletak pada jaringan subkutan dan dengan saluran yang panjang yang terbuka pada permukaan kulit. Sekresi aktif dari kelenjar keringat dibawah pengendalian saraf simpatis. Keringat berisi air dan sedikit garam, melalui difusi secara sederhana kurang lebih 500 cc perhari.



Gambar 9.3 Kelenjar Keringat

Sumber: <https://www.scribd.com/Document/68160747/Kelenjar-Keringat>

Ada empat macam kelenjar keringat yaitu :

- i. Kelenjar ekrin, penyebarannya meluas keseluruhan tubuh, dan menyekresi cairan berair melalui pori-pori kulit, yang berfungsi mendinginkan kulit ketika menguap.

- ii. Kelenjar apokrin, berada di bawah ketiak dan daerah pubik dan aktif pada saat masa dan setelah pubertas, menyekresikan cairan sebagai tanggapan terhadap tekanan atau ketertarikan seksual. Cairan ini lebih kental dari pada cairan yang disekresikan oleh kelenjar ekrin, dan dikeluarkan melalui muara rambut.
- iii. Kelenjar serumin, yang menyekresikan kotoran telinga (serumen) kedalam saluran telinga luar. Serumen ini berfungsi mencegah masuknya benda asing ke telinga.
- iv. *Glandula mammae* menghasilkan susu yang dikeluarkan melalui puting susu.

2. Fisiologi Sistem Integumen

a. Sebagai Pelindung (proteksi)

Epidermis terutama lapisan tanduk berguna untuk menutupi jaringan-jaringan tubuh disebelah dalam dan melindungi tubuh dari pengaruh luar seperti luka dan serangan mikroorganisme. Lapisan paling luar dari dermis dilapisi dengan lapisan tipis lemak, sehingga kulit tahan air. Kulit dapat menahan suhu tinggi dari luar, sehingga suhu tersebut tidak langsung terpapar ke organ didalam kulit. Selain itu, kulit juga dapat mencegah zat kimia masuk kedalam tubuh dan menghalau sinar ultraviolet dari matahari.

Secara spesifik terdapat beberapa kemampuan perlindungan dari kulit yaitu sebagai berikut :

- 1) Kulit adalah relatif tak tertembus air, sehingga tidak terjadi kehilangan air dari jaringan dan juga mencegah masuknya air ke jaringan.

- 2) Kulit melindungi struktur internal dari tubuh terhadap trauma tekanan, trauma suhu, dan trauma mekanik yang membahayakan.
- 3) Kulit melindungi struktur internal dari tubuh terhadap invasi oleh mikroorganisme.
- 4) Kulit mengandung pigmen melanin yang melindungi tubuh terhadap sinar ultraviolet.
- 5) Kulit memiliki kelenjar keringat yang bersifat asam, sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit.

b. Sebagai Indera Peraba

Kulit sangat peka terhadap berbagai rangsangan sensorik yang berhubungan dengan sakit, suhu, tekanan, rabaan, dan getaran. Kulit sebagai alat peraba dirasakan melalui ujung-ujung saraf sensasi dan ditransmisikan melalui saraf sensorik ke medulla spinalis dan otak.

c. Termoregulasi atau Sebagai Alat Pengatur Panas

Suhu tubuh seseorang adalah tetap, meskipun terjadi perubahan suhu lingkungan. Suhu normal tubuh, yaitu suhu visera dan otak ialah 36°C sampai $37,5^{\circ}\text{C}$, suhu kulit sedikit lebih rendah.

Jika terjadi perubahan suhu lingkungan, maka kulit akan mempertahankan suhu tubuh dengan dua cara sebagai berikut :

- **Vasodilatasi**, kulit melebar, kulit menjadi panas, kelebihan panas dipancarkan ke kelenjar keringat sehingga terjadi penguapan cairan pada permukaan tubuh.

- **Vasokonstriksi**, pembuluh darah mengerut, kulit pucat dan dingin, hilangnya keringat dibatasi dan panas suhu tubuh tidak dikeluarkan.

Panas dapat dilepaskan oleh kulit dengan cara penguapan, pemancaran (dengan melepas panas pada udara sekitarnya), konduksi (panas dialihkan ke benda yang bersentuhan dengan kulit seperti kain), dan konveksi (mengalirnya udara panas yang menyebabkan pengurangan panas pada tubuh).

d. Sebagai Tempat Penyimpanan

Kulit berfungsi sebagai alat penampung air dan lemak, yang dapat melepaskannya saat diperlukan.

e. Sebagai Alat Absorpsi

Kulit dapat menyerap zat-zat tertentu, terutama zat-zat yang larut dalam lemak. Penyerapan ini dapat terjadi melalui muara kandung rambut dan masuk kedalam saluran glandula sebacea (kelenjar minyak), merembes melalui dinding pembuluh darah, masuk kedalam peredaran darah dan disalurkan ke organ tubuh lainnya.

f. Sebagai Alat Ekskresi

Dikatakan sebagai alat ekskresi karena kulit dapat mengeluarkan zat-zat tertentu seperti garam, amonia dan urea yang sering disebut dengan keringat.

g. Metabolisme Vitamin D

Ketika kulit terkena sinar matahari langsung, tubuh akan memproduksi vitamin D dengan membakar kolesterol yang ada di sel kulit. Inilah sebabnya, paparan sinar matahari dalam jumlah yang tepat dianggap sangat penting untuk menjaga kadar vitamin D dalam tubuh.

B. Luka _____.

1. Definisi Luka

Luka merupakan suatu permasalahan medis yang paling sering kita temui. Mulai dari luka ringan terkena benda tajam, terjatuh atau bahkan yang lebih parah seperti luka akibat kekerasan, akibat dari kecelakaan berkendara hingga jatuh dari ketinggian. Luka dapat terjadi di mana saja dan kapan saja sehingga dan kadang tidak disadari bahayanya (Ansori, Muhammad. 2015).

Kulit merupakan bagian dari struktur tubuh yang terluar yang berfungsi untuk menjaga dari trauma ataupun sebagai pertahanan dari benda asing. Mekanisme trauma yang terjadi pada kulit dapat menyebabkan rusaknya kontinuitas kulit yang menimbulkan luka/vulnus (Delima, 2013). Vulnus, nama lain dari luka merupakan kondisi dimana kontinuitas jaringan yang rusak akibat trauma, kimiawi, listrik radiasi (Reksoprodjo, 2010) Vulnus atau luka adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal dan mengenai organ tertentu (Potter & Parry, 2010).

Luka merupakan kondisi tubuh yang kehilangan atau mengalami kerusakan jaringan dikarenakan faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang bisa menyebabkan kerusakan jaringan adalah obat, perubahan proses metabolisme, perubahan sirkulasi, oksigen gagal terdistribusi serta terjadinya infeksi. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kerusakan jaringan diantaranya suhu yang ekstrim, terpaparnya dengan zat-zat kimia, radiasi, injury serta munculnya alergen (Potter & Perry, 2009).

Menurut waktu penyembuhan, pembagian luka dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu :

- Luka akut, merupakan luka yang proses penyembuhannya menurut waktu pada konsep penyembuhan luka.
- Luka kronik, merupakan luka yang proses penyembuhannya di luar dari waktu penyembuhan luka yang telah terkonsep (Potter & Perry, 2009).

2. Klasifikasi Luka

Menurut derajat yang terkontaminasi

- Luka bersih
Luka sayat efektif dan steril biasanya disebut sebagai luka bersih sebab luka ini tidak terdapat inflamasi atau infeksi yang merupakan luka sayat efektif dan steril dimana luka ini dikategorikan bersih jika tidak ada kontak dengan organ orofaring, traktus respiratorius ataupun traktus genitourinarius. Dengan demikian kondisi luka tersebut tetap dalam keadaan bersih. Derajat infeksi luka itu sebesar 1%-5% saja
- Luka bersih terkontaminasi
Luka pembedahan namun traktus respiratorius, traktus pencernaan atau traktus perkemihan mengalami luka pembedahan namun kondisi luka dalam keadaan terkontrol. Walaupun proses luka akan lebih lama namun tidak ada tanda infeksi. Derajat infeksi luka sekitar 3%-11%.

c. Luka terkontaminasi

Luka terkontaminasi paling sering ditemukan pada luka yang terbuka yang disebabkan trauma atau karena kecelakaan/luka laserasi, fraktur terbuka ataupun luka penetrasi. Luka terkontaminasi merupakan luka yang mungkin berpotensi terinfeksi spillage saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran kemih.

d. Luka kotor

Luka yang lama, luka karena kecelakaan dan mengandung jaringan mati dan luka tanda infeksi seperti cairan purulent biasa disebut dengan luka kotor. Luka ini juga mungkin disebabkan akibat pembedahan yang mungkin sudah sangat terkontaminasi. Bentuk luka biasanya berporfasi visera, abses dan trauma lama.

3. Penyembuhan Luka

Proses penyembuhan luka merupakan sebuah perjalanan yang kompleks dan senantiasa berubah yang menghasilkan perbaikan anatomi dan fisiologis secara berkelanjutan (Black & Hawks, 2009). Setelah terjadinya luka maka fungsi tubuh tidak akan maksimal, untuk mengatasi hal ini maka tubuh akan melakukan proses metabolisme untuk memperbaiki kembali jaringan tubuh yang telah rusak.

Fase-fase yang terjadi pada saat penyembuhan luka menurut Suriadi, dkk (2006) adalah:

a. Fase inflamasi atau *long fase*

Respon inflamasi akut terjadi beberapa jam setelah cedera, dan efeknya bertahan hingga 5-7 hari. Kerusakan jaringan dan teraktivasi faktor pembekuan menyebabkan pelepasan berbagai substansi

vaso aktif, seperti prostaglandin dan histamin, mengakibatkan peningkatan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, serta stimulasi serat-serat nyeri. Bekuan fibrin menarik leukosit, dan dalam 24 jam pertama muncul terutama neutrofil (sel scavenger ketika berada dalam jaringan, sel ini disebut makrofag). Makrofag memiliki peran penting dalam sebagian besar fase penyembuhan luka, tidak hanya dalam membersihkan sisi yang luka tetapi juga untuk memproduksi faktor pertumbuhan dan substansi lainnya yang mengendalikan proses tersebut. Kapiler-kapiler baru mulai tumbuh ke dalam luka (angiogenesis), menghasilkan pembentukan matriks jaringan penghubung yang baru.

b. Fase Proliferasi atau fibroblast

Selama fase proliferasi, pembentukan pembuluh darah yang baru berlanjut disepanjang luka (angiogenesis atau neo vaskularisasi). Proses ini sangat penting, karena tidak ada jaringan baru yang dapat dibentuk tanpa suplay oksigen dan nutrisi yang di bawah oleh pembuluh darah yang baru. Fibroblas berproliferasi kira-kira 2-4 hari setelah cedera, dan memproduksi matriks (struktur seperti tangga) kolagen di sekitar pembuluh darah yang baru. Sel epitel bermigrasi seperti sebuah lembar yang berpindah sempurna atau dengan “lompatan seperti katak” di sepanjang jaringan yang hidup. Hal lain yang juga berkontribusi terhadap menutupnya luka adalah kontraksi tepi luka, yang akan mengurangi ukuran luka melalui kerja miofibroblas.

Durasi pada fase ini berlangsung 3-6 minggu. Tersifat oleh proses preforasi. Luka yang terjadi mengkerut dan

mengecil sebab serat-serat baru yang terbentuk, diatur dan mengkerut yang tidak perlu dihancurkan. Pada tahap ini luka akan diisi oleh sel radang, fibroblast, kapiler baru, serat kolagen dan terbentuk jaringan yang kemerahan dengan permukaan yang tidak rata jaringan ini disebut dengan jaringan granulasi. Jaringan granulasi akan berhenti setelah seluruh permukaan tersebut tertutupi oleh epitel maka terbentuklah proses penyembuhan luka (Ganong, 2012).

c. Fase *remodelling* atau fase resopsi

Bekuan fibrin awal digantikan oleh jaringan granulasi yang, setelah jaringan granulasi meluas sehingga memenuhi defek dan defek tertutupi oleh permukaan epidermal yang dapat bekerja dengan baik, mengalami *remodelling*. Hal ini biasanya terjadi kira-kira 20 hari setelah cedera, walaupun waktu tersebut bervariasi tergantung pada kondisi individu. Selain itu, selama *remodelling*, kolagen yang berlebihan dibersihkan, dan kolagen yang di butuhkan secara bertahap di gantikan dengan kolagen yang lebih kuat dan lebih teratur yang lebih dibutuhkan oleh orang yang lebih tua sepanjang stress mekanis, walau tidak teratur aslinya. Fase *remodelling* dimulai padawaktu yang berbeda dalam area luka yang berbeda, dan fase ini dapat berlanjut hingga satu tahun atau bahkan lebih lama. Dengan demikian, walaupun luka tampak sembuh secara superfisial, proses membangun kembali di bagian bawah tetap berlanjut.

4. Tipe Penyembuhan Luka

Tipe penyembuhan luka ada tiga fase yang digolongkan sebagai jumlah jaringan yang hilang.

- Primary Intention Healing (penyembuhan luka primer) adalah penyembuhan yang terjadi setelah sisi luka saling bertaut dan durasi penyembuhan luka ini terjadi secepat mungkin.
- Secondary Intention Healing* (penyembuhan luka sekunder) adalah luka yang tidak mengalami *Primary Intention Healing*.
- Tertiary Intention Healing* (penyembuhan luka tertier) luka yang dibiarkan setelah tindakan debridement lalu sisi luka dipertautkan sekitar 4-7 hari dan tipe ini merupakan tipe penyembuhan yang terakhir (Mansjoer, 2001).

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka

Dalam proses penyembuhan luka terjadi proses yang kompleks dan dinamis antara kegiatan bioseluler dan biokimia yang bereksinambungan. Dan juga terjadi disebabkan oleh dua faktor:

- Faktor dari penderita yang sering disebut dengan faktor instrinstik yang meliputi : usia, status nutrisi dan hidrasi, oksigenasi dan perfusi jaringan, status imunologi, dan penyakit penyerta (hipertensi, DM, Arthereosclerosis).
- Faktor dari luar penderita yang disebut dengan faktor ekstrinsik meliputi : pengobatan, radiasi, stres psikologis, infeksi, iskemia dan trauma jaringan.

6. Komplikasi Luka

- Kerusakan Arteri: Pecahnya arteri karena trauma bisa ditandai dengan tidak adanya nadi, CRT menurun, cyanosis bagian distal, hematoma yang lebar, dan dingin pada ekstremitas yang disebabkan oleh tindakan emergensi splinting, perubahan posisi pada yang sakit, tindakan reduksi, dan pembedahan.
- Kompartement Syndrom*: *Kompartement Syndrom* merupakan komplikasi serius yang terjadi karena terjebaknya otot, tulang, saraf, dan pembuluh darah dalam jaringan parut. Ini disebabkan oleh oedema atau perdarahan yang menekan otot, saraf, dan pembuluh darah.
- Infeksi: Sistem pertahanan tubuh rusak bila ada trauma pada jaringan.
- Shock*: *Shock* terjadi karena kehilangan banyak darah dan meningkatnya permeabilitas kapiler yang bisa menyebabkan menurunnya oksigenasi (Agus, Dewa. 2016).

7. Pencegahan

a. Tindakan Antiseptik

Dengan membersihkan luka menggunakan larutan antiseptik seperti halogen, alkohol. Tujuannya untuk mengurangi kemungkinan infeksi pada luka, mempercepat proses penyembuhan luka dan menghilangkan jaringan yang nekrosis.

b. Membalut luka

Untuk mengupayakan kondisi lingkungan yang baik pada luka sehingga proses penyembuhan berlangsung optimal.

c. Pemberian antibiotik

Pemberian antibiotik tergantung pada jenis luka apakah bersih atau tidak. Pada luka kotor maka dapat diberikan antibiotik (Agus, Dewa. 2016).

8. Penatalaksanaan

a. Penatalaksanaan pada luka

- Hemostasis : Mengontrol pendarahan akibat laserasi dengan cara menekan luka dengan menggunakan balutan steril. Setelah pendarahan reda, tempelkan sepotong perban perekat atau kasa diatas luka laserasi sehingga memungkinkan tepi luka menutup dan bekuan darah terbentuk. Luka laserasi yang lebih serius harus di jahit oleh dokter.
- Pembersihan luka.
- Faktor pertumbuhan (penggunaan obat).
- Perlindungan : Memberikan balutan steril atau bersih dan memobilisasi bagian tubuh.
- Berikan profilaksis tetanus sesuai ketentuan, berdasarkan kondisi luka dan status imunisasi pasien.

b. Penatalaksanaan pada pasien :

- Penggunaan universal standar *precaution*.
- Perhatikan kepatenan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi.
- Melengkapi pengkajian survey primer dengan cara mengevaluasi tingkat kesadaran pasien, ukuran, dan reaksi pupil.
- Mengidentifikasi adanya luka lain yang mungkin memerlukan perawatan.

- 5) Mengontrol pendarahan dengan cara penekanan langsung pada area luka, elevasi.
 - 6) Mengidentifikasi adanya syok hemoragik.
 - 7) Mengkaji status imunisasi tetanus pada pasien.
- Menilai kondisi hipotermia, terutama pada saat kulit kehilangan bagian yang luas (Agus, Dewa. 2016).

1. VULNUS AMPITATUM

KONSEP MEDIS

a. Defenisi

Vulnus ampitatum yang sering disebut dengan luka potong yang sering disebabkan oleh benda-benda tajam ukuran besar seperti gergaji dimana luka mengakibatkan perdarahan hebat dan risiko infeksi tinggi. Luka yang terjadi membentuk organ yang sesuai seperti dipotong.

Ampitatum merupakan luka yang disebabkan oleh terpotongnya salah satu bagian tubuh kita sehingga terpisah dari badan atau tubuh dengan penyebabnya adalah beberapa benda tajam yang berukuran besar atau berat. Luka membentuk organ yang sesuai seperti dipotong. Vulnus ampitatum adalah luka yang diakibatkan terputusnya salah satu bagian tubuh, biasa dikenal dengan amputasi.

b. Etiologi

- 1) Luka terbuka yang disebabkan oleh trauma benda yang tajam.
- 2) Luka tertutup yang disebabkan oleh trauma benda yang tumpul.

N A S K A H S I A P C E T A K

- 3) Zat berbahaya kimia.
- 4) Radiasi.
- 5) Sengatan listrik.
- 6) Ledakan perubahan suhu.
- 7) Gigitan hewan.
- 8) Benda tajam.

c. Klasifikasi

Berdasarkan pelaksanaan amputasi, dibedakan menjadi :

1) Amputasi selektif/terencana

Amputasi jenis ini dilakukan pada penyakit yang terdiagnosis dan mendapat penanganan yang baik serta terpantau secara terus-menerus. Amputasi dilakukan sebagai salah satu tindakan alternatif terakhir.

2) Amputasi akibat trauma

Merupakan amputasi yang terjadi sebagai akibat trauma dan tidak direncanakan. Kegiatan tim kesehatan adalah memperbaiki kondisi lokasi amputasi serta memperbaiki kondisi umum klien.

3) Amputasi darurat

Kegiatan amputasi dilakukan secara darurat oleh tim kesehatan. Biasanya merupakan tindakan yang memerlukan kerja yang cepat seperti pada trauma dengan patah tulang multiple dan kerusakan/kehilangan kulit yang luas.

Setelah dilakukan tindakan pemotongan, maka kegiatan selanjutnya meliputi perawatan luka operasi/mencegah

terjadinya infeksi, menjaga kekuatan otot/mencegah kontraktur, mempertahankan intaks jaringan.

d. Manifestasi Klinis

1) Gejala lokal

- a) Nyeri terjadi karena kerusakan ujung-ujung saraf sensoris, intensitas atau derajat terasa nyeri berbeda tergantung pada berat luka atau luas kerusakan ujung saraf dan lokasi luka.
- b) Perdarahan hebat, hebatnya perdarahan tergantung pada lokasi luka dan jenis pembuluh darah yang rusak.
- c) Diastate, luka yang menganga atau tepinya yang melebar.
- d) Gangguan fungsi, fungsi anggota badan akan terganggu, baik oleh karena rasa nyeri atau kerusakan tendon.
- e) Keterbatasan fisik.
- f) Pantom syndrome.
- g) Pasien mmengatakan terdapat perasaan yang tidak nyaman.
- h) Terdapat gangguan citra tubuh.

2) Gejala Umum

Gejala atau tanda umum pada perlukaan dapat terjadi akibat komplikasi yang terjadi seperti syok, akibat nyeri atau perdarahan yang hebat.

e. Pemeriksaan Diagnostik

- 1) ECG.
- 2) Foto Rontgen

N A S K A H S I A P C E T A K

Bertujuan untuk mengetahui ketidaknormalan tulang.

3) CT Scan

Bertujuan untuk mengidentifikasi lesi neoplastik, osteomielitis, pembentukan hematoma.

4) Angiografi dan pemeriksaan aliran darah

Untuk mengevaluasi perubahan sirkulasi/perfusi jaringan dan membantu memperkirakan potensial penyembuhan jaringan setelah amputasi.

5) Kultur luka

Untuk mengidentifikasi adanya infeksi dan organisme penyebab.

6) Biopsy

Untuk mengkonfirmasi diagnosa benigna/maligna.

7) LED

Untuk mengetahui peninggian mengidentifikasi respon inflamasi.

8) Hitung darah lengkap/deferensial

Untuk mengetahui peninggian dan perpindahan ke kiri diduga proses infeksi.

2. VULNUS ICTUM

KONSEP MEDIS

a. Definisi

Vulnus Ictum adalah luka kecil dengan dasar yang sukar dilihat disebabkan oleh tertusuk paku atau benda yang runcing, lukanya kecil, dasar sukar dilihat, tetapi pada luka ini kuman tetanus gampang masuk. Penyebabnya adalah benda runcing tajam atau benda yang

menembus ke dalam kulit, luka kelihatannya mungkin menyebabkan kerusakan yang kecil namun terdapat kerusakan berat di dalamnya.

b. Etiologi

Luka tusuk dapat disebabkan oleh :

- 1) Benda tajam dengan arah lurus pada kulit.
- 2) Suatu gerakan aktif maju yang cepat atau dorongan pada tubuh dengan suatu alat yang ujungnya panjang.

Berat ringannya luka tusuk tergantung dari lokasi anatomi injury.

c. Manifestasi Klinis

1) Gejala Lokal

- a) Sakit yang ditandai dengan nyeri jika terdapat kerusakan di area ujung saraf sensoris. Beratnya tingkat nyeri yang dirasakan tidak bisa dipastikan sesuai dengan berat dan luas luka yang ditimbulkan.
- b) Setelah itu, pada umumnya akan timbul perdarahan. Banyaknya perdarahan tergantung pada lokasi luka, jenis, pembuluh darah yang rusak.
- c) Gangguan fungsi, fungsi anggota badan akan terganggu oleh karena rasa nyeri.

2) Gejala umum:

Gejala-tanda umum pada perlukaan dapat terjadi akibat komplikasi yang terjadi seperti syok akibat nyeri dan atau perdarahan yang hebat.

d. Pemeriksaan Diagnostik

Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan terutama jenis tes darah lengkap untuk mengetahui terjadinya infeksi. Pemeriksaan X-ray Jika terdapat fraktur atau dicurigai terdapat benda asing (Kartika, 2011).

1) Hitung darah lengkap

Peningkatan hematokrit (Ht) awal menunjukkan hemokonsentrasi sehubungan dengan perpindahan kehilangan cairan. Selanjutnya penurunan Ht dan SDM dapat terjadi sehubungan dengan kerusakan oleh panas terhadap endothelium pembuluh darah.

2) GDA

Penurunan PaO₂/peningkatan PaCo₂ mungkin terjadi pada retensi karbonmonoksida. Asidosis dapat terjadi sehubungan dengan penurunan ginjal dan kehilangan mekanisme kompensasi pernapasan.

3) Elektrolit serum

Kalium dapat meningkat pada awal sehubungan dengan cedera jaringan-kerusakan SDM dan penurunan fungsi ginjal.

4) Urine

Adanya albumin, Hb, dan immunoglobulin menunjukkan kerusakan jaringan dalam dan kehilangan protein. Warna hitam kemerahan pada urine sehubungan dengan mioglobulin.

5) Bronkoskopi

Berguna dalam diagnose luas cedera inhalasi, hasil dapat meliputi edema, pendarahan, dan tukak pada saluran pernapasan.

6) EKG

Tanda iskemia miokardial-disritmia dapat terjadi pada luka bakar listrik.

3. VULNUS INCISIVUM

KONSEP MEDIS

a. Defenisi

Beberapa jenis mekanisme trauma baik yang bersifat kimiawi, listrik maupun radiasi dapat menyebabkan terputusnya atau rusaknya kontinuitas jaringan sehingga menyebabkan vulnus atau luka sehingga beberapa fungsi tubuh mungkin dapat terganggu (Purnama, 2015). Seperti trauma yang disebabkan oleh sayatan benda tajam atau tusukan jarum yang menyebabkan luka terbuka yang disebut dengan *Vulnus Incisivum* (Febriana, 2019).

b. Etiologi

Penyebab dari *vulnus incisivum* menurut Delima, (2013) yakni

- 1) Sayatan benda tajam.
- 2) Luka dari tindakan invasive.

c. Patofisiologi

Beberapa mekanisme dari *Vulnus Incivum* biasanya dilakukan dengan sengaja sebagai tindakan dalam membuat sayatan ataupun saat penusukan jarum pada prosedur invasive pada prosedur pengobatan. Saat terjadi luka akibat prosedur invasive biasanya akan menimbulkan reaksi inflamasi sebagai bagian dari mekanisme pertahanan tubuh akibat jaringan yang terputus, jika prosedur invasive yang dilakukan tidak sesuai

dengan standar prosedur dan tidak memperhatikan prinsip steril maka akan memungkinkan timbulnya efek samping berupa infeksi yang disebabkan karena mikroorganisme (Delima, 2013).

d. Manifestasi Klinis

Menurut Delima, (2013) yang dapat muncul dari vulnus incivum adalah :

- 1) Bentuk luka yang tidak teratur.
- 2) Adanya jaringan rusak.
- 3) Terjadinya pembengkakan.
- 4) Perdarahan.
- 5) Tampak lecet atau memar disetiap luka.

e. Pemeriksaan Diagnostik

Menurut Delima, (2013) yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Pemeriksaan diagnostik yang perlu dilakukan terutama jenis darah lengkap. Tujuan untuk mengetahui tentang infeksi yang terjadi. Pemeriksaannya melalui laboratorium.
- 2) Sel-sel darah putih. leukosit dapat terjadi kecenderungan dengan kehilangan sel pada lesi luka dan respon terhadap proses infeksi.
- 3) Hitung darah lengkap hematokrik mungkin tinggi atau lengkap.
- 4) Laju endap darah (LED) menunjukkan karakteristik infeksi.

4. VULNUS PUNCTUM

KONSEP MEDIS

a. Definisi

Vulnus Punctum adalah luka kecil dengan dasar yang sukar dilihat. Disebabkan oleh tertusuk paku atau benda yang runcing, lukanya kecil, dasar sukar dilihat, tetapi pada luka ini kuman tetanus gampang masuk. Disebabkan oleh sesuatu yang runcing dan tajam yang menembus permukaan kulit yang menyebabkan bagian luar kulit tampak mengalami luka kecil namun dapat berbeda dengan luka yang terjadi pada bagian dalam struktur kulit terlebih jika benda tersebut mengenai bagian abdomen. Luka tusuk merupakan bagian dari trauma tajam yang mana luka tusuk masuk ke dalam jaringan tubuh dengan luka sayatan yang sering sangat kecil pada kulit, misalnya luka tusuk pisau (Ansori, Muhammad. 2015). Pada luka tusuk biasanya dapat berbentuk seperti kurva, panjang luka pada permukaan kulit biasanya tampak lebih kecil dari lebar benda yang menusuk apalagi bila luka melintang terhadap otot (Mallo, dkk. 2015).

b. Etiologi

Luka tusuk dapat disebabkan oleh :

- 1) Benda tajam dengan arah lurus pada kulit.
- 2) Suatu gerakan aktif maju yang cepat atau dorongan pada tubuh dengan suatu alat yang ujungnya panjang.

c. Patofisiologi

Vulnus punctum terjadi akibat penusukan benda tajam, sehingga dapat menyebabkan terputusnya atau rusaknya kontinuitas jaringan yang dapat terjadi reaksi proses inflamasi atau peradangan. Dalam hal ini ada peluang besar terjadinya infeksi hebat.

d. Manifestasi Klinis

Tanda dan gejala yang dapat muncul saat terjadi luka dapat menimbulkan gejala lokal dan gejala umum.

1) Gejala Lokal :

- a) Rasa nyeri yang dirasakan memiliki kualitas yang berbeda-beda tergantung dari lokasi luka dan besarnya kerusakan pada ujung saraf.
- b) Perdarahan. Jenis pendarahan yang terjadi berbeda-beda pada setiap kasus tergantung pada jenis pembuluh darah yang rusak dan lokasi luka.
- c) Diastase yaitu luka yang menganga atau tepinya saling melebar.
- d) Gangguan fungsi anggota badan yang mengalami luka.

2) Gejala umum :

Reaksi syok dapat terjadi jika terdapat pendarahan yang hebat (Agus, Dewa. 2016).

e. Pemeriksaan Diagnostik

Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan terutama jenis tes darah lengkap untuk mengetahui terjadinya infeksi. Pemeriksaan X-ray jika terdapat fraktur atau dicurigai terdapat benda asing.

1) Pemeriksaan darah lengkap

Adanya peningkatan Ht dapat menunjukkan adanya hemokonsentrasi yang terjadi akibat perpindahan/kehilangan cairan. Selanjutnya penurunan Ht dan SDM terjadi akibat kerusakan oleh panas yang terhadap endothelium pembuluh darah.

2) GDA

Penurunan PaO₂/peningkatan PaCO₂ mungkin terjadi pada retensi karbon monoksida. Asidosis dapat terjadi sehubungan dengan penurunan ginjal dan kehilangan mekanisme kompensasi pernapasan.

3) Elektrolit serum

Kalium dapat meningkat pada awal sehubungan dengan cedera jaringan/kerusakan SDM dan penurunan fungsi ginjal, hipokalemi dapat terjadi bila mulai diuresis, magnesium mungkin menurun.

4) BUN/keratin

Peninggian menunjukan penurunan perfusi ginjal, namun keratin dapat meningkat karena cedera jaringan.

5) Urine

Adanya albumin, Hb, dan immunoglobulin menunjukkan kerusakan jaringan dalam dan kehilangan protein. Warna hitam kemerahan pada urine sehubungan dengan mioglobulin.

6) Bronkoscopi

Berguna dalam diagnose luas cedera inhalasi, hasil dapat meliputi edema, pendarahan, dan tukak pada saluran pernapasan.

7) EKG

Tanda iskemia miokardial/disritmia dapat terjadi pada luka bakar listrik (Agus, Dewa. 2016).

C. Konsep Asuhan Keperawatan Integritas Kulit dan Luka

1. Pengkajian

Asuhan keperawatan merupakan aspek legal bagi seorang perawat dalam melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan kepada klien, memberikan informasi secara benar dengan memperhatikan aspek legal etik yang berlaku:

- Identitas (nama, umur, pekerjaan, pendidikan, alamat, agama, status, jenis kelamin).
- Keluhan utama : Pasien mengeluh nyeri.
- Riwayat penyakit.

- Riwayat penyakit sekarang: pasien mengeluh nyeri pada bagian tubuh yang tertusuk atau yang terkena benda tajam.
- Riwayat penyakit dahulu: pasien mengatakan tidak mempunyai riwayat hipertensi, diabetes mellitus, jantung, asma dan alergi.
- Riwayat penyakit keluarga: dalam keluarga tidak ada riwayat hipertensi, diabetes mellitus, atau penyakit manular dan berbahaya lainnya.

d. Pemeriksaan fisik (*Head To Toe*)

- Kepala: kesimetrisan bentuk, warna rambut, kebersihan rambut dan tidak berbau, tidak ada ketombe.

- 2) Kulit berwarna coklat, terdapat luka tusuk di bagian tubuh.
- 3) Mata: Kelopak mata agak cekung kedalam, konjungtiva pucat.
- 4) Mulut: Mulut dan lidah bersih, tidak ada perdarahan pada gusi, mulut tidak berbau, gigi belum ada yang tanggal.
- 5) Telinga: Letak telinga simetris, bisa mendengar dengan jelas, telinga bersih.
- 6) Hidung: Bentuk hidung simetris, bersih, tidak ada kotoran.
- 7) Leher: Tidak ada pembengkakan tiroid
- 8) Dada:
 - Paru:
 - Inspeksi = Bentuk dada simetris
 - Palpasi = Vocal fremitus kanan kiri sama
 - Perkusi = Sonor
 - Auskultasi = Tidak ada bunyi tambahan ronchi/wheezing
 - Jantung:
 - Inspeksi = Ictus cardis tidak ada
 - Palpasi = Ictus Cardis teraba
 - Perkusi = Pekak
 - Auskultasi = Vaskuler Lup Dup I II
 - Abdomen:
 - Inspeksi = Luka laparotomi
 - Palpasi = Peristaltik 15 x/menit

N A S K A H S I A P C E T A K

Perkusi = Pekak
Auskultasi = Ada nyeri tekan

e. Ekstremitas

Atas = Terpasang infus RL 30 tetes/menit pada panggul tangan sebelah kanan.

Bawah = Bisa di gerakkan tidak ada kelainan bawaan.

1) Aktivitas dan istirahat

Meliputi keluhan lemah, lelah, dan dapat ditandai dengan adanya perubahan tingkat kesadaran, keterbatasan rentang gerak, perubahan pola aktivitas.

2) Sirkulasi

Meliputi keluhan perubahan tekanan darah dan dapat ditandai dengan adanya perubahan frekuensi jantung seperti takikardi atau bradikardi.

3) Integritas ego

Meliputi keluhan perubahan pola tingkah laku atau kepribadian dan dapat ditandai dengan rasa takut, perasaan cemas dan gelisah.

4) Eliminasi

Meliputi keluhan perubahan pola eliminasi baik itu pola BAB atau BAK seperti konstipasi, retensi urin dan dapat ditandai dengan belum buang air besar selama 2 hari.

5) Neurosensori

Meliputi keluhan seperti rasa nyeri, pusing, vertigo, kesemutan dan dapat ditandai dengan nyeri pada

daerah yang cedera, adanya kemerahan dan perubahan sensitifitas pada area luar.

6) Nyeri

Meliputi keluhan nyeri pada daerah luka bila disentuh atau ditekan dan dapat ditandai dengan wajah meringis, respon menarik pada rangsangan nyeri yang hebat, gelisah tidak bisa tidur.

7) Kulit

Meliputi keluhan rasa nyeri dan panas pada area luka dan dapat ditandai dengan perubahan warna dan bau pada luka ataupun adanya edema.

2. Diagnosis Keperawatan

Masalah 1: Nyeri Akut

- a. Definisi : pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.
- b. Penyebab :
 - 1) Agen pencedera fisiologis (misalnya inflamasi, iskemik, neoplasma).
 - 2) Agen pencedera kimiawi (misalnya terbakar, bahan kimia iritan).
 - 3) Agen pencedera fisik (misalnya abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan).
- c. Gejala dan Tanda Mayor
Subyektif : Mengeluh nyeri.

N A S K A H S I A P C E T A K

Obyektif:

- Tampak meringis.
- Bersikap protektif.
- Gelisah.
- Frekuensi nadi meningkat.
- Sulit tidur.

d. Kondisi Klinis Terkait

- Kondisi pembedahan.
- Cedera traumatis.
- Infeksi.
- Sindrom koroner akut.
- Glaukoma.

Masalah 2: Gangguan Mobilitas Fisik

- a. Definisi : Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri.
- b. Penyebab
 - Kekakuan sendi.
 - Penurunan kekuatan otot.
 - Gangguan neuromuskuler..
- c. Gejala dan Tanda Mayor
Subyektif: Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas
Obyektif:
 - Kekuatan otot menurun.
 - Rentang gerak menurun (ROM).

d. Gejala dan Tanda Minor

Subyektif:

- Nyeri saat beregerak.
- Enggan melakukan pergerakan.
- Merasa cemas saat bergerak.

Obyektif:

- Sendi kaku.
- Gerakan tidak terkoordinasi.
- Gerakan terbatas.
- Fisik lemah.

e. Kondisi Klinis Terkait

- Stroke.
- Cedera medulla spinalis.
- Trauma.
- Osteoarthritis.

Masalah 3: Gangguan Integritas Kulit/Jaringan

a. Definisi: Kerusakan kulit (dermis dan/atau epidermis) atau jaringan (membrane mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi dan/atau ligament).

b. Penyebab:

- Perubahan sirkulasi.
- Perubahan status nutrisi.
- Kekurangan atau kelebihan volume cairan.
- Penurunan mobilitas.
- Bahan kimia iritatif.

N
A
S
K
A
H

S
I
A
P

C
E
T
A
K

- Suhu lingkungan yang ekstrem.
- Faktor mekanis (misalnya Penekanan pada tonjolan tulang, gesekan) atau faktor elektrik.
- Efek samping terapi radiasi.
- Kelembaban.
- Proses penuaan.
- Neuropati perifer.
- Perubahan pigmentasi.
- Perubahan hormonal.
- Kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan/melindungi integritas kulit.

c. Gejala dan Tanda Mayor

Subyektif: Tidak tersedia.

Obyektif: Kerusakan jaringan dan/atau lapisan kulit.

d. Gejala dan Tanda Minor

Subyektif: Tidak tersedia.

Obyektif:

- Nyeri.
- Perdarahan.
- Kemerahan.
- Hematoma.

e. Kondisi Klinis Terkait

- Gagal ginjal.
- Imobilisasi.
- Diabetes mellitus.

- Gagal Jantung Kongestif.
- Imunodefisiensi (misalnya AIDS).

Masalah 4: Gangguan Citra Tubuh

a. Definisi: Perubahan persepsi tentang penampilan, struktur dan fungsi fisik individu.

b. Penyebab

- Perubahan struktur atau bentuk tubuh (misalnya Amputasi, trauma, luka bakar, obesitas, jerawat).
- Perubahan fungsi tubuh (misalnya proses kehamilan, penyakit, kelumpuhan).
- Perubahan fungsi kognitif.
- Ketidakesesuaian budaya, keyakinan atau sistem nilai.
- Transisi perkembangan.
- Gangguan psikososial.
- Efek tindakan/pengobatan (misalnya pembedahan, kemoterapi, terapi radiasi).

c. Gejala dan Tanda Mayor

Subyektif: Mengungkapkan kecacatan/kehilangan bagian tubuh.

Obyektif:

- Kehilangan bagian tubuh.
- Fungsi atau struktur tubuh berubah/hilang.

d. Gejala dan Tanda Minor

Subyektif:

- Tidak mau mengungkapkan kecacatan/kehilangan bagian tubuh.

N A S K A H S I A P C E T A K

- Mengungkapkan perasaan negatif tentang perubahan tubuh.
- Mengungkapkan kekhawatiran pada penolakan atau reaksi orang lain.
- Mengungkapkan perubahan gaya hidup.

Obyektif:

- Menyembunyikan atau menunjukkan bagian tubuh secara berlebihan.
- Menghindari melihat dan atau menyentuh bagian tubuh.
- Fokus berlebihan pada perubahan tubuh.
- Respon non verbal pada perubahan dan persepsi tubuh.
- Fokus pada penampilan dan kekuatan masa lalu.
- Hubungan sosial berubah.

e. Kondisi Klinis Terkait

- Mastektomi.
- Amputasi.
- Jerawat.
- Parut atau luka bakar yang terlihat.
- Obesitas.
- Hiperpigmentasi pada kehamilan.

Masalah 5: Risiko Perdarahan

a. Definisi: Berisiko mengalami kehilangan darah baik internal (terjadi di dalam tubuh) maupun eksternal (terjadi hingga keluar tubuh).

b. Faktor Risiko:

- Aneurisma.
- Gangguan gastrointestinal.
- Gangguan fungsi hati.
- Komplikasi kehamilan.
- Komplikasi pasca partum.
- Gangguan koagulasi.
- Efek agen farmakologis.
- Tindakan pembedahan.
- Trauma.
- Kurang terpapar informasi tentang pencegahan perdarahan.
- Proses keganasan.

c. Kondisi Klinis Terkait:

- Aneurisma.
- Koagulopati intravaskuler diseminata.
- Sirosis hepatis.
- Ulkus lambung.
- Varises.
- Trombositopenia.
- Ketuban pecah sebelum waktunya.
- Plasenta previa.
- Atonia uterus.
- Retensi plasenta.
- Tindakan pembedahan.

- Kanker.
- Trauma.

Masalah 6: Risiko Infeksi

a. Definisi: Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik.

b. Faktor risiko:

- 1) Penyakit kronis.
- 2) Efek prosedur invasive.
- 3) Malnutrisi.
- 4) Peningkatan paparan organisme pathogen lingkungan.
- 5) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer:
 - Gangguan peristaltik.
 - Kerusakan integritas kulit.
 - Perubahan sekresi pH.
 - Penurunan kerja siliaris.
 - Ketuban pecah lama.
 - Ketuban pecah sebelum waktunya.
 - Merokok.
 - Statis cairan tubuh.
- 6) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder
 - Penurunan haemoglobin.
 - Imunosupresi.
 - Leukopenia.
 - Supresi respon inflamasi.
 - Vaksinasi tidak adekuat.

c. Kondisi Klinis Terkait:

- AIDS.
- Luka bakar.
- Penyakit paru obstruktif kronis.
- Diabetes mellitus.
- Tindakan invasive.
- Kondisi penggunaan terapi steroid.
- Penyalahgunaan obat.
- Ketuban pecah sebelum waktunya.
- Kanker.
- Gagal ginjal.
- Imunosupresi.
- Lymphedema.
- Leukositopenia.
- Gangguan fungsi hati.

3. Intervensi Keperawatan

a. Nyeri Akut

Manajemen Nyeri

Observasi

- Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri.
- Identifikasi faktor yang memperberat dan memperringan nyeri.
- Monitor efek samping penggunaan analgetik.

Terapeutik

- Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (misalnya hipnosis, akupresur, terapi

musik, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin).

- Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (misalnya suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan).

Edukasi

- Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri.
- Jelaskan strategi meredakan nyeri.
- Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri.

Kolaborasi

- Kolaborasi pemberian analgetik.

Terapi relaksasi

Observasi

- Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif.
- Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan.
- Monitor respon terhadap relaksasi.

Terapeutik

- Ciptakan lingkungan yang tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman.
- Gunakan pakaian yang longgar.
- Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama.

Edukasi

- Jelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi yang tersedia (misalnya musik, meditasi, napas dalam, relaksasi otot progresif).

- Anjurkan mengambil posisi nyaman.
- Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi.
- Anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih.

Pemberian Analgesik

Observasi

- Identifikasi karakteristik nyeri (misalnya pencetus, pereda, kualitas, lokasi, intensitas, frekuensi, durasi).
- Identifikasi riwayat alergi obat.
- Monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgesik.

Terapeutik

- Tetapkan target efektifitas analgesic untuk mengoptimalkan respons pasien.
- Dokumentasikan respons terhadap efek analgesik dan efek yang tidak diinginkan.

Edukasi

- Jelaskan efek terapi dan efek samping obat.

Kolaborasi

- Kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik, sesuai indikasi.

Terapi Murottal

Observasi

- Identifikasi aspek yang akan difokuskan dalam terapi (misalnya stimulasi, relaksasi, konsentrasi dan pengurangan nyeri).

N A S K A H S I A P C E T A K

- Identifikasi jenis terapi yang digunakan berdasarkan keadaan dan kemampuan pasien (mendengarkan atau membaca Al-Quran).

Terapeutik

- Posisikan dalam posisi dan lingkungan yang nyaman.
- Batasi rangsangan eksternal selama terapi yang dilakukan (misalnya lampu, suara, pengunjung, panggilan telepon).
- Putar rekaman yang telah ditetapkan.

Edukasi

- Jelaskan tujuan dan manfaat terapi.
- Anjurkan memusatkan perhatian atau pikiran pada lantunan ayat Al-Quran.

Perawatan kenyamanan

Observasi

- Identifikasi gejala yang tidak menyenangkan (misalnya mual, nyeri, gatal, sesak).

Terapeutik

- Berikan posisi nyaman.
- Kompres air dingin atau air hangat.

Edukasi

- Jelaskan mengenai kondisi dan pilihan terapi.
- Ajarkan latihan pernapasan.

Kolaborasi

- Kolaborasi pemberian analgesik, antihistamin, jika perlu.

b. Gangguan Mobilitas Fisik

Latihan Rentang Gerak

Observasi:

- Monitor lokasi ketidaknyamanan pada saat bergerak.

Terapeutik:

- Gunakan pakaian yang longgar.
- Lakukan gerakan pasif dengan bantuan sesuai dengan indikasi.

Edukasi:

- Jelaskan tujuan dan prosedur latihan.
- Anjurkan duduk di tempat tidur atau di kursi.

Kolaborasi:

- Kolaborasi dengan fisioterapis mengembangkan program latihan.

c. Gangguan Integritas Kulit

Perawatan Integritas Kulit

Observasi

- Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit (misalnya perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembaban, suhu lingkungan ekstrem dan penurunan mobilitas).

Terapeutik

- Ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring.
- Gunakan produk berbahan ringan atau alami dan hipoalergik pada kulit.

Edukasi

- Anjurkan memakai pelembab (misalnya *lotion*, *se- rum*).
- Anjurkan minum Air yang cukup.
- Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi.

d. Gangguan Citra Tubuh

Promosi Citra Tubuh

Observasi

- Identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan.

Terapeutik

- Diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya.
- Diskusikan kondisi stress yang mempengaruhi citra tubuh (misalnya luka, penyakit, pembedahan).

Edukasi

- Anjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap citra tubuh.

e. Risiko Perdarahan

Pencegahan Perdarahan

Observasi

- Monitor tanda dan gejala perdarahan.

Terapeutik

- Pertahankan bed rest selama perdarahan.
- Batasi tindakan invasive, jika perlu.

Edukasi

- Jelaskan tanda dan gejala perdarahan.
- Anjurkan segera melapor jika terjadi perdarahan.

Kolaborasi

- Kolaborasi pemberian obat pengontrol perdarahan, jika perlu.

Pencegahan syok

Observasi

- Monitor status kardiopulmonal (frekuensi, dan kekuatan nadi, frekuensi napas, tekanan darah).
- Monitor tingkat kesadaran dan respon pupil.

Terapeutik

- Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen >94%.
- Persiapkan intubasi dan ventilasi mekanis.

Edukasi

- Jelaskan penyebab/faktor risiko syok.
- Jelaskan tanda dan gejala syok.

Kolaborasi

- Kolaborasi pemberian transfuse darah.

Pencegahan Cedera

Observasi

- Identifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera.

Terapeutik

- Sediakan pencahayaan yang memadai.
- Gunakan pengaman tempat tidur sesuai dengan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan.

Edukasi

- Jelaskan alasan intervensi pencegahan jatuh ke pasien dan keluarga.

Pemantauan Cairan

Observasi

- Identifikasi tanda-tanda hipovolemia (misalnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urine menurun, hematokrit meningkat, haus, lemah, konsentrasi urine meningkat, berat badan menurun dalam waktu singkat).
- Monitor waktu pengisian kapiler.

Terapeutik

- Atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien.
- Dokumentasikan hasil pemantauan.

Edukasi

- Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan.
- Informasikan hasil pemantauan.

Pencegahan Infeksi

Observasi

- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal.

Terapeutik

- Batasi jumlah pengunjung.
- Cuci tangan sebelum dan setelah kontak dengan pasien dan lingkungan.

- Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko infeksi.

Edukasi

- Jelaskan tanda dan gejala infeksi.
- Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar.

Perawatan Luka

Observasi

- Monitor karakteristik luka (misalnya drainase, warna, ukuran, bau).
- Monitor tanda-tanda infeksi.

Terapeutik

- Lepaskan balutan dan plester secara perlahan.
- Cukur rambut di sekitar luka.
- Bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik.
- Bersihkan jaringan nekrotik.
- Berikan salep yang sesuai kulit.
- Pasung balutan sesuai jenis luka.
- Pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka.
- Ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase.
- Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien.
- Berikan diet dengan kalori 30-35 kkal/kgBB/hari dan protein 1,25-1,5 g/kg/B/hari.
- Berikan terapi TENS (Stimulasi Saraf transkutaneous).

N A S K A H S I A P C E T A K

Edukasi

- Jelaskan tanda dan gejala infeksi.
- Ajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri.

Kolaborasi

- Kolaborasi pemberian antibiotik.

Manajemen lingkungan

Observasi

- Identifikasi keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Terapeutik

- Atur suhu lingkungan yang sesuai.
- Sediakan tempat tidur dan lingkungan yang bersih dan nyaman.
- Izinkan keluarga untuk tinggal mendampingi pasien.

Edukasi

- Ajarkan pasien dan keluarga/pengunjung tentang upaya pencegahan infeksi.

BAB 10

MOBILISASI DAN IMOBILISASI

Konsep Dasar Pemenuhan Kebutuhan Mobilisasi Fisik

1. Definisi mobilisasi dan imobilisasi

a. Pengertian mobilisasi

Mobilisasi merupakan kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas guna mempertahankan kesehatannya (Haswita dan Reni Sulistyawati, 2017).

Jenis mobilisasi yaitu:

- 1) Mobilitas penuh, merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas sehingga dapat melakukan intraksi sosial dan menjalankan peran sehari-hari. Mobilitas penuh ini merupakan fungsi saraf motorik valunter dan sensorik untuk dapat mengontrol seluruh area tubuh seseorang.

- 2) Mobilitas sebagian, merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan jelas dan tidak mampu bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan sensorik pada area tubuhnya. Hal ini dapat dijumpai pada kasus cidera atau patah tulang dengan pemasangan traksi.

b. Pengertian imobilisasi

Imobilisasi merupakan keadaan dimana seseorang tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan (aktivitas), misalnya mengalami trauma tulang belakang, cidera otak berat disertai fraktur pada ekstremitas dan sebagainya. Jenis imobilisasi yaitu:

- 1) Imobilitas fisik, merupakan pembatasan untuk bergerak secara fisik dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan komplikasi pergerakan.
- 2) Imobilitas intelektual, Merupakan keadaan ketika seseorang mengalami keterbatasan daya pikir.
- 3) Imobilitas emosional, merupakan keadaan ketika seseorang mengalami pembatasan secara emosional karena ada perubahan secara tiba-tiba dalam menyesuaikan diri.
- 4) Imobilitas sosial, merupakan keadaan individu yang mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial karena keadaan penyakitnya, sehingga dapat mempengaruhi perannya dalam kehidupan sosial.

2. Faktor yang mempengaruhi mobilisasi dan imobilisasi

Mobilitas seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

a. Gaya hidup

Perubahan gaya hidup dapat mempengaruhi kemampuan mobilitas seseorang karena gaya hidup berdampak pada perilaku atau kebiasaan sehari-hari.

b. Proses penyakit/cidera

Proses penyakit dapat mempengaruhi kemampuan mobilitas karena dapat mempengaruhi fungsi sistem tubuh. Sebagai contoh, orang yang menderita fraktur femur akan mengalami keterbatasan pergerakan dalam ekstremitas bagian bawah.

c. Kebudayaan

Kemampuan melakukan mobilitas dapat juga dipengaruhi kebudayaan. Sebagai contoh, orang yang memiliki budaya sering berjalan jauh memiliki kemampuan mobilitas yang kuat. Sebaliknya ada orang yang mengalami gangguan mobilitas (sakit) karena adat dan budaya tertentu dilarang untuk beraktivitas.

d. Tingkat energi

Energi adalah sumber untuk melakukan mobilitas. Agar seseorang dapat melakukan mobilitas dengan baik dibutuhkan energi yang cukup.

e. Usia dan status perkembangan

Terdapat perbedaan kemampuan mobilitas pada tingkat usia yang berbeda, hal ini dikarenakan kemampuan atau kematangan fungsi alat gerak sejalan dengan perkembangan usia.

3. Perubahan sistem tubuh akibat imobilisasi

Dampak dari imobilisasi dalam tubuh dapat mempengaruhi sistem tubuh, seperti perubahan pada metabolisme tubuh, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan dalam kebutuhan nutrisi, gangguan fungsi gastrointestinal, perubahan sistem pernapasan, perubahan kardiovaskuler, perubahan sistem muskuloskeletal, perubahan kulit, perubahan eliminasi (buang air besar dan kecil) dan perubahan perilaku.

a. Perubahan metabolisme

Secara umum mobilitas dapat mengganggu metabolisme secara normal, mengingat imobilisasi dapat menyebabkan turunnya kecepatan metabolisme dalam tubuh, hal tersebut dapat kita jumpai pada menurunnya basal metabolisme rate yang menyebabkan energi untuk perbaikan sel-sel berkurang, sehingga dapat mempengaruhi gangguan dalam oksigenasi sel.

Kemudian dalam perubahan metabolisme imobilitas dapat mengakibatkan proses anabolisme menurun dan katabolisme meningkat, keadaan ini dapat berisiko meningkatkan gangguan dalam metabolisme. Dalam proses imobilisasi juga dapat menyebabkan menurunnya ekskresi urin dan meningkatnya nitrogen, hal tersebut ditemukan pada pasien yang mengalami imobilitas pada hari ke lima dan ke enam. Beberapa dampak perubahan metabolisme, atrofi kelenjar dan katabolisme protein, dalam mengubah zat gizi dan gangguan gastrointestinal.

b. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit

Sebagai dampak dari imobilitas karena selama proses imobilitas akan terjadi persediaan protein menurun dan konsentrasi protein serum akan berkurang sehingga dapat mengganggu kebutuhan cairan tubuh. Disamping itu berkurangnya perpindahan cairan dari intravaskular ke interstitial dapat menyebabkan edema sehingga terjadi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit.

c. Gangguan perubahan zat gizi

Disebabkan menurunnya pemasukan protein dan kalori sehingga menyebabkan zat-zat makanan pada tingkat sel akan menurun, dimana sel tidak lagi menerima glukosa, asam amino, lemak dan oksigen dalam jumlah yang cukup untuk melakukan aktivitas metabolisme.

d. Gangguan fungsi gastrointestinal

Imobilisasi dapat menurunkan hasil makanan yang dicerna, disamping menurunnya jumlah pemasukan yang cukup dapat menyebabkan keluhan, seperti perut kembung, mual, nyeri gastrik yang dapat menyebabkan gangguan proses eliminasi.

e. Perubahan sistem pernapasan

Karena dengan imobilisasi kadar hemoglobin menurun, ekspansi paru menurun, terjadi pelemahan otot, terganggunya metabolisme. Terjadinya penurunan kadar hemoglobin dapat berdampak pada pengaliran oksigen dari alveoli di paru ke jaringan menurun sehingga dapat menyebabkan terjadinya. Ekspansi paru menurun dapat terjadi karena tekanan yang meningkat oleh permukaan paru.

f. Perubahan kardiovaskular

Terjadinya orthostatic hipotensi, meningkatnya kerja jantung dan terjadi pembentukan thrombus. Terjadinya orthostatic hipotensi dapat disebabkan kemampuan saraf otonom menurun pada posisi tetap dan waktunya lama maka reflex neurovaskular pada vena bagian bawah sehingga aliran darah ke sistem sirkulasi pusat terhambat. Meningkatnya kerja jantung dapat disebabkan karena imobilitas dengan posisi horizontal. Secara normal darah terkumpul pada ekstremitas bawah bergerak dan meningkatkan aliran vena kembali ke jantung dan akhirnya jantung akan meningkatkan kerjanya.

Terjadinya thrombus juga disebabkan karena meningkatnya vena statis yang merupakan penurunan kontraksi muskular sehingga meningkatkan arus balik vena.

g. Perubahan sistem muskuloskeletal

Pertama gangguan muskular yakni menurunnya masa otot sebagai dampak imobilisasi dapat menyebabkan menurunnya kekuatan secara langsung, menurunnya fungsi kapasitas otot yang ditandai dengan menurunnya stabilitas. Kondisi berkurangnya masa otot dapat menyebabkan atropi pada otot, sebagai contoh otot betis seseorang yang dirawat lebih dari enam minggu maka akan memperlihatkan ukuran yang lebih kecil disamping menunjukkan adanya kelemahan, dan keluesan. Kedua, gangguan skeletal yakni adanya imobilisasi juga dapat menyebabkan gangguan dalam

skeletal misalnya akan mudah terjadi kontraktur sendi, osteoporosis.

Kontraktur merupakan kondisi yang abnormal dengan kriteria dengan adanya fleksi dan fleksasi yang disebabkan atropi dan memendeknya otot. Terjadinya kontraktur dapat menyebabkan sendi dalam kedudukan yang tidak berfungsi sedangkan osteoporosis dapat terjadi karena reabsorpsi tulang semakin besar yang mengakibatkan jumlah kalsium ke dalam darah menurun, sedangkan jumlah kalsium dikeluarkan melalui urin semakin besar.

h. Perubahan sistem kulit

Menurunnya elastisitas kulit, karena menurunnya sirkulasi darah sebagai akibat imobilisasi, kemudian terjadi iskemia dan nekrosis jaringan superfisial dengan adanya luka decubitus sebagai akibat kulit yang kuat dan sirkulasi yang menurun ke jaringan.

i. Perubahan eliminasi

Terjadi pembentukan jumlah urine yang berkurang hal ini kemungkinan yang disebabkan karena *intake* yang kurang dan perubahan kardiak *output* menurun sehingga aliran darah renal berkurang dan urine berkurang.

j. Perubahan perilaku

Adanya rasa bermusuhan, bingung, cemas, emosional tinggi, depresi, perubahan sirkulasi tidur dan menurunnya mekanisme coping. Terjadinya perubahan perilaku tersebut diatas sebagai dampak imobilisasi karena selama mobilisasi seorang akan mengalami perubahan peran, konsep diri, kecemasan dan lain-lainnya.

4. Penatalaksanaan gangguan mobilitas

Menurut Stanley dan Beare (2007), penatalaksanaan gangguan mobilitas yaitu pencegahan primer.

Pencegahan primer

Pencegahan primer merupakan proses yang berlangsung sepanjang kehidupan, mobilitas dan aktivitas pada fungsi sistem muskuloskeletal, kardiovaskuler, dan pulmonal. Salah satu terobosan dalam promosi kesehatan adalah pengenalan dan penerimaan latihan sebagai komponen integral dari kehidupan sehari-hari. Latihan sangat bermanfaat baik bagi lansia yang sehat maupun untuk mereka yang mengalami masalah fisik secara teratur dapat menunda proses penuaan, dihubungkan dengan perasaan sejahtera, memperpanjang usia dan peningkatan fungsi kardiovaskuler dan pulmonal.

Aktivitas dan latihan yang dianjurkan dapat meningkatkan tingkat energi, mempertahankan mobilitas dan meningkatkan kemampuan kardiovaskuler dan pulmonal. Walaupun latihan tidak akan mengubah rangkaian proses penuaan normal, hal tersebut dapat mencegah efek mobilitas yang merusak dan gaya hidup yang kurang gerak.

Lansia mengalami peningkatan status kesehatan yang signifikan dengan aktivitas fisik yang rendah sampai sedang dalam waktu luangnya ketika aktivitas-aktivitas ini dipraktikkan secara teratur dan dengan durasi serta intensitas yang sesuai. Sebagai suatu hasil dari latihan, sistem kardiopulmonal memperoleh fungsi secara keseluruhan, sistem muskuloskeletal menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar, kebiasaan nutrisi meningkat, dan upaya-upaya mengendalikan berat badan dapat ditingkatkan, program

latihan juga dapat dihubungkan dengan peningkatan mood atau tingkat ketegangan, ansietas, dan depresi.

Latihan rentang gerak ROM (*Range of motion*)

a. Pengertian ROM

ROM adalah jumlah maksimum gerakan yang mungkin dilakukan sendi pada salah satu dari tiga potongan tubuh, yaitu sagital, transversal, dan frontal. Potongan sagital adalah garis yang melewati tubuh dari depan ke belakang, membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan. Potongan frontal melewati tubuh dari sisi ke sisi dan membagi tubuh menjadi bagian depan ke belakang. Potongan transversal adalah garis horizontal yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah (Potter & Perry, 2005).

Mobilisasi sendi disetiap potongan dibatasi oleh ligamen, otot, dan konstruksi sendi. Beberapa gerakan sendi adalah spesifik untuk setiap potongan. Pada potongan sagital, gerakannya adalah fleksi dan ekstensi (jari-jari tangan dan siku) dan hiperekstensi (pinggul). Pada potongan frontal, gerakannya adalah abduksi dan adduksi (lengan dan tungkai) dan eversi dan inversi (kaki). Pada potongan transversal, gerakannya adalah pronasi dan supinasi (tangan), rotasi internal dan eksternal (lutut), dan dorsi fleksi dan plantar fleksi (kaki) (Potter & Perry, 2005).

Ketika mengkaji rentang gerak, perawat menanyakan pertanyaan dan mengobservasi dalam mengumpulkan data tentang kekakuan sendi, pembengkakan, nyeri, keterbatasan gerak, dan gerakan yang tidak sama. Klien yang memiliki keterbatasan mobilisasi sendi

karena penyakit, ketidakmampuan, atau trauma membutuhkan latihan sendi untuk mengurangi bahaya imobilisasi (Potter & Perry, 2005).

Pengertian ROM lainnya adalah latihan gerakan sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, dimana klien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal baik secara aktif ataupun pasif. Latihan *range of motion* (ROM) adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot (Potter & Perry, 2005).

b. Tujuan ROM

Adapun tujuan dari ROM, yaitu:

- 1) Meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot.
- 2) Mempertahankan fungsi jantung dan pernapasan.
- 3) Mencegah kekakuan pada sendi.
- 4) Merangsang sirkulasi darah.
- 5) Mencegah kelainan bentuk, kekakuan dan kontraktur.

c. Manfaat ROM

Adapun manfaat dari ROM, yaitu:

- 1) Menentukan nilai kemampuan sendi tulang dan otot dalam melakukan pergerakan.
- 2) Mengkaji tulang, sendi, dan otot.
- 3) Mencegah terjadinya kekakuan sendi.

- 4) Memperlancar sirkulasi darah.
- 5) Memperbaiki tonus otot.
- 6) Meningkatkan mobilisasi sendi.
- 7) Memperbaiki toleransi otot untuk latihan.

d. Prinsip latihan ROM

Adapun prinsip latihan ROM, diantaranya:

- 1) ROM harus diulang sekitar 8 kali dan dikerjakan minimal 2 kali sehari.
- 2) ROM dilakukan perlahan dan hati-hati sehingga tidak melelahkan pasien.
- 3) Dalam merencanakan program latihan ROM, perhatikan umur pasien, diagnosa, tanda-tanda vital dan lamanya tirah baring.
- 4) Bagian-bagian tubuh yang dapat dilakukan latihan ROM adalah leher, jari, lengan, siku, bahu, tumit, kaki, dan pergelangan kaki.
- 5) ROM dapat dilakukan pada semua persendian atau hanya pada bagian-bagian yang di curigai mengalami proses penyakit.
- 6) Melakukan ROM harus sesuai waktunya. Misalnya setelah mandi atau perawatan rutin telah dilakukan.

e. Jenis-jenis ROM

ROM dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) ROM aktif

ROM aktif yaitu gerakan yang dilakukan oleh seseorang (pasien) dengan menggunakan energi sendiri. Perawat memberikan motivasi, dan membimbing klien dalam melaksanakan pergerakan sendiri

secara mandiri sesuai dengan rentang gerak sendi normal (klien aktif) kekuatan otot 75 %.

Hal ini untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan cara menggunakan otot-ototnya secara aktif. Sendi yang digerakkan pada ROM aktif adalah sendi di seluruh tubuh dari kepala sampai ujung jari kaki oleh klien sendiri secara aktif.

2) ROM pasif

ROM pasif yaitu energi yang dikeluarkan untuk latihan berasal dari orang lain (perawat) atau alat mekanik. Perawat melakukan gerakan persendian klien sesuai dengan rentang gerak yang normal (klien pasif) kekuatan otot 50 %.

Indikasi latihan pasif adalah pasien semikoma dan tidak sadar, pasien dengan keterbatasan mobilisasi tidak mampu melakukan beberapa atau semua latihan rentang gerak dengan mandiri, pasien tirah baring total atau pasien dengan paralisis ekstermitas total (Suratun, dkk, 2008).

Rentang gerak pasif ini berguna untuk menjaga kelenturan otot-otot dan persendian dengan menggerakkan otot orang lain secara pasif misalnya perawat mengangkat dan menggerakkan kaki pasien. Sendi yang digerakkan pada ROM pasif adalah seluruh persendian tubuh atau hanya pada ekstremitas yang terganggu dan klien tidak mampu melaksanakannya secara mandiri.

f. Indikasi dan sasaran ROM

1) ROM Aktif

Indikasi:

- a) Pasien dapat melakukan kontraksi otot secara aktif dan menggerakkan ruas sendinya baik dengan bantuan atau tidak.
- b) Pasien memiliki kelemahan otot dan tidak dapat menggerakkan persendian sepenuhnya, digunakan A- AROM (*Active-Assistive ROM*), adalah jenis ROM Aktif yang mana bantuan diberikan melalui gaya dari luar apakah secara manual atau mekanik, karena otot penggerak primer memerlukan bantuan untuk menyelesaikan gerakan).
- c) ROM aktif dapat digunakan untuk program latihan aerobik.
- d) ROM aktif digunakan untuk memelihara mobilitas ruas di atas dan di bawah daerah yang tidak dapat bergerak.

Sasaran:

- a) Apabila tidak terdapat inflamasi dan kontraindikasi, sasaran ROM aktif serupa dengan ROM pasif.
- b) Keuntungan fisiologis dari kontraksi otot aktif dan pembelajaran gerak dari kontrol gerak volunter.

2) ROM pasif

Indikasi:

- 1) Pada daerah dimana terdapat inflamasi jaringan akut yang apabila dilakukan pergerakan aktif akan menghambat proses penyembuhan.

- b) Ketika pasien tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk bergerak aktif pada ruas atau seluruh tubuh, misalnya keadaan koma, kelumpuhan atau *bed rest* total.

Sasaran:

- Mempertahankan mobilitas sendi dan jaringan ikat.
- Meminimalisir efek dari pembentukan kontraktur.
- Mempertahankan elastisitas mekanis dari otot.
- Membantu kelancaran sirkulasi.
- Meningkatkan pergerakan sinovial untuk nutrisi tulang rawan serta difusi persendian.
- Menurunkan atau mencegah rasa nyeri.
- Membantu penyembuhan pasca cedera dan operasi.
- Membantu mempertahankan kesadaran akan gerak dari pasien.

Macam-macam gerakan ROM

Ada berbagai macam gerakan ROM, yaitu:

- Fleksi, yaitu berkurangnya sudut persendian.
- Ekstensi, yaitu bertambahnya sudut persendian.
- Hiperekstensi, yaitu ekstensi lebih lanjut.
- Abduksi, yaitu gerakan menjauhi dari garis tengah tubuh.
- Adduksi, yaitu gerakan mendekati garis tengah tubuh.
- Rotasi, yaitu gerakan memutar dari tulang.


N A S K A H S I A P C E T A K

- Eversi, yaitu perputaran bagian telapak kaki ke bagian luar, bergerak membentuk sudut persendian.
- Inversi, yaitu putaran bagian telapak kaki ke bagian dalam bergerak membentuk sudut persendian.
- Pronasi, yaitu pergerakan telapak tangan dimana permukaan tangan bergerak ke bawah.
- Supinasi, yaitu pergerakan telapak tangan dimana permukaan tangan bergerak ke atas.
- Oposisi, yaitu gerakan menyentuhkan ibu jari ke setiap jari-jari tangan pada tangan yang sama.

Gerakan ROM Aktif

1) Leher


- Fleksi 45° gerakan dagu menempel ke dada.
- Ekstensi 45° kembali ke posisi tegak (kepala tegak).
- Hiperekstensi 10° menggerakkan kepala ke arah belakang.
- Rotasi 180° memutar kepala sebanyak 4 kali putaran.
- Fleksi lateral kanan 40-45° dan fleksi lateral kiri 40- 45° memiringkan kepala menuju kedua bahu kiri dan kanan.



Gambar 10.1: Latihan Gerakan ROM pada Bagian Leher

2) Bahu


- Fleksi 180° menaikkan lengan ke atas sejajar dengan kepala.
- Ekstensi 180° mengembalikan lengan ke posisi semula.
- Hiperekstensi $45-60^{\circ}$ menggerakkan lengan ke belakang.
- Abduksi 180° lengan dalam keadaan lurus sejajar bahu lalu gerakan ke arah kepala.
- Adduksi 360° lengan kembali ke posisi tubuh.
- Rotasi internal 90° tangan lurus sejajar bahu lalu gerakan dari bagian siku ke arah kepala secara berulang.
- Rotasi eksternal 90° dan ke arah bawah secara berulang.



Gambar 10.2: Latihan Gerakan ROM pada Bagian Bahu

3) Siku

- Fleksi 150° menggerakkan daerah siku mendekati lengan atas.
- Ekstensi 150° dan luruskan kembali.



Gambar 10.3: Latihan Gerakan ROM pada Bagian Siku

4) Lengan bawah


- Supinasi $70-90^{\circ}$ menggerakkan tangan dengan telapak tangan di atas.
- Pronasi $70-90^{\circ}$ menggerakkan tangan dengan telapak tangan di bawah.



Gambar 10.4: Latihan Gerakan ROM pada Bagian Lengan Bawah

5) Pergelangan tangan


- Fleksi $80-90^{\circ}$ menggerakkan pergelangan tangan ke arah bawah.
- Ekstensi $80-90^{\circ}$ menggerakkan tangan kembali lurus.
- Hiperekstensi $89-90^{\circ}$ menggerakkan tangan ke arah atas.



Gambar 10.5: Latihan Gerakan ROM pada Bagian Pergelangan Tangan

6) Jari-jari tangan

- Fleksi 90° tangan menggenggam.
- Ekstensi 90° membuka genggaman.
- Hiperekstensi 30-60° menggerakkan jari-jari ke arah atas.
- Abduksi 30° meregangkan jari-jari tangan.
- Adduksi 30° merapatkan kembali jari-jari tangan




Gambar 10.6: Latihan Gerakan ROM pada Bagian Jari Tangan

7) Ibu jari

- Fleksi 90° menggenggam.
- Ekstensi 90° membuka genggaman.
- Abduksi 30° menjauhkan/meregangkan ibu jari.

N A S K A H S I A P C E T A K


- Adduksi 30° mendekatkan kembali ibu jari.
- Oposisi mendekatkan ibu jari ke telapak tangan.



Gambar 10.7: Latihan Gerakan ROM pada Bagian Ibu Jari

8) Pinggul


- Fleksi 90-120° menggerakkan tungkai ke atas.
- Ekstensi 90-120° meluruskan tungkai.
- Hiperekstensi 30-50° menggerakkan tungkai ke belakang.
- Abduksi 30-50° menggerakkan tungkai ke samping menjauhi tubuh.
- Adduksi 30-50° merapatkan tungkai kembali mendekat ke tubuh.
- Rotasi internal 90° memutar tungkai ke arah dalam.
- Rotasi eksternal 90° memutar tungkai ke arah luar.



Gambar 10.8: Latihan Gerakan ROM pada Bagian Pinggul

9) Lutut


- Fleksi $120-130^{\circ}$ menggerakkan lutut ke arah belakang.
- Ekstensi $120-130^{\circ}$ menggerakkan lutut kembali keposisi semula lurus.



Gambar 10.9: Latihan Gerakan ROM pada Bagian Lutut

10) Mata kaki

- Dorso fleksi $20-30^{\circ}$ menggerakkan telapak kaki ke arah atas.
- Plantar fleksi $20-30^{\circ}$ menggerakkan telapak kaki ke arah bawah.



Gambar 10.10: Latihan Gerakan ROM pada Bagian Mata Kaki

11) Kaki

- Inversi/supinasi 10° memutar/mengarahkan telapak kaki ke arah samping dalam.
- Eversi/pronasi 10° memutar/mengarahkan telapak kaki ke arah samping luar.




Gambar 10.11: Latihan Gerakan ROM pada Bagian Kaki

12) Jari-jari kaki

- Fleksi $30-60^{\circ}$ menekuk jari-jari kaki ke arah bawah.
- Ekstensi $30-60^{\circ}$ meluruskan kembali jari-jari kaki.

- c) Abduksi 15° mereganggkan jari-jari kaki.
- d) Adduksi 15° merapatkan kembali jari-jari kaki.



Gambar 10.12: Latihan Gerakan ROM pada Bagian Jari-jari Kaki

Gerakan ROM Pasif

1) Fleksi dan ekstensi pergelangan tangan

Cara:

- a) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan.
- b) Atur posisi lengan pasien dengan menjauhi sisi tubuh dan siku menekuk dengan lengan.
- c) Pegang tangan pasien dengan satu tangan dan tangan yang lain memegang pergelangan tangan pasien.
- d) Tekuk tangan pasien ke depan sejauh mungkin.
- e) Catat perubahan yang terjadi.




Gambar 10.13: Latihan Fleksi dan Ekstensi Pergelangan Tangan

2) Fleksi dan ekstensi siku

Cara:

- a) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan.
- b) Atur posisi lengan pasien dengan menjauhi sisi tubuh dengan telapak mengarah ke tubuhnya.
- c) Letakkan tangan di atas siku pasien dan pegang tangannya mendekati bahu.
- d) Lakukan dan kembalikan ke posisi sebelumnya.
- e) Catat perubahan yang terjadi.



Gambar 10.14: Latihan Fleksi dan Ekstensi Siku

3) Pronasi dan supinasi lengan bawah

Cara:

- a) Jelaskan Prosedur yang akan dilakukan.
- b) Atur posisi lengan bawah menjauhi tubuh pasien dengan siku menekuk.
- c) Letakkan satu tangan perawat pada pergelangan pasien dan pegang tangan pasien dengan tangan lainnya.
- d) Putar lengan bawah pasien sehingga telapaknya menjauhinya.

- e) Kembalikan ke posisi semula.
- f) Putar lengan bawah pasien sehingga telapak tangannya menghadap ke arahnya.
- g) Kembalikan ke posisi semula.
- h) Catat perubahan yang terjadi.



Gambar 10.15: Latihan Pronasi dan Supinasi Lengan Bawah

4) Pronasi fleksi bahu

Cara:

- a) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan.
- b) Atur posisi tangan pasien disisi tubuhnya.
- c) Letakkan satu tangan perawat di atas siku pasien dan pegang tangan pasien dengan tangan lainnya.
- d) Angkat lengan pasien pada posisi semula.
- e) Catat perubahan yang terjadi.

N A S K A H S I A P C E T A K




Gambar 10.16: Latihan Pronasi Fleksi Bahu

5) Abduksi dan adduksi bahu

Cara:

- a) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan.
- b) Atur posisi lengan pasien di samping badannya.
- c) Letakkan satu tangan perawat di atas siku pasien dan pegang tangan pasien dengan tangan lainnya.
- d) Gerakkan lengan pasien menjauh dari tubuhnya kearah perawat (Abduksi).
- e) Gerakkan lengan pasien mendekati tubuhnya (Adduksi).
- f) Kembalikan ke posisi semula.
- g) Catat perubahan yang terjadi.



Gambar 10.17: Latihan Abduksi dan Adduksi Bahu

6) Rotasi bahu

Cara:

- Jelaskan prosedur yang akan dilakukan.
- Atur posisi lengan pasien menjauhi tubuh dengan siku menekuk.
- Letakkan satu tangan perawat di lengan atas pasien dekat siku dan pegang tangan pasien dengan tangan yang lain.
- Gerakkan lengan bawah ke bawah sampai menyentuh tempat tidur, telapak tangan menghadap ke bawah.
- Kembalikan posisi lengan ke posisi semula.
- Gerakkan lengan bawah ke belakang sampai menyentuh tempat tidur, telapak tangan menghadap ke atas.
- Kembalikan lengan ke posisi semula.
- Catat perubahan yang terjadi.



Gambar 10.18: Latihan Rotasi Bahu

7) Fleksi dan ekstensi jari-jari

Cara:

- Jelaskan prosedur yang akan dilakukan.
- Pegang jari-jari kaki pasien dengan satu tangan,
- Sementara tangan lain memegang kaki.
- Bengkokkan (tekuk) jari-jari kaki ke bawah
- Luruskan jari-jari kemudian dorong ke belakang.
- Kembalikan ke posisi semula.
- Catat perubahan yang terjadi



Gambar 10.19: Latihan Fleksi Ekstensi Jari

8) Infersi dan efersi kaki

Cara:

- Jelaskan prosedur yang akan dilakukan.
- Pegang separuh bagian atas kaki pasien dengan satu jari dan pegang pergelangan kaki dengan tangan satunya.
- Putar kaki ke dalam sehingga telapak kaki menghadap ke kaki lainnya.
- Kembalikan ke posisi semula.
- Putar kaki keluar sehingga bagian telapak kaki menjauhi kaki yang lain.
- Kembalikan ke posisi semula.
- Catat perubahan yang terjadi.



Gambar 10.20: Latihan Infers Efersi Kaki

9) Fleksi dan ekstensi pergelangan kaki

Cara:

- Jelaskan prosedur yang akan dilakukan.
- Letakkan satu tangan perawat pada telapak kaki pasien dan satu tangan yang lain di atas pergelangan kaki.
- Jaga kaki lurus dan rilek.
- Tekuk pergelangan kaki, arahkan jari-jari kaki ke arah dada pasien.
- Kembalikan ke posisi semula.
- Tekuk pergelangan kaki menjauhi dada pasien.
- Catat perubahan yang terjadi.




Gambar 10.21: Latihan Fleksi dan Ekstensi Kaki

10) Fleksi dan ekstensi lutut

Cara:

- Jelaskan prosedur yang akan dilakukan.
- Letakkan satu tangan di bawah lutut pasien dan pegang tumit pasien dengan tangan yang lain.
- Angkat kaki, tekuk pada lutut dan pangkal paha.
- Lanjutkan menekuk lutut ke arah dada sejauh mungkin.
- Ke bawahkan kaki dan luruskan lutut dengan mengangkat kaki ke atas.
- Kembali ke posisi semula.
- Catat perubahan yang terjadi.




Gambar 10.22: Latihan Fleksi Ekstensi Lutut

11) Rotasi pangkal paha

Cara:

- Jelaskan prosedur yang akan dilakukan.
- Letakkan satu tangan perawat pada pergelangan kaki dan satu tangan yang lain di atas lutut.
- Putar kaki menjauhi perawat.
- Putar kaki ke arah perawat.
- Kembalikan ke posisi semula.
- Catat perubahan yang terjadi.




Gambar 10.23: Latihan Potasi Pangkal Paha

12) Abduksi dan adduksi pangkal paha

Cara:

- Jelaskan prosedur yang akan dilakukan.
- Letakkan satu tangan perawat di bawah lutut pasien dan satu tangan pada tumit.
- Jaga posisi kaki pasien lurus, angkat kaki kurang lebih 8 cm dari tempat tidur, gerakkan kaki menjauhi badan pasien.
- Gerakkan kaki mendekati badan pasien.
- Kembalikan ke posisi semula.
- Catat perubahan yang terjadi.



Gambar 10.24: Latihan Abduksi dan Adduksi Pangkal Paha



Biodata Pengarang



Dr. Risnah S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.

Dilahirkan di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan pada tanggal 12 April 1977. Lulus pada Diploma III Akademi Keperawatan Makassar pada tahun 1999. Setelah itu melanjutkan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

Makassar dan meraih gelar S.KM pada tahun 2003. Gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep) dan Ners diperoleh di Fakultas Kedokteran Program Studi Ilmu Keperawatan UNHAS pada tahun 2004 - 2005 Program Pasca sarjana diselesaikan pada konsentrasi Biomedik - Fisiologi di UNHAS pada tahun 2009. Pada tahun 2013 berkesempatan melanjutkan studi di program *Diploma of Leadership di Coady International Institute Nova Scotia, Halifax – Canada*. Meraih gelar Doktor dengan predikat *cumlaude* di bidang Kesehatan Masyarakat pada Sekolah Pasca Sarjana UNHAS pada tahun 2018. Mengabdikan sebagai dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sejak tahun 2006. Aktif pada berbagai kegiatan ilmiah dan penulisan buku dan jurnal.



Musdalifah, S.Kep. Ns., M.Kes., M.Kep. Anak ketiga dari H. Mukhtar dan Hj. St. Sadariah yang lahir di Jeneponto, 19 Desember 1987. Menamatkan studi sarjana pada Program Studi Keperawatan pada tahun 2009 dan melanjutkan Pendidikan Profesi Ners pada tahun

2011 dan selesai pada tahun 2012 di UIN Alauddin Makassar serta menyelesaikan Program Pendidikan Magister Biomedik Konsentrasi Fisiologi pada tahun 2012 Di Universitas Hasanuddin. Pada tahun 2018, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan Di Universitas Hasanuddin. Pengalaman mengajar di STIKPER Gunung sari Makassar (2014-2019), Kemudian menjadi dosen PNS UIN Alauddin Makassar pada tahun 2019 hingga saat ini. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi Himpunan Perawat Medical Bedah (HIPMEBI) wilayah Sulawesi Selatan.



A. Adriana Amal, S.Kep. Ns., M.Kep. anak pertama dari A.Akmal, S.Pd dan Hj. Darmawati, S.Pd (Alm) yang lahir di Bone, 16 November 1988. Menamatkan studi sarjana pada Program Studi Keperawatan pada tahun 2010 di UIN Alauddin Makassar dan melanjutkan Pendidikan Profesi Ners pada tahun 2011 dan selesai

pada tahun 2012 di STIK GIA Makassar. Pada tahun 2016, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan Di Universitas Hasanuddin. Pengalaman sebagai dosen non PNS UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017-2019. Kemudian menjadi dosen PNS UIN Alauddin Makassar pada tahun 2019 hingga saat ini. Selain itu, penulis juga sebagai Bendahara DPK PPNI UIN Alauddin Makassar.



Nurhidayah, S.Kep. Ns., M.Kep. anak ketujuh dari H. Halede dan Hj. Mantang Koro yang lahir di Pinrang, 16 Februari 1988. Menamatkan studi sarjana pada Program Studi Keperawatan pada tahun 2010 dan melanjutkan Pendidikan Profesi Ners pada tahun 2011 dan selesai

pada tahun 2012 di Stikes Nani Hasanuddin Makassar. Pada tahun 2015, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Hasanuddin. Pengalaman sebagai dosen PTS Stikes Nani Hasanuddin Makassar pada tahun 2010-2018 kemudian menjadi dosen PNS UIN Alauddin Makassar pada tahun 2019 hingga saat ini. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) wilayah Sulawesi Selatan.



Rasmawati, S.Kep., Ns., M.Kep. Sp.Kep.J. lahir di Wotu, Luwu Timur, 18 Juli 1989. Penulis merupakan lulusan S1 Keperawatan dan Ners di Universitas Hasanuddin tahun 2012 kemudian melanjutkan program magister dan spesialis keperawatan jiwa di Universitas Indonesia,

selesai tahun 2017. Penulis merupakan dosen keperawatan di UIN Alauddin Makassar sejak tahun 2019. Selain menjadi staf pengajar, penulis juga aktif dalam mengelola jurnal ilmiah sebagai editor Jurnal Kesehatan, Chief Editor Alauddin Scientific Journal of Nursing (ASJN) serta menjadi koordinator divisi penelitian Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Sulawesi Selatan (IPKJI SUL-SEL) periode 2019-2023.



Daftar Pustaka

- Adawiyah, S. (2018). Membaca Alquran Dapat Menghilangkan Rasa Nyeri. Retrieved from <https://bincangsyariah.com/khazanah/membaca-alquran-dapat-menghilangkan-rasa-nyeri/>
- A Potter, & Perry, A. G. (2006). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Dan Praktik, edisi 4, Volume.2*. Jakarta: EGC.
- Aaronson, P. I., & Ward, J. P. T. (2007). *At A Glance Sistem Kardiovaskular. Edisi ketiga. (Juwalita Surapsari, penerjemah)*. Jakarta: Erlangga
- Alimul H., A. Aziz. 2006. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia-Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan. Buku 1. Jakarta: Salemba Medika
- Amalia Aqila Selma. (2015). *Tips Hidup Sehat Dan Berkah Ala Rasulullah*. Yogyakarta: Abata Press.
- Apriyani, H. (2016). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Tidur Pasien Post Operasi Di Rsd Hm Ryacudu Kotabumi. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 8(1), 10-16.

- Azis, W., Nooryanto, M., & Andarini, S. (2015). Terapi Murotal Al-Qur'an Surat Arrahman Meningkatkan Kadar β -Endorphin dan Menurunkan Intensitas Nyeri pada Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 28(3), 213-216.
- Bahrudin, Mochamad. 2017. *Patofisiologi Nyeri (Pain)*. Vol.13, No.1. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sainmed/article/view/5449/5246>. Diakses pada 06 April 2020
- Barrett Kim E [et al.] *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Ganong [Buku]*. - Jakarta : EGC Medical, 2012. - 24th
- Beckett, A. E. (2010). Are we doing enough to prevent patient injury caused by positioning for surgery?. *Journal of perioperative practice*, 20(1), 26-29.
- Brunner & Suddarth. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah edisi 8 volume 3*. Jakarta: EGC.
- Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. *Public Heal Rep*. 1985;100(2):126-31. 1985
- Carskadon, M. and Dement, W. (2011). Monitoring and staging human sleep. In Kryger and Dement. 4th Edition. *Principles and practice of sleep medicine*. Saint Louis. Elsevier Saunders. ISBN 978-1-4377-0731-1.
- CIPE, *Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem* (2011). Versão 2. Lisboa. Ordem dos Enfermeiros. ISBN 978-92-95094-35-2.
- Corwin, Elizabeth J. (2009). *Buku Saku Patofisiologi*. Jakarta: EGC

- Datak, G., Yetti, K., & Hariyati, R. T. S. (2008). Penurunan nyeri pascabedah pasien tur prostat melalui relaksasi Benson. *Jurnal keperawatan Indonesia*, 12(3), 173-178.
- Deng, L. X., Patel, K., Miaskowski, C., Maravilla, I., Schear, S., Garrigues, S., ... & Ritchie, C. S. (2018). Prevalence and characteristics of moderate to severe pain among hospitalized older adults. *Journal of the American Geriatrics Society*, 66(9), 1744-1751.
- Denkena, B. dan D. Biermann., 2014. *Cutting edge geometries*. *CIRP Annals - Manufacturing Technology*. 63: 631-653)
- Dinarti, Aryani, R., Nurhaeni, H., & Chairani, R. (2013). *Dokumentasi Keperawatan (2nd ed.)*. Jakarta: TIM.
- Debora. 2013. *Proses Keperawatan dan Pemeriksaan Fisik*. Jakarta: Salemba Medika
- Darmadi.(2015). *Sistem Sirkulasi*. Diakses http://www.teachpe.com/anatomy/circulatory_system.php
- Delaune, Sue C., Ledner, Patricia K. 2011. *Fundamentals of Nursing : Standards and Practice*. Delmar a Division of Thomson Learning. United State of America
- Doengoes, Marilyn E, ddk. 2000. *Rencana Asuhan Keperawatan*. Edisi3. Jakarta: EGC.
- Diskes. Baliprov, 2016. Aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk mencapai kesehatan dan kebugaran jasmani
- Dzاهر, A. (2017, Februari Jumat). MIMS Today. Diambil kembali dari Today.mims.com: http://www.readorrefer.in/article/Factors-influencing-personal-hygiene-practices_2260/

- Erazo-Muñoz, M. A., & Colmenares-Mejía, C. C. (2018). Pain in hospitalized patients in a third-level health care institution. *Revista colombiana de anestesiología*, 46(1), 19-25.
- Fabbian, F., De Giorgi, A., Pala, M., Mallozzi Menegatti, A., Gallerani, M., & Manfredini, R. (2014). Pain prevalence and management in an internal medicine setting in Italy. *Pain research and treatment*, 2014.
- Fayaz, A., Croft, P., Langford, R. M., Donaldson, L. J., & Jones, G. T. (2016). Prevalence of chronic pain in the UK: a systematic review and meta-analysis of population studies. *BMJ open*, 6(6).
- Garber, Carol Ewing., et al. 2011. Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing Exercise
- Guyton, A. C., Hall, J. E., 2014. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 12*. Jakarta : EGC, 1022
- Ganong, W. F., 2008. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 22*. Jakarta : EGC , 280- 81.
- Jarvis, S., & Saman, S. (2018). Cardiac system 1: anatomy and physiology | *Nursing Times*. *Nursing Times*, 114(2), 34–37. Retrieved from <https://www.nursingtimes.net/clinical-archive/cardiovascular-clinical-archive/cardiac-system-1-anatomy-and-physiology-29-01-2018/>
- Loukas, M., Saad, Y., Tubbs, R. S., & Shoja, M. M. (2009). The heart and cardiovascular system in the Qur'an and Hadeeth. *International Journal of Cardiology*. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2009.05.011>

- Germossa, G. N., Hellesø, R., & Sjetne, I. S. (2019). Hospitalized patients' pain experience before and after the introduction of a nurse-based pain management programme: a separate sample pre and post study. *BMC nursing*, 18(1), 40.
- Hakim Arief. (2013). *Jangan Tidur Sore HAri*. Cet. I; Jogjakarta: Diva Press
- Hanfi Muchtar. (2014). *Hidup Sehat Setiap hari Seperti Nabi*. Cet. I; Surakarta: Ziyad Books
- Hidayat, A. Azis Alimul. 2005. *Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta : EGC.
- Hidayat, A. A. A., & Uliyah, M. (2015). *Buku Ajar Ilmu Keperawatan Dasar*. Jakarta: Salemba medika.
- Herdman, T. Heather. 2015. *Diagnosis Keperawatan Defenisi dan Klasifikasi 2015-2017*. Jakarta : EGC
- Herlina, Rustina, Yeni., dan Syahreni, Elfi. 2014. *Aplikasi Model Konservasi Levine dalam Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Bayi Prematur di Ruang Perinatologi RSUPN Dr. Ciptomangunkusumo*
- Herdman, T. Heatler, dkk. 2012. *NANDA International Diagnosis Keperawatan : Definisi dan Klasifikasi 2012-2014*. Jakarta: EGC
- Herdman, T. Heatler. 2015. *Diagnosis Keperawatan Defenisi dan Klasifikasi 2015-2017*. Jakarta : EGC
- Henschke, N., Kamper, S. J., & Maher, C. G. (2015, January). The epidemiology and economic consequences of pain. In *Mayo Clinic Proceedings* (Vol. 90, No. 1, pp. 139-147). Elsevier.

- Herlina, Rustina, Yeni., dan Syahreni, Elfi. 2014. Aplikasi Model Konservasi Levine dalam Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Bayi Prematur di Ruang Perinatologi RSUPN Dr. Ciptomangunkusumo
- IASP, I. (2012). International Association for the Study of Pain (IASP) Taxonomy URL: <http://www.iasp-pain.org>.
- Indriyani, P., Hayati, H., & Chodidjah, S. (2013). Kompres dingin dapat menurunkan nyeri anak usia sekolah saat pemasangan infus. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 16(2), 93-100.
- International Association for the Study of Pain. IASP taxonomy. <http://www.iasp-pain.org/Taxonomy?&navItemNumber=576>. Updated October 20, 2014.
- Irawan, H.A. (2013). - .International Conference on Cross Cultural Collaboration in Nursing for Sustainable Development". Bangkok, Thailand, 9-10 September 2013.
- Johnson, J. (2017, Maret 29). Hygiene Expert. Diambil kembali dari hygieneexpert.co.uk: www.hygieneexpert.co.uk/conditionsthataffectpersonalhygiene.html
- Kozier & Erb's, (2015). Fundamental of nursing 3rd edition. Melbourne: Pearson Australia Group
- Kasiati, & Rosmalawati, N. W. D. (2016). Kebutuhan Dasar Manusia I. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan. 2017. Kebutuhan Dasar Manusia II. Jakarta Selatan : Pusdik SDM Kesehatan
- Mardana, I.K., & Aryasa, T. (2017). Penialain Nyeri. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Retrieved from

- https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/0a3e5b2c21e3b90b485f882c78755367.pdf
- Mangku G, Senapathi TGA. (2010). Buku Ajar Ilmu Anestesia dan Reanimasi. Jakarta: Indeks.
- Mubarak, I.W., et al., (2015). Buku Ajar Ilmu Keperawatan Dasar (Buku 1). Salemba Medika : Jakarta.
- Mubarak, Wahit Iqbal.2017.Buku ajar kebutuhan dasar manusia : teori & aplikasi dalam praktek. Jakarta:EGC
- Muntlin, Å., Carlsson, M., Säfwenberg, U., & Gunningberg, L. (2011). Outcomes of a nurse-initiated intravenous analgesic protocol for abdominal pain in an emergency department: a quasi-experimental study. *International journal of nursing studies*, 48(1), 13-23.
- Muttaqin, Arif. 2014. "Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Pernapasan". Jakarta : Salemba Medika
- Munthe, Naomi A.A. 2017. Asuhan Keperawatan dengan Prioritas Masalah Gangguan Kebutuhan Nutrisi Kurang dari Kebutuhan Tubuh di RSUP H.Adam Malik Medan. Universitas Sumatera Utara : Repositori Institusi USU
- NANDA NIC NOC. 2013. Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagona Klien Medis. Yogyakarta: Medication Publishing
- North American Nursing Diagnosis Association. 2012. Nursing Diagnoses: Definition & Classification 2012-2014. Philadelphia.
- Nurko, S., & Scott, S. M. (2011). Coexistence of constipation and incontinence in children and adults. Best practice & research Clinical gastroenterology, 25(1), 29-41.

- Ohayon, M. M. (2011). Epidemiological overview of sleep disorders in the general population. *Sleep Medicine Research*, 2(1), 1-9.
- Odonkor, S. T., Kitcher, J., Okyere, M., & Mahami, T. (2019). Self-Assessment of Hygiene Practices towards Predictive and Preventive Medicine Intervention: A Case Study of University Students in Ghana. *BioMed Research International*.
- Patasik, C. K., Tangka, J., & Rottie, J. (2013). Efektifitas Teknik Relaksasi Nafas Dalam Dan Guided Imagery Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesare Di Irina D Blu Rsup Prof. Dr. RD Kandou Manado. *JURNAL KEPERAWATAN*, 1(1).
- Purnamasari, E. (2014). Efektifitas kompres dingin terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien fraktur Di RSUD Ungaran. *Karya Ilmiah*.
- Potter, P., & Perry, A. (2012). *Fundamental of Nursing*. Jakarta: EGC.
- Potter, Perry. (2010). *Fundamental Of Nursing: Concep, Proses and Practice*. Edisi 7. Vol. 3. Jakarta : EGC
- Raharjo Ahmad Rinto. (2014). *Rahasia Keajaiban Hidup Sehat Dan Berkah Rasulullah*. Cet. I; Yogyakarta: Araska
- Rosmalawati, N. D., & Kasiati. (2016). *Kebutuhan Dsar Manusia 1*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan.
- Reefani Nor Kholish. (2014). *Pola Hidup Dan Tidur Sehat Ala Rasulullah saw*. Jakarta: PT Elex media Komput indo.
- Saladin, Kenneth S. (2012). *Anatomy and Physiology: The Unity of Form and Function*. New York: McGraw Hill. p. 315

- Syaifuddin.(2017). *Anatomi Tubuh Manusia untuk Mahasiswa Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sherwood, L. (2011). *Fisiologis manusia: dari sel – ke sistem (edisi 6) (Brahm. U.P, penerjemah)*. Jakarta: EGC.
- Sholehah Mar'atus. (2016). *Posisi Tidur Dalam Tinjauan Hadits*. Vol 5 nomor 2. Palembang
- Syarfaini. (2012). *Dasar-dasar Ilmu Gizi* . Cet I; Makassar: Alauddin University Press
- Suwarsa, Oki. 2018. Terapi Cairan dan Elektrolit pada Keadaan Gawat Darurat Penyakit Kulit. *Jurnal Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin*, Volume 30, No2. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
- Sumaryani, S., & Indah, P. (2015). Senam disminorhea berbasis Ar-Rahman terhadap penurunan nyeri. *Jurnal Universitas Airlangga*, 10(2).
- Taylor, C.R., Lilis, C., Lemone, P., Lynn, P., 2011. *Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care*, 7th ed. Wolters Kluwer, China
- Tarwoto & Wartonah. 2010. *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan* Edisi 4. Jakarta : Salemba Medika
- Taherkhani A, Shahrokhi A, Barikani A, Rashvand F. Compare the Quality Nursing Care Related to Enteral Nutrition with Standards in Patient at Intensive Care Unit (ICU) in Hospital of Qazvin University of Medical Science. *Alborz University Medical Journal* : Volume 8, No.4 : 377-386.
- Tarwoto dan Wartonah., 2015. *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan*. Edisi :4 .Jakarta

Tucker,susan,mary,eleaner,majorie. 1998. Standar perawatan pasien: proses keperawatan, diagnosis dan evaluasi. Jakarta: EGC

Tim Pokja SDKI DPP PPNI.2016. *Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, Defenisi dan Indikator Diagnostik, Edisi 1.* Jakarta Selatan : DPP PPNI

Tim pokja SIKI DPP PPNI. 2018. *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, Definisi dan Tindakan Keperawatan, edisi 1.* Jakarta Selatan: DPP PPNI.

Tim pokja SIKI DPP PPNI. 2018. *Standar Luaran Keperawatan Indonesia, Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan, edisi 1.* Jakarta Selatan: DPP PPNI.

Vaughans, B. W. (2013). *Keperawatan Dasar.* Yogyakarta: Rapha Publishing.

Yüce, M., Zoroglu, S. S., Ceylan, M. F., Kandemir, H., & Karabekiroglu, K. (2013). Psychiatric comorbidity distribution and diversities in children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder: a study from Turkey. *Neuropsychiatric disease and treatment*, 9, 1791.

Yudianta, N.(2015. *Assessment nyeri. Patient confort assessment guide.*

