

**PENGARUH PELAYANAN INFORMASI OBAT TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN PASIEN RAWAT JALAN INFEKSI SALUAN KEMIH DI  
PUSKESMAS DANGA PERIODE JANUARI-MARET 2017**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**NURJANNA**  
**NIM. 70100112064**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurjanna  
NIM : 70100112064  
Tempat/Tanggal Lahir : Nabire/2 Mei 1994  
Jurusan : Farmasi  
Alamat : Jln. Anton Bhia Wea, Kel. Danga, Kec. Aesesa, Kab.  
Nagekeo, Provinsi NTT  
Judul : Pengaruh Pelayanan Informasi Obat Terhadap Tingkat  
Kepatuhan Pasien Rawat Jalan Infeksi Saluran Kemih di  
Puskesmas Danga Periode Januari-Maret 2017

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 5 Agustus 2019

Penyusun

**Nurjanna**  
70100112064

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pelayanan Informasi Obat Terhadap Tingkat Kepatuhan Pasien Rawat Jalan Infeksi Saluran Kemih Di Puskesmas Danga Periode Januari-Maret 2017” yang disusun oleh Nurjanna, NIM 70100112064, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, di uji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang di selenggarakan pada hari Senin 5 Agustus 2019 yang bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijja 1440 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi.

**Makassar, 5 Agustus 2019**  
**4 Dzulhijja 1440 H**

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A  
Sekretaris : Haeria, S.Si., M.Si  
Pembimbing I : A. Asrul Ismail, S.Farm, M.Sc, Apt  
Pembimbing II : Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., Apt  
Penguji Kompetensi : Nursyamsi Dhuha, S.Farm, M. Si  
Penguji Agama : Dr. Wahyuddin G., M.Ag

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



**Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A.**

NIP.19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam juga tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pelayanan Informasi Obat Terhadap Tingkat Kepatuhan Pasien Rawat Jalan Infeksi Saluran Kemih Di Puskesmas Danga Periode Januari-Maret 2017” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak lepas dari dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat do’a, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang dengan tuntunan serta limpahan kasih-Nya mengajarku arti dan kekuatan dalam hidup,

2. Bapak Prof. H. Hamdan Juhanis, MA, PhD selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
3. Ibu Dr. Nurhidayah, S.Kep., Ns, M.Kes selaku Wakil Dekan I, ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes selaku Wakil Dekan II, dan bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
4. Ibu Haeria, S.Si., M.Si Selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
5. Bapak A. Asrul Ismail, S. Farm., M. Sc., Apt. Selaku pembimbing pertama yang dan ibu Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis,
6. Ibu Nursyamsi Dhuha, S.Farm., M. Si selaku penguji kompetensi dan Bapak Dr. Wahyuddin G, M.Ag selaku penguji agama yang telah memberikan saran dan arahannya dalam penyempurnaan skripsi,
7. Orang tua tercinta Ayahanda Abubakar dan Ibunda Kadaria dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya baik berupa materi, nasehat dan do'a yang tulus serta kesabarannya, suami tercinta Syahrullan Achmad yang dengan setia mendukung setiap aktivitas kuliah saya dengan penuh pengorbanan baik berupa materi, nasehat dan do'a yang tulus serta kesabarannya, anak tercinta Rania Hafizah Mujahidah yang menjadi penyemangat bunda, kedua saudaraku tercinta Masita dan Masida, serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan restu dan Do'a-Nya,

8. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan Farmasi hingga saat ini,
9. Teman-teman Seperjuangan ISOHYDRIS 2012, terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini,
10. Kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin Makassar serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada skripsi ini. Oleh karena, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini kedepan-Nya. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah disisi Allah SWT dan bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin



Makassar, 5 Agustus 2019

**Nurjanna**  
70100112064

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	4
1. Definisi Operasional .....	4
2. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Pelayanan Farmasi .....	8
B. Pelayanan Informasi Obat .....	9
C. Informasi Yang Diberikan Pada Pasien .....	11
D. Kepatuhan .....	16
1. Definisi Kepatuhan .....	16
2. Faktor-Faktoe Yang Berkaitan Dengan Kepatuhan .....	16
3. Metode Pengukuran Tingkat Kepatuhan .....	17
4. Metode Meningkatkan Kepatuhan .....	18
E. Infeksi Saluran Kemih .....	19

1. Definisi .....	19
2. Klasifikasi .....	20
3. Etiologi .....	22
4. Epidemiologi .....	23
5. Patofisiologi .....	24
6. Manifestasi Klinik .....	28
7. Diagnosis.....	29
8. Tata Laksana.....	30
9. Pemberian Profilaksis.....	34
F. Tinjauan islam .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan lokasi penelitian.....	40
1. Jenis penelitian .....	40
2. Lokasi penelitian .....	40
B. Pendekatan penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel.....	40
1. Populasi .....	40
2. Sampel .....	41
D. Metode pengumpulan data.....	41
1. Variabel penelitian.....	41
2. Kriteria sampel.....	41
3. Pengumpulan data.....	42
E. Instrument penelitian.....	42
F. Pengolahan dan Analisis data penelitian .....	44
1. Pengolahan data.....	44
2. Analisis data .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Hasil Penelitian .....	45
B. Pembahasan .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70



KEPUSTAKAAN .....	71
LAMPIRAN .....	73
RIWAYAT HIDUP .....	97



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Pelayanan Informasi Terapi Antibiotik Pada Pasien ISK .....	12
2. Kemungkinan ESO Yang Terjadi Pada Pasien ISK .....	12
3. Interaksi Obat Pada Pasien ISK .....	13
4. Antibiotik Yang Umumnya Digunakan dalam Pengobatan ISK .....	3
5. Terapi Empirik Antibiotik Pada Pasien ISK .....	33
6. Lembar pengumpul data.....	42
7. Kuesioner MMAS-8.....	43
8. Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia.....	46
9. Distribusi Pasien Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
10. Distribusi Pasien Berdasarkan Pekerjaan.....	48
11. Distribusi Pasien Berdasarkan Lama Perawatan.....	48
12. Distribusi Pasien Berdasarkan Jumlah Obat Yang Digunakan.....	49
13. Distribusi Penggunaan Obat Pada Pasien ISK.....	50
14. Distribusi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien ISK.....	51
15. Penggunaan Obat Terapi Penunjang ISK.....	52
16. Distribusi Kepatuhan Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia .....	53
17. Distribusi Kepatuhan Pasien Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	55
18. Distribusi Kepatuhan Pasien Berdasarkan Pekerjaan .....	56
19. Distribusi Kepatuhan Pasien Berdasarkan Lama Perawatan .....	57
20. Distribusi Kepatuhan Pasien Berdasarkan Jumlah Obat Yang Digunakan....	59
21. Skor MMAS-8 Sebelum dan Setelah PIO .....	64
22. Hasil Korelasi dan Analisis Regresi.....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Puskesmas Danga .....	45
2. Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
3. Distribusi Pasien Berdasarkan Usia .....	47
4. Distribusi Pasien Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	47
5. Distribusi Pasien Berdasarkan Pekerjaan.....	48
6. Distribusi Pasien Berdasarkan Lama Perawatan.....	49
7. Distribusi Pasien Berdasarkan Jumlah Obat Yang Digunakan.....	49
8. Distribusi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien ISK .....	52
9. Distibusi Penggunaan Terapi Penunjang Pasien ISK.....	53
10. Distribusi Kepatuhan Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin .....	54
11. Distribusi Kepatuhan Pasien Berdasarkan Usia.....	55
12. Distribusi Kepatuhan Pasien Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	56
13. Distribusi Kepatuhan Pasien Berdasarkan Pekerjaan .....	57
14. Distribusi Kepatuhan Pasien Berdasarkan Lama Perawatan.....	58
15. Distribusi Kepatuhan Pasien Berdasarkan Jumlah Obat.....	59
16. Persentase Tingkat kepatuhan Pasien.....	65

## ABSTRAK

Nama Penulis : Nurjanna  
NIM : 70100112064  
Judul Skripsi : Pengaruh Pelayanan Informasi Obat Terhadap Tingkat Kepatuhan Pasien Rawat Jalan Infeksi Saluran Kemih Di Puskesmas Danga Periode Januari-Maret 2017

---

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi bakteri yang terjadi pada saluran kemih. ISK merupakan kasus yang sering terjadi dalam dunia kedokteran. Antibiotik digunakan dalam terapi ISK, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan obat pada pasien infeksi saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga dan Pengaruh Pelayanan Informasi Obat terhadap tingkat kepatuhan pasien infeksi saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga dengan menggunakan Kuesioner kepatuhan yaitu *Modification Morisky Scale* (MMAS-8). Kemudian dilakukan uji statistik menggunakan distribusi frekuensi, uji Wilcoxon, uji Pearson dan uji Spearman's Rho.

Rancangan penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental yang dilakukan secara prospektif dan teknik pengumpulan data secara *purposive sampling*. Hasil penelitian penggunaan antibiotik pada 25 sampel yaitu Ciprofloxacin 24 (96%) pasien, dan Amoxicillin 1(4%) pasien. Hasil pretest menunjukkan bahwa pada awal penelitian tingkat kepatuhan 24 (96%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah dan 1 (4%) pasien dengan tingkat kepatuhan tinggi. Hasil posttest menunjukkan bahwa setelah pemberian informasi obat terdapat 11 (44%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah, 12 (48%) pasien dengan tingkat kepatuhan sedang, dan 2 (8%) pasien dengan tingkat kepatuhan tinggi. Hasil uji statistik menggunakan uji Wilcoxon dengan nilai  $p\ value < 0,05$  menunjukkan bahwa pelayanan informasi obat (PIO) dapat meningkatkan kepatuhan pasien. Sedangkan hasil uji Pearson dan uji Spearman's Rho dengan nilai  $p\ value > 0,05$  menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, lama pengobatan, jumlah obat dan efek samping dengan tingkat kepatuhan pasien infeksi saluran kemih.

Kata kunci: ISK, PIO, Kepatuhan, MMAS-8, Uji Wilcoxon

## ABSTRACT

Author Name : Nurjanna  
NIM : 70100112064  
Thesis Title : Effect of Drug Information Services on Adherence Levels of Outpatient Urinary Tract Infection at Danga Health Center for the Period of January-March 2017

---

Urinary tract infection (UTI) is a bacterial infection of the urinary system. UTI is a case that often occurs in the medical world. Antibiotics treatments are used in UTI therapy. Therefore, this study was conducted with the aim to describe the use of drugs in patients with urinary tract infections treated at Danga Health Center and the Effect of Drug Information Services on the level of adherence of patients with urinary tract infections treated at the Danga Health Center using a adherence questionnaire namely *Modification Morisky Scale* (MMAS-8). Then statistical tests using frequency distribution, Wilcoxon test, pearson test and Sperman'S Rho test were performed.

The design of this study used a quasi-experimental method that was carried out prospectively and the data collection method use purposive sampling. The results of the study used antibiotics in 25 samples, ware Ciprofloxacin 24 (96%) patients, and Amoxicillin 1 (4%) patients. The pretest results showed that at the beginning of the study the level of adherence was 24 (96%) patients with low levels of adherence and 1 (4%) patients with high levels of adherence. The posttest results showed that after given drug information there were 11 (44%) patients with a low level of adherence, 12 (48%) patients with moderate levels of adherence, and 2 (8%) patients with high levels of adherence. The results of statistical tests using the Wilcoxon test with percentage p value of  $0.000 < 0.05$  show that the Drug Information Service (PIO) can improve patient adherence to treatment. while the pearson test and Spearman'S Rho test results with percentage p value  $> 0,05$  shows that there is no significant relationship between factors of gender, age, education, occupation, duration of treatment, drugs amounts and side-effects with the level of patiens adherence with urinary tract infections.

Keywords: UTI, Drug Information Service, Adherence, MMAS-8, *Wilcoxon Test*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 72 tahun 2016 tentang pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EFPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016: 5-6).

Pelayanan Informasi Obat bertujuan untuk menyediakan beragam informasi terkait obat kepada pasien dan juga tenaga kesehatan serta untuk menunjang penggunaan obat yang rasional. Kegiatan-kegiatan dalam PIO meliputi menjawab pertanyaan pasien atau tenaga kesehatan lain, menerbitkan buletin, leaflet, poster, ataupun newsletter, menyediakan informasi untuk tim farmasi dan terapi terkait penyusunan formularium rumah sakit, melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016: 32-33).

Pelayanan informasi yang jelas, mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana dan terkini sangat diperlukan dalam upaya penggunaan obat yang rasional oleh pasien. Penyerahan obat kepada pasien harus disertai dengan pemberian informasi secara lisan dan tulisan. Informasi lisan sekurang-kurangnya terdiri dari informasi frekuensi, cara pemakaian obat, jangka waktu pengobatan, efek samping obat, aktifitas, dan makanan atau minuman yang harus dihindari selama terapi. Informasi tulisan

dalam bentuk label atau etiket meliputi nama, aturan pakai, cara pakai, dan tanggal penyerahan (Andika Pradana. 2015: 3).

Kepatuhan dalam menggunakan obat dapat diartikan sebagai suatu sikap dalam menjaga dan selalu mengikuti dosis serta sasaran atau anjuran dari tenaga kesehatan dalam upaya menyembuhkan penyakit yang diderita pasien. Sikap patuh untuk mengikuti suatu terapi yang diberikan akan muncul jika ada sebuah pemahaman dan kejelasan tentang bagaimana obat itu digunakan (Andika Pradana. 2015: 3).

Infeksi saluran kemih adalah salah satu penyakit menular yang paling banyak terjadi dengan pengeluaran keuangan yang cukup besar pada masyarakat. Di Amerika dan Australia terjadi lebih dari 7 juta kunjungan dokter setiap tahunnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa 10-12 % dirawat di bangsal Urologi *health care associated infeksi* (HAI), Sementara itu penduduk Indonesia yang menderita infeksi saluran kemih diperkirakan sebanyak 222 juta jiwa. Infeksi saluran kemih di Indonesia dan prevalensinya masih cukup tinggi. Menurut perkiraan departemen kesehatan Republik Indonesia, jumlah penderita ISK di Indonesia adalah 90-100 kasus per 100.000 penduduk pertahunnya atau sekitar 180.000 kasus baru pertahun (Grabe, M, 2015:7).

Penyakit infeksi yang sering ditemukan di praktek dokter umum adalah infeksi saluran kemih (ISK) walaupun bermacam-macam antibiotika sudah tersedia di pasaran. Data penelitian epidemiologi klinik melaporkan hampir 25-35 % semua perempuan dewasa mengalami ISK selama hidupnya. Pada infeksi saluran kemih mikroorganisme dapat berkembang biak dalam saluran kemih, yang dalam keadaan normal tidak mengandung bakteri, virus, atau mikroorganisma lain. Infeksi saluran kemih dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan dari semua usia baik pada anak, remaja, dewasa maupun pada usia lanjut, akan tetapi dari kedua jenis kelamin, ternyata wanita

lebih sering terjadi dari pada laki-laki dengan angka populasi umum kurang lebih 5-15 % (Shirly Kumala, 2009:4).

Islam adalah rahmat dan hidayah dari Allah yang menjadikan alam semesta beserta isinya untuk sekalian manusia. Islam adalah agama yang Allah inginkan sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam segala keadaan dan urusan, baik berupa urusan yang besar (utama) maupun berupa urusan yang kecil (tambahan). Disamping itu islam adalah agama yang mengandung nilai-nilai dan aturan yang membawa manusia untuk hidup sehat dan sejahtera (Sulaiman. 2010: 11).

Rasulullah SAW bersabda, dalam hadits Abu Huraira RA

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula” (H.R. AL-Bukhari. No 5246).

Setiap yang diciptakan olehNya diperuntukan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan setiap penyakit pasti ada obatnya yang menjadi penawarnya agar penyakit itu dapat sembuh. Semua penyakit memiliki obatnya, manusia yang perlu berusaha untuk mencari dan menggunakan obat-obat tersebut bagi penyembuhan penyakitnya.

Sesuai dengan aturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian dirumah sakit yang disebutkan pada pasal 2 tentang pengaturan standar pelayanan kefarmasian dirumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Berdasarkan paparan diatas maka dilakukan penelitian pengaruh pelayanan informasi obat terhadap tingkat



kepatuhan pasien rawat jalan infeksi saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga periode Januari-Maret 2017.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran penggunaan obat pasien rawat jalan infeksi saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga?
2. Bagaimana pengaruh pemberian informasi obat terhadap tingkat kepatuhan pasien rawat jalan infeksi saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

1. Definisi Operasional
  - a. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi ketika ditemukan bakteri pada urin di kandung kemih yang umumnya steril (Clevo Rendi, 2012: 217).
  - b. Pelayanan informasi obat (PIO) adalah kegiatan penyediaan informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker terhadap dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain diluar rumah sakit (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016: 32).
  - c. Kepatuhan adalah tingkat perilaku pasien yang tertuju terhadap instruksi yang diberikan dalam bentuk terapi (Andika Pradana, 2015: 15).
  - d. Pasien adalah orang sakit atau orang yang menjalani pengobatan untuk kesembuhan penyakitnya (Direktorat Jendral Pelayanan Kefarmasian, 2006: 6).

#### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini ditujukan kepada seluruh pasien rawat jalan infeksi saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga. Masalah dibatasi pada bagaimana gambaran penggunaan obat pada pasien rawat jalan infeksi saluran kemih dan bagaimana

pengaruh pemberian informasi obat kepada pasien rawat jalan infeksi saluran kemih terhadap tingkat kepatuhan minum obat. Sebelum diberikan informasi obat, pasien diberikan kuesioner MMAS-8 pertama dan setelah pemberian informasi obat pasien diberikan lagi kuesioner MMAS-8 kedua.

#### **D. Kajian Pustaka**

Atika Wahyu Puspasari, Analisis Efektifitas Penggunaan Booklet Obat Terhadap Tingkat Kepatuhan Ditinjau Dari kadar Hemoglobin Terглиikasi dan Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) Pada Pasien Diabetes Melitus, Depok, 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas pemberian *booklet* obat terhadap tingkat kepatuhan pasien. Metode: penelitian ini merupakan pre-eksperimental yang dilakukan secara prospektif di puskesmas Bakti Jaya Kota Depok. Sampel terdiri dari 30 pasien yang diberikan *booklet* pengobatan. Skor MMAS-8 dan persentase HbA<sub>1c</sub> diukur sebelum dan setelah 8 minggu setelah pemberian intervensi. Hasil: edukasi diabetes dengan pemberian *booklet* efektif membantu peningkatan kepatuhan pasien.

Andika Pradana Putra, Profil Pelayanan Informasi Obat yang Diterima dan Kepatuhan Pasien Asma Menurut Persepsi Pasien di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pelayanan informasi obat yang diterima dan kepatuhan pasien asma berdasarkan persepsi pasien di kabupaten Sleman. Metode penelitian: merupakan penelitian observasional deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Responden dalam penelitian ini adalah penderita asma yang pernah menerima pelayanan informasi obat di kabupaten Sleman. Analisis data dilakukan secara deskriptif berupa frekuensi dan persentase. Hasil: tidak semua komponen informasi mengenai penyakit dan obat asma diterima oleh responden. kepatuhan pasien berdasarkan persepsi pasien yaitu sebesar 59,86 %.

Yugo Susanto, Aplikasi *Pillbox Reminder* Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat Pasien Rawat Jalan di Apotik Appo Farma Banjar Baru. Tujuan Penelitian; Mengetahui gambaran tingkat kepatuhan minum obat pasien rawat jalan. Metode penelitian: penelitian ini menggunakan rancangan kuasi eksperimental. Pengambilan data secara prospektif dan subyek yang mengikuti penelitian ini dari awal sampai akhir penelitian sebanyak 42 pasien dengan intervensi berupa aplikasi digital *pillbox reminder*. Kriteria eksklusi adalah pasien dengan kondisi tuli, buta huruf dan pasien dewasa berusia 18-65 tahun yang memiliki *smartphone* namun tidak bisa mengoperasikannya. Pengumpulan data dengan wawancara dan pengisian kuesioner kepatuhan MMAS *pre* dan *post* intervensi aplikasi digital *pillbox reminder*. Hasil penelitian: tingkat kepatuhan minum obat sebelum intervensi: kepatuhan tinggi 7,14 %, sedang 38,09 %, dan rendah 54,76 %. Sesudah intervensi: kepatuhan tinggi 47,61 %, sedang 33,09 %, dan rendah 19,04 %. Terdapat perbedaan bermakna ( $p=0,000$ ) kepatuhan minum obat sebelum ( $5,45\pm 1,97$ ) dan sesudah ( $7,24\pm 0,99$ ). Rata-rata perubahan adalah  $1,79\pm 0,98$ . Hasil uji regresi menunjukkan bahwa aplikasi digital *pillbox reminder* berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat pada pasien ( $p=0,000$ ;  $R\text{ Square } 0,272$ ).

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui gambaran penggunaan obat pada pasien rawat jalan infeksi saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga.
2. Mengetahui pengaruh pelayanan informasi obat terhadap tingkat kepatuhan pasien rawat jalan infeksi saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Puskesmas

Secara keseluruhan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi kepala puskesmas, komisi medik, panitia farmasi dan terapi serta instalasi farmasi untuk melakukan intervensi bila diperlukan baik berupa perubahan sistem ataupun kebijakan peraturan.

### 2. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman belajar dan penerapan ilmu farmasi yang diperoleh peneliti selama mengikuti pendidikan di Farmasi UIN Alauddin Makassar dan menerapkannya di tempat kerja nanti.

## **G. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran penggunaan obat pada pasien rawat jalan infeksi saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga. Pelayanan Informasi Obat (PIO) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien infeksi saluran kemih sehingga meningkatkan efektifitas terapi yang rasional dan menjadi bahan masukan bagi pihak Puskesmas Danga serta tenaga farmasi lainnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Pelayanan Farmasi***

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan yang langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti serta untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016: 4-5).

Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visitte*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispending sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016: 5-6).

Pelayanan farmasi dirumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau dari semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Apoteker khususnya yang bekerja dirumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar

perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Apoteker harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum. Dengan demikian para apoteker di Indonesia dapat berkompetisi dan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Perkembangan di atas dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi apoteker untuk maju meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara komprehensif dan simultan, baik yang bersifat menegerial, maupun farmasi klinik. Strategi optimalisasi harus ditegakkan dengan cara memanfaatkan sistem informasi rumah sakit secara maksimal pada fungsi manajemen kefarmasian, sehingga diharapkan dengan model ini akan terjadi efisiensi tenaga dan waktu. Efisiensi yang diperoleh kemudian dimanfaatkan untuk melaksanakan fungsi pelayanan farmasi klinik secara intensif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016: 11-12).

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) (Peraturan Pemerintah, 2009:30).

### **B. Pelayanan Informasi Obat**

Pelayanan informasi obat (PIO) merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi dan rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit (kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016: 32).

Pelayanan informasi obat bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai obat pada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit dan pihak lain diluar rumah sakit, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat atau sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, terutama bagi tim farmasi dan terapi, serta menunjang penggunaan obat yang rasional (kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016: 32-33).

Pemberian informasi obat yang dilakukan meliputi tujuan terapi, cara penggunaan yang benar dan teratur, tidak boleh berhenti minum antibiotik tanpa sepengetahuan dokter atau apoteker (harus diminum sampai habis kecuali jika terjadi reaksi obat yang tidak diinginkan), reaksi obat yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi serta tindakan yang harus dilakukan, dan cara penyimpanan (kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011: 16).

Kegiatan yang dilakukan dalam pemberian informasi obat yaitu (Andika Pradana, 2015: 13):

1. Memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara aktif dan pasif.
2. Menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon surat atau tatap muka.
3. Membuat buletin, leaflet, dan label obat.
4. Menyediakan informasi bagi komite atau panitia farmasi dan terapi sehubungan dengan penyusunan formularium rumah sakit.
5. Melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap.
6. Melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya.
7. Mengkoordinasi panitia tentang obat dan kegiatan pelayanan kefarmasian.

### ***C. Informasi yang Diberikan Pada Pasien***

Pemberian informasi obat meliputi tujuan terapi, cara penggunaan yang benar dan teratur, tidak boleh berhenti minum antibiotik tanpa sepengetahuan dokter atau apoteker (harus diminum sampai habis kecuali jika terjadi reaksi obat yang tidak diinginkan), reaksi obat yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi serta tindakan yang harus dilakukan dan cara penyimpanan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011: 16).

Prosedur pelayanan informasi obat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016: 21:

1. Membuka komunikasi antara apoteker dan pasien.
2. Menanyakan informasi latar belakang pasien seperti nama pasien, nomor telepon, alamat rumah, pekerjaan, jenis kelamin, usia, berat badan, riwayat penyakit (termasuk fungsi organ dan hasil laboratorium), riwayat pengobatan (yang diresepkan maupun yang dibeli bebas, dosis, lama pengobatan, pemberian obat yang lalu.
3. Menanyakan informasi penyakit terkait, riwayat pengobatan (interaksi obat dan kegagalan terapi), riwayat alergi dan riwayat efek samping obat.
4. Menanyakan hal-hal yang dikatakan dokter mengenai penyakit, jenis terapi, cara pemakaian, dan efek yang diharapkan dari obat tersebut
5. Menjelaskan rencana terapi, efek yang diharapkan dari obat tersebut, dosis, waktu penggunaan obat, lama penggunaan pengobatan, cara penggunaan obat, efek yang mungkin timbul saat menggunakan obat, hal-hal lain yang mungkin timbul seperti interaksi obat dengan obat lain, atau makanan tertentu dan kemungkinan terjadinya efek obat yang tidak dikehendaki



6. Melakukan verifikasi akhir dalam rangka mengecek pemahaman pasien
7. Dokumentasi dan penutup

Tabel 1. Pelayanan Informasi Terapi Antibiotik Pada Pasien ISK (Dipiro, 2015: 496).

Indikasi	Antibiotik	Dosis	Selang	Durasi (hari)
Simpleks	Trimetoprim-Sulfametoksazol	1 DS tablet	2x sehari	3
	Nitrofurantoin Monohidrat	100 mg	2x sehari	5
	Fosfomysin	3g	Dosis tunggal	1
	Ciprofloxacin	250 mg	2x sehari	3
	Levofloxacin	250 mg	1x sehari	3
	Amoxicillin-Clavulanat	500 mg	3x sehari	5-7
Kompleks	Trimetoprim-Sulfametoksazol	1 DS tablet	2x sehari	7-10
	Ciprofloxacin	250-500 mg	2x sehari	7-10
	Levofloxacin	250 mg	1x sehari	10
	Levofloxacin	750 mg	1x sehari	5
Amoxicillin-Clavulanat	500 mg	3x sehari	7-10	
Infeksi kambuhan	Nitrofurantoin	50 mg	1x sehari	6 bulan
	Trimetoprim-Sulfametoksazol	1/2 SS tablet	1x sehari	6 bulan
Pielonefritis	Trimetoprim-Sulfametoksazol	1 DS tablet	2x sehari	14
	Ciprofloxacin	500 mg	2x sehari	14
	Ciprofloxacin	1000 mg	1x sehari	7
	Levofloxacin	250 mg	1x sehari	10
	Levofloxacin	750 mg	1x sehari	5
Amoxicillin-Clavulanat	500 mg	3x sehari	14	

Tabel 2. Kemungkinan Efek Samping Obat yang Terjadi pada Pasien Infeksi Saluran Kemih (Dipiro, 2015: 496).

Obat	Reaksi Efek Samping	Parameter Monitoring
	Tarapi Oral	
Trimethoprim-sulfamethoxazole	Rash, sindrom Steven-Johnson, gagal ginjal, photosensitivity, hematologic (neutropenia, anemia, dll)	Serum kreatinin, BUN, elektrolites, tanda-tanda ruam dan CBC
Nitrofurantion	Intoleransi gastrointestinal, neuropati, dan reaksi pernapasan	Serum kreatinin dasar dan BUN

Fosfomycin	Diare, sakit kepala dan angioedema	Tidak ada tes rutin yang direkomendasikan
Fluoroquinolones Ciprofloxacin Levofloxacin	Hipersensitivitas, fotosensitivitas, gejala gastrointestinal, pusing, kebingungan, dan tendonitis	CBC, serum kreatinin dasar dan BUN
Penicillin Amoxicilin-clavulanat	Hipersensitivitas (rash yang muncul 3-14 hari setelah terapi dan alergi), diare, superinfeksi dan kejang kejang.	CBC, tanda-tanda ruam dan hipersensitivitas
Sefalosporin Cefdinir Cefpodoxime-proxetil	Hipersensitivitas (rash dan alergi), diare, superinfeksi dan kejang kejang	CBC, tanda-tanda ruam dan hipersensitivitas
Terapi Parenteral		
Aminoglikosida Gentamisin Tobramisin Amikasin	Kerusakan struktur telinga bagian dalam dan kerusakan ginjal	Serum kreatinin, BUN, serum konsentrasi obat, dan monitoring individual farmakokinetik
Penicillin Ampicillin-sulbactam	Hipersensitivitas (rash dan alergi), diare, superinfeksi dan kejang kejang	CBC, tanda-tanda ruam dan hipersensitivitas
Sefalosporin Seftriakson Seftazidime	Hipersensitivitas (rash dan alergi), diare, superinfeksi dan kejang kejang	CBC, tanda-tanda ruam dan hipersensitivitas
Carmapenems	Hipersensitivitas (rash dan alergi), diare, superinfeksi dan kejang-kejang	CBC, tanda-tanda ruam dan hipersensitivitas
Fluoroquinolon Siprofloksasin Levofloksasin	Hipersensitivitas, fotosensitivitas, gejala gastrointestinal, pusing, kebingungan, dan tendonitis	CBC, serum kreatinin dasar dan BUN

Tabel 3. Interaksi obat pada pasien infeksi saluran kemih (Charles Lacy, 2009)

Antibiotik	Interaksi Obat
Trimetoprim-sulfametoksazol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian ACE inhibitor bersama dengan trimethoprim dapat meningkatkan efek hiperkalemik dari ACE inhibitor. Perlu dilakukan monitoring terapi</li> <li>• Amatadin jika diberikan bersama trimethoprim dapat meningkatkan efek toksik yang merugikan dari amatadin. Secara khusus resiko mioklanus dapat ditingkatkan. Amatadin dapat meningkatkan konsentrasi serum trimethoprim. Perlu dilakukan monitoring terapi</li> <li>• Tiazolidindion jika diberikan bersama trimethoprim dapat menurunkan metabolisme tiazolidindion. Perlu dilakukan monitoring terapi</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azathioprin jika diberikan bersamaan dengan trimethoprim-sulfametoksazol dapat meningkatkan efek mielosupresif dari azathioprine. Perlu dilakukan monitoring terapi</li> <li>• Siklosporin jika diberikan dengan derivative sulfonamide dapat meningkatkan efek nefrotoksik dari siklosporin. Perlu dilakukan monitoring terapi</li> <li>• Angiotensin II reseptor bloker jika diberikan bersama trimethoprim dapat meningkatkan efek hiperkalemik dari ARB. Perlu dilakukan monitoring terapi</li> <li>• Methotrexate jika diberikan bersama trimethoprim-sulfametoksazol dapat meningkatkan efek yang merugikan dari methotreksat. Perlu pertimbangan modifikasi terapi</li> <li>• Fenitoin jika diberikan bersama derivat sulfonamide dapat menurunkan metabolisme fenitoin. Perlu monitoring terapi</li> <li>• Untuk sediaan oral diberikan 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan</li> </ul>
Nitrofurantion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norfloxacin jika diberikan bersama nitrofurantion dapat mengurangi efek terapeutik dari norfloxacin. Hindari kombinasi kedua obat ini</li> <li>• Konsentrasi serum nitrofurantion dapat meningkat jika diminum bersama makanan.</li> <li>• Efek antikolinergik (anisotropin, elidin, atropin, scopolamine, metocopolamin) dapat meningkatkan konsentrasi plasma nitrofurantoin dan mungkin meningkatkan efek samping obat</li> <li>• Magaldrat, magnesium karbonat, magnesium glukonat, magnesium sitrat, magnesium hidroksid, dapat mengurangi kemampuan antiinfeksi nitrofurantion</li> </ul>
Ciproflosasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antasida dapat menurunkan penyerapan antibiotik kuinolon pada pemberian oral kecuali sodium bikarbonat. Pertimbangkan modifikasi terapi</li> <li>• Garam kalsium menurunkan penyerapan antibiotik kuinolon pada pemberian oral kecuali kalsium klorida. Pertimbangkan modifikasi terapi</li> <li>• Kafein jika diberikan bersama ciprofloxacin akan menurunkan metabolisme kafein. Perlu monitoring terapi</li> <li>• Kortikosteroid jika diberikan bersama antibiotik kuinolon dapat meningkatkan efek merugikan dari kortikosteroid. Resiko tendonsitis dan pecahnya tendon dapat ditingkatkan. Perlu monitoring terapi</li> <li>• Didanosin dapat menurunkan penyerapan antibiotik kuinolon jika diberikan secara oral kecuali tablet salut enteric. Pertimbangkan modifikasi terapi</li> <li>• Garam magnesium menurunkan penyerapan ciprofloxacin jika diberikan bersamaan secara oral. Pertimbangkan modifikasi terapi</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agen NSAID jika diberikan bersama siprofloksasin dapat meningkatkan efek neurotoksik atau efek kejang. Perlu dilakukan monitoring terapi</li> <li>• Fenitoin jika diberikan bersama siprofloksasin dapat menurunkan konsentrasi serum fenitoin. Perlu dilakukan monitoring terapi</li> <li>• Probenesid dapat meningkatkan konsentrasi serum antibiotik siprofloksasin. Perlu dilakukan monitoring terapi</li> <li>• Sukralfat dapat menurunkan penyerapan siprofloksacin jika diberikan secara oral. Pertimbangkan modifikasi terapi</li> <li>• kadar serum siprofloksasin dapat menurun jika diberikan bersama susu atau jus yang diperkaya kalsium</li> </ul>
Levofloxacin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antasida dapat menurunkan penyerapan antibiotik kuinolon pada pemberian oral kecuali sodium bikarbonat. Pertimbangkan modifikasi terapi</li> <li>• Garam kalsium menurunkan penyerapan antibiotik kuinolon pada pemberian oral kecuali kalsium klorida. Pertimbangkan modifikasi terapi</li> <li>• Kortikosteroid jika diberikan bersama antibiotik kuinolon dapat meningkatkan efek merugikan dari kortikosteroid. Resiko tendonsitis dan pecahnya tendon dapat ditingkatkan. Perlu monitoring terapi</li> <li>• Didanosin dapat menurunkan penyerapan antibiotik kuinolon jika diberikan secara oral kecuali tablet salut enteric. Pertimbangkan modifikasi terapi</li> <li>• Garam magnesium menurunkan penyerapan levofloxacin jika diberikan bersamaan secara oral. Pertimbangkan modifikasi terapi</li> <li>• Agen NSAID jika diberikan bersama levoflosasin dapat meningkatkan efek neurotoksik atau efek kejang. Perlu dilakukan monitoring terapi</li> <li>• Probenesid dapat meningkatkan konsentrasi serum antibiotik kuinolon jika diberikan secara oral. Perlu monitoring terapi</li> <li>• Vitamin K antagonis misalnya warfarin jika diberikan bersama antibiotik kuinolon dapat meningkatkan efek antikoagulan dari vitamin K antagonis. Perlu dilakukan monitoring terapi</li> </ul>
Amoxicillin-Clafulanat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allopurinol meningkatkan potensi reaksi alergi terhadap amoxicillin. Perlu dilakukan monitoring terapi</li> <li>• Methotreksat jika diberikan bersama penisilin dapat menurunkan eksresi methotreksat. Perlu dilakukan monitoring terapi</li> <li>• Derifat tetrasiklin mengurangi efek terapi dari dari penisilin. Pertimbangkan modifikasi terapi</li> <li>• Agen urikosurik (probenesid) menurunkan eksresi penisilin. Perlu dilakukan monitoring terapi</li> </ul>

#### **D. Kepatuhan**

##### **1. Definisi kepatuhan**

Kepatuhan dalam pengobatan didefinisikan sebagai sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh tenaga medis mengenai penyakit dan pengobatannya. Tingkat kepatuhan untuk pasien biasanya digambarkan sebagai persentase jumlah obat yang diminum dan waktu minum obat dalam jangka tertentu (Atika Wahyu, 2012: 16).

##### **2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan**

Kepatuhan pasien terhadap pengobatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi (Atika Wahyu, 2012: 16):

###### **a. Faktor demografi**

Faktor demografi seperti suku, status sosio-ekonomi yang rendah dan tingkat pendidikan yang rendah dikaitkan dengan kepatuhan yang rendah terhadap regimen pengobatan.

###### **b. Faktor psikologi**

Faktor psikologi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap regimen pengobatan. Kepercayaan terhadap pengobatan dapat meningkatkan kepatuhan. Sedangkan factor psikologi seperti depresi, cemas, dan gangguan makan yang dialami pasien dikaitkan dengan ketidakpatuhan.

###### **c. Faktor sosial**

Hubungan antara anggota keluarga dengan masyarakat juga berperan penting dalam pengobatan. Pasien dengan tingkat masalah atau konflik yang rendah dan pasien yang mendapat dukungan memiliki komunikasi yang baik. Dukungan sosial dapat menurunkan rasa depresi atau stress penderita terhadap pengobatan.

d. Faktor yang berhubungan dengan penyakit dan medikasi

Regimen obat yang kompleks dan efek samping obat yang terjadi pada pasien dapat meningkatkan ketidakpatuhan pada pasien. Penelitian pada pasien diabetes menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi pada pasien dengan regimen pengobatan yang sederhana dibandingkan regimen pengobatan yang kompleks.

e. Faktor yang berhubungan dengan tenaga kesehatan

Komunikasi yang rendah dan kurangnya waktu yang dimiliki tenaga kesehatan seperti dokter menyebabkan penyampaian informasi menjadi kurang sehingga pasien tidak cukup mengerti dan paham akan pentingnya pengobatan. Keterbatasan tenaga kesehatan lain seperti apoteker, waktu, dan keahlian yang dimiliki apoteker juga berpengaruh terhadap pemahaman pasien mengenai penggunaan obat sehingga cenderung meningkatkan ketidakpatuhan pasien.

3. Metode Pengukuran Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan terhadap pengobatan dapat diukur dengan metode (Osterberg dan Terrence, 2005):

a. Metode langsung

Pengukuran kepatuhan dengan metode langsung dapat diukur dengan beberapa cara seperti mengukur konsentrasi obat atau metabolit obat dalam darah atau urin. Metode ini umumnya mahal dan memberatkan tenaga kesehatan dan rentan terhadap penolakan pasien.

b. Metode tidak langsung

Pengukuran kepatuhan dengan metode tidak langsung dapat dilakukan dengan bertanya kepada pasien tentang penggunaan obat menggunakan kuesioner, menilai

respon klinik pasien, menghitung jumlah pil obat, dan menghitung tingkat pengambilan kembali resep obat.

4. Metode meningkatkan kepatuhan (Osterberg dan Terrence, 2005):

- a. Pemberian edukasi kepada pasien, anggota keluarga atau keduanya mengenai penyakit dan pengobatannya. Edukasi dapat dilakukan secara individu atau kelompok dan dapat diberikan melalui tulisan, telepon, email, atau ke rumah.
- b. Mengefektifkan jadwal pendosisan melalui penyederhanaan regimen dosis harian, menggunakan kotak pil untuk mengatur jadwal dosis harian, dan menyertakan anggota keluarga berpartisipasi dalam mengingatkan pasien untuk minum obat.
- c. Meningkatkan komunikasi antara pasien dengan petugas kesehatan.

*Morisky Medication Adherence Scale* (MMAS-8) adalah instrument yang digunakan untuk menilai kepatuhan terapi. Pada awalnya kuesioner ini dibuat untuk membantun para praktisi memprediksi kepatuhan pasien dalam pengobatan hipertensi. Kuesioner dengan 8 pertanyaan ini dapat mengukur ketidakpatuhan yang di sengaja maupun yang tidak disengaja antara lain lupa, kecerobohan, menghentikan pengobatan karena merasa kondisi memburuk. MMAS-8 merupakan kuesioner yang memiliki reabilitas dan validitas yang tinggi. Beberapa penelitian kemudian memperluas aplikasi dari instrument ini agar dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pada pasien yang menderita penyakit lain. Kategori respon terdiri dari ya atau tidak untuk pertanyaan no 1-7. Pada item pertanyaan nomor 1-4 dan 6-7 nilai 1 bila jawaban tidak dan 0 bila jawaban ya. Sedangkan item pertanyaan nomor 5 dinilai 1 bila jawaban ya dan 0 bila jawaban tidak. Item pertanyaan nomor 8 dinilai dengan 5 skala *linkert* dengan nilai 1= tidak pernah, 0,75=sesekali, 0,5=kadang-kadang, 0,25=biasanya, dan 0 selalu (Imas Nurhayati, 2016).



Tingkat kepatuhan penggunaan obat berdasarkan *selfreport* pasien yang dinilai dengan kuesioner MMAS-8 lebih bias menangkap hambatan yang berhubungan dengan kebiasaan kepatuhan penggunaan obat. Kuesioner ini tersusun atas 8 pertanyaan dan kategori respon terdiri dari jawaban ya atau tidak dan 5 skala *linkert* untuk 1 item pertanyaan terakhir. Nilai kepatuhan penggunaan obat MMAS-8 adalah 8 skala untuk mengukur kebiasaan penggunaan obat dengan rentang 0 sampai 8 dan dikategorikan menjadi 3 tingkatan kepatuhan yaitu kepatuhan tinggi (nilai=8), kepatuhan sedang (nilai 6-7), dan kepatuhan rendah (nilai<6) (Morisky, dkk., 2008).

### **E. Infeksi saluran kemih**

#### 1. Definisi

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah ditemukan bakteri pada urin di kandung kemih yang umumnya steril. Istilah ini dipakai secara bergantian dengan istilah infeksi urin. Termasuk pula berbagai infeksi di saluran kemih yang tidak hanya mengenai kandung kemih (Clevo Rendi, 2012: 217).

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi bakteri yang terjadi pada saluran kemih. ISK merupakan kasus yang sering terjadi dalam dunia kedokteran. Walaupun terdiri dari berbagai cairan, garam, dan produk buangan, biasanya urin tidak mengandung bakteri. Jika bakteri menuju kandung kemih atau ginjal dan berkembang biak dalam urin maka terjadilah Infeksi saluran kemih (ISK). Jenis Infeksi saluran kemih (ISK) yang paling umum adalah infeksi kandung kemih bawah yang disebut sebagai sistitis. Gejala yang dapat timbul dari penyakit ISK yaitu perasaan tidak enak berkemih ketika sedang berkemih (dysuria). Tidak semua ISK menimbulkan gejala, ISK yang tidak menimbulkan gejala disebut sebagai ISK asimtomatis (Clevo Rendi, 2012:2017).



## 2. Klasifikasi infeksi saluran kemih

### a. Infeksi saluran kemih primer

Berdasarkan adanya gejala sistemik, ISK primer dibagi menjadi dua (Clevo Rendi, 2012: 2018):

- 1) ISK lokal, diterapi dengan antibiotika lokal.
- 2) ISK dengan gejala sistemik, diterapi dengan antibiotika sistemik. Antibiotika yang sering digunakan yaitu amoksilin.

### b. Infeksi saluran kemih sekunder

ISK ini merupakan akibat dari penyakit atau kelainan yang lain. ISK berulang merupakan pertanda dari ISK sekunder, karena penanganan ISK yang tidak tepat. Penyebab ISK sekunder biasanya adalah obstruksi saluran kemih seperti batu saluran kemih, pembesaran prostat, dan struktur uretra (Clevo Rendi, 2012: 2018).

Infeksi saluran kemih akut dapat dibagi menjadi dua kategori umum berdasarkan lokasi anatomi yaitu infeksi saluran kemih bagian bawah (Urethritis, sistitis, dan prostatitis) dan infeksi saluran kemih bagian atas (pielonefritis akut, abses intrarenal, abses perinefritik). Infeksi pada berbagai lokasi ini dapat terjadi bersama atau sendiri dan dapat asimtomatik atau dengan gejala klinis (Kurt j Isselbacher, 2000: 616).

Komplikasi ISK tergantung dari tipe yaitu tipe sederhana (*uncomplicated*) dan tipe berkomplikasi (*complicated*).

- a. ISK sederhana, ISK akut tipe sederhana (sistitis) yaitu non-obstruksi dan bukan merupakan wanita hamil, merupakan penyakit ringan (*self limited disease*) dan tidak menyebabkan akibat lanjut jangka panjang.
- b. ISK berkomplikasi yaitu ISK selama kehamilan, ISK pada diabetes melitus.

Penelitian epidemiologi klinik melaporkan bakteri uria lebih sering ditemukan pada perempuan dengan penyakit diabetes melitus dibandingkan perempuan tanpa diabetes melitus (Aru W. Sudoyo, 2006: 556).

Sistitis adalah inflamasi kandung kemih yang paling sering disebabkan oleh menyebarnya infeksi dari uretra. Hal ini dapat disebabkan oleh aliran balik urin dari uretra ke dalam kandung kemih (refluks uretrivesikal), kontaminasi fekal, pemakaian kateter atau sustoskop. Sistitis lebih sering terjadi pada wanita dari pada pria. Bagian distal uretra biasanya dikolonisasi oleh bakteri setelah dikolonisasi di vagina. Defek mukosa uretra menyebabkan organisme melekat dan berkoloni di suatu tempat di periuretral dan masuk ke dalam kandung kemih. Sistitis akut pada wanita biasanya disebabkan oleh *Escherichia coli*. Hubungan seksual berkaitan dengan infeksi saluran kemih, terutama pada wanita yang gagal berkemih setelah berhubungan seksual. Berkemih dianggap dapat membersihkan bakteri dari kandung kemih. Infeksi juga dapat berkaitan dengan kontrasepsi spermisid diafragma karena jenis kontrasepsi ini dapat menyebabkan obstruksi parsial uretra dan pengosongan kandung kemih yang tidak lengkap, selain itu kontrasepsi ini juga menyebabkan perubahan pH dan flora normal vagina. Sistitis pada pria adalah akibat dari beberapa faktor misalnya infeksi prostat, epididimistis, atau batu kandung kemih (Suzane C. Smelzer, 2001: 1432).

Sistitis interstisial (inflamasi kronik kandung kemih) bukan disebabkan oleh bakteri dan tidak berespon terhadap antibiotik. Gangguan ini terutama dialami oleh wanita (usia 40-50 tahun) namun dapat juga menyerang segala usia, ras, atau jenis kelamin. Penyakit ini dikarakterisasikan oleh demam, gejala berkemih iritabel (sering berkemih, nokturia, urgensi, rasa tertekan pada area suprapublik, nyeri pada saat kandung kemih penuh) dan terutama ditandai dengan hilangnya kapasitas kandung

kemih. Penyebab sititis interstisial belum diketahui meskipun terdapat dugaan beralas dari suatu inflamasi atau autoimun. Dugaan penyebab mencakup penetrasi iritan urin kedalam uretelium atau jaringan subureterial yang disebabkan defek barier diantara urin dan mukosa dinding kandung kemih. Urin mengandung sel darah merah atau sel darah putih meskipun belum terinfeksi dan pemeriksaan sitologi menunjukkan hasil benigna. Adanya tukak hunner (erosi superfisial dinding kandung kemih) dianggap diagnostic namun demikian hal ini tidak terjadi pada semua pasien (Suzanne C. Smelzer, 2001: 1435).

Pielonefritis merupakan infeksi piala ginjal, tubulus, dan jaringan interstisial dari salah satu atau kedua ginjal. Pielonefritis sering terjadi sebagai akibat dari refluks uretrovesikal yang tidak kompeten menyebabkan urin mengalis balik kedalam ureter. Obstruksi Trakus urinarius (yang menyebabkan kerentanan ginjal terhadap infeksi), tumor kandung kemih, striktur, hyperplasia prostatic benigna, dan batu urinarius merupakan penyebab lain. Pielonefritis dapat akut maupun kronis (Suzanne C. Smelzer, 2001: 1436-1437).

### 3. Etiologi

Penyebab infeksi saluran kemih (ISK) biasanya berasal dari berbagai bakteri enterik, terutama bakteri *Escherichia coli* yang sering terdapat pada urin wanita. Gejala infeksi saluran kemih (ISK) sangat bervariasi tergantung dari variasi jenis bakteri tersebut. Pada pria dan pasien di rumah sakit, 30% disebabkan *Proteus*, *Stafilococcus*, dan bahkan *Pseudomonas*. Bila ditemukan pada urin, maka kemungkinan besar terdapat kelainan saluran kemih. Namun harus diperhitungkan kemungkinan kontaminasi jika ditemukan lebih dari satu organisme pada urin (Clevo Rendi, 2012: 218).

#### 4. Epidemiologi

Infeksi saluran kemih tergantung banyak faktor seperti usia, gender, prevalensi bakteri uria, dan faktor disposisi yang menyebabkan perubahan struktur saluran kemih termasuk ginjal. Selama periode usia beberapa bulan dan lebih dari 65 tahun perempuan cenderung menderita ISK dibandingkan laki-laki. ISK berulang pada laki-laki jarang dilaporkan, kecuali disertai faktor predisposisi (pencetus). Prevalensi bakteri asimtomatik lebih sering ditemukan pada perempuan. Prevalensi selama periode sekolah (*school girls*) 1% meningkat menjadi 5% selama periode aktif secara seksual. Prevalensi infeksi asimtomatik meningkat mencapai 30% baik laki-laki maupun perempuan bila disertai faktor predisposisi seperti litiasis, obstruksi saluran kemih, penyakit ginjal polikistik, nekrosis papilar, pasien diabetes mellitus pasca transplantasi ginjal, nefropati analgesik, penyakit *sickle-cell*, kateterisasi, senggama, kehamilan dan peserta pengguna kontrasepsi dengan tablet progesteron (Aru W. Sudoyo, 2006:553).

Infeksi akut pada pasien rawat inap yang tidak dikateter sering terjadi terutama pada kaum perempuan dan menyebabkan lebih dari 6 juta kunjungan pasien pertahun di negara Amerika Serikat. Infeksi terjadi pada 1-3 persen anak perempuan usia sekolah dan insidennya dapat meningkat jelas berkaitan dengan awitan aktivitas seksual pada masa remaja. Sebagian besar infeksi akut simtomatik terjadi pada perempuan muda. Infeksi saluran kemih akut jarang terjadi pada laki-laki dibawah usia 50 tahun tetapi sering pada perempuan berumur 20-50 tahun. Bakteri uria asimtomatik sangat umum pada laki-laki dan perempuan usia lanjut mencapai angka 40-50% pada beberapa penelitian (Kurt J. Isselbacher, 2000: 616).

## 5. Patofisiologi

Sebagian besar merupakan infeksi asenden. Pada wanita jalur yang biasa terjadi adalah mula-mula kuman dari anal berkoloni di vulva, kemudian masuk ke kandung kemih melalui uretra yang pendek secara spontan atau mekanik akibat hubungan seksual. Pada pria, setelah prostat terkoloni maka akan terjadi infeksi asenden. Mungkin juga terjadi akibat pemasangan alat seperti kateter terutama pada golongan usia lanjut (Clevo Rendi, 2012: 218).

Wanita yang sering menderita penyakit ini karena uretra yang pendek, masuknya kuman dalam hubungan seksual, perubahan pH dan flora vulva dalam siklus menstruasi. Pada beberapa frekuensi berkemih yang jarang juga memiliki peran. Seharusnya bakteri yang masuk dibersihkan oleh mekanisme pertahanan tubuh, namun terdapatnya kelainan anatomi yang sering dijumpai adalah refluks, nefropati, batu, dan kehamilan. Pada pria biasanya akibat batu dan penyakit prostat, sedangkan pada anak-anak karena kelainan congenital (Clevo Rendi, 2012: 2019).

Pada individu normal biasanya laki-laki maupun perempuan urin selalu dalam keadaan steril karena dipertahankan jumlah dan frekuensi kencing. Uretrodistal merupakan tempat kolonisasi mikroorganisme *nonpathogenic fastidious* gram positif dan gram negatif. Hampir semua ISK disebabkan oleh invasi mikroorganisme asending dari uretra ke dalam kandung kemih. Pada beberapa pasien tertentu invasi mikroorganisme dapat mencapai ginjal. Proses ini dipermudah refluks vesikoureter. Proses invasi hematogen sangat jarang ditemukan di klinik maupun di rumah sakit. Ginjal diduga merupakan lokasi infeksi sebagai akibat lanjut septokemi atau endokarditis akibat *Staphilococcus aureus* di kenal *nephritis Lohlein* (Aru W. Sudoyo, 2006: 555).

Keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pathogenesis:

a. Jenis kelamin dan aktivitas seksual

Uretra perempuan tampak lebih cenderung didiami oleh basil gram negatif karena letaknya diatas anus, ukurannya pendek (kira-kira 4 cm), dan berakhir dibawah labia. Pijatan uretra yang terjadi selama hubungan seksual menyebabkan bakteri masuk kedalam kandung kemih dan merupakan hal penting dalam pathogenesis infeksi saluran kemih pada perempuan muda (buang air kecil setelah hubungan seksual sudah terbukti menurunkan resiko sistitis, mungkin karena tindakan ini menyebabkan eradikasi bakteri yang masuk selama hubungan seksual). Disamping itu penggunaan diafragma dan spermasida ternyata merubah flora bakteri normal pada introitus berhubungan dengan peningkatan yang nyata kolonisasi *E. coli* pada vagina serta meningkatkan infeksi saluran kemih. Pada laki-laki prostatitis atau sumbatan uretra karena hipertofi prostat merupakan faktor predisposisi yang penting untuk terjadinya bakteriuria. Homoseksualitas juga cenderung meningkatkan resiko sistitis, mungkin berkaitan dengan hubungan seksual secara rektal. Laki-laki yang terinfeksi HIV dengan jumlah sel T CD-4 positif kurang dari 200 sel per mikroliter akhir-akhir ini terbukti meningkatkan resiko bakteri uria dan infeksi saluran kemih simptomatik. Tidak disirkumsisi juga merupakan faktor resiko infeksi saluran kemih baik pada neonatus maupun pada pria muda (Isselbacher, 2000: 617).

b. Kehamilan

Tergantung pada status social ekonomi. Secara keseluruhan infeksi saluran kemih didapatkan pada 2-8% perempuan hamil. Secara khusus infeksi simptomatik saluran kemih bagian atas lebih sering di dapati selama kehamilan 20-30% perempuan hamil dengan bakteri uria tanpa gejala akhirnya berkembang menjadi pielonefritis.

Kecenderungan infeksi saluran kemih bagian atas selama kehamilan ini disebabkan oleh penurunan kekuatan ureter, penurunan peristaltik ureter dan inkompetensi sementara kutub vasikouretral yang terjadi selama kahamilan. Kateterisasi kandung kemih selama atau sesudah melahirkan menyebabkan infeksi tambahan. Peningkatan prevalensi prematurasi dan kematian bayi baru lahir dapat disebabkan oleh infeksi saluran kemih selama kehamilan, terutama yang melibatkan infeksi saluran kemih bagian atas (Isselbacher, 2000: 617).

c. Sumbatan

Adanya halangan bebas urin, tumor, striktura, batu, atau hipertofi prostat menyebabkan hidronefrosis dan peningkatan frekuensi infeksi saluran kemih yang sangat tinggi. Superinfeksi pada sumbatan saluran kemih dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang cepat. Karena itu jika terjadi infeksi, tindakan yang paling penting adalah segera memperbaiki lesi akibat sumbatan. Sebaliknya, pada derajat sumbatan ringan yang tidak progresif atau tidak berhubungan dengan infeksi, harus sangat hati-hati jika mengusahakan perbaikan secara operatif. Adanya infeksi pada pasien seperti ini mungkin lebih merusak dibandingkan dengan sumbatan ringan yang tidak dikoreksi, yang tidak mengganggu fungsi ginjal secara bermakna (Isselbacher, 2000: 617).

d. Disfungsi neurologik kandung kemih

Gangguan saraf yang berkerja pada kandung kemih, seperti pada jejas korda spinalis, tabes dorsalis, multiple sclerosis, diabetes, atau penyakit lain dapat berhubungan dengan infeksi saluran kemih. Infeksi dapat diawali oleh penggunaan kateter untuk drainase kandung kemih dan didukang statis urin dalam kandung kemih dalam waktu lama. Faktor lain yang sering terjadi pada pasien-pesien ini adalah

demineralisasi tulang karena imobilitas, yang menyebabkan hiperkalsiuria, uropati Obstruktiva dan pembentukan batu (Isselbacher, 2000: 617).

e. Refluks vasikoureteral

Keadaan ini diidentifikasi sebagai refluks urin dari kandung kemih ke ureter dan kadang sampai pelvis renal. Hal ini terjadi selama buang air kecil atau dengan peningkatan tekanan pada kandung kemih. Untuk lebih mudahnya refluks vasikouretral terjadi jika gerakan retrioerat zat radio opak atau radioaktif dapat ditunjukkan melalui sistoureterogram selama buang air kecil. Gangguan anatomis pertemuan vasikouretral menyebabkan refluks bakteri dan karena itu terjadi infeksi saluran kemih. Namun karena selalu ada hubungan cairan antara kandung kemih dan ginjal meskipun pada sistem kemih normal, beberapa gerakan mundur bakteri mungkin terjadi selama infeksi tetapi tidak terdeteksi dengan teknik radiologis (Isselbacher, 2000: 617).

f. Faktor virulensi bakteri

Faktor virulensi bakteri mempengaruhi strain tertentu, begitu dimasukkan kedalam kandung kemih akan menyebabkan infeksi traktur urinarius. Tidak semua *E. coli* mampu menginfeksi traktus urinarius asimtomatik pada pasien yang tidak dikateterisasi masuk kedalam sejumlah kecil serogrup O, K, H spesifik, menimbulkan hemilisis dan berbagi dengan sifat uropatogenik lain tertentu. Kelekatan bakteri pada sel uroepitel merupakan langkah pertama yang penting pada awal infeksi. Hampir semua strain *E. coli* yang menyebabkan pielonefritis pada pasien dengan traktus urinarius normal secara anatomi mempunyai pilus tertentu (pilus P atau pilus gal-gal) yang memperantarai perlengkapan pada bagian digalaktosida dari glikofingolipid yang ada di uroepitel. Strain yang menyebabkan pielonefritis juga biasanya merupakan



penghasilan hemolysis, mempunyai aerobaktin dan resisten terhadap kerja bakterisidal dari serum manusia (Isselbacher, 2000: 618).

g. Faktor genetik

Semakin banyak bukti bahwa factor genetik penjamu mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi urinarius. Jumlah dan reseptor pada sel uroepitel tempat bakteri dapat menempel dapat ditentukan setidaknya sebagian secara genetik. Banyak dari struktur ini yang menjadi tempat perlekatan bakteri uropatogenik pada hampir semua strain yang menyebabkan pielonefritis akut tidak berkompliksi (Isselbacher, 2000: 618).

6. Manifestasi klinik

Dapat asimtomatik terutama pada wanita. Terapi singkat biasanya menyebabkan timbulnya ISK simptomatis, akibat reinfeksi organisme yang lebih virulen. Dysuria, frekuensi miksi yang bertambah, dan nyeri suprapubik adalah gejala iritasi kandung kemih. Beberapa pasien mengeluh bau yang tidak menyenangkan atau keruh, dan mungkin hematuria. Bila mengenai saluran kemih atas, mungkin terdapat gejala-gejala pielonefritis akut seperti demam, mual, nyeri pada ginjal. Namun pasien dengan infeksi ginjal, mungkin hanya menunjukkan gejala infeksi saluran kemih bawah atau tidak bergejala (Clevo Rendi, 2012: 219).

Pasien sistitis mengalami urgensi sering berkemih, rasa panas dan nyeri pada saat berkemih, nyeri atau spasme pada area kandung kemih, dan suprapubis. Bakteri, Piuria (adanya sel darah putih dalam urin), bakteri, dan sel darah merah (hematuria) ditemukan pada pemeriksaan urin. Kit kultur memberikan informasi kualitatif yang umum mengenai jumlah koloni bakteri dan mengidentifikasi apakah organisme gram negatif atau positif (Sezanne C. Smelzer, 2001: 1432).

Pasien pielonefritis akut mengalami demam dan menggigil, nyeri panggul, nyeri tekan pada susut konvertebrata, leukositosis, adanya bakteri dan sel darah putih pada urin. Selain itu gejala saluran urinarius bawah seperti disuria dan sering berkemih umumnya sering terjadi. Infeksi saluran urinarius atas sering dikaitkan dengan selimut antibodi bakteri dalam urin. Ginjal pasien pielonefritis akut biasanya membesar di sertai infiltrasi interstisial sel-sel inflamasi. Abses dapat dijumpai pada kapsul ginjal dan pada taut kortikomedularis. Pada akhirnya atrofi dan kerusakan tubulus serta glomerulus terjadi. Ketika pielonefritis menjadi kronis ginjal membentuk jaringan parut, berkontraksi, dan tidak berfungsi (Suzanne C. Smelzer, 2001: 1437).

Pada pasien pielonefritis kronis biasanya tanpa gejala infeksi kecuali terjadi eksaserbasi, nafsu makan rendah, poliuria, haus yang berlebihan, dan kehilangan berat badan. Infeksi menetap atau kambuh dapat menyebabkan jaringan parut progresif di ginjal disertai gagal ginjal pada akhirnya (Suzanne C. Smelzer, 2001: 1437).

#### 7. Diagnosis

Anamnesis adanya riwayat sering ngompol, muntah, diare, demam dengan penyebab yang tidak jelas dapat terjadi pada penderita ISK. Informasi mengenai *bladder control*, pola BAK, dan pancaran air kencing juga penting dalam diagnosis. Gejala poliuri, polidipsi, dan penurunan nafsu makan juga menunjukkan kemungkinan adanya gagal ginjal kronik, begitu pula dengan adanya gejala pancaran air kencing lemah, teraba massa atau benjolan atau nyeri pada abdomen, menunjukkan kemungkinan suatu striktur atau katup uretra (Sudung O. Pardede, 2011: 6).

Pemeriksaan tanda vital termasuk tekanan darah, pengukuran antropometrik, pemeriksaan massa dalam abdomen, kandung kemih, muara uretra, pemeriksaan neurologic ekstremitas bawah tulang belakang untuk melihat adanya spina bifida, perlu

dilakukan pada pasien ISK. Genitalia eksterna diperiksa untuk melihat kelainan fimosis, hipospadia, epispadia pada laki-laki atau sinekie vagina pada perempuan. Pemeriksaan urinalisis dan biakan urin adalah prosedur yang penting. Oleh sebab itu kualitas pemeriksaan urin memegang peran utama untuk menegakkan diagnosis (Sudung O. Pardede, 2011: 6).

Diagnosis pasti ditegakkan dengan kultur organisme melalui urin, terutama samper dari urin porsi tengah. Sampel ini dikirimkan segera ke laboratorium atau dalam waktu 24 jam dalam lemari es dengan suhu 4°C. Bila sulit, ambil urin yang pertama kali dikeluarkan pada pagi hari karena penyimpanan pertama dalam kandung kemih dapat meningkatkan jumlah bakteri (Clevo Rendi, 2012: 219).

Pemeriksaan kateter untuk diagnosis hanya untuk pasien yang memang memakai kateter. Aspirasi suprapublik berguna pada bayi dan dewasa dimana pemeriksaan urin porsi tengah berulang kali tidak menunjukkan hasil karena kontaminasi atau jumlah bakteri yang rendah (Clevo Rendi, 2012: 219).

Dipakai tes stik untuk mengetahui adanya proteinuria, hematuria, glukosuria, dan pH. Pemeriksaan secara mikroskopik dinyatakan positif jika terdapat pyuria >2000 leukosit/ml pada pasien dengan gejala infeksi saluran kemih. Mungkin ditemukan bakteri yang berasal dari kontaminasi vagina (Clevo Rendi, 2012: 220).

Uji nitrit merupakan pemeriksaan tidak langsung terhadap bakteri dalam urin. Dalam keadaan normal nitrit tidak terdapat dalam urin, tetapi dapat ditemukan jika nitrat diubah menjadi nitrit oleh bakteri. Sebagian besar kuman gram negatif dan beberapa kuman gram positif dapat mengubah nitrat menjadi nitrit, sehingga jika uji nitrit positif berarti terdapat kuman dalam urin yang seharusnya steril (Sudung O. Pardede, 2011: 7).

## 8. Tata laksana

Secara umum tujuan terapi ISK adalah menghilangkan gejala dengan cepat, mengatasi kuman patogen, meminimalisasi rekuransi dan mengurangi morbiditas dan mortalitas. Tujuan ini dapat tercapai dengan pemberian antibiotik sambil mencari penyebab (Clevo Rendi, 2012: 221).

Berikut ini adalah deskripsi beberapa agen antimikroba yang umum digunakan dalam terapi infeksi saluran kemih:

### a. Siprofloksasin

Obat golongan kuinolom ini bekerja dengan menghambat DNA gyrase sehingga sintesis DNA kuman terganggu. Siprofloksasin terutama aktif terhadap kuman gram negatif termasuk *Salmonella*, *Shigella*, *Kampilobacter*, *Neiseria*, dan *Pseudomonas*. Obat ini juga aktif terhadap kuman gram positif seperti *pneumonia* dan *Faecalis*, tetapi bukan merupakan obat pilihan utama untuk *Pneumonia streptococcus* (Istiantoro dan Gan, 2007).

### b. Trimethoprim- Sulfametoksazol (kotrimoksazol)

Sulfametoksazol dan trimethoprim digunakan dalam bentuk kombinasi karena sifat sinergisnya. Kombinasi keduanya menghasilkan inhibisi enzim berurutan pada jalur asam folat. Mekanisme kerja sulfametoksazol dengan mengganggu sintesis asam folat dan pertumbuhan lewat penghambat pembentukan asam dihidrofolat dari asam para-aminobenzoat. Dan mekanisme kerja trimethoprim dengan menghambat reduksi asam dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat (Tjay dan Raharja, 2007).

### c. Amoksilin

Amoksilin termasuk antibiotik golongan penisilin bekerja dengan menghambat pembentukan mukopeptida yang diperlukan untuk sintesis dinding sel mikroba.

Terhadap mikroba yang sensitif, penisilin akan menghasilkan efek bakterisid. Amoksilin merupakan turunan dari ampisilin yang hanya berbeda pada gugus hidroksil dan memiliki spektrum antibakteri yang sama. Obat ini diabsorpsi lebih baik jika diberikan per oral dan menghasilkan kadar yang lebih tinggi dalam plasma dan jaringan (Tessy, 2001:369).

d. Seftriakson

Seftriakson merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga. Berkhasiat bakterisid dalam fase pertumbuhan kuman, berdasarkan penghambatan sintesa peptidoglikan yang diperlukan kuman untuk ketangguhan dindingnya. Seftriakson memiliki waktu paruh yang lebih panjang dibandingkan sefalosporin yang lain sehingga cukup diberikan satu kali sehari. Obat ini diindikasikan untuk infeksi berat seperti septikemia, pneumonia, dan meningitis (Tessy, 2001: 369).

e. Gentamisin

Gentamisin merupakan aminoglikosida yang paling sering digunakan. Spektrum anti bakterinya luas, tetapi tidak efektif terhadap kuman anaerob (Tessy, 2001: 369).

f. Ampisilin

Ampisilin adalah antibiotik infeksi saluran kemih, otitis media, sinusitis, bronkitis kronis, salmonelisis invasif dan gonorrhoe. Ampisilin efektif terhadap beberapa mikroba gram negatif dan tahan asam, sehingga dapat diberikan per oral (Istiantoro dan Gan, 2007).

Tabel 4. Antibiotik yang umumnya digunakan pada pengobatan infeksi saluran kemih (Dipiro, 2015: 496)

Indikasi	Antibiotik	Dosis	Selang	Durasi (hari)
Simpleks	Trimetoprim-Sulfametoksazol	1 DS tablet	2x sehari	3
	Nitrofurantoin Monohidrat	100 mg	2x sehari	5
	Fosfomysin	3g	Dosis tunggal	1
	Ciprofloxacin	250 mg	2x sehari	3
	Levofloxacin	250 mg	1x sehari	3
	Amoxicillin-Clavulanat	500 mg	3x sehari	5-7
Kompleks	Trimetoprim-Sulfametoksazol	1 DS tablet	2x sehari	7-10
	Ciprofloxacin	250-500 mg	2x sehari	7-10
	Levofloxacin	250 mg	1x sehari	10
	Amoxicillin-Clavulanat	750 mg 500 mg	1x sehari 3x sehari	5 7-10
Infeksi kambuhan	Nitrofurantoin	50 mg	1x sehari	6 bulan
	Trimetoprim-Sulfametoksazol	1/2 SS tablet	1x sehari	6 bulan
Pielonefritis	Trimetoprim-Sulfametoksazol	1 DS tablet	2x sehari	14
	Ciprofloxacin	500 mg	2x sehari	14
		1000 mg ER	1x sehari	7
	Levofloxacin	250 mg	1x sehari	10
		750 mg	1x sehari	5
	Amoxicillin-Clavulanat	500 mg	3x sehari	14

Tabel 5. Terapi Empirik Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih (Dipiro, 2015: 497)

Diagnosa	Bakteri	Terapi	Durasi (hari)
Sistitis	<i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus</i> <i>Saprophyticus</i>	Nitrofurantoin	5
		Trimethoprim-sulfamethoxazole	3
		Fosfomycin	Dosis tunggal
		Fluoroquinolone	3
		$\beta$ -Lactams	3-7
Sistitis (hamil dan menyusui)	<i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus</i> <i>Saprophyticus</i>	Amoxicillin-clavulanate	7
		Cephalosporin	7
		Trimethoprim-sulfamethoxazole	7

Pyelonephritis Akut			
Simpleks	<i>Escherichia coli</i> ,	Quinolon	7
		Trimethoprim–sulfamethoxazol	14
Kompleks	Gram-positive bacteria <i>E. coli</i> <i>P. mirabilis</i> <i>K. pneumoniae</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Enterococcus faecalis</i>	Amoxicillin or amoxicillin–clavulanic acid	14
		Quinolon	14
Prostatitis	<i>E. coli</i> <i>K. pneumoniae</i> <i>Proteus spp.</i> <i>P. aeruginosa</i>	Trimethoprim–sulfamethoxazol	4-6 minggu
		Quinolon	4-6 minggu

Disamping obat-obatan terapi nonfarmakologi harus diterapkan. Terapi nonfarmakologi mencakup nutrisi dan imobolitas. Asupan makanan dan cairan perlu disesuaikan hingga optimal sesuai kemampuan penderita (Clevo Rendi, 2012: 221).

#### 9. Pemberian profilaksis

Antimikroba profilaksis dosis rendah yang diberikan dalam jangka lama telah digunakan terhadap pasien yang rentan terhadap berulangnya pielonefritis akut atau ISK bawah. Terapi profilaksis sering diberikan kepada anak dengan resiko tinggi terkena infeksi saluran kemih, uropati obstruktif, dan berbagai kondisi resiko tinggi lainnya. Namun demikian efektivitas antibiotik profilaksis ini sering dipertanyakan dan masih kontroversial (Sudung O. Pardede, 2011: 20).

Antibiotik profilaksis bertujuan untuk mencegah infeksi berulang dan mencegah terjadinya patur ginjal. Berbagai penelitian telah membuktikan efektivitas antibiotik profilaksis menurut resiko terjadinya ISK berulang pada anak, dan kurang dari 50% yang mengalami infeksi berulang selama pengamatan 5 tahun. Antibiotik profilaksis dimaksudkan untuk mencapai konsentrasi antibiotik yang tinggi dalam urin

tetapi dalam efek yang minimal terhadap flora normal dalam tubuh (Sudung O. Pardede, 2011: 21).

Pemberian profilaksis menjadi masalah karena beberapa hal antara lain kepatuhan yang kurang, resistensi kuman yang meningkat, timbulnya reaksi simpang (gangguan saluran cerna, *skin rash*, hepatotoksik, kelainan hematologi, sindrom Stevens-johnson), dan tidak nyaman untuk pasien (Sudung O. Pardede, 2011:21).

#### **F. Tinjauan Islam**

Al-Qur'an dan sunnah memberikan perhatian kepada umat islam dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam menjaga kesehatan dan menyembuhkan sakit. Rasulullah SAW telah mengajarkan cara memohon kesehatan dan kesembuhan kepada Allah SWT, mengajarkan berikhtiar dengan cara-cara halal dan diridhoi (Muhadi, 2009:5).

Allah SWT menjelakan dalam Al-Qur'an telah datang pelajaran dari tuhan dan penyembuh bagi penyakit-penyakit. Allah berfirman dalam Q.s Yunus/10:57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)

Terjemahan:

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (Departemen Agama RI, 2009: 3015)

Ayat mulia tersebut menerangkan secara ijma bagaimana usaha Al-Qur'an dalam memperbaiki jiwa manusia dalam empat perkara:

1. Nasehat yang baik dengan cara menggembarakan dan pertakut. Yakni dengan menyebutkan kata-kata yang dapat melunakkan hati manusia sehingga dapat membangkitkan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perkara.
2. Obat bagi segala penyakit hati, seperti syirik, nifak, dan semua penyakit lain yang siapapun menyukainya maka akan terasa olehnya dada yang sesak, seperti



keraguan untuk beriman, kedurhakaan, permusuhan, menyukai kezaliman, serta membenci kebenaran dan kebaikan.

3. Petunjuk kepada jalan kebenarandan keyakinan serta terhindar dari kesesatan dalam kepercayaan dan amal.
4. Rahmat bagi orang yang beriman. Rahmat ini buah yang diperoleh kaum mu'minin dari petunjuk Al-Qur'an yang memenuhi hati mereka, yang diantara pengaruh-pengaruhnya mereka senganantiasa melakukan hal-hal yang ma'ruf, membela orang-orang yang sengsara, mencegah kezaliman, menolak penganiayaan dan kedurhakaan (Ahmad Mustafa, 1992: 235-236).

Ayat ini menegaskan bagwa Al-Qur'an adalah obat bagi apa yang terdapat dalam dada. Sebab memang banyak perasaan dalam hati yang menghendaki segera diobat. Kalau tidak segera diobat maka akan menjadi penyakit yang berlarut-larut. Tadinya hanya sakit hati tetapi akhirnya akan menjadi penyakit jasmani dan rohani, tubuh halus dan tubuh kasar. Setengah dari penyakit yang menimpa hati adalah bodoh dan jahat sangka, ragu-ragu dalam memegang suatu kepercayaan, munafik, benci, dendam, dengki, gelap mata dan lain-lain. Hilang kepercayaan kepada sesama manusia karena pernah dikecewakan. Takut menghadapi tanggung jawab karena pernah terlantar (Hamka, 1985: 236).

Kemajuan pengetahuan kedokteran tentang penyakit hati ini telah sampai kepada kesimpulan bahwa sakit dalam hati dapat mempengaruhi juga kepada badan. Bias timbul penyakit lain dalam tubuh karena ada penyakit hati. Misalnya sesak nafas, darah tinggi, darah rendah, penyakit gula, koreng, dan sebagiannya. Dan apabila badan telah sakit-sakit murunglah mata menghadapi tugas hidup, sehingga berlarut-larut. Maka dari ayat ini ditafsirkan tuhan bersabda bahwasannya unsur kedua dari Al-Qur'an

selain dari berisi pengajaran adalah berisi sesuatu obat yang ada dalam hati (Hamka, 2985: 236-237).

Hubungan ayat ini dengan penelitian ini adalah ketika pasien memiliki penyakit rohani salah satunya yaitu malas, akibat dari kemalasan ini pasien menjadi tidak patuh dengan pengobatan yang sedang dijalaninya. Begitu pula dengan penyakit ragu-ragu yang di alami pasien sehingga pasien ragu untuk mengkonsumsi obat yang di resepkan, akibatnya pasien tidak berhasil menjalani terapinya.

Allah SWT menegaskan bahwa salah satu fungsi Al-Qur'an adalah sebagai obat.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra'/17:82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (٨٢)

Terjemahan:

“Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah bagi orang-orang yang dzalim selain kerugian” (Departemen Agama RI, 2009: 437).

Tegas ayat ini bahwa didalam Al-Qur'an ada obat-obat dan rahmat bagi orang beriman. Banyak penyakit yang menyerang jiwa manusia dapat disembuhkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Ahli psikosomatik di Indonesia, yaitu Prof. Dr. Aulia yakin apabila seseorang yang sakit benar-benar kembali kepada ajaran agamanya, amat diharapkan sakitnya akan sembuh. Betapa besar pengaruh ajaran tauhid yang mengandung ikhlas, sabar, ridho, tawakal dan taubat. Besar pengaruhnya mengobat sakit merana jiwa seorang muslim. Dan beliau juga menganjurkan berobat dengan solat dan doa (Abdul Malik, 1982: 114-115).

Al-Qur'an merupakan obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman. Yakin dapat menghilangkan berbagai macam penyakit di dalam hati misalnya

keraguan, kemunafikan, kemusyrika, dan penyimpangan, maka Al-Qur'an akan menyembuhkan itu semua dan sebagai rahmat yang membawa dan mengantarkan kepada kaimanan, hikmah, dan melahirkan keinginan untuk mencari kabaikan. Dan hal itu tidak berlaku kecuali bagi orang beriman, membenarkan dan mengikutinya, maka ia akan menjadi penyembuh dan rahmat. Sedangkan bagi orang kafir dan zalim, mendengarkan Al-Qur'an tidak menambahkan kepada mereka melainkan mereka makin jauh, makin kafir, dan makin rusak. Dan hal itu bukan berasal dari Al-Qur'an melainkan kekafirannya itu (Ibdu Katsir, 2009: 765-766)

Bukan berhala yang menyembuhkan manusia tatkala ditimpa sakit. Tetapi Allah tuhan semesta alam. Manusia mencari obat, entah dari resep kimia tertentu, entah dari daun-daun yang tumbuh di bumi, entah dengan kekuatan doa. Sebelum ajal segala penyakit dapat diobati. Allah memberikan pula ilham kepada manusia untuk mengoibati sakitnya (Abdul Malik, 1982: 100). Hal ini sesuai dengan sabda Rasulluah SAW dalam hadits Abu Hurairah R.A:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bil Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata: telah menceritakan kepadaku Atha nim Abu Rabah dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda: Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga (HR. Bukhari-5246).

Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali Allah SWT juga menurunkan obatnya. Baik itu penyakit yang muncul pada zaman nabi maupun sesudah nabi. Segala jenis penyakit

pasti ada obatnya, tergantung bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut sehingga penyakit tersebut bias sembuh dengan izin Allah SWT. Hal ini sesuai dengan sabda nabi Muhammad SAW dari riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Dari sahabat Jabir. Rasulullah SAW bersabda “setiap penyakit ada obatnya, dan apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla” (HR. Muslim-4084).

Dalam dunia kesehatan hadits tersebut dapat diartikan bahwa obat akan memberikan efek ketika obat telah berikatan dengan reseptor obat tersebut. Obat merupakan bahan yang sangat berpotensi bila digunakan sesuai dengan aturan. Obat dapat membantu menyembuhkan penyakit atau masalah kesehatan. Namun yang perlu dihindari dalam penggunaan obat yang tidak rasional, yaitu penggunaan obat yang tidak tepat (tidak tepat dosis, indikasi, cara penggunaan, tidak mempertimbangkan kondisi atau riwayat pasien, dan lain-lain), tidak efektif, tidak aman, dan juga tidak ekonomis. Penggunaan obat yang tidak rasional ini dapat menimbulkan dampak negatif dari berbagai segi, seperti pemborosan, efek samping obat meningkatkan kegagalan pengobatan, resistensi antimikroba, dan lain-lain (Irianto, 2013: 208).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental yang dilakukan secara prospektif. Pada rancangan ini subyek dalam penelitian terdiri dari satu kelompok yang diberikan informasi obat sehingga disebut juga *one group pretest-posttest group design*. Pada awal dan akhir penelitian, subyek penelitian diberikan kuesioner yang didesain untuk mengukur tingkat kepatuhan pasien yaitu kuesioner MMAS-8

##### **2. Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Januari-Maret 2017.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang bersifat tertutup karena pilihan jawaban sudah ditentukan, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah tersedia dalam kuesioner. Para responden diminta untuk memberikan informasi terkait penilaian mereka terhadap variabel penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan uji Wilcoxon.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah 29 pasien infeksi saluran kemih yang dirawat jalan di Puskesmas Danga selama bulan Januari-Maret 2017.

## 2. Sampel

Sampel penelitian ini adalah bagian dari populasi yang terpilih dan telah memenuhi syarat penelitian. Sampel penelitian ini adalah pasien infeksi saluran kemih yang dirawat jalan di Puskesmas Danga selama bulan Januari-Maret 2017 yang memenuhi kriteria. Apabila penelitian Eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subyek per kelompok (Rully Indrawan 2014, 102). Namun sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 25 responden yang dirawat jalan selama bulan Januari-Maret 2017.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

#### 1. Variabel Penelitian

- a. Variabel terikat: parameter kepatuhan yaitu skor MMAS-8
- b. Variabel bebas: pelayanan informasi obat oleh Apoteker

#### 2. Kriteria Sampel

##### a. Kriteria inklusi

- 1) Pasien infeksi saluran kemih
- 2) Menjalani terapi antibiotik
- 3) Bersedia menjadi responden
- 4) Usia 17-55 tahun (depkes RI, 2009)

##### b. Kriteria eksklusi

- 1) Tidak menyelesaikan terapi
- 2) Pasien hamil
- 3) Menderita infeksi lain
- 4) Tidak bersedia menjadi responden

### 3. Pengumpulan data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada responden yang menjadi subjek penelitian. Data sekunder diperoleh dari bagian rekam medik untuk mengetahui data lengkap responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu menentukan sampel berdasarkan pada kriteria sampel.

#### E. Instrumen Penelitian

Tabel 6. Lembar pengumpulan data

Penyakit Utama:			Kode Sumber Data:		
Nama (Singkatan):		Usia:	Jenis Kelamin:	Pendidikan:	Pekerjaan:
Nama Obat	Bentuk Sediaan	Beri Tanda X Untuk Obat Yang Dicurigai	Pemberian		
			Dosis	Tgl. Mulai	Tgl. Akhir
Indikasi:		Lama Pengobatan:	Jumlah obat:	Penyakit Utama: Keluhan Penyakit Utama (Beri tanda X) -Sembuh -Meninggal -Tidak tahu -Belum sembuh -Sembuh dengan gejala Sisa	
		Penyakit atau kondisi lain yang menyertai (beri tanda X) -Gangguan ginjal -Gangguan hati -Alergi		-Kondisi medis lainnya lain-lain	
Nagekeo, 2017					
(Tanda Tangan)					

Tabel 7. Kuesioner pengaruh pemberian informasi obat terhadap tingkat kepatuhan berdasarkan kuisisioner *Modification Morisky Scale*

No	Pertanyaan	Jawaban		Skor
		Ya	Tidak	
1	Apakah anda kadang-kadang lupa menggunakan obat atau minum obat untuk penyakit anda?			
2	Selama 2 pekan terakhir ini, pernahkah anda dengan sengaja tidak menggunakan obat atau meminum obat anda?			
3	Pernahkah anda pernah mengurangi atau berhenti menggunakan obat anda atau minum obat tanpa memberitahu dokter anda karena anda merasa kondisi anda tambah parah ketika meminum obat tersebut?			
4	Ketika anda berpergian atau meninggalkan rumah, apakah anda kadang-kadang lupa membawa obat anda?			
5	Apakah anda menggunakan obat anda atau minum obat kemarin ?			
6	Ketika anda merasa agak sehat, apakah anda juga kadang berhenti meminum obat?			
7	Minum obat setiap hari merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Apakah anda pernah merasa terganggu dengan kewajiban anda terhadap pengobatan yang harus anda jalani?			

8. Seberapa sering anda mengalami kesulitan menggunakan obat atau minum obat anda?
- Tidak pernah (skor 1)
  - Sekali-sekali (skor 0.75)
  - Kadang-kadang (skor 0,5)
  - Biasanya (skor 0,25)
  - Selalu (skor 0)

Keterangan:	Skor	Kategori
	<6	Rendah
	6-7	Sedang
	8	Tinggi



## ***F. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian***

### **1. Pengolahan data**

Data diolah secara statistik meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, lama perawatan, jumlah obat yang digunakan, efek samping obat yang terjadi, dan perubahann skor MMAS-8 untuk mengukur tingkat kepatuhan pasien.

### **2. Analisis data**

#### **a. Analisis Univirat**

Analisis Univariat ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran distribusi frekuensi serta proporsi dari variabel yang diteliti seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama perawatan, dan jumlah obat

#### **b. Analisis Bivariat**

Uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro Wilk digunakan untuk menguji disitribusi normal data. Uji Wilcoxon digunakan untuk menguji perubahan skor MMAS-8 sebelum dan sesudah intervensi. Uji Pearson dan uji Spearman's Rho digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel terhadap perubahan skor MMAS

#### **c. Analisis Multivariat**

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memprediksi pengaruh berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama perawatan, dan jumlah obat yang digunakan terhadap perubahan skor MMAS-8 sebelum dan sesudah pemberian informasi obat.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Hasil Penelitian**

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 Januari-13 Maret 2017 di Puskesmas Danga yang terletak di kota Mbay, Kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo, provinsi NTT, dengan jumlah pasien yang diteliti 25 orang. Puskesmas Danga dibangun pada tahun 1974 dengan luas tanah Puskesmas Danga 4.800 m<sup>2</sup>. Adapun batas wilayah:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lape
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Towak
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mbay I
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Nggolombay



Gambar 1. Peta puskesmas Danga

Puskesmas Danga ini memiliki sarana dan prasarana terdiri dari 10 buah ruang rawat jalan dan 3 buah gedung rawat inap. Dipuskesmas danga juga mempunyai 163 tenaga medis terdiri dari 36 pegawai PNS, 13 pegawai PTT, 5 pegawai THL, dan 109 pegawai sukarela.


## 2. Gambaran Subyek Penelitian

### a. Gambaran Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Tabel 8. Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Karakteristik Pasien ISK		Pasien ISK
Jenis Kelamin	Laki-laki	6 (24%)
	Perempuan	19 (76%)
Total		25 (100%)
Usia (tahun)	17-26	6 (24%)
	27-36	6 (24%)
	37-46	10 (40%)
	47-56	3 (12%)
	57-66	0 (0%)
Total		25 (100%)


Sejumlah 25 pasien yang dijadikan sampel penelitian didapatkan usia pasien yang beragam. Jumlah total pasien yang menderita infeksi saluran kemih dari berbagai golongan usia untuk perempuan 19 (76%) pasien dan laki-laki 6 (24%) pasien. Distribusi jumlah pasien ISK berdasarkan jenis kelamin di sajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2. Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin

Jumlah pasien ISK pada rentang usia 17-26 tahun sebanyak 6 (24%) pasien, pada usia 27-36 tahun sebanyak 6 (24%) pasien, pada usia 37-46 tahun sebanyak 10 (40%) pasien, pada usia 47-56 tahun sebanyak 3 (12%) pasien, pada usia 57-66 tahun

tidak terdapat pasien infeksi saluran kemih. Distribusi jumlah pasien ISK berdasarkan usia disajikan dalam gambar berikut:




Gambar 3. Distribusi pasien berdasarkan Usia

b. Gambaran distribusi pasien berdasarkan pendidikan

Tabel 9. Distribusi pasien berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pasien ISK
SD-SLTP	4 (16%)
SLTA	13 (52%)
Perguruan Tinggi	8 (32%)
Total	25 (100%)

Sebanyak 25 pasien infeksi saluran kemih yang dijadikan sampel memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Untuk pendidikan SD-SLTP sebanyak 4 (16%) pasien, SLTA sebanyak 13 (52%) pasien dan perguruan tinggi sebanyak 8 (32%) pasien. Distribusi jumlah pasien ISK berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 4. Distribusi pasien berdasarkan tingkat pendidikan

c. Gambaran distribusi pasien berdasarkan pekerjaan

Tabel 10. Distribusi pasien berdasarkan jenis pekerjaan

Pekerjaan	Pasien ISK
Bekerja	16 (64%)
Tidak bekerja	9 (36%)
Total	25 (100%)

Sebanyak 25 pasien infeksi saluran kemih yang dijadikan sampel yang bekerja sebanyak 16 (64%) pasien dan yang tidak bekerja sebanyak 9 (36%). Distribusi pasien berdasarkan pekerjaan disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 5. Distribusi pasien berdasarkan pekerjaan

d. Gambaran Distribusi Pasien Berdasarkan Lama Perawatan


Tabel 11. Distribusi pasien berdasarkan lama perawatan

No	Lama Perawatan	Pasien ISK (%)
1	1-2 hari	0 (0%)
2	3-4 hari	1 (4%)
3	5< hari	24 (96%)
Total		25 (100%)

Dari 25 pasien infeksi saluran kemih yang dijadikan sampel menjalani lama perawatan yang beragam. Perawatan selama 5< hari (96%) menjadi lama perawatan terbanyak. Jumlah pasien yang patuh sebelum diberikan informasi obat berdasarkan lama perawatan 1-2 hari tidak terdapat pasien yang dirawat, lama perawatan 3-4 hari

sebanyak 1 (4%) pasien, dan lama perawatan  $5 <$  hari sebanyak 24 (96%) pasien.

Distribusi pasien berdasarkan lama perawatan disajikan dalam gambar berikut:




Gambar 6. Distribusi pasien berdasarkan lama perawatan

e. Distribusi total jumlah obat yang digunakan

Tabel 12. Distribusi total jumlah obat yang digunakan

Jumlah Obat	Pasien ISK
1-2	12 (48%)
3-4	13 (52%)
Total	25 (100%)

Sebanyak 25 pasien infeksi saluran kemih yang dijadikan sampel semua mendapat terapi pengobatan infeksi saluran kemih, adapun jumlah obat yang dikonsumsi yaitu penggunaan obat sebanyak 1-2 obat yaitu 12 (48%) pasien dan 3-4 obat yaitu 13 (52%) pasien. Distribusi pasien berdasarkan jumlah obat yang digunakan disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 7. Distribusi pasien berdasarkan jumlah obat

Tabel 13. Distribusi penggunaan antibiotik pada pasien infeksi saluran kemih

Nomor Rekam Medik	Diagnosa	Terapi utama	Lama Perawatan (Hari)	Durasi Penggunaan Obat
12000310	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
06025320	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
03018420	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
01000731	Pielonefritis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat terlalu singkat (14 hari untuk ciprofloxacin)
14023920	Pielonefritis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat terlalu singkat (14 hari untuk ciprofloxacin)
03005220	Pielonefritis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat terlalu singkat (14 hari untuk ciprofloxacin)
01000720	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
01175920	Pielonefritis	Amoxicillin	3	Durasi penggunaan obat terlalu singkat (14 hari untuk Amoxicillin)
09007710	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
14041220	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
0600579	Pielonefritis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat terlalu singkat (14 hari untuk ciprofloxacin)
03014320	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
16003310	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
14047820	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)


02030920	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
01013220	Pielonefritis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
03000710	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
09000410	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
01126910	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
01067090	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
14071410	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
03039220	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
09003320	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
02926020	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)
03623320	Sistitis	Ciprofloxacin	5	Durasi penggunaan obat melebihi masa terapi (3 hari untuk ciprofloxacin)

Tabel 14. Distribusi penggunaan antibiotik pada pasien infeksi saluran kemih

No	Antibiotik	Jumlah	Durasi penggunaan Sesuai	Durasi penggunaan tidak sesuai
1	Ciprofloxacin	24	0	24
2	Amoxicillin	1	0	1

Sebanyak 25 pasien yang dijadikan sampel semua mendapat terapi antibiotik infeksi saluran kemih, adapun jenis antibiotik yang dikonsumsi adalah Ciprofloxacin adalah 24 (96%) pasien dan Amoxicillin 1 (4%) pasien. Distribusi pasien berdasarkan penggunaan antibiotik disajikan dalam gambar berikut:






Gambar 8. Distribusi pasien berdasarkan penggunaan antibiotik

f. Terapi Penunjang Infeksi Saluran Kemih

Tabel 15. Penggunaan obat terapi penunjang infeksi saluran kemih

No	Obat	Jumlah	Prosentase (%)
1	Paracetamol	2	7,14
2	Asam mefenamat	22	78,5
3	Metilprednisolon	2	7,14
4	Natriumdiklofenak	1	3,57
5	Meloxicam	1	3,57
Total		28	100

Selain antibiotik, dalam catatan rekam medis juga ditemukan terapi penunjang untuk pasien rawat jalan infeksi saluran kemih. Obat-obatan sebagai terapi penunjang diberikan berdasar kondisi dan keluhan pasien di puskesmas. Dari 25 pasien terdapat 5 jenis obat terapi penunjang diantaranya yaitu: Paracetamol sebanyak 2 (7,14%) obat, asam mefenamat sebanyak 22 (78,5%) obat, metilprednisolon sebanyak 2 (7,14%) obat, natrium diklofenak sebanyak 1 (3,57%) obat dan meloxicam sebanyak 1 (3,57 %) obat. Distribusi pengobatan terapi penunjang infeksi saluran kemih disajikan dalam gambar berikut berikut



Gambar 9. Distribusi penggunaan terapi penunjang pasien ISK

### 3. Gambaran kepatuhan pasien ISK

- a. Gambaran Distribusi Tingkat kepatuhan Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia


Tabel 16. Gambaran Distribusi Tingkat Kepatuhan Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Karakteristik kepatuhan Pasien ISK		Pre Test Kepatuhan			Post Test Kepatuhan		
		R	S	T	R	S	T
JK	Laki-laki	5 (20%)	0 (0%)	1 (4%)	2 (8%)	2 (8%)	2 (8%)
	Perempuan	19 (76%)	0 (0%)	0 (0%)	8 (32%)	6 (24%)	5 (20%)
Total		24 (96%)	0 (0%)	1 (4%)	10 (40%)	8 (32%)	7 (28%)
Usia (tahun)	17-26	7 (28%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (4%)	5 (20%)	1 (4%)
	27-36	6 (24%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (12%)	2 (8%)	1 (4%)
	37-46	9 (36%)	0 (0%)	1 (4%)	5 (20%)	1 (4%)	4 (16%)
	47-56	2 (8%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (4%)	1 (4%)	1 (4%)
	57-66	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Total		24 (96%)	0 (0%)	1 (4%)	10 (40%)	9 (36%)	6 (24%)

Keterangan: JK = Jenis Kelamin

- R = Kepatuhan Rendah  
 S = Kepatuhan Sedang  
 T = Kepatuhan Tinggi


Tingkat kepatuhan pasien dari berbagai jenis kelamin sebelum dilakukann pelayanan informasi obat untuk perempuan yang kepatuhannya rendah yaitu 19 (76%) pasien, tidak terdapat pasien perempuan yang kepatuhannya sedang dan tinggi, sedangkan untuk laki-laki yang kepatuhannya rendah yaitu 5 (20%), tidak terdapat pasien laki-laki yang kepatuhannya sedang, dan jumlah pasien laki-laki yang kepatuhannya tinggi yaitu 1 (4%) pasien. Jumlah kepatuhan pasien setelah diberikan pelayanan informasi obat untuk perempuan yang kepatuhannya rendah 8 (32%) pasien, kepatuhan sedang 6 (24%) pasien dan kepatuhan tinggi 5 (20%) pasien. Sedangkan untuk pasien laki-laki masing-masing 2 (8%) pasien yang kepatuhannya rendah, sedang, dan tinggi. Distribusi tingkat kepatuhan pasien berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 10. Distribusi Tingkat Kepatuhan Pasien ISK Berdasarkan Jenis Kelamin

Tingkat kepatuhan pasien sebelum dilakukan pelayanan informasi obat tingkat kepatuhan pasien rendah paling banyak ditemukan pada rentang usia 37-46 tahun yaitu sebanyak 9 (36%), tidak terdapat pasien dengan tingkat kepatuhan sedang, dan tingkat

kepatuhan tinggi ditemukan pada rentang usia 37-46 tahun yaitu sebanyak 1 (4%) pasien. Setelah diberikan pelayanan informasi obat di temukan paling banyak pasien yang kepatuhannya rendah pada rentang usia 37-46 tahun yaitu 5 (20%) pasien, yang kepatuhannya sedang paling banyak ditemukan pada rentang usia 17-26 tahun yaitu 5 (20%) pasien, dan yang kepatuhannya tinggi paling banyak ditemukan pada rentang usia 37-46 tahun yaitu 4 (16%) pasien. Distribusi tingkat kepatuhan pasien berdasarkan usia disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 11. Distribusi tingkat kepatuhan pasien ISK berdasarkan usia


b. Gambaran distribusi tingkat kepatuhan pasien berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 17. Distribusi tingkat kepatuhan pasien berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pre Test Kepatuhan			Post Test Kepatuhan		
	R	S	T	R	S	T
SD-SLTP	4 (16%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (8%)	1 (4%)	1 (4%)
SLTA	12 (48%)	0 (0%)	1 (4%)	5 (20%)	4 (16%)	4 (16%)
Perguruan Tinggi	8 (32%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (12%)	3 (12%)	2 (8%)
Total	24 (96%)	0 (0%)	1 (4%)	10 (40%)	8 (32%)	7 (28%)

Keterangan: R = Kepatuhan Rendah  
 S = Kepatuhan Sedang  
 T = Kepatuhan Tinggi

Tingkat kepatuhan pasien sebelum dilakukan pelayanan informasi obat untuk tingkat kepatuhan rendah paling banyak ditemukan pada jenjang pendidikan SLTA sebanyak 12 (48%) pasien, untuk tingkat kepatuhan sedang tidak ditemukan pada berbagai jenjang pendidikan, dan untuk tingkat kepatuhan tinggi di temukan pada jenjang pendidikan SLTA sebanyak 1 (4%) pasien. Jumlah tingkat kepatuhan pasien setelah dilakukan pelayanan informasi obat untuk tingkat kepatuhan rendah paling banyak ditemukan pada jenjang pendidikan SLTA sebanyak 5 (20%), dan untuk tingkat kepatuhan sedang dan tinggi juga paling banyak ditemukan pada jenjang pendidikan SLTA masing-masing 4 (16%) pasien. Distribusi pasien berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 12. Distribusi tingkat kepatuhan pasien ISK berdasarkan tingkat pendidikan


c. Gambaran Distribusi Tingkat Kepatuhan Pasien Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 18. Distribusi tingkat kepatuhan pasien berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan	Pre Test Kepatuhan			Post Test Kepatuhan		
	R	S	T	R	S	T
Bekerja	15 (60%)	0 (0%)	1 (4%)	5 (20%)	7 (28%)	4 (16%)
Tidak bekerja	9 (36%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (20%)	1 (4%)	3 (12%)
Total	8 (32%)	0 (0%)	1 (4%)	10 (40%)	8 (32%)	7 (28%)

Keterangan: R = Kepatuhan Rendah  
 S = Kepatuhan Sedang  
 T = Kepatuhan Tinggi

Tingkat kepatuhan pasien yang bekerja sebelum diberikan informasi obat yaitu 15 (60%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah, tidak terdapat pasien bekerja dengan tingkat kepatuhan sedang, dan 1 (4%) pasien dengan tingkat kepatuhan tinggi. Sedangkan yang tidak bekerja, jumlah pasien dengan tingkat kepatuhan rendah sebanyak 9 (36%) pasien, dan tidak terdapat pasien tidak bekerja dengan tingkat kepatuhan sedang dan tinggi. Jumlah tingkat kepatuhan pasien setelah diberikan pelayanan informasi obat yaitu yang bekerja sebanyak 5 (20%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah, 7 (28%) pasien dengan tingkat kepatuhan sedang dan 4 (16%) pasien dengan tingkat kepatuhan tinggi. Sedangkan yang tidak bekerja sebanyak 5 (20%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah, 1 (4%) pasien dengan tingkat kepatuhan sedang dan 3 (12%) pasien dengan tingkat kepatuhan tinggi. Distribusi tingkat kepatuhan pasien berdasarkan pekerjaan disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 13. Distribusi tingkat kepatuhan pasien ISK berdasarkan pekerjaan


d. Gambaran Distribusi Tingkat Kepatuhan Pasien Berdasarkan Lama Perawatan

Tabel 19. Distribusi pasien berdasarkan lama perawatan

No	Lama Perawatan	Pre Test Kepatuhan			Post Test Kepatuhan		
		R	S	T	R	S	T
1	1-2 hari	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
2	3-4 hari	1 (4%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (4%)	0 (0%)	0 (0%)
3	5 < hari	24 (96%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (38%)	8 (32%)	7 (28%)
Total		25 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (40%)	8 (32%)	7 (28%)

Keterangan: R = Kepatuhan Rendah  
 S = Kepatuhan Sedang  
 T = Kepatuhan Tinggi

Tingkat kepatuhan pasien berdasarkan lama perawatan sebelum dilakukan pelayanan informasi obat yaitu pada lama 1-2 hari tidak terdapat pasien dengan tingkat kepatuhan rendah sedang maupun tinggi. Pada lama perawatan 3-4 hari tidak terdapat pasien dengan kepatuhan rendah dan sedang, terdapat 1 (4%) pasien dengan tingkat kepatuhan tinggi. Sedangkan jumlah pasien yang patuh setelah diberikan pelayanan informasi obat berdasarkan lama perawatan 1-2 hari tidak terdapat pasien dengan tingkat kepatuhan rendah, sedang maupun tinggi. Pada lama perawatan 3-4 hari terdapat 1 (4%) pasien dengan kepatuhan rendah, tidak terdapat pasien dengan tingkat kepatuhan sedang maupun tinggi. Pada lama perawatan 5 < hari terdapat 9 (36%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah, 8 (32%) pasien dengan tingkat kepatuhan sedang, 7 (28%) dengan tingkat kepatuhan tinggi. Distribusi tingkat kepatuhan pasien berdasarkan lama perawatan disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 14. Distribusi tingkat kepatuhan pasien ISK berdasarkan lama perawatan


## e. Distribusi jumlah obat yang digunakan

Tabel 20. Distribusi total jumlah obat yang digunakan

Jumlah Obat	Pre Test Kepatuhan			Post Test Kepatuhan		
	R	S	T	R	S	T
1-2	12 (48%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (0%)	3 (0%)	3 (0%)
3-4	12 (48%)	0 (0%)	1 (4%)	4 (16%)	5 (20%)	4 (16%)
Total	24 (96%)	0 (0%)	1 (4%)	10 (40%)	8 (32%)	7 (28%)

Keterangan: R = Kepatuhan Rendah  
 S = Kepatuhan Sedang  
 T = Kepatuhan Tinggi

Tingkat kepatuhan pasien sebelum diberikan informasi obat berdasarkan jumlah obat sebanyak 1-2 obat yaitu 12 (48%) pasien dengan kepatuhan rendah dan tidak terdapat pasien dengan tingkat kepatuhan sedang dan tinggi, untuk 3-4 obat yaitu 12 (48%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah dan 1 (4) pasien dengan tingkat kepatuhan tinggi. Sedangkan tingkat kepatuhan pasien setelah diberikan informasi obat berdasarkan penggunaan obat sebanyak 1-2 obat yaitu 6 (24%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah dan 3 (12%) dengan tingkat kepatuhan sedang dan tinggi. Untuk 3-4 obat yaitu 4 (16%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah dan tinggi serta 5 (20%) pasien dengan tingkat kepatuhan sedang. Distribusi tingkat kepatuhan pasien berdasarkan jumlah obat disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 15. Distribusi tingkat kepatuhan pasien ISK berdasarkan jumlah obat



## **B. Pembahasan**

Penelitian tentang analisis pengaruh pelayanan informasi obat terhadap tingkat keptuhan pasien rawat jalan infeksi saluran kemih yang di Puskesmas Danga periode 13 Januari-13 Maret 2017. Total seluruh populasi sebanyak 29 pasien dan sampel yang di ambil sebanyak 25. Adapun populasi yang tidak memenuhi kriteria inklusi yaitu 4 pasien hamil. Hasil penelitian pada pasien perempuan sebesar 76% dan laki-laki hanya 24%. Hal ini menunjukkan bahwa pasien perempuan lebih banyak dari pada pasien laki-laki yang menerima terapi antibiotik di dukung dengan pendapat (Clevo Rendi, 2012) yang melaporkan wanita paling sering menderita penyakit infeksi saluran kemih dari pada laki-laki karena uretra pada wanita yang pendek (kira-kira 4 cm). Pijatan uretra yang terjadi selama hubungan seksual menyebabkan bakteri masuk kedalam kandung kemih dan merupakan hal penting dalam pathogenesis infeksi saluran kemih pada perempuan muda. Disamping itu penggunaan diafragma dan spermasida ternyata merubah flora bakteri normal pada introitus berhubungan dengan peningkatan yang nyata kolonisasi *E. coli* pada vagina serta meningkatkan infeksi saluran kemih.

Ditemukan pada usia 37-46 tahun merupakan urutan terbanyak terkena infeksi saluran kemih yaitu 40%, keadaan tersebut hampir sama dengan pedoman praktek klinis *Pharmaceutical Handbook* yang melaporkan bahwa infeksi saluran kemih adalah penyebab paling umum dari semua infeksi pada wanita dewasa khususnya pada wanita muda yang aktif secara seksual. Hampir setenga dari semua wanita akan mengalami satu kali infeksi saluran kemih seumur hidup mereka. Infeksi saluran kemih akut jarang terjadi pada laki-laki dibawah usia 50 tahun tetapi sering pada perempuan berumur 20-50 tahun. Bacteriuria asimtomatik sangat umum pada laki-laki dan perempuan usia lanjut mencapai angka 40-50% pada beberapa penelitian (Kurt J.

Isselbacher, 2000: 616) melaporkan tentang prevalensi infeksi saluran kemih dan hasil yang di temukan dapat dikatakan bahwa usia menjadi salah satu faktor resiko penyebab penyakit infeksi saluran kemih.

Pendidikan pasien terbanyak yaitu pada tingkat SLTA terbanyak 13 pasien dari total 25 pasien atau lebih dari 52% pasien dengan tingkat pendidikan terakhir SLTA yang menderita saluran kemih. Belum diketahui dengan pasti penyebab tingginya angka kejadian infeksi saluran kemih pada pasien dengan tingkat pendidikan SLTA, hal ini hampir sama dengan penelitian (Tezebe Emiru 2013) yang melaporkan bahwa pasien dengan pendidikan terakhir SLTA yang paling banyak menderita infeksi saluran kemih namun tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan kejadian infeksi saluran kemih.

Terdapat 16 responden yang bekerja di berbagai sektor seperti pegawai negeri sipil sebanyak 4 responden, petani sebanyak 8 responden, wirausaha sebanyak 2 responden, honorer sebanyak 2 responden, serta terdapat 9 responden dari total 25 responden yang tidak bekerja mengalami infeksi saluran kemih hal ini sama dengan penelitian (Christian Cofi, dkk. 2012) menyebutkan bahwa responden berasal dari pekerjaan utama adalah bertani sebanyak 3 responden, diikuti oleh pensiunan sebanyak 17 responden, pedagang sebanyak 13 responden, pegawai negeri sipil sebanyak 11 responden, guru sebanyak 9 responden, siswa sebanyak 2 responden, perawat sebanyak 1 responden, keamanan sebanyak 4 responden, mekanik sebanyak 3 responden, pemuka agama sebanyak 2 responden, pengangguran sebanyak 3 responden hal ini menunjukkan bahwa jumlah pasien infeksi saluran kemih yang bekerja lebih tinggi dari pada pasien infeksi saluran kemih yang tidak bekerja dan distribusi organisme yang merata pada pasien dengan berbagai pekerjaan menunjukkan bahwa

infeksi saluran kemih dapat di alami oleh pasien dengan berbagai latar belakang pekerjaan bahkan pada pasien yang tidak bekerja.

Lama perawatan selama 5 hari (96%) menjadi lama perawatan terbanyak dan terdapat pasien pada lama 3-4 hari (4%). Data tersebut sesuai dengan *guedelines on urological infection* yang menyarankan penggunaan ciprofloxacin untuk pasien ISK selama 3 hari untuk pengobatan lini pertama dan untuk Amoxicillin adalah 14 hari.

Adapun yang didiagnosa ISK bagian atas non komplikata yaitu 6 orang (24%), ISK bagian bawah non komplikata sebanyak 19 orang (76%). Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa kejadian ISK atas lebih renda dari ISK bagian bawah.

Hasil jumlah obat yang dikonsumsi pada 25 pasien yaitu penggunaan obat sebanyak 1-2 obat yaitu 12 sampel (48%) dan 3-4 obat yaitu 13 sampel (52%) dan ditemukan 24 diantaranya mengalami potensi interaksi obat dan 1 sampel tidak mengalami potensi interaksi obat. Hal ini sesuai dengan penelitian Amhar (2016) yang mengutip Lin (2003) bahwa semakin meningkatnya jumlah obat yang diterima pasien, rasiko terjadinya interaksi obat juga semakin tinggi, rasiko terjadinya interaksi obat kurang lebih naik 6% pada pasien yang menerima dua obat, 50% untuk yang menerima lima obat hingga 100% bagi pasien yang menerima sepuluh macam jumlah obat.

Ciprofloxacin merupakan antibiotik paling banyak digunakan yaitu 96% dengan jumlah yang menggunakan 24 pasien. Ciprofloxacin merupakan lini pertama dalam terapi infeksi saluran kemih merupakan antibiotik golongan fluorokuinolon yang memiliki aktifitas yang baik terhadap gram positif dan negatif. Urutan kedua sebanyak 4% yang digunakan oleh 1 pasien yaitu amoxicillin yang merupakan antibiotik yang termasuk dalam rekomendasi terapi ISK dalam *Pharmaceutical Handbook*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang berjudul Evaluasi

Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih oleh Elli Puspitasari (2015) didapatkan hasil golongan antibiotik yang paling banyak digunakan adalah golongan flourokuinolon generasi ke 2 (siprofloksacin) sebanyak 32 pasien (80%) dan golongan sefalosporin generasi ke 3 (seftriakson) sebanyak 12 pasien (30%).

Hasil pada pemberian terapi penunjang dapat diketahui bahwa analgetik non narkotik merupakan obat penunjang pada pasien infeksi saluran kemih, hal tersebut sesuai dengan hasil rekam medik yang menunjukkan sebagian besar pasien datang ke Puskesmas dengan keluhan demam dan nyeri pada pinggang atau nyeri saat berkemih. Analgetik non narkotik yang diberikan sebagai terapi pada pasien contohnya parasetamol, asam mefenamat, natrium diklofenak dan meloxicam. Adapun yang berinteraksi dengan ciprofloksacin adalah parasetamol, asam mefenamat, natrium diklofenak, meloxicam. Katagori moderate yaitu ciprofloksacin dan asam mefenamat, paracetamol, natrium diklofenak dan meloxicam. Interaksi ciprofloksacin golongan obat AINS adalah jenis interaksi farmakodinamik dan berhubungan dengan toksisitas. Asam mefenamat akan menimbulkan toksisitas tambahan bersama dengan ciprofloksacin dan levofloxacin didasarkan pada kemungkinan risiko stimulasi SSP dan konvulsi (kejang) ketika AINS di koadministrasikan dengan antibiotika golongan Quinolon. Hal tersebut disebabkan oleh efek perintang terhadap pengikatan GABA kepada reseptornya secara sinergis oleh AINS dan Quinolon. Interaksi antara ciprofloksacin dan metilpredisolon termasuk kategori minor yaitu dapat meningkatkan risiko pecahnya tendon. Tidak terhadap interaksi Amoxicillin dengan obat lain.

Pengukuran tingkat kepatuhan pada pasien menggunakan kuesioner *Morisky Medication Adherence Scale* (MMAS-8). MMAS adalah alat penilaian dari WHO yang tervalidasi dan sering digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pasien terhadap

pengobatan. Kuisisioner ini dipilih karena murah dan mudah digunakan dalam pelayanan kesehatan. MMAS-8 terdiri dari 8 pertanyaan dan kategori respon terdiri dari jawaban ya atau tidak dan 5 skala *likert* untuk satu item pertanyaan terakhir. Nilai kepatuhan penggunaan obat MMAS-8 adalah 8 skala untuk mengukur kebiasaan penggunaan obat dengan rentang 0 sampai 8 dan di kategorikan menjadi 3 tingkatan kepatuhan yaitu kepatuhan tinggi (nilai =8), kepatuhan sedang (nilai=6-7) dan kepatuhan rendah (nilai =<6) (Morisky dkk., 2008).

Dari 25 pasien rata-rata tingkat kepatuhan minum obat pasien meningkat setelah pemberian informasi obat. Hal ini menunjukkan bahwa pasien membutuhkan pelayanan informasi obat yang tepat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan pasien tentang obat dan kepatuhan pasien serta mendukung penggunaan obat yang rasional.

Tabel 21. Rata-rata skor MMAS-8 sebelum dan setelah pemberian informasi obat

Variabel	Sebelum pemberian informasi obat	Setelah pemberian informasi obat	p
Rata-rata MMAS-8 ± SD	3.1400 ± 1.74117	6.1000 ± 1.32094	0.000

Keterangan: SD = Standar deviasi

Pada awal penelitian rata-rata tingkat kepatuhan pasien berdasarkan jawaban kuesioner MMAS-8, yaitu 3.1400 ± 1.74117 dan sebesar 96% pasien memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Ketidakepatuhan di cerminkan dengan pasien tidak rutin minum obat. Hampir semua pasien (88%) tidak menggunakan obat karena alasan berhenti minum obat ketika merasa agak sehat dan (84%) dengan alasan lupa minum obat. Hasil ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Atika yang mengatakan bahwa 53,33% pasien yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dan 73,33% pasien tidak menggunakan obat karena lupa. Solusi yang dapat digunakan untuk menurunkan prevelensi lupa dalam menggunakan obat dapat dilakukan dengan mengefektifkan jadwal pendosisan melalui penyederhanaan regimen dosis harian,

menggunakan kotak pil untuk mengatur jadwal dosis harian dan menyertakan anggota keluarga agar berpartisipasi dalam meningkatkan pasien untuk minum obat (Wahyu Atika 2012 ). Setelah pemberian informasi obat terdapat perbedaan signifikan rata-rata skor MMAS-8, yaitu  $6.1000 \pm 1.32094$ . Skor MMAS rata-rata meningkat  $2.9600 + 1.59863$  dengan hasil analisis *wilcoxon*  $p=0,000 < 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi obat pada pasien infeksi saluran kemih dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatannya. Hal ini sesuai dengan penelitian (Wahyu Atika 2012) yang menyatakan bahwa edukasi efektif membantu meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien.



Gambar 16. Persentase tingkat kepatuhan pasien berdasarkan skor MMAS-8 sebelum dan setelah pemberian informasi obat

Pelayanan informasi obat setelah pilar penting dalam mengoptimalkan terapi pengobatan pada pasien infeksi saluran kemih. Apoteker memiliki peran yang cukup dalam meningkatkan kewaspadaan pasien/pasien/keluarganya terhadap efek samping/reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD) yang mungkin terjadi. Pada

penelitian ini pelayanan informasi obat diberikan oleh apoteker meliputi tujuan terapi, indikasi obat, regimen dosis, cara penggunaan, kemungkinan efek samping yang ditimbulkan dan bahaya resistensi antibiotik apabila pasien tidak menggunakan obat secara teratur. Pelayanan informasi obat kepada pasien maupun keluarga pasien dapat meningkatkan kepatuhan pasien infeksi saluran kemih ditinjau dari peningkatan MMAS-8. Berbagai penelitian (Farsei, Zargarzade 2011 dan Wahyu Atika 2012) melaporkan bahwa intervensi apoteker memegang peranan yang cukup penting untuk membantu mengatasi masalah kepatuhan pasien yang rendah.

Tabel 22. Hasil analisis korelasi Pearson, Spearman's Rho, dan analisis regresi linear berganda jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama pengobatan, jumlah obat, efek samping dengan perubahan skor MMAS-8

Variabel	Korelasi Pearson dan Spearman's Rho		Regresi linear berganda
	r	Sig (2-tailed)	Sig (2-tailed)
Usia	0.047	0,823	0.886
Jenis kelamin	-0.148	0.847	0.557
Tingkat pendidikan	-0.133	0.528	0.153
Pekerjaan	0.094	0.654	0.212
Jumlah obat	0.123	0.559	0.757
Lama pengobatan	0.159	0.449	0.168
Efek samping obat	-	-	0.866

Berdasarkan hasil penelitian, pasien yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki sebagian besar tidak patuh dalam menjalani pengobatan dari berbagai usia, hal ini dapat dilihat dari tingginya angka ketidakpatuhan pasien sebelum diberikan informasi obat yaitu mencapai 96%. Namun setelah pemberian informasi obat rata-rata kepatuhan pasien meningkat dan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu kepatuhan rendah sebesar 44%, kepatuhan sedang sebesar 48% dan kepatuhan tinggi sebesar 8%. Pada variabel usia penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna dengan tingkat kepatuhan dalam menjalani pengobatan infeksi saluran kemih di puskesmas Danga dengan nilai signifikansi 0,823 < 0.05). Jumlah kepatuhan terbanyak



yaitu 24% pasien berada pada rentang usia 17-26 tahun. Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian (Wahyu Atika 2012) yang mengutip (Jin, dkk 2008) bahwa variabel usia kurang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dengan nilai  $p=0,864>0,005$ .

Berdasarkan analisis bivariat menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kepatuhan dalam menjalani pengobatan infeksi saluran kemih di Puskesmas Danga dengan nilai signifikan  $0,847>0,05$ . Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa mayoritas pasien adalah berjenis kelamin perempuan yang patuh setelah pemberian informasi obat yaitu sebesar 44% dan berjenis kelamin laki-laki sebesar 16%. Masih terdapat pasien yang tidak patuh baik laki-laki maupun perempuan yaitu sebesar 40%. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Exa Puspita 2016) yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan penggunaan obat pada pasien hipertensi dengan nilai  $p=0.366$  ( $p>0,05$ ). Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan yang bermakna antara responden perempuan yang patuh 65,6% dan berjenis kelamin laki-laki sebesar 34,5%. Artinya baik pasien perempuan maupun laki-laki keduanya sama-sama memiliki kesadaran untuk patuh dalam penggunaan obat.

Dalam penelitian ini tidak terdapat hubungan yang bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan tingkat pendidikan pasien dengan nilai signifikansi  $0.528>0.05$ . Pasien dengan tingkat pendidikan yang tinggi sebagian tidak memahami pentingnya kepatuhan dalam menjalani pengobatan terutama dengan terapi antibiotik. Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian (Wahyu Atika 2012) yang melaporkan bahwa tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan dengan nilai  $p=0,864>0.05$ . Pasien dengan tingkat pendidikan yang tinggi sebagian tidak



memahami kondisi penyakitnya atau tidak percaya akan pentingnya pengobatan terhadap penyakitnya sehingga menyebabkan pasien tidak patuh. Disisi lain pasien dengan tingkat pendidikan lebih rendah menyatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap saran dokter sehingga menyebabkan mereka lebih patuh. Berbeda dengan penelitian (Exa Puspita 2016) yang mengutip (ekarini 2011) menunjukkan tingkat pendidikan berhubungan dengan tingkat kepatuhan pasien hipertensi dalam menjalani pengobatan. Pasien yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sebagian besar mamiliki kepatuhan dalam menjalani pengobatan.

Variabel jenis pekerjaan tidak berpengaruh secara signifikan dengan tingkat kepatuhan ( $P=0.654>0.05$ ). Baik pasien yang bekerja maupun yang tidak bekerja sama-sama memiliki potensi tidak patuh dalam menjalani pengobatan. Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian (Exa Puspita 2016) yang melaporkan bahwa hasil uji Chi-square pada tabel mengenai hubungan antara status pekerjaan dengan kepatuhan dalam menjalani pengobatan hipertensi diperoleh nilai  $p\ value=0.872$  ( $p>0.05$ ) yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara status pekerjaan dengan kepatuhan.

Variabel jumlah obat tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan ( $p=0,559>0.05$ ). Hal ini serupa dengan penelitian (Grant Devita 2003) yang menyatakan bahwa terdapat korelasi yang lemah antara jumlah obat dengan rata-rata tingkat kepatuhan pasien. Pasien yang mendapat regimen obat lebih sedikit dan sederhana umumnya memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun pasien yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah cenderung tidak patuh terhadap semua pengobatan meskipun pasien hanya mendapatkan satu jenis obat, sebaliknya jika pasien memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk patuh terhadap pengobatan walaupun pasien mendapat lebih dari satu jenis obat maka kepatuhan akan cenderung lebih tinggi.

Variabel lama pengobatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pasien infeksi saluran kemih yang di rawat di puskesmas Danga dengan ( $p=0.449>0.05$ ). Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian (Wahyu Atika 2012) yang menyatakan bahwa lama pengobatan tidak berpengaruh dengan tingkat kepatuhan ( $p=0.316>0.05$ ). lama perawatan pasien infeksi saluran kemih yaitu rata-rata 5 hari, dan selama perawatan ada sebagian pasien rutin mengkonsumsi obat dan cenderung patuh terhadap pengobatan. Namun ada juga pasien yang tidak patuh terhadap pengobatan dengan alasan berhenti minum obat karena merasa kondisinya semakin membaik.

Variabel efek samping obat tidak diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan pasien infeksi saluran kemih dikarenakan tidak diketahui nilai signifikan dengan variabelnya konstan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Wahyu Atika 2012) yang melaporkan bahwa Variabel efek samping tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pasien disebabkan oleh jumlah proporsi pasien yang mengalami efek samping obat sangat sedikit, yaitu 1 dari 30 pasien (3,33%). Namun hasil survei terhadap 2507 pasien pada tahun 2005 menunjukkan bahwa 45% pasien tidak menggunakan obatnya karena khawatir terhadap efek samping obat. Kekhawatiran ini juga dialami oleh pasien yang dirawat di Puskesmas Danga yang diberikan informasi mengenai kemungkinan efek samping obat yang terjadi. Setelah mengetahui bahwa ketika menggunakan obat ada kemungkinan terjadinya efek samping obat pasien menjadi takut untuk menggunakan obatnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Gambaran penggunaan obat pada 25 pasien yaitu Ciprofloxacin 24 (96%) pasien, dan Amoxicillin 1 (4%) pasien.
2. Hasil pretest menunjukkan bahwa pada awal penelitian tingkat kepatuhan 24 (96%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah dan 1 (4%) pasien dengan tingkat kepatuhan tinggi. Hasil posttest menunjukkan bahwa setelah pemberian informasi obat terdapat 11 (44%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah, 12(48%) pasien dengan tingkat kepatuhan sedang, dan 2 (8%) pasien dengan tingkat kepatuhan tinggi
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, lama pengobatan, jumlah obat dan efek samping dengan tingkat kepatuhan pasien infeksi saluran kemih terhadap pengobatannya.
4. Pemberian informasi obat dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatannya, ditinjau dari peningkatan skor MMAS-8.

#### **B. Saran**

1. Membuat pedoman pengobatan untuk penyakit infeksi saluran kemih di Puskesmas Danga, sehingga dapat mengetahui secara jelas dan dapat membandingkan dengan standar yang sudah ditentukan.
2. Dalam memberikan informasi obat hendaknya menciptakan rasa nyaman pada pasien dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien.

## KEPUSTAKAAN

- Abdullah bin Muhammad. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i. 2009.
- Abdullah bin Muhammad. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i. 2009.
- Abdulkarim, Abdulmalik. Tafsir Al-Azhar 13, 14, 15, 16. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1082.
- Abdulkarim, Abdulmalik. Tafsir Al-Azhar 17, 18, 19, 20. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1082.
- Baroro, Farida. *Evaluasi Implementasi Pelayanan Informasi Obat Pasien Rawat Jalan Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan. 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta. PT. syamil. 2010.
- Dipiro, Joseph. *Pharmacotherapy Handbook Ninth Edition*. New York. MC Graw Hill. 2015.
- Faiz Muhammad Almath, Dr. *1100 hadits terpilih: Sinar ajaran Muhammad*. Jakarta. Gema Insani. 1991.
- Hamita APT, Maksun Hadri. *Buku Ajar Analisa Hayati*. Jakarta. EGC. 2012.
- Hamka. Tafsir Al-Azhar. Jakarta. Puastaka Paniimas. 1985.
- Henry F. Chambers. *Senyawa Antimikroba Goodman and Gilman Dasar-dasar Farmakologi Terapi Edisi 10*. Jakarta. EGC. 2011.
- Istiantoro, Y.H, dan Gan. V.G.H. *Penisilin, Sefalosporin dan Antibiotik Betalaktam lainnya dalam Farmakologi dan Terapi*. Edisi kelima. Editor Sulistia G. Ganiswara. Jakarta. 2007.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Standar Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Pelayanan Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Kumala Shrly, Nancy Raisa, Lestari Rahayu. *Uji Kepekaan Bakteri yang Diisolasi dari Urin Penderita Infeksi Saluran Kemih Terhadap Beberapa Antibiotika*. Jakarta: Universitas Pancasila. 2009.
- Kurt J. Isselbacher., Dkk *Harrison Prinsip Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta. EGS. 2000.
- Lacy, Charles. *Drug Information Handbook*. Amerika: Lexi Comp. 2009.
- M. Clevano Rendy. *Asuhan keperawatan Medikal Bedah*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.

- M. Grabe, et al. *Guidelines on Urological Infections*. Eropa: European Association of Urology. 2015.
- Morisky, D.E., dkk. *Predictive Validity of a Medication Adherence Measure in an Outpatient Setting*, *J. Clin.Hyperten*. 2008. 10348-35
- Muhadi Z. *Semua Penyakit Ada Obatnya; Menyembuhkan Penyakit*. Bandung: CV Pustaka. 2009.
- Mustafa, Ahmad Al-Maragi. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang. Toha Putra. 1992.
- Nurhayati, Imas. Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Minum Obat Antituberkulosis Pada Penderita Tuberkulosis Paru di Rumah Sakit Paru Sidawangi Cirebon. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2016.
- Osterberg L, dan Terrence. *Adherence to Medication*. N Eng J Med. 2005.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Ingonesia Tentang Pelayanan Kefarmasian*. Jakarta: Menteri Hukum Dan HAM. 2009.
- Pradana, Andika. Profil Pelayanan Informasi Obat Yang Diterima dan Kepatuhan Pasien Asma Berdasarkan Persepsi Pasien Di Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Universitas Sanata Darma Jogjakarta. 2015.
- Siregar, Charles J.P. dan Endang Kumolosasi. *Farmasi Klinik Teori dan Penerapan*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2006.
- Smantumkul, Chayanee. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat Hipertensi Pada Peseian Hipertensi Di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit X Pada Tahun 2014. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.
- Smelzer C. Suzanne. *Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta. EGC. 2001.
- Sudoyo W. Aru. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta. Departemen Ilmu Penyakit Dalam UI. 2006.
- Sudung O. Pardede. *Konsensus Infeksi Saluran Kemih Pada Anak*. Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). 2011.
- Sulaiman, Shubhi. *Kontribusi Islam terhadap ilmu pengobatan*. Thibbia: Surakarta. 2010.
- Susanto, Yogo. Dkk. Aplikasi Pillbox Reminder Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat Pasien Rawat Jalan di Apotik Appo Farma. Banjar Baru: PIT. 2018.
- Tessy A, Ardayo, Suwanto. *Infeksi salauran kemih dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta : Balai Penerbit FKUI; 2001
- Tjay, T.H., dan Rahardja, K. *Obat–Obat Penting*. Edisi V. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo. 2007.
- Wahyu, Atika Puspasari. *Analisis Efektifitas Penggunaan Booklet Obat Terhadap Tingkat Kepatuhan Ditinjau Dari Kadar Hemoglobin Terglikasi dan Morisky Madication Adherence Scale (MMAS)-8 Pada Pasien Diabetes Melitus*. Depok. Univeritas Indonesia. 2012.

## LAMPIRAN

### 1. Lembar pernyataan persetujuan berpartisipasi dalam penelitian

#### **PPERNYATAAN PERSETUJUAN BERPARTISIPASI DALAM PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan obat pada pasien infeksi saluran kemih yang di rawat di Puskesmas Danga dan untuk mengetahui pengaruh pemberian informasi obat terhadap tingkat kepatuhan pada pasien infeksi saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga. Responden akan diberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diberikan sebanyak dua kali dengan selang waktu tertentu. Peneliti sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Semoga penelitian ini memberi manfaat bagi kita semua.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Usia :  
 Alamat :  
 Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian sebagai responden. Saya menyadari bahwa keikutsertaan diri saya pada penelitian ini adalah sukarela. Saya setuju akan memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.


Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Nagekeo, 2017

Peneliti  
(Nurjanna)

Yang Membuat Pernyataan  
( )

## 2. Skema Kerja



## 3. Formulir data responden

Penyakit Utama:			Kode Sumber Data:		
Nama (Singkatan):	Usia:	Jenis Kelamin:	Pendidikan:	Pekerjaan:	
Nama Obat	Bentuk Sediaan	Beri Tanda X Untuk Obat Yang Dicurigai	Pemberian		
			Dosis	Tgl. Mulai	Tgl. Akhir
Indikasi:		Lama Pengobatan:	Jumlah obat:	Penyakit Utama: Keluhan Penyakit Utama (Beri tanda X) -Sembuh -Meninggal -Tidak tahu -Belum sembuh -Sembuh dengan gejala Sisa	
		Penyakit atau kondisi lain yang menyertai (beri tanda X) -Gangguan ginjal -Gangguan hati -Alergi	-Kondisi medis lainnya lain-lain		
Nagekeo, 2017 (Tanda Tangan)					



## 4. Kuesioner MMAS-8 untuk mengukur tingkat kepatuhan pasien

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda kadang lupa menggunakan obat atau minum obat untuk penyakit anda?	0	1
2	Selama 2 pekan terakhir ini, pernahkah anda dengan sengaja tidak menggunakan obat atau minum obat anda?	0	1
3	Pernahkah anda mengurangi atau berhenti menggunakan obat atau minum obat tanpa memberi tahu dokter anda karena anda merasa kondisi tambah parah keketika minum obat tersebut	0	1
4	Ketika anda bepergian atau meninggalkan rumah apakah anda kadang-kadang lupa membawa obat anda?	0	1
5	Apakah anda menggunakan obat anda atau minum obat anda kemarin?	1	0
6	Ketika merasa agak sehat, apakah anda juga kadang berhenti minum obat?	0	1
7	Minum obat setiap hari merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Apakah anda pernah merasa terganggu dengan kewajiban anda terhadap pengobatan yang harus anda jalani	0	1

8. Seberapa sering anda mengalami kesulitan menggunakan obat atau minum obat anda?
- Tidak pernah (skor 1)
  - Sekali-sekali (skor 0,75)
  - Kadang-kadang (skor 0,5)
  - Biasanya (skor 0,25)
  - Selalu (skor 0)

Keterangan: Skor	Kategori
<6	Rendah
6-7	Sedang
8	Tinggi

## 5. Hasil penelitian secara keseluruhan

Responden	Nomor Rekam Medik	Usia (tahun)	Jenis Kelamin (1=laki-laki,2=perempuan)	Pendidikan (1=SD-SLTP;2=SLTA;3=PT)	Pekerjaan (0=tidak bekerja;1=bekerja)
1	12000310	45	1	1	1
2	06025320	37	2	2	0
3	03018420	25	2	2	1
4	01000731	23	2	2	0
5	14023920	31	2	3	1
6	03005220	25	2	3	1
7	01000720	42	2	2	0
8	01175920	31	2	1	1
9	09007710	50	1	2	1
10	14041220	42	2	2	0
11	0600579	35	2	1	0
12	03014320	22	2	1	0
13	16003310	44	1	3	1
14	14047820	38	2	3	1
15	02030920	36	2	3	1
16	01013220	37	2	2	0
17	03000710	39	2	3	1
18	09000410	47	1	2	1
19	01126910	39	1	2	1
20	01067090	22	2	3	1
21	14071410	17	1	2	1
22	03039220	35	2	2	0
23	09003320	29	2	2	0
24	02926020	47	2	2	1
25	03623320	37	2	3	1

## Lampiran lanjutan

Reaponden	Nomor Rekam Medik	Diagnosa	Terapi utama	Terapi penunjang
1	12000310	Sistitis	Ciprofloxacine	Asam mefenamat
2	06025320	sistitis	Ciprofloxacine	Asam mefenamat
3	03018420	Sistitis	Ciprofloxacine	Asam mefenamat
4	01000731	Pielonefritis	Ciprofloxacine	Asam mefenamat
5	14023920	Pielonefritis	Ciprofloxacine	Asam mefenamat Vit. B com
6	03005220	Pielonefritis	Ciprofloxacine	Asam mefenamat Vit. C
7	01000720	Sistitis	Ciprofloxacine	Asam mefenamat Ranitidin
8	01175920	Pielonefritis	Amoxicillin	Asam mefenamat

9	09007710	Sistitis	Ciprofloxacin	Asam mefenamat Antasida Vit. C
10	14041220	Sistitis	Ciprofloxacin	Asam mefenamat
11	0600579	Pielonefritis	Ciprofloxacin	Asam mefenamat Antasid Vit. C
12	03014320	Sistitis	Ciprofloxacin	Asam mefenamat Metilprednisolon Antasida
13	16003310	Sistitis	Ciprofloxacin	Paracetamol Antasida
14	14047820	Sistitis	Ciprofloxacin	Asam mefenamat
15	02030920	Sistitis	Ciprofloxacin	Asam mefenamat
16	01013220	Pielonefritis	Ciprofloxacin	Paracetamol
17	03000710	Sistitis	Ciprofloxacin	Asam mefenamat Natriumdiklofenak
18	09000410	Sistitis	Ciprofloxacin	Metilprednisolon
19	01126910	Sistitis	Ciprofloxacin	Asam mefenamat
20	01067090	Sistitis	Ciprofloxacin	Asam mefenamat
21	14071410	Sistitis	Ciprofloxacin	Asam mefenamat Antasida
22	03039220	Sistitis	Ciprofloxacin	Asam mefenamat Meloxicam
23	09003320	Sistitis	Ciprofloxacin	Asam mefenamat Antasida
24	02926020	Sistitis	Ciprofloxacin	Asam Mefenamat
25	03623320	Sistitis	Ciprofloxacin	Asam mefenamat Antasida

Lampiran lanjutan

Reaponden	Nomor Rekam Medik	Jumlah obat	Lama pengobatan	Efek samping (1=mengalami; 0=tidak mengalami)
1	12000310	2	5	0
2	06025320	2	5	0
3	03018420	3	5	0
4	01000731	2	5	0
5	14023920	3	5	0
6	03005220	3	5	0
7	01000720	3	5	0
8	01175920	2	3	0
9	09007710	3	5	0
10	14041220	2	5	0
11	0600579	4	5	0
12	03014320	4	5	0
13	16003310	3	5	0
14	14047820	2	5	0

15	02030920	2	5	0
16	01013220	2	5	0
17	03000710	3	5	0
18	09000410	2	5	0
19	01126910	2	5	0
20	01067090	2	5	0
21	14071410	3	5	0
22	03039220	3	5	0
23	09003320	3	5	0
24	02926020	2	5	0
25	03623320	3	5	0

6. Jawaban kuesioner MMAS-8 sebelum pemberian informasi obat

No.	Nomor Rekam Medik	Skor Pertanyaan Kuesioner								Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	12000310	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	06025320	0	1	0	0	1	0	0	1	3
3	03018420	0	1	0	1	0	0	1	1	4
4	01000731	0	1	0	0	0	0	0	0,25	1,25
5	14023920	0	1	0	1	0	0	1	1	4
6	03005220	0	1	0	0	0	0	0	0,25	1,25
7	01000720	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5
8	01175920	0	1	1	0	0	0	1	1	4
9	09007710	1	1	1	1	1	1	1	1	8
10	14041220	0	1	0	0	0	0	1	0,5	2,5
11	0600579	0	1	0	0	1	1	1	1	5
12	03014320	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,75
13	16003310	0	1	0	0	1	0	0	0,5	2,5
14	14047820	1	1	0	0	1	0	0	0,5	3,5
15	02030920	0	1	0	0	1	0	0	0,75	2,75
16	01013220	0	1	0	0	0	0	0	0,5	1,5
17	03000710	0	0	0	0	0	0	0	0,75	5,75
18	09000410	1	1	1	0	1	0	0	0,75	4,75
19	01126910	0	1	1	1	0	0	1	1	5
20	01067090	0	1	0	0	0	0	0	1	2
21	14071410	1	0	0	0	1	0	1	1	4
22	03039220	0	1	0	0	0	0	1	1	3
23	09003320	0	1	1	0	0	0	0	0,75	2,75
24	02926020	0	0	1	0	1	0	0	0,75	2,75
25	03623320	0	1	0	0	1	0	0	1	3
Total Skor Tiap Pertanyaan		4	20	6	5	12	3	10	18,5	

## 7. Jawaban kuesioner MMAS-8 setelah pemberian informasi obat

No.	Nomor Rekam Medik	Skor Pertanyaan Kuesioner								Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	12000310	1	0	1	1	1	1	1	1	7
2	06025320	1	1	1	1	0	1	1	1	7
3	03018420	1	1	1	1	0	0	1	1	6
4	01000731	1	1	1	1	1	1	0	0,75	7,75
5	14023920	1	1	1	1	0	1	1	1	7
6	03005220	1	1	1	0	1	1	1	0,25	5,25
7	01000720	1	1	0	1	0	1	0	0,5	4,5
8	01175920	1	1	1	0	0	0	1	1	5
9	09007710	1	1	1	1	1	1	1	1	8
10	14041220	1	1	0	0	0	1	1	1	5
11	06001579	1	1	1	1	1	1	1	1	8
12	03014320	1	0	0	1	1	0	1	0,75	4,75
13	16003310	1	1	0	0	1	0	0	0,5	3,5
14	14047820	1	1	0	1	1	0	1	0,5	5,5
15	02030920	0	1	0	1	0	0	1	1	4
16	01013220	0	1	1	0	0	1	1	1	5
17	03000710	1	1	0	1	1	1	1	0,75	7,75
18	09000410	1	1	1	0	1	1	0	0,75	5,75
19	01126910	1	1	1	1	1	0	1	1	7
20	01067090	1	1	0	1	1	0	0	1	5
21	14071410	1	0	1	1	1	1	1	1	7
22	03039220	1	1	1	0	1	1	1	1	7
23	09003320	1	1	1	0	1	0	0	0,75	4,75
24	02926020	0	1	1	0	1	1	1	1	7
25	03623320	1	1	1	1	1	1	0	1	7
Total Skor Tiap Pertanyaan		22	22	17	16	17	16	18	22,5	

## 8. Total Skor jawaban Kuesioner MMAS sebelum dan setelah pemberian informasi obat

NO	Nomor Rekam Medik	Skor MMAS Sebelum Pemberian Informasi Obat	Tingkat Kepatuhan Pasien	Skor MMAS Setelah Pemberian Informasi Obat	Tingkat Kepatuhan pasien
1	12000310	1	Rendah	7	Sedang
2	06025320	3	Rendah	7	Sedang
3	03018420	4	Rendah	6	Sedang
4	01000731	1.25	Rendah	7,75	Sedang
5	14023920	4	Rendah	7	Sedang
6	03005220	1.25	Rendah	6,25	Sedang
7	01000720	0.5	Rendah	4,5	Rendah
8	01175920	4	Rendah	5	Rendah
9	09007710	8	Tinggi	8	Tinggi
10	14041220	2.5	Rendah	5	Rendah
11	06001579	5	Rendah	8	Tinggi
12	03014320	0.75	Rendah	4,75	Rendah
13	16003310	2.5	Rendah	3,5	Rendah
14	14047820	3.5	Rendah	5,5	Rendah
15	02030920	2.75	Rendah	4	Rendah
16	01013220	1.5	Rendah	5	Rendah
17	03000710	5,75	Rendah	7,75	Sedang
18	09000410	4,75	Rendah	5,75	Rendah
19	01126910	5	Rendah	7	Sedang
20	01067090	2	Rendah	5	Rendah
21	14071410	4	Rendah	7	Sedang
22	03039220	3	Rendah	7	Sedang
23	09003320	2,75	Rendah	4,75	Rendah
24	02926020	2,75	Rendah	7	Sedang
25	03623320	3	Rendah	7	Sedang

## 9. Uji validasi dan reabilitas Kuesioner MMAS-8

### a. Uji Validitas

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total
P1 Parson Correlation	1	1.000**	-.062	-.062	-.199	-.083	1.000**	.891**	.486**
Sig. (2-tailed)		.000	.745	.745	.293	.663	.000	.000	.007
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2 Parson Correlation	1.000**	1	-.062	-.062	-.199	-.083	1.000**	.891**	.486**
Sig. (2-tailed)	.000		.745	.745	.293	.663	.000	.000	.007
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P3 Parson Correlation	-.062	-.062	1	1.000**	.312	-.149	-.062	-.084	.576**
Sig. (2-tailed)	.745	.745	.000	.000	.093	.432	.745	.658	.001
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P4 Parson Correlation	-.062	-.062	1.000**	1	.312	-.149	-.062	-.084	.576**
Sig. (2-tailed)	.745	.745	.000	.000	.093	.432	.745	.658	.001
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P5 Parson Correlation	-.199	-.199	.312	.312	1	.239	-.199	-.101	.575**
Sig. (2-tailed)	.293	.293	.093	.093	.000	.203	.293	.594	.001
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P6 Parson Correlation	-.083	-.083	-.149	-.149	.239	1	-.083	.113	.337
Sig. (2-tailed)	.663	.663	.432	.432	.203	.000	.663	.552	.069
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P7 Parson Correlation	1.000**	1.000**	-.062	-.062	-.199	-.083	1	.891**	.486**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.745	.745	.293	.663	.000	.000	.007
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P8 Parson Correlation	.891**	.891**	-.084	-.084	.101	.113	.891**	1	.549**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.658	.658	.594	.552	.000	.000	.002
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Total Parson Correlation	.486**	.486**	.576**	.576**	.575**	.337	.486**	.549**	1
Sig. (2-tailed)	.007	.007	.001	.001	.001	.069	.007	.002	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* Correlation is a significant at the 0.01 level (2-tailed)

Kesimpulan: Berdasarkan hasil uji validitas semua item pertanyaan dalam kuesioner MMAS-8 dinyatakan valid karena nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0.3061)

b. Uji Reabilitas

Case processing summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion on all variables in the procedure

Reability Statistics

Crobach's Alpha	N of Items
.688	8

Kesimpulan: berdasarkan hasil uji reabilitas nilai Crobach's Alpha  $>$  0.60 maka kuesioner MMAS-8 dinyatakan realibel.

10. Output SPSS

a. Uji normalitas *Shapiro-Wilk* skor MMAS-8 responden sebelum dan setelah pemberian informasi obat.

Tujuan: mengetahui distribusi skor MMAS-8 sebelum dan setelah pemberian informasi obat

Hipotesis:

$H_0$ : skor MMAS-8 responden sebelum dan setelah pemberian informasi obat terdistribusi normal

$H_a$ : skor MMAS-8 responden sebelum dan setelah pemberian informasi obat tidak terdistribusi normal

Signifikansi : 0,05

kriteria pengujian : jika  $\text{sig} > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

: jika  $\text{sig} < 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima



## Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
MMAS-Pretest	.132	25	.200*	.950	25	.255
MMAS-Posttest	.232	25	.001	.923	25	.060

\*. This is a lower bound of the true significance.

## a. Lilliefors Significance Correction

Nilai signifikansi data  $> 0.05$  maka  $H_0$  ditolak

Kesimpulan: Skor MMAS-8 responden terdistribusi normal

## b. Uji Wilcoxon terhadap skor MMAS sebelum dan setelah pemberian informasi obat

Tujuan: mengetahui ada tidaknya perbedaan skor MMAS-8 sebelum dan setelah pemberian informasi obat

Hipotesis:

$H_0$ : tidak ada perbedaan secara bermakna skor MMAS-8 responden sebelum dan setelah pemberian informasi obat

$H_a$ : ada perbedaan secara bermakna skor MMAS-8 responden sebelum dan setelah pemberian informasi obat

Signifikansi : 0,05  
 kriteria pengujian : jika sig  $> 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak  
 : jika sig  $< 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

## Test Statistik

	Skor MMAS-8 Posttest – Skor MMAS-8 Pretest
Z	-4.298 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

## a. Based on negative ranks

Nilai signifikansi data  $0,000 < 0,05$ ; maka  $H_0$  ditolak Kesimpulan: Ada perbedaan bermakna skor MMAS-8 responden sebelum dan setelah pemberian informasi obat artinya pemberian informasi obat dapat meningkatkan kepatuhan minum obat.

c. Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan usia responden

1) Uji Normalitas *Shapiro-Wilk* skor data usia

Tujuan: mengetahui normalitas skor data usia responden

Hipotesis:

H<sub>0</sub>: skor data usia responden terdistribusi normal

H<sub>a</sub>: skor data usia responden tidak terdistribusi normal

Signifikansi : 0,05

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak

: jika sig < 0,05 ; maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig	Statistic	df	Sig
Usia	.140	25	.200*	.962	25	.465

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Nilai signifikansi 0,465 > 0.05 maka H<sub>a</sub> ditolak

Kesimpulan: Skor data usia responden terdistribusi normal

2) Uji korelasi pearson terhadap terhadap perubahan skor MMAS-8 dengan usia responden

Tujuan: mengetahui ada tidaknya hubungan antara perubahan skor MMAS-8 dengan

Usia responden

Hipotesis:

H<sub>0</sub>: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan usia responden

H<sub>a</sub>: ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan usia responden

Signifikansi : 0,05

kriteria pengujian : jika  $\text{sig} > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

: jika  $\text{sig} < 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

#### Correlation

		Skor MMAS	Usia
Skor MMAS	Pearson Correlation	1	.047
	Sig. (2-tailed)		.823
	N	25	25
Usia	Pearson Correlation	.047	1
	Sig. (2-tailed)	.823	
	N	25	25

Nilai signifikansi data  $0,823 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Kesimpulan: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan usia

d. Uji korelasi perubahan Skor MMAS-8 dengan jenis kelamin

1) Uji normalitas *Shapiro-Wilk* skor data jenis kelamin responden.

Tujuan: mengetahui normalitas skor data jenis kelamin responden

Hipotesis:

$H_0$ : skor data jenis kelamin responden terdistribusi normal

$H_a$ : skor data jenis kelamin responden tidak terdistribusi normal

Signifikansi : 0,05

kriteria pengujian : jika  $\text{sig} > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

: jika  $\text{sig} < 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

#### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Jenis Kelamin	.469	25	.000	.533	25	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Nilai signifikansi data  $0.000 < 0.05$  maka  $H_a$  diterima

Kesimpulan: Skor data jenis kelamin responden tidak terdistribusi normal

2) Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan jenis kelamin responden

Tujuan: mengetahui ada tidaknya hubungan antara perubahan skor MMAS-8 dengan jenis kelamin

Hipotesis:

$H_0$  : tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan jenis kelamin responden

$H_a$  : ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan jenis kelamin responden

Signifikansi : 0,05

Kriteria pengujian : jika  $\text{sig} > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

: jika  $\text{sig} < 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

		Correlation		
			Skor MMAS	Jenis kelamin
Spearman'S Rho	Skor MMAS	Correlation Coefficient	1.000	-.146
		Sig. (2-tailed)	.487	
		N	25	25
	Jenis Kelamin	Correlation Coefficient	-.146	1.000
		Sig. (2-tailed)	.487	
		N	25	25

Nilai signifikansi data  $0,487 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Kesimpulan: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan jenis kelamin responden

e. Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan tingkat pendidikan responden

1) Uji Normalitas *Shapiro-Wilk* skor data pendidikan responden

Tujuan: mengetahui normalitas skor data pendidikan responden

Hipotesis:

$H_0$ : data pendidikan responden terdistribusi normal

$H_a$ : data pendidikan responden tidak terdistribusi normal

Signifikansi : 0,05

Kriteria pengujian : jika  $\text{sig} > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

: jika  $\text{sig} < 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

#### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig	Statistic	df	Sig
Pendidikan	.272	25	.000	.800	25	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$  maka  $H_a$  diterima

Kesimpulan: Skor data pendidikan responden tidak terdistribusi normal

2) Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan tingkat pendidikan responden

Tujuan: mengetahui ada tidaknya hubungan antara perubahan skor MMAS-8 dengan tingkat pendidikan responden

Hipotesis:

$H_0$ : tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan tingkat pendidikan

$H_a$ : ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan tingkat pendidikan responden

Signifikansi : 0,05

Kriteria pengujian : jika  $\text{sig} > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

: jika  $\text{sig} < 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

## Correlation

			Skor MMAS	Pendidikan
Sperman's Rho	Skor MMAS	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	1.000 . 25	-.133 .528 25
	Pendidikan	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	-.133 .528 25	1.000 . 25

Nilai signifikansi data  $0,528 > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Kesimpulan:

Tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan tingkat pendidikan responden

f. Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan pekerjaan responden

1) Uji Normalitas *Shapiro-Wilk* skor data pekerjaan responden

Tujuan: mengetahui normalitas skor data pekerjaan responden

Hipotesis:

$H_0$ : data pekerjaan responden terdistribusi normal

$H_a$ : data pekerjaan responden tidak terdistribusi normal

Signifikansi : 0,05

Kriteria pengujian : jika  $\text{sig} > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

: jika  $\text{sig} < 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

## Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig	Statistic	df	Sig
Pekerjaan	.409	25	.000	.610	25	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$  maka  $H_a$  diterima

Kesimpulan: Skor data pekerjaan responden tidak terdistribusi normal

2) Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan pekerjaan responden

Tujuan: mengetahui ada tidaknya hubungan antara perubahan skor MMAS-8 dengan pekerjaan responden

Hipotesis:

H<sub>0</sub>: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan pekerjaan

H<sub>a</sub>: ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan tingkat pekerjaan

Signifikansi : 0,05

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak

: jika sig < 0,05 ; maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima

		Correlation		
			Skor MMAS	Pekerjaan
Sperman's Rho	Skor MMAS	Correlation Coefficient	1.000	.094
		Sig. (2-tailed)	.	.654
		N	25	25
	Pekerjaan	Correlation Coefficient	.094	1.000
		Sig. (2-tailed)	.654	.
		N	25	25

Nilai signifikansi data 0,654 > 0,05 ; maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak

Kesimpulan: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan pekerjaan responden

g. Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan jumlah obat yang digunakan

1) Uji Normalitas *Shapiro-Wilk* skor data jumlah obat yang digunakan responden

Tujuan: mengetahui normalitas skor data jumlah obat responden

Hipotesis:

H<sub>0</sub>: data jumlah obat responden terdistribusi normal

Ha: data jumlah obat responden tidak terdistribusi normal

Signifikansi : 0,05

Kriteria pengujian : jika  $\text{sig} > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

: jika  $\text{sig} < 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

#### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig	Statistic	df	Sig
Jumlah obat	.304	25	.000	.756	25	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$  maka  $H_a$  diterima

Kesimpulan: Skor data jumlah obat responden tidak terdistribusi normal

2) Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan jumlah obat

Tujuan: mengetahui ada tidaknya hubungan antara perubahan skor MMAS-8 dengan jumlah obat

Hipotesis:

$H_0$ : tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan jumlah obat

$H_a$ : ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan jumlah obat

Signifikansi : 0,05

Kriteria pengujian : jika  $\text{sig} > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

: jika  $\text{sig} < 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima



## Correlation

			Skor MMAS	Jumlah Obat
Sperman's Rho	Skor MMAS	Correlation Coefficient	1.000	.123
		Sig. (2-tailed)	.	.559
		N	25	25
	Jumlah Obat	Correlation Coefficient	.123	1.000
		Sig. (2-tailed)	.559	.
		N	25	25

Nilai signifikansi data  $0,559 > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Kesimpulan: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan jumlah obat

h. Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan lama pengobatan

1) Uji Normalitas *Shapiro-Wilk* skor data lama pengobatan responden

Tujuan: mengetahui normalitas skor data lama pengobatan responden

Hipotesis:

$H_0$ : data lama pengobatan responden terdistribusi normal

$H_a$ : data lama pengobatan responden tidak terdistribusi normal

Signifikansi : 0,05

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

: jika sig < 0,05 ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

## Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Lama pengobatan	.539	25	.000	.203	25	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$  maka  $H_a$  diterima

Kesimpulan: Skor data lama pengobatan responden tidak terdistribusi normal

2) Uji korelasi Skor MMAS-8 dengan lama pengobatan responden

Tujuan: mengetahui ada tidaknya hubungan antara perubahan skor MMAS-8 dengan lama pengobatan

Hipotesis:

$H_0$ : tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan lama pengobatan responden

$H_a$ : ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan lama pengobatan responden

Signifikansi : 0,05

Kriteria pengujian : jika  $\text{sig} > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

: jika  $\text{sig} < 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Correlation

		Skor MMAS	Lama Pengobatan
Sperman's Rho	Skor MMAS	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	1.000 .159 .449 25
	Lama Pengobatan	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	.159 .449 25

Nilai signifikansi data  $0,449 > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Kesimpulan: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan lama pengobatan responden

i. Uji korelasi perunahan skor MMAS-8 dengan efek samping obat yang dialami responden

1) Uji Normalitas *Shapiro-Wilk* skor data efek samping yang terjadi pada responden

Tujuan: mengetahui normalitas skor data efek samping obat responden

Hipotesis:

$H_0$ : data efek samping obat responden terdistribusi normal

$H_a$ : data efek samping obat responden tidak terdistribusi normal

Signifikansi : 0,05

Kriteria pengujian : jika  $\text{sig} > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

: jika  $\text{sig} < 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

#### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
ESO	.	25	.	.	25	.

a. Lilliefors Significance Correction

Kesimpulan: Skor data efek samping obat responden tidak diketahui apakah data terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal

2) Uji korelasi Skor MMAS-8 dengan efek samping obat responden

Tujuan: mengetahui ada tidaknya hubungan antara perubahan skor MMAS-8 dengan efek samping obat

Hipotesis:

$H_0$ : tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan efek samping obat responden

$H_a$ : ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan efek samping obat responden

Signifikansi : 0,05

Kriteria pengujian : jika  $\text{sig} > 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

: jika  $\text{sig} < 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

## Correlation

			Skor MMAS	Pekerjaan
Sperman's Rho	Skor MMAS	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	1.000 . 25	. . 25
	ESO	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	. . 25	1.000 . 25

Nilai signifikansi data tidak diketahui

Kesimpulan: tidak diketahui apakah ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan efek samping responden Karena pasien tidak mengalami ESO dan data ESO konstan

- j. Uji regresi linear faktor perancu terhadap perubahan skor MMAS-8 sebelum dan setelah pemberian informasi obat

Tujuan: mengetahui ada dan tidaknya pengaruh berbagai faktor perancu terhadap skor MMAS-8 sebelum dan setelah pemberian informasi obat

Hipotesis:

Ho: tidak ada pengaruh berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama pengobatan, jumlah obat, dan efek samping obat terhadap skor MMAS-8

Ha: ada pengaruh berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama pengobatan, jumlah obat, dan efek samping obat terhadap skor MMAS-8

Signifikansi : 0,05

Kriteria pengujian : jika  $\text{sig} > 0,05$  ; maka Ho diterima dan Ha ditolak

: jika  $\text{sig} < 0,05$  ; maka Ho ditolak dan Ha diterima

atau :  $F_{\text{tabel}} > F_{\text{hitung}}$  ; maka Ho diterima dan Ha ditolak

$F_{\text{tabel}} > F_{\text{hitung}}$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

#### Model summary

Model	R	R square	Adjusted R square	Std. error of the estimate	Durbin Watson
1	.406 <sup>a</sup>	.164	-.114	1.39418	2.124

a. Predictor: (constant), LPO, usia, pekerjaan, jumlah obat, jenis kelamin, pendidikan  
Anova

Model		Sum of squares	df	Mean square	F	Sig.
1	Regression	6.887	6	1.148	.591	.734 <sup>b</sup>
	Residual	34.988	18	1.944		
	Total	41.875	24			

a. Dependent variable: Skor MMAS-8

b. Predictor (constant), LPO, usia, pekerjaan, jumlah obat, jenis kelamin, pendidikan

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
Usia	.005	.035	.035	.146	.886
Jenis Kelamin	.548	.916	.181	.598	.557
Pendidikan	-.937	.629	-.488	-1.490	.153
Pekerjaan	1.166	.902	.433	1.293	.212
Jumlah Obat	.153	.485	.075	.314	.757
LPO	1.368	.951	.414	1.438	.168
ESO	-.893	5.234	-	-.171	.866

a. Dependent variable: skor MMAS

Nilai signifikan  $0,734 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

$F_{\text{tabel}} 2,62 > F_{\text{hitung}} 0,591$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Kesimpulan: tidak ada pengaruh berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama pengobatan, jumlah obat, dan efek samping obat terhadap skor MMAS-8

11. Gambar Penelitian



Lokasi Penelitian



Instalasi Rawat Jalan



Pemberian informasi Obat



Pengisian Lembar Pengumpulan Data



Pagawai PKM Danga



Pengumpulan Data

### RIWAYAT HIDUP



Nurjanna adalah Nama Lengkapnya, akrab di sapa dengan Jannah, Anak pertama dari tiga bersaudara bersaudara, buah hati pasangan Abubakar Talang, S.Pd dan Kadaria, lahir di Nabire, tanggal 2 Mei 1994. Bertempat tinggal di Jln Anton Bhia Wea, Kel. Danga, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Putri sulung ini sangat menyukai warna ungu dan mempunyai hoby traveling ke tempat-tempat wisata diberbagai kota.

Jenjang pendidikan dimulai pada tahun 2000 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mbay hingga tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikannya di MTS Negeri Mbay, hingga akhirnya tahun 2009 meneruskan lagi ke salah satu sekolah favorit di kota Mbay yaitu MAN Mbay. Setelah itu melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.