

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
DENGAN HIPERTENSI GESTASIONAL**
(Literatur Review)



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan
Pendidikan Program Ahli Madya Kebidanan Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

PUTRI OKTAVIA
NIM : 70400116060

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

HALAMA PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Oktavia
Nim : 70400116060
Tempat/Tanggal Lahir : kabaena, 16 Oktober 1998
Jurusan/Prodi : D3 Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul : “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Hipertensi Gestasional (Literatur Review)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya tulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa 2021
Penyusun

Putri Oktavia
70400116060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH
(LITERATUR REVIEW)**

Nama : Putri Oktavia

Nim : 70400116060

Judul : Manajemen asuhan kebidanan antenatal dengan Hipertensi gestasional

Karya Tulis Ilmiah (literatur review) ini telah disetujui untuk dianjurkan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Samata-Gowa, 03 Agustus 2021

Pembimbing I



Firdayanti, S.S(T., M.Keb
Nip: 1975 1 113200604 2 001

Pembimbing II



dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes
Nip: 1981 10621 200604 2 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Hipertensi Gestasional” yang disusun oleh Putri Oktavia Nim: 70400116060 Mahasiswi Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari senin 16 Agustus 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 16 Agustus 2021
07 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|-------------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes | (.....) |
| Sekretaris | : Zelna yuni andryani.A S.ST.,M.Keb | (.....) |
| Pembimbing I | : Firdayanti, S.SiT., M.Keb | (.....) |
| Pembimbing II | : dr. hj. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes | (.....) |
| Penguji I | : Anieq Mumthiah Al Kautzar, S.ST., M.Keb | (.....) |
| Penguji II | : Prof. Dr. Kasim Salenda, M.Ag | (.....) |

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Berkat ridho dan hidayah-Nya karya tulis ilmiah yang berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Hipertensi Gestasional (Literatur review)**” dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di jurusan kebidanan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kriteria, serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Kasih Sayang dan penghormatan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayahanda Haliruddin dan ibunda Hj. Rajawati yang telah memberikan begitu banyak do'a, kasih sayang, perhatian, bimbingan dan pelajaran hidup yang begitu besar untuk saya dan juga kepada kedua kakak perempuan saya tercinta samsurya dan samsidar yang telah memberikan dukungan moral, material selama masa studi, serta kepada semua keluarga yang telah mendoakan dan member semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penyusun Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Drs. Hamdan johannis, M.A, Ph.D.

2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Dr. dr. syatirah jalaluddin, M.Kes., Sp.A
3. Ibunda Firdayanti, S.SiT., M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan waktunya demi membimbing, memberikan semangat serta saran dan arahan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini (literatur review).
4. Ibunda Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, SpOG, M.Kes selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran yang membangun dan semangat sehingga lebih giat dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini (literatur review)
5. Ibunda Anieq mumthiah Al Kautzar, S.ST., M.Keb selaku penguji I yang telah memberika masukan dan dukungan dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini (literatur review).
6. Ayahanda Prof. Dr. Kasim Salenda, M.Ag selaku penguji II (penguji agama)Yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini (literatur review)
7. Para dosen jurusan kebidnan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama studi.
8. Direktur dan petugas kesehatan Rumah sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa yang telah memberikan izin serta membantu menulis pengambila data kasus yang dilakukan.
9. Kepada semua teman-teman kebidanan angkatan 2016 terkhusus Aisyah Maulida serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal baik di sisi Allah SW

Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ilmiah (literature review) ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagian kesehatan.

Samata-Gowa, 03 Agustus 2021

Penulis,



PUTRIOKTAVIA

Nim: 70400116060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI..... | ii |
| PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH..... | iii |
| PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| ABSTRAK..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Ruang Lingkup..... | 5 |
| C. Tujuan Penulisan..... | 5 |
| D. Manfaat Penulisan..... | 6 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Tinjauan Umum Hipertensi Gestasional..... | 9 |
| 1. Pengertian kehamilan..... | 9 |
| 2. Nutrisi dalam kehamilan..... | 15 |
| B. Tinjauan Khusus Tentang Hipertensi Gestasional..... | 17 |
| 1. Pengertian Kehamilan..... | 17 |
| 2. Etiologi..... | 18 |
| 3. Faktor Resiko..... | 18 |
| 4. Manifestasi klinis..... | 21 |
| 5. Patofisiologi..... | 22 |
| 6. Diagnosis hipertensi gestasional..... | 29 |
| 7. Penatalaksanaan..... | 29 |
| C. Tinjauan kehamilan dengan penyakit dalam pandangan Islam..... | 31 |
| D. Tinjauan Manajemen Asuhan Kebidanan..... | 34 |
| 1. Pengertian..... | 34 |
| 2. Pendokumentasian dalam bentuk Soap..... | 40 |
| BAB III TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING..... | 42 |
| A. Langkah I. Identifikasi Data dasar..... | 42 |
| B. Langkah II. Identifikasi diagnosa/Masalah aktual..... | 49 |
| C. Langkah III. Identifikasi diagnosa/Masalah potensial..... | 55 |

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| D. Langkah IV. Tindakan segera/kolaborasi | 63 |
| E. Langkah V. Rencana Tindakan | 71 |
| F. Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan | 81 |
| G. Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan | 88 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 96 |
| A. Identifikasi data dasar | 96 |
| B. Identifikasi diagnosa/Masalah aktual | 101 |
| C. Identifikasi diagnosa/Masalah potensial | 102 |
| D. Tindakan segera/kolaborasi | 102 |
| E. Rencana Tindakan | 103 |
| F. Implementasi Asuhan Kebidanan | 104 |
| G. Evaluasi Asuhan Kebidanan | 105 |
| BAB V PENUTUP | 108 |
| A. Kesimpulan | 108 |
| B. Saran | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | 111 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
LITERATUR REVIEW, AGUSTUS 2020

Nama : Putri Oktavia
NIM : 70400116060
Pembimbing 1 : Firdayanti
Pembimbing 2 : Dewi Setiawati
Judul : **Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care dengan Hipertensi Gestasional (Literatur review)**

Hipertensi dalam kehamilan merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering muncul selama kehamilan dan dapat menimbulkan komplikasi pada 2-3% kehamilan. Penyebab langsung kematian ibu disebabkan oleh perdarahan (28%), preeklampsia (24%), infeksi (11%), komplikasi (8%), partus lama (5%), trauma obstetrik (5%), emboli obstetric (3%).

Karya Tulis Ilmiah ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan pengumpulan referensi yang kemudian dibuat menjadi Literatur Review dengan menggunakan metode asuhan 7 langkah varney.

Berdasarkan dari banyaknya referensi yang saya dapatkan tanda dan gejala hipertensi gestasional terdapat tekanan darah 160/100 mmHg pada trimester II dan merasa pusing. Diagnosa ditegakkan pada ibu yang memiliki tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih untuk pertama kalinya pada masa kehamilan tidak disertai protein urin. Komplikasi yang akan terjadi jika tidak segera di tangani yakni preeklampsia, eklampsia, gagal ginjal, kelahiran prematur, solusio plasenta, dan kematian janin dalam rahim. Melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan urin agar dapat mendeteksi gejala-gejala komplikasi sedini mungkin. Asuhan yang diberikan pada pasien yang mengalami hipertensi gestasional yaitu dengan mengurangi aktivitas berat, istirahat yang cukup dan untuk pengobatan farmakologi dapat digunakan metildopa atau nefidipin.

Kesimpulan dari Literature Review ini berdasarkan dari berbagai referensi yang di dapatkan yaitu melakukan penatalaksanaan dapat di mulai dengan istirahat yang cukup, mengurangi aktivitas yang berat, memperhatikan tekanan darah, mengatur pola makan yang baik, peyuluhan tanda bahaya selama kehamilan, memberikan obat antihipertensi agar tidak terjadi komplikasi hipertensi gestasional.

Kata kunci : kehamilan, hipertensi gestasional, 7 lagkah varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
LITERATURE REVIEW, AUGUST 2020

Name : Putri Oktavia
Reg. Number : 70400116060
Supervisor 1 : Firdayanti
Supervisor 2 : Dewi Setiawati
Title : **The Antenatal Midwifery Care Management with A Gestational Hypertension (A Literature Review)**

Hypertension in pregnancy has been one of the main health problems that often occurs during pregnancy. Hypertension was evident to cause complications in 2-3% of pregnancies. Moreover, the occurrences of hypertension during pregnancy are not even impossible to cause maternal deaths. Among those maternal deaths, they were mainly because of bleeding (28%), preeclampsia (24%), infection (11%), complications (8%), prolonged labor (5%), obstetric trauma (5%), and obstetric embolism (3%).

The methodological approach used in this study was a literature review. In this research, 64 related references were carefully analysed to conduct a literature review research related to hypertension in pregnancy. The research was to be based on 7 stages of Varney management approach.

Based on the research data analysis, it was suggested that the signs and symptoms of the gestational hypertension was the blood pressure of 160/100 mmHg at tge week 20 of pregnancy. Moreover, the pregnant woman also commonly felt nausea and dizzy without the urine protein. Moreover, it was also evident that the complications that generally occur in pregnancy were preeclampsia, eclampsia, renal failure, premature birth, placental abruption, and intrauterine fetal death. Therefore, the care and treatments given to patients with gestational hypertension were in the forms of reducing strenuous activity, suggesting adequate rest, and administering methyldopa or nefidipine for the pharmacological treatment,

This research concluded that the procedures of treatments given to pregnant patients with hypertension have varied, such as suggesting an adequate rest, reducing strenuous activities, paying particular attention to their blood pressure, regulating a good diet, educating them about the danger signs during pregnancy, and administering antihypertensive drugs. By doing all those treatments, it is expected that any complications in the gestational hypertension will not occur.

Key words: pregnancy, gestational hypertension, 7-stages of Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar belakang*

Kehamilan merupakan penyatuan antara spermatozoa dan juga ovum kemudian dilanjutkan dengan terjadinya nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari fase fertilisasi hingga lahirnya bayi maka kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terdiri dari tiga trimester yakni trimester I berlangsung selama 13 minggu, trimester II 14 – 27 minggu dan trimester III dari 28 hingga ke 40 minggu (Manuaba, 2013).

Kehamilan merupakan suatu keadaan fisiologis, tetapi ada beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kehamilan beresiko, diawali dari hasil bertemunya sperma dan ovum yang tidak menempel dengan sempurna ke rahim, kemungkinan pertumbuhan janin yang terhambat, berbagai penyakit ibu yang mengancam kehamilan, hingga proses kelahiran yang juga mempunyai resiko tersendiri. Salah satu penyakit yang sering mengancam kehamilan adalah hipertensi dalam kehamilan. Penyebab langsung kematian ibu disebabkan oleh perdarahan (28%), preeklampsia (24%), infeksi (11%), komplikasi (8%), partus lama (5%), trauma obstetrik (5%), emboli obstetrik (3%) (Nelawati Radjamuda, 2014).

Hipertensi dalam kehamilan merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering muncul selama kehamilan dan dapat menimbulkan komplikasi pada 2–3% kehamilan. Kejadian hipertensi pada kehamilan sekitar 5-5%, dan

merupakan satu di antara 3 penyebab morbiditas dan mortalitas ibu bersalin di samping infeksi dan perdarahan. Frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan juga meningkat pada ibu hamil yang mengalami hipertensi. Dampak dari hipertensi kehamilan lebih lanjut antara lain risiko kematian maternal, angka prematuritas, berat badan bayi lahir rendah, dan angka kematian perinatal meningkat (Cory, dkk, 2016: 69).

Peningkatan angka kematian perinatal dan ibu jika hipertensi dalam kehamilan tidak segera ditangani. Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5- 15 % penyulit kehamilan dan cukup tinggi. Hal ini disebabkan selain oleh etiologi tidak jelas, juga oleh perawatan dalam persalinan yang masih ditangani oleh petugas non medik dan sistem rujukan yang belum sempurna. Hipertensi dalam kehamilan dapat dialami oleh semua kalangan ibu hamil baik itu yang primigravida maupun yang multiparitas sehingga pengetahuan tentang pengelolaan hipertensi dalam kehamilan harus benar-benar dipahami oleh semua tenaga medik baik di pusat maupun di daerah (Uli, dkk, 2017: 18).

Tenaga medic pusat maupun daerah harus memahami betul manajemen Asuhan Kebidanan sehingga dapat mencegah berbagai macam masalah dalam kehamilan seperti kematian pada ibu. Menurut data *World health organization* (WHO) pada tahun 2018 banyak wanita yang menderita dan meninggal karena masalah serius selama kehamilan dan persalinan. Pada 2015, diperkirakan 303.000 wanita diseluruh dunia meninggal karena komplikasi dalam kehamilan.

Hampir semua kematian ini (99%) terjadi di dataran rendah negara berpenghasilan menengah. Untuk mengurangi kematian ibu dilakukan perawatan berkualitas sebelum, selama dan setelah melahirkan. WHO merekomendasikan wanita hamil itu memulai kontak perawatan antenatal pertama pada trimester pertama kehamilan. Perawatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini kondisi yang mungkin berdampak buruk pada kehamilan yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian (WHO, 2018).

Kematian ibu di Indonesia didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan infeksi. Namun proporsinya telah berubah, dimana perdarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan sedangkan hipertensi dalam kehamilan proporsinya semakin meningkat. Lebih dari 25% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2013 disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan (Uli, dkk, 2017: 9).

Hipertensi dalam kehamilan merupakan salah satu tanda dari penyakit hipertensi gestasional. Di Indonesia kematian ibu pernah menduduki peringkat pertama disebabkan oleh hipertensi gestasional 30% dan komplikasi/perdarahan yaitu 31%. Hipertensi pada kehamilan masih merupakan penyebab utama kematian maternal dan perinatal terutama di Negara berkembang diperkirakan 15-40% kematian maternal berhubungan langsung dengan hipertensi pada kehamilan dan sampai 30% janin meninggal khususnya eklampsia (Ardhiyanti, 2018:59)

Eklampsia merupakan salah satu penyumbang angka kematian ibu di tahun 2017 berkurang 41 kasus, dibanding dengan tahun 2016. Penurunannya

sebesar 26 persen dan pada tahun 2018 tercatat jumlah kematian ibu di provinsi Sulawesi Selatan mencapai 115 kasus. Kasus tersebut dijumpai di Rumah Sakit Umum dengan presentase 79,13% atau sebanyak 91 kasus. Kemudian terjadi di rumah dengan 9 kasus atau sekitar 7,83%, lalu ditemukan di puskesmas dengan 7 kasus atau 6,08%, di jalan 5 kasus atau 4,35%, dipustu 2 kasus atau 1,74% dan rumah bersalin 1 kasus atau 0,87%. Salah satu penyebab kematian ibu di Sul-Sel disebabkan oleh hipertensi gestasional (Dinkes Sul-Sel, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari salah satu rumah sakit rujukan yaitu RSUD Syekh Yusuf Gowa mengenai kasus hipertensi gestasional di dapatkan data yang diperoleh dari ruangan rekam medik RSUD Syekh Yusuf Gowa, menunjukkan jumlah kasus hipertensi gestasional tahun 2018 sebanyak 21% dan tahun 2019 terdapat 25% kasus hipertensi gestasional (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf Gowa 2019).

Berdasarkan uraian data diatas, maka penulis tertarik mengangkat kasus hipertensi gestasional, sehingga penulis menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Dengan Hipertensi Gestasional”.

B. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan literature review ini adalah manajemen kasus dengan Judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Dengan Hipertensi Gestasional”

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan literatur review asuhan pada remaja dengan pernikahan dini sebagai berikut:

- a. Didapatnya informasi dari berbagai sumber mengenai data subjektif dan data objektif terkait faktor dan gejala terjadinya hipertensi gestasional.
- b. Didapatnya informasi dari berbagai sumber mengenai diagnosis hipertensi gestasional.
- c. Didapatnya informasi dari berbagai sumber mengenai komplikasi yang bisa timbul pada ibu dengan hipertensi gestasional.
- d. Didapatnya informasi dari berbagai sumber mengenai kondisi emergensi yang dapat terjadi serta penanganan pada ibu dengan hipertensi gestasional.
- e. Didapatnya informasi dari berbagai sumber mengenai simpulan dari berbagai sumber tentang intervensi apa saja / penatalaksanaan yang tepat pada ibu dengan hipertensi gestasional
- f. Didapatnya informasi dari berbagai sumber mengenai penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke implementasi asuhan pada ibu dengan hipertensi gestasional

- g. Didapatnya informasi dari berbagai sumber mengenai penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber yang menjadi dasar evaluasi pada ibu dengan hipertensi gestasional

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan literatur review sebagai berikut:

1. Manfaat institusi

Sebagai bahan pembelajaran dan sumber pengetahuan untuk penulis berikutnya

2. Manfaat bagi penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ibu dengan hipertensi gestasional berdasarkan *Avoidance Based*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam literatur review ini sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

HALAMAN PERSETUJUAN

KARYA TULIS ILMIAH

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR ISTILAH

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penulisan
- E. Metode Penulisan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan
- B. Tinjauan Khusus Tentang Hipertensi Gestasional
- C. Standar Pelayanan Kebidanan
- D. Manajemen Kebidanan Asuhan Kebidanan

BAB III TELUSURAN *EVIDANCE BASED LEARNING*

- A. Matriks Langkah I
- B. Matriks Langkah II
- C. Matriks Langkah III
- D. Matriks Langkah IV
- E. Matriks Langkah V
- F. Matriks Langkah IV

G. Matriks Langkah VII

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telah Evidance Based Asuhan 7 langkah

Varney Berdasarkan Hasil penelusuran Referensi

B. Implikasi Kebidanan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Kehamilan

a. Pengertian

Kehamilan merupakan penyatuan antara spermatozoa dan juga ovum kemudian dilanjutkan dengan terjadinya nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari fase fertilisasi hingga lahirnya bayi maka kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terdiri dari tiga trimester yakni trimester I berlangsung selama 13 minggu, trimester II 14 – 27 minggu dan trimester III dari 28 hingga ke 40 minggu (Manuaba, 2013).

Untuk dapat menegakkan kehamilan ditetapkan dengan melakukan penilaian terhadap beberapa tanda dan gejala kehamilan. Tanda dan gejala kehamilan dapat dibagi dalam 3 bagian yakni :

1) Tanda dugaan hamil

a. Amenorea (berhentinya menstruasi)

Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan folikel degraaf dan ovulasi sehingga menstruasi tidak terjadi.

Lamanya amenorea dapat diinformasikan dengan memastikan hari pertama haid terakhir (HPHT), dan di gunakan untuk memperkirakan usia kehamilan dan tafsiran persalinan. Tetapi, amenorea juga dapat disebabkan oleh penyakit kronik tertentu,

tumor pituitari, perubahan dan faktor, lingkungan, malnutrisi, dan biasanya gangguan emosional seperti ketakutan akan kehamilan.

b. Mual (nausea) dan muntah (emesis)

Pengaruh ekstrogen dan progesteron terjadi pengeluaran asam lambung yang berlebihan dan menimbulkan mual muntah yang terjadi terutama pada pagi hari yang disebut morning sickness. Dalam batas tertentu hal ini masih fisiologis, tetapi bila terlampaui sering dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang disebut dengan hiperemesis gravidarum.

c. Ngidam (menginginkan makanan tertentu)

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, keinginan yang demikian disebut ngidam. Ngidam sering terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan dan akan menghilang dengan tuanya kehamilan.

d. Syncope (pingsan)

Terjadinya gangguan sirkulasi kedaerah kepala (sentral) menyebabkan iskemia susunan saraf pusat dan menimbulkan syncope atau pingsan. Hal ini sering terjadi terutama jika berada pada tempat yang ramai, biasanya akan hilang setelah 16 minggu.

e. Kelelahan

Sering terjadi pada trimester pertama, akibat dari penurunan kecepatan basal metabolisme (basal metabolisme rate-BMR) pada

kehamilan yang akan meningkat seiring pertambahan usia kehamilan akibat aktivitas metabolisme hasil konsepsi.

f. Payudara tegang

Estrogen meningkatkan perkembangan sistem duktus pada payudara, sedangkan progesterone menstimulasi perkembangan sistem alveolar payudara. Bersama somatomotropin, hormon-hormon ini menimbulkan pembesaran payudara, menimbulkan perasaan tegang dan nyeri selama dua bulan pertama kehamilan, pelebaran puting susu, serta pengeluaran kolostrum.

g. Sering miksi

Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih cepat terasa penuh dan sering miksi. Frekuensi miksi yang sering, terjadi pada triwulan pertama akibat desakan uterus ke kandung kemih. Pada triwulan kedua umumnya keluhan ini akan berkurang karena uterus yang membesar keluar dari rongga panggul. Pada akhir triwulan, gejala bisa timbul karena janin mulai masuk ke rongga panggul dan menekan kembali kandung kemih.

h. Konstipasi atau obstipasi

Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik usus (tonus otot menurun) sehingga kesulitan untuk BAB.

i. Pigmentasi kulit

Pigmentasi terjadi pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu.

Terjadi akibat pengaruh hormone kortikosteroid plasenta yang

merangsang melanofor dan kulit. Pigmentasi ini meliputi sekitar pipi cloasma gravidarum (penghitaman pada daerah dahi, hidung, pipi, dan leher), sekitar leher tampak lebih hitam, dinding perut striae livide/gravidarum (terdapat pada seorang primigravida, warnanya membiru) striae nigra dan linea alba menjadi lebih hitam (linea grisea/nigra), sekitar payudara hiperpigmentasi aerola mammae sehingga terbentuk areola sekunder, sekitar pantat dan paha atas terdapat striae akibat pembesaran bagian tersebut.

j. Epulis

Hipertropi papilla gingivae/gusi, sering terjadi pada triwulan pertama.

k. Varises

Pengaruh estrogen dan progesteron menyebabkan pelebaran pembuluh darah terutama bagi wanita yang mempunyai bakat. Varises dapat terjadi disekitar genitalia eksterna, kaki dan betis, serta payudara. Penampakan pembuluh darah ini dapat hilang setelah persalinan.

2) Tanda kemungkinan (probability sign)

Tanda kemungkinan adalah perubahan-perubahan fisiologis yang dapat diketahui oleh pemeriksa dengan melakukan pemeriksaan fisik kepada wanita hamil. Tanda kemungkinan ini terdiri atas hal-hal berikut ini:

a. Pembesaran perut

Terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi pada bulan keempat kehamilan.

b. Tanda hegar

Tanda hegar adalah pelunakan dan dapat ditekannya isthimus uteri.

c. Tanda goodel

Tanda goodel adalah pelunakan serviks. Pada wanita yang tidak hamil serviks seperti ujung hidung, sedangkan pada wanita hamil melunak seperti bibir.

d. Tanda Chadwick

Perubahan warna menjadi keunguan pada vulva dan mukosa vagina termasuk juga porsio dan serviks.

e. Tanda piscaseck

Merupakan pembesaran uterus yang tidak simetris. Terjadi karena ovum berimplantasi pada daerah dekat dengan kornu sehingga daerah tersebut berkembang lebih dulu.

f. Kontraksi Braxton hicks

Merupakan peregangan sel-sel otot uterus, akibat meningkatnya actomysin didalam otot uterus. Kontraksi ini tidak bermitrik, sporadis, tidak nyeri, biasanya timbul pada kehamilan delapan minggu, tetapi baru dapat diamati dari pemeriksaan abdominal pada trimester ketiga. Kontraksi ini akan terus meningkat

frekuensinya, lamanya dan kekuatannya sampai mendekati persalinan.

g. Teraba ballottement

Ketukan yang mendadak pada uterus menyebabkan janin bergerak dalam cairan ketuban yang dapat dirasakan oleh tangan pemeriksa. Hal ini harus ada pada pemeriksaan kehamilan karena perabaan bagian seperti bentuk janin saja tidak cukup karena dapat saja merupakan myoma uteri.

h. Pemeriksaan tes biologis kehamilan (plano test) positif

Pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya human chorionic gonadotropin (HCG) yang diproduksi oleh sinsiotropoblastik sel selama kehamilan. Hormon dieksresi ini peredaran darah ibu (pada plasma darah), dan dieksresi pada urine ibu. Hormon ini dapat mulai dideteksi pada 26 hari setelah konsepsi dan meningkat dengan cepat pada hari ke 30-60.

Tingkat tertinggi pada hari 60-70 usia gestasi, kemudian menurun pada hari ke 100-300.

3) Tanda pasti (positive sign)

Tanda pasti adalah tanda yang menunjukkan langsung keberadaan janin, yang dapat dilihat langsung oleh pemeriksa. Tanda pasti kehamilan terdiri atas hal-hal berikut ini :

a. Gerakan janin dalam rahim

Gerakan janin ini harus dapat diraba dengan jelas oleh pemeriksa. Gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia kehamilan sekitar 20 minggu.

b. Denyut jantung janin

Dapat didengar dengan pada usia 12 minggu dengan menggunakan alat fetal electrocardiograf (misalnya dopler). Dengan stethoscope lenec, DJJ baru dapat didengar pada usia kehamilan 18-20 minggu.

c. Bagian-bagian janin

Bagian-bagian janin yaitu bagian besar janin (kepala dan bokong) serta bagian kecil janin (lengan dan kaki) dapat diraba dengan jelas pada usia kehamilan lebih tua (trimester terakhir). Bagian janin ini dapat dilihat lebih sempurna lagi menggunakan USG.

d. Kerangka janin

Kerangka janin dapat dilihat dengan foto rontgen maupun USG (Walyani, 2013: 84).

2. Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil Trimester I, II, III

Sangat penting untuk memperhatikan kebutuhan nutrisi seorang ibu hamil. Karena makanan yang dikonsumsi ibu bukanlah untuk ibu sendiri tetapi juga untuk sang jabang bayi. Sehingga ibu wajib memperhatikan kebutuhan nutrisinya. Kebutuhan nutrisi ibu hamil trimester I, II, III

berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Berikut ini merupakan informasi kebutuhan nutrisi ibu hamil yang sering di kaitkan dengan hipertensi.

1. Lemak

Lemak dapat membantu tubuh untuk menyerap banyak nutrisi. Lemak juga menghasilkan energi dan menghemat protein untuk dimanfaatkan dalam fungsi-fungsi pertumbuhan. Namun demikian, dalam keadaan hamil sekalipun ibu hamil harus membatasi asupan lemak karena kebiasaan makan-makanan berlemak sering dihubungkan dengan tekanan darah karena mengonsumsi lemak berlebih dapat memicu penebalan pada dinding arteri (*ateroklerosis*) yang merupakan faktor penyebab terjadinya hipertensi. Makanan yang tinggi lemak antara lain daging berlemak, susu, keju, mentega, margarin dan minyak.

2. Garam

Garam dapat membantu mengatur air dalam darah. Kebutuhan tubuh akan garam sedikit, sekitar 2000 hingga 8000 mg perhari. Beberapa ibu terkena tekanan darah tinggi karena mengonsumsi garam berlebih yang menyebabkan sirkulasi darah terganggu sehingga jantung akan bekerja lebih kuat dan akhirnya tekanan darah seseorang akan tinggi (Corry, dkk, 2016).

3. Kolesterol

Kolesterol memang diperlukan oleh tubuh kita, namun bila di konsumsi berlebihan akan mendatangkan gangguan kesehatan seperti terjadinya penyumbatan darah sehingga jantung akan bekerja lebih kuat

dalam memompa darah. Ada pun makanan yang tinggi kolesterol antara lain hati sapi, lobster, daging merah, ayam goreng, kentang goreng, dan kuning telur (Sukfitrianty, dkk, 2016).

B. Tinjauan Khusus Tentang Hipertensi Gestasional.

1. Pengertian

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa disertai protein urin dan hipertensi menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan atau kehamilan dengan tanda-tanda preeklampsia tetapi tanpa protein urin (Prawirohardjo, 2014).

Hipertensi gestasional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hipertensi yang baru terjadi di trimester kedua kehamilan yang pulih di periode postnatal (Robson, 2011: 32).

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang direklarifikasi sebagai transient jika bukti untuk preeklampsia tidak muncul dan tekanan darah kembali normal setelah 12 minggu postpartum. Diagnosis hipertensi gestasional jika didapatkan tekanan darah sistolik 140 atau diastolic 90 mmHg untuk pertama kalinya pada kehamilan di atas 20 minggu, tidak ada proteinuria, tekanan darah kembali normal sebelum 12 minggu postpartum dan diagnosis di buat pada postpartum (Setiawati, 2013).

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang di alami oleh ibu hamil yang memiliki tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih untuk pertama kalinya pada masa kehamilannya namun tidak di temukan protein urin. Hipertensi gestasional ini juga biasa di sebut dengan hipertensi

transient bila tidak berkembang menjadi preeklamsia dan tekan darah kembali normal setelah 12 minggu post-partum (Elya et al., 2016)

2. Etiologi

Terdapat banyak faktor risiko untuk terjadi hipertensi gestasional yang dapat dikelompokkan dalam faktor risiko sebagai berikut :

- 1) Primigravida
- 2) Hiperplasentosis, misalnya, mola hidatidosa, kehamilan multiple, diabetes melitus, hidrops fetalis, bayi besar.
- 3) Umur yang ekstrim
- 4) Riwayat keluarga yang pernah mengalami preeklamsia dan eklamsia
- 5) Penyakit ginjal
- 6) Obesitas (Jumaiza, Dkk, 2019).

3. Faktor Risiko

Terdapat banyak faktor risiko untuk terjadi hipertensi gestasional yang dapat dikelompokkan dalam faktor risiko sebagai berikut :

1) Primigravida

Ibu hamil yang masuk dalam primigravida dianggap sebagai salah satu faktor risiko untuk mengalami hipertensi gestasional menurut teori yang mengatakan bahwa angka kejadian untuk primigravida, muda maupun tua lebih tinggi. Adapun teori intoleransi imunologik yang menjelaskan hal tersebut bahwa dugaan faktor imunologik berperan terhadap terjadinya hipertensi gestasional terbukti dengan fakta bahwa primigravida mempunyai risiko lebih besar terjadinya hipertensi

gestasional jika dibandingkan dengan multigravida. Hal ini karena adanya respons imun menolak adanya hasil konsepsi yang bersifat asing. Sehingga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya hipertensi gestasional (Jumaiza, dkk, 2019).

2) Hiperplasentosis

Pada kehamilan normal plasenta juga melepaskan debris trofoblas sebagai sisa-sisa proses apoptosis trofoblas, akibat reaksi stres oksidatif. Berbeda dengan proses apoptosis pada hipertensi gestasional, dimana pada hipertensi gestasional terjadi peningkatan stres oksidatif, sehingga produksi debris apoptosis juga meningkat. Makin banyak sel trofoblas plasenta misalnya molahidatidosa, kehamilan multipl, diabetes melitus, hidrops fetalis, bayi besar, maka stres oksidatif akan sangat meningkat, sehingga jumlah sisa debris trofoblas juga makin meningkat sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala hipertensi gestasional (Prawirohardjo, 2014).

3) Umur yang ekstrim

Faktor usia berpengaruh terhadap kemampuan rahim untuk menerima bakal janin. Pada usia di atas 35 tahun, organ reproduksi sudah mengalami penurunan fungsi, jaringan rongga panggul dan otot-ototnya sudah melemah sejalan dengan pertambahan usia. Hal ini membuat rongga panggul dan otot-ototnya sudah melemah sejalan dengan pertambahan usia. Hal ini membuat rongga panggul tidak mudah lagi menghadapi dan mengatasi komplikasi yang berat sehingga usia di atas 35 tahun beresiko

mengalami partus lama. Selain partus lama usia di atas 35 tahun dapat menyebabkan hipertensi, sedangkan pada umur di bawah 20 tahun, rahim dan panggul belum tumbuh mencapai ukuran dewasa, akibatnya ibu bisa terjadi komplikasi seperti hipertensi (Nadyah, 2013).

Dengan bertambahnya umur, resiko terkena hipertensi menjadi lebih besar sehingga prevalensi hipertensi dikalangan usia lanjut cukup tinggi. Tingginya hipertensi sejalan dengan bertambahnya umur, hal ini disebabkan oleh perubahan struktur pada pembuluh darah menjadi lebih kaku, sebagai akibat adalah meningkatnya tekanan darah sistolik (Sukfitrianty, dkk, 2016).

4) Riwayat keluarga yang pernah mengalami preeklampsia dan eklampsia

Hipertensi seperti banyak kondisi kesehatan lain, terjadi dalam keluarga. Jika salah satu (dua orang dari) orang tua atau saudara kandung menderita hipertensi maka peluang untuk terjadinya hipertensi sangat besar. Penelitian menunjukkan bahwa 25% dari kasus hipertensi esensial dalam keluarga mempunyai dasar genetik. Namun demikian, hal ini tidak berarti sesuatu yang pasti. Beberapa kesamaan yang tampak pada banyak keluarga justru mungkin merupakan dampak pengaruh lingkungan, pola makan dan keterampilan dalam menghadapi masalah (Casey, 2010).

5) Penyakit Ginjal

Hipertensi dalam kehamilan mengakibatkan perubahan pada beberapa organ tidak terkecuali pada organ ginjal. Secara umum hipertensi dalam kehamilan menyebabkan terganggunya fungsi ginjal baik prerenal

ataupun direnal. Pada hipertensi dalam kehamilan terjadi vasokonstriksi, yang mengakibatkan terjadinya penurunan aliran darah ke ginjal, sehingga *Laju Filtrasi Glomerulus* (LFG) menurun dan laju ekskresi kreatinin dan urea juga menurun. Selain itu, pada bagian renal terjadi perubahan parenkim ginjal, mengalami pembesaran glomerulus yang diikuti dengan pembengkakan sel endotel dan hilangnya fenestra endotel glomerulus. Kedua hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya akumulasi kreatin dan urea dalam cairan tubuh dan meningkatkan konsentrasinya dalam plasma (Casey, 2010).

6) Obesitas

Kelebihan berat badan (obesitas) dan hipertensi sering beriringan, karena kenaikan berat badan pada ibu hamil melebihi 10-15 kg berat badan normal akan membuat jantung bekerja lebih keras. Obesitas akan membawa resiko penyakit yang lain seperti preeklampsia, diabetes gestasional, dan hipertensi gestasional. Obesitas yang terjadi pada saat kehamilan beresiko tinggi mempunyai peluang 5.140 kali mengalami hipertensi pada kehamilan dibandingkan dengan ibu yang tidak obesitas pada saat kehamilan (Uli, dkk, 2017).

4. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis untuk hipertensi gestasional antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Tekanan darah diastolic <140 mmHg.
- 2) Nyeri kepala saat terjaga.

- 3) Kadang-kadang di sertai mual.
- 4) Penglihatan kabur.
- 5) Nyeri kepala dengan gangguan penglihatan.
- 6) Nyeri epigastrium.
- 7) Pertambahan berat badan yang pesat.

5. Patofisiologi

Meskipun patofisiologi hipertensi gestasional hingga kini belum jelas, namun timbulnya hipertensi ini telah terbukti dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin (Darmawansyih, 2014). Banyak teori telah ditemukan tentang terjadinya hipertensi dalam kehamilan, tetapi tidak ada satu pun teori tersebut yang dianggap mutlak benar. Teori –teori sekarang banyak yang dianut.

1) Teori kelainan vaskularisasi plasenta

Pada kehamilan normal, rahim dan plasenta mendapatkan aliran darah dari cabang- cabang arteri uterina dan arteria ovarika. Kedua pembuluh darah tersebut menembus miometrium berupa arteri arkuata dan arteri arkuata memberi cabang arteria radialis. Arteria radialis menembus endometrium menjadi arteri basalis dan arteri basalis memberi cabang arteria spiralis.

Pada hamil normal, dengan sebab yang belum jelas, terjadi invasi trofoblas ke dalam lapisan otot arteria spiralis, yang menimbulkan degenerasi lapisan otot tersebut sehingga terjadi dilatasi arteri spiralis. Invasi trofoblas juga memasuki jaringan sekitar arteri spiralis, sehingga

jaringan matriks menjadi gembur dan memudahkan lumen arteri spiralis mengalami distensi dan dilatasi. Distensi dan vasodilatasi lumen arteri spiralis ini memberi dampak penurunan tekanan darah, penurunan resistensi vaskular, dan peningkatan aliran darah pada daerah utero plasenta. Akibatnya, aliran darah kejanin cukup banyak dan perfusi jaringan juga meningkat, sehingga dapat menjamin pertumbuhan janin dengan baik. Proses ini dinamakan “remodeling arteri spiralis”.

Pada hipertensi dalam kehamilan tidak terjadi invasi sel-sel trofoblas pada lapisan otot arteri spiralis dan jaringan matriks sekitarnya. Lapisan otot arteri spiralis menjadi tetap kaku dan keras sehingga lumen arteri spiralis tidak memungkinkan mengalami distensi dan vasodilatasi. Akibatnya arteri spiralis relatif mengalami vasokonstriksi, dan terjadi kegagalan “remodeling arteri spiralis”, sehingga aliran darah uteroplasenta menurun, dan terjadilah hipoksia dan iskemia plasenta. Dampak iskemia plasenta akan menimbulkan perubahan-perubahan yang dapat menjelaskan patogenesis HDK selanjutnya.

2) Teori iskemia plasenta, radikal bebas dan disfungsi endotel.

a. Iskemia plasenta dan pembentukan oksidan/ radikal bebas

Plasenta yang mengalami hipoksia akan mengalami oksidan (radikal bebas). Oksidan atau radikal bebas adalah senyawa penerima elektron atau atom/ molekul yang mempunyai elektron yang tidak terpasang. Salah satu oksidan penting yang dihasilkan

plasenta iskemia adalah radikal hidroksil yang sangat toksis, khususnya terhadap membran sel endotel pembuluh darah. Sebenarnya produksi oksidan pada manusia adalah suatu proses normal, karena oksidan memang dibutuhkan untuk perlindungan tubuh. Adanya radikal hidroksil dalam darah mungkin dahulu dianggap sebagai bahan toksin yang beredar dalam darah, maka dulu hipertensi dalam kehamilan disebut “toxaemia”. Radikal hidroksil akan merusak membran sel, yang mengandung banyak asam lemak tidak jenuh menjadi peroksida lemak selain akan merusak membran produksi oksidan (radikal bebas) dalam tubuh yang bersifat toksis, selalu diimbangi dengan produksi antioksidan.

b. Peroksida lemak sebagai oksidan dalam hipertensi dalam kehamilan.

Pada hipertensi dalam kehamilan telah terbukti bahwa kadar oksidan khususnya peroksida lemak meningkat sedangkan antioksidan, misalnya vitamin E pada hipertensi dalam kehamilan menurun, sehingga terjadi dominasi kadar oksidan peroksida lemak yang relatif tinggi.

Peroksida lemak sebagai oksidan / radikal bebas yang sat toksis ini akan beredar di seluruh tubuh dalam aliran darah dan akan merusak membran sel endotel. Membran sel endotel lebih mudah mengalami kerusakan oleh peroksida lemak, karena letaknya langsung berhubungan dengan aliran darah dan

mengandung banyak asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh sangat rentan terhadap oksidan radikal hidroksil, yang akan berubah menjadi peroksida lemak.

c. Disfungsi sel endotel

Akibat sel endotel terpapar terhadap peroksida lemak, maka terjadi kerusakan sel endotel yang kerusakannya dimulai dari membran sel endotel. Kerusakan membran sel endotel mengakibatkan terganggunya fungsi endotel, bahkan rusaknya seluruh struktur endotel. Keadaan ini disebut disfungsi endotel. Pada waktu terjadinya kerusakan endotel yang mengakibatkan disfungsi sel endotel, maka akan terjadi :

- a) Gangguan metabolisme prostaglandin, karena salah satu fungsi sel endotel, adalah memproduksi prostaglandin, yaitu menurunnya produksi prostasiklin (PGE₂) suatu vasodilatator kuat.
- b) Agregasi sel-sel trombosit pada daerah endotel yang mengalami kerusakan. Agregasi sel trombosit ini adalah untuk menutup tempat-tempat dilapisan endotel yang mengalami kerusakan. Agregasi trombosit memproduksi tromboksan (TXA₂) suatu vasokonstriktor kuat.
- c) Perubahan khas pada sel endotel kapilar glomerulus (*glomerular endotheliosis*)
- d) Peningkatan permeabilitas kapilar.

- e) Peningkatan produksi bahan- bahan vasopresor yaitu endotelin.
Kadar NO (vasodilatator) menurun, sedangkan endotelin (vasokonstriktor) meningkat.
- f) Peningkatan faktor koagulasi

3) Teori intoleransi imunologik antara ibu dan janin.

Dugaan bahwa faktor imunologik berperan terhadap terjadinya hipertensi dalam kehamilan terbukti dengan fakta sebagai berikut.

- a. Primigravida mempunyai resiko lebih besar terjadinya hipertensi dalam kehamilan jika dibandingkan dengan multigravida.
- b. Ibu multipara yang kemudian menikah lagi mempunyai resiko lebih besar terjadinya hipertensi dalam kehamilan jika dibandingkan dengan suami sebelumnya.
- c. Seks oral mempunyai resiko lebih rendah terjadinya hipertensi dalam kehamilan ialah makin lama periode ini, makin kecil terjadinya hipertensi dalam kehamilan.

Pada perempuan hamil normal, respons imun tidak menolak adanya “hasil konsepsi“ yang bersifat asing. Hal ini disebabkan adanya *human leukocyte antigen protein G* (HLA-G), yang berperan penting dalam modulasi respons imun, sehingga si ibu tidak menolak hasil konsepsi (plasenta). Adanya HLA-G pada plasenta dapat melindungi trofoblas janin dan lisis oleh sel *natural killer* (NK) ibu.

Selain itu, adanya HLA-G akan memudahkan invasi sel trofoblas kedalam jaringan desidua ibu. Jadi HLA-G merupakan

prakondisi untuk terjadinya invasi trofoblas ke dalam jaringan desidua ibu, disamping untuk menghadapi sel *natural killer*. Pada plasenta hipertensi dalam kehamilan, terjadi penurunan ekspresi HLA-G. Berkurangnya HLA-G di desidua daerah plasenta, menghambat invasi trofoblas ke dalam desidua. Invasi trofoblas sangat penting agar jaringan desidua menjadi lunak, dan gembur sehingga memudahkan terjadinya dilatasi arteri spiralis. HLA-G juga merangsang produksi sitokin, sehingga memudahkan terjadinya reaksi inflamasi. Kemudian terjadi *immune-maladaptation* pada preeklamsia.

4) Teori adaptasi kardiovaskuler

Pada hamil normal pembuluh darah refrakter terhadap bahan – bahan vasopresor. Refrakter, berarti pembuluh darah tidak peka terhadap rangsangan bahan vasopresor, atau dibutuhkan kadar vasopresor yang lebih tinggi untuk menimbulkan respons vasokonstriksi. Pada kehamilan normal terjadinya refrakter pembuluh darah terhadap bahan vasopresor adalah akibat dilindungi oleh adanya sintesis prostaglandin pada sel endotel pembuluh darah. Hal ini dibuktikan bahwa daya refrakter terhadap bahan vasopresor akan hilang bila diberi prostaglandin ini kemudian hari ternyata adalah prostasiklin.

Pada hipertensi dalam kehamilan hilangnya daya refrakter terhadap bahan vasokonstriktor dan ternyata terjadi peningkatan kepekaan terhadap bahan – bahan vasopresor. Artinya daya refrakter pembuluh darah terhadap bahan vasopresor hilang hingga pembuluh darah menjadi

sangat peka terhadap bahan vasopresor. Banyak peneliti telah membuktikan bahwa peningkatan kepekaan terhadap bahan- bahan vasopresor pada hipertensi dalam kehamilan sudah terjadi pada trimester I. Peningkatan kepekaan pada kehamilan yang akan menjadi hipertensi dalam kehamilan, sudah dapat ditemukan pada kehamilan dua puluh minggu. Fakta ini dapat dipakai sebagai prediksi akan terjadinya hipertensi dalam kehamilan.

5) Teori genetik

Ada faktor keturunan dan familial dengan model gen tunggal. Genotipe ibu lebih menentukan terjadinya hipertensi dalam kehamilan secara familial jika dibandingkan dengan genotipe janin.

6) Teori stimulus inflamasi

Teori ini berdasarkan fakta bahwa lepasnya debris trofoblas didalam sirkulasi darah merupakan rangsangan utama terjadinya proses inflamasi. Pada kehamilan normal plasenta juga melepaskan debris trofoblas sebagai sisa- sisa proses apoptosis trofoblas, akibat reaksi stres oksidatif.

Bahan – bahan ini sebagai bahan asing yang kemudian merangsang timbulnya proses inflamasi. Pada kehamilan normal, jumlah debris trofoblas masih dalam batas wajar, sehingga reaksi inflamasi juga masih dalam batas normal. Berbeda dengan proses apoptosis pada preeklamsia, dimana pada preeklamsia terjadi peningkatan stres oksidatif, sehingga produksi debris apoptosis dan nekrotik trofoblas juga meningkat. Makin banyak sel trofoblas plasenta, misalnya pada plasenta besar, pada hamil ganda, maka

reaksi stres oksidatif akan sangat meningkat, sehingga jumlah sisa debris trofoblas juga makin meningkat. Keadaan ini akan mengaktivasi sel endotel, dan sel –sel makrofag/ granulosit, yang lebih besar pula sehingga terjadi reaksi sistemik inflamasi yang menimbulkan gejala- gejala preeklamsia pada ibu (Prawirohardjo, Sarwono, 2014).

6. Diagnosis hipertensi gestasional

- 1) hipertensi yang didapatkan tekanan darah sistolik 140 atau diastolik 90 mmHg untuk pertama kalinya dalam kehamilan diatas 20 minggu
- 2) Tidak didapatkan proteinuria
- 3) Tekanan darah kembali normal sebelum 12 minggu post partum
- 4) Diagnosis hanya dibuat pada postpartum
- 5) Mungkin memiliki tanda – tanda atau gejala preeklamsia, misalnya tidak nyaman atau trombositopenia epigastrika (Setiawati, Dewi, 2013).

7. Penatalaksanaan hipertensi gestasional

Penatalaksanaan hipertensi gestasional ini dapat di mulai dengan mengurangi aktifitas dan menambah istirahat, untuk pengobatan farmakologis dapat digunakan metildopa atau nefidipin sebagai obat yang terpilih pada kasus hipertensi kronik dan hipertensi gestasional (Darmawansyih, 2014).

Pemeriksaan antenatal merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi faktor resiko terjadi resiko terhadap bahaya- bahaya yang berlangsung selama kehamilan dan persalinan terutama hipertensi. Pemeriksaan antenatal penting untuk mendeteksi sedini mungkin hingga tidakan

preventif maupun kuratif dapat dilakukan dengan baik. Pemeriksaan antenatal berupa 7T minimal 4 kali selama kehamilan bertujuan untuk memperoleh kapasitas bahwa kehamilan berakhir dengan persalinan normal (Sukfitriany, Dkk, 2016).

1) Terapi obat antihipertensi.

Pengobatan farmakologik metildopa menjadi pilihan pada ibu yang mengalami hipertensi dalam kehamilan. Sebaliknya penggunaan antihipertensi tidak selalu menunjukkan peningkatan survival pada janin dan menghasilkan anak dengan mental dan perkembangan fisik yang normal. Metildopa, hidralazin dan labetolol merupakan obat pertama untuk anti hipertensi pada wanita hamil. Penggunaan obat-obat anti hipertensi lain akan mempunyai hasil yang sama, tetapi belum diteliti dengan sempurna. Pada table di bawah ini dapat dilihat obat yang dapat digunakan pada hipertensi dengan kehamilan (Fitriani, 2014).

Obat anti hipertensi yang digunakan pada kehamilan.

| Obat | Contoh Obat | Uraian |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A ₂ -adrenergic blocker | Metildopa | Paling sering digunakan, aman, obat pilihan |
| Beta blocker | Atenotol, Mesoprolol | Aman, dilaporkan menyebabkan bradikardi janin, retrdasi pertumbuhan |
| A,β blocker | Labetolol | Manjur, sangat sedikit data aman |
| Vasodilator arterial | Hydralazin | Manjur dan aman semasa kehamilan dan laktasi |
| ACE inhibitor | Kaptopril | Kontraindikasi semasa kehamilan karena toksik untuk janin |
| Calcium channel blocker | Diltiazel | Aman tetapi tidan banyak data mendukung penggunaannya |
| Diuretik | Furosemide | Aman tetapi terbatas kemanjurannya |
| Sodium nitroprusside | | Hindarakan pada kehamilan karena mempunyai potensi toksisits pada janin |
| Magnesium sulfat | | Obat pilihan untuk mencegah kejang eklampsia |

(Fitriani, 2014).

C. Tinjauan Umum Hipertensi Gestasional pada Ibu Hamil Menurut Pandangan Agama Islam.

Dalam kasus ibu hamil dengan hipertensi gestasional akan mengalami kelainan-kelainan selama kehamilannya yang bisa membuat tubuhnya semakin lemah. Kondisi ini merupakan perkembangan jasmani yang wajar, Allah SWT tidak menjadikan kehamilan sebagai hukuman tetapi sebagai karunia dan

rahmat. Oleh karena itu, wanita yang sedang hamil sangat dituntut adanya ketulusan hati, kesediaan menderita, penuh kesabaran dan ketabahan, kepasrahan penuh pada Allah SWT dan penuh harap akan rahmatnya Sesuai dengan firman Allah swt yang dijelaskan pada surah Al-luqman: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَيَّ وَهْنًا وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنشَكَرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَسِيرِ

Terjemahan :

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang tua ibu- bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah dan menyapinya dalam dua tahun, bersyukur kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu ”(Kementrian Agama RI, 201).

Menurut Al-Biqā’I, ayat 14 : bagaikan menyatakan: Luqman menyatakan hal itu kepada anaknya sebagai nasihat kepadanya, padahal Kami telah mewasiatkan anaknya dengan wasiat itu seperti apa yang dinasihatkannya menyangkut hak Kami. Thahir Ibn ‘Asyur berpendapat bahwa jika kita menyatakan bahwa Luqman bukan seorang Nabi, maka ayat ini adalah sisipan yang sengaja diletakkan setelah wasiat Luqman yang lalu tentang keharusan mengesakan Allah dan mensyukuri-Nya.

Allah menggambarkan betapa Dia sejak dini telah melimpahkan anugerah kepada hamba-hamba-Nya dengan mewasiatkan anak agar berbakti kepada orang tuanya. Di ayat 14 tidak menyebutkan jasa bapak, tetapi lebih menekankan jasa ibu. Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu berbeda dengan bapak. Di sisi lain, “peranan bapak” dalam konteks kelahiran anak lebih ringan dibanding dengan peranan ibu.

Setelah pembuahan, semua proses kelahiran anak dipikul sendirian oleh ibu. Bukan hanya sampai masa kelahirannya, tetapi berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu. Memang ayah pun bertanggung jawab menyiapkan dan membantu ibu agar beban yang dipikulnya tidak terlalu berat, tetapi ini tidak langsung menyentuh anak, berbeda dengan peranan ibu.

Kelainan yang dialami ibu semasa kehamilannya yang bisa membuat tubuhnya semakin lemah, maka islam memberikan tuntunan bagi para ibu untuk senantiasa berdzikir dan berdoa kepada Allah meminta kesembuhan darinya Sesuai dengan HR Bukhari dan Muslim.

لَلّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُدْهِبِ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

Terjemahnya :

Ya Allah Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembukanlah ia. (Hanya) Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dariMu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi ”(Kementrian Agama RI, 2013).

Do'a di atas mengajarkan kepada kita untuk tawakkal dalam menghadapi penyakit, dengan menyadari bahwa Allah adalah Tuhan segala manusia, Allah adalah yang mampu menyembuhkan penyakit, maka kita meminta kesembuhan pada-Nya. Setelah itu kita pun menyatakan bahwa hanya diri-Nya saja yang dapat memberi kesembuhan, bukan yang lain, ini adalah tauhid. Dan kita minta pada-Nya supaya menyembuhkan si sakit dengan tanpa menyisakan bekas penyakit sedikit pun.

D. Tinjauan Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian

Menurut Helen Varney (1997) bahwa manajemen asuhan kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang ditemukan oleh perawat dan bidan pada awal 1970-an.

1) Proses Manajemen Asuhan kebidanan

Tujuh langkah manajemen kebidanan menurut Varney yaitu:

a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar)

Langkah I merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien atau orang yang meminta asuhan. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara atau tanya jawab dengan pasien maupun keluarga meliputi: umur pasien, gravida, riwayat kesehatan keluarga yang pernah mengalami preeklampsia dan eklampsia, riwayat kehamilan multiple, molahidatidosa, diabetes militus, hidrops fetalis dan bayi besar. Riwayat penyakit ginjal. Demikian pula dengan data fisik yang diperoleh dalam observasi.

Dalam Pemeriksaan fisik, klien yang umumnya mengalami hipertensi memiliki usia kehamilan di atas 20 minggu, disertai dengan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg, disertai dengan hasil pemeriksaan lab didapatkan protein urin negatif. Dan pemeriksaan fisik salah satunya yaitu pengukuran berat badan. Pemeriksaan

fisik yang dilakukan secara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi.

b. Langkah II: Interpretasi Diagnosa Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien. Berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik.

Pada pasien yang mengalami hipertensi gestasional umumnya memiliki tekanan darah yang melebihi batas normal, di mana ia memiliki tekanan darah $>140/90$ mmHg, atau mengalami peningkatan pada sistolik ≥ 140 mmHg dan diastolik sebesar ≥ 90 mmHg, biasanya pasien mengalami hipertensi pertama kalinya pada umur kehamilan di atas 20 minggu, tanpa disertai dengan adanya protein urin, tekanan darah kembali normal sebelum 12 minggu postpartum, diagnosa hanya dibuat pada postpartum dan memiliki tanda-tanda atau gejala preeklampsia.

c. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial)

Pada langkah ini yaitu mengantisipasi diagnosa/masalah potensial di susun berdasarkan masalah yang dapat beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan pada ibu hipertensi gestasional. Adapun masalah potensial yang sering terjadi adalah resiko

terjadinya preeklampsia ringan. Pada janin pertumbuhan terhambat, kematian janin, persalinan prematur dan solusio plasenta.

Perempuan yang mengalami hipertensi gestasional mempunyai resiko tinggi terjadinya komplikasi berat seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit pembuluh darah otak atau pun gagal organ hingga kematian. Terhadap janin dapat terjadi pertumbuhan janin dalam rahim terhambat, sehingga menyebabkan kelahiran sebelum waktunya dan kematian janin dalam rahim (KJDR).

d. Langkah IV (Menetapkan Kebutuhan terhadap Tindakan Segera dan Kolaborasi)

Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera untuk melakukan konsultasi, kolaborasi dengan segera dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.

Penanganan segera pada kasus ini adalah melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter obgyn untuk mencegah terjadinya komplikasi hipertensi lebih lanjut, kolaborasi dengan dokter ongyn dalam pemberian obat antihipertensi seperti metildopa atau nipidipin. Serta kolaborasi dengan laboratorium untuk mendeteksi perkembangan penyakit hipertensi menjadi

preeklampsia dengan cara memeriksa adanya protein urin dan pemeriksaan tekanan darah agar tidak menimbulkan bentuk kelainan patologis.

e. Langkah V (Perencanaan)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap dilengkapi.

Pelaksanaan yang dilakukan yaitu menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu, menjelaskan hal-hal yang penting seperti peningkatan tekanan darah dan protein urin. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga.

Memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi gestasional dan cara mengatasi serta memantau terjadinya preeklampsia ringan. Memberikan *health education* seperti ajurkan ibu untuk mengurangi aktifitas berat seperti mengangkat beban yang berat, menambah istirahat, diet terhadap makanan yang tinggi protein seperti ikan, telur, tahu, tempe dan kacang-kacangan. Rendah hidrat arang seperti buah dan sayur sayuran. Rendah lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, ikan segar dan

keju. Hindari situasi yang dapat mencetuskan stres dimana stres jelas memainkan peranan penting dalam hipertensi.

Menjelaskan kepada ibu mengenai tanda bahaya dalam kehamilan. Anjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan janinnya. Mengajarkan kepada ibu untuk memantau tanda-tanda preeklampsia ringan. Anjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan USG, DJJ dan mendiskusikan persiapan persalinan dan kelahiran bayinya. Melakukan pemberian obat antihipertensi. Mengajarkan ibu untuk melakukan kunjungan antenatal secara teratur serta anjurkan ibu untuk memperbanyak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.

Dalam islam memberikan tuntunan bagi para ibu untuk senantiasa berdzikir dan berdoa kepada Allah meminta kesembuhan darinya sesuai dengan HR Bukhari dan Muslim).

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبِ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

Artinya:

Ya Allah Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembukanlah ia. (Hanya) Engkau yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dariMu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi

Selain ayat diatas anjurkan ibu untuk membaca surat-surat Al-Quran terkait doa-doa pada ibu hamil seperti surah-surah Al- Quran yang diberikan kepada ibu seperti surat Ali Imran ayat 38

dan surat Ash Saffat ayat 100. Berikut bacaan-bacaan surat Al-Quran yang diberikan:

Surat Ali Imran ayat 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Terjemahnya:

Disanalah Zakariya berdo'a kepada Tuhannya seraya berkata "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Surat Ash Saffat ayat 100

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

terjemahannya:

Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.

f. Langkah VI (Pelaksanaan).

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini biasa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau dilakukan oleh bidan dan sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya.

g. Langkah VII (Evaluasi).

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan pada bantuan

apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedangkan sebagian belum efektif (Mufdillah, 2012).

2) Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP

Varney menyatakan bahwa alur berfikir bidan saat menghadapi klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain apa yang telah dilakukan oleh seseorang bidan melalui proses berfikir sistematis, maka dilakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yaitu:

1. Subjektif (S)

Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa.

2. Objektif (O)

Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien (keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik), hasil laboratorium dan uji diagnosis lain yang merumuskan dalam data focus untuk mendukung asuhan.

3. Assesment (A)

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan juga data objektif dalam suatu identifikasi.

a) Diagnosis masalah.

b) Antisipasi diagnosis/masalah potensial.

c) Tindakan segera.

4. Planning (P)

Pendokumentasian tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment(Walyani,2013).



BAB III
LITERATUR REVIEW

A. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar

Pengumpulan data dasar berkaitan dengan kondisi pasien yaitu kehamilan yang disertai dengan hipertensi gestasional, sehingga dapat ditentukan interpretasi yang benar sesuai dengan referensi yang didapatkan. Berikut adalah matriks referensi tentang hipertensi gestasional yang di aplikasikan dalam 7 langkah mulai dari langkah 1 terdiri dari tanda dan gejala, etiologi, hubungan yang terjadi pada hipertensi gestasional.

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antranatal Dengan Hipertensi Gestasional

| No | Judul Referensi | Oleh (Sebutkan Nama) | Tahun | General Idea | Hasil | Kelemahan | Kelebihan | Perbandingan |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Hubungan usia, graviditas, dan indeks massa tubuh dengan kejadian hipertensi | Dianah ratih puspita | 2013 | Hubungan usia, graviditas, dan indeks massa tubuh. | Ada hubungan antara usia maternal dan Indeks massa tubuh dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan, namun tidk ada hubungan antara graviditas dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan. Usia maternal memiliki peluang 2,774 kali lebih beresiko mengalami hipertensi dalam kehamilan. | Penelitian ini menggunakan study observasional dengan metode cross-sectional secara prospektif. | Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling sesuai kriteria inklusi dengan Eklusif | Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui hubungan antara usia, graviditas, dan indeks massa tubuh dengan hipertensi gestasional. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Pendidikan kesehatan upaya pencegahan hipertensi pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Pembina Palembang tahun 2019 | Mardalena, dkk | 2020 | Upaya pencegahan hipertensi pada kehamilan | Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan dapat di simpulkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya ibu hamil tentang pencegahan hipertensi, yaitu dari rata-rata 5 menjadi 8,5. | Metode dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan Tanya jawab. | Dari hasil kegiatan di peroleh adanya peningkatan pengetahuan tentang pencegahan hipertensi. | Kegiatan pengabdian masyarakat ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan persalinan pada ibu hamil tentang pencegahan hipertensi dengan fisik, psikologi, dan social ibu. |
| 3. | Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di uptd puskesmas dpt sumberjaya kabupaten majalengka | Desi evitasari, dkk | 2020 | Faktor –faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi gestasional | Kurang dari setengah (31,9%) umur ibu beresiko, kurang dari setenagh (42,6%) ibu hamil mempunyai riwayat keluarga, lebih dari setengah (53,2%) ibu hamil tidak rutin melakukan aktifitas fisik, da kurang dari setengah (38,3) ibu hamil obesitas. | Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-section. | Sampel yang digunakan adalah sebagian ibu hamil UPTD puskesmas DPT sumberjaya pada bulan april-juni 2020 | Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Analisis datanya meliputi univariat dengan distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan uji chi square. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Pengaruh pengetahuan, sikap dan dukungan keluarga terhadap diet hipertensi di desa hulu kecamatan pancur batu tahun 2016 | Almina rospitaria, dkk | 2018 | Pengaruh pengetahuan, sikap dan dukungan keluarga terhadap kejadian hipertensi | Ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan sikap serta dukungan keluarga terhadap pelaksanaan diet hipertensi yang dilihat dari nilai signifikan ($p=0.001$), sehingga ($p<0.005$), maka H_a di terima dan H_o ditolak, dengan kata lain pengetahuan yang baik dan sikap positif serta dukungan keluarga yang baik akan memiliki peluang pelaksanaan diet hipertensi dengan baik. | Jenis penelitian adalah cross-sectional study dengan pendekatan explanatory. | Populasi dalam penelitian adalah seluruh penderita hipertensi yang berjumlah 108 orang dan seluruh populasi dijadikan sampel. | Hipertensi ditegakkan apabila didapatkan tekanan darah sistolik (TDS) ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolic (TTD) ≥ 90 mmHg pada dua kali pengukuran dalam waktu yang berbeda. |
| 5. | Hubungan asupan natrium, kalsium dan magnesium dengan tekanan darah pada ibu hamil trimester II dan III (studi di wilayah kerja puskesmas bulu kabupaten temanggung) | Ella febriana, dkk | 2017 | Hubungan asupan nutrium, kalsium, dan magnesium dengan tekanan darah. | Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada hubungan bermakna tekanan darah dengan seluruh asupan zat gizi pada ibu hamil trimester II dan III di puskesmas bulu, temanggung, jawa tengah. | Penelitian ini menggunakan metode survai analitik dengan pendekatan cross sectional | Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil pada trimester II dan III yang terdatadi pukesmas bulu kabupaten temanggung yaitu 114 ibu hamil. | Hipertensi dalam kehamilan merupakan gangguan multifactorial. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi dalam kehamilan. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Pengaruh pemberian pendidikan kesehatan tentang hipertensi kehamilan terhadap upaya pemeliharaan tekanan darah pada ibu hamil desa gebong kecamatan delanggu kabupaten klaten. | Rahayu setyanengsih, dkk | 2014 | Pengaruh pemberian pendidikan kesehatan tentang hipertensi kehamilan terhadap upaya pemeliharaan tekanan darah pada ibu hamil | Terjadi peningkatan nilai upaya pemeliharaan sebelum diberi pendidikan dan setelah diberi pendidikan kesehatan, dan berdasarkan independent paired ttest (uji t) dengan $\alpha = 5\%$ (0.05), di peroleh p sebesar 0.000 sehingga $p < 0.05$, yang berarti hipotesa diterima maka diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan tentang hipertensi kehamilan terhadap upaya pemeliharaan tekanan darah ibu hamil di desa gebong kecamatan delanggu kabupaten klaten. | Pada penelitian ini peneliti menggunakan rancangan peneliti pre exaperimenta l design. | Penelitian memberikan perlakuan pendidikan kesehatan berupa penyuluhan dengan cara memberikan ceramah. | Langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu di mulai dengan memberikan kuesioner selanjutnya peneliti melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang upaya pemeliharaan tekanan darah ibu hamil di desa gebong. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Asuhan kebidanan pada ny. S kehamilan trimester II dengan hipertensi gestasional. | Eka sarofah ningsih | 2019 | Tanda dan gejala hipertensi gestasional | Hasil pemeriksaan pada nyonya S GIII PII trimester II dengan hipertensi adalah keadaan umum cukup, postur tubuh tegak, raut wajah cemas, tensi 160/100 mmHg, bb: 64 kg, lila: 28 cm. pada pemeriksaan fisik di dapatkan konjungtiva tidak pucat, sclera putih, tidak ada tarikan intercosta.berdasarkan data subyektif dan obyektif yang adamaaka diagnose yang di temukan adalah Ny. S GIII PII trimester II dengan hipertensi, dan masalah yang di dapatkan adalah pusing. | Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode peneliti analitik. | Desain penelitian ini juga melalui pendekatan kuantitatif secara sectional. | Peran petugas kesehatan terutama bidan sangat penting didalam memberikan penyuluhan pada ibu hamil. |
| 8. | Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi pada kehamilan studicase control di wilayah puskesmas poriaha kabupaten tapanuli tengah 2017 | Lely desi uli basana, dkk | 2017 | Faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi gestasional. | Penelitian ini menunjukkan bahwa yang paling dominan dari hasil penelitian yang dilakukan di puskesmas poriaha kabupaten tapanuli tengah adalah faktor paritas. Bila ingin mencegah terjadinya hipertensi kehamilan maka dapat dianjurkan kepada ibu-ibu hamil agar tidak hamil di usia < 20 tahun atau > 35 tahun dan kenaikan berat badan saat hamil jangan lebih dari 10-15 kg. | Jenis penelitian yang di gunakan adalah studi analitik dengan desaincase control | Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang melakukakun jungan ke wilayah kerja puskesmas poriaha. | Data di peroleh dari rekam medik ibu hamil disesuaikan dengan lembar kuesioner tentang umur, paritas dan riwayat hipertensi. |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Faktor resiko kejadian hipertensi dalam kehamilan. | Alfiana rohmani, dkk | 2019 | Faktor resiko kejadian hipertensi dalam kehamilan. | Ada hubungan antara usia maternal dan indeks massa tubuh dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan dan tidak ada hubungan antara graviditas dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan. | Penelitian ini menggunakan studi observasional dengan metode cross-sectional secara prospektif | Populasi yang datang penelitian ini adalah semua ibu hamil di poli rawat jalan spesialis ostetri dan ginekologi RSUD tugurejo semarang | Beberapa kesamaan yang tampak pada banyak keluarga justru mungkin merupakan dampak pengaruh lingkungan, pola makan dan keterampilan menghadapi masalah dalam kehamilan seperti hipertensi gestasional. |
|----|----------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Hubungan pola makan dan kecukupan istirahat tidur dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas biromaru | Pesta cory sihotang, dkk | 2016 | Hubungan pola makan dan kecukupan istirahat tidur dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil | Ada hubungan antara pola makan dan hubungan antara istirahat tidur dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas biromaru. | Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitiann kuantitatif dengan menggunakan metode cross sectional dan dilakukan uji chi square. | Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang melakukan kunjungan di puskesmas biromaru pada bulan September 2014 dengan jumlah sampel yang di pakai 41 orang. Teknik pegambilan sampel dilakukan dengan cara noprobablity sampling. | Hasil dari penelitian ini di dapatkan hubungan pola makan dan istirahat tidur dengan kejadian hipertensi. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

B. Langkah II : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Aktual

Identifikasi diagnosis, masalah dan kebutuhan pasien yaitu kehamilan yang disertai dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi yang telah didapatkan. Berikut adalah matriks referensi tentang hipertensi gestasional yang di aplikasikan dalam 7 langkah. langkah II terdiri dari diagnosa

| No | Judul Referensi | Oleh (sebutkan nama) | Tahun | General Idea | Hasil | Kelemahan | Kelebihan | Perbandingan |
|----|-----------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kehamilan dengan hipertensi gestasional | Wirda elya sari | 2015 | Diagnosa hipertensi gestasional | Diagnose hipertensi gestasional ditegakkan pada ibu hamil yang memiliki tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih untuk pertama kalinya pada masa kehamilan namun tidak di temuan proteinuria. | Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif | Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya. | Pembagian hipertensi dalam kehamilan ialah hipertensi kronik, preeclampsia, eklamsi, hipertensi kronik dengan superimposed preeklamsi, hipertensi gestasional. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Asuhan kebidanan pada Ny.P umur 32 tahun G3P2A0 dengan hipertensi gestasional di poli kebidanan rumah sakit M. yunus Bengkulu tahun 2018 | Ronelan br. Situmorang, dkk | 2018 | Menegakkan diagnose | Pada diagnosa kebidanan disusun berdasarkan masalah yang ada pada pasien hipertensi gestasional sehingga didapatkan masalah sesuai dengan kebutuhan pasien | Penelitian ini merupakan penelitian bentuk laporan studi kasus yaitu dapat dilakukan dengan dengan cara meneliti sesuai permasalahan melalui suatu proses yang terdiri dari unit tunggal. | Peneliti ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif dan memusatkan perhatian pada obyek tertentu. | Semua rencana asuhan kebidanan yang ada dalam teori direncanakan semua oleh peneliti, ham ini disesuaikan dengan kebutuhan pasien. |
| 3. | Gambaran kejadian hipertensi pada ibu hamil di RSUD ibu dan anak pertiwi Makassar tahun 2014 | Puasia RS | 2014 | Gambaran kejadian hipertensi pada ibu hamil | Hasil penelitian menunjukka dari 135 responden yang mengalami hipertensi sebanyak 30 orang (22,2%) dan yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 105 orang (77,8%). | Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif untuk menggambarkan kejadian hipertensi pada ibu hamil. | Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di rskd ibu dan anak pertiwi Makassar. Penggunaan sampel engan menggunakan accidental sampling yang dilakukan dengan kebetulan bertemu. | Jumlah sampe dalam penelitian ini adalah 135 orang. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitaian. |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Karakteristik ibu hamil dengan hipertensi | Esti nugraheny, dkk | 2014 | Karakteristik ibu hamil dengan hipertensi | Karakteristik yang mendominasi kejadian hipertensi kehamilan di RSUD penambahan senopati bantul adalah dengan status gizi obesitas. | Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan retrospektif melalui data rekam medis. | Sampel peneliti sebanyak 67 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. | Kuesioner dibuat oleh peneliti berdasarkan kajian literature yang membahas mengenai karakteristik kejadian hipertensi pada kehamilan. |
| 5. | Gambaran diagnostic dan penatalaksanaan hipertensi dalam kehamilan di rumah sakit umum Imelda pekerja Indonesia medan tahun 2016 | Tri adi mylano, dkk | 2016 | Gambaran diagnostic | Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Proporsi keluhan ibu penderita hipertensi yang tertinggi adalah nyeri kepala sebesar 28%, serta yang terendah adalah penurunan kesadaran 2% | Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan desain studi kasus | Penelitian ini mendeskripsikan gambaran diagnostic dan penatalaksanaan hipertensi dengan melihat data sekunder berupa rekam medic. | Data yang dikumpulkan dengan cara mencatat rekam medic penderita hipertensi yang terdapat di rumah sakit umum melda pekrja Indonesia. |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Gambaran deteksi dini ibu hamil dengan hipertensi dalam kehamilan di puskesmas banguntapan I | Diah ayu dewi ratih, dkk | 2018 | Gambaran deteksi dini ibu hamil dengan hipertensi dalam kehamilan. | Dalam penelitian ini bahwa sebagian besar responden melakukan deteksi dini kehamilan tentang hipertensi dalam kategori cukup yaitu sebanyak 31 responden (50,8%) dan 17 responden (27,9%) dalam kategori baik adalah responden yang sering melakukan kunjungan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas. Penelitian ini disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia 20-35 tahun, dengan pendidikan SMA< pekerjaan ibu rumah tangga, dan melakukan deteksi dini tentang hipertensi pada kehamilan dalam kategori cukup. | Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, rancangan penelitian menggunakan pendekatan cross sectional. | Sampel I ambil sesuai dengan criteria inklusi, yang meliputi: ibu hamil trimester I dan II yang tercatat diwilayah kerja puskesmas banguntapan yang melakukan ANC. | Pengambilan data menggunakan kuesioner yang sudaah di lakukan uji validitass,. Penelitian ini dilakukan di puskesmas banguntapan. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Gambaran klinik resiko yang berhubungan dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan pada ibu hamil. | Mardiana | 2016 | Gambaran klinik hipertensi | Gambran klinik hipertensi gestsional mulai dengan kenaikan berat badan diikuti odema kaki atau tangan, kenaikan tekanan darah, dan terakhir tidak ada proteinuria | Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik | Sampel kasus dalam penelitian ini adalah sebagian ibu hamil yang mendeerita hipertensi yang tercatat dalam catatan mesik di rsud kabupaten brebes | Hipertensi gestasional ditandai dengan tekanan darah \geq 140/90 mmHg setelah umur kehamilan 20 minggu, tidak disertai proteinuria. |
| 8. | Hipertensi gestasional pada kehamilan | Imami N | 2015 | Pengukuran tekanan darah | Hipertensi merupakan keadaan dimana tekanan darah sistolik > 140 mmHg dan tekanan darah diastolic > 90 mmHg yang diukur dengan sphygmomanotemer. Pengukuran dilakukan minimal 2 kali dalam rintang waktu 1 minggu | Jenis penelitian ini meggunakan metode deskriptif analitik dengan desain cross sectional. | Dalam penelitian ini akan dilihat apakah ada hubungan antara umur, paritas, umur menorcheobesitas, riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi egstasional | Hipertensi dalam kehamilan mengakibatkan terjadinya peningkatan curah jantung dan tekanan darah. |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Hipertensi kehamilan | Ekky, R | 2018 | Diagnosa hipertensi gestasional. | Hipertensi yang didapatkan tekanan darah sistolik 140 atau diastolic 90 mmHg untuk pertama kalinya dalam kehamilan diatas 20 minggu. Tidak didapatkan proteinurin | Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik | Sampel yng digunakan adalah ibu yang datang memeriksakan kehamilannya di poliklinik obstetric gynekologi sejumlah 181 ibu hamil. | Hipertensi terjadi dimanatekanan darah sistolik > 140 mmHg dan tekanan darah diastolic >90 mmHg yang diukur dengan sphygmomanometer. |
| 10. | Pelaksanaan diagnose keperawatan pada pasien hipertensi di rumah sakit | Erta iman jelita | 2018 | Pelaksanaan diagnose hipertensi | Hipertensi erupakan abnormal pada tekanan sistolik di atas 140 mmHg atau lebih. Dengan beberapa faktor yang tidak dapat di ubah seperti riwayat keluarga, usia. Sedangkan yang dapat diubah yaitu stress, obesitas, nutrisi, dan pola aktivitas. | Penulisan ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan jurnal atau artikel, buku dan e-book yang relevan dan akurat. | Adapun jurnal atau artikel dan e-book yang digunakan adalah pada literature review adalah jurnal atau artikel dan e-book yang didapatkan menggunakan google scholar, | Berdasarkan hasil pencarian literatur didapatkan diagnosa keperawatan pada pasien hipertensi di rumah sakit |

C. Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Potensial

Identifikasi masalah potensial pada kehamilan yang disertai dengan hipertensi gestasional yang mungkin terjadi berdasarkan referensi yang telah didapatkan. Berikut adalah matriks referensi tentang hipertensi gestasional yang di aplikasikan dalam 7 langkah. Langkah III terdiri dari komplikasi yang terjadi pada hipertensi gestasional.

| No | Judul Referensi | Oleh (Sebutkan Nama) | Tahun | General Idea | Hasil | Kelemahan | Kelebihan | Perbandingan |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Hubungan hipertensi dalam kehamilan dengan kelahiran prematur | Amalia safitri, dkk | 2021 | Komplikasi hipertensi | Kehamilan dengan hipertensi yang menyebabkan kelahiran premature masih banyak ditemui di berbagai Negara baik Negara maju maupun berkembang. Meskipun hasil penelitian mempunyai besaran resiko yang berbeda-beda, hasil analisis ini mendapatkan nilai risiko yang masih cukup signifikan yaitu sebesar 3-4 kali lebih besar di banding kehamilan tanpa hipertensi sehingga komplikasi kehamilan seperti hipertensi perlu mendapat perhatian yang | System review merupakan sintesis dari beberapa hasil penelitian yang mencakup teknik kuantitas dan kualitatif. | Systematic review merupakan sintesis dari beberapa hasil penelitian yang revelan, sehingga fakta yang disajikan kepada penentu kebijakan menjadi lebih komprehensif dan berimbang | Metode yang dilakukan untuk pengumpulan dan seleksi artikel adalah dengan menggunakan metode preferred reporting items for systematic review ad meta-analyse. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | lebih baik agar tidak terjadikelahiran premature. | | | |
| 2. | Hubungan antara hipertens gestasional dan usia ibu terhadap bayi berat lahir rendah (BBLR) | Yugita utami nora | 2018 | Hubungan hipertensi dalam kehamilan dengan BBLR | Terdapat hubungan antara hipertensi dengan bayi berat lahir rendah, terdapat hubungan antara usia ibu yang menyebabkan bayi berat lahir rendah (BBLR) | Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. | Jumlah sampel yang diperoleh dari penelitian ini sebanyak 60 sampel yang diambil dengan teknik purposive sampling sesuai dengan criteria restriksi yang telah ditetapkan. | Uji statistic yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan uji statistic chi-square untuk analisi bivariat dan dilanjutkan regresi logistic untuk analisis multivariate. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Gambaran kejadian hipertensi pada ibu hamil di RSKD ibu dan anak pertiwi makassar | A.Arniyanti | 2015 | Komplikasi hipertensi | Hipertensi dalam kehamilan dapat menyebabkan morbiditas atau kesakitan pada ibu hamil dan janin.(termasuk preeklampsia,eklampsia, perdarahan otak. Odema paru, (cairan didalam paru), gagal ginjal akut, pengumpulan atau pengentalan darah didalam pembuluh darah) serta morbiditas pada janin(termasuk pertumbuhan janin terhambat dalam uterus, kematian janin dalam rahim, solusio plasenta atau terlepas dari tempat implantasi, dan kelahiran prematur). Selain ini hipertensi juga merupakan penyebab kematian ibu | Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif | Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya. | Peningkatan tekanan darah terhadap ibu hamil sangat erat kaitannya dengan komplikasi yang akan terjadi pada ibu hamil maupun janinnya. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Asuhan kebidanan pada Ny.P umur 32 tahun G3P2A0 dengan hipertensi gestasional di poli kebidanan rumah sakit M. yunus Bengkulu tahun 2018 | Ronelan br. Situmorang, dkk | 2018 | Masalah potensial yang terjadi pada hipertensi gestasional | Berdasarkan masalah yang dapat beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan pada ibu hamil dengan hipertensi. Adapun masalah potensial terjadi pada Ny.P adalah resiko terjadinya preeklampsia ringan. | Penelitian ini merupakan penelitian bentuk laporan studi kasus yaitu dapat dilakukan dengan cara meneliti sesuai permasalahan melalui suatu proses yang terdiri dari unit tunggal. | Peneliti ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif dan memusatkan perhatian pada obyek tertentu. | Semua rencana asuhan kebidanan yang ada dalam teori direncanakan semua oleh peneliti, ham ini disesuaikan dengan kebutuhan pasien. |
| 5. | Hubungan hipertensi dalam kehamilan dan kehamilan ganda dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di RSUD wates | Sri haryani | 2019 | Hubungan hipertensi dalam kehamilan dengan BBLR | Ada hubungan hipertensi dengan kejadian berat badan lahir rendah di rumah sakit umum daerah wates dengan nilai $p=0,002$ ($p<0,05$) | Penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan case control. | Teknik sampling pada kasus menggunakan total sampling dan pada control menggunakan kuota sampling. | Sampel dalam penelitian ini menggunakan perbandingan 1:1 yaitu: 114 kasus dan 114 kontrol. Analisa data menggunakan uji statistic <i>chi square</i> |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Perdarahan pascapersalinan oleh karena retensi plasenta pada P4A0 post partum spontan, janin besar, dengan hipertensi dalam kehamilan. | Ivanna beru brahmana | 2018 | Komplikasi yang terjadi | Dengan mencermati faktor risiko persalinan berupa: persalinan yang keempaat, taksiran berat janin besar, adanya hipertensi dalam kehamilan, kejadian fatal pada pasien akibat perdarahan pascapersalinan dapat dihindari. Penatalaksanaan kala 3 persalinan yang baik dan penanganan | Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan desain sectional. | Tujuan yang ingin dicapai dengan dibuatnya laporan kasus ini adalah pentingnya mencermati faktor resiko pada pasien inpartu yang masuk ke kanar bersalin termasuk penatalaksanaan kala tiga persalinanyang baik. | Laporan kasus ini dipandang menarik dan perlu dicermati bahwa betapapun amannya persalinan-persalinan sebelumnya, namun waspada di setiap persalinan amatlah penting. |
| 7. | Hipertensi pada ibu hamil dan analisis pengaruhnya terhadap berat badan janin di kota Palembang | Zata ismah | 2018 | Komplikasi hipertensi dalam kehamilan. | Terdapat hubungan signifikan antara hipertensi dan berat badanjanin rendah. Prevelensi ibu yang hipertensi beresiko terhadap kejadian berat badan janin rendah sebesar 7.272 kali (95% cl 3.415-15.482) lebih besar di badingkan ibu yang tidak hipertensi. Peluang berat badan lahir janin rendah pada ibu yang hipertensi sebesar 24,1%. | Desain penelitian ini dilakukan menggunakan studi analitik cross sectionl. | Populasi dalam penelitian ini dalah ibu hamil di kota Palembang dengan jumlah total sampel 752 ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas maupun klinik kota Palembang | Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling. Setiap ibu hamil memenuhi criteria inklusi yang dating ke pelayanan kesehatan terpilih dan bertemu eneliti akan menjadi sampel hingga memenuhi minimal sampel. |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Komplikasi hipertensi dalam kehamilan pada ibu hamil di RSUP DR. M . Djamil padng tahun 2017 | Nursal, dkk | 2017 | Komplikasi hipertensi gestasional | Hipertensi gestasional dapat mengakibatkan kematian yaitu dengan cara merusak organ terlebih dahulu seperti gagal jantung. Ketika jantung memompa darah keseluruh tubuh, tekanan darah tinggi membuat jantung kerja lebih keras. | Penelitian ini menggunakan metode survey analitik dengan pendekatan cross sectional. | Populasi pada populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil pada trimester II dan III yang terdapat di puskesmas bulu kabupaten temanggung yaitu 114 hamil. | Hipertensi dalam kehamilan dapat berdampak buruk terhadap kondisi bayi dan ibu yang dilahirkan maka perlu dilakukan asuhan yang cepat dan tepat. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang hipertensi dalam kehamilan terhadap resiko preeklampsia berat | Ester simanullang | 2019 | Pengetahuan ibu hamil tentang komplikasi hipertensi dalam kehamilan | Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang tekanan darah tinggi dalam kehamilan terhadap terjadinya preeklampsia berat puskesmas pulau rakyat kabupaten asahan tahun 2018 dapat di tarik kesimpulan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara hipertensi dengan preeklampsia berat. Tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara hipertensi dalam kehamilan terhadap kejadian preeklampsia berat. Hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa tidak semua ibu hamil yang mengalami hipertensi dapat juga mengalami preeklampsia. | Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang tekanan darah tinggi dalam kehamilan terhadap kejadian preeklampsia berat. Desain penelitian ini adalah cross sectional. | Populasi adalah kumpulan semua individu dalam suatu batas tertentu. Kumpulan populasi yang aman dukur atau diamati ciri-cirinya disebut populasi studi. | Penelitian ini yang menjadi populasi adalah ibu hamil yang berada di wilayah kerja puskesmas pulau rakyat yaitu sebanyak 121 ibu hamil. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Gambaran pengaruh hipertensi pada kehamilan terhadap ibu dan janin serta faktor-fakto yang memengaruhinya di rsud ciawi | Ignasius hans, dkk | 2020 | Gambaran pengaruh hipertensi pada kehamilan terhadap ibu dan janin serta faktor-fakto yang memengaruhinya | Faktor usia pada ibu hamil I dapatkan usia beresiko (<20 tahun dan >35 tahun) sebanyak 33 (37,5%), IMT beresiko sebanyak 41 (46,59%), primigravida sebesar 25 (28,41%). Angka kejadian komplikasi pada ibu hamil didapatkan kejadian trombotopenia sebanyak 3 (3,41%), oenurunan fungsi ginjal sebanyak 2 (2,27%), angka kejadian komplikasi pada janin dari ibu hamil dengan hipertensi didapatkan kejadian BBLR sebanyak 25 (28,41%) dan kematian jani n sebanyak 4 (4,55%). | Studi deskriptif dilakukan terhadap 88 ibu hamil dengan hipertensi yang menjalani persalinan di rsud ciawi. | Sampel yang diambil secara judgemental non-random sampling menggunakan data rekam medis. | Data diambil adalah data terkait tekanan darah, berat badan, tinggi badan, bayi dan ibu, paritas, dan data komplikasi. Data-data tersebut disajikan dalam tabel dan diagram. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

D. Langkah IV : Identifikasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi

Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan pada kehamilan yang disertai dengan hipertensi gestasional dengan melakukan konsultasi dan kolaborasi berdasarkan referensi yang telah didapatkan. Berikut adalah matriks referensi tentang hipertensi gestasional yang di aplikasikan dalam 7 langkah. langkahIV terdiri dari kolaborasi pada hipertensi gestasional.

| No | Judul Referensi | Oleh (Sebutkan Nama) | Tahun | General Idea | Hasil | Kelemahan | Kelebihan | Perbandingan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Asuhan kebidanan pada Ny. S kehamilan trimester II dengan hipertensi gestasional. | Eka sarofah ningsih | 2019 | Tindakan kolaborasi | Pada antisipasi masalah potensial yang dilakukan berdasarkan adanya data yang mendukung masalah potensial yang mungkingtimbul adalah berpotensi terjadi preeklampsia. Identifikasi kebutuhan segera adalah berkolaborasi dengan dokter spesialis dalam penurunan tekanan darah dan pencegahan kenaikan berat badan yang berlebihan. | Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode peneliti analitik. | Desain penelitian ini juga melalui pendekatan kuantitatif secara sectional. | Peran petugas kesehatan terutamabidan sangat penting didalam memberikan penyuluhan pada ibu hamil. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Asuhan kebidanan pada Ny.P umur 32 tahun G3P2A0 dengan hipertensi gestasional di poli kebidanan rumah sakit M. yunus Bengkulu tahun 2018 | Ronelan br. Situmorang, dkk | 2018 | Antisipasi terjadinya komplikasi pada hipertensi gestasional. | Antisipasi/Tindakan segera dapat dilakukan dalam tindakan pada pasien yaitu berkolaborasi dengan dr, SpOG serta kolaborasi dengan laboratorium dan pemeriksaan tekanan darah agar tidak menimbulkan bentuk kelainan patologis. Hal ini perlu dilakukan karena jika tidak dilakukan tindakan secara cepat dapat menjadi masalah pada kesehatan ibu dan janin. | Penelitian ini merupakan penelitian bentuk laporan studi kasus yaitu dapat dilakukan dengan dengan cara meneliti sesuai permasalahan melalui suatu proses yang terdiri dari unit tunggal. | Peneliti ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif dan memusatkan perhatian pada obyek tertentu. | Semua rencana asuhan kebidanan yang ada dalam teori direncanakan semua oleh peneliti, ham ini disesuaikan dengan kebutuhan pasien. |
| 3. | Tindakan kolaborasi pada kasus hipertensi dan determinannya di Indonesia. | Ekowati | 2015 | Kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain | Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain agar dapat mendeteksi gejala-gejala komplikasi sedini mungkin, mendeteksi faktor-faktor risiko hipertensi dalam kehamilan, dan menginformasikan kepada klien. | Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan desain cross sectional. | Dalam penelitian ini akan ada hubungan antara umur, paritas, umur menarchoobesitas, riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi gestasional | Kolaborasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu dan janin. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Stress pada penyakit terhadap kejadian komplikasi hipertensi pada pasien hipertensi | Hesty titis prasetyorini | 2012 | Stress pada penyakit terhadap kejadian komplikasi | <p>Lebih dari 50% responden mengalami stress yaitu 16 responden (55%). Lebih dari 50% responden mengalami kejadian komplikasi hipertensi yaitu 18 responden (62%). Hasil uji statistik didapatkan bahwa $p=0,002$ yang berarti bahwa ada hubungan antara stress dengan kejadian komplikasi hipertensi pada pasien hipertensi di ruang rawat inap dewasa rumah sakit baptis sendiri.</p> | Desain yang digunakan adalah cross sectional, yaitu jenis penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variable independent dan dependen hanya satu kali, pada satu saat. | Populasi dalam penelitian ini adalah pasien hipertensi di ruang rawat inap dewasa rumah sakit baptis Kediri. populasi diambil berdasarkan data yang diperoleh dari instalasi rekam medis | Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampling yang dilakukan berdasarkan kebetulan, siapa saja yang ditemui, asalkan sesuai dengan persyaratan data yang di inginkan. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Hubungan antara karakteristik dan pengetahuan mengenai hipertensi dalam kehamilan dengan dengan perilaku mencegah komplikasi hipertensi | Etty komairah sambas | 2015 | Pengetahuan mengenai hipertensi dalam kehamilan dengan perilaku mencegah terjadinya komplikasi. | Dari Sembilan variable independen (delapan variable pengetahuan), hanya dua variable yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berhubungan secara signifikan dengan upaya pencegahan komplikasi dalam kehamilan, faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap upaya pencegahan komplikasi HDK berdasarkan hasil beta adalah pendidikan ibu (beta= 0,278) dengan nilai toleransi yaitu 0,896 yang artinya variable independen tidak terjadi hubungan yang saling kuat. | Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik (kualitatif) dengan pendekatan cross sectional | Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh ibu hamil dengan hipertensi dalam kehamilan, atau ibu hamil dengan gejala preeklampsia seperti tekanan darah tinggi, edema, dan protein urin yang mengikuti antenatal care di poliklinik RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya bulan November-Desember tahun 2014 sebanyak 52 orang. | Data yang dikumpulkan adalah data primer: karakteristik ibu, pengetahuan, ibu, dan upaya ibu dalam mencegah komplikasi hipertensi dalam kehamilan dengan cara menyebarkan kuesioner. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Deteksi protein urine sebagai upaya pencegahan preeklampsia | Riani naftuchan , dkk | 2020 | Upaya pencegahan komplikasi dalam kehamilan | Terdapat peningkatan pengetahuan kader aisyiyah ranting talagening kecamatan bobotsari kabupaten purbalingga provinsi jawa tengah dalam deteksi dini dan pencegahan preeclampsia pada ibu hamil serta terdapat peningkatan kesadaran dalam pemeriksaan protein urin pada ibu hamil. | Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan menggunakan media leaflet, power point, dan demonstransi. | Metode yang digunakan dalam pelatihan meliputi ceramah, Tanya jawab, diskusi, praktek pada ibu hamil, . tahapan kegiatan akan dimulai dengan icebrading, pre test, penyampaian materi, praktik pemeriksaan proteinurin menggunakan dipstick dan ditutup dengan post test. | Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari program yang ditawarkan, yang meliputi evaluasi pengetahuan serta pemahaman peserta/mitra yang dilakukan dengan cara pre test dan post test kepada seluruh peserta yang berjumlah 30 peserta |
| 7. | Tindakan pencegahan hipertensi dalam kehamilan dan promosi kesehatan | Mubarak, dkk | 2017 | Tindakan pencegahan hipertensi | Melakukan pemeriksaan antenatal dilakukan oleh tenaga yang terlatih dalam kebidanan, yaitu pembantu bidan, bidan, dokter dan perawat yang terlatih. perlu Perawatan khusus, agar persalinan dapat berlangsung dengan baik. Kehamilan menyangkut kehidupan ibu dan janin. | Jenis penelitian digunakan adalah observasional dengan menggunakan pendekatan case control study | Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang ada di rumah sakit hikmah kota makassar | Melakukan pemeriksaan antenatal care yang teratur dapat membantu untuk mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas pada ibu dan janin. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Asuhan kebidanan pada Ny.S G2P1A0 39 minggu dengan hipertensi gestasional di rumah sakit tanggerang. | Lia amelia | 2017 | Kolaborasi tindakan pada ibu hamil dengan hipertensi gestasional. | Kesimpulan yang didapatkan dari kasus diatas bahwa Ny.S setelah dilakukan kolaborasi dengan dokter yaitu tindakan oemberian nefidipin 10mg per oral. | Metode peneitian yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kasus (case study) yaitu dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus terdiri dari unit tunggal. | Teknik pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam memberikan asuhan yaitu wawancara, pemeriksaan fisik, observasi, dan dokumentasi | Pendekatan dilakukan untuk mnginterpretasikan data adalah menggunakan manajemen kebidanan, yang merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan sesuai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah melalui peneitian. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Upaya dalam mencegah terjadinya hipertensi di RSUD tugurejo | Muflihan, dkk | 2016 | Upaya tenaga kesehatan dalam mencegah terjadinya komplikasi hipertensi gestasional. | Sementara upaya yang lain dilakukan mengurangi jumlah kasus hipertensi gestasional yaitu memberikan pemeriksaan antenatal yang dilayani oleh bidan dan dokter spesialis kandungan, serta pelaksanaan home visite yang dilakukan pada ibu hamil yang tidak dating control sesuai dengan anjuran terutama pada kehamilan risiko tinggi. | Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian obseravasional analitik. | Sampel kasus dalam penlitian ini adalah sebagian ibu hail yang menderita preeclampsia yang tercatat dalam catatan medic di RSUD kabupaten brebes | Melakukan pemeriksaan antenatal secara lengkap dan melakukan kolaborasi agar dapat menekan angka kejadian hipertensi gestasional. |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | asuhan keperawatan pasca partum tindakan section caesarea atas indikasi hipertensi dalam kehamilan. | Novianti dewi, dkk | 2020 | Kolaborasi tenaga kesehatan tindakan pada kasus hipertensi gestasional. | pada tahanan pelaksanaan diagnose risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasive, penulis menemukan kesenjangan, hal ini dikarenakan pada perencanaan kolaborasi dengan dokter terkait pemeriksaan laboratorium yaitu nilai leukosit tidak dilakukan karena klien tidak terjadi tanda-tanda infeksi. | System penulisan yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode pendekatan kasus untuk memperoleh data informasi. | Penulis mengambil data pasien dengan melalui wawancara secara langsung kepadaklien, keluarga dan perawat ruangan. | Penulis melakukan pemeriksaan fisik head to toe seperti inspeksi, palpasi, perkusi, dan aukultasi bertujuan untuk mendapatkan data yang objektif. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

E. Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan

Perencanaan secara menyeluruh dan rasional terhadap masalah kehamilan yang disertai dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi yang telah didapatkan. Berikut adalah matriks referensi tentang hipertensi gestasional, yang diaplikasikan dalam 7 langkah. Langkah V terdiri dari : penatalaksanaan tentang hipertensi gestasional.

| No | Judul Referensi | Oleh (Sebutkan Nama) | Tahun | General Idea | Hasil | Kelemahan | Kelebihan | Perbandingan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kajian penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi gestasional rawat inap periode januari 2009 - desember 2011 | Lisniawati ni lu gede, dkk | 2012 | Penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi gestasional. | Metildopa atau nifedifin (antihipertensi) adalah terapi obat yang diberikan pada pasien hipertensi gestasional sebelum melahirkan.. Dosis metildopa yang digunakan adalah 3 x 250 mg sehari sedangkan dosis nifedifin adalah 3 x 10 mg sehari. Terapi antihipertensi pada pasien hipertensi gestasional baik metildopa maupun nifedipin telah berhasil mencapai target terapi | Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian merupakan penelitian deskriptif retrospektif. | Subjek penelitian ini adalah 75 rekam medic pasien hipertensi gestasional rawat inap. | Dari data rekam medic pasien hipertensi gestasional yang diperoleh pada lembar pengumpulan data kemudian dilakukan pengolahan data ada analisis data. Berdasarkan data demografi pasien, dibuat suatu tabel yang berisi karakteristik |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | pasien. |
| 2. | Hipertensi pada kehamilan | Haidir alatas | 2019 | Pengobatan hipertensi pada kehamilan. | Pengobatan hipertensi pada kehamilan dengan menggunakan obat antihipertensi ternyata tidak mengurangi atau meningkatkan risik kematian ibu, proteinuria, efek samping. Obat yang di rekomendasikan adalah labetalol, nifedipin, dan methyldopa sebagai first line terapi. | Satu study prospective, double-bind, randomized controlled trial dengan subyek wanita hamil. | Penelitian secara RCT telah dilakukan untuk membandingkan labetalol dan nifedipin pada ibu hamil | Study Cochrane systematic review berisi 5 studi melibatkan 1836 wanita membandingkan efek pemberian diuretic (thiazide) dan tanpa diuretic (control) dalam pencegahan preeclampsia. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Teknik relaksasi napas dalam tahap tekanan darah ibu hamil hipertensi trimester III | Dorothy asramila, dkk | 2017 | Teknik relaksasi napas dalam tahap tekanan darah ibu hamil dengan hipertensi | Hasil analisis penelitian yang dilakukan menghasilkan nilai p value = 0,000 ($p < 0,05$) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap perubahan tekanan darah pada ibu hamil hipertensi trimester III. Bagi pelayanan kesehatan, terapi relaksasi napas dalam dapat dijadikan terapi nonfarmakologi dalam mengatasi masalah hipertensigestasional dan preeclampsia ringan. | Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian quasi eksperimen dengan pretest-posttest without control group. | Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil hipertensii trimester III dipuskesmas kawalu kota tasikmalaya | Pemngumpulana data dilakukan ketika keadaan umum ibu dalam keadaan baik, da ibu bias diajak berkomunikasi dengan baik. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Pengaruh konsumsi tablet kalsium terhadap perubahan tekanan darah pada ibu hamil resiko tinggi hipertensi dalam kehamilan diwilayah kerja puskesmas payalombang tebing tinggi | Damayanti, dkk | 2020 | Pengaruh konsumsi tablet kalsium terhadap perubahan tekanan darah pada ibu hamil resiko tinggi hipertensi | Pemberian tablet kalsium ibu hamil dapat menurunkan 4 kali resiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan. | Jenis penelitian kuasi eksperimen dengan menggunakan pendekatan kohort prospektif yang bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh pemberian tablet kalsium pada ibu hamil dengan resiko tinggi hipertensi | Indonesia melalui kementerian kesehatan memberikan suplementasi kalsium untuk pencegahan preeclampsia bagi semua ibu hamil yang terutama yang memiliki resiko tinggi terjadinya preeclampsia dengan asupan kalsium rendah dengan dosis 1,5-2 gram perhari. | Pemberian suplementasi pada ibu hamil yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi untuk mengontrol tekanan darah dan mencegah terjadinya komplikasi. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Studi penggunaan obat antihipertensi pada wanita hamil yang didiagnosis hipertensi di rumah sakit pmi kota bogor | Lidya indhayani | 2018 | Studi penggunaan obat antihipertensi pada wanita hamil | <p>Dari 89 pasien, terdapat 43 pasien yang tidak mendapatkan pengobatan farmakologi, hanya manajemen perubahan hidup. Sejumlah 46 pasien lagi mendapatkan terapi farmakologi. Sebanyak 7 pasien mendapat terapi tentang regimen obat dan tepat dosis, sedangkan 19 pasien lainnya menggunakan kombinasi obat yang tidak tercantum dalam kombinasi obat antihipertensi yang di rekomendasikan oleh pedoman terapi baik dalam standar depkesRI maupun JNC 7. Berdasarkan data tersebut, penanganan pasien di RS PMI kota bogor belum sesuai dengan pedoman terapi yang ada.</p> | <p>Penelitian ini merupakan penelitian observasional-deskriptif yang dilakukan secara konkuren yaitu melakukan pembuatan karakter obat antihipertensi</p> | <p>Kriteria inklusi sampel pada penelitian ini meliputi wanita hamil dengan tekanan darah \geq 140/90 mmHg atau proteinuria \geq 300mg/24 jam.</p> | <p>Analisis data dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu analisis data kuantitatif dan data kualitatif .</p> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Studi eksplorasi penatalaksanaan hipertensi pada wanita melahirkan. | Sulastris | 2021 | Penatalaksanaan hipertensi pada ibu hamil. | Distribusi pengobatan yang di dapatkan ibu hamil dalam penelitian, seluruh responden mendapatkan terapi elektrolit berupa ringer laktat (RL) antihipertensi yang diberikan berupa antihipertensi yang diberikan berupa nifedipin tablet dan metildopa. Beberapa responden juga mendapatkan terapi antiinflamasi, vitamin, suolemen, antibiotic, dan pemberian hormon. Selain terapi farmakologi pasien dalam penelitian juga mendapatkan terapi non farmakologi. | Metode yang peneliti gunakan adalah deskriptif observasional atau non eksperimental, data diambil secara retrospektif dengan metode purposive sampling. | Instrument penelitian yang digunakan adalah ceklist berupa tabel dengan kolom yang berisi usia ibu, usia kehamilan, riwayat penyakit sebelum hamil, komplikasi, data laboratorium, edema dan kejang, data terapi obat yang diberikan pada pasien hipertensi kehamilan. | Hasil penelitian yang didapatkan berupa distribusi frekuensi pasien, distribusi penggunaan obat, distribusi tindakan non farmakologis, dan evaluasi tepat penggunaan tindakan farmakologis pada ibu hamil dan bersalin dengan hipertensi. |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Efektifitas terapi air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada ibu hamil hipertensi | Ummiyati muchlishatun | 2019 | Efektifitas terapi non farmakologi terhadap penurunan hipertensi pada kehamilan. | Pemberian non farmakologi berupa rendaman kaki dengan air hangat dalam kurun waktu 2 minggu mampu menurunkan tekanan darah pada ibu hamil menderita tekanan darah tinggi | Desain penelitian yang digunakan adalah repeated measures experiment (eksperimen berulang), terhadap 21 ibu hamil yang mengalami tekanan darah tinggi. | Instrument yang digunakan untuk mengukur tekanan darah adalah tensimeter digital, dan hasil pengukuran dicatat dalam lembar observasi. | Prosedur penelitian dilaksanakan dengan melakukan pengukuran sebanyak lima kali terhadap subyek yang sama. Terapi dilakukana dengan merendam kaki responden dengan air hangat (suhu 37°C-48) selama 15 menit pada jm 10.00 s/d 17.00 dengan kurun waktu selama 2 minggu. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | <p>Hubungan pengetahuan primigravida tentang hipertensi kehamilan dengan kepatuhan melakukan ANC di bps hj. Sitti Fatimah, amd.keb krian sidoarjo</p> | <p>Kurnia indriyanti purnama sari, dkk</p> | <p>2017</p> | <p>pengetahuan tentang informasi mengenai hipertensi</p> | <p>Semakin baik pengetahuan ibu tentang hipertensi kehamilan maka semakin teratur ibu melakukan pemeriksaan ANC.</p> | <p>Penelitian ini rancangan penelitian yang digunakan adalah teknik cross sectional yaitu penelitian peneliti melakukan observasi atau pengamatan variable pada satu (point time approach)</p> | <p>Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil primigravida yang melakukan pemeriksaan kehamilandi bps hj.sitti Fatimah, amd.keb</p> | <p>Teknik pengambilan sampel adalah consecutivy sampling. Instrument digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan lembar observasi.</p> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Pengetahuan pentingnya nutrisi dan pemeriksaan hipertensi gestasional pada multiple gestasional | Suprianti ningsih, dkkk | 2018 | Pengetahuan tentang pentingnya nutrisi dan pemeriksaan hipertensi gestasional. | Berdasarkan hasil penguabdian yang dilakukan tentang pentingnya pengetahuan nutrisi dan pemeriksaan hipertensi gestasional dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil posttest menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dari hasil pretest sejumlah (75,0%) dan hasil posttest sejumlah (100,0%). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan tentang pentingnya nutrisi dan pemeriksaan hipertensi pada multiple gestasional sebelum dan sesudah seminar. | Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Jenis metode eksperimen semu (quasi experiment) yang digunakan oleh jenis one group pretest-posttest. | Pada penelitian ini penulis berusaha menyelidiki pengaruh suatu perlakuan yang sengaja ditimbulkan terhadap suatu subjek. | Melakukan pretest untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pentingnya nutrisi dan pemeriksaan hipertensi gestasional. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Kehamilan dengan hipertensi gestasional | Wirda elya sari | 2015 | Pengobatan dengan hipertensi gestasional. | Pengobatannya tidak dijelaskan secara spesifik menurut satgas gestosis, namun dapat diberikan antihipertensi bila memenuhi indikasi, serta tatalaksanaan terhadap terminasi kehamilannya adalah konservatif, yang sedapat mungkin diusahakan pervaginam. | Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif | Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya. | Pembagian hipertensi dalam kehamilan ialah hipertensi kronik, preeclampsia, eklamsi, hipertensi kronik dengan superimposed preeklamsi, hipertensi gestasional. |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

F. Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan

Mengidentifikasi pelaksanaan dari semua rencana terkait masalah kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi yang telah didapatkan. Berikut adalah matriks referensi tentang hipertensi gestasional, yang diaplikasikan dalam 7 langkah. Langkah VI terdiri dari implementasi asuhan

| No | Judul Referensi | Oleh (Sebutkan Nama) | Tahun | General Idea | Hasil | Kelemahan | Kelebihan | Perbandingan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengaruh pola makan dengan kejadian hipertensi grade 1 dan 2 pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas kamonji kecamatan palu barat. | Risky wulan taslim, dkk | 2016 | Hubungan pola makan dan stress dengan hipertensi grade 1 dan 2 | Sebagian besar pola makan pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas kamonji kecamatan palu barat berada pada kategori pola makan tidak baik (77,1%). Sebagian besar stress pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas kamonji kecamatan palu barat berada pada kategori stress (28,6%). Sebagian besar responden mengalami hipertensi grade 1 dengan presentase 60%, sedangkan presentase hipertensi grade 2 sebesar 40%. Terdapat hubungan antara pola makan dan stress dengan kejadian | Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian cross sectional. | Pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 35 responden dilakukan menggunakan uji static fisher exact dengan derajat kepercayaan 95% | Adapun frekuensi makanan yang memicu timbulnya kejadian hipertensi dengan pola makan tidak baik seperti makan daging, berlemak, makan gorengan, makanan yang mengandung garam > 3 kali dalam |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | hipertensi grade 1 dan 2 pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas kamonji kecamatan palu barat. | | | seminggu sebesar 70% |
| 2. | Upaya pengendalian hipertensi pada kehamilan. | Heni febriani | 2021 | Upaya pengendalian hipertensi pada kehamilan. | Ibu-ibu telah mampu melakukan tindakan pencegahan apabila ada kemungkinan terjadi hipertensi selama kehamilan. | Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan dengan metode ceramah. | Materi yang disampaikan tentang hipertensi dalam kehamilan meliputi pengertian, faktor risiko, cara pencegahan dan deteksi dini. | Penyuluhan ini memberikan informasi tentang hipertensi dalam kehamilan. |
| 3. | Sikap terhadap kepatuhan ANC hipertensi dengan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja puskesmas doro II kabupaten pekalongan. | Pusipita angraeni | 2019 | Kepatuhan pemeriksaan ANC | Mengontrol hipertensi merupakan kemampuan pasien untuk patuh terhadap instruksi kesehatan. Dari data WHO bahwa hipertensi 60% dari penderita hipertensi yang benar-benar mengikuti petunjuk tenaga kesehatan dan sangat sedikit pasien yang biasa diterapkan secara efektif. | Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analitik. | Desain penelitian ini juga melalui pendekatan kuantitatif secara cross-sectional. | Pemberian pengobatan pada ibu guna untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu bersalin dan bayi. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet rendah garam dan keteraturan control tekanan darah pada penderita hipertensi di poliklinik RSUD tugurejo semarang | Priantini HR,dkk | 2018 | Pengaruh dukungan keluarga dalam mengatasi hipertensi | Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada 45 responden penderita hipertensi di ruang poliklinik RSUD tugurejo semarang dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antar dukungan keluarga dengan kepatuhan diet rendah garam di poliklinik rsud tugurejo semarang ($p=0,017$) dan nilai r sebesar 0,608 yang menunjukkan bahwa korelasinya kuat. Tidak ada hubungan keluarga dengan keteraturan control tekanan darah di poliklinik rsud tugurejo semarang ($p=0,697$) dan nilai r sebesar 0,100 yang menunjukkan bahwa korelasi sangat lemah. | Studi kasus ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan pendekatan continuity of care diberikan pada ibu hamil. | Jenis data primer . cara pengumpulan data anamnesa, observasi, pemeriksaan dan dokumentasi . analisa data dengan membandingkan antara data yang diperoleh dengan teori yang ada. | Menghindari makanan yang asin secara berlebihan dan kadar kole strol serta meningkatkan porsi dalam mengkonsumsi makanan bergizi seimbang seperti buah dan sayur. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Pelaksanaan standar pelayanan minimal pada penderita hipertensi | Isnia nur maulana | 2020 | Pelaksanaan standar Pelayanan hipertensi | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses perencanaan sudah di siapkan sesuai standar pelayanan minimal baik dari puskesmas, dinkes setempat maupun kemenkes. Pendataan sudah dilaksanakan melalui ke tiga program terkait pelayanan hipertensi.pada proses pelaksanaan penemuan kasus dan pendataan diperoleh darimasing-masing program pelayanan hipertensi.</p> <p>Pelayanan kesehatan sesuai standar sebagian besar sudah diterapkan tetapi media KIE tidak diterapkan pada pasien hipertensi saat edukasi maupun konseling.</p> | Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif | Dalam penelitian ini menggunakan proses yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. | KIE yang dilakukan guna untuk mencegah atau menekan terjadinya angka hipertensi pada ibu hamil. |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Penatalaksanaan hipertensi dalam kehamilan | yudasmara | 2017 | Penatalaksanaan hipertensi dalam kehamilan | Pelaksanaan hipertensi dalam kehamilan ini dapat di mulai dengan mengurangi aktifitas berat seperti mengangkat benda yang berat dan menambah istirahat, untuk pengobatan farmakologis dapat digunkan metildopa atau nefidipin sebagai obat yang terpilih pada kasus hipertensi kronik dan hipertensi gestasional. | Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan case control | Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil berada di wilayah kabupaten semarang. | Pemberian obat antihipertensi efektif dapat mencegah terjadinya komplikasi pada ibu. |
| 7. | Pengembangan model peningkatan pemanfaatan pelayanan antenatal dan persalinan oleh keluarga miskin di pedesaan. | arifin | 2018 | Peningkatan Pemanfaatan pelayanan antenatal | Upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus hipertensi gestasional yaitu upaya peningkatan melayani pemeriksaan antenatal yang dilayani oleh bidan dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, serta melakukan pengembangan model pelayanan home visite yang dilakukan pada ibu hamil yang tidak dating control sesuai dengan anjuran terutama pada kehamilan resiko tinggi. | jenis penelitia yang digunakan adalah penelitian observasional analitik. | Sampel kasus dalam penelitian ini adalah sebagian ibu hamil yang menderita preeclampsia yang tercatat dalam medic di RSUD kabupaten brebes | Kejadian hipertensi gestasional dapat dicegah dengan memberikan nasehat tentang diet makanan, cukup istirahat dan pengawasan antenatal. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di poliklinik Obs-Gin rumah sakit jiwa Prof.Dr.V.L, ratumbuysang kota manado | Nelawati radjamuda, dkk | 2016 | Mengetahui faktor resiko | Sebagian besar ibu hamil memang mengalami hipertensi yaitu pada umur <20 tahun 56,5% primipara 52,7%, dan ibu hamil dengan memiliki riwayat hipertensi 55,6%. Terdapat hubungan umur dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil, terdapat hubungan antara paritas dan terdapat hubungan antara riwayat hipertensi dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. | Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. | Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil dalam kehamilan yang berjumlah 207 ibu hamil di poliklinik Obs-Gin RSJ Prof.Dr.V.L, ratumbuysang kota manado. | Untuk membantu mengenali dan mencegah risiko terjadinya hipertensi gestasional terjadinya hipertensi gestasional, petugas kesehatan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan ANC |
| 9. | Pengaruh pola makan dan kecukupan istirahat tidur dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di wilayah biromaru | Corry S, dkk | 2016 | Pengaturan pola hidup terhadap pasien hipertensi | Mengatur pola makanan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kandungan zat gizi dalam konsumsi makanan yang memenuhi kecukupan yang dianjurkan merupakan salah satu upaya untuk penanggulangan dan pencegahan terjadinya kenaikan tekanan darah. | Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numeric dari pada naratif dengan menggunakan metode cross sectional | populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 69 ibu hamil sesuai data dari puskesmas sigi-biromaru | Pola makan yang rendah energy, protein, dan kalsium, serta pelayanan antenatal care berhubungan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Dukungan keluarga terhadap kepatuhan control pengobatan pasien hipertensi dalam kehamilan | Lis nurhayati, dkk | 2019 | Dukungan keluarga terhadap kepatuhan pengobatan pasie HDK | Pada keluarga Ny.S kepatuhan berobat didukung oleh keluarganya yang sering memberitahukan bahwa penyakit hipertensi dapat sembuh jika Ny.S mau berobat secara rutin dan mengingatkan Ny.S untuk berobat. Keluarga juga selalu memberikan dukungan untuk melakukan control ke puskesmas dan peduli dengan keadaan serta selalu memberikan motivasi kepada pasien . | Metode yang digunakan dalam penulisan publikasi ilmiah ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dimana metode ini bersifat mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. | Dalam memperoleh data, penulisan menggunakan beberapa cara diantaranya melalui wawancara kepada pasien dan keluarga, wawancara adalah suatu komunikasi yang direncanakan untuk mengajak klien dan keluarga bertukar pikiran serta perasaan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi klien | Melakukan observasi yaitu metode yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada klien untuk mengetahui perkembangan yang ada pada keadaan klien. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

G. Langkah VII: Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Mengevaluasi semua perencanaan dan pelaksanaan kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi yang telah didapatkan. Berikut adalah matriks referensi tentang hipertensi gestasional yang di aplikasikan dalam 7 langkah. langkahVII terdiri dari evaluasi pada hipertensi gestasional

| No | Judul Referensi | Oleh (Sebutkan Nama) | Tahun | General Idea | Hasil | Kelemahan | Kelebihan | Perbandingan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Evaluasi ketepatan penggunaan obat antihipertensi pada ibu hamil di instalasi rawat inap RSUD pandan arang boyolali periodejanuari-september tahun2016 | Ikhoulfiria alfalasifah. | 2017 | Evaluasi ketepatan penggunaan obat antihipertensi pada ibu hamil | Gambaran terapi antihipertensi adalah terapi tunggal nifedipin sebanyak 21 pasien (53,84%), metildopa sebanyak 4 pasien (10,26%) dan terapi kombinasi berupa nifedipin dengan metildopa sebanyak 14 pasien (35,90%). | Penelitian ini menggunakan metode deskriptif secara observasional (non eksperimental | Pengambilan data secara retrospektif dengan metode purposive sampling. | Data yang diperoleh dianalisi berdasarkan ketepatan indikasi, ketetapan pasien, ketetapan obat, ketetapan dosis. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Evaluasi kualitas pelayanan terhadap pasien rawat jalan peserta BPJS di RSUD penembahan senopati bantu | Fidela firwan firdaus, dkk | 2016 | Evaluasi pelayanan terhadap pasien | Kepuasan pasien rawat jalan peserta BPJS terhadap kualitas pelayanan RSUD penambahan senopati bantu secara umum sesuai dengan teori servqual, realibility atau kehandalan, jaminan, wujud nyata, perhatian, dan kepedulian. Kepuasan pasien yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam memberikan pelayanan. kesehatan yang bemutu mempengaruhi pasien dalam hal menerima perawatan. | Jenis penelitian yang digunakann adalah observasional dengan menggunakan pendekatan case control study | Subjek penelitian ini adalah pasien peserta bpjs yang sebelumnya sudah mempunyai jaminan kesehatan. | Pemeriksaan antenatal care secara rutin efektif dalam mencegah terjadinya komplikasi pada ibu dan janin. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Evaluasi penyakit pada masa kehamilan dalam kita selekta kedokteran | Mansjoer, dkk | 2017 | Evaluasi rencana asuhan yang telah diberikan | Pemeriksaan antenatal yang dilakukan secara adekuat, dan penyuluhan tanda bahaya selama kehamilan, dan dapat diberikan pengobatan yang cukup supay hiertensi gestasional tidak bertambah menjadi preeclampsia ringan yang dapat mempengaruhi kesejahtraan ibu maupun janin. | Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian analitik. | Desain penelitian ini juga melalui pendekatan kuantitatif secara cross sectional. | Sebagai bidan harus segera sigap dalam menghadapi dan menangani kasus tersebut guna untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu bersalin dan bayi. |
| 4. | Evaluasi makan ibu hamil | marbun | 2015 | Evaluasi asupan nutrisi | Mengevaluasi keadaan ibu dengan menilai cara ibu dalam mengatasi rasa pusing, yaitu dengan makan teratur dan bergizi seimbang, mengatur pola makan yang sehat seperti rendah garam, rendah kolestrol, dan rendah hidrat arang serta mengkonsumsi buah-buah dan sayuran-sayuran. | Studi kasus ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan pendekatan contrinuty of care diberikan pada ibu hamil. | Jenis data primer .cara pengumpulan data ananesa, observsi, pemeriksaan dan dokumentasi. Analisa data dengan membandingkan antara atau yang diperoleh dengan teori yang ada. | Dengan asupan nutrisi yang baik dapat membantu mengurangi keluhan yang dialami oleh ibu. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Evaluasi faktor resiko kejadian hipertensi kehamilan di RSKD ibu dan anak siti Fatimah Makassar tahun 2015 | Langelo, dkk | 2015 | Evaluasi pencegahan hipertensi | Menilai kembali penanggulangan dan pencegahan terjadinya kenaikan tekanan darah pada ibu hamil yang pada akhirnya dapat membantu menurunkan angka kematian ibu. | Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif | Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 69 ibu hamil sesuai data dari puskesmas sigi-biromaru | Terjadi penurunan tekanan darah pada ibu jika mengikuti semua anjuran bidan. |
| 6. | Evaluasi cara penurunan tekanan darah pada klien hipertensi primer melalui terapi hipnosis | winarto | 2017 | Evauasi perawatan HDK | Menerapkan perawatan dan manajemen yang tepat pada kasus agar tidak terjadi komplikasi pada ibu dan calon bayinya. | Penelitian observasional dengan rancangan case control. | Total kasus ada 45 orang (ibu melahirkan pada usia kehamilan 20-36 minggu) dan control ad 45 orang (ibu melahirkan bayi tunggal pada usia kehamilan ≥ 37 minggu) | Menjalankan pelayanan kegawat daruratan kebidanan di rumah sakit atau puskesmas dalam penanganan kasus kegawat daruratan kebidanan. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Evaluasi penggunaan obat antihipertensi pada pasien ibu hamil di instalasi rawat inap rsia muslimat jombang tahun 2018 | Siska fatkhul hidayat, dkk | 2020 | Evaluasi penggunaan obat antihipertensi pada pasien ibu hamil | Pasien yang mendapat terapi obat antihipertensi sebanyak 32,5% pasien yang mendapat terapi obat antihipertensi jenis furosemid sebanyak 23% dan yang mendapat obat antihipertensi jenis nifedipin sebanyak 77%. Dosis terapi obat antihipertensi jenis furosemid sebanyak 20-80 mg dan dosis terapi obat antihipertensi jenis nifedipin sebanyak 5-20mg. | Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif secara observasional non ekperimental. | Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah semua pasien ibu hamil yang terdiagnosa hipertensi dan mendapatkan terapi pengobatan antihipertensi di rumah sakit ibu dan anak muslimat jombang. | Analisis data pada penelitian ini merupakan dekriptif non eksperimental yaitu meliputi pengambilan data kualitatif dan data kuantitatif. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Asuhan kebidanan pada Ny.P umur 32 tahun G3P2A0 dengan hipertensi gestasional di poli kebidanan rumah sakit M. yunus Bengkulu tahun 2018 | Ronaler br situmorang, dkk | 2018 | Evaluasi asuhan pada ibu hamil dengan hipertensi gestasional. | Pada evaluasi kebidanan tercapainya keberhasilan dari kriteria yang diterapkan pada criteria apa yang hendak dicapai, waktu pencapaian serta kondisi pasien, tingkat penyakit serta kerjasama peneliti, keluarga dan tim kesehatan lainnya sehingga di dapatkan asuhan kebidanan yang optimal | Penelitian ini merupakan penelitian bentuk laporan studi kasus yaitu dapat dilakukan dengan cara meneliti sesuai permasalahan melalui suatu proses yang terdiri dari unit tunggal. | Peneliti ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif dan memusatkan perhatian pada obyek tertentu. | Semua rencana asuhan kebidanan yang ada dalam teori direncanakan semua oleh peneliti, ham ini disesuaikan dengan kebutuhan pasien. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Evaluasi tahapan dianosa pada pasien hipertensi | Sitepu yohana. | 2016 | Evaluasi tahapan diagnose pada pasien hiertensi | Evaluasi adalah penelitian efektifitas terhadap intervensi keperawatan yang berhubungan dengan hasil perekam EKG, keluhan, dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan hasil normal. Dalam evaluasi perawat melakukan pengkajian ulang tentang keluhan nyeri pada dada dan perilaku klien setelah melakukan implantasi dan intervensi, evauasi harus dilakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara dengan pasien. | Penelitian ini menggunakan penelitian kuitatif dengan jenis peneliti server analitik, dan menggunakan pendekatan cross sectional dimana pengumpulan data, baik variable independen dan variable dependen dilakukan secara bersama-sama. | Penelitian ini untuk mengetahui pengkajia pada pasien hipertensi dan mengetahui diagnose pada pasien hipertensi. | Mengetahui tahapan diagnosa hipertensi pada pasien dan mengetahui asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami hipertensi |
|----|-------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Evaluasi kasus hipertensi dalam kehamilan di kalangan masyarakat | widiyanti | 2018 | Mengevaluasi kasus hipertensi | Memperhatikan pola dan tingkat konsumsi makanannya sehari-hari yang membuat timbulnya berbagai penyakit degenerative terlebih pada ibu hamil yang membuat angka morbiditas dan mortalitas menjadi semakin tinggi. | Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat analitik observasional dengan jenis rancangan penelitian cross sectional. | Besarnya sampel dihitung berdasarkan rumus penentuan besar sampel yaitu sebanyak 55 orang lansia yang bersedia untuk diwawancarai. | Makanan yang dapat mencegah hipertensi yang sering dikonsumsi yaitu jagung, ikan air tawar, tempe, tomat, buah pisang, dan kacang hijau. Sedangkan jenis makanan pemicu hipertensi yang sering dikonsumsi responden yaitu: daging, ikan asin dan biskuit. |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telaah *Evidence Based Learning* Asuhan 7 Langkah Varney Berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan pada kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi yang telah di temukan. Dalam hal ini pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan asuhan kebidanan dengan 7 langkah varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

1. Langkah 1 : Identifikasi Data Dasar

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan mengumpulkan semua referensi yang berkaitan dengan data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien, riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium (Manguji, 2012: 5).

Dari hasil telaah literatur yang didapatkan pada kasus kehamilan dengan hipertensi gestasional dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi lengkap mengenai hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional adalah kenaikan tekanan darah yang hanya dijumpai dalam kehamilan

sampai 12 minggu pasca persalinan, tidak dijumpai keluhan dan tanda-tanda preeklampsia lainnya. Diagnosa akhir ditegakkan pasca persalinan (Fadlun, dan Achmad, 2014: 50).

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang direklarifikasi sebagai transient jika bukti untuk preeklampsia yang tidak muncul, dan tekanan darah kembali normal setelah 12 minggu postpartum. Protein urian adalah penanda yang mendefinisikan sistem kebocoran endotel luas, yang menjadi ciri sindrom preeklampsia. Meskipun demikian, ketika tekanan darah meningkat drastis, sangat berbahaya untuk ibu dan janin jika kita mengabaikan peningkatan ini hanya karena protein urin belum muncul seperti yang Chesley (1985) tegaskan, 10 persen dari kejang eklampsia terjadi sebelum protein urin diidentifikasi (Setiawati, Dewi, 2013: 144).

Terdapat banyak faktor risiko untuk terjadi hipertensi gestasional yang dapat dikelompokkan dalam faktor risiko sebagai berikut :

a. Primigravida

Ibu hamil yang masuk dalam primigravida dianggap sebagai salah satu faktor risiko untuk mengalami hipertensi gestasional menurut teori yang mengatakan bahwa angka kejadian untuk primigravida, muda maupun tua lebih tinggi.

Adapun teori intoleransi imunologik yang menjelaskan hal tersebut bahwa dugaan faktor imunologik berperan terhadap terjadinya hipertensi gestasional terbukti dengan fakta bahwa primigravida

mempunyai resiko lebih besar terjadinya hipertensi gestasional jika dibandingkan dengan multigravida. Hal ini karena adanya respons imun menolak adanya hasil konsepsi yang bersifat asing. Sehingga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya hipertensi gestasional (Jumaiza, dkk, 2018:133).

b. Hiperplasentosis

Pada kehamilan normal plasenta juga melepaskan debris trofoblas sebagai sisa-sisa proses apoptosis trofoblas, akibat reaksi stres oksidatif. Berbeda dengan proses apoptosis pada hipertensi gestasional, dimana pada hipertensi gestasional terjadi peningkatan stres oksidatif, sehingga produksi debris apoptosis juga meningkat. Makin banyak sel trofoblas plasenta misalnya molahidatidosa, kehamilan multipl, diabetes melitus, hidrops fetalis, bayi besar, maka stres oksidatif akan sangat meningkat, sehingga jumlah sisa debris trofoblas juga makin meningkat sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala hipertensi gestasional (Prawirohardjo, Sarwona, 2014: 536-537).

c. Umur yang ekstrim

Umur ibu pada waktu hamil merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelangsungan kehamilan dan juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya hipertensi.

Umur ibu yang terlalu muda (kurang dari 20 tahun) memiliki resiko yang besar untuk terjadinya hipertensi, hal ini disebabkan karena ibu yang hamil pada usia yang terlalu muda dari segi biologis

perkembangan alat-alat reproduksinya yang belum optimal sedangkan pada usia tua (lebih dari 35 tahun) akan menambah terjadinya komplikasi kehamilan, penelitian menunjukkan bahwa dengan bertambahnya umur ibu mengakibatkan absorpsi tubuh cenderung memburuk dan alat reproduksinya sudah mulai degenerasi sehingga memungkinkan terjadinya komplikasi.

Dengan bertambahnya umur, resiko terkena hipertensi menjadi lebih besar sehingga prevalensi hipertensi dikalangan usia lanjut cukup tinggi. Tingginya hipertensi sejalan dengan bertambahnya umur, hal ini disebabkan oleh perubahan struktur pada pembuluh darah menjadi lebih kaku, sebagai akibat adalah meningkatnya tekanan darah sistolik (Sukfitrianty, dkk, 2016: 83).

d. Riwayat keluarga yang pernah mengalami preeklampsia dan eklampsia

Hipertensi seperti banyak kondisi kesehatan lain, terjadi dalam keluarga. Jika salah satu (dua orang dari) orang tua atau saudara kandung menderita hipertensi maka peluang untuk terjadinya hipertensi sangat besar. Penelitian menunjukkan bahwa 25% dari kasus hipertensi esensial dalam keluarga mempunyai dasar genetik. Namun demikian, hal ini tidak berarti sesuatu yang pasti. Beberapa kesamaan yang tampak pada banyak keluarga justru mungkin merupakan dampak pengaruh lingkungan, pola makan dan keterampilan dalam menghadapi masalah (Cessy,2010)

e. Penyakit Ginjal

Hipertensi dalam kehamilan mengakibatkan perubahan pada beberapa organ tidak terkecuali pada organ ginjal. Secara umum hipertensi dalam kehamilan menyebabkan terganggunya fungsi ginjal baik prenatal ataupun direnal.

Pada hipertensi dalam kehamilan terjadi vasokonstriksi, yang mengakibatkan terjadinya penurunan aliran darah ke ginjal, sehingga laju filtrasi glomerulus (LFG) menurun dan laju ekskresi kreatinin dan urea juga menurun. Selain itu, pada bagian renal terjadi perubahan parenkim ginjal, mengalami pembesaran glomerulus yang diikuti dengan pembengkakan sel endotel dan hilangnya fenestra endotel glomerulus. Kedua hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya akumulasi kreatin dan urea dalam cairan tubuh dan meningkatkan konsentrasinya dalam plasma (Casey, Aggif, 2010: 18).

f. Obesitas

Kelebihan berat badan (obesitas) dan hipertensi sering beriringan, karena kenaikan berat badan pada ibu hamil melebihi 10-15 kg berat badan normal akan membuat jantung bekerja lebih keras. Obesitas akan membawa resiko penyakit yang lain seperti preeklampsia, diabetes gestasional, dan hipertensi gestasional. Obesitas yang terjadi pada saat kehamilan beresiko tinggi mempunyai peluang 5.140 kali mengalami hipertensi pada kehamilan dibandingkan dengan

ibu yang tidak obesitas pada saat kehamilan (Uli Basana, Lely Desi, dkk, 2017).

2. Langkah II: Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan semua referensi yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosa atau masalah (Manguji, 2012: 5).

Hipertensi gestasional merupakan hipertensi yang berkembang pada bagian akhir kehamilan, tidak berhubungan dengan protein urin atau gambaran preeklampsia dan akan menghilang setelah 12 minggu postpartum. Keadaan ini bisa menandakan akan terjadi hipertensi kronik pada masa yang akan datang, tetapi mempunyai hubungan dengan hasil yang baik terhadap ibu dan janin (Fitriani, Rini, 2014: 162).

Dari hasil telaah literature yang didapatkan pada pasien yang mengalami hipertensi gestasional umumnya memiliki tekanan darah yang melebihi batas normal, di mana ia memiliki tekanan darah >140/90 mmHg, atau mengalami peningkatan pada sistolik ≥ 140 mmHg dan diastolik sebesar ≥ 90 mmHg, biasanya pasien mengalami hipertensi pertama kalinya pada umur kehamilan di atas 20 minggu, tanpa disertai dengan adanya protein urin, tekanan darah kembali normal sebelum 12 minggu postpartum, diagnosa hanya dibuat pada postpartum dan memiliki tanda-tanda atau gejala preeklamsia.

3. Langkah III: Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini merupakan langkah ketika melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan harus waspada menghadapi diagnosis/masalah potensial yang benar-benar terjadi (Jannah, 2012: 206-207).

Pada langkah ini yaitu mengantisipasi diagnosa/masalah potensial di susun berdasarkan masalah yang dapat beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan pada ibu hipertensi gestasional. Adapun masalah potensial berdasarkan hasil telaah literatur yang didapatkan bahwa masalah potensial adalah resiko terjadinya preeklamsia ringan. Pada janin pertumbuhan terhambat, kematian janin, persalinan prematur dan solusio plasenta.

Perempuan yang mengalami hipertensi gestasional mempunyai resiko tinggi terjadinya komplikasi berat seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit pembuluh darah otak atau pun gagal organ hingga kematian. Terhadap janin dapat terjadi pertumbuhan janin dalam rahim terhambat, sehingga menyebabkan kelahiran sebelum waktunya dan kematian janin dalam rahim (KJDR).

4. Langkah IV: Identifikasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi

Pada langkah ini, yang dilakukan oleh bidan adalah mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter

untuk konsultasi atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien. (Mangkuji, 2012: 6).

Dari hasil telaah literature yang didapatkan pada kehamilan gestasional yaitu melakukan tindakan segera untuk melakukan konsultasi, kolaborasi segera dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.

Penanganan segera pada kasus ini adalah melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter obgyn untuk mencegah terjadinya komplikasi hipertensi lebih lanjut, kolaborasi dengan dokter ongin dalam pemberian obat antihipertensi seperti metildopa atau nepidipin. Serta kolaborasi dengan laboratorium untuk mendeteksi perkembangan penyakit hipertensi menjadi preeklampsia dengan cara memeriksa adanya protein urin dan pemeriksaan tekanan darah agar tidak menimbulkan bentuk kelainan patologis.

5. Langkah V: Rencana Tindakan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh berdasarkan langkah sebelumnya. Semua perencanaan yang dibuatkan harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori *Up To Date*, perawatan berdasarkan bukti (*evidence based care*) (Jannah, 2012: 208-209).

Penatalaksanaan yang dilakukan pada kasus hipertensi gestasional berdasarkan hasil telaah literature yang didapatkan pada kehamilan gestasional yaitu melakukan memantau keadaan ibu, ajurkan ibu untuk mengurangi aktifitas berat seperti mengangkat beban yang berat, menambah istirahat, hindari situasi yang dapat mencetuskan stres dimana stres jelas memainkan peranan penting dalam hipertensi.

Diet terhadap makanan yang tinggi protein seperti ikan, telur, tahu, tempe dan kacang-kacangan. Rendah hidrat arang seperti buah dan sayur sayuran. Rendah lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, ikan segar dan keju. Melakukan pengawasan terhadap kehidupan dan pertumbuhan janin dengan USG, anilisis protein urin dan pemberian obat antihipertensi,

6. Langkah VI: Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang diuraikan pada langkah kelima di atas dilaksanakan secara efisien dan aman. Realisasi dari perencanaan dapat dilakukan oleh bidan, pasien, atau anggota keluarga lain. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab atas terlaksananya seluruh perencanaan (Jannah, Nurul, 2012: 209).

Implementasi yang diberikan pada ibu berdasarkan hasil telaah literatur yang didapatkan yaitu menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menyampaikan hal-hal yang dianggap penting, agar ibu dapat

mengetahui perkembangan penyakit yang diderita serta merupakan tujuan utama pelayanan antenatal. Jelaskan penyebab terjadinya hipertensi gestasional agar ibu tahu cara mengatasi mioma uteri yang diderita. Dan anjuran ibu untuk melakukan pemeriksaan secara rutin disamping itu ibu harus menjaga pola nutrisi. Istirahat yang cukup serta kebersihan diri yang harus terjaga.

7. Langkah VII: Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat di anggap efektif juga memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Adapun kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut efektif sedangkan sebagian belum efektif.

Pada prinsip tahapan evaluasi berdasarkan hasil telaah literature yang didapatkan adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai ke efektifan tindakan yang diberikan dan keberhasilan dapat dilihat dari dari kondisi ibu. Evaluasi yang dilakukan pada kasus hipertensi gestasional yaitu antara lain keadaan umum, tanda-tanda vital, tanda-tanda syok, tanda bahaya pada kehamilan dan nifas atau masalah potensial yang kemungkinan akan terjadi.

B. Implantasi Kebidanan

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa disertai protein urin dan hipertensi menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan atau kehamilan dengan tanda-tanda preeklampsia tetapi tanpa protein urin (Prawirohardjo, Sarwono, 2014: 532).

Hipertensi gestasional adalah kenaikan tekanan darah yang hanya dijumpai dalam kehamilan sampai 12 minggu pasca persalinan, tidak dijumpai keluhan dan tanda-tanda preeklampsia lainnya. Diagnosa akhir ditegakkan pasca persalinan (Fadlun, dan Achmad, 2014: 50).

Hipertensi gestasional yang terjadi dapat menimbulkan komplikasi jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat seperti resiko terjadinya preeklampsia ringan. Pada janin pertumbuhan terhambat, kematian janin, persalinan prematur dan solusio plasenta, penyakit kardiovaskuler, penyakit pembuluh darah otak atau pun gagal organ hingga kematian. Terhadap janin dapat terjadi pertumbuhan janin dalam rahim terhambat, sehingga menyebabkan kelahiran sebelum waktunya dan kematian janin dalam rahim (KJDR).

Pencegahan yang dapat dilakukan pada pasien dengan hipertensi gestasional berdasarkan dari hasil telaah literature yang didapatkan yaitu memantau keadaan ibu, ajurkan ibu untuk mengurangi aktifitas berat seperti mengangkat beban yang berat, menambah istirahat, hindari situasi yang dapat mencetuskan stres dimana stres jelas memainkan peranan penting dalam hipertensi.

Diet terhadap makanan yang tinggi protein seperti ikan, telur, tahu, tempe dan kacang-kacangan. Rendah hidrat arang seperti buah dan sayur sayuran. Rendah lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, ikan segar dan keju. Melakukan pengawasan terhadap kehidupan dan pertumbuhan janin dengan USG, analisis protein urin dan pemberian obat antihipertensi.



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penulisan literatur review pada kehamilan dengan hipertensi gestasional serta menghubungkan dengan teori dan Avidance Based maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu :

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan identifikasi data dasar pada ibu yang mengalami hipertensi gestasional berdasarkan referensi maka didapatkan bahwa hipertensi gestasional adalah kenaikan tekanan darah yang hanya dijumpai dalam kehamilan sampai 12 minggu pasca persalinan, tidak dijumpai keluhan dan tanda-tanda preeklampsia lainnya. Diagnosa akhir ditegakkan pasca persalinan
2. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa / masalah aktual pada ibu yang mengalami hipertensi gestasional berdasarkan referensi maka didapatkan diagnosa aktual dilihat dari keadaan klinis, hasil pemeriksaan antenatal dan pemeriksaan laboratorium.
3. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa / masalah potensial pada kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi maka didapatkan diagnosa potensial diantisipasi terjadinya KJDR, kelahiran premature, gagal organ bahkan kematian.
4. Telah dilakukan pengidentifikasian tindakan segera dan kolaborasi pada kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi yang

didapatkan maka tindakan segera dilakukan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium lengkap, USG dan pemberian obat antihipertensi untuk memperbaiki keadaan ibu dan mencegah terjadinya komplikasi.

5. Telah dilakukan pengidentifikasian tindakan asuhan pada kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi maka didapatkan tindakan asuhan sesuai dengan intervensi yaitu melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Memperbaiki pola nutrisi ibu serta memberikan pengetahuan kepada ibu mengenai hipertensi gestasional
6. Telah dilakukan evaluasi asuhan kebidanan pada kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi maka didapatkan hal-hal yang harus di evaluasi yaitu penanganan kehamilan dengan hipertensi gestasional agar tidak menimbulkan komplikasi pada ibu dan janinnya.

B. Saran

Melihat besarnya efek yang ditimbulkan dengan adanya masalah kehamilan dengan hipertensi gestasional yang akan berdampak pada buruknya keadaan ibu dan janinnya maka perlu diberikan tindakan yang tepat dan segera untuk mengantisipasi masalah tersebut. Oleh karena itu, adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya masalah pada ibu yang mengalami kehamilan dengan hipertensi gestasional maka perlu peningkatan kualitas pelayanan

ANC dan pertolongan yang cepat dan tepat, sehingga dapat segera diantisipasi kemungkinan masalah lain yang dapat terjadi.

Seorang bidan harus dapat menilai dan mengetahui penyulit-penyulit yang dapat terjadi serta memberikan tindakan yang efektif dan efisien



DAFTAR PUSTAKA

- Asramia Dorothy, dkk (2017) “*teknik relaksasi nafas dalam terhadap tekanan darah pada ibu hamil hipertensi gestasional*”.
- A.Arnianti. gambaran kejadian hipertensi pada ibu hamil di RSKD ibu dan anak pertiwi Makassar. Jurnal kesehatan Vol. 4 No. 7, januari. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/article/download/5747/4513>, 2016.(Dinkes tanggal, 28 januari 2019)
- Alfiana, dkk. *Faktor Resiko Kejadian Hipertensi dalam Kehamilan*. Jurnal Of Midwifery Volume 6. Nomor 2 Oktober. <https://jurnal.unived.php/JM/article/view/631>, 2018. (Diakses Tanggal 28 Februari 2019).
- Almina, dkk. *Pengaruh Pengetahuan, Sikap dan Dukungan Keluarga Terhadap Diet Hipertensi di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Tahun*. Jurnal Kesehatan Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018. journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/5107, 2016 (Diakses Tanggal 28 Februari 2019).
- Ardhiyanti, Yulrina. *Asuhan Kebidanan Pada Ny.E Dengan Hipertensi Gestasional*. Jurnal Komunikasi Kesehatan Volume IX. Nomor 2 Tahun. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/JM/article/download/631/549/2010> (Diakses Tanggal 24 Agustus 2019).
- Alatas haidir, (2020), “*hipertensi pada kehamilan*”. Depertemen ilmu penyakit dalam, devisi nefrologi-hipertensi , RSUD banyumas.
- Amelia lia, (2017), *asuhan kebidanan pada Ny.S G2PIA0 39 minggu dengan hipertensi gestasional di rumah sakit tanggerang*.
- Arifin. (2018). *Pengembangan Model Peningkatan Pemanfaatan Pelayanan Antenatal dan Persalinan oleh Keluarga Miskin di Pedesaan*. [Laporan penelitian]. Surabaya: Badan Litbangkes; 2018.
- Brahmana beu ivvana, (2018) “*perdarahan pasca persalinan oleh karena retensi plasenta pada P4A0 post partum spontan, janin besar dengan hipertensi gestasional*”.
- Casey, Aggif dan Benson. *Menurunkan Tekanan Darah*. Jakarta, 2010.
- Corry Sihotang, Pesta, dkk. *Hubungan Pola Makan dan Kecukupan Istirahat Tidur dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Biromaru*. Jurnal Kesehatan Tadulako Vol. 2 No. 1, Januari.

<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/HealthyTadulako/article/download/5747/4513>, 2016. (Diakses tanggal, 28 Januari 2019)

- Darmawansyih. *Penyakit kronik dalam kehamilan*. Alauddin University press, 2014.
- Dianah puspita, 2015, *hubungan usia, graviditas, dan indeks massatubuh dengan kejadian hipertensi*.
- Dewi novianti, dkk, (2020), “*asuhan keperawatan pasc partum tindakan sectional Caesar atas indikasi hipertensi dalam kehamilan*”. Akadecim keperawatan pasar rebo, departemen keperawatan maternitas
- Damayanti, dkk, (2020), *pengaruh konsumsi tablet kalsium terhadap perubahan tekanan darah pad ibu hamil resiko tinggi hipertensi dalam kehamilan di wilayah kerja puskesmas payalombanb tebing tinggi*.
- Evitasari, desi, dkk 2020. “*faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di upd puskesmas jaya kabupaten majalengka*” STIKes YPBI majalengka.
- Ella, dkk. *Hubungan Asupan Natrium, Kalsium dan Magnesium dengan Tekanan Darah pada Ibu Hamil Trimester II dan III*. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Volume 5, Nomor 4, Oktober 2017.
<http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm> (Diakses Tanggal 01 Februari 2020).
- Elya, W., Fakultas, S., & Universitas, K. (2016). *Kehamilan dengan Hipertensi Gestasional Wirda Elya Sari Pregnancy With Gestasional Hypertension*. 4, 145–148.
- Ekowati. (2015). *PrevalensiHipertensi dan Determinannya di Indonesia*. Jurnal Penelitian Kesehatan Vol. 59 No. 12Fadlun, Achmad. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Jakarta: Salemba Medika, 2014.
- Firwan firdaus, fidela, dkk. “*Evaluasi pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat jalan peserta BPJS DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL*” universitas muhammadiyah Yogyakarta
- Febriani heni, (2021), “*upaya pengendalian hipertensi pada kehamilan*”
- Fadlun, ahamad feryanto. *Asuhan kebidanan patologis*. Jakarta: selemba medika
Dinas Kesehatan Sulawesi-Selatan, 2018.
- Fitriani, Rini. *Penyakit Sistemik pada Kehamilan*. Makassar-Gowa: Alauddin University Press, 2014.

- Gede lisnawati, dkk (2019), *kajian penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi gestasional rawat inap periode januari-desember 2011*. Jurusan farmasi fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam universitas udayana jalan kampus unud-jimbran, jimbran-bali Indonesia.
- Hans ignasius, dkk (2020), *gambaran pengaruh hipertensi pada kehamilan terhadap ibu dan janin serta faktor-faktor yang memengaruhi di RSUD ciawi*. Tarumanagara medical journal vol. 3, no. 1, 85-90, oktober 2020
- Hadiani relawati, priantini, dkk (2018). “*Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Diet Rendah Garam dan Keteraturan Kontrol Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi di Poliklinik RSUD Tugurejo Semarang*”. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan. 1(2) Desember.
- Hidayati siska, dkk (2020) *evaluasi penggunaan obat antihipertensi pada pasien ibu hamil di instalasi rawat inap rsia muslimat jombang tahun 2018*.
- Ismah zata, (2018), *hipertensi pada ibu hamil dan analisis pengaruhnya terhadap berat badan janin di kota Palembang*. Vol, 3. No. 3, September 2018
- Ikhoulfiria, A. (2016). *Evaluasi Ketetapan Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Ibu Hamil Di Instalasi Rawat Inap RSUD Pandan Arang Boyolali*. Jurnal Kebidanan
- Indhayani lidya, (2018), *studi penggunaan obat antihipertensi pada wanita hamil yang didiagnosis hipertensi di rumah sakit pmi kot bogor*.
- Imami N. *Hipertensi Pada Kehamilan Analisis Kasus*. Jurnal Kebidanan. <http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/144>. (Diakses 25 Juni 2019).
- Jannah, nurul. *Buku ajaran asuhan kebidanan kehamilan*. Yogyakarta: C.V andi Offset, 2021.
- Jumaiza, dkk. *Analisis Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Trimester III*. Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Volume 4. Nomor 2 Januari 2018.
- <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/AlSihah/article/download/2086/2011>. (Diakses Tanggal 22 Agustus 2019).
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung : C.V Penerbit Diponegoro 2013.
- Langelo. (2015). *Evaluasi Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Kehamilan di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makasar Tahun 2015*. Jurnal. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin

- Mansjoer, dkk. (2017). *Penyakit Pada Masa Kehamilan Dalam Kapita Selekta Kedokteran*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Mangkuji, Betty, dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah SOAP*. Jakarta: EGC, 2012.
- Manuaba, Ida Ayu Handranita., Ida Bagus Gde Fajar Manuaba., Ida Bagus Gde Manuaba. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB*, Jakarta: EGC, 2013
- Mylano Tri Adi, dkk (2021), *Gambaran Diagnostik dan Penatalaksanaan Hipertensi di Rumah Sakit Umum Imelda Rekerja Indonesia Medan Tahun 2015-2016*. Ol.4, No. 1 April (2021)
- Marbun. (2015). *Evaluasi Makanan Ibu Hamil*. [http://:www.isnaini dot com](http://www.isnaini dot com), diunduh 11 April 2015
- Mubarak, dkk. (2017). *Tindakan Pencegahan Hipertensi Dalam Kehamilan dan Promosi Kesehatan*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*
- Mufdillah, dkk. *Konsep Kebidanan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Nuha Medika: 2012.
- Muflihan, dkk. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Hipertensi Dalam Kehamilan di RSUD Tugurejo* (Semarang : Universitas Muhammadiyah Semarang).
- Mardiana, dkk. (2016). “*Gambaran klinik resiko yang berhubungan dengan hipertensi dalam kehamilan pada ibu hamil*”
- Mardalena, dkk (2020), “*pendidikan kesehatan upaya pencegahan hipertensi pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Pembina Palembang tahun 2019*”. Vol. 2, No. 2 Juli 2020
- Muchlisatun Ummiyati, *Efektifitas Terapi Air Hangat Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Ibu Hamil Hipertensi*. 2019
- Nattuchan Riani, *Deteksi dini protein urin sebagai upaya pencegahan preeklampsia*. 2020. Program studi kebidanan program sarjana fakultas ilmu kesehatan, universitas muhammadiyah purwokerto.
- Nadyah. *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak Dan Maternal*. Makassar-Gowa: Alauddin University Press, 2013
- Nur Maulana, Isnia. “*pelaksanaan standar pelayanan minimal pada hipertensi*”, Universitas Negeri Semarang Indonesia. 2020
- Nelawati, Agnes Mantolatu. “*faktor-faktor resiko dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di poli klinik Obs-Gin rumah sakit jiwa prof. Dr. V. L.*

- Ratumbuysang kota manado”, vol. 2 no. 1 januari-juni. Jurnal ilmiah bidan 2014.
- Ningsih, Eka Sarofah. *Asuhan Kebidanan pada Ny. S kehamilan trimester II dengan hipertensi gestasional*, 2019.
- Nora utami yugita, 2018 *hubungan antara hipertensi gestasional dan usia ibu terhadap bayi berat lahir rendah (BBLR)*. Fakultas kedokteran universitas muhammadiyah Surakarta.
- Nugraheny esti, dkk (2018), *karakteristik ibu hamil dengan hipertensi*. Akbid kebidanan ummi khasanah, jl. Pemuda gandekan, batul.
- Ningsih suprianti, (2018), *pengetahuan pentingnya nutrisi dan pemeriksaan hipertensi gestasional pada multiple gestasional*. 2018
- Nursal, dkk. (2017). *Komplikasi hipertensi dalam kehamilan pada Ibu Hamil di RSUP DR. M. Djamil Padang Tahun 2017*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, p-ISSN 1978-3833, e-ISSN 2442-6725. 10(1)38-44 @ 2016 JKMA. <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/17>.
- Nurhayati lis, dkk (2019), *dukungan keluarga terhdap kepatuhan control pengobatan pasien hipertensi*. Volume, 5 nomor 2, juli 2019
- Prawirohardjo, S. 2014. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Edisi Keempat.
- Puspita, A, (2019). *Sikap Terhadap Kepatuhan Diit Hipertensi Dengan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Doro II Kabupaten Pekalongan*. Seminar Nasional Keperawatan PPNI Jawa Tengah. jurnal.unimus.ac.id.
- Pasia, RS (2014) “ *gambaran kejadian hipertensi pada ibu hamil di RSUD ibu dan anak pertiwi Makassar 2014*”. Sekolah tinggi ilmu kesehatan (STIK) Makassar, Indonesia.
- Ratih dewi ayu, dkk 2018 “ *gambaran deteksi dini ibu hamil tentang hipertensi dalam kehamilan di puskesmas banguntapan I*” program studi kebidanan fakultas ilmu kesehatan universitas alma ata Yogyakarta.
- Prasetyni titis hesty 2012 *stress pada penyakit terhadap kejadian komplikasi hipertensi pada pasien hipertensi*. Jurnal stikes Vol. 5, No. 1 juli 2012.

- Purnamasari kurnia, dkk 2017 *hubungan pengetahuan primigravida tentang hipertensi kehalian dengan kepatuhan melakukan ANC di bps hj. Siti Fatimah, Amd.Keb krian-sidoarjo.*
- Robson, Elizabeth dan Waugh, Jason. *Patologi Pada Kehamilan Manajemen danAsuhan Kebidanan.* Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2010.
- Simanullang ester, 2019, *hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang hipertensi dalam kehamilan terhadap resiko preeklamsia berat.* STIKes mitra husada medan. Vol. 2 No. 1. April 2019
- Setiawati, Dewi. *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan.* Makassar-Gowa: Alauddin University Press, 2013.
- Safitri amalia, dkk 2021 “*hubungsn hipertensi dalam kehamilan dengan kelahiran premature*”.
- Situmaronang ronelan, dkk 2018 *asuhan kebidnan pada Ny.P umur 32 tahun G3P2A0 dengan hipertensi gestasional di poli kebidanan rumah sakit M.yunus Bengkulu yahun 2018.* Volume 6 No. 2 oktober 2018.
- Radjamuda nelawati, dkk . “*faktor-faktor resiko dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di poli klinik Obs-Gin rumah sakit jiwa prof. Dr. v. L. ratumbusang kota manado*” , Vol. 2 no. 1 januari-juni. Jurnal ilmiah bidan 2014.
- Sri haryani, 2019. “ *hubungan hipertensi dalam kehamilan dan kehamilan ganda dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di rsud wates*”.
- Setyaningsih rahayu, dkk, *pengaruh pemberian pendidikan kesehatan tenatng hipertensi kehamilan terhadap upaya pemeliharaan tekanan darah ibu hamil desa gebong kecamatan delanggu kabupaten klaten.* 2014.
- Sambas komariah etty, 2015, *hubungan anatara karakteristik dan pengetahuan mengenai hipertensi dalam kehamilan dengan perilaku mencegah komplikasi hipertensi.* Jurnal kesehatan bakti tunas husada Vol. 13 Nomor 1 februari 2015.
- Sulastri, 2021, studi eksplorasi penatalaksanaan hipertensi pada wanita melahirkan
- Sukfitrianty, dkk. *Fakor-Faktor Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar.* Public Health Science Journal Volume 8 Nomor 1 Tahun.journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Sihah/article/view/2086, 2016. (Diakses Tanggal 28 Februari 2019).

- Taslim, dkk. 2016. *Keterkaitan Pola Makan Dan Stres Dengan Kejadian Hipertensi Grade 1 Dan 2 Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Kamonji Kecamatan Palu Barat*. E-Journal Keperawatan (ekp). Vol. 4 No.1. [16]
- Uli Basana, Lely Desi, dkk. *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Hipertensi Pada Kehamilan Studicase Controldi Wilayah Kerja Puskesmas Poriaha Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017*. Jurnal Ilmiah Kohesi Volume 1. Nomor 3 Oktober. sciencemakarioz.org/jurnal/index.php/KOHESI/article/viewFile/169/pdf, 2017. (Diakses Tanggal 28 Januari 2019).
- Walyani, Siwi. (2013). *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Yogyakarta: PT. PUSTAKA BUKU.
- WHO (World Health Organization) 2018. World Health statistic.
- Widiyani. (2018). “*Evaluasi Kasus Hipertensi Dalam Kehamilan Di Kalangan Masyarakat* ”. [http:// health. kompa s.com/ read/2013/ 04/05/ 1404008/](http://health.kompas.com/read/2013/04/05/1404008/). Tanggal akses 21 November 2018.
- Wirda. (2015). *Kehamilan dengan Hipertensi Gestasional*. Jurnal Kebidanan
- Winarto (2017). *Evaluasi Cara Penurunan tekanan darah pada klien hipertensi primer melalui terapi hipnosis*. Jurnal keperawatan Indonesia. 2017;14(1) : 65-72.
- Yudasmara. (2017). *Penatalaksanaan hipertensi dalam kehamilan*, [http://:dancewithmommiyoci. Wordpress.com/tag/kehamilan](http://dancewithmommiyoci.wordpress.com/tag/kehamilan), diunduh pada tanggal 24 maret pada pukul 09.48 WITA.
- Yohana sitepu. (2016). *Evaluasi tahapan diagnose pada pasien hipertensi*.

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PENULIS

Nama : Putri oktavia
 NIM : 70400116060
 Tempat/Tanggal Lahir : Kabaena, 16 oktober 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Kel. Tanah lemo Kec. Bonto bahari Kab.
 Bulukumba

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Haliruddin
2. Ibu : Rajawati

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD : SDN 2 bastiong Ternate 2010
2. Tamat SMP : SMP Negeri 32 Bulukumba 2013
3. Tamat SMA : SMA Negeri 3 Bulukumba 2016
4. Tahun 2016 mengikuti pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan