

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA WANITA USIA
SUBUR DENGAN ANEMIA**
(Literature Review)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Meraih Gelar
Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SRI DEWIYANTI
NIM: 70400117022

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Dewiyanti
Nim : 70400117022
TTL : Songkolo, 11 Juni 1999
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Songkolo, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan
Bontomarannu, Kab. Gowa
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Usia Subur
Dengan Anemia (*Literature Riview*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Mei 2021

Penulis

SRI DEWIYANTI
NIM: 70400117022

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Sri Dewiyanti
Nim : 70400117022
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Usia
Subur Dengan Anemia (*Literature Review*)

Karya Tulis Ilmiah (KTI) telah di periksa dan di setujui oleh pembimbing untuk di ajukan dalam Seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam NegeriAlauddin Makassar.


Samata, 12 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb
NIP : 19760126 200604 2 001

Pembimbing II



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP : 19800701 200604 2 002

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Manajemen Asuhan kebidanan Pada Wanita Usia Subur Dengan Anemia (*Literature Review*)”. Yang disusun oleh Sri Dewiyanti Nim: 70400117022, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari kamis, 12 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 12 Agustus 2021
3 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Penguji I	: Dr. dr. Nadyah, M.Kes	(.....)
Penguji II	: Prof. Mukhtar Lutfi, M.Pd	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“Manajemen Asuhan Kebidanan pada Wanita Usia Subur dengan Anemia”** (*Literature Review*). Sholawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad SAW. Berkat ridho dan rahmatnya karya tulis ini dapat diselesaikan guna memperoleh gelar ahli madya Kebidanan pada Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Terima kasih yang sangat spesial dan tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta ayahanda Sakir dan ibunda Herawati yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dukungan moril dan materil, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih dan sayang dengan penuh keikhlasan sehingga Allah SWT selalu memberi keberkahan hidup serta kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Kepada adik-adik tersayang Sri Dian, Sri Dita, Syimah Dzulaikha serta keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya selama ini yang membuat Penulis semakin bersemangat untuk mencapai gelar ini. Kepada kalian, Penulis persembahkan karya sederhana ini sebagai wujud cinta dan kasih sayang. Kepada seluruh keluarga yang senantiasa mendo'kan memberikan dukungan kepada Penulis, Syukron Jaziila Khair.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes. Beserta seluruh dosen dan staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibunda Firdayanti, S.ST., M.Keb selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Makassar.
4. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT.,S.KM.,M.Keb selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
5. Ibunda Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
6. Ibunda Dr. dr. Nadyah, M.Kes selaku penguji I yang telah memberikan ilmu kepada penulis, memberi kritik dan saran yang membangun guna untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.
7. Ayahanda Prof. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku penguji II yang telah senantiasa memberikan penulis tambahan ilmu agama serta memberikan masukan dan saran yang bersifat islamiah pada Karya Tulis Ilmiah

sehingga penulis dapat mengetahui hubungan kasus yang penulis angkat dan kaitanya dengan islam.

8. Segenap dosen jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan serta motivasi selama masa studi.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Masita, Muhayati, Fatmawati, Rohana, Fanni, Azizah, Vika, Ica, Melinda, Nur fadhilah, Nuralisah, yang selalu mensupport dan memberikan hal-hal yang positif kepada penulis dan saudari-saudari seperjuangan Aviditas Kebidanan 2017. Terima kasih untuk semua hal baik suka maupun duka yang telah dilewati bersama selama ini.
10. Semua pihak yang peneliti tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga penulisan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Makassar, 31 Mei 2021

Penulis

SRI DEWIYANTI
NIM: 70400117022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup Penulisan	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Metode Penulisan.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Prakonsepsi	9
B. Tinjauan Umum Tentang Anemia Pada Wanita Usia Subur	16
C. Tinjauan Tentang Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	43
BAB III TELUSURAN <i>EVIDANCE BASED LEARNING</i>.....	49
A. Matriks Langkah I.....	49
B. Matriks Langkah II.....	58
C. Matriks Langkah III	67
D. Matriks Langkah IV	74
E. Matriks Langkah V	81
F. Matriks Langkah VI.....	87
G. Matriks Langkah VII.....	93
BAB IV PEMBAHASAN.....	101
A. Pembahasan Hasil Telaah Evidance Based Asuhan 7 langkah Varney berdasarkan Hasil Penelusura Referensi	101

B. Implementasi Kebidanan.....	119
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Identifikasi Data Dasar.....	49
Tabel 3.2 Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Aktual.....	58
Tabel 3.3 Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Potensial.....	67
Tabel 3.4 Mengidentifikasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi.....	74
Tabel 3.5 Rencana Asuhan Kebidanan.....	81
Tabel 3.6 Implementasi Asuhan Kebidanan.....	87
Tabel 3.7 Evaluasi.....	93



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, 31 Mei 2021

Nama : Sri Dewiyanti
NIM : 70400117022
Pembimbing 1 : Dr.Hj.Sitti Saleha,S.SiT.,S.KM.,M.Keb
Pembimbing 2 : Dr.dr.Syatirah,Sp,A.,M.Kes
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Usia Subur Dengan Anemia (*Literature Review*)

Anemia merupakan suatu keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam sirkulasi darah kurang dari batas normal. Sehingga fungsinya sebagai pengangkut oksigen keseluruhan jaringan tidak terpenuhi. Anak-anak dan wanita usia subur adalah kelompok yang paling berisiko, dengan perkiraan prevalensi anemia pada balita sebesar 47%, pada wanita hamil sebesar 42%, dan pada wanita tidak hamil usai 15-49 tahun sebesar 30%. Wanita dewasa dengan cadangan zat besi tubuh rendah akan lebih mudah mengalami anemia pada saat hamil. Untuk menjaga keseimbangan besi tubuh selama kehamilan, kecukupan zat besi sangat bergantung pada suplei zat besi cadangan dalam tubuh.

Literature review ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan 7 langkah menurut Helen Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Berdasarkan hasil dari referensi bahwa tindakan yang dilakukan untuk penatalaksanaan anemia pada wanita usia subur yaitu anamnesa, pemeriksaan fisik serta tanda-tanda vital dan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar hemoglobin. Selain itu, memberikan konseling tentang pemenuhan zat gizi terutama zat besi. Melakukan pendekatan dengan memberikan dukungan spiritual dengan tetap menerapkan integrasi keislaman di dalamnya.

Kesimpulan dari hasil *literature review* yang didapat dari 74 sumber, yaitu didapatkannya keadaan wanita usia subur dengan anemia. Jika dilakukan pendekatan dan tatalaksana yang cepat, tepat, dan sesuai maka dari hasil evaluasi didapatkan keadaan pasien lebih baik tanpa adanya penyulit serta masalah atau komplikasi yang timbul.

Kata kunci : Wanita Usia Subur, Anemia, 7 Langkah Varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, MAY 31 2021

Nama : Sri Dewiyanti
Reg.Number : 70400117022
Supervisor1 : Dr.Hj.Sitti Saleha,S.SiT.,S.KM.,M.Keb
Supervisor2 : Dr.dr.Syatirah,Sp,A.,M.Kes
Tittle : A Midwifery Care Management on Women of Child bearing Age
with the Case of Anemia (*A Literature Review*)

Anemia is a condition when the number of red blood cells or the concentration of oxygen carriers in the blood circulation is less than the normal limit. So that its function as a carrier of oxygen throughout the tissue is not fulfilled. Children and women of childbearing age are the group most at risk, with an estimated prevalence of anemia in children under five by 47%, in pregnant women by 42%, and in non-harm women aged 15-49 years by 30%. Adult women with low body iron stores are more prone to anemia during pregnancy. To maintain the body's iron balance during pregnancy, iron adequacy is very dependent on the supply of iron reserves in the body.

The methodological approach taken in this research was literature review where references related to anemia and pregnancy were collected. This research was conducted by employing the 7-stages midwifery approach by Helen Varney and SOAP documentation procedure.

The results of this study indicated that the major treatment that could be given to women of childbearing age with the case of anemia was anamnesis, namely physical and vital signs examination in patients. In addition, laboratory test to determine hemoglobin levels was also important. Furthermore, counseling on the fulfillment of nutrients, especially iron fulfillment, was considered to be pivotal to be given to pregnant women. Last but not least, spiritual support in accordance with Islamic guidance is also necessary.

The major resources of this research were 74 journals related to anemia on pregnant women. This research concludes that the midwifery care management arranged for anemia patients should be given based on correct procedures. In this case, there will be no complications on anemia patients if they are treated based on the appropriate health practices.

Keywords: Women of Childbearing Age, Anemia, 7-stages of Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anemia merupakan masalah gizi yang umum terjadi di dunia, terutama di negara berkembang. Diperkirakan lebih dari 30% penduduk dunia atau 1500 juta orang menderita anemia dan sebagian besar tinggal di daerah tropik. Berdasarkan Riskesdas (2013), dilaporkan bahwa angka kejadian anemia secara nasional adalah sebesar 21,7%, dimana 18,4% terjadi pada laki-laki dan 23,9% terjadi pada perempuan. Anemia defisiensi zat besi merupakan masalah gizi yang paling lazim di dunia dan menjangkiti lebih dari 600 juta manusia. Prevalensi anemia secara global adalah sekitar 51%. Prevalensi untuk balita sekitar 43%, anak usia sekolah 37%, pria dewasa hanya 18%, dan wanita tidak hamil 35% (Suci dan Nurlina, 2018).

Anemia salah satu masalah gizi yang paling banyak dijumpai, baik pada negara maju maupun berkembang, dan pada masyarakat dengan sosial ekonomi rendah maupun tinggi. Anemia dapat terjadi pada siapa saja dan pada setiap kelompok usia. Kelompok yang berisiko tinggi menderita anemia adalah wanita usia subur, ibu hamil, anak usia sekolah, dan remaja. Meskipun demikian kelompok pria juga tidak terlepas dari risiko menderita anemia (Dodik, 2013).

Hasil penelitian Sudikno dan Sandjaja (2016) menunjukkan bahwa prevalensi kejadian anemia pada wanita usia subur berumur <20 tahun sebesar 13,8% lebih tinggi dibandingkan wanita usia subur yang berumur 20-

35 tahun (6,8%). Presentase kejadian anemia pada wanita usia subur yang belum kawin sebesar 14,3%, sedangkan pada wanita usia subur yang sudah menikah hanya 6%. Presentase anemia pada wanita usia subur dengan pendidikan SD kebawah sebesar 11,5%, lebih tinggi dibandingkan wanita usia subur dengan pendidikan SMP maupun SMA ke atas. Menurut pekerjaan diketahui bahwa wanita usia subur yang masih sekolah presentase kejadian anemianya lebih tinggi (16,3%) dibandingkan dengan wanita usia subur yang bekerja, tidak bekerja dan ibu rumah tangga.

Wanita usia subur yang belum pernah melahirkan presentase kejadian anemianya sebesar 13,8% lebih tinggi dari wanita usia subur yang sudah pernah melahirkan. Menurut riwayat keguguran diketahui bahwa presentase kejadian anemia pada wanita usia subur yang tidak mengalami keguguran sebesar 10,2%. Dari variabel status gizi diketahui bahwa presentase kejadian anemia pada wanita usia subur dengan IMT $<18,5 \text{ kg/m}^2$ sebesar 15,0% lebih tinggi dari kelompok wanita usia subur dengan IMT $\geq 18,5-24,9 \text{ kg/m}^2$, IMT = $25,0-29,9 \text{ kg/m}^2$, dan kelompok IMT $\geq 30,0 \text{ kg/m}^2$ (Sudikno dan Sandjaja, 2016).

Seorang wanita lebih berisiko terkena anemia dibandingkan laki-laki. Perbedaan ini dikarenakan wanita dewasa mengalami menstruasi setiap bulan dan akan kehilangan zat besi sekitar 1,4 mg/hari. Kejadian anemia pada wanita usia subur biasanya berlanjut pada masa kehamilan sehingga mengakibatkan risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan, diantaranya risiko kematian maternal, angka prematuritas, berat bayi lahir rendah (BBLR)

dan angka kematian prenatal meningkat, serta meningkatnya risiko perdarahan antepartum dan postpartum (Citra kesumasari, 2012).

Untuk menjaga keseimbangan zat besi tubuh, seorang wanita dewasa membutuhkan asupan zat besi lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dewasa. Apabila kebutuhan zat besi tubuh ini tidak terpenuhi dari diet ataupun suplemen zat besi, akan terjadi pemindahan cadangan zat besi tubuh. Hal ini tentu dapat mengganggu keseimbangan zat besi tubuh mulai dari derajat deplesi hingga menjadi anemia defisiensi besi.

Faktor penyebab anemia lainnya pada wanita usia subur adalah kehilangan banyak darah, asupan zat besi yang tidak memadai, peningkatan kebutuhan fisiologis, malabsorpsi, simpanan zat besi yang buruk, ketidakcukupan gizi, hemoglobinopati, serta obat dan faktor lainnya. Beberapa faktor tersebut dapat disebabkan oleh perilaku, khususnya perilaku kesehatan dan gaya hidup. Perilaku makan seseorang pada akhirnya akan berpengaruh pada status gizi (Fatmah, 2007).

Wanita dewasa dengan cadangan zat besi tubuh rendah akan mudah mengalami anemia pada saat hamil. Kehamilan menambah kebutuhan zat besi ibu untuk dikirim ke fetus, terutama pada kehamilan trimester dua dan tiga sehingga tidak dapat terpenuhi hanya dari diet zat besi harian. Untuk menjaga keseimbangan besi tubuh selama kehamilan, kecukupan kebutuhan zat besi sangat bergantung pada suplei zat besi cadangan dalam tubuh.

Disisi lain jumlah wanita hamil yang memiliki cadangan zat besi tubuh sesuai dengan besarnya kebutuhan sangatlah sedikit. Sebanyak 25-30 %

wanita tidak memiliki cadangan zat besi tubuh. Sebanyak 20% wanita memiliki cadangan zat besi tubuh sebesar 250-400 mg dan kurang dari 5% memiliki cadangan besi tubuh lebih dari 400 mg. Berdasarkan hal ini, wanita dewasa sangat berisiko terkena anemia terlebih pada saat mengalami kehamilan.

Prevalensi anemia diperkirakan 9% dinegara-negara maju, sedangkan dinegara berkembang prevalensinya 43%. Anak-anak dan wanita usia subur adalah kelompok yang paling berisiko, dengan perkiraan prevalensi anemia pada balita sebesar 47%, pada wanita hamil sebesar 42%, dan pada wanita tidak hamil usai 15-49 tahun sebesar 30 %. *World Health Organization* (WHO) menargetkan penurunan prevalensi anemia pada wanita usia subur sebesar 50% pada tahun 2025 (Sudikno, Sandjaja: 2016).

Hasil Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan bahwa presentasi anemia di Indonesia pada wanita usia subur tidak hamil (>15 tahun) di perkirakan sebesar 19,7%. Selanjutnya hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukkan presentase anemia pada wanita usia subur umur 15-44 tahun sebesar 35,3%.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arsiyanti, 2014) di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto karakteristik umur 16-18 kadar hemoglobin berkisar antara 6,2-15,1 dari 166 yang diperiksa, sebanyak 30,7 menderita anemia dengan kadar Hb <12gr/dl (Satriani, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekam Medik Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa dari tahun 2017 terdapat 39 jiwa wanita usia subur yang

mengalami anemia, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 16 jiwa, dan pada tahun 2019 jumlah wanita usia subur yang menderita anemia sebanyak 33 jiwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Manajemen Asuhan Kebidanan pada Wanita Usia Subur dengan Anemia.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan penulisan karya tulis ilmiah ini meliputi Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Usia Subur dengan Anemia.

C. Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Umum

Mampu menyusun *Literature review* dan mengetahui penatalaksanaan pada wanita usia subur dengan anemia melalui pendekatan manajemen asuhan kebidanan menurut Halen Varney sesuai dengan wilayah kerja Bidan.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan penulisan *Literature Review* asuhan kebidanan pada wanita usia subur dengan kasus anemia adalah:

- a. Didapatkannya data subjektif dan data Objektif dari tanda dan gejala dari berbagai referensi tentang wanita usia subur dengan anemia.
- b. Didapatkannya hasil rumusan diagnosis dari berbagai referensi tentang wanita usia subur dengan anemia.

- c. Didapatkannya informasi komplikasi yang bias timbul dari berbagai referensi pada wanita usia subur dengan anemia.
- d. Didapatkannya informasi dari berbagai referensi tentang kondisi emergensi yang dapat terjadi serta penanganannya pada wanita usia subur dengan anemia.
- e. Didapatkannya simpulan dari berbagai referensi tentang intervensi apa saja/ penatalaksanaan yang tepat pada wanita usia subur dengan anemia.
- f. Didapatkannya penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke implementasi asuhan pada wanita usia subur dengan anemia.
- g. Didapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi yang menjadi dasar evaluasi pada wanita usia subur dengan anemia.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian pada kasus ini yaitu :

1. Manfaat Bagi Institusi

Diharapkan *Literature Review* dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi institusi pendidikan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya.

2. Manfaat bagi penulis

- a) Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan DIII kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- b) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis dalam penerapan Asuhan Kebidanan pada Wanita Usia Subur dengan Anemia. Penulisan ini juga merupakan pengalaman yang berharga

karena dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang Manajemen Asuhan Kebidanan pada wanita usia subur dengan anemia.

3. Manfaat bagi pembaca

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang Manajemen Asuhan Kebidanan pada wanita usia subur dengan anemia.

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, metode yang digunakan adalah penulis mempelajari buku-buku, literatur, dan media internet yang berhubungan dengan Anemia.

F. Sistematika Penulisan

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penulisan
- E. Metode Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang
- B. Tinjauan Khusus Tentang
- C. Proses Manajemen Kebidanan

BAB III TELUSURAN *EVIDANCE BASED LEARNING*

- A. Matriks Langkah I
- B. Matriks Langkah II
- C. Matriks Langkah III
- D. Matriks Langkah IV
- E. Matriks Langkah V
- F. Matriks Langkah VI
- G. Matriks Langkah VII

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pembahasan Hasil Telaah Evidance Based Asuhan 7 Langkah Varney Berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi
- B. Implikasi Kebidanan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wanita Usia Subur

1. Defenisi Wanita Usia Subur

Yang dimaksud dengan wanita usia subur (WUS) adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun. Pada wanita usia subur ini berlangsung lebih cepas daripada pria. Puncak kesuburan ada pada rentang usia 20-29 tahun. Pada usia ini wanita memiliki kesempatan 95% untuk hamil. Pada usia 30-an presentasinya menurun hingga 90%. Sedangkan memasuki usia 40, kesempatan hamil berkurang hingga menjadi 40%. Setelah usia 40 tahun wanita hanya punya maksimal 10% kesempatan untuk hamil. Masalah kesuburan organ reproduksi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui. Dimana dalam wanita usia subur ini harus menjaga dan merawat diri.

Masa prakonsepsi merupakan masa sebelum terjadinya kehamilan, dimana periode prakonsepsi yaitu rentang waktu dari tiga bulan hingga satu tahun sebelum konsepsi dan idealnya harus mencakup waktu saat ovum dan sperma matur, yaitu sekitar 100 hari sebelum konsepsi . Pada masa ini calon ibu perlu mempersiapkan diri agar pada masa kehamilan, persalinan dan bayi yang akan dilahirkan nantinya dalam keadaan sehat. Oleh Karena itu, persiapan pernikahan untuk melahirkan generasi kedepan yang lebih baik seharusnya dilakukan jauh sebelum masa ini (Bardosono, 2015).

Salah satu contoh kemukjizatan dari segi isyarat ilmiah yang dikemukakan dalam al-Qur'an yaitu mengenai proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia termasuk salah satu dari *i'jaz al-'ilmi* al-Qur'an karena jauh sebelum hal ini ditemukan dalam dunia pendidikan (ilmu kedokteran), Al-Qur'an memberikan gambaran mengenai periode yang dilalui janin seperti yang dijalani setiap manusia sejak diciptakan dari setetes air mani. Periodisasi janin dari tahap setetes mani hingga menjadi makhluk yang berbentuk lain (manusia), ini kemudian dijelaskan secara terperinci dalam dunia kedokteran. Q.S. al-Mu'minūn/ 23: 12-14 berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا
 الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

12. Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).
14. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm oleh Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah swt berfirman dengan menceritakan bagaimana manusia itu diciptakan yang berasal dari saripati tanah, ialah

Adam kemudian keturunannya diciptakan dari air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, ialah rahim ibunya yang memang tersedia untuk itu dan setelah melewati suatu masa tertentu dijadikanlah air mani itu segumpal darah kemudian segumpal darah itu menjadi segumpal daging dan dari segumpal daging itu terciptalah tulang belulang yang berbentuk kepala, tangan dan kaki kemudian dibungkusnya tulang tulang itu dengan daging, otot dan urat-urat, maka terciptalah suatu makhluk yang berbentuk lain dan kepadanya ditiupkan roh, diberinya sarana pendengaran, penglihatan, mencium, bersuara, berfikir dan bergerak sehingga lengkaplah ia menjadi manusia yang utuh sempurna sebagai makhluk Allah yang pilihan dan termulia (Tafsir al-Qur'an al-'Azhim li al-Imam al-Jalalayn, Juz 1).

Periode kritis untuk menentukan kehamilan sehat serta kualitas bayi yang dilahirkan adalah periode di seputar momen konsepsi atau disebut perikonsepsi (2-4 bulan sebelum hamil, sampai dengan 4 bulan pertama kehamilan). Proses konsepsi merupakan momen reproduksi sangat penting yang mengawali terjadinya kehamilan. Apabila kesuksesan kehamilan ditentukan oleh tahap implantasi dan plasentasi maka intervensi pada masa prakonsepsi dapat menjadi *window of opportunity* bagi keberhasilan suatu program intervensi (Badriah, 2011).

Wanita Usia Subur sebagai calon ibu merupakan kelompok rawan yang harus diperhatikan status kesehatannya. Kualitas seorang generasi penerus akan ditentukan oleh kondisi ibunya sejak sebelum hamil dan

selama kehamilan. Masa pranikah dapat dikaitkan dengan masa prakonsepsi karena setelah menikah wanita akan segera menjalani proses konsepsi (Fillah, dkk, 2019: 2). Masa ini merupakan masa terpenting bagi wanita dan berlangsung kira-kira 33 tahun. Menstruasi pada masa ini paling teratur dan siklus pada alat genital bermakna untuk memungkinkan kehamilan. Pada masa ini terjadi ovulasi kurang lebih 450 kali. Kondisi yang perlu dipantau pada masa subur adalah perawatan antenatal, jarak kehamilan, deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim, serta infeksi menular seksual (Yulizawati, dkk, 2016).

Prakonsepsi merupakan masa sebelum terjadi pertemuan sel sperma dengan ovum/pembuahan atau sebelum hamil. Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum merencanakan kehamilan. Dimulai dari masa remaja, yaitu dengan menjaga kesehatan organ reproduksi, kebutuhan akan gizi seimbang, perilaku hidup sehat, dan lain-lain (Fillah, dkk, 2019: 2). Kehamilan yang sehat membutuhkan persiapan fisik dan mental, oleh karena itu perencanaan kehamilan harus dilakukan sebelum masa kehamilan. Proses kehamilan yang direncanakan dengan baik akan berdampak positif pada kondisi janin dan adaptasi fisik dan psikologis ibu pada kehamilan menjadi lebih baik (Oktalia dan Herizasyam, 2016).

Kebutuhan gizi wanita usia subur pada periode masa konsepsi merupakan faktor penting untuk mendukung kesehatan dan kelangsungan hidup ibu, pertumbuhan janin, serta kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Kekurangan gizi dan masalah stunting (

pendek) berhubungan dengan BBLR pada generasi berikutnya bahkan mencakupi setidaknya tiga generasi selanjutnya. Periode prakonsepsi merupakan calon ibu yang harus dipersiapkan dengan baik. Oleh sebab itu, calon pengantin wanita harus memiliki status gizi yang baik, tidak kurus (atau tidak mengalami kekurangan energi kronis), tidak obesitas, tidak anemia, dan masalah gizi lainnya (Fillah, dkk, 2019: 17).

2. Tujuan Asuhan Pada Periode Prakonsepsi

Tujuan asuhan prakonsepsi adalah memastikan bahwa ibu dan pasangannya berada dalam status kesehatan fisik dan emosional yang optimal saat dimulainya kehamilan. Tujuan lainnya adalah memberikan serangkaian pilihan yang mungkin tidak tersedia saat kehamilan dikonfirmasi kepada calon orang tua. Meskipun kehamilan bagi beberapa pasangan mungkin tidak direncanakan, mayoritas pasangan yang memang merencanakan kehamilan dapat memperoleh manfaat dari asuhan prakonsepsi. Baik bagi mereka yang hanya ingin memberikan yang terbaik bagi bayinya maupun sebagai upaya mengurangi kondisi yang dapat membahayakan kehamilan.

3. Manfaat Asuhan Wanita Usia Subur

Manfaat adanya asuhan pada wanita usia subur adalah adanya kesiapan secara fisik dan emosional yang optimal saat memasuki masa konsepsi. Melalui asuhan prakonsepsi, ibu dan pasangan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menghambat suksesnya proses konsepsi, sehingga ibu dan pasangan dapat melakukan upaya maksimal agar bayi dapat lahir

dengan sehat. Selain itu asuhan prakonsepsi juga bermanfaat untuk identifikasi keadaan penyakit, penilaian keadaan psikologis, kesiapsiagaan keuangan dan tujuan hidup, serta memberikan banyak informasi bagi perempuan dan pasangannya untuk membantu membuat keputusan tentang persalinan yang akan dihadapinya.

Kesehatan pada periode prakonsepsi adalah kesehatan baik pada perempuan maupun laki-laki selama usia reproduktif yakni usia yang masih dapat memiliki keturunan. Tujuan kesehatan prakonsepsi adalah untuk mencapai ibu dan anak dalam kondisi sehat. Terdapat 10,9% ibu hamil yang selama proses kehamilannya tidak mengonsumsi zat besi baik tablet zat besi yang disediakan oleh pelayanan kesehatan maupun multivitamin mengandung zat besi yang dijual bebas (Risksedas, 2013).

Wanita Usia Subur diasumsikan sebagai wanita dewasa yang siap menjadi seorang ibu. Kebutuhan gizi pada masa ini berbeda dengan masa anak-anak, remaja, ataupun lanjut usia. Kebutuhan zat gizi pada masa ini menjadi penting karena merupakan masa dalam mempersiapkan kehamilan dan menyusui. Secara ilmiah sebagai periode yang menentukan kualitas kehidupan, dimana sebagai calon ibu memiliki kontribusi besar pada kesehatan dan keselamatan kehamilan dan kelahiran (Fillah, dkk, 2019: 3-4).

Kesehatan wanita usia subur dalam periode prakonsepsi dapat berubah dan meningkat maka membutuhkan perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku individu. Skrining pra nikah atau disebut juga perawatan

prakonsepsi adalah serangkaian intervensi yang bertujuan mengidentifikasi dan memodifikasi risiko biomedis, perilaku, dan sosial yang berkaitan dengan kesehatan wanita serta hasil kehamilan nantinya. Skrining prakonsepsi dilakukan sebagai langkah pertama untuk memastikan kesehatan calon ibu serta calon anak sedini mungkin, bahkan sebelum proses pembuahan terjadi. Yang termasuk dalam perawatan masa prakonsepsi yaitu pada masa sebelum konsepsi dan masa antara konsepsi yang dapat dimulai dalam jangka waktu dua tahun sebelum konsepsi (Yulizawati, dkk, 2016).

Wanita usia normal yang tidak hamil memiliki kisaran kebutuhan zat besi sebesar 1,3 mg/hari. Kebutuhan ini meningkat ketika hamil dengan kebutuhan ekstra sebesar 3,0 mg/hari terutama untuk peningkatan massa sel darah merah maternal, pertumbuhan plasental dan janin, serta mengganti kehilangan darah saat kelahiran, intestinal fisiologis, dan menstruasi di masa usia subur. Kebutuhan zat besi lebih lanjut sebesar 6-8 mg/hari terjadi setelah 32 minggu gestasi (Elizabeth dan Jason, 2013: 293).

4. Kebutuhan Gizi Wanita Usia Subur

Energi dibutuhkan supaya metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Kecukupan yang dianjurkan dibedakan sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Kebutuhan energi pada laki-laki lebih kurang 2600-2750 kkal, sedangkan pada wanita 2100-2250 kkal. Energi tersebut paling banyak diperoleh dari karbohidrat, lemak, protein, serat dan vitamin. Anjuran asupan gizi dapat berbeda tergantung dari usia dan kondisi setiap orang.

Namun, berikut adalah beberapa anuran terkait gizi yang perlu dipersiapkan jika seorang wanita merencanakan kehamilan yaitu:

- a. Mengonsumsi 400 mg folat yang berasal dari sumber makanan alami (daging, sayur, buah)
- b. Mengonsumsi vitamin A dalam bentuk suplemen tidak lebih dari 5000 IU
- c. Menghindari minuman beralkohol

Di Indonesia, angka kejadian anemia masih tinggi sehingga salah satu cara untuk menurunkan risiko anemia yang mungkin terjadi saat kehamilan adalah dengan menganjurkan wanita yang akan menikah untuk mengonsumsi suplemen besi dan folat. (Fillah, dkk, 2016: 66-82).

B. Tinjauan Umum Tentang Anemia

1. Pengertian Anemia

- a. Anemia merupakan suatu keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah Hemoglobin (Hb) tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh (Kemenkes RI, 2013).
- b. *World Health Organization* (WHO) (2017) menyebutkan anemia adalah suatu kondisi jumlah sel darah merah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Kebutuhan fisiologis seseorang bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, tempat tinggal, perilaku merokok dan tahap kehamilan.

- c. Anemia ialah kondisi berkurangnya sel darah merah atau eritrosit dalam sirkulasi darah atau massa hemoglobin, sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen ke seluruh jaringan (Bakta, 2016).
- d. Anemia didefinisikan sebagai penurunan jumlah massa eritrosit sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk membawa oksigen dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer oleh penurunan kadar hemoglobin (Budiyanto, 2012).
- e. Anemia merupakan kondisi kurangnya sel darah merah “eritrosit” seseorang, Anemia dapat terjadi karena kurangnya hemoglobin yang berarti juga minimnya oksigen ke seluruh tubuh (Tartowo, 2017).
- f. Anemia adalah penurunan kadar hemoglobin (Hb), hematokrit atau hitung eritrosit (*red cell count*) berakibat pada penurunan kapasitas pengangkutan oksigen oleh darah. Tetapi harus di ingat pada keadaan tertentu dimana ketiga parameter tersebut tidak sejalan dengan massa eritrosit, seperti pada dehidrasi, perdarahan akut, dan kehamilan (Amin dan Hardhi, 2015: 35).

Hemoglobin adalah salah satu komponen dalam sel darah merah/eritrosit yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Oksigen diperlukan oleh jaringan tubuh untuk melakukan fungsinya. Kekurangan oksigen dalam jaringan otak dan otot akan menyebabkan gejala antara lain kurangnya konsentrasi dan kurang bugar dalam melakukan aktivitas. Hemoglobin

dibentuk dari gabungan protein dan zat besi dan membentuk sel darah merah/eritrosit (Kementrian Kesehatan, 2016: 11).

Anemia salah satu kelainan darah yang umum terjadi ketika kadar sel darah merah (eritrosit) dalam tubuh menjadi terlalu rendah. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan karena sel darah merah mengandung hemoglobin, yang membawa oksigen ke jaringan tubuh. Anemia dapat menyebabkan berbagai komplikasi, termasuk kelelahan dan stress pada organ tubuh. Memiliki kadar sel darah merah yang normal dan mencegah anemia membutuhkan kerjasama antara ginjal, sumsum tulang, dan nutrisi dalam tubuh. Jika ginjal atau sumsum tulang tidak berfungsi, atau tubuh kurang gizi, maka jumlah sel darah merah dan fungsi normal mungkin sulit untuk dipertahankan.

2. **Klasifikasi Anemia**

a. Klasifikasi berdasarkan penyebabnya

1) Anemia defisiensi besi

Anemia defisiensi besi adalah anemia yang timbul akibat kosongnya cadangan besi tubuh (*depleted iron store*) sehingga penyediaan besi untuk eritropoesis berkurang, yang pada akhirnya pembentukan hemoglobin berkurang (Made Bakta, 2006: 26).

Oleh sebab itu, ketika tubuh kekurangan zat besi produksi hemoglobin akan menurun. Meskipun demikian, penurunan hemoglobin sebetulnya baru akan terjadi jika cadangan zat besi (Fe) dalam tubuh sudah benar-benar habis (Atikah, dkk. 2019: 23).

2) Anemia akibat perdarahan

Anemia akibat perdarahan dapat terjadi karena keacingan dan trauma atau luka yang mengakibatkan kadar Hb menurun. Serta dapat diakibatkan karena terjadi menstruasi yang dalam jangka waktu yang lama dengan volume darah yang berlebihan (Kementrian Kesehatan. 2016: 14).

3) Anemia pada penyakit kronik

Penyakit kronik seringkali disertai dengan anemia, namun tidak semua anemia pada penyakit kronik dapat digolongkan sebagai anemia akibat penyakit kronik. Anemia akibat penyakit kronik adalah anemia yang dijumpai pada penyakit kronik tertentu yang khas ditandai oleh gangguan metabolisme besi, yaitu adanya hipoferemia sehingga menyebabkan berkurangnya penyediaan besi yang dibutuhkan untuk sintesis hemoglobin tetapi cadangan besi sumsum tulang masih cukup (Made Bakta, 2006:39).

4) Anemia Megaloblastik

Anemia megaloblastik adalah anemia yang khas ditandai oleh adanya sel megaloblast dalam sumsum tulang. Anemia megaloblast disebabkan oleh gangguan pembentukan DNA pada inti eritroblast, terutama akibat defisiensi Vitamin B12 dan asam folat. Sel megaloblast ini fungsinya tidak normal, dihancurkan semasa dalam sum-sum tulang sehingga terjadinya eritropoeisis tidak efektif dan masa hidup eritrosit lebih pendek, keadaan ini mengakibatkan

leukopenia, trombositopenia dan gangguan pada oral, gastrointestinal dan neurologi. Anemia megaloblastik disebabkan oleh terjadinya defisiensi vitamin B12 dan asam folat, dimana vitamin B12 dan asam folat berfungsi dalam pembentukan DNA inti sel dan khusus vitamin B12 penting dalam pembentukan myelin (Tarwoto dan Wasnidar, 2013:48).

Selain mengganggu proses pembentukan sel darah merah kekurangan vitamin B12 juga mempengaruhi sistem saraf sehingga penderita anemia ini akan merasakan kesemutan ditangan dan kaki, tungkai dan kaki serta tangan seolah mati rasa. Gejala lain yang dapat terlihat diantaranya adalah buta warna tertentu termasuk warna kuning dan biru, luka terbuka dilidah atau lidah seperti terbakar, penurunan berat badan, warna kulit menjadi lebih gelap, dan mengalami penurunan fungsi intelektual (Atikah, dkk. 2019: 25).

5) Anemia Hemolitik

Anemia hemolitik adalah anemia yang disebabkan penghancuran atau pemecahan sel darah merah yang lebih cepat dari proses pembuatannya dimana umur sel darah merah normalnya adalah 120 hari. Ini dapat disebabkan oleh faktor intrakorpuskuler yang dijumpai pada anemia hemolitik herediter, talasemia, anemia sel sickle (sabit), hemoglobinopati C, D, G, H, I dan paraksimal nokturnal hemoglobinuria serta faktor ekstrakorpuskuler disebabkan malaria, sepsis, keracunan zat logam, dan dapat beserta obat-obatan.

Pada anemia hemolitik umur sel darah merah lebih pendek sehingga sumsum tulang penghasil sel darah merah tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan sel darah merah. Gejala utama adalah anemia dengan kelainan-kelainan gambaran darah, kelelahan, serta gejala komplikasi bila terjadi kelainan pada organ-organ vital. Pengobatan bergantung pada jenis anemia hemolitik serta penyebabnya (Atikah dkk, 2019: 25).

6) Anemia Sel Sabit

Anemia sel sabit (*sickle cell anemia*) adalah suatu penyakit keturunan yang ditandai dengan sel darah merah yang berbentuk sabit, kaku, dan anemia hemolitik kronik. Pada penyakit sel sabit, sel darah merah memiliki hemoglobin (protein pengangkut oksigen) yang bentuknya abnormal sehingga mengurangi jumlah oksigen dalam sel dan menyebabkan bentuk sel menjadi seperti sabit.

Sel yang berbentuk sabit akan menyumbat dan merusak pembuluh darah terkecil dalam limpa, ginjal, otak, tulang, dan organ lainnya serta menyebabkan kurangnya pasokan oksigen ke organ tersebut. Sel sabit ini rapuh dan dapat pecah pada saat melewati pembuluh darah yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan organ bahkan kematian.

7) Anemia Aplastik

Anemia aplastik merupakan jenis anemia yang berbahaya, karena dapat mengancam jiwa. Anemia aplastik terjadi apabila

sumsum tulang tempat pembuatan darah merah terganggu. Kejadian anemia aplastik menyebabkan terjadinya penurunan produksi sel darah (eritrosit, leukosit dan trombosit). Anemia aplastik terjadi karena disebabkan oleh bahan kimia, obat-obatan, virus dan terkait dengan penyakit-penyakit yang lain (Atikah, dkk. 2019: 26).

b. Klasifikasi berdasarkan kadar hemoglobin darah

Kriteria anemia menurut WHO

Laki-laki dewasa	: Hemoglobin 13g%
Wanita dewasa tidak hamil	: Hemoglobin 12g%
Wanita hamil	: Hemoglobin 11g%
Anak umur 6-14 tahun	: Hemoglobin 12g%
Anak umur 6 bulan-6 tahun	: Hemoglobin 11g%

3. Tanda Dan Gejala Anemia

Gejala yang sering ditemui pada penderita anemi adalah 5 L (Lesu, Letih, Lemah, Lelah, Lalai), disertai sakit kepala dan pusing, mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, cepat lelah serta sulit berkonsentrasi. Secara klinis penderita anemia ditandai dengan pucat pada muka, kelopak mata, bibir, kulit, kuku dan telapak tangan (Kementerian kesehatan, 2016: 16).

Gejala anemia sangat bervariasi, tetapi pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga golongan besar yaitu:

a. Gejala umum anemia

Gejala umum anemia disebut juga sebagai sindrom anemia atau anemic syndrome. Gejala umum anemia atau sindrom anemia adalah gejala yang timbul pada semua jenis anemia pada kadar hemoglobin yang sudah menurun sedemikian rupa dibawah titik tertentu. Gejala ini timbul karena anoksia organ target dan mekanisme kompensasi tubuh terhadap penurunan hemoglobin. Gejala-gejala tersebut apabila diklasifikasikan menurut organ yang terkena.

- 1) Sistem kardiovaskular: Lesu, cepat lelah, palpitasi, takikardi, sesak napas saat beraktivitas, angina pektoris, dan gagal jantung.
- 2) Sistem saraf: Sakit kepala, pusing, telinga mendengung, mata berkunang-kunang, kelemahan otot, iritabilitas, lesu, serta perasaan dingin pada ekstremitas.
- 3) Sistem urogenital: Gangguan haid dan libido menurun
- 4) Epitel: Warna pucat pada kulit dan mukosa, elastisitas kulit menurun, serta rambut tipis dan halus

b. Gejala khas masing-masing anemia

Gejala khas yang menjadi ciri dari masing-masing jenis anemia adalah:

- 1) Anemia defisiensi besi: Disfagia, atrofi papil lidah, stomatitis angularis
- 2) Anemia defisiensi asam folat: Lidah merah (buffy tongue)
- 3) Anemia hemolitik: Ikterus dan hepatosplenomegali

4) Anemia aplastik: Perdarahan kulit atau mukosa dan tanda-tanda infeksi

c. Gejala akibat penyakit dasar

Gejala penyakit dasar yang menjadi penyebab anemia. Gejala ini timbul Karena penyakit-penyakit yang mendasari anemia tersebut. Misalnya anemia defisiensi besi yang disebabkan oleh infeksi cacing tambang berat akan menimbulkan gejala seperti pembesaran parotis dan telapak tangan berwarna kuning seperti jerami (Wiwi dan Sulistyono, 2008: 40-41).

4. Penyebab Anemia

Anemia umumnya disebabkan oleh perdarahan kronik, gizi yang buruk atau gangguan penyerapan nutrisi oleh usus. Juga dapat menyebabkan seseorang mengalami kekurangan darah. Faktor risiko terjadinya anemia memang lebih besar pada perempuan di bandingkan kaum pria. Cadangan besi dalam tubuh perempuan lebih sedikit daripada pria sedangkan kebutuhan per harinya justru lebih tinggi. Seorang wanita atau remaja putri akan kehilangan sekitar 1-2 mg zat besi melalui ekskresi secara normal pada saat menstruasi. Berikut ini tiga kemungkinan dasar penyebab anemia:

a. Penghancuran sel darah merah yang berlebihan

Hal ini bisa disebut sebagai anemia hemolitik yang muncul saat sel darah merah dihancurkan lebih cepat dari normal (umur sel darah merah

normalnya 120 hari). Sehingga sumsum tulang penghasil sel darah merah tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan sel darah merah.

b. Kehilangan darah

Kehilangan darah dapat menyebabkan anemia disebabkan oleh perdarahan berlebihan, pembedahan atau permasalahan dengan pembekuan darah. Kehilangan darah yang banyak karena menstruasi pada remaja atau perempuan juga dapat menyebabkan anemia. Semua faktor ini akan meningkatkan kebutuhan tubuh akan zat besi, karena zat besi dibutuhkan untuk membuat sel darah merah baru.

c. Produksi sel darah merah yang tidak optimal

Hal ini terjadi saat sumsum tulang tidak dapat membentuk sel darah merah dalam jumlah cukup yang dapat diakibatkan infeksi virus, paparan terhadap kimia beracun atau obat-obatan (antibiotik, anti kejang atau obat kanker). Penyebab anemia gizi besi pada remaja putri dapat juga terjadi karena asupan besi yang tidak cukup, adanya gangguan absorpsi besi, kehilangan darah yang menetap, penyakit dan kebutuhan meningkat, yaitu sebagai berikut:

1) Asupan zat besi yang tidak cukup

Apabila makanan yang dikonsumsi tidak mengandung zat besi dalam jumlah cukup, maka kebutuhan tubuh terhadap zat besi tidak terpenuhi, ini dikarenakan rendahnya kualitas dan kuantitas zat besi pada makanan yang kita konsumsi. Kurangnya konsumsi sayuran

dan buah-buahan serta lauk pauk akan meningkatnya risiko terjadinya anemia zat besi.

2) Defisiensi asam folat

Pemberian asam folat sebesar 35% menurunkan risiko anemia. Defisiensi asam folat terutama menyebabkan gangguan metabolisme DNA, akibatnya terjadi perubahan morfologi inti sel terutama sel-sel yang sangat cepat membelah seperti sel darah merah, sel darah putih serta sel epitel lambung dan usus, vagina dan serviks. Kekurangan asam folat menghambat pertumbuhan, menyebabkan anemia megaloblastik dan gangguan darah lainnya, peradangan lidah (glositis) dan gangguan saluran cerna.

3) Gangguan absorpsi

Zat besi yang berasal dari makanan dan masuk kedalam tubuh diperlukan proses absorpsi. Proses tersebut dipengaruhi oleh jenis makanan, dimana zat besi terdapat. Absorpsi zat besi dapat lebih ditingkatkan dengan pemberian vitamin C, hal ini dikarenakan karena faktor reduksi dari vitamin C. Zat besi diangkut melalui dinding usus dalam senyawa dengan asam amino atau dengan vitamin C. Karena itu, sayuran segar dan buah-buahan baik dikonsumsi untuk mencegah anemia. Hal ini dikarenakan bukan bahan makanannya yang mengandung gizi besi, tetapi karena kandungan vitamin C yang mempermudah absorpsi zat besi.

Vitamin C dapat meningkatkan absorpsi zat besi non heme sampai 4 kali lipat. Tidak hanya vitamin C saja yang dapat mempermudah absorpsi zat besi, protein juga ikut mempermudah absorpsi zat besi. Kadang faktor yang menentukan absorpsi pada umumnya lebih penting dari jumlah zat besi dalam makanan.

4) Perdarahan

Perdarahan atau kehilangan darah dapat menyebabkan anemia yang disebabkan oleh perdarahan saluran cerna yang lambat karena polip, neoplasma, gastritis, varises esophagus dan hemoroid. Selain itu perdarahan juga dapat berasal dari saluran kemih seperti hematuri, perdarahan pada saluran napas. Perdarahan yang terjadi membuat hilangnya darah dalam tubuh, biasanya setelah mengalami perdarahan, maka tubuh akan mengganti cairan plasma dalam waktu 1 sampai 3 hari, akibatnya konsentrasi sel darah merah menjadi rendah. Jika tidak ada perdarahan kedua konsentrasi sel darah merah menjadi stabil dalam waktu 3-6 minggu.

Saat kehilangan darah kronis, proses absorpsi zat besi dari usus halus untuk membentuk hemoglobin dalam darah terhambat. Sehingga, terbentuk sel darah merah yang mengandung sedikit hemoglobin yang menimbulkan keadaan anemia.

5) Kecacingan

Infeksi cacing tambang menyebabkan perdarahan pada dinding usus, akibatnya sebagian darah akan hilang dan akan dikeluarkan dari tubuh bersama tinja. Setiap hari satu ekor cacing tambang akan menghisap 0,03 sampai 0,15 ml darah dan terjadi terus-menerus sehingga kita akan kehilangan darah setiap harinya, hal ini yang menyebabkan anemia.

6) Peningkatan kebutuhan zat besi

Kebutuhan zat besi wanita lebih tinggi dari pada pria karena terjadi menstruasi dengan perdarahan sebanyak 50-80 cc setiap bulan dan kehilangan zat besi sebesar 30-40 mg. Pada masa kehamilan wanita memerlukan tambahan zat besi untuk meningkatkan sel darah merah dan membentuk sel darah merah janin dan plasenta serta untuk kebutuhan ibu sendiri (Atikah, dkk. 2019: 12-18).

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia

a. Status ekonomi

Pada umumnya perilaku seseorang dibidang kesehatan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi. WHO melaporkan bahwa tingkat ekonomi berperan sebagai latar belakang (*underlying factor*) dari faktor lainnya dalam mempengaruhi kemaian. Disamping penyebab medis, faktor status ekonomi juga mempunyai peranan penting. Tingkat kemiskinan negara berkembang menjadi penyakit anemia terberat dan

mempunyai dampak yang serius pada sebagian besar negara di dunia. Kesukaran yang ditimbulkan oleh gizi buruk, kekurangan air, tabu terhadap makanan, produksi dan cadangan makanan yang tidak cukup dan tidak adanya sistem jaminan sosial yang tidak efektif secara bersama-sama menurunkan kesehatan dan menyebabkan anemia pada para wanita.

b. Pengetahuan

Tingkat pengetahuan gizi yang rendah juga juga dapat mendukung terjadinya kesalahan dalam penyusunan menu makanan sehari-hari. Sehingga jumlah yang dikonsumsi lebih kecil dari kebutuhan, keadaan ini pasti akan menjadi lebih berat bagi wanita. Karena mengalami peningkatan kebutuhan zat makanan.

c. Pendidikan

Konsumsi tablet dapat menimbulkan efek samping yang mengganggu sehingga orang cenderung menolak tablet yang diberikan. Penolakan tersebut sebenarnya berpangkal dari ketidaktahuan mereka bahwa wanita yang sedang aktif dalam kegiatan memerlukan tambahan zat besi. Agar mengerti, para wanita usia subur harus diberikan pendidikan yang tepat misalnya tentang tanda bahaya yang mungkin terjadi akibat anemia.

d. Budaya

Masalah kekurangan gizi bukan hanya disebabkan oleh faktor sosial ekonomi masyarakat. Namun berkaitan pula dengan faktor budaya

setempat. Persepsi masyarakat yang disebut makanan adalah makan sampai kenyang tanpa memperhatikan jenis komposisi dan mutu makanan. Pendistribusian makanan dalam keluarga yang tidak berdasarkan kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga. Namun berdasarkan pantangan-pantangan yang sebagainya merupakan kebiasaan, adat istiadat dan perilaku masyarakat yang menghambat terciptanya pola hidup sehat di masyarakat.

e. Pola konsumsi tablet zat besi

Penyebab anemia gizi besi pada wanita usia subur dikarenakan kurang masuknya unsur besi dalam makanan, karena gangguan reabsorpsi, gangguan penggunaan atau terlampau banyaknya zat besi keluar dari badan misalnya menstruasi. Karena itu, suplemen zat besi perlu diberlakukan bahkan pada wanita yang bergizi baik.

f. Penyakit infeksi

Penyakit infeksi seperti TBC, cacing usus dan malaria juga penyebab terjadinya anemia karena menyebabkan terjadinya peningkatan penghancuran sel darah merah dan terganggunya eritrosit.

g. Pola makan

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pada wanita. Pada prinsipnya gizi makanan adalah makanan yang sehat dan seimbang. Makanan yang tepat adalah makanan yang lebih baik alami, tidak mengandung zat-zat kimia atau adiktif yang bisa mengancam bahkan bisa membahayakan tubuh. Sebuah pola makan yang baik dan teratur

tentunya dapat membantu tubuh untuk mengatasi berbagai macam penyakit dan serta memilih pengaruh positif pada tubuh. Pola makan juga dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kebiasaan, kesenangan, budaya, agama, taraf ekonomi, dan alam (Noor Hidayah, 2016).

Adapun faktor penyebab yang berpengaruh terhadap kejadian anemia yaitu asupan zat gizi sebagai berikut:

a. Zat besi (Fe)

Zat besi adalah salah satu unsur penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Selain itu zat besi mempunyai beberapa fungsi esensial dalam tubuh, yaitu sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, sebagai alat angkut elektron di dalam sel, dan sebagai bagian terpadu berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh.

Pada wanita, zat besi yang dikeluarkan dari badan lebih banyak dari pada laki-laki. Selain dari kehilangan basal, masih ada kehilangan lewat jalur lain. Setiap bulan wanita dewasa mengalami menstruasi, dan periode menstruasi dikeluarkan zat besi rata-rata sebanyak 28 mg/periode. Oleh karena menstruasi terjadi satu kali dalam satu bulan, maka banyaknya zat besi yang dikeluarkan rata-rata sehari adalah 28 mg dibagi dengan 30 sama dengan 1 mg/hari. Dengan demikian wanita mengeluarkan zat besi dari tubuhnya hamper dua kali lebih banyak dari laki-laki dewasa. Meningkatnya kebutuhan zat besi, bila

diiringi dengan kurangnya asupan zat besi dapat berakibat remaja putri rawan terhadap anemia akibat defisiensi besi.

b. Vitamin C

Zat gizi yang telah dikenal luas sangat berperan dalam meningkatkan absorpsi zat besi adalah Vitamin C. Vitamin C dapat meningkatkan absorpsi zat besi non heme sampai empat kali lipat, yaitu dengan merubah besi feri menjadi fero dalam usus halus sehingga mudah diabsorpsi. Vitamin C menghambat pembentukan hemosiderin yang sukar dimobilisasi untuk membebaskan besi bila diperlukan. Vitamin C pada umumnya hanya terdapat pada pangan nabati, yaitu sayur dan buah terutama yang asam seperti jeruk, nenas, rambutan, papaya, gandaria, dan tomat.

c. Protein

Protein dalam darah mempunyai mekanisme yang spesifik sebagai carrier bagi transportasi zat besi pada sel mukosa. Protein itu disebut transferrin yang disintesa di dalam hati dan transferrin akan membawa zat besi dalam darah untuk digunakan pada sintesa hemoglobin. Dengan berkurangnya asupan protein dalam makanan, sintesa transferrin akan terganggu sehingga kadar dalam darah akan turun. Rendahnya kadar transferrin dapat menyebabkan transportasi zat besi tidak dapat berjalan dengan baik, akibatnya kadar Hb akan menurun.

Protein juga mempunyai peranan penting dalam transportasi zat besi dalam tubuh. Kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi zat besi terlambat sehingga akan terjadi defisiensi zat besi, disamping itu makanan yang tinggi protein terutama berasal dari daging, ikan, dan unggas juga banyak mengandung zat besi (Atikah, dkk. 2019: 34-43).

6. Patofisiologi Anemia

Sel darah merah atau eritrosit adalah sel yang sangat penting untuk makhluk hidup. Sel eritrosit termasuk sel yang terbanyak didalam tubuh manusia. Dalam keadaan fisiologik, darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen, mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi dan mekanisme hemostatis. Darah terdiri dari dua komponen utama, pertama plasma darah yaitu bagian darah yang terdiri dari air, elektrolit dan protein darah, kedua sel-sel darah merah yang terdiri dari sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit) dan keping darah (trombosit) (Indah V dan Tristayanto, 2012).

Pembentukan dan pematangan eritrosit didalam sumsum tulang selama 7 hari. Dalam darah perifer inti umumnya sudah hilang. Retikulosit adalah sel eritrosit termuda yang mengandung RNA , yang jumlahnya cukup untuk menggantikan eritrosit yang mati. Kira-kira 10% dari eritrosit dalam darah perifer adalah retikulosit hal ini hanya 1% dari jumlah rangka hidup eritrosit. Sedangkan panjang masa hidup eritrosit setelah pelepasan

dari sumsum tulang kurang lebih 120 hari sampai mengalami penuaan dan destruksi (Kosasih E.N dan Kosasih A.S, 2008).

Proses penghancuran eritrosit terjadi karena proses penuaan (*senescence*) dan proses patologis (hemolisis). Hemolisis yang terjadi pada eritrosit akan mengakibatkan terurainya komponen-komponen hemoglobin menjadi dua komponen yaitu komponen protein, komponen yang globinnya dikembangkan ke *pool* proein dan dapat digunakan kembali. Kedua komponen heme, yang dipecah menjadi dua yaitu besi dan bilirubin. Besi akan dikembalikan ke *pool* besi dan digunakan ulang. Bilirubin akan di ekskresikan melalui hati dan empedu (Handayani dan Hariwibowo, 2008).

Mekanisme dasar terjadinya anemia dalam tubuh disebabkan 3 proses utama yaitu kurangnya produksi sel darah merah yang sehat oleh “Pabrik” nya, kehilangan sel darah merah dalam jumlah besar dan dihancurkannya sel darah merah dalam jumlah yang besar dalam tubuh itu sendiri. Timbulnya anemia mencerminkan adanya kegagalan sumsum tulang atau kehilangan sel darah merah berlebihan atau keduanya.

Kegagalan sumsum tulang dapat terjadi akibat kekurangan nutrisi, pajanan toksik, tumor atau kebanyakan akibat penyebab yang tidak diketahui. Sel darah merah dapat hilang melalui perdarahan atau hemolisis (destruksi) pada kasus yang disebut terakhir, masalah dapat akibat efek sel darah merah yang tidak sesuai dengan ketahanan sel darah merah normal

atau akibat beberapa faktor diluar sel darah merah yang menyebabkan destruksi sel darah merah.

Lisis sel darah merah (disolusi) terjadi terutama dalam sistem fagositik atau dalam sistem retikuloendotelial terutama dalam hati dan limpa. Sebagai hasil samping proses ini bilirubin yang sedang terbentuk dalam fagosit akan masuk dalam aliran darah. Setiap kenaikan destruksi sel darah merah (hemolisis) segera direpleksikan dengan meningkatkan bilirubin plasma (konsentrasi normalnya 1 mg/dl atau kurang ; kadar 1,5 mg/dl mengakibatkan ikterik pada sklera (Tarwoto dan Wasnidar, 2013:44).

Tanda-tanda dari anemia gizi dimulai dengan menipisnya simpanan zat besi (ferritin) dan bertambahnya absorpsi zat besi yang digambarkan dengan meningkatnya kapasitas pengikatan zat besi. Tahap yang lebih lanjut berupa habisnya simpanan zat besi, berkurangnya kejenuhan transferrin, berkurangnya jumlah protoporphirin yang diubah menjadi darah dan akan diikuti dengan menurunnya kadar ferritin serum. Akhirnya terjadi anemia dengan cirinya yang khas yaitu rendahnya kadar Hb (Atikah, dkk. 2019: 11).

7. Dampak Anemia

Anemia dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada wanita usia subur, diantaranya:

- a. Menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia mudah terkena penyakit infeksi

- b. Menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak.
- c. Menurunnya prestasi belajar dan produktifitas kerja/kinerja.

Dampak anemia pada wanita usia subur akan terbawa hingga dia menjadi ibu hamil, anemia dapat mengakibatkan:

- a. Meningkatkan risiko pertumbuhan janin terhambat (PJT), prematur, BBLR, dan gangguan tumbuh kembang anak diantaranya stunting dan gangguan neurokognitif.
- b. Perdarahan sebelum dan saat melahirkan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya.
- c. Bayi lahir dengan cadangan zat besi (Fe) yang rendah akan berlanjut menderita anemia pada bayi dan usia dini.
- d. Meningkatnya risiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi (Kementerian kesehatan, 2016: 17-18).

Wanita hamil yang menderita anemia yang berat lebih mudah diserang penyakit dan bila bila sakitnya lebih besar kemungkinannya berakhir dengan kematian. Bila tidak terlampau parah, kehamilan tadi dapat diakhiri dengan kelahiran bayi dengan berat lahir rendah yang mungkin disertai juga dengan cadangan zat besi yang rendah. Dalam kaitan dengan berat badan lahir rendah, anemia pada kehamilan yan didiagnosis sebelum pencegahan kehamilan berhubungan dengan meningkatnya risiko kelahiran preterm, sedangkan anemia pada kehamilan yang dideteksi pada akhir masa kehamilan sering kali mencerminkan penambahan volume plasma ibu

hamil. Kadar hemoglobin yang tinggi, hemotokrit yang meningkat dan kadar feritin serum yang meningkat pada masa akhir kehamilan berhubungan dengan meningkatnya risiko persalinan preterm. Risiko ini mencerminkan kegagalan pertahanan volume plasma ibu hamil secara adekuat sehingga menyebabkan perfusi plasenta tidak mencukupi (Hari Basuki.).

Pada wanita hamil, anemia meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Disamping itu, pendarahan antepartum dan post partum lebih sering dijumpai pada wanita yang anemis dan lebih sering berakibat fatal. Sebab wanita yang anemis tidak dapat mentolerir kehilangan darah. Gangguan pada masa nifas yaitu dapat terjadinya subinvolisio uteri, daya tahan tubuh terhadap infeksi dan stress kuran, produksi ASI kurang (Saleha, 2009).

8. Tatalaksana Anemia

a. Tatalaksanaan Umum

Perawatan anemia sangat bervariasi dan tergantung penyebab dan beratnya anemia. Jika anemia ringan dan berhubungan tanpa gejala atau gejala minimal, penyelidikan menyeluruh oleh dokter akan dilakukan diluar pasien. Jika penyebab telah ditemukan, maka perawatan yang tepat akan dimulai. Misalnya, jika anemia ringan dan ditemukan terkait dengan kadar zat besi rendah, maka suplemen zat besi dapat diberikan saat penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan penyebab kekurangan zat

besi dilakukan. Di sisi lain, jika anemia berhubungan dengan kehilangan darah secara tiba-tiba dari cedera atau perdarahan tukak lambung.

Kemudian rawat inap dan transfusi sel darah merah mungkin diperlukan untuk meringankan gejala dan mengganti darah yang hilang. Langkah-langkah lebih lanjut untuk mengontrol perdarahan dapat terjadi pada saat yang sama untuk menghentikan kehilangan darah lebih lanjut. Transfusi darah mungkin diperlukan dalam keadaan lain yang kurang kritis juga. Pengobatan harus ditujukan pada penyebab anemia, dan mungkin termasuk:

- a. Transfusi darah
- b. Kortikosteroid atau obat-obatan lainnya yang menekan sistem kekebalan tubuh
- c. Erythropoietin, obat yang membantu sumsum tulang membuat sel-sel darah
- d. Suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, atau vitamin dan mineral lainnya.

Pada anemia berat, transfusi darah mungkin diperlukan. Vitamin B12 injeksi akan diperlukan untuk pasien yang menderita anemia pernisiiosa atau penyebab lainnya dari kekurangan vitamin B12. Pada pasien tertentu dengan penyakit sumsum tulang (atau tulang sumsum rusak dari kemoterapi) atau pasien dengan gagal ginjal, alfa epoetin (Procrit, epogen) dapat digunakan untuk merangsang sumsum tulang produksi sel darah merah.

b. Tatalaksanaan Khusus

Bila tersedia fasilitas pemeriksaan penunjang, tentukan penyebab anemia berdasarkan hasil pemeriksaan darah perifer lengkap dan apus darah tepi:

- 1) Anemia mikrositik hipokrom dapat ditemukan pada keadaan defisiensi besi lakukan pemeriksaan ferritin. Apabila ditemukan kadar ferritin < 15 mg/ml, berikan terapi besi dengan dosis setara 180 mg besi elemental per hari. Apabila kadar ferritin normal, lakukan pemeriksaan SI dan TIBC. Pada Pasien dengan kecurigaan thalassemia perlu dilakukan tatalaksana bersama dokter spesialis penyakit dalam untuk perawatan yang lebih spesifik.
- 2) Anemia normositik normokrom dapat ditemukan pada keadaan Perdarahan segera tanyakan riwayat dan cari tanda dan gejala aborsi, mola, kehamilan ektopik, atau perdarahan pasca persalinan dan Infeksi kronik.
- 3) Anemia makrositik hiperkrom dapat ditemukan pada keadaan defisiensi asam folat dan vitamin B12 berikan asam folat 1x2 mg dan vitamin B12 1x250–1000 μ g.

9. Cara Pencegahan dan Penanggulangan Anemia

Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia dilakukan dengan memberikan asupan zat besi yang cukup kedalam tubuh untuk meningkatkan pembentukan hemoglobin. Upaya yang dapat dilakukan adalah:

a. Meningkatkan asupan makanan sumber zat besi

Meningkatkan asupan makanan sumber zat besi dengan pola makan bergizi seimbang, yang terdiri dari aneka ragam makanan, terutama sumber pangan hewani yang kaya zat besi dengan jumlah yang cukup sesuai dengan AKG. Selain itu juga perlu meningkatkan sumber pangan nabati yang kaya zat besi, walaupun penyerapannya lebih rendah dibanding dengan hewani. Makanan yang kaya sumber zat besi dari hewani contohnya hati, daging dan unggas, sedangkan dari nabati yaitu sayuran berwarna hijau tua dan kacang-kacangan.

Untuk meningkatkan penyerapan zat besi dari sumber nabati perlu mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu. Penyerapan zat besi dapat dihambat oleh zat lain, seperti tanin, fosfor, serat, kalsium, dan fitat.

Al-Qur'an juga memberikan kabar gembira kepada manusia tentang obat yang mampu menyembuhkan penyakit, terutama penyakit jasmani. Al-Qur'an menyebutkan madu sebagai obat, diketahui bahwa satu-satunya gizi yang Allah swt. sifati dengan obat bagi manusia adalah madu. Sebagaimana terdapat dalam QS al-Nahl/16: 69.

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya :

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”.

Quraish Shihab dalam penafsirannya menjelaskan bahwa Kemudian Allah memberi petunjuk pada lebah untuk menjadikan buah-buahan dari berbagai jenis pohon dan tumbuhan sebagai makanannya. Berkat petunjuk yang telah diberikan oleh Tuhan itu, lebah menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan sangat mudah. Dari dalam perut lebah keluar sejenis minuman beraneka warna dan berguna sekali bagi kesehatan manusia. Dan sesungguhnya pada ciptaan yang unik itu terdapat pertanda akan wujud sang Pencipta Yang Mahakuasa lagi Maha bijaksana. Orang-orang yang berakal akan merenungkan hal itu sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan abadi (Shihab, M Quraish, 2019).

Madu merupakan jenis zat yang mengandung unsur glukosa dan perfermentous (semacam zat gula yang sangat mudah dicerna) dalam porsi cukup besar. Melalui ilmu kedokteran modern didapat kesimpulan bahwa glukosa berguna sekali bagi proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit melalui injeksi atau dengan perantaraan mulut yang berfungsi sebagai penguat. Di samping itu, madu juga memiliki

kandungan vitamin yang cukup tinggi terutama vitamin B kompleks (Nurfaidah, 2019).

b. Fortifikasi bahan makanan dengan zat besi

Fortifikasi bahan makanan yaitu menambahkan satu atau lebih zat gizi kedalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut. Penambahan zat gizi dilakukan pada industry pangan, untuk itu disarankan membaca label kemasan untuk mengetahui apakah bahan makanan tersebut sudah difortifikasi dengan zat besi. Makanan yang sudah difortifikasi antara lain tepung terigu, minyak goreng, mentega, dan beberapa *snack*. Zat besi dan vitamin mineral lain juga dapat ditambahkan dalam makanan yang disajikan dirumah tangga dengan bubuk tabor gizi atau dikenal juga dengan *Multiple Micronutrient Powder*.

c. Suplementasi zat besi

Pada keadaan dimana zat besi dari makanan tidak mencakupi kebutuhan terhadap zat besi, perlu didapat dari suplementasi zat besi. Pemberian suplementasi zat besi secara rutin selama jangka waktu tertentu bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat, dan perlu dilanjutkan untuk meningkatkan simpanan zat besi di dalam tubuh.

Suplementasi tablet tambah darah pada remaja putri dan wanita usia subur merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesi untuk memenuhi asupan zat besi. Pemberian tablet tambah darah dengan dosis

yang tepat dapat mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi di dalam tubuh (Kementrian Kesehatan. 2016: 18-20).

C. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney

Adapun 7 langkah manajemen asuhan kebidanan menurut Helen Varney adalah:

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan dan kerangka berpikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (kepmenkes 369; 2007,5).

Menurut helen varney (2007) Manajemen kebidanan merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan dengan urutan logis dan perilaku yang diharapkan dari pemberi asuhan yang berdasarkan ilmiah ,penemuan, dan keterampilan dalam tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien (Surachmandari dan Yulifa, 2014: 126).

Asuhan yang dilakukan harus dicatat secara benar, jelas, singkat, dan logis dalam suatu metode pendokumentasian kepada orang lain mengenai asuhan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan pada seorang klien, yang didalamnya tersirat proses berpikir yang sistemis seorang bidan dalam menghadapi seorang klien sesuai langkah-langkah dalam proses manajemen kebidanan (Surachmindari dan Yulifa, 2014: 126).

2. Tahap-Tahap Manajemen Asuhan Kebidanan

a. Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk evaluasi keadaan secara lengkap, menyeluruh dan fokus yaitu menanyakan riwayat kesehatan. Data yang diperoleh untuk kasus anemia yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data lengkap dari klien dengan menilai keadaan klien melalui anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (laboratorium).

Data subjektif adalah data yang ditetapkan dari ibu seperti ibu mengeluh sering merasa lelah dan sering mengantuk, merasa pusing dan lemah, merasa tidak enak badan, mengeluh sakit kepala sampai penglihatan berkunang-kunang. Data objektif adalah data dari hasil pemeriksaan akan ditemukan pucat pada membrane mukosa dan konjungtiva, kulit pucat, pucat pada kuku jari, muka ikterik dan data penunjang pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan Hb.

b. Langkah II. Mengidentifikasi diagnosis atau masalah aktual

Pada langkah kedua ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan intervensi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang dialami

wanita diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan hasil pengkajian. Masalah juga sering menyertai diagnosis.

Diagnosis pada ibu dengan anemia dapat ditetapkan berdasarkan data objektif hasil pemeriksaan fisik konjungtiva pucat serta data penunjang yang ditentukan dengan tes skrining melalui pengukuran kadar Hb, Hematokrit (Ht), volume sel darah merah (MCV), serta konsentrasi Hb dalam sel darah merah (MCH) dengan batasan terendah 95% acuan (Fill, dkk. 2016:56).

c. Langkah III. Mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial

Langkah ketiga merupakan langkah ketika bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis/masalah yang sudah diidentifikasi (Samarianty, 2012).

Masalah potensial yang bisa timbul Pada kasus anemia yang tidak tertangani dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan komplikasi salah satunya adalah masalah pada jantung, seperti detak jantung yang cepat dan tidak beraturan. Kondisi ini dapat memicu kardiomegali atau gagal jantung.

d. Langkah IV: Tindakan segera/Kolaborasi

Merupakan tindakan segera terhadap kondisi yang diperkirakan akan membahayakan klien. Tindakan ini dilaksanakan secara kolaborasi dan rujukan sesuai dengan kondisi klien. Pada penderita

dengan anemia tidak memerlukan tindakan emergency kecuali jika kondisi anemia yang disebabkan oleh perdarahan dan membutuhkan transfusi darah.

Transfusi untuk anemia dilakukan pada pasien dengan kondisi kadar Hb <7gr% atau kadar hematokrit <20% atau Kadar Hb 7gr% dengan gejala klinis pusing, pandangan berkunang-kunang, atau takikardia (frekuensi nadi >100 x/menit).

e. Langkah V: Rencana asuhan kebidanan

Pada langkah tersebut dilakukan perencanaan yang menyeluruh Rencana untuk pemecahan masalah dibagi menjadi tujuan, rencana pelaksanaan dan evaluasi. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi klien (diagnosa, masalah dan diagnosa potensial) berkaitan dengan semua aspek asuhan kebidanan. (Jannah, 2011).

Penatalaksanaan khusus pada penderita anemia dapat dilakukan pemeriksaan penunjang bila tersedia fasilitas lengkap, tentukan penyebab anemia berdasarkan hasil pemeriksaan darah perifer lengkap dan apus darah tepi. Untuk Anemia mikrositik hipokrom dapat ditemukan pada keadaan dengan defisiensi besi lakukan pemeriksaan ferritin. Apabila ditemukan kadar ferritin < 15 mg/ml, berikan terapi besi dengan dosis setara 180 mg besi elemental per hari. Apabila kadar ferritin normal, lakukan pemeriksaan SI dan TIBC.

Anemia makrositik hiperkrom dapat ditemukan pada keadaan defisiensi asam folat dan vitamin B12 penatalaksanaan dilakukan dengan

berikan asam folat 1 x 2 mg dan vitamin B12 1 x 250 – 1000 µg .
Pentalaksanaan dengan transfusi untuk anemia dilakukan pada pasien dengan kondisi kadar Hb 7 g/dl dengan gejala klinis pusing, pandangan berkunang-kunang, atau takikardia (frekuensi nadi >100 x/menit) (Ellisabeth M.F. Lalita, 2013:125-130).

f. Langkah VI : Pelaksanaan (Implementasi)

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan, klien, keluarga klien, dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Bidan harus melaksanakan implementasi yang efisien terhadap waktu, biaya dan kualitas pelayanan. Pada penderita anemia semua tindakan dapat dikukan secara umum sesuai dengan rencana asuhan.

g. Langkah VII: Evaluasi

Pada langkah tersebut dilakukan evaluasi ke efektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat di anggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Adapun kemungkinan bahwa sebagian belum efektif (Jannah, 2011).

Pada prinsip tahapan evaluasi adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Bidan dapat menyimpulkan jumlah kadar Hb dengan melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kadar Hb kembali normal

atau >11 gr%, tidak terjadi komplikasi, serta kebutuhan ibu nutrisi tubuhnya terpenuhi.



BAB III

TELUSURAN *EVIDANCE BASED LEARNING*

A. Matriks Langkah I

Pada langkah pertama ini Bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien

Tabel 3.1 Identifikasi Data Dasar

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Program Pencegahan Anemia Bagi Wanita Masa Prakonsepsi di Wilayah Kerja Puskesmas Sedimen Kabupaten Karangasem	L.S. Ani, I.W. Weta, N.W.A. Utami, W. Suranadi, K. Suwiyoga	2018	Penyebab anemia	Anemia disebabkan oleh adanya kehilangan zat besi karena perdarahan, faktor nutrisi, peningkatan kebutuhan zat besi serta gangguan absorpsi besi. Kehilangan darah dapat terjadi oleh karena perdarahan menahun yang bersumber dari saluran cerna. Pada wanita dapat terjadi perdarahan pervaginam oleh karena menorhagia dan	Gejala anemia yang sering tidak dikenali sebagai suatu masalah kesehatan oleh wanita prakonsepsi, berdasarkan hal tersebut perlu adanya perbaikan metode pemberian tablet besi dan upaya peningkatan pengetahuan wanita prakonsepsi tentang anemia.	menggunakan metode pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dengan melakukan pendampingan kegiatan program pencegahan anemia bagi wanita masa prakonsepsi	Berbeda dari hasil penelitian Noor Hidayah (2016) yang mengatakan bahwa faktor penyebab anemia yaitu pola makan, penghasilan orang tua dan perspektif gender

					metrorrhagia. Faktor nutrisi sebagai penyebab anemia adalah kurangnya jumlah zat besi total dalam makanan dan kualitas besi dengan bioavailibilitas rendah.		setiap 2 bulan sekali selama 3 kali berturut-turut	
2.	Analisis Faktor Penyebab Anemia Wanita Usia Subur di Desa Jepang Pakis Kabupaten Kudus	Noor Hidayah	2016	Faktor penyebab anemia	Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pola makan, penghasilan keluarga dan perspektif gender dengan kejadian anemia pada WUS di Desa Jepang Pakis Kabupaten Kudus. Yakni $p X^2 = <0,05$.	Pada penelitian ini diharapkan petugas kesehatan memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memotifasi ibu wanita usia subur melalui promosi kesehatan (pendidikan kesehatan) dengan pendekatan permasalahan yang ditemukan agar tidak terjadi anemia.	Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional.	Hal ini sejalan dengan penelitian yang disampaikan Mosse (1996) dalam Linda, 2012 menyatakan bahwa penyebab anemia secara tidak langsung adalah status perempuan yang masih rendah di dalam keluarga. Bahkan masyarakat duniapun lazim bahwa

								perempuan dan anak perempuan makan setelah laki- laki dan anak laki- laki, sekalipun wanita tersebut sedang hamil atau menyusui.
3.	Faktor Determinan Anemia Pada Wanita Dewasa Usia 23-35 Tahun	Erizka Marwita Triyonate, Apoina Kartini	2015	Faktor determinan anemia	Responden yang obesitas sebanyak 31 orang (50%), dan terdapat kejadian anemia sebanyak 9,7% . Sebanyak 40,3% wanita dewasa yang asupan folat kurang dari kebutuhan, sedangkan asupan protein, vitamin C, vitamin B12, folat, besi dan seng sebagian besar sudah dalam kategori cukup. Hasil analisis bivariat menunjukkan tidak ada korelasi bermakna antara	Populasi pada penelitian ini dikelompokkan berdasarkan umur diantara 23-35 tahun yang memiliki berat badan normal dan obesitas.	Pada penelitian ini sampel dan kriteria inklusi terdiri dari wanita usia 23-35 tahun di RW 03, 04, dan 05 Kelurahan Ngaliyan Semarang yang bersedia menjadi responden, tidak sedang mengkonsumsi suplemen	Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan anemia dengan status gizi sehingga hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian di Meksiko tahun 2011 bahwa wanita dewasa normal dan obesitas dapat menyebabkan

					status gizi menurut IMT , asupan protein, vitamin C, folat, vitamin B12, dan seng dengan kejadian anemia pada wanita dewasa ($p > 0,05$). Ada korelasi yang bermakna antara asupan zat besi dengan kejadian anemia ($p < 0,05$).		tambah darah, dan tidak sedang dalam keadaan menstruasi.	anemia
4.	Skrining dan determinan kejadian anemia pada remaja putri SMA Negeri 3 Kendari Tahun 2017	Nur Ia Kaimudin, Hariati Lestari, Jusniar Rusli Afa	2017	Faktor determinan kejadian anemia	Hasil analisis menggunakan uji chi square yaitu status gizi, tingkat asupan vitamin A dan tingkat asupan vitamin C berhubungan secara signifikan dengan kejadian anemia pada remaja putri SMA Negeri 3 Kendari tahun 2017	Pada penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan dan informasi untuk penelitian selanjutnya dan dapat melakukan penelitian tentang anemia dengan variabel yang berbeda yang relevan,	Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan metode propotional stratifien random sampling yaitu merupakan suatu metode pengambilan sampel dimana populasi bersifat heterogen	Hal ini didukung oleh teori Almatsier bahwa absorpsi besi yang efektif dan efisien memerlukan suasana asam dan adanya reduktor, seperti vitamin C. Absorpsi besi dalam bentuk heme dapat meningkatkan empat kali lipat

						misalnya hubungan penyakit infeksi parasit, asupan kalori, hubungan kebiasaan begadang malam terhadap kejadian anemia, hubungan sarapan pagi dengan kejadian anemia dan lain-lain.	dibagi bagi dalam lapisan-lapisan (kelas), sehingga didapatkan total sampel sebanyak 72 orang.	dengan adanya vitamin C. Oleh karena itu, kekurangan vitamin C dapat menghambat proses absorpsi besi sehingga lebih mudah terjadi anemia.
5.	Hubungan antara kecukupan energi dan protein dengan prevalensi anemia pada wanita usia subur di kecamatan Ciampea Bogor	Dian Sufyan, Sreymom Oy, Selvi Mardiana	2019	Faktor terjadinya anemia pada wanita usia subur berdasarkan kecukupan energi dan protein	Teori menyebutkan bahwa anemia dipengaruhi oleh multi faktor seperti asupan makanan sumber zat besi, folat, vitamin B12, inflamasi kronis, infeksi dan genetic. ⁸ Lebih lanjut, defisiensi zat besi menjadi faktor utama yang berkontribusi pada terjadinya anemia	populasi pada studi ini adalah WUS (15 – 44 tahun) yang memiliki anak usia bawah dua tahun (< 23 bulan).	Penelitian menggunakan desain cross sectional, dimana data status anemia dan kecukupan energi dan protein diambil dalam satu waktu. Peneliti juga menggunakan metode sampling multi stage random	Hal ini tidak sejalan dengan teori dari Almatsier bahwa zat besi dan protein adalah komponen utama untuk membuat haemoglobin dan seharusnya berhubungan dengan anemia.

							sampling sehingga total sampel yang dibutuhkan adalah 580 WUS	
6.	Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia gizi pada remaja putri di SMKN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah	Akma Listiana	2016	Faktor-faktor kejadian anemia gizi besi pada remaja putri di SMKN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah	Berdasarkan hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia gizi besi ialah indeks masa tubuh, pengetahuan, asupan suplemen zat besi, dan keadaan menstruasi	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja putri di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah yang berjumlah 600 remaja putri.	Metode penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan desain <i>analitik survey</i> dan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Weliyati (2010) dimana diketahui bahwa ada hubungan antara lama menstruasi dengan kejadian anemia.
7.	Hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri SMAN 1 Pangkalan	Fitri Apriyanti	2019	Hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri SMAN 1 Pangkalan	Hasil penelitian didapatkan ada hubungan status gizi, pengetahuan dan riwayat menstruasi dengan kejadian anemia	Populasi dalam penelitian ini adalah siswi SMAN 1 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang berjumlah sebanyak 237 orang.	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitianan aliti, serta teknik yang digunakan	Dari 38 responden dengan status gizi tidak normal, terdapat 10 responden (26,3%) yang tidak anemia

	Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2019			Kerinci Kabupaten Pelalawan			yaitu teknik Stratified Random yaitu pengambilan sampel dengan memperhatikan strata atau tingkatan dalam populasi	disebabkan karena 4 orang remaja memiliki riwayat menstruasi normal dan pengetahuan yang baik, 1 orang remaja memiliki riwayat menstruasi normal, 5 orang remaja memiliki pengetahuan yang baik.
8.	Pengetahuan dan Perilaku Konsumsi Remaja Putri yang Berhubungan dengan Status Anemia	Sintha Fransiske Simanungkalit dan Oster Suriani Simarmata	2019	Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Konsumsi Remaja Putri dengan Status Anemia	Faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia remaja putri dalam penelitian ini adalah pengetahuan (p value = 0,004), status gizi (p value = 0,034) dan pola konsumsi inhibitor Fe (p value = 0,009). Setelah dilakukan uji multivariat didapatkan pengetahuan	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas X dan XI pada kedua sekolah. Untuk menghitung besar sampel dalam penelitian ini digunakan rumus.	Penelitian ini menggunakan desain penelitian potong lintang. Penelitian dilakukan di SMA Muhammadiyah 4 Depok dan SMK Al-Hidayah	Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian di Pare-Pare bahwa ada hubungan pola makan khususnya konsumsi teh dengan anemia remaja putri.20 Penelitian di

					anemia sebagai faktor dominan anemia remaja putri dengan OR 3,3.		Cinere pada bulan September - Oktober 2018.	Bengkulu juga didapatkan ada hubungan pola konsumsi inhibitor Fe dengan anemia remaja putri.
9.	Profil Konsumsi Zat Gizi Pada Wanita Usia Subur Anemia	Enggar Wijayanti, Ulfa Fitriani	2019	Hubungan Zat Gizi Pada Wanita Usia Subur Anemia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar subjek memiliki status gizi normal. Tingkat konsumsi zat besi, asam folat, dan seng subjek kurang dari AKG, konsumsi energi dalam kategori cukup, dan konsumsi protein, vitamin A serta vitamin C lebih dari AKG. Hasil uji bivariat chi-square menunjukkan tidak ada korelasi yang bermakna antara status anemia dengan konsumsi zat gizi ($p>0,05$). Jadi dari hasil penelitian tersebut wanita usia subur yang	Pada penelitian ini perlu dilakukan pemantauan status besi pada WUS secara rutin sebagai tindakan pencegahan terjadinya anemia, serta diharapkan agar WUS memperhatikan asupan zat gizi baik makro dan mikro yang diperlukan tubuh untuk sintesis heme dalam upaya mengurangi risiko terkena anemia.	Penelitian ini merupakan penelitian <i>cross sectional</i> dan merupakan bagian dari penelitian payung Observasi Klinik Formula Jamu Anemia” yang dilakukan dari bulan Maret-Desember 2018.	Hal ini tidak sesuai dengan penelitian di Peru yang menunjukkan adanya peningkatan kadar feritin dan Hb pada subjek yang diberikan suplementasi besi dan seng

					menderita anemia rata-rata memiliki tingkat konsumsi zat besi, asam folat, dan seng kurang dari AKG.			
10	Anemia Defisiensi Besi dan Indeks Massa Tubuh Terhadap Siklus Menstruasi Remaja	Sri Hidayati, Esti Kusumawati, Nova Lusiana, Ika Mustika	2019	Hubungan Anemia dan Indeks Massa Tubuh Terhadap siklus menstruasi remaja	Hasil Penelitian menunjukkan 15% remaja putri mengalami anemia, 48,3% indeks massa tubuh tidak normal dan 46,7% siklus menstruasi tidak normal. Tidak terdapat pengaruh anemia dan indeks massa tubuh terhadap menstruasi remaja putri.	Perlu dikaji lebih lanjut tentang pengaruh anemia dan indeks massa tubuh terhadap siklus menstruasi dengan jumlah sampel yang lebih besar serta perlu dikaji tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi siklus menstruasi pada remaja putri.	Penelitian ini merupakan penelitian <i>cross sectional</i> dan merupakan bagian dari penelitian payung Observasi Klinik Formula Jamu Anemia” yang dilakukan dari bulan Maret-Desember 2018.	Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tita pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa rerata kadar Hb remaja putri yang mempunyai siklus menstruasi normal lebih tinggi dibandingkan kadar Hb Remaja putri dengan pola siklus menstruasi tidak normal.

B. Langkah 2 Identifikasi Masalah Aktual

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi terhadap data-data yang dikumpulkan.

Tabel 3.2 Identifikasi Masalah Aktual

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kekurangan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Diagnosis dan Tatalaksana Anemia Defisiensi Besi	Ajeng Amalia, Agustyas Tjiptaning rum	2016	Cara mendiagnosis Anemia defisiensi besi	Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa diagnosis anemia dapat ditegakkan berdasarkan (1) Anamnesis untuk mencari faktor predisposisi dan etiologi. (2) Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan adanya gejala pucat menahun tanpa disertai adanya organomegali, seperti <i>hepatomegaly</i> dan <i>splenomegaly</i> . (3) Pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah rutin seperti Hb, PCV (<i>Packed Cell Volume</i>), leukosit, trombosit ditambah pemeriksaan indeks eritrosit, retikulosit, saturasi morfologi	Dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan bagaimana cara pencegahan agar tidak terjadi anemia defisiensi besi	Dapat mengetahui cara mendiagnosis anemia defisiensi besi	Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan Devi Qurrotu Ainy (2017).

					darah tepi dan pemeriksaan status besi (Fe serum, TIBC, Transferrin, <i>Free Erythrocyte Protoporphyrin</i> (FEP), ferritin).			
2.	Pencegahan Anemia Pada Remaja Di Indramayu	Tating Nuraeni	2019	Dampak dari anemia	Anemia menyebabkan darah tidak cukup mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru keseluruh tubuh. Bila oksigen yang diperlukan tidak cukup, maka akan berakibat pada sulitnya berkonsentrasi sehingga prestasi belajar menurun. Kemudian daya tahan fisik rendah sehingga mudah lelah, aktivitas fisik menurun dan mudah sakit karena daya tahan tubuh rendah.	Kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi zat besi terlambat, sehingga akan terjadi defisiensi zat besi.	Metode kegiatan ini yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimana hasil dari kegiatan ini mendapatkan antusiasme peserta yang semakin memahami tentang anemia.	Konsumsi tablet tambah darah sangat penting dilakukan untuk mencegah anemia dan mempersiapkan proses kehamilan ketika sudah dewasa nanti, karena remaja yang sehat kelak akan menjadi ibu hamil sehat yang dapat melahirkan anak yang sehat.
3.	Gejala Anemia Pada Santriwati Arroyan: Studi tentang Pengetahuan	Devi Qurrotu Ainy	2017	Gejala dari Anemia	Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan gejala-gejala anemia yang dialami Santriwati Arroyan yaitu letih, lesu, sering pusing, muka yang pucat dan pada	Penelitian ini tidak menyatakan berapa jumlah populasi yang	Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian survei analitik	Penelitian ini sependapat dengan penelitian L.S. Ani, I.W. Weta, N.W.A Utami, W.

	Anemia di tingkat Mahasantri				konjungtiva terlihat warna yang pucat	digunakan	pendekatan yang digunakan adalah <i>cross sectional</i> .	Suranadi, K. Suwiyoga (2018) mengenai gejala yang ditimbulkan dari anemia
4.	Program Pencegahan Anemia bagi wanita masa prakonsepsi di wilayah kerja Puskesmas Sedimen Kabupaten Karangasem	L.S. Ani, I.W. Weta, N.W.A Utami, W. Suranadi, K. Suwiyoga	2018	Gejala anemia	Gejala anemia sering tidak dikenali sebagai suatu masalah kesehatan oleh wanita prakonsepsi. Dari hasil pengukuran didapatkan kejadian anemia di dahului dengan adanya keluhan seperti letih, lesu, pusing kepala serta cepat lelah. Kondisi tersebut akan menurunkan produktivitas kerja dari wanita prakonsepsi.	Tidak menjelaskan tentang teknik penelitian yang digunakan	Pada jurnal ini diberikan solusi dalam menangani masalah anemia serta pencegahan terhadap anemia.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Devi Qurrotu Ainy (2017)
5.	Faktor Determinan Anemia Pada Wanita Usia Dewasa Usia 23-35 Tahun	Erizka Marwita Triyonate, Apoina Kartini	2015	Hubungan obesitas dengan anemia	Hasil penelitian menunjukkan obesitas berkaitan dengan anemia karena penimbunan lemak di jaringan adiposa dapat menurunkan penyerapan zat besi. Timbunan lemak pada hati dapat memicu pembentukan peroksida lipid yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses	Dalam penelitian tidak dijelaskan mengenai faktor risiko yang dapat timbul jika terjadi anemia akibat	Menggunakan sampel sebanyak 62 sampel yang dipilih secara consecutive sampling dimana populasi dikelompokkan	Pada penelitian lain juga dikatakan bahwa leptin yang merupakan adipokin yang dihasilkan oleh jaringan lemak juga berperan penting untuk

					metabolisme besi sehingga akan terjadi radikal bebas. Hal ini menyebabkan sintesis Hb tidak dapat berjalan dengan sempurna. Pada tahap akhir, hemoglobin menurun jumlahnya dan eritrosit mengecil sehingga dapat terjadi anemia	karena obesitas. Dalam penelitian ini juga tidak dijelaskan mengenai pola diet yang sehat bagi wanita obesitas dalam mencegah dan menanggulangi anemia.	n berdasarkan umur 23-35 tahun yang memiliki berat badan normal dan obesitas.	menstimulasi pengeluaran hepsidin pada penderita obesitas.
6.	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia	Atik Purwandari, Freike Lumy, Feybe Polak	2016	Faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia	Hasil uji statistik setelah dilakukan penelitian, didapatkan ada hubungan signifikan antara paritas, umur serta tingkat konsumsi tablet zat besi dengan kejadian anemia. Serta didapatkan hasil tidak ada hubungan antara pendidikan dengan tingkat anemia	Jurnal ini tidak menjelaskan secara spesifik tentang hasil yang di dapatkan bahwa tidak ada hubungan antara pendidikan	Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat dekriptif analitik yang berupaya mencari hubungan antara variable. Deskriptif analitik	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Akma Listiana (2016).

						dengan tingkat anemia. Serta tidak ada hasil penelitian lain yang membandingkan hal tersebut.	menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i> dengan rancangan studi retrospektif.	
7.	Asupan Protein Nabati dan Kejadian Anemia Wanita Usia Subur Vegan	Fajar Ari Nugroho, Dian Handayani, Yosi Apriani	2015	Hubungan asupan protein nabati dengan kejadian anemia	Kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi zat besi terhambat sehingga bisa mengakibatkan terjadinya defisiensi besi. Hasil analisis hubungan tingkat konsumsi protein nabati dengan kejadian anemia pada WUS vegetarian berdasarkan uji <i>chi-square</i> menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara asupan protein nabati dengan kejadian anemia ($p=0.002$)	Penelitian ini berupa tingkat pengetahuan dan perilaku	Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Cross sectional	Penelitian lain menyebutkan bahwa kekurangan konsumsi energi meningkatkan risiko anemia karena terjadi pemecahan protein yang digunakan untuk energi. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh yang berakibat pada gangguan dalam proses

								pembentukan hemoglobin.
8.	Anemia Defisiensi Besi	Novi Lestari	2017	Patofisiologi anemia defisiensi besi	Tanda-tanda dari anemia gizi dimulai dengan menipisnya simpanan zat besi (ferritin) dan bertambahnya absorpsi zat besi yang digambarkan dengan meningkatnya kapasitas pengikatan besi. Pada tahap yang lebih lanjut berupa habisnya simpanan zat besi, berkurangnya kejenuhan transferrin, berkurangnya jumlah protoporphirin yang diubah menjadi heme, dan akan diikuti dengan menurunnya kadar ferritin serum. Akhirnya terjadi anemia dengan cirinya yang khas yaitu kadar Hb.	Penatalaksanaan anemia belum banyak menggunakan aspek preventif atau pencegahan	Model intervensi dengan <i>metode peer group sharing</i> untuk pencegahan dan penanggulangan anemia adalah metode yang kualitasnya bisa ditingkatkan karena modelnya lebih komprehensif	Cara lain untuk menentukan adanya anemia defisiensi besi adalah dengan trial pemberian preparat besi. Penentuan ini penting untuk mengetahui adanya anemia defisiensi besi subklinis dengan melihat respons hemoglobin terhadap pemberian preparat besi. Bila dengan pemberian preparat besi dosis 6 mg/kg/BB/hari selama 3-4 minggu terjadi peningkatan kadar Hb 1-2 mg/dl

								maka dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan menderita anemia defisiensi besi.
9.	Perbandingan Beberapa Metode Diagnosis Anemia Defisiensi Besi	Ketut Suega, I Made Bakta, Losen Adnyana, Tjok Darmayud a	2017	Diagnosis anemia	Diagnosis anemia defisiensi besi dibuat berdasarkan pemeriksaan klinik dan penunjang laboratorium serta penunjang lainnya, untuk membuktikan adanya anemia defisiensi besi serta penyebab anemia tersebut. Pemeriksaan yang umum dipakai adalah (1) Pemeriksaan morfologi eritrosit (baik dengan hapusan darah tepi maupun dengan alat hitung elektronik); (2) Pemeriksaan kadar besi serum dan total iron binding capacity (TIBC); (3) Pemeriksaan kadar feritin serum; (4) Pengecatan besi sumsum tulang.	Pemeriksaan untuk mencari penyebab anemia defisiensi besi perlu juga diteliti karena etiologi anemia defisiensi besi berbeda-beda menurut daerah masing-masing.	Penelitian lapangan memerlukan cara diagnosis yang praktis, lebih sederhana dan tidak terlalu invasif. Sedangkan di klinik memerlukan pemeriksaan yang akurasiya baik meskipun bersifat invasif.	Pentingnya peran diagnosis dengan akurat yang baik dan disesuaikan dengan setting setempat dan pengenalan pola etiologi anemia defisiensi besi yang merupakan syarat untuk memberikan terapi diklinik dan dalam menyusun strategi pencegahan anemia di lapangan.
10	Analisis faktor-faktor yang	Akma Listiana	2016	Faktor penyebab anemia gizi	Penyebab utama anemia gizi pada wanita adalah kurang memadainya asupan makanan	Masalah anemia pada remaja putri	Mampu mengetahui faktor	Penelitian ini sama dengan maksud penelitian

	<p>berhubungan dengan kejadian anemia gizi pada remaja putri di SMKN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah</p>			<p>pada wanita</p>	<p>sumber Fe, perdarahan patologis akibat penyakit malaria atau infeksi parasit seperti cacingan. Penyebab lainnya adalah dikarenakan asupan dan serapan zat besi yang tidak adekuat yaitu dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang dapat mengganggu penyerapan zat besi seperti the secara bersamaan pada waktu makan. Faktor lainnya yaitu pengetahuan yang kurang tentang anemia, sikap yang tidak mendukung, pendidikan ibu maupun tingkat sosial ekonomi.</p>	<p>terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang gizi yang kurang memadai, asupan tablet Fe yang kurang, dan pola konsumsi remaja putri yang lebih banyak mengonsumsi makanan nabati yang kandungan zat besinya sedikit dibandingkan makanan hewani sehingga pemenuhan zat besi tidak terpenuhi</p>	<p>penyebab dari anemia gizi pada wanita</p>	<p>Ani (2019) mengenai penyebab dari anemia</p>
--	---	--	--	--------------------	--	--	--	---

11	Pengaruh Pemberian Madu Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin pada Mahasiswi S1 Keperawatan Reguler dengan Anemia di Institut Medika Drg. Suherman Tahun 2019	Ani Nurfaidah	2019	Penyebab anemia	Penyebab utama anemia pada wanita adalah kurang memadainya asupan makanan sumber Fe. Sedangkan kebutuhan Fe meningkat karena hilangnya darah saat menstruasi. Penyebab lainnya seperti kekurangan asam folat, kekurangan vitamin B12, anemia akibat penyakit kronis.	Mahasiswi harus memperhatikan kebutuhan zat besinya karena kebutuhan zat besi terus meningkat dengan adanya pertumbuhan.	Pemberian madu efektifitas terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada Mahasiswi Keperawatan	Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Islamiyah (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pisang dan madu terhadap kadar hemoglobin remaja putri yang mengalami anemia.
----	---	---------------	------	-----------------	--	--	---	---

C. Langkah III Identifikasi Masalah Potensial

Pada langkah ini penulis mengidentifikasi masalah potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi.

Tabel 3.3 Identifikasi Masalah Potensial

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Faktor Resiko Kejadian BBLR di RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2016	Nurul Hidayati Ulfah, Triana Sri Hardjanti, Nur Khafidhoh	2016	Faktor resiko terjadinya anemia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mengalami anemia sebelum kehamilan memiliki resiko 2.740 kali lebih tinggi untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan ibu yang tidak mengalami anemia	Tidak terdapat kekurangan pada jurnal	Mampu mengetahui faktor resiko dari kejadian anemia	Penelitian ini sama dengan maksud penelitian Sudikno, Sandjaja (2016)
2.	Hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri SMAN 1 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2019	Fitri Apriyanti	2019	Dampak yang ditimbulkan dari anemia pada remaja putri	Dampak anemia pada remaja putri yaitu pertumbuhan terhambat, tubuh pada masa pertumbuhan mudah terinfeksi, mengakibatkan kebugaran atau kesegaran tubuh berkurang, semangat belajar atau prestasi menurun. Dampak rendahnya status besi (Fe) dapat mengakibatkan anemia dengan gejala pucat, lesu atau lelah, sesak nafas dan kurang nafsu makan, serta gangguan	Anemia pada remaja perlu ditangani secara tepat karena jika tidak mendapatkan penanganan akan berdampak buruk bagi kesehatan. Dampak dari anemia	Dalam penelitian tersebut, kementerian kesehatan berperan dalam mengembangkan program perencanaan dan koordinasi dengan direktorat kesehatan	Penelitian ini sama dengan maksud penelitian Novi lestari (2017)

					pertumbuhan.	mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dapat berlangsung lama dan mempengaruhi kehidupan remaja selanjutnya.	masyarakat memfasilitasi program UKS serta memastikan pengadaan dan ketersediaan suplementasi besi asam folat di sekolah.	
3.	Anemia Defisiensi Besi	Novi Lestari	2017	Dampak yang ditimbulkan dari kekurangan zat besi	Kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan, baik sel maupun otak. Kekurangan Kadar Hb dalam darah dapat menimbulkan gejala lesu, lemah, letih, lelah dan cepat lupa. Akibatnya menurunkan prestasi belajar, olahraga dan produktifitas kerja. Selain itu dapat menurunkan daya tahan tubuh dan mengakibatkan mudah terkena infeksi.	Masa remaja dalam proses perjalanan hidup manusia sangat penting untuk diperhatikan. Karena pada masa remaja ini terjadi proses awal kematangan organ reproduksi yang ditandai dengan adanya peristiwa menstruasi	Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik observasional dengan rancangan potong lintang.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri Apriyanti (2019)

						pada remaja putri.		
4.	Upaya Pencegahan Anemia Pada Remaja Puteri Sebagai Pilar Menuju Peningkatan Kesehatan Ibu	Ila Fadila, Heny Kurniawati	2017	Dampak yang ditimbulkan dari kekurangan zat gizi akibat diet yang tidak seimbang	Diet yang tidak seimbang dengan kebutuhan zat gizi tubuh akan menyebabkan tubuh kekurangan zat gizi yang penting seperti zat besi. Dampak yang ditimbulkan dari anemia antara lain menurunnya kemampuan motorik dan kemampuan kognitif, menurunnya produktifitas, komplikasi kehamilan dan janin pada ibu hamil, gangguan pertumbuhan, imunitas serta rentan terhadap racun dari logam berat.	Asupan mikronutrien berupa zat besi dan kalsium pada remaja perempuan umumnya kurang adekuat, hal ini dapat disebabkan karena diet vegetarian yang dilakukan oleh remaja perempuan.	Pemeriksaan kesehatan berkala termasuk antropometri dapat dilakukan sebagai upaya deteksi dini status gizi remaja perempuan untuk mencegah terjadinya anemia.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Novi lestari (2017) dan penelitian Fitri Apriyanti (2019)
5.	Prevalensi dan faktor risiko pada wanita usia subur di Rumah tangga miskin di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat	Sudikno, Sandjaja	2016	Resiko terjadinya anemia	Kondisi anemia dapat meningkatkan risiko kematian ibu pada saat melahirkan, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, keguguran, dan meningkatkan risiko bayi lahir prematur. Konsekuensi morbiditas terkait dengan anemia kronis	Tidak didapatkan kelemahan dalam referensi terkait	Menggunakan cukup banyak sampel yaitu sebanyak 146 wanita usia subur dari rumah tangga miskin	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurul Hidayati Ulfa (2016)

					memperpanjang hilangnya produktivitas dari kapasitas gangguan kerja, gangguan kognitif, dan peningkatan kerentanan terhadap infeksi, yang juga memberikan beban ekonomi.			
6.	Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia gizi pada remaja putri di SMKN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah	Akma Listiana	2016	Anemia gizi terhadap gangguan pertumbuhan	Anemia gizi juga dapat mengganggu pertumbuhan dimana tinggi dan berat badan menjadi tidak sempurna, menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. Berdasarkan siklus daur hidup, anemia gizi besi pada remaja akan berpengaruh besar pada saat kehamilan dan persalinan. Yaitu terjadinya abortus, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, mengalami penyulit lahirnya bayi karena Rahim tidak mampu berkontraksi dengan baik serta risiko terjadinya perdarahan pasca persalinan yang menyebabkan kematian	Responden pada penelitian ini memiliki pengetahuan rendah pada poin konsumsi tablet Fe selama menstruasi.	Upaya pemberian edukasi di sekolah mengenai gizi pada masa remaja termasuk pencegahan anemia dapat meningkatkan kesadaran remaja perempuan mengenai anemia.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurul hidayati ulfa (2016), dan Sudikno (2016)

					maternal.			
7.	Studi Kualitatif Prosedur Pemasangan Transfusi Darah Pada Pasien Anemia	Nova Yustisia, Titin Aprilatuti i, Helda Desfianty	2020	Dampak bagi kesehatan tubuh apabila mengabaikan anemia	Anemia tidak bisa di abaikan, karena apabila di abaikan tanpa ada penanganan yang baik bisa berdampak negatif bagi kesehatan tubuh. Dampak negatif akibat anemia yaitu apabila hemoglobin dan sel darah merah sudah terlalu rendah dapat menyebabkan pengangkutan oksigen menjadi tidak memadai dan berkurang. Akibatnya dapat menghambat kerja organ-organ penting, salah satunya otak.	Berdasarkan hasil penelitian dari 10 prosedur tindakan yang telah dilakukan, didapatkan 1 prosedur yang tidak menyiapkan sarung tangan, tentu hal tersebut akan menimbulkan bahaya, resiko terjadinya infeksi terhadap pasien dan perawat sendiri serta dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi.	Pemeriksaan tanda vital setelah darah dimasukkan kedalam tubuh diperlukan untuk mengamati reaksi transfusi yang berkaitan dengan reaksi imunologis. Hal ini sejalan dengan penelitian Widodo yang mengatakan bahwa setelah darah di transfusikan pasien harus di observasi secara cermat pada 5-10 menit pertama sejak transfusi dimulai.

8.	Peningkatan Perilaku Penatalaksanaan Anemia Remaja Putri Melalui Peer Group Sharing	Debbiyatus Sofia, Supratikno	2018	Faktor resiko terjadinya anemia	Anemia bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik, perilaku dan emosional. Kondisi tersebut bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan sel otak sehingga mampu menurunkan imunitas, mudah lapar, konsentrasi belajar terganggu, menurunkan prestasi belajar hingga produktifitas kerja rendah.	Penatalaksanaan anemia remaja putri belum banyak menggunakan aspek preventif atau pencegahan.	Dapat mengetahui faktor resiko penyebab terjadinya anemia	Hal ini sejalan dengan penelitian Sudikno dan Sandjaja (2016)
9.	Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Konsumsi Zat besi Dengan Kejadian Anemia Di SMP 18 Surakarta	Fresthy Astrika Yunita, Sri Anggraini Parwatiningsih, Hardining Sih, Agus Eka Nurma Yuneta, M. Nur Dewi Kartikasari,	2020	Kejadian anemia sangat berpengaruh terhadap kinerja fisik	Anemia dapat mempengaruhi kinerja fisik secara negatif, terutama ada produktivitas dalam melakukan suatu pekerjaan, sebagai akibat dari berkurangnya transportasi oksigen yang terkait dengan anemia dan berkurangnya kapasitas oksidatif seluler terkait dengan defisiensi besi. Selain itu, anemia juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko infeksi dengan merusak imunitas bawaan dan imunitas yang di	Variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini diteliti hanya sekali bersamaan, dalam periode waktu tertentu.	Upaya peningkatan pengetahuan remaja untuk meningkatkan konsumsi zat besi salah satunya dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan kesehatan mengenai kebutuhan gizi	Remaja perempuan yang sudah hamil dan menderita anemia dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur dan melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Ila dan kurniawati (2017)

		Ropitasari			perantai oleh sel.		remaja di sekolah.	
10.	Diagnosis, pengobatan dan pencegahan anemia defisiensi besi	Maria abdulsalam, Albert daniel	2015	Risiko dari anemia	Transfusi hanya diberikan sebagai pengobatan tambahan bagi pasien ADB dengan Hb 6 gr/dl atau kurang karena pada kadar Hb tersebut risiko untuk terjadinya gagal jantung besar dan dapat terjadi gangguan fisiologis.	Tidak diberikan penjelasan secara terperinci mengapa pada kondisi Hb 6 gr/dl atau kurang dapat meningkatkan resiko terjadinya gagal jantung	Pembahasan lebih memfokuskan terhadap anemia defisiensi besi	Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bryan Nathaniel, Luse, Febie Christya, Yunita Maslim (2020) yang mengatakan bahwa gagal jantung kronik tidak memiliki hubungan dengan tingkat keparahan anemia. Pasien gagal jantung tanpa komplikasi gagal ginjal jarang ditemukan anemia berat.

D. Langkah IV (Tindakan Emergensi/Kolaborasi)

Pada langkah ini bidan atau dokter melakukan identifikasi yang memungkinkan terdapat kondisi untuk melakukan kolaborasi dan tindakan segera bersama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien.

Tabel 3.4 Identifikasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Pebandingan
1.	Pengaruh Edukasi Kelompok Sebaya Terhadap Perubahan Perilaku Pencegahan Anemia Gizi Besi Pada Wanita Usia Subur di Kota Semarang	Siti Aisah, Junaiti Sahar, Sutanto Priyo Hastono	2010	Tindakan pencegahan anemia	Upaya pencegahan anemia gizi pada wanita usia subur, melalui pengembangan program yang terintegrasi dalam Pokja kesehatan seperti penyuluhan kesehatan gizi secara berkala, melatih keterampilan anggotanya dalam pengelolaan menu makanan bergizi sehari-hari, bekerjasama dengan Puskesmas untuk melakukan deteksi anemia pada anggotanya, melakukan sosialisasi hasil edukasi kelompok sebaya pada anggota lain.	Program pencegahan anemia pada wanita usia subur perlu dilaksanakan sebagai alternatif dari program yang ada.	Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan informasi tentang pentingnya mengkonsumsi tablet zat besi dalam pencegahan terjadinya anemia.	Hasil dari pengabdian menemukan bahea kejadian anemia pada wanita selama periode prakonsepsi sangat tinggi. Edukasi yang diberikan meningkatkan pengetahuan tentang anemia. Penelitian ini sama dengan maksud penelitian Ila Fadila, dkk

					Menggalakkan pemberdayaan wanita usia subur melalui kelompok sebaya di masyarakat			(2017)
2.	Upaya Pencegahan Anemia Pada Remaja Puteri Sebagai pilar menuju peningkatan kesehatan ibu	Ila Fadila, Heny Kurniawati	2017	Melakukan Penanganan pencegahan anemia berdasarkan peningkatan kesehatan	Koordinasi antara guru dan tokoh masyarakat dengan petugas kesehatan atau Puskesmas agar selalu ditingkatkan untuk menanggulangi masalah anemia gizi pada remaja puteri dan wanita. Tokoh masyarakat seperti pimpinan kelompok, kader, serta petugas lain di luar kesehatan sangat berperan dalam memberikan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat, khususnya kelompok remaja puteri, pekerja wanita informal, ibu-ibu rumah tangga agar selalu menjaga kesehatannya dengan mencegah dan mengobati anemia.	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif potong lintang, untuk melihat korelasi antara faktor resiko dengan efeknya, dimana subjek penelitian hanya di observasi sekali saja.	Sampel yang digunakan adalah seluruh Siswi kelas XI dengan jumlah sampel 213 orang. Ini sudah lebih dari besaran sampel minimal 140 orang untuk uji hubungan antara dua variabel	Hal ini sejalan dengan penelitian Siti Aisah, dkk (2010).
3.	Strategi dalam	Intan	2016	Tindakan	Anemia akibat perdarahan	Tidak	Pembahasan	Hal ini serupa

	penanggulangan pencegahan anemia	Parulian Tiurma Roosleyn		segera pada anemia akibat perdarahan	masih membutuhkan terapi segera untuk memulihkan dan mempertahankan perfusi di organ-organ vital. Secara umum apabila hipovolemia yang berbahaya telah teratasi dan hemostasis tercapai, anemia yang tersisa diterapi dengan zat besi.	dipaparkan secara jelas mengenai metode dan populasi yang digunakan	mencakup sumber-sumber yang relevan dengan kasus	dengan penelitian Julia Fitriany, dkk (2018)
4.	Diagnosis dan tatalaksana anemia	Ajeng amalia, Agustyas, Tjiptaningrum	2016	Tindakan pemberian terapi zat besi	Terapi zat besi intramuscular atau intravena dapat dipertimbangkan bila respon pengobatan oral tidak berjalan baik. Transfusi darah diberikan apabila gejala anemia disertai risiko terjadinya gagal jantung yaitu pada kadar Hb 5-8gr/dl. Komponen darah yang diberikan berupa suspensi eritrosit (PRC) diberikan secara serial dengan tetesan lambat	Tidak menjelaskan kiat-kiat apa saja yang dilakukan dalam pencegahan ataupun pengendalian terjadinya anemia	Penjelasan sangat jelas terutama pada segi diagnosis dan tatalaksana anemia dengan defisiensi besi	Penelitian sangat terperinci dalam penggolongan karakteristik yang perlu dinilai
5.	Diagnosis pengobatan	Maria abdulsalam,	2015	Indikasi pemberian besi	Penggunaan secara intramuskular atau	Tidak dijelaskan	Penjelasan lebih terperinci	Penelitian ini sama dengan

	dan pencegahan anemia defisiensi besi	Albert Daniel		dextran secara intramuskular atau intravena	intravena berupa besi dextran dapat dipertimbangkan jika respon pengobatan oral tidak berjalan baik, kehilangan besi terlalu cepat yang tidak dapat dikompensasi dengan pemberian oral atau gangguan saluran cerna	secara spesifik tentang tatalaksana pemberian terapi besi secara intravena	mengenai anemia defisiensi besi	maksud penelitian Ajeng amalia, Agustyas, Tjiptaningrum (2016)
6	Anemia defisiensi besi	Julia Fitriany, Amelia Intan Saputri	2018	Tindakan pemberian transfusi pada anemia berat	Transfusi darah jarang di perlukan. Transfusi darah hanya diberikan pada keadaan anemia yang sangat berat atau yang disertai infeksi yang dapat mempengaruhi respon terapi. Untuk penderita anemia berat dengan kadar Hb <4 g/dl hanya diberi PRC dengan dosis 2-3 mg/kgBB persatu kali pemberian disertai pemberian diuretik seperti furosemide. Jika terdapat gagal jantung nyata dapat dipertimbangkan pemberian transfusi tukar	Metode yang dilakukan adalah literatur review dengan menyimpulkan analisa dari berbagai sumber yang sudah lama	Pembahasan mencakup sumber-sumber yang relevan dengan kasus	Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Maria (2015), dan penelitian Ajeng (2016).

					menggunakan PRC yang segar			
7.	Kualitas Diet, Kurang Energi Kronis (KEK), Dan Anemia Pada Pengantin Wanita di Kabupaten Semarang	Fillah Fithra Dieny, Firdananda Fikri Jauharany, Deny Yudi Fitrianti, A Fahmy Arif Tsani, Ayu Rahadiyahanti, Dewi Marfu'ah Kurniawati, Hartanti Sandi Wijayanti	2019	Dampak anemia pada fase sebelum atau selama kehamilan	Anemia memiliki dampak yang cukup signifikan pada fase sebelum atau selama kehamilan. Anemia dapat berkontribusi pada kematian ibu dan janin. Anemia sebelum atau selama kehamilan juga berdampak terhadap resiko kelahiran bayi berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, perdarahan serta kematian ibu dan janin.	Semakin kurang asupan protein dan zat besi serta rendahnya lingkaran atas berhubungan signifikan dengan menurunnya kadar hemoglobin	Penelitian ini menggunakan metode cross sectional dengan subjek 70 calon pengantin wanita usia 16-30 tahun.	Anemia pada masa prakonsepsi dapat mengakibatkan peningkatan risiko keguguran, kematian janin, kelahiran prematur, perdarahan, serta kematian ibu dan janin. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan kadar hemoglobin, asupan makanan harian dengan sumber bahan makanan yang beragam.
8.	Edukasi Pencegahan Anemia Saat Menstruasi Pada Remaja	Candra Eka Puspitasari, Ni Made Amelia Ratnata	2020	Meningkatkan peran Unit Kesehatan Sekolah dalam pencegahan	Berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi yang dilakukan antara lain diperoleh bahwa penyuluhan dinilai dapat	Perlu adanya monitoring dan tindak lanjut agar dampak dari kegiatan	Evaluasi mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman	Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan dampak negatif

	Putri	Dewi, Siti Rahmatul Aini, Iman Surya Pratama, Erwinayanti , Imania Wahyuning sih, Fitri Ariani		anemia	meningkatkan pengetahuan remaja putri mengenai anemia. Sehingga dapat menyadarkan mereka dalam melakukan pencegahan anemia. Maka perlunya peningkatan peran Unit Kesehatan Sekolah dalam memberikan layanan edukasi anemia, serta pemeriksaan hemoglobin secara berkala. Dan juga melakukan kerja sama antara Sekolah dan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pemberian tablet tambah darah secara rutin.	ini akan semakin dirasakan baik oleh peserta maupun pihak sekolah.	siswi terhadap anemia selama masa menstruasi menggunakan kuisioner yang berisi 18 pertanyaan menunjukkan adanya perubahan positif.	anemia pada remaja putri sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan terhadap anemia.
9.	Hubungan Antara Kecukupan Energi Dan Protein Dengan Prevalensi Anemia Pada	Dian	2019	Program dalam penanganan anemia	Program yang telah terlaksana meliputi suplai tablet tambah darah dan fortifikasi pangan untuk memformulasikan pangan sumber zat besi. Selanjutnya kementerian kesehatan berkolaborasi	Semua populasi yang mengalami anemia (Hb <11 gr/dl)	Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif.	Dengan adanya program-program tersebut maka dapat menekan angka kejadian anemia.

	Wanita Usia Subur Di Kecamatan Ciampea Bogor				dengan kementerian lain untuk meningkatkan kesadaran dan signifikansi intervensi gizi.			
10.	Pengetahuan dan Perilaku Konsumsi Remaja Putri yang Berhubungan dengan Status Anemia	Sintha Fransiske Simanungkalit, Osterr Suriani Simarmata	2019	Pentingnya program Unit Kesehatan Sekolah dalam pencegahan anemia pada remaja putri.	Pencegahan dan pengobatan anemia pada wanita usia reproduksi sangat penting untuk mencegah berat badan lahir rendah, kematian perinatal dan risiko penyakit terkait peran wanita sebagai ibu. Program Usaha Kesehatan Sekolah dapat memberikan peranan penting untuk menanggulangi dan mencegah masalah anemia.	Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan pada remaja putri melalui penyuluhan mengenai pengetahuan anemia dan pola konsumsi inhibitor Fe secara berkala	Penelitian ini menggunakan desain penelitian potong lintang, dengan menggunakan populasi yang cukup besar.	Pengetahuan anemia yang kurang akan mempengaruhi pemilihan makanan yang bersifat membantu dan menghambat penyerapan besi dalam tubuh.

E. Matriks Langkah V Perencanaan

Pada langkah ini perencanaan asuhan yang dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan masalah aktual dan masalah potensial yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.

Tabel 3.5 Perencanaan Asuhan Kebidanan

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Prevalensi dan Faktor Risiko Anemia pada Wanita Usia Subur di Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis, Provinsi Jawa Barat	Sudikno, Sandjaja	2016	Intervensi dalam meningkatkan status zat besi pada masa prakonsepsi	Meningkatkan status zat besi pada masa prakonsepsi sama seperti pemberian suplemen mikronutrien besi folat selama kehamilan. Adanya intervensi peningkatan sumber zat besi yang bioavailabilitas tinggi dalam makanan wanita usia subur. Selain itu perlu adanya fortifikasi makanan, suplementasi zat besi, dan fortifikasi yang universal untuk menurunkan tingkat anemia.	Dari hasil penelitian didapatkan menurut pendidikan tidak menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan anemia.	Desain penelitian yang digunakan adalah <i>cross sectional</i> yang dilaksanakan di dua kabupaten.	Hal ini tidak sejalan dengan hasil Riskesdas 2007 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah prevalensi anemia.
2.	Upaya Pencegahan Anemia Pada	Ila Fadila, Heny Kurniawati	2017	Memberikan pendidikan atau	Pendidikan atau penyuluhan gizi adalah pendekatan edukatif untuk	Perlu adanya upaya penyuluhan	Dalam pengumpulan data	Hal ini sejalan dengan penelitian Sudikno &

	Remaja Putri Sebagai Pilar Menuju Peningkatan Kesehatan Ibu			penyuluhan penyebab terjadinya anemia.	menghasilkan perilaku individu atau masyarakat yang diperlukan dalam meningkatkan perbaikan pangan dan status gizi	tentang makanan seimbang kepada kelompok remaja putri. Kelompok bahan makanan atau makanan hewani yang realtif murah dan mudah di peroleh.	menggunakan kuesioner yang sudah dilakukan pengujian lapangan dan terstruktur yang dipakukan oleh pewawancara yang sudah dilatih terlebih dahulu.	Sandjaja (2016) tentang perlu adanya upaya penyuluhan dan pemberian tablet tambah darah kepada kelompok wanita usia subur.
3.	Pemberian Jus Kelapa Dalam Meningkatkan Kadar Hemoglobin pada Remaja Putri yang Anemia di MA Al-Mu'aawanahon Ilir	Kurniati Ilahi, Susyani, Terati	2019	Perlakuan dengan pemberian jus kelapa dalam meningkatkan kadar hemoglobin	Air kelapa muda mengandung beberapa kandungan gizi yang membantu proses hematopoiesis. Air kelapa muda mengandung asam folat yang diperlukan dalam pembentukan sel darah merah dan pendewasaannya dalam sumsum tulang.	Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang memenuhi kriteria inklusi.	Penelitian ini menggunakan penelitian <i>Quasi eksperiment</i> dengan rancangan <i>pretest and posttest without control group</i> .	Air kelapa muda yang dikonsumsi memiliki manfaat dalam meningkatkan kadar hemoglobin.
4.	Anemia dan Defisiensi Besi Pada Siswa	Fify Henrika, Silangit,	2015	Upaya mengatasi masalah	Cara mengatasi masalah anemia defisiensi besi yang ideal adalah dengan	Tidak didapatkan kelemahan dari	Menggunakan cukup banyak sampel yaitu	Penelitian ini sependapat dengan penelitian

	SLTP 1 Curug Tangerang	Riadi wirawan		anemia defisiensi besi	meningkatkan penyerapan (absorpsi) besi dan kualitas menu makanan. Seperti daging, ikan, ayam, atau bahan makanan yang banyak mengandung vitamin C.	penelitian tersebut	sebanyak 107 orang wanita	Marlinda (2020) tentang pencegahan anemia
5.	Pengaruh Pemberian Jus Kacang Hijau Terhadap peningkatan Kadar Hemoglobin Serum Pada Penderita Anemia Remaja Putri	Kartika Mariyona	2019	Upaya pencegahan anemia dengan pemberian Jus kacang hijau	Upaya pencegahan anemia bisa dilakukan dengan meningkatkan konsumsi zat besi dalam makanan. Kandungan besi sebesar 6,7 mg/100 g yang terdapat dalam kacang hijau dapat memberikan kontribusi terhadap pencegahan anemia.	Pemberian jus kacang hijau pada penelitian yang diberikan satu kali dalam sehari selama 7 hari berturut-turut dan dengan watu yang singkat belum melihatkan hasil yang maksimal dalam pemberian jus kacang hijau.	Pemberian jus kacang hijau dapat menjadi solusi dalam pencegahan anemia. Dan langkah awal yang dilakukan pada masyarakat yang diberikan tablet Fe tetapi tidak meminumnya secara teratur dikarenakan efek samping dari tablet Fe.	Pengobatan non farmakologi dapat menggunakan kacang hijau, kandungan zat besi dalam kacang hijau dapat meningkatkan ketersediaan unsur besi bagi tubuh.
6.	Anemia Defisiensi Besi	Julia Fitriany, Amelia Intan	2018	Pemberian preparat besi	Untuk mendapatkan respon pengobatan dosis yang dipakai 4-6 mg besi elemental/kgBB/hari.	Tidak memiliki populasi	Mampu mengetahui terapi pemberian preparat besi	Tidak di dapatkan perbandingan pada jurnal tersebut

		Saputri			Dosis obat dihitung berdasarkan kandungan besi elemental yang ada dalam garam ferrous. Untuk mengatasi efek samping tersebut, pemberian besi dapat dilakukan pada saat makan atau segera makan. Obat diberikan dalam 2-3 dosis sehari. Preparat besi ini harus terus diberikan selama 2 bulan setelah anemia pada penderita teratasi			
7.	Tatalaksana Anemia Pada Penyakit Gagal Ginjal Kronik	Ade Yonata	2018	Tatalaksanan pemberian transfusi darah pada anemia dengan penyakit gagal ginjal kronik	Bila harus mendapatkan transfusi darah, dianjurkan untuk menggunakan filter leukosit. Transfusi darah dianjurkan dalam jumlah kecil dan bertahap. Pada pasien HD sebaiknya diberikan saat HD. Transfusi darah sebaiknya diberikan dengan kecepatan tetesan 1 ml/menit pada 15 menit pertama dan bila tidak ada	Tidak dijelaskan secara detail mengenai resiko yang dapat ditimbulkan pada tatalaksana pemberian transfusi darah	Dapat mengetahui tatalaksana pemberian transfusi darah pada pasien anemia dengan penyakit gagal ginjal kronik	Tidak ada perbandingan pada jurnal tersebut

					reaksi transfusi dilanjutkan 4 ml/menit.			
8.	Penyuluhan dan Dan Deteksi Dini Anemia Menuju Generasi Berkualitas Pada Mahasiswa Kebidanan	Marlynda Happy Nurmalita Sari, Dina Dewi Anggraini	2020	Pencegahan anemia	Pencegahan dan penanganan anemia dapat dilakukan dengan meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi terutama makanan dengan sumber zat besi baik dari protein hewani, kacang-kacangan, sayuran hijau, dapat juga dengan minum tablet tambah darah, perlunya istirahat dan tidur yang cukup terutama setelah melakukan aktivitas yang cukup melelahkan.	Tidak didapatkan kelemahan dalam jurnal tersebut	Metode yang digunakan yaitu pengabdian masyarakat yang dilakukan pada seluruh Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan Blora dengan jumlah sampel 132	Penelitian ini sejalan dengan Fify (2015)
9.	Perbandingan Zat Besi dengan dan Tanpa Vitamin C terhadap Kadar Hemoglobin Wanita Usia Subur	Tuti Anggraini Utama, Nora Listiana, Desi Susanti	2015	Pencegahan yang dapat dilakukan dalam dalam antisipasi terjadinya anemia	Pencegahan dan pengobatan anemia meliputi pemberian suplementasi tablet besi, pendidikan dan upaya yang ada kaitannya dengan peningkatan asupan zat besi melalui makanan, pengawasan penyakit infeksi pengobatan yang	Kurangnya edukasi yang diberikan tentang pemilihan bahan makanan yang bergizi guna peningkatan asupan zat gizi	Penelitian ini menggunakan desain <i>quasy experimental</i> dengan <i>pre test and post test control group design</i> . Serta menggunakan sampel	Penelitian ini hampir sama dengan penelitian Marlynda (2020) tentang bagaimana pencegahan pada anemia

					efektif dan tepat waktu dapat mengurangi dampak gizi yang tidak tidak diinginkan, mendidik keluarga penderita tentang cara makan yang sehat selama dan sesudah sakit.	dan kada Hb wanita pekerja sehingga masih banyak yang tidak melakukannya di rumah.	penelitian yang cukup besar yaitu 600 orang.	
10.	Pengaruh Pemberian Sari Kurma Pada Remaja Putri Dengan Kadar Hemoglobin di Palangka Raya	Yunarti, Yulia Damiri	2020	Efektifitas manfaat dari sari kurma dalam meningkatkan kadar hemoglobin	Kandungan zat besi dalam kurma yang tinggi membantu meningkatkan kadar hemoglobin dan mencegah anemia maupun mengatasi anemia.	Dalam mengetahui pengaruh pemberian sari kurma dengan peningkatan kadar hemoglobin, peneliti melakukan post test pada hari ke-16 menggunakan haemometer digital. Analisis bivariat menggunakan uji <i>Wilcoxon signed rank test</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>Pra-Experimental Design</i> dengan menggunakan <i>One Group Pra Post Test Design</i> .	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian M.Ridwan, dkk (2018), yang meneliti tentang konsumsi buah kurma meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja putri di Metro.

F. Matriks Langkah VI Pelaksanaan

Mengidentifikasi pelaksanaan dari semua rencana terkait masalah anemia pada wanita usia subur berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

Tabel 3.6 Implementasi Asuhan Kebidanan

No.	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Anemia Dan Defisiensi Besi Pada Siswa SLTP Negeri 1 Curug Tanggerang	Fify Henrika, T. Silangit, Riadi wirawan	2018	Upaya dalam pencegahan anemia	Terdapat empat upaya untuk mencegah anemia; (1) Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan hewani seperti daging, ikan, ayam, hati, telur. Dan dari bahan nabati seperti kacang-kacangan, tempe dan sayuran yang berwarna hijau. (2) banyak mengonsumsi makanan sumber vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi yaitu jambu, jeruk, tomat, dan nanas. (3) minum satu tablet	Perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk mencari penyebab subjek dengan eritrosit mikrositik dan anemia normositik.	Rancangan penelitian ini menggunakan teknik potong lintang secara deskriptif untuk mendapatkan prevalensi, jenis anemia berdasarkan morfologi, dan prevalensi besi pada remaja putri	Penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian Dini Lestrina, dkk (2015).

					penambah darah setiap hari, khususnya saat sedang haid. (4) bila merasakan tanda dan gejala anemia segera konsultasi ke dokter untuk diberikan pengobatan.			
2.	Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan kadar Hemoglobin Pada Wanita Usia Subur di Desa Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam	Dini Lestrina, Ida Nurhayati, Oslida Martony	2015	Pengaruh pemberian promosi kesehatan terhadap peningkatan kadar hemoglobin.	Promosi kesehatan adalah suatu program perubahan perilaku masyarakat yang menyeluruh. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kadar hemoglobin wanita usia subur mengalami peningkatan setelah diberi promosi kesehatan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata kadar hemoglobin sebelum intervensi sebesar 9,168 gr/dl. Terlihat bahwa sesudah intervensi terjadi kenaikan kadar hemoglobin dengan perbedaan sebesar 2,69 gr/dl.	Selain pengetahuan yang rendah ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka anemia pada wanita usia subur di Desa Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam seperti kebiasaan, pola konsumsi, Hygiene dan sanitasi. Masyarakat setempat	Jenis penelitian adalah kuasi eksperimental dengan rancangan sebelum dan setelah perlakuan (pre dan post test) pada satu kelompok penelitian.	Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Notoatmodjo (2010) bahwa pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang.

						memiliki kebiasaan seperti minum teh ketika sarapan.		
3.	Penyuluhan Mengenai Pola Makan Sehat dan Seimbang untuk Pencegahan Anemia pada Kader Posyandu di Puskesmas Nipah, Kabupaten Lombok Utara	Ida Ayu Eka Widiastuti, Ima Arum Lestarini	2019	Pemberian penyuluhan mengenai pola makan sehat dan seimbang	Salah satu pencegahan anemia dengan memberikan penyuluhan mengenai pola makan yang sehat dan seimbang. Adapun zat besi dapat diperoleh dari makanan sehari-hari seperti daging, ikan, unggas. Sayuran seperti Sayur bayam, kacang-kacangan. Makanan yang kaya kandungan vitamin B12 seperti susu, produk olahan susu.	Dari hasil penelitian yang di dapatkan menggunakan soal pre test dan post test, didapatkan bahwa pengetahuan kader posyandu tentang anemia dan pola makan sehat seimbang untuk pencegahan anemia masih rendah sehingga diperlukan sosialisasi yang	Kader Posyandu mempunyai peran yang penting sebagai penyuluh dan fasilitator di lapangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar khususnya para ibu hamil, menyusui dan ibu yang memiliki anak usia sekolah	Diperlukan adanya pelatihan lanjutan tentang cara membuat menu makanan sehat dan seimbang yang mencakup sumber-sumber makanan yang akan zat besi untuk mencegah kejadian anemia

						menyeluruh di semua fasilitas kesehatan.		
4.	Pemberian Jus Kurlapa Dalam Meningkatkan Kadar Hemoglobin Pada Remaja Putri Yang Anemia di Mq Al-Mu'aawanahog an Ilir	Kurniati Ilahi, Susyanti, Terati	2019	Efektifitas pemberian jus kurlapa yang terbuat dari buah kurma dan air kelapa dalam meningkatkan hemoglobin penderita anemia	Kurma mengandung zat besi dan vitamin C yang tinggi dapat digunakan untuk pengobatan anemia. Vitamin C yang tinggi berperan dalam meningkatkan penyerapan besi. Selain kurma, air kelapa muda juga mengandung zat gizi yang dapat membantu pembentukan darah yaitu asam folat sebagai bahan pokok pembentuk inti sel hemoglobin	Pada asupan zat besi, dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden dalam kategori kurang baik, responden jarang mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung zat besi.	Jus kurlapa dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk mencegah dan mengatasi anemia.	Jus kurlapa berpengaruh dalam meningkatkan hemoglobin penderita anemia pada remaja putri di MA Al-Mu'aawanah Ogan Ilir.
5.	Anemia Defisiensi Besi	Masrizal	2015	Melakukan diet yang kaya akan zat besi	Agar anemia dapat dicegah atau diatasi, maka harus banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Selain itu, penanggulangan anemia defisiensi zat besi dapat dilakukan dengan	Sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh, dimana sampel jenuh ini menggunakan semua	Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif observatif dengan membagi antara	Diet yang kaya akan zat besi tidaklah menjamin ketersediaan zst besi dalam tubuh. Karena banyaknya zat

					pengecahan infeksi cacing dan pemberian tablet Fe yang di kombinasikan dengan vitamin C.	populasi yang jumlahnya relatif kecil	variabel bebas dan variabel terikat	besi yang diserap sangat tergantung dari jenis zat besi dan bahan makanan.
6.	Pengaruh Pemberian Madu Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin pada Mahasiswi S1 Keperawatan Reguler dengan Anemia di Institut Medika Drg. Suherman Tahun 2019	Ani Nurfaidah	2019	Kandungan madu dalam peningkatan kadar hemoglobin	Madu mengandung banyak mineral seperti Kalsium (Ca), Besi (Fe), Kalium (K), Natrium (Na), Magnesium (Mg), Fosfor (P), Mangan (Mn), Yodium (I), Seng (Zn) dan Aluminium (Al). tingginya kadar zat besi erat hubungannya dengan kandungan hemoglobin. Hal ini dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk mengatasi anemia	Tidak dijelaskan tentang dosis pemberian madu serta lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pemberian terapi.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>pre-eksperiment design</i> dengan rancangan <i>one group pretest-postest</i>	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Islamiyah (2017) pada remaja putri dalam pemberian madu dengan dosis 28 gr/hari, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kadar hemoglobin
7.	Pengaruh Pemberian Sari Kurma pada Remaja Putri dengan Kadar Hemoglobin di Palangka Raya	Yuniarti, Yulia Kriska Damiri	2020	Pengaruh pemberian sari kurma terhadap peningkatan kadar hemoglobin	Dari hasil penelitian dengan perlakuan pemberian sari kurma sebanyak 2x1 sendok makan/hari, pagi dan malam selama 2 minggu menunjukkan bahwa ada	Kurangnya sampel pada penelitsn ini.	Sari kurma dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kadar hemoglobin	Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sugita dan Kuswati (2019) tentang pengaruh konsumsi sari

					pengaruh terhadap peningkatan kadar hemoglobin dengan p-value 0,000 (<0,005).		pada wanita	kurma terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester 3
9.	Kurma (Phoenix dactylifera) Dalam Terapi Anemia Defisiensi Besi	Nurul Utami, Risti Graharti	2017	Pemberian suplemen besi	Bila diagnosis defisiensi besi sudah ditegakkan, pengobatan harus segera dimulai untuk mencegah anemia kronik. Pengobatan terdiri atas pemberian preparat besi secara oral berupa garam fero (sulfat, glukonat, fumarat, dan lain-lain). Terapi besi diberikan sulfas ferosus 3x10 mg/hari, dengan pemberian makanan yang adekuat.	Tidak ada kesesuaian antara judul penelitian dengan isi dari pembahasan jurnal.	Materi yang disajikan sangat lengkap sehingga mudah untuk dipahami.	Dalam pemberian tindakan atau asuhan penting untuk mengetahui keadaan umum agar pemberian tindakan sesuai dengan standar dan ketepatan dalam diagnosis.
10	Stomatitis Aftosa Rekuren Oleh Karena Anemia	Maharani Laillyza Apriasari, Hening Tuti	2014	Pemberian terapi pada anemia defisiensi besi	Pada umumnya terapi yang diberikan pada pasien anemia defisiensi besi adalah tablet zat besi yang berisi ferrous fumarate yang diberikan peroral. Suplemen tersebut berisi Fe glukonat 250 mg,	Pada saat pasien banyak kegiatan, seringkali makannya tidak teratur. Hal tersebut yang	Diagnosis akhir ditegakkan berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan klinis dan didukung pemeriksaan	Artikel ini melaporkan kasus tentang terjadinya recurrent aphthous stomatitis pada pasien sebagai manifestasi dari

					mangan sulfat 0,2 mg, tembaga sulfat 0,2 mg, vitamin C 50 mg, asam folat 1 mg.	menyebabkan pasien mengalami penurunan asupan zat besi, vitamin dan mineral. Yang menjadi penyebab dari anemia.	darah lengkap.	anemia.
--	--	--	--	--	--	---	----------------	---------

G. Langkah VII Evaluasi

Mengevaluasi semua perencanaan dan pelaksanaan masalah anemia pada wanita usia subur berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

Tabel 3.7 Evaluasi

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Pemberian Jus Kelapa Dalam Meningkatkan Kadar Hemoglobin pada Remaja Putri yang Anemia di MA	Kurniati Ilahi, Susyani, Terati	2019	Pengaruh pemberian jus kelapa muda terhadap peningkatan hemoglobin	Pemberian jus kelapa yang terbuat dari buah kurma 150 gram dan air kelapa muda 250 ml. Jus kelapa sebanyak 300 ml diberikan selama 7 hari berturut-turut menunjukkan ada pengaruh terhadap	Penelitian ini menggunakan metode <i>Quasi Eksperimen</i> dengan rancangan <i>pretest and posttest</i>	Pemberian jus kelapa ini dapat menjadi salah satu pertimbangan yang dapat digunakan untuk mencegah dan	Air kelapa muda juga mengandung beberapa kandungan gizi yang membantu proses hematopoiesis. Air kelapa muda

	Al-Mu'aawanaorgan Ilir				peningkatan Hemoglobin remaja putri yang mengalami anemia di MA Al-Mu'aawanah Organ Ilir.	<i>without control group.</i> Perlu dilakukan penelitian lanjutan agar hasil penelitian dapat menggambarkan mengenai tingkat konsumsi zat besi dengan kejadian anemia	mengatasi anemia	mengandung asam folat yang diperlukan dalam berbagai jenis reaksi biokimia. Asam folat diperlukan untuk pembentukan sel darah merah dan pendewasaannya dalam sumsum tulang
2.	Perbandingan Konsumsi Tablet Fe dengan Tablet Fe dan Madu Terhadap Kadar Hemoglobin Siswi Madrasah Tsanawiyah	Retno Widowati, Rukmaini, Nunu Rahayu	2020	Evaluasi pemberian madu dalam peningkatan kadar hemoglobin	Berdasarkan hasil penelitian pemberian madu yang teratur pagi dan sore sebanyak masing-masing 5 ml selama 30 hari dapat menunjukkan kenaikan yang signifikan kepada kadar hemoglobin.	Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yaitu bias hasil pada sumber. Bias ini terjadi pada perbedaan kondisi responden saat diperiksa. Beberapa	Penelitian ini menggunakan metode <i>quasi experiment design, two groups pre-post test</i>	Pemberian tablet Fe dengan madu dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja putri.

						responden mengalami menstruasi sedangkan yang lain tidak. Sehingga terjadi kemungkinan anemia disebabkan karena responden kehilangan banyak darah akibat menstruasi.		
3.	Pengaruh Pemberian Madu Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin pada Mahasiswi S1 Keperawatan Reguler	Ani Nurfaidah	2019	Evaluasi pemberian madu terhadap peningkatan kadar hemoglobin	Hasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa kadar hemoglobin sebelum diberikan madu terendah adalah 9,5 gr/dl tertinggi adalah 1,8 gr/dl. Kadar hemoglobin sesudah diberikan madu terendah adalah 9,8 gr/dl tertinggi adalah 14,7 gr/dl.	Jumlah sampel yang digunakan sedikit	Penelitian ini menggunakan metode <i>pre eksperiment design</i> dengan rancangan <i>one group pre-test post-test</i> .	Khasiat madu sebagai penyembuh telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 69

	dengan Anemia di Institut Medika Drg. Suherman Tahun 2019							
4.	Pengaruh Pemberian Jus Kacang Hijau Terhadap peningkatan Kadar Hemoglobin Serum Pada Penderita Anemia Remaja Putri	Kartika Mariyona	2019	Pengaruh Pemberian Jus Kacang Hijau terhadap peningkatan kadar haemoglobin pada kasus penderita anemia	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh peningkatan yang signifikan antara kadar hemoglobin sebelum dan sesudah diberikan jus kacang hijau. Karna pada kandungan kacang hijau tidak hanya zat besi tetapi terdiri dari asam amino esensial dan non esensial, protein, karbohidrat dan lemak yang mendukung proses sintesi hemoglobin	Penelitian ini menggunakan metode <i>Quasy Ezperiment</i> dengan desain penelitian <i>Pretes-Postest</i> . Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan dengan penambahan jumlah sampel serta perpanjangan waktu intervensi pemberian jus kacang hijau	Jus kacang hijau dapat menjadi pertimbangan dan diperlukan untuk pembentukan sel darah dan mencegah anemia. Karena kandungan dalam kacang hijau sangat lengkap sehingga dapat membantu proses hemopoises.	Untuk menghindari anemia, tubuh membutuhkan hemoglobin dan sel darah merah dengan konsentrasi yang cukup. Untuk memproduksi komponen tersebut, tubuh membutuhkan zat besi, vitamin B12, asam folat dan protein.
5.	Pemberian Buah Kurma (Phoenix	Arini Pradita Roselyn,	2018	Evaluasi Pengaruh Pemberian	Hasil penelitian yang telah dilakukan kadar Hb pada remaja putri yang	Sampel yang digunakan terlalu sedikit	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian	Hasil penelitian ini didukung oleh pernyataan dalam

	Dactylifera) Ke Penderita Anemia Pada Remaja Putri Terhadap Kadar Hemoglobin Di SMA Negeri 1 Natar Kecamtan Natar Kabupaten Lampung Selatan	Ari Khusuma, Annisa Agata		Kurma pada Remaja yang mengalami anemia	mengalami anemia sebelum dilakukan pemberian kurma pada kelompok intervensi didapatkan hasil rata-rata 10,56 gr/dl sedangkan setelah dilakukan pemberian kurma didapatkan hasil rata-rata sebesar 11,02 gr/dl		kuantitatif	Al Qur'an Surah Maryam ayat 25- 26
6.	Efektifitas Ekstrak Daun Kelor Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin	Erma Nur Fauziandari	2019	Evaluasi pemberian ekstrak daun kelor terhadap peningkatan kadar Hemoglobin	Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa p value<0,05 maka terdapat peningkatan kadar Hb sebelum dan setelah pemberian ekstrak daun kelor	Penelitian ini menggunakan sedikit sampel yaitu dengan jumlah 15 remaja putri usia 15-24 tahun	Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan pre eksperimen. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan <i>the one group pretest-posttest</i>	Hasil ini sejalan dengan penelitian Yulanti (2015) yang menyatakan bahwa konsumsi ekstrak daun kelor berpengaruh terhadap peningkatankadar hemoglobin pada remaja putri.
7.	Upaya Pencegahan Anemia Pada	Julaecha	2020	Tingkat pengetahuan remaja putri	Berdasarkan hasil dari pengabdian kepada masyarakat tentang upaya	Sebagian besar remaja putri kurang	Metode yang digunakan yaitu pelaksanaan	Pengetahuan remaja yang kurang tentang

	Remaja Putri			tentang anemia	<p>pengecahan anemia pada remaja putri, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman remaja putri tentang anemia, manfaat dan efek samping jika tidak mengkonsumsi tablet tambah darah (Fe) serta dampak jangka pendek apabila tidak mengkonsumsi tablet tambah darah.</p>	<p>mengerti tentang efek samping dan manfaat tablet tambah darah karena belum pernah mendapatkan informasi tentang konsumsi tablet tambah darah.</p>	<p>kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan, diskusi tanya jawab, serta menggunakan media leaflet</p>	<p>anemia mempunyai resiko 2,3 kali mengalami anemia. Pengetahuan remaja yang kurang tentang anemia dapat mempengaruhi perilakunya termasuk pola hidup dan kebiasaan makan. Kurangnya pengetahuan tentang anemia menyebabkan kebutuhan zat besi didalam tubuh akan kurang dan tidak mencukupi sehingga anemia dapat terjadi.</p>
8.	Pengaruh Pemberian Sari Kurma Pada	Yunarti, Yulia Kriska	2020	Pengaruh pemberian jus kurlapa	Zat besi di dalam kurma dibutuhkan untuk produksi sel darah merah. Selain zat	Kurangnya sampel pada penelitian ini	Desain penelitian yang digunakan	Penelitian dari Budi Hernawan, dkk (2019)

	Remaja Putri Dengan Kadar Hemoglobin di Palangkaraya	Damiri		terhadap peningkatan kadar hemoglobin	besi, kurma juga mengandung vitamin C yang memegang peran penting dalam proses penyerapan zat besi. Selain kurma, air kelapa juga mengandung beberapa kandungan gizi yang membantu proses hematopoiesis. Air kelapa muda mengandung asam folat yang diperlukan dalam berbagai jenis biokimia. Dari hasil penelitian menunjukkan pemberian jus kurma sebanyak 300 ml selama 7 hari berturut-turut menunjukkan ada pengaruh terhadap peningkatan hemoglobin remaja putri yang mengalami anemia.	yaitu hanya menggunakan 12 orang responden dalam jangka waktu pemberian hanya dalam waktu yang singkat	adalah <i>quasi eksperimen</i> dengan rancangan penelitian <i>pretest dan posttest without control group</i>	menyebutkan bahwa kurma diyakini berkhasiat sebagai fito farmako. Manfaat kurma mengontrol implikasi terapeutik dalam penyakit melalui antioksidan, anti tumor, anti inflamasi, serta anti diabetes.
9.	Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Peningkatan	Dini Lestrina, Ida Nurhayati, Oslida	2015	Evaluasi pelaksanaan promosi kesehatan terhadap	Hasil penelitian menunjukkan sebelum pelaksanaan promosi kesehatan diketahui nilai	Kekurangan vitamin C dapat terjadi karena dalam menu sehari-	Pelaksanaan promosi kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan	Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Aisah, dkk (2010)

	Pengetahuan dan Kadar Hemoglobin pada Wanita Usia Subur di Desa Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam	Martony		peningkatan pengetahuan dan kadar hemoglobin	pengetahuan dan besarnya prevalensi anemia. Setelah pelaksanaan promosi kesehatan terjadi peningkatan kadar hemoglobin wanita usia subur	hari sampel jarang mengkonsumsi buah dan sayur	wanita usia subur secara bermakna	dimana diperoleh kesimpulan ada perbedaan yang signifikan rata-rata nilai pengetahuan, sikap dan keterampilan wanita usia subur.
10.	Edukasi Bagi Calon Pengantin Tentang Anemia Gizi dan Kurang Energi Kronik di Kota Pare-Pare	Suriah, Citrakesum asari, Awaluddin, Ahmad Yani	2018	Evaluasi setelah pemberian pelatihan dan pendidikan mengenai anemia serta pencegahannya	Masalah aneia gizi dan KEK tidak terjadi dengan serta merta pada ibu hamil. Masalah tersebut bisa dihindari dengan memberikan informasi lebih awal kepada calon ibu dalam hal tersebut calon pengantin mengenai kedua masalah gizi tersebut. Berdasarkan data hasil pretest-posttest peserta pelatihan, tampak bahwa hampir semua peserta mengalami peningkatan pengetahuan setelah mendapatkan pelatihan.	Masih terdapat satu orang peserta yang tidak mengalami peningkatan pengetahuan.	Proses kegiatan pelatihan tidak hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi, akan tetapi pelatihan juga dibekali dengan kemampuan berkomunikasi dan mengedukasi melalui praktek simulasi edukasi.	Hal ini sejalan dengan penelitian Citrakesumasari (2012) yang menemukan bahwa kader posyandu dan tokoh masyarakat dapat dilatih menjadi komunikator lokal untuk menyampaikan informasi tentang pencegahan kejadian anemia gizi dan KEK pada wanita.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telaah Evidence Based Asuhan 7 Langkah Varney Berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi

1. Langkah 1 : Identifikasi Data Dasar

Anemia secara umum merupakan sebagai konsentrasi haemoglobin di dalam tubuh. Anemia juga bukan merupakan suatu keadaan spesifik, melainkan dapat disebabkan oleh bermacam-macam reaksi fisiologis dan patologis. Anemia ringan hingga sedang mungkin tidak menimbulkan gejala objektif, namun dapat berlanjut ke keadaan naemia berat dengan gejala-gejala keletihan, napas pendek saat beraktivitas, takikardia dilatasi jantung, dan gagal jantung (Amalia & Tjiptaningrum, 2016).

Faktor penyebab anemia yaitu dipengaruhi oleh pola makan yaitu, Kekurangan zat besi dalam makanan yang dikonsumsi, penyerapan zat besi yang tidak optimal, asupan gizi yang tidak cukup, absorpsi yang tidak adekuat, bertambahnya zat gizi yang hilang dan kebutuhan yang berlebihan. Kesenangan terhadap hal yang tidak disukai dan disukai terhadap makanan, budaya, agama, taraf sosial ekonomi, dan lingkungan alam (Hidayah, 2016).

Ketidakseimbangan asupan gizi seperti zat besi dapat menjadi penyebab anemia karena wanita mengalami menstruasi setiap bulan sehingga membutuhkan asupan zat besi yang banyak. Asupan zat besi pada makanan kurang menyebabkan cadangan besi dalam tubuh banyak

yang dibongkar sehingga dapat mempercepat terjadinya anemia. Anemia dapat menyebabkan cepat lelah, konsentrasi menurun dan menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi. Anemia yang terjadi pada wanita usia subur dapat menyebabkan bertambahnya resiko kejadian bayi dengan berat badan lahir rendah (Kartini, 2015).

Kurangnya asupan gizi pada remaja putri umumnya kekurangan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak dan kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Kurangnya zat gizi makro dan mikro dapat menyebabkan tubuh menjadi kurus dan berat badan turun drastis, pendek, sakit terus menerus dan anemia (Kaimudin et al., 2017).

Protein sebagai sumber zat besi bersumber dari dua jenis makanan yakni pangan hewani dan pangan nabati. Zat besi heme pada pangan hewani di absorpsi secara lebih baik oleh tubuh.¹³ Sumber vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi bila dikonsumsi secara bersamaan. Rendahnya asupan protein dapat menyebabkan produksi haemoglobin yang terbatas karena tidak dapat memproduksi globin sesuai kebutuhan (Sufyan et al., 2019).

Penyebab utama anemia gizi besi pada wanita adalah kurang memadainya asupan makanan sumber *Fe*, perdarahan patologis akibat penyakit malaria atau infeksi parasit seperti cacingan, Penyebab lainnya dari anemia defisiensi besi adalah dikarenakan asupan dan serapan zat besi yang tidak adekuat, yaitu dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang dapat mengganggu penyerapan zat besi seperti teh secara bersamaan pada

waktu makan, Faktor lain terjadinya anemia gizi besi pada remaja putri yaitu pengetahuan yang kurang tentang anemia, sikap yang tidak mendukung, pendidikan ibu maupun tingkat sosial ekonomi keluarga (Listiana, 2016).

Beberapa dampak langsung yang terjadi pada remaja putri yang terkena anemia adalah sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang, kelopak mata, bibir, lidah, kulit dan telapak tangan menjadi pucat, lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai dan juga berdampak jangka panjang karena perempuan nantinya akan hamil dan memiliki anak, pada masa hamil remaja yang sudah menderita anemia akan lebih parah anemianya saat hamil karena masa hamil membutuhkan gizi yang lebih banyak lagi, jika tidak ditanganinya maka akan berdampak buruk pada ibu dan bayinya (Apriyanti, 2019).

Tingginya prevalensi anemia pada remaja putri mengindikasikan bahwa dibutuhkan pencegahan berupa pemberian pengetahuan dan konsumsi suplementasi besi dan asam folat. Pengetahuan mengenai makanan yang tinggi akan zat besi juga masih rendah. Anemia remaja putri perlu ditangani agar remaja putri mempunyai simpanan zat besi di dalam tubuhnya sebagai persiapan mereka sebelum menikah dan hamil (Simanungkalit & Simarmata, 2019).

Konsumsi protein subjek penelitian sebagian besar tergolong cukup meskipun masih terdapat subjek dengan tingkat konsumsi protein yang kurang. Terdapat hubungan antara tingkat konsumsi protein dengan status

anemia. Wanita usia subur meskipun tingkat konsumsi proteinnya cukup namun tetap mengalami anemia, kemungkinan karena cukupnya konsumsi protein tidak disertai dengan kecukupan konsumsi sumber zat besi yang siap pakai (sumber hewani). Protein yang dikonsumsi cenderung berasal dari protein nabati yang memiliki bioavailabilitas yang lebih rendah, sehingga kurang mendukung dalam pembentukan Hb (Wijayanti & Fitriani, 2019).

Anemia sering terjadi pada remaja, remaja cenderung untuk menjaga penampilan dengan menghindari kenaikan badan yang berlebihan. Keadaan tubuh yang tidak sesuai dengan harapan membuat remaja melakukan diet. Remaja saat ini lebih banyak melakukan diet dengan mengurangi asupan karbohidrat. Masalahnya, remaja hanya memikirkan agar berat badannya turun tanpa memperhatikan apakah yang mereka lakukan pola hidup sehat atau tidak. Sejak dahulu di dalam masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa wajah yang cantik dan tubuh yang langsing akan memiliki daya Tarik lebih tinggi dibandingkan yang memiliki tubuh besar (Hidayati et al., 2019).

2. Langkah II : Identifikasi Masalah Aktual

Anemia defisiensi besi adalah anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah, artinya konsentrasi hemoglobin dalam darah berkurang karena terganggunya pembentukan sel-sel dalam darah akibat kurangnya kadar besi dalam darah. Tanda-tanda dari anemia gizi dimulai dengan menipisnya simpanan zat besi (ferritin) dan bertambahnya absorpsi

zat besi yang digambarkan dengan meningkatnya kapasitas pengikatan besi. Pada tahap yang lebih lanjut berupa habisnya simpanan zat besi, berkurangnya kejenuhan transferin, berkurangnya jumlah protoporphirin yang di ubah menjadi heme, dan akan diikuti dengan menurunnya kadar feritin serum. Akhirnya terjadi anemia dengan cirinya yang khas yaitu rendahnya kadar Hemoglobin (Novi, 2017).

Gejala anemia sering tidak dikenali sebagai suatu masalah kesehatan oleh wanita prakonsepsi. Kejadian anemia didahului dengan adanya keluhan seperti letih, lesu, pusing kepala, serta cepat lelah. Kondisi tersebut akan menurunkan produktivitas kerja dari wanita prakonsepsi (L.S. Ani, dkk, 2018).

Diagnosis anemia defisiensi besi dibuat berdasarkan pemeriksaan klinik dan penunjang laboratorium serta penunjang lainnya. Untuk membuktikan adanya anemia maka pemeriksaan laboratorium memegang peranan penting. Pemeriksaan umum yang dipakai adalah: Pemeriksaan morfologi eritrosit (baik dengan hapusan darah tepi maupun dengan alat hitung elektronik), Pemeriksaan kadar besi serum dan total *iron binding capacity* (TIBC), Pemeriksaan kadar feritin serum, Pengecetan besi sumsum tulang. Pengecetan besi sumsum tulang bersifat semi kualitatif dan invasif sehingga tidak praktis dipakai dilapangan (Ketut Suega, dkk, 2017).

Anemia selalu merupakan keadaan tidak normal dan harus dicari penyebabnya. Anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan

laboratorium sederhana dalam evaluasi penderita anemia. Gejala utama adalah fatigue, nadi terasa cepat, jantung berdebar. Menentukan anemia dapat ditegakkan berdasarkan anamnesis untuk mencari faktor predisposisi dan etiologi, pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan adanya gejala pucat menahun tanpa disertai adanya orgnomegali, pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah rutin seperti Hb, PCV (*Packed Cell Volume*), leukosit, trombosit, ditambah pemeriksaan indeks eritrosit, retikulosit, saturasi morfologi darah tepi dan pemeriksaan status besi (Ajeng & Agustyas, 2016).

Anemia gizi pada wanita merupakan masalah yang umum di jumpai terutama di negara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Penyebab utama anemia gizi pada wanita adalah kurang memadainya asupan makanan sumber Fe, perdarahan patologis akibat penyakit malaria atau infeksi parasit seperti cacingan. Penyebab lainnya adalah dikarenakan asupan dan serapan zat besi yang tidak adekuat, yaitu dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang dapat mengganggu penyerapan zat besi seperti minum teh bersamaan pada waktu makan. Faktor lainnya yaitu pengetahuan yang kurang tentang anemia, sikap yang tidak mendukung, pendidikan ibu maupun tingkat sosial ekonomi (Akma Listiana, 2016).

Anemia terjadi dimana jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin dalam darah kurang dari batas normal. Penyebabnya sangat bermacam-macam antara lain yaitu perdarahan hebat, kurangnya zat besi dalam tubuh, rusaknya sel-sel darah, kecacingan, kurangnya asam folat dan sebagainya.

Gejala-gejala anemia yang sering muncul yaitu letih, lesu, sering pusing, muka pucat, dan pada konjungtiva terlihat warna yang pucat (Devi, 2017).

Obesitas berkaitan dengan anemia karena penimbunan lemak di jaringan adiposa dapat menurunkan penyerapan zat besi. Jaringan lemak melepaskan berbagai macam sitokin yang menyebabkan inflamasi sistemik yang berhubungan dengan patogenesis penyakit metabolik dan penyakit degeneratif yang terjadi pada obesitas. Timbunan lemak pada hati dapat memicu pembentukan peroksida lipid yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses metabolisme besi sehingga akan terjadi radikal bebas. Hal ini menyebabkan sintesis Hemoglobin tidak dapat berjalan dengan sempurna. Pada tahap akhir, hemoglobin menurun jumlahnya dan eritrosit mengecil sehingga dapat terjadilah anemia (Eriska & Apoina, 2015).

Diet vegetarian memiliki resiko tinggi terhadap kejadian kekurangan beberapa jenis zat gizi seperti protein, asam amino, vitamin D, vitamin B12, kalsium, seng, tembaga dan besi. Hal ini terutama terjadi pada vegetarian yang sama sekali tidak mengkonsumsi makanan hewani. Zat gizi yang paling berisiko tinggi mengalami defisiensi pada vegetarian akibat pola makan yang di anut dan memiliki fungsi yang sangat esensial bagi tubuh dalam pembentukan hemoglobin adalah protein. Kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi zat besi terhambat sehingga bisa mengakibatkan terjadinya defisiensi besi (Fajar, dkk, 2015).

Anemia didefinisikan sebagai berkurangnya parameter sel darah merah, konsentrasi hemoglobin, hematokrit atau jumlah sel darah merah. Gejala dan tanda anemia bergantung pada derajat dan kecepatan terjadinya anemia, juga kebutuhan oksigen penderita. Gejala anemia dapat disebabkan oleh faktor berkurangnya pasokan oksigen ke jaringan atau adanya hipovolemia misalnya pada penderita dengan perdarahan akut. Gejala umum anemia yang sering muncul yaitu lesu cepat lelah, pusing, sesak napas saat beraktivitas serta sulit berkonsentrasi. Anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium berguna dalam evaluasi penderita anemia.

3. Langkah III : Identifikasi Masalah Potensial

Kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan, baik sel maupun otak. Kekurangan kadar hemoglobin dalam darah dapat menimbulkan gejala lesu, lemah, letih, lelah dan cepat lupa. Akibatnya menurunkan prestasi belajar, olahraga dan produktivitas kerja. Selain itu dapat menurunkan daya tahan tubuh dan mengakibatkan menjadi mudah terkena infeksi (Novi Lestari, 2017).

Kondisi anemia dapat meningkatkan resiko kematian ibu pada saat melahirkan, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, keguguran dan meningkatkan risiko bayi lahir prematur. Konsekuensi morbiditas terkait dengan anemia kronis memperpanjang hilangnya produktivitas dari kapasitas gangguan kerja, gangguan kognitif dan peningkatan kerentanan

terhadap infeksi, yang juga memberikan beban ekonomi (Sudikno & Sandjaja, 2016).

Anemia gizi juga dapat mengganggu pertumbuhan dimana tinggi dan berat badan menjadi tidak sempurna, menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. Berdasarkan siklus daur hidup, anemia gizi pada remaja akan berpengaruh besar pada saat kehamilan dan persalinan. Yaitu dapat meningkatkan resiko terjadinya abortus, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, mengalami penyulit lahirnya bayi karena rahim tidak mampu berkontraksi dengan baik serta risiko terjadinya perdarahan pasca persalinan yang dapat menyebabkan kematian maternal (Akma listiana, 2016).

Diet yang tidak seimbang dengan kebutuhan zat gizi tubuh akan menyebabkan tubuh kekurangan zat gizi yang penting seperti zat besi. Dampak yang dapat ditimbulkan antara lain, menurunnya kemampuan motorik, dan kemampuan kognitif, komplikasi kehamilan dan janin pada ibu hamil, gangguan pertumbuhan, imunitas serta rentan terhadap racun dari logam berat (Ila & Heny, 2017).

Anemia tidak bisa diabaikan, karena apabila diabaikan tanpa ada penanganan yang baik bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Dampak buruk akibat anemia yaitu apabila hemoglobin dan sel darah merah sudah terlalu rendah dapat menyebabkan pengangkutan oksigen menjadi tidak memadai dan berkurang. Akibatnya dapat menghambat kerja organ-organ penting, salah satunya otak (Nova, dkk, 2020).

Dari keseluruhan referensi di atas, memiliki hasil penelitian yang sama mulai dari tanda dan gejala, atau penyebab terjadinya anemia, maupun komplikasi dari terjadinya anemia seperti dapat menurunkan kemampuan motorik serta kemampuan kognitif, meningkatkan resiko infeksi akibat imunitas tubuh menurun. Serta akan berpengaruh besar pada saat kehamilan dan persalinan dengan resiko terjadinya abortus, BBLR, bayi lahir prematur, serta risiko terjadinya perdarahan saat persalinan.

4. Langkah IV : Tindakan Segera dan Kolaborasi

Anemia menandakan permasalahan status gizi dan status kesehatan individu. Anemia merupakan faktor risiko yang paling berkontribusi pada penurunan kualitas harapan hidup wanita. Anemia dipengaruhi oleh multi faktor seperti asupan makanan sumber zat besi, folat, vitamin B12, inflamasi kronis, infeksi cacing dan genetik. Upaya pencegahan anemia gizi pada wanita usia subur dapat dilakukan dengan pengembangan program yang terintegrasi melalui kolaborasi dalam Pokja kesehatan seperti penyuluhan kesehatan gizi secara berkala, melatih keterampilan dalam pengelolaan menu makanan bergizi sehari-hari, bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain untuk melakukan deteksi anemia, melakukan sosialisasi hasil edukasi kelompok sebaya, serta menggalakkan pemberdayaan wanita usia subur melalui kelompok sebaya di masyarakat (Siti & Sutanto, 2010).

Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi zat besi intramuscular atau intravena apabila respon pengobatan oral tidak berjalan

dengan baik. Kolaborasi pada pemberian transfusi darah pada anemia akibat perdarahan untuk memulihkan dan mempertahankan perfusi organ-organ vital (Ajeng & Tjiptaningrum, 2016 dan Intan, 2016).

Pencegahan dan pengobatan anemia pada wanita usia reproduksi sangat penting untuk mencegah BBLR, kematian perinatal, dan risiko penyakit terkait peran wanita sebagai ibu. Maka program yang telah terlaksana meliputi suplai tablet tambah darah, dan fortifikasi pangan untuk memformulasikan pangan sumber zat besi. Selanjutnya kementerian kesehatan berkolaborasi dengan kementerian lain untuk meningkatkan kesadaran dan signifikansi intervensi gizi (Sintha, dkk, 2019 dan Dian, 2019).

5. Langkah V : Perencanaan

Salah satu yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan pengobatan anemia dapat meliputi pemberian suplementasi tablet besi, pendidikan dan upaya yang ada kaitannya dengan peningkatan asupan zat besi melalui makanan, pengawasan penyakit infeksi pengobatan yang efektif dan tepat waktu dapat mengurangi dampak gizi yang tidak diinginkan. Mendidik keluarga penderita tentang cara makan yang sehat selama dan setelah sakit (Tuti anggraini, dkk, 2015).

Meningkatkan status besi pada masa prakonsepsi sama seperti pemberian suplemen mikronutrien besi folat selama kehamilan. Adanya intervensi peningkatan sumber zat besi yang bioavailabilitas tinggi dalam makanan wanita usia subur. Selain itu perlu adanya fortifikasi makanan,

suplementasi zat besi, dan fortifikasi yang universal untuk menurunkan tingkat anemia (Sudikno, Sandjaja, 2016).

Pengetahuan gizi yang rendah atau kurang menyebabkan sebagian remaja tidak memahami makanan sehari-hari yang dikonsumsi sudah memenuhi syarat menu seimbang atau belum. Pengetahuan gizi juga akan membuka wawasan para remaja putri mengenai dampak dari kekeliruan perilaku gizi yang selama ini sudah dilakukan. Pendidikan atau penyuluhan gizi adalah pendekatan edukatif untuk menghasilkan perilaku individu atau masyarakat yang diperlukan dalam meningkatkan perbaikan pangan dan status gizi (Ila & Heny, 2017).

Melakukan pemberian sari kurma sebanyak 2x1 sendok makan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kadar hemoglobin. Kandungan zat besi dalam kurma yang tinggi membantu meningkatkan kadar hemoglobin dan mencegah anemia maupun mengatasi anemia. Kurma memberi banyak manfaat bagi tubuh. Salah satu manfaat yang dapat diberikan kurma antara lain dapat mencegah anemia karena kurma kaya akan kandungan kalsium dan zat besi, yang merupakan dua unsur elektif yang penting untuk pembentukan darah dan sumsum tulang (Yunarti & Yulia, 2020).

Kacang hijau mengandung vitamin dan mineral seperti kalsium, fosfor, besi, natrium dan kalium. Pencegahan anemia bisa dilakukan dengan meningkatkan konsumsi zat besi dalam makanan. Zat gizi dalam kacang hijau selain dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin yang berperan dalam penyimpanan dan pengangkutan oksigen, juga terdapat

dalam beberapa enzim yang berperan dalam metabolisme oksidatif. Pemberian jus kacang hijau dalam hasil penelitian diketahui dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada penderita anemia remaja putri (Kartika Mariyona, 2019).

Anemia pada remaja putri mempunyai dampak besar terhadap tubuh yaitu pertumbuhan akan terganggu, dan tubuh akan mudah mengalami infeksi sehingga berkurangnya kebugaran tubuh, berkurangnya motivasi belajar. Pencegahan dan penanganan anemia dapat dilakukan dengan meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi terutama makanan dengan sumber zat besi baik dari protein hewani, kacang-kacangan, sayuran hijau, dapat juga dengan minum tablet tambah darah. Perlunya istirahat dan tidur yang cukup terutama setelah melakukan aktivitas yang cukup melelahkan (Marlynda & Dina, 2020).

Salah satu cara penanggulangan anemia dengan mengubah pola konsumsinya menjadi lebih baik, salah satunya yaitu dengan membuka pikiran bahwa khasiat buah-buahan sangatlah membantu, salah satunya buah kurma dengan air kelapa muda. Kurma mengandung zat besi, dan air kelapa muda mengandung beberapa kandungan gizi yang membantu proses hematopoesis. Air kelapa muda juga mengandung asam folat yang diperlukan dalam pembentukan sel darah merah dan pendewasaannya dalam sumsum tulang (Kurniati, Susyani: 2019).

Bila harus mendapatkan transfusi darah, maka kolaborasi dengan dokter dalam pemberian transfusi darah. Transfusi darah dianjurkan dalam

jumlah kecil dan bertahap. Pada pasien HD sebaiknya diberikan saat HD. Pemberian transfusi darah sebaiknya diberikan dengan kecepatan tetesan 1 ml/menit pada 15 menit pertama dan bila tidak ada reaksi transfusi dilanjutkan 4 ml/menit (Ade Yonata, 2018).

Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian preparat besi. Pemberian preparat besi dosis 6 mg/kgBB/ hari. Dosis obat dihitung berdasarkan kandungan besi elementel yang ada dalam garam ferrous. Untuk mengatasi efek samping tersebut, pemberian besi dapat dilakukan pada saat makan atau segera makan. Obat diberikan dalam 2-3 dosis sehari. Preparat besi ini harus terus diberikan selama 2 bulan setelah anemia pada penderita teratasi (Julia&Amelia, 2018).

Selain penatalaksanaan dalam bidang medis, terdapat penatalaksanaan anemia dengan bahan-bahan yang alami yaitu pemenuhan zat gizi yang dapat dilakukan dengan mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan kandungan zat besi, vitamin, dan mineral. Mengkonsumsi buah kurma terdapat efektifitas dalam meningkatkan kadar hemoglobin. Hal tersebut karena kandungan zat besi yang tinggi dalam buah kurma. Selain buah kurma, ternyata kacang hijau, air kelapa muda serta madu dapat memberikan kontribusi terhadap pencegahan anemia.

6. Langkah VI : Penatalaksanaan

Rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah di uraikan pada langkah ke 5 dilaksanakan secara efisien, efektif dan aman. Pelaksanaan

dapat dilakukan seluruhnya oleh Bidan atau bersama-sama dengan klien, atau anggota tim kesehatan lainnya jika diperlukan.

Adapun asuhan yang diberikan adalah melakukan program penanggulangan anemia dengan memberikan tablet Fe serta mencegah terjadinya komplikasi pada wanita usia subur dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi.. Adapun zat besi dapat diperoleh dari makanan sehari-hari seperti daging, ikan, hati, telur, dan unggas. Serta yang bersumber dari nabati seperti sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan (Ida & Ima, 2019).

Menganjurkan wanita usia subur mengonsumsi jus kurlapa, dimana bahan dasar terbuat dari air kelapa muda sebanyak 300 ml serta kurma 150 gram yang diberikan selama 7 hari berturut-turut. Efektifitas pemberian jus kelapa muda dengan kurma dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada penderita anemia. Kurma mengandung zat besi dan vitamin C yang tinggi yang dapat digunakan dalam mengatasi anemia. Vitamin c yang tinggi berperan dalam meningkatkan penyerapan besi. Selain kurma, air kelapa muda juga mengandung zat gizi yang dapat membantu pembentukan darah yaitu asam folat sebagai bahan pokok pembentuk inti sel hemoglobin. Selain itu, perlakuan pemberian sari kurma sebanyak 2x1 sendok makan/hari pagi dan malam selama 2 minggu terhadap pengaruh signifikan dalam mengatasi anemia. Dan sari kurma ini juga memiliki tingkat yang berpengaruh pada peningkatan kadar hemoglobin karena dari hasil observasi anemia teratasi dengan peningkatan kadar hemoglobin

setelah pemberian sari kurma (Kurniati, dkk, 2019 dan Yuniarti, dkk,2020).

Mengonsumsi madu dengan dosis 28 gram/hari secara teratur dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan mengatasi anemia. Madu banyak mengandung mineral. Tingginya kadar zat besi erat hubungannya dengan kandungan hemoglobin. Beberapa kandungan mineral dalam madu adalah belerang, kalsium, tembaga, mangan, besi, fosfor, klor, kalium, magnesium, yodium, seng, natrium, dan aluminium. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa ada pengaruh pemberian madu hutan dengan peningkatan kadar hemoglobin pada wanita usia subur (Ani nurfaidah, 2019).

Bila diagnosis anemia defisiensi besi telah ditegakkan, pengobatan harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya anemia kronik. Pemberian pengobatan terdiri atas preparat besi secara oral berupa garan fero (sulfat, glukonat, fumarat, dan lain-lain). Tablet zat besi yang berisi ferrous fumarate yang diberikan peroral. Suplemen tersebut berisi Fe glukonat 250 mg, mangan sulfat 0,2 mg, tembaga 0,2 mg, vitamin C 50 mg, asam folat 1 mg. Terapi besi diberikan sulfas ferosus 3x10 mg, dengan pemberian makanan yang adekuat. Pemberian dosis ini dengan diagnosis dokter dan berdasarkan penelitian efektif dalam menangani anemia (Nurul & Risti, 2017 dan Maharani & Apriasari, 2014).

Dari hasil referensi diatas berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian obat herbal

maupun non-herbal dapat secara efektif dalam mengatasi masalah anemia pada wanita usia subur.

7. Langkah VII : Evaluasi

Pemberian jus kurlapa yang terbuat dari bahan buah kurma 150 gram dan air kelapa muda 250 ml, yang diberikan selama 7 hari berturut-turut secara teratur menunjukkan ada pengaruh peningkatan hemoglobin pada remaja. Karena kurma mengandung zat besi dan vitamin C yang tinggi dapat digunakan dalam mengatasi masalah anemia. Vitamin C yang tinggi berperan dalam meningkatkan penyerapan besi. Selain kurma, air kelapa juga mengandung zat gizi yang dapat membantu proses pembentukan darah yaitu asam folat sebagai bahan pokok pembentuk inti sel hemoglobin (Kurniati & Susyanti, 2019).

Kacang hijau banyak bermanfaat bagi kesehatan khususnya terhadap peningkatan kadar hemoglobin. Pemberian jus kacang hijau sangat efektif dalam mengatasi anemia karena pada kandungan kacang hijau tidak hanya terdapat kandungan zat besi tetapi juga terdiri dari asam amino esensial dan asam amino non esensial, protein, karbohidrat dan lemak yang mendukung proses sintesis hemoglobin (Kartika Mariyona, 2019).

Daun kelor merupakan salah satu jenis tanaman obat multiguns. Daun kelor memiliki efek antioksidan, antikanker, antitumor, antibakteri, anti inflamasi dan anti karsinogenik. Daun kelor mudah dijumpai di Indonesia. Tanaman ini berkembang biak secara stek dan dapat dengan

mudah tumbuh subur pada daerah dengan curah hujan yang cukup. Dalam 100 gram daun kelor mengandung zat besi sebanyak 28,29 mg. Maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa daun kelor dapat menjadi alternatif sumber zat besi (Erma, 2019).

Selain itu, madu juga banyak bermanfaat bagi kesehatan. Madu berkhasiat menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan stamina. Madu cepat berdifusi melalui darah, dan karena itu merupakan sumber energi yang cepat. Madu mendukung pembentukan darah serta membersihkan darah. Selain itu, juga ada efek positif dalam mengatur dan membantu peredaran darah tetap lancar. Pemberian madu dengan dosis 28 gram/hari secara teratur memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hemoglobin (Ani, 2019).

Tingkat pengetahuan seseorang mempengaruhi perilaku individu. Semakin tinggi pengetahuan gizi ibu semakin tinggi kesadaran untuk berperan serta dalam penyelenggaraan makanan sehingga terpenuhi kebutuhan gizi dalam keluarga. Namun pengetahuan yang baik tidak sepenuhnya di aplikasikan dalam pemilihan dan konsumsi makanan bergizi jika tidak dibarengi dengan pelaksanaan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi jika pengetahuan tentang anemia yang rendah, maka sejalan dengan itu asupan zat besi dan vitamin C yang memiliki peran yang kuat dalam peningkatan kadar hemoglobin juga rendah. Maka dari itu dalam upaya pemberdayaan yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang sederhana dalam meningkatkan pengetahuan tentang

kesehatan. Khususnya pemenuhan gizi dalam mengatasi masalah anemia dengan melakukan kegiatan promosi kesehatan atau penyuluhan yang lebih tepat sasaran memberikan pengaruh terhadap perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam mengatasi masalah anemia gizi besi (Dini, dkk, 2015 dan Suriah, dkk, 2018).

Dalam melakukan evaluasi pada wanita usia subur dengan anemia yang perlu di evaluasi adalah perlangsungan kondisi wanita usia subur setelah diberikan terapi obat farmakologi maupun non farmakologi oleh tenaga kesehatan, pemberian penyuluhan atau promosi kesehatan, ataupun berdasarkan tindakan kolaborasi dengan dokter. Yaitu anemia dapat teratasi dengan adanya peningkatan kadar hemoglobin setelah pemberian terapi secara alami dan setelah meminum obat anjuran dari dokter.

B. Implikasi Kebidanan

Anemia merupakan suatu keadaan dimana terjadi penurunan kadar hemoglobin (Hb) di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh sehingga kebutuhan oksigen jaringan tidak terpenuhi. Gejala anemia bergantung pada derajat dan kecepatan terjadinya anemia. Gejala kurang darah muncul sebagai akibat berkurangnya pasokan oksigen ke jaringan sehingga gejala anemia dapat muncul pada berbagai sistem/organ di dalam tubuh. Gejala utamanya adalah pucat, lesu, lemah, kram otot, sesak pada saat beraktifitas, jantung berdebar dan pusing. Ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi cukup sel darah merah sehat sesuai batas jumlah semestinya

adalah penyebab utama anemia. Secara umum anemia dapat disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, perdarahan kronik sampai kehilangan banyak sel darah merah, penghancuran sel darah merah yang terlalu cepat, sel darah merah yang rusak atau produksi sel darah merah yang tidak optimal. Diagnosis anemia dapat ditegakkan dari pemeriksaan laboratorium dengan menentukan kadar Hb, menentukan jenis anemia, dan menentukan kadar besi dalam darah. Anamnesis dan pemeriksaan fisik yang baik dapat membantu mencari gejala penyerta dan komplikasi dari anemia.

Komplikasi yang akan terjadi pada anemia yaitu dapat mengganggu pertumbuhan pada wanita usia subur, menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena infeksi. Menurunkan kemampuan motorik dan kemampuan kognitif. Anemia juga akan berpengaruh besar pada saat kehamilan dan persalinan, yaitu dapat meningkatkan kejadian BBLR, bayi lahir prematur, abortus, maupun perdarahan pada saat persalinan.

Anemia yang dialami oleh pasien akan mengalami masalah yang serius apabila terus diabaikan ataupun tidak diatasi. Pada anemia akibat perdarahan membutuhkan terapi segera untuk memulihkan dan mempertahankan perfusi di organ-organ vital. Pemberian terapi zat besi intramuscular atau intravena dapat dipertimbangkan bila respon pengobatan oral tidak berjalan baik. Transfusi darah diberikan apabila gejala anemia disertai risiko terjadinya gagal jantung yaitu pada kadar Hb 5-8 gr/dl. Maka dari itu perlunya melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pelaksanaan tindakan segera pada pasien anemia.

Asuhan pada wanita usia subur dengan kasus anemia adalah setelah diagnosis anemia telah ditetapkan maka tindakan dilakukan berdasarkan dengan penyebab anemia yang ditemukan. Pencegahan anemia pada wanita usia subur yaitu dengan pemenuhan nutrisi yang baik. Pemenuhan nutrisi yang baik merupakan cara terbaik untuk mencegah terjadinya anemia jika sedang hamil ataupun sedang melakukan program kehamilan.

Setelah melakukan keseluruhan asuhan pada wanita usia subur dengan kasus anemia maka perlu dilakukan evaluasi. Hal-hal yang perlu di evaluasi adalah apakah responden telah mengetahui informasi yang diberikan tentang anemia, kebutuhan zat gizi seimbang, mengevaluasi pemberian terapi farmakologi dan non-farmakologi dalam meningkatkan kadar hemoglobin dalam mengatasi anemia. Dalam evaluasi ini pemberian terapi obat farmakologi dan non-farmakologi efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin terlihat dari kandungan, khasiat serta beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penulisan literatur review pada wanita usia subur dengan anemia serta menghubungkan dengan teori dan *Avidence Based* maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu:

A. Kesimpulan

Berdasarkan referensi, maka untuk melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dengan mendapatkan data subjektif dan objektif dari tanda dan gejala, faktor penyebab berbagai referensi tentang wanita usia subur yang mengalami anemia. Anemia merupakan suatu keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam sirkulasi darah kurang dari batas normal sehingga fungsinya sebagai pengangkut oksigen keseluruhan jaringan tidak terpenuhi. Dari referensi yang didapatkan, gejala anemia bergantung pada derajat dan kecepatan terjadinya anemia. Tanda dan gejala yang sering muncul yaitu lemah, mudah merasa lelah serta sering mengantuk, sulit berkonsentrasi, pusing, pucat dan konjungtiva pucat.

Ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi cukup sel darah merah sesuai batas jumlah semestinya adalah penyebab utama terjadinya anemia. Anemia dapat disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, perdarahan kronik sampai kehilangan banyak sel darah merah, penyakit kronis, penghancuran sel darah merah yang terlalu cepat, sel darah merah yang rusak atau produksi sel darah merah yang tidak optimal.

Berdasarkan hasil referensi yang didapatkan untuk mengetahui diagnosis anemia yaitu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah rutin. Diantaranya kadar Hemoglobin (Hb), PCV (*Packed Cell Volume*), ditambah dengan pemeriksaan indeks eritrosit, retikulosit, saturasi morfologi darah tepi dan pemeriksaan status besi. Pada wanita yang tidak hamil normal kadar hemoglobin adalah 12 gr/dl.

Berdasarkan hasil referensi, masalah potensial yang dapat terjadi pada wanita usia subur dengan anemia yaitu menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi, dapat mengganggu pertumbuhan pada wanita usia subur. Anemia juga akan berpengaruh besar pada saat kehamilan dan persalinan, yaitu dapat meningkatkan kejadian BBLR, dapat mengakibatkan abortus, persalinan prematur, terhambatnya tumbuh kembang janin, rentan terkena infeksi, serta resiko terjadinya perdarahan pada saat persalinan.

Pada anemia akibat perdarahan berdasarkan hasil referensi, maka membutuhkan tindakan terapi segera untuk memulihkan dan mempertahankan perfusi organ-organ vital. Transfusi darah diberikan apabila gejala anemia disertai risiko terjadinya gagal jantung yaitu pada kadar Hb 5-8 gr/dl. Maka dari itu perlunya melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pelaksanaan tindakan segera pada pasien anemia.

Untuk perencanaan tindakan pada anemia yaitu, dimulai dari pemenuhan gizi yang baik, menjaga pola kesehatan dengan istirahat yang cukup, rajin mengikuti penyuluhan untuk mendapatkan informasi terbaru, pemberian tablet Fe disertai vitamin C, pemeriksaan laboratorium.

Selain penatalaksanaan dalam bidang medis, terdapat penatalaksanaan anemia dengan bahan yang alami. Yaitu dengan menjaga pola makan makanan yang bernutrisi serta terdapat kandungan zat besi. Pemberian terapi farmakologi maupun non farmakologi oleh tenaga kesehatan ataupun berdasarkan kolaborasi dengan dokter. Yaitu peningkatan kadar hemoglobin.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan

- a. Anemia dapat berujung pada komplikasi yang lebih berat jika tidak tertangani dengan baik. Sebagai tenaga kesehatan senantiasa dituntut untuk tetap berusaha dalam menanggulangi anemia pada wanita usia subur dengan melakukan tindakan asuhan sesuai standar operasional kerja.
- b. Tenaga kesehatan khususnya bidan, senantiasa selalu mengupdate perkembangan ilmu kesehatan khususnya ilmu kebidanan. Agar dalam melakukan penyuluhan dan memberikan informasi tentang pemenuhan gizi serta cara pengolahan makanan yang benar. Dan menerapkan asuhannya untuk mengoptimalkan upaya dalam mengatasi anemia.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti dalam melakukan asuhan. Dapat memberikan gambaran dan panduan praktik dalam asuhan anemia pada wanita usia subur.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, Proverawati. (2011). *Anemia dan Anemia Kehamilan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Atikah, dkk. (2019). *Buku Referensi Metode Orkesku Dalam Mengidentifikasi Potensi Kejadian Anemia Gizi Pada Remaja Putri*. Jogjakarta: CV Mine.
- Akma Listiana. (2016). "Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Anemia Gizi Besi Pada Remaja Putri Di SMKN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah". *Jurnal Kesehatan VII*(3): 455-469.
- Ajeng Amalia, Agustyas Tjiptaningrum. (2018). "Diagnosis dan Tatalaksana Anemia Defisiensi Besi". *MAJORITY 5* (5).
- Ade Yonata. 2018. "*Tatalaksana Anemia Pada Penyakit Ginjal Kronis*".
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad dan Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi. (2015). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm li al-Imāmayn al-Jalālayn*, Juz 1. Surabaya: al-Hidayah.
- Arini Roselyn, Ari Khusuma, dan Annisa Agata. (2018). "Pemberian Buah Kurma (Phoenix Dactylifera) Ke Penderita Anemia Pada Remaja Putri Terhadap Kadar Hemoglobin Di SMA Negeri 1 Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan". *Jurnal Analisis Medika Bio Sains 5*(1): 01-06.
- Bakta, I Made. (2016). *Hematologi Klinik Ringkas*, Jakarta: EGC
- Bardosono. (2015). *Gizi Prakonsepsi Investasi Penting sebelum Kehamilan*. Jakarta: FKM UI.
- Badriah, DL. (2011). *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*. Bandung: Refika Aditama.
- Citrakesumasari. (2012). *Anemia Gizi, Masalah dan Pencegahannya Cetakan I*. Yogyakarta: Kaliaka.
- Candra Eka Puspitasari, dkk. (2020). "Edukasi Pencegahan Anemia Saat Menstruasi Pada Remaja Putri". *Jurnal PEPADU 1*(4). <http://ippm.unram.ac.id/index.php/jurnalpepadu>
- Dian Sufyan, Sreymom Oy, Selfi Mardiana. (2019). "Hubungan Antara Kecukupan Energi Dan Protein Dengan Prevalensi Anemia Pada Wanita Usia Subur Di Kecamatan Ciampek Bogor". *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat 7*(3).

- Devi Qurrotu Ainy. (2020). "Gejala Anemia Pada Santriwati Arroyyan: Studi Tentang Pengetahuan Anemia di Tingkat Mahasantri".
- Dini Lestrina, Ida Nurhayati, Oslida Martony. (2015). "Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Kadar Hemoglobin Pada Wanita Usia Subur Di Desa Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam". *Wahana Inovasi* 4(1).
- Darmawansyih. (2016). "Hubungan Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe Terhadap Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Kec Pattalassang Kab Gowa". *Alami Journal* 1(1).
- Departemen Agama RI. (2011). *AL-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Toha putra.
- Enggar Wijayanti, Ulfa Fitriani. (2019). "Profil Konsumsi Zat Gizi Pada Wanita Usia Subur Anemia". *MGMII* (I): 39-48.
- Erizka Marwita, Apoina Kartini. (2015). "Faktor Determinan Anemia Pada Wanita Dewasa Usia 23-35 Tahun". *Journal Of Nutrition College* 4(2): 259-263. <http://ejournal-si.undip.ac.id/index.php/jnc>
- Erma Fauziandary. (2019). "Efektifitas Ekstrak Daun Kelor Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin Pada Remaja Putri". *Jurnal Kesehatan Karya Husada* 7(2).
- Fillah, dkk. (2016). *Buku Gizi Prakonsepsi*. Jakarta Timur: Bumi Medika.
- Fatmah. (2007). *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fitri Apriyanti. (2019). "Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri SMAN 1 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2019". *Jurnal Doppler Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai* 3(2).
- Fajar Nugroho, Dian Handayani, Yosi Apriani. (2015). "Asupan Protein Nabati dan Kejadian Anemia Wanita Usia Subur Vegan". *Jurnal Gizi Pangan* 10(3):165-170.
- Fillah Fithra Dieny, dkk. (2019). "Kualitas Diet, Kurang Energi Kronis (KEK), Dan Anemia Pada Pengantin Wanita Di Kabupaten Semarang". *Jurnal Gizi Indonesia* 8(1). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgi/>.
- Hidayah Noor. (2016). "Faktor Penyebab Anemia Wanita Usia Subur di Desa Jepang Pakis Kabupaten Kudus". Jawa Timur: *Jurnal Research Colloquium*.
- Intan Parulian. (2016). "Strategi Dalam Penanggulangan Pencegahan Anemia Pada Kehamilan". *Jurnal Ilmiah Widya* 3(3).

- Ila Fadila dan Heny Kurniawati. (2017). "Upaya Pencegahan Anemia Pada Remaja Putri Sebagai Pilar Menuju Peningkatan Ibu".
- Julia Fitriany, Amelia Saputri. (2018). "Anemia Defisiensi Besi". *Jurnal Averrous* 4(2).
- Julaecha. (2020). "Upaya Pencegahan Anemia Pada Remaja Putri". *Jurnal Abdimas Kesehatan* 2(2).
- Ketut Suega, dkk. (2017). "Perbandingan Beberapa Metode Diagnosis Anemia Defisiensi Besi". *Jurnal Penyakit Dalam* 8(1).
- Kementrian Kesehatan. (2016). *Pedoman pencegahan Dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri Dan Wanita Usia Subur*. Jakarta: Kementrian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan edisi pertama*.
- Kurniati Ilahi, Susyanti, Terati. (2019). "Pemberian Jus Kurlapa Dalam Meningkatkan Kadar Hemoglobin Pada Remaja Putri Yang Anemia di MA Al-Mu'aawanahogan Ilir". *Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang* 14(1).
- Kartika Mariyona. (2019). " Pengaruh Pemberian Jus Kacang Hijau (Phaseolus Radiatus) Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin Serum Pada Penderita Anemia Remaja Putri". *Jurnal Menara Medika* 2(1). <https://jurnal.umsb.ac.id/indeks.php/menaramedika/indeks>
- Lalita, Elisabeth, M. F. (2013). *Asuhan Kebidanan Kehamilan* , Jakarta: In Media.
- L.S. Ani, dkk. (2018). "Program Pencegahan Anemia Bagi Wanita Masa Prakonsepsi Di Wilayah Kerja Puskesmas Sideman Kabupaten Karangasem". *Jurnal Udayana Mengabdi* 17(3).
- Maria Abdulsalam, Albert Daniel. (2015). "Diagnosis, Pengobatan dan Pencegahan Anemia. *Jurnal Sari Pediatri* 4(2):74-77
- Marlynda Sari, Dina Anggraini. (2020). "Penyuluhan Dan Deteksi Dini Anemia Menuju Generasi Berkualitas Pada Mahasiswa Kebidanan. *Jurnal Empathy* 1(1):1-95
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati.
- Masrizal. (2015). "Anemia Defisiensi Besi". *Jurnal Penelitian*
- Nurul Jannah. (2011). *Buku Konsep Dokumentasi Kebidanan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Noor Hidayah. (2016). "Analisis Faktor Penyebab Anemia Wanita Usia Subur Di Desa Jepang Pakis Kabupaten Kudus. *University Research Colloquium*.
- Nur Ia Kaimudin, Hariati Lestari, Jusniar Ruli Afa. (2017). "Skrining dan Determinan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri SMA Negeri 3 Kendari". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat* 2(6).
- Novi Lestari. (2017). "Anemia Defisiensi Besi". *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11(1).
- Oktalia dan Herizasyam. (2016). "Kesiapan Ibu Menghadapi Kehamilan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya". *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan*, Vol. 3 No. 2
- Olivia dan Dian. (2017). *Gizi Prakonsepsi Kehamilan dan Menyusui*. Malang: UB Press.
- Retno Widowati, Rukmaini, Nunu Rahayu. (2020). "Perbandingan Konsumsi Tablet Fe Dengan Tablet Fe dan Madu Terhadap Kadar Hemoglobin Siswi Madrasah Tsanawiyah". *Pancasakti Science Education Journal* 5(1).
- Suriah, dkk. (2018). Edukasi bagi Calon Pengantin Tentang Anemia Gizi dan Kurang Energi Kronik Di Kota Pare-Pare. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*. 25-31 Vol 1.
- Sudikno dan Sandjaja. (2016) "Prevelensi Dan Faktor Risiko Anemia Pada Wanita Usia Subur di rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Kesehatan Reproduksi*. No 2 Vol 7.
- Suriah, dkk. (2018). "Edukasi Bagi Calon Pengantin Tentang Anemia Gizi dan Kurang Energi Kronik Di Kota Pare-Pare". *The Indonesian Journal Of Health Promotion* 1(1): 25-31.
- Satriani. (2018). Analisis Determinan Anemia Pada Remaja Putri (15-18 tahun) di Kecamatan Tamalate Kabupaten Jeneponto.
- Surachmindari, Rita Yulifah. (2014). *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Saleha. (2009). *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika.
- Suci dan Nurlina. (2018). "Hubungan Antara Status Gizi dan Pola Menstruasi Dengan Kejadian Anemia". *Jurnal Window Of Health*, Vol 1 No. 1.

- Sinta Fransiske, Oster Suriani. (2019). "Pengetahuan Dan Perilaku Konsumsi Remaja Putri Yang Berhubungan Dengan Status Anemia". *Jurnal Penelitian Kesehatan* 47(3):175-182.
<https://doi.org/10.22435/bpk.v47i3.1269>
- Sri Hidayati, dkk. (2019). "Anemia Defisiensi Besi Dan Indeks Massa Tubuh Terhadap Siklus Menstruasi Remaja". *Jurnal Kesehatan* 12(1).
- Siti Aisah, Juniati Sahar, Sutanto Hastono. (2010). "Pengaruh Edukasi Kelompok Sebaya Terhadap Perubahan Perilaku Pencegahan Anemia Gizi Pada Wanita Usia Subur Di Kota Semarang. <http://jurnal.unismus.ac.id>
- Tartwoto dan Wasnidar. (2013). *Buku Saku Anemia Pada Ibu Hamil Konsep Dan Pentalaksanaan*. Jakarta: Trans Info Media.
- Tuti Anggraini Utama, Nora Listiana, Desi Susanti. (2015). "Perbandingan Zat Besi Dengan Dan Tanpa Vitamin C Terhadap Kadar Hemoglobin Wanita Usia Subur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 7(8).
- Tating Nuraeni. (2019). "Pencegahan Anemia Pada Remaja Di Indramayu". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1): 43-53.
- Yuniarti, Yulia Kriska Damiri. (2020). "Pengaruh Pemberian Sari Kurma Pada Remaja Putri Dengan Kadar Hemoglobin Di Palangka Raya. *Mahakam Midwifery Journal* 5(2): 93-98.
- Yulizawati, dkk. (2016). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode Peer Education Mengenai Skrining Prakonsepsi Terhadap Pengetahuan dan Sikap Wanita Usia Subur di Wilayah Kabupaten Agam. Padang.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : Sri dewiyanti
Nim : 70400117022
TTL : Songkolo, 11 Juni 1999
Suku : Makassar
Agama : Islam
Alamat : Songkolo Lingkungan Cambayya

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2004-2005 : TK Darul Mustafa
2. Tahun 2006-2011 : SD Inpres Borongkaluku
3. Tahun 2011-2014 : MTS Negeri Gowa
4. Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 8 Gowa
5. Tahun 2017-2021 : Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar