

**UJI AKTIVITAS INHIBITOR ENZIM TIROSINASE EKSTRAK
METANOL DAN FRAKSI N-HEKSAN LEMPUYANG GAJAH (*Zingiber
zerumbet L. Roscoe ex Sm.*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

A.NURUL ARIZKA
NIM:70100117059

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A.Nurul Arizka
Nim : 70100117059
Tempat, Tanggal Lahir : Barru, 25 Mei 1999
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTP Blok AF No.583
Judul : Uji Aktivitas Inhibitor Tirosinase Ekstrak Metanol dan Fraksi N-Heksan Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L. Roscoe ex sm.)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau buatan orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 15 Februari 2022

Penyusun


A. Nurul Arizka

70100117059

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Inhibitor Tirosinase Ekstrak Metanol dan Fraksi N-Heksan Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumber L. Roscoe ex sm.*)” yang disusun oleh **A. Nurul Arizka, Nim:70100117059**, Mahasiswi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Munaqasyah yang di selenggarakan pada tanggal **15 Februari 2022** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.


Gowa, 15 Februari 2022 M
Gowa, 14 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Haeria, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Apt. Mukhriani, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Prof. Siti Aisyah Kara, M.A., PhD	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes.
NIP:19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Inhibitor Enzim Tirosinase Ekstrak Metanol dan Partisi N-Heksan Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil, sehingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan dari beliau.

Selesainya penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan Terima Kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhanis M.A., PhD. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. selaku ketua jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si. selaku sekretaris jurusan Farmasi sekaligus pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis.
5. Haeria, S.Si., M.Si. selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Apt. Mukhriani, S.Si., M.Si. selaku penguji kompetensi dan telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Prof. Siti Aisyah Kara, M.A., PhD. Selaku penguji Integrasi Keislaman yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini
9. Angkatan 2017 Farmasi (KOVALEN) yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada semua pihak yang membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu pada kesempatan ini penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Gowa, 15 Februari 2022

Penulis,



A. Nurul Arizka
70100117059

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Kajian Pustaka	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Uraian Tanaman Lempuyang Gajah	6
5. Enzim Tirosinase	7
6. Inhibitor Tirosinase	9
7. Melanin	10
8. Ekstraksi dan Partisi	12
9. Tinjauan Islam	14
BAB III	16
METODOLOGI PENELITIAN	16
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	16
B. Pendekatan	16
C. Alat dan Bahan	16
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	17
BAB IV	22
HASIL DAN PEMBAHASAN	22


A. Hasil Penelitian	22
B. Pembahasan	24
BAB V	28
PENUTUP	28
A. Kesimpulan	28
B. Saran	28
Daftar Pustaka	29
Riwayat Hidup	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Hasil identifikasi senyawa kimia.....	21
Tabel 2. Hasil persen inhibitor ekstrak metanol Lempuyang Gajah.....	22
Tabel 3. Hasil persen inhibitor pastisi n-heksan Lempuyang Gajah.....	22
Tabel 4. Hasil persen inhibitor asam kojat.....	23
Tabel 5. Hasil nilai IC50.....	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan alur penelitian.....	31
Lampiran 2. Pembuatan Larutan Uji.....	32
Lampiran 3. Uji Penghambatan enzim tirosinase.....	34
Lampiran 4. Hasil Perhitungan.....	35
Lampiran 5. Gambar Penelitian.....	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tanaman Lempuyang Gajah (<i>Zingiber zerumbet</i>).....	39
Gambar 2. Rimpang Lempuyang Gajah (<i>Zingiber zerumbet</i>).....	39
Gambar 2. Skema Mekanisme Kerja Enzim Tirosinase.....	40



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

NAMA : A.Nurul Arizka

NIM : 70100117059

Jurusan : Farmasi

Judul Skripsi : Uji Aktivitas Inhibitor Enzim Tirosinase Ekstrak Metanol dan Partisi N-Heksan Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L. Roscoe ex Sm.*)

Melanin merupakan pigmen yang memberikan warna pada kulit, pigmen melanin yang berlebih dapat menimbulkan masalah pada kulit seperti hiperpigmentasi. Salah satu prinsip untuk menangani hiperpigmentasi yaitu dengan menghambat sintesis melanin yang dapat dilakukan dengan inhibitor tirosinase yang memiliki mekanisme kerja dengan cara menghambat enzim tirosinase. Telah dilakukan penelitian tentang aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak metanol dan fraksi n-heksan Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*) mengandung senyawa flavanoid yang merupakan senyawa yang dapat berpotensi untuk menghambat adanya tirosinase. Adanya inhibitor akan mengurangi dan menghentikan aktivitas tirosinase dalam memproduksi melanin yang nantinya akan mempengaruhi warna kulit. Tujuan penelitian agar dapat melihat seberapa besar aktivitas ekstrak Lempuyang gajah menggunakan pelarut metanol dan partisi N-Heksan dengan konsentrasi berbeda dalam menghambat pembentukan melanin melalui IC50. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) memiliki aktivitas sebagai inhibitor tirosinase dengan rata-rata persen inhibitor 15%, 16%, 17%, 18%, dan 20%. Pada fraksi N-Heksan Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) juga memiliki aktivitas tirosinase dengan persen inhibisi berturut-turut 15%, 17%, 18%, 21%, dan 21,4%. Ekstrak metanol Lempuyang gajah memiliki nilai IC50 yaitu 609,3 µg/mL dan partisi N-Heksan memiliki nilai IC50 452,3 µg/mL. Sedangkan asam kojat memiliki nilai IC50 341,7 µg/mL.

Kata Kunci: *Ekstrak Metanol Lempuyang gajah, partisi N-Heksan Lempuyang gajah, tirosinase, IC50*

ABSTRACT

Name : A.Nurul Arizka
Registration Number : 70100117059
Departement : Pharmacy
The title of Thesis : **Test Tyrosinase Inhibition Activity of Metanol and Partisi N-Heksan Extract from Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L. Roscoe ex Sm.*)**

Melanin is a pigment that gives color to the skin, excess melanin pigment can cause skin problems such as hyperpigmentation. One of the principles to treat hyperpigmentation is by inhibiting melanin synthesis which can be done with tyrosinase inhibitors which have a mechanism of action by inhibiting the tyrosinase enzyme. Research has been carried out on the tyrosinase inhibitor activity of methanol extract and the n-hexane fraction of Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*) containing flavonoid compounds which is a compound that has the potential to inhibit the presence of tyrosinase. The presence of inhibitors will reduce and stop tyrosinase activity in producing melanin which will affect skin color. The aim of this research is to see how much activity of Lempuyang Gajah extract using methanol solvent and N-Hexane partition with different concentrations in inhibiting melanin formation through IC₅₀. The results showed that the methanol extract of Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet*) had activity as a tyrosinase inhibitor with an average percent inhibitor of 15%, 16%, 17%, 18%, and 20%. In the N-Hexane fraction, Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet*) also had tyrosinase activity with inhibition percentages of 15%, 17%, 18%, 21%, and 21.4%, respectively. The methanol extract of Lempuyang Gajah had an IC₅₀ value of 609,3 g/mL and the N-Hexan partition had an IC₅₀ value of 452.3 g/mL. Meanwhile, kojic acid has an IC₅₀ value of 341,7 g/mL.

Keywords : *Ekstrak Metanol Lempuyang gajah, partisi N-Heksan Lempuyang gajah, tirosinase, IC₅₀*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya wanita yang berada pada benua Asia lebih menyukai kulit yang berwarna putih dibandingkan dengan kulit yang berwarna coklat hal ini menyebabkan produk pencerah kulit semakin berkembang. Produk pencerah kulit, khususnya produk kosmetik pencerah kulit yang biasanya mengandung pemutih, sudah digunakan secara luas oleh masyarakat (Sanjeewa et al., 2016).

Kulit adalah bagian tubuh manusia terluar yang memiliki peran sebagai proteksi tubuh. Kulit yang terkena paparan sinar UV secara terus menerus akan mengakibatkan hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi merupakan gangguan pada kulit yang disebabkan melanin yang diproduksi oleh tubuh meningkat dan melanin yang didistribusikan tidak merata, hal inilah yang menyebabkan kulit terlihat gelap (Aprilliani, 2018).

Penggelapan kulit ada karena adanya pembentukan pigmen melanin dikulit melalui oksidasi tirosin yang dibentuk oleh enzim tirosinase membentuk L-DOPA yang kemudian akan membentuk melanin. Salah satu cara untuk menghambat proses terbentuknya melanin adalah dengan melakukan penghambatan aktifitas tirosinase. Tirosinase adalah enzim yang berperan dalam pembentukan warna kulit dengan proses melanogenesis (Sagala et al., 2019).

Tirosinase adalah enzim yang berperan mengkatalisis dua reaksi utama dalam biosintesis melanin yaitu hidroksilasi L-tirosin, menjadi L-dopa dan oksidasi L-dopa menjadi dopakuinon selanjutnya akan berpolimerasi membentuk dopakrom yang kemudian menjadi melanin, penghambat tirosinase yang telah populer di masyarakat adalah hidrokuinon dan asam kojat (Aprilliani, 2018).

Reaksi pencokelatan oleh enzim tirosinase dapat di inhibisi atau dihambat oleh suatu penghambatan reaksi enzimatik berupa ion atau molekul yang disebut

inhibitor tirosinase. Beberapa inhibitor tirosinase diantaranya adalah asam kojat, arbutin, merkuri, dan hidroquinon (Sagala et al., 2019).

Saat ini kosmetik banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya kosmetik pencerah kulit yang biasanya mengandung obat pemutih. Kosmetik adalah bahan yang diaplikasikan secara topikal yang digunakan untuk menghilangkan kotoran kulit, mempertahankan komposisi cairan kulit, melindungi kulit dari paparan sinar UV, memperlambat timbulnya kerutan, memperbaiki penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri (Fatmawati et al., 2020).

Inhibisi tirosinase adalah salah satu strategi untuk mencegah hiperpigmentasi kulit. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meneliti inhibitor tirosinase yang aman dan efektif yang berasal dari bahan alam dan sintetis. Meskipun banyak informasi mengenai inhibitor tirosinase namun hanya sedikit inhibitor yang dapat diterapkan karena memiliki keterbatasan mengenai sitotoksitas, selektivitas, dan stabilitas (Gazali et al., 2014).

Saat ini, inhibitor tirosinase banyak menarik perhatian karena dapat mencegah melanogenesis akibat terpapar langsung dengan radiasi uv sinar matahari. Inhibitor tirosinase menjadi sangat penting dalam medikasi dan kosmetik, untuk mencegah hiperpigmentasi kulit melalui penghambatan oksidasi enzimatis. Banyak inhibitor tirosinase yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik karena memutihkan kulit diantaranya hidroquinon, dan asam kojat. Namun demikian, beberapa senyawa tersebut memiliki efek samping berbahaya terkait karsinogenesis dan mutagenesis seperti asam kojat yang memiliki efek inhibisi dan kestabilan yang paling besar dalam mencegah hiperpigmentasi kulit (Gazali et al., 2014). Asam kojat pada konsentrasi tinggi bersifat hepatokarsinogenik, pemakaian asam kojat pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan erythema dan dermatitis kontak alergi. Oleh karena itu, eksplorasi dan penemuan inhibitor tirosinase yang

aman, sumber dayanya mendukung dan daya inhibisinya kuat sangat dituntut oleh industri kosmetik (Gazali et al., 2014).

Eksplorasi senyawa bioaktif yang potensial sebagai penghambat tirosinase yang berasal dari bahan-bahan alami masih perlu dilakukan, berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui aktivitas penghambatan enzim tirosinase ekstrak etanol Lempuyang Gajah (*Zingiber zumbet L*).

B. Rumusan Masalah

1. Berapa persen (%) inhibisi dari ekstrak metanol dan fraksi n-heksan Lempuyang gajah?
2. Berapa nilai IC_{50} inhibitor tirosinase ekstrak metanol dan fraksi n-heksan tanaman Lempuyang Gajah?
3. Bagaimana aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak dari tanaman Lempuyang Gajah?

C. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilliani, 2018) dengan judul “Uji Inhibisi aktivitas enzim tirosinase beberapa jenis tumbuhan Zingiberaceae”, dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inhibisi aktivitas enzim tirosinase dari beberapa jenis rimpang dengan beberapa jenis tanaman yang memiliki suku Zingiberaceae. Sampel yang terpilih dalam penelitian ini ada 19 jenis sampel. Metode yang digunakan dengan cara sampel diekstraksi dengan cara dimaserasi menggunakan pelarut etanol 96% dan di fraksinasi menggunakan pelarut n-heksan dan etil asetat, setelah itu semua sampel yang telah diekstraksi dilakukan evaluasi uji penghambatan tirosinase secara In-vitro dengan menggunakan kontrol positif alpha-arbutin.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan jurnal Arini Aprilliani pada tahun 2018 yaitu pada sampel yang digunakan dimana peneliti dalam jurnal menggunakan beberapa sampel dari tanaman rimpang sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu tanaman yaitu Lempuyang Gajah. Adapun informasi yang dapat diambil yaitu metode yang digunakan secara In-Vitro dengan menggunakan kontrol positif, didalam penelitian (Aprilliani, 2018) menggunakan kontrol positif alpha-arbutin sedangkan dipenelitian ini menggunakan asam kojat.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sagala et al., 2019) dengan judul penelitian “Uji Aktivitas Inhibisi Terhadap Enzim Tirosinase dari Ekstrak Etanol Daun Pepaya” dan metode yang digunakan yaitu dengan cara maserasi dengan pelarut etanol 70%, L-DOPA digunakan sebagai substrat dengan asam kojat sebagai kontrol positif.

Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu sampel dan pelarut yang digunakan dimana pada penelitian ini digunakan sampel Lempuyang gajah dan pelarut metanol.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Rauf et al., 2020) dengan judul penelitian “Aktivitas Penghambatan Enzim Tirosinase Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (*Croton oblongus Burm F*)” dengan metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi. Pengujian dilakukan dengan L-tirosin sebagai substrat ekstrak metanol Klika Anak Dara dengan konsentrasi 20ppm, 40ppm, 60ppm, 80ppm, dan 100ppm dan asam kojat sebagai kontrol positif lalu diukur serapannya menggunakan microplate reader dengan panjang gelombang 490 nm.
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ((Fatmawati et al., 2020) dengan judul “Pengujian Penghambatan Enzim Tirosinase pada

Formulasi Masker Pencerah Wajah dari Kombinasi Keefir Susu Sapi dan Rumput Laut (*Eucheuma cottonii*)” dengan cara Asam kojat digunakan sebagai kontrol yang dihitung menggunakan rumus dan diukur aktivitas inhibisi tirosinase IC₅₀ dari sampel dan kontrol yang digunakan.

Adapun informasi yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu perhitungan IC₅₀ dengan menggunakan rumus dan diukur inhibisi tirosinase dari sampel dan kontrol positif yang digunakan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui berapa persen inhibisi ekstrak metanol dan fraksi Lempuyang Gajah
- b. Untuk mengetahui nilai IC₅₀ inhibitor tirosinase ekstrak tanaman Lempuyang Gajah.
- c. Untuk mengetahui apakah ekstrak dari Lempuyang Gajah mempunyai aktivitas inhibitor tirosinase

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada penulis dan masyarakat dalam penemuan senyawa dari tanaman-tanaman yang ada disekitar khususnya Lempuyang Gajah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Tanaman Lempuyang Gajah*

1. Klasifikasi Lempuyang Gajah

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledonae
Famili	: Zingiberaceae
Genus	: Zingiber
Spesies	: <i>Zingiber zerumbet</i> (Lianah, 2019)

2. Deskripsi



Gambar 1. Tanaman Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet*) (Hariana, 2008)



Gambar 2. Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet*) (Silalahi, 2018)

Lempuyang gajah merupakan tanaman terna tahunan dan hidupnya berumpun, memiliki batang semu dengan tinggi maksimal mencapai 1-2 meter memiliki warna yang hijau tersusun dengan kumpulan pelepah daun, daun tunggal

dan tersusun berseling pada kanan kiri batang. Ujung daun meruncing, pangkal daun runcing, dan tepi daun rata. Lempuyang gajah memiliki bunga yang muncul dari rimpang memiliki tangkai bunga dengan panjang kurang lebih 12 cm. Memiliki bunga yang berwarna merah (Lianah, 2019).

3. Nama Daerah

Di Indonesia Lempuyang Gajah dikenal dengan sebutan atau nama daerah yaitu Lempuyang kapur (Jawa), Lempuyang Kebo (Jawa), Lempuyang Paek (Madura), Lempuyang Kerbau (Sumatra) (Hariana, 2008).

4. Kandungan Kimia Lempuyang Gajah

Kandungan Kimia yang dimiliki oleh Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet*) yaitu Flavanoid, Polifenol, Minyak atsiri, Alkaloid, dan Saponin (Hariana, 2008).

B. Enzim Tirosinase

Enzim adalah polimer yang mengkatalis reaksi kimia, yang mengkatalis perubahan senyawa menjadi satu atau lebih senyawa dan dapat meningkatkan laju meningkatkan laju reaksi (Murray, Granner, & Rodwel, 2006). Enzim merupakan protein yang bermanfaat atau berfungsi sebagai katalisator dan dapat meningkatkan reaksi kimia, enzim sangat berkaitan dengan reaktan yang biasa disebut substrat yang dapat mengubah reaktan menjadi produk dan melepaskan produk (Mawaddah & Susilawati, 2018).

Tirosinase merupakan enzim yang mengandung tembaga mengatalisasi dua reaksi yang berbeda dengan menggunakan oksigen molekuler (Gazali et al., 2014). Fungsi enzim ialah sebagai katalis untuk proses biokimia yang terjadi dalam sel maupun diluar sel, enzim berfungsi sebagai katalis yang sangat efisien (Mawaddah & Susilawati, 2018).


Salah satu enzim yang berperan untuk mengkatalis adalah enzim tirosinase. Tirosinase merupakan enzim yang berperan dalam mengkatalisis dua reaksi utama dalam biosintesis melanin yaitu, hidroksilasi L-tirosin menjadi L-dopa dan oksidasi L-dopa menjadi dopkuinon selanjutnya dopakuinon akan berpolimerasi membentuk dopakrom yang kemudian menjadi melanin (Aprilliani, 2018).

Keberadaan melanin sangat mempengaruhi warna kulit, dimana warna kulit sangat dipengaruhi oleh enzim tirosinase. Enzim ini dapat mengkatalis dua reaksi biosintesis melanin yaitu O-hidroksilasi dari asam amino L-tirosin menjadi L-3,4-dihidroksifenilalanin dan oksidasi subsukuen dari L-dopa menjadi dopakuinon, senyawa dopakuinon mempunyai kereaktifan yang sangat tinggi sehingga dapat mengalami polimerasi secara spontan membentuk dopakrom yang kemudian menjadi melanin. Salah satu yang dapat menghambat aktifitas tirosinase adalah senyawa polifenol yang merupakan bagian dari flavanoid (Kurniasari et al., 2018).

Salah satu cara untuk mencegah atau menghambat pembentukan melanin adalah dengan melakukan penghambatan aktifitas tirosinase. Tirosinase adalah enzim yang berperan dalam pembentukan pigmen kulit, dalam proses melagonogenesis tirosinase berperan sebagai katalis pada dua reaksi yang berbeda yaitu proses hidroksilasi tirosin menjadi hidroksi-fenilalanin (L-DOPA) menjadi DOPA kuinon, tirosinase diaktifkan oleh sinar UV matahari sehingga mempercepat produksi melanin(Sagala et al., 2019).

Zat yang dapat menghambat enzim tirosinase adalah hidrokuinon dan asam kojat yang diketahui bersifat karsinogenik. Maka dari itu, banyak orang berupaya mencari senyawa baru penghambat enzim tirosinase (Aprilliani, 2018).

Reaksi pencoklatan oleh tirosinase dapat dihambat oleh suatu penghambatan enzimatis berupa ion atau molekul yang disebut inhibitor tirosinase seperti asam kojat, merkuri, hidrokuinon dan arbutin (Sagala et al., 2019).



Gambar 2. Skema Mekanisme Kerja Enzim Tirosinase (Sudjadi & Laila, 2007).

Enzim tirosinase berperan dalam proses awal katalis untuk mengkonversi tirosin menjadi L-3,4-*dihydroxyphenylalanine* (DOPA) dan selanjutnya teroksidasi menjadi DOP-Aquinone (DQ). Sistein selanjutnya akan mengubah DOPA-*quinone* menjadi sisteinil DOPA dan akan teroksidasi menjadi DH 1,4 Benzothiazin dan akhirnya terpolimerase menjadi feomelanin yang berwarna kuning kemerahan dan merupakan melanin yang larut. Jika tidak ada thiol DQ akan langsung menjadi DOPAchrome yang berwarna coklat kehitaman. DOPAchrome secara spontan akan kehilangan asam karboksilat dan 5,6 *dihydroxyndole* akan segera teroksidasi dan terpolimerisasi menjadi coklat kehitaman. DOPAchrome *tautomerase* akan mengubah DOPAchrome menjadi DHI-2-*carboxyl acid* (Rina et al., 2020).

C. *Inhibitor Tirosinase*

Inhibitor tirosinase adalah senyawa-senyawa yang dapat mengganggu aktivitas tirosinase, yaitu enzim yang berperan dalam proses melanogenesis. Penggunaan senyawa ini dalam bidang farmasi dimanfaatkan sebagai agen pencerah kulit dalam kosmetik. Penggunaan senyawa sintetik diketahui memiliki banyak efek samping yang dapat merugikan pengguna (Puraningsih et al., 2020).

Inhibitor tirosinase menghambat aktivitas enzim tirosinase dengan mereduksi bahan yang dapat menyebabkan oksidasi dopakuinon. Inhibitor

tirosinase yang spesifik akan berikatan kovalen dengan enzim sehingga menjadi tidak aktif selama reaksi katalik berlangsung (Rina et al., 2020).

Inhibitor enzim tirosinase sangat dibutuhkan sebagai penghambat produksi melanin pada lapisan epidermis dan membuat kulit tampak lebih cerah (Kurniasari et al., 2018). Menurut (Chang, 2009), mekanisme inhibitor enzim tirosinase dilakukan dengan cara yaitu;

1. Agen pereduksi yang dapat mereduksi dopakuinon seperti asam askorbat.
2. Substrat enzim alternatif yang dapat menyerap hasil reaksi kuinoid yang bukan dari produk dopakrom.
3. Inaktivator enzim non spesifik yang tidak secara khusus mendenaturasi enzim sehingga dapat menghambat aktivitasnya.
4. Inaktivator tirosinase, yang dapat mengkatalisis tirosinase dan membentuk ikatan kovalen dengan enzim sehingga menginaktivasi secara irreversibel. Inhibitor ini dikenal sebagai *suicide substrates*.
5. Inhibitor tirosinase spesifik yang berikatan reversibel dengan tirosinase dan mereduksi kapasitas katalisisnya.

Inhibitor tirosinase menarik banyak perhatian karena dapat mencegah melanogenesis akibat terpapar langsung dengan sinar matahari. Inhibitor tirosinase sudah menjadi sangat penting dalam medikasi dan kosmetik. Untuk mencegah hiperpigmentasi kulit melalui penghambatan oksidasi enzimatik, banyak inhibitor tirosinase yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik oleh industri kosmetik karena dapat memutihkan kulit (Gazali et al., 2014).

D. Melanin

Melanin merupakan pigmen alami yang memberikan warna pada kulit. Melanin adalah pigmen yang utama yang menentukan warna kulit yang disintesis di melasom. Melasom adalah organela pada melanosit yang terletak dilapisan

epidermis basal. Melasma merupakan suatu kelainan pigmentasi yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah melanin dalam epidermis atau dermis yang berupa bercak abu-abu, coklat, ireguler, yang biasa ditemukan di wajah (Pratama & Susilawati, 2018).

Melanin merupakan mekanisme pertahanan utama terhadap sinar ultraviolet dan berperan penting dalam pencegahan kerusakan kulit akibat sinar matahari. Indonesia adalah negara tropis dengan radiasi sinar matahari yang intens oleh karena itu, produksi melanin di kulit dapat terpicu sehingga dapat menyebabkan hiperpigmentasi. Melanin, pigmen utama yang terutama bertanggung jawab pada kulit, rambut dan pigmentasi mata manusia, diproduksi oleh melanosit melalui melanogenesis. Melanogenesis dan pigmentasi kulit adalah faktor fotoprotektif terpenting dalam menanggapi radiasi ultraviolet yang merusak dari sinar matahari dan fotokrosinogenesis kulit. Hilangnya melanin dan dipigmentasi yang abnormal bisa menjadi masalah kecantikan dan dermatologis wajah yang serius (Rauf et al., 2020).

Sintesis melanin berlangsung dalam melanosom yaitu organel khusus pada melanosit. Melanosit merupakan sel berdendrit terletak di lapisan basal epidermis, dan dendritnya dapat mencapai pertengahan lapisan epidermis. Proses pigmentasi pada kulit terjadi melalui dua tahap yaitu, sintesis melanin di dalam melanosom dan transfer melanosom yang sudah dipenuhi melanin ke keratinosit epidermis disekitar melanosit (Hindritiani et al., 2011).

Proses pembentukan melanin dapat dikurangi dengan menghambat enzim tirosinase (Rauf et al., 2020). Melanogenesis difasilitasi oleh suatu jalur kompleks yang terjadi pada melanosoma intraseluler di dalam melanosit dan dirangsang oleh radiasi ultraviolet dan MSH (*α -melanocyte stimulating hormone*). Proses melanogenesis menghasilkan sintesis pigmen-pigmen melanin yang memainkan

peranan protektif dalam melawan fotokarsinogenesis kulit. Hiperpigmentasi tidak hanya menjadi masalah estetika tetapi juga masalah dermatologi. Salah satu agen penyebab utama hiperpigmentasi adalah radiasi ultraviolet (Gazali et al., 2014).

E. Ekstraksi dan Partisi

Ekstraksi adalah proses yang dilakukan oleh cairan penyari untuk menarik keluar zat aktif yang beberapa terdapat pada tanaman obat. Proses ekstraksi yang terjadi adalah masuknya cairan penyari kedalam sel tanaman atau tumbuhan (Ahmad, 2018).

Metode ekstraksi dapat dibagi dua yaitu metode ekstraksi dingin dan metode ekstraksi panas. Metode ekstraksi dengan cara panas dapat dibagi berdasarkan cairan penyari yang digunakan yaitu dengan menggunakan air dan dengan pelarut organik seperti metanol atau etanol. Metode ekstraksi secara panas menurut (Ahmad, 2018).

1. Infusa, proses penyarian yang menggunakan pelarut air pada temperatur 90°C selama 15-20 menit.
2. Soxhlet, metode ekstraksi untuk bahan yang tahan terhadap panas dengan cara meletakkan bahan yang akan di ekstraksi dalam sebuah kantong ekstraksi atau kertas sari didalam sebuah alat ekstraksi dan bekerja secara kontinu dengan pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik dan turun menyari simplisa dalam klonsong dan kembali kedalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon.

Adapun metode-metode ekstraksi menurut (Dirjen POM, 1986) dalam buku (Suroto Hadi Saputra, 2020).

1. Maserasi, metode ini diperuntukkan untuk bahan alam yang mengandung komponen kimia yang tidak tahan pemanasan dan mempunyai tekstur lunak, dilakukan dengan cara penyarian yang sederhana dengan merendam

serbuk simplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur ruangan dan terhindar dari cahaya matahari.

2. Perkolasi, cara penarikan senyawa aktif dengan mengalirkan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi, prinsipnya adalah serbuk simplisia ditempatkan pada bejana yang bagian bawahnya diberi sekat berpori dimana cairan penyari akan melarutkan zat aktif dalam sel simplisia yang dilalui sampel dalam kondisi jenuh.
3. Soxhletasi, proses penyarian simplisia secara berkesinambungan dimana cairan penyari dipanaskan sampai menguap, uapan cairan penyari akan terkondensasi menjadi molekul air oleh pendingin balik dan turun menyari simplisia didalam kelongsong dan kemudian masuk kembali kedalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon.
4. Reflux, merupakan metode berkesinambungan dimana cairan penyari secara kontinu menyari komponen kimia dalam simplisia cairan penyari dipanaskan hingga menguap dan uap tersebut terkondensasi oleh pendingin balik dan akan mengalami kondensasi membentuk molekul cairan dan jatuh ke labu alas bulat sambil menyari simplisia.
5. Destilasi uap air, diperuntukkan untuk simplisia yang mengandung minyak menguap. Uap air digunakan untuk menyari simplisia dengan adanya pemanasan uap air menguap bersama minyak menguap dan terkondensasi oleh kondensor akan terbentuk molekul air yang menetes kedalam corong pisah penampung yang telah di isi air.

Selain itu, metode ekstraksi juga dapat didasarkan pada sifat polaritas dari senyawa yang akan disari. Dimana, pelarut dengan sifat kepolaran yang tinggi akan menarik komponen polar sedangkan pelarut dengan kepolaran rendah akan menarik komponen non polar (Najib, 2018).

Partisi merupakan pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Sebelum melakukan proses partisi yang pertama dilakukan yaitu penentuan metode partisi yang digunakan dengan cara uji pendahuluan sampel. Caranya yaitu diambil sampel sedikit dan dilarutkan dengan aquadest kemudian diaduk apabila sampel larut dalam aquadest maka metode yang digunakan adalah partisi cair-cair, sebaliknya jika sampel tidak larut dalam aquadest maka metode yang digunakan adalah partisi padat-cair (Saputra et al., 2018).

F. Tinjauan Islam

Al-Qur'an menyebutkan banyak tentang pemanfaatan tumbuh-tumbuhan yang baik dimanfaatkan atau digunakan oleh manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-An'am/6:99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَاتَرَ كَثِيرًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالرَّيْنُونِ وَالرُّمَّانِ مُسْتَبِيهَا وَغَيْرَ مُتَسَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيُبْغِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahannya:

“Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu dengan segala macam tumbuh-tumbuhan maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkainya menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pulalah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (Kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”(Husna Achsanul, 2019).

Pada ayat ini dapat diuraikan kumpulan hal-hal yang telah disebut, bermula dengan kata Dan Dia juga selainnya telah menurunkan air, yakni dalam bentuk air hujan lalu kami, yakni Allah SWT mengeluarkan yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni turunnya air tersebut atau air hujan dia pula mengeluarkan berbagai macam tumbuhan, dia pula yang mewarnainya, lalu menyusun butir buahnya dengan rapi dan mudah dipetik yang memiliki bentuk dan rasa yang

berbeda-beda. Kemudian Allah SWT dan mengamatinya mulai sejak berbuah hingga buahnya matang dan hingga dirasakan kenikmatan buahnya. Kebesaran Allah SWT yang telah menjadikan semua itu kepentingan manusia (Husna Achsanul, 2019).

Tafsiran ayat diatas dapat disimpulkan bahwa, tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan Allah SWT memiliki banyak keuntungan bagi manusia salah satunya adalah sebagai obat, hendaknya dilakukan pengembangan salah satunya dengan meneliti kandungan yang ada dalam tumbuhan dan dengan itu kita akan semakin yakin dengan kekuasaan Allah SWT.

Berobat merupakan hal yang disyariatkan selama tidak menggunakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT. Allah SWT tidak memberikan penyakit jika tidak ada obatnya sebagaimana disebutkan dalam hadist yang berbunyi:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

“Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya pula”(Al Abi Alabas, 2007).

Jadi setiap penyakit yang diturunkan Allah SWT ada obatnya, dan pengobatan yang dilakukan harus sesuai dengan penyakit yang diderita.

Allah SWT juga menyukai keindahan sebagaimana disebutkan dalam hadist yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan” (HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud RA).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen laboratorium.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan laboratorium Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

3. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan terhitung mulai 5 Juli sampai 1 September

B. *Pendekatan*

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif berupa analisis data.

C. *Alat dan Bahan*

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bejana maserasi, Cawan porselin, Dekskikator, Oven, Ph meter, Rotary evaporator, Tabung endorf, Timbangan analitik, Mikroplate Reader, Mikro pipet.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu air suling, aluminium foil, asam kojat, asam asetat anhidrat, asam klorida, 2 N asam sulfat pekat, besi (III) klorida, dimetilsulfoksida, ekstrak metanl Lempuyang Gajah, eter, enzim tirosinase, etanol 96%, heksan, kalium hidroksida, kalium dihidrogen fosfat, kertas perkamen, kertas saring, L-tirosin, natrium klorida, magnesium, pereakse dragendorf, mayer, warger, tisu, dan simplisia Lempuyang Gajah.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Penyiapan Sampel

a. Pengambilan sampel

Sampel rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) yang diperoleh di daerah Kabupaten Maros, Sulawesi selatan. Rimpang Lempuyang gajah dipisahkan dengan bagian tumbuhan lainnya dan dicuci dengan air mengalir.

b. Pengolahan sampel

Sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk memisahkan sampel dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya kemudian sampel dicuci bersih dengan air mengalir, kemudian dipotong kecil selanjutnya dikeringkan dengan cara di angin-anginkan kemudian diserbukkan.

2. Maserasi dan Fraksinasi

Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia rimpang lempuyang gajah yaitu dengan cara maserasi yang bertujuan untuk mengekstrak komponen katif yang terdapat dalam sampel kemudian serbuk rimpang lempuyang gajah ditimbang sebanyak 500 gram dan dimaserasi dengan metanol selama 3 x 24 jam dan setiap 1 x 24 jam pelarut metanol diganti dengan yang baru, selanjutnya hasil maserasi di evaporasi dengan bantuan alat *rotary evaporator* (Nuari, Syarifullah, 2017).

Ekstrak kemudian dipartisi dengan cara melarutkan 20 gram ekstrak metanol kedalam 200 ml metanol. Larutan kemudian dimasukkan kedalam corong pisah dan selanjutnya ditambah dengan 200 ml n-heksan. Campuran dalam corong pisah dikocok selama 5 menit secara perlahan lalu didiamkan hingga terjadi pemisahan pada kedua larutan. Proses partisi kemudian dilakukan secara berulang hingga larutan terlihat bening. Kemudian ekstrak metanol dan n-heksan duapkan hingga memperoleh ekstrak kental (Nuari, Syarifullah, 2017).

3. Identifikasi Kandungan Kimia Ekstrak Dan Fraksi

a. Uji alkaloid

Sebanyak 500 mg ekstrak dimasukkan kedalam erlenmeyer lalu ditambahkan 1 ml HCL 2N dan dicukupkan dengan aquadest hingga 10 ml. Kemudian dipanaskan diatas penangas air selama 15 menit, kemudian didinginkan dan disaring . diteteskan larutan dalam kaca arloji dan ditambahkan dengan 2 tetes reagen Bouchardat. Hasil positif dengan ditandai adanya endapan coklat sampai hitam (Utami, 2020).

b. Uji flavanoid

Sebanyak 2 ml larutan ekstrak ditambahkan air panas, kemudian dididihkan selama 5 menit, lalu disaring. Filtrat ditambahkan sedikit demi sedikit serbuk Magnesium dan 1 ml HCl pekat, kemudian dikocok. Uji positif ditunjukkan oleh terbentuknya warna merah, kuning atau jingga (Ilmiati et al., 2017)

c. Uji steroid dan terpenoid

Sebanyak 2 ml larutan ekstrak, ditambahkan beberapa tetes pereaksi Lieberman-Bouchard. Uji positif steroid menghasilkan warna hijau atau biru dan terpenoid menghasilkan warna merah atau violet (Susanti et al., 2015).

d. Uji Saponin

Sebanyak 1 gram ekstrak ditambah dengan 10 ml air panas dimasukkan kedalam tabung reaksi dan didinginkan. Kemudian dikocok secara vertikal selama 10 detik lalu didiamkan. Apabila terbentuk buih atau busa maka disimpulkan bahwa larutan uji mengandung saponin. ;a;u ditambahkan HCl ketika busa yang terbentuk tidak hilang ketika ditambahkan HCl maka disimpulkan bahwa larutan uji mengandung saponin (Susanti et al., 2015).

e. Uji tanin dan polifenol

Sebanyak 2 ml larutan uji dimasukkan masing-masing dalam dua tabung reaksi. Tabung reaksi A berisi larutan uji sebagai kontrol negatif sedangkan tabung reaksi B berisi larutan uji dengan penambahan FeCl_3 10% sampel yang mengandung tanin dan polifenol ditandai dengan timbulnya warna hitam kehijauan atau biru tua (Susanti et al., 2015).

4. Uji Penghambatan Enzim Tirosinase

a. Pembuatan larutan Dapar Fosfat

Ditimbang sebanyak 2,7 g KH_2PO_4 dan dilarutkan dalam air suling sedikit demi sedikit hingga mencukupi volume 400 ml. Kemudian Ph larutan diukur dengan menggunakan pH meter. Ditimbang 5,6 KOH dan larutkan dalam 100 ml air suling. Larutan KOH ditambahkan kedalam larutan KH_2PO_4 hingga mencapai Ph 6,8. Larutan dapar disimpan dilemari pendingin (Rauf et al., 2020)

b. Pembuatan larutan L-Tirosin

Sebanyak 18,2 mg L-tirosin dimasukkan ke dalam labu tentu ukur 100 ml, ditambahkan dapar fosfat sedikit demi sedikit dan dihomogenkan. Volume dicukupkan hingga 100 ml (Rauf et al., 2020).

c. Pembuatan enzim Tirosinase

Sebanyak 1 mg enzim tirosinase di masukkan kedalam labu tentu ukur 100 ml dilarutkan dalam 10 ml larutan dapar fosfat yang telah di dinginkan. Larutan enzim tirosinase di letakkan pada wadah yang berisi es agar suhu enzim tetap stabil pada suhu dingin pada saat pengerjaan (Rauf et al., 2020)

d. Pembuatan Larutan Sampel

Ekstrak Lempuyang Gajah ditimbang sebanyak 30 mg kemudian dilarutkan dengan DMSO sebanyak 50 μl , dihomogenkan lalu tambahkan dapar fosfat sampai

1000 μ l sehingga didapatkan stok 1000 ppm. Larutan stok kemudian di encerkan sesuai konsentrasi yang di inginkan.

e. Pembuatan larutan kontrol positif asam kojat

Sebanyak 5 mg asam kojat dimasukkan kedalam tabung endorf dan dilarutkan dalam dapar fosfat 5 ml. Lalu larutan asam kojat di encerkan hingga memperoleh konsentrasi yang sama dengan larutan uji (Rauf et al., 2020).

f. Pembuatan Seri Konsentrasi

Larutan sampel yang telah dibuat dengan kosentrasi 1000 ppm diencerkan sebanyak 1 ml dengan konsentrasi 20 ppm dengan menambahkan larutan sampel 20 μ l dan dapar fosfat 980 μ l, 40 ppm menambahkan larutan sampel 40 μ l dan dapar fosfat 960 μ l, 60 ppm menambahkan 60 μ l dan dapar fosfat 940 μ l, 80 ppm menambahkan 80 μ l dan dapar fosfat 920 μ l, 100 ppm menambahkan 100 μ l larutan sampel dan dapar fosfat 900 μ l.

g. Penentuan Inhibitor tirosinase

Uji penghambatan aktifitas enzim tirosinase berdasarkan dengan metode modifikasi. Sebanyak 125 μ l L-Tirosin 1 mM, 80 μ l larutan dapar fosfat 50 mM (Ph 6,8), 20 μ l larutan enzim tirosinase dan 25 μ l larutan sampel dimasukkan ke dalam sumuran pada microplate. Campuran tersebut di inkubasi selama 30 menit pada suhu kamar, kemudian diukur serapannya menggunakan microplate reader (ELISA) pada panjang gelombang 450 nm. Dilakukan pengujian blanko tanpa penambahan enzim yaitu digunakan 170 μ l larutan dapar fosfat pH 6,8, 50 μ l L-tirosin 1 mM. Kontrol negatif menggunakan campuran tersebut diatas tanpa penambahan sampel dan untuk kontrol positif menggunakan asam kojat sebagai penganti sampel (Rauf et al., 2020).

Adapun penentuan presentase penghambatan aktivitas enzim tirosinase berdasarkan rumus:

$$\% \text{ Penghambatan Tirosinase} = \frac{A - B}{A} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Absorbansi sampel tanpa penambahan inhibitor.

B = Absorbansi dengan penambahan inhibitor.

IC50 dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linear, log konsentrasi sampel sebagai sumbu x dan persen inhibisi sebagai sumbu y, dari persamaan $y = bx \pm a$ dapat dihitung dengan IC50 dengan rumus

$$y = ax + b$$

$$x = (50 - a) : b$$

Keterangan : a = slope

b = intersep

Nilai IC50 dibawah 100 $\mu\text{g/mL}$ menunjukkan potensi penghambatan aktivitas tirosinase yang paling kuat, nilai IC50 100-450 $\mu\text{g/mL}$ menunjukkan potensi penghambatan yang kurang kuat, sedangkan nilai IC50 450-700 $\mu\text{g/mL}$ menunjukkan potensi penghambatan aktivitas inhibitor tirosinase sangat lemah (Asri et al., 2016).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Identifikasi Golongan Kimia

Ekstrak kental metanol Lempuyang Gajah dan Partisi N-Heksan yang diperoleh kemudian di uji golongan senyawa kimianya untuk mengetahui kandungan yang ada didalam Lempuyang Gajah. Pada pengujian identifikasi senyawa kimia ini meliputi lima golongan senyawa diantaranya Flavanoid, Terpenoid, Saponin, dan Tanin.

Tabel 1. Hasil identifikasi golongan senyawa Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

Uji	Pereaksi	Warna		Keterangan
		Pustaka	Hasil	
Flavanoid	HCL Pekat Magnesium	Merah atau kuning	N-Heksan berubah warna kuning, Metanol kuning pekat	N-Heksan (+) Metanol (+)
	NaOH 10%	Kuning	N-Heksan berubah warna kuning, Metanol kuning pekat	N-Heksan (+) Metanol (+)
Terpenoid / Steroid	H ₂ SO ₄	Hijau atau biru	Tidak ada perubahan pada N- Heksan Sedangkan pada Mtanol mengalami perubahan warna hijau	N-Heksan (-) Metanol (+)
Saponin	HCl	Terbentuk busa atau buih	Tidak ada buih atau busa	N-Heksan (-) Metanol (-)

Tanin	FeCl ₃	Biru tua atau hitam	Tidak ada perubahan	N-Heksan (-) Metanol (+)
-------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------

Keterangan: (+) Positif mengandung senyawa tertentu

(-) Tidak mengandung senyawa tertentu

2. Hasil persen aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak metanol dan partisi N-Heksan Lempuyang Gajah

Ekstrak metanol dan partisi N-heksan Lempuyang Gajah yang diujikan terhadap enzim tirosinase untuk mengetahui berapa persen daya inhibitor dari beberapa konsentrasi yang dibuat.

Tabel 2. Hasil persen inhibitor ekstrak metanol dan partisi N-Heksan Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*) dan kontrol positif.

Sampel	Konsentrasi	Persen (%) Inhibisi
Ekstrak metanol Lempuyang Gajah (<i>Zingiber zerumbet L.</i>)	20 ppm	15
	40 ppm	16
	60 ppm	17
	80 ppm	18
	100 ppm	20
Ekstrak fraksi N-Heksan Lempuyang Gajah (<i>Zingiber zerumbet L.</i>)	20 ppm	15
	40 ppm	17
	60 ppm	18
	80 ppm	21
	100 ppm	21,4
Kontrol Positif Asam Kojat	20 ppm	16,8
	40 ppm	17,2
	60 ppm	20,7
	80 ppm	23,5
	100 ppm	24,2

3. Hasil Nilai IC₅₀ Ekstrak metanol dan partisi n-heksan Lempuyang Gajah

Setelah di dapat konsentrasi terbaik kemudian dibuat grafik dan dihitung nilai IC₅₀ ekstrak tersebut. Nilai IC₅₀ menunjukkan kemampuan ekstrak dalam menghambat 50% aktivitas tirosinase.

Tabel 3. Hasil nilai IC50 Ekstrak metanol dan Partisi N-Heksan Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*)

Sampel	Nilai IC50 ($\mu\text{g/mL}$)
Esktrak metanol Lempuyang Gajah	609,3 $\mu\text{g/MI}$
Esktrak Fraksii N-Heksan	452,3 $\mu\text{g/MI}$
Asam Kojat	341,7 $\mu\text{g/mL}$

B. Pembahasan

Kulit adalah bagian tubuh manusia terluar yang memiliki peran sebagai proteksi tubuh. Kulit yang terkena paparan sinar UV secara terus menerus akan mengakibatkan hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi merupakan gangguan pada kulit yang disebabkan melanin yang diproduksi oleh tubuh meningkat dan melanin yang didistribusikan tidak merata, hal inilah yang menyebabkan kulit terlihat gelap (Aprilliani, 2018).

Keberadaan melanin sangat mempengaruhi warna kulit, dimana warna kulit sangat dipengaruhi oleh enzim tirosinase. Enzim ini dapat mengkatalis dua reaksi biosintesis melanin yaitu O-hidroksilasi dari asam amino L-tirosin menjadi L-3,4-dihidroksifenilalanin dan oksidasi subsukuen dari L-dopa menjadi dopakuinon, senyawa dopakuinon mempunyai kereaktifan yang sangat tinggi sehingga dapat mengalami polimerasi secara spontan membentuk dopakrom yang kemudian menjadi melanin. Salah satu yang dapat menghambat aktifitas tirosinase adalah senyawa polifenol yang merupakan bagian dari flavanoid (Kurniasari et al., 2018).

Inhibitor tirosinase adalah senyawa-senyawa yang dapat mengganggu aktivitas tirosinase, yaitu enzim yang berperan dalam proses melanogenesis. Penggunaan senyawa ini dalam bidang farmasi dimanfaatkan sebagai agen pencerah kulit dalam kosmetik. Penggunaan senyawa sintetik diketahui memiliki banyak efek samping yang dapat merugikan pengguna (Puraningsih et al., 2020).

Pada pengujian ini, sampel rimpang lempuyang gajah diekstraksi dengan metode maserasi. Digunakan metode maserasi karena metode ini terbilang mudah

dan efektif. Simplisia yang telah di haluskan dimasukkan kedalam bejana maserasi kemudian ditambahkan cairan penyari metanol hingga simplisa terendam. Proses perendaman dilakukan selama 3 x 24 jam sambil sesekali diaduk. Sampel kemudian disaring dan dipisahkan ampasnya. Hasil maserasi di pekatkan dengan cara di angin-anginkan atau menggunakan *vacum rotary evaporato* dan diperoleh ekstrak kental.

Pada pengujian ini juga dilakukan dengan cara partisi dimana ekstrak kental metanol ditimbang sebanyak 20 gram lalu ditambahkan n-heksan sebanyak 200 ml, setelah itu dikocok atau dihomogenkan setelah itu didiamkan sampai terbentuk pemisahan antara ekstrak metanol dan n-heksan.

Berdasarkan uji identifikasi golongan senyawa pada ekstrak metanol lempuyang gajah (+) mengandung flavanoid dilihat dari hasil pengujian yang mengalami perubahan warna setelah ditetesi pereaksi HCL pekat dan magnesium. Pada pengujian selanjutnya lempuyang gajah (+) tmengandung terpenoid karena dilihat dari hasil uji yang dilakukan mengalami perubahan warna hijau setelah ditetesi pereaksi H_2SO_4 . Pada pengujian selanjurnya lempuyang gajah (-) tidak mengandung saponin dimana terlihat dari hasil uji tidak terdapat buih atau busa. Pada pengujian selanjutnya lempuyang gajah (+) mengandung tanin karena dilihat dari hasil uji terjadi perubahan warna hitam setelah ditambahkan pereaksi $FeCl_3$.

Pada pengujian identifikasi senyawa dengan partisi n-heksan lempuyang gajah (+) mengandung flavanoid karena diliat dari hasil uji ada perubahan warna setelah ditambahkan pereaksi. Pada pengujian terpenoid (-) mengandung terpenoid karena tidak adanya oerubahan warna setelah ditambahkan pereaksi. Pad pengujian selanjutnya lempuyang gajah (-) tidak mengandung saponin karena setelah dikocok tidak terdapat buih atau busa. Pada pengujian selanjutnya (-) tidak mengandung tanin karena tidak ada perubahan warna setelah ditambahkan pereaksi.

Pada pengujian inhibitor tirosinase terhadap sampel Lempuyang Gajah menggunakan alat *microplate rider* (ELISA) metode ini dipilih karena relatif sederhana, ekonomis, memiliki sensitivitas yang cukup tinggi dan menggunakan jumlah sampel yang sedikit. Penelitian ini menggunakan enzim tirosinase yang disintesis dari jamur dan L-Tirosin sebagai substratnya, sebagai kontrol positifnya digunakan asam kojat. Hal ini dikarenakan asam kojat memiliki tingkat kestabilan yang tinggi. Penggunaan asam kojat sebagai kontrol positif sangat disarankan sebagai pembanding kekuatan penghambatan tirosinase yang baik dengan bahan baru yang ditemukan ataupun dengan kekuatan penambahan bahan lain (Kurniasari et al., 2018).

Prinsip pengukuran yaitu enzim tirosinase akan mengkatalis pembentukan L-Tirosin menjadi L-DOPA kemudian terbentuk dopakrom yang dapat terukur intensitasnya pada panjang gelombang 450 nm. Dopakrom yang terbentuk akan terlihat dengan adanya warna merah muda. Penambahan sampel untuk menghambat aktivitas enzim tirosinase sehingga jumlah dopakrom yang terbentuk semakin berkurang. Serapan yang diperoleh (absorbansi) digunakan untuk mengetahui seberapa besar aktivitas ekstrak dalam menghambat reaksi tirosin-tirosinase. Penghambatan aktivitas enzim tirosinase ditunjukkan dengan nilai IC50 yang merupakan nilai konsentrasi inhibitor tirosinase yang dapat menghambat 50% aktivitas tirosinase.

Mekanisme kerja *microplate reader* (ELISA) yaitu plat mikrotiter dilapisi dengan antigen kemudian memblokir semua situs yang tidak terikat untuk mencegah hasil positif palsu kemudian menambahkan antibodi primer dan antibodi sekunder yang terkonjugasi ke enzim. Setelah itu reaksi substrat dan enzim digunakan untuk menghasilkan produk berwarna sehingga menunjukkan reaksi positif.

Hasil uji aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak metanol lempuyang gajah terhadap daya inhibitor dari beberapa konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, 100 ppm berturut-turut yaitu 15%, 16%, 17%, 18%, dan 20%. Adapun hasil inhibitor tirosinase fraksi n-heksan lempuyang gajah dengan konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm berturut-turut adalah 15%, 17%, 18%, 21%, 21,4%. Adapun hasil inhibitor dari kontrol positif asam kojat dengan konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, 100 ppm berturut-turut 16,8%, 17,2%, 20,7%, 23,5%, 24,2%. Hasil ini diperoleh dari perhitungan nilai absorbansi yang dilakukan secara triplo untuk setiap konsentrasi. Adapun hasil yang diperoleh dalam bentuk presentase bertujuan untuk mengetahui skala perbandingan aktivitas inhibitor enzim pada setiap konsentrasi sampel.

Pengujian Asam Kojat sebagai kontrol positif dilakukan dengan memastikan bahwa metode yang dipakai adalah benar dengan cara membandingkan nilai IC₅₀ yang didapatkan. Hasil dari uji aktivitas inhibitor tirosinase menunjukkan nilai konsentrasi yang didapatkan pada ekstrak metanol yaitu 609,3 µg/mL, fraksi N-Heksan aktivitas enzim tirosinase (IC₅₀) yaitu 452,3 µg/mL, asam kojat sebagai kontrol positif yaitu menunjukkan nilai IC₅₀ sebesar 341,7 µg/mL. Jadi, dari hasil penelitian ini aktivitas dari ekstrak metanol dan fraksi N-Heksan lempuyang gajah memiliki aktivitas yang lemah karena nilai IC₅₀ yang berada di atas 100 µg/mL memiliki aktivitas yang lemah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak Metanol dan fraksi N-Heksan memiliki aktivitas sebagai inhibitor tirosinase.
2. Ekstrak metanol Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*) memiliki rata-rata persen inhibitor pada konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, 100 ppm berturut-turut adalah 15%, 16%, 17%, 18%, 20% dan fraksi N-Heksan memiliki persen inhibitor berturut-turut adalah 15%, 17%, 18%, 21%, 21,4%.
3. Ekstrak metanol Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*) memiliki nilai IC50 609,3 $\mu\text{g/mL}$, partisi N-Heksan memiliki nilai IC50 452,3 $\mu\text{g/mL}$, sedangkan asam kojat sebagai kontrol positif sebesar 341,7 $\mu\text{g/mL}$.


B. Saran

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga dapat memformulasikan sediaan krim pencerah kulit dari bahan alami.

DAFTAR PUSTAKA


- Ahmad, N. (2018). *Ekstraksi Senyawa Bahan Alam*. Deepublish.
- Aprilliani, A. (2018). Uji inhibisi aktivitas enzim tirosinase beberapa jenis tumbuhan anggota suku Zingiberaceae. *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 14(1), 46–57. <https://doi.org/10.20885/jif.vol14.iss1.art05>
- Asri, W., Rohdiana, D., & Ekatama, N. (2016). *Aktivitas Antioksidan Ekstrak Teh putih (Camelia sinensis) dengan Metode DPPH*. 1(1), 1–9.
- Chang. (2009). Identifying 6,7,4-Thrihydroxyisoflavone as a potent tyrosinase Inhibitor. *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry*.
- Dr. Lianah, M. P. (2019). *Biodiversitas Zingiberaceae Mijen Kota Semarang*. Deepublish.
- Fatmawati, F., Jafar, G., & Riantini, R. (2020). Pengujian Penghambatan Enzim Tirosinase Pada Formulasi Masker Pencerah Wajah Dari Kombinasi Kefir Susu Sapi Dan Rumput Laut *Analit: Analytical and ...*, 5(01), 42–52. <http://jurnal.fmipa.unila.ac.id/analit/article/view/2545>
- Gazali, M., P. Zamani, N., & Batubara, I. (2014). Potensi limbah kulit buah Nyirih *Xylocarpus granatum* sebagai inhibitor tirosinase. *Depik*, 3(3), 187–194. <https://doi.org/10.13170/depik.3.3.2153>
- Handayani, S., Mursiti, S., & Wijayati, N. (2018). *Indonesian Journal of Chemical Science Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa Flavonoid dari Rimpang Temu Kunci (Kaempferia pandurata Roxb .) terhadap Streptococcus mutans*. 7(2), 1–7.
- Hariana, D. H. A. (2008). *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya (Seri 2)*. Penebar Swadaya.
- Hindririani, R., Kurnia, D., Setiawan, Sujatno, M., & Sutedja, E. (2011). Penurunan Sintesis Melanin oleh Ekstrak Metanol Buah *Phyllanthus Emblica* pada Mouse melanoma B16 Cell Line. *Artikel Asli, Volume 38*.
- Ilmiati, I., Safitri, W., & Erfiana. (2017). Uji Fitokimia Ekstrak Buah Dengan. *Dinamika*, 08(1), 66–84.
- Kurniasari, A., Anwar, E., & Djajadisastra, J. (2018). Potensi Ekstrak Biji Coklat (*Theobroma cacao* Linn) sebagai Inhibitor Tirosinase untuk Produk Pencerah Kulit. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 8(1), 34–43. <https://doi.org/10.22435/jki.v8i1.7722.34-43>
- Mawaddah, M., & Susilawati, Y. (2018). Potensi tumbuhan sebagai whitening agent. *Farmaka*, 16(2), 598–605.
- Nuari, Syarifullah, A. (2017). Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid Ekstrak Etanol Buah Naga. *Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy)*, 2(2), 118–125. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2017.v3.i2.118>
- Pratama, L. N., & Susilawati, Y. (2018). Review Artikel: Herbal Potensial sebagai Anti Hiperpigmentasi. *Farmaka, Suplemen V*.
- Puraningsih, H., Susilawati, Y., & Chaerunnisa, A. Y. (202 C.E.). *Review Jurnal: Sistem Penghantaran Obat Fitosom untuk Senyawa Inhibitor Tyrosinase*. 1, 34–49.
- Rauf, A., Ningsi, S., Hasriani, A., & Mukhriani, M. (2020). Ativitas Penghambatan

- Enzim Tirosinase Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.). *Jurnal Kesehatan*, 1(1), 17–24. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v1i1.18220>
- Rina, M., Hindun, S., & Auliasari, N. (2020). Potensi Tanaman Sebagai Pencerah Wajah Alami. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 2(4), 558–562.
- Sagala, Z., Pratiwi, R. W., Azmi, N. U., & Maap. (2019). Uji Aktivitas Inhibisi terhadap Enzim Tirosinase dari Ekstrak Etanol Daun Pepaya (*Carica papaya* L.) Secara In Vitro. *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia*, 7(2), 34–38.
- Sanjewa, K., Kim, E., Son, K., & YJ, J. (2016). Bioactive Properties and Potentials Cosmeceutical Application of Phlorotannins Isolated from Brown Seaweeds. *Journal of Photochemistry and Photobiology*, 100–105.
- Saputra, T. R., Ngatin, A., & Sarungu, Y. T. (2018). *Penggunaan metode ekstraksi maserasi dan partisi pada tumbuhan cocor bebek (kalanchoe pinnata) dengan kepolaran berbeda*. 3(1), 5–8.
- Silalahi, M. (2018). *Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (Zingiber zerumbet (L.) Smith.)*. 2(2), 147–160.
- Sudjadj, B., & Laila, S. (2007). *Biologi: Sains dalam Kehidupan* (A. F. Hasan & E. R. Amalia (eds.); Edisi ke 2). Yudisthira.
- Suroto Hadi Saputra, M. . (2020). *Mikroemulsi Ekstrak Bawang Tiwai* (P. D. B. Saragih (ed.)). Deepublish.
- Susanti, N. M. ., I.N.A, B., & WARDITIANI, N. . (2015). *SKRINING FITOKIMIA EKSTRAK ETANOL 90 % DAUN KATUK (Sauropus androgynus (L .) Merr .)*.
- Utami, N. F. (2020). *Potensi Antioksidan dari Biji Kopi Robusta 9 Daerah di Pulau Jawa* (M. Badar (ed.); Pertama). Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Pakuan.


Lampiran 1. Bagan alur penelitian

Lampiran 2. Identifikasi Senyawa


a. Uji Alkaloid




b. Uji Flavanoid




c. Uji Steroid dan Terpenoid



d. Uji Tanin dan Polifenol




e. Uji Saponin




Lampiran 3. Pembuatan Larutan Uji


a. Pembuatan larutan dapar posfat



b. Pembuatan larutan sampel



c. Pembuatan kontrol positif asam kojat



d. Pembuatan L-tirosin

Ditimbang 18,2 mg L-Tirosin dan dimasukkan kedalam labu tentu ukur 100 ml

Ditambah dapar posfat sedikit demi sedikit


Dicukupkan 100 ml dapar posfat

e. Pembuatan enzim

Ditimbang 1 mg enzim dan dimasukkan kedalam labu tentu ukur

Dicukupkan 10 ml

Diletakkan pada wadah yang berisi es batu

Lampiran 3. Uji Penghambatan enzim tirosinase

Tabel 5. Sampel ekstrak metanol (*Zingiber zerumbet L.*)

Konsentrasi	Absorbansi	Rata-rata Absorbansi	Persen (%) Inhibisi
20 ppm	0,1462	0,1494	15%
	0,1634		
	0,1386		
80 ppm	0,1382	0,1472	16%
	0,1699		
	0,1337		
60 ppm	0,1553	0,1461	17%
	0,1323		
	0,1509		
80 ppm	0,1636	0,1433	18%
	0,1283		
	0,1382		
100 ppm	0,1347	0,1409	20%
	0,1546		
	0,1336		

Tabel 6. Partisi N-Heksan Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*)

Konsentrasi	Absorbansi	Rata-rata Absorbansi	Persen (%) Inhibisi
20 ppm	0,1641	0,1494	15%
	0,1398		
	0,1445		
80 ppm	0,1588	0,1455	17%
	0,1337		
	0,1440		
60 ppm	0,1451	0,144	18%
	0,1371		
	0,1445		
80 ppm	0,1533	0,1388	21%
	0,1354		
	0,1277		
100 ppm	0,1581	0,1389	21,4%
	0,1334		
	0,1252		

Tabel 7. Kontrol positif Asam Kojat

Konsentrasi	Absorbansi	Rata-rata Absorbansi	Persen (%) Inhibisi
20 ppm	0,1572	0,1469	16,8%
	0,1258		
	0,1577		
80 ppm	0,1344	0,1462	17,2%
	0,1398		
	0,1646		
60 ppm	0,1442	0,1401	20,7%
	0,1300		
	0,1461		
80 ppm	0,1370	0,1351	23,5%
	0,1372		
	0,1312		
100 ppm	0,1322	0,1339	24,22%
	0,1328		
	0,1369		

Lampiran 4. Perhitungan

a. Perhitungan % Inhibitor Tirosinase

$$\% \text{ Inhibisi Tirosinase} = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

1. % Inhibisi ekstrak metanol

- 20 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,1494}{0,1767} \times 100\% \\ &= 15\% \end{aligned}$$

- 40 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,1472}{0,1767} \times 100\% \\ &= 16\% \end{aligned}$$

- 60 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,1461}{0,1767} \times 100\% \\ &= 17\% \end{aligned}$$

- 80 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,1433}{0,1767} \times 100\% \\ &= 18\% \end{aligned}$$

- 100 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,1409}{0,1767} \times 100\% \\ &= 20\% \end{aligned}$$

2. % Inhibisi Fraksi N-Heksan

- 20 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,1494}{0,1767} \times 100\% \\ &= 15\% \end{aligned}$$

- 40 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,1455}{0,1767} \times 100\% \\ &= 17\% \end{aligned}$$

- 60 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,144}{0,1767} \times 100\% \\ &= 18\% \end{aligned}$$

- 80 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,1388}{0,1767} \times 100\% \\ &= 21\% \end{aligned}$$

- 100 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,1389}{0,1767} \times 100\% \\ &= 21,4\% \end{aligned}$$

3. % Inhibisi Asam Kojat

- 20 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,1469}{0,1767} \times 100\% \\ &= 16,8\% \end{aligned}$$

- 40 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,1462}{0,1767} \times 100\% \\ &= 17,2\% \end{aligned}$$

- 60 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,1401}{0,1767} \times 100\% \\ &= 20,7\% \end{aligned}$$



- 80 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,1351}{0,1767} \times 100\% \\ &= 23,5\% \end{aligned}$$

- 100 ppm


$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi Tirosinase} &= \frac{0,1767-0,1339}{0,1767} \times 100\% \\ &= 24,22\% \end{aligned}$$

b. Kurva

Gambar kurva ekstrak metanol lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*)Gambar kurva partisi N-Heksan lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*)

M A K A S S A R

Gambar kurva kontrol positif asam kojat



c. Perhitungan IC50

1. Ekstrak Metanol

$$y = 0,0588x + 14,169$$

Dik:

$$y = 50$$

$$a = 14,169$$

$$b = 0,0588x$$

$$y = a + bx$$

$$X = \frac{y-a}{b}$$

$$X = \frac{50-14,169}{0,0588}$$

$$X = 609,3 \mu\text{g/ml}$$

2. Fraksi N-Heksan

$$y = 0,0788x + 14,358$$

Dik:

$$y = 50$$

$$a = 14,358$$

$$b = 0,0788x$$

$$y = a + bx$$

$$X = \frac{y-a}{b}$$

$$X = \frac{50-14,358}{0,0788}$$

$$X = 452,3 \mu\text{g/ml}$$

3. Asam Kojat

$$y = 0,1047x + 0,14,22$$

Dik:

$$y = 50$$

$$a = 0,14,22$$

$$b = 0,1047x$$

$$y = a + bx$$

$$X = \frac{y-a}{b}$$

$$X = \frac{50-0,14,11}{0,1047}$$

$$X = 341,7 \mu\text{g/ml}$$

Lampiran 5. Gambar

(a)



(b)



(c)




(d)



(e)



(f)



(g)



(h)

Keterangan:

- (a) Sampel Lempuyang Gajah
- (b) Penimbangan NaOH
- (c) Penimbangan KH_2PO_4
- (d) Penimbangan L-Tirosin
- (e) Penimbangan enzim
- (f) Well plat yang telah diberikan sampel
- (g) Sampel yang telah di inkubasi
- (h) Running

RIWAYAT HIDUP



A.Nurul Arizka akrab disapa Arizka, dilahirkan di Barru, 25 Mei 1999. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak A.sesunriu dan Rawali. Pendidikan dasar ditempuh di SDN No. 3 S.Binangae pada tahun 2005 dan menyelesaikan pada tahun 2011, kemudian pendidikan tingkat lanjut ditempuh di SMPN 1 Barru pada tahun 2011 dan menyelesaikan pada tahun 2014. Pendidikan tingkat menengah ditempuhnya di SMAN 1 Barru pada tahun 2014 dan menyelesaikan pada tahun 2017.

Dia mempunyai hobi membaca. Mottonya adalah mengapa orang lain bisa saya tidak.

Sekarang, penulis merupakan salah seorang Mahasiswi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar 2017. Itu merupakan suatu kesyukuran yang diberikan Allah SWT kepada penulis, semoga kesuksesan akan diraihinya kelak. Aamiin.