

**MANAJEMAN ASUHAN KEBIDANAN ANEMIA PADA WANITA
USIA REPRODUKSI PRAKONSEPSI
(*LITERATUR REVIEW*)
TAHUN 2021**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

CITRA AYU ZAHARANI
NIM. 70400117042

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CITRA AYU ZAHARANI
Nim : 70400117042
Tempat/tgl Lahir : Bantaeng, 02 Mei 2000
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Ahmad Yani Lumpangang, Bantaeng
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Anemia Pada Wanita Usia
Reproduksi Pra Konsepsi (Literatur Review)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang di peroleh batal demi hukum.

Samata, 9 september 2021

Peyusun,

CITRA AYU ZAHARANI
NIM:70400117042

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Citra Ayu Zaharani


Nim : 70400117042

Judul : Manajemen ~~Asuhan~~ Kebidanan Anemia Pada Wanita Usia Reproduksi
Pra Konsepsi (Literatur Review)

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah di setujui untuk di ajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Samata-Gowa, 28 September 2021

Pembimbing I



Ferawati Taherong, S.ST.M.Keb

Pembimbing II



dr. Dewi Setiawati, Sp.Og, M. Kes

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH


Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Anemia Pada Usia Reproduksi Prakonsepsi Tahun 2021 (Literatur Riview)**” yang disusun oleh **Citra Ayu Zaharani** Nim: 70400117042 Mahasiswi Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Selasa 28 September 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 28 September 2021
21 Safar 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Dewi Setiawati Sp.Og, M.Kes	(.....)
Penguji I	: Nurfaizah Alza, S,ST.M.Keb	(.....)
Penguji II	: Prof Dr. Kasjim Salenda, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan judul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Anemia Pada Wanita Reproduksi Prakonsepsi”**. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan hasil kerja Tugas akhir ini agar menjadi jauh lebih baik lagi.

Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tuaku yang tercinta, dan penyemangatku *Ibunda Hasnia Sunusi dan Ayahanda Zainuddin Rani*”, beliau-beliau juga yang tak pernah lelah dalam mendukung dan mendoakan penulis dengan penuh ikhlas sehingga Allah SWT. selalu memberikan keberkahan hidup untuk penulis dalam menuntut ilmu.

Dalam penyelesaian KTI ini penulis mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Makassar.

2. Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar
3. Ibunda Firdayanti, S.ST.,M.Keb selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan di Universitas Islam Negeri Makassar
4. Ibunda Anieq Mumthi"ah Alkautsar, S.ST.,M.Keb selaku sekertaris Prodi Kebidanan di Universitas Islam Negeri Makassar.
5. Ibunda Ferawati Taherong S.ST.M.Keb selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Literatur Review).
6. Ibunda dr. Dewi Setiawati, Sp.OG,M.Kes selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Literatur Review).
7. Ibunda Nurfaizah Alza,S.ST.M.Keb Selaku penguji I yang telah melauangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Literatur Review).
8. Prof Dr. Kasjim Salenda M.Ag selaku penguji Agama yang senantiasa memberikan saya tambahan ilmu agama serta memberikan masukan dan saran yang bersifat Islamiah pada Karya Tulis Ilmiah sehingga

penulis dapat mengetahui hubungan kasus yang penulis angkat dan kaitannya dengan islam.

9. Segenap dosen terkhususnya para dosen Prodi Kebidanan dan para staf akademik Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing penulis selama dalam penyusunan proposal ini berlangsung.
10. Kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan nasehat, dan masukan untuk kebaikan penulis sendiri. Terima kasih untuk selalu menjadi alasan penulis untuk tetap berpendidikan.
11. Kepada ibu kedua saya Alm St. Nur Wahyuni yang juga ibu dari sahabat saya Arfiah, ibu selalu mendoakan dan meberikan support untuk bisa menyelesaikan tugas Karya tulis ilmiah ini, sehingga membuat penulis menjadi semangat.
12. Kepada sahabat-sahabat saya dikampus Arfia, Putri, Niswa dan Tika dan saudari-saudari seperjuangan Aviditas Kebidanan 2017 yang selalu membuat bangku perkuliahan lebih terasa berwarna.
13. Kepada sahabat SMA saya yang selalu mewarnai hari-hari saya, yang selalu menghibur dan menyempatkan waktu untuk bertemu disela-sela kesibukannya masing-masing.
14. Saya juga berterimah kasih pada para member EXO, Kim Min Seok, Kim Joon Myeon, Zhang Yixing, Byun Baek Byun, Kim Jong Dae, Park Chan Yeol, Do Kyung Soo, Kim Jong In, Oh Se Hun, Yang telah menemani

hari- hari saya selama saya mengerjakan Karya Tulis Ilmiah ini dengan memalui lagu – lagunya dan videonya yang menghibur saya.

15. Semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Amiin.

Samata-Gowa, September 2021

Penulis,

CITRA AYU ZAHARANI
NIM:70400117042



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat penulisan.....	7
E. Metode Penulisan.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Remaja	12
B. Tinjauan Khusus Tentang Prakonsepsi	16
C. Tinjauan Umum Tentang Anemia	32
D. Tinjauan Khusus Tentang Anemia Remaja	41
E. Tinjauan Pra Konsepsi Dengan Anemia Dalam Pandangan Islam..	46
F. Proses Manajemen Kebidanan.....	55

BAB III TELUSURAN <i>EVIDANCE BASED LEARNING</i>	65
A. Matriks Langkah I	65
B. Matriks Langkah II.....	78
C. Matriks Langkah III.....	90
D. Matriks Langkah IV.....	101
E. Matriks langkah V	108
F. Matriks Langkah VI	117
G. Matriks Langkakah VII	126
BAB IV PEMBAHASAN.....	136
A. Pembahasan Hasil telaah <i>Evidance Based</i> Asuhan 7 langkah Varney berdasarkan Hasil penelusuran Referensi	136
B. Implikasi Kebidanan	152
BAB V PENUTUP.....	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	157
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	163

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
LITERATUR REVIEW, AGUSTUS 2021

Nama : Citra Ayu Zaharani
NIM : 70400117042
Pembimbing 1 : Ferawati Taherong
Pembimbing 2 : Dewi Setianawaty
Judul : **Manajemen Asuhan Kebidanan Anemia Pada Wanita Usia Reproduksi Prakonsepsi (Literatur Review)**

Anemia merupakan kondisi berkurangnya sel darah merah (eritrosit) dalam sirkulasi darah atau massa haemoglobin (Hb) sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen ke seluruh jaringan. Wanita pra konsepsi dengan anemia cenderung ditemukan pada wanita dengan usia >17-21 tahun dan usia > 35 tahun, tingkat pendidikan rendah, tidak memiliki pekerjaan, dan memiliki keluhan anemia. Usiadiatas 35 tahun adalah usia risiko tinggi bila mengalami kehamilan sehingga sangat diperlukan upaya deteksi dini anemia untuk calon ibu hamil khususnya pada kelompok risiko tinggi

Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan manajemen asuhan kebidanan pada masa pra konsepsi dengan anemia dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah menurut Helen Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Berdasarkan dari referensi bahwa tindakan yang dilakukan untuk penatalaksanaan masa pra konsepsi dengan anemia yaitu pemeriksaan Tanda-tanda vital dan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar HB ibu serta melakukan konseling tentang pemberian kandungan zat besi dan vitamin, serta memberikan dukungan spiritual kepada ibu agar proses penyembuhan dapat berjalan dengan baik serta mengajurkan ibu untuk rutin melakukan pemeriksaan.

Kesimpulan dari literatur review didapatkan yaitu didapatkannya keadaan wanita pra konsepsi dengan anemia. Jika dilakukan penatalaksanaan yang tepat dan sesuai dengan keadaan masa pra konsepsi dengan anemia maka akan didapatkan hasil evaluasi dengan keadaan ibu baik tanpa ada penyulit dan tidak ditemukannya komplikasi atau masalah pada ibu.

Kata kunci : Pra Konsepsi, Anemia 7 langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
LITERATURE REVIEW, AUGUST 2021

Name : Citra Ayu Zaharani
Reg. Number : 70400117042
Supervisor 1 : Ferawati Taherong
Supervisor 2 : Dewi Setianawaty
Title : Midwifery Care Management on Women of Reproductive Age with Anaemia (A Literature Review)

Anaemia is a condition in which the number of red blood cells or the haemoglobin concentration within them is lower than normal. Haemoglobin is needed to carry oxygen to all tissues of the body. Pre-conception women with anaemia tend to be found in women with age > 17-21 years and age > 35 years. Besides, anaemia is also found in women with low educational level, no professions, and anaemia complaints. In particular, women with the age of above 35 years old have been considered to be at risk if they get pregnant. Therefore, it is very necessary for an early detection of anaemia, especially for the high-risk group.

This literature review research aims to carry out research and obtain material resources related to midwifery care management on women of reproductive age with anaemia. This study was conducted by utilising a 7-stage Varney midwifery care management approach and SOAP documentation procedure.

The findings of this research indicated that the treatments given to pre-conception women with anaemia were in the forms of vital sign examination, laboratory examination on HB levels, regular counseling related to balance diet, and spiritual support given to mothers. With these treatments, the process of treatment is considered to be faster. Therefore, pre-conception women are expected to conduct routine medical check up to understand their health condition and get decent treatments.

This research concludes that women with anaemia should be treated based on the health standard. If proper treatments are carried out and in accordance with the conditions of women, the patients are predicted to recover without any further complications

Key words: Pre-conception, Anaemia, 7-stage of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa prakonsepsi adalah masa sebelum hamil, wanita pra-kelahiran dianggap sebagai wanita dewasa atau wanita usia subur yang dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu, di mana persyaratan sehat saat ini tidak sama dengan persyaratan sehat. anak-anak, orang muda, atau orang tua (Muh. Nur Qalbi dkk, 2014).

Prakonsepsi terdiri dari dua kata, khususnya pra dan Konsepsi. Pra berarti sebelumnya dan konsepsi berarti berkumpulnya sel telur dan sel sperma sehingga terjadi persiapan. Dalam arti sebenarnya asumsi adalah periode sebelum persiapan terjadi, khususnya pertemuan sel sperma dengan sel telur. Periode inklinasi yang telah ditetapkan sebelumnya berlangsung dari 90 hari hingga satu tahun sebelum konsepsi, namun sebaiknya mencakup saat ovum dan sperma berkembang, misalnya 100 hari sebelum originasi (Susilowati, et al 2016).

Pembuahan adalah awal kehamilan, di mana satu sel telur disiapkan oleh satu sperma. Telur atau ovum manusia dikeluarkan oleh (indung telur) sejak jam menetas. Sel konsumsi telur (sel stadium awal) mulai terbentuk dengan mengisolasi pada 90 hari inkubasi. Pembelahan berhenti pada tahap yang terus turun sampai pubertas dan menjadi indah ketika telur diperlakukan (Khumaira, 2012), Masa remaja merupakan masa terjadinya perubahan yang berlangsung cepat dalam hal pertumbuhan fisik. Kongnitif, dan psikologi. Masa ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju remaja yang di tandai dengan banyak

perubahan hormone. Perubahan tersebut mempengaruhi kebutuhan gizi. Masa remaja di bagi berdasarkan kondisi perkembangan fisik, psikologi, dan sosial. World Health Organization (WHO) / United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) membaginya menjadi tiga fasi \, yaitu : 1. Remaja Awal (10-14 tahun), 2. Remaja pertengahan (14-17 tahun), 3. Remaja akhir (17-21 tahun) (Susetyowati, 2016).

Anemia adalah masalah kesehatan umum terbesar di dunia, terutama di berbagai kelompok wanita usia reproduksi. Anemia Gizi adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin, hematokrit dan trombosit merah lebih rendah dari nilai normal, karena ketidak cukupan satu atau beberapa komponen makanan dasar yang dapat mempengaruhi awal ketidak cukupan tersebut (Arisman, 2010).

Anemia merupakan masalah kesehatan yang banyak dijumpai di berbagai negara, dan masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Wanita muda memiliki resiko yang lebih tinggi menderita anemia dibandingkan dengan laki – laki muda karena wanita sering mengalami perdarahan menstruasi yang teratur (Ayuningtyas dian, 2017).

Anemia Defisiensi besi adalah Anemia yang timbul akibat berkurangnya peyediaan besi untuk eritropoesis, karena cadangan besi kosong (depeled iron store) yang pada akhirnya mengakibatkan pembentukan hemoglobin berkurang.

Anemia defisiensi bisa di tandai oleh anemia hipokromik mikrositer dan hasil laboratorium menunjukkan cadangan besi kosong. Hal ini di sebabkan tubuh manusia mempunyai kemampuan batas untuk menyerap besi dan seringkali tubuh mengalami kehilangan besi yang berlebihan yang di akibatkan pendarahan.

Data Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO) menargetkan penurunan prevalensi anemia pada WUS sebesar 50% pada tahun 2025. Pada usia 15- 49 tahun, wanita dianggap berada pada kurun waktu masa reproduksi, dimana wanita yang berstatus kawin pada usia tersebut dianjurkan untuk mengatur dan merencanakan kehamilannya untuk mencegah masalah-masalah yang dapat timbul.

Di Afrika dan Asia, anemia di perkirakan berkontribusi lebih dari 115000 kematian ibu dan 591000 kematian perinatal secara global pertahun dimana Prevalensi anemia diperkirakan 9% di Negara-negara maju. Negara berkembang prevalensinya 43%. Anak-anak dan wanita usia subur (WUS) adalah kelompok yang paling beresiko, dengan perkiraan prevalensi anemia pada balita sebesar 47%, pada wanita hamil sebesar 42%. Dan pada wanita yang tidak hamil usia 15-49 tahun sebesar 30% (Sandjaja Sudikno,2016).

Kementrian Kesehatan RI (2010) mendefinisikan bahwa wanita usia subur (WUS) adalah wanita yang berada dalam priode umur antara 15-49 tahun. Wanita pranikah merupakan bagian dari kelompok WUS perlu mempersiapkan kecukupan gizi tubuhnya, karena sebagai calon ibu, gizi yang optimal pada wanita pranikah akan mempengaruhi tumbuh kembang janin, kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan dan keselamatan selama proses melahirkan (Paratmanitya dkk.2012).

Wanita Usia Subur (WUS) Merupakan salah satu kelompok yang rawan menderita anemia gizi. Program penanggulangan anemia gizi telah dikembangkan yaitu dimulai dari remaja, putri tingkat sekolah,SMP,SMA, dan sederajat, serta

wanita di luar sekolah yang termasuk dalam kategori WUS. Penanggulangan anemia ini dilakukan sebagai upaya strategi dalam memutus simpul siklus masalah gizi yang prevalensinya di kalangan WUS masih tergolong dalam kategori tinggi yaitu pada remaja wanita 26,50%, pada WUS 26,9%. Permasalahan ini mengindikasikan anemia/ hemoglobin rendah masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia (Depkes RI, 2015).

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan (Riskesdes) tahun 2013, prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia dilaporkan sebesar 37,1%. Upaya pencegahan melalui program pemberian tablet Fe pada seluruh ibu hamil pada masa kehamilan belum memenuhi harapan, diaman cakupan pemberian tablet besi di Indonesia pada tahun 2012 hanya sebesar 85%. Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan cakupan pemberian tablet tabah darah pada wanita hamil tahun 2011 yaitu sebesar 83,3%.

Laporan Riskesdes tahun 2013 prevalensi statis gizi remaja umur 13-15 tahun di Indonesia adalah sangat kurus (11,1%) terdiri dari (3,3%) sangat kurus dan (7,8%) kurus. Prevalensi gemuk pada remaja umur 13-15 tahun di Indonesia sebesar (10,8%) terdiri dari (8,3%) gemuk dan (2,5%) sangat gemuk (obesitas) (Kemenkes RI, 2013).

Kelompok Wanita Usia Subur (WUS) merupakan masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia terutama anemia pada WUS yang dapat menimbulkan kelelahan, badan lemah, penurunan kapasitas atau kemampuan dan produktifitas kerja. Anemia juga menyebabkan rendahnya kemampuan

jasmanai oleh sel-sel tubuh tidak cukup mendapat pasokan oksigen (Muh.Nur Qalbi dkk,2014).

Hasil Riskedes tahun 2013 menunjukkan presentase anemia pada WUS umur 15-44 tahun sebesar 35,5%. Kondisi anemia dapat meningkatkan resiko kematian ibu pada saat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, janin dan ibu mudah terkena infeksi, keguguran, dan meningkatkan resiko bayi lahir prematur.

Distribusi wanita prakonsepsi berdasarkan asupan zat besi (Fe) di kota Makassar tahun 2013, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki asupan zat besi (Fe) kurang yaitu sebesar 98,4% dan hanya 1.6% responden yang memiliki asupan zat besi (Fe) cukup (Juslina, Thaha, & Virani, 2013).

Pada wanita pra konsepsi yang mengalami anemia diberikan tablet penambah darah sebanyak 10 biji yang dianjurkan untuk dikonsumsi 1 tablet perhari. Dan apabila kondisi berlanjut mereka disarankan untuk mendatangkan layanan kesehatan seperti puskesmas ataupun dokter praktek swasta (L.S.Ani dkk, 2018).

Menurut Agragawal S, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anemia pada populasi melibatkan interaksi kompleks dari faktor-faktor sosial, politik, ekologi, dan biologi. Sedangkan penyebab utama anemia adalah gizi dan infeksi (Sandjaja Sudikno,2016).

Berdasarkan data yang diperoleh di Puskesmas Jongaya dari tahun 2017 terdapat 30 orang wanita usia subur (WUS) yang mengalami Anemia, sedangkan

pada periode 2018 sebanyak 15 orang wanita usia subur yang anemia dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 35 orang wanita usia subur yang mengalami anemia.

Berdasarkan uraian data diatas, dapat kita ketahui bahwa anemia pada Wanita Usia Subur masih tinggi di Indonesia utamanya di Kota Makassar diwilayah kerja Puskesmas Jongaya. Sehingga memerlukan pencegahan dan penanganan sesegera mungkin agar tidak menimbulkan peningkatan anemia pada wanita usia subur, yang berbahaya bagi wanita usia subur. Berdasarkan data di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Manajemen Asuhan Kebidanan Anemia pada Wanita usia reproduksi dalam masa prakonsepsi di Puskesmas Jongaya Makassar.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun ruang lingkup dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah penerapan Manajemen Asuhan Kebidanan Anemia pada wanita usia reproduksi dalam masa Pra Konsepsi di Puskesmas Jongaya Makassar.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dilaksanakannya Asuhan Kebidanan Anemia pada wanita usia reproduksi Pra Konsepsi berdasarkan pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakan pengkajian dan analisa data dasar Anemia pada usia reproduksi Pra Konsepsi.
- b. Dilaksanakan pengidentifikasian diagnosa/masalah aktual Anemia pada wanita usia reproduksi Pra Konsepsi.
- c. Dilaksanakan pengidentifikasian diagnosa/masalah potensial Anemia pada wanita usia reproduksi Pra Konsepsi.
- d. Dilaksanakan tindakan segera dan kolaborasi Anemia pada wanita usia reproduksi Pra Konsepsi.
- e. Dilaksanakan penyusunan rencana tindakan asuhan kebidanan Anemia pada wanita usia reproduksi Pra Konsepsi.
- f. Dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan Anemia pada wanita usia reproduksi Pra Konsepsi.
- g. Dilaksanakan evaluasi asuhan kebidanan Anemia pada wanita usia reproduksi Pra Konsepsi.
- h. Didokumentasikan evaluasi asuhan kebidanan Anemia pada wanita usia reproduksi Pra Konsepsi.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir program pendidikan DIII kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat Ilmiah

Hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan serta sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

3. Manfaat Pendidikan

Untuk menambah wacana bagi pembaca di perpustakaan dan berbagai masukan bagi Program Studi DIII kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga karena dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan yang berhubungan dengan keluhan pada wanita perimenopause.

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini metode yang digunakan adalah:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari berbagai literatur dan mengambil data dari jurnal nasional yang ada relevansinya dengan perimenopause termasuk karya tulis ilmiah.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: Identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana

asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan tehnik antara lain:

a. Anamnesa

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien dan keluarganya yang dapat membantu memberikan keterangan/informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis untuk menjamin diperolehnya data yang lengkap mulai dari kepala sampai kaki (head to toe) meliputi; inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi dan pemeriksaan diagnostik lainnya.

c. Pengkajian psiko sosial

Pengkajian psiko sosial dilakukan meliputi status emosional, respon terhadap yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

d. Studi dokumentasi

Dalam manajemen asuhan kebidanan dalam kasus Pra Konsepsi penulis membaca dan mempelajari status yang berhubungan dengan Pra Konsepsi dengan Anemia baik bersumber dari bidan, dokter, perawat maupun pemeriksaan lainnya.

e. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan klien, keluarga klien, dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi dan rekan-rekan

seprofesi lainnya yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu:

Bab I pendahuluan akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan pustaka yang akan menguraikan tentang Pra Konsepsi dengan Anemia, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian pada bab III, yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah Varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktik yang dilaksanakan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu Pra Konsepsi.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dilakukan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum Tentang Remaja*

1. Pengertian Remaja

Menurut Abrori et.al., 2017 masa remaja adalah masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Istilah remaja atau *adolescence* berasal dari Bahasa latin *adolescence* (dalam Bahasa Inggris) yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang cukup luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.

Dalam Islam, kalimat remaja secara etimologi berasal dari *murahaqoh*, kata kerjanya adalah *raahaqo* yang berarti *al-iqtirab* (dekat). Secara terminologi, berarti mendekati kematangan secara fisik, akal, dan jiwa serta sosial (Masnyur, 2009).

Remaja merupakan suatu masa kehidupan individu dimana terjadi eksplorasi psikologis untuk menentukan identitas diri. Pada masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja, individu mulai mengembangkan ciri-ciri abstrak dan konsep diri menjadi lebih berbeda. Remaja mulai memandang diri dari penilaian dan standar pribadi, tetapi kurang dalam interpretasi perbandingan sosial (Kusmiran Eny, 2011).

Definisi remaja (*adolescence*) menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah periode usia anatar 10 sampai 19 tahun, sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut kaum muda (*youth*) untuk usia antara 15 sampai 24 tahun. Sementara itu, the Health Resources and

Servis Administration Guidelines Amerika Serikat, rentang usia remaja adalah 11-21 tahun dan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu remaja awal (11-14 tahun), remaja menengah (15-17 tahun) dan remaja akhir (18-21 tahun). Definisi ini kemudian disatukan dalam terminologi kaum muda (*young people*) yang mencakup 10-24 tahun (Widyastuti dkk,2010).

Batasan usia remaja menurut Depkes RI adalah antara 10 sampai 19 tahun dan belum kawin. Menurut BKKBN adalah 10 sampai 19 tahun (Andira,2010). Definisi remaja atau “ *Adolescence* “ menurut Harlock (1992) berasal dalam Bahasa latin”*adolescere*” yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Istilah *Adolescence* yang berasal dari bahasa Inggris saat ini mempunyai arti yang cukup luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Sedangkan menurut Piaget mengatakan bahwa masa remaja adalah usia dimana individu mulai berinteraksi dengan masyarakat dewasa (Andira,2010).

Definisi remaja sendiri dapat di tinjau dari tiga sudut pandang, antara lain :

- a. Secara kronologis, remaja adalah individu yang berusia antara 11-12 tahun sampai 20-12 tahun.
- b. Secara fisik, remaja ditandai dengan oleh ciri perubahan pada penampilan fisik dan fungsi psikologis, terutama yang terkait dengan kelenjar seksual.

- c. Secara psikologis, remaja merupakan masa dimana individu mengalami perubahan-perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan moral di antara masa anak-anak menuju masa dewasa (Eny,2011).

Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisisk, emosi dan psikis. Masa remaja, yakni anatar 10 – 19 tahun adalah suara periode masa pematangan organ reproduksi manusia, dan sering disebut masa pubertas. Masa remaja adalah periode peralihan dan masa anak ke masa dewasa.

2. Perkembangan remaja dan ciri- cirinya

Berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja, kita sangat perlu mengenal perkembangan remaja serta ciri-cirinya. Berdasarkan sifat atau ciri perkembangannya, masa (rentang waktu) remaja ada tiga tahap yaitu :

- a. Usia remaja muda (12-15 tahun)

Adapun ciri-ciri perkembangan psikologi pada remaja muda terlihat dari:

- 1) Sikap protes terhadap orang tua.
- 2) Preokupasi dengan badan sendiri.
- 3) Kesetia kawan dengan kelompok seusia.
- 4) Kemampuan untuk berfikir secara abstrak.
- 5) Prilaku yang labil dan berubah-ubah.

- b. Uisa remaja penuh (16-19 tahun)

Adapun ciri-ciri perkembangan psikologi pada remaja muda terlihat dari:

- 1) Kebebasan dari orang tua.
- 2) Ikatan terhadap pekerjaan atau tugas.

- 3) Pengembangan nilai moral dan etis yang mantap
 - 4) Pengembangan hubungan pribadi yang labil
 - 5) Penghargaan kembali kepada orang tua dalam kedudukan yang sejajar
- (Eny,2011).

3. Masa Transisi Remaja

Pada usia remaja, terdapat masa transisi yang akan dialami. Masa transisi tersebut antara lain :

a. Transisi fisik berkaitan dengan perubahan bentuk tubuh

Bentuk tubuh remaja sudah berbeda dengan anak-anak, tapi belum sepenuhnya menampilkan bentuk tubuh orang dewasa. Hal ini menyebabkan kebingungan peran, didukung pula dengan sikap masyarakat yang kurang konsisten.

b. Transisi dalam kehidupan ekonomi

Perubahan hormonal dalam tubuh remaja berhubungan erat dengan peningkatan kehidupan emosi. Remaja sering memperlihatkan ketidakstabilan emosi.

c. Transisi dalam kehidupan sosial

Lingkungan sosial anak semakin besar keluar dari keluarga, di mana lingkungan teman sebaya mulai memegang peran penting. Pergeseran ikatan pada teman sebaya merupakan upaya remaja untuk mandiri (melepaskan ikatan dengan keluarga).

d. Transisi dalam pemahann

Remaja mengalami perkembangan kognitif yang pesat sehingga

mulai mengembangkan kemampuan berfikir abstrak (Eny, 2011).

Dalam hubungannya dengan proses perkembangan, masa remaja merupakan masa transisi dari control eksternal (paling sering orang tua) ke control internal. Masa ini merupakan periode yang sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan pola tingkah laku, yang meliputi pola makan dan perawatan diri. Sumber-sumber informasi di luar keluarga, seperti media (Tv dan radio) dapat menjadi lebih bermakna. Oleh sebab itu, masa remaja merupakan masa yang tepat untuk intervensi pendidikan dasar.

Remaja yang terkena anemia lebih banyak di alami pada anak wanita yang sudah menstruasi. Kurangnya zat besi bisa terjadi pada semua anak di usia sekolah dari segala lapisan ekonomi. Darah yang keluar dari tubuh dapat menyebabkan kurangnya zat besi dalam tubuh. Maka jumlah hemoglobin di dalam sel darah juga akan berkurang, sehingga jumlah oksigen yang dapat di angkut oleh darah keseluruhan tubuh akan berkurang. Apalagi pada remaja putri biasanya mulai pilih-pilih makanan, sehingga dapat mengakibatkan indeks zat besi terganggu (Zein,2010).

B. Tinjauan Umum Tentang Pra Konsepsi

1. Definisi

Masa pra konsepsi merupakan masa sebelum hamil, wanita prakonsepsi diasumsikan sebagai wanita dewasa atau wanita usia subur yang siap menjadi seorang ibu, dimana kebutuhan gizi pada masa ini berbeda

dengan masa anak- anak, remaja, ataupun lanjut usia (Muh. Nur Qalbi dkk,2014).

Masa prakonsepsi merupakan periode kritis dalam mencapai hidup yang sehat, terutama bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga. Prakonsepsi terdiri atas dua kata, yaitu *pra* dan *konsepsi*. *Pra* berarti sebelum dan *konsepsi* berarti pertemuan sel ovum dan sel sperma sehingga terjadi pembuahan. Secara harfiah prakonsepsi adalah periode sebelum terjadinya pembuahan yaitu pertemuan sel sperma dengan ovum.

Periode prakonsepsi memiliki tentang waktu dari tiga bulan hingga satu tahun sebelum konsepsi, tetapi idealnya harus mencakup waktu saat ovum dan sperma matur, yaitu 100 hari sebelum konsepsi. Status gizi dalam kurun waktu tiga sampai enam bulan pada masa prakonsepsi merupakan penentu bagi bayi yang akan dilahirkan.

Wanita prakonsepsi diasumsikan sebagai wanita dewasa atau wanita usia subur (WUS) yang sudah siap menjadi seorang ibu. Pada masa prakonsepsi kebutuhan gizi pada WUS tentunya berbeda dengan kelompok remaja, anak-anak maupun lansia. Prasyarat gizi sempurna pada masa prakonsepsi merupakan kunci kelahiran bayi normal dan sehat (Susilowati,dkk 2016).

2. Asuhan Gizi Prakonsepsi

Gizi yang optimal pada masa prakonsepsi berperan sangat penting dalam proses pembuahan dalam kehamilan. Keadaan kesehatan dan status gizi ibu hamil sesungguhnya ditentukan jauh sebelumnya, yaitu pada masa dewasa dan masa sebelum hamil (prakonsepsi) atau selama menjadi wanita usia subur (WUS)(Indriani dkk, 2013).

Kecukupan gizi ibu hamil akan mempegaruhi konsidi janin dalam tumbuh kembangnya selama kehamilan,menurunkan resiko kesakitan pada bayi, menunjang fungsi optimal dari alat-alat reproduksi dan meningkatkan produksi sel telur dan sperma yang berkualitas. Menurut Bappenas (2011) status gizi janin dalam kandungan di pengaruhi oleh status gizi ibu hamil, bahkan status gizi ibu pada sebelum hamil.

Kurang gizi pada janin akan menyebabkan bayi berat lahir rendah (BBLR) karena sejak dalam kandugan janin sudah mengalami kegagalan pertumbuhan (*foetal growth relardation*). Bayi dengan kondisi kekurangan gizi apabila asupan gizinya tidak segera diperbaiki maka akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembagannya, kondisi ini akan berlanjut samapai dewasa. Salah satu cara untuk memutus siklus ini adalah dengan cara perbaikan gizi pada masa prakonsepsi (Susilowati dkk, 2016).

Setidaknya akan dua alasan utama mengapa calon ibu harus menjaga kondisi gizi sebelum hamil, yaitu :

- a. Gizi yang baik akan menunjang fungsi optimal alat-alat reproduksi, seperti lacarnya proses pematangan sel telur, produksi sel telur dengan kualitas baik, dan proses pembuahnya yang sempurna.
- b. Gizi yang baik berperan penting dalam mempersiapkan cadangan nutrisi bagi tumbuh kembang janin. Bagi calon ibu, gizi yang cukup dan seimbang memengaruhi kondisi kesehatan secara menyeluruh pada masa pembuahan (konsepsi) dan kehamilan.

Pengertian dan kesadaran tentang pentingnya mengonsumsi sumber makanan yang bergizi selama masa prakonsepsi adalah satu penyebab kekurangan gizi pada calon ibu. Kekurangan pengetahuan dan kesadaran seimbang, pola makan yang tidak teratur, konsumsi berlebihan terhadap satu atau beberapa jenis makanan, konsumsi junkfood dan diet berlebihan pada masa prakonsepsi harus dihindari sebelum terlambat (Susilowati dkk. 2016).

3. Kebutuhan Gizi pada Masa Prakonsepsi

Kebutuhan gizi pada WUS tentunya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kebutuhan sesama bayi dan anak-anak.(Patimah,2017).

Gizi yang memengaruhi pada masa prakonsepsi adalah karbohidrat, lemak, protein, asam folat, beberapa kelompok vitamin seperti vitamin A, E, dan B12, serta mineral seperti zinc, besi, kalsium, dan

Omega-3(Patimah,2017). Berikut zat gizi yang perlu di perhatikan dalam masa prakonsepsi agar calon ibu dapat memenuhi kecukupan gizinya:

a. Karbohidrat

Karbohidrat dapat memenuhi 55-57% dari total kebutuhan energy individu. Karbohidrat merupakan zat gizi yang paling berperan sebagai penyedia energi bagi ibu dan janin(Fikawati,dkk 2015).

Karbohidrat dengan kadar indeks glikemik yang tinggi akan mengakibatkan tubuh lebih cepat keying dan berdampak pada resiko kegemukan. Hal ini di akibatkan oleh tingginya kadar gula sehingga akan terjadi penumpukan berupa lemak dalam tubuh. Lemak jahat adalah *Trans Fatty Acids* (TFA),semakin tinggi kadar TFA maka akan semakin tinggi resiko seseorang untuk terkena penyakit degeratif seperti Diabetes.

Hal ini karena lemak yang menumpuk akan mengganggu sistem produksi hormone, isulin dalam tubuh serta dapat merusak kualitas sperma pada pria. Karbohidrat yang disarankan adalah kelompok polisakarida (seperti nasi, jagung, sereal, umbian-umbian) dan disarankan membatasi komsumsi monosakarida (seoerti gula, sirup, makanan dan minuman yang tinggi kadar gula) (Susilowati,dkk 2016).

b. Protein

Protein sangat dibutuhkan oleh tubuh, protein tersusun oleh asam amino, dan salah satunya adalah arginin. Arginin berfungsi memperkuat daya tahan hidup sperma dan mencegah

kemandulan. mengkonsumsi sumber protein dapat membantu merangsang produksi hormon estrogen pada wanita dimana hormone ini berfungsi untuk mengurangi peradangan serta kram pada saat menstruasi. Selain itu protein berperan penting dalam pembentukan dan pemeliharaan sel yang menunjang pertumbuhan janin, perbanyaknya sel payudara, rahim dan plasma. Protein juga dapat menjadi cadangan energi. Cadangan ini dipakai untuk persiapan persalinan, masa sehabis melahirkan, dan menyusui. Sebaiknya 2/3 porsi protein yang dikonsumsi berasal dari sumber protein yang bernilai biologi tinggi, yaitu bersumber dari protein hewani, seperti daging, ikan, telur, susu dan hasil olahannya (Fikawati,dkk 2015)

c. Vitamin C

Vitamin C berperan penting untuk fungsi indung telur dan pembentukan sel telur. Selain sebagai antioksidan (bekerja sama dengan vitamin E dan karoten), vitamin C berperan melindungi sel-sel organ tubuh dari serangan radikal bebas (oksidan) yang mempengaruhi kesehatan sistem produksi.

d. Asam Folat (Vitamin B9)

Asam folat berperan pada masa pembuahan dan kehamilan trimester pertama. Kecukupan asam folat terbukti dapat mengurangi bayi lahir dengan resiko kecacatan sistem syaraf dengan neural tube defect (NTD) seperti spina bifida sebanyak 70%. Asam folat juga

dibutuhkan untuk pembelahan sel normal dan sangat penting selama periode pertumbuhan dan perkembangan janin.

e. Vitamin B6

Definisi vitamin B6 akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan hormon. Padahal, keseimbangan hormone estrogen dan progesteron penting untuk terjadinya kehamilan. Bersama dengan asam amino vitamin B6 akan mensintesis hemoglobin. Dan mengakibatkan pembentukan hem yang berdampak pada terjadinya anemia (Patimah 2017).

f. Vitamin D

Kekurangan vitamin D akan menurunkan kesuburan hingga 75% serta gangguan metabolisme kalsium pada ibu dan janin. Sumber vitamin D diproduksi di dalam tubuh dengan bantuan matahari, selain itu dapat diperoleh dari susu, telur, mentega, keju, minyak ikan, ikan tuna, dan ikan salmon.

g. Vitamin B12

Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan gangguan sintesis DNA dan kekurangan dari hematopoiesis yang menimbulkan peningkatan anemia, ditandai oleh sel darah merah lebih besar dari pada ukuran normal (anemia makrositik), serta dapat berdampak pada perkembangan organ janin yang abnormal yang nantinya akan berakibat cacat bawaan, jenis makanan yang mengandung asam folat

yaitu hati, sayuran hijau, kacang-kacangan, daging, jeruk dan telur (Fikawati, dkk 2015).

h. Vitamin A

Di dalam vitamin A digunakan untuk mensistesi Hb dan memobilisasi cadangan besi ke jaringan tubuh untuk membangun sel darah baru (IHE Report dalam patimah 2017). Kekurangan vitamin A menyebabkan gangguan pengangkutan zat besi dari tempat penyimpanan di dalam tubuh (hepar, sumsum tulang, sel-sel retikuloendithel) kedalam sirkulasi dan konsekuensinya terhadap hematopoietic jaringan tubuh. Suplementasi vitamin A dapat memperbaiki kadar hemoglobin. Kuning telur, hati dan mentega tergolong makanan yang banyak mengandung vitamin A. Selain itu, sayuran berwarna hijau dan buah-buahan berwarna kuning,, terutama wortel, tomat, apel, nangka juga merupakan sumber vitamin A (Fikawati,dkk 2015).

i. Vitamin E

Vitamin E berperan dalam stabilitas membran sel darah merah, meningkatkan fungsi dan daya tahan sel darah merah. Vitamin E yang tidak adekuat mengakibatkan dampak yang buruk pada sel darah merah. Ketika PUFA dalam membran lipid darah dari sel darah merah terkena radikal bebas, maka membran akan pecah, isi sel menghilang, dan sel menajdi rusak. Kehilangan sel darah merah secara terus menerus dapat mengakibatkan anemia hemolitik (Patimah 2017).

j. Zinc

Zinc sangat penting bagi calon ibu karena dapat membantu produksi materi genetik ketika pembuahan terjadi. Zinc berperan penting dalam pertumbuhan organ seks dan juga berkontribusi untuk produksi ovum serta kesuburan pada wanita (Patimah 2017).

k. Zat Besi

Kekurangan Zat besi pada calon ibu dapat menyebabkan anemia dengan gejala lelah, sulit konsentrasi, dan gampang infeksi. Zat besi (Fe) juga berperan dalam proses memperlancar ovulasi. Ketika terjadi ketidak seimbangan besi akan menimbulkan gangguan perkembangan dari anemia karena kekurangan zat besi yang merupakan rangkain dari perubahan cadangan zat besi, transport besi, akhirnya terhadap fungsi metabolic yang terkait dengan zat besi. Sumber makanan yang mengandung zat besi adalah hati, daging, telur, kacang-kacangan, dan sayuran berwarna hijau.

l. Kalsium

Kalsium sangat dibutuhkan pada masa sebelum kehamilan, karena simpanan kalsium yang cukup akan mencegah kelainan tulang pada janin. Selain itu kekurangan kalsium dapat mengakibatkan janin mengambil persediaan kalsium pada tulang ibu yang menyebabkan ibu menderita kerapuhan tulang atau osteoporosis. Sumber kalsium berasal dari susu dan hasil olahannya seperti keju, serta kacang-kacangan dan sayuran hijau (Fikawati,dkk 2015).

m. Fostor

Kecukupan zat fostor diperlukan agar pemuhaan dapat berlangsung dengan baik. Fostor berhubungan dengan kalsium, sebagian besar kedua zat gizi ini berbentuk garam kalsium fosfat di dalam jaringan keras tubuh yaitu tukang dan gigi. Zat gizi ini bisa ditemui pada makanan berkalsium tinggi, seperti susu dan ikan teri.

n. Selenium


Selenium berkontribusi terhadap terjadinya anemia melalui pemeliharaan konsentrasi optimal glutation perioxidase yang merupakan antiolsida seleno-enzim penting dalam eritrosit. Glutation perixoidase membantu melindungi,hemoglobin melawan oksida (radikal bebas) dalam eritrosit (Patimah 2017).

o. Asam lemak Omega-3

Jenis asam lemak omega-3 yang sanagt bermanfaat pada calon ibu adalah *eicosapentaeonic acid* (EPA) dan *docosahexaeonic acid* (DHA). EPA dan DHA mampu menunjang fungsi otak, mata, dan sistem saraf pusat sehingga penting bagi ibu pasa masa kehamilan. Peningkatan komsumsi omega-3 terbukti dapat mencegah bayi lahir premature dan dapat meningkatkan berat badan bayi saat lahir, makanan yang menjadi sumber omega-3 adalah ikan dan makanan laut lainnya (Sulilowati,dkk 2016).

4. Permasalahan Gizi Masa Prakonsepsi

Masalah gizi yang terjadi pada wanita subur (WUS) dapat berakibat intergenerasi. Siklus intergenerasi dari gagal tumbuh, pertama kali dijelaskan oleh *The Second Report on The World Nutrition Situation* (Gambar 1.) yang menjelaskan bahwa bagaimana siklus gagal tumbuh berawal dari keadaan gizi calon ibu yang buruk. Teori tersebut menyebutkan bahwa Wanita Usia Subur (WUS) yang mengalami kurang Energi Kronik (KEK) akan memiliki resiko untuk melahirkan bayi BBLR dari pada wanita yang tidak KEK. Anak yang lahir dengan kondisi BBLR akan mengalami kegagalan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Demikian halnya dengan anak perempuan yang lahir dengan kondisi BBLR maka kemungkinan memiliki postur tubuh pendek lebih besar. Cara untuk memutus mata rantai tersebut adalah dengan memperbaiki status gizi WUS sehingga bayi yang dilahirkan nantinya akan sehat dan normal.



Gambar.1 Siklus Gangguan Pertumbuhan Intergenerasi

Sumber: Patimah,2017

Kerusakan di awal kehidupan akan menimbulkan gangguan permanen, juga dapat memengaruhi generasi berikutnya, dimana perempuan yang memiliki postur tubuh pendek, kelak akan melahirkan bayi BBLR pula nantinya (Patimah 2017). Berat-rigannya gagal tumbuh bergantung pada status gizi sebelum dan selama kehamilan, keadann kekurangan zat gizi, serta dapat menyebabkan BBLR, kurangnya jumlah sel-sel otak dan ukuran kepala, rendahnya ukuran organ-organ tubuh yang lain, perubahan sel-sel utama tubuh, dan organ-organ tubuh yang lain, perubahan sel-sel utama tubuh, dan perubahan proses biokimia, serta kematian. Namun jika anak tersebut lahir dan bertahan hidup, maka perubuhan yang bersifat permanen terhadap struktur tubuh, fisiologi dan metabolisme akan menjadi predisosisi untuk mengalami penyakit kardiovaskular (jantung, hioertensi), gangguan metabolik dan endokrin pada saat usia dewasa.

Nutrisi yang tidak adekuat pada WUS akan mengakibatkan manifestasi penyakit seperti kurang energy protein (KEK) yang akan mengakibatkan anemia dan defiensi zat mikronutrien, sehingga akan berdampak buruk bagi bagi calon ibu. Janin, maupun bayi yang akan dilahirkan, osteomalasia, dan kelelahan yang berlebihan serta mudah terkena infeksi selama kehamilan (Fauziyah,2012).

Kurang energi kronik (KEK) didefinisikan sebagai suatu keadaan kekurangan energy dalam kurun waktu yang lama yang ditandai dengan ukuran lingkar legan atas (LILA) <23,5 cm (Almatier,2011).

Kekurangan energy kronik mengakibatkan perawakan tubuh yang pendek (tinggi badan <145cm) merupakan penyebab terjadinya hambatan pertumbuhan dan maturasi, memperbesar resiko obstetric (kandugan), dan berkurangnya kapasitas kerja. WUS yang kekurangan akan berisiko mengalami komplikasi kehamilan, seperti persalinan macet akibat pengual yang sempit, janin yang dikandung mengalami gangguan pertumbuhan (*intra uterine growth retardation*), bayi lahir berat dengan berat badan rendah (BBLR) hingga tiga generasi berikutnya, bayi lahir prematur, lahir mati (*stillbirths*), dan kematian dimasa neonatal (dari lahir-28 hari kelahiran) (Patimah 2017).

Kurang energi kronik (KEK) adalah masalah gizi yang sering menimpa WUS. Berdasarkan hasil indeks pembangunan kesehatan masyarakat (PKM) tahun 2013 prevalensi KEK pada WUS di Indonesia menunjukkan angka sebesar 20,97%. Salah satu dampak KEK pada WUS adalah anemia gizi besi (AGB). Seorang dikatakan anemia apabila kadar Hemoglobin berada dibawah 12gr/dL yang akan menyebabkan penurunan kapsitas darah untuk membawa oksigen.

Dampak dari ibu hamil yang menderita anemia secara signifikan dapat meningkatkan resiko kelahiran premature sesuai derajat keparahan anemia. WUS yang menderita anemia berat mempunyai resiko 3,8 kali lebih besar melahirkan bayi berat lahir rendah dibandingkan WUS yang tidak anemia (BBLR) (Patimah, 2017). Prevalensia anemia WUS di negara berkembang diperkirakan sebesar 43% (Sudikno dan Sandjaja, 2016)

sedangkan berdasarkan hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa prevalensi anemia WUS di Indonesia sebesar 35,3%.

5. Faktor yang memengaruhi Status gizi

Secara umum, status gizi dipengaruhi oleh tingkat asupan dan penyakit infeksi yang mengganggu proses metabolisme, absorpsi, dan utilitas zat gizi oleh tubuh. Status gizi wanita usia subur (WUS) merupakan kondisi tubuh yang muncul diakibatkan adanya kesinambungan Antara konsumsi dan defisiensi zat gizi. Masalah gizi yang terjadi pada remaja merupakan manifestasi dari masalah gizi pada usia anak, yaitu anemia zat besi, serta kekurangan maupun kelebihan berat badan. WUS yang secara fisik tidak ideal akan berisiko melahirkan bayi berat badan rendah, jika janin yang dikandung tumbuh normal, jalan lahir kemudian yang menjadi masalah. Karena ukuran panggul yang sempit dapat menyebabkan partus macet.

Ketidak berhasilan janin melewati lorong kelahiran secara alami tidak jarang menyebabkan kematian (Patimah 2017). Selain ada beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi WUS sebelum memasuki masa kehamilan, diantaranya:

a. Umur

Umur WUS pada saat pertama kali hamil kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun merupakan kehamilan yang berisiko. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa pada usia yang masih muda pertumbuhan seorang wanita belum sempurna, perkembangan alat

reproduksi belum optimal, dan secara psikologis kejiwaan masih belum siap untuk memasuki masa kehamilan (Sharon, dkk 2017).

Selain itu, Kehamilan di usia muda menjadi sebuah masalah karena akan memberikan konsekuensi terhadap gangguan obstetric dan outcome neonatal secara biologi hal ini disebabkan kebutuhan zat gizi yang seharusnya hanya untuk pertumbuhan WUS maka apabila sedang hamil akan terbagi dengan janin yang dikandungnya, akibatnya WUS akan berisiko mengalami komplikasi kehamilan (Baker, et al, 2009) . Adapun kehamilan diatas umur 35 tahun, terjadinya komplikasi seperti anemia disebabkan oleh kemunduran fungsi faal tubuh dan kemungkinan berisiko hipertensi, diabetes, dan beberapa penyakit lainnya sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap pendarahan, serta turunnya metabolisme tubuh dan kemampuan absorpsi tubuh terhadap zat besi (Patimah 2017).

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu faktor yang memengaruhi persepsi seseorang agar mereka dapat menerima ide-ide baru. Bagi seorang wanita, pendidikan adalah sebuah media yang sangat memengaruhi perubahan seperti pengendalian status kesehatan dan fertilitasnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin mudah menerima informasi yang ada termasuk mengenai gizi. Fauziyah (2012) menyatakan dalam

penelitiannya bahwa semakin lama seorang wanita menerima pendidikan maka semakin besar kemungkinan untuk menerapkan praktik hidup sehat.

c. Status Gizi

Status gizi WUS pada masa prakonsepsi meruokan faktor utama yang mempengaruhi hasil konseps, selain multiparitas, jarak kehamilan, dan keadaan kesehatan ibu. WUS yang sebelum masa kehamilannya memiliki status gizi baik maka akan lebih mudah untuk menjalani dan memelihara kemailan, dibandingkan dengan WUS yang kurus atau obesitas. Akan tetapi di Indonesia masih banyak WUS yang mengalami masalah gizi seperti anemia dan KEK. (Fauziyah 2012).

Anemia yang dialami oleh WUS sebelum memasuki masa prakonsepsi biasanya adalah anemia yang disebabkan karena defisit zat besi dan berdasarkan Riskesdas (2013) sebanyak 35,3% WUS menderita anemia. Anemia defisiensi besi ditandai dengan hemoglobin kurang dari 12 gram/dl dan konsentrasi serum ferritin kurang dari 12 mcq/dl, secara fisik seseorang yang anemia akan mengalami kondisi rambut rapuh, kuku tipis. Mudah patah dan berbentuk seperti sendok (koilonika), lidah tampak pucat hal in disebabkan oleh atropi yang terjadi pada papila lidah, serta bibir pecah-pecah.

Kurang energi kronik (KEK) adalah masalah gizi utama yang dialami wanita, sebanyak 20,97% WUS di Indonesia mengalami KEK (IPKM, 2013). Ciri utama wanita yang mengalami KEK adalah ukuran lingkaran lengan atas (LILA) kurang dari 23,5 cm. WUS yang menderita KEK akan berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah. Dampak lain yang akan dialami adalah cepat lelah, penurunan daya tahan tubuh terhadap infeksi hingga munculnya penyakit degeneratif.

C. Tinjauan Umum Tentang Anemia

1. Pengertian

- a. Anemia merupakan suatu keadaan kadar hemoglobin (Hb) di dalam darah lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok orang menurut umur dan jenis kelamin. Hemoglobin adalah zat warna di dalam darah yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbondioksida dalam tubuh.
- b. Anemia adalah keadaan berkurangnya jumlah eritrosit atau hemoglobin (protein pembawa O₂) dari nilai normal dalam darah sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk membawa O₂ dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer sehingga pengiriman O₂ ke jaringan menurun.
- c. Anemia adalah penurunan kapasitas darah dalam membawa oksigen akibat penurunan produksi sel darah merah, dan atau penurunan hemoglobin (Hb) dalam darah. Anemia sering di definisikan sebagai

penurunan kadar Hb dalam darah sampai dibawah rentang normal 13,3 gr% (pria), 11,5 gr% (wanita dan 11 gr% (anak-anak) (fraser,Diare M, 2009).

- d. Anemia adalah penurunan kapasitas darah dalam membawa oksigen; hal tersebut dapat terjadi akibat penurunan sel darah merah (SDM), dan / atau penurunan hemoglobin (Hb) dalam darah. (Fraser Diane dan Cooper A marganet, 2009).

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anemia adalah suatu keadaan dimana kadar Hb dalam tubuh di bawah batas normal karena dipengaruhi oleh berbagai hal yang mengakibatkan penurunan kapasitas pengangkut oksigen darah.

2. Etiologi

Anemia dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Gangguan pembentukan eritrosit

Gangguan pembentukan eritrosit terjadi apabila terdapat defisiensi substansi tertentu seperti mineral (besi, tembaga), vitamin (B12, asam folat), asam amino, serta gangguan pada sumsum tulang.

- b. Perdarahan

Perdarahan baik akut maupun kronis mengakibatkan penurunan total sel darah merah dalam sirkulasi.

- c. Hemolisis

Hemolisis adalah proses penghancuran eritrosit.

Secara umum penyebab anemia adalah:

- a. Kekurangan zat gizi dalam makanan yang di konsumsi.
- b. Penyerapan zat besi yang tidak optimal, misalnya karena diare, pembedahan saluran pencernaan.
- c. Kehilangan darah yang disebabkan oleh perdarahan menstruasi yang banyak, perdarahan akibat luka, perdarahan karena penyakit tertentu, kanker (Tarwoto S.kep,dkk.2007:13).

3. Batas Normal Kadar Hb dan Metode Pengukuran Hb

Hemoglobin adalah metaloprotein pengangkut oksigen yang mengandung besi dalam darah. Hemoglobin adalah suatu zat di dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh.

Hemoglobin terdiri oleh 4 molekul zat besi (*Hame*), 2 Molekul rantai *Globin Alpa* dan 2 molekul rantai *globin beta*. Rantai *globin alpha* dan *beta* adalah protein yang produksinya disandi oleh *gen globin alpha* dan *beta* (Yuni, 2015).

Kadar hemoglobin pada setiap golongan berbeda, kadar hemoglobin bervariasi tergantung umur dan jenis kelamin.

Tabel 1
Batas Normal Kadar Hemoglobin (Hb)

No	Kelompok	Hemoglobin (gr/dl)
1	Bayi Baru Lahir	17-22
2	Bayi 1 Minggu	15-20

3	Bayi 1 Bulan	11-15
4	Anak-anak	11-13
5	Remaja Laki-laki	14-18
6	Remaja Putri	12-16
7	Laki-laki Dewasa	14-18
8	Wanita Dewasa	12-16
9	Laki-laki Paruh Baya	12,4-14,9
10	Wanita Paruh Baya	11,7-13,8

Sumber : (Yuni, 2015)

Beberapa metode pengukuran Hb yang dapat digunakan yaitu:

- a. Pemeriksaan Hb dengan metode Sahli, dalam penggunaan metode ini Hb dihidrolisis dengan HCL (asam klorida) menjadi globin ferrp-hem (Supariasa, 2001).
- b. Pemeriksaan Hb dengan metode Cyanmethemoglobin, yaitu cara pemeriksaan hemoglobin dengan menggunakan larutan Drabskin dan diukur dengan alat spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu (Supariasa, 2001).
- c. Pemeriksaan Hb dengan metode hemocue, metode ini dilakukan dengan pengukuran optical density pada kuvet yang mempunyai kapasitas volume sebesar 10 mikroliter oleh sinar yang berasal dari lampu berjarak 0.133 milimeter sampai pada dinding parallel celah optis tempat kuvet berada. Prinsip system hemocue terdiri dari pembaca hemoglobin kecil portable, dan memakai mikrocuvettes

sekali pakai.

4. Penyebab Anemia

Beberapa jenis anemia dapat diakibatkan oleh defisiensi zat besi, infeksi atau gangguan genetic, yang paling sering terjadi adalah anemia yang disebabkan oleh kekurangan asupan zat besi. Kehilangan darah yang cukup banyak, seperti saat menstruasi, kecelakaan dan donor darah berlebihan jugadapat menghilangkan zat besi dalam tubuh.Wanita yang mengalami menstruasi setiap bulan berisiko menderita anemia. Kehilangan darah secara perlahan-lahan di dalam tubuh, seperti ulserasi polip kolon dan kanker kolon juga dapat menyebabkan anemia.(Briawan, 2014).

Selain zat besi, masih ada dua jenis lagi anemia yang sering timbul pada anak-anak, remaja dan wanita usia subur. Aplastik anemia terjadi bila sel yang memproduksi butiran darah merah tidak dapat menjalankan tugasnya. Hal ini dapat terjadi karena infeksi virus, radiasi, kemoterapi atau obat tertentu. Adapun jenis berikutnya adalah haemolytic anemia, yang terjadi karena sel darah merah hancur secara dini, lebih cepat dari kemampuan tubuh untuk memperbaharunya. Penyebab anemia jenis ini bermacam-macam, bisa bawaan seperti talasemia atau *sickle cell* anemia(Adriani & Wirjatmadi, 2014).

5. Gejala Anemia

Menurut Natalia Erlina Yuni (2015) dalam bukunya yang berjudul kelainan darah menyebutkan gejala anemia sebagai berikut:

a. Kulit Pucat

- b. Detak Jantung Meningkat.
- c. Sulit Bernafas.
- d. Kurang Tenaga atau cepat lelah,
- e. Pusing terutama saat berdiri.
- f. Sakit kepala,
- g. Siklus menstruasi tidak menentu.
- h. Lidah yang bengkak dan nyeri.
- i. Kulit mata dan mulut berwarna kuning, limpa atau hati membesar, penyembuhan luka atau jaringan yang terganggu.

6. Dampak Anemia

Anemia memiliki dampak buruk pada kesehatan bagi penderitanya, terutama pada golongan rawan gizi yaitu, anak balita, anak sekolah, remaja, wanita usia subur, ibu hamil dan menyusui dan juga pekerja.

Menurut (Fikawati, Syafiq, & Veretamala, 2017) dampak anemia sebagai berikut:

- a. Menurunkan Daya tahan terhadap infeksi

Defisiensi zat besi menyebabkan menurunnya daya tahan terhadap penyakit infeksi (Thompson & Ward, 2008) dan meningkatnya kerentanan mengalami keracunan (Bersamin *et al.*, 2008).

Pada populasi yang mengalami kekurangan zat besi, kematian akibat penyakit infeksi meningkat karena kurangnya zat besi berdampak pada *system imun*.

b. Mengganggu Produktivitas kerja

Selain itu, anemia juga berdampak pada produktivitas kerja dan juga menyebabkan kelelahan .

c. Berdampak saat kehamilan

Anemia yang terjadi pada masa hamil berhubungan dengan kejadian BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) dan peningkatan risiko kematian ibu dan bayi perinatal. Selama kehamilan, anemia diasosiasikan dengan peningkatan kesakitan dan kematian. Anemia tingkat berat diketahui merupakan faktor risiko kematian ibu. Untuk janinnya sendiri, anemia selama kehamilan dapat meningkatkan risiko BBLR, kelahiran prematur, dan defisiensi zat besi serta anemia pada bayi nantinya.

7. Pencegahan Anemia dan penanggulangan Rematri dan WUS

Anemia dapat dicegah dengan cara:

- a. Meningkatkan konsumsi makanan bergizi.
- b. Makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan makanan hewani (daging, ikan, ayam, hati, telur) dan bahan makanan nabati (sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, tempe).
- c. Makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin c (daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk dan nenas) sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam usus.
- d. Menambah pemasukan zat besi kedalam tubuh dengan minum Tablet Tambah Darah (TTD). Mengobati penyakit yang menyebabkan atau

memperberat anemia seperti: kecacingan, malaria, dan penyakit TBC.

Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia dilakukan dengan memberikan asupan zat besi yang cukup ke dalam tubuh untuk meningkatkan pembentukan haemoglobin. Upaya yang dapat dilakukan adalah:

a. Meningkatkan asupan makanan sumber zat besi

Meningkatkan asupan makanan sumber zat besi dengan pola makan bergizi seimbang, yang terdiri dari aneka ragam makanan, terutama sumber pangan hewani yang kaya zat besi (besi heme) dalam jumlah yang cukup sesuai dengan AKG. Selain itu juga perlu meningkatkan sumber pangan nabati yang kaya zat besi (besi non-heme), walaupun penyerapannya lebih rendah dibanding dengan hewani. Makanan yang kaya sumber zat besi dari hewani contohnya hati, ikan, daging dan unggas, sedangkan dari nabati yaitu sayuran berwarna hijau tua dan kacang-kacangan.

b. Fortifikasi bahan makanan dengan zat besi

Fortifikasi bahan makanan yaitu menambahkan satu atau lebih zat gizi ke dalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut. Penambahan zat gizi dilakukan pada industri pangan, untuk itu disarankan membaca label kemasan untuk mengetahui apakah bahan makanan tersebut sudah difortifikasi dengan zat besi. Makanan yang sudah difortifikasi di Indonesia antara lain tepung terigu, beras, minyak goreng, mentega, dan

beberapa snack.

c. Suplementasi zat besi

Pada keadaan dimana zat besi dari makanan tidak mencukupi kebutuhan terhadap zat besi, perlu didapat dari suplementasi zat besi. Pemberian suplementasi zat besi secara rutin selama jangka waktu tertentu bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat, dan perlu dilanjutkan untuk meningkatkan simpanan zat besi didalam tubuh.

Suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) Pada Rematri dan WUS merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi asupan zat besi. Pemberian tablet tambah darah (TTD) dengan dosis yang tepat dapat mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi di dalam tubuh.

Di beberapa Negara lain seperti: India, Bangladesh, dan Vietnam, Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) dilakukan 1 kali seminggu dan hal ini berhasil menurunkan prevalensi anemia di Negara tersebut.

Berdasarkan penelitian di Indonesia dan di beberapa negar lain tersebut, maka pemerintah menetapkan kebijakan program pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri (rematri) dan wanita usia subur (WUS) dilakukan setiap 1 kali seminggu dan sesuai dengan permenkes yang berlaku.

Untuk meningkatkan penyerapan zat besi sebaiknya Tablet

Tambah Darah (TTD) dikonsumsi bersama dengan :

- 1) Buah –buahan sumber vitamin C (jeruk, papaya, manga, jambu biji dan lain-lain).
- 2) Sumber protein hewani, seperti hati, ikan, unggas dan daging.
- 3) Hindari mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) bersamaan dengan: Teh dan kopi karena mengandung senyawa fitat dan tannin yang dapat mengikat zat besi menjadi senyawa yang kompleks sehingga tidak dapat diserap.
- 4) Tablet kalsium dosis yang tinggi, dapat menghambat penyerapan zat besi. Susu hewani umumnya mengandung kalsium dalam jumlah yang tinggi sehingga dapat menurunkan penyerapan zat besi di mukosa usus.

D. Tinjauan Khusus Anemia Remaja

Anemia adalah suatu keadaan ketika kadar hemoglobin (Hb) dalam darah berkurang dari normal, dengan berkurangnya hemoglobin dari normal maka kemampuan sel darah merah untuk membawa oksigen keseluruh tubuh berkurang. Akibatnya, tubuh kita kurang mendapatkan pasokan oksigen yang menyebabkan tubuh lemas dan dapat terjadi karena sejak bayi sudah anemia, infeksi cacing tambang, kurangnya asupan zat besi (Yuni, 2018).

Seseorang dikatakan menderita anemia apabila kadar Hemoglobin dibawah 13gr% bagi pria dewasa, dan bagi remaja dibawah 12gr% dan kurang dari 11gr% bagi anak-anak usia 5tahun sampai masa pubertas, dan apabila Hb dibawah normal maka distribusi oksigen juga tidak normal maka akibatnya

fungsi tubuh juga terganggu. Contohnya pada otot maka akan mudah terasa lelah bila melakukan aktivitas sebentar saja (Zein, 2010).

Anemia merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia, anemia sangat sering terjadi pada anak-anak sekolah terutama remaja putri. Remaja putri berisiko tinggi menderita anemia, karena pada masa ini terjadi peningkatan kebutuhan zat besi akibat adanya pertumbuhan dan menstruasi, aktifitas sekolah, perkuliahan maupun berbagai aktifitas yang tinggi akan berdampak pada pola makan yang tidak teratur, selain itu kebiasaan mengkonsumsi minuman yang menghambat absorpsi zat besi akan mempengaruhi kadar Hb seseorang (Tiaki, 2017).

Briawan, 2012 Menyatakan bahwa anemia disebabkan oleh penurunan produksi sel darah merah dan hemoglobin, peningkatan pengrusakan sel-sel merah (hemolisis) atau kehilangan darah karena perdarahan berat. Anemia didefinisikan suatu keadaan yang mana nilai Hb dalam darah lebih rendah dari keadaan normal (WHO, 2010). Batas kadar normal Hb untuk kelompok orang ditentukan menurut umur dan jenis kelamin seperti yang diperlihatkan dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1**Batas Normal Kadar Hb Menurut Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok	Umur	Hb (gr/dl)
	6 bulan - 59 bulan	11
Anak-anak	5 - 11 tahun	11,5
	12-14 tahun	12
	wanita > 14 tahun	12
Dewasa	wanita hamil	11
	laki-laki >14 tahun	13

Sumber: WHO,2010

Berdasarkan etiologinya, (Titin, 2015) menerangkan anemia dapat dibagi menjadi dua. Penyebab utama adalah meningkatnya kehilangan sel darah merah dan gangguan atau penurunan pembentukan sel. Meningkatnya kehilangan sel darah merah dapat disebabkan oleh perdarahan dan penghancuran sel. Perdarahan dapat disebabkan oleh trauma atau luka, perdarahan kronik karena polip pada kolon, penyakit keganasan, hemoroid, dan menstruasi yang abnormal.

Etiologi yang kedua adalah pembantukan sel darah merah yang terganggu. Setiap keadaan yang mempengaruhi sumsum trulang dimasukkan dalam kelompok ini, seperti :

1. keganasan yang tersebar seperti kanker, obat dan zat toksik, serta radiasi.

2. Penyakit menahun melibatkan ginjal dan hati, infeksi dan defisiensi endokrin. Kekurangan vitamin-vitamin penting seperti vitamin B12, vitamin C dan zat besi juga dapat mengakibatkan pembentukan sel darah merah tidak efektif sehingga menimbulkan anemia.

Menurut Titin,2015, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya anemia, yaitu :

1. Sebab langsung, yaitu karena ketidakcukupan zat besi dan infeksi penyakit.

Kurangnya zat besi dalam tubuh disebabkan karena kurangnya asupan makanan yang mengandung zat besi, makanan cukup, namun bioavailabilitas rendah, serta makanan yang dimakan mengandung zat penghambat absorpsi besi. Infeksi penyakit yang umumnya memperbesar resiko anemia adalah cacing dan malaria.

2. Sebab tidak langsung, yaitu rendahnya perhatian keluarga terhadap wanita, aktifitas wanita tinggi, pola distribusi makanan dalam keluarga dimana ibu dan anak wanita tidak menjadi prioritas.
3. Sebab mendasar yaitu masalah ekonomi, antara lain rendahnya pendidikan, rendahnya pendapatan, status sosial yang rendah dan lokasi geografis yang sulit

Menurut Depkes (2016), penyebab anemia pada remaja putri dan wanita adalah:

1. Pada umumnya konsumsi makanan nabati pada remaja putri dan wanita tinggi, dibanding makanan hewani sehingga kebutuhan Fe tidak

terpenuhi.

2. Sering melakukan diet (pengurangan makan) karena ingin langsing dan mempertahankan berat badannya.
3. Remaja putri dan wanita mengalami menstruasi tiap bulan yang membutuhkan zat besi tiga kali lebih banyak dibanding laki-laki.

WHO (2010) menetapkan batasan prevalensi anemia yang merupakan masalah kesehatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Ketentuan Masalah Kesehatan Masyarakat Berdasarkan
Prevalensi Anemia

Kategori Masalah Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Anemia
Tidak masalah	$\leq 4,9$
Ringan	5,0 – 19,9
Sedang	20,0 – 39,9
Berat	$>40,0$

Sumber: WHO, 2010

Berdasarkan batasan hemoglobin, WHO 2010 juga melakukan klasifikasi anemia, yaitu normal atau tidak anemia, anemia ringan, anemia sedang, anemia berat, dan anemia sangat berat. Batasan hemoglobin untuk setiap klasifikasi, dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3 Klasifikasi Anemia Berdasarkan Batasan Hemoglobin

Klasifikasi	Batasan
Anemia	Hemoglobin
Normal	12 – 14 gr/dl
Ringan	11 – 11,9 gr/dl
Sedang	8 – 10,9 gr dl
Berat	5 – 7,9 gr/dl
Sangat Berat	< 5 gr/dl

Sumber: WHO, 2010.

E. Tinjauan Pra Konsepsi Dengan Anemia Dalam Pandangan Islam

1. Surah An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan :

Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), Dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa/4 :1) (Kementrian Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012).

Dari ayat di atas, dapat di pahami bahwa allah dalam hal ini tidak menyebutkan secara kronologis tentang proses penciptaan perempuan pertama itu. Diktum al-Qur'an lagi-lagi hanyamenyebutkan bahwa 'dariodanya, dia menciptakan pasanganya'. Setidaknya dalam konteks ini

ada tiga hal penting yang memicu polemik di antara para musafir ketika memahami beberapa ayat ini atas, yaitu term *nafs wahidah* (diri yang satu); objek yang ditunjuk dengan kata *minha* (darinya); dan term *zaujaha* (pasangan).

Menurutnya, yang dimaksud dengan term *nafs wahidah* yang terdapat dalam QS. Al-Nisa'/4:1, adalah Nabi Adam, sementara term *zaujaha* diartikan sebagai Hawa. Pendapatnya itu didasarkan pada sebuah riwayat yang berasal dari Qatadah, al-Sadi dan Ibnu Ishaq yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam sebelah kiri ketika si sedang tidur.

Pedapat al-Thabari di atas diamini musafir lain seperti al-Alusi dan Ibu Katsir, al-Zamakhshari, al-Qurtubi, dan juga al-Maraghi. Argumen mereka itu antara lain didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:

“Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan tulang yang bengkok itu, engkau akan mematahkannya, tetapi kalau engkau biarkan, dia akan tetpa bengkok. Maka sekali lagi saling berpasanglah kalain untuk berbuat baik kepada perempuan”(HR.Bukhari dan Muslim).

Kedua, bahwa Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam, melainkan sebagai makhluk yang diciptakan dari jenis (*jins*) yang sama dengan Adam. Artinya, Hawa juga diciptakan dari tanah yang merupakan

unsur utama dalam penciptaan Adam. Pendapat ini, antara lain dikemukakan oleh Abu Muslim al-Isfahani yang menyatakan bahwa maksud kalimat :*wa khalaqa minha zaujaha*” pada ayat tersebut adalah bahwa Allah menciptakan Hawa dari jenis yang sama dengan Adam. Pendapat senada juga dikemukakan oleh al-Razi. Dengan mengutip pendapat Isfahani, dia menyatakan bahwa *dhamir* (kata ganti) *ha* pada kata *minha* (dari padanya) pada ayat di atas, bukan merujuk pada Adam, melainkan “dari jenis” Adam, yaitu tanah.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rashid Ridha. Seditikny ada dua alasan mendasar yang dikemukakan abduh untuk menolak pemahaman yang menyatakan bahwa maksud *nafs wahidah* dalam ayat ini tersebut berarti Adam. *Pertama*, ayat itu dimulai dengan kalimat *ya ayyuha al-nas* (wahai sekalian manusia). Artinya, ayat ini ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian bersifat universal. Sementara itu, Adam tidak diakui secara universal sebagai manusia pertama. Oleh karenanya, pengertian *nim nafs wdhidah* dalam ayat ini, seharusnya juga diakui secara universal.

Kedua, jika yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Adam (sebagai kata ma’rifah), mengapa lanjutan ayat itu menggunakan bentuk *nakirah* pada kita *rijal* dan *nisa’* pada kalimat *wa bassa minhuma rijalan katsir wa nisa’an*? Oleh karena itu, jika memang yang dimaksud dengan *nafs wahidah* adalah Adam, Maka kedua kata itu seharusnya juga diungkapkan dengan ma’rifah.

Peranan perempuan dalam keluarga dengan melalui perkawinan, dapat mengembangbiakkan keturunan melalui proses pembuahan, hamil, melahirkan, nifas, menyusui dan mendidik anak. Kesemuanya ini adalah pangkal dari pertemuan antara Adam dan Hawa yang pada hakikatnya adalah merupakan ciptaan Allah, dapat mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat, selamatlah mereka dari cengkraman dan malapetaka dalam kehidupannya.

2. Surah An Nahl 69

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ
لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan :

Kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). “ Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir. (QS. An-Nahl/16 : 69) (Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012).

Quraish Shihab dalam penafsirannya menyebutkan bahwa Allah SWT telah memberi petunjuk pada lebah untuk menjadikan buah-buahan dari berbagai jenis pohon dan tumbuhan sebagai makanannya. Karena petunjuk tersebut lebah menjalankan tugas-tugasnya dengan sangat mudah. dari dalam perut lebah keluar sejenis minuman beraneka ragam dan berguna sekali bagi kesehatan manusia. Dan sesungguhnya dari ciptaan yang unik itu pertanda akan wujud sang Pencipta yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Madu merupakan jenis zat yang mengandung unsur glukosa dan perferentous

(semacam zat gula yang sangat mudah dicerna) dalam porsi besar. Berdasarkan ilmu kedokteran menyimpulkan bahwa glukosa sangat berguna bagi proses penyembuhan dari berbagai macam jenis penyakit, madu juga memiliki kandungan vitamin yang cukup tinggi terutama vitamin B kompleks (Shihab Quraish, 2013).

Madu adalah cairan yang sifatnya lengket dan memiliki rasa manis yang dihasilkan oleh lebah dan serangga lainnya yang dihasilkan dari nektar bunga. Madu merupakan cairan gula yang memiliki kandungan zat gula berupa fruktosa dan glukosa yang merupakan jenis gula monosakarida yang mudah diserap oleh usus. Selain itu madu juga mengandung vitamin, mineral, asam amino, hormon, antibiotik dan bahan-bahan aromatik. Pada umumnya madu tersusun atas 17,1% air, dan 82,4% karbohidrat total, 0,5% protein, asam amino, vitamin dan mineral.

Madu mengandung vitamin C, vitamin A, besi (Fe), dan vitamin B12 yang berfungsi sebagai pembentuk sel darah merah dan *hemoglobin*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi madu dapat mencegah terjadinya anemia pada kehamilan (Wulandari P, 2015).

Metode pengobatan dalam Islam yang terkenal sampai kini adalah *al-thibb-annabawy* (Pengobatan cara Nabi Muhammad Saw). Tabib-tabib muslim meneladani Rasulullah serta berpedoman pada Al-Quran dan hadis, seperti mengatur pola makan dan minum air putih. Untuk pengobatan dan menjaga kesehatan Rasulullah mengonsumsi madu, susu murni, kurma, biji jantan hitam dan bahan-bahan lainnya. Begitu juga

dengan tuntunan pengobatan sering dituturkan Rasulullah saw dalam berbagai hadist.

Berikut ini sebuah hadis tentang terapi bekam, minum madu yang telah diakui secara medis:

حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ اللَّهُ وَكَذَّبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبُرَّ (رواه البخاري)

Artinya:

Telah disampaikan oleh Muhammad bin Abdirrahman, diberitakan kepada kami oleh Suraij bin Yunus Anu al-Harits disampaikan kepada kami oleh Marwan bin S dari Syuja' dari Salim al-Aqthas dari Said bin Jabir dari Ibnu Abbas dari Nabi Sawbersabda: "Kesembuhan itu terdapat dalam tiga hal, sayatan pisau bekam, meminum madu dan sengatan api, akan tetapi aku melarang mumatku melakukan sengatan api. (HR, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Abu Syaibah, Al-Baihaqi, Tabrani, al-Nasa'i dan nal-Thabari).

Hadis di atas diriwayatkan oleh banyak mukharrij melalui *riwayah bil ma'nyang* bersumber dari berbagai sahabat diantaranya Ibnu Abbas, Jabir Bin Abdullah, Utabah bin Amir, dan Muawiyah bin Khudaij. Hadis diatas merupakan hadis *maqbul* (dapat diterima) disamping diriwayatkan oleh al-Bukhari memiliki (*yawahid* dan *mutabaat*).

Hadis tentang kesembuhan dengan cara berbekam sudah diakui oleh dunia medis, begitu juga dengan khasiat dari madu sudah diteliti secara ilmiah ternyata memang banyak mengandung khasiat untuk kesehatan dan penyembuhan. Pada saat sekarang ini banyak sekali terapi bekam yang di praktekkan dan telah banyak menolong menyembuhkan penyakit-penyakit

tertentu. Begitu juga halnya dengan madu, banyak produk makanan dan kesehatan yang memakai madu sebagai salah satu komposisinya.

Selain dari berbekam, berbagai cara pengobatan disebutkan di dalam hadis seperti:

1. Pengobatan dengan meminum madu
2. Pengobatan dengan habbah sauda` (jintan hitam)
3. Pengobatan dengan ruqyah dan lainnya. Mengenai obat-obatan atau khasiat suatu benda atau tanaman juga banyak disebutkan dalam hadis

Nabi di antaranya:

- a. Manfaat siwak
- b. Keutamaan cuka
- c. Khasiat air zam-zam,
- d. Khasiat cendawan
- e. Khasiat adas
- f. Kkhasiat delima
- g. Khasiat buah tin dan zaitun
- h. Khasiat bubur gandum
- i. Khasiat hulbah
- j. Khasiat senna dan sannut
- k. Khasiat air manna dan yang lainnya.

Mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW, merupakan suatu keharusan bagi umat Islam. Termasuk mewarisi metode pengobatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Pengobatan yang dilakukan Rasulullah menggunakan tiga

cara, yaitu melalui do'a atau pengobatan dengan menggunakan wahyu-wahyu Ilahi yang lebih dikenal dengan istilah do'a-do'a ma'tsur yang datang dari Al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yang shahih. Kedua menggunakan obat-obat tradisional baik dari tanaman maupun hewan. Dan ketiga adalah menggunakan kombinasi dari kedua metode tersebut. Adapun mengenai pengobatan melalui obat-obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan mineral, hal ini tidak asing lagi dalam dunia farmasi.

Pengobatan ini dikenal dengan farmasi. Ilmu farmasi sendiri terpisah dari ilmu Kedokteran di era kehalifahan Abbasiyah (abad ke 8 M). Dalam perkembangannya farmasi terbagi menjadi berbagai cabang ilmu yang saling berkaitan satu sama lainnya. Cabang ilmu tersebut antara lain mencakup Farmakologi (Farmakodinamik, Farmakokinetik, Toksikologi farmasi, Farmakodinamik), Kimia farmasi, Farmasetika, Farmakognosi. Farmakologi bidang ilmu mempelajari efek biokimia dan fisiologis dari obat pada manusia yang didalamnya mencakup Farmakodinamik. Farmakokinetik yang mempelajari faktor-faktor yang mengontrol konsentrasi obat di berbagai tempat di dalam tubuh. Toksikologi farmasi yang mempelajari efek toksik dari obat, serta Farmakodinamik yang mempelajari karakteristik antar obat dan organisme. Kimia farmasi merupakan studi desain obat untuk mengoptimalkan farmakokinetik dan farmakodinamik dan sintesis dari molekul baru. Farmasetika merupakan studi dan desain formulasi obat, sedangkan farmakognosi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki bahan-bahan baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan dan juga beberapa mineral

yang mempunyai khasiat obat. Semua cabang farmasi ini memiliki keterkaitan yang kuat untuk menghasilkan obat yang bermutu dan aman.

Obat ada 3 macam:

1. Mengeluarkan darah dengan bekam.
2. Minum madu
3. Membakar kulit dengan api (besi panas), dan aku melarang umatku membakar kulit (Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Abbas)

Beberapa manfaat yang diberikan lebah sebagai berikut:

1. Madunya merupakan minuman yang lezat berguna bagi kesehatan, sarangnya dapat dibuat lilin, bahan untuk membuat, dan lain-lain.
2. Lebah membantu penyerbukan bunga sehingga terjadi pembuahan.

Kemudian Allah memberi petunjuk pada lebah untuk menjadikan buah-buahan dari berbagai jenis pohon dan tumbuhan sebagai makanannya berkat petunjuk yang telah diberikan, lebah menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan sangat muda. Dari dalam perut lebah keluar sejenis minuman beraneka warna dan berguna bagi kesehatan manusia (Tafsir Muhammad Quraish Shihab)

Melalui ilmu kedokteran modern di dapat kesimpulan bahwa glukosa berguna sekali bagi proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit melalui injeksi atau dengan perantaraan mulut yang berfungsi sebagai penguat. Oleh karena itu madu juga memiliki kandungan vitamin yang cukup tinggi terutam vitamani B kompleks.

F. Proses Manajemen Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah suatu metode atau bentuk pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam memberi asuhan kebidanan. Langkah-langkah dalam manajemen kebidanan menggambarkan alur pola berpikir dan bertindak dalam mengambil keputusan klinis dalam menyelesaikan masalah (Yulifah & Surachmindari, 2014: 125-137).

Proses asuhan kebidanan yang telah dilakukan harus dicatat secara benar, singkat, jelas dan logis dalam suatu metode pendokumentasian yang dapat mengomunikasikan kepada orang lain mengenai asuhan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan pada seorang klien, yang didalamnya tersirat proses berpikir yang sistematis dalam menghadapi seorang klien sesuai langkah-langkah dalam proses manajemen kebidanan (Yulifah & Surachmindari, 2014: 125-137).

2. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Proses manajemen terdiri dari 7 langkah asuhan kebidanan yang dimulai dari pengumpulan data dasar dan diakhiri dengan evaluasi. Tahapan dalam proses asuhan kebidanan ada 7 langkah, yaitu:

a. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pada langkah pertama, dilakukan pengkajian melalui pengumpulan semua data dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, yaitu riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai kebutuhan, peninjauan catatan terbaru atau catatan sebelumnya

dan data laboratorium, serta perbandingannya dengan hasil study (Saminem, 2009). Data yang diperoleh untuk kasus anemia yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data lengkap dari klien dengan menilai keadaan klien melalui anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (Laboratorium).

Data subjektif adalah data yang ditetapkan dari ibu seperti ibu mengeluh sering merasa lelah dan sering mengantuk, merasa pusing dan lemah, merasa tidak enak badan, mengeluh sakit kepala. Data objektif adalah data dari hasil pemeriksaan yang seperti tampak kaku pada tangan, pucat, konjungtiva pucat dan hasil pemeriksaan laboratorium di dapatkan Hb <12 gr.

b. Langkah II : Mengidentifikasi diagnosis atau masalah aktual

Pada langkah ini, bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasi sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Diagnosis kebidanan adalah diagnosis yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standard nomenklatur diagnosis kebidanan (Atik Purwandari, 2008). dari data subjektif dan objektif yang didapatkan pada saat pengkajian data maka diagnosa yang ditegakkan yaitu anemia dengan kadar Hb < 12 gr%. Masalah aktual yang dirasakan ibu adalah sering merasa lelah dan mengantuk, merasa pusing, sering merasakan sakit kepala dan konjungtiva pucat.

Diagnosa anemia dapat ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium apabila kadar Hb <12 gr% yang ditandai dengan wajah tampak pucat, konjungtiva pucat, disertai dengan keluhan diantaranya lemah, lesu, sakit kepala, mata berkunang-kunang (Kemenkes, 2016).

- c. Penyakit infeksi, beberapa infeksi memperbesar risiko anemia.

Infeksi itu Langkah III :

Mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial umumnya adalah Tuberculosis (TBC), cacangan dan malaria, karena menyebabkan terjadinya peningkatan penghancuran sel darah merah dan terganggunya eritrosit. Infeksi cacangan akan menyebabkan malnutrisi dan dapat mengakibatkan anemia defisiensi besi. Infeksi malaria dapat menyebabkan anemia (Nurhidayati Rohmah Dyah, 2013).

Pada langkah ini, bidan mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi. Jika memungkinkan, dilakukan pencegahan. Sambil mengamati kondisi klien, bidan diharapkan dapat bersiap jika diagnosis atau masalah potensial benar-benar terjadi (Saminem,2009).

Adapun masalah potensial anemia pada wanita usia subur dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia mudah terkena infeksi, menurunnya kebugaran dan ketangkasan berfikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak (Kemenkes, 2016).

Kekurangan hemoglobin dalam darah dapat mengakibatkan

kurangnya oksigen yang ditransport ke sel tubuh maupun otak, sehingga dapat menurunkan kebugaran jasmani seseorang dalam melaksanakan aktifitas fisik secara maksimal. Haemoglobin dalam sel darah merah berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke dalam sel untuk metabolisme, apabila asupan oksigen ke dalam sel rendah maka akan menyebabkan menurunnya kebugaran jasmani dan mudah lelah (Sherwood, 2011). Selain itu, anemia yang dialami pada Rematri (remaja putri) dan WUS (wanita usia subur) akan terbawa hingga dia menjadi ibu hamil dapat mengakibatkan, Risiko pertumbuhan janin terhambat (PJT), premature, BBLR, dan gangguan tumbuh kembang anak diantaranya stunting dan gangguan neurokogniti. Perdarahan sebelum dan saat melahirkan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya (Kemenkes, 2016).

d. Langkah IV : Penetapan kebutuhann/ tindakan segera

Bidan atau dokter mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan/atau konsultasi atau penanganan bersama dengan anggota tim kesehatan yang sesuai dengan kondisi klien. Langkah keempat mencerminkan kesinambungan proses manajemen kebidanan. Manajemen bukan hanya selama asuhan primer periodic atau kunjungan prenatal, tetapi juga selama wanita tersebut dalam persalinan (Saminem, 2009).

Pada kasus anemia tidak diperlukan tindakan segera kepada klien selama keadaan atau kondisi klien yang mengalami anemia ini tidak merasakan seperti sesak napas, pingsan, syok atau dalam keadaan tidak

sedarkan diri.

Pingsan adalah kehilangan kesadaran yang secara tiba-tiba dan bersifat sementara, kehilangan kesadaran tersebut terjadi akibat penurunan aliran darah ke otak. Kondisi ini bisa diawali dengan rasa pusing dan penglihatan kabur. Syok merupakan respon tubuh terhadap gangguan pada sistem peredaran darah yang menghambat darah mengalir dalam jumlah yang cukup ke seluruh bagian tubuh. Berkurangnya jumlah darah yang mengalir bisa menyebabkan syok. Yang akan dilakukan adalah pemberian oksigen dan stabilisasi jalan nafas.

e. Langkah V: Intervensi/ Perencanaan tindakan asuhan kebidanan.

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini, informasi atau data yang tidak lengkap dapat dilengkapi (Saminem, 2009).

Perencanaan asuhan yang akan di ambil jika ditemukan anemia pada wanita usia subur yaitu pemberian suplementasi zat besi secara rutin selama jangka waktu tertentu, bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap mengonsumsi makanan yang kaya sumber zat besi dari hewani contohnya hati, ikan, daging, dan unggas, sedangkan dari nabati yaitu sayuran berwarna hijau tua dan kacang-kacangan. Untuk meningkatkan

penyerapan zat besi dari sumber nabati perlu mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk, jambu. Pemberian Tablet Tambah Darah dengan dosis yang tepat dapat mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi didalam tubuh.

f. Langkah VI : Implementasi/ pelaksanaan asuhan

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh yang diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan, dan sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya (Saminem, 2009).

Menganjurkan kepada ibu untuk tetap mengonsumsi makanan yang kaya sumber zat besi dari hewani seperti hati, ikan, daging, dan unggas, sedangkan dari nabati yaitu sayuran berwarna hijau tua dan kacang-kacangan. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi dari sumber nabati perlu mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk, jambu. dan menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi tablet tambah darah.

g. Langkah VII :. Evaluasi

Pada langkah terakhir ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi didalam diagnose dan masalah. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif

dalam pelaksanaannya (Miratu Megasari et al., 2015).

Pada tahapan evaluasi adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai keefektifan tindakan yang diberikan, bidan dapat menyimpulkan jumlah kadar Hb dengan melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kadar Hb kembali normal atau >12 gr%, serta kebutuhan klien terpenuhi sesuai gestasinya.

3. Pendokumentasian Tindakan Asuhan Kebidanan

Pendokumentasian yang benar adalah pendokumentasian mengenai asuhan yang telah dan akan dilakukan pada seorang pasien. Menurut Varney, didalamnya tersirat proses berfikir bidan yang sistematis dalam menghadapi seorang pasien sesuai langkah-langkah manajemen kebidanan maka didokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu:

a. S (Data Subjektif)

Data subjektif (S), merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah pertama (pengkajian data), terutama data yang diperoleh melalui anamnesis. Data Subjektif ini berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis.

b. O (Data Objektif)

Data Objektif (O) merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney pertama (pengkajian data), terutama data yang diperoleh melalui hasil observasi yang jujur dari pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan diagnostik lain. Catatan medik dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimaksudkan dalam data objektif ini.

c. A (Assessment)

A (Assessment), merupakan pendokumentasian hasil analisis dan intepretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. Dalam pendokumentasian manajemen kebidanan, karena keadaan pasien yang setiap saat bisa mengalami perubahan, dan akan ditemukan informasi baru dalam data subjektif maupun data objektif, maka proses pengkajian data akan menjadi sangat dinamis. Hal ini juga menuntut bidan untuk sering melakukan analisis data yang dinamis tersebut dalam rangka mengikuti perkembangan pasien dan analisis yang tepat dan akurat mengikuti perkembangan data pasien akan menjamin cepat diketahuinya perubahan pada pasien, dapat terus diikuti dan diambil keputusan/tindakanyang tepat. Analysis/assessment merupakan pendokumentasian manajemen kebidann menurut helen varney langkah kedua, ketiga, dan keempat sehingga mencakup hal-hal berikut ini: diagnosis/masalah kebidanan, diagnosis/masalah potensial serta perlunya mengidentifikasi kebutuhan tindakan segera untuk antisipasi

diagnosis/masalah potensial dan kebutuhan tindakan segera harus diidentifikasi menurut kewenangan bidan, meliputi: tindakan mandiri, tindakan kolaborasi dan tindakan merujuk klien.

d. P (Planning)

Planning /perencanaan, adalah membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya. Rencana asuhan ini harus bidan mencapai kriteriatujuan yang ingin dicapat dalam batas waktu tertentu. Tindakan yang akan dilaksanakan harus mampu membantu pasien mencapai kemajuan dan harus sesuai dengan hasil kolaborasi tenaga kesehatan lain, anantara lain dokter.

Meskipun secara istilah, P adalah planning/perencanaan saja, namun P dalam metode SOAP ini juga merupakan gambaran pendokumentasian implementasi dan evaluasi. Dengan kata lain, P dalam SOAP meliputi pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah kelima, keenam, dan ketujuh.

Pendokumentasian P dalam SOAP ini, adalah pelaksanaan asuhan sesuai rencana yang telah disusun sesuai dengan keadaan dan dalam rangka mengarasi masalah pasien. Pelaksanaan tindakan harus disetujui oleh pasien, kecuali bila tindakan tidakdilaksanakan akan membahayakan keselamatan pasien. Sebanyak mungkin pasien harus

dilibatkan dalam proses implementasi ini. Bila kondisi pasien berubah, analisis juga berubah, maka rencana asuhan maupun implementasinya pun kemungkinan besar akan ikut berubah atau harus disesuaikan.



BAB III
LITERATUR REVIEW

Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Matriks Pengertian Anemia Pada wanita usia Reproduksi

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Usia Reproduksi Prakonsepsi Dengan Anem

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Pengaruh Model Pendidikan Sebaya Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Anemia Gizi Besi Di Smk Negeri 4 Denpasar	I Putu Suiroaka, A.A. Gde Raka Kayanay, & Hertog Nursanyoto	2016	Pengaruh Model peer education terhadap perubahan pengetahuan dan sikap. Serta pengaruh model pendidikan sebaya terhadap perubahan perilaku.	hasil penelitian yaitu: 1) Rata-rata pengetahuan pada kelompok sebaya sebelum intervensi adalah $68,20 \pm 29,20$ dan setelahnya mengalami peningkatan sangat nyata (<0.001) menjadi $84,26 \pm 16,78$. Sedang rata-rata skor sikap terhadap upaya pencegahan anemia adalah $83,25 \pm 14,22$, dan setelahnya terjadi peningkatan nyata ($p0,05$).	Dari pembahasan kurang terperinci mengenai hasil yang telah didapatkan	penelitian kuasi eksperimen dengan rancangan nonrandomized control group design, dimana sampel dibedakan dalam dua kelompok yaitu kelompok intervensi	Pendidikan kesehatan terkait gizi remaja terhadap anemia yang terjadi

							mendapatkan materi anemia gizi besi melalui penyuluhan model kelompok sebaya dan kelompok kontrol mendapat materi yang sama melalui penyuluhan model klasikal	
2.	Analisis Faktor Penyebab Anemia Wanita Usia Subur Di Desa Jepang Pakis	Noor Hidayah	2016	Menganalisis faktor – faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya anemia pada wanita usia subur yakni dari aspek paritas, status ekonomi, pola makan dan budaya patriaki.	Wanita usia subur, telah menikah dan memiliki anak memiliki banyak peran yang wajib dilakukan. Dalam hal ini karena kondisinya beresiko terjadinya anemia. penelitian ini membuktikan teori dan penelitian sebelumnya	penelitian ini hanya menggunakan umur 25 sampai 35 tahun dengan dengan mengkategorikan wanita usia subur	Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional.	Usia subur merupakan usia yang sangat bagus untuk mengandung dan memiliki anak dikarenakan tubuh dan system vital masih kuat

	Kabupaten Kudus				<p>adanya hubungan yang signifikan antara pendapatan keluarga, budaya patriarki, pola makan dengan kejadian anemia. sedangkan paritas tidak berhubungan dengan kejadian anemia pada wanita usia subur di Desa Jepang Pakis Mejobo Kudus tahun 2015</p>		<p>populasi dalam penelitian ini adalah semua wanita usia subur yang sudah menikah usia 20 – 35 tahun di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pada bulan April 2015 adalah sebanyak 128 orang, besar sampel menggunakan rumus Arikunto (2008) sebanyak 56 orang, dengan</p>	
--	--------------------	--	--	--	--	--	---	--

							tehnik pengambilan sampel random sampling pada sejumlah 5 RW yang ada.	
3.	Penyuluhan Gizi Dan Pemberian Tablet Besi Terhadap Pengetahuan Dan Kadar Hemoglobin Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri Di Mamuju	Ahmady, Hapzah, & Dina Mariana	2016	Mengetahui Pengaruh penyuluhan gizi dan pemberian tablet besi terhadap pengetahuan dan kadar hemoglobin.	Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan peningkatan pengetahuan setelah penyuluhan, sedangkan pada pemberian tablet besi terdapat peningkatan kadar hemoglobin (Hb). Rata-rata peningkatan kadar Hb siswi pada kelompok intervensi adalah 0,93 g/dl, sedangkan pada kelompok kontrol justru mengalami penurunan yaitu rata-rata - 0,27 g/dl. Kemudian dilakukan uji statistik	Hasil dari penelitian hanya melihat efek dari penyuluhan gizi tanpa melihat skil dari pemberi penyuluhan	Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu (Quasi experiment) dengan menggunakan desain non randomized control group pretest – posttest. Pengelompokan anggota sampel pada	Anemia merupakan kekurangan gizi yang biasa terjadi pada wanita ataupun siswi

					untuk melihat perbedaan peningkatan kadar Hb sebelum dan sesudah intervensi antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol maka hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan peningkatan yang signifikan ($p=0,001$)		kelompok intervensi dan kelompok kontrol dilakukan secara non random.	
4.	Hubungan antara Kecukupan Energi dan Protein dengan Prevalensi Anemia pada Wanita Usia Subur di Kecamatan	Dian Sufyan, Sreymom Oy, & Selvi Mardiana	2019	Anemia adalah kondisi rendahnya konsentrasi Hemoglobin (Hb) yang dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas transport oksigen untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu.	Wanita usia subur memiliki resiko lebih besar menderita anemia. Kecukupan asupan protein berhubungan secara signifikan dengan anemia setelah di adjust dengan IMT dan pemakaian KB. Asupan protein sebagai sumber zat besi yang cukup dapat membantu individu untuk cukup memproduksi Hb sehingga anemia tidak terjadi.	Pada penelitian tidak ada hubungan antara asupan zat gizi dan anemia	Penelitian ini adalah jenis penelitian desain cross sectional, dimana data status anemia dan kecukupan energi dan protein diambil dalam satu waktu. Target	Penyebab utama terjadinya anemia pada wanita adalah polah hidup yang kurang sehat dan stress

	n Ciampea Bogor				Berdasarkan suatu studi cross sectional di Makassar terkait prevalensi anemia dan asupan makanan, ditemukan tidak ada hubungan signifikan antara asupan zat besi dengan anemia ($p=0.26$). Hal ini tidak sejalan dengan teori dari Almtsier bahwa zat besi dan protein adalah komponen utama untuk membuat haemoglobin dan seharusnya berhubungan dengan anemia.		populasi pada studi ini adalah WUS (15 – 44 tahun) yang memiliki anak usia bawah dua tahun (< 23 bulan). Pengambilan data dilakukan di 13 desa di Kecamatan Ciampea, Bogor.	
5.	Upaya Berbasis Sekolah Peningkatan Hemoglobin dalam Masa Menstruas	Vivi Silawati, Apriliani Kartika Sari	2020	Anemia adalah suatu keadaan dimana komponen di dalam darah, yakni hemoglobin (Hb) dalam darah jumlahnya kurang dari kadar normal (kemenkes, 2018)	Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan penelitian lain bahwa pemberian tablet Fe pada remaja dapat membantu menurunkan angka anemia pada remaja putri, karena dalam waktu yang cukup singkat pemberian tablet	Sekolah peningkatan hemoglobin yang dilakukan tidak dijelaskan seperti apa system sekolah peningkatan hemoglobin yang dimaksud	Jurnal ini adalah jurnal yang lengkap dari segi akreditasi dan penerbitnya dan termasuk jurnal terbaru yang	Anemia yang terjadi pada remaja wanita yang terjadi diakibatkan faktor makanan dan istirahat serta pola hidup

	i Remaja Putri : Studi di SMP 113 Jakarta				Fe dapat menaikkan kadar hemoglobin sebesar 0,4 gr/dL dan terdapat perbedaan yang signifikan kadar Hb sebelum dan sesudah pemberian tablet fe pada remaja yang menstruasi		dikeluarkan tahun 2020	
--	--	--	--	--	---	--	------------------------	--

Matriks tanda dan gejala etiologi

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Pengaruh Distribusi Makanan, Beban Ganda Dan Pengambilan Keputusan Terhadap Anemia Dalam Kehamilan	Juraida Roito Harahap	2015	Menganalisis Pengaruh ketimpangan gendre dalam keluarga (distribusi makanan, beban ganda, pengembalian keputusan terhadap kehamilan) dan karakteristik ibu (umur, jumlah anak, jarak kehamilan) terhadap anemia dalam kehamilan.	Hasil uji chi square menunjukkan bahwa ada hubungan antara pekerjaan yang dilakukan ibu hamil di rumah tangga, mencari nafkah dan peran sosial dengan anemia dalam kehamilan (p=0,000).Ketimpangan dalam melaksanakan peran reproduktif, produktif dan sosial, menyebabkan ibu mempunyai beban ganda.	Terjkait penelitian hanya mecantumkan etiologi dan tidak mencantumkan tanda dan gejala secara lengkap	Metode penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pra eksperimen <i>one grup pre and post test</i>	Distribusi beban makanan pada wanita sangat berpengaruh tterhadap kejadian anemia yang terjadi

	Di Wilayah Kerja Puskesmas Rumbio Jaya Kabupaten Kampar				Akibatnya ibu membutuhkan energi yang lebih besar. Ibu membutuhkan konsumsi gizi yang baik, apabila tidak terpenuhi maka dapat terjadi anemia pada ibu hamil. Kesehatan ibu hamil akan terganggu jika ibu harus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan keluarga, disamping tetap dituntut melaksanakan pekerjaan rumah tangga.			
2.	Uji Manfaat Kapsul Kelor Untuk Pengobatan Anemia Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Padang	Andi Hasliani	2014	Tanda dan gejala anemia disebut juga sebagai sindroma anemia yang dikumpulkan pada ADB apabila kadar hemoglobin turun dibawah 7-8 g/dl, badan lemah, lesuh, cepat lelah, mata berkeruh kuning,	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ponombon S dkk, 2013 dari 35 responden yang diteliti semua mengalami kenaikan hemoglobin dengan rentang kenaikan 1 – 3 gr/dl. hasil uji wilcoxon nilai p value 0,00 lebih kecil dari nilai α	Penelitian ini tidak mencantumkan tahun penelitian	Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Padang lampe dan Minasa Te'ne Pangkep. Alasan peneliti	Pengobatan daun kelor bisa menyembuhkan penyakit anemia pada ibu hamil

	Lampe Dan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep			serta telinga mendenging, pada pemeriksaan fisik dijumpai pada pasien yang pucat, terutama pada kunjungtiva dan jaringan dibawah kuku, sedangkan gejala khas pada ADB adalah koilohychia, atropi pupil, dan stomatitis angularis	0,05. Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kelor memiliki manfaat yang besar untuk mengatasi anemia karena kandungan zat besinya yang tinggi. Hal ini ditunjang dengan hasil- hasil penellitian yang menunjukkan kenaikan hemoglobin dengan terapi kapsul kelor		menggunaka n Puskesmas ini adalah karena berdasarkan studi awal diwilayah kerja puskesmas tersebut masih tinggi kejadian anemianya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksa n kehamilanny a di wilayah kerja puskesmas Pangkep. Sampel	
--	---	--	--	---	--	--	--	--

							dalam penelitian ini adalah ibu hamil anemia yang memeriksakan kehamilannya di wilayah kerja Puskesmas pangkep. Teknik pengambilan sampel adalah dengan accidental sampling.	
3.	Pengaruh Edukasi Kelompok Sebaya Terhadap Perubahan Perilaku	Ahmady, Hapzah, & Dina Mariana	2016	Anemia dapat terjadi karena kandungan zat besi dari makanan yang dikonsumsi tidak mencukupi kebutuhannya, makanan yang kaya	Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan peningkatan pengetahuan setelah penyuluhan, sedangkan pada pemberian tablet besi	Hasil dari penelitian hanya melihat efek dari penyuluhan gizi tanpa melihat skill dari pemberi penyuluhan	Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu (Quasi experiment)	Anemia merupakan kekurangan gizi yang biasa terjadi pada wanita ataupun siswi

	Pencegahan Anemia Gizi Besi Pada Wanita Usia Subur Di Kota Semarang			akan zat besi berasal dari hewani, makanan nabati, yang berasal dari biji bijian dan tumbuhan jika ini tidak terpenuhi maka dapat memicu terjadinya kasus anemia	terdapat peningkatan kadar hemoglobin (Hb). Rata-rata peningkatan kadar Hb siswi pada kelompok intervensi adalah 0,93 g/dl, sedangkan pada kelompok kontrol justru mengalami penurunan yaitu rata-rata -0,27 g/dl. Kemudian dilakukan uji statistik untuk melihat perbedaan peningkatan kadar Hb sebelum dan sesudah intervensi antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol maka hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan peningkatan yang signifikan ($p=0,001$)		dengan menggunakan desain non randomized control group pretest – posttest. Pengelompokan anggota sampel pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol dilakukan secara non random.	
4.	Hubungan antara Kecukupan Energi dan Protein	Siti Aisah, Junaiti Sahar, dan Sutanto	2019	Ada beberapa yang menyebabkan terjadinya anemia seperti pada usia remaja putri banyaknya	Hasil penelitian diperoleh adanya perbedaan ketrampilan sebelum dan setelah intervensi edukasi kelompok sebaya, demikian juga perbedaan	Pada penelitian tidak ada hubungan antara asupan zat gizi dan anemia	Penelitian ini adalah jenis penelitian desain cross sectional, dimana data	Penyebab utama terjadinya anemia pada wanita adalah polah hidup yang kurang sehat dan stress

	dengan Prevalensi Anemia pada Wanita Usia Subur di Kecamatan Ciampea Bogor	Priyo Hastono		mengimsumsi makanan nabati yang kadungan zat besinya sedikit, remaja putri biasanya ingin tampi langsing sehingga membatasi asupan makanan, remaja putri mengalami hait setiap bulannya.	signifikan rata-rata ketrampilan antara kelompok perlakuan dan kontrol. Secara substansi perbedaan tersebut sangat bermakna terhadap terjadinya perubahan perilaku pencegahan anemia gizi besi pada wanita usia subur karena intervensi yang diberikan		status anemia	
5.	Gerakan Remaja Setia (Sehat Tanpa Anemia) Dapat Pencegah Anemia Pada Remaja	Desmon Wirawati, Astuti Yuni Nursasi, dan Sigit Mulyono	2017	Tanda dan gejala anemia pada remaja wanita subur adalah lemah, lesuh, lelah dan lunglai, seirng mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang, gejala lebih lanjut bila kelopak mata, bibir, lidah, kulit dan telapak tangan menjadi pucat.	Gerakan Remaja SeTiA dapat diterapkan dalam manajemen pelayanan kesehatan di sekolah melalui program UKS. Gerakan Remaja SeTia diterapkan pada pelayanan kesehatan komunitas remaja dan terjadinya peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan dukungan keluarga yang dipersepsikan remaja melalui intervensi penerapan "Buku Panduan	penelitian ini hanya melakukan gerakan pencegahan yang dilakukan pada remaja	Penelitian ini adalah penelitian kreatif yang dimana remaja membuat suatu gerakan remaa setia untuk mencegah anemia	Anemia yang terjadi pada remaja wanita yang terjadi diakibatkan faktor makanan dan sitirahat serta pola hidup

					<p>Menuju Remaja SeTiA. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terlihat signifikan setelah menggunakan buku panduan remaja setia. Terjadinya peningkatan Kadar Hb pada remaja putri melalui intervensi penerapan “Buku Panduan Menuju Remaja SeTiA yaitu setelah trimester kedua. Peningkatan tingkat kemandirian keluarga pada keluarga binaan dan resume dalam mencegah terjadinya anemia dan mengatasi anemia pada remaja melalui intervensi penerapan Gerakan Remaja SeTiA</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Matriks Langkah 2

Matriks identifikasi masalah aktual

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Pengaruh Otak-Otak Tempe Bilis terhadap Kadar Haemoglobin (Hb) wanita hamil dengan Anemia	Mardiah, Yusuf Kristianto, Nurniati Tianastia Rullyni, Rita Ridayani, dan Rahmadona	2019	Anemia adalah salah satu penyakit yang mengakibatkan seseorang mengalami penurunan hemoglobin dalam darah sehingga dapat mengakibatkan dampak seperti, menurunnya kesehatan reproduksi, terhambatnya perkembangan motoric dan kecerdasan, menurunnya kemampuan berkonsentrasi dan focus belajar, mengganggu	hasil penelitian yang terlihat pada tabel 2 diketahui kadar Hb responden sebelum intervensi yang terendah adalah 8.0 gr% dan yang tertinggi 10.9 gr%. Setelah intervensi dilakukan terjadi kenaikan kadar Hb dimana yang terendah adalah 8.3 gr% dan tertinggi 11 gr%. Hasil penelitian menemukan beda rata-rata kadar Hb sebelum dan sesudah intervensi adalah 0.85 gr%. Hasil peningkatan kadar Hb ibu hamil ini, diasumsikan oleh peneliti sebagai pengaruh dari	Penelitian ini hanya menkankan pada peningkatan hemoglobil pada wanita hamil	Penelitian ini menggunakan desain eksperimen semu atau quasy experiment dengan rancangan one group pretest and posttest design. Populasi keseluruhan berjumlah 50 orang ibu hamil anemia dan dilakukan perhitungan sampel berdasarkan rumus Supranto J (2000) sehingga	Otak otak tempe bilis dapat meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah pada wanita hamil yang mengalami anemia

				pertumbuhan sehingga tumbuh badan tidak optimal, menurunkan kebugaran serta membuat wajah pucat.	pemberian otak-otak tempe bilis yang dikonsumsi ibu hamil, karena faktor pengganggunya sudah dikendalikan oleh peneliti dengan menyamakan karakteristik ibu hamil yang dijadikan sampel yaitu umur ibu hamil dalam rentang 20-35 tahun, multipara, usia kehamilan trimester tiga, mengonsumsi tablet Fe program pemerintah dan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi otal-otak tempe bilis.		diperoleh sampel 16 orang ibu hamil anemia yang diambil secara cluster random sampling di 4 (empat) kelurahan wilayah kerja Puskesmas Kota Tanjungpinang	
2.	Upaya Penurunan Anemia pada Remaja Putri dengan Deteksi	Umriaty, Tias Dwi Arti	2019	Dampak anemia yang terjadi pada remaja putri atau wanita masa reproduksi adalah menurunnya kesehatan reproduksi, terhambatnya perkembangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kenaikan kadar Hemoglobin pada pemberian tablet tambah darah mingguan, mingguan dan 10 hari	Pada penelitian ini hanya menggunakan sampel remaja putri sekolah jenjang SMK saja	Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pemberian informasi tentang anemia remaja,	Usia subur merupakan usia yang sangat bagus untuk mengandung dan memiliki anak

	Dini dan Suplementasi Zat Besi pada Siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			motoric mental dan kecerdasan, menurunnya konsentrasi belajar, mengganggu pertumbuhan tinggi bada sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal,, menurunkan kebugaran fisik serta membuat muka pucat.	masa menstruasi, serta mingguan dan pendidikan gizi. Tidak terdapat perbedaan yang nyata pada ketiga perlakuan tersebut ($p>0.05$). suplementasi besi secara mingguan memiliki efektifitas yang sama dengan mingguan dan selama menstruasi dalam meningkatkan kada Hemoglobin pada remaja putrid. Suplementasi besi pada remaja sebaiknya diberikan secara intermitten (mingguan) dengan manfaat tambahan yaitu tingginya kepatuhan konsumsi tablet tambah darah (Susanti et.a, 2016).		pemeriksaan kadar Hemoglobin dan pemberian tablet tambah darah. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 142 siswi yang terdiri dari 83 siswi di SMK 2 Kota Tegal dan 59 siswi di SMK 1 Dukuhhuri.	dikarenakan tubuh dan system vital masih kuat akan tetapi ketika remaja terkena anemia maka sangat disayangkan dan dapat mempengaruhi kesuburan
3.	Pengaruh Pemberian Teh Daun Kelor (Moringa Oleifera	Hamdiya , Asmah Sukarta	201	Faktor yng mengakibatkan anemia adalah makanan yang mengandung zat besih rendah karena	Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh nila p value 0.041 pada kelompok kontrol dan 0.000 pada kelompok intervensi, sehingga dapat	Penelitian ini lebih berfokus kepada nyeri disminore dan tidak terlalu berfokus pada anemia hanya saja	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain Quasi	Pada wanita yang mengalami disminore sangat rentang terjadi anemia

<p>Leaves) Terhadap Penurunan Dismenore Pada Remaja Putri Anemia Di Panti Asuhan Sejahtera Aisyiyah Kabupaten Sidrap</p>			<p>wanita sangat membutuhkan zat besi yang tinggi untuk memngimbangi pengeluaran seperti pendarahan yang terjadi saat disminore.</p>	<p>disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian teh daun kelor dan senam dismenore Terhadap Penurunan Nyeri Dismenore pada remaja Anemia di Panti Asuhan Sejahtera Aisyiah Kabupaten Sidrap. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rilla dkk mendapatkan hasil bahwa Terapi musik dan terapi murrotal memiliki efek terhadap efek terapi music dan terapi murrotal memiliki efek terhadap penurunan tingkat nyeri tetapi tidak memiliki efek yang signifikan terhadap kestabilan tanda-tanda vital pada pasien pasca bedah Anemia pada remaja dengan aktivitas yang kurang saat menstruasi dapat menyebabkan nyeri haid bertambah berat.</p>	<p>bisa mengatasi nyeri diminore dan menghambat pengeluaran darah dapat mengurangi kejadian anemia</p>	<p>Experiment non randomized control group pretest- posttest design, penelitian ini terdiri dari pengambilan data pretest (sebelum) dan posttest (setelah) untuk mengetahui keadaan sebelum dan setelah dilakukan intervensi dan rancangan ini menggunakan kelompok kontrol</p>	<p>yang diakibatkan ppengeluaran darah yang terlalu banyak akan mengakibatkan hemoglobin menurun atau di bawah normal.</p>
--	--	--	--	---	--	---	--

					<p>Jumlah darah yang dikeluarkan oleh penderita anemia juga lebih banyak. Dismenore berdampak pada remaja usia sekolah karena dapat menyebabkan terganggunya aktivitas belajar disekolah. Sehingga kegiatan pembelajaran pada remaja putri yang mengalami dismenore terganggu. Remaja putri memiliki resiko anemia karena setiap bulan terjadi pengeluaran darah atau menstruasi sehingga membutuhkan asupan zat gizi yang lebih banyak</p>			
4.	Perbedaan Kadar Hb Sebelum Dan Sesudah Pemberian Pisang	Fenni Dwi Andina, Chichiki, Nirmasari, Widayati	2018	Faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia adalah salah satunya Gangguan penyerapan zat besi gangguan penyerapan zat besi	Berdasarkan hasil penelitian sesudah dan sebelum intervensi menggunakan uji statistik nonparametric paired sample test mendapatkan p value sebesar 0,038	Penelitian ini hanya melihat perbedaan hb pada wanita yang mengonsumsi pisang ambon dan yang tidak	Penelitian ini menggunakan preeksperimental designs, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh	Penyebab utama terjadinya anemia pada wanita adalah polah hidup yang kurang

	<p>Ambon Pada Wanita Reproduksi Dengan Anemia Di Wilayah Kerja Puskesmas Sumowono</p>			<p>seperti terjadi kelainan traktus alimentarius sehingga penyerapan zat besi terhambat dan yang lainnya seperti kafein, tannin, fiat, zink, kalsium, fosfat, dan lain lain dapat menyebabkan terjadinya anemia pada wanita reproduksi yang harusnya memiliki Hb normal menjadi tidak normal</p>	<p>(<0.005) yang dapat disimpulkan bahwa buah pisang ambon efektif terhadap kenaikan kadar hemoglobin pada wanita reproduksi anemia. Hasil data statistik tersebut sudah membuktikan bahwa memang konsumsi pisang ambon secara rutin akan efektif bagi peningkatan kadar nilai Hb pada pada wanita reproduksi</p>		<p>terhadap terbentuknya variabel dependen dengan desain penelitian menggunakan rancangan one group pretest posttest, karena pada rancangan ini tidak menggunakan kelompok pembandingan (kontrol), tetapi pada desain penelitian ini dilakukan pretest sebelum diberi perlakuan, dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan keadaan sebelum</p>	<p>sehat dan stress serta makanan yang dikonsumsi yang dimana harus lebih tinggi dari pada pengeluaran yang ada sehingga dapat menjaga kadar hb dalam darah</p>
--	---	--	--	--	--	--	---	---

							diberi perlakuan	
5.	Status Anemia, Perilaku Dan Pengetahuan Gizi Serta Kesehatan Reproduksi Buruh Perempuan : Gambaran Kerentanan Kesehatan Reproduksi Buruh Perempuan Di Pabrik Bitratex Kecamatan	Siti Aminah Dan Setyo Irianto	2018	Mengetahui status anemia, perilaku dan pengetahuan tentang gizi serta kesehatan reproduksi buruh perempuan, sebagai gambaran kerentanan buruh perempuan.	Ditemukan 49 orang 55,7 % buruh perempuan berstatus anemia 2. Perilaku dan pengetahuan gizi buruh perempuan pada pabrik Bitratex adalah 47 Orang (53,4 %) berperilaku gizi baik dan 41 orang (46,6 %) berperilaku gizi kurang,, sedang pengetahuan gizi kategori sedang dan kurang 52 orang (59,1 %), katagori baik 36 orang (40,9 %) 3. Perilaku dan pengetahuan kesehatan reproduksi buruh perempuan pada pabrik Bitratex :berperilaku baik ada 51 orang (58 %) dan berperilaku kurang baik ada 37 orang (42 %), sedang pengetahuann	Penelitian ini hanya melihat status anemia yang terjadi pada remaja tanpa melihat ada atau tidaknya populasi status anemia tinggi atau tidaknya	Jenis penelitian adalah diskriptif analitik di bidang gizi masyarakat dengan pendekatan crossseksional. Tempat Penelitian Penelitian dilakukan di pabrik Bitratex di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan pertimbangan bahwa pada pabrik ini semua 85 % karyawannya adalah kaum perempuan.	Anemia yang terjadi pada usia remaja yang dipengaruhi oleh faktor gizi yang kurang dapat meningkatkan status anemia pada remaja putri

	n Pedurungan Kota Semarang				reproduksinya untuk kategori sedang dan kurang ada 45 orang (48,9 %) berpengetahuan baik ada 43 orang (46,7 %).			
6.	Analisis Pola Makan Dan Anemia Gizi Besi Pada Remaja Putri Kota Bengkulu	Desri Suryani, Riska Hafiani, Rinsesti Junita	2015	Faktor faktor yang memicu terjadinya kasus anemia pada wanita adalah gaya hidup dimana remaja dan wanita ingin memiliki penampilan menarik sehingga ia tidak menjaga pola hidupnya dengan baik sehingga mengakibatkan anemia.	Prevalensi anemia gizi besi pada remaja putri di Kota Bengkulu 43 %. Pengetahuan remaja tentang anemia kurang 44,75 % dan pola makan tidak baik sebanyak 79,25 %). Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia p value 0,349 . Tidak terdapat hubungan antara pola makan dengan kejadian anemia p value 0,11	Tidak ada hubungan pola makan dengan status anemia yang ada	Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain Cross sectional. Populasi adalah remaja putri SMP/SMA Se Kota Bengkulu yang terdiri dari 9 Kecamatan	Pola makan remaja sangat mempengaruhi terjadinya anemia karena siklus menstruasi yang mengakibatkan pendarahan dapat mengakibatkan lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan yangm memicu anemia
7.	Program edukasi	Silvia Dewi,	2020	Faktor yang mempegaruhi kasus	Penelitian pre-eksperimental dengan	Penelitian ini memiliki responden	Pemeriksaan kadar hemoglobin	Anemi dapat terjadi karena

	terpadu di sekolah berbasis asrama untuk pencegahan anemia pada remaja putri	dkk		anemia pada wanita adalah pola hidup yang berubah-ubah yang semula serba teratur menjadi tidak teratur.	rancangan one grup pretest-posttest. Sebanyak 66 siswi boarding school di SMPIT LHI Yogyakarta menjadi sampel penelitian (purposive sampling). Darah diambil melalui pembuluh kapiler dan kadar hemoglobin diperiksa menggunakan rapid test sebelum dan sesudah intervensi berupa edukasi. Edukasi diberikan secara terpisah kepada semua sasaran yang meliputi siswi, guru, pendamping asrama, orangtua, dan petugas dapur. Uji hipotesis menggunakan paired t-test.	66 orang dan membutuhkan waktu yang lama karena mengasramakan remaja putri	sebelum intervensi edukasi menunjukkan bahwa delapan dari 66 remaja putri terdeteksi anemia, rerata kadar hemoglobin 13,8 g/dl. Pemeriksaan kadar hemoglobin sesudah intervensi edukasi menunjukkan bahwa lima dari 66 remaja putri terdeteksi anemia, rerata kadar hemoglobin 14,4 g/dl. Uji hipotesis menggunakan paired t-test menunjukkan ada beda kadar hemoglobin sebelum dan sesudah intervensi	gaya hidup dan siklus menstruasi yang mengakibatkan banyaknya pengeluaran darah dari pada zat besi yang masuk yang memicu terjadinya penurunan hemoglobin yang mengakibatkan terjadinya anemia
--	--	-----	--	---	---	--	--	--

							(p<0,05)	
8.	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Anemia Pada Wanita Reproduksi Wilayah Kerja Puskesmas Medan Johor Tahun 2019	Plora Novita Febrina Sinaga	2020	Konsumsi Fe yang rutin pada wanita yang dicurigai anemia akan mencegah terjadinya anemia karena dapat mengimabngi antara pengeluaran yang ada sehingga kadar hemoglobin ada pada batas normal	Bahwa dari enam variabel terdapat empat variabel penelitian yang dominan berpengaruh terhadap kejadian anemia pada wanita di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Johor Tahun 2019 yaitu variabel umur (p value 0,006), pengetahuan (p value 0,000), (p value 0,007) dan kepatuhan konsumsi tablet Fe (p value 0,000). Pada variabel kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan nilai OR= 13,607 artinya bahwa wanita anemia yang tidak patuh dan teratur konsumsi tablet Fe secara rutin beresiko 13 kali lebih besar mengalami anemia tetap dibandingkan yang patuh dan teratur mengkonsumsi tablet Fe.	Melihat faktor faktor yang mempengaruhi kejadian anemia yang ada	enis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain penelitian case control. Case control adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara dua kelompok yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Studi kasus kontrol dilakukan dengan mengidentifikasi kelompok kasus dan kelompok kontrol, kemudian secara retrospektif diteliti	Fe sangat membantu untuk mengganti zat besi yang hilang pada tubuh wanita usia reproduksi sehingga dapat mengimbangi pengeluaran dan pemasukan

							faktorfaktor yang memengaruhi yang mungkin dapat menerangkan apakah kasus dan kontrol dapat terkena paparan atau tidak.	
9.	Efikasi Fortifikasi Sebagai Determinan Anemia Kehamilan Dengan Biskuit Sweet Potato (Ipomoea Batatas L.)	Yanuar Eka, dkk	2020	Faktor yang mempengaruhi kejadian anemia adalah status gizi pada ibu hamil dan kepatuhan terhadap konsumsi Fe yang dapat mengimbangi gizi dan mempertahankan hemoglobin	didapatkan nilai signifikansi $\alpha < 0,05$ yaitu nilai α adalah 0,007 terdapat pengaruh biskuit ubi jalar terhadap peningkatan kadar Hb	Menggunakan biskuit ubi jalar dalam meningkatkan Hb pada ibu hamil	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah true experiment. Populasi penelitian ini sebanyak 10 responden. Uji statistik menggunakan uji Wilcoxon	Penurunan HB dapat memengaruhi terjadinya anemia pada wanita baik ibu hamil maupun wanita reproduksi
10	Edukasi Kesehatan Tentang Resiko Anemia	Hainun Nisa, dkk	2020	Penurunan sel darah merah pada wanita adalah salah satu penyebab terjadinya anemia yang	Berdasarkan hasil penggalan persepsi remaja tentang anemia didapatkan bahwa masih ada remaja yang memiliki persepsi	Melakukan edukasi dalam penelitian tidak memiliki metode apa yang digunakan	Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan edukasi kesehatan	Edukasi kesehatan dapat menambah pengetahuan

<p>Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Putri Di Gor Candrabaga Kota Bekasi Tahun 2019</p>			<p>dipegaruhi oleh beberapa faktor seperti menstruasi, diet, dan kehamilan.</p>	<p>keliru seperti anemia merupakan tekanan darah rendah, masih terdapat remaja yang tidak tahu tentang penyebab anemia pada remaja dan resiko anemia terhadap kesehatan reproduksi remaja, Pelaksanaan edukasi kesehatan dilakukan dengan metode konseling oleh dosen dan mahasiswa STIKes Medistra Indonesia dengan materi pengertian anemia, penyebab serta dampak anemia pada kesehatan reproduksi remaja. Setelah mendapatkan konseling peserta membuat kesepakatan untuk</p>		<p>dengan menyediakan layanan konseling di GOR Candrabaga Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari Kesehatan Nasional</p>	<p>remaja wanita terhadap pengetahuan tentang anemia yang dapat membuat mereka dapat memelihara kesehatan</p>
--	--	--	---	---	--	---	---

Matriks Langkah 3

Matriks identifikasi masalah potensial

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Peer Group e-Posrem (Elektronik-Pos Remaja) untuk Tangkal Anemia Gizi pada Remaja Putri di Area Kerja UPTD Puskesmas Miroto Kota Semarang	Etika Ratna Noer, dkk	2020	Anemia adalah suatu penyakit yang mengakibatkan penurunan kadar HB pada penderitanya yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktivitas, masalah jantung seperti irama aritmia dan berakibat pada gagal jantung ketika tidak ditangani dengan tepat	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan produk berupa peer group pada remaja putri di area kerja UPTD Puskesmas Miroto Kota Semarang, aplikasi berbasis android e-PosRem yang berisi informasi terkait anemia gizi besi dan Posyandu Remaja yang berguna untuk memantau status kesehatan remaja di area kerja UPTD Puskesmas Miroto Kota Semarang. Penggunaan aplikasi berbasis android e-Posrem memerlukan bantuan dari tenaga IT sehingga secara	Penelitian ini tidak mencantumkan metode penelitian apa yang digunakan	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan produk berupa peer group pada remaja putri di area kerja UPTD Puskesmas	Ppaplikasi dalam penyuluhan sebagai proses penyaringan dan penyangkalan anemia pada remaja

					berkala membutuhkan pembaruan dan pengkajian terkait penggunaan aplikasi tersebut kepada kandidat terpilih			
2.	Aplikasi Pemberian Madu Terhadap Peningkatan Hemoglobin (Hb) Pada Remaja Putri Yang Mengalami Anemia	Noor Cholifah, Anisa Wulandari	2018	Anemia adalah penyakit yang diakibatkan oleh pengeluaran dari pada pemasukan yang biasa terjadi pada wanita usia reproduksi atau pun hamil yang jika tidak ditangani akan mengakibatkan beberapa penyakit lainnya seperti perubahan irama jantung yang bisa mengakibatkan gagal jantung.	Kadar Hb kelompok intervensi sebelum diberikan madu hutan terendah adalah 10,00 gr/dl dan kadar Hb tertinggi adalah 11,40 gr/dl. Kadar Hb kelompok intervensi sesudah diberikan madu hutan terendah adalah 12,10 gr/dl dan kadar Hb tertinggi adalah 13,40 gr/dl. Kadar Hb kelompok kontrol terendah adalah 9,40 gr/dl dan kadar Hb tertinggi adalah 10,70 gr/dl. Kadar Hb kelompok kontrol sesudah terendah adalah 9,40 gr/dl dan kadar Hb tertinggi adalah 10,90 gr/dl	Pada penelitian ini tidak dijelaskan aplikasi pemberian madu seperti apa dan SOP terkait pemberian madu	penelitian adalah Quesy eksperimen dengan menggunakan bentuk rancangan control group pre test-post tes. Metode pendekatan yang dipakai adalah case control study. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 71 siswasiswi sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 orang menggunakan	Pemberian madu hutan dapat menambah kadar Hb dalam darah sehingga dapat mencegah terjadinya atau pun mengobati anemia

							random sampling dengan mempertimbangan kriteria inklusi dan esklsi. Analisa bivariat yang digunakan adalah analisa uji t test dan uji wilcoxon	
3.	Kejadian Dysmenorrhea Primer Pada Mahasiswa Yang Mengalami Stress Dan Anemia	Nyimas Aziza	2015	pendarahan yang terjadi saat disminore adalah salah satu faktor terjadinya kasus anemia yang jika tidak ditangani akan mengakibatkan komplikasi gangguan paru-paru seperti hipertensi pulmonal.	hasil penelitian, proporsi stress dalam kategori stress sedang yaitu sebesar 50,93%, anemia sebesar 39,81% dan kejadian dysmenorrhea sebesar 30,55%. Hubungan antara stress dengan kejadian dysmenorrhea primer, hasil uji chi-square diperoleh p value 0,005 dan OR=3,7. Hubungan antara anemia dengan kejadian dysmenorrhea primer, hasil uji chi-square diperoleh p value 0,000	Penelitian ini lebih berfokus kepada nyeri disminore dan tidak terlalu berfokus pada anemia hanya saja bisa mengatasi nyeri disminore dan menghambat pengeluaran darah dapat mengurangi kejadian anemia	penelitian ini analitik dengan pendekatan cross sectional. Seluruh populasi dalam penelitian digunakan sebagai sampel sebanyak 108 orang. Pengumpulan data menggunakan alat ukur kuesioner, memeriksa Hb serta melakukan	Pada wanita yang mengalami disminore sangat rentang terjadi anemia yang diakibatkan ppengeluaran darah yang terlalu banyak akan mengakibatkan hemoglobin menurun atau di bawah

					dan OR=6,3		wawancara untuk mengetahui kejadian dysmenorrhea primer	normal.
4.	Hubungan Indeks Massa Tubuh Dengan Kejadian Anemia Pada Wanita Usia Subur Pranikah	Putri Engla, dkk	2019	Anemia pada remaja putri yang memiliki indeks massa tubuh yang berlebihan akan mengakibatkan komplikasi seperti mudah lelah dan mengakibatkan terjadinya penyakit jantung	Hasil penelitian menunjukkan WUS dengan IMT berlebih merupakan persentase terbesar (66,7%) yang ditemukan pada kelompok anemia. Tidak terdapat hubungan antara IMT dengan kejadian anemia dengan nilai $p > 0,05$. Kesimpulan penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara IMT dengan kejadian anemia.	Penelitian ini melihat indeks massa tubuh terhadap kejadian anemia	Penelitian ini berjenis analitik observasional dengan metode pendekatan cross sectional dilakukan pada 36 WUS pranikah (18 anemia dan 18 tidak anemia) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Pengambilan sampel dilakukan secara consecutive sampling. Pengukuran tinggi	Penyebab utama terjadinya anemia pada wanita adalah polah hidup yang kurang sehat dan stress serta makanan yang dikonsumsi yang dimana harus lebih tinggi dari pada pengeluaran yang ada sehingga dapat menjaga kadar hb dalam darah

							<p>badan menggunakan microtoice dan berat badan menggunakan timbangan pegas. Pemeriksaan hemoglobin dengan metode sianmethemoglobin di Laboratorium Biokimia Universitas Andalas. Uji Bivariat dilakukan dengan uji Chi Square</p>	
5.	<p>Profil Konsumsi Zat Gizi Pada Wanita Usia</p>	<p>Enggar Wijayanti, Ulfa Fitriani</p>	2019	<p>Faktor faktor yang mendorong remaja putri megalami anemia adalah menstruasi yang terjadi setiap bulannya</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar subjek memiliki status gizi normal. Tingkat konsumsi zat besi, asam folat, dan</p>	<p>Penelitian ini menerapkan komsumsi gizi padawanita subur</p>	<p>Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectional dan merupakan bagian dari</p>	<p>Anemia yang terjadi pada usia remaja yang dipegaruhi oleh faktor gizi</p>

	Subur Anemia			yang merupakan siklus menstruasi yang terjadi selama 28 hari selama kurang dari 7 hari, lama pendarahan 3-5 hari dengan jumlah darah yang dikeluarkan sekitar 30-40 cc kelihangan ini dapat memperparah kejadian anemia yang akan mengakibatkan terjadinya komplikasi yang serius seperti terjadinya gagal jantung	seng subjek kurang dari AKG, konsumsi energi dalam kategori cukup, dan konsumsi protein, vitamin A serta vitamin C lebih dari AKG. Hasil uji bivariat chi-square menunjukkan tidak ada korelasi yang bermakna antara status anemia dengan konsumsi zat gizi ($p>0,05$).		penelitian "Observasi Klinik Formula Jamu Anemia" yang dilakukan pada bulan Maret-Desember 2018. Jumlah subjek sebanyak 83 orang dengan rentang usia 16-49 tahun. Data konsumsi makanan dikumpulkan dengan wawancara menggunakan food recall 24 jam dan selanjutnya dianalisis dengan program Nutrisurvey	yang kurang dapat meningkatkan status anemia pada remaja putri jika tidak mengonsumsi gizi secara tepat dan tidak teratur
6.	Pengaruh Intervensi Penyuluha	Sutrio Syakir	2018	Faktor faktor yang memicu terjadinya kasus anemia pada	Hasil penelitian menunjukkan ada perubahan skor	Penelitian ini hanya melihat sikap dari remaja terhadap	penelitian adalah Pre-eksperimental dengan rancangan	Pola makan remaja sangat mempengaruhi

	n Gizi Dengan Media Animasi Terhadap Perubahan Pengetahuan Dan Sikap Tentang Anemia Pada Remaja Putri			wanita adalah gaya hidup dimana remaja wanita ingin memiliki penampilan menarik sehingga ia tidak menjaga pola hidupnya dengan baik sehingga mengakibatkan anemia yang bisa memicu terjadinya komplikasi jika tidak ditangani dengan baik	pengetahuan dan sikap setelah dilakukan intervensi dengan menggunakan media animasi ($p < 0,05$).	anemia	tes awal-akhir kelompok (onegroup pretest-posttest design). Variabel penelitian pengetahuan dan sikap yang diukur sebelum dan sesudah diberi penyuluhan gizi dengan media animasi	terjadinya anemia karena siklus menstruasi yang mengakibatkan pendarahan dapat mengakibatkan lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan yangm memicu anemia
7.	Program edukasi terpadu di sekolah berbasis asrama untuk pencegahan anemia pada	Silvia Dewi, dkk	2020	Komplikasi anemia bukan main main karena bisa mengakibatkan penyakit gagal jantung jika tidak dtangani secara serius	Penelitian pre-eksperimental dengan rancangan one grup pretest-posttest. Sebanyak 66 siswi boarding school di SMPIT LHI Yogyakarta menjadi sampel penelitian (purposive sampling). Darah diambil melalui pembuluh kapiler dan	Penelitian ini memiliki responden 66 orang dan membutuhkan waktu yang lama karena mengasramakan remaja putri	Pemeriksaan kadar hemoglobin sebelum intervensi edukasi menunjukkan bahwa delapan dari 66 remaja putri terdeteksi anemia, rerata kadar	Anemi dapat terjadi karena gaya hidup dan siklus menstruasi yang mengakibatkan banyaknya pengeluaran darah dari pada

	remaja putri				kadar hemoglobin diperiksa menggunakan rapid test sebelum dan sesudah intervensi berupa edukasi. Edukasi diberikan secara terpisah kepada semua sasaran yang meliputi siswi, guru, pendamping asrama, orangtua, dan petugas dapur. Uji hipotesis menggunakan paired t-test.		hemoglobin 13,8 g/dl. Pemeriksaan kadar hemoglobin sesudah intervensi edukasi menunjukkan bahwa lima dari 66 remaja putri terdeteksi anemia, rerata kadar hemoglobin 14,4 g/dl. Uji hipotesis menggunakan paired t-test menunjukkan ada beda kadar hemoglobin sebelum dan sesudah intervensi ($p < 0,05$)	zat besi yang masuk yang memicu terjadinya penurunan hemoglobin yang mengakibatkan terjadinya anemia
8.	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian	Plora Novita Febrina Sinaga	2020	Pola hidup yang kurang baik dan makan yang tidak teratur pada wanita yang setiap bulannya rutin menstruasi akan	Bahwa dari enam variabel terdapat empat variabel penelitian yang dominan berpengaruh terhadap kejadian anemia pada wanita di Wilayah Kerja	Melihat faktor faktor yang mempengaruhi kejadian anemia yang ada	enis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain penelitian case control. Case	Fe sangat membantu untuk mengganti zat besi yang hilang pada

Anemia Pada Wanita Reproduksi Wilayah Kerja Puskesmas Medan Johor Tahun 2019				rentang terjadi penyakit anemia yang mengakibatkan terjadinya komplikasi yang serius seperti rentang terjadi infeksi dan bisa mempengaruhi pertumbuhan pada remaja.	Puskesmas Medan Johor Tahun 2019 yaitu variabel umur (p value 0,006), pengetahuan (p value 0,000), (p value 0,007) dan kepatuhan konsumsi tablet Fe (p value 0,000). Pada variabel kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan nilai OR= 13,607 artinya bahwa wanita anemia yang tidak patuh dan teratur konsumsi tablet Fe secara rutin beresiko 13 kali lebih besar mengalami anemia tetap dibandingkan yang patuh dan teratur mengkonsumsi tablet Fe.		control adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara dua kelompok yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Studi kasus kontrol dilakukan dengan mengidentifikasi kelompok kasus dan kelompok kontrol, kemudian secara retrospektif diteliti faktor-faktor yang memengaruhi yang mungkin dapat menerangkan apakah kasus dan kontrol dapat terkena paparan atau tidak.	tubuh wanita usia reprodusi sehingga dapat mengimbangi pengeluaran dan pemasukan
--	--	--	--	---	--	--	---	--

9.	Pengaruh Konsumsi Cookies Kerang Dara (Anadara Granosa) terhadap Perubahan Kadar Haemoglobin Wanita Usia Subur	Vera Iriani Abdullah, C.H.Hau mahu	2020	Kejadian anemia yang diakibatkan oleh status gizi pada ibu hamil dan kepatuhan terhadap konsumsi Fe yang dapat mengimbangi gizi dan mempertahankan hemoglobin dapat memicu timbulnya komplikasi jika tidak ditangani dengan segera	Hasil berdasarkan uji statistik menggunakan T-Test, maka nilai tv 884 lebih besar dari nilai tabel 0,05, maka kesimpulannya adalah Ada Pengaruh Konsumsi Kue Kerang Dara (Anadara Granosa) Terhadap Meningkatnya Perempuan Bersalin Anak Hemoglobin Level di Desa Klaten di Distrik Aimas	Dosis terkait dan takaran cookies kerang pada penelitian ini tidak dijelaskan secara lengkap	Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu metode desain kelompok kontrol pretest-posttest. Populasi dari semua Wanita Melahirkan yang tinggal di Desa Klaten, dengan jumlah sampel 14 orang dibagi menjadi 2 kelompok: kontrol dan intervensi. Teknik pengumpulan data menggunakan random sampling	Penurunan HB dapat memengaruhi terjadinya anemia pada wanita baik ibu hamil maupun wanita reproduksi
10	Pengaruh Edukasi Pencegahan dan Penanganan Anemia	Sukmawati, dkk	2019	Penurunan sel darah merah pada wanita adalah salah satu penyebab terjadinya anemia yang dipengaruhi oleh	Hasil penelitian didapatkan rata-rata pengetahuan sebelum edukasi 51,97 sedangkan sesudah edukasi rata-rata 64,03 dan terdapat	Melakukan edukasi dalam penelitian tidak memiliki metode apa yang digunakan	Desain penelitian menggunakan metode Pre Eksperiment Design One Group dengan	Edukasi kesehatan dapat menambah pengetahuan remaja wanita

	Terhadap Pengeahuan dan Sikap Ibu Hamil			beberapa faktor seperti menstruasi, diet, dan kehamilan. Yang jika tidak ditangani akan mengakibatkan komplikasi baik komplikasi kehamilan maupun komplikasi jantung dan mempengaruhi pertumbuhan	perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi sebesar 8,06 dengan P-Value 0,000. rata-rata sikap sebelum edukasi 50,54 dan sesudah edukasi rata-rata sikap 69,73 serta terdapat perbedaan sikap sebelum dan sesudah edukasi sebesar 19,19 dengan P-Value 0,000		jenis Pre Test and Post Test Group. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berjumlah 37 orang	terhadap pengetahuan tentang anemia yang dapat membuat mereka dapat memelihara kesehatan
--	---	--	--	---	--	--	--	--

Matriks Langkah 4

Tindakan Kolaborasi dan Emergency

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Faktor Determinan Anemia Pada Wanita Dewasa Usia 23-35 Tahun	Erizka Marwita	2015	Dalam mengatasi kasus anemia dan mendeteksi tingginya kasus anemia maka asupan nutrisi dan pola hidup di ditekankan untuk menekan terjadinya kasus anemia pada wanita usia subur	Responden yang obesitas sebanyak 31 orang (50%), dan terdapat kejadian anemia sebanyak 9,7% . Sebanyak 40,3% wanita dewasa yang asupan folat kurang dari kebutuhan, sedangkan asupan protein, vitamin C, vitamin B12, folat, besi dan seng sebagian besar sudah dalam kategori cukup. Hasil analisis bivariat menunjukkan tidak ada korelasi bermakna antara status gizi menurut IMT , asupan protein, vitamin C, folat, vitamin B12, dan seng dengan kejadian anemia pada wanita dewasa ($p = > 0,05$). Ada	Penelitian ini hanya melihat anemia dari segi makanan dan gizi	Penelitian ini mampu mengatasi anemia yang terjadi dengan menekankan pentingnya menjaga nitroso dan gizi yang akan kita konsumsi	Pencegahan anemia ditinjau dari segi gizi akan tetapi anemia juga harus dijaga dari segi psikologi dan stress seorang wanita

					korelasi yang bermakna antara asupan zat besi dengan kejadian anemia ($p < 0,05$).			
2.	Pengaruh Pendidikan Gizi Metode Peer Educator Terhadap Perubahan Perilaku Remaja Putri Pada Pencegahan Anemia Defisiensi Besi Di Kota Semarang	Lu'lu'atul Khodijah, dkk	2018	beberapa penyakit lainnya seperti perubahan irama jantung yang bisa mengakibatkan gagal jantung adalah komplikasi anemia yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya maka dalam keadaan ini perlunya dilakukan edukasi terkait penyakit anemia dan bagaimana cara penanganannya	Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pengetahuan sebesar 1.98 ± 1.915 , sikap 2.35 ± 1.777 serta praktik 4.88 ± 1.472 pada kelompok intervensi. Saran penelitian setiap sekolah memiliki kegiatan Peer Educator yang membahas mengenai kesehatan pada remaja	Pada penelitian ini hanya mengedukasi kalangan remaja dan tidak mengedukasi kalangan ibu usia produksi	Penelitian ini menggunakan media edukasi untuk memberikan ilmu pengetahuan terkait anemia pada remaja putri jurnal ini merupakan jurnal langksp dan terakreditasi	Edukasi dalam bentuk modifikasi bentuk asrama lebih efektif terhadap pemberian pengetahuan terhadap remaja putri dalam pengetahuan anemia
3.	Pengukuran Peluang dan Prevalensi Anemia	Darmawati, dkk	2020	pendarahan yang terjadi pada wanita post partum ditangani dengan bekerjasama dengan ahligizi terkait	hasil bahwa 49.0% wanita postpartum mengalami anemia ringan, 10.8% mengalami anemia sedang, dan 40.2% lainnya tidak	Penelitian ini hanya melakukan penelitian untuk melihat anemia pada wanita post partum	Penelitian ini adalah penelitian yang melihat atau mendeteksi anemia atau tidak	Pada wanita yang post partum sangat rentan terjadi anemia yang

	Defisiensi Zat Besi pada Wanita Post Partum			makanan yang wajib dan baik untuk menambah kadar hemoglobin dalam darah	mengalami anemia. Ditemukan terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosiodemografi (usia, pendidikan, pendapatan) dengan kejadian anemia pada wanita postpartum (0.01; 0.039; 0.05). Usia, pendidikan, dan pendapatan keluarga merupakan faktor risiko yang berkorelasi terhadap anemia pada ibu postpartum		melalui kandungan zat besi yang ada dalam tubuh dan yang di konsumsi	diakibatkan pengeluaran darah yang terlalu banyak akan mengakibatkan hemoglobin menurun atau di bawah normal.
4.	Pengaruh Vigna Radiata Terhadap Anemia	Erindra Budi C, dkk	2019	Anemia pada remaja putri dapat dilihat melalui vigna dan dapat diatasi dengan bekerja sama dengan tenaga medis lainnya	Sebelum dilakukan intervensi, subjek dengan anemia sebanyak 12 orang, tidak anemia empat orang. Setelah intervensi, subjek dengan anemia sebanyak delapan orang, tidak anemia delapan orang. Uji beda Mc Nemar dengan taraf signifikansi 0.05 diperoleh nilai signifikansi	Penelitian ini tidak mempunyai SOP Vigna	Penelitian ini adalah penelitian yang melihat pengaruh dari vigna untuk mendeteksi penyakit anemia pada wanita	Faktor yang menyebabkan terjadinya anemia adalah makanan yang dikonsumsi yang dimana harus lebih tinggi dari pada pengeluaran

					(p) 0.03.			yang ada sehingga dapat menjaga kadar hb dalam darah
5.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Anemia Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Air Dingin Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang	Putri Aulia Azra, Bunga Ch Rosha2	2015	Faktor berhubungan dengan kasus anemia ibu hamil dipengaruhi oleh status gizi maka dari itu tindakan yang dilakukan untuk setiap ibu hamil adalah menekankan Fe dan mengonsumsi makanan yang tinggi akan gizi	Sebesar 69,4 persen ibu hamil mengalami anemia. Uji chi square menunjukkan hubungan bermakna antara umur kehamilan, suplementasi tablet besi, dan konsumsi (protein, lemak, vitamin c, dan zat besi) terhadap status anemia pada ibu hamil	Penelitian ini hanya mencantumkan beberapa faktor yang mempercepat anemia terjadi pada ibu hamil	Jenis penelitian ini Cross sectional. Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui pengisian kuesioner dan sampel diambil dengan cara Simple Random Sampling	Anemia yang terjadi pada ibu hamil akibat kekurangan zat besi
6.	Pengaruh Intervensi Penyuluhan	Sutrio Syakir	2018	Faktor faktor yang memicu terjadinya kasus anemia pada	Hasil penelitian menunjukkan ada perubahan skor	Penelitian ini hanya melihat sikap dari remaja terhadap	penelitian adalah Pre-eksperimental dengan rancangan	Pola makan remaja sangat mempengaruhi

	n Gizi Dengan Media Animasi Terhadap Perubahan Pengetahuan Dan Sikap Tentang Anemia Pada Remaja Putri			wanita adalah gaya hidup dimana remaja wanita ingin memiliki penampilan menarik sehingga ia tidak menjaga pola hidupnya dengan baik sehingga mengakibatkan anemia	pengetahuan dan sikap setelah dilakukan intervensi dengan menggunakan media animasi ($p < 0,05$).	anemia	tes awal-akhir kelompok (onegroup pretest-posttest design). Variabel penelitian pengetahuan dan sikap yang diukur sebelum dan sesudah diberi penyuluhan gizi dengan media animasi	terjadinya anemia karena siklus menstruasi yang mengakibatkan pendarahan dapat mengakibatkan lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan yangm memicu anemia
7.	Prevalensi Dan Faktor Risiko Anemia Pada Wanita Usia Subur Di Rumah	Sudikno	2016	anemia bukan penyakit yang ganas akan tetapi bisa mengakibatkan penakit gagal jantung jika tidak dtangani secara serius, maka dari itu kita harus memperbaiki asupan nutrisi dan mencegah	Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gartner A, dkk.26 pada WUS di Maroko dan Tunisia, Wilunda C, dkk.30 di Tanzania. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan kejadian anemia pada WUS yang belum kawin	Pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya hubungan antara status kawin dengan risiko kejadian anemia	Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Sampel sebanyak 146	pengeluaran darah dari pada zat besi yang masuk yang memicu terjadinya penurunan hemoglobin yang mengakibatkan

	Tangga Miskin Di Kabupaten Tasikmalaya Dan Ciamis, Provinsi Jawa Barat			secara dini	dibandingkan WUS yang sudah kawin.		WUS dari rumahtangga miskin di 24 desa peri-urban yang terpilih. Kriteria inklusi meliputi WUS yang sehat, usia 15-35 tahun, tidak menderita penyakit serius (kronis atau akut), dan tidak mengalami anemia yang serius (terjadinya anemia
8.	Laporan Tugas Akhir Asuhan Kebidanan Pada Ny."H" Dengan Anemia Sedang Di Wilayah	Andi wahyuni	2017	Pola hidup yang kurang baik dan makan yang tidak teratur pada wanita yang setiap bulang rutin menstruasi akan rentang terjadi penyakit anemia yang mengakibatkan terjadinya komplikasi yang serius seperti	Penganan anemia sedang dengan melakukan edukasi terhadap ny H melalui edukasi gizi dan perubahan pola hidup yang baik dalap mengubah perilaku klien	Penelitian ini hanya menggunakan 1 pasien	Studi kasus atau case study pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan menurut varney yang terdiri dari 7	Fe sangat memvantu untuk mengganti zat besi yang hilang pada tubuh wanita usia repsoduksi sehingga dapat mengimbangi

	Kerja Puskesmas Gunung			rentang terjadi infeksi dan bisa mempengaruhi pertumbuhan pada remaja.			langkah	pengeluaran dan pemasukan
9.	Rasio Prevalensi Anemia Ibu Bersalin Terhadap Kejadian Persalinan Preterm Di Rsud Wonosari Tahun 2016	Noviana, dkk	2017	Kejadian anemia yang diakibatkan oleh status gizi pada ibu post partum dan kepatuhan terhadap konsumsi Fe yang dapat mengimbangi gizi dan mempertahankan hemoglobin	Hasil analisis RP=2,115. Penelitian ini menunjukkan bahwa ibu bersalin dengan anemia berpeluang mengalami persalinan preterm 2,115 kali lebih besar dibandingkan ibu bersalin yang tidak anemia. (CI:1,330-3,365).	Pada penelitian ini hanya melihat rasio prevalensi	Penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain cross setiona	Penurunan HB dapat memngaruhi terjadinya anemia pada wanita baik ibu hamil maupun wanita resproduksi
10	Substitusi tepung daun kelor (Moringa oleifera L.) pada cookies terhadap	Devillya Puspita Dewi	2018	Penurunan sel darah merah pada wanita adalah salah satu penyebab terjadinya anemia yanh dipegaruhi oleh beberapa faktor seperti menstruasi,	Cookies B memiliki warna kehijauan, sedikit beraroma daun kelor, rasa manis dan teksturnya agak keras. Kadar protein, lemak, abu, dan Fe tertinggi terdapat pada cookies D yaitu 11,95%;	Penelitian ini sangat suit untuk di aplikasikan untuk masyarakat	Jenis penelitian True Experimental. Rancangan yang digunakan Rancangan Acak Sederhana dengan empat variasi	Konsumsi makanan dan Edukasi kesehatan dapat menambah pengetahuan remaja wanita

	sifat fisik, sifat organoleptik, kadar proksimat, dan kadar Fe			diet, dan kehamilan. Maka dari itu dibutuhkan pemenuhan nutrisi bagi wanita seperti zat besi dan pengetahuan dengan cara edukasi yang baik adalah tindakan emergensi yang dilakukan sebelum terjadinya anemia	16,52%; 3,665%; dan 31,52 ppm. Kadar karbohidrat dan air tertinggi terdapat pada cookies A yaitu 62,485% dan 15,77%.		cookies substitusi tepung daun kelor yaitu 0%, 40%, 50%, dan 60%. Data dianalisis dengan uji Kruskal-Wallis dan Mann Whitney serta uji Anova	terhadap pengetahuan tentang anemia yang dapat membuat mereka dapat memelihara kesehatan
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Matriks Langkah 5

Matriks intervensi

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Uji Manfaat Kapsul Kelor Untuk Pengobatan	Andi Hasliani	2016	Penanganan terkait anemia adalah uji kapsul kelor untuk mengobati ibu hamil yang menderita anemia dengan cara	berdasarkan uji Wilcoxon didapatkan P value $0,00 < \alpha 0,05$. Terjadi peningkatan kadar hemoglobin yang signifikan pada ibu hamil	Penelitian intervensi yang melakukan uji coba kapsul kelor	Penelitian ini menggunakan desain penelitian quasi eksperiment dengan pretest and post test	aplikasi penelitian intervensi pemberian kapsul kelor dapat

	n Anemia Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Padang Lampe Dan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep			peneingkatan hemoglobing	anemia setelah diberikan kapsul kelor selama dua bulan		design	meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah pada ibu hamil yang mnengalami anemia
2.	Pengaruh Distribusi Makanan, Beban Ganda Dan Pengambilan Keputusan Terhadap Anemia Dalam Kehamilan Di Wilayah	Juraida Roito Harahap	2016	Anemia adalah penyakit yang diakibatkan oleh pengeluaran dari pada pemasukan yang biasa terjadi pada wanita usia reproduksi atau pun hamil yang jika tidak ditangani akan mengakibatkan beberapa penyakit lainnya seperti perubahan irama jantung yang bisa mengakibatkan gagal	Dari hasil analisis didapat sebagian besar ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2011 mengalami anemia dalam kehamilan (64,6%). Keadaan ini menunjukkan angka yang lebih tinggi dari angka anemia di Kabupaten Kampar sebesar 56,32%. Angka yang didapat pada penelitian ini juga lebih	Pada penelitian ini tidak dijelaskan SOP terkait distribusi dan tidak mencantumkan metode penelitian	Distribusi makan dengan gizi seimbaqng buntut meningkatkan hemoglobin pada penderit anemia	Makanan yang mengandung zat besi menjadi proses yang dapat mencegah terjadinya atau pun mengobati anemia

	Kerja Puskesmas Rumbio Jaya Kabupaten Kampar			jantung.	tinggi dari kejadian anemia di Provinsi Riau (48%) dan SDKI tahun 2001 sebesar 40,1%.			
3.	Pengaruh Otak-Otak Tempe Bilis terhadap Kadar Haemoglobin (Hb) Ibu Hamil dengan Anemia	Mardiah, dkk	2019	Otak otak tempe bilis adalah salasatu intervensi yang digunakan dan mampu menungkatkan kardar hemoglobin dalam darah pada ibu hamil yang menderita anemia	Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kadar Hb meningkat 0,85 gr% setelah diberikan makanan otak-otak tempe bilis dengan p value 0,000	Dalam penelitian ini hanya mempunyai 16 sampel dan SOP pemberian tidak dijelaskan	kuasi eksperimen dengan rancangan one group pre and post test dan jumlah sampel 16 ibu hamil dengan anemia yang diberikan makanan otak-otak tempe bilis selama 10 hari	Pada wanita yang menderita anemia mengakibatkan hemoglobin menurun atau di bawah normal. salah atu penaganannya adalah dengan mengomsumsi makanan yang bergizi dan dapat meningkatkan Hb

4.	Pengaruh Pemberian Teh Daun Kelor (Moringa Oleifera Leaves) Terhadap Penurunan Dismenore Pada Remaja Putri Anemia Di Panti Asuhan Sejahtera Aisyiyah Kabupaten Sidrap	Hamdiya , Asmah Sukarta	2019	Anemia pada remaja putri yang memiliki indeks massa tubuh yang berlebihan akan mengakibatkan komplikasi seperti mudah lelah dan mengakibatkan terjadinya penyakit jantung untuk megatasi itu maka dilakukan penelitian pemberian the daun kelor untuk meningkatkan kadar Hb dalam arah	Hasil penelitian yaitu nilai p value 0.041 pada kelompok kontrol dan 0.000 pada kelompok intervensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian teh daun kelor dan senam dismenore Terhadap Penurunan Nyeri Dismenore pada remaja Anemia di Panti Asuhan Sejahtera Aisyiyah Kabupaten Sidra	Pembuatan alat penelitian ini sangat bsulit dan tidak ada SOP terkait pembuatan	penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain Quasi Experiment non randomized control group pretest- posttest design	Anemia adalah penyakit yang diakibatkan oleh menrunnya kadar Hb dalam darah untuk meningkatkan Hb dalam darah maka dibutuhkan makanan yang bergizi yang dapat meningkatkan Hb
5.	Program edukasi terpadu di sekolah berbasis asrama	Silvia Dewi, dkk	2020	Untuk melakukan pencegahan primer adalah melakukan edukasi kepada remaja wanita yang renatang terhadap anemia	Pemeriksaan kadar hemoglobin sebelum intervensi edukasi menunjukkan bahwa delapan dari 66 remaja putri terdeteksi anemia,	Terkait kait pemberian edukasi tidak dijelaskan SOP terkait dengan pelaksanaan kegiatan	Penelitian yang dilakukan adalah edukasi terkait melakukan dengan cara mengasramakan	Anemia yang terjadi pada usia remaja yang dipegaruhi oleh faktor gizi

	untuk pencegahan anemia pada remaja putri				rerata kadar hemoglobin 13,8 g/dl. Pemeriksaan kadar hemoglobin sesudah intervensi edukasi menunjukkan bahwa lima dari 66 remaja putri terdeteksi anemia, rerata kadar hemoglobin 14,4 g/dl. Uji hipotesis menggunakan paired t-test menunjukkan ada beda kadar hemoglobin sebelum dan sesudah intervensi ($p < 0,05$)		responden	yang kurang dapat meningkatkan status anemia pada remaja putri jika tidak mengonsumsi gizi secara tepat dan tidak teratur
6.	Pengaruh Intervensi Penyuluhan Gizi Dengan Media Animasi Terhadap Perubahan Pengetahuan Dan	Sutrio Syakir	2018	Untuk melakukan pencegahan primer adalah melakukan edukasi kepada remaja wanita yang matang terhadap anemia dengan menggunakan media animasi	Hasil penelitian menunjukkan ada perubahan skor pengetahuan dan sikap setelah dilakukan intervensi dengan menggunakan media animasi ($p < 0,05$).	Penelitian ini hanya melihat sikap dari remaja terhadap anemia	penelitian adalah Pre-eksperimental dengan rancangan tes awal-akhir kelompok (onegroup pretest-posttest design). Variabel penelitian pengetahuan dan sikap yang diukur	Pola makan remaja sangat mempengaruhi terjadinya anemia karena siklus menstruasi yang mengakibatkan pendarahan dapat

	Sikap Tentang Anemia Pada Remaja Putri						sebelum dan sesudah diberi penyuluhan gizi dengan media animasi	mengakibatkan lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan yangm memicu anemia
7.	Program edukasi terpadu di sekolah berbasis asrama untuk pencegahan anemia pada remaja putri	Silvia Dewi, dkk	2020	Komplikasi anemia bukan main main karena bisa mengakibatkan penakit gagal jantung jika tidak dtangani secara serius	Penelitian pre-eksperimental dengan rancangan one grup pretest-posttest. Sebanyak 66 siswi boarding school di SMPIT LHI Yogyakarta menjadi sampel penelitian (purposive sampling). Darah diambil melalui pembuluh kapiler dan kadar hemoglobin diperiksa menggunakan rapid test sebelum dan sesudah intervensi berupa edukasi. Edukasi diberikan secara terpisah kepada semua sasaran yang meliputi siswi, guru,	Penelitian ini memiliki responden 66 orang dan membutuhkan waktu yang lama karena mengasramakan remaja putri	Pemeriksaan kadar hemoglobin sebelum intervensi edukasi menunjukkan bahwa delapan dari 66 remaja putri terdeteksi anemia, rerata kadar hemoglobin 13,8 g/dl. Pemeriksaan kadar hemoglobin sesudah intervensi edukasi menunjukkan bahwa lima dari 66 remaja putri	Anemi dapat terjadi karena gaya hidup dan siklus menstruasi yang mengakibatkan banyaknya pengeluaran darah dari pada zat besi yang masuk yang memicu terjadinya penurunan hemoglobin yang mengakibatkan

					pendamping asrama, orangtua, dan petugas dapur. Uji hipotesis menggunakan paired t-test.		terdeteksi anemia, rerata kadar hemoglobin 14,4 g/dl. Uji hipotesis menggunakan paired t-test menunjukkan ada beda kadar hemoglobin sebelum dan sesudah intervensi ($p < 0,05$)	terjadinya anemia
8.	Aplikasi Pemberian Madu Terhadap Peningkatan Hemoglobin (Hb) Pada Remaja Putri Yang Mengalami Anemia	Noor Cholifah, Anisa Wulandari	2018	Peanganan anemia untuk meningkatkan Hb dalam darah adalah dengan melakukan pemberian madu menggunakan aplikasi	Kadar Hb kelompok intervensi sebelum diberikan madu hutan terendah adalah 10,00 gr/dl dan kadar Hb tertinggi adalah 11,40 gr/dl. Kadar Hb kelompok intervensi sesudah diberikan madu hutan terendah adalah 12,10 gr/dl dan kadar Hb tertinggi adalah 13,40 gr/dl. Kadar Hb kelompok kontrol terendah adalah	Tidak dijelaskan terkait SOP pemberian madu	penelitian adalah Quesy eksperimen dengan menggunakan bentuk rancangan control group pre test-post tes. Metode pendekatan yang dipakai adalah case control study. Populasi dalam penelitian	Fe sangat memantu untuk mengganti zat besi yang hilang pada tubuh wanita usia reprodksi sehingga dapat mengimbangi pengeluaran dan pemasukan

					9,40 gr/dl dan kadar Hb tertinggi adalah 10,70 gr/dl. Kadar Hb kelompok kontrol sesudah terendah adalah 9,40 gr/dl dan kadar Hb tertinggi adalah 10,90 gr/dl		ini sebanyak 71 siswaswi sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 orang menggunakan random sampling dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eskluasi	
9.	Pengaruh Konsumsi Cookies Kerang Dara (Anadara Granosa) terhadap Perubahan Kadar Haemoglobin Wanita Usia Subur	Vera Iriani Abdulla, C.H.Hau mahu	2020	Kejadian anemia yang diakibatkan oleh status gizi pada ibu hamil dan kepatuhan terhadap konsumsi Fe yang dapat mengimbangi gizi dan mempertahankan hemoglobin dapat memicu timbulnya komplikasi jika tidak ditangani dengan segera maka untuk meningkatkan kadar	Hasil berdasarkan uji statistik menggunakan T-Test, maka nilai tv 884 lebih besar dari nilai ttabel 0,05, maka kesimpulannya adalah Ada Pengaruh Konsumsi Kue Kerang Dara (Anadara Granosa) Terhadap Meningkatnya Perempuan Bersalin Anak Hemoglobin Level di Desa Klaigit di Distrik Aimas	Dosis terkait dan takarang coocis kerang pada penelitian ini tidak dijelaskan secara lengkap	Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu metode desain kelompok kontrol pretest-posttest. Populasi dari semua Wanita Melahirkan yang tinggal di Desa Klaigit, dengan jumlah sampel 14 orang dibagi menjadi 2	Penurunan HB dapat memngaruhi terjadinya anemia pada wanita baik ibu hamil maupun wanita reproduksi

				tromvosit dalam darah dilakukan pemberian cookies kerang			kelompok: kontrol dan intervensi. Teknik pengumpulan data menggunakan random sampling	
10	Pengaruh Edukasi Pencegahan dan Penanganan Anemia Terhadap Pengeahuan dan Sikap Ibu Hamil	Sukmawati, dkk	2019	Penurunan sel darah merah pada wanita adalah salah satu penyebab terjadinya anemia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti menstruasi, diet, dan kehamilan. Yang jika tidak ditangani akan mengakibatkan komplikasi baik komplikasi kehamilan maupun komplikasi jantung dan mempengaruhi pertumbuhan	Hasil penelitian didapatkan rata-rata pengetahuan sebelum edukasi 51,97 sedangkan sesudah edukasi rata-rata 64,03 dan terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi sebesar 8,06 dengan P-Value 0,000. rata-rata sikap sebelum edukasi 50,54 dan sesudah edukasi rata-rata sikap 69,73 serta terdapat perbedaan sikap sebelum dan sesudah edukasi sebesar 19,19 dengan P-Value 0,000	Melakukan edukasi dalam penelitian tidak memiliki metode apa yang digunakan	Desain penelitian menggunakan metode Pre Eksperiment Design One Group dengan jenis Pre Test and Post Test Group. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berjumlah 37 orang	Edukasi kesehatan dapat menambah pengetahuan remaja wanita terhadap pengetahuan tentang anemia yang dapat membuat mereka dapat memelihara kesehatan

Matriks Langkah 6

Matriks Implementasi

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Uji Manfaat Kapsul Kelor Untuk Pengobatan Anemia Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Padang Lampe Dan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep	Andi Hasliani	2016	Melakukan implementasi Penanganan terkait anemia adalah uji kapsul kelor untuk mengobati ibu hamil yang menderita anemia dengan cara peningkatan hemoglobing	berdasarkan uji Wilcoxon didapatkan P value $0,00 < a 0,05$. Terjadi peningkatan kadar hemoglobin yang signifikan pada ibu hamil anemia setelah diberikan kapsul kelor selama dua bulan	Penelitian intervensi yang melakukan uji coba kapsul kelor	Penelitian ini menggunakan desain penelitian quasi eksperiment dengan pretest and post test design	aplikasi penelitian intervensi pemberian kapsul kelor dapat meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah pada ibu hamil yang mengalami anemia
2.	Pengaruh Distribusi Makanan, Beban	Juraida Roito Harahap	2016	Melakukan implementasi Anemia adalah penyakit yang diakibatkan oleh	Dari hasil analisis didapat sebagian besar ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Rumbio Jaya	Pada penelitian ini tidak dijelaskan SOP terkait distribusi dan tidak mencantumkan	Distribusi makan dengan gizi seimbang buntut meningkatkan	Makanan yang mengandung zat besi menjadi proses

	Ganda Dan Pengambilan Keputusan Terhadap Anemia Dalam Kehamilan Di Wilayah Kerja Puskesmas Rumbio Jaya Kabupaten Kampar			melakukan implementasi terkait penanganan anemia melalui menghitung pengeluaran dari pada pemasukan yang biasa terjadi pada wanita usia reproduksi atau pun hamil yang jika tidak ditangani akan mengakibatkan beberapa penyakit lainnya seperti perubahan irama jantung yang bisa mengakibatkan gagal jantung.	Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2011 mengalami anemia dalam kehamilan (64,6%). Keadaan ini menunjukkan angka yang lebih tinggi dari angka anemia di Kabupaten Kampar sebesar 56,32%. Angka yang didapat pada penelitian ini juga lebih tinggi dari kejadian anemia di Provinsi Riau (48%) dan SDKI tahun 2001 sebesar 40,1%.	metode penelitian	hemoglobin pada penderita anemia	yang dapat mencegah terjadinya atau pun mengobati anemia
3.	Pengaruh Otak-Otak Tempe Bilis terhadap Kadar Haemoglobin (Hb) Ibu Hamil	Mardiah, dkk	2019	Implementasi Otak otak tempe bilis yang digunakan dan mampu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah pada ibu hamil yang menderita anemia	Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kadar Hb meningkat 0,85 gr% setelah diberikan makanan otak-otak tempe bilis dengan p value 0,000	Dalam penelitian ini hanya mempunyai 16 sampel dan SOP pemberian tidak dijelaskan	kuasi eksperimen dengan rancangan one group pre and post test dan jumlah sampel 16 ibu hamil dengan anemia yang diberikan makanan otak-	Pada wanita yang menderita anemia mengakibatkan hemoglobin menurun atau di bawah normal.salah

	dengan Anemia						otak tempe bilis selama 10 hari	atu penaganannya adalah dengan mengomsumsi makanan yang bergizi dan dapat meningkatkan Hb
4.	Pengaruh Pemberian Teh Daun Kelor (Moringa Oleifera Leaves) Terhadap Penurunan Dismenore Pada Remaja Putri Anemia Di Panti Asuhan Sejahtera	Hamdiya , Asmah Sukarta	2019	Implelentasi yang dilakukan pada pasien Anemia pada remaja putri yang memiliki indeks massa tubuh yang berlebihan akan mengakibatkan komplikasi seperti mudah lelah dan mengakibatkan terjadinya penyakit jantung untuk megnatasi itu maka dilakukan penelitian pemberian the daun kelor untuk meningkatkan kadar	Hasil penelitian yaitu nilai p value 0.041 pada kelompok kontrol dan 0.000 pada kelompok intervensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian teh daun kelor dan senam dismenore Terhadap Penurunan Nyeri Dismenore pada remaja Anemia di Panti Asuhan Sejahtera Aisiyah Kabupaten Sidra	Pembuatan alat penelitian ini sangat bsulit dan tidak ada SOP terkait pembuatan	penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain Quasi Experiment non randomized control group pretest- posttest design	Anemia adalah penyakit yang diakibatkan oleh menrungnya kadar Hb dalam darah untuk meningkatkan Hb dalam darah maka dibutuhkan makanan yang bergizi yang dapat meningkatkan Hb

	Aisyiyah Kabupaten Sidrap			Hb dalam arah				
5.	Program edukasi terpadu di sekolah berbasis asrama untuk pencegahan anemia pada remaja putri	Silvia Dewi, dkk	2020	Implementasi yang dilakukan pencegahan primer adalah melakukan edukasi kepada remaja wanita yang renatang terhadap anemia	Pemeriksaan kadar hemoglobin sebelum intervensi edukasi menunjukkan bahwa delapan dari 66 remaja putri terdeteksi anemia, rerata kadar hemoglobin 13,8 g/dl. Pemeriksaan kadar hemoglobin sesudah intervensi edukasi menunjukkan bahwa lima dari 66 remaja putri terdeteksi anemia, rerata kadar hemoglobin 14,4 g/dl. Uji hipotesis menggunakan paired t-test menunjukkan ada beda kadar hemoglobin sebelum dan sesudah intervensi ($p < 0,05$)	Terkait kait pemberian edukasi tidak dijelaskan SOP terkait dengan pelaksanaan kegiatan	Penelitian yang dilakukan adalah edukasi terkait melakukan dengan cara mengasramakan responden	Anemia yang terjadi pada usia remaja yang dipengaruhi oleh faktor gizi yang kurang dapat meningkatkan status anemia pada remaja putri jika tidak mengonsumsi gizi secara tepat dan tidak teratur


6.	Pengaruh Intervensi Penyuluhan Gizi Dengan Media Animasi Terhadap Perubahan Pengetahuan Dan Sikap Tentang Anemia Pada Remaja Putri	Sutrio Syakir	2018	Untuk melakukan pencegahan primer adalah melakukan edukasi kepada remaja wanita yang renatang terhadap anemia dengan menggunakan media animasi adalah implementasi yang baik dilakukan untuk menangani anemia	Hasil penelitian menunjukkan ada perubahan skor pengetahuan dan sikap setelah dilakukan intervensi dengan menggunakan media animasi ($p < 0,05$).	Penelitian ini hanya melihat sikap dari remaja terhadap anemia	penelitian adalah Pre-eksperimental dengan rancangan tes awal-akhir kelompok (onegroup pretest-posttest design). Variabel penelitian pengetahuan dan sikap yang diukur sebelum dan sesudah diberi penyuluhan gizi dengan media animasi	Pola makan remaja sangat mempengaruhi terjadinya anemia karena siklus menstruasi yang mengakibatkan pendarahan dapat mengakibatkan lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan yangm memicu anemia
7.	Program edukasi terpadu di sekolah berbasis asrama untuk	Silvia Dewi, dkk	2020	Implementasi yang baik dilakukan adalah yang terbukti memberikan pengetahuan tentang pencegahan anemia melalui edukasi yang	Penelitian pre-eksperimental dengan rancangan one grup pretest-posttest. Sebanyak 66 siswi boarding school di SMPIT LHI Yogyakarta menjadi sampel penelitian	Penelitian ini memiliki responden 66 orang dan membutuhkan waktu yang lama karena mengasramakan remaja putri	Pemeriksaan kadar hemoglobin sebelum intervensi edukasi menunjukkan bahwa delapan dari 66 remaja	Anemi dapat terjadi karena gaya hidup dan siklus menstruasi yang mengakibatkan

	pencegahan anemia pada remaja putri			merupakan pencegahan primer	(purposive sampling). Darah diambil melalui pembuluh kapiler dan kadar hemoglobin diperiksa menggunakan rapid test sebelum dan sesudah intervensi berupa edukasi. Edukasi diberikan secara terpisah kepada semua sasaran yang meliputi siswi, guru, pendamping asrama, orangtua, dan petugas dapur. Uji hipotesis menggunakan paired t-test.		putri terdeteksi anemia, rerata kadar hemoglobin 13,8 g/dl. Pemeriksaan kadar hemoglobin sesudah intervensi edukasi menunjukkan bahwa lima dari 66 remaja putri terdeteksi anemia, rerata kadar hemoglobin 14,4 g/dl. Uji hipotesis menggunakan paired t-test menunjukkan ada beda kadar hemoglobin sebelum dan sesudah intervensi ($p < 0,05$)	banyaknya pengeluaran darah dari pada zat besi yang masuk yang memicu terjadinya penurunan hemoglobin yang mengakibatkan terjadinya anemia
8.	Aplikasi Pemberian Madu	Noor Cholifah, Anisa	2018	Peanganan anemia adalah bentuk implementasi untuk	Kadar Hb kelompok intervensi sebelum diberikan madu hutan	Tidak dijelaskan terkait SOP pemberian madu	penelitian adalah Quesy eksperimen	Fe sangat memvantu untuk

	Terhadap Peningkatan Hemoglobin (Hb) Pada Remaja Putri Yang Mengalami Anemia	Wulandari		meningkatkan Hb dalam darah adalah dengan melakukan pemberian madu menggunakan aplikasi	terendah adalah 10,00 gr/dl dan kadar Hb tertinggi adalah 11,40 gr/dl. Kadar Hb kelompok intervensi sesudah diberikan madu hutan terendah adalah 12,10 gr/dl dan kadar Hb tertinggi adalah 13,40 gr/dl. Kadar Hb kelompok kontrol terendah adalah 9,40 gr/dl dan kadar Hb tertinggi adalah 10,70 gr/dl. Kadar Hb kelompok kontrol sesudah terendah adalah 9,40 gr/dl dan kadar Hb tertinggi adalah 10,90 gr/dl		dengan menggunakan bentuk rancangan control group pre test-post tes. Metode pendekatan yang dipakai adalah case control study. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 71 siswaswi sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 orang menggunakan random sampling dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eskresi	menganti zat besi yang hilang pada tubuh wanita usia reprodusi sehingga dapat mengimbangi pengeluaran dan pemasukan
9.	Pengaruh Konsumsi Cookies	Vera Iriani Abdulla,	2020	Implementasi dengan mengimsumsi makanan g komsumsi	Hasil berdasarkan uji statistik menggunakan T-Test, maka nilai tv 884	Dosis terkait dan takarang coocis kerang pada	Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu	Penurunan HB dapat memngaruhi

	Kerang Dara (Anadara Granosa) terhadap Perubahan Kadar Haemoglobin Wanita Usia Subur	C.H.Haumu		Fe yang dapat mengimbangi gizi dan mempertahankan hemoglobin dapat memicu timbulnya implelentasi untuk meningkatkan kadar Hb dalam darah dilakukan pemberian cookies kerang	lebih besar dari nilai ttabel 0,05, maka kesimpulannya adalah Ada Pengaruh Konsumsi Kue Kerang Dara (Anadara Granosa) Terhadap Meningkatnya Perempuan Bersalin Anak Hemoglobin Level di Desa Klaigit di Distrik Aimas	penelitian ini tidak dijelaskan secara lengkap	metode desain kelompok kontrol pretest-posttest. Populasi dari semua Wanita Melahirkan yang tinggal di Desa Klaigit, dengan jumlah sampel 14 orang dibagi menjadi 2 kelompok: kontrol dan intervensi. Teknik pengumpulan data menggunakan random sampling	terjadinya anemia pada wanita baik ibu hamil maupun wanita resproduksi
10	Pengaruh Edukasi Pencegahan dan Penanganan Anemia Terhadap Pengeahuan dan	Sukmawati, dkk	2019	Implementasi pencegahan primer adalah edukasi terhadap pengetahuan ibu hamil tentang anemia	Hasil penelitian didapatkan rata-rata pengetahuan sebelum edukasi 51,97 sedangkan sesudah edukasi rata-rata 64,03 dan terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi sebesar 8,06	Melakukan edukasi dalam penelitian tidak memiliki metode apa yang digunakan	Desain penelitian menggunakan metode Pre Eksperiment Design One Group dengan jenis Pre Test and Post Test Group. Sampel dalam	Edukasi kesehatan dapat menambah pengetahuan remaja wanita terhadap pengetahuan tentang anemia

	Sikap Ibu Hamil				dengan P-Value 0,000. rata-rata sikap sebelum edukasi 50,54 dan sesudah edukasi rata-rata sikap 69,73 serta terdapat perbedaan sikap sebelum dan sesudah edukasi sebesar 19,19 dengan P-Value 0,000		penelitian ini adalah ibu hamil yang berjumlah 37 orang	yang dapat membuat mereka dapat memelihara kesehatan
--	-----------------	--	--	--	---	--	---	--



Matriks Langkah 7

Matriks Evaluasi

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Hubungan Anemia Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Primer	Ita Herawati	2019	Manajemen pendarahan pada ibu post partum agar tidak terjadi anemia adalah dengan memperhatikan asupan gizi sebelum menjalani persalinan dan memperhatikan hal yang akan memicu pendarahan	Dari hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara kejadian anemia pada ibu bersalin dengan kejadian perdarahan postpartum dengan nilai $p = 0,001$ dan nilai OR 15,972 beresiko mempertinggi angka kejadian perdarahan postpartum	Penelitian ini hanya menkankan pada peningkatan hemoglobil pada wanita hamil	Metode penelitian yang digunakan adalah analitik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin pervaginam di RSUD Kabupaten Bekasi pada bulan Januari - Desember 2015 baik yang mengalami perdarahan postpartum maupun yang tidak mengalami perdarahan postpartum	Pada proses kelahiran atau proses persalinan banyak mengeluarkan darah yang mengakibatkan terjadinya penurunan hemoglobin

							dengan jumlah sampel 98 orang	
2.	Hubungan Usia, Gravida Dan Jarak Kehamilan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Gantiwarno Tahun 2017	Tusi Eka Redowati	2018	Manajemen yang harus dilakukan pada ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum guna mencegah terjadinya anemia adalah pengetahuan yang harus diberikan kepada ibu hamil dan asupan nutrisi yang dapat memenuhi agar dapat mempertahankan gizi ibu hamil dan mencegah terjadinya anemia	hasil penelitian pembahasan terdapat hubungan antara usia dengan kejadian anemia pada ibu hamil dengan $Pvalue 0,045 < \alpha (0,05)$, terdapat hubungan antara gravida dengan kejadian anemia pada ibu hamil dengan $Pvalue 0,000 < \alpha (0,05)$ dan OR 0,156, serta terdapat hubungan antara jarak kehamilan dengan kejadian anemia pada ibu hamil dengan $Pvalue 0,033 < \alpha (0,05)$ dan OR 3,923	Pada penelitian ini hanya melihat hubungan heperamisis gravidarum dengan kejadian anemia	Jenis Penelitian ini adalah Analitik, populasi penelitian yaitu 89 ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Gantiwarno Tahun 2017 dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 89 responden diambil dengan teknik cluster sampling. Cara ukur yang digunakan dengan alat ukur berupa lembar kuesioner dan alat ukur Hb digital, dianalisa secara univariat dengan presentasi	Heperemisis gravidarum sangat mempegaruhi kejadian anemia pada ibu hamil

							dan bivariat dengan chi square.	
3.	Faktor Risiko Kejadian Anemia pada Ibu Hamil	Octa Dwienda Ristica	2015	Manajemen asuhan kebidanan yang dilakukan pada faktor resiko yang memengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil adalah, pengetahuan, atau edukasi, pemberian asupan gizi dan berikan suplemen Fe	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan signifikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil yaitu: Paritas (CI95%:OR=1,66-6,16), Kecukupan konsumsi zat besi (CI95%:OR=1,59-5,80), Status KEK (CI95%:OR=1,44-2,50), Pendidikan ibu (CI95%:OR=1,24-4,50). Variabel yang tidak berhubungan adalah umur ibu, pendapatan keluarga, pekerjaan dan pengetahuan	Penelitian ini lebih berfokus kepada nyeri disminore dan tidak terlalu berfokus pada anemia hanya saja bisa mengatasi nyeri diminore dan menghambat pengeluaran darah dapat mengurangi kejadian anemia	Desain penelitian ini adalah studi penampang analitik (analytic cross sectional study). Populasi adalah seluruh ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Tenayan Raya tahun 2012 sebesar 771 ibu hamil, dengan sampel 212 orang ibu hamil. Cara pengambilan data yaitu dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan regresi logistic ganda	Ada beberapa kejadian yang mengakibatkan terjadinya anemia seperti pendarahan, heperemisis gravidarum dan pemicu lainnya

4.	Hubungan Anemia Dengan kejadian Persalinan Preterm Di RSUD Dr.Habdulmoeloe Bandar Lampung	Siti Khoiriya h	2018	Manajemen kebidanan yang dilakukan pada pencegahan terjadinya anemia terhadap wanita yang menjalani persalinan maupun tidak adalah dengan memberinya pengetahuan, edukasi tentang gizi yang harus dipenuhi untuk mencegah anemia.	Hasil distribusi frekuensi prematur 60 (19,2%) dan tidak prematur 251 (80,7%), Anemia 146 (46,9%) dan tidak anemia 165 (53,0%), dan Hasil statistic dengan menggunakan uji chi square dengan kejadian persalinan prematur di peroleh anemia p value 0,502 >0,05 dan OR=1,264.	Penelitian ini hanya melihat hubungan kejadian persalinan yang mengakibatkan anemia	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik, dengan rancangan Cross Sectional. Populasi penelitian ini seluruh ibu bersalin yaitu 1401 orang, Tehnik sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus stratified random sampling terdapat 311 orang yang di jadikan sampel penelitian	Persalinan yang tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan pendarahan yang jika tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan anemia
5.	Hubungan Kepatuhan Ibu Hamil Mengkons	Wiwit Hidayah dan Tri Anasari	2015	Manajemen asuhan yang dilakukan pada kejadian anemia adalah memeberika	Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mardiani (2010) yang menyatakan terdapat	Penelitian ini hanya melihat hubungan dari penggunaan Fe terhadap kejadian	Rancangan penelitian yang digunakan adalah case control	Anemia yang terjadi pada usia remaja yang

<p>umsi Tablet Fe Dengan Kejadian Anemia Di Desa Pageraji Kecamatan n Cilongok Kabupaten Banyumas</p>			<p>asupan gizi yang bisa meningkatkan kadar trombosit dalam darah</p>	<p>hubungan antara sikap ibu hamil tentang anemia dengan perilaku minum tablet tambah darah ($p = 0,000$). Hal tersebut dikarenakan sikap menjadi pertimbangan dalam menentukan tindakan minum tablet tambah darah. Anemia memiliki dampak yang berbahaya bagi kehamilan ibu. Menurut Manuaba (1998), anemia dapat mengakibatkan terjadinya abortus, persalinan prematuritas, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, mudah terjadi infeksi, ancaman dekompensasi kordis (Hb 6 gr%), molahidatidosa, hiperemesis gravidarum, perdarahan antepartum, dan ketuban pecah dini.</p>	<p>anemia</p>	<p>dengan pendekatan retrospektif. Penelitian ini menggunakan data primer berupa data kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet zat besi yaitu dengan menggunakan check list.</p>	<p>dipegaruhi oleh faktor gizi yang kurang dapat meningkatkan status anemia pada remaja putri</p>
---	--	--	---	---	---------------	---	---

6.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Anemia	Atik Purwandari, Freike Lumy, Feybe Polak	2016	Faktor faktor yang memicu terjadinya kasus anemia pada wanita adalah gaya hidup dimana remaja dan wanita ingin memiliki penampilan menarik sehingga ia tidak menjaga pola hidupnya dengan baik sehingga mengakibatkan anemia	Hasil uji statistik, didapatkan ada hubungan signifikan antara paritas dengan tingkat anemia. Nilai $X^2 = 14.761$ dan $p = 0.005$ IK 95 % = 0.006 – 0.010, ada hubungan signifikan antara umur dengan Tingkat anemia. Nilai $X^2 = 16.967$ dan $p = 0.002$ IK 95 % = 0.001 – 0.003, ada hubungan signifikan antara kunjungan ANC dengan tingkat anemia. Nilai $X^2 = 8.719$ dan $p = 0.013$ IK 95 % = 0.011 – 0.015, ada hubungan signifikan antara konsumsi tablet zat besi dengan tingkat anemia. Nilai $X^2 = 11.059$ dan $p = 0.004$ IK 95 % = 0.009 – 0.013, tidak ada hubungan antara pendidikan dengan tingkat anemia.	Tidak ada hubungan pola makan dengan status anemia yang ada	Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi adalah semua ibu hamil trimester III yang mengalami anemia dan memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa pada tahun 2009-2010 yang berjumlah 56 ibu hamil	Pola makan remaja sangat mempengaruhi terjadinya anemia karena siklus menstruasi yang mengakibatkan pendarahan dapat mengakibatkan lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan yangm memicu anemia
----	---	---	------	--	--	---	--	---

7.	Defisiensi Besi Pada Wanita Usia Subur Pranikah Obesitas	Fillah Fithra Dieny, dkk	2019	Manajemen asuhan kebidanan yang dilakukan untuk mencegah anemia pada wanita usia subur adalah memberikan edukasi pada wanita terkait pola makan dan pengaturan dietnya	Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ertan Sal et al. pada anak-anak usia 5-18 tahun, yang melaporkan bahwa terdapat perbedaan kadar TIBC pada kelompok obesitas dan kelompok non obesitas dengan signifikansi $p < 0,001$	Penelitian ini hanya melihat zat besi dari wanita usia subur obesitas	Status obesitas dilihat mahasiswi obesitas dan 25 mahasiswi non obesitas. Status besi diukur melalui serum besi, serum 18-25 tahun dan dipilih dengan metode systematic random sampling. Subjek terdiri dari 25 sectional yang dilakukan pada 50 mahasiswi Universitas Diponegoro, Semarang. Subjek berusia non obesitas. Metode. P	Anemi dapat terjadi karena gaya hidup dan siklus menstruasi yang mengakibatkan banyaknya pengeluaran darah dari pada zat besi yang masuk yang memicu terjadinya penurunan hemoglobin yang mengakibatkan terjadinya anemia
8.	Hubungan Tingkat Pengetahuan	Lindung Purbadewi	2020	Implementasi yang dilakukan untuk pencegahan anemia adalah edukasi tentang	Hasil analisis dengan menggunakan chi square menunjukkan nilai chi square hitung (X ² hitung)	Melihat hubungan pengetahuan dengan mepeganruhi kejadian anemia	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, dengan	Fe sangat memvantu untuk menganti zat

	Tentang Anemia Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil			pengetahuan untuk konsumsi Fe yang rutin pada wanita yang dicurigai anemia akan mencegah terjadinya anemia karena dapat mengimbangi antara pengeluaran yang ada sehingga kadar hemoglobin ada pada batas normal	sebesar 12,548. Berdasarkan nilai df (degree of freedom) sebesar 1 dan taraf signifikansi 5% diketahui X^2 tabel sebesar 3,841. Hal ini berarti bahwa X^2 hitung $> X^2$ tabel (12,548 $>$ 3,841). Selain itu dapat dilihat dari nilai p yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ ($p < \alpha$), berarti ada hubungan tingkat pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Moyudan Sleman Yogyakarta	yang ada	pendekatan crosssectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang tercatat di register kohort ibu	besi yang hilang pada tubuh wanita usia reproduksi sehingga dapat mengimbangi pengeluaran dan pemasukan
9.	Diagnosis dan Tatalaksana Anemia Defisiensi Besi	Ajeng Amalia, dkk	2016	Penatalaksanaan anemia pada penelitian ini adalah menentukan diagnosis dan melakukan intervensi dan implementasi yang dimulai dengan	Anemia defisiensi besi adalah keadaan berkurangnya zat besi dalam tubuh untuk sintesis hemoglobin. Untuk mendiagnosis anemia defisiensi besi dapat melalui anamnesis,	Tidak memiliki metode penelitian	Penatalaksanaan anemia defisiensi zat besi	Penurunan HB dapat memengaruhi terjadinya anemia pada wanita baik ibu hamil maupun wanita

				pencegahan primer	pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Penatalaksanaan anemia defisiensi besi adalah pemberian zat besi secara oral, pemberian zat besi secara intramuskular, dan tranfusi darah			resproduksi
10	Anemia Defisiensi Besi	Julia Fitriany	2018	Manajemen asuhan kebidanan yang dilakukan adalah melakukan pencegahan primer seperti edukasi dan penyuluhan pencegahan sekunder dan tersier	Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya anemia defisiensi besi yaitu kebutuhan yang meningkat, asupan zat besi yang kurang, infeksi, dan perdarahan saluran cerna dan juga terdapat faktor-faktor lainnya. Anemia defisiensi besi dapat di diagnosis dengan cara anamnesis, pemeriksaan	Tidak memiliki metode penelitian	Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anemia pada wanita produksi dan remaja putri	Edukasi kesehatan dapat menambah pengetahuan remaja wanita terhadap pengetahuan tentang anemia yang dapat membuat mereka dapat

					fisik dan pemeriksaan penunjang. Penatalaksanaan anemia defisiensi besi dapat dilakukan dengan pemberian zat besi secara oral, secara intramuskular dan transfusi darah			memelihara kesehatan
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Asuhan 7 Langkah Varney Berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi

Pada bab pembahasan ini akan diuraikan tentang asuhan kebidanan mengenai anemia pada wanita usia reproduksi berdasarkan referensi yang telah di temukan. Pembahasan ini akan diuraikan secara narasi berdasarkan asuhan kebidanan dengan 7 langkah varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pada langkah pertama mengidentifikasi terjadinya anemia pada wanita usia reproduksi mengumpulkan semua informasi akurat dan lengkap dari semua sumber yang telah melakukan penelitian terhadap anemia. Dilangkah ini akan didapatkan berbagai referensi tentang definisi, tanda dan gejala serta faktor-faktor penyebab terjadinya anemia. Berdasarkan dari referensi matriks langkah I diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pada penelitian (I Putu Suiraoaka, A.A. Gede Raka Karanaya, 2016) anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin lebih rendah dari normal. Serupa dengan penelitian (Hidayah, 2016) yang mengatakan anemia

merupakan suatu kondisi terdapat defisiensi ukuran/jumlah eritrosit atau kandungan hemoglobin. Anemia terjadi apabila kepekatan hemoglobin dalam darah dibawah batas normal. Hemoglobin adalah sejenis pigmen yang terdapat dalam sel darah merah bertugas dari paru-paru ke jaringan tubuh (Ahmady, Mariana Dina, 2016).

Sedangkan penelitian (Sufyan, Oy, & Mardiana, 2019) mengatakan zat besi mempunyai peranan penting dalam tubuh, selain membantu hemoglobin mengangkut oksigen dan myoglobin menyimpan oksigen, zat besi juga membantu berbagai macam enzim dalam mengikat oksigen untuk proses pembakaran. Penelitian lainnya mengatakan anemia adalah suatu keadaan kekurangan hemoglobin dan zat besi dalam darah yang sering terjadi pada wanita usia reproduksi dan subu (Silawati & Sari, 2020).

Pada matriks penyebab terjadinya anemia pada wanita reproduksi (Juraida Roito Harahap, 2015) mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan anemia dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekologi, dan biologi. Dalam penelitian ini faktor terjadinya anemia adalah faktor ekonomi, kurang mengomsumsi makanan hewani salah satu sumber zat besi yang mudah diserap (*heme iron*), sedangkan bahan makanan nabati (*non-heme iron*) adalah zat besi yang tinggi tetapi sulit diserap oleh tubuh sehingga diperlukan porsi besar untuk mencukupi kebutuhan zat besi. Menurut penelitian (Erizka Marwia, 2015) faktor lain yang dapat mempengaruhi anemia pada wanita usia reproduksi adalah faktor

pendidikan yang kurang pada wanita cenderung untuk tidak memperhatikan keadaan dirinya untuk mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi untuk mencegah terjadinya anemia. Berdasarkan penelitian (Desri Suryani, 2015) obesitas juga merupakan faktor resiko anemia dapat meningkatkan 2-4 kali resiko terjadinya anemia pada wanita. Hasil penelitian (Hidayah, 2016) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi anemia adalah faktor makanan, kebutuhan makanan perlu dilihat bukan hanya dalam konteks porsi saja, melainkan harus ditentukan pula berdasarkan mutu zat-zat gizi yang terkandung didalam makanan yang dikonsumsi seperti, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta kecukupan dalam cairan. Penelitian (Wijayanti, 2019) Faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia adalah kebutuhan mengonsumsi Fe yang tidak terpenuhi, zat besi merupakan mineral mikro terdapat pada manusia yaitu 3-5 gram sebagai alat angkut oksigen dan paru-paru ke jaringan tubuh dan meningkatkan volume darah sehingga akan banyak melakukan pembentukan hemoglobin maka, jika sebaliknya konsumsi Fe yang kurang maka akan terjadi sebaliknya dan mengakibatkan anemia

1. Langkah II: Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan semua referensi yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosa atau masalah yang ada pada wanita subur yang mengalami anemia

Menurut peneliti (Siti, 2015) penentuan diagnosa anemia dapat dilakukan dengan meanamnesa yang dilakukan didapatkan klien mudah lelah, sering pusing, mata berkunang kunang dan keluah mual muntah, serta dilakukan pemeriksaan dan pengawasan Hb yang dilakukan menggunakan alat sahli didapatkan hasil pemeriksaan Hb 11g%, Hb 9-10g%, Hb 7-8g%, Hb <7g%. menurut penelitian (Sudikno, 2016) mengatakan metode yang paling sering digunakan di labolatorium dan paling sederhana adalah metode sahli, dan yang lebih canggih adalah metode cynmethemoglobin, hasil pembacaan metode sahli dipengaruhi subjektivitas karena yang membandingkan warna adalah mata telanjang, maka disimpulkan untuk menegakkan diagnose anemia tidak hanya dilihat dari hasil anamnesa yang didapatkan dari data pasien atau pun keluhan tetapi didapat dengan pemeriksaan labolatorium. Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan (Desmon, 2017) mengatakan diagnose anemia dapat kita lihat dengan melakukan anamnesa yang didapatkan dari pasien atau pun data objektif yang di dapatkan oleh klien seperti terjadinya seperti, klien mudah lelah, sering pusing, mata berkunang kunang dan keluhan mual muntah. Sejalan dengan penelitian (Elya Sugianti, 2017) yang mengatakan bahwa untuk menegakkan diagnosa perlu diperhatikan anamnesa melalui pengkajian yang dilakukan karena kita tidak selamanya ada pada daerah yang memiliki labolatorium maka penegakkan diagnose dapat dilihat melalui data subjektif ataupun keluhan yang didapatkan dari klien, maka kesimpulan dari langkah 2 ini adalah penegakan diagnose

dapat dilihat dari 2 aspek yaitu melalui anamnesa dan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan lalu memcocokkan dan mengidentifikasi lalu menengakkan diagnose yang ada.

2. Langkah III: Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini merupakan langkah ketika melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan.

Menurut (Purwandari, 2019) mudah lelah, mata berkunang-kunang, mual- mual adalah tanda awal dicurigainya anemia sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka bisa dilakukan pencegahan yang mungkin dilakukan pada bidan guna meminimalisir terjadinya komplikasi yang parah.

Pada penelitian (Zafira, 2019) mengatakan anemia pada wanita usia subur yang disebabkan kekurangan zat besi yang akan berdampak pada kesehatan reproduksi wanita usia subur, menurunkan konsentrasi belajar, menurunkan kemampuan fisik, dan mengakibatkan muka pucat. Menurut (Yohanes, 2020) yang mengatakan komplikasi dari anemia adalah gagal jantung kongestif, konfusi kanker, penyakit ginjal, gondok, gangguan pembentukan heme, penyakit infeksi kuman, thalassemia, rematoid, dan gangguan system imun., komplikasi diatas adalah akibat yang terjadi jika anemia tidak ditangani secara baik. Sedangkan penelitian

lainnya mengatakan komplikasi dari anemia pada wanita usia produksi adalah mempengaruhi kesuburan yang mengakibatkan kemandulan, dan kelemahan saat hamil yang dapat mengakibatkan kematian pada wanita (Dewi Novitasari, 2012)

Berbeda dengan penelitian (Tsalissavrina, 2012) Yang mengatakan komplikasi dari anemia adalah kemampuan belajar pada remaja, kegagalan pertumbuhan pada anak sehingga tingginya tidak maksimal, dan kegagalan pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandung ibu hamil. Penelitian lainnya mengatakan bahwa komplikasi dari anemia sangat fatal jika tidak ditangani dengan baik dikarenakan bisa berdampak buruk pada wanita terutama pada wanita usia subur seperti terganggunya kesuburan yang bahkan bisa mengakibatkan kesulitan dalam mengandung (Kaderman, 2018)

3. Langkah IV: Identifikasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi

Pada langkah ini dilakukan oleh bidan adalah mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk konsultasi atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien.

Menurut (Sudirman, 2016) Pada setiap kasus anemia perlu perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. terapi spesifik sebaiknya diberikan setelah diagnosis ditegakkan
- b. terapi diberikan atas indikasi yang jelas, rasional, dan efisien.

Jenis-jenis terapi yang dapat diberikan adalah :

1. terapi gawat darurat

Pada kasus anemia dengan payah jantung atau ancaman payah jantung, maka harus segera terapi darurat dengan transfuse sel darah yang ditampakan (PRC) untuk mencegah perburukan payah jantung tersebut

2. terapi khusus masing-masing anemia

Terapi ini bergantung pada jenis anemia yang dijumpai, misalnya preparat besi untuk anemia defisiensi besi.

3. terapi kausal

Terapi kausal adalah terapi yang dilakukan untuk mengobati penyakit dasar penyebab anemia. Misalnya anemia defisiensi besi yang disebabkan oleh infeksi cacing tambang.

4. terapi ex-juvantivus (empiris)

Terapi yang terpaksa dilakukan sebelum diagnosis dapat dipastikan, jika terapi ini berhasil, berarti diagnosis dapat dikuatkan. Terapi hanya dilakukan jika tidak tersedia fasilitas diagnosis yang mencukupi. Pada pemberian terapi jenis ini penderita harus diawasi dengan ketat

Menurut (Kaderman, 2018) Setelah diagnosis ditegakkan maka disebutkan rencana pemberian terapi, terapi terhadap anemia defisiensi besi dapat berupa

- a. terapi kausal : tergantung penyebabnya misalnya, pengobatan cacing tambang, pengobatan hemoroid, pengobatan memorigia. Terapi kausal harus dilakukan, kalau tidak maka anemia akan kambuh kembali
- b. pemberian preparat besi untuk menganti kekurangan besi dalam tubuh, besi per oral merupakan obat merupakan obat pilihan pertama karena efektif, murah, dan aman. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Desri Suryani, 2015) Yang mengatakan untuk mengatasi anemia besi pada wanita subur dengan mengonsumsi zat besi dan vitamin dibuktikan dengan hasil hubungan pemberian Fe dan zat besi dalam meningkatkan hemoglobin terhadap wanita usia subur yang memiliki distribusi frekuensi yang tinggi.

4. Langkah V: Rencana Tindakan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh berdasarkan silangkah sebelumnya. Semua perencanaan yang dibuatkan harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, penelitian-penelitian terbaru, terkait rencana tindakan yang dilakukan untuk mengatasi anemia berdasarkan bukti (*evidence based care*).

Adapun penatalaksanaan yang dilakukan pada wanita usia subur yang menderita anemia adalah

Menurut Tarwoto, (2010) penatalaksanaan yang dilakukan pada wanita usia produksi yang mengalami anemia antara lain:

- a. mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dari bahan hewani (daging, ikan, ayam, hati, dan telur): dan dari bahan nabati (sayuran yang berwarna hijau tua, kacang-kacangan, dan tempe)
- b. banyak makan makanan sumber vitamin c yang bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi, misalnya: jambu, jeruk, tomat dan nanas
- c. minum 1 tablet penambah darah setiap hari, khususnya saat mengalami haid
- d. bila merasakan adanya tanda dan gejala anemia, segera ke pelayanan kesehatan untuk diberikan pengobatan

Menurut Anie Kurniawan, (2010) mengatakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi anemia adalah:

- a. terapi spesifik diberikan setelah ditegakkan diagnosis
- b. terapi diberikan atas indikasi yang jelas, rasional, dan efisien

jenis terapi yang dilakukan adalah:

- a. terapi gawat darurat

pada kasus anemia dengan payah jantung atau ancaman payah jantung, maka harus segera diberikan terapi darurat dengan transfuse sel darah merah yang dimampatkan (prc) untuk mencegah perburukan payah jantung

- b. terapi khas untuk masing masing anemia

terapi ini tergantung pada jenis anemia yang dijumpai misalnya, preparat besi untuk anemia defisiensi zat besi

c. terapi kausal

terapi kausal merupakan terapi untuk mengobati penyakit dasar menjadi penyebab anemia. Misalnya, anemia defisiensi zat besi yang disebabkan infeksi cacing tambang harus diberikan obat anti cacing

d. terapi ex-juvanvirus (empiris)

terapi ini adalah terapi yang terpaksa diberikan sebelum ditegakkan diagnosis, jika terapi ini berhasil, berarti diagnosis dapat dikuatkan. Terapi hanya dilakukan jika tidak tersedia fasilitas diagnosis yang mencukupi. Pada pemberian terapi jenis ini, pada penderita harus diawasi dengan ketat. Jika terdapat respon yang baik, terapi diteruskan, tetapi jika terjadi sebaliknya maka harus dilakukan evaluasi kembali

Menurut (Susarmi, 2017) setelah ditegakkan diagnosis maka dibuat rencana tindakan terapi yang akan dilakukan pada wanita yang mengalami anemia.

- a. terapi kausal : tergantung pada penyebab, misalnya pengobatan cacing tambang, pengobatan hemoroid, pengobatan menoragia. Terapi kausal ini dilakukan, kalau tidak maka anemia akan kambuh kembali.
- b. pemberian preparat besi untuk mengganti kekurangan zat besi dalam tubuh adalah besi per oral merupakan obat pilihan pertama karena efektif, murah, dan aman, ada beberapa preparat yang tersedia yaitu *ferrous sulphat* (sulfat ferrous) preparat pilihan pertama dengan dosis 3x200 mg, dan *ferrous gluconate*, *ferrous fumarate*, *ferrous lactate*, dan

ferrous succinate, harga lebih mahal tetapi efektifitasnya dan efeksamping ampir sama

5. Langkah VI: Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang diuraikan pada langkah kelima di atas dilaksanakan secara efisien dan aman. Realisasi dari perencanaan dapat dilakukan oleh bidan, pasien, atau anggota keluarga lain. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab atas terlaksananya seluruh perencanaan

Berdasarkan klasifikasi anemia tingkat WHO dimana rerata kadar HB yang memiliki <11 g/dl wanita usia reproduksi merupakan salah satu kelompok yang beresiko tinggi mengalami anemia, wanita usia subur rentang mengalami anemia dimana salah satu penyebabnya karena siklus menstruasi setiap bulan sehingga terjadi peningkatan kebutuhan zat besi Status gizi responden berdasarkan IMT pada Penelitian yang dilakukan (Siagian, 2017) menunjukkan bahwa responden kurus memiliki peluang mengalami anemia dibanding dengan yang tidak kurus (Siagian, 2017) Penelitian lainnya menyebutkan bahwa kejadian anemia pada WUS cenderung terjadi pada WUS dengan MT kategori kurus dibandingkan dengan yang memiliki IMT normal.1 Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Iran yang menunjukkan tidak ada perbedaan kadar Hb, mean corpuscular volume (MCV), serum Iron, total iron binding capacity (TIBC), indeks saturasi transferin, dan kadar feritin dengan IM Penelitian (Sahana ON, 2015) menyebutkan sebanyak 32 persen WUS yang

mengalami anemia gizi besi juga mengalami obesitas. Hasil penelitian (Sudigno, 2017) menunjukkan tidak ada hubungan antara status gizi dengan status anemia subjek. Hasil analisis terhadap konsumsi zat gizi berupa energi, protein, zat besi, asam folat, vitamin C, vitamin A, dan seng pada subjek WUS penderita anemia dibandingkan AKG, diketahui tingkat konsumsi energi rata-rata tergolong rendah dibandingkan AKG pada semua tingkatan umur, akan tetapi tingkat kecukupan konsumsi energi termasuk kategori cukup ($\geq 70\%$ AKG). Penelitian yang dilakukan melaporkan bahwa tingkat konsumsi energi berpengaruh terhadap kejadian anemia. Subjek dengan konsumsi energi yang rendah cenderung lebih rentan mengalami anemia dibanding dengan yang konsumsi energinya cukup. Energi diperlukan dalam proses fisiologis tubuh antara lain dalam metabolisme zat gizi. Kekurangan asupan energi akan menghambat proses pembentukan Hb (Masthalina H, 2015) Penelitian lain menyebutkan bahwa kekurangan konsumsi energi meningkatkan risiko anemia karena terjadi pemecahan protein yang digunakan untuk energi. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh yang berakibat pada gangguan dalam proses pembentukan Hb. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudigno, (2015) bahwa tingkat konsumsi energi tidak berhubungan dengan kejadian anemia.

Konsumsi protein subjek penelitian sebagian besar tergolong cukup meskipun masih terdapat subjek dengan tingkat konsumsi protein yang kurang. Hasil uji statistik menunjukkan tidak terdapat hubungan antara

tingkat konsumsi protein dengan status anemia. Wanita usia subur meskipun tingkat konsumsinya cukup namun tetap mengalami anemia, kemungkinan karena cukupnya konsumsi protein tidak disertai dengan kecukupan konsumsi sumber zat besi yang siap pakai (sumber hewani). Protein yang dikonsumsi cenderung berasal dari protein nabati yang memiliki bioavailabilitas yang lebih rendah, sehingga kurang mendukung dalam pembentukan Hb. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang menyebutkan jika pada umumnya penderita anemia tingkat konsumsinya rendah akan berdampak pada asupan dari zat besi yang ikut rendah sehingga berisiko mengalami anemia (Sudigno, 2017) Protein merupakan komponen utama dari globin yang berperan dalam transportasi dan penyimpanan zat besi. Selain itu, di dalam usus halus penyerapan zat besi dibantu oleh heme carrier protein (HCP1) Absorpsi zat besi di dalam usus halus dibantu protein yang bertindak sebagai alat angkut yakni transferin dan ferritin Konsumsi zat besi subjek seluruhnya masuk dalam kategori kurang bila dibandingkan dengan angka kecukupan yang dianjurkan.

Zat besi merupakan komponen penting dalam pembentukan Hb. Apabila jumlah zat besi dan simpanan besi dalam tubuh cukup, maka kebutuhan untuk pembentukan sel darah merah dalam sumsum tulang akan tercukupi. Namun bila simpanan zat besi dan asupan zat besi dari makanan kurang, maka akan terjadi ketidakseimbangan zat besi sehingga menyebabkan anemia gizi besi (Masthalina H, 2015) Terlepas dari

tingginya kebutuhan zat besi, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya prevalensi defisiensi besi, yakni asupan zat besi inadekuat, tingkat bioavailabilitas zat besi yang rendah dari diet sehari-hari, dan bioavailabilitas rendah dari besi karboni, Selain itu dapat terjadi karena adanya gangguan absorpsi zat Penelitian (Siti et al., 2015), menyebutkan bahwa asupan zat besi akan memengaruhi peningkatan Hb hampir sembilan kali dibandingkan asupan seng, vitamin B9, vitamin B12, dan vitamin C. Pada penelitian ini rata-rata asupan zat besi subjek lebih didominasi oleh sumber zat besi non-heme dibandingkan dengan besi heme. Berdasarkan hasil recall makanan subjek penelitian diketahui dalam sehari subjek mengonsumsi karbohidrat nasi sebanyak 3-6 centong. Mengonsumsi beras, sementara diketahui kandungan zat besi dalam 100 gram beras hanya sebesar 1,8 mg.⁴ Hasil recall juga menunjukkan bahwa dalam sehari sebagian besar subjek mengonsumsi protein nabati seperti kacang-kacangan dan olahannya seperti tahu, tempe, sari kedelai serta protein dari sayuran dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan sumber hewani. Bahan makanan dari nabati seperti kacang-kacangan, sayuran serta sereal kaya akan sumber zat besi non-heme. 18,26,27 Konsumsi sumber zat besi yang berasal dari non-heme memiliki bioavailabilitas yang lebih rendah yaitu 2-10 persen dibandingkan dengan zat besi heme yang memiliki bioavailabilitas mencapai 25-30 persen.^{9,27} Tingkat konsumsi asam folat dari seluruh subjek dalam penelitian ini masih tergolong kurang dibandingkan angka kecukupan yang dianjurkan. Defisiensi asam folat

dapat menyebabkan gangguan pematangan inti eritrosit sehingga berpengaruh terhadap bentuk dan ukuran sel darah merah.²⁴ Kekurangan asam folat dapat menjadi penyebab terjadinya anemia megaloblastik dengan kadar MCV yang tinggi.

Defisiensi asam folat menyebabkan gangguan metabolisme DNA yang selanjutnya mengakibatkan perubahan morfologi inti sel seperti sel darah merah, sel darah putih, sel Zat gizi yang memengaruhi penyerapan zat besi dalam tubuh salah satunya adalah vitamin C. Vitamin C berfungsi dalam metabolisme besi yaitu mempercepat absorpsi zat besi di usus dan terlibat dalam mobilisasi simpanan besi terutama hemosiderin dalam limpa.

Vitamin C mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyerapan besi terutama dari besi non-heme yang banyak ditemukan dalam produk makanan nabati. Vitamin C juga menghambat pembentukan hemosiderin yang sulit dimobilisasi untuk membebaskan besi bila diperlukan. Asupan vitamin C makanan yang dikonsumsi bersama makanan yang kaya akan zat besi dapat meningkatkan penyerapan zat besi secara signifikan. Tingkat konsumsi vitamin A pada sebagian besar subjek dalam penelitian ini termasuk kategori cukup bila dibandingkan dengan AKG yang dianjurkan. Hasil uji statistik menunjukkan tidak terdapat hubungan antara tingkat konsumsi vitamin A dengan status anemia ($p > 0,05$). Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Malaysia bahwa terdapat hubungan antara anemia defisiensi besi dengan

defisiensi vitamin A.14 Vitamin A berfungsi dalam membantu penyerapan zat besi dan pembentukan Hb. Zat besi bersama dengan retinol akan diangkut oleh retinol binding protein (RBP) dan transferin yang disintesis di dalam hati.

Adanya defisiensi vitamin A dapat mengakibatkan gangguan mobilisasi zat besi dari hati.3,24 Pada penelitian ini, meskipun subjek mengonsumsi vitamin A cukup namun masih mengalami anemia, kemungkinan karena kecukupan konsumsi vitamin A tidak diimbangi dengan kecukupan konsumsi zat besi. Penelitian Suharno et al, menyebutkan bahwa terdapat penurunan prevalensi anemia saat vitamin A dan zat besi diberikan dalam waktu bersamaan. Hampir seluruh responden memiliki tingkat konsumsi yang kurang dari angka kecukupan yang dianjurkan.

6. Langkah VII: Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan dimana pada tahap ini ditemukan kemajuan atau keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien. Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi (Manguji Betty, 2013)

Hasil evaluasi setelah melakukan asuhan kebidanan menurut (Ratna Ayu, 2017) Adalah ketikan proses asuhan kebidanan penanganan

anemia pada wanita usia subur sudah dilakukan dari tahap pengkajian sampai implementasi pemberian kandungan zat besi dan vitamin sudah dan sampai pada tahap evaluasi dianggap berhasil ketika Hb meningkat dari 8,6 gram% menjadi 10 gram% maka wanita usia subur menghabiskan obat yang diberikan, serta mengurangi aktifitasnya. Dengan demikian hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan berhasil dengan melihat perubahan yang telah dirasakan klien baik dari keluhan, kadar Hb. Evaluasi penelitian (Nurjannah. A, 2017) Yang mengatakan setelah melakukan asuhan kebidanan yang ditandai dengan keadaan umum baik, kesadaran composmentis, tanda- tanda vital dalam batas normal. Pusing, sakit kepala, terkadang cepat merasakan lelah yang sering dirasakan klien sudah teratasi, Hb meningkat dari 8,4 gram% menjadi 10 gram% dengan klien menghabiskan obat yang diberikan, serta mengurangi aktifitasnya. Dengan demikian hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan klien berhasil dengan melihat perubahan yang telah dirasakan klien baik dari keluhan dan kadar Hb klien. Sedangkan penelitian lainnya mengemukakan hal yang sama yaitu evaluasi asuhan kebidanan dilakukan untuk melihat kembali keadaan klien setelah dilakukan tahap pengkajian sampai implementasi dimana untuk melihat keberhasilan dari implementasi atau tindakan yang diberikan kepada klien berhasil atau tidak (Uto, 2016)

B. Implantasi Kebidanan

anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin lebih rendah dari normal. Serupa dengan penelitian (Hidayah, 2016) yang mengatakan

anemia merupakan suatu kondisi terdapat defisiensi ukuran/jumlah eritrosit atau kandungan hemoglobin. Anemia terjadi apabila kepekatan hemoglobin dalam darah dibawah batas normal. Hemoglobin adalah sejenis pigmen yang terdapat dalam sel darah merah bertugas dari paru-paru ke jaringan tubuh (Ahmady, 2016).

Penyebab anemia yang terjadi pada wanita usia subur ada beberapa yaitu gangguan pembentukan eritrosit terjadi apabila terdapat defisiensi substansi tertentu seperti mineral (besi, tembaga), vitamin (B12, asam folat), asam amino, serta gangguan pada sumsum tulang. Perdarahan baik akut maupun kronis mengakibatkan penurunan total sel darah merah dalam sirkulasi dan hemolisis atau proses penghancuran eritrosit adapun penyebab anemia secara umum adalah Kekurangan zat gizi dalam makanan yang di konsumsi, penyerapan zat besi yang tidak optimal, misalnya karena diare, pembedahan saluran pencernaan, kehilangan darah yang disebabkan oleh perdarahan menstruasi yang banyak, perdarahan akibat luka, perdarahan karena penyakit tertentu, kanker (Wijayanti, 2019)

Dampak dari anemia adalah menurunkan Daya tahan terhadap infeksi Defisiensi zat besi menyebabkan menurunnya daya tahan terhadap penyakit infeksi dan meningkatnya kerentanan mengalami keracunan, kekurangan zat besi, kematian akibat penyakit infeksi meningkat karena kurangnya zat besi berdampak pada *system imun*, mengganggu Produktivitas kerja, selain itu, anemia juga berdampak pada produktivitas kerja dan juga menyebabkan kelelahan dan berdampak saat kehamilan, simana pada masa hamil

berhubungan dengan kejadian BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) dan peningkatan risiko kematian ibu dan bayi perinatal. Selama kehamilan, anemia diasosiasikan dengan peningkatan kesakitan dan kematian. Anemia tingkat berat diketahui merupakan faktor risiko kematian ibu. Untuk janinnya sendiri, anemia selama kehamilan dapat meningkatkan risiko BBLR, kelahiran prematur, dan defisiensi zat besi serta anemia pada bayi nantinya (Syakir, 2018)

Sedangkan pencegahan yang dilakukan pada pasien yang mengalami anemia adalah Meningkatkan konsumsi makanan bergizi yang banyak mengandung zat besi dari bahan makanan hewani (daging, ikan, ayam, hati, telur) dan bahan makanan nabati (sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, tempe, makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin c (daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk dan nenas) sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam usus, menambah pemasukan zat besi kedalam tubuh dengan minum Tablet Tambah Darah (TTD). Mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperberat anemia seperti: kecacingan, malaria, dan penyakit TBC (Wijayanti, 2019)

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penulisan literatur review dengan Anemia pada usia reproduksi sedang serta menghubungkan dengan teori dan *Avidance Based* maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan telaah referensi di dapatkan informasi bahwa data dasar pada wanita usia reproduksi yang mengalami anemia masih tinggi dan sering terjadi secara signifikan
2. Berdasarkan telaah referensi didapatkan informasi bahwa diagnosa / masalah aktual pada wanita usia reproduksi yang mengalami anemia maka didapatkan diagnosa aktual dilihat dari keadaan klinis, hasil pemeriksaan fisik bahwa wanita usia subur yang mengalami anemia akan cenderung tidak bersemangat, mudah lelah, lemas dan pucat
3. Berdasarkan telaah referensi didapatkan informasi bahwa diagnosa / masalah potensial adalah diantisipasi terjadinya gangguan kesuburan dan bahkan menyebabkan kematian
4. Berdasarkan telaah referensi didapatkan informasi bahwa tindakan segera dan kolaborasi pada yang dilakukan untuk mengatasi anemia pada wanita usia reproduksi adalah pemberian obat zink yang tinggi akan zat besi serta

5. melakukan transfuse dara bagi wanita yang mengalami penurunan Hb secara drastis
6. Berdasarkan telaah referensi didapatkan informasi bahwa tindakan asuhan pada wanita usia reproduksi yang mengalami anemia yaitu melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Memberbaiki keadaan umum klien serta memberikan pengetahuan kepada wanita terkait makanan yang harus dikonsumsi untuk mencegah terjadinya anemia
7. Berdasarkan telaah referensi didapatkan informasi mengenai wanita usia reproduksi yang mengalami anemia, hal yang harus di evaluasi yaitu penanganan yang sudah dilakukan apakah berhasil meningkatkan kadar Hb pada klien yang mengalami anemia atau tidak

B. Saran

Melihat besarnya efek yang ditimbulkan dengan adanya anemia pada wanita uisa subur yang akan berdampak pada buruknya perlu diberikan tindakan yang tepat dan segera untuk mengantisipasi masalah tersebut. Oleh karena itu, adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya komplikasi pada klien wanita mengalami anemia agar mendapat pertolongan yang cepat dan tepat, sehingga dapat segera di antisipasi kemungkinan masalah lain yang dapat terjadi.
2. Seorang bidan harus dapat menilai dan mengetahui penyulit-penyulit lewat pengetahuan yang dimiliki sehingga terjadi pertolongan secara cepat serta memberikan tindakan yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani,M., & Wirjatmadi, B. 2014. *Gizi dan Kesehatan Balita Peranan Micro Zinc pada Pertumbuhan Balita*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Almatsier Sunita, Susirah Soetardjo dan Moesijanti Soekarti. 2011. *Gizi Dalam Daur Kehidupan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmady, Mariana Dina, H. (2016). PENYULUHAN GIZI DAN PEMBERIAN TABLET BESI TERHADAP PENGETAHUAN DAN KADAR HEMOGLOBIN SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI MAMUJU. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 2
- Andira Dita. 2010. *Seluk Beluk Kesehatan Reproduksi Wanita*. Cetakan: Yogyakarta: A Plus Book.
- Ani, L. S., Weta, I. W., Utami, N. W. A., Suranadi, W., & Suwiyoga, K. (2018). Program Pencegahan Anemia Bagi Wanita Masa Prakonsepsi Di Wilayah Kerja Puskesmas Sidemen Kabupaten Karangasem. *Buletin Udayana Mengabdikan*, 17(3), 145–151. <https://doi.org/10.24843/bum.2018.v17.i03.p2>
- Ahmady, Mariana Dina, H. (2016). PENYULUHAN GIZI DAN PEMBERIAN TABLET BESI TERHADAP PENGETAHUAN DAN KADAR HEMOGLOBIN SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI MAMUJU. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 2.
- Arisman, M. B. (2010). *Buku Ajar Ilmu Gizi Dalam Daur Kehidupan*. Edisi-2. Jakarta: EGC.
- Atik Purwandari, A.Md.Keb., S. (2008). *KONSEP KEBIDANAN SEJARAH & PROFESIONALISME*
- Baker, PN.;S.J. Wheeler; Sanders, TA.; Thomas, JE.; Hutchinson, Cj.;Clarke, K.; et al. 2009. A Prospective Study of Micronutrient Status in Adolescent Pregnancy. *American Journal of Clinical Nutrition*, Vol. 89 (4); 1114-1124.
- Bersamin, Andrea, Heneman, Karrie, Hathaway, Cristy, et al. 2008. Nutritional and Health Info Sheet: Iron and Iron Deficiency Anemia. dalam S. Fikawati, A. Syarif, & a, Veratamala, *Gizi Anak dan Remaja*, PGM: 33 (2).
- Briawan D. *Anemia:Masalah Gizi pada Remaja Wanita*. Jakarta: EGC; 2014
- Briawan, Dodik. 2012. *Anemia Masalah Gizi Pada Remaja Wanita*. Buku Kedokteran ECG Jakarta.
- Caturiyanti Nigtiyasi Titin. Hubungan antara pengetahuan, sikap dan tidak dengan kejadian anemia remaja putri kels X dan XI SMA Negeri 1 polokarya, 2015

- Desmon Wirawati, Astuti Yuni Nursasi, dan S. M. (2017). gerakan remaja setia (sehat tanpa anemia) dapat pencegahan anemia pada remaja. *Jurnal Medikes*, 4(November 2017), 185–194.
- Desri Suryani, Riska Hanafi, & R. J. (2015). Analisis Pola Makan dan Anemia Gizi Besi pada Remaja Putri kota Bengkulu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 11–18.
- Dewi Novitasari. (2012). *FAKTOR-FAKTOR RISIKO KEJADIAN GIZI BURUK PADA SEMARANG*.
- Elya Sugianti. (2017). EVALUATION OF FEEDING α ™ S PROGRAMME TO THE MALNUTRITION. *Jurnal Cakrawala*, 11(2), 217–224.
- Erizka Marwia Triyonate, A. K. (2015). faktor determinan anemia pada wanita dewasa usia 23-35 tahun. *Journal of Nutrition Collage*, 4.
- Fauziyah, Anny. 2012. *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Nutrisi Prakonsepsi Terhadap Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Praktik Konsumsi Makanan Sehat Wanita Pranikah di Kota Tegal*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fikawati, Sandra, Ahmad Syafiq dan Khaula Karima. 2015. *Gizi Ibu dan Bayi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fikawati S, Syafiq A, Veratamala A *Gizi Anak dan Remaja*. Depok: Rajawali Pers; 2017
- Fraser Diane & Cooper Margaret .2009 *Rencana Asuhan Keperawatan Medical Bedah*. Jakarta. EGC
- Hidayah, N. (2016). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB ANEMIA WANITA USIA SUBUR DI DESA JEPANG PAKIS KABUPATEN KUDUS. *The 3 University Reseach Colloquium*, 70–78.
- I Putu Suiraoaka, A.A. Gede Raka Karanaya, & H. N. (2016). pengaruh model pendidikan sebaya terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang anemia gizi besi di SMK Negeri 4 Dempasar. *Jurnal Ilmu Gizi*, vol 5 no 4, 1–9.
- Indriani Yaktiworo, Reni Zuraida dan Rabiatul Adawiyah. 2013. Pola Makan Dan Tingkat Kecukupan Gizi Wanita Usia Subur Pada Rumah Tangga Miskin. Seminar Nasional Sains & Teknologi V Lembaga Penelitian. Universitas Lampung.

- Juraida Roito Harahap. (2015). pengaruh distribusi makanan beban ganda dan pengambilan keputusan terhadap anemia dalam kehamilan di wilayah kerja puskesmas rumbio jaya kabupaten kempar. *Jurnal Proteksi Kesehatan, volum 4 no*, 79–90.
- Juslina, Thaha, A. R., & Virani, D. (2013). Asupan Zat Besi (Fe) dan Hubungannya dengan Jenis-Jenis Anemia pada Wanita Prakonsepsi di Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, 190*, 1–10.
- Kaderman Matius Harita. (2018). *Perbedaan Asupan FE dan Kadar HB Anak Gizi Kurang 12-59 Bulan Sebelum Dan Sesudah Di Intervensi Cookies Tepung Daun Kelor Di Wilayah Kerja Puskesmas Pertumbuhan*.
- Kementrian Agama RI. (2015). *RIAL-Quran Dan Terjemahannya*. jakarta Toha Putra
- Kementerian Kesehatan RI. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementeria Kesehatan RI. Jakarta: 2013.
- KEMENKES. (2016). *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia*. 97.
- Khumaira, Marsha. 2012. *Ilmu Kebidanan*, Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Kusmiran, Eny. 2011. *Kesehatan reproduksi remaja dan wanita* . Jakarta. Salemba Medika.
- Nurhidayati Rohmah Dyah. (2013). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Anemia Pada Ibu Hamil Diwilayah Kerja Puskesmas Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. *Naskah Publikasi*, 1–16.
- Nurjannah. A. (2017). Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ny “M” Dengan Anemia Di Puskesmas Mamajang. *Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehtan*.
- Manshur Abd al-Qadir. 2009. *Buku Pintar Fikih Wanita*. Cetakan : Jakarta: Zaman.
- Mangkuji Betty. (2013). *Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney*. jakarta: penerbit buku kedokteran EGC.
- Masthalina H, L. D. Y. (2015). Pola Konsumsi (Faktor Inhibitor dan Enhacer Fe) terhadap Status Anemia Remaja Putri. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, 11(1)*, 80–6.

- Miratu Megasari, S.S.T., M. K., Juli Selvi Yanti, M. K., Een Husanah, M. K., & Novita Lusiana, M. K. (2015). *Rujukan Lengkap KONSEP KEBIDANAN*.
- Purwandari, A., Lumy, F., Dalema, A., & Tuminting, P. (2019). Pemanfaatan Jambu Biji Merah Dan Pisang Ambon Terhadap Peningkatan Kadar Haemoglobin Ibu Hamil. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 7, 29–37.
- Paratmanitya, Y., Hadi, H., & Susetyowati. (2014). Citra Tubuh , Asupan Makan Dan Status Gizi Wanita Usia Subur (Wus) Pranikah Program Pascasarjana. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 8(3), 126–134. <https://jurnal.ugm.ac.id/jgki/article/view/18208>
- Patimah, Sitti. 2017. *Gizi Remaja Putri Plus 1000 Hari Pertama Kehidupan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Qalbi, M. N., Thaha, A. R., & Syam, A. (2014). *Indikator Antropometri dan Gambaran Conjunctiva sebagai Prediktor Status Anemia pada Wanita Prakonsepsi di Kota Makassar*. 1–11.
- Ratna Ayu Dinar. (2017). *Manajemen asuhan antenatal pada ny R dengan anemia di puskesmas somba opu Gowa*.
- Risikesdes, 2016. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Sahana ON, S. S. (2015). Hubungan Asupan Mikronutrien dengan Kadar Hemoglobin pada Wanita Usia Subur (WUS). *Media Gizi Indonesia*, 10(2), 184–91.
- Sherwood, L. (2011). *Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem*. Ed 2 Jakarta: EGC.
- Siagian, A. E. (2017). Research Article Relation Between Food Consumption and Anemia in Children in Primary School in a. *Final Disposal Waste Area. Pakistan J Nutr*, 16(4), 242–8.
- Silawati, V., & Sari, A. K. (2020). Upaya Berbasis Sekolah Peningkatan Hemoglobin dalam Masa Menstruasi Remaja Putri : Studi di SMP 113 Jakarta. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 6(2), 8–13.
- Siti, O., Dan, A., & Irianto, S. (2015). status anemia, perilaku dan pengetahuan gizi serta kesehatan reproduksi buruh perempuan. *Jurnal Unimus*, 219–232.
- Sudigno, S. (2017). Prevalensi dan Faktor Risiko Anemia pada WUS di Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(2), 71–82.

- Sudikno, S. (2016). prevalensi dan faktor resiko anemia pada wanita usia subur si rumah tangga miskin di bkabupaten tasikmalaya dan ciamis provinsi jawa barat. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(2), 71–82.
- Sudirman. (2016). *Indonesian Journal of Human Nutrition*. 3(2), 105–122.
- Sufyan, D., Oy, S., & Mardiana, S. (2019). Hubungan antara Kecukupan Energi dan Protein dengan Prevalensi Anemia pada Wanita Usia Subur di Kecamatan Ciampea Bogor. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 11, 232–237.
- Susarmi. (2017). *LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. ” H ” DENGAN ANEMIA SEDANG DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA KOTA BALIKPAPAN 01 MARET - 10 JUNI 2017 Oleh : ANDI WAHYUNI NIM : PO 7224114002.*
- Susilowati.Kuspriyanto.2016. *Gizi dalam Daur kehidupan*.Bandung: PT Refika Aditama
- Syakir, S. (2018). PENGARUH INTERVENSI PENYULUHAN GIZI DENGAN MEDIA ANIMASI TERHADAP PERUBAHAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG ANEMIA PADA REMAJA PUTRI. *Journal Uhamka*, 3(1), 18–25.
- Tarwoto,Ns., dan Wasnidar. 2007. *Anemia Pada Ibu Hamil*. Trans Info Media. Jakarta.
- Tiaki Nur Khatim Ah. 2017. Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri Kelas XI Di SMKN 2 Yogyakarta.
- Tsalissavrina, I., Prawirohartono, E. P., & Lestari, L. A. (2012). Efek F100 dan formula tepung tempe terhadap kadar serum Fe dan hemoglobin pada anak gizi kurang. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 9(1), 25–33.
- Uto, M. Y. (2016). Asuhan Kebidanan Pada Ny A.M ia ruangan edelweis RUSD Dr.Dr. W. *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri*.
- Wijayanti, E., Fitriani, U., & Tengah, J. (2019). PROFIL KONSUMSI ZAT GIZI PADA WANITA USIA SUBUR ANEMIA Nutrient Intake Profil in Anemic Childbearing Age Women payung “ Observasi Klinik Formula Jamu. *MGMI, VOL 11 No*, 39–48.
- Widyaastuti,dkk. *Kesehatan Reproduksi* . Yogyakarta: Fitramaya. 2010.
- Yohanes. (2020). *potensi sirsak (annona moricata) sebagai pecegahan kista ovarium*. 8(1), 92–101.

Yulifah, R., & Surachmindari. (2013). *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.

Yulifah, R., & Surachmindari. (2013). *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.

Yuni,Erlina,Natalia.2018. *Kelainan Darah*. Yogyakarta.

Yuni EY. *Kelaiana Darah*. Yogyakarta: Nuha Medika: 2015

Yulifah, Rita dan Sucarhmindari. 2014.*Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan*, Jakarta: Salemba Medika.

Zafira, A. I. (2019). *Analisis Pencegahan dan Penanganan Ovarian Cysts Ditinjau dari Pola Makan Pasien*.

Zeln,Umar. 2010. *Ilmu Kesehatan Umum*. Medan. USU Pres.



RIWAYAT HIDUP



A. IDENTIAS PENULIS

Nama : Citra Ayu Zaharani
 NIM : 70400117042
 Tempat/Tanggal Lahir: Bantaeng/ 02 Mei 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jln. Ahmad Yani Lumpangang Dusun Polewi Desa
 Lumpangang. Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten
 Bantaeng.

Nama Orang Tua

1. Ayah : Zainuddin Rani, S.Pd, MM
2. Ibu : Hasnia Sunusi A.Ma

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD : SDN 40 Lumpangang (2006 – 2011)
2. Tamat SMP : SMPN 2 Bantaeng (2011 – 2014)
3. Tamat SMA : SMAN 4 Bantaeng (2014 – 2015)
 SMAN 3 Bantaeng (2015 – 2017)
4. Tahun 2017 mengikuti pendidikan di Universitas Islam Negeri
 Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan (2017 – 2021)