MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA POST PARTUM BLUES
(*Literatur Review*)

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Meraih Gelar
Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ROHANA
NIM: 70400117016

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rohana
Nim	: 70400117016
TTL	: Lanta Barat/5 Agustus 1999
Jurusan/Prodi	: Kebidanan
Fakultas/Program	: Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat	: Desa Lanta Barat kec. Lambu kab. Bima
Judul	: Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Post Partum Blues (*literatur review*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Samata, 15 september 2021

Penulis

Rohana

NIM: 70400117016

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Rohana

Nim : 70400117016

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan pada Post Partum Blues (*Literature Review*)

Karya Tulis Ilmiah (KTI) telah di periksa dan di setujui oleh pembimbing untuk di ajukan dalam Seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 15 Oktober 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Ferawati Tanerong, S.ST., M.Keb	**dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed**
NIP : 19760126 200604 2 0012	NIP : 198704072015032003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul **"Manajemen Asuhan kebidanan Pada Pos Partum Blues (*Literatur Review*)"**. Yang disusun oleh **Rohana Nim: 70400117016**, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 20 Oktober 2021 M, dinyatakam telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 20 Oktober 2021
13 Rabiul Awal 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb.	(.....)
Pembimbing I	: Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed	(.....)
Penguji I	: Dr. dr. Nadyah Haruna, M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Muhammad Sabir Maidin, M. Ag	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Kedokteran &Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang sederhana ini dengan judul **"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Post Partum Blues"** penulis menyadari karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan hasil kerja tugas akhir ini agar menjadi jauh lebih baik lagi.

Maka itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Terima kasih yang sangat spesial dan tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta ayahanda Muhammad dan ibunda Arna yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dukungan moril dan materil, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih dan sayang dengan penuh ke ikhlasan sehingga Allah SWT selalu memberi keberkahan hidup serta kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Kepada kakak-kakak tersayang Maskur, Firmansyah, Ernawati, Efi Nafiri, Arifudin, serta keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya selama ini yang membuat Penulis semakin bersemangat untuk mencapai gelar ini. Kepada kalian, Penulis persembahkan karya sederhana ini sebagai wujud cinta dan kasih sayang. Kepada seluruh keluarga yang senantiasa mendo'kan memberikan dukungan kepada Penulis, Syukron Jaziila Khair.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

2. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, MA,Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Makassar
3. Kepada Ibu Dr.dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes Sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar.
4. Ibunda Firdayanti, S.Si.T.,M.Keb Selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Makassar.
5. Ibunda Ferawati Taherong,S.ST.,M.Keb selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya dan membantu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (*Literatur Review)*
6. Ibunda dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (*Literatur review)*
7. Ibunda Dr. dr. Nadyah, M.Kes selaku penguji I yang telah memberikan ilmu kepada saya, memberi kritik dan saran yang membangun guna untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.
8. Ayahanda Dr Sabir Maidin, M. Ag selaku penguji II yang telah senantiasa memberikan saya tambahan ilmu agama serta memberikan masukan dan saran yang bersifat islamiah pada Karya Tulis Ilmiah sehingga penulis dapat mengetahui hubungan kasus yang penulis angkat dan kaitanya dengan islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

9. Segenap dosen terkhususnya para dosen Prodi Kebidanan dan para staf akademik kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing penulis selama dalam penyusunan proposal ini berlangsung.
10. Kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan nasehat dan masukan untuk kebaikan penulis sendiri. Terima kasih untuk selalu menjadi alasan penulis untuk tetap berpendidikan.
11. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu mensupport sayadan saudarisaudari seperjuangan Aviditas Kebidanan 2017 yang membuat bangku perkuliahan lebih berwarna.
12. Semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan proposal ini.

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Amiin.

Makassar, 15 Oktober 2021

Penulis

ROHANA
NIM: 70400117016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**

Halaman Pernyataan Keaslian KTI ..... **ii**

Halaman Persetujuan Karya Tulis Ilmiah ..... **iii**

Pengesahan Karya Tulis Ilmiah ..... **iv**

Kata Pengantar ..... **v**

Daftar Isi ..... **viii**

Abstrak ..... **xi**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Ruang Lingkup 4

C. Tujuan Penulisan 4

1. Tujuan Umum 4

2. Tujuan Khusus 4

D. Manfaat Penulisan 5

E. Sistematika Penulisan 5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA **8**

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas 8

1. Pengertian Masa Nifas 8

2. Adaptasi Psikologis Masa Nifas 11

3. Perubahan Fisiologi Persalinan 11

B. Tinjauan khusus tentang post partum blues 12

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

1. Definisi Post Partum Blues 12
2. Gejala Post Partum Blues..... 14
3. Penyebab Post partum blues..... 15
4. Faktor Resiko Post partum blues 17
5. Patofisiologi post partum blues..... 17
6. Penanganan post partum blues..... 19
C. Manajemen Asuhan Kebidanan 24
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan 24
2. Tahapan Dalam Manajeman Asuhan Kebidanan 27

BAB III TELUSURAN *EVIDANCE BASED LEARNING*

A. Matriks Langkah I..... 29
B. Matriks Langkah II..... 39
C. Matriks Langkah III 48
D. Matriks Langkah IV..... 64
E. Matriks Langkah V..... 78
F. Matriks Langkah VI..... 90
G. Matriks Langkah VII 101

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telaah Evidance Based Asuhan 7 langkah Varney berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi 114
B. Implikasi Kebidanan 168

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 170

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

B. Saran 171

DAFTAR PUSTAKA 174

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, 20 Septmber 2021

Nama	**:**	**Rohana**
NIM	**:**	**70400117016**
Pembimbing 1	**:**	**Ferawati Taherong, S.ST.,M.Keb**
Pembimbimg 2	**:**	**dr. Jelita Inayah Sari, M.biomed**
Judul	**:**	**MENEJENEN ASUHAN KEBIDAN AN POST PARTUM BLUES *(Literatur Review***

Post partum blues merupakan problem pisikologis sesudah melahirkan seperti kemunculan kesedihan, kemurungan atau kecemasan, labilitas perasaan dan depresi pada ibu. Biasanaya terjadi secara teori terjadi sejak kelahiran bayi atau mulai minggu ke-4 dan biasanya hanya terjadi selama 2 hari hinggan 4 minggu. Angka kejadian post partum blues di Asia cukup tinggi dan sangat bervariasi antara 26-85%, sedangkan di Indonesia angka kejadian post partum blues antara 50-70%. Jika post partum blues dibiarkan, dapat berlanjut menjadi depresi pasca melahirkan. Berbagai faktor yang dapat melatarbelakangi post partum blues adalah dukungan keluarga, pengetahuan, status kehamilan dan jenis persalinan.

Literatur review ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan 7 langkah menurut Helen Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Berdasarkan hasil dari referensi bahwa tindakan yang dilakukan untuk penatalaksanaan pada ibu dengan post partum blues yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan individu Pemberian pendidikan kesehatan mengenai maternal depressive symptoms memperkenalkan ibu pada kondisi yang mungkin dialaminya setelah melewati masa persalinan. Pendidikan kesehatan ini juga membantu ibu menemukan alternatif pemecahan masalah jika timbul gejala depresif yang dapat dirasakan sendiri oleh ibu melalui aktifitas fisik berupa senam nifas dan relaksasi seperti terdapat dalam buku panduan yang diberikan.

Kesimpulan dari hasil literatur review yang didapatkan dari berbagai sumber yaitu didapatkannya hasil asuhan pada ibu dengan postpartum blues keadaan umum ibu membaik , kesadaran composmentis, tanda-tanda vital normal, serta postpartum blues teratasi dengan tidak terjadinya berbagai komplikasi yang mungkin dapat timbul seperti dedpresi.

Kata kunci : Post Natal Care, Post Partum Blues, 7 Langkah Varney

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, SEPTEMBER 20, 2021

Name : Rohana
Reg. Number : 70400117016
Supervisor 1 : Ferawati Taherong, S.ST.,M.Keb
Supervisor 2 : dr. Jelita Inayah Sari, M.biomed
Tittle : *Post Partum Blues Midwifery Care Management (A Literature Review)*

Postpartum blues is defined as low mood and mild depressive symptoms such as sadness, moodiness, anxiety and depression that are transient and self-limited and are extremely common in the perinatal period. This symptom mostly occurs on the week 4 during postpartum period, and it generally happens in 2 days or even longer to 4 weeks. The occurrences of postpartum blues in Asia are considered to be high and varies between 26-85% in every country. In Indonesia, the occurrences of post partum blues were apparent to be between 50% and 70%. If the postpartum blues are ignored, the symptom can progress into a postpartum depression. Various factors have been considered to be the main causes of post partum blues such as the lack of family support, the lack of knowledge, the pregnancy status, and the type of delivery experienced by a mother.

The major purpose of this research was to investigate the midwifery care management that should be taken in handling the case of postpartum blues. The research was conducted based on 7-stages of Varney management approach and SOAP documentation procedure.

The findings of this research indicated that the major treatment that should be given to a mother with the case of postpartum blues were by providing personal health advice related to maternal depressive symptoms. It is also important to introduce the mother on various physical and psychological conditions that might be experienced by a mother with a new baby. This health advice education may also help the mother to find alternative solutions if depressive symptoms arise again during her postpartum period. Various personal treatments could be done such as physical activities in the form of postpartum exercises and relaxation. Those activities could be personally done by paying attention on the provided health guidebook.

Based on the refernce tracing and analysis, this study concludes that providing medical health consultation and appropriate treatments could help new mothers to solve their postpartum blues. In general, after giving appropriate treatments on patients with postpartum blues, mothers condition will generally improve shown by their composmentis consciousness, their normal vital signs, and the absence of any various complications or depression.

Key words: Perinatal Care, Post Partum Blues, 7-stages of Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Masa nifas merupakan masa semua organ reproduksi perempuan setelah melahirkan ke kondisi semula seperti sebelum hamil (Lowdermilk et al., 2013). Proses pemulihan pada masa nifas disebut dengan adaptasi postpartum. Adaptasi postpartum terdiri dari dua yaitu adaptasi fisiologi dan psikologis. Adaptasi psikologis pada ibu postpartum dimulai ketika seorang ibu mulai merawat dan mengurus bayinya. Hal ini merupakan peran dan tanggung jawab baru bagi setiap wanita setelah melahirkan (Sylvén et al., 2017). Peran dan tanggung jawab baru ini sering membuat ibu merasa tidak percaya diri dan mengalami stress. Ibu merasa sedih dan putus asa karena belum mampu untuk merawat bayi dengan baik. Kondisi ini membuat ibu menjadi lebih sensitif. Kondisi seperti ini dikenal dengan baby blues atau postpartum blues. Kondisi ini muncul pada minggu pertama sampai kedua setelah melahirkan yang puncaknya pada hari ke tiga sampai kelima. Kejadian postpartum blues ini dialami oleh duapertiga ibu postpartum. Di Asia kejadian postpartum blues mencapai 26-85 % sedangkan di Indonesia berkisar 50-70% (Restyana, 2014). Penyebab postpartum blues belum diketahui secara pasti. Banyak factor yang dapat menyebabkan postpartum blues, salah satunya yaitu dukungan sosial (Ningrum, 2017). Dukungan sosial bisa berasal dari suami, keluarga dan tetangga/lingkungan. Penyebab postpartum blues yang lain yaitu terjadi pada wanita primipara karena berada dalam masa adaptasi, bagi wanita primipara kondisi setelah melahirkan dapat menimbulkan stres,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

karena perubahan peran (Masruroh, 2013), dukungan suami dan kesiapan ibu dalam melahirkan (Susanti & Sulistiyanti, 2016), usia ibu, paritas dan dukungan sosial suami (D. A. Fatmawati, 2015), pekerjaan dan dukungan keluarga (Wahyuni et al., 2014).

WHO melaporkan sekitar 99% kematian ibu terjadi di negara berkembang pada tahun 1994 dari 95.866 persalinan terdapat 67 kematian ibu (69.9/100.00 k elahiran hidup), jumlah kematian di luar rumah sakit sangat tinggi 73.3% dan di dalam rumah sekitar 26.7%.

Data dari WHO (2018) mencatat prevalansi post partum blues secara umum dalam populasi dunia adalah 3-8% dengan 50% kasus terjadi pada usia produktif 20-50 tahun. WHO juga mengatakan bahwa ganguan post partum blues ini mengenai sekitar 20% wanita dan 12% laki-laki pada suatu waktu kehidupan (Hutagoal, 2019). Sementara prevalansi post partum blues di Negara-negara Asia cukup tinggi dan bervariasi antara 26-85% dari wanita pasca persalinan Munawaroh, 2018).

Di indonesia telah dilakukan beberapa penelitian tentang depresi post partum berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Edwar (2017). Angka kejadian Post partum blues di Indonesia mencapai 23% sedangkan skrining dengan mengunakan EPDS didapatkan bahwa 14-17% wanita post partum beresiko mengalami post partum blues. Tingginya angka kejadian post partum blues pada ibu yang melahirkan dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keadaan psikologis ibu.

Pengaruh konseling terhadap depresi post partum, hasil penelitian ini sejalan denggan penelitian hutagaol (2010) pada ibu-ibu trimester tiga dengan jumlah sampal 50 responden (intervensi 25, kontrol). Hasil depresi pada ibu post partum normal rata-rata depresi kelompk yang di brikan intervensi edukasi menunjukan penurunan sedangkan kelompok kontrol menunjukan menunjukan peningkatan berdasarkan uji statistik terhadap perbedaan yang bermakna dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

nilai *p* value 0,000 (p<0,05) sehinga dapat di simpulkan bahwa intervensi edukasi dapat berfungsi terhadap depresi pada ibu post partum. (Aisyiyah 2017)

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Setyowati dan Uke (2006), menjelaskan bahwa kemungkinan terjadinya post partum blues di sebabkan oleh pengalaman yang tidak menyenangkan pada priode kehamilandan persalian sebanyak 38,71%, faktor pisikososial (dukungan sosial sebanyak 19,35%, kualitas dan kondisi bayi baru lahir sebanyak 16,31 %)serta faktor spritual sebanyak 16,31 % (Machmudah. 2010).

Ibu post partum blues harus di tangani secara kuat, karna peran ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak juga dalam hubunganya dengan peran ibu di keluarga. Untuk itu seorang ibu yang berada dalam kondisi pasca melahirkan perlu mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam menjalankan perawatan sebagai pendidik untuk meningkatkan penggatahuan ibu tentang post partum blues dengan memberikan informasi melalui penyuluhan-penyuluhan agar ibu-ibu pasca melahirkan yang mengalami ganguan pisikologis pasca melahirkan tidak jatuh pada ganguan jiwa.

Kejadian post partum blues secara pisikologis, seorang wanita yang baru saja melahirkan akan mengalami tekanan pisikis. Banyak wanita yang sepintas merasa bahagia dengan keahiran bayinya, namun setelah dengan itu, akan muncul ganguan suatu hati, perasaan sedih dan tekanan yang dialami oleh seorang wanita setelah melahirkan yang berlangsung pada minggu pertama, terutama pada hari ketiga hingga kelima. Ganguan psikologis tersebut di sebut dengan post partum blues. (Hasni, et all. 2012).

Pada tahun 2018 angka kejadian post partum di RSU Pertiwi Makassar menunjukan sebanyak 20 ibu post partum mengalami post partum blues pada ruangan perawatan dan pada tahun 2019 angka kejadian post partum blues mengelamai penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 14 orang dari 944 ibu post partum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan **Manejemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Post Partum Dengan Post Partum Blues Di RSU Pertiwi Makassar.**

B. Ruang lingkup

Ruang lingkup pembahasan karia tulis ilmia ini meliputi manejemen asuhan kebidanan dengan post partum blues.

C. Tujuan penulisan

Penulisan karya ilmia bertujuan untuk:

1. Tujuan umum

Dapat melaksanakan manejemen asuhan kebidanan pada post partum blues di RS Pertiwi Makassar melalui pendekatan dengan mengunakan manejemen kebidanan 7 langkah varney dan pendekatan SOAP sesuai dengan wilaya kerja Bidan.

2. Tujuan khusus

a. Dilaksanakanya pengkajian dan analisa data pada post partum blues di RSU Pertiwi Makassar Tahun 2020.
b. Dirumuskanya diagnose /maalah potensial pada post partum blues di RSU Pertiwi Makassar Tahun 2020.
c. Dirumuskanya diagnosa / masalah aktual pada post partum blues di RSU Pertiwi Makasar Tahun 2020.
d. Diidentifikasinya tindakan segera dan kola borasip pada post partum blues di RSU Pertiwi Makasar Tahun 2020.
e. Didapatkanya rencana tindakan asuhan pada post partum blues di RSU Pertiwi Makasar Tahun 2020.
f. Dilaksakannya tindakan yang di susun pada post partum blues di RSU Pertiwi Makasar Tahun 2020.
g. Diketahuinya hasil tindakan yang di lakukan pada post partum blues di RSU Pertiwi Makasar Tahun 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

h. Didokumentasikanya semua temuan dan tindakan yang telah di berikan pada post partum blues di RSU Pertiwi Makassar Tahun 2020.

D. Manfaat penulisan

Adapun manfaat penelitian dalam kasus ini yaitu:

1. Manfaat praktis

   Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir program diploma kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Maksasar.

2. Manfaat ilmiah

   Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumber informasi, menambah pengetahuan serta sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

3. Manfaat bagi institusi

   Diharapkan karya tulis ilmiah ini dijadikan sebagai bahan acuan bagi institusi pendidikan dalan penyusunan karya tulis ilmiah selanjutnya.

4. Manfaat bagi penulis

   Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang manajemen asuhan kebidanan pada post partum blues di RSU Fatimah Makassar tahun 2020. Penulisan ini juga merupakan pengalaman yang berharga karna dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang ibu dengan kasus post partum blues.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, metode yang digunakan adalah:

1. Studi kepustakaan

   Penulis mempelajari buku, literatur, dan media internet yang berhubungan dengan post partum blues.

2. Studi kasus

   Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

langkah meliputi: identifikasi data dasar, indetifikasi diagnose/masalah aktual, indetifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi rencana asuhan atau intervensi, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan teknik ini antara lain:

a. Anamnesa

Pada teknik ini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan di RSU Pertiwi Makassar dengan koreksi manual, melakukan pendekatan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang memberikan informasi untuk kebutuhan penelitian ini.

b. Pemeriksaan fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari pemeriksaan dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan teknik inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi

1) Inspeksi, merupakan metode observasi dengan obtik secara langsung dengan fungsi untuk mendeteksi tanda vital.
2) Palsasi, dilakukan dengan metode sentuhan ataupun rabahan berfungsi untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk
4) Auskultasi adalah mendengar apa yang dilakukan menggunakan stetoskop dengan tujuan mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi paristaltik usus, serta mengetahui tekanan darah, alat lain selain stetoskop adalah lenek yangdigunakan untuk mendengarkan denyut jantung janin (DJJ).

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui riwayat status kesehatan pada klien baik dari dokter, bidan, laboratoriun dengan data-data penunjang yang dibutuhkan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

4. Diksusi

   Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan keluarga klien, dokter, bidan, pembimbing institusi dan lahan yang membantu untuk mendapatkan jawaban yang menunjang kebutuhan penelitian.

F. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini terdiri dari bab I sampai V yaitu: pada bab I memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan kepenulisan, manfaat kepenulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Pada bab II memuat tentang tujuan teoritis yang terdiri dari tinjauan umum post partum, tinjauan umum mengenai post partum blues pandangan islam mengenai post partum blues, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Pada bab III yaitu studi kasus, pada bab ini diuraukan mengenai 7 langkah varney yang terdiri dari indetifikasi data dasar, indentifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan atau intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV memuat tentang pembahasan kesenjangan teori dan praktek asuhan kebidanan dilapangan yang dilakukan di RSU Fatimah Makassar dalam memberikan asuhan pada post partum blues.

Pada bab V berisi tentang penutup yang terdiri point kesimpulan dan point saran dari asuhan yang telah dilakukan, temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan kemudian selanjutnya dafar pustaka bagian ini memuat sumber dari literatur yang di jadikan bahan penyusunan karya tulis ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas

1. Pengertian Masa nifas

Masa nifas atau (puerperium) dimulai 2 jam seteah lahirnya palasenta sampai dengag 6 minggu (42 hari) setelah itu. Jadi puerperium yaitu dari kata puer yang artinya bayi dan peraus melahirkan. Jadi paurperium berarti masa setelah melahirkan bayi yaitu masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandung kemih kembali setelah pra hamil.sekitar 50 % kematian terjadi dalam 24 jam pertama pos partum sehingga pelayanan pasca persalianan yang berkualitas arusa terselenggara pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi.

Secara pisikologis, setelah melahirkan seorang ibu akan merasakan gejala psikiatri, demikian juga pada masa menyusui, agar perubahan pisikologis tidak berlebihan, ibu perlu mengatahu hal yang lebih lanjut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Kelahiran adalah sebuah momen yang dapat membentuk sebuah ikatan anatara ibu dan bayinya. Pada saat bayi di lahirkan adalah saat yang sangat menakjubkan bagi seorang ibu ketika iya dapat melihat, mengengam dan memberika ASI pada bayinya untuk pertama kalinya.

Menurut Brazeton (1978), *Bonding* merupakan suatu ketertarikan matual pertama antara individu, misalnya antara orang tua dan anak, saat pertama kali mereka bertemu. *Attachmet* adalah suatu perasaan menyayang ata 12 n loyalitas yang mengikat individu dengan individu lain sementara itu

Menurut Nelson Dan May (1996), *Boding attacdment* merupakan ikatan antara individu merupakan pencurahan perhatian, serta adanya hubungan emosional dan fisik yang akrab.

Menurut Klaus, Kenell (1992) *Boding attacdment* bersifat unik spesifik dan bertahan lama, mereka juga menambahkan bahwa ikatan orang tua terhadap anakna dapat terus berlanjut bahk selamanya walaupun terpisahkan oleh jarak dan waktu.

Bonding adalah suatu langkah untuk mengungkapakan rasa sayang oleh ibu terhadap bayinya, segera setelah lahir. Sedangkan *Attacdmean* adalah intraksi antara ibu dan bayi secara spesifik sepanjang waktu.

1. Prakondisi yang mempengaruhi ikatan (Marcer,1996) adalah sebagai berikut. :
   a. Kesehatan emosional orang tua.
   b. Sistem dukungan sosial yang meliputi pasangan hidup, teman dan keluarga.
   c. Suatu tingkat keterampilan dalam berkomunikasi dan memberikan asuhan yang berkomputen.
   d. Kedekatan orang tua dan bayi.
   e. Kecocokan orang tua bayi (termasuk keadaan, tempramen dan jenis kelamin)
2. Adaptasi pisikologis ibu masa nifas.

Banyak faktor yang diduga berperan dalam sindrom ini, salah satu yang penting adalah kecukupan dukungan sosial dan lingkungan (terutama suami). Kurangnya dukungan sosial dari keluarga khusus nya dari suami selama priode persalinan (nifas) diduga kuat merupakan faktor penting dalam terjadinya *post partum blues.*

3. Prebuhan pisikologis pada masa nifas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Proses persalinan dan lahirnya bayi memberikan arti dan makna yang sangat besar bagi seorang ibu, bahka sering kali dapat mengubah sikap dan pisikologis orang tua.

Meskipun fisik ibu nifas secara bertahap mengalami pemulihan, secara emosional ibu nifas belum pulih, minggu pertama merupakan masa rentan, masi terdapat rasa gembira berganti depresi atau berubah-ubah di antara keduanya. Perasaan tidak mampu menyadi seorang ibu, merawat bayi, terutama jika ibu menyusui bertambah atau menurunya minat seks. Timbulnya gejala-gejala pisikologis tersebut di pengaruhi oleh:

a. Jenis persalinan yang ibu alami.
b. Dukungan dan lingkungan sekitar.
c. Bertambahnya tugas dan tanggung jawab ibu dangan kehadiran bayi.

Hal-hal yang dapat membantu ibu dalam beradaptasi pada masa nifas antara lain sebagai berikut:

a. Memahami fungsi menjadi orang tua.
b. Adananya respon dan dukungan dari keluarga.
c. Riwayat dan pengalaman kehamilan sertapersalinan sebelumnya.
d. Harapan, keinginan dan aspirasi saat hamil dan melahirkan.

Teori Revarubin (1963) Menjelaskan bahwa “seorang ibu yang baru melahirkan menglami adaptasi pisikologis paa masa nifas dengan mealalui tiga fase penyusuaian ibu (prilaku ibu terhadap perangnya sebagai ibu“ tiga fase adaptasi pisikologi masa nifas dapat di paparkan sebagai berikut :

1) Fase taking in

Hari pertama sampai hari ke dua setelah persalian ibu masih merasakan kelelahan setelah persalian yang di laluainya. Pada saat ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

fokus perhatian ibu pada bayinya sendiri, sehingga cenderung pasif pada lingkunganya, ketidak nyamanan yang di alami antara lain rasa mules, nyeri pada luka jahitan, kurang tidur, kelelahan hal yang perlu di perhatikan dalam fase ini adalah istirahat yang cukup, komunikasi yang baik nutrisi.

Pengalaman selama proses persalinan sering berulang di ceritakanya, kelelahan membuat ibu perlu cukup istirahat untuk mencegah gejala kurang tidur, seperti mudah tersinggung, hal ini membuat ibu cenderung lebih pasif terhadap lingkunganya oleh karna itu kondisi ini perlu di pahami dan menjaga komunikasi yang baik.

a. Ganguan pisikologis yang dapat di alami ibu pada fase ini adalah:
   1) Kekecewaan pada bayinya.
   2) Ketidak nyamanan sebagai akibat perubahan fisik yang di alami
   3) Rasa bersalah karna belum bisa menyusui bayinya
   4) Kritikan suami atau keluarga tentang perawatan bayinya.

2). Fase Aking Hold

Fase ini berlangsung 3-10 hari setelah melahirkan pada fase taking hold, ibu merasa khawatir akan rasa ketidak mampuan dan rasa tanggung jawabnya terhadap merawat bayi, selain itu perasaan yang sangat sensitif dan muda tersinggung jika komunikasi kurang hati-hati. Oleh karna itu ibu memerlukan dukungan karna saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk menerima berbagai penyuluhan dalam merawat diri dan bayinya sehingga tumbu rasa percaya diri.

3). Fase Letting Go

Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan perang barunya yang berlang sung 10 hari setelah melahirkan. Dan sudah mulai menyusuaikan diri dengan ketergantunggan bayinya, keinginan untuk merawat diridan bayinya meningkat dalam fase ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Hal yang harus di penuhi dalam masa nifas adalah sebagi berikut:

a. Fisik: istirahat, asupan gizi, lingkungan bersih,
b. Pisikologi: dukungan dari keluarga sangat di perlukan.
c. Sosial: perhatian, rasa kasih sayang, menemani ibu saat sedih dan menemani saat ibu merasa kesepian.
d. Pisikososial.

B. Tinjauan Khusus Tentang Post Partum Blues

1. Pengertian Post Partum Blues

Melahirka adalah karunia terbesar bagi wanita dalam hidupnya, sayangnya taksemua mengangap seperti itu, bahkan ada juga wanita yang mengalami depresi setelah melahirkan, depresi ini adalah bahasa kedokterannya adalah depresi post partum atau baby blues.

Jadi post partum blues merupakan problem pisikologis sesudah melahirkan seperti kemunculan kesedihan, kemurungan atau kecemasan, labilitas perasaan dan depresi pada ibu. Biasanaya terjadi secara teori terjadi sejak kelahiran bayi atau mulai minggu ke-4 dan biasanya hanya terjadi selama 2 hari hinggan 4 minggu.

Menurut (Sudarsono, 2009) wanita yang baru pertama melahirkan lebih umum menderita depresi karna setelah melahirkan wanita tersebut berada dalam proses adaptasi, kalau dulu hanya memikirkan diri sendiri, begitu bayi lahir jika ibu tidak paham peran barunya, dia akan menjadi binggung sementara bayinya harus tetap di rawat. Sedangkan ibu yang sudah pernah beberapa kali melahirkan secara pisikologis lebih siap menghadapi bayinya di banding dengan ibu yang baru pertama kali.

Post partum blues ialah keadaan transien dari peningkatan reaktifitas emosional yang dialami oleh separuh dari wanita dalam jangka waktu satu minggu pasca persalinan. Gejala klinis jelas terlihat dari hari ke 3 hingga hari ke 5, kemudian menghilang dalam beberapa jam hingga beberapa hari kemudian. Post partum blues umumnya terjadi 50% pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

ibu baru (Rahayu, 2017). Periode post partum menyebabkan stress emosional terhadap ibu baru, bahkan lebih menyulitkan bila terjadi perubahan fisik yang hebat. Angka kejadian post partum blues di Asia cukup tinggi dan bervariasi antara 26-85%, sedangkan di Indonesia angka kejadian post partum blues antara 50-70% dari wanita pasca persalinan (Susanti, 2017).

Menurut Bobak (dalam Fitriana 2015) di Indonesia kejadian post partum blues yaitu 50 – 70 % dan hal ini dapat berlanjut menjadi depresi postpartum dengan jumlah bervariasi dari 5% hingga lebih dari 25% setelah ibu melahirkan. Data dari BKKBN Provinsi Aceh (2012) dalam Fitriana (2015) menunjukkan bahwa 7 dari 10 ibu yang melahirkan di Provinsi tersebut mengalami depresi berat setelah melahirkan. Gejala depresi yang ditunjukkan 23 seperti susah tidur dan tidak nafsu makan merupakan keluhan yang paling sering dirasakan para ibu pasca melahirkan.

a. Dampak Post Partum Blues

Prilaku Post Partum Blues akan menimbulkan masalah terutama pada tumbuh kembang anak itu sendiri.

Post Partum Blues menurut Ambarwati (2009) adalah perasaan sedih yang dialami oleh ibu setelah melahirkan, hal ini berkaitan dengan bayinya.

Menurut Cunninghum (2006), post partum blues merupakan ganguan suasana hati yang berlangsung 3-6 hari pasca melahirkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2. Gejala Post Partum Blues

Gejala post partum blues menurut Ambarwati (2009)

a) Menangis
b) Mengalami perubahan perasaan
c) Cemas
d) Khawati mengenai sang bayi
e) Kesepian
f) Penurunan gairah seksual
g) Kurang percaya diri terhadap kemampuanya menjadi seorang ibu.

Adapun beberapa-beberapa gejala post partum blues menurut engga aksara di tahuh (2012), yaitu :

a) Merasakan cemas dan khawatir yang berlebihan
b) kebingungan
c) tidak percaya diri
d) mengangap dirinya tidak berguna
e) perasaan sedih
f) hiperaktif atau senang secara berlebihan
g) mudah tersingung (sensitif)
h) menyendiri dan mengabikan bayi
i) marah secara berlebihan

Selain dari gejala yang telah diuraikan Pitriani juga mengatakan bahwa gejala post partum blues terbagi atas atas 2, yaitu gejala umum dan gejala medis.

a. Gejala umum pada ibu post partum blues menurut Fitriani (2014) terbagi atas 6, yaitu :

1) Perasaan negatif terhadap bayi yang dilahirkannya (termasuk adanya keinginan untuk membunuh bayi tersebut)

2) Perubahan drastis berat badan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

3) Adanya perasaan untuk membenci diri sendiri, perasaan bersalah dan merasa dirinya tidak berguna bagi orang lain

4) Sama sekali tidak bias berkonsentrasi walaupun dengan masalah kecil

5) Mudah marah, mudah terhasut, kegelisahan secara mendalam dan kehilangan harapan

6) Merencanakan dan percobaan bunuh diri

7) Sering terganggu dalam waktu istirahat dan insomnia berat

8) Muncul perasaan malas untuk mengurus bayinya (Pitriani, 2014 : 82).

b. Gejala Medis

Gejala post partum blues sampai saat ini belum ada tes khusus yang dapat mengdiagnosis gejala langsung post partum blues. Secara medis dokter menyimpulkan beberapa sistem yang dapat yang tampak dapat disimpulkan sebagai depresi post partum blues bila memenuhi gejala yang ada. Kekurangan hormon tiroid pada individu yang mengalami kelelahan yang luar biasa (fatigue) ditemukan juga pada ibu yang mengalami post partum blues jumlah kadar tiroid yang sangat rendah (Pitriani,2014 : 93).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

3. Penyebab Post Partum Blues.

Faktor-faktor yang memempengaruhinya dan factor penyebab post partum blues di antaranya adalah:

a. Faktor hormonal, berupa perubahan kadar estrogen, progestron, prolaktin danestroil yang terlalu rendah dan terlalu tinggi. Kadar estrogen turun secara bermakna setelah melahirkan ternyata estrogen memiliki efek supresi terhadap aktivitas enzim otak yang berkerja mengaktifkan, baik narodrenalin maupun serotoni yang berperan dalam suasana hati dan kejadian depresi.

b. Faktor demografi, yaitu umur dan paritas. Umur yang terlalu muda untuk melahirkan, sehingga dia memikirkan tanggung jawab sebagai seorang ibu untuk mengurus anaknya. Sedangkan post partum blues

c. Banyak terjadi pada ibu priminipara, mengingat dia baru memasuki peranya sebagai seorang ibu, tetapi tidak menuntut kemungkinan juga terjadi pada ibu yang sudah pernah melahirkan, yaitu jika ibu memiliki riwayat post partum blues sebelumya.

d. Pengalam dalam proses kehamilan dan persalinan. Kesulitan-kesulitan yang dialami ibu selama kehamilanya akan turut memperburuk kondisi ibu setelah melahirkan. Sedangkan pada persalinan, hal-hal yang tidak menyenangkan pada ibu mencakup lamananya persalinan serta intervensi medis yang di gunakan selama proses persalinan, seperti ibu yang melahirkan dengan cara oprasi sesar akan menimbulksn perasaan takut pada peralatan oprasi dan jarum. Ada dugaan bahwa semakin besar trauma fisik yang terjadi selama proses persalinan akan semakin besar pula trauma pisikis yang muncul.

e. Latar belakang pisikososial wanita yang bersangkutan, seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, kehamilan yang tidak di inginkan, riwayat ganguan kejiwaan sebelumnya, status sosial dan ekonomi, serta keadaan dukungan sosial dari lingkungan (suami, keluarga dan teman). Apakah suami menginginkan juga kehamilan ini.? Apakah keluarga dan teman memberikan dukungnan moril (misalnya dalam membantu dalam menyelesaikan dukungan rumah tangga atau berperan sebagai tempat ibu mengadu/berkeluh kesah) selama ibu menjalani masa kehamilanya.

f. Fisik. Kelelahan fisik karna aktivitas mengasu bayi menyusui, memandikan, menganti popok, dan menimang sepanjang hari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

bahkan tak jarang di malam buta sangatlah menguras tenanga apalagi jiak tidak ada bantuan dari suami atau anggota keluarga yang lain.

4. Faktror Resiko Post Partum blues

Factor resiko post partum blues berdasarkan hasil penelitian retrospektif pada 182 perempan (O'Hare *et al*,1991 *cit* posmontier & waite,2011) yaitu riwayat pribadi dan keluarga dengan depresi, penyesuain social, peristiwa yang membuat stress dalam hidup dan kadar estriol bebas dan total. Umur, pendidikan dan paritas tidak berhubungan dengan post partum blues. (Hapgood *et al*, 1988 *cit* posmontier & waite, 2011) menemukan bahwa usia, ras, status pernikahan, dan status sosialekonomibukanlah factor resiko postpartum blues, hau and levy (2003) *cit* posmontier & waite, (2011) menemukan bahwa wanita yang berusia antara 35 sampai 39 tahun mempunyai insidens post partum blues dibandingkan dengan usia 18 tahun sampai 35 tahun.

5. Patofisiologi Post Partm blues

Patofisiologi postpartum blues adalah adanya perubahan kadar estrogen, progestron, prolaktin denestroil yang terlalu rendah dan terlalu tinggi, kadar estrogen yang turun secara bermakna setelah melahirkan. Ternyata estrogen memiliki efek supresi terhadap aktifitas enzin otak. Yang berperan dalam suasana hati dan kejadian postpartum.

Sindrom post partum blues di sebabkan oleh perubahan hormone yang di alami oleh wanita. Perubahan hormon pada wanita di mulai sejak kehamilan sampai pasca persalinan. Perubahan hormone berpengaruh pada fisik, mental dan pisikis ibu. Adapun beberapa hormone yang mengalami penurunan pada masa pemulihan sehabis melahirkan yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

1. Estrogen

   Hormon estrogen berfungsi menstimulasi sistem aluran asi agar membesar sehinga mempermudah ibu untuk menyusui bayinya. Hormone ini meningkat saat ibu hamil dan berkurang setelah ibu melahirkan.

2. Progesterone

   Hormon progesteron berpengaruh pada pertumbuhan dan ukuran alveoli pada payudara calon ibu. Hormone ini meningkat produksinya saat ibu hamil dan menurun saat ibu melahirkan.

3. Oksitosin

   Hormon oksitosin berfungsi untuk melancarkan dan memudahkan persalinan sehinga tidak mengalami rasa sakit yang berlebihan. Hormone ini juga berpengaruh melepaskan plasenta dari rahimnya ibu

4. Katekolamin

   Hormon katekolamin di butuhkan ibu untuk mengejan sehinga bayi segera lahir dan selamat. Hormone ini juga membuat ibu tidak nyaman karna membuat mulut ibu kering, pupil membesar dan dapat meningkatkan emosi ibu.

5. Prolaktin

   Hormon prolaktin mampu meningkatkan persediaan ASI dan kelangsungannya. Hormon ini dapat meningkatkan kewaspadaan ibu tapi bila berlebihan dapat menimbulkan kecemasan pada ibu.

6. Beta Endhorfin

   Hormon beta endhorfin akan keluar saat tubuh merasa stress atau sakit sehingga mampu meningkatkan daya tahan tubuh atas rasa sakit. Hormon ini berkaitan dengan emosi yang dialami ibu setelah melahirkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

6. Penangana Post Partum blues

Adapun penangan yang bisa di berikan pada kasus post partum blues di antaranya dengan melakukan pendekatan spiritual dan pendekatan medis.

a. Pendekatan spiritual

Islam memandang anak adalah titipan yang harus dijaga oleh orang tua sebaik mungkin. Terkadang ada orang tua yang enggan mengurus anaknya bahkan tidak memberikan nafkah dan kasih saying pada anak. Post partum blues merupakan salah salah satu masalah yang berdampak buruk bagi bayi, sehingga ibu memerlukan dukungan psikologis dan meningkatkan jiwa spiritual terhadap Allah SWT.

Berdasarkan hasil penelitian Azizah (2016), terdapat perbedaan antara kelompok ibu yang diberikan terapi Al-Quran dengan kelompok yang tidak diberikan terapi Al-Quran. Kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberikan terapi mendengar Al-Qur'an hasil yang didapat 1 orang (6,7%) tidak mengalami post partum blues, 9 orang (60%) mengalami post partum blues ringan, 4 orang (26,7%) mengalami post partum blues sedang, dan 1 orang lainnya (6,7%) dari post partum blues berat.

Penelitian di atas menunjukkan bahwa terapi mendengarkan Al Qur'an sangat membantu ibu nifas dalam mencegah konstruksi post partum blues. Salah satu diantara sekian banyak mukjizat Al-Qur’an yang sudah terbukti sejak diturunkannya hingga saat ini adalah bisa menjadi penyembuh, termasuk penyembuh hati. Kemukjizatan Al-Qur-an ditegaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Isra`: 82:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

b. Pendekatan medis

Pendekatan medis Menurut Marni (2014) dalam Pratama (2016) terdapat 3 penanganan post partum blues yaitu :

1. Komunikasi terapeutik

Komunikasi terapeutik bertujuan untuk menciptakan hubungan baik antara bidan dengan pasien dalam rangka kesembuan klien dengan cara mendorong pasien mampu meredakan segala ketegangan emosinya dan dapat memahami dirinya sendiri.

2. Peningkatan support mental

Peningkatan suport mental dapat dilakukan olehkeluarga pasien diantaranya:

a) Meminta suami untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti membantu mengurus bayinya dan menyiapkan susu.

b) Memanggil nenek atau keluarga bayi agar bisa menemani ibu dalam menghadapi kesibukan merawat bayi

c) Suami lebih perhatian terhadap istri dan permasalahan yang dihadapi istrinya

d) Menyiapkan mental dalam menghadapi kelahiran anaknya

e) Suami menggantikan peran istri ketika istri kelelahan dan memperbanyak dukungan dan menemani istri dalam mengurus anaknya

f) Ibu dianjurkan sering berkumpul dengan teman-teman terdekat atau keluarga

3. Dilakukan pada diri klien sendiri

Penanganan post partum blues juga dapat dilakukan pada diri klien itu sendiri yaitu dengan cara anjurkan ibu belajar tenang dengan menarik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

nafas panjang, tidur ketika bayi tidur, berolahraga ringan, ikhlas dan tulus dengan peran baru sebagai ibu. Bicarakan rasa cemas dan komunikasikan masalah yang ada, bersifat fleksibel dan bergabung dengan kelompokkelompok ibu baru.Pitriani (2014: 83-84) mengatakan bahwa terdapat 7 cara menangani post partum blues yaitu:

a. Komunikasikan segala permaslahan atau hal lain yang ingin di ungkapkan
b. Bicarakan rasa cemas yang di alami
c. Bersikap tulus dan iklas dalam menerima aktivitas dan peran baru setelah melahirkan
d. Bersikap fleksibel dan tidak terlalu ferfeksionis dalam mengurus bayi atau rumah tangga
e. Belajar tenang dan menarik napas panjang dan meditasi
f. Kebutuhan istirahat cuckup tidurlah ketika bayi tidur
g. Berolahraga ringan
h. Bergabung dengan kelompok ibu-ibu baru
i. Dukungan tenaga kesehata dan dukungan suami, keluarga, teman, dan sesama ibu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

The internasional childbirth education 2 Association position statement and review of post partum emotional disorders (posmonter & waite, 2011) menyatakan bahwa post partum blues dapat diatasi oleh ibu dengan teknik perawatan diri yang baik dan mengunakan dukugan social. Hal ini merupakan nutrisi yang baik, aktivitas diri yang teratur dan tidur, mengembangkan support system, harapan yang ralistik tentang peran sebagai ibu, istirahat, bernapas dalam, menerima dan mengekspresikan perasaan yang negative, membangun perasaan humor.

Anak adalah rezki yang Allah tabaroka wa ta'ala berikan kepada setiap hamba dengan kehendaknya. Rezki anak merupakan hal yang takternilai harganya. Rezki yang Allah subahana wata'alah berikan ini harus di syukuri dengan sebenar-benar rasa syukur, dengan mendidik sang buah

hati yang Allah wajala berikan kepada kita menjadi anak sholeh sholeha. Sebagaimana yg di jelaskan dalam (QS Al-Baqarah ayat 233) dan (QS. Al-Anfal [8]:27-28)

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ
رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ
بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا
وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ
وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Terjemahanya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ

أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ﴿٢٨﴾

Terjemahanya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui, dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Menurut Hasbi Ash Shidieqy, hadhana adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentinganya dalam batas umur terntentu oleh orang yang berhak mendidikinya dari mahram-mahramnya. Sedangkan menurut ahli fikih, hadhana adalah melakukan pememliharaan anak- anak yang msih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah dewasa, tetapi belum mumayyiz tampah perintah dari padanya. Menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikanya menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mapu berdiri sendri dan memikul tangungjawabnya.

Mazhab mendifinisikan hadhanan sebagai mendidik anak-anak yang tidak dapat mengurus diri sendiri sampai orang tertentu oleh orang yang berhak terhadapnya yaitu di kalangan keluarganya.

Mazhab Al-Syafi'I disebutkan hadhanan merupakan usaha usaha menjaga orang yang tidak bisa mengurus dirinya dari pada perkara yang menyakitkannya karna iatidak mumayyiz, seperti anak- anak dan orang besar yang gila juga dengan mendidiknya (mendidik orang yang di jaga) dari perkara yang menimbulkan kemaslatan kepada yang berkaitan dengan pemeliharaan makan dan minum dan sebagainya. Dari beberapa divinis yang telah di paparkan di atas hadhanah bukan hanya dalam konteks memilihara anak yang lebih kecil saja tapi menjabarkanya menjadi lebih luas, seperti orang gila dan idiot yang tidak bisa menjaga dirinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

dari hal-hal yang membahayakan dan paham yang menyakitkan diri sendiri. Karna itu orang gila dapat di golongkan kepada orang yang mendapatkan hadhanah dari kerabat dan keluarganya juga mendapatkan pengampuan dari kerabatnya.

C. Manejemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manejemen Asuhan Kebidanan

Manejemen asuhan kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khususnya di lakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat.

Manejemen kebidanan dapat di gunakan oleh bidan di dalam melaksanakan kegiatan pemiliharaan dan peningkatan kesehatan pemecehan penyakit, penyembuhan, pemulihan kesehatan ibu dan anak dalam lingkung dan tanggung jawab.

a. Langkah-Langkah Manejemen Asuhan Kebidanan

Adapun dalam tahap-tahap Manejemen Kebidanan Yaitu:

a) Langkah I. Identivikasi data dasar

Pada langkah pertama di kumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dengan kondisi klien untuk memproleh hasil anamnesa dengan klien, orang tuan/keluarga, hasil pemeriksaan dan dari dokumentasi pasien atau catatan tentang kesehatan lainya.

Kedua, yaitu akan di dapatkan data objektif dengan melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhanya.

Ketiga, yaitu pemerikasaan tanda-tanda vital pada kasus ini memungkinkan untuk melihat patas normal tanda-tanda vital.

b) Langkah II. Identivikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah ini di lakukan identivikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah kebutuhan klien berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

interpretasi yang benar atas data-data yang yang telah di kumpulkan. Data dasar yang di kumpulkan di interpensikan, sehinga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik.

Masalah post partum blues dapat di tegakkan berdasarkan interpensi data yang di kumpul bahwa post partum blues akan menimbulkan masalah-masalah seperti depresi post partum blues.

c) Langkah III. Antisipasi diagnosa/masalah pontensial

Pada langkah ini kita mengindentifikasi diagnosa atau masalah pontesial dan mengantisipasi penangananya. pada langkah ini kita menidentivikasi masalah pontensial atau diagnosis ponesial yang berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah di identivikasikan langkah ini membutuhkan atisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegehan, sambil mengamati klien, bidan di harapkan dapat bersiap-siap bila diagnose masalah pontensial ini benar benar terjadi. Langkah ini sangat penting dalam melakukan asuan yang aman. Pada ibu post partum blues perlu untuk melakukan antisipasi terjadinya masalah pontensial berupa depresi post partum.

d) Langkah IV. Tindakan segera/kolaborasi

Pada langkah ini bidan dan dokter melakukan identivikasi yang memungkinkan terjadi untukmelakukan kolaborasi dan tindakan segerabersama tim kesehatan lainya sesuai dengan kondisi pasien.

Pada kondisi post partum blues dapat menyebabkan depresi dan meganggu tumbuh kembang bayi, sehingga membutuhkan perawatan dan asuhan yang maksimal.

e) Langkah V. Rencana asuahan Kebidana /intervensi

Pada langkah ini di rencaakan asuhan yang menyeluruh di tentukan oleh langkah-langkah sebelumnya dan merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

lanjutan manejemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah di identifikasi atau di adaptasi. Setiap rencana asuhan harus di sertai klien dan bidan agar melaksanakan dengan efektif.

f) Langkah IV. Implementasi asuhan kebidanan

Melaksanakan rencana tindakan serta efesiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat di kerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainya. Bidan harus melaksanakan implementasi yang efesien dan akan mengurangi waktu perawatan serta akan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan klien.

Pada langkah ke enam ini rencana asuhan menyeluruh seperti telah di uraikan pada langkah 5 di laksanakansecara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa di lakukan seluruhnya oleh bidan, dan sebaian lagi di lakukan oleh klien, atau anggota tim kesehatan yang lain. Jika bidan tidak melakukan sendiri ia tetap memiku tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaanya. (Missalnya memastikan agar langkah-langkah tersebut benar-benar di lakukan).

Dalam situasi di mana bidan berkolaborasi dengan dokter, untuk menangani klien yang mengalami komplikasi maka keterlibat bidan dalam menejeman asuhan klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manejemen yang efesien akan meningkatnya waktu dan biaya serta meningkatnya mutu dan asuhan klien.

g) Langkah VII. Evaluasi

Mengatahui sejauh mana tingkat keberhasilah asuhan yang di berikan kepada klien pada tahap evaluasi ini bidan harus melakukan pengamatan dan observasi terhadap masalah yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

di hadapi klien, apakah masalah di hadapi seluruhnya, sebagian telah di pecahkan atau mungkin timbul masalah baru. Pada prinsipnya tahapan evaluasi adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan sejauh mana tercapainya rencana yang di lakukan.

Pada langkah ke tuju ini di lakukan evaluasi ke efektivitasan dari asuhan yang sudah di berikaan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah di penuhi sesuai dengan kebutuhan sebagai mana telah di identivikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat di angap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaan. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif dan sebagian belum efektif.

2. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Pendokumentasian adalah cacatan tentang interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga, dan tim kesehatan yang mencatat tentang hasil pemeriksaan, prosedur pengobatan pasa pasien dan pendidikan pada pasien, serta respon pasien terhadap semua kegiatan yang di lakukan. Alur berfikir bidan dalam menghadapi klien meliputi 7 langkah. Untuk mengatahui apa yang telah di lakukan oleh seorang bidan melalui proses berfikir sistematis di dokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu:

a. Subjektif (S)

Mengambarkan dokumentasi hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis sebagai langkah I Varney.

b. Objektif (O)

Mengambarkan dokumentasi hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboraturium dan uji dignostik yang di rumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan sebagai langkah I Varney.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

c. Assesmen (S)

Mengamabarkan dokumentasi hasil analisis dan interpensi data subjektif dan objektif dalam suatu identivikasi:

1) Dignosis/masalah
2) Antisipasi diagnosis/kemungkinan masalah

Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi atau perujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 Varney.

d. Planning (p)

Mengambarkan dokumentasi tingkat (I) dan evaluasi perencanaan (E) berdasarkan pengkajian langkah 5,6 dan 7 Varney.

Soap ini di lakukan pada asuhan tahap berikutnya atau pada evaluasi hari berikutnya. Karna pada kasus ini memerlukan asuhan yang di berikan setiap harinya sampai ibu benar-benar baik dan menerima keadaanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB III

TELUSURAN *EVIDANCE BASED LEARNING*

Judul: Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ibu Post Partum Blues

A. Matriks langkah I

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Hubungan antara tingkat kecemasan emosional ibu post partum dengan kejadian post partum blues di keluharan sukorame kediri tahun 2018	Halimatus Saidah dan Wilda Al Lauf	2018	Hubungan antara tingkat kecemasan emosional ibu post partum dengan kejadian post partum dengan kejadian post partum blues.	Tingkat kecemasan ibu post partum sebagian kecil (25,%) yaitu 6 responden. Dan kejadian Post partum blues sebagaian besar (62,5%) yaitu 15 responden. Hasil analisa data dengan menggunakan uji spearman rank didapatkan hasil *p-value* 0,000 < taraf signifikan (= 0,05) dengan demikian ada hubungan antara tingkat kecemasan emosional ibu post partum dengan kejadian post	Kelemahan dlm jurnal ini berada pada referensi penelitian dimana dia hanya mengunakan 18 referensi	Rancangan penelitian ini adalah rancangan penelitian inferensial dengan pendekatan Cross Sectional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 24 orang yang	Hasil penelitian ini ada kaitanya dengan penelitian. Rini astir fatmawati dan Nina gartika. Dimana kecemasan emosianal ibu ada kaitanya dengan dukan social.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					partum blues di kelurahan sukorame wilayah kerja puskesmas sukorame. Dan nilai koefisien (r) sebesar 0,859 kekuatan korelasi dalam kategori sangat kuat kerja puskesmas Sukorame.		diambil dengan menggunakan metode Purposive Sampling.	
2.	Faktor-faktor pisikologis yang mempengaruhi pospartum blues	Susanti prasentia ningrum	2017	pisikologis yang mempengaruhi pospartum blues	Analisa data mengunakan rekresi linear sederhana dan menunjukan bahwa dari ke 3 variabel independen yang mebrikan prediksi pengaruh terbesar pada munculnya pospatum blues adalah variabel penyesuaian diri (56,3 %),kemudian coping stres (46,1 %) dan dukungan sosial (30,2%).	Kelemahan dalam penelitian ini tidak mempaparkan sampel yang di gunakan dlm proses penelitian	Jenis penelitian yaitu kuantitatif korelasional dengan tenik pengambilan sampel puposive sampling.	Penelitian jurnal ini sejalan dengan hasil penenelitian, yang di lakukan oleh Rini astir fatmawati dan Nina gartika dimana salah satu factor fisikologis terjadinya post partum blues adalah dukungan social.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

3.	Hubungan antara karakteristik ibu,kondisi bayi dan dukungansosial suami di rumah sakit umum ahmad yani metro tahun 2014.	Devi kumiasari dan yetti amir astuti.	2015	Hubungan antara karekteristik ibu,kondisi bayi dan dukungansosial suami di rumah sakit umum ahmad yani.	sebanyak 6 (17,1%)responden mengalami pospartum blues,usia responden tidak beresiko 20 (57,1) perinta responden multipara 18 (51,4%) responde,sebagian tingkat responden tinggi (SMA, sarjana 21 (60,0%) responden,ibu yang tidak bekerja 18 (51,4%) responden usia kehamilan responden tidak aterem (pre/post) 26 (74,3%)responden.komplikasi kehamilan yaitu sebesar 20 (57,1%) respondenkeadaan bayi asfiksia ringgan yaitu sebesar 17 (48,6%)responden. Responden mendapatkan dukungan dari suami yaitu sebesar 22 (62,9%) ada hubungan antara umur,pendidikan,pekerjaa	Pembahasan hasis penelitiaan ini kurang sistematis sehingga sulit untuk di pahami.	Jenis prenelitian kuantitatif analitik dengan pendekatan cross sectional.sampel dalam penelitian ini 35.data di ambil dengan instrumen tes dan lembar observasi.uiji statistik di lakukan dengan chi square dan regresi binary logistik.	Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian halimatus saidah dan wilda Al- lauf dimana tersuebut membahas hubungan antara tingkat kecemasan emosianal ibu, sehingga akan terlihat pada krakteristik ibu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

					n,peritas ibu,kondisi bayi dan dukugan sosial.			
4.	Dukungan sosial pada ibu pospartum priminipara terhadap kejadian pospartum blues	Riani astri,fatmawati dan nina gartika	2020	Dukungan sosial pada ibu pospartum priminipara terhadap kejadian pospartum blues	Jumlah sempel 106 dengan kriteria inklus ibu pospartum hari ke 1-7,semua jenis persalinan,ibu sadar penuh,primipara. Analisis data dengan chi-square, ibu pospartum primipara mendapatkan dukungan sosial baik sebanyak 89,6% dan sebanyak 40,6 % ibu primipara mengalami pospartum blues,hasi analisis bivariantal di dapatkan p-value 0,007 (p-vulue <0,005) yang berarti terdapat hubungan antara dukungan sosial terhadap kejadian pospartum blues terhadap ibu primipara. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa penting untuk melakukan	Tidak sistematis serta referensi yang di gunakan tidak terlalu banyak.	Pengumpulan data dengan instumen endinbrugh postnatal depression scale(EPDS) dan kuensioner.	Jurnal yang di bahas oleh Rini astir, fatmawati dan nina gartika sejalan dengan penelitiqan yang dilakukan oleh susanti presentia ningrum, dimana dukungan social merupakan salah satu penyeba terjadinya postpartum blues.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

					deteksi dini kejadian pospartum blues atau depresi pospartum.			
5.	Faktor resiko yang yang berpengaruh terhadap kejadian pospartum blues	Dian ayu fatmawati	2015	Faktor resiko yang berpengaruh terhadap kejadian pospartum blues	Proporsi pospartum blues di wilaya kerja puskesmas kota yogyakarta adalah 46% faktor resiko usia ibu (p=0,000,RP=3,41), faktor perintas (p=0,007,RP=1,94) dan faktor dukungan sosial suami (p=0,000,RP=2,44) memiliki pengaruh signifikan terhadap kejadian post partum blues. Faktor resiko pendidikan (p=0,015),faktor star=tus pekerjaan ibu (p=0,908) dan faktor ekonomi keluarga (p=0,908) dan faktor status ekonomi keluarga (p=0,432) tidak bermakna berpengaruh pada kejadian post partum blues. Hasil multivariat	Pembahasan tentang post partum blous di bawa umur pada penelitian tidak terlalu banyak.	Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan rancangan penelitian cross sectional pendekatan kuantitatif dan kualitatif.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian, Susanti prasentia ningrum di mana penellitian ini membahas tentang factor yang penyebaba terjadinya postpartum blues.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

					menunjukan faktor usia ibu merupak faktor rsiko yang paling mepengaruhi kejadian post partum blues.			
6.	Pospartum blues pada persalian di bawah usia dua puluh tahun	Istiani nur chasanah,kurniasari pratiwi dan sri martuti	2016	Pospartum blues pada persalian dibawa usia dua puluh tahun	Hasil penelitian mendapatkan hasil 45,5% responden yang mengalami pospartum blues dan 54,5% tidak mengalami posparum blues.	Referensi yang di gunakan dalam penelitian ini sangat sedikit dan.	Penelitian ini yang melibatkan kebelakang, artinya pengumpulan data dimulai dari efek atau akibat yang terjadi kemudian dari efek tersebut di telususri penyebab atau variabel-variabel yang mempengaruhi	Hasil penelitian Istiani nur chasanah, kurniasari pratiwi dan sri martuti, ada keterkaitan atau kesamaan dlm hasil penelitian dimana usia merupakan salah satu penyebab terjadinya post partum blues.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

7.	Gambaran faktor-faktor resiko post partum blues di wilayah kerja puskesmas Blora.	Krisdiana wijayanti	2013	Gambarsan faktor resiko pospartum blues	Hasil penelitian menunjukan bahwa 48,6% mengalami beby blues.resikonya faktor usia (20-35 thn 84,3%),perintas (multipara 61,43%),inco-RP 500,000-1000,000,00 64,3%) Pekerjaan (pengangguran 62,9%),pendidikan (lebih tinggi pendidikan 53%),dukungan keluarga (sangat mendukung 91,4%) jenis persalian (pervaginam persaian 58%),riwayat sindrom permenstruasi 58,6% menyusui 100%. Berdasarkanpenelitian ini menyarakan bidan untuk memberikan pelayanan pisikologis pada ibu setelah melahirkan dan memberikan informasi tentang perubahan fisiologi pada priode post	Penelitian ini mengunakan ibu postpartum hari ke 2-10.	Penelitian survei yang bersifat deskriptif dengan jenis metode potong lintang (cross sectionnal).	Jurnal hasil penelitian, krisdiana wijayanti dan jurnal hasil penelitian kumiasari dan yeti amir astute.dalam hasil penelitianya memiliki pembahasan bahawasanya umur adalah salah satu factor yang menyembabaka n terjadinya postpartum blues.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

					partum untuk mencega postpartum blues.			
8	Gambaran kejadian postpartum blues pada ibu nifas berdasarkan karakteristik di rumahsakit umum tingkat IV seriningsih kota bandung	Lisna anisa fitriani dan siti nurbaeti		Gambaran kejadian postpartum blues pada ibu nifa berdasarkan karekteristik	Hasil penelitian menunjukan hampir setengahnya mengalami post partum blues ringan (42,5%) dan hampir setengahnya (35,0%) mengalami postpartum blues berat,berdasarkan usia hampir setengahnya ringgan dan berat (30,0) berdasarkan pendidikan sebagian kecil ringgan (20,0%), berdasarkan jumlah perintas sebagian kecil ringgan (37,5%) berdasarkan pekerjaan hampir semuanya ringgan (30,0%) berdasarkan status kehamilan sebagian kecil ringan (22,5%) dan berdasarkan dukungan sosial hampir setengahnya ringan (35,%)	Pembahasan tentang gambaran kejadian post partum blues sedikit serta sedikit sulit untuk di pahami, dan referensi yang di gunakan sangat sedikit.	Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengna teknik pengambilan sempel yang di ambil sebanyak 40 responde.	Hasil penelitian dalam jurnal ini tentang gambaran kejadian postpartum blues pada ibu nifad berdasarkan karakteristik, dimana hamper setengah dari ibu postpartum mengalami postpartum blus, sedangakan jurnal yang di teliti oleh Devi kumiasari dan yeti amir astute, membhasa karakteristik berdasarkan umur dan peritas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

9	Hubungan dukungan suami terhadap postpartum blues pada ibu nifas di BPS amarina Amd.keb kelurahan ganjar sari kecematan metro barat kota metro tahun 2016	Vida wira utami dan monica ivana DS	2016	Hubungan dukungan suami terhadap postpartum blues	Diketahui distribusi ferekuansi diukungan suami kategori mendukung sebanyak 36 orang (60,0%),di ketahui kelompok kontrol sebanyak 40 org (66,7%). Ada hubungan dukungan suami dengan terjadinya postpartum blues pada ibu nifas.	Pembahasan dalam jurnal ini tidak sistematis sehingga sulit untuk di pahami.	Rancangan penelitian yang digunakan mengunaka nanalitik dengan pendekatan case control,pop ulasi dalam penelitian ini mengunaka n populasi kasus 20 orang dan kontrol40 orang sempel dalam penelitian ini mengunaka n semua kasus 20 dan kontrol 2x kasus	Penelitian ini membahas tentang dukungan suami yang menjadi salah satu factor penyebaba terjadinya postpartum blues. Jurnal yg berbeda di dapatkah hasil penelitianya dimana dukungan suami menjadi salah faktor yang menyebabkan terjadinya postpartum blues jurnal ini di teliti oleh Devi kumia sari dan yeti amir astute.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

							sehing berjumlah 40.	
10	Gambaran faktor-faktor dukungan keluarga, pengatahuan, status kehamilan, dan jenis persalinan. Yang melatar belakangi kejadian post partum blues pada ibu nifas hari ke-7 di polindes doa ibu gasikharjo dan polindes teratai karadena palang.	Mariayatul qiftiyah	2018	Gambaran faktor-faktor dukungan keluarga, pengatahuan, status kehamilan, dan jenis persalinan. Yang melatar belakangi kejadian post partum blues pada ibu nifas hari ke-7	Di dapatkan bahwa setengah respinden (45,83%) mendapatkan dukungan keluarga kurang.hampir setengahnya responden memiliki pengatahuan kurang (41,66%) hampir seluruhnya responden (87,5%) di rencanakan status kehamilanya.sebagian besar responden (75%) jenis persalinan normal dan setengahnya responden(50%) mengalami pospartum blue ringan.	Pembahasan tentang dukungan keluarga dalam jurnal ini sedikit, begitupun dengan referensi yang di gunakan.	Penelitian mengunakan desain penelitian deskriptif populasi dalam penelitian ini sebanyak teknik pengambila sampel sampling jenuh.	Jurnal ini membahas tentang gambaran faktor-faktor dukungan keluarga, pengatahuan, status kehamilan, jenis persalinan, yang melatar belakangi terjadinya post partum blues, sedangkan penelitian, Devi kumiasari dan yrtti amir astute, membahas hubungan antara karakteristik ibu dan kondisisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

								ibu , dimana isi dlm pembahasanya memilik kesamaan dari hasil reponden yg di lakukan penelitian.

B. Matriks Langkah II: Diagnosa Masalah Aktual

NO	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Hubungan antara tingkat kecemasan emosional ibu post partum dengan kejadian post partum blues di keluharan sukorame kediri tahun 2018	Halimatus Saidah dan Wilda Al Lauf	2018	Hubungan antara tingkat kecemasan emosional ibu post partum dengan kejadian post partum dengan kejadian post partum blues.	Tingkat kecemasan ibu post partum sebagian kecil (25,%) yaitu 6 responden. Dan kejadian Post partum blues sebagaian besar (62,5%) yaitu 15 responden. Hasil analisa data dengan menggunakan uji spearman rank didapatkan hasil *p-value* 0,000 < taraf signifikan (= 0,05) dengan demikian ada hubungan antara	Kelemahan dlm jurnal ini berada pada referensi penelitian dimana dia hanya mengunakan 18 referensi	Rancangan penelitian ini adalah rancangan penelitian inferensial dengan pendekatan Cross Sectional. Sampel yang digunakan dalam	Hasil penelitian ini ada kaitanya dengan penelitian. Rini astir fatmawati dan Nina gartika. Dimana kecemasan emosianal ibu ada kaitanya dengan dukan social.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

					tingkat kecemasan emosional ibu post partum dengan kejadian post partum blues di kelurahan sukorame wilayah kerja puskesmas sukorame. Dan nilai koefisien (r) sebesar 0,859 kekuatan korelasi dalam kategori sangat kuat kerja puskesmas Sukorame.		penelitian ini yaitu 24 orang yang diambil dengan menggunakan metode Purposive Sampling.	
2.	Faktor-faktor pisikologis yang mempengaruhi pospartum blues	Susanti prasentia ningrum	2017	pisikologis yang mempengaruhi pospartum blues	Analisa data mengunakan rekresi linear sederhana dan menunjukan bahwa dari ke 3 variabel independenyang mebrikan prediksi pengaruh terbesar pada munculnya pospatum blues adalah variabel penyesuaiandiri (56,3 %),kemudian coping stres (46,1 %) dan dukungan sosial (30,2%).	Kelemahan dalam penelitian ini tidak mempaparkan sampel yang di gunakan dlm proses penelitian	Jenis penelitian yaitu kuantitatif korelasional dengan tenik pengambilan sampel puposive sampling.	Hasil penelitian ini ada kaitanya dengan penelitian. Rini astir fatmawati dan Nina gartika. Dimana kecemasan emosianal ibu ada kaitanya dengan dukan social.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

3.	Hubungan antara karakteristik ibu,kondisi bayi dan dukungansosial suami di rumah sakit umum ahmad yani metro tahun 2014.	Devi kumiasari dan yetti amir astuti.	2015	Hubungan antara karekteristik ibu,kondisi bayi dan dukungansosial suami di rumah sakit umum ahmad yani.	sebanyak 6 (17,1%)responden mengalami pospartum blues,usia responden tidak beresiko 20 (57,1) perinta responden multipara 18 (51,4%) responde,sebagian tingkat responden tinggi (SMA, sarjana 21 (60,0%) responden,ibu yang tidak bekerja 18 (51,4%) responden usia kehamilan responden tidak aterem (pre/post) 26 (74,3%)responden.komplikasi kehamilan yaitu sebesar 20 (57,1%) respondenkeadaan bayi asfiksia ringgan yaitu sebesar 17 (48,6%)responden. Responden mendapatkan dukungan dari suami yaitu sebesar 22 (62,9%) ada hubungan antara umur,pendidikan,pekerjaa	Pembahasan hasis penelitiaan ini kurang sistematis sehingga sulit untuk di pahami.	Jenis prenelitian kuantitatif analitik dengan pendekatan cross sectional.sampel dalam penelitian ini 35.data di ambil dengan instrumen tes dan lembar observasi.uiji statistik di lakukan dengan chi square dan regresi binary logistik.	Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian halimatus saidah dan wilda Al- lauf dimana tersuebut membahas hubungan antara tingkat kecemasan emosianal ibu, sehingga akan terlihat pada krakteristik ibu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					n,peritas ibu,kondisi bayi dan dukugan sosial.			
4.	Dukungan sosial pada ibu pospartum priminipara terhadap kejadian pospartum blues	Riani astri,fatmawati dan nina gartika	2020	Dukungan sosial pada ibu pospartum priminipara terhadap kejadian pospartum blues	Jumlah sempel 106 dengan kriteria inklus ibu pospartum hari ke 1-7,semua jenis persalinan,ibu sadar penuh,primipara. Analisis data dengan chi-square, ibu pospartum primipara mendapatkan dukungan sosial baik sebanyak 89,6% dan sebanyak 40,6 % ibu primipara mengalami pospartum blues,hasi analisis bivariantal di dapatkan p-value 0,007 (p-vulue <0,005) yang berarti terdapat hubungan antara dukungan sosial terhadap kejadian pospartum blues terhadap ibu primipara. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa penting untuk melakukan deteksi dini kejadian	Tidak sistematis serta referensi yang di gunakan tidak terlalu banyak.	Pengumpulan data dengan instumen endinbrugh postnatal depression scale(EPDS) dan kuensioner.	Jurnal yang di bahas oleh Rini astir, fatmawati dan nina gartika sejalan dengan penelitiqan yang dilakukan oleh susanti presentia ningrum, dimana dukungan social merupakan salah satu penyeba terjadinya postpartum blues.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

					pospartum blues atau depresi pospartum.			
5.	Faktor resiko yang yang berpengaruh terhadap kejadian pospartum blues	Dian ayu fatmawati	2015	Faktor resiko yang berpengaruh terhadap kejadian pospartum blues	Proporsi pospartum blues di wilaya kerja puskesmas kota yogyakarta adalah 46% faktor resiko usia ibu (p=0,000,RP=3,41), faktor perintas (p=0,007,RP=1,94) dan faktor dukungan sosial suami (p=0,000,RP=2,44) memiliki pengaruh signifikan terhadap kejadian post partum blues. Faktor resiko pendidikan (p=0,015),faktor star=tus pekerjaan ibu (p=0,908) dan faktor ekonomi keluarga (p=0,908) dan faktor status ekonomi keluarga (p=0,432) tidak bermakna berpengaruh pada kejadian post partum blues. Hasil multivariat menunjukan faktor usia	pembahasan tentang post partum blous di bawa umur tidak terlalu banyak.	Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan rancangan penelitian cross sectional pendekatan kuantitatif dan kualitatif.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian, Susanti prasentia ningrum di mana penellitian ini membahas tentang factor yang penyebaba terjadinya postpartum blues.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

					ibu merupak faktor rsiko yang paling mepengaruhi kejadian post partum blues.			
7.	Gambaran faktor-faktor resiko post partum blues di wilayah kerja puskesmas Blora.	Krisdiana wijayanti	2013	Gambarsan faktor resiko pospartum blues	Hasil penelitian menunjukan bahwa 48,6% mengalami beby blues.resikonya faktor usia (20-35 thn 84,3%),perintas (multipara 61,43%),inco-RP 500,000-1000,000,00 64,3%) Pekerjaan (pengangguran 62,9%),pendidikan (lebih tinggi pendidikan 53%),dukungan keluarga (sangat mendukung 91,4%) jenis persalian (pervaginam persaian 58%),riwayat sindrom permenstruasi 58,6% menyusui 100%. Berdasarkanpenelitian ini menyarakan bidan untuk memberikan pelayanan	Penelitian ini mengunakan ibu postpartum hari ke 2-10.	Penelitian survei yang bersifat deskriptif dengan jenis metode potong lintang (cross sectionnal).	Jurnal hasil penelitian, krisdiana wijayanti dan jurnal hasil penelitian kumiasari dan yet amir astute. Dalam hasil penelitianya memiliki pembahasan bahawasanya umur adalah salah satu factor yang menyembabaka n terjadinya postpartum blues.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					pisikologis pada ibu setelah melahirkan dan memberikan informasi tentang perubahan fisiologi pada priode post partum untuk mencega postpartum blues.			
8.	Gambaran tingkat depresi ibu post partum	Dwi restarina	2017	Tingkat depresi ibu post partum	Tingkat depresi ibu post partum pada responden bervariasi mulai tidak depresi atau depresi minimal sebanyak 48 responden (55, 8%), ringan 18 responden (20, 9%), sedang 13 responden (15, 1%) dan berat 7 responden (8, 1%) resiko tinggi ibu mengalami deprsi post partum terjadi pada ibu yang memiliki rentang usia 20-34 tahun (81, 4%), memiliki jenjang pendidikan menengahnya (45, 3%), merupakan ibu rumah tangga (82, 4%), dan ibu multipara (53, 49%), dan	Pada penelitian ini terdapat kekurangan diman pembahasan tentang depresi post partum terlalu banyak.	Pada penelitian ini mengunakan metode penelitian yang sering di gunakan pada umumnya.	Dwi rastarina melakukan penelitian tentang tingkatan depres pada ibu post partum dimana penelitian ini mendapatkan bahwa semua responden penelitian mengalami depresi dari depresi ringgan sampai berat dan pada penelitian yang di lakukan oleh Aryes dirgayunita

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					pada penelitian ini menunjukan bahwa deoresi post partum di alami oleh setiap responden dengan tingkat depresi yang berfariasi.			melakukan penelitian tentang ciri, penyebab dan depresi dimana penelitian ini mendapatkan ciri depresi di antaranya rasacemas yang berlebihan, dan adanya factor penyeba dan pendukung lainya.
9.	Ciri, penyebab dan penangan depresi	Aries dirgayunita	2016	Ciri depresi	Depresi adalah ganguan suasana hati atau emosi yang di tandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah dan tidak berarti. Individu yang mengalami depresi pada umumnya menunjukan gejala fisik, gejala pisikis dan gejala social yang khas. Depresi			Aryes dirgayunita melakukan penelitian tentang ciri, penyebab dan depresi dimana penelitian ini mendapatkan ciri depresi di antaranya rasacemas yang berlebihan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					di sebabkan oleh beberapa kombinasi factor yaitu factor biologis, factor psikologi, indifidu dan factor social.			adanya factor penyeba dan pendukung lainya. Dan ulfa nurhidaya ddk, mengatakan sebagian besar ibu mengalami depresi post partum baik ringan maupun berat
10.	Karakter depresi post partum	Ulfa nurhidayati, windhu purnomi dan rachmat hargono	2015	Karakter depresi post partum	Sebagagian besar ibu post partum berusia 21-34 tahun sabanyak 80, 9%, pekerjaan ibu sebagian besar 71, 43%, sebagai ibu rumah tangga, sebagian besar 38, 1%, berpendidikan SMA, peritas ibu post partum sebagian besar 1-2 anak 85, 7%. Jadi post partum dapat terjadi pada ibu nifas lebih dari 10 hari dengan tidak memandang			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					karakteristik ibu baik berdasarkan usi, peritas, pendidikan dan pekerjaan.			

C. Matriks Langkah III: Diagnosa Masalah Potensial

NO	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Prevalensi dan factor resiko depresi postpartum blues di kota Denpasar mengunakan edingburg postnatal. Depression scale	Ariguna dira, anak ayu sriwahyuni	2016	Prevalensi dan factor resiko depresi postpartum blues di kota Denpasar mengunakan edingburg postnatal. Depression scale	Prevelensi depresi post partum di kota Denpasar mengunakan skoring EPDS sebanyak 9 ibu (20,5%). Sebanyak 4 ibu (9,1%) membutuhkan pemantauan exstra. Factor resika yang di dapat dalam penelitian ini adalah riwayat pendidikan ibu yang rendah, primipara, umur, memiliki riwayat anak yang meningal dan kehamilan yang tidak di harapkan.	Referensi yang di gunakan sangat sedikit.	Subjek penelitian adalah 44 ibu yang melahirkan di rumah sakit umum sanglah Denpasar. Penelitian ini menguakan dua alat skrining Edinburgh postnatal depression	Jurnal ini membahas tentang faktor resiko depresi post partum blues dimana di dapatkan dari hasil penelitian salah satu penyebabnya adalah pendidikan ibu yang rendah, umur, memiliki anak yang meningal sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

							scale (EPDS).	penelitian yang di lakukan oleh Martini fairus,sepeti widiyanti adalah faktor yang menyebabkan terjadinya postpartum blues dengan kurangnya dukungan suami.
2.	Hubungan dukungan suami dengan kejadian depresi partum pada ibu nifas	Martini fairus,sepeti widiyanti	2014	Hubungan dukungansuami dengan kejadian depresi partum pada ibu nifas	Hasil penelitian menunjukan. Hasil penelitian menunjukkan dari 59 orang ibu nifas yang depresi didapat 27 orang (45,76%) responden yang tidak mendapat dukungan suami. Dukungan suami diperkirakan menjadi penyebab utama terjadinya depresi postpartum. Hal ini dikarenakan suami	Referensi yang di gunakan dlm penelitian ini sangat sedikit dimana hanaya 12 referensi.	Penelitian ini mengunakan dua tempat untuk melakukan penelitian yaitu klinik dan puskesmas, di lakukan dengan pendekatan	Penelitian ini membahas tentang hubungan dukungan suami dengan kejadian depresi post patum, yg dikatakan dalam hasil penelitianya merupakan salah satu penyebab utama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					merupakan orang terdekat yang bertanggung jawab memfasilitasi timbulnya rasa nyaman, aman, rasa dihormati, rasa berharga, dibutuhkan, kuat, semangat untuk menyelesaikan kehamilan dan persalinan dengan baik dan penuh kebahagian.		case 50ias50bl study.ibu dengan dengan depresi post partum di jadikan klompok khusus dan ibu tidak dengan depresi di jadikan klompok control kemudian.	dlm terjadinya postpartum blues, sedangkan dalam penelitian Rosa Imani Khan. Melakukan penelitian tentang karakteristik penyebab terjadinya depresi dima depresi itusendiri adalah masalah pontensial yg terjadi pada kasusus postpartum blues.
3.	Perilaku Asertif, Harga Diri dan Kecenderungan Depresi	Rosa Imani Khan	2012	Perilaku Asertif, Harga Diri dan Kecenderungan Depresi	Analisis data menunjukkan bahwa terdapat korelasi 50ias50ble antara perilaku asertif dengan tingkat	Pembahasab tentang prilaku asertif dalam jurnal ini tidak	Analisis data dilakukan dengan teknik 50ias50ble	Rosa imani khan. Melakukan penelitian tentang prilaku asertif,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

					kecenderungan depresi. Semakin tinggi perilaku asertif maka tingkat kecenderungan depresi yang dimiliki akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Hasil yang lain juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi 51ias51ble antara harga diri dengan tingkat kecenderungan depresi. Semakin tinggi harga diri maka tingkat kecenderungan depresi yang dimiliki akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya	sistematis sehingga tidak bisa di pahami.	51 korelasi spearman rank, dengan bantuan program 51ias51ble 51 SPSS versi 13. For Windows.	hargadiri dan kencendrungan depresi, dimana di dapatkan hasil dalam penelitian ini Semakin tinggi harga diri maka tingkat kecenderungan depresi yang dimiliki akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Sedangkan prima daniyanti kusuma melakukan penelitian Karateristik penyebab terjadinya depresi post partum pada primipara dan multipara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

4.	Karateristik penyebab terjadinya depresi post partum pada primipara dan multipara.	Prima Daniyati Kusuma	2017	Penyebab terjadinya depresi post partum pada primipara dan multipara.	Kejadian depresi postpartum lebih besar pada kelompok ibu primipara sebanyak 24 orang (70,59%) dibandingkan pada kelompok ibu multipara sebanyak 20 orang (58,82%). Tidak ada hubungan antara umur, tingkat pendidikan, dan persalinan dengan depresi postpartum. Ada hubungan antara pekerjaan dan status perkawinan ibu dengan depresi postpartum	Referensi yang di gunakan dalam penelitian ini sangat sedikit serta penjelasan tentang karakteristik terjadinya depresi post partum tidak terlalu bisa di pahami.	Penelitian ini adalah penelitian survey analitik dengan menggunakan metode penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu postpartum	Prima daniyanti kusuma melakukan Penelitian Karateristik penyebab terjadinya depresi post partum pada primipara dan multipara. Dimana di dapatkan dalam hasil penelitian ini, ibu primipara lebih bannyak mengalami depresi post partum blues sedangkan Agrian melakukan penelitian hubungan status gizi dengan terjadinya depresi post

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

								partum blues.
5.	Perbedaan depresi pada ibu hamil dengan depresi pada ibu post partum terhadap kesiapan peran menjadi ibu di RSIA BUNDA ARIF PURWOKERO	Devi Irmaning Tyas, Atun Raudotul Ma'rifah, dan Noor Yunida Triana	2015	Perbedaan depresi pada ibu hamil dengan depresi pada ibu post partum terhadap kesiapan peran menjadi ibu	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur responden paling banyak yaitu berusia 20-30 tahun sebanyak 51 reponden (75 %). Karakteristik Responden Berdasarkan Paritas menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak pada responden dengan paritas multipara sebanyak 41 responden (60,3 %). Responden Depresi Selama Kehamilan diketahui bahwa sebagian besar responden adalah ibu hamil yang mengalami depresi sebanyak 20 responden (58,8 %). Responden Depresi Postpartum diketahui bahwa sebagian besar responden postpartum tidak mengalami depresi sebanyak 29 responden (85,3 %. Responden Ibu	Penjelasan tentang depresi pada ibu hami dalam jurnal ini tidak terlalu banyak dan sedikit sulit di pahami.	Jenis penelitian yang di gunakan adalah studi komparatif dengan pendekatan crosss sectional. Dan sampel yg di gunakan sebanyak 68, terdiri dari 34 ibu hamil dan 34 ibu post partum.	Penelitian Devi Irmaning Tyas, Atun Raudotul Ma'rifah, dan Noor Yunida Triana. Melakukan penelitian dengan kasus perbedaan depresi pada ibu hamil, dimana ksrakteristik responden paling banyak yang itu berusia 20-30 tahun. Sedangkan dalam penelitian Angriani melakukan penelitian hubungan depresi dgn status gizi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					Hamil Berdasarkan Kesiapan Peran Menjadi Ibu diketahui bahwa sebagian besar ibu hamil siap menghadapi peran baru menjadi ibu sebanyak 26 responden (76,5 %).Responden Ibu Postpartum Berdasarkan Kesiapan Peran Menjadi Ibu diketahui bahwa sebagian besar ibu postpartum siap menghadapi peran baru menjadi ibu yaitu 32 responden (94,1%). Perbedaan depresi pada ibu hamil dan ibu postpartum dengan kesiapan menghadapi peran menjadi ibu menggunakan uji U Man Whitney dengan bantuan program SPSS 20,0 For Windows. Uji non parametik dengan uji U Man Whitney (U) diperoleh hasil ρ = 0,000.			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					Nilai $\rho < \alpha$ (0,000 < 0,05), maka ha diterima artinya ada perbedaan depresi pada ibu hamil dengan depresi pada ibu postpartum terhadap kesiapan peran.			
6.	Hubungan Depresi dengan Status Gizi	Angraini	2014	Hubungan Depresi dengan Status Gizi	Sebagian besar subyek penelitian berjenis kelamin perempuan sebesar 67,33%, berstatus domisili kos atau kontrak sebesar 60,40%, tidak menderita depresi sebesar 40,59% dan berstatus gizi normal sebesar 59,41%. Berdasarkan hasil analisis bivariat, didapatkan bahwa depresi berhubungan dengan status gizi (p=0,023). Simpulan : terdapat hubungan antara depresi dengan status gizi	Penelitian ini mengunakan mahasiswa sebagi sampel untuk di lakukan penelitian.	penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectional pada 101 orang mahasiswa Pengambilan sampel dilakukan dengan metode total sampling yaitu	Angraini melakukan penelitian tentnag hubungan depresi dengan status gizi dimana di dapatkan bahwa adanya hubungan dengan status gizi (p=0,023). Sedangkan dalam penelitian Rizky Fauzy, Endang Fourianalisyawati. Melakukan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

							mengambil seluruh sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi	dengan kasus hubungan antara depresi dengan kualitas hidup dimana di dapatkan hasil uiji coba normalitas didapatkan skor normalitas depresi sebesar 1.989 (p = 0.001 < 0.05) dan kualitas hidup sebesar 0.864 (p = 0.252 > 0.05).
7.	Hubungan antara Depresi dengan Kualitas Hidup pada Ibu Hamil Berisiko Tinggi	Rizky Fauzy, Endang Fourianalisyawati	2016	Hubungan antara Depresi dengan Kualitas Hidup pada Ibu Hamil Berisiko Tinggi	Hasil uji coba normalitas, didapatkan skor normalitas depresi sebesar 1.989 (p = 0.001 < 0.05) dan kualitas hidup sebesar 0.864 (p = 0.252 > 0.05). Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel depresi tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, data penelitian ini dapat	Penelitian mengunakan ibu hamil beresiko tinggi untuk di jadikan sasaran dlm melakuikan penelitian.	Variabel bebas dalam penelitian ini adalah depresi, dimana dalam penelitian ini skor resiliensi	Rizky Fauzy, Endang Fourianalisyawati tahun 2016 melakukan penelitian hububungan depresi dengan kkualitas hidup dimana di dapatkan hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					dianalisa dengan menggunakan metode statistitik non parametrik, Spearman Correlation. Hasil		diperoleh menggunakan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 105	dlm penelitian ini sebesar 0.864 (p = 0.252 > 0.05 sedangakan dalam penelitian lain yang di lakukan oleh Eko Radityo dimana ganguan tidur merupakan salah satu faktor penyebab depresi.
8.	Depresi dan gangguan tidur	Eko Radityo	2012	Depresi dan gangguan tidur	Beberapa penelitian yang tidak memfokuskan pada orang tua juga telah menemukan peningkatan risiko depresi pada subjek yang di-follow up dengan gangguan tidur pada awalnya. Odds ratio untuk depresi tiga sampai empat kali pada beberapa penelitian. Bukti dari dua studi prospektif pada	Refrensi yang di gunakan dalam melakukan penelitian sangat sedikit.	Menggunakan metode cohort dilakukan pengukuran terhadap keluhan EDS.	Eko Radityo. Melakukan penelitian dimana ganguan tidur merupakan salah satu faktor penyebab depresi. Sedangkan penelitian yang lain yang di lakukan oleh Komang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					orang tua juga mendukung penelitian diatas. Tambahan pada studi epidemiologi, ada bukti bahwa gangguan tidur juga mempengaruhi perjalanan penyakit depresi. Pasien yang diperiksa mempunyai tingkat gangguan tidur yang tinggi beberapa minggu sebelum episode depresi mayor, memiliki risiko tinggi untuk episode itu. Artinya gangguan tidur mendahului rangkaian gejala yang mendasari depresi mayor.			Prayoga Ariguna, Dira dan Ayu Sri Wahyuni mendapaatkan bahwa riwayat pendidikan ibu adalah salah satu faktor yang menyebabkan depresi.
9.	Prevalansi dan Faktor resiko depresi post partum di kota Denpasar mengunakan edingburgh postnatal	Komang Prayoga Ariguna, Dira dan Ayu Sri Wahyuni	2016	Prevalansi dan Faktor resiko depresi postpartum di kota Denpasa	Prevalensi depresi postpartum di kota denpasar menggunakan skoring EPDS sebanyak 9 ibu (20,5%). Sebanyak 4 ibu (9,1%) membutuhkan pemantuan ekstra. Faktor resiko yang didapat dalam	Pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu bisa di mengerti	Data dianalisa dengan statistical product and service solution (SPSS).dan	Jurnal ini membahas tentang faktor resiko depresi post partum dimana di dapatkan hasil dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

	depression scale.				penelitian ini adalah riwayat pendidikan ibu yang rendah, primipara, umur,memiliki riwayat anak meninggal dan kehamilan tidak diharapkan		subjek penelitian	penelitian ini Faktor resiko yang didapat dalam penelitian ini adalah riwayat pendidikan ibu yang rendah, primipara, umur,memiliki riwayat anak meninggal dan kehamilan tidak di harapkan. Sedankan dalam penelitian Risa Arianie Rusli, Tatik Meiyuntarining sih dan Weni Endahing Warni Tahun 2011 meneliti perbedaan depresi pasca melahirkan dimana di dapakan hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

								bahwa usia menjadi salah satu penyebab depresi.
10.	Perbedaan Depresi Pasca Melahirkan pada Ibu Primipara Ditinjau dari Usia Ibu Hamil	Risa Arianie Rusli, Tatik Meiyuntarini ngsih dan Weni Endahing Warni	2011	Perbedaan Depresi Pasca Melahirkan pada Ibu Primipara Ditinjau dari Usia Ibu Hamil	Berdasarkan hasil perhitungan analisis t-test untuk menguji perbedaan depresi pasca persalinan dari kedua kelompok usia (usia remaja tengah dan usia awal dewasa madya) diperoleh hasil sebesar -1,132 dengan nilai p = -1.132 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan depresi pasca melahirkan pada ibu primipara ditinjau dari usia ibu hamil, yaitu usia remaja tengah dan usia awal dewasa madya	Referensi yang di gunakan dalam penelitian ini sangat sedikit.	Kelebihan dalam penelitian ini mengunaka nvariabel ibu usia remaja dan ibu usia dewasa.	Risa Arianie Rusli, Tatik Meiyuntarining sih dan Weni Endahing Warni Tahun 2011 meneliti perbedaan depresi pasca melahirkan dimana di dapakan hasil bahwa usia menjadi salah satu penyebab depresi.Dan Dayang Mardhatillah, Andi Lis Arming dan Gandini Ratnawati meneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

								Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Postpartum di mana didapatkan hasil sebanyak 40% ibu nifas mengalami postpartum blues
11.	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Postpartum Blues di Wilayah Kerja Puskesmas Temindung Tahun 2019	Dayang Mardhatillah, Andi Lis Arming dan Gandini Ratnawati	2019	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Postpartum	penelitian ini menunjukkan sebanyak 40% ibu nifas mengalami postpartum blues, hal ini terjadi pada 34,4% ibu dengan usia tidak beresiko (p=0,229), 40,9% ibu dengan paritas sedang/multipara (p=1,00), 41,2% ibu dengan latar belakang pendidikan sedang/SMA (p=0,516) dan 53,6% ibu yang tidak bekerja	Pembahasan tentang factor yang berhubungan tentang dgn kejadian pospatum blues sangat sedikit.	penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analitik yaitu melakukan analisa terhadap masing-masing	Faktor penyebab yang di dapatkan dalam penelitian Dayang Mardhatillah, Andi Lis Arming dan Gandini Ratnawati didapatkan 53,6% ibu yang tidak bekerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

					(p=0,012)		62ias62ble dalam bentuk narasi kemudian mencari hubungan sebab akibat.	Risa Arianie Rusli, Tatik Meiyuntarining sih dan Weni Endahing Warni Tahun 2011 meneliti perbedaan depresi pasca melahirkan dimana di dapakan hasil bahwa usia menjadi salah satu penyebab depresi.
12.	Peran zink dan factor psikosial terhadap kejadian postpartum blues	Yesi kurniati.	2017	Peran zink dan factor psikosial terhadap kejadian postpartum blues	sampel yang diperoleh pada penelitian ini berjumlah 67 orang dengan 40 orang menderita postpartum blues (59,7%) dan 27 orang tidak menderita postpartum (40,3%).	Penjelasan tentang peran zink dalam terjadinya postpartum blues terlalu berbelit sehingga tidak begitu di pahami.	Penelitian ini mengunakan Skor EPDS untuk menilai mood seorang ibu pasca melahirkan .Instrument	Jurnal ini membahas tentang peran zink terhadap kejadian post partum blues dimana di dapatkan hasil dalam penelitianya 40 orang menderita postpartum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

							nya terdiri dari 10 item pengukuran .EPDS dinilai dengan skor, dimana skor maksimum adalah 30.	blues (59,7%) dan 27 orang tidak menderita postpartum (40,3%). Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Martini fairus,sepeti widiyanti adalah faktor yang menyebabkan terjadin ya postpartum blues dengan kurangnya dukungan suami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

D. Langkah IV: Tindakan Emergensi/Kolaborasi

NO	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Pengunaan MOMMOODBOOSTER (MMB) sebagai intervensi pada ibu dengan depresi post partum.	Immawanti	2014	Pengunaan MOMMOODBOOSTER MMB) sebagai intervensi pada ibu dengan depresi post partum.	Depresi post partum merupakan ganguan mood setelah melahirkan yang merefleksikan disregulasi pisikologika yang merupakan tanda dari gejala-gejala depresi mayor. Mood yang tertekan, hilangnya ketertarikan atau kesenan dalam beraktivitas, ganguan napsumakan,ganguan tidur, aktifitasi fisik, atau pelembaban pisikomotor, lemah, merasa tidak berguna, susah konsetrasi, serta adanya keinginan untuk bunuh diri.	Dalam penelitian ini tidak mengunakan sampel atau mempaparkan berapa saja sampel yang di gunakan serta penelitian ini mengunakan internet berbasis Web ini sebagai media untuk promosi kesehatan	Penelitian ini mengunakan metode penelitian Literatur MomMood Booster serta penelitian ini mengunaka internet yang berbasis web sehingamudah di akses.	Immawanti melakukan penelitian gangguan mood setelah melahirkan yang merefleksikan disregulasi psikologikal yang merupakan tanda dari gejala – gejala depresi. Sedangkan Yesi kurniati. Melakukan penelitian tentang peang zink dan factor psikosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

								terhadap kejadian postpartum blues dimana hasil yang di dapatkan sebanyak 40 orang menderita depresi postpartum blues.
2.	Peran zink dan factor psikosial terhadap kejadian postpartum blues	Yesi kurniati.	2017	Peran zink dan factor psikosial terhadap kejadian postpartum blues	Sampel yang diperoleh pada penelitian ini berjumlah 67 orang dengan 40 orang menderita postpartum blues (59,7%) dan 27 orang tidak menderita postpartum (40,3%).	Penjelasan tentang peran zink dalam terjadinya postpartum blues terlalu berbelit sehingga tidak begitu di pahami.	Penelitian ini mengunakan Skor EPDS untuk menilai mood seorang ibu pasca melahirkan .Instrumentnya terdiri dari 10 item pengukuran .EPDS	Yesi kurniati. Melakukan penelitian tentang peang zink dan factor psikosial terhadap kejadian postpartum blues dimana hasil yang di dapatkan sebanyak 40 orang menderita depresi postpartum blues. Dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

							dinilai dengan skor, dimana skor maksimum adalah 30.	Yustisia Imaninditya P.W, Murwati. Melakukan studi diskriptif tingkat depresi postpartum blues,dimana di dapatkan hasil sindrom depresi postpartum terbanyak multipara yaitu (66.7%). Berdasarkan pendidikan yang mengalami sindrom depresi postpartum terbanyak.
3.	Studi diskriptif tingkat depresi postpartum pada ibu nifas di wilaya kerja puskesmas	Yustisia Imaninditya P.W, Murwati.	2013	Studi diskriptif tingkat depresi postpartum pada ibu nifas.	Hasil penelitian menunjukan sebagian responden yang tidak mengalami depresi sebesar (66.7%). Berdasarkan kelompok	Dalam penjelasan penelitian ini hasil yg di paparkan dalam table	Tata bahasa dan penulisan mudah di pahami dan juga	Yustisia Imaninditya P.W, Murwati. Melakukan studi diskriptif tingkat depresi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	klaten selatan tahun 2013				umer responden yang mengalami sindrom depresi post partum adalah kelompok umur 24-29 tahun (46.7%). Berdasarkan jumlah peritas yang mengalami sindrom depresi post partum terbanyak multipara yaitu (66.7%). Berdasarkan pendidikan yang mengalami sindrom depresi post partum terbanyak, dan yang pendidikan menengah yaitu (66,3%). Berdasarkan riwayat persalinan yang rentan mengalami sindrom depresi post partum hinga. Dan berdasarkan dukungan sosial yang rentan mengalami sindrom deprsi post partum adalah yang selain yang mendapatkan dukungan tinggi sebesar (26,7	tidak bisa terlalu di pahimi,	penelitian ini mengunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 responden.	postpartum blues,dimana di dapatkan hasil sindrom depresi postpartum terbanyak multipara yaitu (66.7%). Berdasarkan pendidikan yang mengalami sindrom depresi postpartum terbanyak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

4.	Pengaruh psikoedukasi terhap depresi postpartum pada ibu primipara.	Awaludin Jahid Abdilah, Septiyani Eka. Putri	2016	Pengaruh psikoedukasi terhap depresi postpartum.	Ibu primipara sesudah diberikan Psikoedukasi dari 24 responden menunjukan bahwa tingkat depresi ringan sebanyak 10 responden (41.7%). Berdasarkan hasil uji T-Test Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Depresi Postpartum primipara yaitu dengan nilai p value 0.016 sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan tingkat depresi setelah dilakukan Psikoedukasi pada ibu primipara.	Dalam jurnal ini tidak menjelaskan secara terperinci berapa sampel yang di gunakan untuk melakukan penelitian.	Desain penelitian yang digunakan adalah one-group pretest-post test desain yaitu kelompok subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobservasi lagi setelah dilakukan intervensi. Ciri dari penelitian ini adalah mengungkapkan hubungan sebab akibat	Penelitian ini melakukan tentang pengaruh psikoedukasi terhadap depresi postpartum dimana penelitian ini mendapatkan hasil di dapat terjadi penurunan tingkat depresi setelah dilakukan Psikoedukasi pada ibu primipara. Penelitian lain yang di lakukan oleh Aries Dirgayunita. Penanganan depresi post partum dengan melakukan oalhraga nifas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

							dengan cara melibatkan satu kelompok subjek. Serta pembahasa nya cukup mudah di pahami dan di mengerti.	
5.	Depresi Ciri, Penyebab dan Penangannya	Aries Dirgayunita	2016	Ciri, Penyebab dan Penangannya	Perubahan pola hidup Berolahraga,Mengatur pola makan,Berdoa, memiliki keinginan untuk berubah, Rekreasi, dan Bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang kita lakukan. Serta Tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan suatu kesalahan atau mengalami kegagalan.	Tidak terdapat sampel dalam penelitian iniserta reverensi yang di gunakan tidak terlalu banayak atau sedikit.	Penjelasan dalam jurnal ini sangat jelasa dan sangat mudah di pahami baik dari penulisan dan penyusaun setiap pembahasa n.	Dalam hasil penelitian yang di lakukan oleh Aries Dirgayunita. Salah satu penangana depresi post partum dengan melakukan olah raga.sedangkan Kristina Maharani, Choirul Anwar dan Agus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

								Suwandono. Melakukan pencegahan depresi dengan kombinasi herbal.
6.	Kombinasi herbal steam bath dan massage terapi pada ibu nifas dalam mencegah post partum blues.	Kristina Maharani, Choirul Anwar dan Agus Suwandono.	2019	Kombinasi herbal steam bath dan massage terapi pada ibu nifas dalam mencegah post partum blues.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pemberian terapi herbal steam bath dan massage terapi terhadap pencegahan postpartum blues sebelum dan sesudah perlakuan yang ditunjukkan dengan hasil p value < 0,05. Sebelum dan sesudah dilakukan intervensi herbal steam bath dan massage terapi didapatkan hasil p value 0,001 maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi herbal steam bath dan massage terapi. Dengan kata lain	Penelitian ini tidak menyebutkan jenis herbal yg di gunakan untuk,melakukan terapi serta cara dan prosesedur kerja terapi tersebut.	Analisis data menggunakan analisis univariat, bivariate dan multivariate. Data dalam bentuk presentase mengenai karakteristik responden berdasarkan umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, paritas,	Kristina Maharani, Choirul Anwar dan Agus Suwandono. Melakukan pencegahan depresi dengan kombinasi herbal. Dan penelitian lain yang di lakukan oleh Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Dermawan Waruwu. Melakukan penelitian tentang Pengaruh Cognitive

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					intervensi kombinasi herbal steam bath dan massage terapi efektif mencegah terjadinya postpartum blues.		jenis persalinan. Pengkategorian data sesuai dengan alat ukur yang telah ditentukan yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui nilai mean, modus maupun standar deviasi dari setiap variabel yang diukur.	Behavior Therapy Terhadap Postpartum Depression dimana di dapatkan perubahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

7.	Pengaruh Cognitive Behavior Therapy Terhadap Postpartum Depression	Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Dermawan Waruwu	2018	Pengaruh Cognitive Behavior Therapy Terhadap Postpartum Depression	Hasil penelitian menunjukan sebelum dan sesudah pemberian Cognitive Behavior Therapy adalah (p = 0,034 < 0,05 ; z = 2,121) dan perbandingan posttest 1 dengan follow up (p = 0,038 < 0, 05 ; z = 2,070). Dengan demikian, perlakuan Cognitive Behavior Therapy dapat menurunkan postpartum depression pada ibu melahirkan.	tidak menampilkan sampel yg di gunakan untuk melakukan penelitian serta patokan usia yg di jadikan target penelitian penelitian hanya ibu dgn usia 20-35 tahun.	tipe penelitian eksperimen serta menggunakan Beck Depression Inventory (BDI) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Cognitive Behavior Therapy terhadap postpartum depression	Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Dermawan Waruwu. Melakukan penelitian Tentang Pengaruh Cognitive Behavior Therapy Terhadap Postpartum Depression dimana di dapatkan perubahan. Kristina Maharani, Choirul Anwar dan Agus Suwandono. Melakukan pencegahan depresi dengan kombinasi herbal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

8.	Progeressive muscle relaxation untuk membantu menurunkan kecemasan pada ibu menyusui selam post partum.	Nevy Norma Renityas dan Ika Agustina.	2020	Progeressive muscle relaxation untuk membantu menurunkan kecemasan pada ibu menyusui selam post partum.	penelitian ini menunjukkan ada pengaruh yang signifikan Progresive Muscle Relaxation terhadap kecemasan ibu menyusui di Puskesmas Ponggok Kabupaten Blitar ditunjukkan dengan dan nilai (p-value = 0,001) < (α = 0,05).	Kriteria penelitian hanya ibu primipara yang bisa membaca dan menulis saja tidak ibu yang memliki keterbelakangan.	Pengambilan sampel dengan cara purposive sampling, jumlah populasi 92 ibu post partum dan sampel 48 responden yang terbagi atas kelompok perlakuan dan control	Penelitian ini mengunakan muscle relaxation untuk membantu menurunkan pada ibu menyusui dimana di dapatkan hasil bahwa muscik relaxation bisa di jadikan penanganan pada kasus depresi untuk menurunkan tingkat kecemasan. Sedangakan pada penelitiamn yang di lakukan oleh Irma fidora, Elsi dwi hapsari dan Ibrahim rahmat melakukuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

								penelitian tentang pengaruh pemberiaan pindidikan untuk penanganan awal terjadinya depresi.
9.	Pengaruh pemberian pendidikan kesehatan individu terhadap perubahan maternal depressive pada ibu postpartum.	Irma Fidora, Elsi Dwi Hapsari dan Ibrahim Rahmat	2018	Pengaruh pemberian pendidikan kesehatan individu terhadap perubahan maternal depressive pada ibu postpartum.	Skor maternal depressive symptoms sebelum intervensi yaitu 12,83 dan terjadi penurunan signifikan setelah intervensi (minggu ketiga), 7,69. Delta perubahan skor adalah 4,89 (p=0,002).	Ukuran atau jumlah sampel yang di gunakan dalam sampel ini sangat kecil atau berjumlah 35 sampelsaja.	Penelitian ini di lakukan di puskesmas tegalarejo Yogyakarta dengan populasi penelitian adalah seluruh ibu post partum blues di wilaya tersebut.	Penelitian ini melakukan penelitian tentang penanganan depresi dengan memberikan pendidikan kesehatan individu terhadap perubahan maternal. Adapun penelitian lain yg di lakukan untuk mecegah atau salah satu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

								langkah awal pencegahan terjadinya depresi pada ibu Melakukan pencegahan depresi dengan kombinasi herbal. Dimana penelitian ini di lakukan oleh Kristina Maharani, Choirul Anwar dan Agus Suwandono.
10.	Prevalensi dan fakror resiko depresi postpartum di kota Denpasar mengunakan edingburgh postnatal depression scale.	I Komang Prayoga Ariguna Dira, Ayu Sri Wahyuni.	2016	Prevalensi dan fakror resiko depresi post partum mengunakan edingburgh postnatal depression scale.	Prevalensi depresi postpartum di kota denpasar menggunakan skoring EPDS sebanyak 9 ibu (20,5%). Sebanyak 4 ibu (9,1%) membutuhkan pemantuan ekstra. Faktor resiko yang didapat dalam penelitian ini adalah riwayat pendidikan ibu yang rendah, primipara,	Ibu yang pernah melahirkan di rumasakit umum sanglah Denpasar juga di jadikan targer atau sasaran	Pada penelitian ini menggunakan 44 orang sampel melebihi 1 orang dari total minimal sampel.	Jurnala ini membahas tentang faktor resiko depresi post partum dimana di dapatkan hasil, umur, riwayat pendididkan ibu yang rendah, adalah salah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					umur,memiliki riwayat anak meninggal dan kehamilan tidak diharapkan. Simpulan: Prevalensi depresi postpartum dikota Denpasar berdasarkan skor EPDS adalah 20,5%.	penelitian.	Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ibu yang melahirkan di di Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar, UPT Puskesmas Denpasar Selatan/BKIA Pekambingan dan bidan praktek swasta di kota Denpasar, yang	satu yang menyebabkan terjadinya depresi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

							mampu berkomunikasi secara verbal dan bersedia menjadi responden.	
11.	Efektivitas psikoedukasi terhadap depresi post partum di RSIAITTI FATIMAH dan RSIA PERTIWI MAKASSAR TAHUN 2014	Annur Hikmah Basri,Andi Zulkifli dan M.Tahir Abdullah.	2014	Efektivitas psikoedukasi terhadap depresi post partum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian intervensi psikoedukasi, booklet, dan kontrol berpengaruh terhadap perubahan depresi postpartum. Persentase penurunan paling tinggi pada intervensi psikoedukasi. Kelompok psikoedukasi dengan booklet dan psikoedukasi dengan kontrol terdapat perbedaan yang bermakna (p=0,001), sedangkan kelompok booklet dan kontrol terdapat perbedaan namun tidak bermakna (p=0,937). Dari ketiga kelompok,intervensi	Daftar pustak yang digunakan dalam penelitian ini sangat sedikit yaitu ndalebi dari 10 jurnal.	dilaksanakan di RSIA Siti Fatimah dan RSIA Per tiwi Kota Makassar dengan pertimbangan kedua RSIA tersebut merupakan Rumah Sakit Bersalin terbesar dan jumlah kunjungan terbanyak	Penelitian ini membahas tentang keefektifitasan psikoedukasi terhadap terjadinya depresi postpartum, penelitian ini sejalan dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Awaludin Jahid Abdilah, Septiyani Eka. Putri dimana education tentanh kesehatan individu salah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					psikoedukasi yang memilki penurunan tingkat depresi paling besar.			satu langkah awal untuk mencegah terjadinya depresi pada ibu.

E. Langkah V: Intervensi

NO	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Pengunaan MOMMOODBOOSTER (MMB) sebagai intervensi pada ibu dengan depresi post partum.	Immawanti		Pengunaan MOMMOODBOOSTER (MMB) sebagai intervensi pada ibu dengan depresi post partum.	Depresi postpartum merupakan gangguan mood setelah melahirkan yang merefleksikan disregulasi psikologikal yang merupakan tanda dari gejala – gejala depresi major. Mood yang tertekan, hilangnya ketertarikan atau kesenangan dalam beraktivitas, gangguan nafsu makan, gangguan	Dalam penelitian ini tidak mengunakan sampel atau mempaparkan berapa saja sampel yang di gunakan serta penelitian ini mengunakan internet	Penelitian ini mengunakan metode penelitian Literatur MomMood Booster serta penelitian ini mengunaka internet	Penelitian ini mengunakan Mommoodbooster sebagai intervensi pada ibu, dimana depresi post partum merupakan gangguann mood setelah melahirkan. sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					tidur, agitasi fisik atau pelambatan psikomotor, lemah, merasa tidak berguna, susah konsentrasi, keinginan untuk bunuh diri.	berbasis Web ini sebagai media untuk promosi kesehatan	yang berbasis web sehingamu dah di akses.	penelitian yang di lakukan oleh Yustisia Imaninditya , Murwati. Tahun 2013 tentang studi diskriptif tingkat depri postpartum mendapatkan hasil dgn kelompok umur 24-29 mengalami sindrom.
2.	Studi diskriptif tingkat depresi postpartum pada ibu nifas di wilayah kerja puskesmas klaten selatan tahun 2013.	Yustisia Imaninditya , Murwati	2013	Studi diskriptif tingkat depresi postpartum pada ibu nifas	Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden tidak mengalami depresi sebesar (66.7%). Berdasarkan kelompok umur responden yang mengalami sindrom depresi postpartum adalah kelompok umur 24-29 tahun (46.7%).	Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sangat kecil, serta penususna pembahasan tidak sistematis.	Instrument yang digunakan kuisioner tentang biodata, Interpersonal Support Evaluation List (ISEL)dan Edinburg	Yustisia Imaninditya, Murwati. Tahun 2013 tentang studi diskriptif tingkat depri postpartum mendapatkan hasil dgn kelompok umur 24-29 mengalami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					Berdasarkan jumlah paritas yang mengalami sindrom depresi postpartum terbanyak multipara yaitu (66.7%). Berdasarkan pendidikan yang mengalami sindrom depresi postpartum terbanyak yang berpendidikan menengah yaitu (63.3%). Berdasarkan riwayat persalinan yang rentan mengalami sindrom depresi postpartum hingga ke tingkat sedang adalah responden yang bersalin dengan sc yaitu (6.7%). Berdasarkan dukungan sosial yang rentan mengalami sindrom depresi postpartum adalah yang selain mendapat dukungan tinggi sebesar (26,7%).		Postpartum Depression Scale (EPDS). Analisa data univariat untuk menentukan frekuensi dan distribusi.	sindrom. Penelitian yg lain yg mengunakan Mommoodbooster sebagai intervensi pada ibu, dimana depresi post partum merupakan gangguann mood setelah melahirkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

3.	Pengaruh psikoedukasi terhadap depresi post partum pada ibu primipara	Awaludin Jahid Abdilah,Septi yani Eka Putri	2016	Pengaruh psikoedukasi terhadap depresi postpartum pada inu primipara.	Gambaran depresi ibu postpartum primipara sebelum diberikan Psikoedukasi dari 24 responden menunjukan bahwa responden dengan depresi ringan sebanyak 12 responden 50.0%). Dan ibu primipara sesudah diberikan Psikoedukasi dari 24 responden menunjukan bahwa tingkat depresi ringan sebanyak 10 responden (41.7%). Berdasarkan hasil uji T-Test Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Depresi Postpartum primipara yaitu dengan nilai p value 0.016 sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan tingkat depresi setelah dilakukan Psikoedukasi pada ibu postpartum primipara	Sampel yang di gunakan terlalu kecil dimana hanya 24 sampel dengan ibu postpartum hari ke 29-40 hari. Serta referensi yang di gunakan sangat sedikit.	Ciri dari penelitian ini adalah mengungka pkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subjek. Pada penelitian ini adalah mendeskrip sikan seberapa besarkah pengaruh pemberian psikoeduka si terhadap depresi postpartum	Jurnal ini membahas tentang pengaruh pisikoedukasi untuk di jadikan langkah awal mencegah terjadinya depresi postpartum, sehinga bisa di jadikan sebagai intervensi atau penatalaksanaan awal. Penelitian yang di lakukan oleh Munaaya Fitriyya, Yuliana, mengarah kepada asuhan yg akan di berikan pada ibu postpartum untuk mencegah terjadinya depresi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

4.	Kajiaan asuhan kebidanan pada ibu nifas ny. A umur 17 tahun P1A0 dengan postpartum blues di seragen.	Munaaya Fitriyya, Yuliana	2017	Kajiaan asuhan kebidanan pada ibu nifas	Pada kasus ini sudah dilaksanakan pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu nifas Ny. A dengan post partum blues yaitu komunikasi terapeutik kepada ibu dan keluarga tentang mengajarkan ibu dan keluarga cara perawatan bayi sehari-hari, menganjurkan ibu untuk menceritakan segala permasalahan atau hal lain yang ingin diungkapkan, menganjurkan ibu makan untuk mengkonsumsi gizi seimbang, menganjurkan suami, keluarga, teman, teman sesama ibu untuk memberikan dukungan pada ibu, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, menganjurkan ibu untuk berolah raga ringan, menganjurkan ibu bergabung dengan kelompok ibuibu baru,	Reverensi yang di gunakan sangat sedikit Penyususnan pembahasan tidak sistematis sehinga sulit untuk di pahami.	Penelitian ini menggunakan instrumnt format asuhan kebidanan Ibu nifas dengan pendokumentasian 7 langkah Varney dan catatatan perkembangan.	Munaaya Fitriyya, Yuliana, mengarah kepada asuhan yg akan di berikan pada ibu postpartum untuk mencegah terjadinya depresi. Dengan cara mengajarkan ibu dan keluarga tentang cara menjaga ibu dan bayi, baik dari status kesehatan ataupun status gizi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					menganjurkan suami dan keluarga untuk lebih memperhatikan ibu.			
5.	Kombinasi herbal steam bath dan massage terapi pada inu nifas pada ibu nifas dalam mencegahan postpartum blues.	Kristina Maharani, Choirul Anwar dan Agus Suwandono.	2019	Kombinasi herbal steam bath dan massage terapi pada inu nifas pada ibu nifas dalam mencegahan postpartum	Herbal steam bath dan massage terapi lebih efektif dibandingkan dengan perawatan nifas konvensional dalam pencegahan post partum blues dengan p-value < 0,05.	Penelitian ini tidak menerapkan cara pengunaan atau metode yang di gunakan dalam melakukan perawatan.	Penelitian ini memanfaatkan rempah-rempahan untuk di jadikan terapi dalam menangani kasus postpartum blues.	Kristina Maharani, Choirul Anwar dan Agus Suwandono. Melakukan pencegahan depresi dengan kombinasi herbal. Penelitian yantentang pengaruh psikoedukasi terhadap depresi postpartum. dimana penelitian, yang di lakukan oleh peneliti lain mendapatkan hasil adanya penurunan tingkat depresi setelah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

								dilakukan Psikoedukasi pada ibu.
6.	Pengaruh psikoedukasi terhadap tingkat postpartum blues ibu primipara berusia remaja.	Bina Melvia Girsang, Miranda Novalina dan Jaji	2015	Pengaruh psikoedukasi terhadap tingkat postpartum blues ibu primipara berusia remaja.	Tingkat postpartum blues sebelum diberikan intervensi psikoeduaksi berada pada SD 1,218 mean 12,30 dan median 12 dengan skor minimal 10 dan maksimal 15, sedangkan tingkat postpartum blues setelah diberikan intervensi psikoedukasi berada pada SD 1,701 dengan mean 10,50 dan mdian 10 dengan skor minimal 8 dan maksimal 13.Maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa ada perubahan bermakna antara tingkat postpartum blues sebelum dan sesudah intervensi. P value = 0,001 dengan α=0,05 artinya	Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sangat sedikit penulisan tidak sistematis.	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian Pre-eksperimental, dengan jenis penelitian One group pre-post test design.	Jurnal ini melakukan penelitian tentang pengaruh psicoedukasa terhadap terjadinya depresi post partum hasil dimana adanya penurunan tingkat depresi setelah dilakukan Psikoedukasi pada ibu. Sedangkan pada penelitian yang di lakukan oleh Jurnal yang di teliti oleh Ni Nyoman Ari Indra Dewi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

					psikoedukasi memiliki pengaruh yang efektif dalam penurunan tingkat postpartum blues.			Dermawan Waruwu, mengatakan bahwa ada perubahan sesudah pemberian cognitive.
7.	Pengaruh Cognitive Behavior Therapy Terhadap Postpartum Depression.	Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Dermawan Waruwu	2018	Pengaruh Cognitive Behavior Therapy Terhadap Postpartum Depression	Hasil penelitian menunjukkan sebelum dan sesudah pemberian Cognitive Behavior Therapy adalah (p = 0,034 < 0,05 ; z = 2,121) dan perbandingan posttest 1 dengan follow up (p = 0,038 < 0, 05 ; z = 2,070). Dengan demikian, perlakuan Cognitive Behavior Therapy dapat menurunkan postpartum depression pada ibu melahirkan	Penelitian ini melakukan penelitian pada ibu postpartum 1-2 bulan setelah melahirkan.	penelitian dilakukan pengukuran depresi dengan menggunakan skala depresi terhadap subyek penelitian sebanyak tiga kali dengan selang waktu masing-masing satu minggu,	Jurnal yang di teliti oleh Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Dermawan Waruwu, mengatakan bahwa ada perubahan sesudah pemberian cognitive dan penelitian ini juga sejalan dgn hasil penelitian yang di lakukan oleh Bina Melvia Girsang, Miranda Novalina dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

							kemudian diberikan perlakuan (treatment) selama enam sesi. Setelah diberikan perlakuan dilakukan pengukuran kembali dengan skala yang sama sebanyak dua kali dengan jeda waktu satu minggu.	Jaji, pada tahun 2015.
8.	Pengaruh pemberian Pendidikan kesehatan individu terhadap perubahan	Irma Fidora, Elsi Dwi Hapsari dan Ibrahim Rahmat	2014	Pengaruh pemberian Pendidikan kesehatan individu terhadap perubahan maternal depressive symptoms pada ibu	Skor maternal depressive symptoms sebelum intervensi yaitu 12,83 dan terjadi penurunan signifikan setelah intervensi (minggu	Tidak ada kelemahan dalam jurnal tersebut	Mengguna kan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca	Jurnal yang di teliti oleh Irma Fidora, Elsi Dwi Hapsari dan Ibrahim Rahmat memiki persamaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	maternal depressive symptoms pada ibu postpartum.			postpartum.	ketiga), 7,69. Delta perubahan skor adalah 4,89 (p=0,002). Kesimpulan: Pendidikan kesehatan disertai buku panduan berpengaruh signifikan menurunkan maternal depressive symptoms pada ibu postpartum.			dengan melakukan pemberian pendidikan kesehatan individu, sedangkan pada jurnal yang di teliti oleh Bina Melvia Girsang, Miranda Novalina dan Jaji, melakukan pemberian edukasi untuk mencegah terjadinya depresi post partum pada ibu.
9.	Pengaruh pemberian KIE (komunikasi informasi) Persiapan persalinan dan nifas terhadap	Dwi Winarni,Kris diana Wijayanti dan Ngadiyono.	2017	Pemberian informasi persiapan persalinan dan nifas	Hasil penelitian tersebut untuk umur adalah usia reproduksi sehat /tidak beresiko (20-35 tahun) sebanyak 33 (83%), paritas untuk primipara	Penelitian melakukan control pada hari ke 10 pospartum.	Penelitian ini mengambil semua populasi ibu hamil trimester	Jurnal ini melakukan penelitian tentang pengaruh pemberian KIE terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	kejadian post partum blues.				dan mul-tipara sama-sama 20 (50%), tingkat pendidikan terbanyak pendidikan SMA 18 (43%), paling sedikit D3/S1 3(8%), pekerjaan kebanyakan ibu yang tidak bekerja/ ibu rumah tangga 25 (62%)		tiga yanga datang periksa.	kejadian post partum blues dimana di dapatkan hasil reproduksi sehat /tidak beresiko (20-35 tahun) sebanyak 33 (83%), dimana ini adalah jumlah terbanyak dari hasil penelitian yang mengalami post partum blues. Sedangkan pada penelitian lain yang di teliti oleh Annur Hikmah Basri1,Andi Zulkifli dan M.Tahir Abdullah. Umur responden memiliki kontribisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

								terhadap kejadian depresi post partum.
10.	Efektifitas psikoedukasi terhadap depresi postpartum. di RSIA Sitti fatimah dan RSIA Pertiwi Makassar Tahun 2014	Annur Hikmah Basri1,Andi Zulkifli dan M.Tahir Abdullah	2014	psikoedukasi terhadap depresi postpartum	Umur responden memiliki kontribusi terhadap kejadian depresi postpartum. Hasil pengolahan data tentang umur responden menunjukkan bahwa kelompok umur yang paling banyak menderita yaitu kelompok umur 33 – 37 tahun sebesar 30,8%.	Penelitian ini tidak menerapkan table untuk mempaparkan hasil penelitian, sehingga tidak bisa terlalu di pahami.	dilaksanakan dilakukan di RSIA Siti Fatimah dan RSIA Pertiwi Kota Makassar dengan pertimbangan kedua RSIA tersebut merupakan Rumah Sakit Bersalin terbesar dan jumlah kunjungan terbanyak.	Jurnal ini mengatakan bahwa umur memiliki kontribusi terhadap kejadian depresi post partum dan klompok umur yang paling banyak menderita yaitu kelompok umur 33-37 tahun sebesar 30,8 %.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

F. Langkah VI: Penatalaksanaan

NO	Judul Referensi	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Pengaruh psikoedukasi terhadap depresi post partum pada ibu primipara	Awaludin Jahid Abdilah,Septiyani Eka Putri	2016	Pengaruh pisiko edukasi terhadap postpartum blues	Tingkat postpartum blues sebelum diberikan intervensi psikoeduaksi berada pada SD 1,218 mean 12,30 dan median 12 dengan skor minimal 10 dan maksimal 15, sedangkan tingkat	Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sangat sedikit penulisan tidak sistematis.	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian Pre-eksperimental, dengan jenis penelitian One group pre-post test design.	Jurnal ini melakukan penelitian tentang pengaruh psicoedukasa terhadap terjadinya depresi post partum hasil dimana adanya penurunan tingkat depresi setelah dilakukan Psikoedukasi pada ibu. Begitupun yg di dapatkan pada hasil penelitian yang di lakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

								oleh Jurnal yang di teliti oleh Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Dermawan Waruwu, mengatakan bahwa ada perubahan sesudah pemberian cognitive
2.	Hipnoterapi terhadap depresi post partum pada ibu primipara	Nengah Runiari, Nyoman Hartati dan I Wayan Candra	2013	Hopnoterapi terhadap depresi post partum	yang peneliti dapatkan data meliputi karakteristik responden, kecenderungan depresi postpartum pada ibu primipara yang dilakukan hipnoterapi, kecenderungan depresi postpartum pada ibu primipara yang tidak dilakukan hipnoterapi dan pengaruh hipnoterapi terhadap kecenderungan	Sampel yang di gunakan terlalu sedikit diaman hanya 24 sampel saja.	menganalis is pengaruh hipnoterapi terhadap kecenderun gan depresi postpartum primipara.	Jurnal ini melakukan Hopnoterapi terhadap depresi post partum, dimana di dapatkan kecenderungan depresi postpartum pada ibu primipara yang tidak dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					depresi postpartum pada ibu primipara.			hipnoterapi. Dan jurnal lain yang di teliti oleh Ade eka sari widiyanti menerapkan massage terapi kedua jurnal ini membahas tentang terapi namun di dapatkan hasil yang berbeda.
3.	Penerapan massage terapi dengan tehnik effluarange sebagai pencegahan depresi pada ibu di BPM Tugirah Tahun 2017	Ade eka sari widiyanti.	2017	Massage terapi dengan teknik efflurang sebagai pencegahan depresi post partum.	Hasil penelitian di RSUD Kebumen adalah kemungkinan depresi rendah 75,8%, baby blues 15,4%, kemungkinan depresi postpartum 2,2%, dan yang mengalami depresi postpartum adalah 6,6%. Hal ini dapat ditangani dengan pengobatan medis atau non farmakologi. Penanganan tanpa obat seperti latihan, akupunktur	Pembahasan tentang penangan kasus depresi post partum dng mengunakan metode massage terapi sangat sedikit.	mendeskripsikan fakta-fakta dari pengkajian yang didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung, dan dokumentasi.	Jurnal ini menerapkan masageterapi sebagia pencegahan depresi, sedangkan pada jurnal yg di teliti oleh Nengah Runiari, Nyoman Hartati dan I Wayan Candra, melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					dan massage terapi. Maka dari itu penulis tertarik menerapkan massage effleurage sebagai pencegahan depresi postpartum pada ibu nifas.			peneliaian pada krakteristik responden sebelum dan sesudah pemberian terapi.
4.	Upaya meningkatkan kebutuhan aktivitas dan latihan pada ibu post partum.	Tyas febriani.	2017	Meningkatkan kebutuhan aktifitas dan latihan pada ibu post partum	penelitian yang dilakukan penulis didapatkan masalah hambatan mobilitas fisik yang disebabkan karena nyeri. Intervensi yang dilakukan penulis meliputi: observasi nyeri, ajarkan relaksasi nafas dalam, ajarkan ambulasi dini. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 hari aktivitas dan latihan dapat terpenuhi, sehingga intervensi dihentikan	Waktu yang di gunakan dalam penelitian hanya tiga hari saja.	Melakukan wawan cara dan obserfasi secara langsung	Jurnal Tyas febriani. Melakukan penelitian upaya untuk meningkatkan kebutuhan aktivitas dimana di dapatkan hasil dalam penelitian ini, hambatan mobilitas fisik yang di sebabka oleh nyeri. Dan kajian yang di lakukan oleh Munaaya Fitriyya, Yuliana. Yaitu komunikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

								terapeutik kepada ibu dan keluarga tentang mengajarkan ibu dan keluarga cara perawatan bayi sehari-hari,
5.	Pengaruh pemberian KIE (komunikasi informasi) Persiapan persalinan dan nifas terhadap kejadian post partum blues.	Dwi Winarni,Kris diana Wijayanti dan Ngadiyono.	2017	Pemberian informasi persiapan persalinan dan nifas	Hasil penelitian tersebut untuk umur adalah usia reproduksi sehat /tidak beresiko (20-35 tahun) sebanyak 33 (83%), paritas untuk primipara dan mul-tipara sama-sama 20 (50%), tingkat pendidikan terbanyak pendidikan SMA 18 (43%), paling sedikit D3/S1 3(8%), pekerjaan kebanyakan ibu yang tidak bekerja/ ibu rumah tangga 25 (62%)	Jumlah sampel yang digunakan kurang	Mengguna kan referenssi dalampenel itian yang terbaru	Pada Jurnal ini melakukan penelitian tentang pengaruh pemberian KIE terhadap kejadian post partum blues dimana di dapatkan hasil reproduksi sehat /tidak beresiko (20-35 tahun) sebanyak 33 (83%), dimana ini adalah jumlah terbanyak dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

								hasil penelitian yang mengalami post partum blues.pada Jurnal yang di teliti oleh Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Dermawan Waruwu, mengatakan bahwa ada perubahan sesudah pemberian cognitive
6.	Pengaruh Cognitive Behavior Therapy Terhadap Postpartum Depression.	Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Dermawan Waruwu	2018	Pengaruh Cognitive Behavior Therapy Terhadap Postpartum Depression	Hasil penelitian menunjukkan sebelum dan sesudah pemberian Cognitive Behavior Therapy adalah (p = 0,034 < 0,05 ; z = 2,121) dan perbandingan posttest 1 dengan follow up (p = 0,038 < 0, 05 ; z = 2,070). Dengan demikian,	Penelitian ini melakukan penelitian pada ibu postpartum 1-2 bulan setelah melahirkan.	penelitian dilakukan pengukuran depresi dengan menggunakan skala depresi terhadap subyek penelitian	Jurnal yang di teliti oleh Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Dermawan Waruwu, mengatakan bahwa ada perubahan sesudah pemberian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					perlakuan Cognitive Behavior Therapy dapat menurunkan postpartum depression pada ibu melahirkan		sebanyak tiga kali dengan selang waktu masing-masing satu minggu..	cognitive. Pada Jurnal Dwi Winarni,Krisdiana Wijayanti dan Ngadiyono. ini melakukan penelitian tentang pengaruh pemberian KIE terhadap kejadian post partum blues dimana di dapatkan hasil reproduksi sehat /tidak beresiko (20-35 tahun) sebanyak 33 (83%), dimana ini adalah jumlah terbanyak dari hasil penelitian yang mengalami post partum blues.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

7.	Studi diskriptif tingkat depresi postpartum pada ibu nifas di wilayah kerja puskesmas klaten selatan tahun 2013.	Yustisia Imaninditya , Murwati	2013	Studi diskriptif tingkat depresi postpartum pada ibu nifas	Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden tidak mengalami depresi sebesar (66.7%). Berdasarkan kelompok umur responden yang mengalami sindrom depresi postpartum adalah kelompok umur 24-29 tahun (46.7%). Berdasarkan jumlah paritas yang mengalami sindrom depresi postpartum terbanyak multipara yaitu (66.7%). Berdasarkan pendidikan yang mengalami sindrom depresi postpartum terbanyak yang berpendidikan menengah yaitu (63.3%). Berdasarkan riwayat persalinan yang rentan mengalami sindrom depresi postpartum hingga ke tingkat sedang adalah	Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sangat kecil, serta penususna pembahasan tidak sistematis.	Instrument yang digunakan kuisioner tentang biodata.	Jurnal ini tentang studi diskriptif tingkat depresi dimana di dapatkan hasil tertinggi dalam penelitian ini yaitu multipara sebesar (66.7%). Pada penelitian yang di lakukan oleh Kristina Maharani, Choirul Anwar dan Agus Suwandono melakukan penangan pada postpartum dengan kombinasi herbal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

					responden yang bersalin dengan sc yaitu (6.7%). Berdasarkan dukungan sosial yang rentan mengalami sindrom depresi postpartum adalah yang selain mendapat dukungan tinggi sebesar (26,7%).			
8.	Kombinasi herbal steam bath dan massage terapi pada inu nifas pada ibu nifas dalam mencegahan postpartum blues.	Kristina Maharani, Choirul Anwar dan Agus Suwandono.	2019	Kombinasi herbal steam bath dan massage terapi pada inu nifas pada ibu nifas dalam mencegahan postpartum	Herbal steam bath dan massage terapi lebih efektif dibandingkan dengan perawatan nifas konvensional dalam pencegahan post partum blues dengan p-value < 0,05.	Penelitian ini tidak menerapkan cara pengunaan atau metode yang di gunakan dalam melakukan perawatan.	Penelitian ini memanfaatkan rempah-rempahan untuk di jadikan terapi dalam menangani kasus postpartum blues.	Kristina Maharani, Choirul Anwar dan Agus Suwandono melakukan penangan pada postpartum dengan kombinasi herbal. Dan pada penelitian Munaaya Fitriyya, Yuliana melakukan asuhan untuk mencegah terjadinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

								depresi pada ibu post partum.
9.	Kajiaan asuhan kebidanan pada ibu nifas ny. A umur 17 tahun P1A0 dengan postpartum blues di seragen.	Munaaya Fitriyya, Yuliana	2017	Kajiaan asuhan kebidanan pada ibu nifas	Pada kasus ini sudah dilaksanakan pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu nifas Ny. A dengan post partum blues yaitu komunikasi terapeutik kepada ibu dan keluarga tentang mengajarkan ibu dan keluarga cara perawatan bayi sehari-hari, menganjurkan ibu untuk menceritakan segala permasalahan atau hal lain yang ingin diungkapkan, menganjurkan ibu makan untuk mengkonsumsi gizi seimbang, menganjurkan suami, keluarga, teman, teman sesama ibu untuk memberikan dukungan pada ibu, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, menganjurkan ibu untuk berolah raga ringan, menganjurkan ibu	Reverensi yang di gunakan sangat sedikit Penyususnan pembahasan tidak sistematis sehinga sulit untuk di pahami.	Penelitian ini menggunakan instrumnt format asuhan kebidanan Ibu nifas dengan pendokumentasian 7 langkah Varney dan catatatan perkembangan.	Munaaya Fitriyya, Yuliana melakukan asuhan untuk mencegah terjadinya depresi pada ibu post partum. Dan pada penelitian Annur Hikmah Basri,Andi Zulkifli dan M.Tahir Abdullah, melakukan edukasi untuk penangan depresi postpartum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					bergabung dengan kelompok ibuibu baru, menganjurkan suami dan keluarga untuk lebih memperhatikan ibu.			
10.	Efektivitas psikoedukasi terhadap depresi post partum di RSIAITTI FATIMAH dan RSIA PERTIWI MAKASSAR TAHUN 2014	Annur Hikmah Basri, Andi Zulkifli dan M.Tahir Abdullah.	2014	Efektivitas psikoedukasi terhadap depresi post partum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian intervensi psikoedukasi, booklet, dan kontrolberpengaruh terhadap perubahan depresi postpartum. Persentase penurunan paling tinggi pada intervensi psikoedukasi. Kelompok psikoedukasi dengan booklet dan psikoedukasi dengan kontrol terdapat perbedaan yang bermakna (p=0,001), sedangkan kelompok booklet dan kontrol terdapat perbedaan namun tidak bermakna (p=0,937). Dari ketiga kelompok, intervensi psikoedukasi yang memilki penurunan	Daftar pustak yang digunakan dalam penelitian ini sangat sedikit yaitu ndalebi dari 10 jurnal.	dilaksanakan di RSIA Siti Fatimah dan RSIA Per tiwi Kota Makassar dengan pertimbangan kedua RSIA tersebut merupakan Rumah Sakit Bersalin terbesar dan jumlah kunjungan terbanyak	Jurnal ini mengatakan bahwa umur memiliki kontribusi terhadap kejadian depresi post partum dan klompok umur yang paling banyak menderita yaitu kelompok umur 33-37 tahun sebesar 30,8 %. Dan Munaaya Fitriyya, Yuliana melakukan asuhan untuk mencegah terjadinya depresi pada ibu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					tingkat depresi paling besar.			post partum.

G. Langkah VII: Evaluasi

NO	Judul Referensi	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Analisis health seeking behavior pada ibu post partum blues suku Madura.	Adenia Dwi Ristanti, Elly Dwi Masita	2020	Analisis health seeking behavior	Maka dapat diasumsikan bahwa dukungan suami, keluarga, dan lingkungan, keyakinan, serta budaya berpengaruh terhadap perilaku health seeking pada ibu postpartum blues.	Referensi yang di gunakan dalam penelitian ini sedikit.	menganalis is faktor-faktor yang mempengar uhi perilaku health seeking behavior pada ibu postpartum blues	Pada penelitian yang di lakukan oleh adenia dwi ristanti dan elly dwi masita 2020. Healt seeking behavior di jadikan intervensi untuk mengevaluasi post partum blues.
2.	Hubungan post partum blues, dan efikasi diri dengan	Ratna Indriyan	2015	efikasi diri dengan pelaksanaan senam	Tentang Distribusi postpartum blues di Polindes menunjukkan	Pembahasan tentang metode penangan	Mencari hubungan antar var iabelindepe	Pada penelitian yang di lakukan oleh ratna adriani 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	pelaksanaan senam di polindes tunas bunda.				bahwa sebagian besar responden kemungkinan mengalami postpartum blues, yaitu sebanyak 17 responden (54,8%).	dalam jurnal ini tidak begitu banyak.	ndent dan dependent.	Tentang efikasi diri dengan pelaksanaan senam dimana metode ini bisa di jadikan asuhan terhadap kasusu post partum blues sehinga bisa di evaluasi tingkat keberhasilanya dan terdapar perubahan setelah melakukan intervensi dan pada penelitian yang di lakukan oleh munaaya fitriyya dan yuliana di tahun 2017. dimana penelitian ini melakukan asuhan kebidanan dimana asuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

								yang di berikan berupa education terhadap ibu tentang perawatan diri dan bayi.
3.	Kajian asuhan kebidanan pad ibu nifas ny. A umur 17 tahun P1A0 dengan post partum blues di srage.	Munaaya Fitriyya, Yuliana	2017	Asuhan kebidanan	ajarkan ibu dan keluarga cara perawatan bayi sehari-hari, anjurkan ibu untuk menceritakan segala permasalahan atau hal lain yang ingin diungkapkan, anjurkan ibu makan untuk menambah nafsu makan, anjurkan suami, keluarga, teman, teman sesama ibu untuk memberikan dukungan pada ibu, anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, anjurkan ibu untuk berolah raga ringan, anjurkan ibu bergabung dengan kelompok ibu-ibu baru, anjurkan suami dan keluarga untuk lebih	Referensi yang di gunakann dalam melakukan penelitian jurnal ini sangat sedikit.	Pengambilan data melalui wawancar, observasi, pemeriksan dan dokumentasi.	pada penelitian yang di lakukan oleh munaaya fitriyya dan yuliana di tahun 2017. dimana penelitian ini melakukan asuhan kebidanan dimana asuhan yang di berikan berupa education terhadap ibu tentang perawatan diri dan bayi. dan pada penelitian yang di lakukan oleh Rotua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

					memperhatikan ibu.			Lenawati Tindaon, Elis Anggeria 2018. dimana penelitian ini melakukan penenlitian tentang evektivitas konseling terhadap kejadian post partum blues dimana di dapatkan adanya perubahan dan penurunan setelah di lakukan evaluasi.
4.	Efektivitas konseling terhadap post partum blues pada ibu primipara.	Rotua Lenawati Tindaon, Elis Anggeria	2018	Konseling terhadap post partum blues	Melalui kuesioner EPDS postpartum blues ibu primipara diperoleh p-value 0,000 Maka dapat disimpulkan bahwa ada efektivitas Konseling	Pemaparan hasil dalam penelitian ini sangat sedikit.	Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan	Pada penelitian yang di lakukan oleh munaaya fitriyya dan yuliana di tahun 2017. Dimana penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

					terhadap Postpartum Blues pada ibu primipara.		wawancara , dan kuesioner yang mengacu pada kerangka konsep dan tinjauan pustaka	melakukan asuhan kebidanan dimana asuhan yang di berikan berupa education terhadap ibu tentang perawatan diri dan bayi. Dan pada penelitian yang di lakukan oleh Rotua Lenawati Tindaon, Elis Anggeria 2018. Dimana penelitian ini melakukan penenlitian tentang evektivitas konseling terhadap kejadian post partum blues dimana di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

								dapatkan adanya perubahan dan penurunan setelah di lakukan evaluasi. berbeda dengan penelitian di atas dimana penelitian yang di lakukan oleh desthalia di tahun 2020 dimana penelitian ini lebih mengarah pada jenis persalinan dimana jenis persalinan ini adalah salah satu faktor penyebabab ternjadinya post partum blues.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

5.	Hubungan jenis persalinan dengan kejadian post partum blues di rumah sakit daerah balung kebupaten jember.	Desthalia cyatraningtias	2020	jenis persalinan dengan kejadian post partum blues	Berdasarkan hasil penelitian ibu yang menjalani persalinan terbanyak berada pada rentang usia 20-35 tahun, lebih dari setengah ibu yang menjalani persalinan memiliki status peritas multipara. Pendidikan yang paling banyak di tempuh oleh ibu post partum adalah SMA/Sederajat, lebih dari setengah ibu post partum memiliki status tidak berkerja atau ibu rumah tangga.	Jurnal ini tidak memiliki kekurangan	Meningkatkan kemampuan mengenaipenelitian dan penyusunan metodelogi dalam bidang keperawatan maternitas.	penelitian yang di lakukan oleh desthalia di tahun 2020 dimana penelitian ini lebih mengarah pada jenis persalinan dimana jenis persalinan ini adalah salah satu faktor penyebabab ternjadinya post partum blues. Dan pada penelitian lain yang di lakukan oleh ika lestari sugeng 2013 mengatakan kadar oksitoson dan bendungan asi bisa menjadi penyebab post parum blues sehinga di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

								perlukan evaluasi yang lebih terhadap peningkatan volume asi dan kadar oksitosin.
6.	Kadar oksitosin dan bendungan asi pada ibu primipara dengan post partum blues.	Ika Larasati Sugeng	2013	Kadar oksitosin dan bendungan asi	Perubahan tingkat oksitosin pada postpartum blues p=0,002 dan kejadian pembengkakan payudara meningkat pada ibu dengan postpartum bluesp=0,000.Ada perbedaan tingkat oksitosin antara ibu postpartum blues dan ibu tidak postpartum blues. Kejadian pembengkakan payudara juga lebih meningkat pada ibu postpartum blues dibandingkan dengan ibu tidak postpartum blues	Pembahasan tentang kadar oksitoson dan bendungan Asi dalam jurnal ini tidak terlalu banyak.	Variabel independen adalah postpartum blues, variabel dependen adalah pembengkakan payudara dan tingkat oksitosin.	Pada penelitian lain yang di lakukan oleh ika lestari sugeng 2013 mengatakan kadar oksitoson dan bendungan asi bisa menjadi penyebab post parum blues sehinga di perlukan evaluasi yang lebih terhadap peningkatan volume asi dan kadar oksitosin. dan pada penelitian lain yang di lakukkan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

								budi astuti 2015 melakukan penelitian dengan melakukan peneliain terhadap sikap perawat pada saat melakukan intervensi dan evaluasi terhadap kasus post partum blues.
7.	Hubungan tingkat pengatahuan dengan sikap perawat dalan perawatan pasien post partum blues di rumah sakit DKT Yogyakarta.	Budi astuti	2015	dengan sikap perawat dalan perawatan pasien	Responden paling banyak memiliki tingkat pengetahuan tentang perawatan pasien postpartum blues baik yaitu 20 orang (50%), dan responden paling banyak memiliki sikap tentang perawatan pasien postpartum blues cukup yaitu 25 orang (62,5%)		desain penelitian ini bersifat korelasional dengan pendekatan crosssectional.	Pada penelitian yang di lakukan oleh budi astuti 2015 lebih mengarah pada sikap perawat dalam memberikan intervensi dan evaluasi pada kasus post partum blues. Sedangkan pada penelitian yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

								di lakukan oleh salma 2018. Memberikana asuhan untuk mengevaluasi kasus post partum blues melihat sejauh mana tingkat keefektivitasan asuhan yang telah di berikan.
8.	Kombinasi herbal steam bath dan massage terapi pada inu nifas pada ibu nifas dalam mencegahan postpartum blues.	Kristina Maharani, Choirul Anwar dan Agus Suwandono.	2019	Kombinasi herbal steam bath dan massage terapi pada inu nifas pada ibu nifas dalam mencegahan postpartum	Herbal steam bath dan massage terapi lebih efektif dibandingkan dengan perawatan nifas konvensional dalam pencegahan post partum blues dengan p-value < 0,05.	Penelitian ini tidak menerapkan cara pengunaan atau metode yang di gunakan dalam melakukan perawatan.	Penelitian ini memanfaatkan rempah-rempahan untuk di jadikan terapi dalam menangani kasus postpartum blues.	Kristina Maharani, Choirul Anwar dan Agus Suwandono melakukan penangan pada postpartum dengan kombinasi herbal. Dan pada penelitian Munaaya Fitriyya, Yuliana melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

								asuhan untuk mencegah terjadinya depresi pada ibu post partum.
9.	Menejemen asuhan kebidana post natal care dengah post partum blues.	Salma	2018	Asuhan kebidanan post natal care dengan post partum blues	Evaluasi yang berhasil dilakukan sebelum dan sesudah meliputi: Ibu menyusui bayinya secara on-demand, mulai menyayangi bayinya, nafsu makan bertambah, tidak ada infeksi luka jahitan yang membuat kondisi psikologi ibu memburuk, ibu mulai terbuka kepada suami dan menceritakan segala permasalahan yang ada. Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny"R" secara garis besar tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus. Kunjungan yang	Pada jurnan ini tidak dapat kekurangan baik dari segi penulisan dan pembahasan	Pembahasa tentang kasus post partum blues n dalam penenlitian ini sangat mudah di mengerti sangat sistematis	Pada penelitian yang di lakukan oleh salma 2018. memberikana asuhan untuk mengevaluasi kasus post partum blues melihat sejauh mana tingkat keefektivitasan asuhan yang telah di berikan. dan pada penelitian yang di oleh budi astuti 2015. tingkat pengetahuan perawat dalam memberikan asuahan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					dilakukan pada Ny.”R” yaitu sebanyak 6 kali. kunjungan dilakukan sebanyak tiga kali selama di rumah sakit dan 3 kali kunjungan selama dirumah.			medapatkah hasil yang maksimal pada saat evaluasi.
10.	Pengaruh pemberian musik klasik terhadap gejalan post partum blues pada ibu primipara	Desi simpan hati hasibuan	2018	Pemberian musik klasik terhadap gejala post partum blues	Pemberian intervensi musik klasik membuat seseorang menjadi rileks, menimbulkan rasa aman dan sejahtera, melepaskan rasa gembira dan sedih, melespaskan rasa sakit dan menurunkan sres.Hal ini terjadi karena Musik mengatur hormon-hormon yang berkaitan dengan stres.Hormon-hormon, seperti adrenocorticotrophic (ACTH), prolaktik, dan human growth hormone (HGH) dalam darah menurun secara signifikan pada orang-orang yang mendengarkan musik	Tidak terdapat kekurangan dalam penelitian ini	Penelitian ini menggunakan pendekatan rancangan nonequivalent control group design yang menggunakan dua kelompok subjek penelitian, yaitu satu kelompok ekperimen dan satu kelompok	Pada penelitian yang di lakukan oleh desi simpan hati hasibuan (2018) dima terapi musik memiliki efektifitas untuk mencegah terjadinya post partum blues sehinga bisa di evaluasi tingkat ke efektivitasnya. sedangkan pada peneelitian yang di lakukan oleh salma 2018, dimana melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

					yang santai.Selain itu, musik juga dapat meningkatkan pelepasan endorpin. Sehingga di simpulkan bahwa pemberian terapi musik klasik berpengaruh terhadap penurunan gejala post partum blues		kontol, berikut skema desain penelitian	evaluasi pada ibu post partum blues setelah memberikan asuhan, diman asuhan yg di berikan berupa perawatan diri ibu dan bayinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BABA IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan hasil Telaah Evidance Based Asuhan 7 Langah Varney Berdasarkan Hasil Penelusuran Reverensi

Pada bagian pembahasan, setelah menguraiankan berbagai referensi dalambentuk matrik, akan dilakukan perbandingan dari reverensi yang satu ke refewrensi yang lain pembahasan akan di uraiakan dalam 7 langkah varney:

1. Langkah 1: Identivikasi Data Dasar.

Pada langkah pertama identivikasi terjadinya post partm blues mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap dari berbagai sumber yang telahmelakukan penelitian tetang post partum blues. Di langkah ini akan di dapatkan berbagai referensi tentang definisi tanda dan gejala,dan fakto-faktor penyebab terjadinya depresi post partum blues berdasarkandaro matriks dari langkah satu di atas maka dapat di simpulkan sebagai berikut.

Pada penelitian yang di laukan oleh Halimatus Saidah, SST., M.HKes Wilda Al aluf, S.Tr.Keb(2018). Kecemasan yang berlebihan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya post partum blues, dimana ibu akan mengalami kesulitan untuk istirahat dan tidur serta sering mengalami gejala gangguan fisik yaitu sakit kepala dan leher. Ibu merasa cemas karena ketidak mampuannya untuk merawat bayinya setelah beberapa hari pasca bersalin dan ketakutan menjadi tidak menarik lagi. Karena adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

kecemasan yang dialami oleh ibu post partum sehingga mengakibatkan terjadinya Post Partum Blues.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Mariyatul Qiftiyah (2018) dukungan keluarga, pengatahuan, satus kehamilan, merupakan salah satu penyebab post partum blues. Dan setengahnya responden mengalami post partum blues ringan mendapatkan dukungan keluarga kurang dan pengetahuan kurang. Sehingga masih diperlukan peran serta dukungan keluarga dalam mencegah faktor-faktor yang melatarbelakangi post partum blues.

Secara psikologis, seorang wanita yang baru saja melahirkan akan mengalami tekanan psikis. Banyak wanita yang sepintas merasa bahagia dengan kelahiran bayinya, namun sejalan dengan itu, akan muncul gangguan suasana hati, perasaan sedih dan tekanan yang dialami oleh seorang wanita setelah melahirkan yang berlangsung pada minggu pertama, terutama pada hari ketiga hingga kelima. Gangguan psikologis tersebut disebut dengan post partum blues (Hasni, 2012).

Pada penelitian yang di lakukan oleh Krisdiana Wijayanti, Feri Anita Wijayanti dan Erni Nuryanti pada tahun (2013 di) wilaya kerja puskesmas blora, tentang gambaran faktor resiko post partum blues.dimana jumlah responden didominasi pada rentang usia 20 – 35 tahun yaitu 59 responden. Responden terbanyak berdasarkan paritas adalah multipara, dan pada penelitian ini mengatakan tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadiaan baby blues. Kejadian baby blues pada penelitian ini terdapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

kecenderungan persentase yang tinggi pada kelompok umur >35 tahun yaitu 60% diikuti oleh kelompok ibu usia muda <20 tahun yaitu 50%. Walaupun beberapa penelitian menyatakan bahwa umur tidak menunjukkan terdapat hubungan dengan kejadian postpartum blues (O'Hara dkk, 1991 dan Machmudah, 2010) akan tetapi adanya kecenderungan gangguan mood pada ibu usia muda (Machmudah, 2010) memungkinkan menjadi salah satu faktor risiko terjadinya postpartum blues.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Devi Kurniasari, Yetti Amir Astuti, pada tahun (2014). Tentang hubungan antara karakteristk ibu, kondisi bayi dan dukungan suami terhadap terjadinya post partum blues. Paada penelitian ini mengatakan bahwa dukungan social dari suami merupakan factor yang paling dominan yg menjadi penyebab terjadinya post partum blues. Dukungan suami sangat diperlukan, karena ibu tidak akan merasa beban dengan apa yang terjadi pada dirinya, baik dukungan saat hamil, saat bersalin maupun masa nifas. Perhatian suami, komunikasi yang di jalin, sikap dan perilaku suami dalam membantu ibu baik dalam kehamilan, persalinan dan nifas akan mempengaruhi kondisi ibu.

Faktor internal lainnya yang dapat mendukung terjadinya postpartum blues adalah kondisi kesehatan ibu selama periode perinatal, penyakit yang menyertai ibu sebelum dan sesudah kehamilan dapat membuat ibu merasa takut, cemas dan penuh ketegangan dan kekhawatiran sehingga dapat memicu peningkatan hormon-hormon kortikosteroid. Perubahan hormon kortikosteroid dapat memunculkan gejala perubahan denyut jantung, nadi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

pusing dan mudah lelah. Faktor psikologis dan kepribadian juga dapat mempengaruhi terjadinya postpartum blues. Karakteristik ibu, kondisi bayi dan dukungan suami merupakan faktor resiko terjadinya postpartum blues (Mansyur, 2014).

Pada penelitian yang di lakukan oleh Riani Astri, Ariani Fatmawati dan Nina Gartika pada tahun (2020). Adanya pengaruh dukungan sosial pada Ibu postpartum primipara Terhadap Kejadian Postpartum Blue, dimana di dapatkan hasil dalam penelitian yaitu p-value 0,007 (pvalue <0,005) yang berarti terdapat hubungan antara dukungan sosial terhadap kejadian postpartum blues. Sehinga dapat di simpulkan bahwa kurangnya dukungan social merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya post partum blues, dan hasil penelitian lain menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kejadian postpartum blues pada ibu remaja (A. Fatmawati & Gartika, 2019), dukungan suami factor yang paling berhubungan dengan kejadian postpartum blues (Kurniasari & Astuti, 2015) dan dukungan sosial bidan/tenaga kesehatan factor yang paling dominan memengaruhi kejadian postpartum blues pada ibu postpartum remaja (Nurfatimah & Entoh, 2018).

Pada penelitian yang di lakukan oleh Diah Ayu Fatmawati (2015) tentang faktor resiko yang berpengaruh terhadap kejadian post partum blues, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor risiko berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian postpartum blues. Analisis bivariat menunjukkan ada 3 faktor risiko yang secara signifikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

berpengaruh terhadap kejadian postpartum blues yaitu usia, paritas dan dukungan sosial suami, sedangkan 5 faktor risiko yaitu pendidikan, status pekerjaan ibu, jenis persalinan, kehamilan tidak direncanakan dan status ekonomi keluarga secara statistik tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kejadian postpartum blues, dan hasil analisis multivariat menunjukan bahwa usia ibu adalah faktor terkuat yang paling dominan berpengaruh terhadap kejadian post partum blues.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Winda wira utami dkk (2016). Post partum blues merupakan kesedihan atau kemurungan setelah melahirkan biasanya hanya muncul sementara waktu yakni sekitar dua hari hinga dua minggu sejak kelahiran bayi beberapa penyusuain di perlukan oleh wanita dalam menghadapi atau aktivitas dan peran barunya menjadi seorang ibu pada minggu- minggu atau bulan-bualn pertama setelah melahirkan bayi dari segifisik maupun dari segi psikologis sebagian wanita berhasil menyusuaikan diri dengan baik dan sebagianya lagi tidak berhasil menyusuaikan diri dengan baik dan mengalami ganguan-ganguan psikologis salah satunya yang di sebut post partum blues.

Menurut pendapat penelitian status peritas juga dapat mempengaruhi terjadinya post partum blues status peritas responden penelitian ini sebagian besar ibu primipara sebanyak 15 orang (25.0%). Sebagiab besar ibu akan mengalami post partum blues karna baru pertama kalinya hamil dan melahirkan seorang bayi disamping itu fisik dan mental ibu juga belum siap hal yang dapat menyebabkan terjadinya post partum blues karna

kemungkinan adanya perbedaan pedapat dengan suami atau keluarga lainya gejala post partum blues juga muncul sebagai reaksi yang dipicu oleh situasi stress karna adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan atau pristiwa-peristiwa lain yang dinilai sebagai pontensial stress bagi seorang ibu setelah melahirkan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bina Malvia dkk (2015). Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa responden terbanyak penderita postpartum blues ialah ibu primipara remaja dengan riwayat persalinan seksio sesarea. Sementara itu, ibu primipara remaja dengan riwayat persalinan cunam hanya 1 orang responden yang mengalami postpartum blues. Riwayat persalinan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab sindrom postpartum blues. Dalam penelitian ini, hal yang menyebabkan terjadinya postpartum blues yang dikaitkan dengan faktor riwayat persalinan dikarenakan oleh ibu primipara remaja di wilayah kabupaten Bungo masih berusia belia dan berukuran tubuh kecil atau pendek sekitar 154 cm sehingga para ibu primipara remaja kebanyakan mempunyai kesulitan dalam proses persalinan dengan berbagai indikasi seperti luas panggul yang sempit atau persalinan yang macet, ketidakmampuan mengejan, serta usia bayi yang prematur. Ketidak mampuan mengejan, serta usia bayi yang prematur.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Susanti prasetya ningrum (2018). Dari hasil analisa penggunaan coping pada istri-istri, diketahui bahwa istri sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekat. Saat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

istri mampu memahami adanya perasaan tidak nyaman, kemudian mencari dukungan terutama lingkungan terdekat, bisa suami atau orang tua dan lain-lain. Dukungan sosial dari lingkungan terdekat dapat meningkatkan kepercayaan diri istri untuk mampu mereduksi gejalagejala yang mengarah pada postpartum blues.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lisna Anisa Fitriana dkk (2015). Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa kejadian postpartum blues pada ibu nifas di Rumah Sakit Umum TK IV Sariningsih Bandung bulan Mei 2015 menunjukkan bahwa hampir setengahnya mengalami postpartum blues ringan dan hampir setengahnya mengalami postpartum blues berat. Dan hampir setengahnya responden berusia 20-35 tahun, sebagian kecil berpendidikan SMA/SMK, sebagian kecil paritas multipara, hampir setengahnya jenis persalinan SC, hampir setengahnya mempunyai penghasilan perbulan 1.000.000-3.000.000, hampir setengahnya ibu yang tidak bekerja, sebagian kecil kehamilan yang tidak diinganakan dan hampir setengahnya mendapat dukungan sosial.

Pada langkah satu di dapatkan identifikasi data dasar dari beberapa hasil penelitian dimana di dapatkan bahwa salah satu tanda dan gejala post partum blues adalah di tandai dengan ada kecemasan, merasa kurang mampu untuk merawat bayinya, perasaan sedih, kesulitan tidur, adanya ketakutan menjadi tidak menarik lagi. Dan adapun beberapa faktor penyeba terjadinya post partum blues itu sendiri salah satunya seperti kurangnya dukuangan keluarga, umur >35 tahun dan <20 tahun, dukungan sosial,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

dukungan suami, peritas, riwayat seksio sesarea, kehamilan tidak di inginkan, pendidikan dan ekonomi.

2. Langkah II : Identifikasi Masalah Aktul

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bina Malvia dkk (2015). Postpartum blues yang dialami oleh ibu primipara remaja juga dikarenakan kurangnya peran tenaga kesehatan seperti bidan ataupun perawat dalam mengintervensi postpartum blues yang dialami ibu. Tidak ada intervensi lebih yang dilakukan oleh bidan maupun perawat di daerah penelitian dalam membantu ibu mengatasi postpartum blues yang dialami oleh ibu primipara remaja. Selain itu, postpartum blues juga terjadi pada ibu yang melahirkan anak pertama (primipara). Hal ini menunjukkan bahwa ibu dengan kelahiran anak pertama memberikan kontribusi terhadap postpartum blues, karena biasanya ibu yang melahirkan anak pertama mempunyai tekanan-tekanan kecemasan yang tinggi, labilitas perasaan, cemas, dan memiliki perasaan bersalah yang tinggi, dan ada ketakutan tersendiri jika bayi yang dilahirkan tidak selamat dan jika selamat takut tidak mampu memberikan perawatan yang baik, apalagi ketika melakukan persalinan kurang mendapatkan perhatian dan dukungan dari suami, karena dukungan suami akan berpengaruh terhadap psikologis ibu ketika melahirkan dan dapat mencegah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dian Irawati, Firida Yuliana (2014). Padap penelitian ini distribusi frekuansi pengaruh factor psikososial terhadap terjadinya post partum blues pada responden dapat dilihat variable

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya post partum blues adalah variable status kehamilan dan dukungan sosial dan semua ibu yang tidak menginginkan kehamilanya mengalami post partum blues dan di antaranya tidak mendapatkan dukungan suami, berpengetahuan kurang, pengaruh cara persalinan, umur, peritas dan pendidikan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Komang Lindayani ddk (2019). faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian gejala depresi post partum adalah jenis keluarga (p-value = 0,042) dan nutrisi bayi (p-value = 0,006). Kekuatan hubungan faktor risiko jenis keluarga (OR = 0,098) lebih besar dibandingkan dengan OR nutrisi bayi (OR = 0,046). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi ibu nifas yang kemungkinan mengalami depresi post partum adalah sebesar 25,4% sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kelompok responden dengan jenis keluarga inti mengalami gejala depresi post partum sebanyak 3,8 % sedangkan kelompok dari keluarga besar sebanyak 39%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang hidup dalam kondisi keluarga besar mengalami kecenderungan mengalami depresi post partum. Penelitian ini membuktikan bahwa jenis keluarga memiliki hubungan yang signifikan (p-value = 0,001) dengan kejadian depresi post partum dimana struktur keluarga yang besar memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami depresi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Nurhidayati ddk (2015). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa umur ibu post partum sebagian besar adalah umur 21-35 tahun. Hal ini berarti bahwa usia ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

adalah usia paling bagus untuk masa reproduksi. Faktor umur ibu saat kehamilan dan persalinan seringkali dikaitkan dengan kesiapan mental perempuan tersebut untuk menjadi seorang ibu. Usia ideal bagi seorang wanita untuk hamil dan melahirkan terutama kehamilan pertama adalah antara umur 20-30 tahun karena dalam periode kehidupan ini, resiko wanita menghadapi komplikasi medis ketika hamil dan melahirkan tergolong yang paling rendah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aries Dirgayunita (2016). Ada beberapa tanda dan gejala post partum blues seperti ganguan tidur, sulit tidur (insomnia) atau tidur berlebihan (hypersomnia), menurutnya tingkatan aktivitas, sulit makan atau makan berlebihan, gejala sakit fisik yang tidak hilang seperti sakit kepala, masalah pencernaan, sakit lambung,lelah, sulit berkonsentrasi, mengingat atau memutuskan. Dan adapun gejala psikologinya rasa cemas dan hampa secara terus menerus, rasa putus asa atau pesimis,rasa bersalah tidak bahagia, tidak berdaya, tidak berguna, tidak tenang dan gampang teringgung, berpikir ingin mati atau bunuh diri.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi Natalia Setiawati ddk (2020). Hasil pengamatan yang peneliti dapatkan bahwa problematika marital di wilayah puskesmas yang peneliti ambil mayoritas karena perceraian, kawin kontrak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peneliti mendapatkan informasi dari Sekdes setempat yang mengatakan bahwa tingginya angka perceraian dan kawin kontrak dikarenakan pendapatan suami di wilayah tersebut sangat rendah lebih banyak suami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

bekerja sebagai buruh harian lepas (kuli bangunan), sehingga pendapatan yang dihasilkan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, apalagi keluarga yang memiliki anak lebih dari dua Terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu, riwayat komplikasi, pekerjaan ibu, pendapatan suami, dukungan suami serta problematika marital dengan kejadian depresi postpartum pada ibu bersalin.

Pada penelitian yangdilakukan oleh Komang Prayoga Ariguna Dira dkk (2016). Penelitian ini menunjukkan prevalensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi depresi postpartum pada ibu melahirkan di kota Denpasar. Dari 44 ibu yang mengisi kuisoner EPDS 4 ibu (9,1%) ibu mendapatkan skor 10-12. Skor 10-12 berarti menunjukkan adanya gangguan gejala yang mungkin menimbulkan kegelisahan. Disarankan ulangi EPDS dalam waktu 2 minggu dan terus memantau kemajuan secara teratur. Sebanyak 9 ibu (20,5%) ibu mendapatkan skore ≥13. Skor ≥13 menunjukkan bahwa sudah mengalami depresi postpartum yang memerlukan penanganan yang tepat dan disarankan untuk merujuk ke psikiater. faktor sosiodemografi, faktor obsetri dan faktor marital. Faktor sosiodemografi meliputi: Umur ibu yang lebih dari 35 tahun, Ibu yang tingkat pendidikannya kurang dari lima dari lima tahun, ibu yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibu mertua, riwayat depresi, riwayat penyakit terdahulu dan riwayat keluarga. Faktor obsetri meliputi: kehamilan yang tidak diinginkan, kematian bayi saat melahirkan. Faktor marital meliputi: ibu yang tidak memiliki hubungan baik dengan suaminya, tidak mendapat dukungan dan bantuan dari suami,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

mendapat kekerasan dari suami, pasangan yang tidak bahagia, hubungan yang buruk dengan suami.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi restrain (2017). Proporsi ibu post partum berdasarkan peritas terdiri dari primipara dan multipara , tingkat pendidikan, proporsi ibu primipara berdasarkan tingkat depresinya terdiri dari 40 responden (46,5%. Terdapat 10 responden depresi ringgan, 6 responden depresi sedang, 3 respondnen depresi berat dan 21 responden tidak depresi sedangkan pada multi para dari 46 responden (53,49%). Sebanyak 8 responden mengalami depresi ringan, 7 responden depresi sedang, 4 responden depresi berat dan 27 responden tidak depresi.

Pada penelitian yang di laukan oleh Halimatus Saidah, SST., M.HKes Wilda Al aluf, S.Tr.Keb(2018). Kecemasan yang berlebihan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya post partum blues, dimana ibu akan mengalami kesulitan untuk istirahat dan tidur serta sering mengalami gejala gangguan fisik yaitu sakit kepala dan leher. Ibu merasa cemas karena ketidak mampuannya untuk merawat bayinya setelah beberapa hari pasca bersalin dan ketakutan menjadi tidak menarik lagi. Karena adanya kecemasan yang dialami oleh ibu post partum sehingga mengakibatkan terjadinya Post Partum Blues.

Pada langkah dua melakukan identifikasi masalah aktual atau masalah yang terjadi sekarang ini dimana didapatkan diagnosis masalah aktual dari data subjektif dan objektif pada langkah satu dilihat dari tanda dan gejala serta keluhan pasien itu sendiri. Dari hasil penelitian beberapa

peneliti salah satu tandan dan gejala serta faktor penyebterjadinya post partum di antaranya adalah, kurangnya peran tenaga kesehata, status kehamila, dukungan sosial, dukungan suami, umur, peritas, cara bersalin, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pendidkan ibu dan adapun tanda dan gejala post partum yang di dapatkan dari hasi penelitian. Cemas dan hampa, merasa putus asa atau pesimi dan kegelisahan.

3. Langkah III : Identifikasi Masalah Potensial

Pada penelitian yang di lakukan oleh Komang Prayoga Ariguna Dira dan Ayu Sriwahyuni (2016). Tentang prelenvensi dan factor resiko depresi post partum di dapatkan hasil sebagi berikut bahwa depress post partum blues bukan hanya berdampak besar pada ibu saja tetapi antara anak juga sulitnya interaksi antara ibu yang sedang mengalami depresi dengan anaknya meningkatkat kan ganguan tingkah laku dan ganguan kognitif anak bahkan dapat membahayakan anak oleh sebab itu alat skraning untuk diagnosis sangat penting. Dimana di dapatkan hasil dari penelitian ini faktor resiko yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah riwayat Pendidikan ibu yang rendah, primipara, umur, memiliki riwayat anak yang meningal dan kehamilan yang tidak di harapkan.

Menurut guasia et al, salah satu penyebab terjadinya depresi postpartum blues adalah kemiskinan, hubungan yang tidak bbaik dengan ibu mertu, melahirkan bayi dengan jenis kelamin perempuan, kehamilan yang tidak terencana, kerentanan terhadap gejala pisikiatri, bayi yang di rawat di rumah sakit, suami yang tidak berkerja, serta perselisihan serius

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

dengan salah satu angota keluarga. Survei di atas di lakukan di negara berkembang (india dan Pakistan) yang masih mempunyai adat istiadat yang kuat.

Pada peenelitian yang di lakukan oleh Martin Fairus dan Septi Widiyanti (20014). Hubungan dukungan suami dengan kejadian depresi post partum pada ibu nifas. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 4 variabel yang di duga berhubungan terdapat 2 variabel yang berhubungan dengan kejadian depresi post partum yaitu: peritas (p=0,010) dan Pendidikan (p=0,016) dengan peritas sebagai variable yang paling dominan (OR=3,228) berarti ibu nifas dengan peritas beresiko mempunyai peluang 3,228 kali untuk terjadinya depresi post partum, perbandingan ibu nifas dengan peritas yang tidak beresiko telah di kontrol oleh usia dan dukungan suami.

Depresi post partum blues adalah ganguan kejiwaan yang timbul beberapa hari atau pada minggu pertama setelah melahirkan yang di tandai dengan labilitas suasana hati, kesedihan dysphoria dan kebinggungan terhadap diri sendiri (Kaplan et al, 2007). Depresi post partum kejadianya senantiasa meningkat, hal ini karna priode kehamilan dan persalinan merupakan priode krisis perkembangan. (fraser 2009).

Pada penelitian yang di lakukan oleh Devi Ir maning Tyas, Atun Raodatul Ma'rifah dan Noor Yunida Triana (2015). Tentang perbedaan depresi pada ibu hamil dengan depresi pada ibu postpartum terhadap kesiapan menjadi ibu. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

responden yang tidak mengalami depresi sebanyak 29 responden (85,3%) di kernakan usia dan peritas ibu postpartum yang ideal dan serta dukungan sosial dari keluarga dan suami yang tinggi dan terpenuhi, serta adaptasi peran yang baik dengan bayi, responden yang paling sedikit mengalami depresi yaitu 5 responden (14,7%) di karnakan kurang adanya dukungan dari suami seperti suami kurang siaga pada saat proses persalinan atau kurang membantu dalam merawat bayi serta tidak keluarnya ASI setelah melahirkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh (urbayantum 2010) bahwa dukungan sosial dan emosianal dari keluarga maupun suami dapat menurunkan kecendrungan depresi post partum. Di temuka bahwa semakin tinggi dukungan sosial semakin rendah kecendrungan depresi postpartum. Terdapat perbedaan depresi pada ibu hamil dan ibu post partum terhadap kesiapan menjadi ibu pada sebagian ibu yang mengalami depresi ternyata juga mengalami ke tidak siapan atau tidak siap menghadapi peran menjadi seorang ibu.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Angriani (2014). Dimana adanya hubungan depresi dengan status gizi, hasil penelitian menunjukan bahwa depresi memiliki hubungan yang bermakna secara statistik dengan status gizi. Pada semua kategori depresi, responden sebagian besar memiliki satatus gizi yang mormal, yang presnentase terbesar yaitu sebesar 69,56%. Hal ini bias mengambarkan bahwa keadaan depresi yang di alami oleh subjek penelitian akan membuat subjek berprilaku makan lebih, sehingga status gizi juga semakin meningkat bahwa sampai obesitas. Tetapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

di sisi yang berbeda, subjek yang memiliki status gizi kurang dengan prevelensi sebesar 18,92% dimana hal ini menggambarkan bahwa depresi yang di alami subjek bias membuar subjek tidak mau makan sehingan memiliki asupan makan yang kurang.

Penelitian ini juga belum dapat mentukan faktor penyebab dan akibat secara jelas, karena variable-variabel dalam penelitian ini di ukur pada satu waktu yang hamper bersamaan, namun hasil penelitian ini secara logika menunjukan bahwa depresi merupakan salah satu factor resiko terjadinya status gizi lebih dan status gizi kurang (malnutris), dimana dua kondisi tersebut baik gizi lebih atau gizi kurang sama-sama memiliki dampak yang tidak baik terhadap kesehatan dan kualitas hidup.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Rizky Fauzi dan Endang faurianalisyawati (2016). Tentang hubungan antara depresi dengan kualitas hidup ibu pada hamil beresiko tinggi. Penelitian menunjukan adanya hubungan yang segnifikan dan bernilai negatife antara depresi dengan seluruh demensi kualitas hidup. Hubungan ini bersifat negatif dengan artian semakin tinggi skor depresi subjek, maka semakin rendah presepsi subjek terhadap kualitas hidup. Hasil penelitian menunjukan bahwa sekor total depresi denga sekor setiap dimensi dari kulitas hidup WHOQOL-BREF. Depresi memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan dimensi kesehatan fisik kualitas hidup sebesar r=-0,614 (p=0,01). Hal ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara depresi dengan kualitas hidup, semakin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

tinggi tngkat depresi individu maka akan semakin rendah presepsi individu terhadap kualitas hidup.

Depresi merupakan salah satu di antara bentuk ganguan keseimbangan mood (suasana perasaan). Mood adalah kondisi perasaan yang terus ada yang mewarnai kehidupan pisikologis individu. Perasaan sedih atau depresi bukanlah suatu hal yang abnormal dalam konteks pristiwa atau situwasi yang penuh tekanan, namun ada orang dengan gangguan mood yang luar biasa parah atu berlangsung lama akan menganggu kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal (samiun, 2006).

Pada penelitian yang di lakukan oleh Rosa Imani Khan (2012). Tentan prilaku asertif, harga diri dan kecendrungan depresi dimana hal ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya depresi atau kemungkinan masalah potensial pada kasus post partum blues. Hasil penelitian secara umum telah membahas bahwa seluruh hipotensi yang telah di rumuskan dalam penelitian ini di terima atau terbukti kebenaranya, hipotensi pertama dalam penelitian ini adalah korelasi negative antara prilaku asertif dengan tingkat kecendrungan depresi.

Depresi ibarat ibarat penyakit jangtung coroner dimana salah satu penyebab umumnya penyumbatan saluran darah ke jantung itu sendiri. Ketidak mampuan mengutarakan isi hati secara asertif dapat menimbulkan penumbatan emosional dalam batin individu. Kalua ini terjadi rerus menerus dan dalam kurung waktu yang berkepanjangan, maka rasa kater-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

tekan (starssed) pun makin memumpuk, bebab kemampuan yang menumpuk akan menyumbat kemampuan untuk menjalankan fungsi sehari-hari dengan lapang dan segar. Apabila kondisi tersebut berlangsung terus menerus, maka akan membuka pintu terhadap depresi. Individu tidak lagi merasa bergairah mengahadapi hidup dan akhrinya perasaan hambar mewarnai pandangan hidupnya, individu kemudian mulai membatasi pergaulan dengan orang lain dan kehilang semangat memenuhi tanggung jawab sehari-hari.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Eko Radityo (2020). Depresi dengan gangguan tidur, depresi adalah gangguan mood yang di karakteristikan dangan kesedihan yang intens, berlangsung dalam waktu lama, dan menggangu kehidupan normal. Orang depresi menjadi pesimis dan putus asa merasa sia-sia dan sering di iringi dengan persaan tentang hilangnya kesenangan. Depresi dapat terjadi pada keadaan normal sebagai bagian dalam perjalanan peroses kematangan dari emosi sehingga definisi depresi adalah sebagai berikut: pada keadaan normal merupakan gangguan kemurungan (kesedihan patah semangat) yang di tandai dengan perasaan yang tidak pas, menurunya kegiatan, dan pesimisme menghadapi masalah yang akan datang. Pada kasus patologis merupakan ketikamauan ekxstrim untuk bereaksi terhapa rangsangan di sertai menurunya nilai diri, delusi ketik puasan, tidak mampu dan putus asa.

Ganguan tidur dapat disebabkan oleh banyak hal atau bersifat holostik. Hal yang mempengaruhinya adalah biopisikososial yaitu dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

factor genetic, psikologis, dan lingkungan, sehingga bisa dikatakan penyebabnya sangat kompleks dan memerlukan invetigasi yang cermat. Etiolog deprei yang dihubungkan dengan gangguan tidur adalah terganggunya neurotrasmiter seriotonin. Serotoninergik berproyeksi dari nucleus rafe dorsalin batak otak ke korteks serebri, hipotalamis, ganglia basalis, septum dan hopokampus. Proyeksi dari tempat-tempat ini mendasari keterlibatanya pada gangguan pisikiatrik. Ada 14 responden serotonin namun satu trimester saja dapat memberikan efek keseluruh otak.

Pada langkah tiga melakukan identifikasi masalah potensial atau kemungkinan masalah yang akan terjadi. Pada kasus post partum blues ini kemungkinan masalah yang akan terjadi pada ibu dengan post partum blues adalalah depresi post partum. Depresi merupakan salah satu bentuk ganguan keseimbangan mood (suasana perasaan). Mood adalah kondisi perasaan yang terus ada yang mewarnai kehidupan psikologis individu. Dimana tanda dan gejala post depresi post partum seperti kesedihan yang intes berlangsung dalam waktu lama, merasa putus asa, pesimis, adanya ganguan tidur, merasa tidak berdaya, tidak berguna, tidak tenang dan gampang tersinggung dan adanya keinginan untuk bunuh diri. Dan yang menjadi faktor penyebabnya riwayat pendidikan, umur, memeliki riwayat anak yang meningeal, kurangnya dukungan suami, sosial dan kehamilan yang di harapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

4. Langkah IV : Tindakan Segera dan Kolaborasi

Pada penelitian yang di lakukan oleh Immawanti (2015). Tentang pengunaan mommoodbooster sebagai intervensi pada ibu depresi post partum. Dimana mommoodbooster ini bisa di jadikan penanganan awal untuk mencegah terdajadinya post partum blues atau depresi post partum blues. Di mana di dapatkan hasil dalam penelitian ini adalah. Depresi postpartum merupakan gangguan mood setelah melahirkan yang merefleksikan disregulasi psikologikal yang merupakan tanda dari gejala-gejala depresi major. Mood yang tertekan, hilangnya ketertarikan atau kesenangan dalam beraktivitas, gangguan nafsu makan, gangguan tidur, agitasi fisik atau pelambatan psikomotor, lemah, merasa tidak berguna, susah konsentrasi, keinginan untuk bunuh diri. Untuk menegakkan diagnosis tersebut selain dari riwayat serta penampakan gejala juga dapat ditunjang melalui test *Edinburgh Postnatal Depression Scele* (EPDS).

Pada penelitian yang di lakukan oleh Yustisia Imaninditya P dan Murwati (2013). Tentang peneangan post partum blues dengan caran mengunakan studi diskriptif tingkat depresi postpartum pad ibu nifas. Pengambilan data dilaksanakan dengan melakukan kunjungan rumah dengan memberikan kuesioner EPDS dan ISEL, tujuan dari kunjungan rumah itu sendiri selain dari pengambilan sampel juga untuk meberikan dukungan sosial, yang di mana di dapatkan hasil dari penelitian ini adalah Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar (63,3%) berada dalam keadaan normal atau tidak depresi, sebanyak 30% ibu nifas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

mengalami depresi ringan dan sebanyak 6,7% depresi sedang dialami ibu nifas di wilayah tersebut. Tingkat depresi postpartum berdasarkan karakteristik umur yaitu usia 24-29 sebanyak 14 responden (46.7%), paritas multipara sebanyak 20 responden (66.7%), pendidikan yaitu pendidikan menengah sebanyak 19 responden (63.3%), riwayat persalinan yaitu responden yang bersalin dengan bantuan alat 4 orang (13.3%) dan SC sebanyak 2 orang (6.7%) dan berdasar dukungan sosial yaitu responden yang mendapat dukungan sosial cukup 6 orang (20%) dan rendah berjumlah 2 orang (6.7%).

Pada penelitian yang di lakukan oleh Awaludin Jahid Abdilah dan Septiyani Eka Putri (2016). Pengaruh psikoedukasi terhadap depresi post partum pada ibu primipara. Berdasarkan hasil penelitian hampir sebagian besar responden (ibu postpartum) primipara mengalami depresi setelah melahirkan dari tingkat ringan hingga tingkat berat) hal ini dimungkinkan karena setelah melahirkan ada beberapa fase perubahan yang akan dialami ibu postpartum primipara fase tersebut diantaranya: Periode Taking In, Periode Taking Hold, Periode Letting Go. Sehingga pada masa setelah post partum primipara tidak semua ibu dapat menerima keadaan yang dialaminya sekarang sehingga dari hasil penelitian sebelum dilakukan psikoedukasi dapat disimpulkan bahwa 79,2% ibu post partum primipara mengalami depresi. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sulistyawati A bahwasanya pada masa postpartum primipara ibu akan mengalami fase mandiri. Pada fase ini tidak semua ibu Postpartum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

primipara mampu beradaptasi secara psikologis sehingga muncul gangguan mood yang berkepanjangan ditandai dengan adanya perasaan sedih, murung, cemas, panik, mudah marah, kelelahan, disertai gejala depresi seperti gangguan tidur dan selera makan, sulit berkonsentrasi, perasan tidak berharga, menyalahkan diri dan tidak mempunyai harapan untuk masa depan. Hal ini yang membuat sebagian besar ibu Post partum primipara mengalami depresi karena pada masa/fase ini ibu postpartum primipara belum mampu beradaptasi secara psikologis terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya baik perubahan secara fisik maupun perubahan secara psikis (perubahan peran menjadi seorang ibu).

Pada penelitian yang di lakukan oleh Aries Dirgayunita (2016). Tentang penanganan depresi. Depresi dapat ditangani dengan perubahan pola hidup, terapi psikologi, dan dengan pengobatan (obat antiretroviral/ARV). Dilarang keras mengobati diri sendiri dengan alkhohol, merokok yang berlebihan dan narkoba, karena zat yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan gejala depresi dan menimbulkan masalah lain. Berikut beberapa cara penanganan depresi dengan cara olah raga, mengatur pola makan, berdo'a, memilih keberanian untuk berubah, rekrasi. Dan adapun terapi psikolok yang di berikan Terapi interpersonal bantuan psikoterapi bisa dilakukan oleh psikolog dalam jangka pendek yang berfokus kepada hubungan antara orang-orang dengan perkembangan symptom gangguan kejiwaan, Konseling kelompok dan dukungan social. Mengunjungi tempat layanan bimbingan konseling.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Pelaksaan wawancara konseling yang dilakukan antara seorang konselor professional dengan beberapa pasien sekaligus dalam kelompok kecil, Terapi humor Profesional medis yang membantu pasien untuk mempertahankan sikap mental yang positif dan berbagai tawa merespons psikologis dari tertawa termasuk meningkatkan pernafasan, sirkulasi, sekresi hormone, enzim pencernaan, dan peningkatan tekanan darah, Terapi Kognitif (CBT) Pendekatan CBT memusatkan perhatian pada proses berpikir klien yang berhubungan dengan kesulitan emosional dan psikologi klien. Pendekatan ini akan berupaya membantu klien mengubah pikiran-pikiran atau pernyataan diri negatif dan keyakinan-keyakinan pasien yang tidak rasional. Fokus dalam teori ini adalah mengganti cara-cara berfikir yang tidak logis menjadi logis.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Kristina Maharani, Choirul Anwar dan Agus Suwandono (2019). Tentang kombinasi herbal steam beat dan massage terapi pada ibu nifas dalam mencegah postpartum blues. Pada proses herbal steam bath, jenis bahan tumbuhan yang digunakan pada ramuan seperti serai wangi dan daun jeruk perut bahan tersebut mengandung bahan senyawa bioaktif terutama minyak atsiri, alkoid. Minyak atsiri meupakan senyawa bioaktif yang terdapat yang terdapat hampir diseluruh bagian tumbuhan diatas daun, batang, buah, biji dan rimpang yang berfunsi sebagai aromaterapi dengan efek menenangkan dan menyegarkan untuk kesehatan, sehingga dapat bermanfaat untuk memulihkan kesehatan ibu nifas dengan postpartum blues.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Menurut Watuseke dalam Zumsteg, Weekerle (2007) mandi uap tradisional dengan menggunakan tanaman herbal atau obat obatan untuk perawatan ibu setelah melahirkan atau ibu pada masa nifas. Pada proses herbal steam bath bertujuan untuk penyembuhan setelah melahirkan atau masa nifas untu mengembalikan kondisi fisik dan psikis ibu seperti sebelum hamil dan melahirkan. Dalam penelitian Sinuhaji (2014) melalui proses oukup/sauna ibu dipaksa berkeringat, yang dimana keringat mempunyai manfaat bagi ibu nifas yaitu keringat membuat suhu tubuh tetap dingin, dapat membersihkan racun dari tubuh, dapat mempercantik kulit, memperlancar sirkulasi darah, menurunkan stress.

Dalam herbal steam bath ini menggunakan rempah-rempah yang mengandung minyak atsiri didalamnya. Minyak atsiri merupakan senyawa bioaktif yang terdapat hampir diseluruh bagian tumbuhan di atas daun, batang, buah biji dan rimpang yang berfungsi sebagai aromaterapi dengan efek menenangkan dan menyegarkan untuk kesehatan dan kegunaan lain. Sedangkan untuk massage terapi back efflurage bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah, memberi tekanan, menghangatkan otot abdomen dan meningkatkan relaksasi fisik dan mental.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Ni Nyoman Ari Indra Dewi dan Dermawan Waruwu (2018). Tentang Pengaruh Cognitive Behavior Therapy Terhadap Postpartum Depression Dari hasil analisis data yang dilakukan ditemukan bahwa hipotesa yang diajukan tersebut dapat diterima hal ini dibuktikan dari beberapa hal adanya perbedaan depresi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

signifikan sebelum dan sesudah pemberian perlakuan dengan Cognitive Behavior Therapy pada wanita pasca melahirkan selama enam sesi. Pada nilai mean (ratarata) sebelum pemberian Cognitive Behavior Therapy didapatkan nilai 22, 26 dan sesudah pemberian Cognitive Behavior Therapy menurun menjadi 12,40. Ini menandakan wanita pasca melahirkan mengalami penurunan tingkat depresi akibat perlakuan Cognitive Behavior Therapy Sehingga hipotesis diterima atau terbukti.

Pada penlitiann yang di lakukan oleh Nevy Norma Renityas, Ika Agustina (2020). Tentang Progressive muscle relaxation untuk membantu menurunkan kecemasan pada ibu menyusui selama post partum dimana hal ini bisa di jadikan penangan untuk kasus post partum blues itu sendiri. Terapi Relaksasi Otot Progresif merupakan gerakan dan latihan pernapasan dengan tehnik bernafas secara perlahan dan dalam menggunakan otot pernafasan, sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh, menahan inspirasi secara maksimal dan kemudian menghembuskan nafas secara perlahan Secara umum tujuan relaksasi adalah untuk mengurangi tingkat kecemasan dalam hal fisiologis individu dan membawa individu ke keadaan yang lebih tenang baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu gangguan psikologis yang dialami ibu postpartum adalah kecemasan.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Irma Fidora, Elsi Dwi Hapsari dan Ibrahim Rahmat (2018). Dimana salah satu penenganan awal yang bisa di berikan pada kasus post partum blues adalah dengan pemberian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

pendidikan kesehatan individu terhadap perubahan maternal depressive symptoms pada ibu post partum. Model konsep diri sebagai salah satu konsep adaptasi berpusat pada aspek psikologis. Ibu postpartum mengalami perubahan tidak hanya fisik namun juga psikologis yang akan sangat mempengaruhi kehidupannya. Proses ini penting dan harus mendapatkan perhatian khusus. Fungsi peran berfokus pada bagaimana seseorang menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Ibu postpartum memiliki peran baru terhadap lingkungannya yaitu bayi yang baru dilahirkan. Peran ibu mencakup banyak hal diantaranya mengawasi kebutuhan fisik bayi, memenuhi kebutuhan bonding kepada bayi seperti memegang dan memeluk. Pada ibu yang bisa beradaptasi dengan baik dan tidak mengalami maternal depressive symptoms, pemenuhan peranan akan berfungsi baik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Annur Hikmah Basri, Andi Zulkifli dan M.Tahir Abdullah (2014). Dimana adanya pengaruh psiko edukasi untuk mencega terjadinya depresi yang di dapatkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang bermakna baik pada kelompok intervensi psikoedukasi, intervensi booklet, maupun kelompok kontrol. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian psikoedukasi dapat menurunkan tingkat depresi sehingga dapat diberikan kepada ibu yang mengalami depresi dan tidak suka meminum obat anti-depresan.

Metode psikoedukasi berupa penjelasan singkat dan pembagian booklet dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih cepat dan jelas kepada responden karena ada interaksi langsung dan diskusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Selain itu, responden dapat mempelajarinya kembali dengan membaca booklet yang telah dibagikan apabila ada yang terlupakan atau kurang jelas. Penjelasan tentang efek buruk dari depresi postpartum, mengundang perhatian ibu untuk berusaha mencegah resiko tersebut. Efek buruk depresi terhadap ibu, bayi, suami dan anggota keluarga lainnya dianggap sebagai ancaman kesehatan, sehingga mendorong motivasi responden dan pasangannya untuk berusaha mencegah terjadinya depresi postpartum.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nengah Runiari, Nyoman Hartati dan Wayan Candra (2013). Tentang adanya kaitan hipnoterapi dalam pencegahan depresi post partum. Hipnoterapi merupakan salah satu program yang dapat diberikan pada ibu dalam menghadapi perubahan peran dalam hidupnya, sehingga ibu menjadi terlatih dan mampu mengontrol emosinya serta dapat menjaga ibu agar selalu sehat. Pada pre tes kelompok perlakuan ditemukan sebanyak 9 orang (75%) ibu primipara kecenderungan tidak mengalami depresi dan pada post tes sebanyak 10 orang (83.3%). Pada pre tes kelompok kontrol didapatkan hasil mayoritas ibu postpartum kecenderungan tidak mengalami depresi yaitu sebanyak 7 orang (58%). Pada post tes mayoritas ibu primipara mengalami kecenderungan depresi yaitu sebanyak 10 orang (83.3%). Berdasarkan hasil uji square p= 0.015 (< 0.05), artinya ada pengaruh hipnoterapi terhadap kecenderungan depresi postpartum pada ibu primipara.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Tyas Febriani (2017). Tentang meningkatkan kebutuhan aktivitas dan latihan pada ibu post partum.

Adapun tindakan yang di lakukan untuk mengatasi kasus ini di antaranya adalah teknik relaksasi nafas dalam. Menganjurkan pasien untuk menarik napas dalam sehingga paru-paru terisi penuh, menghembuskan napas secara perlahan, serta melemaskan otot-otot tangan, kaki, perut dan punggung. Ulangi hal ini beberapa kali sampai tubuh terasa nyaman, tenang, dan rileks (Saputra, 2013). Setelah dilakukan tindakan tersebut nyeri pasien dapat berkurang sehingga pasien berani untuk bergerak. Menurut penelitian Widiatic (2015) penurunan intensitas nyeri bisa disebabkan karena pasien telah fokus pada pelaksanaan relaksasi nafas dalam sehingga dapat meningkatkan suplai oksigen kedalam sel tubuh yang akhirnya dapat mengurangi stress dan menurunkan intensitas nyeri.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah (2016). Dimana penelitian ini melakukan penelitian tentang terapi mendengarkan al-qur'an untuk mencegah terjadinya post partum blues. Peran terapi mendengarkan Al Qur'an disini yaitu menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin secara alami, meningkatkan perasaan rileks, mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang. Selain itu, saat mendengarkan Al Qur'an tekanan darah akan menurun, detak jantung, denyut nadi, aktivitas gelombang otak bahkan pernafasan menjadi lebih lambat dan dalam sehingga dapat menimbulkan ketenangan dan pemikiran yang lebih baik lagi. Hal ini sejalan dengan penelitian Ardiansyah (2014) ada pengaruh yang signifikan pemberian terapi murotal terhadap penurunan tingkat stres. Dan di dapatkan juga hasil dalam penelitian ini ada perubahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

yang sangat siknifikan sebelum dan sesudah memberikaterapi mendengarkan al-qur'an.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Meilani Indriyanti (2014). Tentang pengaruh bina keluarga mandiri terhadap kemandirian keluar untuk mencegah terjadinya post partum blues. Hasil penelitian bahwa sebanyak 8 (53,3%) keluarga pada kelompok eksperimen berada pada kategori keluarga mandiri tingkat III dan tidak ada yang berada pada kategori keluarga mandiri tingkat I. Artinya tingkat kemandirian keluarga dalam pencegahan terjadinya postpartum blues pada kelompok eksperimen dinilai sudah cukup baik. Kemandirian keluarga tingkat III ditandai dengan keluarga yang dapat menerima pelayanan dengan baik, dapat mengungkapkan masalah terkait pencegahan postpartum blues, melakukan tindakan pencegahan postpartum blues dan mengunjungi fasilitas kesehatan terkait postpartum blues.

Didapatkan dari hasil penelitian di atas dimana tindakan segera dan kolaborasi yang bisa di lakukan oleh tenaga kesehatan. Di antaranya seperti pengunaan mommboodbooster, pemberian psikoedukasi, pemberian herbal steam bath, memberikan pendidikan kesehatan pada ibu, terapi mucle relaxation, hipnoterapi, teknik relaksasi napas dalam, terapi mendengarkan al-kuraan serta melakukan pembinaan keluarga mandiri dan pemberian antiretroviral/ARV oleh dokter psikiater jika ada masalah atau komplikasi seperti terjadinya depress post partum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

5. Langkah V : Perencanaan

Pada penelitian yang di lakukan oleh Immawanti (2015). Dimana intervensi untuk asuhan atau rencana asuhan yang akan di berikan pada kasus post partum blues ini adalah dengan mengunakan intervensi pengunaan mommoodster dimana mommoodster ini. Penggunaan internet berbasis Web sebagai media untuk promosi kesehatan dapat meningkatkan kesadaran dan kehadiran ibu dalam melakukan pemeriksaan dan perawatan secara rutin selama periode postnatal. Solusi internet berbasis web dapat berkontribusi untuk menyelamatkan kehidupan perempuan dan bayinya serta pencapaian Millennium Development Goals 4 dan 5. Selain itu, juga harus dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan kesehatan ibu dan anak di negara berkembang untuk membuat kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi pelayanan kesehatan melalui penggunaan internet. Penelitian di Autsralia (2014), mengeksplorasi kelayakan program pengobatan depresi secara online menilai bahwa kesehatan mental pemuda dengan memanfaatkan intervensi berbasis internet.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Pada penelitian yang di lakukan oleh Yustisia Imaninditya P dan Murwati (2013). Dimana intervensi yang bisa di lakukan pada kasu post partum blues yaitu dengan mengunakan studi diskriptif dimana yang pengambilan datanya dilakukan dengan melakukan kunjungan rumah untuk melihat evektivitas dari asuhan yang di berikan. Tingkat depresi postpartum berdasarkan karakteristik umur yaitu usia 24-29 sebanyak 14 responden (46.7%), paritas multipara sebanyak 20 responden (66.7%), pendidikan

yaitu pendidikan menengah sebanyak 19 responden (63.3%), riwayat persalinan yaitu responden yang bersalin dengan bantuan alat 4 orang (13.3%) dan SC sebanyak 2 orang (6.7%) dan berdasar dukungan sosial yaitu responden yang mendapat dukungan sosial cukup 6 orang (20%) dan rendah berjumlah 2 orang (6.7%). dimana dalam penelitian ini perlunya peningkatan dalam memberikan komunikasi dan edukasi (KIE) tentang depresi postpartum kepada para ibu nifas, Untuk ibu nifas agar mempertahankan kondisi kesehatannya dan lebih membuka diri terhadap orang lain dan selalu menganggap semua permasalahan yang ada sebagai proses yang harus dilalui dalam kehidupan.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Awaludin Jahid Abdilah dan Septiyani Eka Putri (2016). Dimana adanya pengaruh psikoedukasi terhadap depresi berdasarkan hasil penelitian yang dapat di gambarkan bahwa adanya perubahan tingkat depresi yang di alami ibu postpartum setelah di berikan psikoedukasi hal ini dapat di buktikan pada data univariat bahwa ibu dengan depresi ringan sebelum di berikan psikoedukasi berjumlah 12 orang dan setelah di berikan berjumlah 10 orang. Hal ini sesuai dengan pendapat Matteson (2000), dukungan sosial, (social support) didefinisikan sebagai informasi verbal atau non verbal, saran, bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang yang akrab dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah laku penerimanya. Orang yang merasa mendapat dukungan sosial,

secara emosional merasa lega karena diperhatikan, mendapat saran atau kesan yang menyenangkan pada dirinya. Psikoedukasi yang diberikan pada penelitian ini menunjukan hasil bermakna dibandingkan tidak diberi Psikoedukasi. Ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan untuk merubah perilaku ibu postpartum dalam menghadapi depresi. Analisa bivariat adalah analisa untuk melihat hasil antara tingkat depresi post partum primipara sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluan kesehatan, dengan menggunakan uji paired t test yang dilakukan untuk melihat perbedaan hasil.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Munaaya Fitriyya danYuliana (2017). Tentang rencana kajian yang harus di lakukan untuk menangani post partum blues dimana intervensi yang di lakukan ajarkan ibu dan keluarga cara perawatan bayi sehari-hari, anjurkan ibu untuk menceritakan segala permasalahan atau hal lain yang ingin di ungkapkan, anjurkan ibu makan untuk menambah nafsu makan, anjurkan suami, keluarga, teman-teman, sesama ibu untuk memberikan dukungan pada ibu, anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, anjurkan ibu untuk berolahraga ringan, anjurkan ibu untuk berkumpul dengan kelompok ibu-ibu baru, aanjurkan suami dan keluarga untuk lebih memperhatikan ibu.

Penanganan post partum blues adalah komunikasikan segala permasalahan atau hal lain yang ingin diungkapkan, bicarakan rasa cemas yang dialami, bersikap tulus ikhlas dalam menerima aktifitas dan peran baru setelah melahirkan, bersikap fleksibel dan tidak terlalu perfeksionis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

dalam mengurus bayi atau rumah tangga, belajar tenang dengan menarik nafas panjang dan meditasi, kebutuhan istirahat harus cukup, tidurlah ketika bayi tidur, berolahraga ringan, bergabung dengan kelompok ibu-ibu baru, dukungan tenaga kesehatan, dukungan suami, keluarga, teman, teman sesama ibu, konsultasikan pada dokter atau orang yang professional, agar dapat meminimalisasikan faktor resiko lainya dan membantu melakukan pengawasan bisa juga dengan cara memberikan dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, terapi psikologis dari psikiater dan psikolog, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian anti depresan, pasien dengan percobaan bunuh diri sebaiknya tidak ditinggal sendirian dirumah, jika diperlukan lakukan perawatan dirumah sakit, tidak dianjurkan rooming in/rawat gabung dengan bayinya (Suherni, 2009; h. 99).

Pada penelitian yang di lakukan oleh Kristina Maharani, Choirul Anwar dan Agus Suwandono (2019). Dimana kombinasi herbal di jadikan intervensi untuk kasus post partum blues. Pada proses herbal steam bath, jenis bahan tumbuhan yang digunakan pada ramuan seperti serai wangi dan daun jeruk perut bahan tersebut mengandung bahan senyawa bioaktif terutama minyak atsiri, alkoid. Minyak atsiri meupakan senyawa bioaktif yang terdapat yang terdapat hampir diseluruh bagian tumbuhan diatas daun, batang, buah, biji dan rimpang yang berfunsi sebagai aromaterapi dengan efek menenangkan dan menyegarkan untuk kesehatan, sehingga dapat bermanfaat untuk memulihkan kesehatan ibu nifas dengan postpartum blues.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Pada penelitian yang di lakukan oleh. Bina Melvia Girsang, Miranda Novalina dan Jaji (2015). Dimana adanya pengaruh psikoedukasi terhadap post partum blues sehinga hal ini bisa di jadikan sebagai intervensi atau rencana asuhan yang akan di berikan pada kasus post partum blues. Psikoedukasi yang efektif dengan follow up setiap hari sangat penting untuk melihat perkembangan ibu dalam mengatasi postpartum blues yang dialami sehingga penurunan tingkat postpartum blues ibu benar-benar dari intervensi psikoedukasi yang dilakukan peneliti dan bukan dari faktor lingkungan sekitar untuk melihat keefektifan psikoedukasi.

Selain psikoedukasi, ada beberapa alternatif intervensi lain yang dapat dilakukan dalam menurunkan tingkat postpartum blues, diantaranya adalah dukungan sosial pada ibu dalam melakukan bounding attachment atau skin to skin contact antara ibu dan bayi pasca persalinan. Para ibu yang melakukan kontak kulit 6 jam setiap hari selama 1 minggu dapat menjadi salah satu alternatif dalam menurunkan postpartum blues tanpa obat (Bigelow, 2012).

Hasil penelitian sejalan dengan pendapat Mottaghipour (2005), bahwa pemberian psikoedukasi bagi klien postpartum dengan mengemas materi edukasi tentang cara pencegahan stress pascapersalinan dalam bentuk poster, leaflet, booklet, flipchart dan video berisi hal-hal yang menyebabkan setelah melahirkan rentan terhadap stress pasca persalian yang diterapkan membuktikan bahwa terjadi penurunan angka postaprtum blues maupun depresi postpartum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Pada penelitiaan yang di lakukan Oleh Ni Nyoman Ari Indra Dewi Dan Dermawan Waruwu (2018). Cognitive Behavior Therapy berpengaruh terhadap penurunan depresi pasca melahirkan dan dari hasil analisa data bahwa adanya perbedaan depresi yang signivikan sebelum dan sesudah pemberian perlakuan dengan Cognitive Behavior Therapy ($p = 0,034 < 0,05$; $z = -2,121$), pada wanita pasca melahirkan selama enam sesi. Pada nilai mean (ratarata) sebelum pemberian Cognitive Behavior Therapy didapatkan nilai 22, 26 dan sesudah pemberian Cognitive Behavior Therapy menurun menjadi 12,40. Ini menandakan wanita pasca melahirkan mengalami penurunan tingkat depresi akibat perlakuan Cognitive Behavior Therapy. Sehingga hipotesis diterima atau terbukti.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Irma Fidora, Elsi Dwi Hapsari dan Ibrahim Rahmat (2018). Dimana intervensi yang di lakukan yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan individu Pemberian pendidikan kesehatan mengenai maternal depressive symptoms memperkenalkan ibu pada kondisi yang mungkin dialaminya setelah melewati masa persalinan. Pendidikan kesehatan ini juga membantu ibu menemukan alternatif pemecahan masalah jika timbul gejala depresif yang dapat dirasakan sendiri oleh ibu melalui aktifitas fisik berupa senam nifas dan relaksasi seperti terdapat dalam buku panduan yang diberikan.

Pentingnya pendidikan kesehatan terhadap ibu postpartum didukung oleh beberapa penelitian diantaranya Nazara tahun 2006 yang mendapatkan hasil penelitian bahwa intervensi dengan pemberian pendidikan kesehatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

berupa psikoedukasi efektif mencegah kejadian depresi postpartum. Penelitian Soep tahun 2009 juga memperoleh hasil yang sama dimana pemberian psikoedukasi terhadap ibu postpartum menurunkan skor depresi secara bermakna. Intervensi berupa pendidikan kesehatan ini merupakan asuhan keperawatan mandiri yang bisa diprogramkan dalam lingkup keperawatan maternitas untuk meningkatkan kesejahteraan baik ibu maupun bayi baru lahir.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Dwi Winarni dkk (2017). Dimana adanya efektifitas pemberiaan komunikasi informasi edukasi terhadap kejadian post partum blues dan intervensi yang di berikan adalah berupa persiapan kehamilan dan kehamilan. Postpartum blues merupakan kesedihan atau kemurungan setelah melahirkan, biasanya hanya muncul sementara waktu yakni 2 hari hingga 2 minggu sejak kelahiran bayi dan dikategorikan sindrom gangguan mental ringan. Dari penelitian yang dilakukan se Kenwa (2015), didapatkan hasil bahwa pemberian konseling merupakan salah satu intervensi yang dapat diberikan pada ibu, yaitu dengan membantu memecahkan masalah yang dialami saat itu.

Dukungan dari tenaga kesehatan sangat diperlukan terutama pada masa keha-milan untuk mencegah terjadinya postpartum blues misal dengan cara memberikan informasi yang memadai atau adekuat tentang proses kehamilan dan persalinan serta penyulit-penyulit yang mungkin timbul pada masa tersebut dan penanganannya (Chilmiyah,2015). Girsang,B.M.(2013) yang menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan ibu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

tentang postpartum blues, tidak ada orang ataupun keluarga yang memberitahu atau membantu ibu dalam perawatan bayi dengan baik dan benar sehingga semua hal yang berkaitan dengan bayi harus dilakukan sendiri. Hal senada juga dilakukan Ratnawati (2009) membuktikan bahwa dukungan sosial suami pada kejadian postpartum blues yang disajikan dalam bentuk distribusi usia, paritas, jenis persalinan, kondisi bayi, lama rawat inap, kejadian post-partum blues dan dukungan suami.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Difa Ardiyanti dan Siti Muthia Dinni (2018). Dimana penelitian ini melakukan model rach untuk mendeteksi dini post partum depressesion Pemodelan Rasch dipilih karena dianggap lebih mampu mengembalikan data sesuai kondisi alamiahnya dibandingkan teori tes klasik karena data skor mentah dikonversi dulu ke dalam bentuk odds ratio dan selanjutnya dilakukan transformasi logaritma menjadi unit logit sebagai manisfestasi probabilitas responden dalam merespons suatu aitem. Melalui pemodelan Rasch, suatu respon yang bersifat ordinal dapat ditransformasikan ke dalam bentuk rasio yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dengan mengacu pada prinsip probabilitas. Pemodelan Rasch juga mampu melakukan prediksi terhadap data hilang (missing data), yang didasarkan pada pola respon yang sistematis. Hal ini jelas menjadikan hasil analisis statistik yang lebih akurat dan mampu menghasilkan nilai pengukuran standar eror untuk instrumen yang digunakan yang dapat meningkatkan ketepatan perhitungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Pada penelitian yang di lakukan oleh Ade eka sari widayanti (2017). Dimana rencana asuhan dengan memberikan massage terapi dengan memberikan teknik effleurage sebagai penccegahan depresi post partum Massage terapi sebenarnya telah dipraktekkan secara luas di dunia termasuk Indonesia. Seni pijat diajarkan secara turun-temurun walaupun pada awalnya tidak diketahui secara jelas bagaimana pijat dan sentuhan dapat berpengaruh demikian positif pada tubuh manusia (Roesli, 2007). Hasil uji wilcoxon yang dilakukan oleh Murwati dan Henik Istiqomah (2015) diperoleh nilai significancy 0.001, hal ini berarti "Ada perbedaan skor depresi postpartum yang bermakna antara sebelum dan sesudah dilakukan massage teraphy". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh massage terapi 2 kali seminggu dengan durasi 30 menit terhadap depresi postpartum.

Efek lain dari terapi pijat adalah berkurangnya tingkat stres terbukti dengan berkurangnya hormon stres (kortisol, adrenalin dan nonadrenalin), membuat tidur lebih lelap (Rosalina, 2007). Masase dalam hal ini merupakan manipulasi dari struktur jaringan lunak yang dapat menenangkan serta mengurangi stress psikologis dengan meningkatkan hormone morphin endogen seperti endorphin, enkefalin dan dinorfin sekaligus menurunkan kadar stress hormon seperti hormon cortisol, norepinephrine dan dopamine (Best, dkk., 2008).

Pada penelitian yang di lakukan oleh Annur Hikmah Basri, Andi Zulkifli dan M.Tahir Abdullah (2014). Dimana adanya evektivitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

pemberiaan psikoedukasi untuk di jadikan asuhan pada kasus post partum blues Metode psikoedukasi berupa penjelasan singkat dan pembagian booklet dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih cepat dan jelas kepada responden karena ada interaksi langsung dan diskusi. Selain itu, responden dapat mempelajarinya kembali dengan membaca booklet yang telah dibagikan apabila ada yang terlupakan atau kurang jelas. Penjelasan tentang efek buruk dari depresi postpartum, mengundang perhatian ibu untuk berusaha mencegah resiko tersebut. Efek buruk depresi terhadap ibu, bayi, suami dan anggota keluarga lainnya dianggap sebagai ancaman kesehatan, sehingga mendorong motivasi responden dan pasangannya untuk berusaha mencegah terjadinya depresi postpartum.

Selain itu, ibu postpartum memiliki kemampuan yang baik dalam membangun koping (proses intervensi yang diberikan, interaksi peneliti dengan ibu postpartum, tingkat keyakinan responden dalam menerapkan anjuran yang diberikan, serta struktur materi psikoedukasi yang dikemas secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh responden) yang konstruktif, dan menggunakannya secara efektif dalam menghadapi berbagai gangguan emosional dan psikologis.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Dewa Ayu Ketut Surinati, Gusti Agung Oka Mayuni dan Ni Luh Wayan Yuliasih (2013). Hipnoterapi merupakan salah satu program yang dapat diberikan pada ibu dalam menghadapi perubahan peran dalam hidupnya, sehingga ibu menjadi terlatih dan mampu mengontrol emosinya serta dapat menjaga ibu agar

selalu sehat. Teknik hipnosis atau sugesti yang paling baik diberikan pada masa pascapersalinan adalah glove anasthesia. Teknik ini sangat membantu mengurangi rasa nyeri serta keluhan dan ketidaknyamanan yang dirasakan ibu, serta kontraksi, rasa mulas, rasa sakit akibat jahitan pada perineum, atau luka operasi (Aprillia, 2010).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden rata-rata mengalami labilitas perasaan, kecemasan dan perasaan bersalah, namun tidak ada responden yang mempunyai kecenderungan keinginan bunuh diri dan melukai atau mencederai bayinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan skor pada item pernyataan nomor 8, 16, 21, 24 dan 32 semuanya mendapatkan skor 0 baik pada hari ketiga maupun hari ketujuh. Tingkat depresi yang dialami responden termasuk dalam katagori depresi ringan dan sedang. Albin (2001) menjelaskan bahwa individu yang mengalami depresi sering merasa dirinya tidak berharga dan merasa bersalah. Mereka tidak mampu memusatkan pikirannya dan tidak dapat membuat keputusan. Individu yang mengalami depresi selalu menyalahkan diri sendiri, merasakan kesedihan yang mendalam dan rasa putus asa tanpa sebab. Mereka mempersepsikan diri sendiri dan seluruh alam dunia dalam suasana yang gelap dan suram. Pandangan suram ini menciptakan perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan yang berkelanjutan.

Pada penelitian yang di lakukan oleh tyas febriani (2017). Dimana intervensi yang di berikan adalah meningkatkan kebutuhan aktivitas dan latihan pada ibu post partum blues intervensi kunjungan rumah diharapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

aktivitas dapat dilakukan secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Intervensi yang dilakukan meliputi observasi skala nyeri, melatih ambulasi dini (early ambulation), ajarkan relaksasi nafas dalam, pemberian obat analgesik yaitu untuk membantu mengurangi rasa nyeri.

Intervensi yang dilakukan meliputi observasi kala nyeri, melatih ambulasi dini (early ambulation), ajarkan relaksasi nafas dalam, pemberian obat analgesik yaitu untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Intervensi keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk memperoleh hasil yang diharapkan seperti telah diidentifikasi untuk keperluan pasien. Jelasnya, intervensi keperawatan bisa meliputi penilaian, pengajaran, konseling, atau perlakuan aktual langsung (Vaughans, 2013).

Pada penelitian yang di lakukan oleh Meilani Indriyanti (2014). Dimana adanya pengaruh bina keluarga mandiri terhadap terjadinya post partum blues, intervensi ini bertujuan memberikan kesadaran pada keluarga Bina Keluarga Mandiri merupakan suatu metode baru dengan keluarga sehingga pusat keperawatan dalam menangani kasus selama kehamilan khususnya postpartum blues. Bina keluarga Mandiri ini bertujuan untuk memandirikan klien, khususnya keluarga dalam menangani masalah postpartum blues. Keuntungan keluarga yang melakukan Bina keluarga Mandiri adalah dapat mengetahui adanya masalah yang terjadi pada keluarga, sehingga diharapkan masalahnya dapat diatasi dengan sedini mngkin. Upaya yang dapat dilakukan keluarga dan petugas kesehatan untuk mencegah terjadinya post partum blues pada ibu antara lain dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

memberikan asuhan keperawatan yang memfasilitasi potensi ibu untuk beradaptasi terhadap perubahanperubahan yang terjadi. Ibu yang telah mengalami postpartum blues membutuhkan dukungan psikologis seperti juga kebutuhan fisik lainnya yang harus dipenuhi. Menurut Logsdon et al, (2006) ibu postpartum mungkin perlu untuk mengatur atau menata kembali kegiatan rutin sehari-hari, atau mungkin menghilangkan beberapa kegiatan, disesuaikan dengan konsep mereka tentang keibuan dan perawatan bayi, bila diperlukan dapat diberikan pertolongan dari para ahli.

Rencana asuhan yang bisa dilakukan berdasarkan hasil dari beberapa penelitian dia atas. Di antaranya seperti pengunaan mommoodboster, melakukan kunjungan rumah, memberikan psikoedukasi, mengajarkan ibu dan keluarga cara perawatan bayi, memberikan dukungan sosial, memberikan pendidikan kesehatan individu, pemberian informasi edukasi terhadap kejadian post partum blues, massage terapi (terapi pijat), hipnoterapi dan melakukan bina keluarga mandiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

6. Langkah VI : Peneatalaksanaan

Pada penelitian yang di lakukan oleh awaludin jahil abdilah dkk, (2016). Mengatakan bahwa hampir sebagian responden ibu post partum primipara mengalami depresi setelah melahirkan dari tingkat ringan sampai tingkat berat, berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa adanya perubahan tingkat depresi yang di alami ibu post partum sebelum dan sesudah di berikan pisikoedukasi ini dapat di buktikan pada data univariat

bahwa ibu dengan depresi ringgan sebelum di berikan pisikoedukasi berjumlah 12 orang, setelah di berikan psikoedukasi berjumlah 10 orang.

Hal ini sesuai dengan pendapat matteson (2000), dukungan sosial di difinisikan sebagai invormasi varbel atau non varbel serta bantuan yang nyata atau tingkahlakuk yang di berikan orang yang akrab dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran atau hal-hal yang bisa memberikan ke untungan emosianal atau pengaruh pada tingkahlaku penerimanya. penelitian ini juga mengatakan bahwa perlunya dilakukan program pemberian penyuluhan kesehatan khusus melalui pisikoedukasi dengan pemberian informasi yang cukup tentang pencegahan depres post partum primipara dan juga pembagian booklet di lakukan pada saat pemeriksaan ANC berlangsung sehinga ibu post partum dapat mencegah terjadinya depresi post partum primipara.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Kristina maharani dkk (2019). Mengatakan bahwa adanya perubahan yang signisikan sebelun dan sesudah di lakukan intervensi herbal steam bath dan massage terapi dengan kata lain intervensi kombinasi herbal steam bath dan masage terapi evektif mencega terjadinya post partum blues. Pada penelilitian ini herbal steam bath merupakan terapi sauna yang di lakukan untuk meningkatkan kesehatan dan kecantikan yang merangsang sirkulasi darah dan bisa membantu bahab-bahan yang bersifat racun dari sel dan jaringan sehingga tubuh menjadi sehat dan jiwa pun tenang dan nyaman. Pada proses herbal steam bath, jenis bahan tumbuhan yang di gunakan pada ramuan seperti serai wangi dan

daun jeruk perut bahan tersebut mengandung bahan senyawa bioktif terutama minyak atsiri, alkoid. minyak atsiri merupakan senyawa bioaktif yang terdapat hampir di seluruh bagian tubuh di atas daun, batanng, buah, biji dan rimpang yang berfungsi sebagai aromaterapi dengan efek menenangkan dan menyegarkan untuk kesehatan, sehinga dapat bermanfaat untuk memulihkan kesehatan ibu nifas dengan post partum blues.

Pada penelitian yang di lakukkaan oleh Irma Fidora dkk, (2018). Mengatakan bahwa ibu post partum mengalami perubahan tidak hanya fisik namun juga psikologis yang sangat mempengaruhi kehidupanya, proses ini penting dan harus mendapatkan perhatian khusus, fingsi peran berfokus pada bagaimana seseorang menempatkan dirinya pada posisi tertentu. ibu post partum memiliki peran baru terhadap lingkungannya yaitu bayi yang baru lahir peran itu mencakup banyak hal di antaranya mengawasi kebutuhan fisik, bayi, memenuhi kebutuhan bonding terhadap bayi seperti memegang dan memeluk pada ibu yang bisa beradaptasi dengan baik dan tidak mengalami maternal depressive sympotoms, pemberian pendidkan kesehatan mengenai maternal depressive symptoms memperkenalkan ibu pada kondisi yang mungkin di alaminya setelah melewati masa persalinan. Pendidikan kesehatan ini juga membantu ibu menemukan alternatif pemecahan masalah jika timbul gejala depresi yang dapat di rasakan sendiri oleh ibu melalui aktifitas fisik berupa senam nifas dan relaksasi seperti terdapat dalam buku panduan yang di berikan. Pentingnya pendidikan kesehatan terhadap ibu post partum di dukung oleh beberapa penelitian di

antaranya nazara tahun 2006 yang mendapatkan hasil penelitian bahwa intervensi dengan pemberian pendidikan kesehatan berupa berupa psikoedukasi efektif mencegah terjadinya depresi post partum. Penelitian soep 2009 juga memperoleh hasil yang sama dimana pemberian pisikoedukasi terhadap ibu post partum menurunkan skor depresi secara bermakna. Intervensi berupa pendidkan kesehatan ini merupakan asuhan keperawatan mandiri yang bisa di programkan dalam lingkup keperawatan maternitas untuk meningkatkan kesejahteraan baik ibu maupun bayi baru lahir.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Difah Ardiayanti dan Siti Muthia Dinni (2018). Melakukan pengembang aplikasi model rasch untuk mendeteksi dini post partum depression dimana di dapatkan hasil dalam penelitian ini mengatakan ada beberapa aitem berpengaruh dan responden yang tepat atau sesuai dengan pengembangan aplikasi model rach, dan pada penelitian ini juga mengatakan bahwa system ini terbukti memberikan hasil yang konsisten dan terbukti mengungkap satu konstrak piikologis dimana terdapat 13 aitem yang sesuai mode.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Ade eka sari widiyanti (2017). Penelitian mengatakan bahwa massage teraphy dapat mencegah depresi post partum karna di dapatkan sekor sebelu intervensi dan sesudah intervensi terjadi perubahan. Adapun upaya lain yang bias di lakukan untuk penanganan depresi post partum blues meliputi pengobatan terapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

psikologi, psikososial dan penanganan tampa obat seperti latihan aku puntur dan massage terapi (fitelson, dkk,2011).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Meilani indriyanti (2014). Hasil penelitian kelompok kontrol dan eksperimen dan di ketahui nilai signifikan pada penilitin ini 0,005 (p<5%) yang diinterpensikan bahwa dengan diberikan intervensi hipotesis Ho dan Ha di terima, adan pengaruh pemberian bina keluarga mandiri terhadap tingkat kemandirian keluarga hasil tersebut menunjukan nilai rata-rata tingakat kemandirian keluarga kelompok eksperimen lebih besar dari kelompok kontrol artinya kelompok yang diberikan intervensi berupa bina keluarga mandiri menunjukan kemandirian keluarga yang lebih baik dalam pencegahan terjadinya post partum blues dari kelompok yang tidak diberikan intervensi hal ini dikarnakan responden mendengar langsung dari Pembina yang diberikan langsung peneliti hinga mudah dipahami mengenai post partum blues.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tyas Febriani (2017). Asuhan keperawatan dilakukan tiga hari pada hari pertama melakukan bina hubungan saling percaya kepada klien serta mengkaji masalah yang dialami klien, dan melakukan intervensi keperawatan sesuai masalah yang dialami pasien karna masalah yang dialami klien actual dan harus segera diatasi, hari ke dua melakukan intervensi terhadap intervensi yang sudah dilakukan dan pada hari ke tiga melakukan evaluasi terhadap intervensi yang sudah dilakukan alat yang digunakan untuk pengambilan data adalah tensi, thermometer dan setoskop.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Pada peneilitian yang dilakukan oleh Annur Hikmah Basri dkk (2014). Intervensinya adalah dilakukan program penyuluhan kesehatan khususnya melalui psikoedukasi dengan memberikan informasi yang cukup tentang pencegahan depresi post partum selain itu pembagian booklet dilakukan pada saat pemeriksaan ANC berlansung hingga ibu prepartum dapat mencegah terjadinya depresi post partum terdapat perbedaan yang bermakna sebelum dan sesuada di lakukan intervensi psikoedukasi.

Pada penelitian yang di lakukan oleh munaaya fitriyya dan Yuliana (2017). Melakukan kajian pada ibu post partum blues dengan post prtum blues dimana didapatkan hasil dalam penelitian ini setelah di lakukan asuhan kebidanan selama tiga hari keadaan ibu baik, ibu tidak cemas lagi, bisa tidur, maumakan, dan perasaanya sudah tidak cemas lagi. Hasil pengkajia, pengawasan, pelaksanaan, rencana tindakan pada ibu nifas dengan post partum blues tidak ada kesenjangan, antara teori dengan kasus selama tiga hari keadaan pasien sudah membaik. Pada kasus ini sudah di laksanakan pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan post partum blues yaitu komunikasi trapeutik kepada ibu dan keluarga tentang mengajarkan ibu dan keluarga cara perawatan bayi sehari-hari, menganjurkan ibu untuk menceritakan segala permasalah atau hal lain yang ingin diungkapkan, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, menganjurkan ibu untuk olahraga ringan, menganjurkan ibu untuk bergabung dengan kelompok ibu- ibu baru dan menganjurkan suami dan keluarga untuk lebih memperhatikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Penatalaksaan pada kasus post partum blues ini seperti pemberian herbal steam. Herbal steam merupakan terapi sauna yang di lakukan untuk meningkatkan kesehatan dan kecantikan melancarkan sirkulasi darah sehinga tubuh menjadi sehat dan jiwa pun tenang dan nyaman. Kemudian pemberian pendidikan kesehatan ini juga membantu ibu menemukan alternative pemecahan masalahjika timbul gejala yang bisa di rasakan sendiri oleh ibu melalui aktifitas fisik seperti senam nifas dan relaksasi, melakukan massage terapi atau seni pijat, seni pijat di ajarkan secara turun temurun walaupun pada awalnya tidak di ketahui secara jelas bagaiman pijat dan sentuhan dapat berpengaruh demikian positif pada tubuh manusia. Kemudian mengajarkan cara perawatan bayi sehari-hari, anjurkan ibu untuk menceritakan segala permasalahan atau hal lain yang ingin di ungkapkan, anjurkan ibu makan untuk menambah nafsu makan, anjurkan suami, keluarga, teman-teman, sesama ibu untuk memberikan dukungan pada ibu, anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, anjurkan ibu untuk berolahraga ringan, anjurkan ibu untuk berkumpul dengan kelompok ibu-ibu baru, aanjurkan suami dan keluarga untuk lebih memperhatikan ibu.

7. Langkah VII : Evaluasi

Pada penelitian yang di lakukan oleh Adenia dwi ristanti, Elly dwi masita (2020). Pada penelitian ini mengatakan atau hasil evaluasi dari penelitian ini di dapatkan bahwa dukungan suami, keluarga dan lingkungan, keyakinan, serta budaya berpengaruh terhadap prilaku health seeking pada ibu post partum blues. Intervensi tersebut merupakan line

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

pertama dalam perawatan post partum blues, sebuah penelitian meta-analisasi menunjukan bahwa ubu yang di rawat dengan intervensi psikososial lebih kecil memungkinkanya untuk tetap post partum blues pada satu tahun post partum di bandingkan dengan ibu yang meneriman perawatan standar di layanan primer. Untuk ibu dengan gejala penyakit sedang, dsn untuk meredakan dengan gejala penyakit ringan tidak dapat merespon intervensi psikososial saja, dapat di rekomendasikan untuk mendapatkan psikoterapi formal seperti terapi prilaku kognitif dan terapi interpersonal.

Pada penelitin yang di lakukan oleh Ratna indriani (2015). Mengefaluasi adanya perubahan tingkat deprsi setelah adanya senam nifas dimana senam nifas adalah intervensi yang meraka pakai untuk menurunkan angka kejadian post partum blues, hubungan post partum blues dengan senam nifas adalah upaya meningkatkan kualitas keikutsertaan ibu dalam senam nifas dapat di lakukan oleh bidan melalui pendekatan efikasi diri, bidan memberikan reward untuk meningkatkan motivasionl ibu akan memiliki efikasi diri positif yang akan meningkatkan usahanya untuk melakukan senam nifas dengan positif, bidan juga secara komperhensif harus memberikan pendidikan kesehatan pada ibu. Proses kognitif berpengaruh pada efikasi diri ibu dalam penetapan suatu tujuan untuk menetapkan suatu tujuan untuk melakukan senam nifas secara positif.

Menurut Teori Lawrence green yang mencoba menganalisis prilaku manusia dari tingkat kesehatan menyebutkan bahwa factor predisposisi

(predisposising factor) perilaku terwujud dalam keyakinan yang berkenaan dengan kemauan seseorang atau kelompok untuk bertindak. Teori konsep efikasi diri bandura (2005) menyatakan bahwa efikasi diri berpusat pada teori sosial kognitif. Bandura mengambarkan keyakinan sebagai penentu individu berfikir, berprilaku, dan berkeyakinan. Bandura (2005).

Pada penelitian yang di lakukan oleh munaaya fitriyya dan Yuliana (2017). Melakukan kajian pada ibu post partum blues dengan post prtum blues dimana didapatkan hasil dalam penelitian ini setelah di lakukan asuhan kebidanan selama tiga hari keadaan ibu baik, ibu tidak cemas lagi, bisa tidur, maumakan, dan perasaanya sudah tidak cemas lagi. Hasil pengkajia, pengawasan, pelaksanaan, rencana tindakan pada ibu nifas dengan post partum blues tidak ada kesenjangan, antara teori dengan kasus selama tiga hari keadaan pasien sudah membaik. Pada kasus ini sudah di laksanakan pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan post partum blues yaitu komunikasi trapeutik kepada ibu dan keluarga tentang mengajarkan ibu dan keluarga cara perawatan bayi sehari-hari, menganjurkan ibu untuk menceritakan segala permasalah atau hal lain yang ingin diungkapkan, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, menganjurkan ibu untuk olahraga ringan, menganjurkan ibu untuk bergabung dengan kelompok ibu- ibu baru dan menganjurkan suami dan keluarga untuk lebih memperhatikan ibu.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Rotua Lenawati Tindoa dan Elis Anggeria (2018). Pada penelitian ini melakukan penilaian terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

evektivitas konseling terhada post partum blues, dimana hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar responden memerlukan bantuan dari tenaga medis untuk masalah yang dihadapi pada post partum blues, berdasarkan hasil screening yang telah dilakukan gejala-gejala yang paling sering muncul pada ibu yang mengalami babyblue adalah hamper selalu menyalakan diri sendiri secara tidak semestinya bila keadaan menjadi buruk. Hal tersebut Nampak ibu sangat sedih bila anaknya sedang menangis, ibu susah tidur dan terkadang suka marah-marah tampa sebab yang jelas. Selain itu ibu juga sering merasa khawatir dan cemas tampa alasan yang jelas dan hal tersebut di ungkapkan langsung oleh responden tsb. Dari hasil penelitian melalui kuensioner EPDS post partum ibu primi para di proleh p-value 0,000. Maka dapat di simpulkan bahwa ada evektivitas konseling terhadap post partum blues pada ibu primipara.

Pada penelitian yang di lakukan oleh (2010). Evaluasi hasil penelitian dimana adanya hubungan jenis persalinan dengan kejadian post partum blues, dimana jenis persalinan merupakan salah satu factor penyebab post partum blues itu sendiri, salah satu faktor penyebab post partum blues itu sendiri adalah pengalaman kehamilan dan persalinan ibu. Jenis persalinan yang sering di gunakan adalah persalinan normal dan persalinan dengan bantuan alat ataupun dengan oprasi section ceasarea. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dirksen dan andriansen (1985, dalam Dewi, Marianti & Wahyuni, 2011) mengatakan bahwa beberapa alat medis yang di gunakan untuk pertolongan persalinan seperti ceaserea dan episiotomy

dapat memicu timbulnya post partum blues pada ibu pasca melahirkan (Miyansaski dkk,2014).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ika Larasati Sugeng (2013). Megevaluasi adanya perubahan kadar oksitosin pada ibu primipara dengan post partum blues dimana pada penelitian ini di dapatkan hasil adanya perubahan kadar oksitosin pada post partum blues serta meningkatnya pembengakan payudara pada ibu post partum yang di sebabkan oleh bertambahnya produksi asi pada ibu setelah melahirkan. Responsden kelompok model perawatan topikal ASI lebih cepat mengalami pelepasan tali pusat dibanding dengan model perawatan kering terbuka. Hal tersebut mendukung pendapat bahwa ASI mempunyai banyak agen imunologis, bahan anti inflamasi dan antimikroba yang berguna untuk dapat melawan infeksi sehingga waktu pelepasan tali pusat dapat berlangsung lebih cepat (Mullany, 2003).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Pada penelitian yang dilakukan oleh Budi Astuti (2015). Melakukan evaluasi pengatahuan dan sikap perawat dalam perawatan pasien post partum blues, pengetahuan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan yang penting dalam penentuan sikap yang utuh. Pengetahuan akan membentuk kepercayaan yang sifatnya akan menjadi dasar bagi sebuah pengambilan keputusan dan menentukan sikap terhadap suatu obyek tertentu.Perawat bersikap kurang baik karena selama ini belum ada pelatihan dan seminar tentang pengetahuan dan sikap perawat dalam merawat post partum blues. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang

dilakukan oleh Handayani (2008), penelitian tersebut menunjukkanhasil tingkat pengetahuan berkorelasi dengan sikap responden. Selain itu penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh wicaksono(2012), dimana penelitian ini juga membuktikan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap perawatan pasien.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Salma (2018). Melakukan pengevaluasiaan keefektifitas asuhan yang sudah di berikan terjadi perubahan prilaku dari ibu yang mengalami post partum blues, mengulangi kembali proses menejemen dengan benar terhadap setiap aspek asuhan yang di berikan tapi belum efektif. Melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu seperti kondisi psikis ibu seperti sudah ingin mengurus dan memberikan ASI pada bayinya, evaluasi kondisi fisik ibu, tekanan darah, status gizi ibu sudah baik serta kondisi spiritual ibu.

Beberapa literature dan penelitian menunjukan depresi saat kehamilan dapat berkembang menjadi depresi pasca persalinan, wanita dengan kehamilan yang tidak di inginkan akan mengalami peningkatkan depresi dan stress yang akan berlanjut pada saat setelah melahirkan (susanti, 2013).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Desy Simpan Hati Hasibuan (2018). Evaluasi yang di lakukan pada penelitian ini adalah perubahan yang terjadi setelah pada ibu post partum blues setelah di lakukan terapi musik klasik, Musik juga merupakan perwujudan tertentu seperti seni suara, seni tari, seni drama, baca puisi dan gerak yang berirama. Jadi terapi musik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

adalah suatu usaha yang berupa bantuan yang merupakan proses terencana dengan menggunakan musik sebagai media penyembuhan bagi anak yang mengalami hambatan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Dalam hal ini musik merupakan alat bantu atau media untuk menumbuhkembangkan kemauan daya kreasi serta konsentrasi pada penderita yang mengalami hambatan, baik fisik motorik, social emosinal serta mental intelegensy. Pada umumnya manusia membutuhkan hiburan atau rekreasi.

Terapi musik adalah keahlian mengunakan musik atau elemen musik oleh seorang terapis untuk mengingkatkan, mempertahankan dan mengebalkan mental, fisik, emosional dan spiritual. Dalam kedokteran, terapi musik disebut sebagai tehnik yang di gunakan untuk penyembuhan suatu penyakit dengan mengunakan bunyi atau irama tertentu. Jenis musik yang di gunakan dalam terapi musik dapat di sesuaikan dengan keinginan, seperti musik klasik, intrumentalia, slow musik, orchestra, dan musik modern lainnya. Tetapi beberapa ahli menyarankan untuk tidak menggunakan jenis musik tertentu seperti pop disco, rock and roll, dan musik berirama keras lainnya, karena jenis musik dengan anapestic beat (2 beat pendek, 1 beat panjang dan kemudian pause) merupakan irama yang berlawanan dengan irama jantung. Musik lembut dan teratur seperti intrumentalia dan musik klasik merupakan musik yang sering di gunakan untuk terapi musik (Potter, 2005 dalam Suryana 2012).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Di dapatkan dari hasil penelitian di atas bahwa terdapat perubah yang signifikan. Setelah pemberian psikoedukasi dan melakukan terapi senam nifas, massage, moommboosterd, pembinaan keluarga mandiri serta konseling post partum adapun perubahan- perubahan yang terjadi pada ibu seperti kondisi psikis ibu seperti sudah ingin mengurus dan memberikan ASI pada bayinya.

B. Implikasi Kebidanan

Post partum blues ialah keadaan transien dari peningkatan reaktifitas emosional yang dialami oleh separuh dari wanita dalam jangka waktu satu minggu pasca persalinan. Gejala klinis jelas terlihat dari hari ke 3 hingga hari ke 5, kemudian menghilang dalam beberapa jam hingga beberapa hari kemudian. Gejala post partum blues tergantung pada drajat dan kecepatan terjadinya post partum blues. Tanda dan gejala yang sering muncul yaitu, menangis, mengalami perubahan perasaan, cema, khawatir mengenai sang bayi, kesepian, penurunan gairah seksual, serta kurang percaya diri terhadap kemampuan menjadi seorang ibu. Periode post partum menyebabkan stress emosional terhadap ibu baru, bahkan lebih menyulitkan bila terjadi perubahan fisik yang hebat.

Pada post partum blues timbul berbagai manifestasi klinik dan komplikasi yang dapat terjadi baik pada ibu maupun anaknya. Pada ibu dengan post partum blues perlu antisipasi berupa depresi post partum dan mangganggu tumbuh kembang anak. Sesuai dengan diagnose potensial tindakan segera yaitu bidan dan dokter melakukan identifikasi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

memungkinkan terjadi untuk melakukan kolaborasi sesuai dengan kondisi pasien.

Rencana tindakan yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan individu Pemberian pendidikan kesehatan mengenai maternal depressive symptoms memperkenalkan ibu pada kondisi yang mungkin dialaminya setelah melewati masa persalinan. Pendidikan kesehatan ini juga membantu ibu menemukan alternatif pemecahan masalah jika timbul gejala depresif yang dapat dirasakan sendiri oleh ibu melalui aktifitas fisik berupa senam nifas dan relaksasi seperti terdapat dalam buku panduan yang diberikan. Dukungan dari tenaga kesehatan sangat diperlukan terutama pada masa kehamilan untuk mencegah terjadinya postpartum blues misal dengan cara memberikan informasi yang memadai atau adekuat tentang proses kehamilan dan persalinan serta penyulit-penyulit yang mungkin timbul pada masa tersebut dan penanganannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penulisan literatur review pada ibu dengan post partum blues serta menghubungkan dengan teori dan *Avidance Based* maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu:

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan referensi, maka untuk melakukan pendekatan menejemen asuhan kebidanan yang dimulai dengan mendapatkan data subjektif dan objektif dari tanda dan gejala, factor penyebab berbagai referensi tentang post partum blues. Post partum blues adalah suatu sindroma gangguan afek ringan yang sering tampak dalam minggu pertama setelah persalinan dan memuncak pada hari ke tiga sampai kelima dan menyerang dalam rentang waktu 14 hari terhitung setelah persalinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Dari referensi yang didapatkan gejala post partum blues tergantung pada drajat dan kecepatan terjadinya post partum blues. Tanda dan gejala yang sering muncul yaitu, menangis, mengalami perubahan perasaan, cema, khawatir mengenai sang bayi, kesepian, penurunan gairah seksual, serta kurang percaya diri terhadap kemampuan menjadi seorang ibu.

Berdasarkan hasil referensi pada post partum blues timbul berbagai manifestasi klinik dan komplikasi yang dapat terjadi baik pada ibu maupun anaknya. Pada ibu dengan post partum blues perlu antisipasi berupa depresi post partum dan mangganggu tumbuh kembang anak. Dari hasil referensi sesuai dengan diagnose potensial tindakan segera yaitu bidan dan dokter

melakukan identifikasi yang memungkinkan terjadi untuk melakukan kolaborasi sesuai dengan kondisi pasien.

Dari hasil referensi untuk rencana tindakan yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan individu Pemberian pendidikan kesehatan mengenai maternal depressive symptoms memperkenalkan ibu pada kondisi yang mungkin dialaminya setelah melewati masa persalinan. Pendidikan kesehatan ini juga membantu ibu menemukan alternatif pemecahan masalah jika timbul gejala depresif yang dapat dirasakan sendiri oleh ibu melalui aktifitas fisik berupa senam nifas dan relaksasi seperti terdapat dalam buku panduan yang diberikan. Dukungan dari tenaga kesehatan sangat diperlukan terutama pada masa keha-milan untuk mencegah terjadinya postpartum blues misal dengan cara memberikan informasi yang memadai atau adekuat tentang proses kehamilan dan persalinan serta penyulit-penyulit yang mungkin timbul pada masa tersebut dan penanganannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

B. Saran

1. Bagi ibu (klien)
   a. Diharapakan pada setiap ibu dan calon ibu untuk senantiasa mempersiapkan kehamilanya baik secara materi, psikis dan juga persiapan materi
   b. Diharapkan pada ibu untuk tidak menyembunyikan segala permasalahan yang ia miliki , hendaknya setiap masalah yang dimiliki di ceritakan kepada suami ataupun kerabat terdekat.

c. Diharapkan ibu sering berkumpul dengan kelompok-kelompok ibu baru

2. Bagi suami dan keluarga ibu

a. Diharapkan suami menemani istri jika melakukan pemeriksaan kehamilan

b. Diharapkan suami lebih memberikan perhatian lebih kepada ibu hamil, pasca melahirkan dan di kehidupan sehari-hari

c. Diharapkan suami sering membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah dan membantu ibu mengurus bayinya

d. Bagi keluarga diharapkan memberikan dukungan kepada ibu, jangan mengkritik dan menyudutkan ibu yang baru saja menjadi seorang ibu

3. Bagi bidan

a. Petugas kesehatan dapat mengenali dan mendeteksi secara dini post partum blues

b. Petugas kesehatan khususnya bidan perlu menjelaskan keadaan ibu kepada keluarga ibu kondisi yang dialami oleh ibu serta diharapkan memberikan dorongan moral pada keluarga

c. Petugas kesehatan hendaknya juga memperhatikan kondisi psikis ibu yang

baru melahirkan jangan hanya berfokus kepada kondisi fisik pasien

d. Tenaga kesehatan hendaknya lebih memberikan perhatian dan berlaku ramah kepada pasien agar pasien merasa lebih bahagia dan tidak segan menceritakan kendala dan masalah yang ibu alami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

4. Bagi instutusi Pendidikan

   a. Agar menerapkan asuhan kebidanan dalam pemecahan masalah dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat metode ini sangat bermanfaatdalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang lebih profesional.

   b. Perlu adanya persamaan presepsi antara pendidikan dan petugas kesehatan

      dilahan praktek tentang penerapan asuhan kebidanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

Aisyiyah. *Pengaruh Pemberian Konseling Terhadap Depresi Pada Ibu Post partum, Ilmiyah Umum Dan Kesehatan.* 2017.

Ardiyanti Diva dan Dinni Muthia. 2018. *Aplikasi Model Rasch dalam Pengembangan Instrumen Deteksi Dini Postpartum Depression*. Jurnal Psikologi 45 (2). https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi

Azizah Nur. 2016. *Terapi Mendengarkan Al-qura'an Terhadap Pencegahan Post Partum Blues Pada Ibu Nifas di RS Tk III 04.06.03 Dr. soetartoYogyakarta.*

Astri Riani, dkk. 2020. *Dukungan Sosial Pada Ibu Postpartum Primipara Terhadap Kejadian Postpartum Blues.* Jurnal Kesehatan Perintis 7 (1). https://jurnal.stikesperintis.ac.id/index.php/JKP.

Angraini. 2014. *Hubungan Depresi dengan Status Gizi.* Jurnal Medula 2 (2).

Awaludin Jahid dan Eka Putri . 2016. *Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Depresi Postpartum Pada Ibu Primipara.*

Budi Astuti. 2015. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Perawat Dalam Perawatan Pasien Postpartum Blues di Rumah Sakit DKI yogyakarta.*

Bina Melvia, dkk. 2015. *Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Tingkat Postpartum Blues Ibu Primipara Berusia Remaja.* Jurnal Keperawatan Soedirman 10 (2).

Desthalia Cyatraningtyas. 2020. *Hubungan Jenis Persalinan Dengan Kejadian Postpartum Blues Pada Ibu Nifas di Rumah Sakit Daerah BalungKabupaten Jember.*

Dian Irawati dan Farida Yuliani. 2014. *Pengaruh Faktor Psikososial Dan Cara Persalinan Terjadinya Post Partum Blues Pada Ibu Nifas.* Jurnal Hospital Majapahit 6 (1).

Dwi Natalia Setiawati, dkk. 2019. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Depresi Post Partum di Kebupaten Bogor Tahun* 2019. Muhammadiyah Public Health Journal 1 (1). https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MPHJ/

Dirgayunita Aries. 2016. *Depresi: Ciri, Penyebab dan Penangannya.* Journal An-nafs: Kajian dan Penelitian Psikologi 1 (1).

Devi Irmaning Tyas, dkk. 2015. *Perbedaan Deprsi Dengan Depresi Pada Ibu Hami Dengan Depresi Pada Ibu Postpartum Terhadap Kesiap Peran*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Menjadi Seorang Ibu di RSIA Bunda Arif Purwokerto. Jurnal Viva Medika 08 (14).

Dayang Mardhatillah, dkk. 2019. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Postpartum Blues di Wilayah Kerja Puskesmas Temindung Tahun 2019.*

Desy Hasibuan. 2018. *Pengaruh Pemberian Music Klasik Terhadap Gejala Post Partum Blues Pada Ibu Primipara Di Klinik Sumiariani Dan Klinik Pratama Jannah Medan Tahun 2018.*

Edwar. 2017. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika

Eko Radityo. 2020. *DEPRESI DAN GANGGUAN TIDUR*. Medical School Udayana University.

Fatma Ibrahim. *Faktor Yang Berhubungan Denagan Depresi Post partum Di Rs Pertiwi Makasar*. Jurnal Depresi Pospartu. 2012.

Fatmawati Diah Ayu. 2015. *Faktor Resiko Yang Perpengaruh Terhadap Kejadian Post Partum Blues*. Jurnal eduhealth 5 (1).

Fitriana Anisa dan Siti Nurbaeti. 2015. *Gambaran Kejadian Postpartum Blues Pada Ibu Nifas Berdasarkan Karekteristik Di Rumah Sakit Umum Tingkat IV Sariningsih Kota Bandung*.

Fidora Irma, dkk. 2018. *Pengaruh Pemberian Pendidikan Kesehatan Individu Terhadap Perubahan Maternal Depressive Symptoms Pada Ibu Post Partum.* Jurnal Menara Medika 1 (1).

Fitriani, Lisa dkk. 2015. *Gambaran kejadian post partum blues pada ibu nifas berdasarkan karkteristik di rumah sakit umum tingkat IV sariningsih kota bandung.* Jurnal DIII keperawatan fakultas olahraga dan kesehatan universitas pendidikan Indonesia. http;//jurnal.akpornotoksomo.ac.id/index.php/jkn/article/download/50/47

Fitriyya dan Yuliana. 2017. *Kajian Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Ny "A" Umur 17 Tahun P1A0 Dengan Post Partum Blues Di Sarage*. Jurnal Ilmiah Kebidanan 8 (2).

Girsang Mevia, dkk. 2015. *Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Tingkar Post Partum Blues Ibu Primipara Berusia Remaja*. Jurnal Keperawatan Soedirman 10 (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Haryani, Reni. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Dan Menyusui.* Jakarta Timur: Tras Info Media. 2012.

Hikmah Basri, dkk. 2014. Efektivitas Psikoedukasi Terhadap Depresi Post Partum Di RSIA Sitti Fatimah dan RSIA Pertiwi Makassar Tahun 2014

Hutagoal, E. 2019. Hubungan dukungan suami dengan kemauan ibu memberikan ASI Esklusif di Puskesmas Tumiting Kecematan Tumiting. *Ejournal Keperawatan (e-Kp), 3 (1), 1-7*

Indriyanti Meilani. 2014. *Pengaruh Bina Keluarga Mandiri (BKM) Terhadap Kemandirian Keluarga Dalam Mencegah Terjadinya Post Partum Blues.*

Ika Larasati Sugeng. 2013. *Kada Oksitosin dan Bendungan Asi Pada Ibu Primipara Pengan Post Partum Blues.* Jurnal Ners 8 (1).

Indra Dewi dan Dermawan Waruwu. 2018. *Pengaruh Cognitive Behavior Therapy Terhadap Postpartum Depression.* Jurnal Psikologi Mandala 2 (1).

Immawanti. 2015. *Pengunaan Mommoodbooster (MMB) Sebagai Intervensi Pada Ibu Dengan Depresi Postpartum.* Jurnal Kesehatan Marendeng https://ejurnal.stikes-marendeng.ac.id

Kristina Maharani, dkk. 2019. *Kombinasi Herbal Steam Bath dan Massage Terapi Pada Ibu Nifas Dalam Mencegah Post Partum Blues.* Jurnal Keperawatan Silampari 2 (2). https://doi.org/10.31539/jks.v2i2.509

Krisdiana, dkk. 2013. *Gambaran Faktor-Faktor Resiko Postpartum Blues di Wilayah Kerja Puskesmas Blora*. Jurnal Kebidan 2 (5).

Kurniasari Devi dan Yetti Amir Astuti. 2015. *Hubungan Antara Karakteristik Ibu , Kondisi Bayi dan Dukungan Sosial Suami Dengan Post Partum Blues Pada Ibu Dengan Persalinan SC Di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro tahun 2014.* Jurnal Kesehatan Holistik 9 (3).

Komang Prayoga dan Sri Wahyuni. 2016. *Prevalendi dan Factor Resiko Depresi Postpartum di Kota Denpasar Mengunakan Edinburgh Postnatal Pepression Scale.* E-Jurnal Medikal 5 (7).

Lia dewi, Vivia Nani. Tri sunarsi. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas.* Jakarta Selatan: Salemba Medika. 2011.

Lindayani Komang dan Gusti Ayu Marhaeni. 2019. *Prevalansi dan Factor Resiko Depresi Postpartum di Kota Denpasar tahun 2019*. Jurnal Midwifery Update (MU). http://jurnalmu.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/jurnalmu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Marliandiani, Yefi. Nina Puspita Ningrum. 2015. *Buku Ajaran Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas Dan Menyusui*. Jakarta selatan : Salemba Medika. 2015.

Marni. *Asuhan kebidanan pada masa nifas "puerperium care".* Yogyakarta : pustaka pelajar. 2012.

Martini Fairus dan Septi Widiyanti. 2014. *Hubungan Dukungan Suami Dengan Kejadian Depresi Postpartum Pada Ibu Nifas. Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai* 7 (1).

Nugroho, Taufan. *Obsestrik Dan Ginekolog.* Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.

Nurhidayati Ulfa. 2015. *Karakteristik Depresi Post Partum Di Puskesmas Pandawangi Kota Malang.*

Nevy Norma dan Ika Agustina. 2020. *Progressive Muscle Relaxation Untuk Membantu Menurunkan Kecemasan Pada Ibu Menyusui Selama Postpartum.* Jurnal Keperawatan dan Profesi Ners IJPN 1 (1).

Pitriani, Risa ddk. Panduan lengkap asuhan kebidanan ibu nifas III. Yogyakarta : Deepublish. 2014.

Prima Daniyati Kusuma. 2017. *Karakteristik Penyebab Terjadinya Depresi Postpartum Pada Primipara Dan Multipara.* Jurnal Keperawatan Notokusumo 5 (1).

Puspa Tri Rahayu. *Pengalaman Baby Blues.* Fakultas Ilmu Kesehatan, UMP ,2017

Puspita sari, E. Kurnia Dwi Ramadini. *Asuhan Masanifas Posnatal Care*. Jakarta Timur : Tras Info Media. 2014.

Ririn Arianti, D. *Pengaruh Jenis Persalinan Terhadap Resiko Depresi Posprtum*. Jurnal Pengaruh Jenis Persalinan, 99-101. 2016.

Rukiyah, Yeyenai. Lia yulianti. *Asuhan Kebidanan 4 Patologi*. DKI Jakarta: Trans Infomedia. 2012.

Vita Suntomo, Andina. *Asuhan kebidanan nifas dan menyusui.* Yogyakarta: Pustaka Baru Pres. 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Qiftiyah Mariyatul. 2018. "*Gambaran Faktor-Faktor Dukungan Keluarga, Pengetahuan, Status Kehamilan Dan Jenis Persalinan Yang Melatarbelakangi Kejadian Post Partum Blues Pada Ibu Nifas Hari Ke-7 Di Polindes Doa Ibu Gesikharjo dan Polindes Teratai Kradenan Palang".* Jurnal Kebidanan Universitas Islam Lamongan 10 (2)

Resinta Agustin. 2014. *Gambaran Kejadian Postpartum Blues Pada Ibu Postpartum Remaja di Kecamatan Wates Kulon Progo.*

Ratna Indriyani. 2015. *Hubungan Postpartum Blues, Dan Efikasi Diri Dengan Pelaksanaan Senam Nifas Di Polindes Tunas Bunda Desa Manddelen Kecematan Lenteng Tahun 2015.* Jurnal Kesehatan Wiraraja Medika.

Retno Arienta Sari. 2020. *Literature Review: Depresi Postpartum.* Jurnal Kesehatan 11 (1). http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK

Rotua Lenawati dan Elis. 2018. *Efektivitas Konseling Terhadap Post Partum Blues Pada Ibu Primipara.* Jurnal JUMANTIK 3 (2).

Restarina Dwi. 2017. *Gambaran Tingkat Depresi Ibu Postpartum di Wilayah Kerja Puskesmas Ciputat Timur Kota Tanggerang Selatan Tahun 2017.*

Rosa Imani Khan. 2012. *Perilaku Asertif, Harga Diri dan Kecenderungan Depresi.* Jurnal Psikologi Indonesia 1 (2).

Rizky Fauzy & Endang Fourianalisyawati. 2016. *Hubungan antara Depresi dengan Kualitas Hidup pada Ibu Hamil Berisiko Tinggi.* Jurnal Psikogenesis 4 (2).

Risa Arianie Rusli, dkk. 2011. *Perbedaan Depresi Pasca Melahirkan pada Ibu Primipara Ditinjau dari Usia Ibu Hamil.* Jurnal INSAN 13 (01).

Runiari Nengah, dkk. 2013. *Hipnoterapi Terhadap Depresi Postpartum Pada Ibu Primipara.* Jurnal Gema keperawatan 6 (1).

Susanti Ningrum. 2017. *Faktor-Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Postpartum Blues.* Jurnal Ilmiah Psikologi 4 (2).

Saidah Halimatus, Wilda Al aluf. 2018. *"Hubungan Antara Tingkat Kecemasan Emosional Ibu Post Partum Dengan Kejadian Post Blues Di Kelurahan Sukorame Wilayah Kerja Puskesmas Sukorame Kediri Tahun 2018".* Jurnal Kesehatan Makia 7 (1).

Sabatini Anggawijaya. 2013. *Hubungan Antara Depresi Dan Prokrastinasi Akademik.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya 2 (2).

Sari Widiyanti. 2017. *Penerapa Massage Terapi Dengan Tehnik Effluerage Sebagai Pencegahan Depresi Postpartum Pada Ibu Nifas Di BPM Tugirah Tahun 2017.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Salmah. 2018. *Menejemen Asuhan Kebidana Post Natal Care Pada Ny "R" Dengan Post Partum Blues 02-29 Juli 2018 Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2018.*

Utami Wira Vida dan Monica Ivana. 2016. *Hubungan Dukungan Sami Terhadap postpartum Blues Pada Ibu Nifa Di BPS Amrina, Amd. Keb Kelurahan Ganjar Asri Kecematan Metro Barat Kota Metro Tahun 2016.* Jurnal Kebidanan 2 (4).

Unitasari Eva dan Suryani. 2020. *Wellness And Healthy Magazine*. Volume (2).

Winarni Dwi, dkk. 2017. *Pengaruh Pemberian KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Persiapan Persalian Dan Nifas Terhadap Kejadian postpartum Blues. Jurnal Kebidanan 6(4).*

Word Health Organizatio (WHO). 2018. *Panduan Kesehatan Dalam Kebidanan.* Amerika: WHO; 2018.

Yessy Kurniati. 2017. *Peran Zink Dan Faktor Psikososial Terhadap Kejadian Postpartum Blues.*

Yustisia dan Murwati. 2013. *Studi Diskriptif Tingkat Depresi Postpartum Pada Ibu Nifas Di Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Selatan Tahun 2013.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Rohana

Nim : 70400117016

TTL : Latar Barat/ 5 Agustus 1999

Suku : Nusa Tengara Barat

Agama : Islam

Alamat : Bima

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006-2011 :SDN Lanta Barat
2. Tahun 2011-2014 :SMPN 9 Lambu
3. Tahun 2014-2017 :SMAN 1 Lambu
4. Tahun 2017-2021 :Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR