

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
DENGAN HIPERTENSI GESTASIONAL
TAHUN 2020
(Literatur Review)**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan
Pendidikan Program Ahli Madya Kebidanan Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**SRIREZKI ADRIANI
NIM.70400117014**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITA ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRIREZKI ADRIANI

Nim : 70400117014

TTL : Kabere, 14 Oktiber 1999

Jurusan/Prodi : Kebidanan (D3)

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Perumahan Bumi Batara Gowa No. E16/6

Judul : ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL DENGAN
HIPERTENSI GESTASIONAL (*Literatur Review*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Kaerya Tulis Ilmih (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari twrbukti duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.



Samata-Gowa,

Penulis

SRIREZKI ADRIANI
70400117014

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : SRIREZKI ADRIANI
Nim : 70400117014
Judul : ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL DENGAN
HIPERTENSI GESTASIONAL (*Literatur Review*)

Karya Tulis Ilmiah ini telah diselesaikan untuk di auhkan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 11 Agustus 2021


Pembimbing I



Anieq Munthi'ah Al Kautsae, S.ST, M.Keb

NIP: 19890116 201903 2 009

Pembimbing II



Nurfaizah Alza, S.ST., M.Keb

NIP

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul **“Manajemen Asuhan kebidanan Antenatal dengan Hipertensi Gestasional (*Literatur Review*)”**. Yang disusun oleh **Srirezki Adriani Nim : 70400117014**, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 11 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 11 Agustus 2021
2 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SIT, M.Keb.	(.....)
Pembimbing I	: Anieq Munthi'ah Al Kautsae, S.ST, M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: Nurfaizah Alza, S.ST., M.Keb	(.....)
Penguji I	: dr. Andi Tihardimanto K, M.Kes	(.....)
Penguji II	: Drs. Syamsul Bahri, M.Pd	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar.


Dr.dr.Syatirah,Sp.A.,M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala proses di balik penyusunan Tugas Akhir bisa sampai pada titik ini. Adapun judul Tugas Akhir ini yaitu **“Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Hipertensi Gestasional”**. Karya Tulis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan DIII kebidanan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan.

Dalam menyelesaikan tugas Akhir ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu, ibu, ibu, Alm bapak, ayah serta, seluruh keluarga tercinta. Teruntuk mama ningsihku yang slalu senantiasa memberikan Do'a, dukungan, semangat, dan slalu mempercayai anaknya dalam melakukan apapun walaupun saya tahu di balik itu banyak cemas yang menggagunya. Untuk Ayah yang slalu khawatir dengan anak-anaknya yang jauh dari kampung, kakak ian yang menjadi pengganti orang tua di tanah rantau ini, terima kasih karna mau sabar hadapi saya yang manja dan banyak maunya walaupun kadang dia marahi saya tapi saya tau dia marah karna sayang sama adiknya, untuk bunda kaila yang slalu kirimkan doa serta mengirimkan video si kecil yang menjadi moodbooster di tengah-tengah penyusunan tugas akhir ini serta untuk adik-adik saya yang siap untuk

saya reportkan sebagai penghubung informasi saya dengan orang tua serta keluarga yang ada di kampung.

2. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Makassar
3. Kepada Ibu Dr. dr. Syatira, Sp.A., M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar
4. Ibunda Firdayanti, S.ST., M.Keb selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Makassar sekaligus sebagai Pembimbing Akademik saya
5. Ibunda Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S,ST., M.Keb selaku sekertaris Jurusan Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Makassar sekaligus sebagai pembimbing 1 saya yang telah meluangkan banyak waktu memberikan bimbingan, arahan, serta saran dalam penyusunan Tugas Akhir ini (*Literatur Review*)
6. Ibunda Nurfazah Alza, S.ST., M.Keb sebagai pembimbing 2 yang telah banyak memberikan saya bimbingan, arahan, saran serta, ilmu dalam memasukkan jurnal kedalam Tugas Akhir (*Literatur Review*)
7. dr. Andi Tihardimanto K, M.Kes selaku penguji 1 yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan Tugas Akhir (*Literatur Review*)
8. Drs. Syamsul Bahri M. Pd selaku penguji Agama yang telah memberikan saya tambahan ilmu agaman serta memberikan masukan dan saran yang bersifat islamiah dalam penyusunan Tugas Akhir (*Literatur Review*)

9. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar program studi Kebidanan Universitas Islam Negeri Makassar atas segala ilmu yang telah di berikan kepada penulis selama menepuh pendidikan di Kebidanan
10. Kepada Sahabat seperjuangan saya dalam menepuh pendidikan DIII kebidanan di Universitas Islam Negeri Makassar A. Nur Fajrih Jihan & Cindy Asrida serta AVID17AS keluarga besar Kebidanan 2017 yang memberi warna hari-hari dikampus
11. Serta semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir (*Literatur Review*)

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Aamiin.

Samata- Gowa, 2021

Penulis



SRIREZKI ADRIANI
70400117014

DAFTAR ISI

HALAMAN UDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penulis	7
D. Manfaat Penulisan	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.....	10
1. Kehamilan	10
2. Proses terjadinya kehamilan.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi dalam Kehamilan	23
1. Pengertian Hipertensi dalam kehamilan.....	23
2. Klasifikasi hipertensi dalam kehamilan	24

C. Tinjauan Kasus tentang hipertensi gestasional	25
1. Definisi.....	25
2. Faktor Resiko	28
3. Patofisiologi	34
4. Diagnosis.....	35
5. Komplikasi Hipertensi Gestasional.....	38
6. Penatalaksanaan Hipertensi Gestasional	40
7. Pencegahan.....	43
D. Tinjauan Manajemen Asuhan Kebidanan	45
1. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	45
2. Pendokumentasian dalam Bentuk SOAP	52

BAB III LITERATUR REVIEW

A. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar	54
B. Langkah II : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Aktual	62
C. Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Potensial	68
D. Langkah IV : Identifikasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi	76
E. Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan	83
F. Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan	89
G. Langkah VII : Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan	96

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telaah <i>Evidence Based Learning</i> Asuhan 7	
langkah Varney Berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi.....	102
1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar	102

2. Langkah II : Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual	106
3. Langkah III : Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial	107
4. Langkah IV : Identifikasi Perlunya Tindakan segera atau Kolaborasi	108
5. Langkah V : Rencana Tindakan.....	109
6. Langkah VI : Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan ...	110
7. Langkah VII: Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan	110
B. Implantasi Kebidanan.....	111
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
RIWAYAT HIDUP	120



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
LITERATUR REVIEW, NOVEMBER 2020

Nama : Srirezki Adriani
NIM : 70400117014
Pembimbing 1 : Anieq Munthi'ah Al Kautsar, S.ST, M.Keb
Pembimbing 2 : Nurfaizah Alza, S.ST, M.Keb
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Hipertensi Gestasional Tahun 2020

Hipertensi gestasional (disebut juga *trasiet hypertension*) adalah hipertensi yang timbul pada kehamilan Tanpa disertai dengan proteinuria dan hipertensi Akan menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan atau kehamilan dengan tanda-tanda preeklampsia tetapi tanpa proteinuria.

Literatur review ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Hipertensi Gestasional tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah menurut Helen Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Dari materi gestasional berdasarkan referensi maka didapatkan bahwa hipertensi gestasional adalah kenaikan tekanan darah yang hanya dijumpai dalam kehamilan sampai 12 minggu pasca persalinan, tidak dijumpai keluhan dan tanda-tanda preeklampsia lainnya. Diagnosa akhir ditegakkan pasca persalinan serta tindakan segera yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium lengkap, USG dan pemberian obat antihipertensi untuk memperbaiki keadaan ibu dan mencegah terjadinya komplikasi dan Memberbaiki pola nutrisi ibu serta memberikan pengetahuan kepada ibu mengenai hipertensi gestasional.

Kesimpulan dari studi kasus dengan manajemen asuhan 7 langkah varney pendokumentasian dalam bentuk SOAP yakni pada pemantauan pertama sampai akhir penulis berharap semuanya berlangsung normal tanpa ada penyulit, tidak ditemukannya komplikasi atau masalah pada ibu dan bayinya.

Kata kunci : Asuhan Kebidanan Antenatal , Hipertensi Gestasional , 7 langkah Varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
LITERATURE REVIEW, NOVEMBER, 2020

Name : Srirezki Adriani
Reg. Number : 70400117014
Supervisor 1 : Anieq Munthi'ah Al Kautsar, S.ST, M.Keb
Supervisor 2 : Nurfaizah Alza, S.ST, M.Keb
Title : Antenatal Midwifery Care Management on Patients with Gestational Hypertension in 2020

Gestational hypertension (also spelled *trasiel hypertension*) is hypertension that occurs mostly in pregnancy without the sign of proteinuria. This type of hypertension will mostly disappear 3 months after postpartum. The sign of this hypertension is the occurrence of preeclampsia without proteinuria.

The methodological approach taken in this study was literature review. Various related references such as books and journals were collected to be used as research data to investigate antenatal midwifery care management on patients with gestational hypertension. This study was conducted by utilising the 7-stages of Varney midwifery care management approach and SOAP documentation procedures.

Based on the results of this research, it was apparent that gestational hypertension is an increase of blood pressure in pregnant women which is felt up to 12 weeks of postpartum. The treatments that could be done for patients with gestational hypertension are conducting complete laboratory and ultrasound examination and administering antihypertensive drugs to the patients. The latter was done to improve the condition of the patients and to prevent complications. In addition, the patients' nutrition should be fulfilled during pregnancy. Therefore, knowledge and information related to gestational hypertension should be given by health workers.

This research concludes that the treatments given to patients with gestational hypertension should be in accordance with the appropriate standards of midwifery care. With appropriate treatments, the patients with gestational hypertension could be treated and cured without any complications.

Key words: Antenatal Midwifery Care Management, Gestational Hypertension, 7-stages of Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan merupakan fertilisasi bertemunya sel telur (ovum) wanita dengan sel Benih (spermatozoa) pria. Kemudian dilanjutkan dengan pembelahan sel (zigot) dari hasil pembuahan, kemudian setelah terjadi pembelahan zigot tahap selanjutnya adalah Nidasi atau implantasi zigot pada dinding saluran reproduksi. Normalnya implantasi terjadi pada lapisan endometrium dinding kavum uteri. Dari pertumbuhan dan perkembangan zigot-embrio-janin menjadi bakal individu baru (Icesmi sukami k, 2013)

Kehamilan merupakan salah satu keadaan fisiologis, tetapi ada beberapa keadaan yang menyebabkan kehamilan penuh dengan ancaman. Salah satunya penyakit yang sering mengancam kehamilan adalah hipertensi dalam kehamilan keadaan ini dapat menyebabkan morbiditas pada janin (termasuk pertumbuhan janin terhambat di dalam rahim, kematian janin dalam rahim dan kelahiran prematur) serta morbiditas pada ibu (termasuk kejang eklamsi, pendarahan otak, edema paru, gagal ginjal akut, dan penggumpalan darah di dalam pembuluh darah) bahkan dapat menyebabkan kematian ibu (Prawiharjo, 2014: 557)

Hipertensi adalah tekanan darah sekurang-kurangnya 140 mmHg systolic atau 90 mmHg diastolic pada dua kali pemeriksaan berjarak 4-6 jam pada wanita yang sebelumnya normotensi. Bila ditemukan tekanan darah tinggi $\geq 140/90$ mmHg pada ibu hamil, lakukan pemeriksaan Kadar protein urin dengan tes celup

atau protein urin 24 jam dan tentukan diagnosis. (Kementrian kesehatan Republik Indonesia, 2013)

Hipertensi merupakan salah satu masalah medis yang kerap kali muncul selama kehamilan dan dapat menimbulkan komplikasi pada 2-3% kehamilan. Hipertensi pada kehamilan dapat menyebabkan kejang eklamsi, pendarahan otak, edema paru(cairan di dalam paru), gagal ginjal akut, dan penggumpalan atau pengentalan darah di dalam Rahim, kematian janin dalam Rahim, solusio plasenta/terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya, dan dapat menyebabkan kelahiran premature. Selain itu hipertensi pada kehamilan juga masih merupakan sumber utama penyebab kematian pada ibu. (Basri et al., 2018).

Hipertensi dalam kehamilan adalah hipertensi yang terjadi pada saat kehamilan dimana secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi yang terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu dan hipertensi yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu, bahwa yang dimaksud dengan hipertensi yaitu tekan darah $\geq 140/90$ mmHg.

Hipertensi Gestasional adalah hipertensi tanpa proteinuria yang timbul setelah kehamilan 20 minggu dan menghilang setelah persalinan. Diagnosis pada Hipertensi Gestasional adalah $\geq 149/90$ mmHg, tidak memilih riwayat hipertensi sebelum hamil, tekanan dara normal di usia kehamilan ≤ 12 minggu, tidak ada proteinuria (diperiksa dengan tes celup urin), dapat disertai dengan tanda dan gejala preeklamsia, seperti nyeri ulu hati, dan trombositopenia. (Kementrian kesehatan Republik Indonesia, 2013)

Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5-15% penyulit kehamilan dan merupakan salah satu dari tiga penyebab tertinggi mortalitas dan morbiditas ibu bersalin. Di Indonesia mortalitas dan morbiditas hipertensi dalam kehamilan juga masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh etimologi yang tidak jelas, juga perawatan dalam persalinan yang masih ditangani oleh petugas nonmedis dan sistem rujukan yang masih belum sempurna. (Prawiharjo, 2014: 531)

Prevalensi hipertensi yang diinduksi kehamilan diantara wanita yang dirawat di rumah sakit adalah 33 (7,9%), dimana 5 (15,2%) adalah hipertensi gestasional, 12 (36,4%) adalah preeklamsia ringan, 15 (45,5%) adalah preeklamsia berat dan 3% adalah eklampsia. Dari 33 kasus, hasil kelahiran menunjukkan 8 (24,2%) memiliki berat badan lahir rendah dan hanya 2 (6,1%) adalah neonatus dengan berat lahir sangat rendah, 3 (9,1%) masih lahir, 6 (1,4%) mengalami asfiksia lahir, 17 (51,5%) adalah persalinan prematur dan 7 (21,2%) bayi dirawat diunit perawatan intensif neonatal, sementara 3 (9,1%) adalah kematian neonatal.

Prevalensi hipertensi yang diinduksi kehamilan diantara wanita yang menghadiri layanan persalinan adalah 7,9%. Hasil kelahiran buruk dari hipertensi yang diinduksi kehamilan, 24,2% adalah berat badan lahir rendah dan hanya 6,1% adalah bayi berat lahir sangat rendah dan 9,1% adalah kelahiran mati. (Schneider et al., 2019)

Di Indonesia hipertensi pada kehamilan menjadi satu diantar tiga penyebab kematian dan kesakitan ibu bersalin. Dari 440 kabupaten dan 33 provinsi yang ada di Indonesia ditemukan ibu hamil dengan hipertensi 12, 7%(1062 orang). Dari

jumlah kasus ditemukan paling banyak di provinsi Sumatra selatan (18,0%). Persentase hipertensi pada kelompok umur < 18 dan >35 tahun (kelompok usia resiko tinggi terjadinya eklamsia) sebesar 24,3% (Riset Kesehatan Dasar, 2018)

Eklampsia merupakan salah satu penyumbang angka kematian ibu ditahun 2017 berkurang 41 kasus, dibanding dengan tahun 2016. Penurunannya sebesar 26 persen dan pada tahun 2018 tercatat jumlah kematian ibu di provinsi Sulawesi Selatan mencapai 115 kasus. Kasus tersebut dijumpai di Rumah Sakit Umum dengan persentase 79, 13% atau sebanyak 91 kasus. Kemudian terjadi di rumah dengan 9 kasus atau sekitar 7,83%, lalu ditemukan di puskesmas dengan 7 kasus atau 6,08%, di jalan 5 kasus atau 4,35%, di pustu 2 kasus atau 1,74% dan rumah bersalin 1 kasus atau 0,87%.

Berdasarkan data Dinkes Sulawesi Selatan terdapat 11 kabupaten yang angka kematian ibu dan bayi tertinggi yakni Gowa di urutan pertama, Bone posisi kedua, Jeneponto posisi ketiga dan Bulukumba, Pangkep dan Luwu adalah posisi ke empat. Lalu posisi ke Lima ada Sinjai, Maros, Toraja sedangkan Luwu utara dan Makassar merupakan urutan ke enam. Salah satu penyebab kematian ibu di Sul-Sel disebabkan oleh hipertensi gestasional. (Dinas kesehatan Sulawesi Selatan, 2018)

Ibu hamil yang dengan komplikasi hipertensi gestasional berdasarkan data yang diperoleh dari salah satu pusat kesehatan masyarakat yaitu Puskesmas Batua Raya di dapatkan data yang diperoleh dari ruangan KAI Puskesmas Batua Raya, menunjukkan jumlah kasus hipertensi gestasional tahun 2018 terdapat 10 kasus dan pada tahun 2019 terdapat 7 kasus. (Puskesmas Batua Raya, 2020)

Meski saat ini penyebab pasti dari hipertensi belum diketahui dengan pasti, banyak teori telah dikemukakan tentang kejadian hipertensi dalam kehamilan tetapi tidak ada satupun dari teori tersebut yang dianggap mutlak besar. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kekurangan defisiensi gizi berperan dalam terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Defisiensi kalsium yang dapat terjadi pada ibu hamil dapat mengakibatkan terjadinya resiko hipertensi pada kehamilan. (Prawiharjo, 2014: 532)

Kebutuhan kalsium meningkat pada saat kehamilan karna digunakan sebagai cadangan kalsium ibu yang berfungsi membentuk jaringan baru pada janin. Selain penting bagi kesehatan tulang ibu dan janin, asupan kalsium yang cukup dapat mengurangi kejadian hipertensi (Kodyat, 2014)

Menurut penelitian yang dilakukan lutfiatunnisa, faktor lain yang terbukti berhubungan dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan yaitu tingkat pengetahuan, riwayat hipertensi, status gizi sebelum hamil, penambahan berat badan yang berlebih saat kehamilan, konsumsi lemak dan konsumsi kalsium. (Lutfiatunnisa et al., 2016)

Selain defisiensi kalsium ada beberapa penelitian yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dalam kehamilan diantaranya primigravida, kehamilan kembar, umur yang ekstrim riwayat keluarga yang Perna mengalami preeklmsia/eklamsia, penyakit hipertensi yang sudah ada saat sebelum hamil, dan obesitas.

Obesitas adalah suatu keadaan dimana terjadi penimbunan lemak yang berlebih dari jaringan lemak tubuh dan dapat menimbulkan beberapa penyakit.

Terjadinya resistansi leptin merupakan penyebab yang mendasari beberapa perubahan hormonal, metabolik, neurologi, dan hemodynamic pada hipertensi pada obesitas. (Kesehatan et al., 2017)

Berdasarkan penelitian dari Sumiati, dkk menyatakan bahwa obesitas dapat mempengaruhi kejadian preeklamsia pada kehamilan. Hal tersebut juga dikuatkan dalam teori pada buku Prof. dr. IBG Manuaba, SpOG, bahwa dijumpai beberapa faktor yang mempengaruhi preeklamsia, diantaranya primigravida, penyakit yang menyertai kehamilan seperti diabetes melitus, kegemukan, usia ibu diatas 35 tahun.

Di dalam pernyataan tersebut telah disebutkan salah satu faktor yang menyebabkan hipertensi yakni kegemukan, karena seseorang dengan berat badan berlebih (Obesitas), cenderung memiliki penyakit penyerta diantaranya hipertensi, stoker, diabetes, jantung koroner, gagal jantung, sampai dengan gagal ginjal. Dikarenakan seseorang dengan obesitas akan mempengaruhi proses metabolisme dalam tubuh, proses pernapasan, dan semua kerja organ dapat dipengaruhi, akibat obesitas, terutama pendarahan. Eklamsi akan terjadi dikarenakan karena preeklamsia yang tidak tertangani. Sedangkan hipertensi gestasional yang juga tidak dapat ditangani cara maksimal yang juga dapat menyebabkan preeklamsia yang akan berkembang menjadi eklamsia. (Kehamilan et al., 2012)

B. Ruang lingkup

Ruang lingkup penulisan literature review ini adalah manajemen kasus dengan Judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Dengan Hipertensi Gestasional Tahun 2020”

C. Tujuan penulis

Adapun tujuan penulisan literatur review asuhan pada ibu hamil dengan hipertensi gestasional sebagai berikut:

1. Mengetahui informasi dari berbagai sumber mengenai data subjektif dan data objektif terkait faktor dan gejala terjadinya hipertensi gestasional.
2. Mengetahui informasi dari berbagai sumber mengenai diagnosis mengenai hipertensi gestasional.
3. Mengetahui informasi dari berbagai sumber mengenai komplikasi yang bisa timbul pada ibu dengan hipertensi gestasional.
4. Mengetahui informasi dari berbagai sumber mengenai kondisi emergensi yang dapat terjadi serta penanganan pada ibu dengan hipertensi gestasional.
5. Mengetahui informasi dari berbagai sumber mengenai simpulan dari berbagai sumber tentang intervensi apa saja / penatalaksanaan yang tepat pada ibu dengan hipertensi gestasional
6. Mengetahui informasi dari berbagai sumber mengenai penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke implementasi asuhan pada ibu dengan hipertensi gestasional
7. Mengetahui informasi dari berbagai sumber mengenai penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber yang menjadi dasar evaluasi pada ibu dengan hipertensi gestasional

D. Manfaat penulisan

1. Bagi penulis

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir jenjang pendidikan DIII Kebidanan UIN Alauddin Makassar.
- b. Memperoleh pengalaman berharga dan menambah pengetahuan dalam penerapan Asuhan Kebidanan pada ibu Hamil dengan hipertensi sehingga dapat mempraktikkan teori-teori yang dipelajari.

2. Bagi institusi

Sebagai literature dan referensi bagi mahasiswa kebidanan dalam rangka peningkatan pengetahuan.

3. Bagi praktisi

Sebagai sumber informasi agar dapat mengurangi mobilitas dan mortalitas pada persalinan dan memberikan masukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada klien dengan penerapan Manajemen Asuhan Kebidanan dengan hipertensi pada ibu hamil.

E. Metode penelitian

Studi pustaka

Yakni penyusun mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan profil kesehatan diantaranya buku, teks book, artikel, serta jurnal dan mengakses data melalui internet dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I, di Bab ini terdapat pendahuluan. Di mana Akan di uraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulis, tujuan penulis, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II, pada Bab ini tentang tujuan umum kehamilan (pengertian kehamilan, tanda dan gejala kehamilan, serta nutrisi dalam kehamilan), pengertian, etimologi, patafisiologi, Manifestasi klinis, pemeriksaan diagnostik, penatalaksanaan komplikasi dan yang terakhir membahas tentang proses Manajemen Asuhan Kebidanan (pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan dan Proses Manajemen Asuhan Kebidanan).

BAB III, yaitu telusuran *evidence based learning*, akan menguraikan tentang matriks 7 langkah varney, langkah I identifikasi datadasar, langkah II diagnosa aktual, langkah III diagnosa potensial, langkah IV tindakan segera dan kolaborasi, langkah V rencana tindakan, langkah VI penatalaksanaan dan langkah VII evaluasi.

BAB IV, Bab ini membahas tentang hasil telah *evidence based learning* 7 langkah varney berdasarkan hasil penelusuran referensi. Serta komplikasi kebidanan mengenai hipertensi gestasional.

BAB V, yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat dan literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang kehamilan

1. Kehamilan

Kehamilan merupakan proses alami yang dialami setiap wanita yang telah mengalami menstruasi, kehamilan merupakan penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi, pertumbuhan janin, hingga lahirnya bayi. Kehamilan normalnya berlangsung dalam jangka waktu 40 minggu atau 9 bulan jika dilihat dari kalender internasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa kehamilan merupakan pertemuan antara sel telur dan sperma di dalam atau di luar Rahim dan berakhir dengan keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir.

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, lama hamil normal yaitu 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Pembagian kehamilan dibagi menjadi 3 trimester yang pertama trimester I, dimulai dari konsepsi sampai tiga bulan (0-12 minggu), trimester II, dimulai dari bulan ke empat sampai bulan ke enam (13-28 minggu), dan trimester III, di mulai dari bulan tujuh sampai bulan kesembilan (29 minggu-42 minggu). (Fatimah & Nuryaningsih, 2018)

2. Proses terjadinya kehamilan

Fertilisasi atau biasa disebut juga dengan konsepsi merupakan suatu kejadian penyatuan antara sel telur dan sel Mani/sperma di tuba falopii. Pada saat pria dan wanita melakukan hubungan seksual (bersenggama/*coitus*), dengan ejakulasi sperma dari saluran reproduksi pria di dalam vagina, Akan dilepaskan

cairan Mani/sperma yang berupa sel-sel sperma ke dalam saluran reproduksi wanita.

Proses fertilisasi dimulai dari pada saat spermatozoa bergerak menuju vagina ke dalam Rahim, masuk ke saluran tuba. Perjalanan ini dipengaruhi oleh peran dari kontraksi myometrium dan dinding tuba yang juga terjadi saat senggama.

Ovum yang keluar dari ovarium yang kemudian ditangkap oleh fimbriae dengan umbai pada ujung proksimalnya dan kemudian dibawa ke tuba falopii. Setelah ovum telah dikeluarkan maka folikel mengempis dan membentuk korpus luteum setelah itu terjadi maka ovum siap untuk dibuahi sperma yang dapat mencapainya.

Dari 60-100 juta sperma yang dilepaskan pada saat ejakulasi ke dalam vagina pada saat ovulasi, ada beberapa yang dapat menembus saluran heliks pada mucus serviks sehingga dapat mencapai rongga uterus, beberapa dapat melewati pintu masuk tuba falopii yang kecil dan beberapa diantaranya yang dapat hidup sampai mencapai ovum yang berada pada ujung fimbria tuba falopii. Hal tersebut karena dalam beberapa jam protein plasma dan lipoprotein yang terkandung dalam sel air Mani diluruhkan yang dapat disebut dengan reaksi kapitalis.

Selanjutnya setelah reaksi kapitalis, sperma mengalami reaksi akrosom, reaksi ini terjadi ketika sperma mendekat dengan oosit. Pada saat sperma telah mencapai Oost (sel telur/ovum), terjadi reaksi zona atau reaksi cortical (pemblokkan sperma lain) pada selaput zona pelusida (lapisan pelindung sel telur), Oost menyelesaikan pembelahan miosis (pembelahan sel) keduanya,

menghasilkan Oost definitif yang kemudian menjadi pro nukleus (mengandung DNA) wanita. Inti sel sperma membesar membentuk pro nukleus pria, kemudian ekor sel sperma terlepas dan ber degenerasi. Peonukleus pria dan wanita masing bersatu sehingga membentuk zigot yang memiliki jumlah DNA genap atau diploid.

Hasil utama dari pembuahan yang telah dialami yaitu penggenapan jumlah kromosom dari penggabungan DNA dari ayah dan ibu menjadi suatu bakal baru dengan jumlah kromosom genap/diploid. Penentuan jenis kelamin dari hasil penggabungan tersebut tergantung dari X dan Y yang dikandung oleh sperma yang membuahi ovum. Dan setelah itu di sinilah menjadi permulaan pembelahan dan tingkat-tingkat pembentukan dan perkembangan emrio.

Setelah itu masuklah kita pada masa di mana zigot mulai menjalani pembelahan awal mitosis (pembagian sel) hingga beberapa kali. Sel-sel yang dihasilkan dari proses pembelahan berukuran lebih kecil dari ukuran induknya yang biasa disebut blastomer. Setelah 3-4 kali pembelahan zigot memasuki tingkat morulah atau sel yang terbelah hingga 16 sel, yakni pada hari ke 3-4 setelah terjadi fertilisasi.

Morula terdiri dari kumpulan sel-sel yang terbelah di dalam yang akan menjadi jaringan-jaringan embrio hingga menjadi janin (*inner cell mass*) dan lapisan luar sel yang kemudian akan tumbuh menjadi trafoblas hingga plasenta (*out cell mass*).

Kira-kira pada hari ke 5-6 setelah rongga *inner cell mass* merembes cairan yang hingga mencapai dan menembus zona polusida, membentuk ruang antara

sel. Ruang antara sel ini kemudian menyatu hingga memenuhi sebagian besar massa dari zigot membentuk rongga yang bernama blastocysts (sel bulat berongga). Inner sel yang tetap berkumpul membentuk satu sisi yang tetap berbatasan dengan lapisan dari sel telur. Pada tahap ini disebut dengan embrioblas dan *outer cell mass* disebut tropoblas.

Setelah terjadinya pembelahan sel pada zigot tahap selanjutnya adalah implantasi atau biasa juga disebut sebagai nidasi yaitu masuknya atau tertanamnya konsepsi ke dalam endometrium. Pada akhir minggu pertama yaitu hari ke 5-7 zigot telah mencapai vakum uteri. Pada saat itu keadaan uterus telah mencapai sekresi lendir di bawah pengaruh progesterone dari korpus luteum yang masih aktif. Sehingga lapisan endometrium yang berada di dinding Rahim menjadi kaya pembuluh darah dan banyak muara kelenjar selaput lendir rahim yang terbuka dan aktif.

Kontak antara zigot dan tingkat blastosista dengan dinding rahim pada keadaan tersebut mencetuskan berbagai reaksi seluler, sehingga sel-sel trofoblas zigot tersebut menempel dan mengadakan infiltrasi pada lapisan epitel endometrium uterus. (terjadi implantasi).

Setelah implantasi, sel-sel dari trofoblas tertanam pada endometrium yang terus berkembang membentuk jaringan bersama sistem pembuluh darah maternal untuk membentuk plasenta yang kemudian berfungsi sebagai sumber nutrisi dan oksigenasi bagi jaringan embrioblas yang tumbuh menjadi janin. (Marmi, 2011)

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan proses kehamilan dalam firman Allah SWT QS. Al-Mu'Min/23:12-14

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢٠﴾ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٢١﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٢٢﴾

Terjemahnya:

“Dan, sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian, Kami jadikan saripati itu air Mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air Mani itu Kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus daging. Kemudian, Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah, Pencipta paling baik” (Kementerian Agama RI, 2012, H: 330).

Setelah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keberuntungan orang-orang orang mukmin dengan aneka sifat mereka yang terpuji, kini ayat-ayat di atas menjelaskan proses kejadian manusia. Uraian tentang proses pilih tersebut yang demikian mengagumkan membuktikan perlunya beriman dan tunduk kepada Allah Sang Pencipta serta mengharuskan mengikuti jejak orang-orang mukmin yang disebut pada ayat-ayat kelompok pertama. Hal itulah yang dapat mengantarkan manusia mencapai kesempurnaan hidup duniawi dan ukhrawi.

Ayat ini lebih kurangnya menyatakan: *Dan sesungguhnya bersumpah bahwa Kami telah menciptakan manusia*, yakni jenis manusia yang kamu saksikan, bermula *dari suatu saripati yang bersal dari tanah*. Kemudian kami menjadikannya, yakni saripati itu, *nuthfab* yang disimpan dalam tempat yang kukuk, yakni rahim ibu. Kemudian kami ciptakan yakni jadikan, *nuthfab*

itu'alaqah, lalu kami ciptakan yakni, yakni jadikan, alaqah itu mudigah yang merupakan suatu yang kesil sekerat daging, lalu kami ciptakan, yakni jadikan mudigah itu tulang belulang, lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian kami, mewujudkannya, yakni tulang yang terbungkus daging itu yang menjadi-setelah kami meniupkan ruh ciptaan kami kepadanya-mahluk lain dari pada yang lain yang sepenuhnya berbeda dengan unsur-unsur kejadiannya yang tersebut di atas bahkan berbeda dengan mahluk-mahluk lainnya.

Tanda-tanda kehamilan:

- a. Tanda pasti kehamilan
 - 1) Pemeriksaan obstetri
 - a) Mendengar denyut jantung fetus

Pada keadaan normalnya denyut jantung berkisaran 140-160/menit yang dapat di dengar melalui fetostetoskop dimulai dari usia kehamilan 17-19 minggu atau dengan alat Doppler mulai dari usia kehamilan 10-12 minggu. Kecuali mendengar denyut jantung fetus (janin), pada kehamilan lanjut dapat didengar beberapa bunyi dan beberapa bising yaitu sebagai berikut:

(1) Bising tali pusat

Bising tali pusat terdengar sebagai bunyi meniup yang sesuai dengan nadi fetus dan disebabkan oleh tali pusat yang tertekan. Bising akan hilang jika sikap ibu akan berubah.

(2) Bising rahim

Bising rahim terdengar seirama dengan nadi ibu yang terdengar pada bagian bawa rahim. Bising rahim disebabkan karena adanya darah yang

melalui vena uterine yang membesar. Bising ini juga terdengar jika vakularisasi (pembuluh darah yang bertambah) uterus sangat bertambah, misalnya pada miom yang besar atau neoplasma ovarium yang besar.

(3) Bising usus

Bising usus disebabkan karena adanya udara atau cairan yang melalui Usus Ibu.

(4) Bunyi aorta

Bunyi aorta terdengar seirama dengan nadi ibu.

(5) Bunyi gerakan fetus

b) Melihat dan meraba gerakan fetus.

Gerakan fetus dapat diraba dan dilihat pada usia kehamilan 20 minggu atau lebih.

2) Pemeriksaan ultrasonography

Kantung kehamilan mulai dapat dideteksi pada usia kehamilan antar 5-6 minggu, katup fetus mulai dideteksi pada usia kehamilan 6-7 minggu, gerakan jantung fetus dapat dilihat pada usia kehamilan 7 minggu dan gerakan anggota badan serta gerakan dada terlihat pada usia kehamilan 9 minggu.

3) Pemeriksaan elektrokardiograf.

Jika fetus masih hidup, pada kehamilan muda terkadang dapat terlihat elektrokardiogram fetus.

4) Pemeriksaan radiologi

Pada usia kehamilan 14 minggu fokki ossifikasi fetalis suda dapat terlihat. Rontgenografi dapat dilakukan jika fetus telah meninggal.

b. Tanda tidak pasti kehamilan

1) Tanda hegar

Pada pemeriksaan bimanual dengan meletakkan 2 jari pada forniks posterior dan tangan lainnya pada dinding perut di atas simpisis pubis, maka korpus uteri seakan-akan terpisah dari serviks uteri karena isthmus uteri yang sangat lunak. Tanda inilah yang di sebut tanda Hager dan terdapat pada usia kehamilan antara 6-8 minggu setelah menstruasi terakhir.

2) Tanda goedel

Pada usia kehamilan antara 6-8 minggu serviks uteri biasanya teraba sangat lunak, yang diberi nama tanda Goedel. Pemakaian kontrasepsi estrogen-progesterone dapat menyebabkan serviks uterus menjadi sangat lunak. Sedangkan pada kehamilan dengan adanya inflamasi atau karsinoma serviks uteri, servikuteri tetap dalam keadaan kaku.

3) Kontraksi Braxton hicks

Uterus gravidus yang berkontraksi yang tidak teratur dan tidak disertai dengan adanya rasa nyeri disebut kontraksi Braxton hicks. Pada perabaan uterus yang awalnya lunak menjadi keras. Kontraksi yang mirip kadang-kadang terdapat pada hematomata dan juga pada mina uteri yang

lunak. Adanya kontraksi Braxton hick's pada kehamilan bukanlah kehamilan ectopic.

4) Tanda piskacek

Tanda piskacek ialah suatu pembesaran uterus yang tidak rata karena uterus yang berkembang sangat cepat pada tempat implantasi zigot. Tanda piskacek seringkali sulit dibedakan dengan kehamilan ectopic pada parsintestinalis tuba yang belum terganggu.

5) Ballottement

Ballottement yaitu keadaan di mana jika uterus digoyangkan maka fetus yang ada di dalam uterus melenting disebabkan keadaan fetus yang masih kecil dengan air ketuban yang massanya lebih banyak, keadaan seperti ini didapati ketika usia kehamilan mencapai 20 minggu. Dengan adanya lentingan pada fetus maka ballottement ini dapat disebut ballottement in toto untuk dibedakan dengan balloteine, yang ditimbulkan kepala fetus saja pada kehamilan lanjut.

6) Pembesaran perut

Setelah kehamilan 12 minggu uterus biasanya dapat diraba dari luar diatas simpfisis pubis dan pembesaran perut mulai tampak. Adapun tinggi fundus uteri pada kehamilan yaitu sebagai berikut:

- a) Akhir bulan ke 4 : fundus uteri 1-2 jari diatas simpfisis,
- b) Akhir bulan ke 5 : fundus uteri 2-3 jari di bawah pusat,
- c) Akhir bulan ke 6 : fundus uteri setinggi dengan pusat,
- d) Akhir bulan ke 7 : fundus uteri 2-3 jari di atas pusat,

- e) Akhir bulan ke 8 : fundus uteri pertengahan pusat dan proses sifoideus,
- f) Akhir bulan ke 9 : fundus uteri sampai ke arkus kostarum,
- g) Akhir bulan ke 10: fundus uteri 1-2 jari dibawa arkus kostarum atau setinggi akhir bulan ke 8.

7) Uji endokrin

Yaitu adanya khoriogonadotropin (HCG) dalam plasma dan urin dari ibu yang merupakan dasar untuk melakukan uji kehamilan, tetapi uji kehamilan ini bukan merupakan sebagai petunjuk absolut tentang ada tidaknya suatu kehamilan. (Unit et al., 2009)

c. Kebutuhan fisik ibu hamil trimester I, II, dan III.

1) Oksigen

Peningkatan jumlah progesterone selama kehamilan dapat mempengaruhi pernapasan, CO₂ menurun dan O₂ meningkat, peningkatan O₂ sangat bermanfaat bagi janin. Kehamilan menyebabkan hiperventilasi, di mana keadaan CO₂ menurun. Pada trimester III, janin membesar dan menekan diafragma, menekan vena cava inferior, yang yang menyebabkan nafas pendek.

2) Nutrisi

a) Kalori

Pada ibu hamil jumlah kalori yang dibutuhkan setiap harinya yaitu sebesar 2500 kalori. Jumlah kalori yang berlebihan dapat menyebabkan obesitas pada ibu yang dapat menyebabkan hipertensi. Pertambahan berat badan normalnya 10-12 kg selama masa kehamilan.

b) Protein

Pada ibu hamil jumlah protein yang diperlukan oleh ibu hamil yaitu 86 gram per hari. Sumber protein dapat ditemukan dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan dan juga dapat ditemukan pada sumber makanan hewani seperti ikan, ayam, keju, Susu, dan telur. Mal protein dapat menyebabkan kelahiran prematur, anemia dan edema.

c) Kalsium

Pertambahan kalsium pada ibu hamil adalah 1, 5 kg per hari. Dalam pertumbuhan janin kalsium sangat dibutuhkan terutama bagi pengembangan otot dan rangka. Sumber kalsium sangat mudah diperoleh contohnya dari Susu, keju, yogurt, dan kalsium karbonat. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan reteksia pada bayi atau osteomalasia.

d) Zat besi

Asupan zat besi diperlukan untuk ibu hamil dengan jumlah 39 mg/hari terutama ketika telah memasuki trimester kedua. Pemberian zat besi yang diberikan pada ibu hamil berupa *ferrous glucometer*, *ferrous fumarat*, dan *ferrous sulphate*. Kekurangan zat besi pada ibu hamil dapat menyebabkan anemia defisiensi zat besi.

e) Asam folat

Asam folat yang dibutuhkan ibu hamil dalam sehari sebesar 400 Mg. ibu hamil yang kekurangan asam folat dapat menyebabkan anemia megaloblastik pada ibu hamil.

f) Air

Kebutuhan air ini terkadang sering dilupakan, sedangkan air itu sendiri berfungsi untuk membantu sistem pencernaan dan membantu proses transportasi. Selama kehamilan terdapat perubahan nutrisi dan cairan pada membran sel. Air dapat menjaga keseimbangan sel darah, darah, getah bening, dan cairan vital tubuh lainnya. Air juga menjaga keseimbangan suhu tubuh karena itu kita dianjurkan untuk minum 6-8 gelas/hari atau 1500-2000 ml. Dan bila perlu ibu hamil harus mengonsumsi Susu dan jus sekali sehari. Dan sebaiknya bagi ibu hamil agar sebisa mungkin untuk membatasi mengonsumsi minuman yang mengandung kafein seperti teh, cokelat, kopi serta minuman yang mengandung pemanis buatan (sakarin) dikarenakan bahan seperti ini memiliki reaksi silang terhadap plasenta. (Asrina et al., 2010)

d. Peningkatan berat badan selama hamil

Normal kenaikan berat badan pada saat kehamilan meningkat hingga 6-16 kg, terutama sejak pertumbuhan isi konsepsi dan volume organ/cairan intrauterine. Berat janin ditambah dengan 2.5-3.5 kg, ditambah berat plasenta 0.5kg, ditambah cairan amnion 1.0 kg, berat uterus 1.0 kg, penambahan volume sirkulasi maternal 1.5 kg, pertumbuhan mammae 1.0-1.5 kg, penumpukan cairan interstitial di pelvis dan ditambah dengan ekstremitas 1.0-1.5kg. (Icesmi sukami k, 2013)

1) Kenaikan berat badan yang banyak

Kenaikan berat badan yang terlalu berlebih pada ibu hamil juga tidak baik bagi ibu dan calon bayi. Kemungkinan yang akan dialami ibu yang memiliki

kenaikan berat badan yang berlebihan diantaranya akan mengalami resiko penyakit jantung, hipertensi, diabetes kehamilan, dan masalah pernafasan. Dampak yang di alami ketika persalinan bayi bisa menjadi terlalu besar sehingga sulit lahir secara paravaginal, dan jika dilakukan Beda creaser, kelebihan lemak akan mempersulit pembedahan.

Bayi juga dapat mengalami resiko spina bifida dan cacat batang saraf, dan menurut beberapa penelitian keadaan ini juga dapat meningkatkan resiko kanker payudara jika bayi yang dikandung berjenis kelamin perempuan. Ibu dengan berat badan berlebih juga dapat berakibat memiliki bayi besar dan semakin besar bayi semakin banyak trauma yang di alami pada regon panggul.

2) Kenaikan berat badan yang terlalu sedikit

Kenaikan berat badan yang terlalu sedikit pada ibu hamil juga memiliki beberapa resiko pada calon bayi. Bayi dari ibu yang memiliki kenaikan berat badan kurang dari 10kg selama masa kehamilannya, kemungkinan besar bayi dapat lahir secara prematur, bayi juga mengalami kecil kehamilan. Bayi yang lahir kurang dari 3000-2500 kg memiliki resiko angka lahir mati yang lebih tinggi, perkembangan yang buruk, keterbelakangan mental, dan intelegensi yang rendah.

Gizi yang tidak memadai dapat menimbulkan resiko masalah pertumbuhan atau keterbatasan janin. Kenaikan berat badan yang tidak memadai dikaitkan dengan masalah pernapasan, kesulitan berjalan dan bahkan palsy serebral. Selain itu perempuan yang diet selama hamil mengalami kesulitan untuk pemberian ASI dikarenakan tidak cukup lemak yang dapat digunakan untuk memproduksi ASI. (Francis-Cheung, 2008)

B. Tinjauan umum tentang hipertensi dalam kehamilan

1. Pengertian

Hipertensi dalam kehamilan adalah hipertensi yang terjadi ketika hipertensi pertama kali terdeteksi pada ibu yang diketahui memiliki tekanan darah normal (normotensive) setelah 20 minggu kehamilan tanpa adanya proteinuria yang signifikan atau ciri-ciri preeklamsia lainnya. Hipertensi dalam kehamilan terjadi apabila tekanan darah mencapai 140/90 mmHg atau lebih saat kehamilan. Diagnosis untuk menegakkan hipertensi dalam kehamilan yaitu dengan melakukan pengkajian riwayat kesehatan, pengukuran tekanan darah yang berulang, pengukuran tekanan darah dilakukan minimal 2 kali dengan selang waktu 4 jam, urinalis, edema dan peningkatan berat badan yang berlebihan.

Hipertensi merupakan tanda terpenting guna menegakkan diagnosa hipertensi dalam kehamilan. Tekanan diastolic menggambarkan besaran curat jantung. Pada preeklamsia peningkatan reaktivitas vascular dimulai umur kehamilan 20 minggu, Tetapi hipertensi dideteksi umumnya pada trimester II. Tekanan darah yang tinggi pada preeklamsia bersifat labil dan mengikuti irama sirkadian normal (proses internal yang mengatur siklus tidur bangun).

Hipertensi dalam kehamilan tidak seperti yang terjadi pada umumnya tetapi mempunyai kaitan erat dengan kesakitan dan kematian yang tinggi baik pada janin maupun pada ibunya. Hipertensi dalam kehamilan yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi preeklamsia yang dapat meningkatkan morbiditas (sakit) pada ibu dan janin. Morbiditas pada ibu terjadi kejang eklamsia,

pendarahan otak, edema paru, gagal ginjal akut, dan penggumpalan darah di dalam pembuluh darah.

Selain morbiditas pada ibu, hipertensi dalam kehamilan juga mengakibatkan morbiditas pada janin, seperti pertumbuhan janin terhambat di dalam rahim, kematian janin dalam rahim, solusio plasenta, dan kelahiran prematur.

2. Klasifikasi hipertensi dalam kehamilan

Klasifikasi diagnosa jenis hipertensi dalam kehamilan adalah sebagai berikut:

- a. Hipertensi kronik adalah hipertensi yang timbul sebelum usia kehamilan 20 minggu atau hipertensi yang pertama kali di diagnosa setelah umur kehamilan 20 minggu dan hipertensi menetap sampai 12 minggu pasca persalinan.
- b. Preeklamsia adalah hipertensi yang timbul setelah 29 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria.
- c. Eklamsia adalah preeklamsia yang disertai kejang-kejang atau dapat sampai menyebabkan koma.
- d. Hipertensi kronik dengan *superimposed* preeklamsia adalah hipertensi kronik disertai tanda-tanda preeklamsia atau hipertensi kronik disertai proteinuria.
- e. Hipertensi gestasional (disebut juga *transient hypertension*) adalah hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa disertai dengan proteinuria dan hipertensi akan menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan atau kehamilan dengan tanda-tanda preeklamsia tetapi tanpa proteinuria. (Nurhidayati et al., 2018)

C. Tinjauan kasus tentang hipertensi gestasional

1. Definisi

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa adanya protein urin. Hipertensi gestasional ini juga bersifat sementara dan akan menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan. (Prawiharjo, 2014: 531)

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang terjadi pada usia kehamilan >20 minggu dan biasanya akan kembali normal setelah 6 minggu pasca persalinan. (Antonia Anna Lukito, Eka Harmeiwaty, 2019).

Hipertensi gestasional adalah hipertensi tanpa proteinuria yang timbul setelah kehamilan 20 minggu dan menghilang setelah persalinan. (Kementrian kesehatan Republik Indonesia, 2013)

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang di alami oleh ibu hamil yang memiliki tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih untuk pertama kalinya pada masa kehamilannya namun tidak di temukan protein urin. Hipertensi gestasional ini juga biasa di sebut dengan hipertensi transient bila tidak berkembang menjadi preeklamsia dan tekan darah kembali normal setelah 12 minggu post-partum. (Elya et al., 2016)

Hipertensi gestasional yaitu hipertensi tanpa proteinuria yang timbul setelah kehamilan 20 minggu dan hilang setelah persalinan. (Kementrian kesehatan Republik Indonesia, 2013)

Dalam kasus ibu Hamil dengan hipertensi gestasional mengalami kelainan. Kelainan selama masa kehamilan yang dapat membuat tubuhnya semakin lemah. Kondisi ini merupakan perkembangan jasmani yang wajar, Allah SWT tidak

menjadikan kehamilan sebagai hukuman tetapi sebagai karunia dan rahmat. Oleh karena itu, perempuan yang sedang hamil sangat di tuntut adanya ketulusan hati, kesediaan menderita, penuh kesabaran dan ketabahan, kepasrahan penuh pada Allah SWT dan penuh harapan akan rahmat-Nya serta tetap memenuhi kebutuhannya selama masa kehamilan seperti mengkonsumsi makanan yang baik bagi kesehatan sesuai dengan firman Allah SWT yang dijelaskan dalam firman Allah. QS. Al-Maryam/19: 26

فَكُلِّي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Maka makan dan minum serta bersenang hatilah. Jika engkau melihat seorang manusia maka katakanlah:” sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.”(Kementerian Agama RI, 2002, H: 244-246).

Malaikat Jibril, atau bayi Maryam, melanjutkan ucapannya guna memberikan ketenangan pada sang ibu dengan menyatakan *maka makan-lah* dari buah kurma yang berjatuh dari tangan ibu *dan minum-lah* dari air telaga itu *serta bersenang hatilah* dengan kelahiran anakmu itu. *Jika engkau melihat seorang manusia yang engkau yakini bahwa dia manusia lalu ia bertanya keadaanmu, maka katakanlah yakin berilah isyarat yang maknanya: “sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa, yakni menahan diri untuk berbicara demi, untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka karena adanya nazar itu hingga aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia hari ini.”* Ini karena jika engkau berbicara pasti panjang uraian

dan timbul aneka gugatan, sedang kami bermaksud membungkam siapa yang mencurigai mu.

Kata *qarri* terambil dari kata *qarri* dan *qarra* yang berarti *sejuk/dingin*. Kata ini bila dirangkaikan dengan kata *'ain/mata*, merupakan ungkapan tentang rasa bahagia dan senang serta kenyamanan hidup. Sementara ulama berkata, jika air mata terasa hangat, itu pertanda kesedihan, tetapi apa bila sejuk itu pertanda kegembiraan.

Bernazar untuk tidak berbicara merupakan salah satu Cara Budha yang dikenal pada masa lalu, termasuk oleh pada masa jahiliah. Sisa dari ibadah tersebut masih tampak hingga kini dalam bentuk mengheningkan cipta. Rasul saw, melarang melakukan puasa diam. Di sini, kata tersebut adalah *shaum* bagi kaum muslimin yang mengheningkan cipta, dan hendaknya melakukan atas dorongan ibadah dan hendaknya merangkaikan hening cipta itu dengan DOA agar kiranya arwah para syahadat ditempatkan Allah pada tempat sebaik-baiknya.

Allah Swt. Mengilhami Maryam as. Agar jangan bicara karena Allah bermaksud membungkam semua yang meragukan kesucian beliau melalui ucapan bayi yang dilahirkannya itu. Ini juga mengesahkan bahwa tidaklah terpuji berdiskusi dengan orang-orang yang hanya bermaksud mencari-cari kesalahan atau tidak jernih pemikiran dan hatinya. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Siapa yang meninggalkan pertengkaran padahal dia dalam posisi yang benar, Allah akan membangun untuknya istana di tengah surga, sedang siapa yang meninggalkannya karena memang dia salah, Allah membangun untuknya istana di pinggiran surga” (Shihab, 2012)

2. Faktor resiko

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi resiko terjadinya hipertensi gestasional yaitu sebagai berikut:

a. Primigravida

Grafid adalah wanita hamil, sedang primigravida adalah seorang wanita hamil untuk pertama kalinya. Mengapa primigravida dianggap sebagai salah satu faktor resiko mengalami hipertensi gestasional dalam sebuah teori yang mengatakan bahwa angka kejadian bagi primigravida lebih tinggi. Ada pun teori intoleransi imunologi yang menjelaskan bahwa dugaan imunologi berperan terhadap terjadinya hipertensi gestasional dapat dibuktikan bahwa primigravida mempunyai resiko yang lebih besar mengalami hipertensi gestasional jika dibandingkan dengan multigravida. Hal ini terjadi dikarenakan adanya respon imun menolak adanya hasil konsepsi yang bersifat asing, sehingga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya hipertensi gestasional.

b. Kehamilan kembar

Kehamilan kembar atau kehamilan ganda adalah kehamilan dengan dua janin atau lebih. Hipertensi banyak terjadi di karena kan kehamilan kembar, dilihat dari teori hiperplasentosis, kehamilan kembar memiliki resiko terjadinya preeklamsia. Kejadian preeklamsia pada kehamilan kembar dapat meningkat 4-5 kali dibandingkan dengan kehamilan tunggal. (Sutrimah et al., 2015)

c. Umur yang ekstrim

Kehamilan pada ibu yang berusia ekstrim yaitu < 20 tahun dan > 35 tahun termasuk dalam kehamilan beresiko tinggi yang dapat menyebabkan komplikasi

dalam kehamilan. Usia merupakan salah satu faktor resiko terjadi hipertensi dalam kehamilan. Ibu hamil yang berumur < 20 atau > 35 tahun mempunyai resiko 15,731 mengalami preeklamsia di bandingkan dengan ibu hamil yang berusia 20-35 tahun. (Saraswati, N., 2014)

Umur ibu yang terlalu muda < 20 tahun memiliki resiko tinggi mengalami hipertensi, hal ini di sebabkan karena segi biologis perkembangan alat-alat reproduksi yang belum optimal. Sedangkan pada ibu yang memiliki usia > 35 tahun telah terjadi proses degeneratif yang mengakibatkan perubahan seksual dan fungsional yang terjadi pada pembuluh darah perifer yang bertanggung jawab terhadap perubahan tekanan darah. (Cunnunghsm, F. garry, 2010)

Tingginya tekanan darah sejalan dengan bertambahnya usia, hal ini disebabkan karena perubahan struktur pada pembuluh darah besar, sehingga lumen menjadi sempit dan dinding pembuluh darah menjadi kaku dari sebelumnya, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya tekan darah systolic. Usia 20-35 tahun adalah usia yang cukup aman untuk melahirkan dengan resiko kesakitan dan kematian ibu yang paling rendah. (Sukfitrianty et al., 2016)

d. Riwayat keluarga pernah preeklamsia/eklamsia

Ibu hamil dengan riwayat keluarga yang pernah mengalami preeklamsia memiliki resiko 2,618 kali mengalami kejadian preeklamsia dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak memiliki riwayat keturunan keluarga. Preeklamsia merupakan penyakit yang diturunkan, penyakit ini banyak ditemukan pada anak perempuan dari ibu yang menderita preeklamsia atau memiliki riwayat

preeklamsia dalam keluarga. Faktor genetik merupakan faktor resiko terjadinya preklamsia. (Saraswati, N., 2014)

e. Penyakit hipertensi yang sudah ada sebelum hamil

Ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil sebelumnya memiliki resiko 6,026 kali mengalami kejadian preklamsia dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki riwayat hipertensi. (Saraswati, N., 2014)

Ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami *superimposed* preeklamsia. Hal ini karena hipertensi yang diderita sejak sebelum hamil menyebabkan kerusakan pada organ penting tubuh dan ditambah lagi dengan adanya kehamilan maka kerja tubuh bertambah berat sehingga dapat mengakibatkan gangguan/kerusakan yang lebih berat dengan timbulnya edema dan proteinuria. (Dewi, 2014)

f. Konsumsi kalsium

Konsumsi kalsium merupakan faktor resiko hipertensi pada kehamilan. Ibu hamil yang mengonsumsi kalsium yang kurang memiliki resiko empat kali mengalami hipertensi kehamilan dibandingkan dengan ibu yang mengonsumsi kalsium yang cukup. Peran kalsium sangat penting dan perlu diperhatikan karena kekurangan kalsium dalam diet dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi. Ibu hamil memerlukan sekitar 2-2,5% kebutuhan kalsium. Kalsium berfungsi untuk mempertahankan konsentrasi dalam darah pada aktivitas kontraksi otot. Kontraksi otot pembuluh darah sangat penting dikarenakan dapat mempertahankan tekanan darah. (Lutfiatunnisa et al., 2016)

g. Obesitas

Berikut ini adalah penjelasan lebih spesifik pada obesitas mengenai definisi, faktor yang menyebabkan obesitas, dampak serta hubungan hipertensi dengan obesitas adalah sebagai berikut:

1) Definisi obesitas

Obesitas adalah suatu keadaan di mana terjadi penimbunan lemak yang berlebihan di jaringan lemak tubuh dan dapat menimbulkan beberapa penyakit. Terjadinya resistansi leptin merupakan penyebab yang mendasari beberapa perubahan hormonal, metabolik, neurologi dan hemodynamic pada hipertensi pada obesitas. (Kesehatan et al., 2017)

Ibu hamil dengan $IMT \geq 30$ memiliki resiko tinggi lima kali lipat dibandingkan dengan ibu hamil yang memiliki *IMT underweight* $IMT < 18,5$ dan normal $IMT 18,5-24,9$. (Quedarusman et al., 2013).

Pada wanita hamil kelebihan berat badan yang normalnya tidak lebih tidak lebih dari 12,5 kg untuk rata-rata orang Indonesia. Kegemukan terbagi menjadi dua *overweight* yakni kondisi yang menunjukkan berat badan berlebih. Wanita dikatakan obesitas bila memiliki komposisi lemak tubuh lebih dari 25% dari berat badan, sedangkan laki-laki dikatakan *overweight* bila komposisi lemak tubuhnya lebih dari 20% berat badan. Sedangkan obesitas adalah kelebihan berat badan yang mencapai 120% di atas berat badan ideal (BBI).

2) Pada dasarnya obesitas yang dialami oleh seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

a) Genetik

Apabila dilihat sekilat, orang tua yang gemuk memiliki anak yang gemuk pula. Hal ini didasarkan pada saat ibu hamil maka unsur sel lemak yang ada dalam tubuh ibu yang berjumlah besar dan melebihi normal secara otomatis diturunkan pada janinnya. Hal ini mengakibatkan bayi lahir dengan unsur lemak besar pula di dalam tubuhnya.

b) Disfungsi salah satu bagian otak

Sistem pengontrol suatu makan di dalam tubuh manusia terletak pada hippocampus yaitu hippocampus laterals (menggerakkan nafsu makan) dan ventral medial (menghentikan nafsu makan) apa bila terjadi kerusakan pada salah satu sistem ini maka seseorang akan menderita kegemukan.

c) Pola makan yang berlebihan

Orang obesitas biasanya lebih responsive terhadap makanan dari pada normal. Hal ini baik dari rangsangan penglihatan terhadap makan. Orang yang obesitas makan makanan yang ia inginkan, bukan karena kebutuhan akibat lapar. Itulah sebabnya mengapa orang yang pola makanya berlebihan mengakibatkan ia lebih mudah gemuk.

d) Kurang gerak/kurang olahraga

Pada dasarnya tingkat pengeluaran kalori tubuh dipengaruhi oleh 2 faktor tingkat dan aktifitas olahraga secara umum dan angka metabolisme basal dan tingkat atau tingkat anergi yang di pertahankan untuk memelihara fungsi minimal

tubuh. Seseorang dengan olahraga yang teratur akan mengeluarkan kalori yang juga teratur, sehingga tanpa adanya kelebihan kalori yang apabila disimpan dalam tubuh dapat berakibat pada kegemukan.

e) Faktor lingkungan

Apabila seseorang hidup dalam kebudayaan yang menyatakan bahwa seorang yang gemuk itu makmur atau sederhana, maka seseorang tidak akan peduli dengan apa yang menyebabkan kegemukan yang dialami terlebih lagi jika ia tidak ada masalah psikologis yang menyertai. (Proverawati & Asfuah, 2009)

3) Dampak Obesitas

Obesitas sering dikaitkan dengan banyaknya lemak pada tubuh. Pada penderita obesitas, penumpukan lemak tubuh terjadi secara berlebihan. Lemak sendiri bias menjadi kawan sekaligus lawan bagi kesehatan tubuh. Di satu sisi, lemak sangat dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi, untuk membantu penyerapan vitamin, dan untuk membantu metabolisme dalam tubuh. Di sisi lain, kelebihan lemak juga dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan dan dapat menimbulkan berbagai penyakit degeneratif. Berbagai penelitian dapat membuktikan bahwa kegemukan dan obesitas merupakan faktor pencetus berbagai penyakit salah satunya adalah Hipertensi.

4) Hubungan Obesitas dengan hipertensi

Penumpukan lemak berlebihan akibat obesitas dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit sehingga tidak bias mengembang secara sempurna (kurang elastis). Selain itu, penderita obesitas biasanya juga memiliki Kadar

lemak darah yang tinggi. Kondisi tersebut dapat memicu adanya penumpukan lemak dalam pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi sempit. Dampaknya aliran darah ke seluruh tubuh pun terganggu. Hal ini memaksa jantung memompa darah lebih keras, sehingga tekanan darah meningkat dan dapat menyebabkan hipertensi. (Khasanah, 2012)

3. Patofisiologi

Penyebab hipertensi dalam kehamilan hingga kini masih belum diketahui secara pasti, banyak teori yang dikemukakan tentang terjadinya hipertensi dalam kehamilan, tetapi tidak ada satupun teori yang dianggap mutlak benar. (Prawiharjo, 2014:532)

Meskipun penyebab belum di ketahui pasti, bukti manifestasi klinisnya mulai tampak sejak awal kehamilan, berupa perubahan fisiologis tersamar yang terakumulasi sepanjang kehamilan, dan akhirnya menjadi nyata secara klinis. Tanda klinis ini merupakan akibat vasospasm, difusi endotel, dan ischemia. Meskipun sejumlah besar dampak sindrom preeklamsia pada ibu biasanya diuraikan persisten organ, manifestasi klinis ini seringkali multiple dan bertumpang tindih secara klinis. (Cunnunghsm, F. Garry, 2010)

Hipertensi merupakan tanda terpenting guna menegakkan diagnosis hipertensi dalam kehamilan. Tekanan diastolic menggambarkan system perifer. Sedangkan tekanan systolic menggambarkan besaran curah jantung. Pada preeklamsia peningkatan reaktivitas vascular dimulai umur kehamilan 20 minggu, tetapi hipertensi umumnya dideteksi pada umumnya pada trimester II. Tekanan

darah yang tinggi pada preeklamsia bersifat labil dan mengikut irama sakarida normal. (Prawiharjo, 2014)

Teori defisiensi gizi/teori diet adalah teori tentang terjadinya hipertensi dalam kehamilan (Prawiharjo, 2014). Rendahnya asupan kalsium pada ibu hamil menyebabkan peningkatan hormon para tiroid (PHT), dimana mengakibatkan kalsium intra seluler meningkat melalui permeabilitas membran sel terhadap kalsium. Hal itu dapat menyebabkan kalsium dan mitokondria lepas ke sistol. Peningkatan Kadar kalsium antara seluler menyebabkan otot polos pembuluh darah meningkat. (Lutfiatunnisa et al., 2016)

Kebutuhan kalsium meningkat pada masa kehamilan dikarenakan digunakan sebagai cadangan kalsium ibu guna pembentukan jaringan baru pada janin (Kodyat, 2014). Selain penting bagi kesehatan tulang dan janin, asupan kalsium yang cukup dapat mengurangi kejadian hipertensi selama kehamilan. (Say et al., 2006)

Pada suku Indian Maya di Amerika Selatan yang mendapat asupan kalsium tinggi dari jeruk nipis, memiliki insiden preeklamsia yang rendah. Memiliki peningkatan rata-rata tekanan darah rendah, yang menjadi predisposisi terjadinya preeklamsia.

4. Diagnosis

a. Diagnosa hipertensi dalam kehamilan

1) Pengkajian riwayat kesehatan

Pengkajian riwayat kesehatan yang komprehensif saat pemeriksaan pertama akan mengidentifikasi: keadaan sosial yang buruk, usia dan paritas,

primipaternitas, riwayat gangguan hipertensif dalam keluarga, riwayat preeklamsi yang pernah dialami, maupun adanya gangguan kesehatan lainnya. (Freser et al., 2011)

2) Pengukuran tekanan darah

Pengukuran tekanan darah sebaiknya jangan dilakukan ketika ibu mengalami ansietas, nyeri, periode latihan fisik, atau merokok. Periode istirahat 10 menit diberikan kepada ibu sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah. Posisi terlentang atau miring ke kanan sebaiknya tidak dilakukan Karna efek uterus gravid pada aliran vena menyebabkan terjadinya hipotensi postural. Posisi duduk atau berbaring miring ke kiri dengan manset stigmomanometer kira-kira sejajar dengan jantung merupakan posisi yang di anjurkan dalam melakukan pemeriksaan tekanan darah.

Tekanan darah dapat lebih tinggi dari sebelumnya jika menggunakan mangsetafigmano meter yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran lingkaran lengan. Dua manset harus segera disediakan dengan kantong inflasi 35 cm untuk penggunaan normal dan 42 cm untuk lengan yang lebih besar.

Pembulatan hasil pengukuran tekanan darah harus dihindari, dan pencatatan tekanan darah dibuat seakurat mungkin hingga 2 mmHg dari hasil pengukuran. Penggunaan karotkof IV (suara hembusan) atau korotkoff V (hilang suara) masih kontroversial. Karotkof V lebih mendekati tekanan intra-arteri oleh Karna itu, pengukuran ini sebaiknya pengukuran di lakukan dengan menggunakan Karoktof IV. (Freser et al., 2011)

3) Urinalisis

Proteinuria yang ditemukan pada ibu hamil yang tidak menderita infeksi saluran kemih merupakan indikasi adanya endoteliosis glomerulus. Jumlah protein dalam urine sering digunakan sebagai indeks keparahan preeklampsia. Peningkatan proteinuria yang signifikan disertai dengan berkurangnya haluan urine mengindikasikan adanya kerusakan ginjal (Freser et al., 2011). Kriteria minimum hasil proteinuria ≥ 300 mg/24 jam atau $\geq 1+$ pada pemeriksaan carik celup dianggap sebagai indikasi preeklamsia. (Cunnunghsm, F. Garry, 2010)

4) Odem dan peningkatan berat badan yang berlebihan

Pengkajian ini hanya dilakukan ketika diagnosis preeklamsia telah dibuat berdasarkan kriteria lainnya. Odem klinis dapat bersifat ringan atau berat, dan keparahan nya berhubungan dengan semakin memburuknya preeklamsia. Edema yang tiba-tiba muncul, menyebar dan parah merupakan tanda-tanda adanya preeklamsia atau keadaan patologis lainnya sehingga pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan. Edema tidak akan cekung ke dalam jika tertekan dan kemungkinan ditemukan di daerah anatomis yang tidak mengantung seperti wajah, tangan, abdomen bagian bawah, vulva, dan area sacrum. (Freser et al., 2011)

b. Diagnosis hipertensi gestasional

- 1) Tekanan darah yang didapatkan saat pengukuran dilakukan yaitu systolic ≥ 140 atau diastolic ≥ 90 mmHg untuk pertama kalinya pada usia kehamilan diatas 20 minggu.
- 2) Tidak didapatkan proteinuria.

- 3) Tekanan darah kembali normal sebelum 12 minggu post partum.
- 4) Diagnosis hanya di buat pada saat post partum.
- 5) Mungkin memiliki tanda-tanda gejala preeclampsia, tidak nyaman atau thrombocytopenia epigastria.

5. Komplikasi Hipertensi Gestasional

a. Preeklamsia ringan

Penyebab preeklamsia ringan secara pasti belum diketahui. Teori yang banyak ditemukan sebagai penyebab yaitu ischemia plasenta atau kurangnya sirkulasi O₂ ke plasenta.

b. Kematian janin dalam rahim (KJDR)

Kematian janin dalam rahim terjadi akibat efek kerusakan yang terjadi pada pembuluh darah ibu hamil yang merusak sistem vaskular sasi darah, sehingga mengganggu pertukaran oksigen dan nutrisi melalui plasenta dari ibu ke janin.

c. Persalinan prematur

Pada kasus hipertensi gestasional dapat mengakibatkan kelahiran prematur. Sebab, pada ibu hamil dengan tekan darah tinggi, pembuluh darah akan menyempit. Sehingga suplai oksigen ke organ-organ tubuh berkurang begitu pula dengan suplai oksigen pada janin pun akan berkurang.

d. Pertumbuhan janin terhambat (IUGR)

Hipertensi Gestasional mempengaruhi pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah ke plasenta. Jika plasenta tidak mendapatkan jumlah darah

yang cukup maka janin akan kekurangan oksigen dan nutrisi. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan pada janin terhambat.

e. Solusio plasenta

Solusi plasenta yaitu suatu keadaan dalam kehamilan, dimana plasenta yang berimplantasi dengan normal (pada fundus atau korpus uteri) terlepas dari tempat implantasinya sebelum Kala II.

f. Penyakit kardiovaskuler

Ibu hamil yang mengalami hipertensi gestational ditandai dengan tingginya tekan darah $\geq 140/90$ mmHg untuk pertama kalinya dalam kehamilan atas 20 minggu usia kehamilan, beresiko mengalami peningkatan penyakit kardiovaskuler di masa yang akan datang, meskipun fakta menunjukkan bahwa tekan darah akan kembali normal sebelum 12 minggu postpartum.

g. Gagal organ

Akibat sel endotel terpapar terhadap peroksida lemak, maka akan terjadi kekurangan sel endotel yang kerusakannya dimulai dari membran sel endotel. Kerusakan membran sel endotel mengakibatkan terganggunya fungsi endotel yang mengakibatkan difusi sel endotel.

h. Kematian

Hipertensi gestasional dapat mengakibatkan kematian yaitu dengan cara merusak organ terlebih dahulu seperti gagal jantung. Ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh, tekanan darah membuat jantung bekerja lebih keras. Jantung harus melawan tekan darah yang tinggi yang lama kelamaan membuat

otot jantung menjadi lebih besar. Otot jantung yang membesar akan membuat jantung menjadi kaku dan bengkok. (Situmorang & Sapitri, 2018)

6. Penatalaksanaan Hipertensi Gestasional

Penatalaksanaan hipertensi gestasional ini dapat dimulai dengan mengurangi aktifitas berat seperti mengangkat beban berat dan menambah istirahat, untuk pengobatan farmakologis dapat digunakan metildopa atau nifedipin sebagai obat yang terpilih pada kasus hipertensi kronik dan hipertensi gestasional. (Darmawangsyih, 2011)

Selain itu penatalaksanaan hipertensi gestasional adalah menghindari situasi yang dapat memicu stress di mana stress memiliki peranan penting dalam pemicu hipertensi. Stres atau ketegangan emosional dapat mempengaruhi sistem kardiovaskuler, pada kasus hipertensi. Stres di percaya dapat meningkatkan resiko hipertensi melalui aktivitas sistem saraf simpatis yang mengakibatkan naiknya tekanan darah intermitten (tidak menentu). Pada saat seseorang yang mengalami stres, hormone adrenalin dilepaskan dan kemudian meningkatkan tekanan darah melalui kontraksi arteri (vas konstriksi) dan denyut jantung. Apabila stres berlanjut, tekanan darah tetap tinggi sehingga seseorang mengalami hipertensi. (Syahitdah & Nissa, 2018)

Pemberian terapi Motal Al-Qur'an merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat stres pada ibu. Dengan terapi motal Al-Qur'an dapat menciptakan suasana hati yang damai dan menenangkan perasaan menjadi lebih rileks. Hal ini telah di jelaskan bahwa Al-Qur'an memberikan manfaat dan sebagai obat yang mujarab bagi seseorang yang mengalami kegundahan hati,

keputusasaan, kecemasan, dan Al-Qur'an juga memberikan ketenangan pada sistem tubuh manusia.

Adapun alternatif lain untuk menurunkan tekanan darah selain dari mendengarkan mortal yaitu mengurangi mengonsumsi makanan yang tinggi natrium dan rendah protein karena dapat menyebabkan gangguan kehamilan seperti hipertensi. Dampak dari gangguan pola nutrisi selama kehamilan bisa berakibat dengan semakin meningkatnya angka kejadian hipertensi yang ditandai dengan banyaknya ibu hamil dengan gejala tekanan darah tinggi, kelebihan Kadar protein dalam urin, edema kaki, penglihatan kabur, sesak nafas dan bisa berakibat fatal seperti menurunnya kesadaran dan kejang hal ini paling sering terjadi pada ibu berusia tri-semester dua. Ada pun jenis makanan yang tinggi protein seperti ikan, telur, tahu, Tempe dan kacang-kacangan. (Eenk, 2018: 21)

Kenaikan Kadar natrium dalam darah dapat merangsang sekresi renin dan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah perifer yang berdampak pada meningkatnya tekanan darah. Makanan yang mengandung lemak tinggi juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tekanan darah dalam tubuh sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi. Maka dari itu diet terhadap makanan rendah lemak merupakan salah satu cara untuk mengatasi hipertensi. Makan yang rendah lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, ikan Segar dan keju. (Syahitdah & Nissa, 2018)

Selain mengurangi mengonsumsi makanan tinggi natrium dan tinggi lemak. Ada pun upaya dalam mengatasi hipertensi selain dengan obat-obatan konvensional (obat-obatan kimia) yang menimbulkan efek samping dan

membutuhkan pengobatan yang mahal, dapat juga dengan memanfaatkan buah-buahan Segar dengan Cara diolah menjadi jus. Buah-buahan yang dapat diolah menjadi jus untuk mengobati hipertensi dan memiliki kandungan kalium tinggi seperti pisang, ubi, srikaya, belimbing Manis dan semangka. (Hermawan & Novariana, 2018)

Buah dan sayur memang memiliki banyak manfaat selain kaya akan vitamin buah dan sayur juga mengandung hidrat arang yang rendah. Salah satu jenis sayuran yang mengandung hidrat arang yang rendah dan telah terbukti dalam penurunan tekanan darah yaitu mentimun. Kandungan yang terdapat dalam mentimun seperti mineral, potasium, magnesium dan fosfor yang dapat mengobati hipertensi. Di dalam mentimun yang bersifat diuretik dan kandungan air yang tinggi berfungsi sebagai penurunan tekanan darah tinggi. (Hermawan & Novariana, 2018)

Selain mengonsumsi buah dan sayur sebagai Cara penurunan tekanan darah juga dilakukan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk memeriksakan keadaan ibu dan janin secara berkala, yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar ibu hamil dapat melalui masalah kehamilan, persalinan, nifas dengan baik dan selamat serta menghasilkan bayi yang sehat. Pemeriksaan antenatal dilakukan oleh tenaga yang terlatih dalam kebidanan yaitu pembantu bidan, bidan, dokter dan perawat yang terlatih.

Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi khusus, agar dapat berlangsung dengan baik. Kehamilan menyangkut kehidupan ibu dan janin.

Resiko kehamilan ini bersifat dinamis, karena ibu hamil pada mulanya normal secara tiba-tiba dapat menjadi berisiko tinggi. Ibu hamil yang memiliki kunjungan ke empat pelayanan kesehatan kurang dari 4 kali (K4) pada trimester beresiko melahirkan bayi berat rendah dibandingkan dengan ibu hamil yang memiliki kunjungan pada tempat pelayanan kesehatan lebih dari 4 kali pada trimester beresiko melahirkan bayi berat badan lahir rendah.

Pemeriksaan antenatal merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi faktor risiko terhadap terjadinya bahaya-bahaya yang berlangsung selama kehamilan dan persalinan terutama hipertensi. Pemeriksaan antenatal penting untuk mendeteksi sedini mungkin hingga tindakan preventif maupun kuratif dapat dilakukan dengan baik. Pemeriksaan antenatal berupa 7T minimal 4 kali selama kehamilan bertujuan untuk memperoleh kapasitas bahwa kehamilan berakhir dengan persalinan normal. (Sukfitrianty et al., 2016)

7. Pencegahan

Ibu hamil dengan risiko sedang preeklamsia (kehamilan pertama, berusia > 40 tahun, interval kehamilan >10 tahun, indeks masa tubuh >35 kg/m² saat kunjungan pertama, riwayat preeklamsia pada keluarga, dan kehamilan multiple) serta risiko tinggi (hipertensi pada kehamilan sebelumnya, gagal ginjal kronis, penyakit autoimun, diabetes mellitus tipe 1 dan dua, dan hipertensi kronis) diberikan 100-160 mg aspirin setiap hari pada masa 12-36 minggu kehamilan. (Lukito et al., 2019)

Strategi yang dilakukan guna mencegah hipertensi dalam kehamilan meliputi upaya non farmakologi dan farmakologi. Upaya non farmakologi

meliputi edukasi, deteksi prenatal dini dan manipulasi diet. Sedangkan upaya farmakologi pemberian aspirin dosis rendah dan antioksidan. (Cunningham & Redston, 2013).

a. Penyuluhan untuk kehamilan berikutnya

Wanita yang mengalami hipertensi selama kehamilan harus di evaluasi selama pada masa postpartum dini dan di beri penyuluhan mengenai kehamilan mendatang serta resiko kardiovaskular. Wanita yang mengalami hipertensi. Edukasi mengenai beberapa factor resiko yang memperberat resiko kehamilan dan memberi anti oksidan vitamin C pada wanita beresiko tinggi dapat menurunkan angka morbiditas hipertensi dalam kehamilan.

b. Deteksi pranatal dini

Selama kehamilan, waktu pemeriksaan pranatal di jadwalkan 1 kali saat trimester pertama, 1 kali saat trimester kedua dan 2 kali pada trimester ketiga. Kunjungan dapat di tambah tergantung pada kondisi maternal. Dengan adanya pemeriksaan secara rutin selama kehamilan dapat dilakukan deteksi dini hipertensi dalam kehamilan. Wanita dengan hipertensi yang nyata $\geq 140/90$ mmHg sering dirawat inapikan selama 2 sampai 3 hari untuk dievaluasi keparahan hipertensi kehamilannya yang baru muncul.

c. Manipulasi diet

Salah satu usaha awal yang ditujukan untuk pencegahan hipertensi sebagai penyulit kehamilan adalah pembatasan asupan garam. Diet tinggi kalsium dan pemberian kapsul dengan kandungan minyak ikan dapat mencegah hipertensi dalam kehamilan.

d. Antioksidan

Terapi oksidan dapat menurunkan aktivitas sel endotel dengan mengisyaratkan bahwa terapi semacam ini bermanfaat dalam pencegahan hipertensi dalam kehamilan, terutama preeklamsia. Antioksidan tersebut dapat berupa vitamin C dan E. (Cunningham & Redston, 2013)

D. Tinjauan Manajemen Asuhan Kebidanan

Menurut Helen Varney (1997) bahwa Manajemen Asuhan Kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang ditemukan oleh perawat dan bidan pada awal 1970-an.

1. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

Tujuh langkah Manajemen Kebidanan menurut Varney yaitu:

a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar)

Langkah I merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien atau orang yang meminta asuhan. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara atau Tanya jawab dengan pasien maupun keluarga meliputi: umur pasien, gravid, riwayat kesehatan keluarga yang pernah mengalami preeklampsia dan eklampsia, riwayat kehamilan multiple, molahidatidosa, diabetes melitus, hidro ps fatalis dan bayi besar. Riwayat penyakit ginjal. Demikian pula dengan data fisik yang diperoleh dalam observasi.

Dalam Pemeriksaan fisik, klien yang umumnya mengalami hipertensi memiliki usia kehamilan di atas 20 minggu, disertai dengan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg, disertai dengan hasil pemeriksaan lab didapatkan protein urin

negatif Dan pemeriksaan fisik salah satunya yaitu pengukuran berat badan. Ibu hamil dengan $IMT \geq 30$ memiliki resiko tinggi lima kali lipat dibandingkan dengan ibu hamil yang memiliki *IMT underweight* $IMT < 18,5$ dan normal $IMT 18,5-24,9$ (Quedarusman et al., 2013).

Anjuran total penambahan berat badan selama kehamilan didasarkan pada status gizi ibu sebelum hamil yang diukur menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT) maka IMT dibawah 18,5 (*underweight*) maka kenaikan berat badan ideal ibu selama kehamilan adalah 12-18 kg, jika IMT antara 18,5-24,9 (normal) maka selama kehamilan kenaikan berat badan yang baik adalah 11-16 kg, pada trimester pertama kenaikan berat badan pada ibu hamil sebaiknya 0,5 hingga 2,5 kg, setelah itu diikuti dengan kenaikan berat 0,5 kg per minggu. Jika IMT ibu antara 25-29,9 (*overweight*) maka kenaikan berat badan selama kehamilan pun disarankan tidak terlalu tinggi, idealnya 1-11 kg dan jika IMT ibu di atas 30 (obesitas) maka ibu disarankan untuk menjaga kenaikan berat badannya hanya berkisaran 5-9 kg. ("Optimal Pregnancy Weight _ Program Studi Ilmu Gizi," 2016)

b. Langkah II: Interpretasi Diagnosa Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien. Berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik.

Pada pasien yang mengalami hipertensi gestasional umumnya memiliki tanda dan gejala seperti terdapat edema akibat berat badan yang berlebih, tidak memiliki protein urin, serta tekanan darah yang melebihi batas normal, di mana ia

memiliki tekanan darah $>140/90$ mmHg, atau mengalami peningkatan pada systolic ≥ 140 mmHg dan diastolic sebesar ≥ 90 mmHg, biasanya pasien mengalami hipertensi pertama kalinya pada umur kehamilan di atas 20 minggu, tanpa disertai dengan adanya protein urin, tekanan darah kembali normal sebelum 12 minggu postpartum, diagnosa hanya dibuat pada postpartum. (Elya et al., 2016)

c. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial)

Pada langkah ini yaitu mengantisipasi diagnosa/masalah potensial disusun berdasarkan masalah yang dapat beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan pada ibu hipertensi gestasional. adapun masalah potensial yang dapat timbul adalah resiko terjadinya preeklampsia ringan. Pada janin pertumbuhan terhambat, kematian janin, persalinan prematur dan solusio plasenta.

Perempuan yang mengalami hipertensi gestasional mempunyai resiko tinggi terjadinya komplikasi berat seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit pembuluh darah otak ataupun gagal organ hingga kematian. Terhadap janin dapat terjadi pertumbuhan janin dalam rahim terhambat, sehingga menyebabkan kelahiran sebelum waktunya dan kematian janin dalam rahim (KJDR). (Situmorang & Sapitri, 2018)

d. Langkah IV (Menetapkan Kebutuhan terhadap Tindakan Segera dan Kolaborasi)

Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera untuk melakukan konsultasi, kolaborasi dengan segera dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter

untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota Tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.

Penanganan segera pada kasus ini adalah melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter obgyn untuk mencegah terjadinya komplikasi hipertensi lebih lanjut, kolaborasi dengan dokter obgyn dalam pemberian obat anti hipertensi seperti metildopa atau nipidipin serta berkolaborasi dengan petugas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan urin untuk memastikan tidak ada protein pada urin.

Tindakan segera ini dapat dilakukan jika pasien telah mengalami sakit kepala secara terus menerus dan pada pemeriksaan laboratorium terdapat protein urin $\geq +2$ dan terdapat tanda-tanda kejang dan syok.

e. Langkah V (Perencanaan)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap dilengkapi.

Pelaksanaan yang dilakukan yaitu menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu, menjelaskan hal-hal yang penting seperti peningkatan tekanan darah dan protein urin. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga. Memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi gestasional dan Cara mengatasi serta memantau terjadinya preeklampsia ringan. Memberikan *health education* seperti anjurkan ibu untuk mengurangi aktifitas berat seperti mengangkat beban yang berat, menambah

istirahat, diet terhadap makanan yang tinggi protein seperti ikan, telur, tahu, Tempe dan kacang-kacangan. Rendah hidrat arang seperti buah dan sayur sayuran. Rendah lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, ikan segar dan keju. Hindari situasi yang dapat mencetuskan stres dimana stres jelas memainkan peranan penting dalam hipertensi.

Menjelaskan kepada ibu mengenai tanda bahaya dalam kehamilan. Anjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan janinnya. Mengajarkan kepada ibu untuk memantau tanda-tanda preeklampsia ringan. Anjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan USG, DJJ dan mendiskusikan persiapan persalinan dan kelahiran bayinya. Melakukan pemberian obat anti hipertensi. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan antenatal secara teratur serta anjurkan ibu untuk memperbanyak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.

f. Langkah VI (Pelaksanaan).

Pada langkah ini dilakukan pelaksanaan asuhan langsung secara efisien dan aman. Pada langkah keenam ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman.

Pelaksanaan dikerjakan sesuai dengan rencana asuhan yang telah dibuat yaitu:

- 1) Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien
- 2) Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada pasien melibatkan suami dan keluarga.
- 3) Memberikan ibu mengenai pendidikan kesehatan hipertensi gestasional.

- 4) Memberikan *health education* pada ibu mengenai kebutuhan istirahat, menjaga kebersihan dan menganjurkan diet makanan tinggi protein, rendah hidrat arang, rendah lemak, dan diet rendah garam.
- 5) Menjelaskan pada ibu tentang 10 tanda bahaya kehamilan.
- 6) Menganjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya.
- 7) Menganjurkan pada ibu untuk memantau tanda-tanda terjadinya preeklampsia ringan.
- 8) Menganjurkan ibu untuk melakukan persiapan persalinan dan kelahiran bayinya.
- 9) Menganjurkan ibu untuk melakukan USG.
- 10) Melakukan pemberian obat anti hipertensi.
- 11) Menganjurkan pasien untuk kunjungan pemeriksaan kehamilan lebih sering yaitu 1 minggu sekali.
- 12) Menganjurkan ibu untuk memperbanyak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an.

g. Langkah VII (Evaluasi).

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar tetap terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dianggap efektif jika memang benar dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan USG, diagnosa yang ditegakkan pada klien yakni hipertensi

gestasional. Rencana asuhan yang telah disusun berorientasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan dilaksanakan secara menyeluruh. Adanya kerjasama antara pasien dan petugas kesehatan sehingga tidak ditemukan hambatan pada saat pelaksanaan asuhan.

Diet yang seimbang dengan istirahat yang cukup merupakan penanganan sederhana yang dilakukan dalam kasus hipertensi gestasional, dimana pola makan yang tidak seimbang seperti tingginya konsumsi makanan yang banyak mengandung lemak, banyak mengkonsumsi garam dan juga banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet dapat mempengaruhi tekanan darah dimana tekanan darah dapat meningkat melebihi batas normal, sehingga dapat membahayakan ibu dan janinnya. Pemberian terapi obat berupa nifedipin yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter juga dapat membantu menurunkan tekanan darah apabila dikonsumsi secara teratur. Selain pemberian obat-obatan, ibu dan keluarga diberi dukungan dengan menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap bersabar dan yakinkan ibu bahwa kejadian yang dialami adalah kehendak Allah SWT.

Tindakan akhir yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya preklamsi adalah dengan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan tidak ada protein urin. Serta dilakukan kolaborasi dengan dokter obgyn/ahli kandungan dalam pemeriksaan USG untuk memastikan keadaan janin baik serta sehat dan tidak mengalami kelainan. Selama pemantauan berlangsung, ibu diberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan. Memantau keadaan psikologi ibu agar lebih baik tidak lagi merasakan cemas berlebihan, memantau tanda-tanda vital

hingga kembali dengan normal dan meminta ibu agar senantiasa berserah diri kepada Allah SWT, agar ibu tetap dalam keadaan sehat.

Sehingga pada akhirnya keadaan ibu yang kembali membaik dan tanda-tanda vital kembali normal, dan tidak terjadi komplikasi terhadap ibu dan janinnya. Hal itu dapat terjadi dikarenakan terlaksananya manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.

2. Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP

Varney menyatakan bahwa alur berfikir bidan saat menghadapi klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain yang telah dilakukan oleh seseorang bidan melalui proses berfikir sistematis, maka dilakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yaitu:

a. Subjektif (S)

Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis.

b. Objektif (O)

Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien (keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik), hasil laboratorium dan uji diagnosis lain yang merumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan.

Adapun data objektif pada ibu obesitas dengan hipertensi gestational yaitu, tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg disertai dengan peningkatan berat badan yang berlebihan yang dapat menimbulkan edema klinis yang dapat bersifat ringan dan berat.

c. Assessment (A)

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan juga data objektif dalam suatu identifikasi.

- 1) Diagnosis masalah.
- 2) Antisipasi diagnosis/masalah potensial.
- 3) Tindakan segera.

d. Planning (P)

Planing atau perencanaan adalah membuat asuhan saat ini dan akan datang. Rencana asuhan yang di buat berdasarkan analisa di interpretasi data. Rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraan. Tindakan yang dilaksanakan harus mampu membantu pasien mencapai kemajuan dan harus sesuai dengan hasil kolaborasi tenaga kesehatan lainnya.

Pada planning ini juga dilakukan kunjungan untuk mengetahui progresif dari asuhan yang telah dilakukan pada klien. Setiap kunjungan yang dilakukan dimulai dipantau dari kunjungan rutin ANC pada trimester akhir hingga klien telah melalui proses persalinan di mana dalam teori dikatakan bawah pemantauan tekanan darah pada ibu hipertensi gestational kembali normal setelah 12 minggu post-partum.

BAB III

LITERATUR REVIEW

A. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar

Mengumpulkan semua referensi yang akurat berkaitan dengan kondisi pasien yaitu kehamilan yang disertai dengan hipertensi gestasional, sehingga dapat ditentukan interpretasi yang benar sesuai dengan referensi yang didapatkan.

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antrantatal Care Dengan Hipertensi Gestasional

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Trimester III	Jumaiza, dkk	2018	Pernyakit yang terjadi pada masa kehamilan	Peningkatan tekanan darah selama kehamilan merupakan salah satu jenis penyakit yang perlu diwaspadai dimana keadaan ini bisa membahayakan ibu hamil karena pada beberapa kasus hipertensi dengan komplikasi merupakan penyebab utama	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.	Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2017 di UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak.	Tekanan darah merupakan dorongan pembuluh darah terhadap dinding pembuluh darah. Beberapa perubahan terjadi dalam sirkulasi selama kehamilan sebagai dampak pengaruh

					kematian pada ibu hamil			hormonal, meningkatnya berat badan dan adanya jaringan-jaringan ekstra yang diperlukan bagi janin untuk tumbuh dan berkembang.
2.	Gambaran Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar	A.Arniyanti	2015	Defenisi Hipertensi	Hipertensi adalah kondisi tekanan darah melebihi batas normal. Orang dianggap menderita hipertensi bila tekanan sistoliknya diatas 130 mmHg (milimeter air raksa) dan bisa juga disertai tekanan diastolnya yang diatas 90 mmHg pada dua atau tiga kali pemeriksaan. Pada kehamilan, hipertensi biasa muncul pada trimester ketiga, atau tiga bulan terakhir kehamilan. Peningkatan hipertensi ini paling sering terjadi pada	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif	Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya.	Hipertensi adalah salah satu masalah medis yang sering muncul selama kehamilan dan dapat menimbulkan komplikasi pada 2-3% kehamilan.

					kehamilan anak pertama dan pada ibu hamil diatas 35 tahun. (A. Arniyanti, 2016)			
3.	Faktor Risiko Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar	Sukfitrianty, dkk	2016	Penjelasan hipertensi pada kehamilan	Hipertensi pada kehamilan masih merupakan penyebab utama kematian maternal dan perinatal terutama di negara berkembang diperkirakan 15–40% kematian maternal berhubungan langsung dengan hipertensi pada kehamilan dan sampai 30% janin meninggal khususnya eklampsia	Jenis penelitian yang digunakan adalah observasion al dengan menggunakan pendekatan case control study	Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang ada di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar	Tingginya hipertensi sejalan dengan bertambahnya umur, hal ini disebabkan oleh perubahan struktur pada pembuluh darah besar, sehingga lumen menjadi lebih sempit dan dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku, sebagai akibat adalah meningkatnya tekanan darah sistolik.
4.	Pengaruh Pengetahuan, Sikap dan Dukungan Keluarga	Almina, R, dkk	2018	Pengertian hipertensi	Hipertensi atau yang dikenal dengan nama penyakit darah tinggi adalah suatu keadaan dimana terjadi	Jenis penelitian adalah Cross-Sectional	Populasi dalam penelitian adalah seluruh	Hipertensi ditegakkan apabila didapatkan tekanan darah sistolik (TDS) ≥ 140 mmHg

	Terhadap Diet Hipertensi di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Tahun 2016				peningkatan tekanan darah di atas ambang batas normal yaitu 120/80 mmHg. Menurut WHO (World Health Organization), batas tekanan darah yang dianggap normal adalah kurang dari 130/85 mmHg. Bila tekanan darah sudah lebih dari 140/90 mmHg dinyatakan hipertensi (batas tersebut untuk orang dewasa di atas 18 tahun). (Almina, 2018)	Study dengan pendekatan explanatory.	penderita hipertensi di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu berjumlah 108 orang dan seluruh populasi dijadikan sampel.	dan atau tekanan darah diastolik (TDD) ≥ 90 mmHg pada dua kali pengukuran dalam waktu yang berbeda
5.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Hipertensi Pada Kehamilan Studi case Contral di Wilayah Kerja Puskesmas Poriahan Tapanuli Tengah Tahun	Uli, B, dkk	2017	Penjelasan hipertensi pada kehamilan	Hipertensi pada kehamilan adalah hipertensi yang terjadi saat kehamilan berlangsung dan biasanya pada bulan terakhir kehamilan atau lebih setelah 20 minggu usia kehamilan pada wanita yang sebelumnya normotensif, tekanan	Jenis penelitian yang digunakan adalah studi analitik dengan desain studi case control	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang melakukan kunjungan ke di Wilayah kerja Puskesmas Poriaha	Hipertensi berasal dari bahasa latin yaitu hiper dan tension. Hiper artinya tekanan yang berlebihan dan tension artinya tensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi medis dimana seseorang

	2017				darah mencapai nilai 140/90 mmHg, atau kenaikan tekanan sistolik 30 mmHg dan tekanan diastolik 15 mmHg di atas nilai normal		Kabupaten	mengalami peningkatan tekanan darah secara kronis (dalam waktu yang lama) yang mengakibatkan angka kesakitan dan angka kematian.
6.	Hubungan Asupan Natrium, Kalsium dan Magnesium dengan Tekanan Darah pada Ibu Hamil Trimester II dan III (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Kabupaten Temanggung)	Ella, F, dkk	2017	Penjelasan tentang hipertensi	Hipertensi atau tekanan darah tinggi yang dialami oleh ibu hamil erat kaitannya dengan hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional merupakan suatu penyakit dengan gejala hipertensi, oedema dan proteinuria negatif yang muncul pada saat kehamilan biasanya pada triwulan kedua dan ketiga	Penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan cross sectional	Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil pada trimester II dan III yang terdata di Puskesmas Bulu Kabupaten Temanggung yaitu 114 ibu hamil.	Hipertensi dalam kehamilan merupakan gangguan multifaktorial. Faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi dalam kehamilan .

7.	Analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada kehamilan di Kota Manado	Yudhaputra, dkk	2016	Faktor penyebab terjadinya hipertensi	Hipertensi merupakan manifestasi gangguan hemodinamik sistem kardiovaskular, yang penyebabnya adalah multi faktor sehingga tidak bisa diterangkan dengan hanya satu mekanisme tunggal. Hipertensi adalah masalah medik yang cukup sering didapatkan pada kehamilan, dengan angka kejadian sekitar 2-4%. (Yudhaputra, 2016)	Desain penelitian yang digunakan ialah penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional.	Sampel penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang datang atau yang ada dan bersedia di tempat penelitian dalam periode september-november 2016.	Gangguan hipertensi pada kehamilan (hypertension pregnancy disorders) merupakan penyebab peningkatan morbiditas dan mortalitas maternal, janin dan neonates yang disebabkan dari berbagai macam faktor.
8.	Hubungan Konsumsi Makanan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Desa Mekarbahalat Kecamatan Jawa Marajabah Jambi Kabupaten Simalungun Tahun 2016	Ira, dkk	2016	Etiologi terjadinya hipertensi	Banyak faktor risiko yang dapat menyebabkan hipertensi seperti pola konsumsi makanan, aktivitas fisik, tingkat stress, merokok maupun faktor genetik. Penduduk yang masih kurang dalam memperhatikan pola dan tingkat konsumsi makanannya sehari-hari	Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat analitik observasional dengan jenis rancangan	Besarnya sampel dihitung berdasarkan rumus penentuan besar sampel yaitu sebanyak 55 orang lansia yang bersedia untuk	Adanya kenaikan tekanan darah dapat disebabkan oleh paritas, umur dan pola nutrisi ibu

					yang membuat timbulnya berbagai penyakit degeneratif terlebih pada lansia yang membuat angka morbiditas dan mortalitas menjadi semakin tinggi. Ketidakseimbangan	penelitian cross sectional.	diwawancarai .	
9.	Hubungan Pola Makan Dan Stres Dengan Kejadian Hipertensi Grade 1 dan 2 Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Kamonji Kacamatan Palu Barat	Risky, dkk	2016	Penyebab terjadinya komplikasi kehamilan	Kehamilan dapat mengubah selera makan dan pola makan (kebiasaan mengidam), dimana pada umumnya nafsu makan wanita hamil akan meningkat, hal ini menjadi penyebab diet makanan menjadi tidak seimbang sehingga dapat menyebabkan komplikasi antara lain hipertensi pada ibu hamil.	Jenis penelitian ini adalah penelitian Cross Sectional	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil hipertensi yang datang memeriksakan kehamilannya di pusupustu wilayah kerja Puskesmas Kamonji	Adapun frekuensi makan yang dapat memicu timbulnya kejadian hipertensi dengan pola makan tidak baik seperti makan daging, makan yang berlemak, makanan gorengan, makanan yang mengandung garam ≥ 3 kali dalam seminggu sebesar 70%

10.	Aktivitas fisik, stress, dan asupan makanan terhadap tekanan darah pada wanita prediabetes	Rohmah, dkk	2018	Definisi hipertensi	Hipertensi merupakan suatu keadaan dimana tekanan darah lebih dari normal dalam jangka waktu yang lama. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya diatas 140/90 mmHg. Namun, tidak harus tekanan darah sistolik dan diastolik diatas normal untuk dapat dikatakan hipertensi, cukup salah satu memenuhi kriteria hipertensi maka ia sudah dikatakan menderita hipertensi. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai tekanan darah 140/80 mmHg sudah dikatakan mengalami hipertensi walaupun tekanan darah diastoliknya normal	Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup keilmuan gizi masyarakat dengan desain cross sectional.	Populasi terjangkau yang digunakan adalah wanita prediabetes usia 35-50 tahun di wilayah kerja puskesmas Kedungmundu dan perkantoran di Semarang	Secara teoritis, Tekanan darah tinggi termasuk jenis penyakit silent killer yang dapat menyebabkan kematian tanpa sering diketahui gejalanya, selain itu tekanan darah tinggi
-----	--	-------------	------	---------------------	--	---	--	---

B. Langkah II : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Aktual

Identifikasi diagnosis, masalah dan kebutuhan pasien yaitu kehamilan yang disertai dengan hipertensi gestasional

berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No	Judul Referensi	Oleh (sebutkan nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Hubungan Preeklampsia dan Faktor Lain Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	Lia, I	2018	Faktor penyebab terjadinya hipertensi	Ibu hamil yang masuk dalam primigravida dianggap sebagai salah satu faktor resiko untuk mengalami hipertensi gestasional menurut teori yang mengatakan bahwa angka kejadian untuk primigravida, muda maupun tua lebih tinggi.	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analitik.	Desain penelitian ini juga melalui pendekatan kuantitatif secara cross sectional.	Paritas atau frekuensi ibu melahirkan anak sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan anaknya, karena ini memungkinkan meningkatnya angka kesakitan dan kematian maternal. Pada ibu yang baru pertama kali melahirkan kemungkinan lebih tinggi dengan ibu yang sudah mempunyai anak.

2.	Analisis Perilaku Kesehatan Dan Faktor Resiko Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Poliklinik Obstetri Gynekologi RSUD Kabupaten Kediri	Fitri, dkk	2018	Melakukan pemeriksaan pada ibu hamil	Terjadinya peningkatan resistensi insulin atau pembengkakan telah dikaitkan dengan disfungsi endothelial, dan peningkatan sekresi endotelin (vasokonstriktor kuat). Resistensi insulin dapat mengurangi oksida nitrat, meningkatkan resikonya hipertensi dan penyakit kardiovaskular yang disebabkan berbagai macam faktor salah satunya yaitu riwayat keluarga, obesitas dan paritas	Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik.	Sampel yang digunakan adalah ibu yang datang memeriksakan kehamilannya di Poliklinik Obstetri Gynekologi di RSUD Kabupaten Kediri yang memenuhi kriteria inklusi sejumlah 181 ibu hamil.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi dalam kehamilan meliputi usia ibu, paritas, riwayat keluarga, obesitas, kehamilan kembar, interval kehamilan, diabetes gestasional dan riwayat medis pada ibu hamil
3.	Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Trimester III	Jumaiza, dkk	2018	Pemeriksaan laboratorium	Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosa pada ibu hamil yang mengalami hipertensi gestasional	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.	Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2017 di UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak.	Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa disertai proteinuria dan hipertensi menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan atau kehamilan dengan tanda-tanda preeklampsia tetapi tanpa proteinuria

4.	Gambaran Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar	A.Arniyanti	2015	Penegakkan diagnosis.	Kelebihan berat badan (obesitas) dan hipertensi sering beriringan, adanya peningkatan tekanan darah terhadap ibu hamil sangat erat kaitannya dengan kenaikan berat badan yang berlebih merupakan gejala hiperten pada ibu hamil. Kenaikan berat badan yang berlebih menunjukkan adanya penimbunan cairan yang berlebihan dalam jaringan tubuh atau di oedema yang merupakan pertanda hipertensi.	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif	Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya.	Adanya peningkatan tekanan darah terhadap ibu hamil sangat erat kaitannya dengan kenaikan berat badan yang berlebih merupakan gejala hiperten pada ibu hamil. Kenaikan berat badan yang berlebih menunjukkan adanya penimbunan cairan yang berlebihan dalam jaringan tubuh atau di oedema yang merupakan pertanda hipertensi.
5.	Asuhan Kebidanan Pada Ny. E Dengan Hipertensi Gestasional	Yulrina, A	2018	Gejala hipertensi gestasional	Keluhan yang dirasakan oleh ibu merupakan gejala yang biasanya muncul pada ibu yang mengalami Hipertensi Gestasional, seperti nyeri kepala saat terjaga, tengkuk terasa pegal, susah tidur, sesak nafas, mudah	Studi kasus ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan pendekatan Continuity of care	Jenis data primer. Cara pengumpulan data anamnesa, observasi, pemeriksaan dan dokumentasi. Analisa data dengan membandingkan	Hipertensi dalam kehamilan merupakan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg untuk pertama kalinya pada kehamilan, tidak disertai dengan proteinuria dan tekanan darah kembali normal ≤ 12 minggu

					lelah dan mata berkunang-kunang. (Yulrina, 2018)	diberikan pada ibu hamil	antara data yang diperoleh dengan teori yang ada.	pasca persalinan
6.	Hubungan Paritas Dan Pendidikan Ibu Dengan Kejadian Preeklamsia Di Wilayah Kabupaten Semarang	Vistra, dkk	2018	Pemeriksaan tekanan darah.	Pada wanita dengan hipertensi getasional, tidak terjadi penurunan sensitivitas terhadap vasoceptida tersebut, sehingga peningkatan besar volume darah langsung meningkatkan curah jantung dan tekanan darah. (Vistra, 2018)	Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan case control.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang berada di wilayah kabupaten Semarang	Pada wanita dengan hipertensi getasional terjadi peningkatan besar volume darah langsung meningkatkan dan tekanan darah
7.	Faktor Risiko Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar	Sukfitrianty, dkk	2016	Tindakan anamnesa pada ibu mengenai umur	Dengan bertambahnya umur, resiko terkena hipertensi menjadi lebih besar sehingga prevalensi hipertensi dikalangan usia lanjut cukup tinggi. Tingginya hipertensi sejalan dengan bertambahnya umur, hal ini disebabkan oleh perubahan struktur pada pembuluh darah menjadi lebih kaku, sebagai akibat adalah	Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan menggunakan pendekatan case control study	Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang ada di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar	Umur ibu pada saat hamil merupakan salah satu faktor internal yang berperang penting dalam kehamilan

					meningkatnya tekanan darah sistolik			
8.	Faktor Resiko Kejadian Hipertensi dalam Kehamilan	Alfina, dkk	2016	Pengkajian riwayat keluarga	Hipertensi seperti banyak kondisi kesehatan lain, terjadi dalam keluarga. Jika salah satu (dua orang dari) orang tua atau saudara kandung menderita hipertensi maka peluang untuk terjadinya hipertensi sangat besar. Penelitian menunjukkan bahwa 25% dari kasus hipertensi esensial dalam keluarga mempunyai dasar genetis. Namun demikian, hal ini tidak berarti sesuatu yang pasti. (Alvina, 2018)	Penelitian ini menggunakan studi observasional dengan metode cross-sectional secara Prospektif	Populasi penelitian ini adalah semua ibu hamil yang datang di Poli Rawat Jalan Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD Tugurejo Semarang	Beberapa kesamaan yang tampak pada banyak keluarga justru mungkin merupakan dampak pengaruh lingkungan, pola makan dan keterampilan dalam menghadapi masalah dalam kehamilan seperti hipertensi gestasional.
9.	Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil	Nuning dan Mardiana	2016	Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tekanan darah	Gambaran klinik hipertensi gestasional mulai dengan kenaikan berat badan diikuti edema kaki atau tangan, kenaikan tekanan darah, dan terakhir tidak ada proteinuria. Preeklampsia merupakan komplikasi kehamilan yang berkelanjutan dengan penyebab yang sama. Oleh	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik	Sampel kasus dalam penelitian ini adalah sebagian ibu hamil yang menderita preeklampsia yang tercatat dalam catatan medik di RSUD	Hipertensi gestasional ditandai dengan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg setelah umur kehamilan 20 minggu, tidak disertai dengan proteinuria

					karena itu, pencegahan atau diagnosis dini dapat mengurangi kejadian dan menurunkan angka kesakitan dan kematian.		Kabupaten Brebes	
10.	Hipertensi Pada Kehamilan Analisis Kasus	Imami, N.	2015	Pengukuran tekanan darah	Hipertensi merupakan keadaan dimana tekanan darah sistolik >140mmHg dan tekanan darah diastolik >90mmHg yang diukur dengan sphygmomanometer. Pengukuran dilakukan minimal 2 kali dalam rentang waktu 1 minggu.	Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan desain cross sectional	Dalam penelitian ini akan dilihat apakah ada hubungan antara umur, paritas, umur menarcheobesitas, riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi gestasional	Hipertensi dalam kehamilan mengakibatkan terjadinya peningkatan curah jantung dan tekanan darah

C. Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Potensial

Identifikasi masalah potensial pada kehamilan yang disertai dengan hipertensi gestasional yang mungkin terjadi berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Hubungan Preeklampsia dan Faktor Lain Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	Lia, I	2018	Komplikasi hipertensi gestasional	Tingginya hipertensi gestasional yang menimpa ibu hamil memberikan dampak negatif terhadap janin yang di kandung ibu dalam kehamilan dan persalinan yang diantaranya akan lahir janin dengan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), perdarahan, gagal jantung, syok hingga kematian.	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analitik.	Desain penelitian ini juga melalui pendekatan kuantitatif secara cross sectional.	Pada penderita hipertensi gestasional, aliran darah ke plasenta menurun dan menyebabkan gangguan pada plasenta. Plasenta yang tidak baik akan berdampak pada gangguan pertumbuhan janin sehingga berat badan janin yang dilahirkan rendah.

2.	Pengaruh Ibu Bersalin Dengan Preeklamsia Terhadap Kejadian Resiko Tinggi Pada Bayi Baru Lahir Di RSD Dr. Soebandi Jember Tahun 2017	Eni, dkk	2017	Masalah yang diakibatkan oleh hipertensi gestasional	Hipertensi dalam kehamilan dapat menyebabkan komplikasi pada ibu dan janin. Komplikasi yang terberat adalah kematian ibu dan janin. Dampak preeklamsia terhadap ibu yaitu solusio plasenta, hipofibrinogenemia, hemolisis, perdarahan otak, kelainan mata, edema paru-paru, nekrosis hati, sindroma HELLP, kelainan ginjal. Sedangkan pada janin yaitu prematuritas, asfiksia, dan kematian janin intra uterin	Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional	Pengambilan data menggunakan data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari suatu institusi ataupun instansi, majalah ilmiah, atau hasil penelitian orang lain	Kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) pada bayi baru lahir juga merupakan salah satu dari risiko yang disebabkan oleh hipertensi gestasional.
3.	Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Trimester III	Jumaiza, dkk	2018	Efek dari hipertensi gestasional	Perempuan hamil dengan hipertensi mempunyai resiko tinggi untuk komplikasi yang berat seperti penyakit jantung, penyakit pembuluh darah otak, ataupun gagal organ hingga kematian. Terhadap janin,	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.	Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2017 di UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak.	Hipertensi dalam kehamilan merupakan penyulit kehamilan dan merupakan salah satu dari tiga penyebab tertinggi mortalitas dan morbiditas ibu

					hipertensi mengakibatkan resiko perkembangan janin dalam rahim yang terlambat, kelahiran sebelum waktunya, dan kematian janin dalam rahim.			bersalin
4.	Analisis Perilaku Kesehatan Dan Faktor Resiko Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Poliklinik Obstetri Gynekologi RSUD Kabupaten Kediri	Fitri, dkk	2018	Komplikasi yang terjadi	Salah satu komplikasi yang sering terjadi adalah hipertensi pada kehamilan. Penyakit ini menyebabkan angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi pada ibu dan janin yang dikandungnya sehingga merupakan masalah kesehatan pada masyarakat.	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.	Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2017 di UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak.	Hipertensi gestasional adalah sindrom hipertensi kehamilan tertentu dengan kondisi multisistem dengan multifaktorial penyebab, unik untuk manusia, yang berhubungan secara signifikan terhadap angka kematian dan kesakitan maternal dan perinatal.
5.	Hubungan Preeklamsia Dengan Kejadian Persalinan	Nurhayati	2018	Masalah potensial yang terjadi pada hipertensi gestasional	Hipertensi gestasional mengakibatkan terbatasnya pertumbuhan janin dan kecil untuk usia kehamilan serta kelahiran	Penelitian observasional dengan rancangan case control	Total kasus ada 45 orang (ibu melahirkan bayi tunggal pada usia kehamilan 20-36	Ibu hamil dengan hipertensi gestasional dapat menjadi berbahaya untuk ibu dan bayi.

	Preterm di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang				prematur. Sehingga dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas neonatal. Tanpa perawatan dan manajemen yang tepat, hipertensi gestasional akan menyebabkan beberapa komplikasi kesehatan yang serius termasuk persalinan preterm/prematur dan kejadian kematian.		minggu) dan kontrol ada 45 orang (ibu melahirkan bayi tunggal pada usia kehamilan ≥ 37 minggu).	Hal ini dapat menyebabkan munculnya masalah perkembangan dan kejadian kematian bayi
6.	Gambaran Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar	A.Arniyanti	2015	Komplikasi pada hipertensi gestasional	Hipertensi dalam kehamilan dapat menyebabkan morbiditas atau kesakitan pada ibu (termasuk preeklampsia, eklampsia, perdarahan otak. Oedema paru, (cairan didalam paru), gagal ginjal akut, dan pengumpulan atau pengentalan darah didalam pembuluh darah) serta morbiditas pada janin (termasuk pertumbuhan janin terhambat dalam uterus,	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif	Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya.	Peningkatan tekanan darah terhadap ibu hamil sangat erat kaitannya dengan komplikasi yang akan terjadi pada ibu maupun janinnya.

					kematian janin dalam rahim, solusio plasenta atau terlepas dari tempat implantasi, dan kelahiran prematur). Selain itu hipertensi juga merupakan penyebab kematian ibu.			
7.	Hubungan Asupan Natrium, Kalsium dan Magnesium dengan Tekanan Darah pada Ibu Hamil Trimester II dan III (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Kabupaten Temanggung)	Ella, F, dkk	2017	Komplikasi yang terjadi pada kasus hipertensi gestasional	Hipertensi dalam kehamilan memiliki kecenderungan ke arah komplikasi. Hipertensi gestasional merupakan suatu penyakit dengan gejala hipertensi, pusing dan oedema yang muncul pada saat kehamilan biasanya pada triwulan kedua dan ketiga, sedangkan eklampsia merupakan kasus akut pada penderita preeklamsi yang disertai dengan kejang menyeluruh dan koma.	Penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan cross sectional	Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil pada trimester II dan III yang terdata di Puskesmas Bulu Kabupaten Temanggung yaitu 114 ibu hamil.	Mengingat hipertensi dalam kehamilan dapat berdampak buruk terhadap kondisi bayi dan ibu yang dilahirkan maka perlu dilakukan asuhan yang cepat dan tepat mengenai kondisi bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan hipertensi gestasional

8.	Prevalensi Hipertensi Pada Kehamilan Di Indonesia Dan Berbagai Faktor Yang Berhubungan	Anna, M	2015	Komplikasi hipertensi gestasional	Beberapa komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh hipertensi pada kehamilan antara lain kekurangan cairan plasma akibat gangguan pembuluh darah, gangguan ginjal, gangguan hematologis, gangguan kardiovaskular, gangguan hati, gangguan pernafasan, sindrom HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count), serta gangguan pada janin seperti pertumbuhan terhambat, prematuritas hingga kematian dalam rahim. Hipertensi pada kehamilan juga dapat berlanjut menjadi preeklamsia dan eklamsia yang dapat menyebabkan kematian pada ibu maupun janin. (Anna, 2015)	Penelitian ini adalah analisis lanjut riset kesehatan dasar	Metode penghitungan dan cara penarikan sampel yang serupa dengan survei kesehatan nasional	Ibu hamil yang menderita hipertensi sebelum hamil memiliki kemungkinan komplikasi pada kehamilannya lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil yang menderita hipertensi ketika sudah hamil
----	--	---------	------	-----------------------------------	--	---	--	--

9.	Analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada kehamilan di Kota Manado	Yudhaputra, dkk	2016	Masalah yang ditimbulkan hipertensi gestasional	Gangguan hipertensi pada kehamilan (hypertension pregnancy disorders) merupakan penyebab peningkatan morbiditas dan mortalitas maternal, janin dan neonatus. Wanita hamil dengan hipertensi mempunyai risiko yang tinggi untuk komplikasi yang berat seperti solusio plasenta, penyakit serebrovaskular, gagal organ dan koagulasi intravascular.	Desain penelitian yang digunakan ialah penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional.	Sampel penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang datang atau yang ada dan bersedia di tempat penelitian dalam periode september-november 2016.	Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah arteri, kerusakan pada jantung, kerusakan pada otak, ginjal dan mata, serta mempercepat terjadinya penyakit kardiovaskular yang kronis.
10.	Hipertensi Pada Kehamilan Analisis Kasus	Imami, N.	2015	Komplikasi hipertensi gestasional	Salah satu penyakit yang sering mengancam kehamilan adalah hipertensi dalam kehamilan keadaan ini dapat meyebabkan morbiditas pada janin (termasuk pertumbuhan janin terhambat didalam rahim, kematian janin dalam rahim dan kekahiran prematur) serta	Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan desain cross sectional	Dalam penelitian ini akan dilihat apakah ada hubungan antara umur, paritas, umur menarcheobesitas, riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi gestasional	Ancaman kehidupan otak, ginjal dan perubahan karakteristik hati dari penyakit ini merupakan risiko tinggi bagi wanita. Penyebab utama penyakit ini masih belum diketahui dan ini tak dapat

					morbiditas pada ibu (termasuk kejang preeklampsia, pendarahan otak, edema paru, gagal ginjal akut dan penggumpalan darah) bahkan meyebabkan kematian ibu.			dicegah atau disembuhkan secara efektif.
--	--	--	--	--	---	--	--	--

D. Langkah IV : Identifikasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi

Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan pada kehamilan yang disertai dengan hipertensi gestasional dengan melakukan konsultasi dan kolaborasi berdasarkan referensi yang telah didapatkan.

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Pengaruh Ibu Bersalin Dengan Preeklamsia Terhadap Kejadian Resiko Tinggi Pada Bayi Baru Lahir Di RSD Dr. Soebandi Jember Tahun 2017	Eni, dkk	2017	Pemberian obat Dopamet	Jika terjadi preeklamsia maka tindakan segera yang dilakukan yaitu berkolaborasi dengan dokter mengenai pemberian obat Dopamet 3 x 500 mg dengan cara oral.	Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional	Pengambilan data menggunakan data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari suatu institusi ataupun instansi, majalah ilmiah, atau hasil penelitian orang lain	Penyebab terjadinya hipertensi dalam kehamilan saat ini tidak bisa diketahui dengan pasti maka pemeriksaan kehamilan secara teratur sangat penting agar dapat mendeteksi komplikasi yang akan terjadi.
2.	Faktor Risiko Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit	Sukfitrianty, dkk	2016	Pemberian MgSO ₄	Jika terjadi eklampsia maka tindakan yang dilakukan adalah pemberian MgSO ₄	Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional	Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang ada di	Pemberian anti kejang/anti konvulsan magnesium sulfat

	Hikmah Kota Makassar				secara intravena kepada ibu dengan eklamsia (sebagai tatalaksana kejang) dan preeklamsia berat (sebagai pencegahan kejang).	dengan menggunakan pendekatan case control study	Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar	(MgSO ₄) sebagai pencegahan dan terapi kejang. MgSO ₄ merupakan obat pilihan untuk mencegah dan mengatasi kejang pada preeklamsia berat dan eklamsia.
3.	Analisis Perilaku Kesehatan Dan Faktor Resiko Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Poliklinik Obstetri Gynekologi RSUD Kabupaten Kediri	Fitri, dkk	2018	Pengobatan segera untuk menghindari komplikasi pada ibu	Dalam keadaan gawat tindakan yang dilakukan yaitu pemberian obat-obatan untuk menghindari kejang (anti kejang), antihipertensi, pemberian diuretik, pemberian infus dekstrosa 5%, dan pemberian antasida.	Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik.	Sampel yang digunakan adalah ibu yang datang memeriksakan kehamilannya di Poliklinik Obstetri Gynekologi di RSUD Kabupaten Kediri yang memenuhi kriteria inklusi sejumlah 181 ibu hamil.	Pasien dianjurkan segera berobat jika terdapat gejala kaki bertambah berat (edema), kepala pusing, gerakan janin terasa berkurang dan mata makin kabur.
4.	Hubungan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di	Pesta S, dkk	2016	Tindakan kolaborasi	Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain seperti ahli gizi agar dapat	Desain penelitian ini adalah penelitian	Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 69 ibu	Kolaborasi yang dilakukan untuk membantu mencegah

	Wilayah Biromaru				mengungkapkan jika kandungan zat gizi dalam konsumsi makanan yang memenuhi kecukupan yang dianjurkan merupakan salah satu upaya untuk penanggulangan dan pencegahan terjadinya kenaikan tekanan darah pada ibu hamil yang pada akhirnya dapat membantu menurunkan angka kematian bagi ibu	kuantitatif yaitu pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif dengan menggunakan metode cross sectional	hamil sesuai data dari Puskesmas Sigi-Biromaru	terjadinya komplikasi pada ibu dan janin
5.	Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil	Nuning dan Mardiana	2016	Kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya	Pada kasus hipertensi gestasional tindakan segera yang perlu dilakukan adalah kolaborasi dengan dr, SpOG serta kolaborasi dengan laboratorium dan pemeriksaan tekanan darah, DJJ, agar tidak menimbulkan bentuk kelainan patologis.	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik	Sampel kasus dalam penelitian ini adalah sebagian ibu hamil yang menderita preeklampsia yang tercatat dalam catatan medik di RSUD Kabupaten Brebes	Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain agar dapat mencegah terjadinya komplikasi pada ibu dan janin.

6.	Hipertensi Pada Kehamilan Analisis Kasus	Imami, N	2015	Pencegahan komplikasi pada ibu dan janin	Jika terjadi penyakit kardiovaskuler pada ibu hamil maka tindakan yang dilakukan yaitu pelaksanaan antenatal dengan kerja sama yang baik antara spesialis obstetri, kardiologis, nutrisisionis serta melakukan manajemen persalinan baik normal maupun seksio sesarea dalam anestesi regional. Kala persalinan biasanya tidak berbahaya. Pemberian sedasi dan derivat morfin dapat menguntungkan ibu	Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan desain cross sectional	Dalam penelitian ini akan dilihat apakah ada hubungan antara umur, paritas, umur menarche obesitas, riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi gestasional	Pada penderita penyakit jantung, dalam kala persalinan diperlukan pengawasan khusus dan sedapat-dapatnya diusahakan partus pervaginam.
7.	Asuhan Kebidanan pada Ny. S kehamilan trimester II dengan hipertensi gestasional, 2019.	Ningsih, E	2019	Tindakan yang dilakukan pada kasus hipertensi gestasional.	Penanganan segera pada kasus ini adalah melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter obgyn untuk mencegah terjadinya komplikasi hipertensi lebih lanjut, kolaborasi dengan dokter ongyn dalam	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analitik.	Desain penelitian ini juga melalui pendekatan kuantitatif secara cross sectional.	Peran petugas kesehatan terutama bidan sangat penting didalam memberikan penyuluhan pada ibu hamil.

					pemberian obat antihipertensi seperti metildopa atau nepidipin. Serta kolaborasi dengan laboratorium untuk mendeteksi perkembangan penyakit hipertensi menjadi preeklampsia dengan cara memeriksa adanya protein urin dan pemeriksaan tekanan darah agar tidak menimbulkan bentuk kelainan patologis.			
8.	Hubungan Preeklampsia Dengan Kejadian Persalinan Preterm di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang	Nurhayati	2018	Penggunaan aspirin	Jika pertumbuhan janin terhambat terjadi pada ibu hamil dengan hipertensi perlu dilakukan pengawasan dan pengobatan dari dokter spesialis. Tindakan yang dilakukan yaitu menggunakan aspirin dalam jumlah kecil dapat membantu dalam	Penelitian observasional dengan rancangan case control di Rumah Sakit Umum Tangerang.	Total kasus ada 45 orang (ibu melahirkan bayi tunggal pada usia kehamilan 20-36 minggu) dan kontrol ada 45 orang (ibu melahirkan bayi tunggal pada usia kehamilan ≥ 37 minggu).	Tatalaksana kehamilan dengan IUGR bertujuan suportif, karena tidak ada terapi yang paling efektif sejauh ini, adalah untuk melahirkan bayi yang sudah cukup usia dalam kondisi terbaiknya dan

					beberapa kasus IUGR. Apabila istirahat di rumah tidak dapat dilakukan maka harus segera dirawat di rumah sakit. Pengawasan pada janin termasuk diantaranya adalah melihat pergerakan janin serta pertumbuhan janin menggunakan USG setiap 3-4 minggu.			meminimalisasi risiko pada ibu
9.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Hipertensi Pada Kehamilan Studi kasus Contraldi Wilayah Kerja Puskesmas Poriahan Tapanuli Tengah Tahun 2017	Uli, B, dkk	2017	Pemberian PASI dan terapi obat	Jika terjadi kelahiran prematur maka tindakan yang dilakukan adalah Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian PASI dan terapi obat. Obat yang diberikan yaitu Fixac ml/hari dan San B pl ml/hari dalam bent menggunakan pipet serta pemberian PASI 20 cc s melalui NGT.	Jenis penelitian yang digunakan adalah studi analitik dengan desain studi case control	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang melakukan kunjungan ke di Wilayah kerja Puskesmas Poriahan Kabupaten	Pada masalah bayi dengan kelahiran prematur perlu dilakukan penanganan sesuai dengan masalah yang ada maka tindakan yang paling tepat yaitu melakukan kolaborasi dengan dokter

10.	Hubungan Konsumsi Makanan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Desa Mekarbahalat Kecamatan Jawa Marajabah Jambi Kabupaten Simalungun Tahun 2016	Ira, dkk	2016	Pemberian obat antihipertensi	Pada kasus hipertensi gestasional perlu dilakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat antihipertensi. Antihipertensi yang dapat diberikan adalah nifedipin 10 mg. Setelah 1 jam, jika tekanan darah masih tinggi dapat diberikan nifedipin ulangan 10 mg dengan interval satu jam, dua jam, atau tiga jam sesuai kebutuhan.	Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat analitik observasional dengan jenis rancangan penelitian cross sectional.	Besarnya sampel dihitung berdasarkan rumus penentuan besar sampel yaitu sebanyak 55 orang lansia yang bersedia untuk diwawancarai.	Pemberian obat antihipertensi yaitu diberikan adalah nifedipin 10 mg.
-----	--	----------	------	-------------------------------	---	---	--	---

E. Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan

Perencanaan secara menyeluruh dan rasional terhadap masalah kehamilan yang disertai dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi yang telah didapatkan

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Faktor Risiko Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar	Sukfitrianty, dkk	2016	Meningkatkan pengetahuan ibu dengan hipertensi gestasional	Perlunya peningkatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin ditempat pelayanan kesehatan.	Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan menggunakan pendekatan case control study	Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang ada di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar	Pemeriksaan antenatal care pada ibu secara rutin untuk menekan angka kajadian hipertensi gestasional
2.	Pengaruh Pengetahuan, Sikap Dan Dukungan Keluarga Terhadap Diet Hipertensi Di Desa Hulu	Almina, dkk	2018	Memberikan pengetahuan baik	Menyampaikan bahwa pengetahuan datang dari pengalaman dapat diperoleh dengan informasi yang didapat dan akan mempengaruhi sikap. Jika mempunyai pengetahuan tinggi, secara otomatis orang tersebut bersikap dan	Jenis penelitian adalah Cross-Sectional Study dengan pendekatan explanatory.	Populasi dalam penelitian adalah seluruh penderita hipertensi di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu berjumlah 108 orang dan seluruh	Pengetahuan responden yang baik dan sikap positif serta dukungan keluarga yang baik akan memiliki peluang

	Kecamatan Pancur Baru Tahun 2016				berperilaku yang sesuai dengan pengetahuannya.		populasi dijadikan sampel.	pelaksanaan diet hipertensi dengan baik.
3.	Hubungan Preeklampsia dan Faktor Lain Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	Lia, I	2018	Melakukan tindakan ANC	Melakukan pemeriksaan antenatal yang adekuat, penyuluhan tanda bahaya selama kehamilan, dan dapat diberikan pengobatan yang cukup supaya hipertensi gestasional tidak bertambah menjadi preeklamsia ringan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu maupun janin	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analitik.	Desain penelitian ini juga melalui pendekatan kuantitatif secara cross sectional.	Kepada ibu hamil agar menjarangkan jarak kehamilan dan melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama hamil untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu dan janin.
4.	Hubungan Preeklamsia Dengan Kejadian Persalinan Preterm di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang	Nurhayati	2018	Pemeriksaan ANC secara rutin	Kunjungan pemeriksaan kehamilan yang rutin dan tepat akan segera diketahui ada atau tidaknya masalah dalam kehamilan. Hal ini sesuai dengan tujuan antenatal care yaitu mengenal dan menangani sedini mungkin penyulit yang terdapat saat kehamilan, saat persalinan dan kala nifas; mengenal dan menangani penyakit yang menyertai	Penelitian observasional dengan rancangan case control	Total kasus ada 45 orang (ibu melahirkan bayi tunggal pada usia kehamilan 20-36 minggu) dan kontrol ada 45 orang (ibu melahirkan bayi tunggal pada usia kehamilan ≥ 37 minggu).	Ibu yang melakukan kunjungan ANC kurang dari 4 kali mempunyai risiko 4,88 kali lebih besar untuk melahirkan preterm dibandingkan dengan ibu yang melakukan

					kehamilan, persalinan dan kala nifas; memberikan nasehat dan petunjuk yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, kala nifas, laktasi dan aspek keluarga berencana; menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal			kunjungan ANC lebih dari 4 kali
5.	Pengaruh Ibu Bersalin Dengan Preeklamsia Terhadap Kejadian Resiko Tinggi Pada Bayi Baru Lahir Di RSD Dr. Soebandi Jember Tahun 2017	Eni, dkk	2017	Upaya mengatasi masalah hipertensi gestasional	Pemberikan pengobatan yang cukup supaya penyakit tidak menjadi lebih berat, harus selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya preeklampsia kalau ada faktor-faktor predisposisi, diet tinggi protein, dan rendah lemak, karbohidrat, garam dan penambahan berat badan yang tidak berlebihan perlu dianjurkan, Mencari pada tiap pemeriksaan tanda-tanda preeclampsia	Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional	Pengambilan data menggunakan data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari suatu institusi ataupun instansi, majalah ilmiah, atau hasil penelitian orang lain	Pemberian obat pada ibu yang mengalami hipertensi gestasional dapat membantu mendeteksi dini komplikasi pada masa kehamilan, persalinan dan nifas.
6.	Gambaran Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	A.Arniyanti	2015	Menjaga berat badan agar tetap ideal	Ibu hamil harus menjaga berat badanya selama hamil agar mengalami kenaikan secara normal. Cara yang dapat dilakukan oleh ibu adalah dengan berolahraga ringan	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif	Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya.	Mengaja berat badan selama hamil karena adanya peningkatan tekanan darah

	Makassar				secara teratur, makanan dengan menu gizi seimbang namun tidak berlebih dan istirahat yang cukup			terhadap ibu hamil sangat erat kaitannya dengan kenaikan berat badan yang berlebih
7.	Asuhan Kebidanan Pada Ny. E Dengan Hipertensi Gestasional	Yulrina, A	2018	Menjaga pola istirahat	Asuhan yang dapat diberikan pada ibu hamil dengan Hipertensi Gestasional adalah pemeriksaan antenatal care yang teratur, cukup istirahat dengan tidur malam sekurang-kurangnya 8-10 jam dan tidur siang sedikitnya 2 jam, kurangi pekerjaan rumah tangga dan hindari situasi yang mencetuskan stress, diet tinggi protein, rendah hidrat arang, rendah lemak dan rendah garam	Studi kasus ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan pendekatan Continuity of care diberikan pada ibu hamil	Jenis data primer. Cara pengumpulan data anamnesa, observasi, pemeriksaan dan dokumentasi. Analisa data dengan membandingkan antara data yang diperoleh dengan teori yang ada.	Asuhan yang dilakukan pada ibu dengan hipertensi gestasional sesuai dengan teori yang ada disesuaikan dengan kebutuhan pasien seperti tetap menjaga pola istirahat
8.	Hipertensi Pada Kehamilan Analisis Kasus	Imami N.	2015	Memberikan pelayanan yang adekuat di	Memberikan pelayanan kepada pasien dengan mengukur tinggi badan, memonitor berat	Jenis penelitian ini menggunakan	Dalam penelitian ini akan dilihat apakah ada	Pemberi pelayanan kesehatan harus

				fasilitas kesehatan. Faktor yang	badan, tekanan darah, dan posisi fundus uteri, memberikan vaksin tetanus toxoid dan memberikan sedikitnya 90 tablet zat besi. Wanita hamil diberikan pelayanan perawatan antenatal paling tidak empat kali; sekali pada trimester pertama dan trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga. Akan tetapi, di kota besar jumlah kunjungan antenatal tergantung kebijakan dan prosedur yang digunakan di rumah sakit.	metode deskriptif analitik dengan desain cross sectional	hubungan antara umur, paritas, umur menarche obesitas, riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi gestasional	meluaskan wawasannya dalam melihat masalah perempuan dengan melibatkan suatu tim multidisiplin
9.	Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil	Nuning dan Mardiana	2016	Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka kejadian hipertensi gestasional	Penyuluhan yang dilakukan oleh bidan desa dalam acara PKK desa atau arisan desa yang biasa dilakukan setiap sebulan sekali sehingga mereka cenderung memperhatikan kesehatannya dengan melakukan pemeriksaan antenatal secara lengkap sehingga tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kejadian preeklampsia.	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik	Sampel kasus dalam penelitian ini adalah sebagian ibu hamil yang menderita preeklampsia yang tercatat dalam catatan medik di RSUD Kabupaten Brebes	Penyuluhan dilakukan agar ibu yang mengalami hipertensi gestasional melakukan pemeriksaan antenatal dapat mencegah perkembangan hipertensi gestasional

10.	Analisis Perilaku Kesehatan Dan Faktor Resiko Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Poliklinik Obstetri Gynekologi RSUD Kabupaten Kediri	Fitri, dkk	2018	Upaya pencegahan pada ibu yang mengalami hipertensi gestasional	Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi yaitu melakukan deteksi dini tanda dan bahaya dalam kehamilan. Melalui tanda-tanda klinis pada saat perawatan antenatal dengan pemantauan kenaikan tekanan darah, proteinuria, kenaikan berat badan selama hamil dan status gizi serta menghindari faktor-faktor yang beresiko untuk terjadinya hipertensi gestasional dalam kehamilan.	Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik.	Sampel yang digunakan adalah ibu yang datang memeriksakan kehamilannya di Poliklinik Obstetri Gynekologi di RSUD Kabupaten Kediri yang memenuhi kriteria inklusi sejumlah 181 ibu hamil.	Untuk membantu mengenali dan mencegah resiko terjadinya hipertensi gestasional, petugas kesehatan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan ANC.
-----	--	------------	------	---	---	--	--	--

F. Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan

Mengidentifikasi pelaksanaan dari semua rencana terkait masalah kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi yang telah didapatkan

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Faktor Risiko Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar	Sukfitrianty, dkk	2016	Melakukan pemeriksaan antenatal secara rutin	Pemeriksaan antenatal merupakan salah upaya untuk mendeteksi faktor resiko terjadi resiko terhadap bahaya-bahaya kelangsungan kehamilan dan persalinan terutama penyakit hipertensi. Pemeriksaan antenatal penting untuk mendeteksi sedini mungkin sehingga tindakan preventif maupun kuratif dapat dilakukan dengan baik. Pemeriksaan antenatal berupa pelayanan 7 T minimal 4 kali selama kehamilan bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa kehamilan berakhir dengan persalinan normal	Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan menggunakan pendekatan case control study	Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang ada di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar	Melakukan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksa keadaan ibu dan janin secara berkala, yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan

2.	Hubungan Konsumsi Makanan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Desa Mekarbahalat Kecamatan Jawa Marajabah Jambi Kabupaten Simalungun Tahun 2016	Ira, dkk	2016	Menjaga pola nutrisi selama hamil.	Memperbaiki asuhan nutrisi ibu hamil agar tidak terjadi masalah dalam kehamilannya. Asupan makanan dengan kandungan lemak dan natrium yang tinggi dapat memengaruhi tinggi rendahnya tekanan darah dalam tubuh sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi. Kenaikan kadar natrium dalam darah dapat merangsang sekresi renin dan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah perifer yang berdampak pada meningkatnya tekanan darah.	Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat analitik observasional dengan jenis rancangan penelitian cross sectional.	Besarnya sampel dihitung berdasarkan rumus penentuan besar sampel yaitu sebanyak 55 orang lansia yang bersedia untuk diwawancarai.	Jenis makanan pencegah hipertensi yang sering dikonsumsi responden yaitu jagung, ikan air tawar, tempe, tomat, buah pisang dan kacang hijau. Sedangkan jenis makanan pemicu hipertensi yang sering dikonsumsi responden yaitu: daging babi, ikan asin dan biskuit.
3.	Hubungan Preeklampsia dan Faktor Lain Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	Lia, I	2018	Pemberian pengobatan pada kasus hipertensi gestasional	Melakukan pemeriksaan antenatal yang adekuat, teliti mengontrol tanda-tanda hipertensi gestasional sedini mungkin, memperbaiki status gizi ibu hamil, penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, penyuluhan tanda bahaya selama kehamilan, dan dapat diberikan pengobatan yang cukup supaya hipertensi	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analitik.	Desain penelitian ini juga melalui pendekatan kuantitatif secara cross sectional.	Pemberian pengobatan pada ibu guna untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu bersalin dan bayi.

					gestasional tidak bertambah menjadi preeklamsia ringan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu maupun janin.			
4.	Analisis Perilaku Kesehatan Dan Faktor Resiko Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Poliklinik Obstetri Gynekologi RSUD Kabupaten Kediri	Fitri, dkk	2018	Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi	Melakukan skrining rutin faktor resiko spesifik untuk hipertensi gestasional dan pemantauan perilaku kesehatan yang baik, diharapkan para ibu bisa melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ke tenaga kesehatan dan jika dideteksi adanya tanda bahaya atau komplikasi yang menyertai kehamilan maka petugas kesehatan bisa melakukan deteksi dini kegawatdaruratan maternal dan neonatal, melakukan pemantauan secara intensif kesejahteraan ibu dan janin, melakukan rujukan dini terencana apabila dibutuhkan sehingga mengurangi komplikasi ke ibu dan janin	Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik.	Sampel yang digunakan adalah ibu yang datang memeriksakan kehamilannya di Poliklinik Obstetri Gynekologi di RSUD Kabupaten Kediri yang memenuhi kriteria inklusi sejumlah 181 ibu hamil.	Untuk membantu mengenali dan mencegah resiko terjadinya hipertensi gestasional, petugas kesehatan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan ANC
5.	Asuhan Kebidanan Pada Ny. E Dengan	Yulrina, A	2018	Upaya dalam mengatasi hipertensi	Memberitahu ibu beberapa cara mengatasi pusing, yaitu makan teratur dan bergizi seimbang,	Studi kasus ini menggunakan	Jenis data primer. Cara pengumpulan	Pada ibu yang mengalami hipertensi

	Hipertensi Gestasional				mengatur pola makan yang sehat seperti rendah garam, rendah kolesterol, dan rendah hidrat arang serta meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran.	metode deskriptif observasional dengan pendekatan Continuity of care diberikan pada ibu hamil	data anamnesa, observasi, pemeriksaan dan dokumentasi. Analisa data dengan membandingkan antara data yang diperoleh dengan teori yang ada.	gestasional untuk menghindari makanan yang asin secara berlebihan karena dapat meningkatkan kadar kolesterol dan bisa meningkatkan tekanan darah serta meningkatkan porsi dalam mengkonsumsi makanan bergizi seimbang seperti buah dan sayur.
6.	Hubungan Paritas Dan Pendidikan Ibu Dengan Kejadian Preeklamsia Di Wilayah Kabupaten Semarang	Vistra, dkk	2018	Asuhan yang diberikan pada ibu dengan hipertensi gestasional	Penatalaksanaan hipertensi gestasional ini dapat di mulai dengan mengurangi aktifitas berat seperti mengangkat benda yang berat dan menambah istirahat, untuk pengobatan farmakologis dapat digunakan metildopa atau nefidipin sebagai obat yang terpilih pada kasus hipertensi kronik dan hipertensi gestasional.	Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan case control.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang berada di wilayah kabupaten Semarang	Pemberian obat antihipertensi efektif dapat mencegah terjadinya komplikasi pada ibu

7.	Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil	Nuning dan Mardiana	2016	Tindakan yang dilakukan pada kasus hipertensi gestasional	Sementara upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus hipertensi gestasional yaitu upaya peningkatan pelayanan pemeriksaan antenatal yang dilayani oleh bidan dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, serta pelaksanaan home visite yang dilakukan pada ibu hamil yang tidak datang kontrol sesuai dengan anjuran terutama pada kehamilan risiko tinggi	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik	Sampel kasus dalam penelitian ini adalah sebagian ibu hamil yang menderita preeklampsia yang tercatat dalam catatan medik di RSUD Kabupaten Brebes	Kejadian hipertensi gestasional dapat dicegah dengan memberikan nasehat tentang diet makanan, cukup istirahat dan pengawasan antenatal.
8.	Hubungan Pola Makan Dan Kecukupan Istirahat Tidur Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Wilayah Biromaru	Corry S, dkk	2016	Diet terhadap makanan yang dapat membantu mencegah terjadi hipertensi	Mengatur pola makanan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kandungan zat gizi dalam konsumsi makanan yang memenuhi kecukupan yang dianjurkan merupakan salah satu upaya untuk penanggulangan dan pencegahan terjadinya kenaikan tekanan darah pada ibu hamil yang pada akhirnya dapat membantu menurunkan angka kematian bagi ibu	Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa,	Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 69 ibu hamil sesuai data dari Puskesmas Sigi-Biromaru	Pola makan yang rendah energi, protein, dan kalsium, serta pelayanan antenatal care berhubungan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil.

						dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif dengan menggunakan metode cross sectional		
9.	Hipertensi Pada Kehamilan Analisis Kasus	Imami N.	2015	Asuhan yang diberikan pada kasus hipertensi gestasional	Dalam perencanaan program, status perempuan dalam masyarakat tertentu juga harus dipertimbangkan. Pemberi pelayanan kesehatan harus meluaskan wawasannya dalam melihat masalah perempuan dengan melibatkan suatu tim multidisiplin.	Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan desain cross sectional	Dalam penelitian ini akan dilihat apakah ada hubungan antara umur, paritas, umur menarche obesitas, riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi gestasional	KIE yang lakukan guna untuk mencegah atau menekan terjadinya angka hipertensi pada ibu hamil
10.	Hubungan Preeklamsia Dengan Kejadian Persalinan Preterm di Rumah Sakit	Nurhayati	2018	Melakukan perawatan yang tepat karena tanpa perawatan dan manajemen yang tepat	Perawatan yang tepat dapat membantu mengenal dan menangani sedini mungkin penyulit yang terdapat saat kehamilan, saat persalinan dan kala nifas; mengenal dan menangani penyakit yang	Penelitian observasional dengan rancangan case control	Total kasus ada 45 orang (ibu melahirkan bayi tunggal pada usia kehamilan 20-36 minggu) dan kontrol ada 45	Pelayanan kegawatdaruratan kebidanan di rumah Sakit atau puskesmas harus dapat digunakan sebagai sarana

	Umum Kabupaten Tangerang				menyertai kehamilan, persalinan dan kala nifas; memberikan nasehat dan petunjuk yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, kala nifas, laktasi dan aspek keluarga berencana; menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal		orang (ibu melahirkan bayi tunggal pada usia kehamilan ≥ 37 minggu).	dalam penanganan kasus kegawatdaruaratan kebidanan.
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	---	--



G. Langkah VII: Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Mengevaluasi semua perencanaan dan pelaksanaan kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi yang telah didapatkan

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Faktor Risiko Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar	Sukfitrianty, dkk	2016	Evaluasi asuhan yang telah diberikan	Mengevaluasi hasil pemeriksaan antenatal yang merupakan salah upaya untuk mendeteksi faktor resiko terjadi resiko terhadap bahaya-bahaya kelangsungan kehamilan dan persalinan terutama penyakit hipertensi.	Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan menggunakan pendekatan case control study	Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang ada di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar	Pemeriksaan antenatal care secara rutin efektif dalam mencegah terjadinya komplikasi pada ibu dan janin
2.	Hubungan Konsumsi Makanan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Desa	Ira, dkk	2016	Mengevaluasi asuhan yang diberikan	Memperhatikan pola dan tingkat konsumsi makanannya sehari-hari yang membuat timbulnya berbagai penyakit degeneratif terlebih pada pada ibu	Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat analitik observasional dengan jenis rancangan penelitian	Besarnya sampel dihitung berdasarkan rumus penentuan besar sampel yaitu sebanyak 55 orang lansia yang	Makanan yang dapat mencegah hipertensi yang sering dikonsumsi yaitu jagung, ikan air tawar, tempe, tomat, buah pisang

	Mekarbahalat Kecamatan Jawa Marajabah Jambi Kabupaten Simalungun Tahun 2016				hamil yang membuat angka morbiditas dan mortalitas menjadi semakin tinggi.	cross sectional.	bersedia untuk diwawancarai.	dan kacang hijau. Sedangkan jenis makanan pemicu hipertensi yang sering dikonsumsi responden yaitu: daging babi, ikan asin dan biskuit.
3.	Hubungan Preeklampsia dan Faktor Lain Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	Lia, I	2018	Evaluasi rencana asuhan yang telah diberikan	Pemeriksaan antenatal yang dilakukan secara adekuat, dan penyuluhan tanda bahaya selama kehamilan, dan dapat diberikan pengobatan yang cukup supaya hipertensi gestasional tidak bertambah menjadi preeklamsia ringan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu maupun janin.	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analitik.	Desain penelitian ini juga melalui pendekatan kuantitatif secara cross sectional.	Sebagai bidan harus segera sigap dalam menghadapi dan menangani kasus tersebut guna untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu bersalin dan bayi.
4.	Analisis Perilaku Kesehatan Dan Faktor Resiko Kejadian	Fitri, dkk	2018	Evaluasi perilaku ibu hamil dengan hipertensi gestasional	Pemantauan yang dilakukan perilaku karena diharapkan para ibu bisa melakukan pemeriksaan kehamilan	Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik.	Sampel yang digunakan adalah ibu yang datang memeriksakan kehamilannya di	Mengenali dan mencegah resiko terjadinya hipertensi gestasional,

	Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Poliklinik Obstetri Gynekologi RSUD Kabupaten Kediri				secara rutin ke tenaga kesehatan dan jika dideteksi adanya tanda bahaya atau komplikasi yang menyertai kehamilan maka petugas kesehatan bisa melakukan deteksi dini kegawatdaruratan maternal dan neonatal		Poliklinik Obstetri Gynekologi di RSUD Kabupaten Kediri yang memenuhi kriteria inklusi sejumlah 181 ibu hamil.	petugas cara melakukan skrining deteksi dini hipertensi gestasional dengan memperhatikan perilaku kesehatan
5.	Asuhan Kebidanan Pada Ny. E Dengan Hipertensi Gestasional	Yulrina, A	2018	Evaluasi kembali keluhan ibu	Mengevaluasi keadaan ibu dengan menilai cara ibu dalam mengatasi rasa pusing, yaitu dengan makan teratur dan bergizi seimbang, mengatur pola makan yang sehat seperti rendah garam, rendah kolesterol, dan rendah hidrat arang serta meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran.	Studi kasus ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan pendekatan Continuity of care diberikan pada ibu hamil	Jenis data primer. Cara pengumpulan data anamnesa, observasi, pemeriksaan dan dokumentasi. Analisa data dengan membandingkan antara data yang diperoleh dengan teori yang ada.	Dengan asupan nutrisi yang baik dapat membantu mengurangi keluhan yang dialami oleh ibu

6.	Hubungan Paritas Dan Pendidikan Ibu Dengan Kejadian Preeklamsia Di Wilayah Kabupaten Semarang	Vistra, dkk	2018	Evaluasi pencegahan terhadap hipertensi	Penatalaksanaan hipertensi gestasional ini dapat di mulai dengan mengurangi aktifitas berat seperti mengangkat benda yang berat dan menambah istirahat, untuk pengobatan farmakologis dapat digunakan metildopa atau nefidipin sebagai obat yang terpilih pada kasus hipertensi kronik dan hipertensi gestasional.	Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan case control.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang berada di wilayah kabupaten Semarang	Melakukan penyuluhan dan memberikan pendidikan kepada ibu mengenai penyebab terjadinya hipertensi gestasional
7.	Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil	Nuning dan Mardiana	2016	Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hipertensi gestasional	Upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus hipertensi gestasional yaitu upaya peningkatan pelayanan pemeriksaan antenatal yang dilayani oleh bidan dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, serta pelaksanaan home visite yang dilakukan	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik	Sampel kasus dalam penelitian ini adalah sebagian ibu hamil yang menderita preeklampsia yang tercatat dalam catatan medik di RSUD Kabupaten Brebes	Memberikan nasehat tentang cara mengatasi hipertensi gestasional

					pada ibu hamil yang tidak datang kontrol sesuai dengan anjuran terutama pada kehamilan risiko tinggi			
8.	Hubungan Pola Makan Dan Kecukupan Istirahat Tidur Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Wilayah Biromaru	Corry S, dkk	2016	Evaluasi tingkat keberhasilan asuhan yang diberikan	Menilai kembali penanggulangan dan pencegahan terjadinya kenaikan tekanan darah pada ibu hamil yang pada akhirnya dapat membantu menurunkan angka kematian bagi ibu	Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif dengan menggunakan metode cross sectional	Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 69 ibu hamil sesuai data dari Puskesmas Sigi-Biromaru	Terjadi penurunan tekanan darah pada ibu jika mengikuti semua anjuran bidan
9.	Hipertensi Pada Kehamilan Analisis Kasus	Imami N.	2015	Mengevaluasi tingkat keberhasilan program pemerintah	Menjalankan perencanaan program, status perempuan dalam masyarakat tertentu juga harus dipertimbangkan. Pemberi pelayanan kesehatan harus	Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan desain cross sectional	Dalam penelitian ini akan dilihat apakah ada hubungan antara umur, paritas, umur menarcheobesitas, riwayat keluarga	Menerapkan semua aturan-aturan pemerintah agar dapat menekan angka terjadinya kematian pada ibu dan janin.

					meluaskan wawasannya dalam melihat masalah perempuan dengan melibatkan suatu tim multidisiplin.		dengan kejadian hipertensi gestasional	
10.	Hubungan Preeklamsia Dengan Kejadian Persalinan Preterm di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang	Nurhayati	2018	Evaluasi asuhan yang diberikan pada ibu dengan hipertensi gestasional	Menerapkan perawatan dan manajemen yang tepat pada kasus agar tidak terjadi komplikasi pada ibu dan calon bayinya.	Penelitian observasional dengan rancangan case control	Total kasus ada 45 orang (ibu melahirkan bayi tunggal pada usia kehamilan 20-36 minggu) dan kontrol ada 45 orang (ibu melahirkan bayi tunggal pada usia kehamilan ≥ 37 minggu).	Menjalankan pelayanan kegawatdaruratan kebidanan di rumah Sakit atau puskesmas sebagai sarana dalam penanganan kasus kegawatdaruratan kebidanan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telaah *Evidence Based Learning* Asuhan 7 Langkah Varney Berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan pada kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi yang telah di temukan. Dalam hal ini pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan asuhan kebidanan dengan 7 langkah varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potesial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan mengumpulkan semua referensi yang berkaitan dengan data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien, riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium (Mangkuji, 2012: 5).

Dari hasil telaah literatur yang didapatkan pada kasus kehamilan dengan hipertensi gestasional dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi lengkap mengenai hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional adalah kenaikan tekanan darah yang hanya dijumpai dalam kehamilan

sampai 12 minggu pasca persalinan, tidak dijumpai keluhan dan tanda-tanda preeklampsia lainnya. Diagnosa akhir ditegakkan pasca persalinan (Fadlun, dan Achmad, 2014: 50).

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang direklarifikasi sebagai transient jika bukti untuk preeklampsia yang tidak muncul, dan tekanan darah kembali normal setelah 12 minggu postpartum. Protein urian adalah penanda yang mendefinisikan sistem kebocoran endotel luas, yang menjadi ciri sindrom preeklampsia. Meskipun demikian, ketika tekanan darah meningkat drastis, sangat berbahaya untuk ibu dan janin jika kita mengabaikan peningkatan ini hanya karena protein urin belum muncul seperti yang chesley (1985) tegaskan, 10 persen dari kejang eklampsia terjadi sebelum protein urin diidentifikasi (Setiawati, Dewi, 2013: 144).

Terdapat banyak faktor risiko untuk terjadi hipertensi gestasional yang dapat dikelompokkan dalam faktor resiko sebagai berikut :

a. Primigravida

Ibu hamil yang masuk dalam primigravida dianggap sebagai salah satu faktor resiko untuk mengalami hipertensi gestasional menurut teori yang mengatakan bahwa angka kejadian untuk primigravida, muda maupun tua lebih tinggi. Adapun teori intoleransi imunologik yang menjelaskan hal tersebut bahwa dugaan faktor imunologik berperan terhadap terjadinya hipertensi gestasional terbukti dengan fakta bahwa primigravida mempunyai resiko lebih besar

terjadinya hipertensi gestasional jika dibandingkan dengan multigravida. Hal ini karena adanya respons imun menolak adanya hasil konsepsi yang bersifat asing. Sehingga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya hipertensi gestasional (Jumaiza, dkk, 2018:133).

b. Hiperplasentosis

Pada kehamilan normal plasenta juga melepaskan debris trofoblas sebagai sisa-sisa proses apoptosis trofoblas, akibat reaksi stres oksidatif. Berbeda dengan proses apoptosis pada hipertensi gestasional, dimana pada hipertensi gestasional terjadi peningkatan stres oksidatif, sehingga produksi debris apoptosis juga meningkat. Makin banyak sel trofoblas plasenta misalnya mola hidatidosa, kehamilan multiple, diabetes melitus, hidrops fetalis, bayi besar, maka stres oksidatif akan sangat meningkat, sehingga jumlah sisa debris trofoblas juga makin meningkat sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala hipertensi gestasional (Prawirohardjo, Sarwono, 2014: 536-537).

c. Umur yang ekstrim

Umur ibu pada waktu hamil merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelangsungan kehamilan dan juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya hipertensi. Umur ibu yang terlalu muda (kurang dari 20 tahun) memiliki resiko yang besar untuk terjadinya hipertensi, hal ini disebabkan karena ibu yang hamil pada usia yang terlalu muda dari segi biologis perkembangan alat-alat reproduksinya yang belum optimal sedangkan pada usia tua (lebih dari 35 tahun) akan

menambah terjadinya komplikasi kehamilan, penelitian menunjukkan bahwa dengan bertambahnya umur ibu mengakibatkan absorpsi tubuh cenderung memburuk dan alat reproduksinya sudah mulai degenerasi sehingga memungkinkan terjadinya komplikasi.

Dengan bertambahnya umur, resiko terkena hipertensi menjadi lebih besar sehingga prevalensi hipertensi dikalangan usia lanjut cukup tinggi. Tingginya hipertensi sejalan dengan bertambahnya umur, hal ini disebabkan oleh perubahan struktur pada pembuluh darah menjadi lebih kaku, sebagai akibat adalah meningkatnya tekanan darah sistolik (Sukfitrianty, dkk, 2016: 83).

d. Riwayat keluarga yang pernah mengalami preeklampsia dan eklampsia

Hipertensi seperti banyak kondisi kesehatan lain, terjadi dalam keluarga. Jika salah satu (dua orang dari) orang tua atau saudara kandung menderita hipertensi maka peluang untuk terjadinya hipertensi sangat besar. Penelitian menunjukkan bahwa 25% dari kasus hipertensi esensial dalam keluarga mempunyai dasar genetis. Namun demikian, hal ini tidak berarti sesuatu yang pasti. Beberapa kesamaan yang tampak pada banyak keluarga justru mungkin merupakan dampak pengaruh lingkungan, pola makan dan keterampilan dalam menghadapi masalah (Casey, Aggif, 2010: 19).

e. Penyakit Ginjal

Hipertensi dalam kehamilan mengakibatkan perubahan pada beberapa organ tidak terkecuali pada organ ginjal. Secara umum

hipertensi dalam kehamilan menyebabkan terganggunya fungsi ginjal baik prerenal ataupun direnal. Pada hipertensi dalam kehamilan terjadi vasokonstriksi, yang mengakibatkan terjadinya penurunan aliran darah ke ginjal, sehingga laju filtrasi glomerulus (LFG) menurun dan laju ekskresi kreatinin dan urea juga menurun. Selain itu, pada bagian renal terjadi perubahan parenkim ginjal, mengalami pembesaran glomerulus yang diikuti dengan pembengkakan sel endotel dan hilangnya fenestra endotel glomerulus. Kedua hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya akumulasi kreatin dan urea dalam cairan tubuh dan meningkatkan konsentrasinya dalam plasma (Casey, Aggif, 2010: 18).

f. **Obesitas**

Kelebihan berat badan (obesitas) dan hipertensi sering beriringan, karena kenaikan berat badan pada ibu hamil melebihi 10-15 kg berat badan normal akan membuat jantung bekerja lebih keras. Obesitas akan membawa resiko penyakit yang lain seperti preeklamsia, diabetes gestasional, dan hipertensi gestasional. Obesitas yang terjadi pada saat kehamilan beresiko tinggi mempunyai peluang 5.140 kali mengalami hipertensi pada kehamilan dibandingkan dengan ibu yang tidak obesitas pada saat kehamilan (Uli, dkk, 2017).

2. Langkah II: Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan semua referensi yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosa atau masalah (Mangkuji, 2012: 5).

Hipertensi gestasional merupakan hipertensi yang berkembang pada bagian akhir kehamilan, tidak berhubungan dengan protein urin atau gambaran preeklampsia dan akan menghilang setelah 12 minggu postpartum. Keadaan ini bisa menandakan akan terjadi hipertensi kronik pada masa yang akan datang, tetapi mempunyai hubungan dengan hasil yang baik terhadap ibu dan janin (Fitriani, Rini, 2014: 162).

Dari hasil telaah literature yang didapatkan pada pasien yang mengalami hipertensi gestasional umumnya memiliki tekanan darah yang melebihi batas normal, di mana ia memiliki tekanan darah $>140/90$ mmHg, atau mengalami peningkatan pada sistolik ≥ 140 mmHg dan diastolik sebesar ≥ 90 mmHg, biasanya pasien mengalami hipertensi pertama kalinya pada umur kehamilan di atas 20 minggu, tanpa disertai dengan adanya protein urin, tekanan darah kembali normal sebelum 12 minggu postpartum, diagnosa hanya dibuat pada postpartum dan memiliki tanda-tanda atau gejala preeklamisia.

3. Langkah III: Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini merupakan langkah ketika melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan harus waspada menghadapi diagnosis/masalah potensial yang benar-benar terjadi (Jannah, 2012: 206-207).

Pada langkah ini yaitu mengantisipasi diagnosa/masalah potensial di susun berdasarkan masalah yang dapat beresiko tinggi terhadap masalah

kesehatan pada ibu hipertensi gestasional. Adapun masalah potensial berdasarkan hasil telaah literatur yang didapatkan bahwa masalah potensial adalah resiko terjadinya preeklamsia ringan. Pada janin pertumbuhan terhambat, kematian janin, persalinan prematur dan solusio plasenta.

Perempuan yang mengalami hipertensi gestasional mempunyai resiko tinggi terjadinya komplikasi berat seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit pembuluh darah otak atau pun gagal organ hingga kematian. Terhadap janin dapat terjadi pertumbuhan janin dalam rahim terhambat, sehingga menyebabkan kelahiran sebelum waktunya dan kematian janin dalam rahim (KJDR).

4. *Langkah IV: Identifikasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi*

Pada langkah ini, yang dilakukan oleh bidan adalah mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk konsultasi atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien (Mangkuji, 2012: 6).

Dari hasil telaah literature yang didapatkan pada kehamilan gestasional yaitu melakukan tindakan segera untuk melakukan konsultasi, kolaborasi segera dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.

Penanganan segera pada kasus ini adalah melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter obgyn untuk mencegah terjadinya komplikasi hipertensi lebih lanjut, kolaborasi dengan dokter ongyin dalam pemberian obat antihipertensi seperti metildopa atau nepidipin. Serta kolaborasi dengan laboratorium untuk mendeteksi perkembangan penyakit hipertensi menjadi preeklampsia dengan cara memeriksa adanya protein urin dan pemeriksaan tekanan darah agar tidak menimbulkan bentuk kelainan patologis.

5. Langkah V: Rencana Tindakan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh berdasarkan langkah sebelumnya. Semua perencanaan yang dibuatkan harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori *Up To Date*, perawatan berdasarkan bukti (*evidence based care*) (Jannah, 2012: 208-209).

Penataksanaan yang dilakukan pada kasus hipertensi gestasional berdasarkan hasil telaah literature yang didapatkan pada kehamilan gestasional yaitu melakukan memantau keadaan ibu, ajurkan ibu untuk mengurangi aktifitas berat seperti mengangkat beban yang berat, menambah istirahat, hindari situasi yang dapat mencetuskan stres dimana stres jelas memainkan peranan penting dalam hipertensi. Diet terhadap makanan yang tinggi protein seperti ikan, telur, tahu, tempe dan kacang-kacangan. Rendah hidrat arang seperti buah dan sayur sayuran. Rendah lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, ikan segar dan

keju. Melakukan pengawasan terhadap kehidupan dan pertumbuhan janin dengan USG, analisis protein urin dan pemberian obat antihipertensi,

6. *Langkah VI: Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan*

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang diuraikan pada langkah kelima di atas dilaksanakan secara efisien dan aman. Realisasi dari perencanaan dapat dilakukan oleh bidan, pasien, atau anggota keluarga lain. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab atas terlaksananya seluruh perencanaan (Jannah, Nurul, 2012: 209).

Implementasi yang diberikan pada ibu berdasarkan hasil telaah literatur yang didapatkan yaitu menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menyampaikan hal-hal yang dianggap penting, agar ibu dapat mengetahui perkembangan penyakit yang diderita serta merupakan tujuan utama pelayanan antenatal. Jelaskan penyebab terjadinya hipertensi gestasional agar ibu tahu cara mengatasi penyakit yang diderita. Dan anjuran ibu untuk melakukan pemeriksaan secara rutin disamping itu ibu harus menjaga pola nutrisi. Istirahat yang cukup serta kebersihan diri yang harus terjaga.

7. *Langkah VII: Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan*

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif

juga memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Adapun kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut efektif sedangkan sebagian belum efektif.

Pada prinsip tahapan evaluasi berdasarkan hasil telaah literature yang didapatkan adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai ke efektifan tindakan yang diberikan dan keberhasilan dapat dilihat dari kondisi ibu. Evaluasi yang dilakukan pada kasus hipertensi gestasional yaitu antara lain keadaan umum, tanda-tanda vital, tanda-tanda syok, tanda bahaya pada kehamilan dan nifas atau masalah potensial yang mungkin akan terjadi.

B. Implantasi Kebidanan

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa disertai protein urin dan hipertensi menghilang setelah 3 bulan pascapersalinan atau kehamilan dengan tanda-tanda preeklampsia tetapi tanpa protein urin.

Hipertensi gestasional adalah kenaikan tekanan darah yang hanya dijumpai dalam kehamilan sampai 12 minggu pasca persalinan, tidak dijumpai keluhan dan tanda-tanda preeklampsia lainnya. Diagnosa akhir ditegakkan pasca persalinan.

Hipertensi gestasional yang terjadi dapat menimbulkan komplikasi jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat seperti resiko terjadinya

preeklamsia ringan. Pada janin pertumbuhan terhambat, kematian janin, persalinan prematur dan solusio plasenta, penyakit kardiovaskuler, penyakit pembuluh darah otak atau pun gagal organ hingga kematian. Terhadap janin dapat terjadi pertumbuhan janin dalam rahim terhambat, sehingga menyebabkan kelahiran sebelum waktunya dan kematian janin dalam rahim (KJDR).

Pencegahan yang dapat dilakukan pada pasien dengan hipertensi gestasional berdasarkan dari hasil telaah literature yang didapatkan yaitu memantau keadaan ibu, ajurkan ibu untuk mengurangi aktifitas berat seperti mengangkat beban yang berat, menambah istirahat, hindari situasi yang dapat mencetuskan stres dimana stres jelas memainkan peranan penting dalam hipertensi. Diet terhadap makanan yang tinggi protein seperti ikan, telur, tahu, tempe dan kacang-kacangan. Rendah hidrat arang seperti buah dan sayur sayuran. Rendah lemak seperti putih telur dan rendah garam seperti daging, ikan segar dan keju. Melakukan pengawasan terhadap kehidupan dan pertumbuhan janin dengan USG, analisis protein urin dan pemberian obat antihipertensi.

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penulisan literatur review pada kehamilan dengan hipertensi gestasional serta menghubungkan dengan teori dan Avidance Based maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu :

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan identifikasi data dasar pada ibu yang mengalami hipertensi gestasional berdasarkan referensi maka didapatkan bahwa hipertensi gestasional adalah kenaikan tekanan darah yang hanya dijumpai dalam kehamilan sampai 12 minggu pasca persalinan, tidak dijumpai keluhan dan tanda-tanda preeklampsia lainnya. Diagnosa akhir ditegakkan pasca persalinan
2. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa / masalah aktual pada ibu yang mengalami hipertensi gestasional berdasarkan referensi maka didapatkan diagnosa aktual dilihat dari keadaan klinis, hasil pemeriksaan antenatal dan pemeriksaan laboratorium.
3. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa / masalah potensial pada kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi maka didapatkan diagnosa potensial diantisipasi terjadinya KJDR, kelahiran premature, gagal organ bahkan kematian.
4. Telah dilakukan pengidentifikasian tindakan segera dan kolaborasi pada kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi yang

5. didapatkan maka tindakan segera dilakukan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium lengkap, USG dan pemberian obat antihipertensi untuk memperbaiki keadaan ibu dan mencegah terjadinya komplikasi.
6. Telah dilakukan pengidentifikasian tindakan asuhan pada kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi maka didapatkan tindakan asuhan sesuai dengan intervensi yaitu melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Memberbaiki pola nutrisi ibu serta memberikan pengetahuan kepada ibu mengenai hipertensi gestasional
7. Telah dilakukan evaluasi asuhan kebidanan pada kehamilan dengan hipertensi gestasional berdasarkan referensi maka didapatkan hal-hal yang harus di evaluasi yaitu penanganan kehamilan dengan hipertensi gestasional agar tidak menimbulkan komplikasi pada ibu dan janinnya.

B. Saran

Melihat besarnya efek yang ditimbulkan dengan adanya masalah kehamilan dengan hipertensi gestasional yang akan berdampak pada buruknya keadaan ibu dan janinnya maka perlu diberikan tindakan yang tepat dan segera untuk mengantisipasi masalah tersebut. Oleh karena itu, adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya masalah pada ibu yang mengalami kehamilan dengan hipertensi gestasional maka perlu peningkatan kualitas pelayanan

ANC dan pertolongan yang cepat dan tepat, sehingga dapat segera diantisipasi kemungkinan masalah lain yang dapat terjadi.

2. Seorang bidan harus dapat menilai dan mengetahui penyulit-penyulit yang dapat terjadi serta memberikan tindakan yang efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Arniyanti. (2016). Gamabran Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil Di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar. *Http://Jurnal.Untad.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/ /Article/Download/ 5747/4513, 4 No 7, Ja.*
- Almina, D. (2018). Pengaru Pengetahuan, Sikap dan Dukungan Keluarga Terhadap Diet Hipertensi di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Tahun. *Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Kesehatan/Article/View/5107, 201, 11 Nomor 1.*
- Alvina, D. (2018). Faktor Resiko Kejadian Hipertansi dalam Kehamilan. *Jurnal Of Midwifery, volume 6.*
- Anna, M. (2015). Prevalensi Hipertensi pada Kehamilan Di Indonesia dan Berbagai Faktir yang Berhubungan. *Https://Www.Neliti.Com/Publications/21333/Prevalensi-Hipertensi-Pada-Kehamilan-Di-Indonesia-Dan-Berbagai-Faktor., 15 No. 2 A.*
- Antonia Anna Lukito, Eka Harmeiwaty, N. M. H. (2019). *hipertensi event_Update_konsensus_2019123191.* 118. http://www.inash.or.id/upload/event/event_Update_konsensus_2019123191.pdf
- Asrina, siswoyo putri, S., Sulistyorini, D., syamrotul maflihah, I., & nirmala sari, D. (2010). *asuhan kebidanan masa kehamilan.*
- Basri, H., Akbar, R., & Dwinata, I. (2018). Faktor yang Berhubungan dengan Hipertensi pada Ibu Hamil di Kota Makassar. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, 14(2), 21–30.* <https://doi.org/10.24853/JKK.14.2.21-30>
- Cunningham, G., & Redston, C. (2013). *Face2face intermediate student's book.*
- Cunnunghsm, F. garry, et al. (2010). *williams obsentric (23 tahun).* McGraw-hill compenies.
- Darmawangsyih. (2011). *farmakologi kebidanan (Alauddin U).*
- Dewi, V. K. (2014). Hubungan Obesitas dan Riwayat Hipertensi dengan Kejadian Preeklampsi di Puskesmas Rawat Inap Danau Panggang. *Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, 1(2), 57–61.*
- Dinas kesehata Sulawesi Selatan. (2018).
- Elya, W., Fakultas, S., & Universitas, K. (2016). *Kehamilan dengan Hipertensi Gestasional Wirda Elya Sari Pregnancy With Gestasional Hypertension. 4,*

145–148.

Fatimah, & Nuryaningsih. (2018). *Buku Ajar Buku Ajar*.

Francis-cheung, T. (2008). *manajemen berat badan kehamilan* (L. Juwono (Ed.)).

Freser, M, D., & Cooper, margareta A. (2011). *buku ajar bidan myles*. EGC.

Hermawan, N. S. A., & Novariana, N. (2018). Terapi Herbal Sari Mentimun untuk Menurunkan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.30604/jika.v3i1.69>

Icesmi sukami k, margareta Z. (2013). *kehamilan, persalinan dan nifas* (isna1 (Ed.)).

Kehamilan, P., Rsu, D. I., Surabaya, H., Prodi, M., Universitas, D. K., Adi, P., Surabaya, B., Kunci, K., & Eklampsia, P. (2012). *Hubungan obesitas terhadap pre eklampsia pada kehamilan di rsu haji. surabaya. April*, 21–24.

Kementrian kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Asuhan Keperawatan Bayi Dan Anak Untuk Perawat Dan Bidan*.

Kesehatan, J., Vol, T., Nur, A. F., Arifuddin, A., Stikes, K., & Nusantara, W. (2017). *FAKTOR RISIKO KEJADIAN PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI RSU ANUTAPURA KOTA PALU 2 . Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako Healthy Tadulako Journal (A . Fahira Nur , Adhar Arifuddin : 69-75) PENDAHULUAN Masalah kesehatan adalah suatu . 3(2), 69–75.*

Khasanah, N. (2012). *Waspada berbagai penyakit degeneratif akibat pola makan* (D. Yulianto (Ed.); Laksana).

Kodyat, B. A. (2014). Pedoman Gizi Seimbang 2014. Permenkes RI No. 41 Tahun 2014. *Persagi*, 41, 1–83. <https://file.persagi.org/share/8 Benny Kodyat - PGS 2014.pdf>

Lukito, A. A., Hermeiwaty, E., & Antonia Anna Lukito, Eka Harmeiwaty, N. M. H. (2019). *Konsensus penatalaksanaan hiperetensi*.

Lutfiatunnisa, A. A. Z., Nugrahaeni, A., Yulawati, S., & Sutiningsih, D. (2016). Faktor Host, Konsumsi Lemak, Konsumsi Kalsium dan Kejadian Hipertensi Pada Kehamilan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 69–78.

Marmi. (2011). *asuhan kebidanan pada masa antenatal* (sujono riyadi (Ed.)).

Nurhidayati, R., Sarjana, P., Kebidanan, T., Kebidanan, J., Kesehatan, P., & Kesehatan, K. (2018). *Hubungan asupan kalsium dengan HDK*.

- Optimal Pregnancy Weight _ Program Studi Ilmu Gizi. (2016). *Departement of Nurtion Science*.
- Prawiharjo, S. (2014). *ilmu kebidanan*. PT bina usaha.
- Proverawati, A., & Asfuah, S. (2009). *Buku Ajaran Gizi untuk Kebidanan* (Nuha Medik).
- Puskesmas Batua Raya. (2020).
- Quedarusman, H., Wantania, J., & Kaeng, J. J. (2013). Hubungan Indeks Massa Tubuh Ibu Dan Peningkatan Berat Badan Saat Kehamilan Dengan Preeklampsia. *Jurnal E-Biomedik*, 1(1), 305–311. <https://doi.org/10.35790/ebm.1.1.2013.4363>
- Riset Kesehatan Dasar. (2018).
- Saraswati, N., M. (2014). Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil di RSUD Brebes tahun 2014. *Unnes Journal of Public Health*, 5(2).
- Say, L., Chou, D., Gemmill, A., Tunçalp, Ö., Moller, A., Daniels, J., Gülmezoglu, A. M., Temmerman, M., & Alkema, L. (2006). *Global causes of maternal death : a WHO systematic analysis*. 323–333. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(14\)70227-X](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(14)70227-X)
- Schneider, D., Gonzalez, J. R., Yamamoto, M., Yang, J., Lo, J. C., Permanente, K., & California, N. (2019). *The Association of Polycystic Ovary Syndrome and Gestational Hypertensive Disorders in a Diverse Community-Based Cohort*. 2019.
- shihab, Q. (2012). *Tafsir Al-mishbah*.
- Situmorang, R., & Sapitri. (2018). *Asuhan kebidana pada Ny P umur 32 tahun G3P2A0 dengan hipertensi Gestasional*. 6(2), 1–32.
- Sukfitrianty, Aswadi, & Lagu, A. M. H. R. (2016). Faktor Risiko Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar. *Public Health Science Journal*, 8(2548–5334), 79–88.
- Sutrimah, S., Mifbakhudin, M., & Wahyuni, D. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. *Jurnal Kebidanan*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.26714/JK.4.1.2015.1-10>
- Syahitdah, R., & Nissa, C. (2018). Aktivitas Fisik, Stress, dan Asupan Makanan terhadap Tekanan Darah Pada Wanita Prediabetes. *Jurnal Gizi Indonesia*, 7(1), 54. <https://doi.org/10.14710/jgi.7.1.54-62>

Unit, K., Dan, O., Sakit, R., Palembang, U., Luar, L., Fakultas, B., & Sriwijaya, U. (2009). *Ilmu kebidanan*.

Vistra, dkk. (2018). Hubungan Paritas dan Pendidikan Ibu Dengan Kejadian Preeklamsia Di Wilayah Kabupaten Semarang. *Jurnal SIKLUS*. <https://Ejournal.Poltektegal.Ac.Id/Index.Php/Siklus/Article/View/830>, 07 Nomor 0.

Yudhaputra, D. (2016). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi Pada Kehamilan di Kota Manado. *Jurnal E-Biomedik*. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Ebiomedik/Article/View/14633>, 4 Nomor 2.

Yulrina. (2018). Asuhan Kebidanan Pada Ny.E Dengan Hipertensi Gestasional. *Jurnal Komunikasi Kesehatan, IX Nomor 2*.



RIWAYAT HIDUP**A. Idintitas**

Nama : Srirezki Adriani
Nim : 70400117014
Tempat/Tanggal Lahir : Kabere, 14 Oktober 1999
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Bumi Batara Gowa Blok.E
No. 16/6

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006-2011 : SD Negeri 86 Bulu
2. Tahun 2011-2014 : SMP Negeri SATAP 6 Maiwa
3. Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 7 Enrekang
4. Tahun 2017-2021 : UIN Alauddin Makassar Jurusan
Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan.