

**ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA KOMBINASI OBAT
ANTIHIPERTENSI TERHADAP PASIEN HIPERTENSI DI
INSTALASI RAWAT INAP RSUD I LAGALIGO
KABUPATEN LUWU TIMUR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

AFRIANDI

NIM. 70100117047

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afriandi
NIM : 70100117047
Tempat Tgl Lahir : Palopo, 25 April 1999
Jurusan : Farmasi
Alamat : Perumahan Budidaya Permai Blok F No.18
Judul : Analisis Efektivitas Biaya Kombinasi Obat Antihipertensi
Terhadap Pasien Hipertensi Di Instalasi Rawat Inap
RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 15 Februari 2021

Penyusun,



Afriandi

NIM. 70100117047

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Biaya Kombinasi Obat Antihipertensi Terhadap Pasien Hipertensi Di Instalasi Rawat Inap RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur” yang disusun oleh Afriandi, NIM: 70100117047, Mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 16 Februari 2022** yang bertepatan dengan **15 Rajab 1443 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan, jurusan Farmasi

Gowa, 16 Februari 2022

15 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. apt. Gemy N. Handayani, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. M. Rusdi, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: apt. Mukhriani, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.Hi.	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp. A, M.Kes.
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. Skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Biaya Kombinasi Obat Antihipertensi Terhadap Pasien Hipertensi Di Instalasi Rawat Inap RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur” ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Harapan penulis, semoga penelitian ini dapat diterima sehingga penelitian dapat dilaksanakan dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya dalam analisis efektivitas biaya terapi antihipertensi.

Terkhusus ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas do’a dan dukungan dari banyak pihak terutama kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Taufin dan Ibunda Andi Rabia serta kepada saudara terkasih Kakak Hendra S.T, Arianti S.E, Adnan S.I.Kom, dan Adi Saputra S.H yang memberikan banyak kasih sayang, motivasi, do’a dan dukungan, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Syafirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan selaku

pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. M. Fais Satrinegara, S.Km., MARS selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Bapak Apt. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar
8. Bapak Apt. M. Rusdi, S.Si., M.Si selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Apt. Mukhriani, S.Si., M.Si selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Bapak Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.HI selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Farmasi yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah SWT serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
12. Seluruh pegawai RSUD I Lagaligo yang telah membantu penulis, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah Swt.
13. Rekan, saudara, dan teman-teman angkatan 2017 “KOVALEN” yang telah banyak membantu serta berjuang dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun, besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, 15 Februari 2021

Penulis



Afriandi

70100117047



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	3
1.Definisi Operasional	3
2.Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.Tujuan Penelitian.....	9
2.Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	10
B. Hipertensi	11
1.Definisi	11
2.Epidemiolog	12

3.Etiologi	13
4.Klasifikasi.....	14
5.Pengaturan Tekanan Darah.....	14
6.Faktor Penyebab Hipertensi	15
7.Penyebab Kegagalan Terapi	17
8.Penatalaksanaan Hipertensi	17
C. Farmakoekonomi	27
1. Definisi	27
2.Biaya.....	27
3.Metode Kajian Farmakoekonomi	28
4.Metode ACER dan ICER	34
D. Tinjauan Islam	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Populasi Penelitian	40
D. Sampel Penelitian	41
1.Kriteria Inklusi.....	41
2.Kriteria Eksklusi	41
E. Variabel Penelitian	41
F. Penentuan Besar Sampel	42
G. Metode Pengumpulan Data	43
H. Instrumen Penelitian	43
I. Pengolahan Data	43
J. Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45


A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR LAMPIRAN.....	80
RIWAYAT PENULIS	92



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

1. Skema Penelitian.....	67
2. Surat Pengambilan Data Awal	68
3. Kode Etik Penelitian	69
4. Surat Penelitian	70
5. Surat Selesai Penelitian.....	71
6. Analisis Univariat.....	72
7. Lampiran Data Pasien HIpertensi Di RSUD I Lagaligo.....	75



DAFTAR GAMBAR

1. Klasifikasi hipertensi menurut JNC 8	12
2. Penatalaksanaan hipertensi menurut JNC 8	24
3. Skema variabel penelitian	39
4. Karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin	43
5. pasien berdasarkan usia	44
6. pasien berdasarkan tekanan darah	45
7. pasien berdasarkan lama rawat inap	46
8. pasien berdasarkan penyakit penyerta	47
9. Regimen terapi berdasarkan golongan obat	49
10. Regimen terapi berdasarkan jenis obat	51



DAFTAR TABEL

1. Persentase penderita hipertensi di Sulawesi Selatan.....	11
2. Golongan terapi antihipertensi menurut JNC 8.....	22
3. Metode kajian Analisis.....	27
4. Kelompok Alternatif berdasarkan Efektivitas Biaya	29
5. Langkah perhitungan analisis efektivitas biaya	31
6. pasien berdasarkan jenis kelamin.....	42
7. pasien berdasarkan usia.....	43
8. pasien berdasarkan klasifikasi hipertensi	44
9. pasien berdasarkan lama rawat inap.....	45
10. pasien berdasarkan penyakit penyerta.....	46
11. Regimen terapi berdasarkan golongan obat	48
12. Regimen terapi berdasarkan jenis obat	49
13. Perhitungan analisis efektifitas biaya rawat inap 2 hari.....	51
14. Perhitungan analisis efektifitas biaya rawat inap 3 hari.....	52
15. Perhitungan analisis efektifitas biaya rawat inap 4 hari.....	53
16. Perhitungan analisis efektifitas biaya rawat inap 5 hari.....	54
17. Perhitungan analisis efektifitas biaya rawat inap 6 hari.....	54
18. Perhitungan analisis efektifitas biaya rawat inap 7 hari.....	55
19. Perhitungan analisis efektifitas biaya rawat inap 8 hari.....	55
20. Perhitungan analisis efektifitas biaya rawat inap 9 hari.....	56
21. Perhitungan analisis efektifitas biaya rawat inap 10 hari.....	57
22. Perhitungan analisis efektifitas biaya rawat inap 11 hari.....	57
23. Perhitungan analisis efektifitas biaya rawat inap 13 hari.....	58

24. Perhitungan Total biaya medik terapi kombinasi dua.....	59
25. Perhitungan Total biaya medik terapi kombinasi tiga	60
26. Efektifitas <i>outcome</i> terapi kombinasi dua.....	61
27. Efektifitas <i>outcome</i> terapi kombinasi tiga.....	62
28. Nilai ACER terapi kombinasi dua.....	63
29. Nilai ACER terapi kombinasi tiga	63
30. Nilai ICER terapi kombinasi dua	64
31. Nilai ICER terapi kombinasi tiga.....	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Afriandi

Nim : 70100117047

Judul : Analisis Efektivitas Biaya Kombinasi Obat Antihipertensi Terhadap Pasien Hipertensi Di Instalasi Rawat Inap RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah secara terus-menerus hingga mencapai 140/90 mmHg atau melebihi angka tersebut. Terapi antihipertensi memiliki berbagai macam variasi obat yang merupakan faktor penting pengambilan kebijakan dalam menerapkan terapi untuk pasien hipertensi sehingga dibutuhkan tinjauan farmakoekonomi yang digunakan untuk membantu dalam efisiensi penggunaan obat dari segi biaya dalam terapi farmakologi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis efektivitas biaya terapi antihipertensi dan perhitungan nilai ACER dan ICER yang paling *cost-effective* di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dilakukan secara retrospektif dengan menggunakan data sekunder yaitu rekam medik dan jumlah sampel sebanyak 63. Metode yang digunakan adalah metode ACER dan ICER. Hasil yang didapatkan yaitu Penggunaan obat yang memiliki efektivitas tertinggi adalah kombinasi captopril dengan bisoprolol, kombinasi candesartan dengan amlodipin, kombinasi lisinopril dengan bisoprolol dan furosemid, furosemid dengan captopril dan bisoprolol yang masing-masing memiliki efektivitas (outcome) 100%. Penggunaan obat yang paling *cost-effective* adalah kombinasi dua captopril furosemid sebesar Rp. 8.667 dan kombinasi tiga yaitu captopril, amlodipin, furosemid sebesar Rp. 39.956, sedangkan nilai ICER yang paling *cost-effective* pada kombinasi dua yaitu candesartan furosemid dibandingkan dengan captopril furosemid yaitu sebesar – Rp. 520.449 dan kombinasi tiga yaitu kombinasi amlodipin, furosemid, lisinopril dibandingkan dengan captopril amlodipin furosemid sebesar Rp. 513

Kata kunci : Hipertensi, Antihipertensi, Analisis Efektivitas Biaya.

ABSTRACT

Name : Afriandi

NIM : 70100117047

Title : Cost Effectiveness Analysis of Antihypertensive Drug Combinations Against Hypertension Patients in the Inpatient Installation of RSUD I Lagaligo East Luwu Regency

Hypertension is an increase in blood pressure continuously until it reaches 140/90 mmHg or exceeds that number. Antihypertensive therapy has various kinds of drug variations which are important factors in policy making in implementing therapy for hypertensive patients so that pharmacoeconomic methods are needed to assist in the efficiency of drug use in terms of cost in pharmacological therapy. The purpose of this study was to determine the cost-effectiveness analysis of antihypertensive therapy and to calculate the most cost-effective ACER and ICER values in RSUD I Lagaligo, East Luwu Regency. This research is a non-experimental research conducted retrospectively using secondary data, namely medical records and a total sample of 63. The method used is the ACER and ICER methods. The results obtained are the use of drugs that have the highest effectiveness is the combination of captopril with bisoprolol, the combination of candesartan with amlodipine, the combination of lisinopril with bisoprolol and furosemide, furosemide with captopril and bisoprolol, each of which has an effectiveness (outcome) of 100%. The most cost-effective use of the drug is a combination of two captopril furosemides of Rp. 8,667 and a combination of three, namely captopril, amlodipine, furosemide of Rp. 39,956, while the most cost-effective ICER value in the combination of the two is candesartan furosemide compared to captopril furosemide, which is -Rp. 520449 and combination of three, namely the combination of amlodipine, furosemide, and lisinopril compared to captopril amlodipine furosemide of Rp. 513

M A K A S S A R

Keywords: *Hypertension, Antihypertensive, Cost Effectiveness Analysis.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hipertensi merupakan kelainan, suatu gejala yang timbul dari adanya gangguan pada mekanisme regulasi tekanan darah dan termasuk menjadi faktor risiko untuk penyakit kardiovaskular. Diketahui bahwa sekitar 25% dari penduduk dunia terkena gangguan ini. Dengan melakukan pola hidup yang baik, penanganannya juga terdiri dari pengobatan, biasanya dilakukan seumur hidup untuk menurunkan tekanan darah agar tidak muncul komplikasi atau penyakit lainnya (Tjay & Kirana Rahardja, 2015).

Data *World Health Organization* (WHO) tahun 2018 menunjukkan bahwa hampir 1,13 Miliar orang di dunia mengalami hipertensi. Dalam artian terdapat 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penderita hipertensi akan terus meningkat setiap tahunnya, diperkirakan terjadi di tahun 2025, akan ada 1,5 Miliar orang yang terkena hipertensi dan diperkirakan setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Oleh karena itu hipertensi tidak bisa dianggap remeh. Sebelum penyakit menyerang, sebaiknya harus mengenal lebih jauh tentang penyakit ini (Kemenkes.RI, 2019).

Menurut Data Sampel Registration System (SRS) Indonesia Tahun 2014, hipertensi dengan komplikasi (5,3%) merupakan penyebab kematian nomor 5 (lima) pada semua umur. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan bahwa biaya pelayanan hipertensi mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 2,8 Triliun rupiah, tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 3 Triliun rupiah (Kemenkes RI 2020).

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi salah satu penyebab utama kematian prematur di dunia. Hipertensi ditandai dengan hasil

pengukuran tekanan darah yang menunjukkan tekanan sistolik sebesar ≥ 140 mmHg atau dan tekanan diastolik sebesar ≥ 90 mmHg. Pengukuran tekanan darah dilakukan sesuai dengan standar British Society of Hypertension menggunakan alat sphygmomanometer air raksa, digital atau anaeroid yang telah ditera (Kemenkes.RI, 2019).

Berbagai faktor terkait dengan genetik dan pola hidup seperti halnya aktivitas fisik yang kurang, asupan makanan asin dan kaya lemak, serta kebiasaan merokok dan minum alkohol yang mengakibatkan melonjaknya angka hipertensi (Risesdas, 2018).

Pada dasarnya, hipertensi membutuhkan waktu terapi yang panjang dalam pengobatannya, dalam hal ini akan menyebabkan pasien yang mendapat perawatan akan dirawat semakin lama. Semakin lama pasien dirawat maka akan berkaitan dengan besarnya biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh pasien. Utamanya pada penderita hipertensi di RSUD I Lagaligo, Luwu Timur yang sering mendapatkan pasien hipertensi. Terapi yang didapatkan pada tahun 2020 dengan keterangan rawat inap berjumlah sekitar 180 pasien terdapat dalam kondisi pasien hipertensi *grade 1* dan hipertensi *grade 2*.

Penggunaan terapi antihipertensi kombinasi digunakan karena dengan menerima terapi kombinasimayoritas pasien tidak dapat dikontrol dengan menggunakan satu obat antihipertensi, dengan kata lain obat yang dibutuhkan yaitu dua atau lebih obat antihipertensi dari kelas obat yang berbeda. Penggunaan terapi kombinasi kemungkinan mampu lebih cepat untuk mencapai tujuan tekanan darah yang diinginkan. Penggunaan lebih dari satu obat lebih sering mendapatkan hasil penurunan tekanan darah yang lebih besar untuk dosis yang lebih rendah dibandingkan jika obat yang digunakan tunggal (Tandililing et al., 2017).

Pada daerah Luwu Timur, terkait dengan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan mengalami terjadinya peningkatan, akibatnya membutuhkan suatu ide-ide ataupun pemikiran yang khusus dalam peningkatan efisiensi ataupun terkait penggunaan dana dengan lebih rasional. Dalam hal ini, peranan tentang farmakoekonomi sangat diperlukan dan mempunyai peranan penting untuk analisis biaya terapi pada sistem pelayanan kesehatan, dan dalam penelitian mengenai bentuk identifikasi, pengukuran, dan membandingkan suatu biaya, serta keuntungan yang diperoleh dari hasil program pelayanan dan terapi serta determinasi dari alternatif yang baik (Wijayanti et al., 2016).

Berdasarkan hal tersebut, terkait pemberian terapi pengobatan dalam penggunaan obat antihipertensi yang digunakan oleh pasien tentunya akan berdampak besar pada biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh pasien. Mengingat penyakit hipertensi juga merupakan penyakit yang membutuhkan pengobatan yang lama, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas biaya yang dikeluarkan oleh pasien hipertensi yang mendapat terapi kombinasi antihipertensi di RSUD I Lagaligo.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas kombinasi obat antihipertensi pada pasien hipertensi di instalasi rawat inap RSUD I Lagaligo?
2. Bagaimana efektivitas biaya pengobatan berdasarkan nilai ACER dan ICER yang paling *cost effective*?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup

1. Definisi Operasional

- a. Hipertensi adalah terjadinya peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik. Dimana tekanan darah sistolik diatas 140 mmHg dan diastolik 90 mmHg.

- b. Antihipertensi adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah.
- c. Rekam medis merupakan catatan yang berisi data dari pasien terkait pemeriksaan, pengobatan, amensis, tindakan, serta pelayanan untuk pasien pada fasilitas kesehatan.
- d. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- e. Efektif yaitu segala sesuatu yang hasil akhirnya sesuai dengan keinginan. Dalam hal ini biaya suatu terapi dikatakan efektif jika tujuan dari terapi yang diinginkan terpenuhi dan biaya yang digunakan diberikan secara optimal.
- f. Biaya adalah nilai dari peluang yang hilang sebagai akibat dari penggunaan sumberdaya dalam sebuah kegiatan.
- g. Retrospektif merupakan teknik pengumpulan data yang terjadi di masa lampau atau masa lalu.
- h. Noneksperimental adalah penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri (variabel) subjek penelitian dengan keadaan apa adanya, tanpa ada manipulasi (intervensi) dari peneliti.
- i. ACER(*Average cost-effectiveness*) digunakan untuk mengetahui efektivitas obat dengan biaya terapi rendah.
- j. ICER diartikan sebagai rasio perbedaan antara biaya dari 2 alternatif dengan perbedaan efektivitas antara alternatif
- k. Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan.

- l. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang akan diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu dalam hal ini adalah populasi yang memenuhi kriteria inklusi.
- m. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum dari suatu populasi target yang akan dijadikan subjek penelitian.
- n. Kriteria eksklusi adalah mengeluarkan atau menghilangkan beberapa subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena kriteria dan sebab-sebab tertentu.
- o. Analisis univariat adalah analisis dari setiap atau masing-masing variabel penelitian yang memberikan informasi. Informasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau ukuran statistik lainnya.
- p. Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun kelompok. Analisis deskriptif umumnya menampilkan tabel distribusi frekuensi, grafik, dan mean.
- q. Outcome adalah efektifitas dari hasil perawatan pasien yang telah menggunakan obat antihipertensi kombinasi untuk menurunkan tekanan darah.
- r. DBD adalah singkatan dari demam berdarah dengue merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk *aedes aegypti* dan *aedes albopictus*.
- s. Abdominal pain atau bisa disebut nyeri perut merupakan sensasi tidak nyaman yang dirasakan pada area dibawah tepi tulang rusuk/iga sampai sekitar lipat paha.
- t. Vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing hingga merasa dirinya atau sekelilingnya berputar.
- u. CHF adalah singkatan dari *congestive heart failure* merupakan kondisi dimana jantung tidak memompa cukup darah ke organ tubuh dan jaringan lain.

- v. Pneumonia adalah infeksi yang menyerang salah satu atau kedua paru paru, sehingga menyebabkan kantong udara di paru tersebut meradang dan membengkak.
- w. Abses hepar adalah kantung nanah yang terbentuk akibat cedera di dalam organ hati.
- x. CKD adalah singkatan dari *chronic kidney disease* merupakan kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal.
- y. Angina adalah suatu jenis nyeri dada yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke jantung.
- z. PPOK adalah singkatan dari penyakit paru obstruktif kronis merupakan peradangan pada paru paru yang berkembang dalam jangka panjang.
- aa. Hematemesis adalah muntahan isi lambung bercampur darah (muntah darah).
- bb. TBC atau Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri *mycobacterium tuberculosis* di paru paru.
- cc. Dispnea adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan bernafas (sesak napas).
- dd. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik.
- ee. Endokarditis adalah peradangan pada endokardium, umumnya disebabkan oleh bakteri tetapi bisa juga oleh jamur dan virus.
- ff. DM tipe 1 adalah kondisi diabetes yang terjadi akibat tubuh tidak dapat memproduksi hormon insulin yang bertugas membantu penyerapan gula dalam darah menjadi energi.
- gg. Edema adalah kondisi membengkaknya jaringan tubuh akibat penumpukan cairan.

hh. Dispepsia adalah rasa tidak nyaman yang timbul pada perut bagian atas, kondisi ini bisa disebabkan oleh penyakit asam lambung atau maag.

ii. DM Tipe 2 adalah kondisi diabetes yang disebabkan oleh kadar gula darah yang naik diakibatkan kurang optimalnya produksi atau penyerapan insulin oleh tubuh.

jj. Apendicitis akut adalah radang pada usus buntu yang terjadi secara mendadak.

kk. abses mandibula adalah terbentuknya benjolan berisi nanah pada mandibula atau rahang bawah.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif harga obat untuk pasien hipertensi di instalasi rawat inap RSUD I Lagaligo.

D. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan jurnal (Skarayadi et al., 2017) berjudul “Efektifitas Biaya Terapi Antihipertensi Pada Pasien Rawat Jalan Di UPT Puskesmas Puter” penelitian ini menggunakan desain deskriptif dalam pengambilan datanya menggunakan retrospektif yang diambil dari catatan medis penderita hipertensi. Pengumpulan data yang telah memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian ini yaitu 15 orang dari 25 pasien lansia membayar tunai dengan memiliki sistol dan diastol tidak berdasarkan JNC 8 yaitu 90 mmHg dan diastoliknya 150 mmHg. Pada pasien lansia sesuai standar JNC 8. Efektifitas pengobatan hipertensi pasien tunai yaitu 50% dan pasien prolansis 96,77%. Sehingga biaya obat rata-rata pada pasien lansia prolansis yaitu Rp. 36.227. tiap bulan Puskesmas Puter mengeluarkan biaya per pasien hingga Rp. 25.000 bagi yang menerima konseling. Total biaya pengobatan pasien prolansis yaitu Rp. 61. 227 dan biaya pasien tunai dalam hal ini telah termasuk obat dan pemeriksaan yaitu Rp. 3000. Biaya sebesar Rp. 3000 karena menerima subsidi. Sehingga nilai ACER dari pasien umum yaitu

Rp. 60. Didapatkan nilai ICER Rp. 124.965. penelitian ini dalam pengobatan hipertensi pronalis lebih efektif jika dibandingkan pengobatan hipertensi umum. Namun pengobatan hipertensi lansia tidak *cost effective* karena biaya pengobatan pasien hipertensi umum menerima subsidi sehingga jauh lebih rendah dari pasien hipertensi pronalis.

2. Penelitian (Nurhikmah, 2019) berjudul “*Cost Effectiveness* Kombinasi Antihipertensi Candesartan-Bisoprolol dan Candesartan-Amlodipin Pada Pasien Rawat Jalan Penderita Hipertensi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan desain penelitian yang digunakan adalah Cross sectional study data yang diambil yaitu data prospektif berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Hasilnya yaitu penelitian menunjukkan bahwa efektivitas terapi dan nilai ACER yang didapatkan dari 31 pasien hipertensi ialah kombinasi Candesartan-Bisoprolol yaitu nilai ACER sebesar 85,71% (Rp. 2.314) dan kombinasi Candesartan-Amlodipin sebesar 70,58% (Rp. 2.643). nilai ICER sebesar Rp. 7.832 menunjukkan bahwa harga obat lebih mahal, namun terapi yang didapatkan lebih efektif. Bahwa diketahui untuk terapi kombinasi antihipertensi yang paling *Cost-Effective* adalah golongan ARB dan beta bloker.

3. Berdasarkan penelitian (Zulfah, 2019) judul “Analisis Efektivitas Biaya Kombinasi Obat Antihipertensi Pada Pasien Rawat Inap Di RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya”. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan dengan metode *Cost Effectiveness Analysis* (CEA). Instrumen ini menggunakan lembar yang dibuat oleh peneliti dan rekam medis pasien serta rincian pembayaran setiap pasien. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif. Terapi dari *Cost effective* bagi setiap kelompok yaitu ACE-I Diuretik untuk kelompok kombinasi dua obat., ACE-I- β -Bloker-CCB bagi kelompok menggunakan tiga obat dan ACE-I- β -Bloker-CCB-Diuretik untuk kelompok yang

menggunkan empat kombinasi antihipertensi. Sehingga pada perhitungan ICER didapatkan nilai ICER terendah antara terapi ACE-I-CCB-Diuretik dan terapi ACEI-ARB-Diuretik sebesar Rp. 12.511,02.

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui efektivitas biaya terapi kombinasi obat antihipertensi pada pasien hipertensi di instalasi rawat inap RSUD I Lagaligo.
- b. Untuk mengetahui efektivitas biaya pengobatan berdasarkan nilai ACER yang paling *cost effective* dan nilai ICER yang paling efektif terapinya di instalasi rawat inap RSUD I Lagaligo.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan meningkatkan persediaan obat serta pelayanan kesehatan yang efektif. Serta penyediaan obat terapi yang optimal dengan menjamin pelayanan bermutu tinggi terhadap biaya minimal pada pasien hipertensi di RSUD I Lagaligo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu timur memiliki jumlah penduduk di tahun 2020 sebanyak 305.407 jiwa. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo (RSUD I Lagaligo) merupakan rumah sakit kelas C yang letaknya berada di Provinsi Sulawesi Selatan di Jl. Sungkuruwira Kecamatan Wotu kabupaten Luwu Timur. RSUD I Lagaligo merupakan rumah sakit umum daerah yang telah lulus Akreditasi dengan predikat paripurna. Predikat ini diberikan oleh KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit). RSUD I Lagaligo memiliki struktur organisasi terdiri atas Direktur; bagian tata usaha, terdiri atas: sub bagian umum dan kepegawaian; sub bagian perencanaan; dan sub bagian keuangan. Bidan pelayanan medik dan keperawatan; dan seksi pelayanan dan penunjang medik. Bidang pengembangan sumber daya manusia dan rekam medik, terdiri atas: seksi pemeliharaan sarana dan prasarana; dan seksi pengawasan dan pengendalian. Data SDM di RSUD I Lagaligo menunjukkan medis berjumlah 31 orang diantaranya dokter umum berjumlah 8 orang, dokter gigi 2 orang, dokter spesialis berjumlah 21 orang, keperawatan berjumlah 81 orang, kebidanan berjumlah 21 orang, kefarmasian berjumlah 14 orang, kesehatan masyarakat berjumlah 11 orang, kesehatan lingkungan berjumlah 3 orang, gizi berjumlah 2 orang, keterampilan fisik berjumlah 6, keteknisian medis berjumlah 10 orang, teknis biomedika berjumlah 22 orang, struktural berjumlah 11 orang dan dukungan manajemen berjumlah 7 orang (BPS Luwu timur,2021).

B. Hipertensi

1. Definisi

Hipertensi termasuk penyakit umum yang diderita setiap orang dengan sederhananya didefinisikan terjadinya peningkatan tekanan darah arteri yang terjadi secara signifikan atau terus-menerus. Saat ini, hipertensi diidentifikasi sebagai salah satu faktor risiko yang paling signifikan untuk penyakit kardiovaskular. Terjadinya peningkatan tekanan darah dan diagnosis hipertensi juga harus melaksanakan kontrol tekanan darah dengan melakukan pengobatan yang tepat dalam mengurangi angka morbiditas dan mortalitas dari penyakit kardiovaskular (Dipiro, 2016).

Hipertensi diartikan sebagai peningkatan tekanan darah secara terus-menerus hingga mencapai 140/90 mmHg atau melebihi dari angka tersebut (Brunton et al., 2018).

Khususnya pada penderita hipertensi menggunakan tensimeter dengan kalibrasi yang baik untuk mengukur tekanan darah. Pembacaan harus dilakukan setelah pasien beristirahat dengan nyaman, punggung ditopang dengan posisi duduk atau terlentang, setidaknya selama 5 menit dan setidaknya 30 menit setelah mengonsumsi kopi atau merokok (SJ & Papadakis, 2019).

Krisis hipertensi merupakan suatu keadaan potensial yang mampu mengancam jiwa sehingga membutuhkan tindakan medik segera dalam mencegah atau mengurangi kerusakan pada organ yang dapat terkena misalnya otak, jantung, ginjal dan sebagainya. Penggolongan krisis hipertensi dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan kecepatan diperlukan (Handayani, 2013).

a. Kegawatan Hipertensi (*Hypertensive Emergency*)

Hypertensive emergency adalah krisis hipertensi yang diikuti dengan kerusakan organ target yang terjadi secara mendadak atau sedang dalam proses. Karenanya tekanan darah diturunkan dalam beberapa menit. Hipertensi darurat umumnya terjadi tingkat kenaikan tekanan darah sistol melebihi 180 mmHg atau diastol 120 mmHg, tetapi dapat terjadi untuk tingkat lebih rendah pada pasien yang sebelumnya tekanan darahnya tidak tinggi. Konsekuensi darurat ini terjadi apabila tekanan darah tidak terkontrol sehingga mengakibatkan keparahan diantaranya stroke, hilang kesadaran, serangan jantung, angina, edema paru, dan eklampsia (Handayani, 2013).

b. Hipertensi Mendesak (*Hypertensive Urgency*)

Hypertensive urgency merupakan krisis hipertensi tanpa merusak organ target sehingga penurunan tekanan darah dapat dilakukan lebih lambat, yaitu dalam waktu beberapa jam. Pasien hipertensi dapat mengalami hipertensi urgensi atau bisa saja pasien tidak mengalami gejala satu atau lebih diantaranya sakit kepala, sesak napas, mimisan, dan keemasan yang parah. Pengobatan hipertensi urgensi biasanya membutuhkan dosis tambahan dari obat oral, tetapi biasanya pasien tidak mewajibkan untuk ditangani rawat inap ketika penurunan tekanan darahnya cepat (Handayani, 2013).

2. Epidemiologi

Pada Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020 dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013, dan 2018 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi termasuk hipertensi.

Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, jumlah estimasi penderita hipertensi yang berumur di atas 15 tahun di

Sulawesi Selatan berkisar 1.520.659 penderita dengan pelayanan sebanyak 381.133 dari seluruh jumlah estimasi.

Tahun	Diagnosa	Jumlah	%
2016	Hipertensi	5,811	6.62
2017	Hipertensi	7,566	4.07
2018	Hipertensi	7,884	4.68

Tabel 1. Persentase Penderita Hipertensi Di Luwu Timur

3. Etiologi

Berdasarkan etiologi pada hipertensi terbagi 2 yaitu (Handayani, 2009) :

a. Hipertensi Esensial

Hipertensi esensial atau disebut juga hipertensi primer merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebab atau etiologinya. Terdapat kasus dengan jumlah 90% hipertensi yang merupakan golongan hipertensi esensial dan kelainan yang dimiliki yaitu terjadinya peningkatan resistensi perifer. Hipertensi esensial memiliki beberapa macam faktor penyebab diantaranya faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik memiliki sifat poligenik dan biasanya dalam keluarga memiliki riwayat penyakit kardiovaskular. Sedangkan faktor dari lingkungan terdapat 3 penyebab yaitu mengkonsumsi garam berlebih, stress psikis, dan berat badan berlebih atau obesitas.

b. Hipertensi Sekunder

Hipertensi sekunder memiliki kasus yang lebih rendah dari hipertensi primer. Prevalensi yang dimiliki yaitu 5-8% dari penderita hipertensi. Hipertensi sekunder diketahui penyebabnya dari penyakit ginjal (endokrin), obat-obatan, dan lain-lain.

Hipertensi renal terdiri dari hipertensi renovaskular yaitu hipertensi yang diakibatkan dari lesi pada arteri ginjal sehingga mengakibatkan hipoperfusi ginjal, seperti stenosis arteri ginjal dan vaskulitis intrarenal. Hipertensi akibat lesi yang terdapat di parenkim ginjal yang menyebabkan adanya gangguan dari fungsi ginjal polikistik, nefropati diabetik, dan lain-lain.

Hipertensi endokrin dapat terjadi akibat dari adanya kelainan korteks adrenal (aldosteronisme primer sindrom cushing), tumor pada medula adrenal (feokromositoma), akromegali, hipotiroidisme, hiperparatiroidisme, dan lain-lain. Terdapat penyakit lainnya yang mengakibatkan terjadinya hipertensi yaitu koarktasio aorta, kelainan neurologik terdiri dari tumor otak, ensefalitas, polisitemia, dan lain-lain.

Terdapat beberapa jenis obat, yaitu kontrasepsi hormonal yang didapatkan sering menjadi penyebab hipertensi, hormon adrenokortikotropik, kortikosteroid, simpatomimetik amin (efedrin, fenilefrin, fenilpropanolamin, amfetamin), kokain, siklosporin, dan eritropietin.

4. Klasifikasi Hipertensi

Klasifikasi tekanan darah menurut JNC 8 (James et al., 2014)

Classification	Systolic Blood Pressure (mmHg)		Diastolic Blood Pressure (mmHg)
Normal	<120	AND	<80
Prehypertension	120-139	OR	80-89
Stage 1 HTN	140-159	OR	90-99
Stage 2 HTN	≥160	OR	≥100

Gambar 1. Klasifikasi Hipertensi menurut JNC 8

5. Pengaturan Tekanan Darah

Meningkatnya tekanan darah di dalam arteri bisa terjadi melalui beberapa cara:

- a. Jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan pada setiap detiknya.
- b. Arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku.
- c. Bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Hal ini terjadi jika terdapat kelainan fungsi ginjal sehingga tidak dapat membuang sejumlah garam dan air dari dalam tubuh.

Sebaliknya, jika:

- a. Aktivitas memompa jantung berkurang
- b. Arteri mengalami pelebaran
- c. Banyak cairan keluar dari sirkulasi

Maka tekanan darah akan menurun atau menjadi lebih kecil

(Handayani & Misbahuddin., 2010).

6. Faktor Penyebab Hipertensi

Beberapa faktor yang menjadi penyebab dari timbulnya penyakit hipertensi atau meningkatnya tekanan darah secara reversibel yaitu (Handayani, 2009):

- a. Garam merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada hipertensi. Ion natrium menyebabkan retensi air, sehingga terjadi peningkatan pada volume darah dan meningkatnya tekanan darah pada pembuluh darah. Pada golongan penduduk yang mengkonsumsi garam berlebih, lebih banyak menderita hipertensi daripada penduduk yang sedikit mengkonsumsi garam.
- b. Drop (liquorice), merupakan jenis gula yang terbuat dari *succus liquiritae* yang memiliki kandungan dari asam glizirinat dan mempunyai khasiat atau bermanfaat sebagai retensi air dan mengakibatkan peningkatan tekanan darah jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih.

c. Stress dapat membuat terjadinya peningkatan tekanan darah untuk sementara. Penyebabnya yaitu pelepasan adrenalin dan nonadrenalin yang mempunyai sifat vasokonstriktif. Tekanan darah juga akan meningkat ketika waktu adanya ketegangan fisik, misalnya pengeluaran tenaga atau olahraga. Apabila stress hilang, maka akan terjadi penurunan tekanan darah.

d. Merokok juga salah satu penyebab dari hipertensi yaitu dalam rokok mengandung nikotin yang berkhasiat sebagai vasokonstriksi dan mampu meningkatkan tekanan darah. Merokok akan menyebabkan hipertensi menjadi lebih buruk pada sistem pembuluh darah.

e. Pil anti hamil memiliki kandungan hormon wanita estrogen yang bersifat sebagai retensi garam dan air. Wanita yang peka disarankan untuk melakukan perencanaan dari suatu pembatasan kelahiran dengan cara yang lain.

f. Kehamilan, dapat menaikkan tekanan darah pada saat proses kehamilan. Mekanisme hipertensi sama dengan proses pada ginjal. Ketika uterus diregangkan terlalu banyak pada janin dan menerima kurang darah, sehingga dilepaskan suatu zat yang menyebabkan peningkatan hipertensi.

g. Jantung akan memompa lebih kuat sehingga akan meningkatkan banyak cairan pada setiap detik.

h. Cairan dalam sirkulasi bertambah akan mengakibatkan tingginya tekanan darah. Peristiwa ini terjadi ketika pada kelainan pada fungsi ginjal yang tidak memiliki kemampuan untuk membuang sejumlah garam dan air di dalam tubuh. Sehingga volume dara pada tubuh meningkat dan tekanan darah juga meningkat.

Berdasarkan dari faktor pemicu, hipertensi yang penyebabnya tidak dapat di kontrol, misalnya umur, jenis kelamin, dan keturunan. Pada kasus hipertensi primer terdapat sekitar 70-80% yang memiliki riwayat hipertensi dalam keluarga.

Apabila hipertensi ditemukan pada kedua orang tua, maka resiko terjadinya hipertensi primer lebih besar (Handayani, 2009).

Sedangkan pada hipertensi yang penyebabnya dapat dikontrol yaitu obesitas atau kegemukan, stress, kurangnya pergerakan olahraga, merokok, konsumsi garam berlebih, dan mengkonsumsi alkohol. Faktor lingkungan dapat berpengaruh terjadinya hipertensi primer. Stress dan hipertensi memiliki keterkaitan ketika melalui aktivasi saraf simpatis. Saraf simpatis merupakan saraf yang berfungsi ketika melakukan aktivitas dan parasimpatis berfungsi ketika tidak beraktivitas (Handayani, 2009)

7. Penyebab Kegagalan Terapi Hipertensi

Penyebab dari kegagalan terap hipertensi, yaitu:

- a. Ketidapatuhan penderita termasuk dalam biaya pengobatan, instruksi tidak jelas, efek samping obat, dan frekuensi pemberian yang tidak praktis.
- b. Obatnya sendiri, maksudnya adalah dosis yang diberikan terlalu rendah, kombinasi yang tidak cocok, terjadinya toleransi, adanya interaksi dengan obat lain.
- c. Adanya kondisi lain, yaitu obesitas, diet tinggi natrium atau alkohol, retensi cairan, kerusakan ginjal yang progresif, kurangnya pemberian diuretik.
- d. pseudohipertensi

8. Penatalaksanaan Hipertensi

a. Terapi Nonfarmakologi

Menurut (Handayani, 2009) pengobatan non farmakologi untuk hipertensi yaitu:

- 1) Mengurangi konsumsi garam atau diet rendah garam, kolesterol, maupun lemak jenuh.
- 2) Ciptakan keadaan rileks

Terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam relaksasi seperti yoga atau hypnosis yang mengontrol sistem saraf yang mampu menurunkan tekanan darah.

3) Olahraga

Melakukan aktivitas olahraga yaitu senam aerobik atau jalan cepat yang dilakukan selama 30-45 menit sebanyak 3-4 kali dalam seminggu.

4) Mengurangi konsumsi alkohol dan penderita diharapkan untuk berhenti merokok.

b. Terapi Farmakologi

Adapun beberapa terapi farmakologi menurut (Dipiro, 2016), yaitu :

1) Calcium Channal Blocker

Pada terapi CCB termasuk jenis dari dihidropiridin dan nondihidropiridin merupakan terapi lini pertama dan sangat efektif sebagai terapi antihipertensi. CCB memiliki indikasi kuat untuk penyakit arteri koroner dan diabetes. Pada kontraksi sel otot jantung dan otot polos membutuhkan peningkatan konsentrasi kalsium intraseluler bebas dari cairan ekstraseluler. Apabila otot polos jantung atau pembuluh darah dirangsang, maka saluran masuk ke membran sel dan memungkinkan masuknya kalsium ke dalam sel. Masuknya kalsium ke dalam sel akan melepaskan kalsium yang disimpan dari retikulum sarkoplasma. CCB bekerja dengan cara menghambat masuknya kalsium melewati membran sel (Dipiro, 2016).

2) Angiotensin Converting Enzym Agents

ACEi merupakan terapi lini pertama untuk penderita hipertensi. ACEi didistribusikan di banyak jaringan dan menempati dibeberapa jenis sel yang berbeda, dan tempat utamanya berada di sel endotel. Oleh karena itu, lokasi utama dari produksi angiotensin II terdapat dipembuluh darah, bukan di ginjal. ACEi memblok ACE, sehingga akan menghambat konversi angiotensin I menjadi

angiotensin II. Angiotensin II sangat berfungsi untuk vasokonstriktor yang mampu merangsang sekresi aldosteron, dan menyebabkan terjadinya peningkatan reabsorpsi natrium dan air yang menyertai kehilangan kalium dengan memblokir ACE, terjadi vasodilatasi dan penurunan aldosteron. ACEi juga menghalangi degradasi bradikinin dan merangsang terjadinya sintesis dari vasodilatasi lainnya yaitu prostaglandin 2 dan Prostaglandin. Dari pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, ACEi dapat menurunkan tekanan darah terhadap penderita hipertensi dengan aktivitas renin yang menunjukkan hal tersebut normal hal ini membuktikan bahwa bradikinin dan produksi jaringan ACEi penting dalam patogenesis hipertensi. Dengan meningkatnya efek bradikinin maka, mampu menurunkan tekanan darah menggunakan terapi ACEi dan bertanggung jawab atas efek samping dari batuk kering. ACEi mampu mencegah dan menurunkan LVH dengan mengurangi stimulasi langsung pada angiotensin II di sel miokard.

Umumnya penggunaan ACEi ditoleransi dengan baik. Karena dapat menurunkan aldosteron dan meningkatkan konsentrasi cairan kalium. Dalam peningkatan yang kecil, sehingga hiperkalemia dapat terjadi. Penderita CKD atau yang sedang menerima suplemen kalium bersamaan, diuretik hemat kalium, ARB, atau penghambat renin yang langsung dapat berisiko terjadinya hiperkalemia (Dipiro, 2016).

3) Angiotensin Reseptor Blocker

ARB merupakan terapi lini pertama pada kebanyakan pasien hipertensi. Nyatanya terapi ARB secara langsung dibandingkan dengan terapi ACEi yang dalam penanganannya untuk penderita hipertensi. Diketahui dari penelitian sebelumnya bahwa kombinasi ARB dengan ACEi tidak disarankan walaupun tidak memiliki kejadian terhadap kardiovaskular lainnya hanya saja dapat dihubungkan dengan risiko efek samping yang lebih seperti disfungsi ginjal

dan hipotensi. Oleh sebab itu, tidak ada alasan penggunaan hipertensi kombinasi ARB dengan ACEi dalam penanganan hipertensi. Pada pasien penderita diabetes tipe 2 dan nefropati, penggunaan terapi ARB dalam nefropati telah terbukti mampu mengurangi kadar gula dalam darah. Terdapat beberapa manfaat dari ARB tidak tergantung pada penurunan tekanan darah, dan menunjukkan bahwa efek farmakologis ARB pada arteriol eferen mampu mengakibatkan progresi penyakit ginjal yang dilemahkan. Sedangkan pada pasien HFrEF, penggunaan terapi ARB terbukti mengurangi risiko rawat inap akibat gagal jantung jika dalam penggunaannya sebagai terapi pasien intoleran ACEi. Terapi ARB memiliki efek samping yang paling rendah dalam penggunaan antihipertensi. Dalam hal ini, ARB tidak mempengaruhi bradikinin, maka ARB tidak menyebabkan batuk kering seperti ACEi. Obat ini telah disebut sebagai “ACEi tanpa batuk,” dalam perbedaan farmakologisnya bahwa ACEi dan ARB memiliki efek yang berbeda terhadap otot polos pembuluh darah dan jaringan miokard yang mampu berkorelasi memiliki perbedaan efek ketika dibandingkan dengan ACEi. Seperti ACEi dan ARB dapat menyebabkan insufisiensi ginjal, hiperkalemia, dan hipotensi ortostatik. Kepawaspadaan yang diterapkan untuk terapi ACEi pada pasien dengan dugaan stenosis arteri ginjal bilateral, maka dengan menggunakan obat-obatan yang mampu meningkatkan kalium dan obat yang meningkatkan risiko hipotensi yang berlaku untuk ARB. Pada dasarnya ACEi, ARB, CCB merupakan First Line, pasien dengan riwayat ACEi angiodema dapat diobati dengan ARB (Dipiro, 2016)

4) Diuretik

Ada empat subkelas dari diuretik yaitu tiazid, loop, agen hemat kalium, dan antagonis aldosteron. Tiazid merupakan jenis dari diuretik yang banyak diminati atau disukai untuk pengobatan hipertensi dan digunakan sebagai

terapi lini pertama untuk hipertensi. Bukti dari hal ini yaitu membenarkan rekomendasi dari ALLHAT. Jika terapi kombinasi dibutuhkan untuk penderita hipertensi dalam mengontrol tekanan darah. Golongan tiazid sebagai terapi tambahan, tetapi tidak harus sebagai agen kedua dan sangat efektif dalam menurunkan tekanan darah. Loop biasanya diperlukan untuk hipertensi pada pasien CKD jika GFR diperkirakan kurang dari 30 mL/menit/1,73 m², utamanya jika mengalami edema. Tetapi, kebanyakan pasien dengan GFR yang kemungkinan kurang dari 30 mL/menit/1,73 m³ tetapi mempunyai efek antihipertensi dengan tiazid. Diuretik hemat kalium merupakan agen antihipertensi yang diketahui penggunaannya atau efeknya sangat lemah bila digunakan secara tunggal dan dapat memberikan efek aditif jika digunakan dalam kombinasi bersamaan dengan tiazid atau diuretik loop. Fungsi utama dari penggunaan diuretik hemat kalium ini yaitu pada kombinasi dengan diuretik lain yang melawan sifat dari pemborosan kalium pada agen diuretik lainnya. Antagonis aldosteron dalam hal ini spironolakton dan eplerenon pada teknisnya memiliki keunggulan sebagai hemat kalium tetapi lebih berfungsi sebagai antihipertensi. Tetapi obat tersebut dipandang sebagai kelas yang tidak bebas karena bukti yang mendukung terhadap indikasi kuat. Dalam hal ini penderita hipertensi penggunaan dari obat golongan diuretik juga sangat disarankan (Dipiro, 2016).

5) β -blocker

Beta bloker telah digunakan dalam beberapa pengujian untuk penggunaan terapi hipertensi. Tetapi dalam sebagian uji coba, tiazid merupakan agen lini pertama dengan β -Bloker yang ditambahkan dalam penurunan tekanan darah. Pada pasien hipertensi tanpa indikasi penggunaannya dengan terapi ACEi, ARB, CCB, dan diuretik tiazid sebagai lini pertama sebelum menggunakan β -

bloker. Dalam hal ini rekomendasi yang berdasarkan pada meta analisis memberikan saran untuk terapi berbasis β -bloker mungkin tidak mengurangi dari penderita kardiovaskular serta agen lainnya jika digunakan sebagai obat awal atau lini pertama dalam mengobati pasien penderita hipertensi dan tanpa indikasi yang kuat untuk β -bloker.

Pada β 1-Adrenoseptor dan β 2-Adrenoseptor didistribusikan dalam seluruh tubuh, namun konsentrasinya tidak sama yang terjadi pada organ dan jaringan tertentu. Terdapat reseptor β 1 yang banyak di jantung dan ginjal, dan lebih banyak dari reseptor β 2 di paru-paru, hati, pankreas, dan otot polos arteriolar. Stimulasi reseptor β 1 akan meningkatkan laju jantung, kontraktilitas, dan pelepasan renin. Sedangkan reseptor β 2 mengakibatkan bronkodilatasi dan vasodilatasi. Terapi penyekat β kardioselektif tidak akan memicu bronkospasme dan vasokonstriksi. Dalam hal sekresi insulin dan glikogenolisis dimediasi oleh reseptor β 2 dengan memblokir reseptor β 2 mampu mengurangi proses ini dan meningkatkan glukosa darah atau pemulihan tumpul dari hipoglikemia.

Beberapa β -bloker seperti acebutolol, pindolol bertindak sebagai antagonis β -reseptor parsial. Semua untuk obat antihipertensi yang berada pada golongan β -bloker memberikan aksi stabilisasi membran pada sel jantung ketika yang diberikan adalah dosis besar. Aktivitas ini diperlukan apabila β -bloker digunakan sebagai agen antiaritmia (Dipiro, 2016).

6) Alpha Adrenoseptor Antagonis


Prazosin, terazosin, dan doxazosin termasuk dalam reseptor alfa postsinaps, mengendurkan otot polos, serta mampu menurunkan tekanan darah dengan cara menurunkan pembuluh darah perifer. Agen ini sangat efektif dalam terapi obat tunggal untuk beberapa individu. Namun terdapat efek samping yang timbul dan tafilaksisi yang muncul dalam penggunaan jangka panjang. Agen ini termasuk


hipotensi yang ditandai dengan penggunaan setelah dosis pertama. Oleh karena itu, penggunaannya dosisnya harus kecil yang akan diberikan sebelum tidur. Tidak seperti beta bloker dan diuretik, alpha bloker tidak mempunyai efek yang merugikan terhadap kadar lipid serum, namun meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan kolesterol total (Dipiro, 2016).

No.	Obat antihipertensi	Dosis harian awal, mg	Dosis terget dalam RCT ditinjau, mg	Jumlah dosis perhari
1	ACE Inhibitor			
	Captopril	50	150-200	2
	Enalapril	5	20	1-2
	Lisinopril	10	40	1
2	Antagonis Reseptor bloker			
	Eprosartan	400	600-800	1-2
	Candesartan	4	12-32	1
	Losartan	50	100	1-2
	Valsartan	40-80	160-320	1
	Irbesartan	75	300	1
3	B-bloker			
	Atenolol	25-50	100	1
	Metoprolol	50	100-200	1-2
4	Kalsium kanal bloker			
	Amlodipin	2.5	10	1

	Diltiazem	120-180	360	1
	Nitrendipin	10	20	1-2
5	Diuretik tipe tiazid			
	Bendroflumetiazid	5	10	1
	Clorthalidon	12.5	12.5-25	1
	HCT	12.5-25	25-100 ²	1-2
	Indapamid	1.25	1.25-2.5	1

Tabel 2. Golongan Terapi Antihipertensi menurut JNC 8 (James et al., 2014)





Gambar 2. Penatalaksanaan Hipertensi menurut JNC 8 (James et al., 2014)

C. Farmakoekonomi

1. Definisi

Farmakoekonomi merupakan suatu deskripsi dan analisis biaya terapi obat dalam sistem pelayanan kesehatan dan masyarakat. Studi farmakoekonomi didefinisikan sebagai bentuk identifikasi, pengukuran, dan membandingkan biaya, risiko, dan manfaat dari program, pelayanan, baik itu terapi dan menentukan suatu alternatif yang memberikan keluaran kesehatan terbaik bagi sumber daya yang digunakan. Dalam hal ini farmakoekonomi spesifiknya yaitu mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya atau penggunaan dari sumber daya dengan risiko (klinik, ekonomik, humanistik) yang berasal dari produk dan pelayanan farmasi. Sehingga farmakoekonomi sebagai pertimbangan suatu biaya yang dibutuhkan dalam memperoleh produk atau pelayanan farmasi jika dibandingkan dengan konsekuensi (*outcome*) yang didapatkan dalam menetapkan alternatif yang menghasilkan keluaran optimal per rupiah yang dikeluarkan. Dalam hal ini, digunakan sebagai pengambil keputusan klinik jika memilih pilihan terapi yang paling *cost-effective*. Biaya diartikan sebagai nilai yang diperoleh dari sumber daya yang digunakan dalam suatu program atau terapi obat. Konsekuensi diartikan sebagai efek, baik itu terhadap *output* ataupun *outcome* yang berasal dari suatu terapi obat (Andayani, 2013).

2. Biaya

a. Biaya Langsung

Biaya langsung merupakan biaya yang berkaitan secara langsung dengan perawatan kesehatan, dalam hal ini terkait biaya obat dan pembekalan kesehatan, konsultasi dengan dokter, biaya jasa perawat, penggunaan fasilitas rumah sakit diantaranya kamar rawat inap, peralatan. Ada uji laboratorium, biaya pelayanan informal dan biaya yang lainnya. Tidak hanya biaya langsung medis, terdapat pula

biaya langsung non medis yaitu biaya ambulan dan biaya transportasi lainnya pada pasien(Kemenkes RI, 2013).

b. Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung yaitu jumlahnya dari suatu biaya yang memiliki kaitan dengan produktivitas dari pasien yang menderita suatu penyakit, dalam hal ini termasuk biaya transportasi, biaya hilangnya produktivitas, biaya pendamping (termasuk anggota keluarga yang menemani pasien)(Kemenkes RI, 2013).

c. Biaya Nirwujud (*intangible cost*)

Biaya nirwujud merupakan biaya yang tidak mudah untuk diukur dalam unit moneter, tetapi akan terlihat dalam pengukuran kualitas hidup, seperti rasa sakit dan cemas yang dialami pasien dan/atau keluarga(Kemenkes RI, 2013).

d. Biaya Terhindarkan (*averted cost, avoided cost*)

Biaya terhindarkan yaitu pencapaian dari pengeluaran yang dihindarkan karena penggunaan dari intervensi kesehatan(Kemenkes RI, 2013).

3. Metode Kajian Farmakoekonomi

Metode analisis ini tidak hanya mementingkan efektivitas, keamanan, kualitas obat yang dibandingkan, namun juga dari aspek ekonominya karena aspek ekonomi merupakan prinsip utama dari kajian farmakoekonomi.

Metode analisis	analisis
Analisis Minimalisasi Biaya (AMiB)	Efek dua intervensi sama atau setara, valuasi/biaya dalam rupiah.
Analisis Efektivitas Biaya (AEB)	Efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan diukur dalam unit alamiah/indikator, valuasi/biaya dalam rupiah.
Analisis Utilitas-Biaya (AUB)	Efek satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan dalam quality-adjusted life years (QALY), valuasi/biaya dalam

	rupiah.
Analisis Manfaat-Biaya (AMB)	Efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan dinyatakan dalam rupiah, valuasi/biaya dalam rupiah

Tabel 3. Metode Kajian Analisis(Kemenkes RI, 2013).

a. Analisis Minimalisasi Biaya (AMiB)

Dalam metode kajian farmakoekonomi, analisis minimalisasi biaya termasuk yang paling sederhana, karena hanya dipergunakan dalam hal membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan, termasuk obat, memberikan hasil yang sama, setara, serupa. Karena dikatakan hasil dari pengobatan terhadap asumsi sama, sehingga hanya diperlukan untuk membandingkan satu sisi yaitu biaya. Langkah-langkah yang utama dalam melakukan analisis tersebut sebelum menggunakannya yaitu menentukan kesetaraan dari intervensi misalnya obat yang akan dikaji. Namun, sangat jarang dijumpai dua terapi, termasuk obat, yang setara atau dapat dibuktikan dan diasumsikan setara(Kemenkes RI, 2013).

b. Analisis Efektivitas Biaya (AEB)

Analisis efektivitas biaya dalam kajian farmakoekonomi juga sangat mudah dan sederhana dan sangat banyak digunakan untuk membandingkan dua ataupun lebih intervensi kesehatan yang diketahui akan memberikan efek yang tidak sama atau berbeda. Dengan analisis dalam mengukur biaya secara sekaligus hasilnya, pengguna bisa dengan mudah menentukan bentuk intervensi kesehatan yang efisien membutuhkan biaya yang paling murah dalam hasil pengobatan menjadi tujuan intervensi. Metode kajian farmakoekonomi pada analisis efektivitas biaya digunakan dalam memilih intervensi kesehatan dengan memberi nilai tertinggi dan dana yang jumlahnya terbatas, misalnya yaitu:(Kemenkes RI, 2013).

1) Dengan membuat perbandingan dua atau lebih jenis obat dengan kelas terapi yang sama. Namun, memberikan hasil pengobatan yang berbeda. Misalnya, dalam penggunaan obat antihipertensi yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah diastolik yang berbeda.

2) Membandingkan dua atau lebih terapi dengan hasil pengobatannya yang diukur dalam unit ilmiah yang sama, hanya saja mekanisme yang tidak sama.

Menggunakan metode AEB harus dilakukan perhitungan rasio biaya rata-rata dan rasio inkremental efektivitas biaya yaitu ($RIEB = \text{incremental Cost-Effectiveness Ratio/ICER}$). Dengan ICER dapat diketahui berapa besarnya suatu biaya tambahan bagi setiap perubahan satu unit efektivitas-biaya. Serta dalam pengambil keputusan alternatif yang mudah mana yang memberikan efektivitas biaya terbaik. Berdasarkan tabel efektivitas biaya menggunakan metode AEB.

Dapat dikelompokkan suatu intervensi kesehatan dengan cara relatif pada intervensi kesehatan yang lain dalam keempat posisi, yaitu:

1) Posisi Dominan pada Kolom G (Kolom D dan H)

Apabila intervensi kesehatan memberikan efektivitas yang tinggi dengan biaya sama (kolom H) atau efektivitas yang sama terhadap biaya yang lebih rendah (kolom D), efektivitas lebih tinggi terhadap biaya lebih rendah (kolom G), nantinya akan terpilih sehingga tidak dibutuhkan perlakuan AEB.

2) Posisi Didominasi pada Kolom C (Kolom B dan F)

Sebaliknya dari posisi dominasi, intervensi kesehatan memberikan efektivitas biaya yang lebih rendah dengan biaya sama (kolom B) atau efektivitas biaya sama dengan biaya lebih tinggi (kolom F), efektivitas lebih rendah dengan biaya lebih tinggi (kolom C), tidak dibutuhkan untuk alternatif lagi

3) Posisi Seimbang pada Kolom E

Intervensi kesehatan yang ditawarkan kepada efektivitas dan biaya yang sama (kolom E) dapat mungkin terjadi dalam pemilihan ketika dalam pilihan tersebut didapatkan atau lebih memungkinkan untuk ditaati oleh pasien.

4) Posisi yang Membutuhkan Pertimbangan Efektivitas Biaya pada Kolom A dan I

Apabila intervensi kesehatan dalam menawarkan pemberian efektivitas biaya lebih rendah dengan biaya yang lebih rendah (kolom A). Sebaliknya, dalam menawarkan efektivitas yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih tinggi juga dalam melakukan pemilihan perlu diperhitungkan RIEB.

Efektivitas-biaya	Biaya lebih rendah	Biaya sama	Biaya lebih tinggi
Efektivitas lebih rendah	A (Perlu Perhitungan RIEB)	B	C (Didominasi)
Efektivitas sama	D	E	F
Efektivitas lebih tinggi	G (Dominan)	H	I (Perlu Perhitungan RIEB)

Tabel 4. Kelompok Alternatif berdasarkan Efektivitas Biaya

No.	Langkah	Contoh
1	Tentukan tujuan	Membandingkan biaya dan efektivitas dua terapi penunjang baru bagi pasien asma yang mendapat pengobatan inhalasi kortikosteroid, yaitu terapi penunjang breathAgain® dan AsthamaBeGone®

2	Buat daftar cara untuk mencapai tujuan tersebut	<p>Membandingkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Inhaler kortikosteroid Plasebo (A) ❖ Inhaler kortikosteroid BreatheAgain®(B) ❖ Inhaler kortikosteroid AsthmaBeGone®(C) <p>Membandingkan jumlah pasien dari masing-masing terapi yang meningkatkan FEV (<i>Forced expiration volume</i>) $\geq 12\%$</p>								
3	Identifikasi tingkat efektivitas	<p>Hasil studi literatur menunjukkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Efektivitas pengobatan A = 35% ❖ Efektivitas pengobatan B = 60% ❖ Efektivitas pengobatan C = 61% 								
4	Identifikasi dan hitung biaya pengobatan	<p>Biaya yang teridentifikasi dan diukur adalah biaya medikasi, biaya kunjungan tal terjadwal, biaya kunjungan ke unit gawat darurat, biaya rawat inap:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Biaya rerata pengobatan A = Rp. 320.000/pasien ❖ Biaya rerata pengobatan B = Rp. 537.000/pasien ❖ Biaya rerata pengobatan C = Rp. 381.000/pasien 								
5	Hitung dan lakukan interpretasi efektivitas biaya dari pilihan pengobatan	<p>a. Hitung rasio efektivitas-biaya (REB) setiap pengobatan.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>Rumus: Biaya/Efektivitas</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ REB pengobatan A = $\text{Rp. } 320.000 / 0,35 = \text{Rp. } 914.286$ ▪ REB pengobatan B = $\text{Rp. } 537.000 / 0,60 = \text{Rp. } 890.000$ ▪ REB pengobatan C = $\text{Rp. } 381.000 / 0,61 = \text{Rp. } 624.590$ <p>b. Tentukan posisi alternatif pengobatan dalam tabel atau diagram efektivitas-biaya. Biaya yang dilihat adalah biaya pengobatan, bukan rerata efektivitas-biaya.</p>								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Efektivitas-biaya</th> <th style="width: 25%;">Biaya lebih rendah</th> <th style="width: 25%;">Biaya sama</th> <th style="width: 25%;">Biaya lebih tinggi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Efektivitas lebih rendah</td> <td style="text-align: center;">A terhadap B A terhadap C</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Efektivitas-biaya	Biaya lebih rendah	Biaya sama	Biaya lebih tinggi	Efektivitas lebih rendah	A terhadap B A terhadap C		
Efektivitas-biaya	Biaya lebih rendah	Biaya sama	Biaya lebih tinggi							
Efektivitas lebih rendah	A terhadap B A terhadap C									

		(lakukan RIEB)	
Efektivitas sama	C terhadap B		B terhadap C
Efektivitas lebih tinggi			B terhadap A C terhadap A (lakukan RIEB)

c. Hitung rasio inkremental efektivitas-biaya (RIEB) setiap pengobatan.

- Untuk pengobatan C terhadap B, atau sebaliknya, tidak dilakukan perhitungan RIEB.
- RIEB pengobatan B terhadap A
 $= (\text{Rp. } 537.000 - \text{Rp. } 320.000) / (0,60 - 0,35) = \text{Rp. } 868.000$
- RIEB pengobatan C terhadap A = $(\text{Rp. } 381.000) = \text{Rp. } 234.615$.

Tabel 5. Langkah perhitungan analisis efektivitas biaya (Kemenkes RI, 2013).

c. Analisis Utilitas-Biaya (AUB)

Analisis Utilitas-Biaya tidak jauh perbedaannya dengan AEB, dilihat dari hasilnya, diketahui bahwa dengan utilitas yang berkaitan dengan meningkatnya kualitas atau adanya perubahan kualitas dikarenakan intervensi kesehatan yang dilakukan. QALY (*Quality-adjust life years*) atau jumlah tahun yang disesuaikan (JTKD) merupakan pengharapan sebuah hasil dari suatu intervensi kesehatan yang memiliki ikatan erat dengan besaran kualitas hidup. QALY dalam hal penambahan usia merupakan hasil intervensi yang disesuaikan nilainya dengan kualitas hidup yang didapatkan (Kemenkes RI, 2013).

d. Analisis Manfaat-Biaya

Analisis Manfaat Biaya (AMB-*Cost Benefit-analysis*, CBA) merupakan metode kajian analisis yang berdasarkan dari teori ekonomi yang menghitung dan

memberikan perbandingan dengan surplus biaya suatu intervensi kesehatan dengan manfaatnya. Sehingga, surplus biaya dan manfaat ditunjukkan dalam satuan moneter. AMB memiliki dua keuntungan, pertama yaitu AMB kemungkinan terdapat perbandingan dari program atau intervensi dengan hasil yang sangat berbeda. Keuntungan kedua yang dimiliki AMB yaitu dari sekian teknik, AMB satu-satunya teknik yang digunakan dalam membandingkan internal dari program ataupun intervensi. Jika surplus manfaatnya memiliki nilai, hal positif. Sehingga program/intervensi harus dipilih/didanai/dilakukan (Kemenkes RI, 2013).

e. Penyesuaian Nilai (Discounting)

Dalam mendapatkan nilai saat ini atau nilai sekarang, dibutuhkan penyesuaian nilai dengan faktor koreksi disebut dengan discounting. Tingkat discounting tidak sama dengan tingkat inflasi, keduanya memiliki konsep yang berbeda. Inflasi dengan menggambarkan perubahan harga sedangkan discounting berhubungan dengan preferensi waktu yang telah diperhitungkan dengan nilai uang (Kemenkes RI, 2013).

f. Analisis Sensitivitas

Metode yang paling sederhana yaitu analisis sensitivitas satu arah, perlakuannya mengubah nilai dari suatu variabel dalam memungkinkan dengan menjaga nilai variabel lainnya setara. Hasilnya dari satu arah akan diperlihatkan dalam diagram tornado, yang terjadi variabel yang memiliki dampak besar ditempatkan di puncak diagram dan hingga kebawah berdasarkan urutan besarnya dampak (Kemenkes RI, 2013).

4. Metode *Average Cost-Effectiveness Ratio* (ACER) dan *Incremental Cost-Effectiveness Ratio* (ICER)

Rasio C/E memiliki dua bentuk diantaranya yaitu rata-rata atau tunggal dan tambahan (*Incremental cost-effectiveness ratio* atau ICER). *Average cost effectiveness ratio* (ACER) diartikan sebagai berikut:

$$ACER = C/E$$

Keterangan:

ACER = *Average cost effectiveness ratio* (rata-rata biaya efektif rasio)

C = *Cost* (Biaya)

E = *Effectiveness* (Efektivitas)

Perhitungan ACER didefinisikan sebagai biaya rata-rata yang harus dikeluarkan dalam efektifitas suatu obat tertentu, seperti halnya rata-rata biaya per kesembuhan atau rata-rata biaya per persentase penurunan tekanan darah dalam mmHg.

Sedangkan ICER diartikan sebagai rasio perbedaan antara biaya dari 2 alternatif dengan perbedaan efektivitas antara alternatif dan perhitungannya berdasarkan persamaan, yaitu:

$$ICER = \frac{\Delta \text{biaya}}{\Delta \text{efek}} = \frac{\text{biaya teknologi baru} - \text{biaya pembanding}}{\text{efek teknologi baru} - \text{efek pembanding}}$$

(Andayani, 2013)

ACER memberikan informasi yang bermanfaat, namun analisis *incremental* merupakan ciri dari CEA, analisis *incremental* harus dilakukan dalam CEA. Interpretasi ICER berbeda ACER, hasil ICER menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau mencapai peningkatan satu unit *outcome* relatif terhadap pembandingannya. ICER merupakan perbandingan dari perbedaan biaya dibagi dengan perbedaan nilai *outcome*. Jika perhitungan ICER memberikan nilai negatif, maka suatu terapi (*dominant option*) lebih efektif dan lebih murah dibandingkan alternatifnya (*dominated option*). Jika suatu alternatif terapi lebih

efektif tetapi lebih mahal dibandingkan lainnya, ICER digunakan untuk menjelaskan besarnya tambahan biaya untuk setiap unit perbaikan kesehatan, dimana fungsi nilai ICER adalah menentukan apakah suatu obat dapat digantikan dengan obat yang lain untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dan juga untuk mendapatkan efektifitas terapi yang lebih baik di bandingkan dengan obat sebelumnya.

D. Tinjauan Islam tentang Pengobatan

Islam memiliki tujuan dalam memelihara suatu agama, akal, jiwa, jasmani, harta. Apabila seorang muslim terkena penyakit ringan atau berat dan itu semua sudah Allah SWT. tetapkan. Jika orang terkena penyakit hendaknya mengobatinya dan meluruskan niatnya. Dan sesama muslim harus saling tolong menolong.

Hendaknya ketika seseorang ingin berkonsultasi kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. dan mengetahui atau mempunyai ilmu pengobatan. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nahl: 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015).

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah volume 7 telah dijelaskan bahwa bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jika kalian, hai orang-orang kafir, tidak mengetahui itu maka bertanyalah kepada orang-orang berilmu yang mengetahui kitab-kitab samawi.

Kalian akan tahu bahwa semua Rasul Allah itu manusia, bukan malaikat (Shihab, 2005).

Berdasarkan tafsir dihalaman sebelumnya maka hendaknya ketika kita ingin berkonsultasi terkait penyakit yang diderita maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengobatan. Dalam hal ini orang yang mengobati untuk berniat menolong saudaranya sesama Muslim sesuai dengan kemampuannya dan ilmu pengobatan yang dimilikinya.

Dan dijelaskan pula dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim, mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alihi wa Sallam bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

“Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya”

(HR. Imam Bukhari)

Berdasarkan hadist tersebut, setiap penyakit pasti ada penawarnya. Allah swt menciptakan obat-obatan untuk menyembuhkan semua penyakit tersebut. Tetapi tidak semua manusia memiliki ilmu pengobatan dan penyakit tersebut juga akan sembuh bergantung dari kecocokan terhadap obat yang dikonsumsi.

Oleh karena itu, ketika sedang sakit hendaknya berkonsultasi kepada tenaga kesehatan untuk mengetahui penyakit dan mendapatkan obat yang cocok untuk penyakitnya. Sehingga tidak membuang buang terlalu banyak biaya atau boros karena boros merupakan perbuatan yang disukai setan, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 21 :

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar.” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015)

Pada zaman sekarang untuk melakukan pengobatan diperlukan adanya pembiayaan. Dalam hal melakukan proses pengobatan yang memerlukan biaya sebaiknya perlu diperhatikan. Dalam al-qur’an telah dijelaskan bahwa kita harus cermat terhadap proses pengeluaran biaya.

Sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah SWT. Bahwa:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا


Terjemahnya:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015).

Berdasarkan Tafsir Al-misbah oleh Quraish Shihab bahwa, sebab orang-orang yang menghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) merupakan saudara-saudara setan. Mereka menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya, akan sama seperti sifat setan(Shihab, 2005).

Dari ayat tersebut apabila dihubungkan dengan penelitian ini terkait efektivitas biaya dalam pengobatan, kita dianjurkan untuk tetap memperhatikan

biaya yang dikeluarkan dalam pengobatan. Dalam hal ini, perlu diperhatikan dalam melakukan suatu pengobatan perlu memilih pengobatan yang efektif dimana efektivitas suatu pengobatan harus menerima obat sesuai kebutuhan pasien dalam periode waktu yang cukup dan harga yang murah atau biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak untuk pasien, namun efektif dalam penyembuhannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian observasional dengan rancangan penelitian secara potong lintang (*Cross sectional*). Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif berdasarkan basis data rekam medik pasien hipertensi yang dirawat inap. Basis data rekam medik dilakukan validitas data resep pasien hipertensi. Validitas data yang dilakukan adalah nama pasien, umur, lama rawat inap, nama obat, jumlah obat, dan dosis obat yang diberikan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di RSUD I Lagaligo.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini yaitu bulan September-Oktober 2021.

C. Populasi Penelitian

Populasi yaitu keseluruhan dari subjek dan atau objek yang akan menjadi sasaran dalam penelitian (Sugiyono, 2015). Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh pasien yang didiagnosa menderita penyakit hipertensi dan rawat inap yang menerima terapi kombinasi antihipertensi di RSUD I Lagaligo selama periode tahun 2020.

D. Sampel Penelitian

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2015). Sampel penelitian ini yaitu seluruh pasien yang didiagnosa menderita penyakit hipertensi rawat inap yang menerima terapi kombinasi antihipertensi (golongan ACE-I, ARB, CCB, b-bloker dan Diuretik tiazid) di

RSUD I Lagaligo selama periode tahun 2020 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria dalam penelitian ini yaitu.

1. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi merupakan kriteria yang dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat dijadikan sebagai sampel. Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Pasien dengan diagnosis hipertensi dengan atau tanpa penyakit penyerta.
- b. Pasien rawat inap periode tahun 2020.
- c. Pasien hipertensi berusia 18-60 tahun.
- d. Pasien yang menerima terapi pengobatan antihipertensi kombinasi
- e. Pasien BPJS

2. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi merupakan ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat dijadikan sebagai sampel. Kriteria eksklusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Hamil
- b. Pasien dengan rekam medik tidak lengkap
- c. Pasien yang meninggal dan tidak menyelesaikan terapi.
- d. Data statis pasien tidak lengkap

E. Variabel Penelitian


1. Variabel Dependen

Variabel dependen/terikat (y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, sehingga pada penelitian ini variabel dependen yaitu Efektivitas biaya kombinasi obat antihipertensi

2. Variabel Independen

Variabel independen/bebas (x) yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Pada penelitian ini yaitu biaya medik langsung, CEA meliputi ACER dan ICER

Gambar 3. Skema Variabel Penelitian



F. Penentuan Besar Sampel

Penentuan jumlah sampel berdasarkan rumus slovin sudah banyak digunakan oleh peneliti, karena rumus slovin dinilai mudah dan praktis dalam penggunaannya (Riyanto & Hatmawan, 2020). Besar sampel apabila diketahui populasi (N), maka pengambilan sampel dengan menggunakan rumus slovin dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%)

Berdasarkan rumus di atas, perhitungan sampel untuk jumlah pasien rawat inap RSUD I lagaligo tahun 2020 dengan jumlah populasi sebanyak 170 orang dengan nilai d yang digunakan peneliti yaitu 10% karena pada tingkat akurasi

yaitu 90%, semakin besar jumlah sampel maka diharapkan akurasi hasil penelitian juga semakin tinggi.. Perhitungannya dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

$$n = \frac{170}{170(10)^2 + 1}$$

$$n = \frac{170}{170(0,01) + 1}$$

$$n = \frac{170}{1,71}$$

$$n = \frac{170}{2,7}$$

$$n = 63 \text{ orang}$$

jadi, jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 63 sampel.

G. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data menggunakan metode retrospektif dimana bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau kejadian ataupun variabel dimasa lalu (Siswanto et al., 2017). Data yang diambil merupakan data sekunder dengan kejadian atau keadaan masa lalu.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rekam medik pasien penderita hipertensi rawat inap di RSUD I Lagaligo periode tahun 2020.

I. Pengolahan Data

Dilakukan pengolahan data dengan cara yaitu

1. Data yang telah dikumpulkan di kelompokkan kemudian diatur dalam SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

2. Dianalisis biaya medik langsungnya
3. Hasilnya kemudian diolah dan dibahas dengan farmakoekonomi.
4. Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pengolahan data.

J. Analisis Data

Hasil penelitian kemudian dianalisis secara analisis deskriptif. Suatu besarnya biaya dihitung untuk mendapatkan ada atau tidaknya efektivitas biaya pada pasien hipertensi yang mendapat terapi kombinasi antihipertensi yang menjalani rawat inap.

Analisis efektivitas biaya dapat dihitung menggunakan rumus *Cost Effectiveness Average* (CEA) berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan dari pasien hipertensi terhadap efektivitas penggunaan obat menggunakan rumus yaitu:

$$CEA = \frac{\text{Biaya Penggunaan obat}}{\text{Efektivitas Penggunaan Obat}}$$

Sedangkan *Incremental Cost-Effectiveness Ratio* (ICER) yaitu sebagai rasio perbedaan antara biaya 2 alternatif dengan perbedaan dari efektivitas terkait alternatif dan dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$ICER = \frac{\Delta \text{biaya}}{\Delta \text{efek}} = \frac{\text{biaya teknologi baru} - \text{biaya pembanding}}{\text{efek teknologi baru} - \text{efek pembanding}}$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Subjek Penelitian

Pada gambaran subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pasien berjumlah 63 pasien yang telah sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi pada pasien hipertensi di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur pada periode 2021.

2. Analisis Univariat

Analisis univariat yang dilakukan untuk memperoleh gambaran dari variabel yang diteliti kemudian diperoleh hasil dalam bentuk tabel, grafik atau diagram.

3. Pembagian Pasien

Deskripsi sampel dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui pasien hipertensi di Instalasi Rawat Inap RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur


a. Jenis Kelamin

Tabel 6. Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Pasien	Persentase %
1	Perempuan	23	36,5
2	Laki-laki	40	63,5
	Total	63	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien di RSUD I Lagaligo

Berdasarkan tabel 6. pasien untuk jenis kelamin terdapat 63 pasien yang dijadikan sampel ditemukan bahwa pasien laki-laki memiliki persentase lebih tinggi yaitu 63,5% dan perempuan yaitu 36,5%. Jenis kelamin pasien disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 4. Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin Di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

b. Usia


Tabel 7. Pasien Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah Pasien
1	18	1
2	30	1
3	32	1
4	33	1
5	34	2
6	36	1
7	38	1
8	39	1
9	42	2
10	43	1
11	44	1
12	45	3
13	46	1
14	47	2
15	48	2
16	49	1
17	50	1

18	51	4
19	53	5
20	54	4
21	55	1
22	56	4
23	57	3
24	58	3
25	59	5
26	60	11
Total		63

Sumber : Data Rekam Medik Pasien Di RSUD I Lagaligo

Berdasarkan tabel 7. pasien berdasarkan usia dengan jumlah pasien yaitu 63 memiliki usia beragam. Pasien yang berusia 18, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 50, 55 tahun masing-masing terdapat 1 pasien. Usia 34, 42, 47, 48 tahun masing-masing terdapat 2 pasien. Usia 45, 57, 58 tahun masing-masing terdapat 3 pasien. Usia 51, 54, 56 tahun masing-masing terdapat 5 pasien, sedangkan pasien yang berusia 60 tahun memiliki 11 pasien. Pasien berdasarkan usia disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 5. Berdasarkan Usia Di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur


c. Klasifikasi Hipertensi

Tabel 8. Pasien Hipertensi Berdasarkan Klasifikasi Hpertensi

No.	Klasifikasi Hipertensi	Pasien	Persentase %
1	Normal	0	0
2	Prehipertensi	2	3,2
3	Hipertensi <i>Stage 1</i>	12	19,0
4	Hipertensi <i>Stage 2</i>	49	77,8
Total		63	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien Di RSUD I Lagaligo

Berdasarkan tabel 8. Sampel yang digunakan sebanyak 63 terdapat pasien dengan klasifikasi tekanan darah yang berbeda-beda. Klasifikasi hipertensi normal yaitu 0%, prehipertensi sebanyak 2 pasien (3,2%), hipertensi *stage 1* sebanyak 12 pasien (19,0%), dan hipertensi *stage 2* sebanyak 49 pasien (77,8%). tekanan darah disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 6. Berdasarkan Tekanan Darah Pasien Di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur


d. Lama Rawat Inap

Tabel 9. Kalsifikasi Pasien Hipertensi Berdasarkan Lama Rawat Inap

No.	Lama Rawat (Hari)	Pasien	Persentase %
1	2	5	7,9
2	3	9	14,2
3	4	17	27,0
4	5	4	6,3
5	6	10	15,9
6	7	4	6,3
7	8	3	4,8
8	9	3	4,8
9	10	1	1,6
10	11	6	9,5
11	13	1	1,6
Total		63	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien Di RSUD I Lagaligo

Berdasarkan tabel 9 sampel yang digunakan sebanyak 63 pasien. Lama rawat selama 13 hari yaitu terdapat 1 pasien dan untuk lama rawat inap selama 4 hari memiliki jumlah pasien terbanyak yaitu 17 pasien, pada keterangan lama rawat inap disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 7. Pasien Berdasarkan Lama Rawat Inap Di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

e. Penyakit Penyerta


Tabel 10. Pasien Berdasarkan Penyakit Penyerta

No.	Penyakit Penyerta	Pasien	Persentase %
1	DBD	1	1,6
2	Abdominal Pain	3	4,8
3	Vertigo	3	4,8
4	CHF	20	31,7
5	Pneumonia	1	1,6
6	Abses Hepar	1	1,6
7	CKD	1	1,6
6	Angina	1	1,6
8	PPOK	2	3,2
9	Hematemesis	1	1,6
10	TBC	3	4,8
11	Dipsnea	1	1,6
12	Anemia	2	3,2
13	Endocardia	1	1,6
14	DM Tipe 1	1	1,6
15	Edema	1	1,6

16	Dispepsia	7	11,1
17	DM Tipe 2	8	12,7
18	Apendictis Akut	1	1,6
19	Tanpa Penyakit Penyerta	3	4,8
20	Abses Mandibula	1	1,6
Total		63	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien Di RSUD I Lagaligo

Berdasarkan tabel 10 pada penderita hipertensi memiliki penyakit penyerta Yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular diantaranya CHF memiliki pasien tertinggi yaitu 20 pasien dengan persentase 31,7%, disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 8. Pasien Berdasarkan Penyakit Penyerta Di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

4. Regimen Terapi

a. Golongan Obat

Tabel 11. Regimen Terapi Berdasarkan Golongan Obat


No.	Golongan Obat	Pasien	Persentase %
1	ACEI CCB	14	22,2
2	ACEI CCB ARB	1	1,6

3	Diuretik CCB	12	19,0
4	Diuretik ACEI	12	19,0
5	ARB CCB	2	3,2
6	Diuretik ARB	10	15,9
7	Beta Bloker CCB	4	6,3
8	ACEI CCB Diuretik	5	7,9
9	ACEI Beta Bloker Diuretik	2	3,2
10	Beta Bloker ACEI	1	1,6
Total		63	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien Di RSUD I Lagaligo

Berdasarkan tabel 11 yaitu regimen terapi antihipertensi menurut golongan obat pada pasien hipertensi dengan menggunakan terapi kombinasi. Penggunaan kombinasi tertinggi pada kombinasi dua yaitu ACEI CCB terdapat 14 pasien (22,2) menggunakan golongan obat tersebut. Penggunaan Diuretik CCB dan Diuretik ACEI masing-masing penggunaannya sebanyak 12 pasien (19,0%), Diuretik ARB sebanyak 10 pasien (15,9%) dan terendah yaitu Beta Bloker ACEI sebanyak 1 pasien (1,6%) sedangkan untuk kombinasi 3 yaitu tertinggi pada penggunaan ACEI CCB Diuretik sebanyak 5 pasien (7,9%), terendah yaitu ACEI CCB ARB sebanyak 1 pasien (1,6%), regimen terapi berdasarkan golongan obat disajikan dalam gambar berikut:

M A K A S S A R



Gambar 9. Regimen Terapi Pasien Berdasarkan Golongan Obat Di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

b. Jenis Obat

Tabel 12. Regimen Terapi Berdasarkan Jenis Obat


No.	Jenis Obat	Pasien	Persentase %
1	Amlodipin Captopril	14	22,2
2	Captopril Bisoprolol	1	1,6
3	Candesartan Furosemid	12	19,0
4	Amlodipin Furosemid	9	14,3
5	Captopril Furosemid	7	11,1
6	Candesartan Amlodipin	1	1,6
7	Bisoprolol Amlodipin	4	6,3
8	Furosemid Lisinopril	7	11,1
9	Furosemid Captopril Bisoprolol	1	1,6
10	Amlodipin Furosemid Lisinopril	2	3,2
11	Lisinopril Bisoprolol Furosemid	1	1,6
12	Captopril Amlodipin Candesartan	1	1,6
13	Captopril Amlodipin Furosemid	3	4,8

Total	63	100
-------	----	-----

Sumber : Data Rekam Medik Pasien Di RSUD I Lagaligo

Berdasarkan tabel 12 regimen terapi berdasarkan jenis obat pada pasien hipertensi penggunaan tertinggi yaitu kombinasi 2 amlodipin captopril sebanyak 14 pasien (22,2%), kombinasi Candesartan Furosemid sebanyak 12 pasien (19,0%), kombinasi Amlodipin Furosemid sebanyak 9 pasien (14,3%), regimen terapi dengan jumlah sebanyak 7 pasien (11,1%) yaitu regimen terapi kombinasi Captopril Furosemid dan Furosemid Lisinopril, kombinasi Bisoprolol Amlodipin sebanyak 4 pasien (6,3%) dan terdapat 2 penggunaan terendah untuk regimen terapi pasien hipertensi dengan kombinasi 2 yaitu 1 pasien (1,6%) yaitu Captopril Bisoprolol dan Candesartan Amlodipin. sedangkan pada penggunaan kombinasi 3 tertinggi adalah jenis obat Captopril Amlodipin Furosemid sebanyak 3 pasien (4,8%), kombinasi Amlodipin Furosemid Lisinopril sebanyak 2 pasien (3,2%), dan terdapat 3 regimen terapi pasien hipertensi terendah untuk kombinasi 3 masing-masing 1 pasien (1,6%) yaitu kombinasi Furosemid Captopril Bisoprolol, kombinasi Lisinopril Bisoprolol Furosemid, dan Captopril Amlodipin Candesartan, regimen terapi pasien berdasarkan jenis obat disajikan dalam gambar berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR



Gambar 10. Regimen Terapi Pasien Berdasarkan Jenis Obat Di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

4. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Berdasarkan Lama Rawat Inap

a. 2 Hari Rawat Inap

Tabel 13. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 2 Hari

Usia	Jenis Kelamin	Penyakit Penyerta	Tekanan Darah. Pre-treatment (mmHg)	Tekanan Darah. Post-treatment (mmHg)	Obat Antihipertensi		Biaya Obat		Total Biaya
					obat 1	obat 2	obat 1	obat 2	
34 th	P	Tanpa Penyakit Penyerta	180/100	160/90	amlodipin 6 tablet	captopril 5 tablet	Rp15,240	Rp1,340	Rp16,580
59 th	L	Tanpa Penyakit Penyerta	190/80	150/90	amlodipin 2 tablet	captopril 3 tablet	Rp5,080	Rp804	Rp5,884
60 th	P	DBD	170/90	150/90	amlodipin 7 tablet	captopril 5 tablet	Rp17,780	Rp1,340	Rp19,120
43 th	L	CHF	170/90	130/80	captopril 6 tablet	furosemid 2 tablet	Rp1,608	Rp560	Rp2,168
58 th	P	Abdominal Pain	190/110	120/80	bisoprolol 4 tablet	amlodipin 6 tablet	Rp19,248	Rp15,240	Rp34,488

Berdasarkan tabel 13. Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 2 Hari, 2 dari 5 pasien berhasil mencapai target terapi, adapun 2 pasien yang mencapai target terapi, 1 pasien menggunakan kombinasi obat captopril furosemid, dan 1 pasien menggunakan kombinasi obat bisoprolol amlodipin, berdasarkan tabel tersebut,

obat yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik adalah kombinasi captopril furosemid.

b. 3 Hari Rawat Inap

Tabel 14. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 3 Hari

Usia	Jenis Kelamin	Penyakit Penyerta	Tekanan Darah. Pre-treatment (mmHg)	Tekanan Darah. Post-treatment (mmHg)	Obat Antihipertensi yang di konsumsi			Biaya Obat			Total Biaya
					obat 1	obat 2	obat 3	obat 1	obat 2	obat 3	
57 th	L	Dispepsia	160/90	130/80	amlodipin 4 tablet	captopril 7 tablet	—	Rp10,160	Rp1,876	—	Rp12,036
54 th	L	Vertigo	160/100	140/90	amlodipin 5 tablet	captopril 12 tablet	—	Rp12,700	Rp3,216	—	Rp15,916
33 th	L	Endocardia	160/85	150/90	candesartan 4 tablet	furosemid 2 tablet	—	Rp38,500	Rp560	—	Rp39,060
56 th	L	CHF	180/100	130/90	amlodipin 7 tablet	furosemid 10 tablet	—	Rp17,780	Rp2,800	—	Rp20,580
38 th	P	CKD	150/90	130/70	amlodipin 5 tablet	furosemid 8 tablet	—	Rp12,700	Rp2,240	—	Rp14,940
48 th	P	DM Tipe 2	180/100	170/90	bisoprolol 4 tablet	amlodipin 4 tablet	—	Rp19,248	Rp10,160	—	Rp29,408
55 th	L	CHF	160/100	130/90	captopril 8 tablet	furosemid 6 tablet	bisoprolol 8 tablet	Rp2,144	Rp1,680	Rp38,496	Rp42,320
53 th	L	CHF	160/90	130/80	Lisinopril 4 tablet	furosemid 6 tablet	bisoprolol 8 tablet	Rp1,668	Rp1,680	Rp38,496	Rp41,844
59 th	L	Hematemesis	160/90	140/90	Lisinopril 4 tablet	Furosemid 8 tablet	Amlodipin 7 tablet	Rp1,668	Rp2,240	Rp17,780	Rp21,688

Berdasarkan tabel 14. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 3 Hari, 5 dari 9 pasien berhasil mencapai target terapi, adapun 5 pasien yang mencapai target terapi, 1 pasien menggunakan kombinasi obat amlodipin captopril, 2 pasien menggunakan kombinasi obat amlodipin furosemid, 1 pasien menggunakan kombinasi obat captopril furosemid, 1 pasien menggunakan kombinasi obat lisinopril furosemid berdasarkan tabel tersebut, obat yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik adalah kombinasi amlodipin furosemid.

c. 4 Hari Rawat Inap

Tabel 15. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 4 Hari

Usia	Jenis Kela min	Penyakit Penyerta	Tekanan Darah. Pre-treatment (mmHg)	Tekanan Darah. Post-treatment (mmHg)	Obat Antihipertensi yang di konsumsi			Biaya Obat			Total Biaya
					obat 1	obat 2	obat 3	obat 1	obat 2	obat 3	
59 th	L	Tanpa Penyakit Penyerta	170/90	150/100	amlodipin 6 tablet	captopril 8 tablet		Rp15,240	Rp2,144	—	Rp17,384
45 th	L	Abdominal Pain	200/100	150/90	amlodipin 2 tablet	captopril10 tablet		Rp5,080	Rp2,680	—	Rp7,760
42 th	L	vertigo	170/100	110/80	amlodipin 7 tablet	captopril 10 tablet		Rp17,780	Rp2,680	—	Rp20,460
44 th	L	Abdominal Pain	170/100	170/90	amlodipin 3 tablet	captopril 8 tablet		Rp7,620	Rp2,144	—	Rp9,764
47 th	L	DM Tipe 2	160/90	130/80	amlodipin 5 tablet	captopril 10 tablet		Rp12,700	Rp2,680	—	Rp15,380
60 th	P	DM Tipe 2	160/100	140/90	amlodipin 7 tablet	captopril 10 tablet		Rp17,780	Rp2,680	—	Rp20,460
60 th	P	CHF	200/110	150/90	Candesartan 5 tablet	furosemid 2 tablet		Rp48,125	Rp560	—	Rp48,685
53 th	L	DM Tipe 2	150/100	120/80	amlodipin 5 tablet	furosemid 5 tablet		Rp12,700	Rp1,400	—	Rp14,100
60 th	L	Abses Mandibula	180/90	150/90	Amlodipin 6 tablet	Furosemid 8 tablet		Rp15,240	Rp2,240	—	Rp17,480
51 th	L	Edema	130/90	100/80	captopril 7 Tablet	furosemid 7 Tablet		Rp1,876	Rp1,960	—	Rp3,836
54 th	L	CHF	160/100	130/80	Captopril 8 tablet	Furosemid 5 tablet		Rp2,144	Rp1,400	—	Rp3,544
60 th	L	Dispepsia	190/110	130/90	candesartan 12 Tablet	amlodipin 7 tablet		Rp.115.500	Rp17,780	—	Rp17,780
60 th	L	Vertigo	210/120	130/90	Bisoprolol 4 tablet	Amlodipin 4 tablet		Rp19,248	Rp10,160	—	Rp29,408
53 th	P	CHF	160/90	130/80	Bisoprolol 6 tablet	Captopril 14 tablet		Rp28,872	Rp3,752	—	Rp32,624
49 th	P	Pneumonia	160/110	150/90	Furosemid 10 tablet	Lisinopril 7 tablet		Rp2,800	Rp2,919	—	Rp5,719
30 th	L	Dipsnea	160/90	130/80	Furosemid 10 tablet	Lisinopril 5 tablet		Rp2,800	Rp2,085	—	Rp4,885
56 th	L	Angina	165/100	145/90	Captopril 10 tablet	Furosemid 5 tablet	Amlodipin 7 tablet	Rp2,680	Rp1,400	Rp17,780	Rp21,860

Berdasarkan tabel 15. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 4 Hari, 11 dari 17 pasien berhasil mencapai target terapi, adapun 11 pasien yang mencapai target terapi, 3 pasien menggunakan kombinasi obat amlodipin captopril, 2 pasien menggunakan kombinasi obat amlodipin furosemid, 2 pasien menggunakan kombinasi obat captopril furosemid, 1 pasien menggunakan kombinasi obat candesartan amlodipin, 1 pasien menggunakan kombinasi obat bisoprolol amlodipin, 1 pasien menggunakan kombinasi obat bisoprolol captopril, 1 pasien menggunakan kombinasi obat furosemid lisinopril, berdasarkan tabel

tersebut, obat yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik adalah kombinasi Captopril furosemid.

d. 5 Hari Rawat Inap

Tabel 16. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 5 Hari

Usia	Jenis Kelamin	Penyakit Penyerta	Tekanan Darah. Pre-treatment (mmHg)	Tekanan Darah. Post-treatment (mmHg)	Obat Antihipertensi yang di konsumsi		Biaya Obat		Total Biaya
					obat 1	obat 2	obat 1	obat 2	
59 th	L	TBC	180/100	160/80	candesartan 7 tablet	furosemid 7 tablet	Rp67,375	Rp1,960	Rp69,335
48 th	L	TBC	180/100	150/90	candesartan 5 tablet	furosemid 5 tablet	Rp48,125	Rp1,400	Rp49,525
54 th	P	Anemia	170/100	135/85	candesartan 5 tablet	furosemid 12 tablet	Rp48,125	Rp3,360	Rp51,485
56 th	L	DM Tipe 2	150/100	120/70	amlodipin 8 tablet	furosemid 5 tablet	Rp20,320	Rp1,400	Rp21,720

Berdasarkan tabel 16. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 5 Hari, 2 dari 4 pasien berhasil mencapai target terapi, adapun 2 pasien yang mencapai target terapi, 1 pasien menggunakan kombinasi obat candesartan furosemid, 1 pasien menggunakan kombinasi obat amlodipin furosemid, berdasarkan tabel tersebut, obat yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik adalah kombinasi amlodipin furosemid.

e. 6 Hari Rawat Inap

Tabel 17. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 6 Hari

Usia	Jenis Kelamin	Penyakit Penyerta	Tekanan Darah. Pre-treatment (mmHg)	Tekanan Darah. Post-treatment (mmHg)	Obat Antihipertensi yang di konsumsi			Biaya Obat			Total Biaya
					obat 1	obat 2	obat 3	obat 1	obat 2	obat 3	
45 th	L	Dispepsia	180/100	150/100	amlodipin 7 tablet	captopril 12 tablet	—	Rp17,780	Rp3,216	—	Rp20,996
53 th	L	PPOK	160/100	135/85	amlodipin 12 tablet	captopril 20 tablet	—	Rp30,480	Rp5,360	—	Rp35,840
39 th	L	DM Tipe 2	150/90	140/90	candesartan 7 tablet	furosemid 12 tablet	—	Rp67,375	Rp3,360	—	Rp70,735
58 th	L	CHF	160/90	130/80	candesartan 2 tablet	furosemid 10 tablet	—	Rp19,250	Rp2,800	—	Rp22,050
34 th	L	PPOK	160/90	140/90	captopril 18 tablet	furosemid 7 tablet	—	Rp4,824	Rp1,960	—	Rp6,784
32 th	L	CHF	160/100	140/90	furosemid 10 tablet	Lisinopril 4 tablet	—	Rp2,800	Rp1,668	—	Rp4,468
51 th	P	CHF	160/90	130/90	furosemid 10 tablet	Lisinopril 7 tablet	—	Rp2,800	Rp2,919	—	Rp5,719
18 th	P	TBC	160/100	140/90	furosemid 8 tablet	Lisinopril 9 tablet	—	Rp2,240	Rp3,753	—	Rp5,993

46 th	L	CHF	170/100	130/80	furosemid 5 tablet	Lisinopril 7 tablet		Rp1,400	Rp2,919		Rp4,319
60 th	L	CHF	160/90	130/80	captopril 12 tablet	furosemid 12 tablet	amlodipin 7 tablet	Rp3,216	Rp3,360	Rp17,780	Rp24,356

Berdasarkan tabel 17. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 6 hari, 5 dari 10 pasien berhasil mencapai target terapi, adapun 5 pasien yang mencapai target terapi, 1 pasien menggunakan kombinasi obat amlodipin captopril, 1 pasien menggunakan kombinasi obat candesartan furosemid, 2 pasien menggunakan kombinasi obat furosemid lisinopril, 1 pasien menggunakan kombinasi obat captopril furosemid amlodipin, berdasarkan tabel tersebut, obat yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik adalah kombinasi furosemid lisinopril.

f. 7 Hari Rawat Inap

Tabel 18. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 7 hari

Usia	Jenis Kelamin	Penyakit Penyerta	Tekanan Darah. Pre-treatment (mmHg)	Tekanan Darah. Post-treatment (mmHg)	Obat Antihipertensi yang di konsumsi			Biaya Obat			Total Biaya
					obat 1	obat 2	obat 3	obat 1	obat 2	obat 3	
56 th	L	DM Tipe 1	140/80	140/80	amlodipin 6 Tablet	furosemid 6 Tablet		Rp15,240	Rp1,680		Rp16,920
60 th	P	Dispepsia	170/90	130/90	captopril 16 tablet	furosemid 12 tablet		Rp4,288	Rp3,360		Rp7,648
57 th	P	Apendicitis Akut	140/80	100/70	Bisoprolol 12 Tablet	amlodipin 8 tablet		Rp57,744	Rp20,320		Rp78,064
50 th	P	CHF	160/100	130/80	Lisinopril 7 tablet	Furosemid 12 tablet	Amlodipin 10 tablet	Rp2,919	Rp3,360	Rp25,400	Rp31,679

Berdasarkan tabel 18. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 7 hari 3 dari 4 pasien berhasil mencapai target terapi, adapun 3 pasien yang mencapai target terapi, 1 pasien menggunakan kombinasi obat captopril furosemid, 1 pasien menggunakan kombinasi obat bisoprolol amlodipin, dan 1 pasien menggunakan kombinasi obat lisinopril furosemid berdasarkan tabel tersebut, obat yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik adalah kombinasi captopril furosemid.

g. 8 Hari Rawat Inap

Tabel 19. Perhitungan Total Biaya Medik Bisoprolol Captopril

Usia	Jenis Kelamin	Penyakit Penyerta	Tekanan Darah. Pre-treatment (mmHg)	Tekanan Darah. Post-treatment (mmHg)	Obat Antihipertensi yang di konsumsi		Biaya Obat		Total Biaya
					obat 1	obat 2	obat 1	obat 2	
42 th	L	CHF	160/100	130/80	Candesartan 8 tablet	Furosemid 6 tablet	Rp77,000	Rp1,680	Rp78,680
45 th	P	DM Tipe 2	180/90	130/80	amlodipin 7 tablet	furosemid 17 tablet	Rp17,780	Rp4,760	Rp22,540
59 th	P	CHF	170/110	130/80	Furosemid 12 tablet	Lisinopril 12 tablet	Rp3,360	Rp5,004	Rp8,364

Berdasarkan tabel 19. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 8 hari, 3 dari 3 pasien berhasil mencapai target terapi, adapun 3 pasien yang mencapai target terapi, 1 pasien menggunakan kombinasi obat candesartan furosemid, 1 pasien menggunakan kombinasi obat amlodipin furosemid, dan 1 pasien menggunakan kombinasi obat furosemid lisinopril berdasarkan tabel tersebut, obat yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik adalah kombinasi furosemid lisinopril.

h. 9 Hari Rawat Inap

Tabel 20. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 9 hari

Usia	Jenis Kelamin	Penyakit Penyerta	Tekanan Darah. Pre-treatment (mmHg)	Tekanan Darah. Post-treatment (mmHg)	Obat Antihipertensi yang di konsumsi			Biaya Obat			Total Biaya
					obat 1	obat 2	obat 3	obat 1	obat 2	obat 3	
51 th	P	Abses Hepar	170/90	130/90	amlodipin 8 tablet	captopril 20 tablet	—	Rp20,320	Rp5,360	—	Rp25,680
57 th	P	Dispepsia	180/100	130/90	candesartan 14 tablet	furosemid 8 tablet	—	Rp134,750	Rp2,240	—	Rp136,990
36 th	P	CHF	190/110	140/90	captopril 22 tablet	amlodipin 10 tablet	candesartan 8 tablet	Rp5,896	Rp25,400	Rp77,000	Rp108,296

Berdasarkan tabel 20. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 9 hari, 2 dari 3 pasien berhasil mencapai target terapi, adapun 3 pasien yang mencapai target terapi, 1 pasien menggunakan kombinasi obat amlodipin captopril, 1 pasien menggunakan kombinasi obat candesartan furosemid, berdasarkan tabel tersebut, obat yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik adalah kombinasi amlodipin captopril.

i. 10 Hari Rawat Inap

Tabel 21. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 10 hari

Usia	Jenis Kelamin	Penyakit Penyerta	Tekanan Darah. Pre-treatment (mmHg)	Tekanan Darah. Post-treatment (mmHg)	Obat Antihipertensi yang di konsumsi		Biaya Obat		Total Biaya
					obat 1	obat 2	obat 1	obat 2	
60 th	P	CHF	160/100	130/80	candesartan 10 tablet	Furosemid 16 tablet	Rp96,250	Rp4,480	Rp100,730

Berdasarkan tabel 21. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 10 hari, 1 dari 1 pasien berhasil mencapai target terapi, adapun 1 pasien yang mencapai target terapi, pasien tersebut menggunakan kombinasi obat candesartan furosemid, berdasarkan tabel tersebut, obat yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik adalah kombinasi candesartan furosemid.

j. 11 Hari Rawat Inap

Tabel 22. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 11 hari

Usia	Jenis Kelamin	Penyakit Penyerta	Tekanan Darah. Pre-treatment (mmHg)	Tekanan Darah. Post-treatment (mmHg)	Obat Antihipertensi yang di konsumsi			Biaya Obat			Total Biaya
					obat 1	obat 2	obat 3	obat 1	obat 2	obat 3	
51 th	L	CHF	170/100	130/80	Candesartan 10 tablet	Furosemid 14 tablet	—	Rp96,250	Rp3,920	—	Rp100,170
58 th	P	Dispepsia	170/120	140/90	Candesartan 12 tablet	Furosemid 10 tablet	—	Rp115,500	Rp2,800	—	Rp118,300
54 th	L	Dispepsia	210/110	130/70	Amlodipin 8 tablet	Furosemid 10 tablet	—	Rp20,320	Rp2,800	—	Rp23,120
53 th	P	CHF	170/110	130/80	Amlodipin 10 tablet	Furosemid 12 tablet	—	Rp25,400	Rp3,360	—	Rp28,760
60 th	L	CHF	180/110	130/80	Captopril 18 tablet	Furosemid 12 tablet	—	Rp4,824	Rp3,360	—	Rp8,184
60 th	L	Anemia	220/100	130/90	Captopril 22 tablet	Furosemid 10 tablet	Amlodipin 10 tablet	Rp5,896	Rp2,800	Rp25,400	Rp34,096

Berdasarkan tabel 22. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 11 hari, 6 dari 6 pasien berhasil mencapai target terapi, adapun 6 pasien yang mencapai target terapi, 2 pasien menggunakan kombinasi obat candesartan furosemid, 2 pasien menggunakan kombinasi obat amlodipin furosemid, 1 pasien menggunakan kombinasi obat captopril furosemid, dan 1 pasien menggunakan kombinasi obat captopril furosemid amlodipin, berdasarkan tabel tersebut, obat

yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik adalah kombinasi captopril furosemid.

k. 13 Hari Rawat Inap

Tabel 23. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 13 hari

Usia	Jenis Kelamin	Penyakit Penyerta	Tekanan Darah. Pre-treatment (mmHg)	Tekanan Darah. Post-treatment (mmHg)	Obat Antihipertensi yang di konsumsi		Biaya Obat		Total Biaya
					obat 1	obat 2	obat 1	obat 2	
47 th	L	DM Tipe 2	180/100	140/90	Captopril 24 tablet	Furosemid 16 tablet	Rp6,432	Rp4,480	Rp10,912

Berdasarkan tabel 22. Perhitungan Analisis Efektifitas Biaya Rawat Inap 13 hari, hanya ada 1 pasien pada rawat inap hari 13 namun tidak mencapai target terapi sehingga dapat di katakan obat yang digunakan tidak efektif.

5. Perhitungan Total Biaya Medik Terapi Kombinasi Dua

Tabel 24. Total biaya Medik Terapi Kombinasi Dua Pada Pasien Hipertensi Di Instalasi Rawat Inap RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

No	Terapi	Jumah Pasien	Total Biaya Medik (Rp)	Rata-Rata Biaya Medik (Rp)	Biaya Medik (100 orang) (Rp)
1	Amlodipin Captopril	14	243.260	17.376	1.737.571
2	Candesartan Furosemid	12	885.745	73.812	7.381.208
3	Amlodipin Furosemid	9	180.160	20.018	2.001.778
4	Captopril Furosemid	7	43.076	6.154	615.371
5	Candesartan Amlodipin	1	17.780	17.780	1.778.000
6	Bisoprolol Amlodipin	4	171.368	42.842	4.284.200
7	Furosemid Lisinopril	7	39.467	5.638	563.814
8	Captopril bisoprolol	1	32.624	32.624	3.262.400

Sumber : Data Rekam Medik Pasien Di Instalasi Rawat Inap RSUD I Lagaligo

Berdasarkan tabel 24 total biaya medik di RSUD I Lagaligo untuk penggunaan terapi antihipertensi yang telah dikonversikan 100 orang, diperoleh kombinasi Amlodipin captopril total biaya medik yaitu Rp. 1.737.571, kombinasi

candesartan furosemid Rp. 7.381.208, kombinasi amlodipin furosemid Rp. 2.001.778, kombinasi captopril furosemid Rp. 615.371, kombinasi candesartan amlodipin Rp. 1.778.000, kombinasi bisoprolol amlodipin Rp. 4.284.200, kombinasi furosemid lisinopril Rp. 563.814, kombinasi captopril bisoprolol Rp. 3.262.400.

5. Perhitungan Total Biaya Medik Terapi Kombinasi Tiga

Tabel 25. Total biaya Medik Terapi Kombinasi Dua Pada Pasien Hipertensi Di Instalasi Rawat Inap RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

No	Terapi	Jumah Pasien	Total Biaya Medik (Rp)	Rata-Rata Biaya Medik (Rp)	Biaya Medik (100 orang) (Rp)
1	Captopril Amlodipin Furosemid	3	80.312	26.771	2.677.067
2	Furosemid Captopril Bisoprolol	1	42.320	42.320	4.232.000
3	Amlodipin Furosemid Lisinopril	2	53.367	26.684	2.668.350
4	Lisinopril Bisoprolol Furosemid	1	41.844	41.844	4.184.400
5	Captopril Amlodipin Candesartan	1	108.296	108.296	10.829.600

Berdasarkan tabel 25 total biaya medik di RSUD I Lagaligo untuk penggunaan terapi antihipertensi yang telah dikonversikan 100 orang, diperoleh kombinasi captopril amlodipin furosemid Rp. 2.677.067, kombinasi furosemid captopril bisoprolol Rp. 4.232.000, kombinasi amlodipin furosemid lisinopril Rp. 2.668.350, kombinasi Lisinopril bisoprolol furosemid Rp. 4.184.400, kombinasi captopril amlodipin candesartan Rp. 10.829.600.

6. Analisis Efektivitas Terapi Kombinasi Dua

Tabel 26. Efektivitas *Outcome* Pasien Hipertensi

No	Terapi	Jumah Pasien	Jumlah Pasien Mencapai Target Terapi	Efektivitas (%)
1	Amlodipin Captopril	14	6	43

2	Candesartan Furosemid	12	7	58
3	Amlodipin Furosemid	9	8	89
4	Captopril Furosemid	7	5	71
5	Candesartan Amlodipin	1	1	100
6	Bisoprolol Amlodipin	4	3	75
7	Furosemid Lisinopril	7	4	57
8	Captopril bisoprolol	1	1	100

Sumber : Data Rekam Medik Pasien Di RSUD I Lagaligo (diolah)

Berdasarkan efektivitas terapi pada pasien hipertensi tabel 26 dari jumlah sampel sebanyak 63 pasien menunjukkan bahwa kombinasi Amlodipin Captopril penggunaan pasien dengan terapi tersebut sebanyak 14 pasien dengan jumlah pasien yang mencapai penurunan tekanan darah sesuai target sebanyak 6 pasien dengan efektivitasnya 43%, kombinasi Candesartan Furosemid total pasien sebanyak 12 dengan jumlah pasien sesuai target sebanyak 7 dengan persentase efektivitasnya sebesar 58%, kombinasi Amlodipin Furosemid dengan jumlah pasien yaitu 9 dan yang memenuhi target berjumlah 8 pasien dengan efektivitasnya 89%, kombinasi Captopril Furosemid total pasien 7 dengan mencapai target sebanyak 5 pasien dan efektivitasnya 71%, kombinasi CandesartanAmlodipin total pasien sebanyak 1 dengan pasien mencapai target 1 pasien dan efektivitasnya sebanyak 100%, kombinasi Bisoprolol Amlodipin total pasien 4 dengan mencapai target sebanyak 3 pasien dan efektivitasnya 75%, kombinasi Furosemid Lisinopril total pasien 7 dengan mencapai target 4 pasien dan efektivitasnya 57%, kombinasi Captopril Bisoprolol total penggunaan terapi tersebut 1 pasien dengan mencapai target 1 pasien dan efektivitasnya yaitu 100%.

7. Analisis Efektivitas Terapi Kombinasi Tiga

Tabel 27. Efektivitas Outcome Pasien Hipertensi

No	Terapi	Jumah Pasien	Jumlah Pasien Mencapai Target Terapi	Efektivitas (%)
1	Captopril Amlodipin Furosemid	3	2	67

2	Furosemid Captopril Bisoprolol	1	1	100
3	Amlodipin Furosemid Lisinopril	2	1	50
4	Lisinopril Bisoprolol Furosemid	1	1	100
5	Captopril Amlodipin Candesartan	1	0	0

Berdasarkan efektivitas terapi pada pasien hipertensi tabel 27 dari jumlah sampel sebanyak 63 pasien menunjukkan bahwa kombinasi Captopril Amlodipin Furosemid total pasien 3 mencapai target 2 dan efektivitasnya 67%, kombinasi Amlodipin Furosemid Lisinopril total pasien 2 mencapai target 1 dan efektivitasnya sebanyak 50%, total pasien 1 dengan mencapai target 1 pasien dan efektivitasnya sebanyak 100% untuk kombinasi Furosemid Captopril Bisoprolol dan penggunaan pada kombinasi Lisinopril Bisoprolol Furosemid total pasien 1 dengan mencapai target 1 pasien dan efektivitasnya 100% dan kombinasi Captopril Amlodipin Candesartan total pasien 1 dan tidak ada yang mencapai target dengan efektivitasnya 0%.

8. Perhitungan Nilai ACER Terapi Kombinasi Dua

Tabel 28. Nilai ACER Terapi Kombinasi Dua Antihipertensi

No.	Terapi	Rata-Rata Biaya Medik (Rp)	Efektivitas (%)	Nilai ACER (Rp)
1	Amlodipin Captopril	1.737.571	43	40.409
2	Candesartan Furosemid	7.381.208	58	127.262
3	Amlodipin Furosemid	2.001.778	89	22.492
4	Captopril Furosemid	615.371	71	8.667
5	Candesartan Amlodipin	1.778.000	100	17.780
6	Bisoprolol Amlodipin	4.284.200	75	57.123
7	Furosemid Lisinopril	563.814	57	9.891
8	Captopril bisoprolol	3.262.400	100	32.624

Sumber : Data Rekam Medik Pasien Di RSUD I Lagaligo (diolah)

Berdasarkan tabel 28 untuk regimen terapi antihipertensi berdasarkan nilai ACER kombinasi captopril furosemid sebesar Rp. 8.667, merupakan yang paling *Cost Effective* menurut perhitungan ACER di bandingkan kombinasi yang lain.

9. Perhitungan Nilai ACER Terapi Kombinasi Tiga

Tabel 29. Nilai ACER Terapi Kombinasi Dua Antihipertensi Pada Pasien Hipertensi

No.	Terapi	Rata-Rata Biaya Medik (Rp)	Efektivitas (%)	Nilai ACER (Rp)
1	Captopril Amlodipin Furosemid	2.677.067	67	39.956
2	Furosemid Captopril Bisoprolol	4.232.000	100	42.320
3	Amlodipin Furosemid Lisinopril	2.668.350	50	53.367
4	Lisinopril Bisoprolol Furosemid	4.184.400	100	41.844
5	Captopril Amlodipin Candesartan	10.829.600	0	Tidak efektif

Berdasarkan tabel 29 untuk regimen terapi antihipertensi berdasarkan nilai ACER kombinasi captopril amlodipin furosemid sebesar Rp. 39.956, merupakan yang paling *cost effective* menurut perhitungan ACER di bandingkan dengan kombinasi yang lain.

10. Perhitungan Nilai ICER Terapi Kombinasi 2

Tabel 30. Nilai ICER Terapi Antihipertensi Kombinasi 2 Pada Pasien Hipertensi

No	Terapi	Biaya Medik 100 pasien	Efektifitas	ΔC	ΔE	ICER
1	Captopril Furosemid	615371	71	-1122200	28	-40079
	Amlodipin Captopril	1737571	43			
2	Captopril Furosemid	615371	71	51557	14	3683
	Furosemid Lisinopril	563814	57			
3	Captopril Furosemid	615371	71	-6765837	13	-520449
	Candesartan Furosemid	7381208	58			
4	Captopril Furosemid	615371	71	-3668829	-4	917207
	Bisoprolol Amlodipin	4284200	75			
5	Captopril Furosemid	615371	71	-1386406	-18	77023
	Amlodipin Furosemid	2001778	89			
6	Captopril Furosemid	615371	71	-2647029	-29	91277
	Captopril Bisoprolol	3262400	100			
7	Captopril Furosemid	615371	71	-1162629	-29	40091
	Candesartan Amlodipin	1778000	100			

8	Captopril Furosemid	615371	71	-1122200	28	-40079
	Amlodipin Captopril	1737571	43			

Sumber : Data Rekam Medik Pasien Di RSUD I Lagaligo (diolah)

Berdasarkan tabel 30 untuk perhitungan nilai ICER kombinasi amlodipin captopril di jadikan sebagai pembanding karena merupakan kombinasi yang paling *cost effective* di bandingkan kombinasi yang lain, dan berdasarkan table tersebut kombinasi Candesartan furosemid memiliki nilai ICER yang paling rendah yaitu sebesar – Rp. 520.449, menandakan bahwa kombinasi tersebut akan lebih baik apabila di ganti menjadi kombinasi Captopril Furosemid.

11. Perhitungan Nilai ICER Terapi Kombinasi 3

Tabel 30. Nilai ICER Terapi Antihipertensi Kombinasi 3 Pada Pasien Hipertensi

No	Terapi	Biaya Medik 100 pasien	Efektifitas	ΔC	ΔE	ICER
1	Captopril Amlodipin Furosemid	2677067	67	-1554933	-33	47119
	Furosemid Captopril Bisoprolol	4232000	100			
2	Captopril Amlodipin Furosemid	2677067	67	8717	17	513
	Amlodipin Furosemid Lisinopril	2668350	50			
3	Captopril Amlodipin Furosemid	2677067	67	-1507333	-33	45677
	Lisinopril Bisoprolol Furosemid	4184400	100			

Berdasarkan tabel 33. Untuk perhitungan nilai ICER kombinasi captopril amlodipin furosemid di jadikan sebagai pembanding karena merupakan kombinasi yang paling *cost effective* di bandingkan kombinasi yang lain, dan berdasarkan table tersebut kombinasi amlodipin furosemid Lisinopril memiliki nilai ICER yang paling rendah yaitu sebesar Rp. 513, menandakan bahwa kombinasi tersebut akan lebih baik apabila di ganti menjadi kombinasi captopril amlodipin furosemid

B. Pembahasan

Analisis farmakoekonomi adalah bentuk cara yang komprehensif dalam menentukan pengaruh ekonomi dari alternatif suatu terapi obat ataupun intervensi kesehatan lainnya. Farmakoekonomi digunakan untuk menilai apakah tambahan keuntungan dari intervensi atau *outcome* berimbang dengan biaya tambahan dari intervensi tersebut (Andayani,2013). Farmakoekonomi mempertimbangkan dua sisi yaitu biaya (*cost*) dan hasil pengobatan (*outcome*). Dalam hal ini farmakoekonomi spesifiknya yaitu mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya atau penggunaan dari sumber daya dengan risiko (klinik, ekonomik, humanistik) yang berasal dari produk dan pelayanan farmasi. Sehingga farmakoekonomi sebagai pertimbangan suatu biaya yang dibutuhkan dalam memperoleh produk atau pelayanan farmasi jika dibandingkan dengan konsekuensi (*outcome*) yang didapatkan dalam menetapkan alternatif yang menghasilkan keluaran optimal per rupiah yang dikeluarkan. Dalam hal ini, digunakan sebagai pengambil keputusan klinik jika memilih pilihan terapi yang paling *cost-effective*. Adanya variasi harga obat antihipertensi merupakan faktor penting dalam mengambil kebijakan untuk menetapkan terapi pada pasien hipertensi. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu penelitian mengenai efektivitas penggunaan obat antihipertensi dilihat dari biaya yang dikeluarkan.

Metode analisis dalam kajian farmakoekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Efektivitas Biaya (AEB) penggunaan Antihipertensi pada pasien hipertensi di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. Telah terpenuhi jumlah sampel yang akan dianalisis sebanyak 63 sampel.

Pengambilan data pasien hipertensi di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur menggunakan lembar pengumpulan data berupa rekam medik. Data yang diambil diantaranya pasien, terapi antihipertensi dan biaya langsung yang

berhubungan dengan pasien. Sehingga diperoleh data pasien usia 18-60 tahun dengan menggunakan terapi kombinasi antihipertensi.

Hasil penelitian yang diperoleh pada tabel 6 pasien berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa dari 63 pasien telah dilakukan proses pengambilan data berdasarkan jenis kelamin, pasien hipertensi yang paling banyak adalah berjenis kelamin laki-laki dibandingkan pasien yang berjenis kelamin perempuan. Pasien berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40 pasien (63,5%) dan pasien berjenis kelamin perempuan sebanyak 23 pasien (36,5%). Pada umumnya lebih banyak pria penderita hipertensi dibandingkan dengan perempuan, stress terjadi yang berkepanjangan adalah hal yang paling umum serta membuat orang kurang berolahraga, dan berusaha mengatasi stressnya dengan merokok, meminum alkohol dan kopi, padahal semuanya termasuk dalam daftar penyebab yang meningkatkan risiko hipertensi. Pria yang mengalami pekerjaan penuh tekanan misalnya, menyanggah jabatan yang menuntut tanggung jawab besar tanpa disertai wewenang pengambilan keputusan akan mengalami tekanan darah yang lebih tinggi selama jam kerjanya, dibandingkan dengan rekannya yang jabatannya lebih “longgar” tanggung jawabnya. Stress yang terlalu besar dapat memicu terjadinya berbagai penyakit misalnya, sakit kepala, sulit tidur, tukak lambung, hipertensi, penyakit jantung, dan stroke (Handayani, 2009).

Hasil penelitian yang diperoleh pada tabel 7 pasien berdasarkan usia menunjukkan bahwa pasien yang berusia 18, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 50, 55 tahun masing-masing terdapat 1 pasien. Usia 34, 42, 47, 48 tahun masing-masing terdapat 2 pasien. Usia 45, 57, 58 tahun masing-masing terdapat 3 pasien. Usia 51, 54, 56 tahun masing-masing terdapat 5 pasien, sedangkan pasien yang berusia 60 tahun memiliki 11 pasien. Penyebaran hipertensi berdasarkan golongan umur terdapat kesepakatan dari para peneliti. Disimpulkan bahwa prevalensi

hipertensi akan meningkat dengan bertambahnya usia. Sebagai gambaran, salah satu penelitian tentang penyebaran menurut umur dapat dilihat pada tabel:

1. 20-29 yaitu 6,10
2. 30-39 yaitu 6,70
3. 40-49 yaitu 10,10
4. 50-59 yaitu 10,20
5. Diatas 60 yaitu 13,00

Seluruh umur 8,60

Prevalensi meningkat menurut usia. Sejalan dengan bertambahnya usia, hampir setiap orang mengalami kenaikan tekanan darah, tekanan sistolik terus meningkatkan sampai usia 80 tahun dan tekanan distolik terus meningkat sampai usia 55-60 tahun, kemudian berkurang secara perlahan atau bahkan menurun drastis (Handayani, 2009).

Berdasarkan tabel 8 pasien hipertensi berdasarkan klasifikasi hipertensi. Pembagian klasifikasi ini dibagi berdasarkan JNC 8 Tahun 2014 klasifikasi hipertensi yaitu normal $<120/<80$ mmHg, prehipertensi $120-139/80-89$ mmHg, Hipertensi stage 1 $140-159/90-99$ mmHg, dan Hipertensi stage 2 $\geq 160/\geq 100$ mmHg. Pada hasil penelitian tabel 8 yang diperoleh dari data pasien berdasarkan klasifikasi hipertensi prehipertensi sebanyak 2 pasien (3,2%), hipertensi *stage* 1 sebanyak 12 pasien (19,0%), dan hipertensi *stage* 2 sebanyak 49 pasien (77,8%) sehingga data yang diperoleh dari klasifikasi hipertensi yng tertinggi adalah hipertensi *stage* 2. Pada JNC 8 penggunaan obat antihipertensi tunggal diberikan kepada pasien hipertensi *stage* 1. Sedangkan umumnya pada terapi kombinasi antihipertensi diberikan kepada pasien hipertensi *stage* 2 yang memiliki tekanan darah jauh dari target nilai tekanan darah seharusnya.

Berdasarkan tabel 9 rawat inap dari data yang diperoleh yaitu pasien terbanyak yang lama rawat inap dirumah sakit berjumlah 17 pasien dengan rawat inap selama 4 hari, semua pasien rawat inap menjalani perawatan di ruang perawatan kelas III BPJS sesuai dengan prosedur rumah sakit.

Pasien berdasarkan tabel 10 penyakit penyerta seperti penyakit kardiovaskular lainnya ataupun penyakit komplikasi yang berpotensi memperburuk kerusakan organ. Dari data penelitian tabel 10 pasien berdasarkan penyakit penyerta diperoleh bahwa CHF memiliki jumlah paling banyak yaitu 20 pasien, diikuti dengan penderita Diabetes Mellitus. Hubungan antara tekanan darah dengan kerusakan pada sistem kardiovaskular sangat berkelanjutan dan menjadi faktor risiko. Hipertensi terjadi dalam jangka waktu yang lama dan tidak terkontrol sehingga menyebabkan adanya kerusakan pada organ lain dan membentuk komplikasi. Apabila terjadi komplikasi maka kualitas hidup menjadi berkurang dan bisa mengakibatkan kematian.

Berdasarkan literatur menurut JNC 8 (James et al., 2014) bahwa usia pasien <60 tahun dengan target tekanan darah mencapai <140/90 mmHg terapi yang diberikan yaitu golongan diuretik, ACEI, ARB, CCB, ataupun terapi kombinasi dengan golongan kelas lain. Terapi kombinasi dianggap sangat penting dan efektif dalam pengobatan terapi untuk pasien hipertensi, karena dengan memiliki dosis yang masing-masing rendah akan memberikan efek samping yang berkurang dan dapat menurunkan tekanan darah yang lebih besar. Dalam penelitian ini berdasarkan tabel 11 regimen golongan jenis terapi antihipertensi yang paling banyak diberikan adalah diperoleh golongan kombinasi CCB ACEI dengan jenis obatnya yaitu kombinasi Amlodipin Captopril. Penggunaan CCB dan ACEI memberikan pengontrolan tekanan darah yang efektif karena menggunakan dua mekanisme kerja yang berbeda dan saling melengkapi.

Penggunaan CCB berfungsi untuk memberikan penurunan tekanan darah melalui vasodilatasi perifer dan mengaktifkan *Sympathetic Nervous System* (SNS) melalui peningkatan aktivitas renin dan produksi angiotensin II. ACEI telah terbukti aman dan efektif dalam menurunkan tekanan darah dan dapat diserap dengan cepat karena memiliki bioavailabilitas sekitar 70% (Ahadiyah et al., 2020).

Pada penelitian ini hanya menggunakan data biaya medik langsung yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pasien terkait berupa biaya obat hipertensi dari pasien hipertensi. Pada biaya medik langsung untuk setiap obat yang diberikan harga satuannya berbeda-beda. Data harga obat didapatkan dari apotek dimana pada pasien hipertensi harga obatnya berdasarkan BPJS Kesehatan. Biaya medik merupakan hasil dari penjumlahan dari total biaya terapi penggunaan obat yang digunakan untuk pasien hipertensi selama menjalankan rawat inap di RSUD I Lagaligo. Pada tabel 24 perhitungan untuk biaya medik kombinasi dua yang digunakan untuk berbagai jenis terapi antihipertensi. Sehingga yang dihitung hanya biaya obat saja. Dalam hasil penelitian di RSUD I Lagaligo kabupaten Luwu Timur diperoleh biaya medik kombinasi dua dengan jumlah biaya terbanyak yang dikonversikan ke dalam 100 orang yaitu terapi kombinasi candesartan furosemid sebesar Rp. 7.381.208 dan yang terendah yaitu terapi kombinasi furosemid lisinopril dengan total biaya medik Rp. 563.814. sedangkan pada tabel 29 biaya medik kombinasi 3 dengan jumlah biaya terbanyak yang dikonversikan ke dalam 100 pasien yaitu kombinasi captopril amlodipin dan candesartan dengan jumlah Rp. 10.829.000 dan terendah yaitu kombinasi amlodipin furosemid dan lisinopril Rp. 2.668.350. Ditemukan perbedaan dari masing-masing biaya di karenakan lamanya rawat inap pasien dirumah sakit. Apabila pasien semakin lama dirawat, maka obat yang dikonsumsi dan biaya yang dikeluarkan juga semakin meningkat.

Berdasarkan efektivitas terapi pada tabel 26 dan 27 menggunakan data pasien berasal dari data sekunder atau data rekam medik. Keberhasilan suatu terapi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, tidak hanya jenis terapi yang digunakan, diantaranya adalah kepatuhan dari penggunaan obat dalam hal ini kerasionalan suatu penggunaan obat. Untuk diketahui efektivitas dari suatu penggunaan terapi hipertensi dapat diketahui berdasarkan penurunan tekanan darah sistolik/diastol. Pada JNC 2014 untuk penderita hipertensi dengan usia <60 tahun tanpa penyakit diabetes dan CKD target tekanan darah yaitu <140/<90 mmHg dan untuk usia <60 tahun dengan penderita diabetes tanpa CKD dan penderita CKD dengan atau tanpa diabetes target tekanan darah yang dibutuhkan mencapai <140/<90 mmHg. Dari data hasil penelitian pada tabel 26 dan 27 menunjukkan bahwa alternatif terapi paling efektif yaitu kombinasi Candesartan Amlodipin, kombinasi Captopril Bisoprolol, kombinasi Furosemid Captopril Bisoprolol, dan kombinasi Lisinopril Bisoprolol Furosemid dengan efektivitasnya 100%. Sedangkan untuk alternatif terapi kurang efektif adalah kombinasi Captopril Amlodipin Candesartan dengan efektivitas 0%.

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan nilai ACER untuk regimen terapi antihipertensi kombinasi dua pada tabel 28 yaitu amlodipin dan captopril memiliki nilai ACER Rp. 40.409, kombinasi candesartan dan furosemid nilai ACER yaitu Rp. 127.262, kombinasi amlodipin dan furosemid nilai ACER sebesar Rp. 22.492, kombinasi captopril dan furosemid nilai ACER yaitu Rp. 8.667, kombinasi candesartan dan amlodipin memiliki nilai ACER sebesar Rp. 17.780, kombinasi bisoprolol dan amlodipin memiliki nilai ACER yaitu Rp. 57.123, kombinasi furosemid dan lisinopril memiliki nilai ACER sebesar Rp. 9.891, kombinasi captopril dan bisoprolol Rp. 32.624, sedangkan pada tabel 29 untuk nilai ACER terapi kombinasi 3 yaitu kombinasi captopril, amlodipin, dan furosemid memiliki

nilai ACER sebesar Rp. 39.956, kombinasi furosemid, captopril, dan bisoprolol memiliki nilai ACER sebesar Rp. 42.320, kombinasi amlodipin, furosemid, dan lisinopril memiliki nilai ACER sebesar Rp. 53.367, kombinasi lisinopril, bisoprolol, dan furosemid memiliki nilai ACER Rp. 41.844, dan kombinasi captopril, amlodipin, dan candesartan nilai ACER tidak efektif dengan efektivitas 0%.

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan nilai ICER untuk regimen terapi antihipertensi kombinasi dua pada tabel 30 yaitu kombinasi amlodipin captopril dibandingkan dengan kombinasi captopril furosemid memiliki nilai ICER –Rp 1122200, kombinasi furosemid lisinopril dibandingkan dengan kombinasi captopril furosemid memiliki nilai ICER Rp. 3683, kombinasi candesartan furosemid dibandingkan dengan kombinasi captopril furosemid nilai ICER –Rp. 520449, kombinasi bisoprolol amlodipin dibandingkan dengan kombinasi captopril furosemid memiliki nilai ICER Rp. 917207, kombinasi amlodipin dan furosemid dibandingkan dengan kombinasi captopril furosemid nilai ICER Rp. 77023, kombinasi captopril bisoprolol dibandingkan dengan captopril dan furosemid nilai ICER yaitu Rp. 91277, kombinasi candesartan amlodipin dibandingkan dengan captopril furosemid memiliki nilai ICER Rp. 40091, kombinasi amlodipin captopril dibandingkan dengan kombinasi captopril dan furosemid nilai ICER yaitu –Rp. 40079, sedangkan pada tabel 31 Nilai ICER terapi kombinasi 3 yaitu kombinasi furosemid, captopril dan bisoprolol dibandingkan dengan kombinasi captopril, amlodipin, dan furosemid memiliki nilai ICER Rp. 47119 kombinasi amlodipin, furosemid, dan lisinopril dibandingkan dengan captopril, amlodipin dan furosemid nilai ICER Rp. 531, kombinasi lisinopril, bisoprolol, dan furosemid dibandingkan dengan kombinasi captopril, amlodipin dan furosemid yaitu nilai ICER Rp. 45677.

Pada nilai ACER didapatkan melalui perhitungan biaya medik dibagi dengan *outcome* klinik. Berdasarkan tabel 30 nilai ACER kombinasi dua diperoleh untuk tiap alternatif terapi yang paling *cost-effective* yaitu kombinasi captopril dan furosemid dengan nilai ACER yaitu Rp. 8.667 per persentase *outcome* (efektivitas), sedangkan untuk nilai ACER kombinasi tiga diperoleh alternatif yang paling *cost-effective* yaitu kombinasi captopril amlodipin furosemid sebesar Rp. 39.956 dengan memberikan penjelasan terkait biaya yang dikeluarkan dalam sebuah pengobatan mencapai hasil yang efektif dengan mencapai target dan harga yang lebih murah (Andayani, 2013).

ICER (*Incremental Cost Effectiveness Ratio*) adalah perbandingan perbedaan biaya dengan perbedaan nilai *outcome*. Apabila nilai ICER bernilai negatif, maka terapi pengobatan lebih efektif dan murah. ICER digunakan untuk menjelaskan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan terapi pengobatan (Andayani, 2013). Berdasarkan tabel 32 untuk perhitungan nilai ICER kombinasi amlodipin captopril di jadikan sebagai pembanding karena merupakan kombinasi yang paling *cost effective* di bandingkan kombinasi yang lain, dan berdasarkan tabel 32 tersebut kombinasi Candesartan furosemid memiliki nilai ICER yang paling rendah yaitu sebesar – Rp. 520.449, menandakan bahwa kombinasi tersebut akan lebih baik apabila di ganti menjadi kombinasi Captopril Furosemid.

Berdasarkan tabel 31. Untuk perhitungan nilai ICER kombinasi captopril amlodipin furosemid di jadikan sebagai pembanding karena merupakan kombinasi yang paling *cost effective* di bandingkan kombinasi yang lain, dan berdasarkan table tersebut kombinasi amlodipin furosemid Lisinopril memiliki nilai ICER yang paling rendah yaitu sebesar Rp. 513, menandakan bahwa kombinasi tersebut akan lebih baik apabila di ganti menjadi kombinasi captopril amlodipin furosemid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan:

1. Penggunaan obat yang memiliki efektivitas tertinggi adalah kombinasi captopril dengan bisoprolol, kombinasi candesartan dengan amlodipin, kombinasi lisinopril dengan bisoprolol dan furosemid, furosemid dengan captopril dan bisoprolol yang masing-masing memiliki efektivitas (outcome) 100%.
2. Penggunaan obat yang paling *cost-effective* adalah kombinasi dua captopril furosemid sebesar Rp. 8.667 dan kombinasi tiga yaitu captopril, amlodipin, furosemid sebesar Rp. 39.956, sedangkan nilai ICER yang paling *cost-effective* pada kombinasi dua yaitu candesartan furosemid dibandingkan dengan captopril furosemid yaitu sebesar -Rp. 520449 dan kombinasi tiga yaitu kombinasi amlodipin, furosemid, lisinopril dibandingkan dengan captopril amlodipin furosemid sebesar Rp. 513.

B. Saran

Diharapkan untuk pihak rumah sakit pemberian terapi antihipertensi diberikan sesuai dengan guideline demi tercapainya biaya dan efektivitas terapi yang efektif serta efisien bagi pasien dan untuk pengadaan obat antihipertensi selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan dalam menentukan obat apa yang paling *cost effectiveness* agar dapat membantu pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadiah, N., Handayani, N., & Suhardiana, E. Evaluasi Kesesuaian Obat Dan Dosis Antihipertensi Di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit “X” Kota Tasikmalaya. *Media Informasi*, 15(2), 129–137. 2020.
- Andayani, T. M. *Farmakoekonomi Prinsip Dan Metodologi*. 2013.
- Aryzki, S., Aisyah, N., Hutami, H., & Wahyusari, B. Evaluasi Rasionalitas Pengobatan Hipertensi Di Puskesmas Pelambuan Banjar Masin Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mauntung*, 4(2), 119. 2018.
- Brunton, L. L., Dandan, R. H., & Knollmann, B. C. Goodman & Gillman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th Edition. In *The Routledge Companion to Aesthetics*. 2018.
- Chiburdanidze, A., & Yulianti, T. Ketepatan Pemilihan Obat Antihipertensi Pada Pasien Hipertensi Rawat Jalan di Surakarta. *URECOL (University Research Colloquium)*, 663–668. 2018.
- Dipiro. *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Third Edition*. In McGraw-Hill Company. 2016.
- Handayani, G. N. *Farmakologi*. Cakrawala Yogyakarta. 2009.
- Handayani, G. N., dan Misbahuddin. *Farmakologi II*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2010.
- Handayani, G. N. *Farmakologi Toksikologi "HIPERTENSI"*. Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- James, P. A., Oparil, S., Carter, B. L., Cushman, W. C., Dennison-Himmelfarb, C., Handler, J., Lackland, D. T., LeFevre, M. L., MacKenzie, T. D., Ogedegbe, O., Smith, S. C., Svetkey, L. P., Taler, S. J., Townsend, R. R., Wright, J. T., Narva, A. S., & Ortiz, E. 2014 Evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: Report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 311(5), 507–520. 2014.
- Kemkes.RI. Pusdatin Hipertensi. *Infodatin, Hipertensi*, 1–7. 2019.
- Kemkes, R. Profil Kesehatan Indonesia 2016. In *Profil Kesehatan Provinsi Bali*. Profil-Kesehatan-Indonesia-2016.
- Kemkes RI. *Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi*. 2013.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. 2015


- Laloan, M. M. C., Tiwow, G. A. R., Palandi, R. R., & Tumbel, S. L. Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antihipertensi Kombinasi Amlodipin-Bisoprolol Dibandingkan Kombinasi Amlodipin-Captopril Pada Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. *Jurnal Biofarmasetikal Tropis*, 2(2), 85–89. 2019.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. 2020.
- Shihab, Q. M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 5*. Lentera Hati. 2005.
- Siswanto, Susila, & Suyanto. *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran*. 2017.
- SJ, M., & Papadakis, M. Current Medical Diagnosis & Treatment—1980. In *McGraw-Hill Medical*. 2019.
- Skarayadi, O., Sutarna, T. H., & Ambarsundari, A. Efektivitas Biaya Terapi Antihipertensi Pada Pasien Rawat Jalan Di Upt Puskesmas Puter. *Kartika Jurnal Ilmiah Farmasi*, 5(1), 21–23. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 2015.
- Tandililing, S., Mukaddas, A., & Faustine, I. Profil Penggunaan Obat Pasien Hipertensi Esensial Di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur Periode Januari-Desember Tahun 2014. *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 3(1), 49–56. 2017.
- Tjay, T. H., & Kirana Rahardja. *Obat-Obat Penting Edisi 7: Khasiat, Penggunaan dan Efek Sampingnya*. PT. Elex Media Komputindo. 2015.
- Tjay, T. H., & Rahardja, K. *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya*. PT Elex Media. 2015
- Untari, E. K., Agilina, A. R., Susanti, R., Studi, P., Fakultas, F., Universitas, K., & Pontiana, T. Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Obat Antihipertensi di Puskesmas Siantan Hilir Kota Pontianak Tahun 2015. *Pharmaceutical Sciences and Research*, 5(1), 32–39. 2018.
- Wijayanti, N. W., Mukaddas, A., & Tandah, M. R. Analisis Efektifitas Biaya Pengobatan Kombinasi Amlodipin Furosemid Dibandingkan dengan Kombinasi Amlodipin Bisoprolol pada Pasien Hipertensi Rawat Jalan di Rsud Undata Palu Periode Agustus-Oktober Tahun 2014. *Online Jurnal of Natural Science*, 5(1), 101–110. 2016.

Zulfah, M. Analisis Efektivitas Biaya Kombinasi Obat Antihipertensi Pada Pasien Rawat Inap Di RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya. *Journal of Pharmacopolium*, 2(1), 53–62. 2019.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 1. Skema Penelitian



Lampiran 2. Surat Pengambilan Data Awal


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus 1 - Jalan Haji Agus Salim, Alauddin Makassar
 Kampus 2 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 3 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 4 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 5 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 6 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 7 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 8 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 9 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 10 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 11 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 12 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 13 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 14 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 15 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 16 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 17 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 18 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 19 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar
 Kampus 20 - Jalan H.M. Yasin Jempang, Alauddin Makassar

Nomor : B-804/Un.06-FKIK/PP.00.9/02/2021 Gowa, 23 Februari 2021
 Lamp : -
 Hal : **Permohonan Izin Survey Penelitian**


Kepada Yth,
 Direktur RSUD I Laga Ligo Kec. Wotu
 Kab. Luwu Timur
 Di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wb, Wb,
 Sehubungan dengan penyusunan Proposal Penelitian mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :


Nama : **Afrandi**
 NIM : 70100117047
 Jurusan : Farmasi
 Judul : Analisis Efektifitas Biaya Obat ACEI dan ARB Terhadap Pasien Hipertensi Rawat Jalan di RSUD I Laga Ligo Kabupaten Luwu Timur.
 Data : Data Pasien Pengidap Penyakit Hipertensi.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut dapat diberi izin untuk izin observasi penyelesaian proposal penelitian.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

 Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
Gemy Nasihy Handayani

Tembusan:
 - Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)


 Ditulis dengan CamScanner

Lampiran 3. Kode Etik Penelitian



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No : A.066/KEPK/FKIK/VIII/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Afrizaldi
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Analisis efektivitas biaya kombinasi obat antihipertensi terhadap pasien hipertensi di instalasi rawat inap RSUD I Lagaligo kabupaten luwu timur"

"Analysis of the cost-effectiveness of the combination of antihypertensive drugs for hypertensive patients in the inpatient installation of RSUD I Lagaligo, East Luwu Regency"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bebas Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Value, 2) Scientific Value, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risk, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laid Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

This declaration of ethics applies during the period August 30, 2021 until August 30, 2022

August 30, 2021
 Professor and Chairperson.

 DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**

Jalan. Sangkuruwira Nomor.1 Wolu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan (52571).
Telepon: (0473) 2321281, Website: rsudlagaligo.luwutimurkab.go.id
Email: rsudlagaligo@gmail.com

Nomor : 070/3033/RSUD-ILG
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. **KASUBAG. KEUANGAN
KARU. REKAM MEDIS
KEPALA IFRS**
di-
Tempat

Berdasarkan surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, No.255/DPMPPTSP/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 Perihal Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : AFRIANDI
NIM : 70100117047
Program Studi : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan / Farmasi
Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR

Bermaksud untuk melakukan penelitian di Ruang Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul :

"ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA KOMBINASI OBAT ANTI HIPERTENSI TERHADAP PASIEN HIPERTENSI DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR" yang akan dilaksanakan dari Tanggal 13 September – 13 Oktober 2021.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 Wolu, 14 September 2021
 Kabid Pengembangan SOM & RM
Hajar Ndr, S.S., Apt., M.Kes
 Pangkal - Rembind Tk.1
 Nip : 19790301 200502 2 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur RSUD I Lagaligo (Sebagai Laporan) di Wolu ;
2. Arsip

Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**

Jalan. Dangkunawita Nomor.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan (52071),
Telepon. (0473) 2321281, Website. rsulagaligo.luwutimorkab.go.id
Email. rsulagaligo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 498 / 3176 /RSUD-I Lagaligo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hajar Nur, S.Si,Apt
NIP : 19790301 200502 2 007
Pangkat/Gol.Ruangan : Pembina / IV.a
Jabatan : Kabid. Pengembangan SDM & RM

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Ahsani
NIM : 70100117047
Studi : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan / Farmasi
Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Berdasarkan surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, No : No.256/DPMP/TSP/00/2021 Tanggal 13 September 2021, perihal Izin Penelitian sebagai syarat penyusunan Skripsi, maka kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut diatas, benar telah melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA KOMBINASI OBAT ANTI HIPERTENSI TERHADAP PASIEN HIPERTENSI DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR"** sejak tanggal 13 September – 13 Oktober 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wotu, 04 Oktober 2021
Kabid. Pengembangan SDM & RM

Hajar Nur, S.Si,Apt,M.Kes
Pangkat : Pembina/IV.a
Nip : 19790301 200502 2 007

Terseluran, Rasio, 10)

1. Kabid Pelayanan Medik & Keperawatan
2. Atsio

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6. Analisis Univariat

Jenis_kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	perempuan	23	36.5	36.5	36.5
	laki-laki	40	63.5	63.5	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-45	16	25.4	25.4	25.4
	46-60	47	74.6	74.6	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Klasifikasi hipertensi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	prehipertensi	2	3.2	3.2	3.2
	hipertensi 1	12	19.0	19.0	22.2
	hipertensi 2	49	77.8	77.8	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Lama_inap

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	17	27.0	27.0	27.0
	5	4	6.3	6.3	33.3
	7	4	6.3	6.3	39.7
	10	2	3.2	3.2	42.9
	2	5	7.9	7.9	50.8
	3	8	12.7	12.7	63.5
	8	3	4.8	4.8	68.3
	9	3	4.8	4.8	73.0
	10	1	1.6	1.6	74.6
	6	10	15.9	15.9	90.5
	11	5	7.9	7.9	98.4
	13	1	1.6	1.6	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Penyakit penyerta

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	DBD	1	1.6	1.6	1.6
	Abdominal Pain	3	4.8	4.8	6.3
	Vertigo	3	4.8	4.8	11.1
	CHF	20	31.7	31.7	42.9
	AbsesHepar	1	1.6	1.6	44.4
	CKD	1	1.6	1.6	46.0
	Pneumonia	1	1.6	1.6	47.6
	Unstable Angina	1	1.6	1.6	49.2
	PPOK	2	3.2	3.2	52.4
	Hematemesis	1	1.6	1.6	54.0
	TBC	3	4.8	4.8	58.7
	Dipsnea	1	1.6	1.6	60.3
	Anemia	2	3.2	3.2	63.5
	Endocardia	1	1.6	1.6	65.1
	DM tipe 1	1	1.6	1.6	66.7
	Udem	1	1.6	1.6	68.3
	Dispepsia	7	11.1	11.1	79.4
	DM Tipe 2	8	12.7	12.7	92.1
	Apendictisakut	1	1.6	1.6	93.7
	Tanpapenyakitpenyerta	3	4.8	4.8	98.4
Abses mandibula	1	1.6	1.6	100.0	
Total	63	100.0	100.0		

Golongan_obat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ACEICCB	14	22.2	22.2	22.2
	ACEICCBARB	1	1.6	1.6	23.8
	DiuretikCCB	12	19.0	19.0	42.9
	DiuretikACEI	12	19.0	19.0	61.9
	ARBCCB	2	3.2	3.2	65.1
	DiuretikARB	10	15.9	15.9	81.0
	Beta BlokerCCB	4	6.3	6.3	87.3
	ACEICCBdiuretik	5	7.9	7.9	95.2

	ACEI Beta Bloker Diuretik	2	3.2	3.2	98.4
	Beta Bloker ACEI	1	1.6	1.6	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Jenis obat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Amlodipin captopril	14	22.2	22.2	22.2
	amlodipin furosemid lisinopril	2	3.2	3.2	25.4
	captopril bisoprolol	1	1.6	1.6	27.0
	lisinopril bisoprolol furosemid	1	1.6	1.6	28.6
	captopril amlodipin candesartan	1	1.6	1.6	30.2
	candesartan furosemid	12	19.0	19.0	49.2
	amlodipin furosemid	9	14.3	14.3	63.5
	captopril furosemid	7	11.1	11.1	74.6
	candesartan amlodipin	1	1.6	1.6	76.2
	bisoprolol amlodipin	4	6.3	6.3	82.5
	furosemid lisinopril	7	11.1	11.1	93.7
	captopril amlodipin furosemid	3	4.8	4.8	98.4
	furosemid captopril bisoprolol	1	1.6	1.6	100.0
Total	63	100.0	100.0		

ALAUDDIN
MAKASSAR

7. Lampiran Data Pasien Hipertensi Di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

No	Usia	Jenis Kelamin	Diagnosa	penyakit penyerta	Tekanan Darah pre-treatment (mmHg)	Tekanan Darah post treatment (mmHg)	Obat HT	Biaya Obat		Total
1	60 th	P	hipertensi 2	Dengue fever	170/90	150/90	amlodipin captopril	Rp17,780.00	Rp13,400.00	Rp31,180.00
2	59 th	L	hipertensi 2	TB paru	180/100	160/80	candesartan furosemid	Rp67,375.00	Rp1,960.00	Rp69,335.00
3	56 th	L	hipertensi 1	DM tipe 1	140/80	140/80	amlodipin furosemid	Rp15,204.00	Rp1,680.00	Rp16,884.00
4	51 th	L	prehipertensi	udem	130/90	100/80	captopril furosemid	Rp1,876.00	Rp1,960.00	Rp3,836.00
5	60 th	L	hipertensi 2	dispepsia	190/110	130/90	candesartan amlodipin	Rp82,500.00	Rp17,780.00	Rp100,280.00
6	48 th	L	hipertensi 2	TB paru	180/100	150/90	furosemid candesartan	Rp1,400.00	Rp48,125.00	Rp49,525.00
7	53 th	L	hipertensi 1	DM tipe 2	1530100	120/80	furosemid amlodipin	Rp1,400.00	Rp12,700.00	Rp14,100.00
8	57 th	P	prehipertensi	apendictis akut	140/80	100/70	bisoprolol amlodipin	Rp57,744.00	Rp20,320.00	Rp78,064.00
9	34 th	P	hipertensi 2	HT essensial	180/100	160/90	captopril amlodipin	Rp1,340.00	Rp15,240.00	Rp16,580.00
10	59 th	L	hipertensi 2	HT essensial	190/80	150/90	captopril amlodipin	Rp804.00	Rp5,080.00	Rp17,384.00
11	45 th	P	hipertensi 2	DM tipe 2	180/90	130/80	amlodipin furosemid	Rp17,780.00	Rp4,760.00	Rp22,540.00
12	60 th	L	hipertensi 2	abses mandibula	180/90	130/70	amlodipin furosemid	Rp15,240.00	Rp2,240.00	Rp17,480.00
13	56 th	L	hipertensi 1	DM Tipe 2	150/100	120/70	amlodipin furosemid	Rp20,320.00	Rp1,400.00	Rp21,720.00
14	58 th	P	hipertensi 2	abominal pain	190/110	120/80	amlodipin bisoprolol	Rp15,240.00	Rp19,248.00	Rp34,488.00
15	45 th	L	hipertensi 2	abdominal pain	200/100	150/90	captopril amlodipin	Rp2,680.00	Rp5,080.00	Rp7,760.00
16	42 th	L	hipertensi 2	Vertigo	170/100	110/80	captopril amlodipin	Rp2,144.00	Rp17,780.00	Rp19,924.00
17	44 th	L	hipertensi 2	abdominal pain	170/100	170/90	captopril amlodipin	Rp2,144.00	Rp7,620.00	Rp9,764.00
18	56 th	L	hipertensi 2	CHF	180/100	130/90	furosemid amlodipin	Rp2,800.00	Rp17,780.00	Rp20,580.00
19	51 th	P	hipertensi 2	abses hepar	170/90	130/90	captopril amlodipin	Rp53,600.00	Rp20.320.00	Rp53,620.32

20	54 th	P	hipertensi 2	CHF	170/100	135/85	candesartan furosemid	Rp48,125.00	Rp3,350.00		Rp51,485.00
21	60 th	P	hipertensi 2	CHF	200/110	150/90	candesartan furosemid	Rp48,125.00	Rp560		Rp48,685.00
22	45 th	L	hipertensi 2	dispepsia	180/100	150/100	captopril amlodipin	Rp3,216.00	Rp17,780.00		Rp20,996.00
23	38 th	P	hipertensi 1	CKD	150/90	130/70	furosemid amlodipin	Rp1,960.00	Rp12,700.00		Rp14,660.00
24	49 th	P	hipertensi 2	pneumonia	160/110	150/90	furosemid lisinopril	Rp2,800.00	Rp2,919.00		Rp5,719.00
25	54 th	L	hipertensi 2	dispepsia	210/110	130/70	amlodipin furosemid	Rp20,320.00	Rp2,800.00		Rp23,120.00
26	39 th	L	hipertensi 1	DM tipe 2	150/90	140/90	furosemid candesartan	Rp3,360.00	Rp67,375.00		Rp70,735.00
27	56 th	L	hipertensi 2	Unstable angina	165/100	145/90	captopril amlodipin furosemid	Rp2,680.00	Rp1,400.00	Rp17,780.00	Rp21,860.00
28	55 th	L	hipertensi 2	CHF	160/100	130/90	furosemid captopril bisoprolol	Rp560	Rp2,144.00	Rp19,248.00	Rp21,952.00
29	34 th	L	hipertensi 2	ppok	160/90	140/90	furosemid captopril	Rp1,960.00	Rp4,824.00		Rp6,784.00
30	57 th	L	hipertensi 1	Dispepsia	160/90	130/80	amlodipin captopril	Rp10,160.00	Rp1,876.00		Rp12,036.00
31	47 th	L	hipertensi 1	Dm tipe 2	160/90	130/80	amlodipin captopril	Rp12,700.00	Rp2,680.00		Rp15,380.00
32	58 th	P	hipertensi 2	Dispepsia	170/120	140/90	furosemid candesartan	Rp2,800.00	Rp115,500.00		Rp118,300.00
33	60 th	P	hipertensi 2	DM Tipe 2	160/100	140/90	captopril amlodipin	Rp2,680.00	Rp17,780.00		Rp20,460.00
34	60 th	P	hipertensi 2	dyspepsia	170/90	130/90	furosemid captopril	Rp3,360.00	Rp4,288.00		Rp7,648.00
35	59 th	L	hipertensi 1	Hematemesis	160/90	140/90	amlodipin furosemid lisinopril	Rp10,160.00	Rp1,680.00	Rp1,668.00	Rp13,508.00
36	32 th	L	hipertensi 2	chf	160/100	140/90	furosemid lisinopril	Rp2,800.00	Rp1,668.00		Rp4,468.00
37	50th	L	hipertensi 2	CHF	160/100	130/80	furosemid, lisinopril amlodipin	Rp3,360.00	Rp2,919.00	Rp48,120.00	Rp54,399.00
38	54 th	L	hipertensi 2	CHF	160/100	130/80	furosemid captopril	Rp1,400.00	Rp2,144.00		Rp3,544.00
39	59 th	P	hipertensi 2	CHF	170/110	130/80	furosemid lisinopril	Rp3,360.00	Rp5,004.00		Rp8,364.00
40	51 th	L	hipertensi 2	CHF	170/100	130/80	furosemid candesartan	Rp3,920.00	Rp68,750.00		Rp72,670.00

41	53 th	P	hipertensi 2	CHF	160/90	130/80	captopril bisoprolol	Rp3,752.00	Rp28,872.00		Rp32,624.00
42	51 th	P	hipertensi 1	CHF	160/90	130/90	furosemid lisinopril	Rp2,800.00	Rp2,919.00		Rp5,719.00
43	60 th	L	hipertensi 2	CHF	180/110	130/80	furosemid captopril	Rp3,360.00	Rp4,824.00		Rp8,184.00
44	53 th	P	hipertensi 2	CHF	170/110	130/80	furosemid amlodipin	Rp3,360.00	Rp25,400.00		Rp28,760.00
45	47 th	L	hipertensi 2	dm t2	180/100	140/90	furosemid captopril	Rp4,480.00	Rp6,432.00		Rp10,912.00
46	58 th	L	hipertensi 2	CHF	160/100	130/80	furosemid candesartan	Rp2,800.00	Rp19,250.00		Rp16,550.00
47	60 th	L	hipertensi 2	CHF	160/90	130/80	furosemid captopril amlodipin	Rp3,360.00	Rp3,216.00	Rp17,780.00	Rp24,356.00
48	54 th	P	hipertensi 2	HT	170/90	150/100	Amlodipin Captopril	Rp15,240.00	Rp2,144.00		Rp17,384.00
49	30 th	L	hipertensi 1	dyspnea	160/90	130/80	furosemid lisinopril	Rp2,800.00	Rp2,085.00		Rp4,885.00
50	57 th	P	hipertensi 2	dyspepsia	180/100	130/90	Candesartan Furosemid	Rp134,750.00	Rp2,240.00		Rp136,990.00
51	50 th	P	hipertensi 2	CHF	160/90	130/80	lisinopril bisoprolol furosemid	Rp1,668.00	Rp38,496.00	Rp1,680.00	Rp41,844.00
52	60 th	L	hipertensi 2	anemia	220/100	130/90	captopril amlodipin furosemid	Rp5,896.00	Rp2,540.00	Rp2,800.00	Rp11,236.00
53	36 th	P	hipertensi 2	CHF	190/110	140/90	captopril amlodipin candesartan	Rp5,896.00	Rp25,400.00	Rp55,000.00	Rp86,296.00
54	48 th	P	hipertensi 2	DM tipe 2	180/100	170/90	amlodipin bisoprolol	Rp10,160.00	Rp19,248.00		Rp29,408.00
55	60 th	L	hipertensi 2	vertigo	210/120	130/90	bisoprolol amlodipin	Rp19,248.00	Rp1,016.00		Rp20,264.00
56	54 th	L	hipertensi 2	vertigo	160/100	140/90	captopril amlodipin	Rp3,216.00	Rp127.00		Rp3,343.00
57	43 th	L	hipertensi 2	CHF	170/90	130/80	furosemid captopril	Rp560	Rp1,608.00		Rp2,168.00
58	18 th	P	hipertensi 2	TBC	160/100	140/90	lisinopril furosemid	Rp3,753.00	Rp2,240.00		Rp5,993.00
59	46 th	L	hipertensi 2	CHF	170/100	130/80	furosemid lisinopril	Rp1,400.00	Rp2,919.00		Rp4,319.00
60	59 th	L	hipertensi 1	CHF	160/90	130/80	Candesartan furosemid	Rp96,250.00	Rp4,480.00		Rp100,730.00
61	42 th	L	hipertensi 2	CHF	160/100	130/80	furosemid candesartan	Rp2,800.00	Rp82,500.00		Rp85,300.00

62	53 th	L	hipertensi 2	PPOK	160/100	135/85	captopril amlodipin	Rp5,360.00	Rp30,480.00		Rp35,840.00
63	33 th	L	hipertensi 1	endocardia	160/85	150/90	furosemid candesartan	Rp560	Rp27,500.00		Rp28,060.00



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

RIWAYAT PENULIS



Afriandi Lahir di palopo 25 april 1999 merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara dari pasangan Taufin dan A.Rabia. saat masih kecil tinggal di kolaka utara lalu kemudian pindah ke luwu timur hingga tamat SMA di SMAN 1 Mangkutana. Lalu kemudian melanjutkan studi S1 jurusan farmasi di UIN Alauddin Makassar. Memiliki cita cita menjadi pebisnis yang hebat namun tidak melupakan dasar dasar nilai Islam dalam setiap bisnisnya. Ia juga memiliki impian dapat menuntut pendidikan di luar negeri suatu hari nanti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R