

EVALUASI KUALITAS HIDUP PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 SELAMA MASA PANDEMI COVID-19



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANDI FITRA FEBRIANTI SYAM
70100117071

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Fitra Febrianti Syam
NIM : 70100117071
Tempat/Tanggal Lahir : Alas, 15 Februari 1999
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Villa Samata Jl. H.M. Yasin Limpo
Judul : Evaluasi KualitasHidup Penderita Diabetes
Melitus Tipe 2 Selama Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Gowa, Februari 2022

Penulis



Andi Fitra Febrianti Syam

NIM. 70100117071

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Evaluasi Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Selama Masa Pandemi COVID-19**” yang disusun oleh **Andi Fitra Febrianti Syam, NIM. 70100117071**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Februari 2022 M yang bertepatan dengan 19 Rajab 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 21 Februari 2022 M
19 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A.	(.....)
Sekretaris	: Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Apt. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc.	(.....)
Penguji II	: Dra. Audah Mannan, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A.

NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَ عَلَيَّ إِلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada baginda Rasulullah, Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni adinul Islam.

Skripsi yang berjudul “Evaluasi Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Selama Masa Pandemi Covid-19” disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana Farmasi di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian penelitian dan skripsi ini, penulis tak pernah luput dari beberapa hambatan dan halangan, namun berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua, yaitu Bapak Ir. H. Syamri dan Ibu Nilawati, yang telah tulus memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, serta iringan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada keluarga besar atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah swt.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag., selaku Wakil

Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. H. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr. apt. H. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr. H. M. Faris Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. selaku ketua jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar. Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si. selaku sekretaris jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
4. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si., selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya dalam membimbing dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini
5. Apt. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
6. Apt. Munifah Wahyudin, S.Farm., M.Sc., selaku penguji kompetensi dan juga pembimbing akademik yang telah memberikan saran, masukan, motivasi, dan dorongan selama masa kuliah terutama dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Dra. Audah Mannan, M.Ag., selaku Penguji Agama yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi, atas ilmu dan pengetahuan dan segala bentuk bantuan yang telah diberikan selama masa kuliah sehingga penulis dapat sampai pada titik ini.
9. Nuri Juni Antasari, Jannisa Fitrilianti, dan Ananda Ike Septiani, saudara tak sedarah saya yang senantiasa memberikan saya dukungan serta doa dari kejauhan dan selalu menjadi tempat saya menumpahkan keluh kesah tanpa menghakimi.
10. Angkatan 2017 Farmasi (KOVALEN) yang menjadi salah satu alasan saya bisa bertahan hingga saat ini. terima kasih telah berbagi banyak pengalaman hidup selama bersama-sama.


Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Namun, terlepas dari itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya terkhusus di bidang Farmasi, serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT.



DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Diabetes Melitus.....	9
B. Covid-19.....	31
C. Kualitas Hidup.....	37
D. Tinjauan Dalam Islam	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
D. Populasi dan Sampel	42
E. Penentuan Besaran Sampel	43
F. Variabel Penelitian	44
G. Metode Pengumpulan Data	44
H. Instrumen Penelitian.....	44
I. Validasi dan Reliabilitas Penelitian.....	44
J. Langkah Analisis Data	46

K. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
KEPUSTAKAAN	62
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 2.....	14
Gambar 2. Algoritma Intensifikasi Terapi Injeksi GLP-1RA Pada DM Tipe 2 ...	27
Gambar 3. Algoritma Tatalaksana DM Tipe 2.....	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Pengambilan Data	64
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Pengambilan Data	65
Lampiran 3. Surat Izin Pengambilan Data Dinas Kesehatan Kota Makassar	66
Lampiran 4. Surat Izin Pengambilan Data Dinas Kesehatan Kota Makassar	67
Lampiran 5. Kode Etik Penelitian	68
Lampiran 6. Naskah Penjelasan	70
Lampiran 7. Informend Consent (Persetujuan responden)	72
Lampiran 8. Kuesioner Penelitian.....	74
Lampiran 9. Hasil Skoring Data Responden Uji Validitas	77
Lampiran 10. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner	78
Lampiran 11. Data Hasil Penelitian	80
Lampiran 12. Frekuensi item pertanyaan.....	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria diagnosis diabetes melitus menurut.....	15
Tabel 2. Kadar tes laboratorium darah untuk diagnosis diabetes dan preadiabetes	16
Tabel 3. Profil obat Antihiperqlikemia oral yang tersedia di Indonesia	23
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kualitas Hidup	45
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas	46
Tabel 6. Jenis Kelamin Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota Makassar	48
Tabel 7. Usia Responden Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota Makassar Pada Tahun 2021.....	48
Tabel 8. Pendidikan Responden Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota Makassar Pada Tahun 2021	49
Tabel 9. Pekerjaan Responden Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota Makassar Pada Tahun 2021	50
Tabel 10. Distribusi Frekuensi Responden Dari Aspek Kualitas Hidup Secara Umum.....	50
Tabel 11. Distribusi Frekuensi Responden Dari Aspek Kesehatan Fisik	51
Tabel 12. Distribusi Frekuensi Responden Dari Aspek Hubungan Sosial	52
Tabel 13. Distribusi Frekuensi Responden Dari Aspek Lingkungan Responden .	52
Tabel 14. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan item pertanyaan	54

ABSTRAK

Nama : Andi Fitra Febrianti Syam

NIM : 70100117071

Judul : Evaluasi Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Selama Masa Pandemi COVID-19

Pada awal tahun 2020, virus Corona (COVID-19) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO). Virus ini sangat berbahaya dan berisiko terutama pada individu dengan penyakit kronis (komorbid), salah satunya penderita diabetes melitus. Untuk mencegah penularan tersebut maka perlu diperhatikan kualitas hidup dari penderita yang mencangkup masalah kesehatan fisik, status psikologik, tingkat kebebasan, hubungan sosial, dan lingkungan yang mereka tempati. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas hidup penderita DM tipe 2 di Kota Makassar selama masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Data yang digunakan ialah data primer, yang diambil dari instrument berupa kuesioner dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 26. Dari hasil penelitian ini diperoleh skro rata-rata dari masing-masing aspek masuk dalam kategori cukup, yaitu 90 orang (90%) pada aspek kesehatan fisik dan faktor perilaku, 53 orang (53%) pada aspek hubungan sosial, dan 62 orang (62%) pada aspek lingkungan sosial. Kesimpulannya, sebaian besar masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik karena seluruh aspek masuk dalam kategori yang sama.

Kata Kunci: COVID-19, Diabetes Melitus, Kualitas Hidup



ABSTRACT

Name : Andi Fitra Febrianti Syam
Student ID Number : 70100117071
Research Title : Evaluation Quality of Life Diabetes Mellitus Type 2
Patiens During the COVID-19 Pandemi

At the beginning of 2020, the World Health Organization (WHO) was declared the Corona Virus (COVID-19) as a pandemi. This virus is vey dangerous and risky, especially for people with chronic diseases (comorbidities), one of which is diabetes mellitus. To prevent transmission, it is necessary to pay attention to the quality of life the sufferer which includes physical health problems, psychological status, level of freedom, social relationships, and the environment they live in. This study was conducted to find out how the quality of life of type 2 DM patients in Makassar City during the COVID-19 pandemi. This study using a descriptive method with a cross sectional approach. The data used is primary data, which is taken from the instrument in the form of a questionnaire using simple random sampling technique. Data were analyzed by using SPSS version 26. From the results of this study, the average score of each aspect was included in the sufficient category, namely 90 people (90%) in the aspect of physical health and behavioral faktors, 53 people (53%) in the relationship aspect. sosial aspect, and 62 people (62%) on the sosial environment aspect. In conclusion, most people have a good quality of life because all aspects fall into the same category.

Keywords: COVID-19, Diabetes Mellitus, Quality of Life



BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya infeksi berat. Berdasarkan laporan dari *World Health Organization* (WHO) terdapat 44 pasien pneumonia berat di suatu wilayah yaitu kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, tepatnya di hari terakhir tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang dekat dengan virus corona penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang mewabah di Hongkong pada tahun 2003, sehingga WHO menyebutnya sebagai novel corona virus (nCov-19). Dalam jangka waktu yang singkat muncul laporan dari provinsi lain di luar Cina bahkan dari berbagai Negara akibat adanya orang-orang dengan riwayat perjalanan dari Kota Wuhan dan Cina yaitu Korea Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Makau, Hongkong, Singapura, Malaysia, hingga total 25 negara termasuk Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab, Vietnam dan Kuba. Ancaman pandemi semakin besar ketika berbagai kasus menunjukkan penularan antar manusia (*human to human transmission*) pada dokter dan petugas medis yang merawat pasien tanpa ada riwayat berpergian ke pasar yang sudah ditutup. Dari gambaran klinis pasien COVID-19 diketahui komorbid berhubungan dengan morbiditas dan mortalitas. Komorbid yang diketahui berhubungan dengan luaran pasien adalah usia lanjut, hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan penyakit serebrovaskular (Davies, 2020).

Diabetes melitus (DM) merupakan salah satu penyakit utama yang mengancam kesehatan penduduk dunia. Diabetes melitus merupakan penyakit tidak menular dengan prevalensi komplikasi dan kematian yang tinggi pada usia

produktif. Morbiditas dan mortalitas akibat diabetes berhubungan dengan perkembangan berbagai komplikasi mikrovaskular (retinopati, nefropati, dan



neuropati) dan komplikasi makrovaskular (penyakit jantung coroner, stroke, dan penyakit pembuluh darah perifer). Penderita diabetes rentan terhadap infeksi akibat hiperglikemia. Terdapat bukti klinis bahwa pasien diabetes memiliki risiko lebih tinggi tertular virus COVID-19. COVID-19 saat ini menjadi tantangan bagi pasien diabetes. Diabetes melitus merupakan predisposisi perjalanan penyakit yang sangat parah dan meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19. Selain itu, pasien diabetes yang memiliki penyakit penyerta akan memperburuk hasil klinis. Dalam penelitian Yan, terungkap angka kematian pasien COVID-19 dengan diabetes cukup besar. Diabetes dapat menyebabkan peningkatan risiko kematian. Pasien COVID-19 dengan diabetes berisiko mengalami keparahan yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). *Angiotensin-Converting Enzyme 2* (ACE2) diekspresikan di beberapa jaringan, termasuk kelenjar ludah dan pankreas. Di pankreas, SARS-CoV-2 ditemukan mengurangi pelepasan insulin di mana pasien diabetes melitus sangat bergantung pada insulin. Infeksi SARS-CoV-2 telah terbukti menyebabkan ketosis atau ketoasidosis dan menyebabkan ketoasidosis diabetik pada mereka yang menderita diabetes. SARS-CoV-2 juga dapat menginfeksi dan menyebabkan kerusakan pada sel dan sel pankreas. Hingga saat ini tidak ada terapi spesifik anti virus nCoV 2019 dan anti virus corona lainnya, terutama bagi penderita komorbid seperti DM. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tata laksana dalam pencegahan penularan COVID-19 pada penderita DM, hal ini juga dapat berpengaruh pada kualitas hidupnya (Kun'ain et al., 2020)

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari (Goyena, 2019) bahwa kualitas hidup sangat diperlukan dalam mengelola sebuah penyakit, salah satunya penyakit DM. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, penderita DM sangat perlu memperhatikan dan meningkatkan kualitas hidupnya. WHO mengatakan Kualitas

hidup (*Quality of Life*) merupakan persepsi individu dalam hidupnya yang ditinjau dari konteks budaya, perilaku dan sistem nilai dimana mereka tinggal dan berhubungan dengan standar hidup, harapan, kesenangan, dan penelitian individu terhadap posisi mereka dalam kehidupan. Masalah yang mencangkup kualitas hidup begitu luas dan kompleks termasuk masalah kesehatan fisik, status psikologik, tingkat kebebasan, hubungan sosial, dan lingkungan yang mereka tempati (WHO, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hidup penderita Diabetes Melitus tipe 2 selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penderita Diabetes Melitus tipe 2 telah menjaga kualitas hidupnya selama masa pandemi sehingga dapat mengurangi risiko meningkatnya keparahan infeksi COVID-19.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 selama masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana perilaku penderita diabetes melitus tipe 2 menghadapi Covid-19?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup

1. Definisi Operasional

a. Evaluasi Kualitas Hidup

Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris “*evaluation*” yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Kualitas hidup (*Quality of Life*) merupakan persepsi individu dalam hidupnya yang ditinjau dari konteks budaya, perilaku dan sistem nilai dimana mereka tinggal dan berhubungan dengan standar hidup, harapan, kesenangan, dan penelitian individu terhadap posisi mereka dalam kehidupan. Dalam penelitian ini evaluasi difokuskan pada penderita diabetes

melitus tipe 2 menggunakan instrumen berupa kuesioner berbasis daring (dalam jaringan) yang merujuk pada *World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)*.

b. Diabetes Melitus Tipe 2

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit yang diakibatkan karena kehilangan progresif sekresi insulin sel- β yang adekuat dan sering dilatar belakangi oleh resistensi insulin.

c. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) merupakan penyakit yang telah menyebar ke banyak Negara di seluruh dunia diakibatkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV-2)*, RNA β -coronavirus untai tunggal.

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan pengambilan data dari kuisisioner secara prospektif kepada penderita diabetes melitus tipe 2. Penelitian ini hanya mencangkup kualitas hidup pendrita diabetes melitus tipe 2 selama masa pandemi Covid-19.

D. Kajian Pustaka

(Alimehr et al., 2021) "*The Impact of Coronavirus Disease (COVID-19) on Quality of Life in Diabetic Patiens*". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis investigasi fenomenologis yang telah dilakukan untuk menyelidiki pengalaman dan perasaan pribadi pasien dengan diabetes dalam hal efek penyakit korona pada kualitas hidup mereka. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur digunakan mengumpulkan informasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 15 pasien yang dirujuk ke Puskesmas, dan setiap wawancara direkam dengan persetujuan pasien dan ditulis di atas kertas dan dianalisis. Data penelitian ini diklasifikasikan menjadi 6 tema

utama dan 19 subtema setelah dianalisis. Tema utama dari informasi yang diperoleh dari penelitian ini termasuk pengetahuan dan kesadaran, efek psikologis, hiburan, dan program rekreasi, keluarga pasien, perawatan medis, dan komunikasi dengan pasien menempatkan penekanan terbesar pada perawatan medis. Hasil dari penelitian ini yaitu, pasien mengungkapkan bahwa stres akibat penyakit korona dan depresi merupakan efek psikologis yang utama. Mereka juga mengungkapkan beberapa masalah perawatan medis yang serius, termasuk pengurangan rujukan ke pusat kesehatan untuk tindak lanjut dan perawatan dan kekurangan dokter tenaga kesehatan untuk memberikan layanan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Alimehr et al. dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode yang digunakan. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan *Cross-Sectional*, kemudian untuk pengambilan data menggunakan instrumen berupa kuesioner yang kemudian disebarakan kepada penderita diabetes melitus tipe 2 di Kota Makassar.

(Joensen et al., 2020) "*Diabetes and COVID-19: psychosocial consequences of the COVID-19 pandemi in people with diabetes in Denmark-what characterizes people with high levels of COVID-19-related worries?*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Cross-sectional survey* yaitu dengan menyebarkan kuesioner yang mencakup item tentang kekhawatiran spesifik Covid-19 serta kekhawatiran terkait diabetes, status sosiodemografi dan kesehatan, hubungan sosial, dukungan sosial khusus diabetes, tekanan diabetes, dan perubahan perilaku khusus diabetes. Hasil penelitian ini menunjukkan orang dengan diabetes memiliki masalah yang berkaitan antara Covid-19 dengan diabetes mereka. Sebagian dari kekhawatiran mereka akan terpengaruh secara berlebihan jika mereka terinfeksi Covid-19 karena diabetes, sekitar sepertiganya takut digolongkan sebagai kelompok risiko dan tidak dapat ditangani jika

terinfeksi. Regresi logistik menunjukkan bahwa wanita, diabetes tipe 1, komplikasi dan penderitaan diabetes, perasaan ketika terisolasi dan kesepian, dan telah mengubah perilaku terkait dengan kekhawatiran yang lebih besar terkait Covid-19 dan isolasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Joensen *et al* dapat dilihat perbedaan bahwa penelitian ini berfokus pada kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 selama masa pandemi covid-19.

(Sunnah et al., 2020) “*Upaya Peningkatan Dan Monitoring Obat, Kesehatan Fisik Serta Psikologis Pada Pasien Penyakit Kronis Selama Pandemi Covid-19*”. Topik utama dalam studi penelitian ini yaitu kesehatan jiwa serta pemahaman materi pasien prolans dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes melitus. Tujuan kegiatan ini dalam rangka memberikan edukasi, meningkatkan kepatuhan pasien prolans terhadap terapi dan mencegah terjadinya kecemasan yang berlebihan sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jiwa selama pandemi Covid-19. Dilihat dari penelitian yang dilakukan Sunnah *et al* dapat dilihat perbedaan dari penelitian saya, yaitu penelitian ini berfokus pada kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2. Dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner berbasis daring terkait kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 selama masa pandemi Covid-19. Dimana akhir dari penelitian ini akan memberikan manfaat kepada sesama ilmuwan dan juga masyarakat sebagai bahan evaluasi dan landasan bagi para penyedia layanan kesehatan dalam penanganan dan tindakan yang perlu dilakukan selama masa pandemi Covid-19 ini.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 selama masa pandemi Covid-19.

- b. Untuk mengetahui perilaku penderita diabetes melitus tipe 2 menghadapi Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

a. Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 selama masa pandemi Covid-19 bagi para ilmuwan serta dapat dijadikan rujukan sebagai bahan evaluasi dan dapat melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi para penyedia layanan kesehatan dalam penanganan dan tindakan yang perlu dilakukan terhadap penderita diabetes melitus tipe 2 selama masa pandemi Covid-19.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Diabetes Melitus*

1. Definisi

Diabetes melitus (DM) adalah berbagai kelompok gangguan metabolisme yang semuanya memiliki peningkatan glukosa darah (BG) kronis sebagai ciri khasnya (DiPiro, 2020).

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya (PERKENI, 2019).

2. Epidemiologi

Penelitian epidemiologi menunjukkan diabetes melitus (DM) secara global terus meningkat hingga tahun 2045. Peningkatan ini telah diprediksi oleh *International Diabetes Federation* (IDF) bahwa pada tahun 2045 penderita diabetes melitus akan terus meningkat hingga 700 juta jiwa (IDF, 2019). Kondisi di Indonesia tidak jauh berbeda, volume kejadian yang tinggi tentu saja diikuti dengan beban biaya yang tinggi pula. Diagnosis dini dan tatalaksana komprehensif pada penderita DM dapat menekan angka morbiditas dan mortalitas terhadap adanya penyakit komorbid ataupun komplikasinya (PERKENI, 2019).

3. Klasifikasi

Diabetes dapat diklasifikasikan ke dalam kategori umum sebagai berikut:

- a. Diabetes tipe 1 (diakibatkan karena kerusakan sel autoimun, biasanya menyebabkan defisiensi insulin absolut)
- b. Diabetes tipe 2 (diakibatkan karena kehilangan progresif sekresi insulin sel- β yang adekuat yang sering dilatarbelakangi oleh resistensi insulin)

- c. Diabetes melitus gestasional (diabetes yang didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan yang tidak jelas merupakan diabetes sebelum kehamilan)
- d. Jenis diabetes tertentu karena penyebab lain, misalnya, sindrom diabetes monogenic (seperti diabetes neonatal dan diabetes maturitas pada usia muda), penyakit pankreas eksokrin (seperti fibrosis kistik dan pankreatitis), dan obat atau bahan kimia. Diabetes yang diinduksi (seperti dengan penggunaan glukokortikoid, dalam pengobatan HIV/AIDS, atau setelah transplantasi organ) (ADA, 2020)

Diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 adalah penyakit heterogen di mana presentase klinis dan perkembangan penyakit dapat sangat bervariasi. Klasifikasi berperan penting dalam menentukan terapi, namun bagi beberapa orang tidak dapat secara jelas diklasifikasikan sebagai penderita diabetes tipe 1 atau tipe 2 pada saat diagnosis. Paradigma tradisional mengatakan bahwa diabetes tipe 2 yang hanya terjadi pada orang dewasa dan diabetes tipe 1 hanya terjadi pada anak-anak tidak lagi akurat, karena kedua penyakit tersebut terjadi pada kedua kelompok umur (ADA, 2020).

Terkadang, pasien dengan diabetes tipe 2 bisa jadi disertai dengan *diabetic ketoacidosis (DKA)*, terutama etnis minoritas. Penting bagi penyedia untuk menyadari bahwa klasifikasi tipe diabetes tidak selalu langsung pada presentasi dan kesalahan diagnosis sering terjadi (misalnya, orang dewasa dengan diabetes tipe 1 salah didiagnosis memiliki diabetes tipe 2; individu dengan diabetes onset maturitas pada usia muda [MODY] salah didiagnosis menderita diabetes tipe 1, dll). Meskipun kesulitan dalam membedakan tipe diabetes dapat terjadi pada semua kelompok saat onset, diagnosis menjadi lebih jelas waktu ke waktu (ADA, 2020).

4. Etiologi

Diabetes melitus disebabkan oleh gangguan sekresi insulin, glukagon, dan hormon lainnya yang dapat mengakibatkan metabolisme karbohidrat dan lemak yang tidak normal. Hal ini sering disertai dengan resistensi insulin, terutama pada penderita DM tipe 2. Dalam banyak kasus, etiologi yang mendasari gangguan tersebut kompleks dan kurang dipahami (DiPiro, 2020).

Setelah mengonsumsi makanan, konsumsi karbohidrat meningkatkan konsentrasi glukosa plasma dan merangsang pelepasan hormon incretin dari usus dan pelepasan insulin dari sel β pankreas. Hiperinsulinemia yang dihasilkan menekan produksi glukosa hati, menekan pelepasan glukagon, dan memicu pengambilan glukosa oleh jaringan perifer. Lebih dari 75% dari total pembuangan glukosa tubuh terjadi di jaringan, termasuk otak dan saraf tepi, yang tidak memerlukan insulin. Pengambilan glukosa otak terjadi pada tingkat yang sama selama periode makanan dan puasa. 25% sisa metabolisme glukosa terjadi di hati dan otot, jaringan yang membutuhkan insulin untuk meningkatkan pengambilan glukosa ke dalam sel. Selama puasa, sekitar 85% glukosa diproduksi oleh hati dan sisanya oleh ginjal (DiPiro, 2020).

Meskipun jaringan lemak hanya bertanggung jawab atas sebagian kecil dari total pembuangan glukosa tubuh, jaringan lemak memainkan peran penting dalam homeostasis glukosa. Insulin memberikan efek antilipolitik yang kuat, mengurangi kadar asam plasma-*free fatty acid* (FFA). Peningkatan kadar FFA menghambat pengambilan glukosa oleh otot dan merangsang gluconeogenesis hati. Konsentrasi FFA yang lebih rendah menghasilkan peningkatan pengambilan glukosa di otot dan secara tidak langsung mengurangi produksi glukosa hati (DiPiro, 2020).

Glukagon diproduksi oleh sel α pankreas dan disekresikan dalam keadaan puasa. Glukagon merangsang produksi glukosa hati dan glikogenolisis. Glukagon dan sekresi insulin sangat erat kaitannya. Sekresi yang tepat dari kedua hormon diperlukan untuk menjaga konsentrasi glukosa plasma dalam kisaran normal (DiPiro, 2020).

5. Faktor Risiko

Menurut (DiPiro, 2020), faktor risiko dari DM tipe 2 diantaranya:

- a. Usia ≥ 45 tahun
- b. Riwayat keluarga DM tipe 2 (yaitu, orang tua atau saudara kandung dengan diabetes tipe 2)
- c. Ras atau etnis berisiko tinggi (yaitu, Afrika Amerika, Hispanik/Latin, Amerika Asli, Amerika Asia, Hawaii Asli, atau Penduduk Kepulauan Pasifik)
- d. Kegemukan atau obesitas (yaitu, $\geq 20\%$ melebihi berat badan ideal atau indeks massa tubuh [BMI] $\geq 25 \text{ kg/m}^2$)
- e. Gaya hidup menetap (yaitu, aktivitas fisik harian terbatas)
- f. Riwayat gangguan toleransi glukosa, *Impaired Fasting Glucose* (IFG), atau peningkatan hemoglobin A1C
- g. Hipertensi ($\geq 140/90$ mmHg pada orang dewasa atau dalam terapi hipertensi)
- h. Dislipidemia (kolesterol *high-density lipoprotein* (HDL) ≤ 35 mg/dL (0,91 mmol/L) atau kadar trigliserida ≥ 250 mg/dL (2,83 mmol/dL))
- i. Riwayat *Gestational Diabetes Mellitus* (GDM) atau persalinan bayi dengan berat lebih dari 9 pon (4 kg)
- j. Riwayat penyakit vascular (misalnya, infark miokard, stroke iskemik, penyakit arteri perifer)
- k. Adanya *acanthosis nigricans* (yaitu, kulit gelap, tebal, dan seperti beludru di sekitar leher atau ketiak)

1. Penyakit ovarium polikistik

American Diabetes Association juga menyatakan bahwa risiko terkenanya DM tipe 2 meningkat seiring bertambahnya usia, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik. Ini terjadi lebih sering pada wanita dengan diabetes gestasional, pada mereka dengan hipertensi atau dislipidemia, dan pada sub kelompok ras/etnis tertentu (Afrika Amerika, Indian Amerika, Hispanik/Latin, dan Asia Amerika). Hal ini sering dikaitkan dengan kecenderungan genetic yang kuat atau riwayat keluarga pada kerabat tingkat pertama, lebih dari diabetes tipe 1. Namun, genetika diabetes tipe 2 kurang dipahami (ADA, 2020).


6. Patofisiologi

Secara keliru disebut diabetes noninsulin-dependen atau diabetes onset orang dewasa, DM tipe 2 adalah hasil dari disfungsi sel β ditambah dengan beberapa derajat resistensi insulin. Seiring waktu, ada kehilangan progresif sel β . Kebanyakan individu dengan DM tipe 2 kelebihan berat badan atau obesitas. Adipositas perut merupakan penyumbang utama resistensi insulin. Genetika memainkan peran penting dalam perkembangan DM tipe 2 karena ada pola pewarisan yang kuat. Ratusan mutasi gen telah dikaitkan dengan perkembangan DM tipe 2. Mayoritas mutasi genetic yang terkait dengan DM tipe 2 tampaknya mempengaruhi perkembangan dan fungsi sel β , sensitivitas sel terhadap aksi insulin, atau perkembangan obesitas. Namun, tidak satupun dari mutasi gen tunggal ini yang menunjukkan hubungan yang kuat dengan DM tipe 2 dengan demikian, DM tipe 2 kemungkinan poligenetik, dengan lebih dari satu cacat genetic berkontribusi pada patogenesisnya dan beragam kombinasi gangguan berkontribusi pada perkembangan di populasi yang berbeda (DiPiro, 2020).

Pada penderita DM tipe 2, tekanan darah tinggi dan dyslipidemia, ditandai dengan trigliserida serum tinggi dan kadar kolestrol HDL rendah, merupakan

kondisi penyerta yang sangat sering. Meningkatnya *Plasmanogen Activator Inhibitor* (PAI-1), yang berkontribusi pada keadaan hiperkoagulasi, juga sering terjadi. Ada beberapa faktor risiko untuk pengembangan DM tipe 2 (ADA, 2020).

Kebanyakan pasien yang mengembangkan DM tipe 2 memiliki beberapa cacat yang berdampak pada regulasi glukosa plasma: (1) gangguan sekresi insulin; (2) defisiensi dan resistensi terhadap hormon incretin; (3) resistensi insulin yang melibatkan otot, hati, dan adiposit; (4) sekresi glucagon berlebih; (5) peningkatan produksi glukosa hati; (6) peningkatan regulasi kotransporter natrium-glukosa di ginjal; (7) peradangan sistemik; dan (8) rasa kenyang berkurang (DiPiro, 2020).



Gambar 1. Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 2

7. Diagnosa

Diagnosis DM ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara enzimatis dengan bahan plasma darah vena. Pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan glucometer. Diagnosis tidak dapat ditegakkan atas dasar adanya glukosuria (PERKENI, 2019).

Berbagai keluhan dapat ditemukan pada penyandang DM. kecurigaan adanya DM perlu dipikirkan apabila terdapat keluhan seperti:

- a. Keluhan klasik DM: poliuria, polydipsia, polifagia, dan penurunan berat badannya yang tidak dapat dijelaskan sebabnya.
- b. Keluhan lain: lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulva pada wanita (PERKENI, 2019).

Tabel 1 Kriteria diagnosis diabetes melitus menurut

Pemeriksaan glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L). puasa ditiadakan sebagai tidak adanya asupan kalori selama minimal 8 jam.
Atau
Pemeriksaan glukosa plasma 2-jam ≥ 200 mg/dL (11,0 mmol/L) selama tes toleransi glukosa oral. Tes harus dilakukan seperti yang dijelaskan oleh WHO, menggunakan beban glukosa yang mengandung setara dengan 75 g glukosa anhidrat yang dilakukan dalam air.
Atau
Pemeriksaan A1C $\geq 6,5\%$ (48 mmol/mol). Pengujian harus dilakukan di laboratorium dengan menggunakan metode yang disertifikasi NGSP (<i>National Glycohaemoglobin Standardization Program</i>) dan distandarisasi dengan pengujian DCCT (<i>Diabetes Control and Complications Trial</i>)
Atau
Pada pasien dengan gejala klasik hiperglikemia atau krisis hiperglikemik, glukosa plasma acak ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L)
*jika tidak ada hiperglikemia yang jelas, diagnosis memerlukan dua hasil tes abnormal dari sampel yang sama atau dalam dua sampel uji yang terpisah.

Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal atau kriteria DM digolongkan ke dalam kelompok prediabetes yang meliputi toleransi glukosa terganggu (TGT) dan glukosa darah puasa terganggu (GDPT)

- a. Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT): hasil pemeriksaan glukosa plasma puasa antara 100-125 mg/dL dan pemeriksaan TTGO glukosa plasma selama 2-jam < 140 mg/dL;
- b. Toleransi Glukosa Terganggu (TGT): Hasil pemeriksaan glukosa plasma 2-jam setelah TTGO antara 140-199 mg/dL dan glukosa plasma puasa <100 mg/dL
- c. Bersama-sama didapatkan GDPT dan TGT
- d. Diagnosis prediabetes dapat juga ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan HbA1c yang menunjukkan angka 5,7-6,4% (PERKENI, 2019).

Tabel 2. Kadar tes laboratorium darah untuk diagnosis diabetes dan preadiabetes

	HbA1c (100%)	Glukosa Darah Puasa (mg/dL)	Glukosa plasma 2 jam setelah TTGO (mg/dL)
Diabetes	≥ 6,5	≥ 126	≥ 200
Prediabetes	5,7 – 6,4	100 – 125	140 – 199
Normal	< 5,7	70 – 99	70 – 139

Cara pelaksanaan TTGO (PERKENI, 2019):

- a. Tiga hari sebelum pemeriksaan, pasien tetap makan (dengan karbohidrat yang cukup) dan melakukan kegiatan jasmani seperti kebiasaan sehari-hari
- b. Berpuasa paling sedikit 8 jam (mulai malam hari) sebelum pemeriksaan, minum air putih tanpa glukosa tetap diperbolehkan
- c. Dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa
- d. Diberikan glukosa 75 gram (orang dewasa) atau, 1,75 g/kgBB (anak-anak), dilarutkan dalam air 250 ml dan diminum dalam waktu 5 menit
- e. Berpuasa kembali sampai pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan 2 jam setelah minum larutan glukosa selesai
- f. Dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah 2 jam sesudah beban glukosa
- g. Selama proses pemeriksaan, subjek yang diperiksa tetap istirahat dan tidak merokok

Kriteria pengujian diabetes atau pradiabetes pada orang dewasa tanpa gejala (ADA, 2020):

- a. Pengujian harus dipertimbangkan pada orang dewasa yang kelebihan berat badan atau obesitas ($BMI \geq 25 \text{ kg / m}^2$ atau 23 kg / m^2 di Asia Amerika) yang memiliki satu atau lebih faktor risiko berikut
 - 1) Kerabat tingkat pertama dengan diabetes
 - 2) Ras / etnis berisiko tinggi (misalnya, Amerika Afrika, Latin, Amerika Pribumi, Amerika Asia, Penduduk Kepulauan Pasifik)
 - 3) Riwayat CVD
 - 4) Hipertensi ($140/90 \text{ mmHg}$ atau dalam terapi hipertensi)
 - 5) Tingkat kolesterol HDL, 35 mg/dL ($0,90 \text{ mmol/L}$) dan/atau tingkat trigliserida 250 mg/dL ($2,82 \text{ mmol/L}$)
 - 6) Wanita dengan sindrom ovarium polikistik
 - 7) Ketidakaktifan fisik
 - 8) Kondisi klinis lain yang terikat dengan resistensi insulin (misalnya obesitas parah, acanthosis nigricans)
- b. Pasien dengan pradiabetes ($A1C \geq 5,7$ [39 mmol/mol], IGT atau IFT) harus dites setiap tahun
- c. Wanita yang didiagnosis dengan GDM harus menjalani tes seumur hidup setidaknya setiap 3 tahun
- d. Untuk semua pasien lain, pengujian harus dimulai pada usia 45 tahun
- e. Jika hasilnya normal, pengujian harus diulang dengan interval minimal 3 tahun, dengan pertimbangan pengujian yang lebih sering tergantung pada hasil awal dan status risiko

8. Terapi

a. Terapi Nonfarmakologi

1) Terapi Nutrisi Medis (TNM)

Terapi nutrisi medis merupakan bagian penting dari penatalaksanaan DM secara komprehensif. Kunci keberhasilannya adalah keterlibatan secara menyeluruh dari anggota tim (dokter ahli gizi, petugas kesehatan yang lain serta pasien dan keluarganya). Terapi TNM sebaiknya diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap penderita DM agar mencapai sasaran (PERKENI, 2019).

Prinsip pengaturan makanan pada penyandang DM hampir sama dengan anjuran makan masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Penyandang DM perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis, dan jumlah kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri (PERKENI, 2019).

2) Latihan Fisik

Latihan fisik merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan DM tipe 2. Program latihan fisik secara teratur dilakukan 3-5 hari seminggu selama sekitar 3-45 menit, dengan total 150 menit per minggu, dengan jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari bukan termasuk dalam latihan fisik. Latihan fisik yang dianjurkan berupa latihan fisik yang bersifat aerobik dengan intensitas sedang (50-70% denyut jantung maksimal) seperti jalan cepat, bersepeda santai, *jogging*, dan berenang. Denyut jantung maksimal dihitung dengan cara mengurangi 220 dengan usia pasien. Pasien diabetes dengan usia muda dan bugar dapat melakukan 90 menit/minggu dengan

latihan aerobik berat, mencapai $> 70\%$ denyut jantung maksimal (PERKENI, 2019).

Pemeriksaan glukosa darah dianjurkan sebelum latihan fisik. Pasien dengan kadar glukosa darah < 100 mg/dL harus mengonsumsi karbohidrat terlebih dahulu dan bila >250 mg/dL dianjurkan untuk menunda latihan fisik (PERKENI, 2019)

b. Terapi Farmakologi

Terapi farmakologi diberikan bersama dengan pengaturan makan dan latihan jasmani (gaya hidup sehat). Terapi farmakologi terdiri dari obat oral.

1) Obat Antihiperglikemia Oral

Berdasarkan cara kerjanya, obat-anti-hiperglikemia oral dibagi menjadi 6 golongan:

a) Pemacu Sekresi Insulin (*Insulin Secretagogue*)


(1). *Sulfonylurea*

Obat golongan ini mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin oleh sel betapankreas. Efek samping utama adalah hipoglikemia dan peningkatan berat badan. Hati-hati menggunakan sulfonylurea pada pasien dengan risiko tinggi hipoglikemia (orang tua, gangguan fungsi hati, dan ginjal).

(2). Glinid

Glinid merupakan obat yang cara kerjanya mirip dengan sulfonylurea, namun berbeda dengan lokasi reseptor, dengan hasil akhir berupa penekanan pada peningkatan sekresi insulin fase pertama. Golongan ini terdiri dari 2 macam obat yaitu Repaglinid (derivat asam benzoate) dan Nateglinid (derivat fenilalanin). Obat ini diabsorpsi dengan cepat setelah pemberian secara oral dan diekskresi secara cepat melalui hati. Obat ini dapat mengatasi hiperglikemia post prandial.

Efek samping yang mungkin terjadi adalah hipoglikemia. Obat golongan glinid sudah tidak tersedia di Indonesia.



b) Peningkat Sensitivitas terhadap Insulin

(3). Metformin

Metformin mempunyai efek utama mengurangi produksi glukosa hati (gluconeogenesis), dan memperbaiki ambilan glukosa di jaringan perifer. Metformin merupakan pilihan pertama pada sebagian besar kasus DM tipe 2. Dosis metformin diturunkan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal (LFG 30-60 ml/menit/1,73 m²). Metformin tidak boleh diberikan pada beberapa keadaan LFG < 30 mL/menit/1,73 m², adanya gangguan hati berat, serta pasien-pasien dengan kecenderungan hipoksemia (misalnya penyakit serebrovaskular, sepsis, renjatan, PPOK, gagal jantung NYHA *fungsi class* III-IV). Efek samping yang mungkin terjadi adalah gangguan saluran pencernaan seperti dyspepsia, diare, dan lain-lain.

(4). Tiazolidinedion (TZD)

Tiazolidinedion merupakan agonis *Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma* (PPAR-gamma), suatu reseptor inti yang terdapat antara lain di sel otot, lemak, dan hati. Golongan ini mempunyai efek menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa, sehingga meningkatkan glukosa di jaringan perifer. Tiazolidinedion meningkatkan retensi cairan tubuh sehingga dikontraindikasikan pada pasien dengan gagal jantung (NYHA *fungsi class* III-IV) karena dapat memperberat edema/retensi cairan. Hati-hati pada gangguan faal hati, dan bila diberikan perlu pemantauan faal hati secara berkala. Obat yang masuk dalam golongan ini adalah pioglitazone.

c) Penghambat Alfa Glukosidase

Obat ini bekerja dengan menghambat kerja enzim alfa glukosidase di saluran pencernaan sehingga menghambat absorbs glukosa dalam usus halus. Penghambat glukosidase alfa tidak digunakan pada keadaan LFG ≤ 30

ml/min/1,73 m². Gangguan faal hati yang berat, *irritabel bowel syndrome*. Efek samping yang mungkin terjadi berupa *bloating* (penumpukan gas dalam usus) sehingga sering menimbulkan flatus. Guna mengurangi efek samping pada awalnya diberikan dengan dosis kecil. Contoh obat golongan ini adalah acarbose.

d) Penghambat enzim *Dipeptyl Peptidase-4* (DPP-4 inhibitor)

Dipeptil peptidase-4 (DPP-4) adalah suatu serin protoase, yang didistribusikan secara luas dalam tubuh. Enzim ini memecah dua asam amino dari peptide yang mengandung alanine atau prolin di posisi kedua peptide N-terminal. Enzim DPP-4 terekspresikan di berbagai organ tubuh, termasuk di usus dan membrane *brushborder* ginjal, di hepatosit, endothelium vaskuler dari kapiler villi, dan dalam bentuk larut dalam plasma. Penghambat DPP-4 akan menghambat lokasi peningkatan pada DPP-4 sehingga akan mencegah inaktivasi dari *glucagon-like peptide* (GLP)-1. Proses inhibisi ini akan mempertahankan kadar GLP-1 dan *glucose-dependent insulinotropic polypeptide* (GIP) dalam bentuk aktif di sirkulasi darah, sehingga dapat memperbaiki toleransi glukosa, meningkatkan respons insulin, dan mengurangi sekresi glucagon. Penghambat DPP-4 merupakan agen oral, dan yang termasuk dalam golongan ini adalah vildagliptin, linagliptin, sitagliptin, saxagliptin dan alogliptin.

e) Penghambat enzim *Sodium Glucose co-Transporter 2* (SGLT-2 inhibitor)

Obat ini bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal dan meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin. Obat golongan ini mempunyai manfaat untuk menurunkan berat badan dan tekanan darah. Efek samping yang dapat terjadi akibat pemberian obat ini adalah infeksi saluran kencing dan genital. Pada penyandang DM dengan gangguan fungsi ginjal perlu dilakukan penyesuaian dosis, dan tidak diperkenankan bila LFG kurang dari 45 ml/menit. Hati-hati karena dapat mencetuskan ketoasidosis.

Tabel 3. Profil obat Antihiperglikemia oral yang tersedia di Indonesia

Golongan Obat	Cara Kerja Utama	Efek Samping Utama	Penuurunan HbA1c
Metformin	Menurunkan produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitifitas terhadap insulin	Dyspepsia, diare, asidosis laktat	1,0-1,3%
Thiazolidinedione	Meningkatkan sensitifitas terhadap insulin	Edema	0,5-1,4%
Sulfonylurea	Meningkatkan sekresi insulin	BB naik, hipoglikemia	0,4-1,2%
Glinid	Meningkatkan sekresi insulin	BB naik, hipoglikemia	0,5-1,0%
Penghambat Alfa-Glukosidase	Menghambat absorpsi glukosa	Flatulen, tinja lembek	0,5-0,8%
Penghambat DPP-4	Meningkatkan sekresi insulin dan menghambat sekresi glucagon	Sebah, muntah	0,5-0,9%
Penghambat SGLT-2	Menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus distal	Infeksi saluran kemih dan genital	0,5-0,9%

2) Obat Antihiperglikemia Suntik

Termasuk anti hiperglikemia suntik, yaitu insulin, agonis GLP-1 dan kombinasi insulin dan agonis GLP-1 (PERKENI, 2019)

a) Insulin

Insulin digunakan pada keadaan:

- (1). HbA1c saat diperiksa $\geq 7,5\%$ dan sudah menggunakan satu atau dua obat antidiabetes
- (2). HbA1c saat diperiksa $> 9\%$
- (3). Penurunan berat badan yang cepat
- (4). Hiperglikemia berat yang disertai ketosis
- (5). Krisis hiperglikemia
- (6). Gagal dengan kombinasi OHO dosis optimal
- (7). Stres berat (infeksi sistemik, operasi besar, infark miokard akut, stroke)
- (8). Kehamilan dengan DM/diabetes melitus gestasional yang tidak terkontrol dengan perencanaan makan
- (9). Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat

- (10). Kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO
- (11). Kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi (PERKENI, 2019)

Jenis dan Lama Kerja Insulin

Berdasarkan lama kerja, insulin terbagi menjadi 6 jenis:

- (1). Insulin kerja cepat (*Rapid-acting insulin*)
- (2). Insulin kerja pendek (*Short-acting insulin*)
- (3). Insulin kerja menengah (*Intermediate-acting insulin*)
- (4). Insulin kerja panjang (*Long-acting insulin*)
- (5). Insulin kerja ultra panjang (*Ultra long-acting insulin*)
- (6). Insulin campuran tetap, kerja pendek dengan menengah dan kerja cepat dengan menengah (*Premixed insulin*)
- (7). Insulin campuran tetap, kerja ultra panjang dengan kerja cepat (PERKENI, 2019)

Efek samping terapi insulin yaitu:

- (1). Efek samping utama terapi insulin adalah terjadinya hipoglikemia
- (2). Penatalaksanaan hipoglikemia dapat dilihat dalam bagian komplikasi DM
- (3). Efek samping yang lain berupa reaksi alergi terhadap insulin (PERKENI, 2019).

Cara penyuntikan insulin:

- (1). Insulin umumnya diberikan dengan suntikan di bawah kulit (subkutan), dengan arah alat suntik tegak lurus terhadap cubitan permukaan kulit
- (2). Pada keadaan khusus diberikan intramuscular atau *drip*
- (3). Insulin campuran (*mixed insulin*) merupakan kombinasi antara insulin kerja pendek dan insulin kerja menengah, dengan perbandingan dosis yang tertentu, namun bila tidak terdapat sediaan insulin campuran tersebut atau

diperlukan perbandingan dosis yang lain, dapat dilakukan pencampuran sendiri antara kedua jenis insulin tersebut

- (4). Lokasi penyuntikan, cara penyuntikan maupun cara insulin harus dilakukan dengan benar, demikian pula mengenai rotasi tempat suntik
- (5). Penyuntikan insulin dengan menggunakan semprit insulin dan jarumnya sebaiknya hanya dipergunakan sekali, meskipun dapat dipakai 2-3 kali oleh penyandang diabetes yang sama, sejauh sterilitas penyimpanan terjamin. Penyuntikan insulin dengan menggunakan pen, perlu penggantian jarum suntuk setiap kali dipakai, meskipun dapat dipakai 2-3 kali oleh penderita diabetes yang sama asal sterilitas dapat dijaga
- (6). Kesesuaian konsentrasi insulin dalam kemasan (jumlah unit/mL) dengan semprit yang dipakai (jumlah unit/mL dari semprit) harus diperhatikan, dan dianjurkan memakai konsentrasi yang tetap. Saat ini yang tersedia hanya U100 (artinya 100 unit/mL)
- (7). Penyuntikan dilakukan pada daerah: perut sekitar pusat sampai ke samping, kedua lengan atas bagian luar (bukan daerah deltoid), kedua paha bagian luar (PERKENI, 2019).

b) Agonis GLP-1/*Incretin Mimetic*

Inkretin adalah hormon peptide yang disekresi gastrointestinal setelah makanan dicerna, yang mempunyai potensi untuk meningkatkan sekresi insulin melalui stimulasi glukosa. Dua macam inkretin yang dominan adalah *glucose-dependent insulintropic polypeptide* (GIP) dan *glucagon-like peptide* (GLP)-1 (PERKENI, 2019).

Agonis GLP-1 mempunyai efek menurunkan berat badan, menghambat pelepasan glucagon, menghambat nafsu makan, dan memperlambat pengosongan lambung sehingga menurunkan kadar glukosa darah postprandial. Efek samping


yang timbul pada pemberian obat ini antara lain rasa sebah dan muntah. Obat yang termasuk golongan ini adalah: Liraglutide, Exenatide, Albiglutide, Lixisenatide dan Dulaglutide (PERKENI, 2019).

Pada penderita diabetes, agonis GLP-1 (*Glucagon Like Peptide-1 Reseptor Agonis* (GLP-1 RA)) digunakan sebagai penurun kadar glukosa darah dengan meningkatkan jumlah GLP-1 dalam darah yang digunakan dengan cara disuntikkan melalui subkutan. Berdasarkan cara kerjanya golongan obat ini dibagi menjadi 2 yakni kerja pendek dan kerja panjang. Agonis GLP-1 kerja pendek memiliki waktu paruh kurang dari 24 jam yang diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari, contohnya adalah liraglutide dan lixisenatide, serta ada sediaan yang diberikan 1 kali dalam seminggu yaitu exenatide LAR, dulaglutide dan semaglutide (PERKENI, 2019).

Dosis berbeda untuk masing-masing terapi, dengan dosis minimal, dosis tengah, dan dosis maksimal. Penggunaan golongan obat ini dititrasi perminggu hingga mencapai dosis maksimal tanpa efek samping dan dipertahankan. Golongan obat ini dapat dikombinasi dengan semua jenis oral anti diabetic kecuali penghambat DPP-4, dan dapat dikombinasikan dengan insulin (PERKENI, 2019).

Pemakaian agonis GLP-1 dibatasi pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal yang berat, yaitu LFG kurang dari 30 mL permenit per 1,73 m² (PERKENI, 2019).

Algoritma intensifikasi terapi injeksi pada DM tipe



Gambar 2. Algoritma Intensifikasi Terapi Injeksi GLP-1RA Pada DM Tipe 2 (ADA, 2020)

3) Terapi Kombinasi

Pengaturan diet dan kegiatan jasmani merupakan hal yang utama dalam penatalaksanaan DM, namun bila diperlukan dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian obat antihiperqlikemia oral tunggal atau kombinasi sejak dini. Pemberian obat antihiperqlikemia oral maupun insulin selalu dimulai dengan dosis rendah, untuk kemudian dinaikkan secara bertahap sesuai dengan respon kadar glukosa darah. Terapi kombinasi obat antihiperqlikemia oral baik secara terpisah ataupun *fixed dose combination*, harus menggunakan dua macam obat dengan mekanisme kerja yang berbeda. Pada keadaan tertentu apabila sasaran kadar glukosa darah belum tercapai dengan kombinasi dua macam obat, dapat

diberikan kombinasi dua obat antihiperglikemia dengan insulin. Pada pasien yang disertai dengan alasan klinis dan insulin tidak memungkinkan untuk dipakai, terapi dapat diberikan kombinasi tiga obat anti-hiperglikemia oral (PERKENI, 2019).

Kombinasi obat antihiperglikemia oral dengan insulin dimulai dengan pemberian insulin basal (insulin kerja menengah atau insulin kerja panjang). Insulin kerja menengah harus diberikan 10 malam menjelang tidur, sedangkan insulin kerja panjang dapat diberikan sejak sore sampai sebelum tidur, atau diberikan pada pagi hari sesuai dengan kenyamanan pasien. Pendekatan terapi tersebut pada umumnya dapat mencapai kendali glukosa darah yang baik dengan dosis insulin yang cukup kecil. Dosis awal insulin basal untuk kombinasi adalah 6-10 unit. Kemudian dilakukan evaluasi dengan mengukur kadar glukosa darah puasa keesokan harinya (PERKENI, 2019).

Dosis insulin dinaikkan secara perlahan (pada umumnya 2 unit) apabila kadar glukosa darah puasa belum mencapai target. Pada keadaan kadar glukosa darah sepanjang hari dan masih tidak terkontrol meskipun sudah mendapat insulin basal, maka perlu diberikan terapi kombinasi insulin basal dan prandial, sedangkan pemberian obat antihiperglikemia oral terutama golongan sulfonilurea dihentikan dengan hati-hati (PERKENI, 2019).

4) Kombinasi Insulin Basal dengan Agonis GLP-1

Manfaat insulin basal terutama adalah menurunkan glukosa darah puasa, sedangkan agonis GLP1 akan menurunkan glukosa darah setelah makan, dengan target akhir adalah menurunkan HbA1c. manfaat lain dari kombinasi insulin basal dengan agonis GLP-1 adalah rendahnya risiko hipoglikemia potensi peningkatan berat badan. Keuntungan pemberian secara terpisah adalah pengaturan dosis yang fleksibel dan terhindar dari kemungkinan interaksi obat, namun pasien kurang


nyaman karena harus menyuntikkan 2 obat sehingga dapat mengakibatkan *clinical inertia*. Ko-formulasi rasio tetap insulin dan agonis GLP-1 yang tersedia saat ini adalah IdegLira, ko-formulasi antara insulin degludeg dengan liraglutide dan IGLarLixi, ko-formulasi antara insulin glarhine dan lixisentide (PERKENI, 2019).

Pasien yang sudah mendapatkan agonis GLP-1 kombinasi dengan obat antihiperqlikemik oral dan HbA1c belum mencapai target, maka dapat ditambahkan insulin basal memulai dengan dosis inisiasi dan dititrasi sapa mencapai target glukosa darah puasa 80-130 md/dL dan HbA1c < 70% (atau individual sesuai kondisi pasien) dan seterusnya (PERKENI, 2019).

Daftar obat dalam algoritme bukan menunjukkan urutan pilihan. Pilihan obat tetap harus mempertimbangkan tentang keamanan, efektifitas, penerimaan pasien, ketersediaan dan harga. Dengan demikian pemilihan harus didasarkan pada kebutuhan atau kepentingan penyandang DM secara perseorangan (individualisasi). Pemilihan obat juga perlu mempertimbangkan keamanan (hipoglikemia, pengaruh terhadap jantung, efektifitas, ketersediaan, toleransi pasien dan harga) (PERKENI, 2019).

Pasien dengan penyakit kardiovaskular aterosklerotik (PKVAS), gagal jantung dan penyakit ginjal kronik, diberikan agonis GLP-1 sebagai terapi setelah metformin dan perubahan pola hidup, sesuai dengan rekomendasi dari *American Diabetes Association* (ADA) dan *European Association for the Studi of Diabetes* (EASD) (PERKENI, 2019).

Algoritma pengobatan DM tipe 2 tanpa dekomposisi metabolik dapat dilihat pada gambar 3 (PERKENI, 2019).



Gambar 4. Algoritma Tatalaksana DM tipe 2

Pemilihan dan penggunaan obat memperimbangan faktor pembiayaan, ketersediaan obat, efektifitas, manfaat kardionasal, efek samping, efek terhadap berat badan, serta pilihan pasien

Pengalokasian bukan hanya meliputi gula darah, tetapi juga penanganan faktor-faktor risiko kardionasal yang lain secara terintegrasi

Obat Agonis GLP-1 dan penghambat SGLT-2 tertentu menunjukkan manfaat untuk pasien dengan komorbid penyakit kardiovaskuler aterosklerotik, gagal jantung dan gagal ginjal. Kedua golongan obat ini disarankan menjadi pilihan untuk pasien dengan komorbid/komplikasi penyakit tersebut.

Bila HbA1C tidak bisa dipertahankan sebagai pedoman dipakai glukosa darah puasa yang dikonversikan ke HbA1C (poin 7 penjelasan algoritma)

Gambar 3. Algoritma Tatalaksana DM Tipe 2 (PERKENI, 2019)

B. Covid-19

1. Definisi

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Menurut WHO, coronavirus merupakan wabah yang telah dinyatakan sebagai apndemi global, dan penyakit tersebut telah menyebar ke banyak Negara di seluruh dunia. Covid-19 ditandai dengan demam, batuk kering, kelelahan dan sesak napas, dan sebagian besar gejalanya ringan; namun, untuk beberapa, penyakit ini dapat berkembang menjadi pneumonia dan kegagalan multiorgan (Ma & Holt, 2020).

2. Epidemiologi

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus Covid-19 di China setiap hari dan memuncak pada akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, lalu bertambah hingga ke provinsi-provinsi lainnya dan juga China secara keseluruhan. Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi Covid-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai Negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman (Susilo et al., 2020).

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kauss kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara (Susilo et al., 2020).

Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menajdi pusat pandemi Covid-19, dengan

kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus Covid-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 20 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3% (Susilo et al., 2020).

3. Etiologi

Coronavirus adalah virus RNA rantai tunggal, tidak bersegmen, dan memiliki kapsul. Struktur protein utama pada coronavirus ada 4, yaitu glikoprotein S (*spike*), glikoprotein M (membrane), dan protein N (nukleokapsid), dan protein E (selubung). Coronavirus bisa menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Coronavirus masuk ke dalam bangsa Nidovirales, keluarga Coronaviridae dan terdapat 4 genus yaitu gammacoronavirus, deltacoronavirus, alphacoronavirus, serta betacoronavirus. Sebelum adanya Covid-19, terdapat 6 macam coronavirus, serta betacoronavirus. Sebelumnya ada Covid-19, terdapat 6 macam coronavirus yang bisa mengakibatkan infeksi pada manusia, yaitu SARS-CoV (betacoronavirus), HCoV-229E (alphacoronavirus), HCoV-HKU1 (betacoronavirus), serta MERS-CoV (betacoronavirus) (Kemenkes RI, 2020).

Etiologi Covid-19 yang berasal dari coronavirus merupakan genus betacoronavirus yang biasanya berdiameter 60-140 nm dengan umumnya berbentuk bulat disertai beberapa pleomorfik. Berdasarkan hasil analisis filogenetik memperlihatkan bahwa coronavirus ini termasuk ke dalam golongan subgenus yang sama dengan coronavirus penyebab wabah SARS (*Severe Acute Respiratory Illness*) yang terjadi pada tahun 2002-2004 yang lalu, yaitu Sarbecovirus. Berdasarkan hal ini, badan *International Committee on Taxonomy of Viruses* mengusulkan nama SARS-CoV-2 (Susilo et al., 2020).

4. Patogenesis Covid-19

Respon imun terhadap SARS-CoV-2

Infeksi SARS-CoV-2 menyebabkan peningkatan pelepasan sitokin dan kemokin pro-inflamasi termasuk interleukin IL-1 β , IL-4, dan IL-10, monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1), interferon- γ (IFN γ), dan interferon gamma-induced protein 10 (IP-10). Khususnya pasien ICU dengan penyakit parah mengalami peningkatan kadar IL-2, IL-6, IL-7, IL-10, faktor perangsang koloni granulosit (GCSF) plasma, IP-10, MCP-1, protein inflamasi makrofag-1A. (MIP-1A) dan tumor necrosis faktor- α (TNF- α), menunjukkan potensi “badai sitokin” yang berkorelasi dengan keparahan penyakit Covid-19. Pelepasan sitokin dan kemokin pro-inflamasi berpotensi dikaitkan dengan apoptosis sel epitel dan endotel massif dan kebocoran vascular akibat replikasi virus yang cepat. Dari sitokin pro-inflamasi yang dilepaskan, IL-1 β dan IL-6 menjadi perhatian khusus dan tampaknya terikat erat dengan kejadian Covid-19 yang parah pada pasien dewasa. Hipercytokinema ini tampaknya memainkan peran penting dalam perkembangan fibrosis paru dan dikaitkan dengan peningkatan viral load, hilangnya fungsi paru-paru, cedera paru-paru, dan peningkatan mortalitas (Azar et al., 2020).

IL-1 β terbukti meningkat dalam cairan lavage bronchoalveolar dan dalam plasma pasien dengan ARDS. Demikian pula, IL-6 berfungsi sebagai faktor proinflamasi dan terbukti memainkan peran penting dalam perkembangan fibrosis paru. IL-6 adalah sitokin pleiotropic penting yang secara signifikan berkontribusi pada inflamasi akut. Kadar IL-6 yang meningkat berkorelasi dengan peningkatan keparahan pneumonia terkait Covid-19. Dalam kasus ringan, kadar IL-6 sistemik kurang dari 100 pg/mL. Namun, dalam kasus kritis, kadar IL-6 lebih besar dari 100 pg/mL, konsentrasi di atas yang biasanya kita bisa saksikan munculnya “*inflaatory storm*”. Akibatnya, penghambatan IL-1 β dan IL-6 bermanfaat pada

banyak infeksi virus. Sebuah studi retrospektif yang mengamati kemanjuran tocilizumab (antagonis IL-6R) dalam mengobati Covid-19 menunjukkan bahwa tocilizumab mungkin merupakan pengobatan yang efektif pada pasien dengan bentuk penyakit yang parah. Saat ini, beberapa uji klinis tentang keamanan dan kemanjuran tocilizumab dalam pengobatan pneumonia terkait Covid-19 yang parah pada pasien rawat inap dewasa telah terdaftar. Menariknya, aktivasi IL-6 secara langsung berkorelasi dengan aktivasi jalur *Mechanistic Target of Rapamycin* (Mtor), jalur yang terlibat dalam kelangsungan hidup sel, proliferasi, dan pertumbuhan untuk menekan baik respon imun bawaan maupun yang didapat dan menghambat peradangan dengan bekerja pada reseptor IL-18R α , juga terbukti menekan produksi IL-1 β dan IL-6 dengan memodulasi jalur mTOR dan meningkatkan adenosine , monofosfat kinase (AMPK). IL-38 adalah sitokin penghambat lain dari IL-1 β dan anggota keluarga IL proinflamasi lainnya. Baik IL-38 dan IL-37 disarankan untuk berfungsi sebagai sitokin terapeutik potensial dengan menghambat peradangan yang disebabkan oleh Covid-19, memberikan pendekatan baru yang relevan untuk mengobati penyakit tersebut (Azar et al., 2020).

5. Faktor Risiko

Diabetes melitus adalah salah satu penyebab utama morbiditas di seluruh dunia, dan diprediksikan akan terus meningkat selama beberapa decade mendatang. Banyak bukti telah melaporkan peningkatan kerentanan pasien diabetesterhadap penyakit menular, yang dikaitkan dengan sistem kekebalan yang rusak pada diabetes. Mengingat penurunan kekebalan pada pasien diabetes, pneumonia sekarang telah menjadi faktor kematian yang cukup besar pada diabetes. Pada pasien dengan SARS, diabetes dan kadar glukosa plasma keduanya terbukti secara independen terkait morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi.

Dalam sebuah penelitian dilakukan pada sekelompok 52 pasien ICU yang terinfeksi SARS-CoV-2 adalah pasien diabetes sejumlah 22% dan penyakit serebrovaskular sebesar 22% (Azar et al., 2020).

6. Manifestasi Klinik

Manifestasi klinik pasien Covid-19 memiliki spectrum luas, mulai dari tanpa gejala (asintomatik), gejala ringan, pneumonia, pneumonia berat, ARDS, sepsis, hingga syok sepsis. Sekitar 80% kasus tergolong ringan atau sedang, 13,8% mengalami sakit berat, dan sebanyak 6,1% pasien jatuh ke dalam keadaan kritis. Beberapa besar proporsi infeksi asintomatik belum diketahui. Viremia dan *viral load* yang tinggi dari swab nasofaring pada pasien yang asintomatik telah dilaporkan (Susilo et al., 2020).

Gejala ringan didefinisikan sebagai pasien dengan infeksi akut saluran pernapasan tanpa komplikasi, bisa disertai dengan demam, *fatigue*, batuk (dengan atau tanpa sputum), anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kongesti nasal, atau sakit kepala. Pasien tidak membutuhkan suplementasi oksigen. Pada beberapa kasus pasien juga mengeluhkan diare dan muntah. Pasien Covid-19 dengan pneumonia berat ditandai dengan demam, ditambah salah satu dari gejala: (1) frekuensi pernapasan >30x/menit, (2) distress pernapasan berat, atau (3) saturasi oksigen <93% tanpa bantuan oksigen. Pada pasien geriatri dapat muncul gejala-gejala yang atipikal (Susilo et al., 2020).

Sebagian besar pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 menunjukkan gejala-gejala pada sistem pernapasan seperti demam, batuk, bersin, dan sesak napas. Berdasarkan data 55.924 kasus, gejala tersering dalam demam, batuk kering, *fatigue*. Gejala lain yang dapat ditemukan adalah batuk produktif, sesak napas, sakit tenggorokan, nyeri kepala, miagra/artalgia, menggigil, mual/muntah, kongesti nasal, diare, nyeri abdomen, hemoptosis, dan kongesti konjungtiva.

Lebih dari 40% demam pada pasien Covid-19 memiliki suhu puncak antara 38,1-39°C, sementara 34% mengalami demam suhu lebih dari 39°C (Susilo et al., 2020).

Perjalanan penyakit dimulai dengan masa inkubasi yang biasanya sekitar 3-14 hari (median 5 hari). Pada masa ini leukosit dan limfosit masih normal atau sedikit menurun dan pasien tidak bergejala. Pada fase berikutnya (gejala awal), virus menyebar melalui aliran darah, diduga terutama pada jaringan yang mengekspresi ACE2 seperti paru-paru, saluran cerna dan jantung. Gejala pada fase ini umumnya ringan. Serangan kedua terjadi empat hingga tujuh hari setelah timbul gejala awal. Pada saat ini pasien masih demam dan mulai sesak, lesi di paru memburuk, limfosit menurun. Penanda inflamasi mulai meningkat dan mulai terjadi hiperkoagulasi. Jika tidak teratasi, fase selanjutnya inflamasi makin tak terkontrol, terjadi badai sitokin yang mengakibatkan ARDS, sepsis, dan komplikasi lainnya (Susilo et al., 2020).

7. Penanganan Covid-19 pada Penderita Diabetes Melitus

- a) Rekomendasi untuk penderita diabetes dalam mencegah Covid-19 (PERKENI, 2020)
- 1) Sering mencuci tangan dan hindari menyentuh wajah
 - 2) Penderita diabetes harus tinggal di rumah dan menjaga jarak. Kurangi paparan terhadap orang yang berpotensi sebagai karier virus
 - 3) Jika terpaksa keluar rumah maka pastikan untuk selalu menggunakan masker dengan bahan dasar kain
 - 4) Terus konsumsi obat oral maupun injeksi
 - 5) Tetap jaga pola makan yang sehat dan seimbang. Hal ini harus diimbangi dengan olah raga cukup
 - 6) Cek gula darah secara teratur. Jika merasa tidak enak badan, cek kemungkinan hipoglikemia

- 7) Hubungi dokter anda untuk instruksi selanjutnya
- b) Rekomendasi untuk penderita diabetes melitus dengan infeksi Covid-19 (PERKENI, 2020).
- 1) Cari pertolongan medis secepatnya jika ada gejala pernapasan mirip infeksi Covid-19. Asesmen dan rekomendasi yang tepat harus diikuti
 - 2) Teruskan obat atau oral injeksi, jika gejala infeksi ringan atau sedang dengan kadar gula darah yang stabil
 - 3) Tetap cek kadar gula darah secara teratur. Jika merasa tidak enak badan, cek kemungkinan hipoglikemia
 - 4) Jika keadaan memburuk, cari pertolongan gawat darurat.

C. Kualitas Hidup

WHO mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu tentang posisi mereka pada kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai tempat mereka hidup dan dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar, dan perhatian mereka. Kualitas hidup secara kompleks dipengaruhi oleh kesehatan fisik, keadaan psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, kepercayaan pribadi, dan hubungan mereka dengan ciri-ciri menonjol di lingkungan hidup mereka (WHO, 2011).

Definisi sehat menurut *World Health Organization* (WHO) adalah suatu keadaan dimana tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga adanya keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan sosial. Sehingga pengukuran kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan meliputi tiga bidang fungsi yaitu: fisik, psikologi (kognitif dan emosional), dan sosial. Sampai saat ini faktor penyebab turunnya kualitas hidup pada manusia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama belum diketahui secara pasti. Masalahnya antara lain sulitnya melakukan penelitian terhadap manusia untuk mencari hubungan

sebab-akibat. Diakui masalahnya sangat kompleks dan banyak factor (multifactorial) yang berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia (Jacob & Sandjaya, 2018).

Frank-Stormberg dalam (Afiyanti, 1999) mendefinisakan kualitas hidup individu secara murni dengan mengukur melalui ukuran indicator obyektif dari pendapatan, pekerjaan, edukasi, dan fungsi fisik individu.

D. Tinjauan Dalam Islam

Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sebagai bekal manusia dalam menjalankan tugasnya, maka Allah karuniakan kepada manusia potensi berupa akal. Dengan akalnya manusia dapat membedakan perubahan baik-buruk. Namun demikian dalam pengembangan akal manusia perlu adanya bimbingan yang tepat sehingga manusia tidak salah jalan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Maka Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman bagi manusia dalam kehidupannya. Bagi umat Islam, Al-Qur'an mewahyukan pemahaman-pemahaman tentang berbagai macam aspek kehidupan dan alam semesta yang Allah SWT ciptakan. Hal ini juga berkaitan dengan cara manusia menjaga kualitas hidupnya, dapat diperhatikan dari kebiasaan sehari-hari terutama bagi penderita diabetes melitus. Sebagaimana yang telah kita ketahui, penderita diabetes melitus tidak jauh dari makanan dan minuman yang dikonsumsi, maka dari itu hal ini telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemah:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kau mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi untuk seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapa pun untuk memonopli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Makanan halal, adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agamanya. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik. karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, seperti misalnya pemutusan hubungan. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik. Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani, seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan, dan janganlah kau mengikuti langkah-langkah setan.

Surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - ١٩٥

Terjemah:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa Rasul saw. menjelaskan makna ihsan sebagai: “menyembah Allah, seakan-akan melihat-Nya dan bila itu tidak tercapai maka yakinlah bahwa Dia melihatmu.” Dengan demikian, perintah ihsan bermakna perintah melakukan segala aktivitas positif, seakan-akan anda melihat Allah atau paling tidak selalu merasa dilihat dan diawasi oleh-Nya. Kesadaran akan pengawasan melekat itu, menjadikan seseorang selalu ingin berbuat sebaik mungkin, dan memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya terhadap diri anda. Dengan demikian ihsan lebih tinggi dan lebih dalam kandungannya daripada adil, karena berlaku adil adalah mengambil semua hak anda atau memberi semua hak orang lain, sedang ihsan adalah memberi lebih banyak daripada yang harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil. Ihsan diperintahkan Allah, karena demikian itulah yang dilakukan Allah terhadap makhluk-makhluk-Nya dan arena itu pula sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan.

Kesehatan adalah suatu yang penting dalam kualitas hidup, terutama bagi umat Islam. Umat Islam sebelum memulai sesuatu diwajibkan untuk memperhatikan dirinya. Kesehatan merupakan nikmat yang perlu dijaga. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadist:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابًا قَبْلَ هَرَمٍ مَكَ ، وَ صِحَّةً قَبْلَ سَقَمٍ ، وَ غِنًى قَبْلَ فَقْرٍ ،
 وَ فَرَاغًا قَبْلَ شُغْلٍ ، وَ حَيَاةً قَبْلَ مَوْتٍ

Artinya:

“Ambillah kesempatan lima (keadaan) sebelum lima (keadaan). (Yaitu) mudamu sebelum pikunmu, kesehatanmu sebelum sakitmu, cukup sebelum fakirmu, luang waktumu sebelum sibukmu, kehidupanmu sebelum matimu.” [HR Al Hakim di dalam Al Mustadrak; disisihkan oleh Syaikh Al Albani di dalam Shahih At Targhib wat Targhib 3/311, no. 3355, Penerbit Maktabul Ma’arif, Cet I, Th. 1421 H/2000 M]

Hadist di atas menjelaskan kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga diri dari sesuatu yang dapat menyebabkan kemudharatan atasnya, dengan cara senantiasa menjaga pola hidup sehat, lebih mengontrol makanan dan minuman agar tidak berlebihan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional deskriptif. Penelitian observasional adalah penelitian mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Siswanto, 2016).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Cross-Sectional* yaitu penelitian yang diadakan dalam waktu yang bersamaan tetapi dengan subjek yang berbeda-beda (Siswanto, 2016).

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September hingga Desember 2021.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat yang menderita Diabetes Melitus tipe 2 di Kota Makassar.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat yang menderita Diabetes Melitus tipe 2 di Kota Makassar yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu antara lain:

a. Kriteria Inklusi:

- 1) Masyarakat yang bersedia ikut serta dalam penelitian ini dan bersedia mengisi kuesioner
- 2) Responden laki-laki dan perempuan berusia lebih dari 45 tahun.
- 3) Responden diabetes melitus tipe 2 yang sedang menjalani pengobatan

b. Kriteria Eksklusi:

- 1) Masyarakat yang menderita Diabetes Melitus tipe 2 dengan komplikasi
- 2) Masyarakat yang menderita Diabetes Melitus yang terinfeksi Covid-19
- 3) Masyarakat yang tidak bersedia atau mengundurkan diri.

E. Penentuan Besaran Sampel

Untuk menghitung besaran sampel dari populasi masyarakat Kota Makassar digunakan rumus Slovin. Rumus slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut (Riyanto & Hatmawan, 2020)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

N= Jumlah sampel

N= Total populasi

E= tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel (e=0,1)

$$n = \frac{26.643}{1 + 26.610(0,1)^2}$$

$$n = \frac{26.643}{267,1}$$

$$n = 99,74 \approx 100$$

F. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan
2. Variabel terikat atau variabel dependen adalah kualitas hidup masyarakat penderita diabetes melitus selama masa pandemi Covid-19.

G. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengisi kuesioner kualitas hidup yaitu *World Health Organization Quality of Life (WHOQL)* dan faktor perilaku penderita DM tipe 2.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner yang berisikan pertanyaan seputar kualitas hidup dari WHOQL yang telah disiapkan oleh peneliti dan diisi oleh responden. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk diisi oleh responden (Siswanto *et al.*, 2016).

I. Validasi dan Reliabilitas Penelitian

1. Validitas Instrumen Penelitian

Uji validitas kuesioner dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana data yang ditampung pada kuesioner mengukur apa yang akan diukur. Kuesioner harus berkaitan dengan variabel yang akan diukur dan tidak keluar dari topik yang telah ditentukan. Jenis pengujian validasi kuesioner pada penelitian ini yaitu pengujian

validitas konstruk. Sebuah instrumen yang dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila kriteria yang ada dalam instrumen secara teoritis telah mencerminkan apa yang diukur. Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep, untuk mencari kerangka tersebut dapat dilakukan: (1) mencari definisi-definisi konsep yang dikemukakan para ahli yang tertulis dalam literatur, (2) jika tidak terdapat pada literatur maka harus didefinisikan sendiri konsep tersebut, (3) menanyakan kepada calon responden. Suatu instrumen yang valid akan mempunyai validitas yang tinggi dan sebaliknya, instrumen yang kurang valid mempunyai validitas yang rendah. Instrumen yang valid adalah instrumen yang mengukur keadaan yang akan diukur dengan tepat dan sebaliknya, instrumen yang dikatakan tidak valid bila digunakan untuk mengukur keadaan yang tidak tepat diukur dengan instrumen tersebut (Siswanto *et al.*, 2016).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kualitas Hidup

Nomor Item	rhitung	Rtabel	Keterangan
1	0,647	0,2960	Valid
2	0,495	0,2960	Valid
3	0,693	0,2960	Valid
4	0,586	0,2960	Valid
5	0,639	0,2960	Valid
6	0,566	0,2960	Valid
7	0,633	0,2960	Valid
8	0,598	0,2960	Valid
9	0,652	0,2960	Valid
10	0,671	0,2960	Valid
11	0,640	0,2960	Valid
12	0,547	0,2960	Valid
13	0,442	0,2960	Valid
14	0,602	0,2960	Valid
15	0,685	0,2960	Valid
16	0,800	0,2960	Valid
17	0,659	0,2960	Valid
18	0,473	0,2960	Valid
19	0,466	0,2960	Valid
20	0,665	0,2960	Valid
21	0,555	0,2960	Valid
22	0,400	0,2960	Valid

2. Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen dapat dipercaya atau diandalkan. Bila instrumen dapat digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dengan hasil pengukuran relative konstan, maka instrumen tersebut reliabel (Siswanto *et al.*, 2016).

Reliabilitas dihitung dengan menggunakan rumus Croncbach's Alpha yaitu sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\Sigma \sigma_b^2}{\sigma^2_t} \right)$$

Keterangan:

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

$\Sigma \sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ^2_t = varians total

Apabila diperoleh r hitung $>$ dan r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,931	22

J. Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden dengan cara mengelompokkan data ke dalam suatu kategori, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Proses kegiatan ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah proses memeriksa data yang telah dikumpulkan terkait kelengkapan identitas responden dan daftar pertanyaan yang telah dijawab. Memastikan bahwa variabel yang diteliti telah sesuai dengan isian pada instrumen atau tidak.

2. Memberi Kode (*Coding*)

Memberi kode adalah kegiatan menyederhanakan data hasil penelitian dengan memberikan symbol-simbol tertentu masing-masing data yang sudah diklasifikasikan.

3. Tabulasi Data (*Tabulating*)

Tabulasi adalah kegiatan menyusun data yang telah diberikan kode dalam bentuk tabel dengan analisis yang dibutuhkan

K. Analisis Data

Metode statistik deskriptif adalah sekumpulan metode yang berupaya membuat ringkasan dan deskripsi data yang telah dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk melihat kualitas hidup dari penderita diabetes melitus tipe 2 selama pandemi COVID-19 di Kota Makassar.

Data diolah menggunakan aplikasi IBM SPSS *Statistic Version 26*. Pengumpulan data dilakukan pada bulan September hingga Desember 2021.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini responden yang terlibat merupakan masyarakat yang menderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Kota Makassar. Responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 100 orang.

1. Karakteristik Reponden Penelitian

Ada 4 karakteristik yang digunakan pada penelitian ini yaitu penderita Diabetes Melitus Tipe 2 yang sedang menjalani pengobatan, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan.

a. Jenis Kelamin

Tabel 6. Jenis Kelamin Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota Makassar

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Laki-laki	38	38%
2	Perempuan	62	62%
Jumlah		100	100%

Dari tabel 1.2 diperoleh hasil bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu dengan frekuensi 62 orang (62%), sedangkan laki-laki 38 orang (38%).

b. Usia

Tabel 7. Usia Responden Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota Makassar Pada Tahun 2021

No	Usia	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	45-50	29	29%
2	51-56	33	33%
3	57-62	21	21%
4	63-68	10	10%
5.	69-74	4	4%
6.	75-80	3	3%
Jumlah		100	100%

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa responden yang berusia 45-50 tahun memiliki frekuensi sebanyak 29 orang (29%), responden yang berusia 51-56 memiliki frekuensi sebanyak 33 orang (33%), responden yang berusia 57-62 tahun memiliki frekuensi sebanyak 21 orang (21%), responden yang berusia 63-68 tahun memiliki frekuensi sebanyak 10 orang (10%), responden yang berusia 69-74 tahun memiliki frekuensi sebanyak 4 orang (4%), dan responden yang berusia 75-80 tahun memiliki frekuensi sebanyak 3 orang (3%).

c. Pendidikan

Tabel 8. Pendidikan Responden Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota Makassar Pada Tahun 2021

No	Pendidikan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	5	5%
2	SD sederajat	44	44%
3	SMP sederajat	13	13%
4	SMA sederajat	23	23%
5	PT sederajat	15	15%
Jumlah		100	100%

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa frekuensi responden yang tidak sekolah sebanyak 5 orang (5%), responden dengan pendidikan terakhir SD sederajat memiliki frekuensi sebanyak 44 orang (44%), responden dengan pendidikan terakhir SMP sederajat memiliki frekuensi sebanyak 13 orang (13%), responden dengan pendidikan terakhir SMA sederajat memiliki frekuensi sebanyak 23 orang (23%), dan responden dengan pendidikan terakhir Perguruan Tinggi memiliki responden sebanyak 15 orang (15%).

d. Pekerjaan

Tabel 9. Pekerjaan Responden Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota Makassar Pada Tahun 2021

No	Pekerjaan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Bekerja	49	49%
2	Pegawai Swasta	31	31%
3	Pegawai Negeri	15	15%
4	Lainnya	5	5%
Jumlah		100	100%

Dari tabel 1.4 menunjukkan frekuensi responden yang tidak bekerja sebanyak 49 orang (49%), responden yang bekerja sebagai pegawai swasta memiliki frekuensi sebanyak 31 orang (31%), responden yang bekerja sebagai pegawai negeri memiliki frekuensi sebanyak 15 orang (15%), dan responden yang memiliki jenis pekerjaan lainnya memiliki frekuensi sebanyak 5 orang (5%).

2. Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Kota Makassar

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Apa Yang Dipikirkan Tentang Kehidupan Responden Pada Empat Minggu Terakhir

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Total
	SBR	BR	BBS	BK	SBK	
A1	0 (0%)	9 (9%)	53 (53%)	31 (31%)	7 (7%)	100 (100%)

Keterangan :

- A1 : Bagaimana menurut anda kualitas hidup anda?
 SBR : Sangat buruk
 BR : Buruk
 BBS : Biasa-biasa saja
 BK : Baik
 SBK : Sangat baik

Berdasarkan tabel 2.1 distribusi frekuensi kualitas hidup penderita Diabetes Melitus di Kota Makassar selama pandemi COVID-19 berdasarkan hal yang sering dialami beberapa hari terakhir sebelum pengisian kuesioner, untuk

kategori biasa-biasa saja sebanyak 53 orang (53%), baik 31 (31%), buruk 9 orang (9%), dan sangat baik 7 orang (7%).

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Responden Dari Aspek Kesehatan Fisik

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Total
	TSS	SDK	SDG	SRK	SPNH	
A2	2 (2%)	28 (28%)	40 (40%)	25 (25%)	5 (5%)	100 (100%)
A3	0 (0%)	6 (6%)	49 (49%)	30 (30%)	15 (15%)	100 (100%)
A4	0 (0%)	6 (6%)	49 (49%)	35 (35%)	10 (10%)	100 (100%)
A5	1 (1%)	9 (9%)	34 (34%)	46 (46%)	10 (10%)	100 (100%)
B1	6 (6%)	38 (38%)	0 (0%)	49 (49%)	7 (7%)	100 (100%)

Keterangan :

A2 : Apakah anda memiliki vitalitas yang cukup untuk beraktivitas sehari?

A3 : Apakah anda dapat menerima penampilan tubuh anda?

A4 : Apakah anda memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan anda?

A5 : Seberapa jauh ketesediaan informasi bagi kebutuhan anda dari hari ke hari?

B1 : Seberapa sering anda memiliki kesempatan untuk bersenang-senang?

TSS : Tidak sama sekali

SDK : Sedikit

SDG : Sedang

SRK : Seringkali

SPNH : Sepenuhnya

Distribusi frekuensi dari aspek kesehatan fisik responden mengenai vitalitas untuk sehari-hari dari responden didapatkan kategori sedang sebanyak 40 orang (40%), sedikit 28 orang (28%), seringkali 25 orang (25%), sepenuhnya 5 orang (5%), dan tidak sama sekali 2 orang (2%). Sedangkan dari tiap individu yang dapat menerima penampilan dari tubuhnya sebagian besar bisa menerima penampilannya, hal ini ditunjukkan pada kategori sedang yaitu 49 orang (49%), kemudian untuk kategori seringkali 30 orang (30%), sepenuhnya 15 orang (15%), dan sedikit menerima 6 orang (6%). Kemudian untuk ketesediaan informasi yang

diterima sehari-hari, untuk kategori sedang sebanyak 49 orang (40%), kategori seringkali 35 orang (35%), sepenuhnya 10 orang (10%), dan sedikit 9 orang (9%). Dalam penelitian ini, sebagian besar responden cukup sering meluangkan waktunya untuk ber-rekreasi, hal ini ditunjukkan dengan hasil jawaban responden yang memilih kategori seringkali sebanyak 49 orang (49%), kemudian kategori sedikit 38 orang (38%), kategori sepenuhnya 7 orang (7%), dan tidak sama sekali sebanyak 6 orang (6%).

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Responden Dari Aspek Hubungan Sosial

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Total
	SBR	BR	BBS	BK	SBK	
B2	0 (0%)	1 (1%)	39 (39%)	28 (28%)	32 (32%)	100 (100%)

Keterangan :

B2 : Seberapa baik kemampuan anda dalam bergaul?
 SBR : Sangat buruk
 BR : Buruk
 BBS : Biasa-biasa saja
 BK : Baik
 SBK : Sangat baik

Berdasarkan distribusi frekuensi dari aspek hubungan sosial responden dalam bergaul diperoleh hasil untuk kategori biasa-biasa saja 39 orang (39%), sangat baik 32 orang (32%), baik 28 orang (28%), dan buruk 1 orang (%).

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Responden Dari Aspek Lingkungan Responden

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Total
	STM	TM	BBS	M	SM	
B3	1 (1%)	7 (7%)	38 (38%)	42 (42%)	12 (12%)	100 (100%)
B4	0 (0%)	0 (0%)	64 (64%)	30 (30%)	6 (6%)	100 (100%)
B5	0 (0%)	6 (6%)	54 (54%)	34 (34%)	6 (6%)	100 (100%)
C1	0 (0%)	3 (3%)	49 (49%)	34 (34%)	14 (14%)	100 (100%)
C2	0 (0%)	1 (1%)	46 (46%)	25 (25%)	28 (28%)	100 (100%)
C3	3 (3%)	9 (9%)	74 (74%)	7 (7%)	7 (7%)	100 (100%)
C4	0	2	35	29	34	100

	(0%)	(2%)	(35%)	(29%)	(34%)	(100%)
C5	0 (0%)	1 (1%)	24 (24%)	49 (49%)	26 (26%)	100 (100%)
D1	0 (0%)	6 (6%)	25 (25%)	41 (41%)	28 (28%)	100 (100%)
D2	0 (0%)	3 (3%)	36 (36%)	38 (38%)	23 (23%)	100 (100%)

Keterangan :

- B3 : Seberapa puaskah anda dengan tidur anda?
 B4 : Seberapa puaskah anda dengan kemampuan anda untuk menampilkan aktivitas kehidupan anda sehari-hari?
 B5 : Seberapa puaskah anda dengan kemampuan anda untuk bekerja?
 C1 : Seberapa puaskah anda terhadap diri anda?
 C2 : Seberapa puaskah anda dengan hubungan personal atau sosial anda?
 C3 : Seberapa puaskah anda dengan kehidupan seksual anda?
 C4 : Seberapa puaskah anda dengan dukungan yang anda peroleh dari teman anda?
 C5 : Seberapa puaskah anda dengan kondisi tempat anda tinggal saat ini?
 D1 : Seberapa puaskah anda dengan akses anda pada layanan kesehatan?
 D2 : Seberapa puaskah anda dengan transportasi yang harus anda jalani?
 STM : Sangat tidak memuaskan
 TM : Tidak memuaskan
 BBS : Biasa-biasa saja
 M : Memuaskan
 SM : Sangat memuaskan

Distribusi frekuensi dari aspek lingkungan diperoleh hasil untuk kepuasan tidur dengan kategori sangat memuaskan 42 orang (42%), biasa-biasa saja 38 orang (38%), sangat memuaskan 12 orang (12%), tidak memuaskan 7 orang (7%), dan sangat tida memuaskan 1 orang (1%). Frekuensi mengenai kemampuan dalam beraktivitas sehari-hari untuk kategori biasa-biasa saja 64 orang (64%), memuaskan 30 orang (30%), dan sangat memuaskan 6 orang (6%). Untuk kemampuan tiap responden dalam bekerja menunjukkan frekuensi 54 orang (54%) untuk kategori biasa-biasa saja, memuaskan 34 orang (34%), dan sangat memuaskan 6 orang (6%). Distribusi frekuensi kepuasan terhadap diri sendiri

untuk kategori biasa-biasa saja 49 orang (49%), memuaskan 34 orang (34%), dan sangat memuaskan 14 orang (14%). Distribusi frekuensi hubungan personal maupun sosial untuk kategori biasa-biasa saja 46 orang (46%), sangat memuaskan 28 orang (28%), dan memuaskan 25 orang (25%). Frekuensi mengenai kepuasan seksual untuk kategori biasa-biasa saja 74 orang (74%), tidak memuaskan 9 orang (9%), dan kategori memuaskan dan sangat memuaskan didapatkan frekuensi yang sama yaitu masing masing 7 orang (7%), dan sangat tidak memuaskan 3 orang (3%). Distribusi frkuensi dukungan dari temateman responden untuk kategori biasa-biasa saja 35 orang (35%), sangat memuaskan 34 orang (34%), memuaskan 29 orang (29%), dan tidak memuaskan 2 orang (2%). Frekuensi mengenai kondisi tempat tinggal untuk kategori memuaskan 49 orang (49%), sangat memuaskan 26 orang (26%), biasa-biasa saja 24 orang (24%). Frekuensi untuk layanan kesehatan untuk kategori memuaskan 41 orang (41%), sangat memuaskan 28 orang (28%), biasa biasa saja 25 orang (25%), dan tidak memuaskan 6 orang (6%). Frekuensi mengenai transportasi yang digunakan sehari-hari untuk kategori memuaskan 38 orang (38%), biasa-biasa saja 36 orang (36%), sangat memuaskan 23 orang (23%), dan tidak memuaskan 3 orang (3%).

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Responden faktor perilaku

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Total
	STS	TS	N	S	SS	
D3	2 (2%)	16 (16%)	21 (21%)	33 (33%)	28 (28%)	100 (100%)
D4	0 (0%)	4 (4%)	40 (40%)	26 (26%)	30 (30%)	100 (100%)
D5	2 (2%)	32 (32%)	42 (42%)	14 (14%)	10 (10%)	100 (100%)
E1	1 (1%)	6 (6%)	44 (44%)	34 (34%)	15 (15%)	100 (100%)
E2	0 (0%)	7 (7%)	26 (26%)	45 (45%)	22 (22%)	100 (100%)

Keterangan :

D3 : Apakah anda rutin mengecek gula darah anda?

D4 : Apakah anda mencuci tangan sebelum meminum obat?

D5	:	Apakah anda rutin berolah raga 3-5 hari seminggu?
E1	:	Apakah pola makan anda lebih teratur disbanding sebelum adanya pandemi?
E2	:	Apakah anda mengalami adanya perubahan pada diri anda selama masa pandemi?
STS	:	Sangat tidak setuju
TS	:	Tidak setuju
N	:	Netral
S	:	Setuju
SS	:	Sangat setuju

Dari tabel 2.5 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan aspek faktor perilaku responden mengenai kerutinan cek gula darah untuk kategori setuju 33 orang (33%), sangat setuju 28 orang (28%), netral 21 orang (21%), tidak setuju 16 orang (16%), dan sangat tidak setuju 2 orang (22%). Frekuensi mengenai kepatuhan mencuci tangan sebelum mengonsumsi obat untuk kategori netral 40 orang (40%), sangat setuju 30 orang (30%), setuju 26 orang (26%). Dan tidak setuju 4 orang (4%). Frekuensi kerutinan berolah raga tiap minggu untuk kategori netral 42 orang (42%), tidak setuju 32 orang (32%), setuju 14 orang (14%), sangat setuju 10 orang (10%), dan sangat tidak setuju 2 orang (2%). Frekuensi pola makan dari tiap individu untuk kategori netral 44 orang (44%), setuju 34 orang (34%), sangat setuju 15 orang (15%), tidak setuju 6 orang (5%), dan sangat tidak setuju 1 orang (1%). Frekuensi perubahan pada diri tiap individu setelah pandemi untuk kategori setuju 45 orang (45%), netral 26 orang (26%), sangat setuju 22 orang (22%), dan tidak setuju 7 orang (7%).

B. Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan pada penderita diabetes melitus tipe 2 yang berdomisili Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui aplikasi *Google Form* yang berisikan kuesioner dari *World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF* yang telah divalidasi dan diakses oleh responden secara daring (dalam jaringan). Hal ini dilakukan karena kondisi pandemi COVID-19 yang tak kunjung berhenti, sehingga untuk mengurangi risiko penularan COVID-

19, peneliti tidak melakukan pengambilan data secara langsung. Data yang digunakan dalam kuesioner ini adalah data primer berupa kuesioner yang disebar ke penderita diabetes melitus tipe 2 yang berdomisili Kota Makassar.

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang pertama yaitu usia. Berdasarkan data, didapatkan frekuensi tertinggi penderita DM di Kota Makassar yaitu pada usia 51-60 tahun sebanyak 46 orang (46%). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari (DiPiro, 2020) bahwa faktor risiko penderita diabetes melitus adalah orang dengan usia lebih dari 45 tahun. (PERKENI, 2019) juga menyatakan orang dengan usia lebih dari 45 tahun harus dilakukan skrining DM, sebab intoleransi glukosa meningkat seiring dengan meningkatnya usia.

Pendidikan terakhir pasien DM di Kota Makassar paling banyak yaitu Sekolah Dasar sebanyak 44 orang dengan persentase 44%. (Arda et al., 2020) mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kualitas hidup. Individu yang memiliki pendidikan rendah cenderung berdiam diri dan kurang aktif dalam mencari informasi tentang manajemen perawatan, pengobatan, dan peningkatan kualitas hidup. Namun dengan demikian, orang berpendidikan tinggi pun belum tentu memiliki kualitas hidup yang tinggi, karena hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukannya bahwa terdapat responden yang berpendidikan tinggi namun kualitas hidupnya rendah.

Pada hasil penelitian ini didapatkan data bahwa penderita Diabetes Melitus di Kota Makassar banyak yang tidak bekerja, yaitu sebanyak 49 orang (49%). Dalam penelitiannya (Arda et al., 2020) mengatakan bahwa responden yang memiliki status bekerja baik itu PNS, pegawai swasta, wiraswasta ataupun petani maka akan memiliki banyak aktivitas fisik yang dilakukan di luar rumah. Berbeda dengan responden dengan status tidak bekerja akan menghabiskan sebagian

waktunya di dalam rumah dan cenderung kurang melakukan aktivitas fisik. (PERKENI, 2019) juga menyatakan bahwa individu dengan aktivitas fisik yang kurang merupakan faktor risiko diabetes melitus.

2. Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus di Kota Makassar

a. Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Apa Yang dipikirkan Tentang Kehidupan Responden Pada Empat Minggu Terakhir

Distribusi frekuensi kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 di Kota Makassar selama masa pandemi COVID-19 diperoleh frekuensi 53 orang (53%) untuk kategori cukup, 38 orang (38%) untuk kategori baik, dan 9 orang (9%) untuk kategori kurang.

b. Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Aspek Kesehatan Fisik

Berdasarkan hasil, diperoleh frekuensi kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 di Kota Makassar berdasarkan aspek kesehatan fisik sebagian besar masuk dalam kategori cukup dengan frekuensi 90 orang (90%) dan kategori baik 10 orang (10%).

c. Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Aspek Hubungan Sosial

Pada aspek hubungan sosial, sebagian besar penderita diabetes melitus tipe 2 diperoleh hasil 53 orang (53%) untuk kategori cukup, 38 orang (38%) untuk kategori baik, dan 9 orang (9%) untuk kategori kurang.

d. Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Aspek Lingkungan

Frekuensi kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 berdasarkan aspek lingkungannya, sebagian besar masuk dalam kategori cukup dengan frekuensi 62 orang (62%) dan 38 orang (38%) masuk dalam kategori baik.

e. Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Aspek Faktor Perilaku

Kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 berdasarkan aspek faktor perilaku didapatkan hasil untuk kategori cukup 90 orang (90%), dan 10 orang (10%) untuk kategori baik.

Berdasarkan hasil dari kelima aspek dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penderita diabetes melitus tipe 2 di Kota Makassar selama COVID-19 dapat dikatakan memiliki kualitas hidup yang baik karena seluruh aspek masuk dalam kategori yang sama, yaitu cukup baik. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh David Cella (Wicaksono & Fajriyah, 2018) penderita yang memiliki kualitas hidup tinggi atau baik jika kondisi dari seluruh aspeknya berada dalam keadaan seimbang. Seluruh aspek dikatakan seimbang jika seluruhnya termasuk dalam kategori yang sama.


Kesehatan adalah suatu yang penting dalam kualitas hidup, terutama bagi umat Islam. Umat Islam sebelum memulai sesuatu diwajibkan untuk memperhatikan dirinya. Kesehatan merupakan nikmat yang perlu dijaga. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadist:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابًا قَبْلَ هَرَمٍ مَكَ ، وَ صِحَّةً قَبْلَ سَقَمٍ ، وَ غِنًى قَبْلَ فَقْرٍ ،
 وَ فَرَاغًا قَبْلَ شُغْلٍ ، وَ حَيَاةً قَبْلَ مَوْتٍ

Artinya:

“Ambillah kesempatan lima (keadaan) sebelum lima (keadaan). (Yaitu) mudamu sebelum pikunmu, kesehatanmu sebelum sakitmu, cukup sebelum fakirmu, luang waktumu sebelum sibukmu, kehidupanmu sebelum matimu.” [HR Al Hakim di dalam Al Mustadrak; disisihkan oleh Syaikh Al Albani di dalam Shahih At Targib wat Targib 3/311, no. 3355, Penerbit Maktabul Ma’arif, Cet I, Th. 1421 H/2000 M]

Hadist di atas menjelaskan kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga diri dari sesuatu yang dapat menyebabkan kemudharatan atasnya, dengan cara senantiasa menjaga pola hidup sehat, lebih mengontrol makanan dan minuman agar tidak berlebihan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai evaluasi kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 di Kota Makassar selama masa pandemi COVID-19, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebanyak 100 responden yang diteliti pada penderita diabetes melitus tipe 2 sebagian besar dapat dikatakan memiliki kualitas hidup yang baik, hal ini dikarenakan seluruh aspek masuk dalam kategori yang sama, yaitu cukup. Pada aspek kesehatan fisik dan faktor perilaku diperoleh hasil yang sama untuk kategori cukup yaitu masing-masing 90 orang (90%), pada aspek hubungan sosial 53 orang (53%), dan aspek lingkungan sosial sebanyak 62 orang (62%).
2. Dilihat dari faktor perilaku selama pandemi COVID-19, mayoritas penderita diabetes melitus tipe 2 di Kota Makassar cukup paham bagaimana cara menghadapi pandemi.


B. Saran

Melalui penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang berperan dalam penelitian ini:

1. Bagi penderita diabetes melitus tipe 2, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan baik selama masa pandemi COVID-19 maupun setelah pandemi ini berakhir.
2. Untuk penyedia layanan kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan dan penanganan yang lebih baik lagi pada penderita diabetes melitus tipe 2 dengan mengayomi dan memberikan informasi yang lebih

detail ketika melakukan kunjungan maupun konsultasi bersama pasien mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat meningkatkan kualitas hidup pasien yang lebih baik lagi.

3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.



KEPUSTAKAAN

- ADA. (2020). Standards of medical care in diabetes—2020 abridged for primary care providers. *Clinical Diabetes*, 38(1), 10–38.
<https://doi.org/10.2337/cd20-as01>
- Afiyanti, Y. (1999). *Pendahuluan*. 1987.
- Alimehr, M., Malayen, S., Vafa, F. S., Tahmasebi, M. J., Nikbina, M., & Doostifar, K. (2021). The impact of coronavirus disease (COVID-19) on quality of life in diabetic patients. *Clinical Diabetology*, 10(3), 237–242.
<https://doi.org/10.5603/DK.a2021.0024>
- Arda, Z. A., Hanapi, S., Paramata, Y., & Ngobuto, A. R. (2020). Quality of life of diabetes mellitus and determinants in Gorontalo district. *Jurnal Promotif Preventif*, 3(1), 14–21. <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP>
- Azar, W. S., Njeim, R., Fares, A. H., Azar, N. S., Azar, S. T., El Sayed, M., & Eid, A. A. (2020). COVID-19 and diabetes mellitus: how one pandemic worsens the other. *Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders*, 21(4), 451–463. <https://doi.org/10.1007/s11154-020-09573-6>
- Davies, P. D. O. (2020). Multi-drug resistant tuberculosis. *CPD Infection*, 3(1), 9–12.
- DiPiro, J. T. (n.d.). *PAST EDITORS OF PHARMACOTHERAPY*.
- Goyena, R. (2019). Jurnal Ilmu Keperawatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- IDF. (2019). International Diabetes Federation. In *The Lancet* (Vol. 266, Issue 6881). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(55\)92135-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(55)92135-8)
- Jacob, D. E., & Sandjaya. (2018). Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan (Jnik). *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan (JNIK)*, 1, 1–16.
- Joensen, L. E., Madsen, K. P., Holm, L., Nielsen, K. A., Rod, M. H., Petersen, A. A., Rod, N. H., & Willaing, I. (2020). Diabetes and COVID-19: psychosocial consequences of the COVID-19 pandemic in people with diabetes in Denmark—what characterizes people with high levels of COVID-19-related worries? *Diabetic Medicine*, 37(7), 1146–1154.
<https://doi.org/10.1111/dme.14319>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Kesiapan Kementerian Kesehatan RI Dalam Menghadapi Outbreak Novel Coronavirus. *Kementerian Kesehatan RI*, 1–26.
<https://www.papdi.or.id/pdfs/817/dr Siti Nadia - Kemenkes RI.pdf>

- Kun'ain, U. I. A., Rahardjo, S. S., & Tamtomo, D. G. (2020). Meta-Analysis: The Effect of Diabetes Mellitus Comorbidity on the Risk of Death in Covid-19 Patients. *Indonesian Journal of Medicine*, 5(4), 368–377. <https://doi.org/10.26911/theijmed.2020.05.04.12>.
- Ma, R. C. W., & Holt, R. I. G. (2020). COVID-19 and diabetes. *Diabetic Medicine*, 37(5), 723–725. <https://doi.org/10.1111/dme.14300>
- PERKENI. (2019). Pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus tipe 2 dewasa di Indonesia 2019. *Perkumpulan Endokrinologi Indonesia*, 1–117. <https://pbperkeni.or.id/wp-content/uploads/2020/07/Pedoman-Pengelolaan-DM-Tipe-2-Dewasa-di-Indonesia-eBook-PDF-1.pdf>
- PERKENI. (2020). Pernyataan Resmi dan Rekomendasi Penanganan Diabetes Mellitus di era Pandemi COVID-19. *The Indonesian Society of Endocrinology*, 1–5.
- Sunnah, I., Pujiastuti, A., & Liyanovitasari. (2020). Upaya Peningkatan Dan Monitoring Obat , Kesehatan Fisik Serta Psikologis Pada Pasien Penyakit Kronis Selama Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Community Empowerment*, 133–138.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- WHO. (2011). Cerebral arterial gas embolism with delayed treatment and a fatal outcome in a 14-year-old diver. *Diving and Hyperbaric Medicine*, 41(1), 31–34.
- Wicaksono, S., & Fajriyah, N. N. (2018). *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIK) Vol XI, No 1, Maret 2018 ISSN 1978-3167, E-ISSN 2580-135X. XI(I)*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Pengambilan Data

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Komplek Jalan Sultan Alauddin No. 43 Makassar Telepon (0411) 868720 Faksimil(0411) 864922
Kampus II, Jalan H.M. Yasin Limpo No. 26-Gowa Telepon 1300388 (041) 3941879 faksimil(041) 8221400
Email: fak.un-alauddin.ac.id

Nomor : B-345 / Un.06/FRK/PP.00.9/09/2021 Gowa, 14 September 2021
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Andi Fitra Febrianti Syam
N I M : T0100117071
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Farmasi
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Kost Amari, Villa Samata, Jl. H.M. Yasin Limpo

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Evaluasi Kualitas Hidup Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 Selama Masa Pandemi Covid-19".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Apt. Alifa Putri Febrianti, S.Farm., M.Farm.Klin
2. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Sulawesi Selatan, terhitung mulai tanggal 20 September 2021 s/d 31 Oktober 2021

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam
Kepala Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,



Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Pengambilan Data

 	
PERNYATAAN PERIZINAN PENELITIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN	
Nomor : 2190/MS.01/PTSP/2021	Kepada/Yth. Wakilnya Makassar
Lampiran :	
Perihal : izin Penelitian	
di Tempat	
Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UN Atsuddi Makassar Nomor B-0482/TK/KOP/00.009/0021 tanggal 21 September 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:	
Nama : ANDI FIRSA FEBRIANTI SYAM Nomor Pokok : 70100117074 Program Studi : Farmasi Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1) Alamat : J. H. M. Yasin Lingsi No. 36, Sarung Gowa	
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "EVALUASI KUALITAS HEMOGLOBIN A1C PADA PENYAKIT DIABETES MELITUS TIPE II SELAMA MASA PANDEMI COVID-19" Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 September s.d 20 Oktober 2021	
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian. Dokumen ini diperuntukkan secara eksklusif dan hanya ini dapat digunakan sehubungan dengan menggunakan pendaftaran Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Dibuatkan di Makassar Pada tanggal : 29 September 2021	
A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu	
 H. H. DENNY IRAWAN SAARD, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya Np : 19629024 199003 1 003	
Peduli PT 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UN Atsuddi Makassar di Makassar 2. Tempat	
Nomor PTSP 2021-021	
 Jl. Hologorelle No.5 Tello (0411) 811017 Fax. (0411) 048038 Website : http://www.sulawesi.go.id Email : ptsp@sulawesi.go.id Telepon 9023	
Nomor : 2190/MS.01/PTSP/0021 Halaman : 2 (2)	
Lampiran Surat Izin Penelitian Kepada Yth :	

Lampiran 3. Surat Izin Pengambilan Data Dinas Kesehatan Kota Makassar

DOKUMEN KESEHATAN NO. 101/1011/2021
 FAX: (0411) 887738

Surat Izin	32/10 - 2021
Nomor	3720
Diterbitkan Kepada	

1. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
 1. Subag Umum dan Kepegawaian
 2. Subag Keuangan
 3. Subag Perencanaan dan Pelaporan

2. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer & Tradisional
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Seksi Penyakit dan Pencegahan Mulu

3. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN
 1. Seksi Kelembagaan
 2. Seksi Ases Kesehatan Persebaran Kesehatan & Jumlah Kesehatan
 3. Seksi SDM Kesehatan dan Regulasi Kesehatan

4. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT
 1. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular
 2. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa
 3. Seksi Surveilans dan Imunisasi

5. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga

VI. SEKRETARIS KORPRI

12/10
 100/1011/2021



Lampiran 4. Surat Izin Pengambilan Data Dinas Kesehatan Kota Makassar

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
 Telp +62411 - 3615007 Fax +62411 - 3615007
 Email : Keshang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 19 Oktober 2021

Kepada
Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR

DI-
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/3335 -B/BKBP/X/2021

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbit Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor **21604/S.01/PTSP/2021**, Tanggal **29 September 2021** perihal Izin Penelitian

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Makassar menyetujui dan membenarkan Izin Penelitian kepada :

Nama : **ANDI FITRA FEBRIANTI SYAM**
NIM / Jurusan : **70100117071 / Farmasi**
Pekerjaan : **Mahasiswa (S1) UIN**
Tanggal pelaksanaan : **19 s/d 30 Oktober 2021**
Jenis Penelitian : **Skripsi**
Alamat : **Jl. St. Alauddin No.259, Makassar**
Judul : **"EVALUASI KUALITAS HIDUP PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE SELAMA MASA PANDEMI COVID-19"**

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

WALIKOTA MAKASSAR
 KERALA BADAN KESBANGPOL
 u.d
 KEBERTARIS

DR. HARI, S.P., S.H., M.H., M.Si
 Pembina Tingkat II V b
 19730607 199311 1 001

Tembusan :
 1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel di Makassar (sebagai laporan)
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan)
 4. Kepala Unit Pelaksanaan Tugas/TPT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

Lampiran 5. Kode Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No.A.057/KEPK/FKIK/VI/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : Anah Fitra Febrianti Syam
 Principal Investigator

Nama institusi : UIN Alauddin Makassar
 Name of the Institution

Dengan judul:
 Title

"Evaluasi Kualitas Hidup Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 Selama Masa Pandemi Covid-19"

"Evaluation Quality of Life Diabetes Mellitus Type 2 Patients During the Covid-19 Pandemic"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Penterimaan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bijakan-Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022.

This declaration of ethics applies during the period July 26, 2021 until July 26, 2022.

July 26, 2021
 Professor and Chairperson,

 DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 6. Naskah Penjelasan**NASKAH PENJELASAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI
SUBJEK PENELITIAN**

Assalamualikum wr.wb

Saya Andi Fitra Febrianti Syam, NIM : 70100117071 mahasiswa program studi (Farmasi) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul (Evaluasi Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Selama Masa Pandemi Covid-19) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 selama masa pandemi covid-19.

Saya membutuhkan waktu dan kesediaan saudara(i) agar bersedia mengisi lembar kuesioner untuk menjawab pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian saya. Saya akan menjamin jawaban anda akan dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan. Hanya peneliti yang akan mengetahui informasi ini. Anda berhak menolak jika tidak bersedia menjadi informan. Namun sangat kami harapkan kesediaan anda sekalian untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan kami mengharapkan jawaban jujur anda atas pertanyaan yang kami berikan. Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban para informan jika bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

- Demi menjaga kerahasiaan informan, peneliti tidak mencantumkan nama informan, tetapi lembar tersebut hanya di diberi simbol atau kode tertentu, sebagai pengganti identitas informan.

- keikutsertaan secara sukarela. informan dapat mengundurkan diri kapan saja dan tidak mempengaruhi kualitas.
- Pengisian kuesioner di lakukan kepada informan sekitar 10-15 menit untuk mengetahui kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 selama masa pandemi covid-19.

Apabila informan ingin mengundurkan diri selama proses penelitian ini berlangsung atau jika ada hal – hal yang kurang berkenan maka responden dapat mengungkapkan langsung atau menghubungi saya. Jika bersedia mengikuti penelitian ini, silahkan menandatangani lembar persetujuan informan. Apabila terdapat hal – hal yang kurang jelas, dapat menghubungi saya melalui nomor ini 0853 3746 0144. Demikian penyampaian dari saya, atas segala perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Gowa, 03 Juni 2021

Andi Fitra Febrianti Syam

Penanggung jawab : Apt. Alifia Putri Febriyanti, S,Farm., M.Farm., Klin.
Peneliti utama : Andi Fitra Febrianti Syam
Nama : Andi Fitra Febrianti Syam
Alamat : Desa Dalam, Dusun Telaga Bakti, Kecamatan Alas
No. HP : 0853 3746 0144

Lampiran 7. Informend Consent (Persetujuan responden)

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN
SETELAH MENDAPAT PENJELASAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (inisial) :

Usia :

Alamat :

No. Telepon :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian (Judul penelitian) Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gowa, Maret 2019


Informan

()

Penanggung jawab : Apt. Alifia Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm., Klin.

Nama : Andi Fitra Febrianti Syam

Alamat : Desa Dalam, Dusun Telaga Bakti, Kecamatan Alas
No. HP : 0853 3746 0144



Lampiran 8. Kuesioner Penelitian

**KUESIONER KUALITAS HIDUP dan KUESIONER FAKTOR
PSIKOSOSIAL & PERILAKU.**

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Alamat :
4. No. Telp./Hp :
5. Pendidikan Terakhir :
 - a. Tidak Sekolah
 - b. SD dan Sederajat
 - c. SMP dan Sederajat
 - d. SMA dan Sederajat
 - e. Perguruan Tinggi
6. Pekerjaan :
 - a. Tidak Bekerja
 - b. Karyawan Swasta
 - c. PNS
 - d. Lainnya...

B. Kuesioner Kualitas Hidup

No.	Pertanyaan	Sangat Buruk	Buruk	Biasa-Biasa Saja	Baik	Sangat Baik
1.	Bagaimana menurut anda kualitas hidup anda?					

No.	Pertanyaan	Tdk Sama Sekali	Sedikit	Sedang	Seringkali	Sepenuh ya Dialami
2.	Apakah anda memiliki vitalitas yang cukup untuk beraktivitas sehari?					
3.	Apakah anda dapat menerima penampilan tubuh anda?					
4.	Apakah anda memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan anda?					
5.	Seberapa jauh ketersediaan informasi bagi kebutuhan anda dari hari ke hari?					
6.	Seberapa sering anda memiliki kesempatan untuk bersenang-senang/rekreasi?					

No.	Pertanyaan	Sangat Buruk	Buruk	Biasa-biasa saja	Baik	Sangat Baik
7.	Seberapa baik kemampuan anda dalam bergaul?					

No.	Pertanyaan	Sangat tdk memuaskan	Tdk memuaskan	Biasa-biasa saja	Memuaskan	Sangat memuaskan
8.	Seberapa puaskah anda dg tidur anda?					
9.	Seberapa puaskah anda dg kemampuan anda untuk menampilkan aktivitas kehidupan anda sehari-hari?					
10.	Seberapa puaskan anda dg kemampuan anda untuk bekerja?					
11.	Seberapa puaskah anda terhadap diri anda?					
12.	Seberapa puaskah anda dengan hubungan personal/sosial anda?					
13.	Seberapa puaskah anda dengan kehidupan seksual anda?					
14.	Seberapa puaskah anda dengan dukungan yang anda peroleh dari teman anda?					
15.	Seberapa puaskah anda dg					

	kondisi tempat anda tinggal saat ini?					
16.	Seberapa puaskah anda dgn akses anda pd layanan kesehatan?					
17.	Seberapa puaskah anda dg transportasi yang harus anda jalani?					

No.	Pertanyaan	Sangat tidak setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1.	Apakah anda rutin mengecek gula darah anda?					
2.	Apakah anda mencuci tangan sebelum meminum obat?					
3.	Apakah anda rutin berolah raga 3-5 hari seminggu?					
4.	Apakah pola makan anda lebih teratur dibanding sebelum adanya pandemi?					
5.	Apakah anda mengalami adanya perubahan pada diri anda selama masa pandemi?					

Lampiran 9. Hasil Skoring Data Responden Uji Validitas

Responden	Nilai Hitap J1	Total	Responden	Aspek Kesehatan Fisik					Total	Responden	Aspek Hubungan Sosial		Total	Responden	Aspek Lingkungan Sosial								Total	
				A2	A3	A4	A5	A6			A7	B1			B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4		C5
1	4	4	1	3	5	4	4	4	20	1	5	5	1	3	4	4	5	5	3	5	1	5	5	44
2	4	4	2	3	4	5	4	3	17	2	4	4	2	3	3	4	4	3	3	5	1	3	4	35
3	4	4	3	3	5	4	5	4	21	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
4	2	2	4	3	5	4	3	3	15	4	3	3	4	3	3	4	5	3	3	3	4	4	4	36
5	4	4	5	4	3	4	3	3	17	5	3	3	5	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	32
6	2	2	5	3	3	2	2	1	11	5	3	3	5	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	33
7	4	4	7	4	3	3	4	2	15	1	3	3	3	3	3	4	2	3	3	4	1	4	4	34
8	4	4	3	2	4	3	3	2	14	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	37
9	4	4	3	2	5	3	3	3	11	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	5	3	4	4	42
10	4	4	10	4	4	4	4	3	33	10	4	4	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
11	2	2	11	3	4	3	3	2	14	11	4	4	11	2	3	2	2	3	3	4	1	4	3	33
12	4	4	12	3	5	5	4	2	17	12	3	3	12	4	5	5	5	3	3	3	3	3	3	42
13	4	4	13	4	4	4	4	2	13	13	3	3	13	3	4	4	4	3	4	1	4	3	3	37
14	2	2	14	3	3	3	3	3	15	14	3	3	14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
15	2	2	15	3	3	3	3	3	13	15	3	3	15	4	4	3	4	1	1	3	3	3	3	32
16	4	4	16	4	4	4	4	4	20	16	3	3	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
17	3	3	17	3	3	3	3	2	14	17	3	3	17	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	31
18	4	4	18	4	5	4	5	3	21	18	3	3	18	3	3	3	3	4	2	3	1	4	4	30
19	4	4	19	4	5	4	5	4	23	19	3	3	19	3	3	3	3	4	2	3	1	4	4	33
20	2	2	20	3	3	3	4	4	17	20	4	4	20	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	39
21	2	2	21	2	2	2	2	1	14	21	3	3	21	2	1	3	4	3	4	3	4	3	4	38
22	3	3	22	3	3	3	3	3	15	22	3	3	22	3	3	3	4	4	3	4	1	3	3	32
23	4	4	23	3	5	3	3	2	15	23	3	3	23	4	4	4	3	4	2	3	1	3	3	38
24	1	1	24	1	1	1	1	1	5	24	1	1	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
25	3	3	25	2	2	4	3	2	11	25	3	3	25	2	2	2	2	3	2	4	4	3	4	32
26	2	2	26	3	3	4	3	3	16	26	3	3	26	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	38
27	4	4	27	4	3	3	4	3	21	27	4	4	27	2	4	3	4	3	4	4	4	3	3	38
28	3	3	28	3	4	4	3	2	16	28	3	3	28	4	3	3	4	3	3	4	1	3	3	34
29	4	4	29	3	4	3	3	4	17	29	4	4	29	4	4	4	4	3	3	4	1	4	4	39
30	2	2	30	2	4	3	3	3	15	30	4	4	30	1	4	3	2	4	3	4	1	4	3	34

Responden	Faktor Perilaku					Total
	D3	D4	D5	E1	E2	
1	4	3	5	3	4	19
2	2	4	2	3	3	14
3	5	5	4	4	4	22
4	4	4	2	4	5	19
5	3	4	3	3	4	17
6	2	4	2	2	4	14
7	3	5	3	4	3	18
8	3	5	3	3	3	17
9	4	4	4	4	4	20
10	4	5	4	3	3	19
11	4	3	2	3	4	16
12	2	3	2	3	3	13
13	3	4	2	3	3	15
14	3	3	3	3	3	15
15	3	3	3	3	4	16
16	3	4	4	3	2	16
17	4	3	1	1	3	12
18	3	5	3	3	3	17
19	3	5	3	3	3	17
20	4	3	3	4	4	18
21	5	1	1	1	5	13
22	3	4	2	3	3	15
23	3	3	3	3	3	15
24	1	1	1	1	1	5
25	4	3	2	4	4	17
26	4	4	2	4	5	19
27	4	3	3	3	4	17
28	4	5	3	4	4	20
29	3	4	3	4	4	18
30	4	4	3	3	3	17

Lampiran 10. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,931	22

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	71,27	143,099	,647	,927
B5	71,40	147,145	,495	,929

C1	70,70	137,872	,693	,926
C2	71,13	143,430	,586	,928
C3	71,20	143,062	,639	,927
C4	71,90	143,610	,566	,928
C5	71,13	142,464	,633	,927
D1	71,47	145,085	,598	,927
D2	71,33	141,954	,652	,926
D3	71,17	141,730	,671	,926
D4	70,87	139,361	,640	,927
D5	71,30	144,562	,547	,928
E1	71,53	146,809	,442	,930
E2	71,03	144,378	,602	,927
E3	70,57	142,254	,685	,926
E4	70,97	140,861	,800	,924
E5	70,97	144,171	,659	,927
F2	71,23	145,909	,473	,930
F3	70,90	143,955	,466	,930
F5	71,90	140,921	,665	,926
G1	71,53	144,533	,555	,928
G2	71,10	147,748	,400	,931



Lampiran 11. Data Hasil Penelitian

Responden	Peningkatan kemampuan Kualitas Hidup		Total	Aspek Kesehatan Fisik					Total	Responden	Aspek Kesejahteraan Sosial		Total	Responden	Aspek Lingkungan Sosial									Total
	A1	A2		A1	A2	A3	A4	A5			A6	A7			A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	
1	3	3	3	1	4	4	3	4	2	17	1	2	3	3	4	4	3	4	4	3	37			
2	3	3	3	2	4	4	3	3	2	18	1	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	38		
3	3	3	3	2	3	3	3	4	2	18	1	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	38		
4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	13	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	32		
5	4	4	4	3	4	3	4	2	4	14	1	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	34		
6	4	4	4	4	4	5	3	4	4	22	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	46		
7	3	3	3	3	3	3	3	3	1	18	1	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	33		
8	3	3	3	3	3	4	3	4	4	17	1	2	3	3	4	4	3	4	3	3	3	44		
9	4	4	4	4	4	3	3	3	4	24	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	50		
10	3	3	3	18	2	3	3	3	4	13	13	4	4	18	4	3	4	4	3	4	4	39		
11	3	3	3	11	3	3	3	3	2	22	11	3	3	11	4	4	4	4	3	3	3	45		
12	4	4	4	12	3	3	4	3	2	14	12	4	4	12	3	3	4	3	4	3	4	34		
13	3	3	3	13	3	4	3	4	2	13	13	3	3	13	3	3	3	3	3	3	3	32		
14	3	3	3	14	3	3	3	3	4	20	14	4	4	14	2	4	4	3	3	3	3	44		
15	3	3	3	15	3	3	3	4	4	17	15	3	3	15	4	3	4	4	3	4	4	33		
16	4	4	4	14	4	4	4	3	2	14	14	3	3	14	3	3	3	3	3	3	3	30		
17	3	3	3	17	3	4	3	3	4	18	17	2	2	17	2	2	2	2	2	2	2	31		
18	4	4	4	18	3	3	3	3	4	18	18	4	4	18	3	4	4	4	3	3	3	35		
19	3	3	3	19	3	3	3	4	4	13	19	3	3	19	3	3	3	3	3	4	4	32		
20	4	4	4	20	3	3	3	3	2	14	20	4	4	20	4	4	4	3	3	3	3	34		
21	3	3	3	21	4	3	3	3	3	22	21	2	2	21	3	3	3	3	3	3	3	48		
22	3	3	3	21	3	3	3	2	4	14	21	4	4	21	3	3	3	3	4	4	4	34		
23	3	3	3	23	3	4	3	3	3	18	23	3	3	23	4	4	3	3	3	3	3	42		
24	4	4	4	24	3	3	3	3	4	18	24	4	4	24	4	3	4	4	3	4	4	33		
25	3	3	3	25	2	3	3	3	4	15	25	3	3	25	3	4	4	4	3	3	4	40		
26	4	4	4	26	3	3	3	4	4	14	26	3	3	26	4	3	4	3	3	3	3	37		
27	3	3	3	27	3	3	4	4	3	21	27	3	3	27	3	4	4	3	4	3	3	34		
28	3	3	3	28	4	4	4	4	2	14	28	3	3	28	4	3	4	4	3	4	4	34		
29	3	3	3	29	4	4	4	3	3	17	29	3	3	29	2	4	4	3	3	4	3	37		
30	3	3	3	30	4	4	4	3	2	17	30	3	3	30	2	4	4	3	4	3	3	37		

11	3	3	31	4	4	4	4	5	19	31	3	3	31	2	1	4	5	2	4	1	5	1	5	40
12	4	4	32	3	5	3	5	5	19	32	5	5	32	2	1	4	5	2	4	1	5	1	5	40
13	2	2	33	3	4	4	4	1	19	33	4	4	33	2	4	4	5	1	4	1	5	2	4	40
14	6	3	34	4	2	4	6	2	19	34	3	6	34	2	1	4	5	2	4	1	5	1	4	41
15	5	2	35	3	3	4	4	3	19	35	2	5	35	2	1	3	5	1	3	1	5	1	5	44
16	5	3	36	3	2	3	5	3	20	36	3	3	36	3	1	3	5	1	3	1	5	1	5	50
17	6	3	37	3	3	3	3	3	19	37	2	3	37	2	1	3	5	1	3	1	5	1	5	50
18	2	2	38	3	2	3	2	1	9	38	2	2	38	4	1	3	4	5	3	3	5	1	5	42
19	3	3	39	3	2	3	3	1	19	39	2	2	39	1	1	3	4	5	1	3	2	3	4	54
20	2	3	40	3	2	4	2	2	19	40	5	2	40	4	1	2	5	2	2	1	2	2	2	42
21	4	4	41	4	3	4	4	4	21	41	4	4	41	4	1	4	4	4	3	3	5	5	4	44
22	2	3	42	3	2	3	2	4	15	42	4	4	42	2	1	2	5	2	2	2	4	4	2	58
23	4	4	43	4	4	4	4	4	20	43	5	5	43	3	1	4	4	5	2	2	4	5	4	44
24	4	4	44	4	4	2	4	2	17	44	5	2	44	4	1	4	4	5	2	2	4	4	4	41
25	2	2	45	2	2	2	4	2	15	45	5	2	45	4	1	2	2	2	2	4	4	2	2	51
26	3	2	46	2	2	3	4	2	18	46	2	2	46	2	1	2	5	2	2	4	4	4	1	51
27	2	2	47	2	2	2	5	2	14	47	5	2	47	2	1	2	5	2	2	2	4	4	1	60
28	3	2	48	3	4	4	4	4	19	48	4	4	48	4	1	3	4	4	2	4	4	4	4	48
29	3	2	49	3	2	3	3	2	15	49	2	2	49	3	1	2	2	2	2	4	2	2	2	58
30	2	2	50	3	2	3	2	2	15	50	3	2	50	3	1	2	2	1	2	4	4	2	2	52
31	3	2	51	2	3	3	3	2	15	51	2	2	51	2	1	3	3	2	2	2	3	3	3	58
32	2	2	52	2	2	2	2	2	12	52	2	2	52	4	1	2	2	2	2	1	2	2	2	56
33	2	2	53	2	2	2	2	2	12	53	2	2	53	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	58
34	2	2	54	2	2	3	4	4	18	54	2	2	54	3	1	2	2	2	2	2	3	2	4	51
35	4	4	55	3	3	4	3	4	15	55	4	4	55	4	1	4	4	4	3	4	3	3	4	54
36	2	2	56	2	2	2	2	4	12	56	2	2	56	3	1	2	2	2	2	3	2	2	2	46
37	3	2	57	2	2	2	2	2	12	57	5	2	57	3	1	2	5	3	3	3	3	3	3	58
38	4	4	58	2	2	3	4	4	17	58	2	2	58	4	1	3	2	2	2	3	4	2	2	54
39	3	2	59	4	3	3	3	2	15	59	2	2	59	2	1	2	3	2	2	3	4	4	3	52
40	5	2	60	4	2	3	4	2	18	60	2	2	60	2	1	2	5	2	2	3	3	1	2	58
41	2	2	61	2	2	4	4	4	18	61	4	4	61	4	1	2	2	2	2	3	4	2	2	51
42	3	2	62	4	2	3	4	4	18	62	4	4	62	3	1	2	2	2	2	3	4	4	2	53
43	6	3	63	3	3	4	3	4	19	63	3	3	63	3	1	3	3	1	3	3	4	4	3	51
44	2	2	64	2	2	3	2	4	18	64	2	2	64	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	58
45	3	2	65	2	2	2	2	4	15	65	4	4	65	4	1	2	2	2	2	2	3	4	4	58



Responden	Aspek Lingkungan Sosial										Total	Responden	Faktor Perilaku					Total
	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2			D3	D4	D5	E1	E2	
1	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	37	1	2	4	4	3	4	17
2	3	3	3	3	4	4	3	5	5	5	38	2	4	5	4	4	4	21
3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	2	32	3	4	3	2	2	2	13
4	2	3	2	3	3	3	4	4	4	4	32	4	4	4	3	4	3	18
5	3	3	3	4	3	2	3	4	5	3	33	5	4	4	3	4	2	17
6	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	40	6	4	4	3	4	4	19
7	3	3	3	3	3	3	4	5	4	4	35	7	5	5	3	3	5	21
8	3	4	4	5	5	4	4	5	5	5	44	8	4	3	3	5	4	19
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	9	3	3	1	3	3	13
10	4	3	2	4	4	2	5	4	4	4	36	10	4	4	2	3	2	15
11	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	45	11	3	3	2	3	3	14
12	3	3	4	5	4	1	4	4	2	4	34	12	4	5	3	4	4	20
13	3	3	3	2	3	3	5	5	4	5	36	13	5	5	3	2	5	20
14	2	4	4	5	5	5	5	5	3	5	43	14	4	5	3	3	4	19
15	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	38	15	4	3	3	2	3	15
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	16	4	4	2	4	4	18
17	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	31	17	4	4	3	4	3	18
18	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	35	18	3	3	3	3	3	15
19	3	3	3	3	3	1	3	4	4	2	29	19	2	3	2	2	3	12
20	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	34	20	5	3	2	3	4	17
21	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	48	21	5	5	4	4	2	20
22	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	34	22	5	4	3	4	3	19
23	4	4	3	3	3	5	5	5	5	5	42	23	5	4	3	5	5	22
24	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	37	24	5	5	3	3	3	19
25	5	4	4	4	4	2	5	4	4	4	40	25	4	5	3	3	3	18
26	4	3	4	5	3	2	5	4	4	3	37	26	5	3	4	3	5	20
27	5	4	4	3	4	2	5	4	4	3	38	27	5	5	5	4	3	22
28	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	38	28	4	4	3	4	2	17
29	2	4	4	2	4	3	4	5	5	4	37	29	2	3	5	3	4	17
30	2	4	4	2	4	3	4	5	5	4	37	30	2	3	5	3	4	17

31	2	3	4	5	5	4	5	5	5	5	43	31	2	5	4	5	5	21
32	5	3	4	5	5	4	5	5	5	5	46	32	1	2	2	5	4	14
33	5	4	4	5	5	4	2	5	5	4	43	33	1	4	2	5	4	16
34	2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	41	34	2	4	5	2	5	18
35	2	5	5	5	5	2	5	5	5	5	44	35	5	5	5	5	5	25
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	36	5	5	5	5	3	23
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	37	5	5	5	5	5	25
38	4	3	3	4	5	3	5	5	5	5	42	38	4	5	5	5	5	24
39	1	3	2	3	5	1	5	5	5	4	34	39	5	5	2	4	4	20
40	4	3	3	5	5	2	5	5	5	5	42	40	5	5	3	5	5	23
41	4	4	4	4	5	3	5	5	5	5	44	41	5	5	4	4	4	22
42	3	3	2	3	2	3	2	4	4	2	28	42	3	4	2	4	3	16
43	5	4	4	4	5	3	5	4	5	5	44	43	5	5	5	5	5	25
44	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	41	44	4	4	4	5	5	22
45	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	33	45	3	2	2	4	2	13
46	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	32	46	2	2	2	4	2	12
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	47	2	2	2	4	4	14
48	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	36	48	4	3	2	4	3	16
49	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	30	49	2	3	2	3	3	13
50	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	32	50	4	3	2	4	3	16
51	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	30	51	3	3	2	3	4	15
52	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	30	52	2	3	2	3	3	13
53	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	28	53	2	3	2	3	3	13
54	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31	54	2	3	2	3	3	13
55	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	36	55	4	3	3	3	3	16
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	56	4	3	2	3	4	16
57	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29	57	3	3	2	3	4	15
58	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	32	58	2	3	2	3	3	13
59	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	32	59	4	3	2	3	4	16
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	60	2	4	2	3	4	15
61	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	32	61	3	3	3	3	3	15
62	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	32	62	2	3	2	3	4	14
63	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31	63	3	3	2	4	4	16
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	64	3	3	3	3	3	15
65	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	33	65	4	3	4	3	4	18

66	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	32	66	4	4	3	4	4	19
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	67	2	3	2	3	4	14
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	68	3	3	4	3	4	17
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	69	4	4	3	3	4	18
70	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	34	70	4	3	3	3	4	17
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	71	3	3	3	3	4	16
72	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	34	72	3	3	3	3	4	16
73	3	3	5	5	4	3	4	4	4	3	38	73	4	4	4	4	4	20
74	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39	74	4	4	4	4	5	21
75	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	36	75	4	4	4	4	4	20
76	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39	76	4	4	4	4	5	21
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	77	4	4	3	3	4	18
78	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33	78	4	4	3	3	4	18
79	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	34	79	3	3	3	3	4	16
80	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39	80	4	4	3	4	4	19
81	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39	81	3	3	3	3	4	16
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	82	3	3	3	3	3	15
83	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	32	83	3	3	3	4	4	17
84	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	34	84	3	3	2	3	4	15
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	85	3	3	3	3	3	15
86	4	5	4	4	3	3	5	4	4	4	40	86	3	4	2	3	4	16
87	5	3	3	4	5	3	4	4	4	4	39	87	3	3	3	3	3	15
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	88	5	5	1	1	5	17
89	4	3	3	4	5	3	5	5	5	5	42	89	4	5	5	5	5	24
90	4	3	3	4	5	2	5	5	5	5	41	90	5	5	2	4	5	21
91	4	4	3	3	5	2	5	5	5	5	41	91	5	5	2	4	5	21
92	5	4	4	4	5	3	5	5	5	5	45	92	5	5	4	4	5	23
93	4	4	3	4	5	3	5	4	4	4	40	93	5	5	3	3	4	20
94	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	41	94	5	5	3	4	4	21
95	4	4	3	4	5	3	5	4	4	4	40	95	5	5	3	4	4	21
96	4	4	4	4	5	3	5	4	5	4	42	96	5	5	3	4	5	22
97	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	41	97	5	4	3	5	5	22
98	4	4	3	4	5	3	5	4	4	4	40	98	5	5	3	5	5	23
99	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	41	99	5	5	3	4	4	21
100	5	4	4	4	5	3	5	4	5	5	44	100	5	5	3	2	4	19

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 12. Frekuensi item pertanyaan

A1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	9	9,0	9,0	9,0
	3	53	53,0	53,0	62,0
	4	31	31,0	31,0	93,0
	5	7	7,0	7,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

A2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2,0	2,0	2,0
	2	28	28,0	28,0	30,0
	3	40	40,0	40,0	70,0
	4	25	25,0	25,0	95,0
	5	5	5,0	5,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

A3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	6	6,0	6,0	6,0
	3	49	49,0	49,0	55,0
	4	30	30,0	30,0	85,0
	5	15	15,0	15,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

A4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	6	6,0	6,0	6,0

3	49	49,0	49,0	55,0
4	35	35,0	35,0	90,0
5	10	10,0	10,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

A5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1,0	1,0	1,0
	2	9	9,0	9,0	10,0
	3	34	34,0	34,0	44,0
	4	46	46,0	46,0	90,0
	5	10	10,0	10,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

B1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	6,0	6,0	6,0
	2	38	38,0	38,0	44,0
	4	49	49,0	49,0	93,0
	5	7	7,0	7,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

B2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,0	1,0	1,0
	3	39	39,0	39,0	40,0
	4	28	28,0	28,0	68,0
	5	32	32,0	32,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

B3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1,0	1,0	1,0
	2	7	7,0	7,0	8,0
	3	38	38,0	38,0	46,0
	4	42	42,0	42,0	88,0
	5	12	12,0	12,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

B4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	64	64,0	64,0	64,0
	4	30	30,0	30,0	94,0
	5	6	6,0	6,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

B5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	6	6,0	6,0	6,0
	3	54	54,0	54,0	60,0
	4	34	34,0	34,0	94,0
	5	6	6,0	6,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

C1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	3,0	3,0	3,0
	3	49	49,0	49,0	52,0
	4	34	34,0	34,0	86,0
	5	14	14,0	14,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

C2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,0	1,0	1,0
	3	46	46,0	46,0	47,0
	4	25	25,0	25,0	72,0
	5	28	28,0	28,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

C3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3,0	3,0	3,0
	2	9	9,0	9,0	12,0
	3	74	74,0	74,0	86,0
	4	7	7,0	7,0	93,0
	5	7	7,0	7,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

C4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2,0	2,0	2,0
	3	35	35,0	35,0	37,0
	4	29	29,0	29,0	66,0
	5	34	34,0	34,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

C5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,0	1,0	1,0
	3	24	24,0	24,0	25,0

	4	49	49,0	49,0	74,0
	5	26	26,0	26,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

D1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	6	6,0	6,0	6,0
	3	25	25,0	25,0	31,0
	4	41	41,0	41,0	72,0
	5	28	28,0	28,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

D2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	3,0	3,0	3,0
	3	36	36,0	36,0	39,0
	4	38	38,0	38,0	77,0
	5	23	23,0	23,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

D3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2,0	2,0	2,0
	2	16	16,0	16,0	18,0
	3	21	21,0	21,0	39,0
	4	33	33,0	33,0	72,0
	5	28	28,0	28,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

D4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	4,0	4,0	4,0
	3	40	40,0	40,0	44,0
	4	26	26,0	26,0	70,0
	5	30	30,0	30,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

D5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2,0	2,0	2,0
	2	32	32,0	32,0	34,0
	3	42	42,0	42,0	76,0
	4	14	14,0	14,0	90,0
	5	10	10,0	10,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	


E1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1,0	1,0	1,0
	2	6	6,0	6,0	7,0
	3	44	44,0	44,0	51,0
	4	34	34,0	34,0	85,0
	5	15	15,0	15,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

E2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	7	7,0	7,0	7,0
	3	26	26,0	26,0	33,0
	4	45	45,0	45,0	78,0
	5	22	22,0	22,0	100,0

Total	100	100,0	100,0
-------	-----	-------	-------



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andi Fitra Febrianti Syam, atau kerap disapa Febby merupakan anak sulung dari pasangan Ir. H. Syamri dan Hj. Nilawati yang lahir di Alas pada tanggal 15 Februari 1999. Saat ini penulis tinggal di Villa Samata Jl. H.M Yasin Limpo, Gowa, Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2003 penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pertama di Taman Kanak-kanak Dharma Bakti, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 07 Alas pada tahun 2005. Setelah menempuh pendidikan dasar selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2011 penulis kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 01 Alas. Setelah lulus pada tahun 2014, penulis kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA Negeri 01 Alas hingga tahun 2017. Dan pada tahun itu juga, penulis melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi dan dinyatakan lulus di Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selama berkuliah, penulis pernah aktif dalam lembaga kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi periode 2018/2019, periode 2019/2020, dan periode 2020/2021. Selain itu, penulis juga aktif dalam komunitas ISO Visual Art pada tahun 2018 hingga saat ini.

