

**ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN KEMATIAN JANIN
DALAM RAHIM (KJDR) DI RSIA ANANDA MAKASSAR
TAHUN 2021**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

APRIANI SAHID

NIM : 70600118020

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apriani Sahid

NIM : 70600118020

Tempat/Tgl Lahir : Luwu, 03 April 2000

Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Kompleks Grand Tamalate No.03, Makassar

Judul : Analisis Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin
Dalam Rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar
Tahun 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Februari 2022

Penyusun



Apriani Sahid

NIM:70600118020

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Judul : Analisis Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di
RSIA Ananda Makassar Tahun 2021

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diajukan Dalam Seminar Hasil Karya
Tulis Ilmiah (KTI) Mahasiswa Kedokteran


Makassar, 18 Februari 2022

Pembimbing 1



dr. Rini Fitriani, M Kes

Pembimbing 2



dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021, yang disusun oleh Apriani Sahid, NIM 70600118020, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Februari 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 18 Februari 2022

18 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Andi Tihardimanto, M.Kes., SP. JP	(.....)
Pembimbing I	: dr. Rini Fitriani, M. Kes	(.....)
Pembimbing II	: dr. Utami Murti Pratiwi, M. Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Rista Suryaningsih, M. Med. Ed	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Abdul Rahim Yunus, M. A	(.....)

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes

NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak.

Dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Sahid dan Ibunda Hayani atas kasih sayang, doa beserta dukungan semangat dan bantuan maupun materinya sehingga penyusun dapat meraih gelar Sarjana Kedokteran.

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa materiil maupun moril. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penyusun selama menjalankan pendidikan.
3. dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan Bapak dr. Andi Tihardimanto K,M.Kes, MARS, Sp.JP. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata

kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penyusun menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar serta seluruh staf prodi kedokteran yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

4. dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku pembimbing I dan dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes selaku pembimbing II, yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang tepat.
5. dr. Rista Suryaningsih, M. Med.Ed selaku penguji kompetensi dan Prof. Dr. Abdul Rahim Yunus, M.Ag. selaku penguji integrasi keislaman.
6. Kepada para Pegawai di RSIA Ananda Makassar dalam penelitian ini beserta seluruh Staf RSIA Ananda Makassar yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.
7. Kepada teman-teman Fibronectin angkatan 2018, banyak hal yang telah kita lalui bersama semoga makin kompak. Terkhusus untuk teman sebimbingan saya Isnada Rahim, Shanun Shari Shakunti, dan Muthiaturrehman Syafiuddin yang telah memberikan semangat serta saran-saran yang positif kepada penyusun.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin !. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 04 Agustus 2021

Penyusun



Apriani Sahid

70600118020

DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Persetujuan Ujian Hasil KTI	iii
Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel dan Bagan	ix
Daftar gambar	x
Daftar lampiran.....	xi
Abstrak.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Hipotesis.....	8
D. Variabel dan Definisi Operasional,.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Tujuan Penelitian	17
H. Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Kematian Janin Dalam Rahim	19
1. Definisi.....	19
2. Epidemiologi.....	20
3. Etiologi.....	21
4. Manifestasi Klinis	22
5. Penegakan Diagnosis	23
6. Tatalaksana.....	25
7. Komplikasi	26
B. Tinjauan Umum Faktor Risiko Kematian Janin Dalam Rahim	27
1. Faktor Maternal.....	27


2. Faktor Fetal	37
3. Faktor Plasenta	38
C. Kerangka Teori.....	40
D. Kerangka Konsep	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Populasi dan Sampel	43
E. Teknik Pengambilan Sampel.....	44
F. Pengumpulan Data	46
G. Instrumen Penelitian.....	47
H. Pengolahan dan Analisis Data.....	47
I. Penyajian Data	50
J. Alur Penelitian	50
K. Etika penelitian.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Hasil Penelitian	52
1. Analisis Univariat.....	52
2. Analisis Bivariat.....	58
3. Analisis Multivariat.....	65
C. Pembahasan.....	66
D. Keterbatasan Penelitian	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
Daftar Pustaka.....	87
Lampiran	94
Daftar Riwayat Hidup	114

Daftar Tabel dan Bagan

Tabel 1.1. Definisi Operasional	12
Tabel 1.2. Kajian Pustaka.....	16
Bagan 2.1. Kerangka Teori	40
Bagan 2.2. Kerangka Konsep.....	40
Tabel 3.1 Kontingensi <i>Odds Ratio</i>	47
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur Ibu	53
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Kehamilan	53
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Paritas	54
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian Preeklampsia	54
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian Eklampsia.....	55
Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian Diabetes Mellitus	56
Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian Anemia.....	56
Tabel 4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Kelainan Kongenital.....	57
Tabel 4.9 Distribusi Responden Berdasarkan Kelainan Patologis Plasenta	58
Tabel 4.10 Risiko Kejadian KJDR Berdasarkan Umur Ibu	59
Tabel 4.11 Risiko Kejadian KJDR Berdasarkan Usia Kehamilan.....	59
Tabel 4.12 Risiko Kejadian KJDR Berdasarkan Riwayat Paritas.....	60
Tabel 4.13 Risiko Kejadian KJDR Berdasarkan Kejadian Preeklampsia.....	61
Tabel 4.14 Risiko Kejadian KJDR Berdasarkan Kejadian Eklampsia	62
Tabel 4.15 Risiko Kejadian KJDR Berdasarkan Kejadian Diabetes Mellitus	62
Tabel 4.16 Risiko Kejadian KJDR Berdasarkan Kejadian Anemia.....	63
Tabel 4.17 Risiko Kejadian KJDR Berdasarkan Kelainan Kongenital.....	63
Tabel 4.18 Risiko Kejadian KJDR Berdasarkan Kelainan Patologis Plasenta	64
Tabel 4.19 Hasil Analisis Bivariat Variabel Independen.....	65
Tabel 4.20 Hasil Analisis Regresi Berganda Logistik	66


Daftar Gambar

Gambar 1.1. SDKI Tahun 1991-2017 Tren Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita.....	2
Gambar 1.2. Angka Kematian Bayi Provinsi Sulsel 2020.....	4
Gambar 1.3 Angka Kematian Bayi Provinsi Sulsel 2016-2020.....	4



Daftar Lampiran

Lampiran 1. Pengumpulan Data	94
Lampiran 2. Tabel Output hasil olah data.....	97
Lampiran 3. Persuratan	107
Lampiran 4. Dokumentasi.....	113



**Analisis Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di
RSIA Ananda Makassar Tahun 2021**

**Apriani Sahid,¹ Rini Fitriani,² Utami Murti Pratiwi,³ Rista Suryaningsih,⁴
Abdul Rahim Yunus,⁵**

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar

ABSTRAK

Tujuan : Untuk menganalisis besar faktor risiko Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Metode : Penelitian ini menggunakan desain *Case Control* dengan teknik *purposive sampling*. Subyek penelitian adalah ibu yang mengalami kematian janin dalam rahim dan ibu dengan persalinan bayi lahir hidup di RSIA Ananda Makassar yang berjumlah 72 responden dengan perbandingan 1 : 1. Analisis data bivariante menggunakan uji Odd Ratio (OR) dan uji multivariante menggunakan regresi logistic berganda.

Hasil : Hasil analisis statistic yaitu umur ibu OR 3,143 (CI 95% = 0,760-12,993), usia kehamilan OR 30,077 (CI 95% = 6,195-146,014), riwayat paritas OR 1,375 (CI 95% = 0,285-6,635), preeklampsia OR 0,647 (CI 95% = 0,102-4,124), diabetes mellitus OR 3,182 (CI 95% = 0,315-32,138), anemia OR 0,569 (CI 95% = 0,223-1,453), kelainan kongenital OR 2,059 (CI 95% = 0,178-23,773), kelainan patologis plasenta OR 2,742 (CI 95% = 0,496-15,168) dan hasil analisis multivariante yaitu usia kehamilan dengan OR 28,583 (CI 95% = 5,849-139,688) yang merupakan variabel yang paling berisiko terhadap kejadian kematian janin dalam rahim.

Kesimpulan : ANC, edukasi dan meningkatkan berbagai upaya pelayanan kesehatan selama kehamilan agar dapat menurunkan angka kematian janin di Indonesia.

Kata Kunci : Faktor risiko, Kematian Janin Dalam Rahim.

The Analysis of Risk Factors for Intrauterine Fetal Death at AnandaHospital of Makassar in 2021

Apriani Sahid,¹ Rini Fitriani,² Utami Murti Pratiwi,³ Rista Suryaningsih,⁴ AbdulRahim Yunus,⁵

Medical Education Program, Faculty of Medicine and Health Sciences, UIN AlauddinMakassar

ABSTRACT

Purpose: The major purpose of this research was to investigate the risk factors of intrauterine fetal death at Ananda hospital of Makassar in 2021.

Method: The methodological approach used in this research was Case Control design by using a purposive sampling technique. The main research subjects were the mothers undergoing an intrauterine fetal as well as the mothers with live births at Ananda hospital. The total of 72 respondents was selected in this research where the ratio of 1:1 was used. Moreover, the bivariat data analysis was conducted by using Odd Ratio (OR), while the multivariate test was done by using multiple logistic regression.

Findings: Based on the statistical data analysis, this research indicated several findings and numbers such as the maternal age OR was 3,143 (95% CI = 0.760-12.993); the gestational age OR was 30,077 (95% CI = 6.195-146.014); the history of parity OR was 1.375 (95% CI = 0.285-6.635); the preeclampsia OR was 0.647 (95% CI = 0.102-4.124); the diabetes mellitus OR was 3.182 (95% CI = 0.315-32.138), the anemia OR was 0.569 (95% CI = 0.223-1.453); the congenital abnormalities OR 2.059 (95% CI = 0.178-23,773), and the placental pathological abnormalities OR was 2.742 (95% CI = 0.496-15.168). Furthermore, based on the multivariate analysis, it was found that the gestational age with the OR of 28.583 (95% CI = 5.849-139.688) was considered to be the riskiest variable influencing the occurrences of the intrauterine fetal death.

Conclusion: This research concludes that the ANC, continuous education, and proper health care are significant to be given to pregnant patients in order to reduce the numbers of fetal mortality in Indonesia.

Key Words: Risk Factors, Intrauterine Fetal Death

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Angka kematian bayi (AKB) adalah indikator yang sangat penting sebagai cerminan derajat kesehatan dalam masyarakat di suatu daerah ([DINKES,2020]). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting dalam menilai suatu status kesehatan seorang anak, status kependudukan serta kondisi perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan Profil Kematian Neonatal Berdasarkan Sosio Demografi Dan Kondisi Ibu Saat Hamil Di Indonesia Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 2011, dua per tiga dari AKB merupakan kematian neonatus dan dua per tiga dari kematian neonatus tersebut merupakan kematian perinatal (Luqyana, 2017). Dalam menilai suatu tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara dan kualitas hidup masyarakat di perlukan indikator yang salah satunya adalah Angka Kematian Perinatal (Simamora,2016). Kematian perinatal merupakan kematian yang terjadi pada saat usia kehamilan 28 minggu hingga 7 hari post partum. Kematian perinatal juga merupakan salah satu indikator keberhasilan asuhan prenatal dan neonatal di suatu daerah dan juga akan menjadi cerminan yang memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan ibu dan lingkungan sosial ekonomi (Meisuri,2018). Menurut WHO pada tahun 2015 diseluruh dunia terdapat 18,4 bayi lahir mati untuk setiap 1000 total kelahiran, dan sebagian besar terjadi pada negara dengan penghasilan rendah dan menengah, di negara negara dengan penghasilan tinggi didapatkan kasus 1,3 hingga 8 per 1000 kelahiran (WHO,2016).

Kematian bayi bukan hanya terjadi setelah dilahirkan, namun dapat juga terjadi saat masih dalam kandungan atau yang disebut dengan *Intrauterine Fetal Death* (IUFD) dalam (Mardania,2019). Berdasarkan penelitian *World Health Organization* (WHO) bahwa diseluruh dunia didapatkan angka kematian bayi sebanyak 10.000.000 jiwa per tahun dan negara ASEAN lainnya. Indonesia termasuk dalam negara penyumbang kematian perinatal yang tinggi. Menurut

Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, didapatkan jumlah kematian bayi sudah mencapai 32 per 1.000 kelahiran hidup (Putri,2017). Setiap tahun diperkirakan kematian perinatal diseluruh dunia terdapat 7,6 juta, dan diantaranya adalah kematian janin, dan 98% diantaranya terjadi di negara berkembang (Adeyani,2019).

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan Angka Kematian Neonatal (AKN) sebanyak 15 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 24 per 1.000 kelahiran hidup, serta Angka Kematian Balita (AKABA) sebanyak 32 per 1.000 kelahiran hidup, hasil tersebut diharapkan terus mengalami penurunan dan diharapkan pada tahun 2024 Angka Kematian Neonatal (AKN) menjadi 10 per 1.000 kelahiran hidup serta Angka Kematian Bayi menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2024. Sedangkan sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Angka Kematian Balita diharapkan bisa mencapai angka 18,8 per kelahiran hidup (KEMENKES,2020).



Sumber: SDKI tahun 1991-2017

Gambar 1.1. SDKI Tahun 1991-2017 Tren Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita

Angka Kematian Bayi berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, tidak ada data untuk provinsi. Sedangkan untuk SDKI tahun 2012, provinsi dengan Angka Kematian Bayi tertinggi adalah Papua Barat dengan total 74 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan provinsi dengan Angka Kematian Bayi terendah adalah Kalimantan Timur dengan total 21 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan untuk Sulawesi Selatan Angka Kematian Bayi sebanyak 25 per 1.000 kelahiran hidup (BPS,2017).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan pada tahun 2015 dalam Asra (2018), didapatkan bahwa penyebab kematian perinatal terbanyak disebabkan oleh Kematian Janin dalam Rahim yaitu dengan jumlah 29,5% (Asra,2018). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, yaitu di tahun 2018 kasus kematian bayi adalah sebanyak 1.037 kasus, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2019 dengan jumlah kasus sebanyak 916 kasus hingga pada tahun 2020 didapatkan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 791 kasus. Pada tahun 2020 didapatkan kasus kematian bayi tertinggi terjadi di kabupaten Jeneponto yaitu sebanyak 69 kasus, kemudian diikuti oleh kabupaten Pangkep yaitu sebanyak 58 kasus dan Bone sebanyak 57 kasus untuk jumlah kasus kematian bayi terendah terjadi di kota Pare pare, sedangkan kota Makassar berada di urutan ke 8 dengan jumlah kasus sebanyak 43 kasus. Angka Kematian Bayi (AKB) di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 dan 2019 tercatat sebanyak 6 kasus per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 5 kasus per 100.000 kelahiran hidup (DINKES, 2020).



Gambar 1.2. Angka Kematian Bayi Provinsi Sulsel 2020

**ANGKA KEMATIAN BAYI DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2016-2020**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun	Orang	1.183	1.059	1.037	919	791
Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	148.216	150.220	150.624	152.680	154.733
AKB per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Angka (per 100.000 KH)	7	7	6	6	5

Gambar 1.3. Angka Kematian Bayi Provinsi Sulsel 2016-2020

Kematian Janin terbagi atas dua yakni Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) dini dan Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) lanjut. Dikatakan sebagai KJDR dini jika kematian janin terjadi dibawah usia gestasi 24 minggu sedangkan dikatakan sebagai KJDR lanjut jika kematian janin diatas usia gestasi 24 minggu. (Mardaniah, 2019), sedangkan menurut *United States National Center for Health Statistic* dalam Adeyani (2019) kematian janin terdiri atas *Early Fetal Death* yang merupakan kematian janin pada usia gestasi dibawah

20 minggu, *Intermediate Fetal Death* yaitu kematian janin yang terjadi diantara usia gestasi 20 hingga 28 minggu, serta *Late Fetal Death* yaitu kematian janin yang terjadi pada usia gestasi diatas 28 minggu (Adeyani,2019).

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya Kematian Janin dalam Rahim diantaranya adalah faktor maternal, fetal dan faktor plasenta, sesuai dengan penelitian sebelumnya didapatkan bahwa untuk faktor maternal disebabkan oleh kehamilan post term, umur ibu, penyakit sistemi, hipertensi. Untuk faktor fetal didapatkan kelainan kongenital, kelainan genetik dan infeksi, sedangkan untuk faktor kelainan patologis plasenta adalah kelainan tali pusat, pelepasan plasenta serta ketuban pecah dini (Luqyana, 2017). Beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada kasus kematian janin diantaranya adalah infeksi, terjadinya koagulopati dan juga trauma emosional bagi orang tua yang mengalami kasus kematian janin (Prawirohardjo,2018).

Selain dari bidang sains dan kedokteran terkait permasalahan Kematian Janin dalam Rahim, terdapat kajian keislaman tentang kematian dalam QS. Al-Anbiya ayat 35, Allah swt, berfirman :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِنَّا نُرْجِعُونَ

Artinya: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. (QS. Al Anbiya: 35)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup akan mengalami kematian pada waktunya, tanpa melihat usia, dapat terjadi pada lansia, remaja, dewasa maupun anak-anak dan bahkan janin yang masih berada dalam kandungan.

Kehamilan merupakan beban yang berat bagi kaum wanita, dan pada saat kehamilan wanita itu berada dalam kondisi yang lemah (Dewi,2019). Dalam Qur'an Surah Luqman ayat 14 Allah swt, berfirman :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ
فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”

Jadi ketika wanita itu hamil ia berada dalam kondisi yang lemah dan jika ia hamil kembali ketika kondisinya belum pulih sepenuhnya hal itu akan mempengaruhi kehamilannya. Dalam QS. An-Nisa 4 : 9 juga dijelaskan untuk tidak meninggalkan anak yang lemah.

وَأَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)” oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Sehubungan dengan ayat tersebut diatas Allah memerintahkan untuk menjaga anak karena ia merupakan harta dan amanah bagi orang tua yang harus di jaga baik-baik dalam QS. At Taghabun 64 : 15.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : *“sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan di sisi Allah pahala yang besar”*.

Berdasarkan uraian sebelumnya dan berdasarkan data yang diperoleh di RSIA Ananda Makassar pada bulan Mei tahun 2020-2021 terdapat 54 kasus Kematian Janin dalam Rahim. Kematian Janin dalam Rahim merupakan masalah besar terutama di Negara-negara berkembang yang masih memiliki persentase yang cukup tinggi. kasus ini cukup menjadi suatu masalah kesehatan bagi ibu utamanya ibu yang menginginkan bayi kemudian mengalami kasus kematian janin dalam rahim, selain itu kematian janin akan memberikan komplikasi bagi ibu baik dalam fisik atau kesehatannya maupun psikis ataupun mentalnya, Oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian janin dalam rahim ini agar kasus serupa dapat dicegah. Karena hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait *“Analisis Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin Dalam Rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah dikemukakan sebelumnya khususnya di Indonesia, maka dapat dirumuskan masalah : *“Berapa besar faktor risiko umur ibu, usia kehamilan, riwayat paritas, preeclampsia, eklampsia, diabetes mellitus, anemia, kelainan kongenital dan kelainan patologis plasenta terhadap kejadian Kematian Janin dalam Rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021”*.

C. Hipotesis

1. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a) Umur ibu merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.
- b) Usia kehamilan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.
- c) Riwayat paritas merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.

- d) Preeklampsia merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.
- e) Eklampsia merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.
- f) Diabetes Mellitus merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.
- g) Anemia merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.
- h) Kelainan kongenital merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.
- i) Kelainan patologis plasenta merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.

2. Hipotesis Nol (H_0)

- a) Umur ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.
- b) Usia kehamilan bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.
- c) Riwayat paritas bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.
- d) Preeklampsia bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.
- e) Eklampsia bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.
- f) Diabetes Mellitus bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.
- g) Anemia bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.
- h) Kelainan kongenital bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.

- i) Kelainan patologis plasenta bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim.

D. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel

- a) Variabel Dependen : Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR)
 b) Variabel Independen :

- 1) Umur Ibu
- 2) Usia Kehamilan
- 3) Riwayat Paritas
- 4) Preeklampsia
- 5) Eklampsia
- 6) Diabetes Mellitus
- 7) Anemia
- 8) Kelainan Kongenital
- 9) Kelainan Patologis Plasenta

2. Definisi Operasional

Variabel Dependen		Definisi Operasional	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR)		Suatu keadaan dimana janin mati dalam rahim dengan Usia Kehamilan ≥ 20 minggu, dan atau berat badan ≤ 500 gram di RSIA Ananda Makassar.	Lembar pengumpulan data	0. Ya = mengalami KJDR 1. Tidak = Tidak mengalami KJDR	Nominal
Variabel Independen		Definisi Operasional	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
Faktor Maternal	Umur Ibu	Lama hidup pasien yang di hitung mulai tahun lahirnya hingga usia pada saat kematian janin.	Lembar pengumpulan data	0. Risiko tinggi : < 20 atau > 35 tahun 1. Risiko	Nominal

				rendah : 20-35 tahun	
Usia Kehamilan	Lama waktu janin dalam Rahim yang dihitung mulai dari Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) hingga pada saat kematian janin.	Lembar pengumpulan data	0.Risiko tinggi : UK <37 atau >42 minggu 1.Risiko rendah : UK 37-42 minggu	Nominal	
Paritas	Banyaknya kelahiran yang telah dialami atau jumlah persalinan yang dialami.	Lembar pengumpulan data	0.Risiko tinggi : Paritas ≥ 5 1.Risiko rendah : Paritas <5	Nominal	
Preeklampsia	Riwayat penyakit kehamilan menderit a preeclampsia.	Lembar pengumpulan data	0.Risiko tinggi : Menderit a Preeklamps ia 1.Risiko rendah : Tidak menderit a Preeklamps ia	Nominal	
Eklampsia	Riwayat penyakit kehamilan menderit a eklampsia.	Lembar pengumpulan data	0.Risiko tinggi : Menderit a eklampsia 1.Risiko	Nominal	

				rendah : Tidak menderita eklampsia	
	Diabetes Mellitus	Riwayat penyakit kehamilan menderita diabetes mellitus.	Lembar pengumpulan data	0.Risiko tinggi : Menderita DM 1.Risiko rendah : Tidak menderita DM	Nominal
	Kadar Hb	Kadar Hemoglobin yang bersumber dari hasil pemeriksaan laboratorium.	Lembar pengumpulan data	0.Risiko tinggi : Kadar Hb<11 1.Risiko rendah : Kadar Hb = 11,0 – 16,0 g/dl	Nominal
Faktor Janin	Kelainan Kongenital	Kondisi dimana terdapat abnormalitas atau kelainan dari janin.	Lembar pengumpulan data	0.Risiko tinggi : Ada kelainan kongenital 1.Risiko rendah : Tidak ada kelainan kongenital	Nominal
Faktor Plasenta	Kelainan patologis	Suatu kondisi dimana terdapat kelainan yang	Lembar pengumpulan	0.Risiko tinggi : Ada	Nominal

	plasenta	berhubungan dengan plasenta seperti, plasenta previa, solusio plasenta, vasa previa dan sebagainya.	data	kelainan atologis plasenta 1. Risiko rendah : Tidak ada kelainan patologis plasenta	
--	----------	---	------	---	--

Tabel 1.1 Definisi Operasional Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin Dalam Rahim di RSIA Ananda Makassar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada “faktor risiko yang dapat mempengaruhi kejadian kematian janin dalam rahim dengan lokasi penelitian yaitu pada bagian Rekam Medik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar.

F. Kajian Pustaka

Sebagai bahan penguat penelitian, peneliti mengutip dari beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian :

Nama Peneliti	Judul dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
Liya Lugita Sari (2021)	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian <i>Intrauterine Fetal Death</i> (IUF) <u>Metode</u> : <i>Case</i>	Didapatkan hasil penelitian responden dengan umur tidak berisiko 21 ibu (61,8%), paritas tidak berisiko (61,8%), penyulit kehamilan tidak berisiko 23 ibu (67,6%), pasien dengan IUF 17 ibu (50%). Didapatkan adanya hubungan antara umur, paritas, dan penyulit kehamilan dengan kejadian IUF di RSUD Hasanuddin	<u>Persamaan</u> : Variabel penelitian yaitu : umur ibu dan paritas serta metode penelitian. <u>Perbedaan</u> :

	<i>Control.</i>	Damrah Manna.	Hanya meneliti terkait hubungan dari umur ibu, paritas sebagai faktor risiko IUFD
Nurul Fadliah Fahrul (2017)	Faktor risiko terhadap kejadian Kematian Janin Dalam Rahim pada ibu hamil di Rumah Sakit DR Wahidin Sudirohusodo periode 1 januari 2015-31 desember 2016 <u>Metode :</u> Deskriptif Operasional	Usia <20 tahun 1 orang (1,67%), 20-35 tahun 40 orang (66,66%), usia >35 tahun 19 orang (31,67), Nulipara 22 orang (36,67%), multipara 2 dan 3 anak 20 orang (33,33%), Multipara 4-5 anak 14 orang (23,33%), grandemultipara 4 orang (6,66%), trimester 2 sebanyak 29 orang (48,3%), trimester 3 sebanyak 31 orang (51,7%), IRT 41 orang, IMT<25 kg/m ² 36 orang (60%), IMT >25 kg/m ² 24 orang (40%), Hb>10 gr/dl 33 orang (55%), Hb<10 gr/dl 27 orang (45%), Rokok tidak ada sampel, 49 orang memiliki faktor maternal, fetal, dan plasenta, 28 orang dengan multifactor.	<u>Persamaan :</u> Variabel penelitian usia ibu, paritas, usia kehamilan, Kadar Hb. <u>Perbedaan :</u> Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Operasional.
Susmita Sharma, dkk (2016)	<i>Analytical study of intrauterine fetal death cases and associated maternal conditions</i> <u>Metode :</u> Studi Retrospektif	Angka kematian akibat IUFD didapatkan sebanyak 36 per 1000 kelahiran hidup	<u>Persamaan :</u> Prevalensi dari variabel dependen. <u>Perbedaan :</u> Hasil penelitian menunjukkan prevalensi dari variabel dependen dan metode penelitian yaitu studi

			retrospektif
Sry Ayu Perdana, dkk(2017)	<p>Identifikasi Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) di RSUD Dewi Sartika Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016</p> <p><u>Metode :</u> Penelitian Deskriptif</p>	<p>Pasien yang mengalami KJDR dengan preeklampsia sebanyak 52 orang (63%), dan yang tidak mengalami preeklampsia 47 orang (36%), umur kehamilan 20 hingga 28 minggu sebanyak 56 orang, Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) sebanyak 45 orang (61%), tidak mengalami PJT 54 orang (38%)</p>	<p><u>Persamaan :</u> Variabel penelitian preeklampsia, umur kehamilan.</p> <p><u>Perbedaan :</u> Hasil penelitian berupa prevalensi dari variabel penelitian serta metode penelitian penelitian deskriptif</p>
Jayashree V Kanavi.,dkk (2015)	<p><i>Incidence and risk factors for intrauterine foetal demise : a retrospective study in a tertiary care center in India</i></p> <p><u>Metode :</u> Studi Retrospektif</p>	<p>IUFD sebanyak 39 per 1000 kelahiran hidup, usia <20 tahun dan >30 tahun (p = 0,26), kejadian IUFD meningkat pada multipara (p = 0,036), penyebab terbanyak dari IUFD adalah preeklampsia 48,1% dengan HELLP syndrome, IUGR, Abruptio, Anemia 20,4%, SLE 2,5%, Anhidramnion 6,3%.</p>	<p><u>Persamaan :</u> Variabel penelitian yaitu paritas, preeklampsia, dan anemia.</p> <p><u>Perbedaan :</u> Hasil penelitian menunjukkan prevalensi dari variabel independen dan metode penelitian.</p>
Sinha Kavita, dkk. (2019)	<p><i>Risk Factors in Patients with Intrauterine Fetal Death at</i></p>	<p>Sebanyak (78,4%) pasien dengan IUFD usia reproduksi (20-35 tahun) dan (15,4%) usia <19 tahun (p=0,008) . (58,5%) memiliki setidaknya satu kunjungan ANC dan</p>	<p><u>Persamaan :</u> Variabel penelitian usia ibu, paritas,</p>

	<p><i>Tertiary Referral Centre</i></p> <p><u>Metode</u> : <i>Cross Sectional</i></p>	<p>primigravida (17%) dengan preterm (63,07%). Pasien dengan hipertensi (36,92%), tidak diketahui sebanyak (26,15%), anemia (18,46%), KPD (15,4%), APH (13,8%). Sebagian besar bayi lahir dengan berat badan rendah (63,69%) dan mayoritas adalah laki-laki (63,1%)</p>	<p>anemia.</p> <p><u>Perbedaan</u> :</p> <p>Hasil penelitian berupa prevalensi dari variabel penelitian dan metode penelitian <i>Cross Sectional</i></p>
<p>Nursaci Mardani,dk k (2019)</p>	<p>Gambaran faktor risiko <i>Intrauterine Fetal Death</i> (IUFD)</p> <p><u>Metode</u> : <i>Cross Sectional</i></p>	<p>usia gestasional preterm 72,8%, aterm 27,2%, postterm 0%, usia maternal 35 tahun 25,9%, paritas nulipara 32,1%, primipara 24,7%, multipara 43,2%, IMT normal 46,9%, overweight 30,9%, obesitas 22,2%, penyakit hipertensi gestasional 1,2%, hipertensi kronik 0%, preeklampsia 17,3%, eklampsia 0%, anemia 27,2%, diabetes melitus 6,3%, ibu yang tidak berpenyakit 48,1%. Ibu dengan gemeli 1,2%, yang tidak gemeli 98,8%. Kelainan prolapsus tali pusat 1,2%, lilitan tali pusat 0%, dan tidak ada kelainan tali pusat 98,8%, solusio plasenta 4,9%, dan tidak mengalami 95,1%.</p>	<p><u>Persamaan</u> :</p> <p>Variabel penelitian usia ibu, paritas, preeklampsia, anemia, kelainan plasenta.</p> <p><u>Perbedaan</u> :</p> <p>Hasil penelitian berupa gambaran prevalensi dari variabel penelitian dan metode penelitian <i>Cross Sectional</i></p>
<p>Ani Triana (2012)</p>	<p>Pengaruh Kadar Hb dan Paritas dengan Kejadian <i>Intrauterine Fetal Death</i> (IUFD) di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru</p>	<p>Ibu dengan kadar Hb <11 gr % berisiko mengalami IUFD 3 kali (95%) dibanding ibu yang memiliki kadar Hb \geq 11 gr%, ibu yang memiliki paritas 0 dan >4 lebih berisiko melahirkan dengan IUFD 1,5 kali (95%) dibanding ibu dengan paritas 1 sampai 4.</p>	<p><u>Persamaan</u> :</p> <p>Variabel penelitian kadar hb dan paritas serta metode penelitian., serta hasil penelitian berupa besar faktor risiko dari variabel</p>

	<u>Metode</u> : <i>Case Control</i>		penelitian. <u>Perbedaan</u> : Hanya 2 variabel yang diteliti
--	-------------------------------------	--	---

Tabel 1.2. Kajian Pustaka dari Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin Dalam Rahim di RSIA Ananda Makassar

G. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisa faktor risiko yang mempengaruhi kejadian Kematian Janin dalam Rahim di RSIA Ananda Makassar tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui besar faktor risiko umur ibu terhadap kejadian Kematian Janin dalam Rahim
- b) Untuk mengetahui besar faktor risiko usia kehamilan terhadap kejadian Kematian Janin dalam Rahim
- c) Untuk mengetahui besar faktor risiko riwayat paritas terhadap kejadian Kematian Janin dalam Rahim
- d) Untuk mengetahui besar faktor risiko preeklampsia terhadap kejadian Kematian Janin dalam Rahim
- e) Untuk mengetahui besar faktor risiko eklampsia terhadap kejadian Kematian Janin dalam Rahim
- f) Untuk mengetahui besar faktor risiko Diabetes Mellitus terhadap kejadian Kematian Janin dalam Rahim
- g) Untuk mengetahui besar faktor risiko anemia terhadap kejadian Kematian Janin dalam Rahim
- h) Untuk mengetahui besar faktor risiko kelainan kongenital terhadap kejadian Kematian Janin dalam Rahim
- i) Untuk mengetahui besar faktor risiko kelainan patologis plasenta terhadap kejadian Kematian Janin dalam Rahim

- j) Untuk mengetahui faktor risiko yang paling mempengaruhi Kematian Janin dalam Rahim

H. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, sebagai peneliti dapat menjadi bahan pembelajaran dan tambahan wawasan sehingga peneliti dapat memahami terkait faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian Kematian Janin dalam Rahim.

2. Bagi RSIA Ananda Makassar

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi RSIA Ananda Makassar dan menambah pengetahuan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan utamanya dalam menghadapi kasus Kematian Janin Dalam Rahim di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar.

3. Bagi Institusi


Dengan adanya bahan penelitian ini maka akan menjadi salah satu tambahan referensi kampus berupa bacaan yang akan ditempatkan di perpustakaan yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa tentang kejadian Kematian Janin dalam Rahim.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kejadian Kematian Janin dalam Rahim sehingga dapat dilakukan berbagai upaya agar dapat mencegah terjadinya Kematian Janin dalam Rahim.

5. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan juga dasar yang memberikan informasi dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan dalam menuntaskan kejadian kejadian Kematian Janin dalam Rahim.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)

1. Definisi

Menurut *World Health Organization (WHO)* dan *The American College of Obstetrian and Gynecologists (ACOG 1993)* dalam Prawirohardjo (2020) mengatakan bahwa Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) merupakan suatu kondisi dimana janin mati di dalam rahim pada usia kehamilan 20 minggu atau lebih dan dengan berat badan 500 gram atau lebih. KJDR merupakan salah satu faktor risiko kedua yang masuk ke dalam kelompok faktor risiko pada ibu hamil sebagai masalah kesehatan. (Prawirohardjo, 2020). Sama halnya yang disampaikan oleh *National Vital Statistic Report* dalam Cunningham (2010) bahwa kematian janin merupakan kematian yang terjadi pada usia kehamilan 20 minggu atau lebih. (Cunningham,2010)

Dalam sumber yang lain menyebutkan bahwa KJDR merupakan kematian janin dengan usia kehamilan >24 minggu dan/atau janin dengan berat badan >500 gram. (Patil,2016). Sama halnya yang dikemukakan oleh *The Perinatal Mortality Surveillance Report (CEMACH)* dalam RCOG (2010) yang mendefinisikan KJDR sebagai kematian janin yang terjadi diatas usia kehamilan 24 minggu yang disertai dengan tidak adanya tanda-tanda kehidupan (RCOG,2010).

Menurut *Queensland Government* dalam *Queensland Clinical Guidelines* Kematian Janin adalah bayi yang lahir tanpa disertai dengan detak jantung dan pernafasan serta tidak adanya tanda-tanda kehidupan yang terjadi pada bayi dengan berat lahir ≥ 400 gram dan atau pada saat kehamilan >20 minggu. (Queensland,2018)

Klasifikasi dari Kematian Janin dalam Rahim terbagi atas 2 yakni : jika KJDR terjadi pada usia kehamilan sebelum 24 minggu disebut sebagai KJDR dini dan disebut sebagai KJDR lanjut jika terjadi pada usia kehamilan setelah 24 minggu. (Mardania,2019).

2. Epidemiologi

Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) merupakan salah satu penyebab terbesar terjadinya kematian perinatal diseluruh dunia, dan setidaknya terdapat 3,2 juta kasus dan sebagian besar terdapat di negara berkembang (Bano,2016).

Berdasarkan penelitian *World Health Organization* (WHO) bahwa diseluruh dunia didapatkan angka kematian bayi sebanyak 10.000.000 jiwa per tahun dan negara ASEAN lainnya. Indonesia termasuk dalam negara penyumbang kematian perinatal tertinggi. Menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, didapatkan jumlah kematian bayi sudah mencapai 32 per 1.000 kelahiran hidup (Putri,2017). Setiap tahun diperkirakan kematian perinatal diseluruh dunia terdapat 7,6 juta, dan diantaranya adalah kematian janin, dan 98% diantaranya terjadi di negara berkembang (Adeyani,2019).

Kasus Kematian Perinatal yang terjadi di negara-negara berkembang yang dihimpun dari *Level and Trends in Child Mortality* dalam Simamora (2016) menyatakan bahwa kasus kematian perinatal pada tahun 2012, di Bangladesh didapatkan sebanyak 24/1000 kelahiran, di Pakistan didapatkan sebanyak 42/1000 kelahiran, sedangkan di India didapatkan sebanyak 31/1000 kelahiran, adapun di Myanmar sekitar 26/1000 kelahiran, dan di Indonesia didapatkan kasus kematian perinatal sebanyak 15/1000 kelahiran (Simamora,2016).

3. Etiologi

Penyebab dari Kasus Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) dalam Prawirohardjo (2020) dapat diklasifikasikan menjadi 3 faktor utama yaitu :

a) Faktor Maternal

Untuk faktor maternal sebagai penyebab dari kasus kematian janin antara lain : Usia kehamilan *post term* (42 minggu), penyakit Diabetes Mellitus, Penyakit autoimun seperti *Systemic Lupus Eritematous* (SLE), penyakit infeksi, hipertensi atau tekanan darah tinggi, preeklampsia dan eklampsia, umur maternal yang tua risiko meningkat pada usia >40 tahun, kelainan pada rhesus, ruptur pada uterus, dan hipotensi.

b) Faktor Fetal

Untuk faktor fetal atau janin sebagai penyebab dari kasus kematian janin antara lain : gemelli atau hamil kembar, pertumbuhan janin yang terhambat, adanya kelainan kongenital, adanya kelainan genetik dan infeksi pada janin.

c) Faktor Plasenta

Untuk faktor plasenta sebagai penyebab dari kasus kematian janin antara lain : adanya kelainan pada tali pusat, terlepasnya plasenta, ketuban pecah dini serta vasa previa.

Dari sumber yang lain menyebutkan bahwa KJDR merupakan kematian janin sebagai akibat dari gangguan pada pertumbuhan janin, adanya suatu kegawatan pada janin ataupun karena suatu kelainan bawaan serta adanya infeksi yang sebelumnya tidak terdiagnosis sehingga tidak mendapatkan penanganan. (Fitriahadi,2017)

Sedangkan menurut Cunningham (2010) mengatakan bahwa ada 4 faktor yang menjadi penyebab dari kasus kematian janin, yaitu faktor fetal, faktor plasenta, faktor maternal serta faktor yang tidak diketahui. Untuk faktor fetal terdiri dari anomali kromosom, hidrops nonimun, dan adanya infeksi. Untuk faktor plasenta terdiri dari adanya kejadian ketuban pecah dini, kelainan pada plasenta seperti solusio plasenta dan plasenta previa, adanya gangguan pada tali pusat, asfiksia intrapartum dan koriamnionitis. Untuk faktor maternal didasari pada penyakit-penyakit yang dimiliki oleh maternal seperti Diabetes Mellitus, Hipertensi, Obesitas, penyakit ginjal, kelainan pada darah seperti trombofilia, infeksi, ruptur pada uterus, usia ibu diatas 35 tahun dan kelahiran post term, faktor keempat yaitu faktor yang tidak diketahui.

Dalam referensi Malik (2016) menyatakan bahwa penyebab paling umum dari kematian janin yang terjadi pada trimester III adalah komplikasi pada tali pusat. Adapun Faktor risiko dari kematian janin terbagi atas 2 yaitu :

- a) faktor umum meliputi, data sosiodemografi seperti lingkungan tempat tinggal, pekerjaan dan tingkat pendidikan.
- b) faktor khusus meliputi, faktor janin, faktor ibu dan faktor plasenta.

4. Patomekanisme

Dalam Semian (2018) disebutkan bahwa pada kasus kematian janin, jika didapatkan kematian janin telah masuk dalam fase lanjut, akan menyebabkan beberapa perubahan pada tubuh ibu. Perubahan tersebut sebagai berikut :

- a) Tegang mati atau rigor mortis, yang berlangsung selama 2,5 jam setelah mati dan kemudian akan lemas kembali.

- b) Stadium maserasi I : munculnya lepuh kulit, yang pada awalnya berisi cairan yang jernih, lalu berubah menjadi berwarna merah kecoklatan
- c) Stadium maserasi II : pecahnya lepuhan dan menyebabkan perubahan warna pada air ketuban menjadi berwarna merah kecoklatan, kondisi ini terjadi pada 48 jam setelah kematian janin.
- d) Stadium maserasi III : stadium ini terjadi jika kematian janin telah terjadi selama 3 minggu, tubuh janin menjadi sangat lemas dan tulang sangat longgar serta didapatkan adanya edema dibawah kulit.

5. Manifestasi Klinis

Pada kasus Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) keluhan yang yang dirasakan oleh pasien berupa pasien tidak merasakan adanya pergerakan dari janin, dan berlangsung selama beberapa hari, pasien juga akan mengeluh perutnya tidak bertambah besar, dan merasakan perutnya mengeras, serta nyeri seperti ingin melahirkan (Putri,2017).

Apabila terjadi kematian janin maka pada pemeriksaan fisik akan didapatkan tinggi dari fundus uteri yang tidak sesuai dengan usia kehamilan, dan berat badan ibu cenderung menurun, dan disertai dengan mengecilnya lingkaran perut (Luqyana,2017).

6. Penegakan Diagnosis

Anamnesis

Dalam penegakan diagnosis dari kasus kematian janin diperlukan anamnesis yang lengkap meliputi : Riwayat ibu, riwayat keluarga, riwayat kelainan genetik, riwayat kehamilan, riwayat obstetrik sebelumnya, riwayat imunisasi, dan riwayat sosial. (Maslovich,2020)

Pada hasil anamnesis pasien akan mengeluhkan gerakan janin yang berkurang atau menghilang, tidak didapatkan adanya pertumbuhan janin, tinggi fundus yang menurun, disertai dengan berat badan ibu hamil berkurang serta lingkaran perut yang semakin mengecil, Pada pemeriksaan dengan menggunakan fetoskopi dan Doppler akan didapatkan hasil denyut jantung janin hilang. Diagnosis pasti untuk menegakkan kasus kematian janin dapat dilakukan pemeriksaan USG akan didapatkan tidak adanya tanda-tanda kehidupan yang ditandai dengan hilangnya gerakan jantung janin. (Prawirohardjo,2020)

Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan doppler janin untuk mengetahui denyut jantung janin, pemeriksaan status antropometri ibu hamil, serta pemeriksaan TTV (Maslovich,2020). Pada pemeriksaan antropometri akan didapatkan berat badan ibu menurun, serta lingkaran perut yang mengecil (Luqyana,2017).

Pemeriksaan Penunjang

Beberapa pemeriksaan untuk kasus kematian janin dalam Prawirohardjo (2020) adalah :

- a) Pemeriksaan radiologi setelah 5 hari akan didapatkan gambaran tulang kepala yang kolaps, dan saling tumpang tindik atau gejala *spalding*, tulang belakang yang hiperfleksi, serta didapatkan adanya edema pada sekitar tulang kepala, pada jantung dan pembuluh darah didapatkan adanya gambaran udara atau gas.
- b) pemeriksaan hCG pada urin akan didapatkan hasil yang negatif.

Sedangkan dari sumber yang berbeda didapatkan dalam Fitriahadi (2017), pemeriksaan pada kasus Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) terdiri dari :

- a) Pada pemeriksaan radiologi, jika kematian janin sudah dialami selama 5 hari, akan didapatkan hasil pemeriksaan radiologi berupa *overlapping* pada tulang tengkorak, adanya *hyperfleksi collumna vertebralis*, adanya gelembung udara dalam jantung serta edema *scalp*.
- b) Pada pemeriksaan Ultrasonography (USG) akan didapatkan hilangnya gerakan pada jantung janin, ukurang kepala pada janin yang menyusut serta berkurangnya cairan ketuban. Pemeriksaan USG merupakan salah satu pemeriksaan *gold standar* dari kasus kematian janin dalam rahim.

7. Tatalaksana

Apabila diagnosis dari kematian janin telah ditegakkan, maka segera berikan informasi dan rencana penatalaksanaannya seperti rencana tindakan agar dapat diintervensi dengan segera. Jika kematian janin sudah terjadi selama 3 hingga 4 minggu maka kadar fibrinogen mulai mengalami penurunan dan cenderung akan terjadi koagulopati. Setelah diagnosis ditegakkan maka dilakukan pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan darah perifer, pemeriksaan fungsi pembekuan dan pemeriksaan gula darah. Untuk persalinan pervaginam di tunggu lahir spontan setelah 2 minggu. Selain itu persalinan juga dapat terjadi secara aktif dengan melakukan induksi persalinan menggunakan oksitosin ataupun dengan menggunakan misoprostol, namun perlu hati-hati jika pasien memiliki riwayat pascaseksio secarea atau miomektomi karena dapat berakibat pada terjadinya ruptur uteri, pada kasus kematian janin 24 hingga 28 minggu dapat menggunakan misoprostol secara vaginal dengan dosis 50 hingga 100 µg yang diberikan tiap 4 hingga 6 jam, sedangkan pada usia kehamilan >28 minggu dosis misoprostol menjadi

25 µg yang diberikan pervaginam tiap 6 jam. Persalinan perabdominam juga dapat dilakukan jika janin letak lintang (Prawirohardjo,2020).

Kasus Kematian Janin Dalam Rahim merupakan suatu kegawatdaruratan yang harus segera ditangani. Untuk penatalaksanaan dari kasus Kematian Janin Dalam Rahim dalam Putri (2017) disebutkan bahwa tatalaksana KJDR terbagi menjadi 2 yaitu tatalaksana aktif dan tatalaksana pasif.

Tatalaksana aktif terdiri dari :

- a) Uterus dengan usia kehamilan ≤ 12 minggu, akan dilakukan kuretase.
- b) Uterus dengan usia kehamilan ≥ 12 minggu akan dilakukan induksi persalinan dengan menggunakan oksitosin. Oksitosin digunakan untuk keperluan pembukaan pada serviks dengan menggunakan kateter *foley* yang dipasang selama 24 jam.

Tatalaksana pasif terdiri dari :

- a) Tunggu persalinan spontan 2 hingga 4 minggu
- b) Lakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar fibrinogen, pemeriksaan ini dilakukan setiap minggu.

8. Komplikasi

Beberapa komplikasi yang dapat terjadi dari kasus kematian janin adalah adanya trauma psikis pada ibu maupun keluarganya. Kasus kematian janin yang disertai oleh Ketuban Pecah Dini (KPD) akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Kematian janin yang berlangsung selama lebih dari 2 minggu akan berakibat pada terjadinya koagulopati (Prawirohardjo,2020). Adanya kasus KJDR akan memberikan trauma psikologis dan stres bagi orang tua disertai dengan

tekanan emosional yang dapat berakibat pada gejala depresi (Bano, 2016).

Dalam Luqyana (2017) menyebutkan beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada kasus kematian janin yaitu adanya trauma emosional yang berat, infeksi dapat terjadi jika kematian janin disertai dengan ketuban pecah, dan dapat terjadi koagulopati jika kematian janin sudah berlangsung selama lebih dari 2 minggu (Luqyana,2017).

B. Tinjauan Umum Faktor Risiko Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR)

1. Faktor Maternal

a) Umur Ibu

Umur merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang, terutama pada wanita yang hamil, usia akan sangat mempengaruhi kondisi kehamilannya termasuk mempengaruhi kandungan dan perkembangan dari janin yang di kandung (Asra, 2018). Sedangkan Menurut *Queensland Guidelines*, faktor risiko maternal seperti usia maternal yang terlalu tua diatas 35 tahun atau terlalu muda dibawah 15 tahun akan meningkatkan risiko terjadinya kematian janin. (Queensland,2018)

Kelompok umur yang termasuk dalam kategori risiko rendah terhadap terjadinya Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) adalah kelompok umur 20-30 tahun karena masih memiliki fungsi reproduksi yang baik (Mahyuni,2015). Usia ibu yang terlalu tua menjadi faktor risiko dari kejadian kematian janin karena pada usia yang terlalu tua akan terjadi penurunan fungsi dari reproduksi sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi dalam kehamilan seperti kematian janin. sedangkan pada usia yang terlalu muda ibu dianggap belum siap secara emosional dan fisik sehingga

meningkatkan risiko terjadinya komplikasi dalam kehamilan. (Mahardika,2019)

Semakin bertambahnya usia pada wanita hamil akan menyebabkan menurunnya perfusi uteroplasenta sehingga vaskularisasi semakin berkurang. Mekanisme secara fisiologis usia wanita hamil yang tua >35 tahun akan meningkatkan risiko timbulnya lesi sklerotik, sehingga akan terjadi penurunan perfusi dan mengganggu distribusi nutrisi yang akan disalurkan ke janin (Luqyana,2017).

Wanita hamil dengan usia <20 tahun masih termasuk dalam kelompok remaja dan belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatannya, disertai dengan informasi-informasi yang didapatkan masih kurang akurat karena hanya mendapatkan informasi dari teman sebayanya tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk wanita hamil dengan usia >35 tahun memiliki ketidakacuhan pada kesehatan bayinya karena telah menganggap bahwa dirinya sudah berpengalaman sebelumnya (Meisuri,2018).

Perempuan dengan umur <20 tahun memiliki psikis yang belum siap untuk menerima kehamilannya sehingga akan berakibat pada stress yang juga akan mempengaruhi hormone dalam tubuh, selain itu pada usia <20 tahun perkembangan otot rahim yang belum cukup serta kekuatan dan kontraksi yang belum baik, selain itu system hormonal juga belum stabil. Sedangkan pada usia kehamilan >35 tahun selain terjadi penurunan dari reproduksi, pada usia tersebut juga akan disertai dengan penyakit-penyakit kronis. Selain itu pada usia >35 tahun. (Mahardika, 2019).

b) Usia Kehamilan

Pada kehamilan posterm (>42 minggu) fungsi plasenta mulai mengalami penurunan sehingga dengan adanya penurunan dari fungsi plasenta tersebut akan menyebabkan berkurangnya pemasokan makanan serta oksigen bagi janin yang melalui plasenta. Selain itu pada usia kehamilan posterm juga akan terjadi spasme dari arteri spiralis (cabang arteri radialis yang menembus endometrium), arteri ini akan kaku dan keras sehingga lumen tidak mengalami vasodilatasi, yang menyebabkan aliran darah utero plasenta menurun, hal tersebut akan menyebabkan hipoksia plasenta (Mardania,2019).

Pada usia kehamilan <37 minggu, belum terjadi perkembangan paru yang sempurna, otot pada saluran pernafasan masih tidak bekerja dengan baik, dan tulang tulang pernafasan masih melengkung. Semakin muda usia kehamilan seorang wanita maka akan semakin kurang sempurna pertumbuhan dan perkembangan dari organ-organ dalam tubuh, baik secara anatomi maupun secara fisiologi sehingga akan memudahkan terjadinya komplikasi seperti asfiksia dan kematian janin (Carolin, 2019).

c) Paritas

Ibu dengan riwayat persalinan sebanyak 7 kali akan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kematian perinatal. (Yoteni,2017). Dalam penelitian yang dilakukan di Yoaunde Hospital, wanita dengan riwayat paritas 5 memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami kematian janin. (Momo,2019)

Faktor paritas merupakan salah satu faktor risiko dari Kematian Janin Dalam Rahim karena dengan tingginya paritas akan menyebabkan kondisi uterus belum pulih untuk hamil kembali, sehingga akan mempengaruhi endometrium pada saat

kehamilan selanjutnya, hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya vaskularisasi atau karena adanya atrofi pada desidua sebagai akibat dari persalinan yang terjadi sebelumnya (Mardania,2019)

d) Preeklampsia

Preeklampsia peningkatan dari Tekanan Darah 140/90 mmHg yang terjadi pada kehamilan 20 minggu, disertai dengan kerusakan organ dan sebelumnya pasien memiliki tekanan darah yang masuk dalam kategori normotensi. (Alsammani,2021)

Menurut Cunningham (2010) kriteria minimum dari preeklampsia adalah Tekanan Darah 140/90 mmHg dan terjadi setelah kehamilan 20 minggu dan pada pemeriksaan laboratorium didapatkan proteinuria 300 mg/24 jam atau didapatkan hasil protein urin 2+ yang dilakukan dengan pemeriksaan *dipstik*. (Cunningham,2010)

Hipertensi yang terjadi akibat kehamilan akan menyebabkan terjadinya invasi dari sel-sel trofoblas pada lapisan arteri spiralis dan jaringan matriks sekitarnya. Lapisan arteri spiralis akan menjadi kaku dan keras sehingga lumen dari arteri spiralis tidak mengalami disetensi dan vasodilatasi, akibatnya akan terjadi vasokonstriksi yang menyebabkan penurunan aliran darah ke janin sehingga terjadilah hipoksia yang dapat menjadi penyebab dari kematian janin dalam rahim. (Mardania,2019)

Dalam referensi lain juga dikatakan bahwa adanya kondisi preeklampsia akan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah sehingga akan mempengaruhi suplai oksigen berupa berakurangnya suplai oksigen dan nutrisi yang akan dibawa oleh darah ke jaringan, sehingga adanya hambatan aliran darah akibat kondisi preeklampsia akan menyebabkan berkurangnya oksigen pada janin, karena kurangnya suplai darah dari ibu ke janin melalui plasenta

akibat spasme vaskuler (Asra, 2018). Pada preeklamsi terjadi spasme pembuluh darah disertai dengan retensi garam dan air. Jika semua arteriola dalam tubuh mengalami spasme, maka tekanan darah akan naik, sebagai usaha untuk mengatasi kenaikan tekanan perifer agar oksigen jaringan dapat dicukupi, maka aliran darah menurun ke placenta dan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin dan karena kekurangan oksigen terjadi gawat janin (Sari, 2021).

e) Anemia

Dalam Mardania (2019) menyebutkan bahwa defisiensi dari zat besi atau anemia akan menyebabkan beberapa kondisi :

- 1) Pada penderita anemia akan terjadi penurunan imunitas karena defisiensi zat besi akan menyebabkan tubuh kekurangan leukosit dan limfosit. Leukosit berguna untuk membunuh mikroorganisme, sedangkan limfosit akan kehilangan kemampuan bereplikasi yang menyebabkan penurunan respon sel dengan imunitas.
- 2) Menurunnya kadar dari zat besi akan menyebabkan gangguan pada produksi triodontironin dan fungsi tiroid, selain itu berkurangnya kadar zat besi juga akan mengganggu produksi dan metabolisme dari katekolamin serta neurotransmitter, yang dapat menyebabkan terganggunya respon tubuh terutama terhadap suhu lingkungan, akibatnya akan memberikan keadaan yang tidak nyaman bagi pasien.
- 3) Defisiensi dari zat besi memicu logam berat divalen seperti kadmium dan timbal. Konsentrasi yang berlebihan dari logam berat tersebut akan memicu terjadinya intoksifikasi sehingga akan mempengaruhi kehamilan dan meningkatkan mortalitas dan morbiditas bagi ibu dan janin yang di kandung.

Pada saat hamil, terjadi peningkatan metabolisme sehingga terjadi peningkatan kebutuhan oksigen yang akan memicu produksi eritropoietin. Untuk menjaga agar konsentrasi hemoglobin dalam tubuh tetap normal, maka diperlukan asupan zat besi untuk ibu hamil sebanyak 30 mg/hari. Ibu hamil dianggap masuk dalam kategori anemia jika kadar Hemoglobin (Hb) dibawah 11 g/dl pada trimester I dan III dibawah 10 g/dl pada trimester II (Prawirohardjo,2020).

Nilai batas untuk anemia pada perempuan^s

Status kehamilan	Hemoglobin (g/dl)	Hematokrit (%)
Tidak hamil	12,0	36
Hamil		
• Trimester 1	11,0	33
• Trimester 2	10,5	32
• Trimester 3	11,0	33

Gambar 2.1. Nilai batas untuk anemia pada perempuan

Selain anemia, juga terdapat kelainan polisitemia yang merupakan suatu kondisi terjadinya peningkatan jumlah sel darah merah dalam sirkulasi, polisitemia merupakan suatu keadaan dimana kadar haemoglobin >16,5 g/dl atau hematokrit >49% pada laki-laki dan >16,0 g/dl atau hematokrit >48% pada wanita (Cahyanur,2019).

f) Eklampsia

Menurut *National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy* dalam Hartono (2019) menyebutkan eklampsia merupakan salah satu hipertensi yang terjadi dalam kehamilan dan merupakan peningkatan tekanan darah yang disertai dengan kejang atau koma (Hartono,2019). Terdapat teori terkait patomekanisme dari eklampsia yang meliputi : (Alfiansyah,2017).

1. Hambatan perkembangan uterovaskuler

Ada beberapa perubahan pada uterovaskuler dimana perubahan tersebut terjadi pada wanita yang sedang hamil, perubahan tersebut dapat disebabkan karena pada wanita hamil terdapat interaksi antara *allograft* janin dan ibu yang menyebabkan terjadinya perubahan vaskuler local dan sistemik. Jadi, pada pasien eklampsia terdapat hambatan pada perkembangan arteri uteorplasenta.

2. Inhibisi regulasi dari aliran darah serebral

Eklampsia menyebabkan tidak normalnya aliran darah serebral. Terdapatnya hambatan pada regulasi perfusi serebral menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah yang disertai dengan meningkatkan permeabilitas, sehingga menyebabkan edema pada serebral, iskemik dan ensefalopati.

3. Disfungsi endotel

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan pada sirkulasi sistemik pada wanita yang hamil yaitu, fibronektin seluler, faktor *Von Willebrand*, molekul adhesi sel (*P-selectin*, *vascular endothelial adhesion molecule-1*), sitokin (IL-6), dan *Tumor Necrosis Factor-a* (TNF-a).

4. Stress oksidatif

Adanya molekul leptin yang tinggi pada peredaran darah wanita yang menderita eklampsia akan menyebabkan agregasi dari trombosit yang juga mempengaruhi koagulasi dan berhubungan dengan eklampsia. Stress oksidatif juga merangsang produksi dan sekresi dan faktor antiangiogenik *activin A* dari sel endotel plasenta.

g) Diabetes Mellitus

Kondisi diabetes mellitus akan menyebabkan kondisi ibu dan janin menjadi semakin berat karena terdapat gangguan pada

pankreas yang bertugas untuk menghasilkan insulin, sehingga akan mengganggu proses metabolisme di dalam tubuh (Meisuri,2018)

Suatu kondisi tubuh dengan resistensi insulin selama kehamilan ditandai dengan hiperinsulinemia. Adanya resistensi insulin ini disebabkan karena adanya hormon diabetogenik yang merupakan hasil dari sekresi plasenta. Hormon ini terdiri dari hormon pertumbuhan, *corticotropin releasing hormon*, *placenta lactogen*, dan progesterone (Mardania,2019).

Hormon ini akan mengalami perubahan endokrinologik serta metabolik yang dapat menyebabkan perubahan dan menjamin bahan metabolisme serta nutrisi yang akan di salurkan ke janin setiap saat. Diabetes Mellitus dalam kehamilan biasanya akan terjadi jika fungsi dari pankreas tidak mampu untuk mengatasi keadaan resistensi insulin sebagai akibat dari perubahan hormon diabetogenik dalam kehamilan. Adapun ibu dengan penyakit Diabetes Mellitus yang tidak terkontrol akan menjadi faktor risiko yang tinggi terhadap kejadian Kematian Janin Dalam Rahim (Mardania,2019).


h) Kehamilan multiple

Kehamilan multiple atau disebut juga dengan gemelli (kehamilan ganda) merupakan suatu kehamilan yang terjadi dengan dua janin ataupun lebih dalam uterus. Kehamilan multiple terbagi atas dua yaitu kehamilan monozigot dan dizigot. Untuk kehamilan monozigot didapatkan dari satu telur yang dibuahi oleh satu sel sperma dan kemudian membelah pada saat setelah fertilisasi. Pada kehamilan monozigot terbagi menjadi beberapa tipe berdasarkan waktu pemisahannya yaitu dikorionik-diamniotik, monokorionik-diamniotik, serta monokorionik-monoamniotik. Selain monozigot juga terdapat jenis dizigot yaitu

janin yang dibuahi dari dua sel telur dan sel sperma yang berbeda. Jenis kehamilan multiple dengan risiko tinggi mengalami kematian janin adalah jenis monokorionik (Saffira,2020).

i) Status Gizi

Status gizi ibu sangat mempengaruhi kesehatan pada janin yang di kandungnya, Menurut *Queensland Guidelines*, faktor risiko maternal seperti Indeks Massa Tubuh (IMT) kejadian kematian janin akan meningkat pada pasien dengan IMT >30 kg/m². Ibu dengan status gizi obesitas akan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi penyakit yang lain seperti diabetes gestasional dan preeklampsia yang juga merupakan salah satu faktor risiko dari kematian janin. (Queensland,2018), Allah swt berfirman dalam QS Al-A'raf 7 : 31 sebagai berikut :



يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “wahai anak cucu Adam ! pakailan pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, maka dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Dalam tafsir ibnu katsir disebutkan bahwa makna yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah makan dan minumlah selagi tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak untuk suatu kesombongan, dikatakan sikap yang berlebihan ialah jika kamu memakan semua makanan yang engkau sukai.

j) Frekuensi *Antenatal Care* (ANC)

Perawatan *Antenatal* merupakan suatu perawatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau kesehatan ibu dan

pertumbuhan janin, serta untuk deteksi dini apabila terdapat masalah atau gangguan maupun komplikasi dalam kehamilan agar dapat ditangani lebih cepat, dengan frekuensi ANC yang teratur akan mengurangi risiko terjadinya kematian janin (Yoteni,2017).

Asuhan Antenatal atau *Antenatal Care* merupakan suatu program pengawasan yang dilakukan sebelum persalinan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada dalam rahim. Ibu yang hamil sebaiknya dianjurkan untuk selalu berkonsultasi dengan bidan atau dokter sedini mungkin mulai sejak hamil agar mendapatkan pelayanan antenatal. (Helvian,2018)

Asuhan ini dilakukan pada setiap trimester sehingga dapat dilakukan pengontrolan apabila terdapat penyakit yang dialami ibu hamil selama masa kehamilannya. Dengan melakukan ANC yang teratur diharapkan ibu hamil dapat terhindari dari berbagai macam komplikasi yang dapat terjadi pada masa kehamilan. (Ihsanul,2020).

Antenatal (ANC) adalah suatu upaya yang sangat penting untuk mengontrol kondisi kesehatan kehamilan Ibu dan janin sehingga hal ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi angka kematian ibu (Sakinah,2018). Jadi *Antenatal Care* (ANC) merupakan suatu metode untuk mendeteksi kehamilan seorang ibu hamil. Pemeriksaan ANC dilakukan rutin sejak masa kehamilan dini, sehingga apabila terdapat ketidaknormalan pada janin maka petugas kesehatan dapat segera mengambil tindakan (Helvian, 2018).

2. Faktor Fetal

a) Kelainan kongenital

Salah satu faktor risiko yang menjadi penyebab terjadinya Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) adalah kelainan kongenital atau malformasi kongenital. Ada beberapa kelainan kongenital yang ditemukan seperti labiopalatoschisis, stenosis pylorus, dislokasi femur kongenital, spina bifida, anencefalus, dan defek jantung kongenital. Dalam Cunningham disebutkan bahwa salah satu penyebab kematian janin adalah kelainan kongenital dimana organ vital tidak terbentuk dengan sempurna pada kelainan jantung. Ada beberapa contoh kelainan kongenital seperti *Neural Tube Defect*, *Hydrops*, Hidrosefalus, dan kelainan jantung (Cunningham,2010). Dalam QS. Ar-Ra'd 13 : 8 Allah swt berfirman :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

Artinya : “Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya”.

b) Pertumbuhan Janin Terhambat (*Intrauterine Growth Restriction* atau IUGR)

Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT), diklasifikasikan menjadi 2 yakni PJT tipe 1 dan PJT tipe 2. Pada PJT tipe 1 disebabkan oleh faktor instrinsik seperti kelainan kromosom dan faktor ekstrinsik seperti bahan teratogenik, infeksi selama kehamilan, kekurangan gizi berat, PJT tipe 1 sering terjadi pada usia kehamilan muda, sedangkan untuk PJT tipe 2 biasanya disebabkan oleh faktor ekstrinsik seperti insufisiensi plasenta dan

umumnya pada usia kehamilan memasuki trimester ke III. Pertumbuhan Janin Terhambat Pertumbuhan janin terhambat yang disertai dengan pulsasi dari vena umbilikal is akan meningkatkan risiko kematian perinatal (Prawirohardjo,2020).

3. Faktor Plasenta

Kondisi Patologis Plasenta


Adanya kelainan pada plasenta merupakan suatu keadaan umum yang menjadi penyebab dari kejadian Kematian Janin Dalam Rahim, adanya faktor plasenta seperti solusio plasenta akan meningkatkan risiko kematian janin (Maslovich,2020).

faktor plasenta yang dapat menyebabkan kematian janin adalah solusio plasenta yang merupakan terlepasnya plasenta dari tempat yang seharusnya di dinding uterus sebelum waktunya. Pelepasan plasenta ini dapat terjadi di retroplasenta yang merupakan akibat dari terjadinya ruptur arteri spiralis, dapat juga terjadi pada marginal sebagai akibat dari rupturnya vena-vena marginalis. Apabila terjadi pelepasan plasenta sebelum waktunya akan menyebabkan terjadinya perdarahan yang hebat bahkan mencapai 1.000 ml dan akan menyebabkan terjadinya kematian janin (Mardania,2019).


Salah satu faktor plasenta yang juga dapat menyebabkan kematian janin adalah kelainan tali pusat sebanyak 75%, apabila terdapat penekanan pada tali pusat oleh bagian terendah dari janin dan jalan lahir maka akan menghambat sirkulasi dari ibu ke janin, yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian janin. Ostruksi yang terjadi pada tali pusat dan apabila obstruksinya menetap akan menyebabkan hipoksia terhadap otot jantung sehingga bila tidak segera ditangani akan menyebabkan terjadinya kematian janin (Mardania,2019). Lilitan tali pusat yang terjadi lebih dari sekali

akan meningkatkan kejadian kematian perinatal, Lilitan tali pusat dapat menyebabkan bradikardi dan hipoksia pada janin jika sudah berlangsung lama (Prawirohardjo, 2020).

Selain solusio plasenta terdapat juga plasenta previa dan vasa previa. Plasenta previa merupakan kondisi dimana plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim (SBR) sehingga menyebabkan penutupan pada sebagian atau seluruh dari ostium uteri internum. Plasenta previa terdiri atas plasenta previa totalis (plasenta menutup seluruh OUI), plasenta previa parsialis (plasenta menutup sebagian OUI), dan plasenta previa marginalis (plasenta berada di tepi OUI), adapula plasenta letak rendah (plasenta berada pada jarak ± 2 cm dari OUI), apabila terjadi kasus plasenta previa akan menyebabkan terjadinya perdarahan pada kehamilan yang dapat berakibat pada gawat janin . Vasa previa merupakan suatu kondisi dimana pembuluh darah dari janin terletak dalam selaput ketuban dan melewati OUI untuk sampai ke dalam insersinya di tali pusat, hal ini dapat menyebabkan terjadinya perdarahan jika selaput ketuban yang melewati pembukaan serviks robek atau pecah sehingga alur vaskularisasi dari janin akan terputus, dan dapat menyebabkan kematian pada janin (Prawirohardjo,2020).




C. Kerangka Teori



Bagan 2.1. Kerangka Teori Penelitian

D. Kerangka Konsep



Bagan 2.2. Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain penelitian *case control*. Jenis penelitian ini menjelaskan sebab-sebab dari suatu kejadian seperti suatu penyakit yang diidentifikasi saat ini lalu faktor risiko atau penyebabnya dikaji pada waktu yang lalu (Masturah,2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko sebagai variabel independen yang menyebabkan kejadian Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) sebagai variabel dependen, dilakukan dengan cara membandingkan dan mengidentifikasi kelompok kasus (yang mengalami KJDR) dengan kelompok kontrol (yang tidak mengalami KJDR), untuk mengetahui paparan faktor risiko terhadap sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu data rekam medik dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar sebagai data penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Bagian Rekam Medik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar, yang akan dilaksanakan pada 27 Desember 2021 – 10 Januari 2022.

C. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung (Sugiyono,2016). Pada penelitian ini peneliti mengambil data sekunder melalui bagian Rekam Medik Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian dengan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti (Sugiyono,2016). Pada penelitian ini populasi untuk kasus adalah semua pasien ibu hamil yang mengalami Kematian Janin Dalam Rahim sedangkan untuk populasi kontrol adalah semua ibu hamil dengan persalinan bayi lahir hidup di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar. Populasi pada penelitian ini diambil dari 1 januari sampai 31 Desember 2021 sebanyak 40 kasus.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi penelitian dan bagian dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pada penelitian ini, sampel yang akan digunakan untuk sampel kasus adalah ibu hamil dengan kejadian kematian janin dalam rahim yang memenuhi kriteria inklus dan kriteria eksklusi, sedangkan untuk sampel kontrol adalah ibu dengan bayi lahir hidup yang memenuhi kriteria inklus dan kriteria eksklusi dan tercatat pada rekam medik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar. Untuk ukuran sampel ditentukam jumlah sampel dari populasi dengan menggunakan rumus *Isaac* dan *Michael* dengan taraf kesalahan 5%.

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan :

s : jumlah sampel

chi kuadrat : berdasarkan tabel *chi square* dengan dk = 1, dan taraf kesalahan = 5% didapatkan chi kuadrat = 3,841 (dalam tabel chi kuadrat)

- N : jumlah populasi = 40
P : peluang benar (0,5)
Q : peluang salah (0,5)
d : perbedaan bias (0,05)

Jadi, dalam penelitian ini didapatkan ukuran sampel sebagai berikut :

$$s = \frac{3,841 \cdot 40 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,05^2 \cdot (40 - 1) + 3,841 \cdot 0,5 \cdot 0,5}$$

$$s = \frac{38,41}{0,0025 (39) + 0,96025}$$

$$s = \frac{38,41}{0,0975 + 0,96025} = \frac{38,41}{1,05775} = 36,31 \text{ (dibulatkan jadi, 36)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan ukuran sampel dengan menggunakan rumus *Isaac* dan *Michael* untuk sampel kasus didapatkan jumlah sampel sebanyak 36 sampel. Pada penelitian ini menggunakan perbandingan 1 : 1 (kasus : kontrol) sehingga untuk sampel kontrol sebanyak 36 sampel. Jadi, total sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 72 sampel yang terdiri dari 36 sampel kasus dan 36 sampel kontrol.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Berdasarkan desain penelitian yaitu *case control*, dibutuhkan sampel kasus dan sampel control. Sehingga, teknik pengambilan sampel kasus dan sampel kontrol pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sampel dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan oleh peneliti. Sampel kasus diperoleh dengan mengambil data pasien yang mengalami

kematian janin dalam rahim, sedangkan untuk sampel kontrol diperoleh dengan mengambil data pasien yang melahirkan bayi hidup, yang didapatkan dari data rekam medik di RSIA Ananda Makassar dan data primer yang bersumber langsung dari pasien. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi dari sampel kasus dan sampel kontrol sebagai berikut :

Sampel Kasus

1. Kriteria Inklusi

- a) Ibu hamil dengan diagnosis kematian janin pada usia kehamilan ≥ 20 minggu.
- b) Memiliki data yang tercatat pada rekam medik RSIA Ananda Makassar
- c) Bersedia menjadi responden.

2. Kriteria Eksklusi

- a) Ibu hamil dengan diagnosis kematian janin namun memiliki data yang tidak lengkap pada rekam medik di RSIA Ananda Makassar.
- b) Tidak bersedia menjadi responden.
- c) Ibu hamil dengan kehamilan multiple.
- d) Ibu yang tidak memiliki riwayat ANC lengkap.
- e) Ibu dengan riwayat pemeriksaan mengalami pertumbuhan janin terhambat (PJT).
- f) Ibu dengan status gizi buruk selama kehamilan

Sampel Kontrol

1. Kriteria Inklusi

- a) Ibu hamil dengan persalinan bayi lahir hidup.
- b) Memiliki data yang tercatat pada rekam medik di RSIA Ananda Makassar.
- c) Bersedia menjadi responden.

2. Kriteria Eksklusi

- a) Ibu hamil dengan diagnosis kematian janin namun memiliki data yang tidak lengkap pada rekam medik di RSIA Ananda Makassar.
- b) Tidak bersedia menjadi responden.
- c) Ibu hamil dengan kehamilan multiple.
- d) Ibu yang tidak memiliki riwayat ANC lengkap.
- e) Ibu dengan riwayat pemeriksaan mengalami pertumbuhan janin terhambat (PJT).
- f) Ibu dengan status gizi buruk selama kehamilan

F. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengumpulan data sekunder dan data primer, pengumpulan data dilakukan setelah mendapatkan izin dari pihak kampus dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri atas :

1. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara pada ibu yang mengalami kejadian kematian janin dalam Rahim.

2. Data Sekunder

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diambil dari catatan rekam medic pasien dan buku KIA pasien pada saat mengalami kematian janin dalam rahim di RSIA Ananda Makassar.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel-tabel tertentu untuk mencatat data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dan diambil dari bagian Rekam Medik di RSIA Ananda Makassar.

H. Pengolahan dan Analisis data

Pengolahan Data

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan cara manual dan dengan bantuan pencatatan SPSS, kalkulator dan Microsoft Excel untuk memperoleh hasil statistic yang diharapkan,

1. *Collecting*

Pengumpulan data sekunder yang bersumber dari Bagian Rekam Medik Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar.

2. *Editing*

Pengeditan merupakan proses untuk memeriksa atau mengoreksi data yang telah dikumpulkan.

3. *Coding*

Melakukan pemberian kode pada variabel yang akan diteliti, seperti nama pasien diubah menjadi inisial nama pasien A, B, C,.....

4. *Entering*

Data yang didapatkan dari Rekam Medik tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi pengolahan data dalam program komputer yaitu SPSS.

5. *Tabulating*

Tabulasi adalah proses yang dilakukan untuk memasukkan data ke dalam bentuk tabel dengan membuat tabel yang mencakup data yang akan dianalisis.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis statistik, dimana analisis statistik yang digunakan yaitu metode analisis univariat dan analisis bivariat.

1. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah analisis untuk menjelaskan dan menggambarkan karakteristik tiap variabel dalam penelitian. Analisis univariat dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan persentase data yang diperoleh terhadap variabel berdasarkan masalah penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel. Untuk analisis univariat dalam penelitian menggunakan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = persentase sampel

f = jumlah variabel independen

n = jumlah sampel kasus

2. Analisis Bivariat

Analisa bivariat yaitu analisa yang digunakan untuk melihat hubungan atau korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen digunakan uji statistik *Odds Ratio (OR)* untuk mengetahui perbandingan faktor risiko dari setiap variabel independen terhadap sampel kasus dan sampel kontrol dengan menggunakan tabel. *Odds Ratio* merupakan rasio antara odd yang terpapar dengan yang tidak terpapar. Adapun rumus dari *Odds Ratio* sebagai berikut :

$$OR = \frac{ad}{bc}$$

Faktor risiko	Kelompok sampel		Jumlah
	Sampel kasus(+)	Sampel kontrol(-)	
(+)	a	b	a+b
(-)	c	d	c+d
Total	a+c	b+d	t

Tabel 3.1. Kontingensi 2x2 Odds Ratio

Keterangan :

- a : Jumlah sampel kasus dengan faktor risiko (+)
- b : jumlah sampel kontrol dengan faktor risiko (+)
- c : jumlah sampel kasus dengan faktor risiko (-)
- d : jumlah sampel kontrol dengan faktor risiko (-)
- a+b : jumlah sampel kasus dan kontrol dengan faktor risiko (+)
- c+d : jumlah sampel kasus dan kontrol dengan faktor risiko (-)
- a+c : jumlah sampel kasus dengan faktor risiko (+) dan (-)
- b+d : jumlah sampel kontrol dengan faktor risiko (+) dan (-)
- t : jumlah keseluruhan

Untuk interpretasi dari *Odds Ratio* :

- a) $OR > 1$ berarti variabel independen merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim.
- b) $OR = 1$ berarti variabel independen bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim.
- c) $OR < 1$ berarti variabel independen merupakan faktor protektif dari kematian janin dalam rahim.

Untuk uji kemaknaan dari *Odds Ratio* dilakukan :

- a) Menentukan nilai dari *Confidence Interval* (CI) yaitu 95%.

b) Menentukan *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL). Adapun interpretasi kebermaknaannya sebagai berikut :

- 1) Jika didapatkan nilai LL dan UL <1 atau >1 , maka OR yang diperoleh memiliki kebermaknaan.
- 2) Jika didapatkan nilai LL dan UL adalah 1, maka OR yang diperoleh tidak memiliki kebermaknaan.


3. Analisis Multivariat


Pada penelitian ini dilakukan analisis multivariate yang bertujuan untuk mendapatkan variabel independen yang memiliki kaitan yang lebih erat dengan variabel dependen, dengan menggunakan uji statistik regresi logistik. Hasil analisis dalam analisis multivariate ini adalah variabel dengan nilai OR yang terbesar dan menjadi faktor risiko yang dominan atau variabel independen utama yang paling mempengaruhi variabel dependen.

I. Penyajian Data

Data yang telah diolah sebelumnya akan disajikan dalam bentuk tabel untuk menggambarkan proporsi faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kejadian Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar.

J. Alur Penelitian





K. Etika penelitian

Mengajukan permohonan persetujuan etika penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Adapun prinsip-prinsip etika penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. *Respect for the person*

Menghormati segala harkat martabat manusia sebagai pribadi yang mempunyai kebebasan berkehendak atau memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri.

2. *Beneficence dan nonmaleficence*

Berkewajiban untuk membantu orang lain dengan dengan berbuat baik dan tidak merugikan siapapun.

3. *Justice*

Obyek penelitian berhak menerima perlakuan yang benar dan layak serta manfaat yang seimbang, peneliti tidak boleh mengambil kesempatan dan keuntungan dari ketidakmampuan masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar, merupakan salah satu rumah sakit yang berstatus swasta, Rumah Sakit ini didirikan oleh PT. Ananda Idy Bahagia, Rumah Sakit ini telah beroperasi sejak 28 Oktober 1995 yang berlokasi di jalan raya yang strategis dan mudah dijangkau yaitu di Jl. Andi Djemma No.58 Makassar atau Jl. Landak Baru No. 63 Makassar. Adapun Visi dari RSIA Ananda Makassar adalah menjadikan Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar terbaik di kota Makassar dengan mengutamakan mutu dalam pelayanan kepada masyarakat, sedangkan misi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar ini adalah melayani dengan senyum, simpatik dan hati yang tulus, serta mengutamakan keselamatan pasien (*Patient safety*), dan memberikan pelayanan yang bermutu dengan SDM yang professional.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan persentase tiap masing-masing variabel dalam penelitian, yang dapat dilihat pada tabel distribusi responden berdasarkan faktor risiko sebagai berikut :

- a. Distribusi Responden berdasarkan Umur Ibu.

Tabel 4.1 Distribusi Responden berdasarkan Umur Ibu di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Variabel	Kasus		Kontrol		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Umur Ibu						
Risiko Tinggi (<20 tahun dan >35 tahun)	8	22,2	3	8,3	11	15,3
Risiko Rendah (20-35 tahun)	28	77,8	33	91,7	61	84,7
Jumlah	36	100,0	36	100,0	72	100,0

Sumber : data sekunder dan data primer

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan distribusi frekuensi responden yang mengalami KJDR dengan umur ibu risiko tinggi yaitu berjumlah 8 orang (22,2%), dan responden yang mengalami KJDR dengan umur ibu risiko rendah yaitu berjumlah 28 orang (77,8%). Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan umur ibu risiko tinggi yaitu berjumlah 3 orang (8,3%) dan responden yang tidak mengalami KJDR dengan umur ibu risiko rendah yaitu berjumlah 33 orang (91,7%). Responden dengan umur risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol.

b. Distribusi Responden berdasarkan Usia Kehamilan.

Tabel 4.2 Distribusi Responden berdasarkan Usia Kehamilan di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Variabel	Kasus		Kontrol		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Usia Kehamilan						
Risiko Tinggi (<37 minggu dan >42 minggu)	23	63,9	2	5,6	25	34,7
Risiko Rendah (37-42 minggu)	13	36,1	34	94,4	47	65,3
Jumlah	36	100,0	36	100,0	72	100,0

Sumber : data sekunder dan data primer

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan distribusi frekuensi responden yang mengalami KJDR dengan usia kehamilan risiko tinggi yaitu berjumlah 23 orang (63,9%), dan responden yang mengalami KJDR dengan usia kehamilan risiko rendah yaitu berjumlah 13 orang (36,1%). Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan usia kehamilan risiko tinggi yaitu berjumlah 2 orang (5,6%) dan responden yang tidak mengalami KJDR dengan usia kehamilan risiko rendah yaitu berjumlah 34 orang (94,4%). Responden dengan usia kehamilan risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol.

c. Distribusi Responden berdasarkan Riwayat Paritas.

Tabel 4.3 Distribusi Responden berdasarkan Riwayat Paritas di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Variabel	Kasus		Kontrol		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Riwayat Paritas						
Risiko Tinggi (≥ 5)	4	11,1	3	8,3	7	9,7
Risiko Rendah (< 5)	32	88,9	33	91,7	65	90,3
Jumlah	36	100,0	36	100,0	72	100,0

Sumber : data sekunder dan data primer

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan distribusi frekuensi responden yang mengalami KJDR dengan riwayat paritas risiko tinggi yaitu berjumlah 4 orang (11,1%), dan responden yang mengalami KJDR dengan riwayat paritas risiko rendah yaitu berjumlah 32 orang (88,9%). Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan riwayat paritas risiko tinggi yaitu berjumlah 3 orang (8,3%) dan responden yang tidak mengalami KJDR dengan riwayat paritas risiko rendah yaitu berjumlah 33 orang (91,7%). Responden dengan riwayat paritas risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol.

d. Distribusi Responden berdasarkan kejadian Preeklampsia.

Tabel 4.4 Distribusi Responden berdasarkan Kejadian Preeklampsia di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Variabel	Kasus		Kontrol		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Preeklampsia						
Risiko Tinggi (Mengalami Preeklampsia)	2	5,6	3	8,3	5	6,9
Risiko Rendah (Tidak mengalami Preeklampsia)	34	94,4	33	91,7	67	93,1
Jumlah	36	100,0	36	100,0	72	100,0

Sumber : data sekunder dan data primer

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan distribusi frekuensi responden yang mengalami KJDR dengan kejadian preeklampsia yaitu berjumlah 2 orang (5,6%), dan responden yang mengalami KJDR tanpa mengalami preeklampsia yaitu berjumlah 34 orang (94,4%). Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan kejadian preeklampsia yaitu berjumlah 3 orang (8,3%) dan responden yang tidak mengalami KJDR tanpa mengalami preeklampsia yaitu berjumlah 33 orang (91,7%). Responden yang mengalami preeklampsia lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok kasus.

e. Distribusi Responden berdasarkan kejadian Eklampsia.

Tabel 4.5 Distribusi Responden berdasarkan Kejadian Eklampsia di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Variabel	Kasus		Kontrol		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Eklampsia						
Risiko Tinggi (Mengalami Eklampsia)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Risiko Rendah (Tidak mengalami Eklampsia)	36	100	36	100	72	100
Jumlah	36	100,0	36	100,0	72	100,0

Sumber : data sekunder dan data primer

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan distribusi frekuensi responden yang mengalami KJDR dengan kejadian eklampsia yaitu berjumlah 0 orang (0,00%), dan responden yang mengalami KJDR tanpa mengalami eklampsia yaitu berjumlah 36 orang (100%). Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan kejadian eklampsia yaitu berjumlah 0 orang (0,00%) dan responden yang tidak mengalami KJDR tanpa mengalami eklampsia yaitu berjumlah 36 orang (100%). Responden yang mengalami eklampsia yang merupakan risiko tinggi tidak didapatkan, baik pada responden dengan KJDR maupun responden yang tidak KJDR.

f. Distribusi Responden berdasarkan kejadian Diabetes Mellitus (DM).

Tabel 4.6 Distribusi Responden berdasarkan kejadian Diabetes Mellitus (DM) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Variabel	Kasus		Kontrol		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Diabetes Mellitus						
Risiko Tinggi (Mengalami DM)	3	8,3	1	2,8	4	5,6
Risiko Rendah (Tidak mengalami DM)	33	91,7	35	97,2	68	94,4
Jumlah	36	100,0	36	100,0	72	100,0

Sumber : data sekunder dan data primer

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan distribusi frekuensi responden yang mengalami KJDR dengan kejadian Diabetes Mellitus yaitu berjumlah 3 orang (8,3%), dan responden yang mengalami KJDR tanpa mengalami Diabetes Mellitus yaitu berjumlah 33 orang (91,7%). Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan kejadian Diabetes Mellitus yaitu berjumlah 1 orang (2,8%) dan responden yang tidak mengalami KJDR tanpa mengalami Diabetes Mellitus yaitu berjumlah 35 orang (97,2%). Responden yang mengalami Diabetes lebih banyak terjadi pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol.

g. Distribusi Responden berdasarkan kejadian Anemia.

Tabel 4.7 Distribusi Responden berdasarkan kejadian Anemia di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Variabel	Kasus		Kontrol		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Anemia						
Risiko Tinggi (Mengalami Anemia)	14	38,9	19	52,8	33	45,8
Risiko Rendah (Tidak mengalami Anemia)	22	61,1	17	47,2	39	54,2
Jumlah	36	100,0	36	100,0	72	100,0

Sumber : data sekunder dan data primer

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan distribusi frekuensi responden yang mengalami KJDR dengan kejadian anemia yaitu berjumlah 14 orang (38,9%), dan responden yang mengalami KJDR tanpa mengalami anemia yaitu berjumlah 22 orang (61,1%). Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan kejadian anemia yaitu berjumlah 19 orang (52,8%) dan responden yang tidak mengalami KJDR tanpa mengalami anemia yaitu berjumlah 17 orang (47,2%). Responden yang mengalami anemia lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok kasus.

h. Distribusi Responden berdasarkan Kelainan Kongenital.

Tabel 4.8 Distribusi Responden berdasarkan Kelainan Kongenital di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Variabel	Kasus		Kontrol		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Kelainan Kongenital						
Risiko Tinggi (Mengalami Kelainan Kongenital)	2	5,6	1	2,8	3	4,2
Risiko Rendah (Tidak mengalami Kelainan Kongenital)	34	94,4	35	97,2	69	95,8
Jumlah	36	100,0	36	100,0	72	100,0

Sumber : data sekunder dan data primer

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan distribusi frekuensi responden dengan KJDR yang mengalami kelainan kongenital pada janin berjumlah 2 orang (5,6%), dan responden dengan KJDR yang tidak mengalami kelainan kongenital pada janin berjumlah 34 orang (94,4%). Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan kelainan kongenital pada janin berjumlah 1 orang (2,8%) serta responden yang tidak mengalami KJDR dan tidak mengalami kelainan kongenital pada janin yaitu berjumlah 35 orang (97,2%). Responden dengan kelainan kongenital pada janin lebih banyak terjadi pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol.

i. Distribusi Responden berdasarkan Kelainan Patologis Plasenta.

Tabel 4.9 Distribusi Responden berdasarkan Kelainan Patologis Plasenta di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Variabel	Kasus		Kontrol		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Kel. Patologis Plasenta						
Risiko Tinggi (Mengalami Kel. Patologis Plasenta)	5	13,9	2	5,6	7	9,7
Risiko Rendah (Tidak mengalami Kel. Patologis Plasenta)	31	86,1	34	94,4	65	90,3
Jumlah	36	100,0	36	100,0	72	100,0

Sumber : data sekunder dan data primer

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan distribusi frekuensi responden yang mengalami KJDR dengan kelainan patologis plasenta yaitu berjumlah 5 orang (13,9%), dan responden yang mengalami KJDR tanpa kelainan patologis plasenta yaitu berjumlah 31 orang (86,1%). Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan kelainan patologis plasenta yaitu berjumlah 2 orang (5,6%) dan responden yang tidak mengalami KJDR tanpa kelainan patologis plasenta yaitu berjumlah 34 orang (94,4%). Responden yang mengalami kelainan patologis plasenta lebih banyak terjadi pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariate bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen digunakan uji statistik *Odds Ratio (OR)* untuk mengetahui perbandingan faktor risiko dari setiap variabel independen terhadap sampel kasus dan sampel kontrol.

a. Risiko kejadian KJDR berdasarkan Umur Ibu.

Tabel 4.10 Risiko kejadian KJDR berdasarkan umur ibu di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Umur Ibu	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	8	22,2	3	8,3	11	15,3	0,190	3,143	0,760	12,993
Risiko Rendah	28	77,8	33	91,7	61	84,7				
Total	36	100,0	36	100,0	72	100,0				

Sumber : data sekunder dan data primer

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa ibu dengan umur risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 8 orang (22,2%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 3 orang (8,3%). Hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 3,143 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,760 dan *Upper Limit* (UL) sebesar 12,993. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan umur berisiko tinggi memiliki risiko 3,143 kali lebih besar untuk mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR) dibanding dengan ibu dengan umur risiko rendah. Nilai *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 3,143 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau umur ibu bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

b. Risiko kejadian KJDR berdasarkan Usia Kehamilan.

Tabel 4.11 Risiko kejadian KJDR berdasarkan usia kehamilan di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Usia kehamilan	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	23	63,9	2	5,6	25	34,7	0,000	30,077	6,195	146,014
Risiko Rendah	13	36,1	34	94,4	47	65,3				
Total	36	100,0	36	100,0	72	100,0				

Sumber : data sekunder dan data primer

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa ibu dengan usia kehamilan risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 23 orang (63,9%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 2 orang (5,6%). Hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 30,077 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 6,195 dan *Upper Limit* (UL) sebesar 146,014. Nilai OR 30,077 yang berarti usia kehamilan merupakan faktor risiko terhadap kematian janin dalam rahim (KJDR). Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan usia kehamilan risiko tinggi memiliki risiko 30,077 kali mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL) dengan tingkat kepercayaan 95% (CI 95% = 6,195 – 146,014) tidak mencakup angka 1 sehingga nilai 30,077 dianggap bermakna secara statistik atau usia kehamilan dengan risiko tinggi merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

c. Risiko kejadian KJDR berdasarkan Riwayat Paritas.

Tabel 4.12 Risiko kejadian KJDR berdasarkan riwayat paritas di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Rwayat Paritas	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	4	11,1	3	8,3	7	9,7	1,000	1,375	0,285	6,635
Risiko Rendah	32	88,9	33	91,7	65	90,3				
Total	36	100,0	36	100,0	72	100,0				

Sumber : data sekunder dan data primer

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa ibu dengan riwayat paritas risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 4 orang (11,1%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 3 orang (8,3%). Hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 1,375 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,285 dan *Upper Limit* (UL) sebesar 6,635. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan riwayat paritas berisiko tinggi memiliki risiko 1,375 kali lebih besar untuk

mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR) dibanding dengan ibu dengan riwayat paritas risiko rendah. Nilai *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 1,375 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau riwayat paritas bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

d. Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian Preeklampsia.

Tabel 4.13 Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian preeklampsia di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Preeklam psia	Kasus		Kontrol		Total		p- value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	2	5,6	3	8,3	5	6,9	1,000	0,647	0,102	4,124
Risiko Rendah	34	94,4	33	91,7	67	93,1				
Total	36	100,0	36	100,0	72	100,0				

Sumber : data sekunder dan data primer

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa ibu dengan preeklampsia lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 3 orang (8,3%) dibandingkan dengan kelompok kasus yang berjumlah 2 orang (5,6%). Hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,647 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,102 dan *Upper Limit* (UL) sebesar 4,124. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan preeklampsia memiliki risiko 0,647 kali mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 0,647 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau preeklampsia bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

- e. Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian Eklampsia.

Tabel 4.14 Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian eklampsia di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Eklampsia	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Risiko Rendah	36	100	36	100	72	100	-	-	-	-
Total	36	100,0	36	100,0	72	100,0				

Sumber : data sekunder dan data primer

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa kejadian eklampsia yang merupakan risiko tinggi tidak didapatkan pada kelompok kontrol maupun kelompok kasus, sehingga tidak dapat dilakukan analisis penelitian.

- f. Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian Diabetes Mellitus.

Tabel 4.15 Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian Diabetes Mellitus (DM) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

DM	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	3	8,3	1	2,8	4	5,6				
Risiko Rendah	33	91,7	35	97,2	68	94,4	0,607	3,182	0,315	32,138
Total	36	100,0	36	100,0	72	100,0				

Sumber : data sekunder dan data primer

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa ibu dengan Diabetes Mellitus (DM) lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 3 orang (8,3%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 1 orang (2,8%). Hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 3,182 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,315 dan *Upper Limit* (UL) sebesar 32,138. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan Diabetes Mellitus memiliki risiko 3,182 kali lebih besar untuk mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat

kepercayaan 95%, sehingga nilai 3,182 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau Diabetes Mellitus bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

g. Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian Anemia.

Tabel 4.16 Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian anemia di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Anemia	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	14	38,9	19	52,8	33	45,8				
Risiko Rendah	22	61,1	17	47,2	39	54,2	0,344	0,569	0,223	1,453
Total	36	100,0	36	100,0	72	100,0				

Sumber : data sekunder dan data primer

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa ibu dengan anemia lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 19 orang (52,8%) dibandingkan dengan kelompok kasus yang berjumlah 14 orang (38,9%). Hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,569 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,223 dan *Upper Limit* (UL) sebesar 1,453. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 0,569 kali lebih besar untuk mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 0,569 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau anemia bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

h. Risiko kejadian KJDR berdasarkan Kelainan Kongenital.

Tabel 4.17 Risiko kejadian KJDR berdasarkan kelainan kongenital di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Kel. kongenital	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	2	5,6	1	2,8	3	4,2				
Risiko Rendah	34	94,4	35	97,2	69	95,8	1,000	2,059	0,178	23,773
Total	36	100,0	36	100,0	72	100,0				

Sumber : data sekunder dan data primer

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa ibu dengan kelainan kongenital pada janin lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 2 orang (5,6%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 1 orang (2,8%). Hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,059 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,178 dan *Upper Limit* (UL) sebesar 23,773. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 2,059 kali lebih besar untuk mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 2,059 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau anemia bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

i. Risiko kejadian KJDR berdasarkan Kelainan Patologis Plasenta.

Tabel 4.18 Risiko kejadian KJDR berdasarkan kelainan patologis plasenta di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Kel. Patologis plasenta	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	5	13,9	2	5,6	7	9,7				
Risiko Rendah	31	86,1	34	94,4	65	90,3	0,426	2,742	0,496	15,168
Total	36	100,0	36	100,0	72	100,0				

Sumber : data sekunder dan data primer

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa ibu dengan kelainan patologis pada plasenta lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 5 orang (13,9%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 2 orang (5,6%). Hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,742 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,496 dan *Upper Limit* (UL) sebesar 15,168. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 2,742 kali lebih besar untuk mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai *Lower Limit* (LL)

dan *Upper Limit* (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 2,742 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau kelainan patologis plasenta bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

3. Analisis Multivariat

Analisis multivariate bertujuan untuk mengetahui variabel independen yang lebih erat kaitannya dengan variabel dependen dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik.

a. Penentuan Variabel Independen yang diikutkan dalam Uji Regresi Logistik

Variabel yang diduga merupakan faktor risiko kejadian kematian janin dalam rahim (KJDR) akan dijadikan calon dalam analisis multivariate. Variabel yang akan diikutkan adalah variabel dengan nilai $p < 0,25$. Ketentuan dari nilai $p < 0,25$ yaitu memberi peluang variabel independen yang mungkin secara bersamaan memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil analisis bivariat dari masing-masing variabel independen yang diikutkan dalam analisis multivariate.

Tabel 4.19 Tabel Hasil Analisis Bivariat Variabel Independen yang diikutkan dalam analisis Multivariat.

Variabel	OR	CI 95%		<i>p-value</i>	Keterangan
		LL	UL		
Umur ibu	3,143	0,760	12,993	0,190	Diikutkan
Usia kehamilan	30,077	6,195	146,014	0,000	Diikutkan
Riwayat paritas	1,375	0,285	6,635	1,000	Tidak Diikutkan
Preeklampsia	0,647	0,102	4,124	1,000	Tidak Diikutkan
Eklampsia	-	-	-	-	Tidak Diikutkan
Diabetes Mellitus	3,182	0,315	32,138	0,607	Tidak Diikutkan
Anemia	0,569	0,223	1,453	0,344	Tidak

					Diikutkan
Kelainan Kongenital	2,059	0,178	23,773	1,000	Tidak Diikutkan
Kelainan patologis plasenta	2,742	0,496	15,168	0,426	Tidak Diikutkan

Sumber : data sekunder dan data primer

Berdasarkan tabel 4.19 menjelaskan bahwa dari 9 variabel yang diteliti, terdapat 2 variabel yang memiliki nilai $p < 0,25$ sehingga diikutkan dalam uji regresi logistik yaitu variabel umur ibu dan usia kehamilan. Sedangkan untuk variabel yang tidak memiliki nilai $p < 0,25$ tidak diikutkan dalam uji tersebut.

b. Hasil Analisis Multivariat

Tabel 4.20 Tabel Hasil Analisis Regresi Berganda Logistik faktor yang paling mempengaruhi Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

Variabel	OR	CI 95%		p-value
		LL	UL	
Umur ibu	2,371	0,419	13,430	0,329
Usia kehamilan	28,583	5,849	139,688	0,000

Sumber : data sekunder dan data primer

Tabel 4.20 menunjukkan hasil analisis multivariate dengan menggunakan uji regresi berganda logistic yang menunjukkan bahwa 2 variabel yang diikutkan dalam uji regresi berganda logistik, didapatkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar adalah Usia Kehamilan dengan nilai $p < 0,000 < 0,25$ dan nilai OR 28,583 (CI 95% = 5,849 – 139,688).

C. Pembahasan

Telah dilakukan penelitian terkait faktor risiko yang menyebabkan Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021. Selama pengambilan sampel didapatkan sebanyak 36 sampel yang mengalami kematian janin dalam rahim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan

bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kematian janin dalam rahim yaitu umur ibu, usia kehamilan, riwayat paritas, preeclampsia, eklampsia, diabetes mellitus, anemia, kelainan kongenital dan kelainan patologis plasenta.

a. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan Umur Ibu.

Umur Ibu pada penelitian ini adalah umur ibu pada saat kehamilan terakhir. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 3,143 pada CI 95% dengan nilai *lower limit* (LL) 0,760 dan *upper limit* (UL) sebesar 12,993. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan umur risiko tinggi memiliki risiko 3,143 kali mengalami kematian janin dalam rahim dibandingkan dengan ibu dengan umur risiko rendah. Nilai *lower limit* dan *upper limit* mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 3,143 dianggap tidak bermakna secara statistic atau umur ibu bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogi, Suci dan Wahyuni (2021) dengan judul Faktor Risiko Kematian Janin dalam Rahim pada Ibu Hamil dengan Malaria di Puskesmas Sentani Kabupaten Jayapura, penelitian tersebut menunjukkan bahwa umur ibu tidak memiliki hubungan dengan kejadian kematian janin. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartalina (2020) dengan judul penelitian Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian IUFD di RSUD Embung Fatimah Kota Batam, yang menunjukkan bahwa umur ibu merupakan faktor risiko dari kematian janin dengan OR 1,977 kali mengalami kematian janin dibandingkan dengan ibu yang memiliki umur tidak berisiko.

Dalam penelitian ini umur ibu bukan merupakan faktor risiko terjadinya kematian janin dalam rahim, sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori. Umur ibu merupakan faktor risiko terjadinya

kematian janin dalam rahim, hal ini disebabkan karena pada usia <20 tahun ibu hamil dianggap belum siap secara emosional dan fisik sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi dalam kehamilan, seperti organ reproduksi yang belum siap untuk kehamilan, dan peredaran darah menuju serviks dan uterus belum sempurna sehingga akan mengganggu pemberian nutrisi dari janin. Selain itu ibu hamil dengan usia <20 tahun belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatannya (Mahardika,2019 dan Meisuri,2018). Sedangkan, pada usia >35 tahun akan terjadi penurunan fungsi dari reproduksi sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi dalam kehamilan seperti kematian janin. Ibu dengan usia >35 tahun mengalami penurunan dari perfusi uteroplasenta sehingga vaskularisasi akan semakin berkurang, dan akan mengganggu distribusi nutrisi yang disalurkan dari ibu ke janin (Mahardika,2019 dan Luqyana,2017). Kelompok umur 20-35 tahun merupakan usia reproduktif karena masih memiliki fungsi reproduksi yang baik. Namun meskipun pada usia reproduktif kematian janin juga dapat terjadi, hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran ibu akan pentingnya menjaga kesehatan kehamilannya (Asra,2018).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur ibu tidak bermakna secara signifikan terhadap kematian janin dalam rahim, sehingga umur ibu bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim. Menurut peneliti, hal ini bisa saja terjadi karena ibu dengan umur risiko tinggi untuk mengalami kematian janin dalam rahim, sudah melakukan pemeriksaan kehamilannya secara rutin, atau ibu dengan umur berisiko namun yang dibekali dengan pengetahuan yang cukup terkait kondisi kesehatan kehamilannya, dapat mengurangi risiko terjadinya kematian janin dalam rahim.

- b. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan Usia Kehamilan.

Usia kehamilan pada penelitian ini adalah lama waktu janin berada dalam kandungan ibu hingga kejadian kematian janin terjadi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa usia kehamilan dengan risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 23 orang (63,9%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 2 orang (5,6%). Hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 30,077 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 6,195 dan *Upper Limit* (UL) sebesar 146,014. Nilai OR 30,077 yang berarti usia kehamilan merupakan faktor risiko terhadap kematian janin dalam rahim (KJDR). Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan usia kehamilan risiko tinggi memiliki risiko 30,077 kali mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL) dengan tingkat kepercayaan 95% (CI 95% = 6,195 – 146,014) tidak mencakup angka 1 sehingga nilai 30,077 dianggap bermakna secara statistik atau usia kehamilan dengan risiko tinggi merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofia Semian (2018) dengan judul penelitian Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kejadian IUFD di Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, menunjukkan bahwa usia kehamilan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim, dengan hasil penelitian OR 2,495 yang menunjukkan bahwa usia kehamilan <37 dan >42 minggu berisiko 2,495 kali mengalami KJDR dibandingkan dengan usia kehamilan yang tidak berisiko. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triana (2012) menunjukkan bahwa umur kehamilan ≤ 40 minggu memiliki risiko 2,5 kali mengalami KJDR.

Dalam penelitian ini, usia kehamilan merupakan faktor risiko terjadinya kematian janin dalam rahim, sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan teori. Usia kehamilan merupakan faktor risiko terjadinya

kematian janin dalam rahim, hal ini disebabkan karena pada usia kehamilan <37 minggu, belum terjadi perkembangan paru yang sempurna, otot pada saluran pernafasan masih tidak bekerja dengan baik, dan tulang tulang pernafasan masih melengkung. Semakin muda usia kehamilan seorang wanita maka akan semakin kurang sempurna pertumbuhan dan perkembangan dari organ-organ dalam tubuh, baik secara anatomi maupun secara fisiologi sehingga akan memudahkan terjadinya komplikasi seperti asfiksia dan kematian janin (Caroline, 2019). Sedangkan pada kehamilan posterm (>42 minggu) fungsi plasenta mulai mengalami penurunan sehingga dengan adanya penurunan dari fungsi plasenta dan spasme dari arteri spiralis, hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya pemasokan makanan serta oksigen bagi janin yang melalui plasenta (Mardania, 2019). Menurut peneliti, kelompok ibu dengan usia kehamilan 37-42 minggu merupakan risiko rendah karena pada usia kehamilan tersebut, organ-organ pada janin sudah mulai sempurna dan janin sudah siap untuk hidup di luar kandungan.

- c. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan Riwayat Paritas.

Riwayat paritas pada penelitian ini adalah jumlah persalinan yang telah terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa riwayat paritas dengan risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 4 orang (11,1%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 3 orang (8,3%). Hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 1,375 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,285 dan *Upper Limit* (UL) sebesar 6,635. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan riwayat paritas berisiko tinggi memiliki risiko 1,375 kali lebih besar untuk mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR) dibanding dengan ibu dengan riwayat paritas risiko rendah. Nilai *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat

kepercayaan 95%, sehingga nilai 1,375 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau riwayat paritas bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogi, Suci dan Wahyuni (2021) dengan judul penelitian Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) pada Ibu hamil dengan Malaria di Puskesmas Sentani Kabupaten Jayapura, yang menunjukkan bahwa paritas tidak memiliki hubungan dengan kejadian kematian janin. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartalina (2020) dengan judul penelitian Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian IUFD di RSUD Embung Fatimah Kota Batam menjelaskan bahwa paritas merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim, paritas dengan risiko tinggi memiliki risiko 3,852 kali mengalami kematian janin. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liya Lugita (2021) dengan judul penelitian Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Intrauterine Fetal Death (IUFD) pada Ibu Bersalin di RSUD Hasanuddin Damrah Manna yang menunjukkan bahwa paritas merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim, ibu dengan paritas berisiko memiliki peluang 1,5 kali mengalami kematian janin dibandingkan dengan ibu dengan paritas tidak berisiko.

Dalam penelitian ini, riwayat paritas bukan merupakan faktor risiko terjadinya kematian janin dalam rahim, sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Winjosastro (2016) bahwa paritas yang berisiko melahirkan dengan KJDR adalah ibu dengan paritas >4 , semakin tinggi paritas maka kondisi endometrium akan semakin buruk dan akan mempengaruhi pada kehamilan berikutnya, hal ini disebabkan karena vaskularisasi yang berkurang ataupun karena perubahan pada atrofi desidua, yang berakibat pada kematian janin. Riwayat paritas merupakan faktor risiko

terjadinya kematian janin dalam rahim, hal ini disebabkan karena tingginya paritas akan menyebabkan kondisi uterus belum pulih untuk hamil kembali, sehingga akan mempengaruhi endometrium pada saat kehamilan selanjutnya, hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya vaskularisasi atau karena adanya atrofi pada desidua sebagai akibat dari persalinan yang terjadi sebelumnya (Mardania,2019).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paritas tidak bermakna secara signifikan terhadap kematian janin dalam rahim, sehingga riwayat paritas bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim. Menurut peneliti, hal tersebut dapat terjadi karena ibu dengan riwayat paritas risiko tinggi, sudah memiliki pengalaman di kehamilan sebelumnya sehingga, ibu akan lebih mempersiapkan kehamilannya, seperti menjaga jarak kehamilan untuk memberikan waktu bagi uterus untuk kembali pulih.

d. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan kejadian Preeklampsia.

Preeklampsia pada penelitian ini adalah responden dengan diagnosis mengalami preeklampsia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preeklampsia lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 3 orang (8,3%) dibandingkan dengan kelompok kasus yang berjumlah 2 orang (5,6%). Hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,647 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,102 dan *Upper Limit* (UL) sebesar 4,124. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan preeklampsia memiliki risiko 0,647 kali mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 0,647 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau preeklampsia bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Alvira (2017) dengan judul penelitian Karakteristik ibu bersalin dengan *intra uterine fetal death* (IUFD) di RS TK II Kartika Husada Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara preeklampsia dengan kejadian KJDR. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Budi (2017) dengan judul penelitian Karakteristik pasien ibu hamil dengan Preeklampsia di RSUP Sanglah Denpasar. Menunjukkan bahwa preeklampsia merupakan faktor risiko dengan risiko 5 kali lebih besar mengalami kematian janin.

Dalam penelitian ini, preeklampsia bukan merupakan faktor risiko terhadap terjadinya kematian janin dalam rahim, berdasarkan hasil penelitian preeklampsia merupakan faktor protektif terhadap kematian janin dalam rahim, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori, bahwa preeklampsia merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim, hal ini disebabkan karena adanya kejadian preeklampsia terjadi spasme pembuluh darah, jika semua arteriola dalam tubuh mengalami spasme, maka tekanan darah akan naik, sebagai usaha untuk mengatasi kenaikan tekanan perifer agar oksigen jaringan dapat dicukupi, maka aliran darah menurun ke placenta sehingga menyebabkan kurangnya suplai oksigen ke janin dan karena kekurangan oksigen terjadilah gawat janin akibat spasme vaskuler tersebut (Asra,2018). Akibatnya akan terjadi vasokonstriksi yang menyebabkan penurunan aliran darah ke janin sehingga terjadilah hipoksia yang dapat menjadi penyebab dari kematian janin dalam rahim (Mardania,2019).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preeklampsia tidak bermakna secara signifikan terhadap kematian janin dalam rahim, sehingga preeklampsia bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim. Menurut peneliti, adanya penyakit dalam kehamilan

seperti preeklampsia yang merupakan faktor risiko yang dapat dimodifikasi dengan perbaikan gaya hidup, yaitu dengan mengurangi konsumsi garam dan patuh mengonsumsi obat penurun tekanan darah yang sudah diresepkan oleh dokter kandungan kepada pasien.

- e. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan kejadian Eklampsia.

Eklampsia pada penelitian ini adalah responden dengan diagnosis mengalami eklampsia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kejadian eklampsia yang merupakan risiko tinggi tidak didapatkan pada kelompok kasus maupun kelompok kontrol, sehingga tidak dapat dilakukan analisis penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa eklampsia yang merupakan risiko tinggi tidak didapatkan pada kasus kematian janin.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori bahwa eklampsia merupakan faktor risiko dari kematian janin, hal ini disebabkan karena pada wanita yang sedang hamil terjadi perubahan pada uterovaskuler, perubahan tersebut dapat disebabkan karena pada wanita hamil terdapat interaksi antara *allograft* janin dan ibu yang menyebabkan terjadinya perubahan vaskuler lokal dan sistemik. Jadi, pada pasien eklampsia terdapat hambatan pada perkembangan arteri uteroplenta, yang berhubungan langsung dengan janin (Alfiansyah,2017).

- f. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan kejadian Diabetes Mellitus.

Diabetes Mellitus (DM) pada penelitian ini adalah responden dengan diagnosis mengalami Diabetes Mellitus (DM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Diabetes Mellitus (DM) lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 3 orang (8,3%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 1 orang (2,8%). Hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 3,182 pada CI 95% dengan *Lower*

Limit (LL) sebesar 0,315 dan *Upper Limit* (UL) sebesar 32,138. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan Diabetes Mellitus memiliki risiko 3,182 kali lebih besar untuk mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 3,182 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau Diabetes Mellitus bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulansi (2012) dengan judul penelitian faktor- faktor yang mempengaruhi kejadian IUFD di RSUD Ende Kupang menunjukkan bahwa Diabetes Mellitus bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim, dengan hasil penelitian tidak didapatkannya kasus kematian janin dalam rahim berdasarkan penyakit penyerta yaitu Diabetes Mellitus. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmed Hussain dkk (2020) di Pusat Medis AL Portsmouth menunjukkan, bahwa Diabetes Mellitus merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim dengan risiko 4-6 kali mengalami kematian janin dalam rahim, dibandingkan dengan ibu tanpa diabetes mellitus.

Dalam penelitian ini, Diabetes Mellitus (DM) bukan merupakan faktor risiko terjadinya kematian janin dalam rahim. Sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori. Diabetes Mellitus merupakan faktor risiko terjadinya kematian janin dalam rahim, hal ini disebabkan karena, kondisi diabetes mellitus akan menyebabkan kondisi ibu dan janin menjadi semakin berat karena terdapat gangguan pada pankreas yang bertugas untuk menghasilkan insulin, sehingga akan mengganggu proses metabolisme di dalam tubuh (Meisuri,2018). Adanya resistensi insulin ini disebabkan karena adanya hormon diabetogenik yang merupakan hasil dari sekresi plasenta. Hormon ini terdiri dari hormon pertumbuhan, *corticotropin releasing hormon*, *placenta lactogen*, dan

progesterone. Hormon ini akan mengalami perubahan endokrinologik serta metabolik yang dapat menyebabkan perubahan dan menjamin bahan metabolisme serta nutrisi yang akan di salurkan ke janin setiap saat. Diabetes Mellitus dalam kehamilan biasanya akan terjadi jika fungsi dari pankreas tidak mampu untuk mengatasi keadaan resistensi insulin sebagai akibat dari perubahan hormon diabetogenik dalam kehamilan. Sehingga ibu dengan penyakit Diabetes Mellitus yang tidak terkontrol akan menjadi faktor risiko yang tinggi terhadap kejadian Kematian Janin Dalam Rahim (Mardania,2019).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Diabetes Mellitus tidak bermakna secara signifikan terhadap kematian janin dalam rahim, sehingga Diabetes Mellitus bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim. Menurut peneliti, hal ini bisa saja terjadi karena, adanya penyakit dalam kehamilan seperti Diabetes Mellitus yang merupakan faktor risiko yang dapat dimodifikasi dengan perbaikan gaya hidup yaitu dengan rutin melakukan pemeriksaan selama kehamilan, selain memantau kondisi kehamilan juga dapat mengetahui apabila ada penyakit penyulit dalam kehamilan, sehingga dapat segera dilakukan tindakan kuratif terhadap penyakit tersebut. Selain itu, ibu juga dapat melakukan pemeriksaan untuk memantau kadar glukosa darah jika memiliki riwayat DM dalam keluarga sehingga, apabila pasien memiliki penyakit Diabetes dapat dikontrol sesegera mungkin agar kondisi pasien tidak memperburuk janin yang dikandungnya.

- g. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan kejadian Anemia.

Anemia pada penelitian ini adalah responden dengan kadar Hb <11 g/dl. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu dengan anemia lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 19 orang (52,8%) dibandingkan dengan kelompok kasus yang berjumlah 14

orang (38,9%). Hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,569 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,223 dan *Upper Limit* (UL) sebesar 1,453. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 0,569 kali lebih besar untuk mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 0,569 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau anemia bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meisuri (2018) dengan judul penelitian Faktor Determinan yang mempengaruhi Kejadian Kematian Perinatal di Kota Lampung yang menunjukkan bahwa anemia bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simamora (2016) dengan judul penelitian Gambaran Kematian Perinatal di RSUP Prof Dr. dr. D. Kandou Manado menunjukkan bahwa anemia merupakan faktor risiko dari kematian janin dan memiliki risiko 2,309 kali mengalami kematian janin dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami anemia, hal ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triana (2012) dengan judul penelitian Pengaruh Kadar Hb dan Paritas dengan Kejadian Intrauterine Fetal Death (IUFD) di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru yang menunjukkan bahwa anemia memiliki risiko 1,772 kali mengalami kematian janin, serta penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2020) dengan judul penelitian Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Intra Uterine Fetal Death (IUFD) di RSUD Imelda Medan, menunjukkan bahwa anemia berisiko 2,309 kali mengalami KJDR.

Dalam penelitian ini, anemia bukan merupakan faktor risiko terjadinya kematian janin dalam rahim, berdasarkan hasil penelitian anemia merupakan faktor protektif dari kematian janin dalam rahim, sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori bahwa anemia

merupakan faktor risiko dari KJDR hal ini disebabkan karena, pada saat hamil terjadi peningkatan metabolisme sehingga terjadi peningkatan kebutuhan oksigen yang akan memicu produksi eritropoietin. Ibu hamil dianggap masuk dalam kategori anemia jika kadar Hemoglobin (Hb) dibawah 11 g/dl (Prawirohardjo,2020). Adanya Defisiensi dari zat besi memicu logam berat divalen seperti kadmium dan timbal. Konsentrasi yang berlebihan dari logam berat tersebut akan memicu terjadinya intoksifikasi sehingga akan mempengaruhi kehamilan dan meningkatkan mortalitas dan morbiditas bagi ibu dan janin yang di kandung (Mardania,2019).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anemia tidak bermakna secara signifikan terhadap kematian janin dalam rahim, sehingga Anemia bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim. Menurut peneliti, hal ini bisa saja terjadi karena, ibu telah melakukan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya anemia yaitu dengan rutin melakukan ANC, sehingga kondisi kehamilannya dikontrol dan kadar Hb dari ibu juga dapat terpantau, maka dapat dilakukan pencegahan terhadap anemia tersebut, dengan pemberian tablet Fe jika ibu patuh mengonsumsinya maka kadar Hb ibu dapat terkontrol.

- h. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan Kelainan Kongenital.

Kelainan kongenital pada penelitian ini adalah responden dengan diagnosis janin mengalami kelainan kongenital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu dengan janin mengalami kelainan kongenital lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 2 orang (5,6%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 1 orang (2,8%). Hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,059 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,178 dan *Upper Limit* (UL)

sebesar 23,773. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan kelainan kongenital memiliki risiko 2,059 kali lebih besar untuk mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 2,059 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau kelainan kongenital bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofia Semian (2018) dengan judul penelitian Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kejadian IUFD di Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Manggarai Barat, menunjukkan bahwa kelainan kongenital merupakan faktor risiko dari KJDR dengan risiko sebesar 1,239 kali mengalami KJDR, selain itu penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummul Mahmudah dkk (2011) dengan hasil penelitian Analisis Faktor Ibu dan Bayi yang Berhubungan dengan Kejadian Kematian Perinatal di Kabupaten Batang yang menunjukkan, bahwa janin yang mengalami kelainan kongenital memiliki 2,205 kali berisiko mengalami KJDR. Dalam penelitian ini, kelainan kongenital bukan merupakan faktor risiko terjadinya kematian janin dalam rahim sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori. Kelainan kongenital dikaitkan dengan pematangan organ vital, yang pembentukannya tidak sempurna (Cunningham,2010). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelainan kongenital tidak bermakna secara signifikan terhadap kematian janin dalam rahim, sehingga kelainan kongenital bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim. Menurut peneliti, ketidakbermaknaan hasil penelitian ini, disebabkan karena ibu dengan kelainan kongenital, telah rutin melakukan pemeriksaan kehamilan, sehingga dapat dilakukan observasi selama kehamilan untuk mengetahui perkembangan janin, melakukan evaluasi apabila didapatkan adanya kondisi seperti kondisi kelainan kongenital maka

dapat diketahui apakah terdapat pemulihan atau prognosis yang baik. Dengan melakukan pemeriksaan kehamilan yang rutin juga dapat menentukan jenis persalinan yang akan dilakukan untuk menyelamatkan ibu dan janin yang dikandungnya.

- i. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan Kelainan Patologis Plasenta.

Kelainan patologis plasenta pada penelitian ini adalah responden dengan diagnosis kelainan patologis plasenta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelainan patologis plasenta lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 5 orang (13,9%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 2 orang (5,6%). Hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,742 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,496 dan *Upper Limit* (UL) sebesar 15,168. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 2,742 kali lebih besar untuk mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 2,742 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau kelainan patologis plasenta bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofian Semian (2018) dengan judul penelitian Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kejadian IUFD di Kabupaten Manggarai Barat, menunjukkan bahwa kelainan patologis merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim, dengan adanya kelainan patologis pada plasenta berisiko 1,771 kali mengalami KJDR.

Dalam penelitian ini, kelainan patologis plasenta bukan merupakan faktor risiko terjadinya kematian janin dalam rahim, hal ini tidak sesuai dengan teori. Berdasarkan penelitian didapatkan kelainan patologis plasenta pada sampel kasus yaitu plasenta previa, solusio

plasenta dan lilitan tali pusat, Plasenta previa merupakan kondisi dimana plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim (SBR) sehingga menyebabkan penutupan pada sebagian atau seluruh dari ostium uteri internum. Plasenta previa terdiri atas plasenta previa totalis (plasenta menutup seluruh OUI), plasenta previa parsialis (plasenta menutup sebagian OUI), dan plasenta previa marginalis (plasenta berada di tepi OUI), adapula plasenta letak rendah (plasenta berada pada jarak ± 2 cm dari OUI, apabila terjadi kasus plasenta previa akan menyebabkan terjadinya perdarahan pada kehamilan yang dapat berakibat pada gawat janin (Prawirohardjo,2020). Faktor kelainan patologis plasenta yang lain adalah solusio plasenta, yang merupakan terlepasnya plasenta dari tempat yang seharusnya di dinding uterus sebelum waktunya, hal ini akan menyebabkan anoksia pada janin yang berakibat pada kematian janin (Mardania,2019).

Selain plasenta previa dan solusio plasenta juga didapatkan kelainan patologis dari plasenta yaitu lilitan tali pusat (LTP), hal ini akan meningkatkan kejadian kematian perinatal, karena dapat menyebabkan bradikardi dan hipoksia pada janin jika sudah berlangsung lama (Prawirohardjo,2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelainan patologis plasenta tidak bermakna secara signifikan terhadap kematian janin dalam rahim, sehingga kelainan patologis plasenta bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim. Menurut peneliti, ketidakbermaknaan hasil penelitian ini disebabkan karena ibu telah melakukan pemeriksaan ANC yang rutin sehingga dapat dipantau kondisi kehamilannya dan juga dapat dilakukan persiapan untuk mengangani apabila ada kelainan plasenta pada janin yang dapat menyebabkan gawat janin, selain itu juga dapat dilakukan persiapan untuk persalinan dengan pilihan persalinan normal atau dengan sectio caesar. Ibu dengan kelainan plasenta sudah

membatasi aktivitas sehari-hari dan memperbanyak istirahat agar mengurangi kontraksi pada rahim yang dapat memicu perdarahan.

j. Hasil Analisis Multivariat

Berdasarkan hasil uji multivariate dengan menggunakan uji regresi logistik yang menunjukkan bahwa 2 variabel yang diikutkan dalam uji regresi berganda logistik didapatkan hasil bahwa nilai variabel dengan nilai $p < 0,25$ adalah variabel usia kehamilan. Oleh karena itu faktor risiko terbesar yang mempengaruhi kematian janin dalam rahim adalah usia kehamilan dengan nilai $p \ 0,000 < 0,25$ dan nilai OR 28,583 (CI 95% = 5,849 – 139,688).

Dalam penelitian ini, usia kehamilan merupakan faktor risiko yang paling mempengaruhi terjadinya kematian janin dalam rahim, hal ini disebabkan karena pada usia kehamilan < 37 minggu, belum terjadi perkembangan paru yang sempurna, otot pada saluran pernafasan masih tidak bekerja dengan baik, dan tulang tulang pernafasan masih melengkung. Semakin muda usia kehamilan seorang wanita maka akan semakin kurang sempurna pertumbuhan dan perkembangan dari organ-organ dalam tubuh, baik secara anatomi maupun secara fisiologi sehingga akan memudahkan terjadinya komplikasi seperti asfiksia dan kematian janin (Caroline, 2019). Sedangkan pada kehamilan posterm (> 42 minggu) fungsi plasenta mulai mengalami penurunan sehingga dengan adanya penurunan dari fungsi plasenta dan spasme dari arteri spiralis, hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya pemasokan makanan serta oksigen bagi janin yang melalui plasenta (Mardania, 2019). Menurut peneliti, kelompok ibu dengan usia kehamilan 37-42 minggu merupakan risiko rendah karena pada usia kehamilan tersebut, organ-organ pada janin sudah mulai sempurna dan janin sudah siap untuk hidup di luar kandungan.

D. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam pengumpulan data diperoleh catatan medik data yang tidak lengkap dalam berkas rekam medik sehingga dianggap sebagai *missing case* dan tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian.
2. Jumlah sampel penelitian yang kurang mencukupi karena banyaknya variabel yang diteliti sehingga mempengaruhi kemaknaan hasil pengolahan data.
3. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan kriteria yang ditentukan oleh peneliti, sehingga sampel dengan variabel kasus tetapi tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian yang dilakukan tentang analisis faktor risiko kejadian kematian janin dalam rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ibu dengan umur risiko tinggi memiliki nilai $p = 0,190$ dengan OR 3,143 kali mengalami kematian janin dalam rahim dibandingkan dengan ibu dengan umur risiko rendah, tetapi faktor risiko ini tidak signifikan, sehingga umur ibu bukan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.
2. Ibu dengan usia kehamilan risiko tinggi memiliki nilai $p = 0,000$ dengan OR 30,077 kali mengalami kematian janin dalam rahim dibandingkan dengan ibu dengan usia kehamilan risiko rendah, dan faktor risiko ini signifikan, sehingga usia kehamilan adalah faktor risiko dari kematian janin dalam rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.
3. Ibu dengan riwayat paritas risiko tinggi memiliki nilai $p = 1,000$ dengan OR 1,375 kali mengalami kematian janin dalam rahim dibandingkan dengan ibu dengan riwayat paritas risiko rendah tetapi faktor risiko ini tidak signifikan, sehingga riwayat paritas bukan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.
4. Ibu dengan preeklampsia merupakan faktor protektif dengan nilai $p = 1,000$ dan OR sebesar 0,647, faktor risiko ini tidak signifikan, sehingga preeklampsia bukan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.
5. Ibu dengan eklampsia yang merupakan risiko tinggi tidak didapatkan pada kasus kematian janin dalam rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.
6. Ibu dengan Diabetes Mellitus yang merupakan risiko tinggi memiliki nilai $p = 0,607$ dengan OR 3,182 kali mengalami kematian janin dibandingkan

dengan ibu yang tidak mengalami Diabetes Mellitus, tetapi faktor risiko ini tidak signifikan, sehingga Diabetes Mellitus bukan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

7. Anemia (Kadar Hb <11 g/dl) merupakan faktor protektif dengan nilai $p = 0,344$ dan OR sebesar 0,569 kali terhadap kematian janin dalam rahim, dan risiko ini tidak signifikan, sehingga anemia bukan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.
8. Ibu dengan janin mengalami kelainan kongenital yang merupakan risiko tinggi memiliki nilai $p = 1,000$ dengan OR 2,059 kali mengalami kematian janin dalam rahim dibandingkan dengan ibu dengan janin tanpa kelainan kongenital, tetapi faktor risiko ini tidak signifikan, sehingga kelainan kongenital bukan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.
9. Ibu dengan kelainan patologis plasenta yang merupakan risiko tinggi memiliki nilai $p = 0,426$ dengan OR 2,742 kali mengalami kematian janin dalam rahim dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami kelainan patologis plasenta, tetapi faktor risiko ini tidak signifikan, sehingga kelainan patologis plasenta bukan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.
10. Faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian kematian janin dalam rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021 adalah Usia Kehamilan dengan nilai $p = 0,000$ dan OR sebesar 28,583.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

- a) Memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kematian janin dalam rahim, dengan melakukan pencegahan sebelum dan selama masa kehamilan.
- b) Rajin melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan agar kondisi ibu dan janin dapat terpantau.

- c) Memperluas wawasan ibu terkait informasi mengenai kematian janin dalam rahim agar dapat dilakukan langkah pencegahan yang tepat.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

- a) Diharapkan kepada petugas kesehatan agar dapat mengenali dan melakukan usaha-usaha preventif pada saat ibu hamil melakukan ANC sehingga faktor risiko KJDR dapat dihindari.
- b) Diharapkan pada petugas kesehatan agar mengisi data rekam medic secara lengkap dengan pengisian yang mudah dibaca serta menyimpan data rekam medic di tempat yang aman dengan rapi dan teratur agar tidak ada data rekam medik yang hilang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi data dasar dalam penelitian selanjutnya.
- b) Mengembangkan penelitian ini seperti menambahkan variabel-variabel lain yang juga merupakan faktor risiko yang dapat diteliti.
- c) Melakukan penelitian di rumah sakit yang lain dan sampel yang lebih jelas antara variabel dependen-independen.



DAFTAR PUSTAKA

- Adeyani, Alif. dkk. “*Kematian Janin Dalam Rahim Ditinjau dari Aspek Medis, Kaidah Dasar Bioetik, dan Keutamaannya dalam Tinjauan Islam*”. UMI Medical Journal, Vol.4, No.2 (Desember 2019). Diakses dari <http://jurnal.fk.umi.ac.id/index.php/umimedicaljournal/article/view/67> pada 17 Agustus 2021
- Alsammani, Mohamed Alkhatim. “*Incidence and Causes of Stillbirth in Omdurman Maternity Hospital, Sudan : A Prospective Cross Sectional Study*”. diakses dari <https://www.cureus.com/articles/58631-incidence-and-causes-of-stillbirth-in-omdurman-maternity-hospital-sudan-a-prospective-cross-sectional-study.pdf> pada 16 Agustus 2021
- Alfiansyah, Angga dan Rodiani. “*Wanita Usia 20 Tahun, Primigravida Hamil 37 Minggu dengan Eklampsia Antepartum*”. Jurnal Medula Unila, Vol.7, No.1. (2017) Diakses dari <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/medula/article/view/739> pada 05 Oktober 2021.
- Asra, Nurhuda. dkk. “*Analisis Hubungan Faktor Resiko dengan Kejadian Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di RSIA ST. Khadijah I Makassar Tahun 2018*”. Jurnal Ilmiah Kesehatan Diangosis (2018). Diakses dari <http://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jikd/article/download/72/69/339> pada 09 Agustus 2021
- Badan Pusat Statistik (BPS). Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup menurut Provinsi 2012-2017. <https://www.bps.go.id/indicator/30/1584/1/angka-kematian-bayi-akb-per-1000-kelahiran-hidup-menurut-provinsi.html> diakses pada 10 Agustus 2021
- Bano, Nosheen, dkk. “*Intrauterine Fetal Deaths : Frequency of Causes at A Tertiary Care Hospital*”. *The Professional Medical Journal*. Volume 23, Issue 6 (2016). h.731-735. diakses dari <http://theprofesional.com/index.php/tpmj/article/download/1626/1322> pada 16 Agustus 2021

- Cahyanur, Rahmat dan Rinaldi Ikhwan. “*Pendekatan Klinis Polisitemia*”. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol.6, No.3 (September 2019). Diakses dari <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/349> pada 04 Oktober 2021
- Carolin, Bunga Tiara, dan Widiastuti Ika. “*Faktor Yang berhubungan dengan Persalinan Preterm di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Kebayoran Baru Jakarta Selatan Periode Januari-Juni Tahun 2017*”. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan Nasional Vol.1, No.1 (2019). Di akses dari <http://journal.unas.ac.id/health/article/viewFile/495/389> pada 05 Oktober 2021
- Cunningham,dkk . Williams Obstetrics Ed. 23. New York : Mc. Graw Hill Medical. 2010. h.707
- DINKES Sulsel. “Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020”. Sulawesi Selatan ; 2020. Diakses dari [http://dinkes.sulselprov.go.id/uploads/info/LAKIP DINAS KESEHATAN TAHUN 2020-fix.pdf](http://dinkes.sulselprov.go.id/uploads/info/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2020-fix.pdf) pada 09 Agustus 2021
- Dewi, Ratna. “*Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur’an*”. Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 10, No.2 (2019). Diakses pada 20 september 2021 pada <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/maw/article/download/920/333/#:~:text=Konsep%20kesehatan%20reproduksi%20perempuan%20menurut,yang%20kontekstual%20dari%20para%20mufassir.>
- Farnaz, Zand. dkk. “*Prevalence and Risk Factor of Intrauterine Fetal Death in Kurdish Pregnant Women. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences*”. (Desember 2016). Diakses dari <https://www.jchps.com/specialissues/2016%20Special%20Issue%207/12%200841116.pdf> pada 16 Agustus 2021
- Fitriahadi, Enny. *Buku Ajar Asuhan Kehamilan Disertai Daftar Tilik*. Yogyakarta : Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta. 2017. h. 204-206
- Hartono, Harvey Alvin, dkk. “*Kematian Janin dalam Rahim pada Kehamilan Aterm dengan Eklampsia, Partial HELLP Syndrome, Edema Paru Akut dan Syok*

Kardiogenik". Indonesian Journal of Obstetrics and Gynecology Science (2019). Diakses dari <http://www.obgynia.com/obgyn/index.php/obgynia/article/view/132> pada 16 Agustus 2021

Helvian, Fhirastika Annisha. "*Hubungan Tingkat Kepuasan Pasien Antenatal Care (ANC) dengan Mutu Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*". Alami Journal, Vol.2, No. 1 (Januari 2018). Hal 37-45

Hussain, Ahmed, dkk. "Diabetes, Fetal Demise, and Shoulder Dystocia: The Importance of Glucose Screening to Prevent Catastrophic Obstetric Outcomes". Hindawi Case Report in Obgyn (2020). Diakses dari <https://www.hindawi.com/journals/criog/2020/8142109/> pada 18 Januari 2022

Idrus, Achmad Musyahid. "*Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin*". Vol 4, No.1 (Juni 2016). h.78-105 diakses dari http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1505/1448 pada 09 Agustus 2021

Ihsanul, M Yusril. dkk. "*Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC dengan Onset Perdarahan Postpartum di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018*". Alami Journal, Vol. 4, No.2 (Juli 2020). Hal. 10-17

Kanavi, Jayashree V. dkk. "*Incidence and Risk Factors for Intrauterine Foetal Demise : a Retrospective Study in a Tertiary Care Center in India. International Journal of Pregnancy and Child Birth. Vol, 2, Issue 2. 2017.* diakses dari <https://medcraveonline.com/IPCB/incidence-and-risk-factors-for-intrauterine-foetal-demise-a-retrospective-study-in-a-tertiary-care-centre-in-india.html> pada 16 Agustus 2021.

Kavita, Sinha dkk. "*Risk Factors in Patients with Intrauterine Fetal Death at Tertiary Referral Centre*". Journal of Nepalgunj Medical College. Vol. 17, No.2 Desember 2019. diakses dari

- <https://www.nepjol.info/index.php/JNGMC/article/view/28752> pada 16 Agustus 2021
- Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020. “Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019”. Jakarta : KEMENKES RI 2020. <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf> diakses pada 10 Agustus 2021
- Lawn, Joy E. dkk. “*Stillbirths : rates, risk factors, and acceleration towards 2030*”. Pubmed.gov (Februari 2016). h. 587- 603. [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(15\)00837-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00837-5/fulltext) diakses pada 09 agustus 2021
- Leisher. SH, dkk. “*Stillbirths: Investment in ending preventable stillbirths by 2030 will yield multiple returns and help achieve multiple Sustainable Development Goals* “. Brief for GSDR (2016) : Sustainable Development Goals diakses dari <https://sustainabledevelopment.un.org> pada 09 Agustus 2021
- Luqyana, Salwa Darin. dkk. “*Intrauterine Fetal Death : Usia Maternal sebagai Salah Satu Faktor Resiko*”. Jurnal Medula, Vol.7, No.5 (Desember 2017). diakses dari <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/medula/article/view/1829> pada 09 Agustus 2021
- Mahardika, Annisa. dkk. “*Gambaran Faktor Risiko pada Ibu dengan Bayi Lahir Mati (Stillbirth) di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017*”. Jurnal Unigal (2019). diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/mj/article/download/3027/2704> pada 16 Agustus 2021
- Mahyani, Akhmad. dkk. “*Hubungan Umur, Paritas dan Pendidikan Ibu dengan Kejadian Intra Uterine Fetal Death (IUFD) di Ruang Bersalin di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin*”. Jurnal Kesehatan Indonesia, Vol.5, No.3 (Juli 2016). diakses dari

- <https://journal.stikeshb.ac.id/index.php/jurkessia/article/view/62/60> pada 16 Agustus 2021
- Malik, Rukhsana. dkk. “*Common Risk Factors in Patients with Intrauterine Fetal Death*”. *J Postgrad Med Inst. Vol. 30, Issue 4* (Juli 2016). h. 337-41 diakses dari <https://jpmi.org.pk/index.php/jpmi/article/view/1744> pada 16 Agustus 2021
- Mardania, Nursaci. dkk. “*Gambaran Faktor Resiko Intrauterine Fetal Death (IUFD)*”. *Jurnal Medika Karya Ilmiah Kesehatan, Vol. 4, No.2* (2019). diakses dari <http://jurnal.itkeswhs.ac.id/index.php/medika/article/view/92> pada 09 Agustus 2021
- Maslovich, Mark M. dan Burke, Lori M. *Intrauterine Fetal Demise*. NCBI (2020). diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557533/> pada 16 Agustus 2021
- Masturah, Imas dan Anggita, Nauri. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. KEMENKES. 2018. h. 164
- Meisuri, Nidia Putri. dkk. “*Faktor Determinan yang Mempengaruhi Kejadian Kematian Perinatal*”. *Majority, Vol.7, No.3* (Desember 2018) : h.121- 127 diakses dari <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/2063> pada 16 Agustus 2021.
- Momo, Romaric Joel Tetsiguia, dkk. “*Risk Factors of Intrauterine Fetal Death : A Case Control Study at The Maternal of Yaounde Central Hospital*”. *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology, Vol.8, Issue 6* (Juni 2019). h. 2149-2154 diakses dari <https://www.ijrcog.org/index.php/ijrcog/article/view/6544> pada 16 Agustus 2021
- Patil, Nanda J, dkk. “*Placental Pathology in Intrauterine Foetal Deaths*”. *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology. Volume 5, Issue 7* (Juli 2016). h.2250 diakses dari <https://www.ijrcog.org/index.php/ijrcog/article/view/1371> pada 16 Agustus 2021

- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan 2020*. Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono
Prawirohardjo. 2020. h. 29-30
- Putri, Anggun Chaerunnisa. dkk. “*Kematian Janin Intrauterin dan Hubungannya dengan Preeklampsia*”. *Medula*, Vol.7, No.5 (Desember 2017). diakses dari <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/2063> pada 09 Agustus 2021
- Queensland Clinical Guidelines. *Queensland Health Clinical Excellence Queensland : Stillbirth Care*. 2018. Queensland Government. diakses dari https://www.health.qld.gov.au/_data/assets/pdf_file/0023/143087/g-stillbirth.pdf pada 16 Agustus 2021
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). *Late Intrauterine Fetal Death and Stillbirth Green-top Guideline No.55*. 2010 : NICE accredited
- Saffira, Adrina Nur, dkk. “*Luaran Maternal dan Neonatal pada Kehamilan Gemelli di RSUP Dr. Kariadi Semarang*”. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, Vol. 9, No.2 Maret 2020. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/medico/article/download/27079/23774> pada 16 Agustus 2021
- Sakinah, Andi Irhamnia. “*Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Keikutsertaan Ibu Hamil dalam Asuhan Antenatal Care (ANC) di Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2016*”. *Alami Journal*, Vol. 2, No.1 (Januari 2018). Hal. 20-27
- Sari, Liya Lugita. “*Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Intrauterine Fetal Death (IUFD) pada Ibu Bersalin di RSUD Hasanuddin Damrah Manna*”. *Jurnal Sains Kesehatan* Vol. 28 No.1 April 2021. diakses dari <http://jurnal.stikestrimandirisakti.ac.id/index.php/jsk/article/view/128> pada 16 Agustus 2021
- Sharma, Susmita. dkk. “*Analytical Study of Intrauterine Fetal Death Cases and Associated Maternal Conditions*”. *International Journal of Applied and Basic Medical Research* Vol.6, No.1. Januari-Maret 2016. diakses dari <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26958515/> pada tanggal 16 Agustus 2021

- Simamora, Wellina R. dkk. “*Gambaran Kematian Perinatal di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado*”. Jurnal e-Clinic (eCl), Vol.4, No.2 (Juli-Desember 2016). diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic/article/download/14472/14045> pada 09 Agustus 2021
- Sinaga, Elvalini Warnelis. “*Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Intra Uterine Fetal Death (IUFD)*”. Jurnal Imelda Vol. 6, No.2 (2020) di akses di <https://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEBIDANAN/article/view/443> pada 23 Januari 2022
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan : Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2016. h.117
- Semian, Sofia. “*Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kejadian IUFD di Kabupaten Manggarai Barat Nusat Tenggara Timur*. (2018). Diakses dari <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/1722/1/SKRIPSI.pdf> pada 16 Agustus 2021
- WHO. “The Neglected tragedy of Stillbirths 2016”. https://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/stillbirth/Lancet-series/en/ diakses pada 09 Agustus 2021
- Yogi, dkk. “*Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) pada Ibu Hamil dengan Malaria di Puskesmas Sentani Kabupaten Jayapura*”. Jurnal Intan Husada, Vol.9, No. 1 (2021). Diakses dari <https://akperinsada.ac.id/e-jurnal/index.php/insada/article/view/209/100> pada 23 Januari 2022
- Yoteni, Ida. dkk. “*Risk Factors Intrauterin Fetal Death at Nabire Genaral Hospital Papua Province*”. International Journal of Sciences : Basic and Applied Research (IJSBAR), Vol 31, No.3 (2017). h.267-281 diakses dari <https://www.gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/download/6986/3328/> pada 16 Agustus 2021

LAMPIRAN

Lampiran 1 → Pengumpulan Data

NO	No RM	Nama	Umar Ibu	Usia Kehamilan	Riwayat Partus	Preeklampsia	Eklampsia	DM	Anemia	Kel. Kongenital	Kel. Poto Plasenta	Keterangan	AMC	Pendidikan
1	77730	Ny. MV	22	39	1	Tidak	Tidak	Tidak	8,6 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	4	
2	77782	Ny. PA	16	34	1	Tidak	Tidak	Tidak	8,9 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	3	
3	43727	Ny. AI	43	38	3	Tidak	Tidak	Tidak	11,6 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	4	
4	69890	Ny. HW	23	39	1	Tidak	Tidak	Tidak	9,8 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	4	
5	73866	Ny. SL	28	29	2	Tidak	Tidak	Tidak	11,4 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	3	
6	73426	Ny. NA	38	26	4	Tidak	Tidak	Tidak	10,6 g/dl	Ya (Hidrosefalus)	Tidak	KIDR	3	
7	32146	Ny. NAS	29	25	3	Tidak	Tidak	Tidak	10,4 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	3	
8	72700	Ny. IP	22	26	2	Tidak	Tidak	Tidak	5,2 g/dl	Ya (Hidrosefalus)	Tidak	KIDR	3	
9	72990	Ny. SF	27	39	2	Tidak	Tidak	Ya	14,1 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	4	
10	74578	Ny. SY	29	36	2	Tidak	Tidak	Tidak	11,3 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	4	
11	71069	Ny. FH	32	24	5	Tidak	Tidak	Tidak	13,6 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	3	
12	71128	Ny. NAL	25	26	2	Tidak	Tidak	Tidak	11,3 g/dl	Tidak	Ya (plasenta previa)	KIDR	3	
13	71471	Ny. ER	26	25	2	Tidak	Tidak	Tidak	10,3 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	3	
14	66790	Ny. SMW	40	34	5	Tidak	Tidak	Tidak	12,3 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	3	
15	70870	Ny. SYF	24	35	1	Tidak	Tidak	Tidak	10,6 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	4	
16	70840	Ny. IND	27	26	1	Tidak	Tidak	Tidak	12,6 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	3	
17	68947	Ny. FT	37	27	2	Tidak	Tidak	Tidak	12,8 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	3	
18	68316	Ny. DvN	21	36	1	Tidak	Tidak	Tidak	12,4 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	4	
19	66942	Ny. ANR	25	34	5	Tidak	Tidak	Tidak	8,9 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	3	
20	66450	Ny. RHN	37	30	3	Ya	Tidak	Tidak	10,3 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	3	
21	67621	Ny. NFD	22	39	2	Tidak	Tidak	Tidak	13,3 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	4	
22	11552	Ny. TC	28	41	2	Tidak	Tidak	Tidak	10,7 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	4	
23	17030	Ny. FI	29	38	3	Tidak	Tidak	Tidak	12,5 g/dl	Tidak	Ya (LTP)	KIDR	4	
24	65240	Ny. RD	38	31	3	Tidak	Tidak	Tidak	14 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	3	
25	63441	Ny. DTO	39	37	6	Tidak	Tidak	Tidak	7,2 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	4	
26	62391	Ny. SMT	27	30	2	Tidak	Tidak	Ya	10,5	Tidak	Tidak	KIDR	3	
27	55538	Ny. HMS	33	38	3	Tidak	Tidak	Tidak	12,6 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	4	
28	53942	Ny. DF	25	28	1	Tidak	Tidak	Tidak	11,1 g/dl	Tidak	Ya (plasenta previa)	KIDR	3	
29	52018	Ny. FCH	26	38	1	Tidak	Tidak	Tidak	12 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	4	
30	10941	Ny. ALN	29	30	3	Tidak	Tidak	Tidak	11,9 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	3	
31	59281	Ny. NHI	26	30	1	Tidak	Tidak	Ya	13,7 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	3	
32	57861	Ny. HRT	29	39	1	Tidak	Tidak	Tidak	11,7 g/dl	Tidak	Tidak	KIDR	4	

33	41212	Ny. NVT	29	38	4	Ya	Tidak	Tidak	11,3 g/dl	Tidak	Tidak	KJDR	4	
34	25345	Ny. WDV	27	39	4	Tidak	Tidak	Tidak	10,9 g/dl	Tidak	Tidak	KJDR	4	
35	64527	Ny. MS	23	27	2	Tidak	Tidak	Tidak	11,8 g/dl	Tidak	Tidak	KJDR	3	
36	58928	Ny. STM	21	25	1	Tidak	Tidak	Tidak	11,4 g/dl	Tidak	Tidak	Ya (Solusio Plasenta)	KJDR	3
37	91349	Ny. RS	26	39	1	Tidak	Tidak	Ya	12 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
38	80724	Ny. MD	25	38	1	Tidak	Tidak	Tidak	12,6 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
39	91335	Ny. IS	33	41	2	Tidak	Tidak	Tidak	11 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
40	91394	Ny. SP	28	40	2	Tidak	Tidak	Tidak	13,1 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
41	91291	Ny. KK	29	40	1	Tidak	Tidak	Tidak	8,3 g/dl	Tidak	Tidak	Ya (plasenta previa)	TIDAK KJDR	3
42	91399	Ny. NDH	30	39	2	Ya	Tidak	Tidak	13,4 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
43	58455	Ny. NI	27	38	4	Tidak	Tidak	Tidak	12,9 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
44	58451	Ny. FR	27	38	2	Tidak	Tidak	Tidak	11,1 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
45	58382	Ny. FN	24	40	2	Tidak	Tidak	Tidak	12,1 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
46	58626	Ny. WE	28	40	1	Tidak	Tidak	Tidak	14,9 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
47	58569	Ny. AH	32	39	2	Tidak	Tidak	Tidak	11,1 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
48	58452	Ny. HA	38	38	2	Ya	Tidak	Tidak	10,9 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	3	
49	51075	Ny. AO	21	40	1	Tidak	Tidak	Tidak	11,8 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
50	54924	Ny. RM	25	38	5	Tidak	Tidak	Tidak	9,1 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	S1
51	91397	Ny. NRH	25	40	1	Tidak	Tidak	Tidak	11,8 g/dl	Ya (Polidactil)	Tidak	TIDAK KJDR	4	
52	91494	Ny. ISY	29	41	3	Tidak	Tidak	Tidak	11,3 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
53	21844	Ny. DY	34	38	5	Tidak	Tidak	Tidak	9,5 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	S1
54	48108	Ny. U	24	40	1	Tidak	Tidak	Tidak	9,8 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
55	48678	Ny. NI	27	39	2	Ya	Tidak	Tidak	11,8 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
56	48069	Ny. IAY	28	37	1	Tidak	Tidak	Tidak	10,8 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
57	58401	Ny. PA	25	41	2	Tidak	Tidak	Tidak	12,3 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
58	58557	Ny. NAM	32	39	3	Tidak	Tidak	Tidak	10,6 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
59	58385	Ny. FW	34	39	3	Tidak	Tidak	Tidak	10,4 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
60	56457	Ny. RS	33	38	4	Tidak	Tidak	Tidak	10,8 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
61	58352	Ny. SH	31	36	1	Tidak	Tidak	Tidak	10,1 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
62	52964	Ny. DA	18	39	2	Tidak	Tidak	Tidak	10,5 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	SMA
63	89887	Ny. HR	28	38	4	Tidak	Tidak	Tidak	11,7 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	
64	46659	Ny. IA	26	37	1	Tidak	Tidak	Tidak	10,8 g/dl	Tidak	Tidak	Ya (retensio plasenta)	TIDAK KJDR	4
65	58317	Ny. SU	22	38	2	Tidak	Tidak	Tidak	10,7 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KJDR	4	

66	10923	Ny. FH	34	36	3	Tidak	Tidak	Tidak	11,8 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KIDR	4	
67	46671	Ny. AD	27	40	1	Tidak	Tidak	Tidak	9 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KIDR	4	
68	18861	Ny. RV	25	38	2	Tidak	Tidak	Tidak	10,9 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KIDR	4	
69	17647	Ny. RR	28	38	2	Tidak	Tidak	Tidak	10,2 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KIDR	4	
70	25651	Ny. HC	37	38	5	Tidak	Tidak	Tidak	10,5 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KIDR	4	SI
71	23538	Ny. RN	24	37	2	Tidak	Tidak	Tidak	9,5 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KIDR	4	
72	29052	Ny. NH	26	40	2	Tidak	Tidak	Tidak	10,8 g/dl	Tidak	Tidak	TIDAK KIDR	4	



Lampiran 2 → Output hasil olah data SPSS

ANALISIS UNIVARIAT DAN BIVARIAT

Umur Ibu * Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)

Crosstab

		Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)			
		KJDR	Tidak KJDR	Total	
Umur Ibu	Risiko Tinggi	Count	8	3	11
		Expected Count	5.5	5.5	11.0
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	22.2%	8.3%	15.3%
	Risiko Rendah	Count	28	33	61
		Expected Count	30.5	30.5	61.0
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	77.8%	91.7%	84.7%
Total	Count	36	36	72	
	Expected Count	36.0	36.0	72.0	
	% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.683 ^a	1	.101		
Continuity Correction ^b	1.717	1	.190		
Likelihood Ratio	2.769	1	.096		
Fisher's Exact Test				.189	.094
Linear-by-Linear Association	2.645	1	.104		
N of Valid Cases	72				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Umur Ibu (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	3.143	.760	12.993
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = KJDR	1.584	1.007	2.492
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = Tidak KJDR	.504	.187	1.360
N of Valid Cases	72		

Usia Kehamilan * Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)

Crosstab

		Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)		Total	
		KJDR	Tidak KJDR		
Usia Kehamilan	Risiko Tinggi	Count	23	2	25
		Expected Count	12.5	12.5	25.0
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	83.9%	5.8%	34.7%
	Risiko Rendah	Count	13	34	47
		Expected Count	23.5	23.5	47.0
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	36.1%	94.4%	65.3%
Total	Count	36	36	72	
	Expected Count	36.0	36.0	72.0	
	% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	27.023 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	24.511	1	.000		
Likelihood Ratio	30.442	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	26.648	1	.000		
N of Valid Cases	72				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia Kehamilan (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	30.077	6.195	146.014
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = KJDR	3.326	2.065	5.357
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = Tidak KJDR	.111	.029	.423
N of Valid Cases	72		

Riwayat Paritas * Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)

		Crosstab		
		Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)		Total
Riwayat Paritas	Risiko	Count	KJDR	
Risiko Tinggi	Count	4	3	7
	Expected Count	3.5	3.5	7.0
	% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	11.1%	8.3%	9.7%
Risiko Rendah	Count	32	33	65
	Expected Count	32.5	32.5	65.0
	% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	88.9%	91.7%	90.3%
Total	Count	36	36	72
	Expected Count	36.0	36.0	72.0
	% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.158 ^a	1	.691		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.159	1	.690		
Fisher's Exact Test				1.000	.500
Linear-by-Linear Association	.156	1	.693		
N of Valid Cases	72				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Paritas (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	1.375	.285	6.635
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = KJDR	1.161	.584	2.308
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = Tidak KJDR	.844	.347	2.052
N of Valid Cases	72		

Preeklampsia * Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)

		Crosstab		
		Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)		Total
Preeklampsia	Risiko Tinggi	Count	KJDR	
			Expected Count	
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)		
	Risiko Rendah	Count	KJDR	Tidak KJDR
		Expected Count		
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)		
Total		Count	KJDR	Tidak KJDR
		Expected Count		
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)		

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.215 ^a	1	.643		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.216	1	.642		
Fisher's Exact Test				1.000	.500
Linear-by-Linear Association	.212	1	.645		
N of Valid Cases	72				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Preeklampsia (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	.647	.102	4.124
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = KJDR	.788	.263	2.366
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = Tidak KJDR	1.218	.572	2.594
N of Valid Cases	72		

Eklampsia * Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)

		Crosstab		
		Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)		Total
Eklampsia	Risiko Rendah	Count	KJDR	
				36
		Expected Count	36.0	36.0
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	100.0%	100.0%
Total		Count	36	36
		Expected Count	36.0	36.0
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	72

a. No statistics are computed because Eklampsia is a constant.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for Eklampsia (Risiko Rendah / .)	. ^a

a. No statistics are computed because Eklampsia is a constant.

Diabetes Mellitus * Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)

			Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)		Total
			KJDR	Tidak KJDR	
DM	Risiko Tinggi	Count	3	1	4
		Expected Count	2.0	2.0	4.0
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	8.3%	2.8%	5.6%
	Risiko Rendah	Count	33	35	68
		Expected Count	34.0	34.0	68.0
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	91.7%	97.2%	94.4%
Total	Count	36	36	72	
	Expected Count	36.0	36.0	72.0	
	% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.058 ^a	1	.303		
Continuity Correction ^b	.265	1	.607		
Likelihood Ratio	1.105	1	.293		
Fisher's Exact Test				.614	.307
Linear-by-Linear Association	1.044	1	.307		
N of Valid Cases	72				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for DM (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	3.182	.315	32.138
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = KJDR	1.545	.834	2.803
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = Tidak KJDR	.486	.088	2.694
N of Valid Cases	72		

Anemia * Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)

		Crosstab		
		Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)		Total
Anemia	Risiko Tinggi	Count	KJDR	
			Expected Count	
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)		
Total	Risiko Rendah	Count		
		Expected Count		
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)		
		Count		
		Expected Count		
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)		

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.399 ^a	1	.237		
Continuity Correction ^b	.895	1	.344		
Likelihood Ratio	1.403	1	.236		
Fisher's Exact Test				.344	.172
Linear-by-Linear Association	1.379	1	.240		
N of Valid Cases	72				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,60.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Anemia (Risiko Tinggi/Risiko Rendah)	.569	.223	1.453
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = KJDR	.752	.464	1.220
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = Tidak KJDR	1.321	.832	2.098
N of Valid Cases	72		

Kelainan Kongenital * Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)

			Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)		
			KJDR	Tidak KJDR	Total
Kelainan Kongenital	Risiko Tinggi	Count	2	1	3
		Expected Count	1.5	1.5	3.0
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	5.6%	2.9%	4.2%
	Risiko Rendah	Count	34	35	69
		Expected Count	34.5	34.5	69.0
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	94.4%	97.2%	95.8%
Total	Count	36	36	72	
	Expected Count	36.0	36.0	72.0	
	% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	100.0%	100.0%	100.0%	



Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	348 ^a	1	.655		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.354	1	.652		
Fisher's Exact Test				1.000	.600
Linear-by-Linear Association	.343	1	.658		
N of Valid Cases	72				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kelainan Kongenital (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	2.059	.178	23.773
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = KJDR	1.353	.587	3.119
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = Tidak KJDR	.657	.130	3.311
N of Valid Cases	72		

Kelainan Patologis Plasenta * Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)

			Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)		Total
			KJDR	Tidak KJDR	
Kelainan Patologis Plasenta	Risiko Tinggi	Count	5	2	7
		Expected Count	3.5	3.5	7.0
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	13.9%	5.6%	9.7%
	Risiko Rendah	Count	31	34	65
		Expected Count	32.5	32.5	65.0
		% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	88.1%	94.4%	90.3%
Total	Count	36	36	72	
	Expected Count	36.0	36.0	72.0	
	% within Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.424 ^a	1	.233		
Continuity Correction ^b	.633	1	.426		
Likelihood Ratio	1.467	1	.226		
Fisher's Exact Test				.429	.214
Linear-by-Linear Association	1.404	1	.236		
N of Valid Cases	72				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,50.

b. Computed only for a 2x2 table


Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kelainan Patologis Plasenta (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	2.742	.496	15.168
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = KJDR	1.498	.879	2.553
For cohort Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) = Tidak KJDR	.546	.165	1.803
N of Valid Cases	72		

ANALISIS MULTIVARIAT

Variables in the Equation									
		B.	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	umur ibu	.863	.885	.952	1	.329	2.371	.419	13.430
	usia kehamilan	3.353	.910	17.154	1	.000	28.583	5.849	139.688
	Constant	-3.149	1.068	8.698	1	.003	.043		

a. Variable(s) entered on step 1: umur ibu, usia kehamilan.



Lampiran 3 → Persuratan

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.180/KEPK/FKIK/XII/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Apriani Sahid
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Analisis Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) di RSIA
Ananda Makassar Tahun 2021"**

"Analysis of Risk Factors for Intrauterine Fetal Death (IUFD) at RSIA Ananda Makassar in 2021"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bajikan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Permission/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022.

This declaration of ethics applies during the period December 3rd, 2021 until December 3rd, 2022.

3 Desember 3rd, 2021
Chairperson,
Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 24745/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur RSIA Ananda Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4568/FKIK/PP.00.9/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **APRIANI SAHID**
Nomor Pokok : 70600118020
Program Studi : **Pend. Dokter**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN KEMATIAN JANIN DALAM RAHIM (KJDR) DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2021 "

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 24 Desember 2021 s/d 24 Januari 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 24 Desember 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal

SNMP PTSP 24.12.2021



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus 1: Jl. Sultan Alauddin No.62 Makassar
Kampus 2: Jl. H.M. Yusuf Lempu No.35 Rantang Palang-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : B- 4569/Un.06/FKIK/PP.00.9/12/2021 Gowa, 14 Desember 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Proposal
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Direktur RSIA Ananda Makassar
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Apriani Sahid
N I M : 70600118020
Fakultas/Jurusan : Pendidikan Dokter
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Muhajirin Desa Saga, Kec. Bajo, Kab. Luwu

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

**"Analisis Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR)
di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021".**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. dr. Rini Fitriani, M. Kes
2. dr. Utami Murti Pratiwi, M. Kes

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di UPT Puskesmas Galesong, terhitung mulai 29 November 2021 s/d 07 Januari 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan

Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I, Jl. Sultan Alauddin, No.52 Makassar
Kampus II, Jl. H.M. Yasin Lempu No.36 Rongkang Palang-Gowa, Telp. (0411) 941879 Fax (0411) 8221400

Nomor : B- 4568/Un.D6/FKIK/PP.00.9/12/2021 Gowa, 14 Desember 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Proposal
Perihal : **Pemohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan
Di Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Apriani Sahid
N I M : 70600118020
Fakultas/Jurusan : Pendidikan Dokter
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Muhajirin Desa Saga, Kec. Bajo, Kab. Luwu

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Analisis Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. dr. Rini Fitriani, M. Kes
2. dr. Utami Murti Prafiwi, M. Kes

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di UPT Puskesmas Galesong, terhitung mulai 29 November 2021 s/d 07 Januari 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan,

Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa



Rumah Sakit Ibu dan Anak ANANDA

Jl. Andi Djemma No. 57, Makassar – Indonesia
Telp. +62411 – 874596, Fax: +62411 – 853694

Email: sekretariat@anandahospital.com | Website: www.anandahospital.com

FORM PENGANTAR PENELITIAN

Kepada Yth. Koordinator Unit	
REKAM MEDIS	
Dengan hormat, Dengan ini menerangkan bahwa peneliti/mahasiswa berikut ini :	
Nama	: Apriani Sahid
Stambuk	: 70600118020
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Institusi Pendidikan	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Akan melakukan pengambilan data awal :	
Terhitung	: 22 Juni 2021 – 22 Juli 2021
Jenis Data	: Angka Kejadian Kematian Janin Dalam Rahim Tahun 2020 - 2021
Untuk penelitian dengan judul : <i>"Analisis Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR)"</i>	
Harap dilakukan pembimbingan dan pendampingan seperlunya	
Mengetahui, Divisi SDM dan Diklat	
	
Qalbia Muhammad Ner, SKM., MARS	

54

132



Rumah Sakit Ibu dan Anak ANANDA

Jl. Andi Djemma No. 57, Makassar – Indonesia
Telp. +62411 – 874596, Fax : +62411 – 853694

Email : sekretariat@anandahospital.com | Website : www.anandahospital.com

FORM PENGANTAR PENELITIAN

Kepada Yth Koordinator Unit	
RUANG PERAWATAN LANTAI 6 SIDENRENG RUANG PERAWATAN LANTAI 7 SIDENRENG UNIT REKAM MEDIK	
Dengan hormat, Dengan ini menerangkan bahwa peneliti/mahasiswa berikut ini :	
Nama	: Apriani Sahid
Stambuk	: 70600118020
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Institusi Pendidikan	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Akan melakukan pengambilan data :	
Terhitung	: 01 Januari 2022 – 01 Maret 2022
Jenis Data	: Kuesioner Pasien Pasca Melahirkan
Untuk penelitian dengan judul : <i>"Analisis Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar"</i>	
Harap dilakukan pembimbingan dan pendampingan seperlunya.	
Mengetahui, Divisi SDM dan Diklat	
 Qalbia Muhammad Nur, SKM., MARS	

Lampiran 4 → Dokumentasi



Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Apriani Sahid
Tempat, Tanggal Lahir : Luwu, 03 April 2000
Alamat : Kompleks Grand Tamalate 1 No.3
Agama : Islam
Nomor HP : 081342157945
E-mail : aprianisahid03@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1. SDN 30 RUMAJU (2007 – 2012)
2. SMPN 1 BAJO (2012-2015)
3. SMAN 01 UNGGULAN KAMANRE (2016-2018)
4. UIN ALAUDDIN MAKASSAR, PRODI PENDIDIKAN DOKTER (2018)

Riwayat Prestasi

1. Juara 1 Olimpiade Sains Nasional Bidang Fisika Tingkat Kabupaten.
2. Juara 3 Lomba Pidato Agama Tingkat Kabupaten.

Riwayat Organisasi

1. OSIS SMPN 1 BAJO (Bendahara Umum)
2. Anggota Sanggar Seni Kamase
3. OSIS SMAN 01 Unggulan Kamanre (Anggota divisi SCMP)
4. Anggota Alauddin Medical Research Club (2020)
5. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Kedokteran 2021-2022

Pengalaman Mengikuti Ekstrakurikuler dan Pelatihan

1. Pramuka
2. Karate
3. Palang Merah Remaja
4. Basic Islamic Leadership I dan II HMJ-Kedokteran UINAM