STUDI LITERATUR TANAMAN YANG BERPOTENSI SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN CANGKANG KAPSUL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

FIRDHA RACHMADHANI
NIM : 70100117076

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawa ini :

Nama : Firdha Rachmadhani

Nim : 70100117076

Tempat tanggal lahir : To'balo, 27 Desember 1999

Jurusan : Farmasi

Alamat : Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan

Judul : Studi Literatur Tanaman Yang Berpotensi Sebagai Bahan Baku Pembuatan Cangkang Kapsul

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terdapat bukti kopian, tiruan dan duplikasi dari skripsi orang lain maka skripsi ini tidak sah dan melanggar hukum.

Gowa, 16 Februari 2022

Penulis,

Firdha Rachmadhani
NIM 70100117076

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berupa Studi Literatur yang berjudul "**Studi Literatur Tanaman Yang Berpotensi Sebagai Bahan Baku Pembuatan Cangkang Kapsul**" yang disusun oleh **Firdha Rachmadhani**, Nim: **70100117076**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 16 Februari 2022** yang bertepatan dengan **15 Rajab 1443 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 16 Februari 2022
15 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(……)
Sekretaris	: apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si.	(……)
Pembimbing I	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(……)
Pembimbing II	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si.	(……)
Penguji I	: apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si.	(……)
Penguji II	: Dr. St. Nasriah, M.Sos.I.	(……)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang telah memberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Studi literatur tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul". Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini banyak hambatan maupun rintangan yang penulis hadapi tetapi hambatan bisa dilalui dengan adanya doa dan dukungan dari berbagai pihak terutama kepada kedua orang tua saya, bapak Kasmuddin dan ibu Nurnaeni yang memberikan motivasi sehingga pada penelitian ini dapat terselesaikan.

Dalam penyusun skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

6. Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S,Si., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Dr. H. M Fais Satrianegara, S.KM, MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. apt. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. apt. Syamsuri Syakri, S.Farm, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
12. apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan serta meluangkan waktunya demi terselesainya skripsi ini.
13. Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing II yang selalu mengarahkan dan membimbing demi terselesainya skripsi ini
14. apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Selaku Penguji Kompetensi yang telah memberi tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan skripsi ini.
15. Dr. St. Nasriah, M.Sos.I. selaku Penguji Agama yang telah memberikan saran maupun kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

16. Tak lupa pula ucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen farmasi dan Staf jurusan farmasi, atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
17. Kepada semua keluarga besar PANAR yang selalu mendoakan dan mendukung saya sampai sejauh ini terima kasih banyak.
18. Kepada teman Angkatan 2017 (Kovalen) yang selalu menyemangati, meberikan doa serta dukungan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, terima kasih banyak.
19. Terima kasih juga untuk Febi, Yulai, Kajol, Sobo, Nadila, Atika dan Dindong yang selalu membantu, mendoakan, mendukung serta memberikan saya solusi. Semoga kalian dimudahkan dan dilancarkan segala urusanannya.
20. Terima kasih juga untuk teman-teman bimbingan kharisa, Narti, Hikmah dan Marwah yang selalu membantu dan memberikan semngat.
21. Terima kasih untuk ceo wifi corner Anas faturrahman Putra yang mengajarkan saya mengenai materi-materi yang belum dipahami.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Namun penulis berharap dengan adanya skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti – peneliti selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gowa, 16 Februari 2022

Penulis,

Firdha Rachmadhani

NIM : 70100117076

DAFTAR ISI

JUDUL……i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan 3
BAB II METODE 4
2.1 Strategi Pencarian Literatur 4
2.1.1 *Framework Penelitian* 4
2.1.2 Kata Kunci 6
2.1.3 Database *6*
2.2 Kriteria Inklusi dan eksklusi Jurnal / Artikel 6
2.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 7
2.3.1 Hasil Pencarian dan Seleksi Studi 7
2.3.2 Daftar Artikel Hasil Pencarian 8
BAB III HASIL DAN ANALISIS 10
3.1 Hasil 10

3.2 Analisis 10

BAB IV PEMBAHASAN 19

4.1 Cangkang kapsul 19

4.2 Jenis tanaman yang berpotensi sebagai pembuatan cangkang kapsul 32

4.3 Kandungan tanaman yang berpotensi sebagai pembuatan cangkang kapsul. 42

4.4 Karakteristik cangkang kapsul dari bahan baku tanaman 44

4.5 Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tanaman 50

BAB V PENUTUP 55

5.1 Kesimpulan 55

5.2 Saran 55

DAFTAR PUSTAKA 56

LAMPIRAN 61

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 71

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1. *Framework* Penelitian 4

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 6

Tabel 3. Hasil penelusuran literatur 7

Tabel 4. Daftar Artikel Hasil Seleksi 8

Tabel 5. Hasil analisis artikel 10

Tabel 6. Spesifikasi berat kapsul cangkang keras 20

Tabel 7. Volume dan Ukuran 28

Tabel 8. Keseragaman bobot 29

Tabel 9. Jenis tanaman yang berpotensi sebagai pembuatan cangkang kapsul 41

Tabel 10. Kandungan tanaman yang berpotensi sebagai pembuatan cangkang kapsul 44

Tabel 11. Karakteristik cangkang kapsul 46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Penelitian 5
Gambar 2. Cangkang kapsul keras..... 20
Gambar 3. Isi kapsul keras 20
Gambar 4. Alat pengisi kapsul.. ..... .23
Gambar 5. Mesin Pengisi 23
Gambar 6. Cangkang kapsul lunak 24
Gambar 7. Ukuran kapsul keras ……...……..……...28
Gambar 8. Skema *drug release*..... 31

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Situs pencarian pustaka 61

Lampiran 2. Screenshot jurnal 64

Lampiran 3. Gambar tanaman..... 68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama	:	Firdha Rachmadhani
Nomor Induk Mahasiswa	:	70100117076
Judul Penelitian	:	Studi Literatur Tanaman Yang Berpotensi Sebagai Bahan Baku Pembuatan Cangkang Kapsul

Kapsul adalah sediaan yang mengandung satu macam bahan obat atau lebih yang dimasukkan kedalam cangkang kapsul atau wadah kecil. Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui tanaman apa saja yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul, kandungan tanaman dan karakteristik cangkang kapsul dari bahan baku tanaman dengan menggunakan metode PICO melalui kriteria inklusi dan eksklusi. Kata kunci yang digunakan yaitu cangkang kapsul dari bahan baku tanaman dan *manufacture of plant capsule shells* dengan database yang digunakan yaitu *Pubmed*, *ScienceDirect* dan *Google scholar*. Dari hasil analisis jurnal terdapat 9 tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul yaitu kulit buah coklat (*Theobroma cacao* L), jagung (*Zea mays L*.), jagung berlilin (*Zea mays ceratina*), kentang (*Solanum tuberosum*), lidah buaya (*Aloe vera* L), singkong (*Manihot esculenta*), daun cincau hijau (*Premnaoblongifolia Merr*), sagu rumbia (*Metroxylon sagu rottb*), sorgum (*Sorghum bicolor (L.) Moench*). Kandungan tanaman yang berpotensi dalam pembuatan cangkang kapsul yang terdapat pada tanaman adalah polisakarida seperti pati, pektin dan karagenan. Karakteristik cangkang kapsul dari bahan baku tanaman terdapat kadar air, kadar abu, kuat tarik, panjang kapsul, berat kapsul, diameter badan, diameter tutup dan waktu hancur. Allah swt menyampaikan dalam al-qur'an tentang berbagai macam tanaman didunia ini yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik sebagai makanan dan obat-obatan. Serta dapat juga dijadikan sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Kata Kunci : Cangkang Kapsul, Tanaman, Bahan baku.

ABSTRACT

Name	:	Firdha Rachmadhani
Student ID Number	:	70100117076
Research Title	:	*Study of Plant Literature Potentially as Raw Materials for Making Capsule Shells*

Capsules are preparations containing one or more kinds of medicinal ingredients which are enclosed in a capsule shell or small container. This literature study aims to find out what plants have the potential as raw materials for making capsule shells, plant content and characteristics of capsule shells from plant raw materials using the PICO method through inclusion and exclusion criteria. The keywords used are capsule shells from plant raw materials and manufacture of plant capsule shells with the databases used are Pubmed, ScienceDirect and Google scholar. From the results of the journal analysis, there are 9 plants that have the potential as raw materials for making capsule shells, namely cocoa skin (*Theobroma cacao L*), corn (*Zea mays L*.), waxy corn (*Zea mays ceratina*), potato (*Solanum tuberosum*), aloe vera (*Aloe vera L),* cassava (*Manihot esculenta*), green grass jelly (*Premnaoblongifolia Merr*), sago palm (Metroxylon sago rottb), sorghum (*Sorghum bicolor* (L.) *Moench*).The content of plants that have the potential to make capsule shells found in plants are polysaccharides such as starch, pectin and carrageenan. Characteristics of capsule shells from plant raw materials include moisture content, ash content, tensile strength, capsule length, capsule weight, body diameter, cap diameter and disintegration time. Allah swt conveys in the Qur'an about various kinds of plants in this world that can be used by humans both as food and medicine. And can also be used as raw material for making capsule shells.

Keywords: *Capsule Shell, Plants, Raw material*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*

Cangkang kapsul atau sediaan kapsul adalah jenis sediaan farmasi yang sangat banyak digunakan karena dapat menutupi rasa yang tidak menyenangkan dari obat (Amin, 2020). Obat yang memiliki rasa yang tidak enak seperti pahit, anyir, manis dan bau dapat ditutupi jika dibuat dalam bentuk kapsul (Gadri, 2012). Cangkang kapsul berfungsi untuk menjaga bahan aktif obat dari pengaruh lingkungan sehingga terjaga stabilitasnya. Cangkang kapsul yang biasa digunakan pada bidang farmasi terdiri dari dua jenis yaitu cangkang lunak (*soft capsule*) dan cangkang keras (*hard capsule*). Cangkang kapsul pada umumnya terbuat dari gelatin, bisa juga dari bahan bahan lainya seperti pati atau bahan yang sesuai (Amin, 2020).

Bahan yang umumnya digunakan dalam pembuatan kapsul pada industri farmasi yaitu gelatin. Kapsul gelatin cangkang keras digunakan sebagai obat kapsul komersial. Data dari *Gelatin Manufacturers of Europ*e pada tahun 2005, produksi gelatin dunia terbesar berasal dari bahan baku kulit babi yakni 44,5% (136.000 ton), kedua dari kulit sapi 27,6% (84.000 ton), ketiga dari tulang 26,6% (81.000 ton) dan sisanya berasal dari selainnya 1,3% (4.000 ton). Data menunjukkan sebagian besar gelatin berasal dari sapi dan babi, hal tesebut membatasi konsumen vegetarian, Muslim, Yahudi, dan Hindu yang tidak dapat mengkonsumsinya (Fonkwe et al. 2005).

Asal bahan baku gelatin tersebut juga memiliki resiko kontaminasi virus yang menyebabkan penyakit *bovine spongiform encephalopathy* (BSE), *foot and mouth disease* (FMD), dan *swine influenza* (Eveline et al. 2011). Ku et al. (2010) menyatakan bahwa kapsul gelatin memiliki beberapa kekurangan antara lain

memiliki reaktivitas terhadap komponen pengisi, terdapat interaksi dengan polimer anion dan kation. Kekurangan lain dari kapsul gelatin yaitu kelarutan gelatin dalam air mengurangi pelepasan obat lambat dari penghancuran cangkang kapsul (Suptijah et al., 2012).

Selain gelatin, bahan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan cangkang kapsul dapat berupa bahan yang berasal dari tanaman yaitu polisakarida. Polisakarida meliputi pati, karagenan, alginat, pektin dan gum arab dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuat cangkang kapsul (Christi et al., 2016).

Pati tersusun atas dua polimer utama yaitu amilosa 10% - 30% dan amilopektin 70% - 90%, juga mengandung protein 0,25% dan lemak 0,1% - 0,3% (Selpiana et al., 2015). Amilopektin memiliki sifat alir dan daya kompresibilitas yang kurang baik, tetapi memiliki sifat granul yang mengembang dan daya pengikat yang baik, sehingga amilopektin sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul pengganti gelatin (Oktavia et al., 2013).

Adapun hasil penelitian dari (Nurminah., 2019) tentang pembuatan cangkang kapsul dengan menggunakan bahan baku tanaman yaitu pisang kepok (*Musa paradisiaca L*) mengandung pati dengan konsetrasi 2% dan dikombinasikan dengan karagenan 1% dapat menghasilkan cangkang kapsul dengan karakteristik dan mutu yang baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan studi literatur untuk mengetahui manfaat tanaman yang dapat digunakan dalam pembuatan cangkang kapsul sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

1.2 *Rumusan Masalah*

1. Apa saja tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul ?
2. Apa kandungan tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul ?
3. Bagaimana karakteristik cangkang kapsul dari bahan baku tanaman ?
4. Bagaimana pemanfaatan tanaman dalam prespektif islam ?

1.3 *Tujuan*

1. Untuk mengetahui tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul
2. Untuk mengetahui kandungan tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul
3. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik cangkang kapsul daribahan baku tanaman ?
4. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan tanaman dalam prespektif Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB II

METODE

2.1 *Strategi Pencarian Literatur*

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Metode studi literatur merupakan rangkaian penelitian dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan penyusunan kerangka pemikiran (Madury et al., 2012).

2.1.1 *Framework penelitian*

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode PICO (*Population Intervensions, Comparison* dan *Outcome*).

Tabel 1. *Framework Penelitian*

P	**I**	**C**	**O**
Population	***Intervention***	***Comparison***	***Outcome***
Tanaman yang berpotensi dalam pembuatan cangkang kapsul	Jenis, kandungan tanaman, karakteristik cangkang kapsul	Cangkang kapsul komersial atau cangkang kapsul yang dibuat dari gelatin	Potensi tanaman sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan berdasarkan kerangka berikut :



Gambar 1. Kerangka Penelitian

2.1.2 *Kata Kunci*

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur yaitu cangkang kapsul dari bahan baku tanaman, *manufacture of plant capsule shells.*

2.1.3 *Database*

Database yang digunakan dalam penelusuran pustaka yaitu *Google scholar, Pubmed (https;//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), Science direct (http;//wsciencedirect.com/).*

2.2 *Kriteria Inklusi dan eksklusi Jurnal / Artikel*

Kriteria yang digunakan dalam pencarian dan pengumpulan artikel disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2**.** Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria Inklusi	**Kriteria Eksklusi**
1. Rentang waktu publikasi jurnal maksimal 10 tahun terakhir (2011-2021) 2. Berbahasa Indonesia dan inggris 3. Subjek penelitian yaitu tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul 4. Tipe jurnal termasuk *original research article* 5. Kriteria jurnal memiliki *International Standard Serrial Number* (ISSN) atau *Digital Object Identifier* (DOI) 6. Ketersediaan naskah *full text* dan *open acces* jurnal	1. Jurnal dengan Metode penelitian yang tidak jelas 2. Adanya duplikasi artikel pada database pencarian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

2.3 *Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas*

2.3.1 *Hasil Pencarian dan Seleksi Studi*

Hasil penelusuran literatur disajikan pada tabel dibawah ini yang memuat database, kata kunci dan jumlah artikel :

Tabel 3. Hasil penelusuran literatur

Data-base	Kata kunci	Jumlah Artikel		
		Inklusi	Ekslusi	Akhir
Google scholar	Cangkang kapsul dari bahan baku tanaman	231	225	6
	manufacture of plant capsule shells	1	1	1
Pubmed	Cangkang kapsul dari bahan baku tanaman	0	0	0
	manufacture of plant capsule shells	19	19	0
Science direct	Cangkang kapsul dari bahan baku tanaman	0	0	0
	manufacture of plant capsule shells	203	203	0
Total pustaka yang akan dianalisis dan dibahas				7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

2.3.2 DaftarArtikel Hasil Pencarian

Artikel hasil pencarian yang telah diseleksi dibawah ini yang memuat judul, penulis, dan tahun, nomor DOI/ISSN dan kriteria jurnal :

Tabel 4**.** Daftar Artikel Hasil Seleksi

No	Judul	Penulis dan Tahun	NOMOR ISSN/DOI	Kriteria jurnal
1.	Optimasi Formula Film Berbasis Amilopektin Pati Singkong dan Karagenan sebagai Bahan Baku Cangkang Kapsul	Christi et al., 2016	ISSN: 2355-7877	-
2.	Aplikasi edible film dari rumput laut eucheumma cottoni dan pati sorgum dengan plasticizer gliserol dan filler caco3 sebagai bahan pembuat cangkang kapsul	Rakhman, 2017	DOI: 10.35450/jip	S4
3.	Karakterisasi dan Pembuatan Cangkang Kapsul Keras dari Tepung Pektin Lidah Buaya [Aloe vera (L)Burm.f] Sebagai Alternatif Bahan Pembuatan Cangkang Kapsul Keras	Hidayana, 2017	ISSN : 2460-6472	-
4.	Karakterisasi dan formulasi cangkang kapsul dari tepung pektin kulit buah cokelat (theobroma cacao L)	Suparman, 2019	https://doi.org/10.29313/jiff.v2i2.4646	S4
5.	Pengujian sifat fisik dan cemaran mikroba pada cangkang kapsul pati sagu rumbia (Metroxylon sagu Rottb) dan karagenan	Ihsan, 2019	http://dx.doi.org/10.24111/jrihh.v11i1.4802	S2

6.	*Physical and mechanical properties of plant-derived soft-shell capsules formulated with hydroxypropyl starches from different botanical sources*	Ock et al, 2020	https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.106871	Q1
7.	Karakterisasi dan Pembuatan Cangkang Kapsul Keras dari Ekstrak Daun Cincau Hijau (Premna oblongifolia Merr)	Amin. 2020	ISSN: 2548-947x	-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB III

HASIL DAN ANALISIS

3.1 *Hasil*

Hasil penelusuran jurnal dari data base *Google scholar*, *Pubmed* dan *Sciencedirect* diperoleh sebanyak 7 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dapat dianalisis.

3.2 *Analisis*

Hasil analisis artikel disajikan pada table berikut :

Tabel 5. Hasil analisis artikel

No	Judul Penulis dan tahun	*Population*	*Intervention*	*Comparison*	*Outcome*
1.	Optimasi Formula Film Berbasis Amilopektin Pati Singkong dan Karagenan sebagai Bahan Baku Cangkang Kapsul (Christi et al., 2016)	Singkong	**Jenis tanaman :** singkong **Kandungan tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul:** Amilopektin **Karakteristik cangkang kapsul :** Formula 6 Amilopektin: Karagenan: Gliserin. 1.01 % :1.01%: 2.17% . Kadar air 21.45% kadar abu 7.58%	cangkang kapsul komersial: • Kadar air 13-16% • Kadar abu < 5%	Singkong berpotensi sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul, yang memiliki kandungan amilopektin. Konsetrasi amilopektin dan karagenan pada formula 6 yaitu 1.01 % dan 1.01 %. pada formula 28 yaitu 3 % dan 2 %. sehingga menyebabkan kapsul yang

			Formula 28 Amilopektin: Karagenan: Gliserin. 3% :2% : 2.90% Kadar air 17.67% Kadar abu 7.78%		terbentuk pada formula 28 lebih kokoh dan keras. Dengan Kadar air 17.67%, kadar abu 7.78% belum memenuhi standar cangkang kapsul komersial.
2.	Aplikasi edible film dari rumput laut eucheumma cottoni dan pati sorgum dengan plasticizer gliserol dan filler caco3 sebagai bahan pembuat cangkang kapsul (Rakhman, 2017)	Sorgum	**Jenis tanaman :** Sorgum **Kandungan tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul:** pati **Karakteristik cangkang kapsul :** yang didapatkan hasil spesifikasi edible film yaitu kuat tarik 11,12 Mpa, perpanjangan 3,14% modulus young 353,11 Mpa kadar air 11,39% kadar abu	Persyaratan yang memenuhi standar edible film : • Kuat tarik 10-45 Mpa • Perpanjangan 40-50% • Modulus young 100-400 Mpa • Kadar air 12,5% • Kadar abu < 5%.	Biji sorgum berpotensi sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul, yang mengandung pati. Pada formulasi pati sorgum dan selulosa dari rumput laut Didapatkan hasil yang terbaik menunjukkan pada formulasi 6:4 dengan CaCO3 0,4% dan gliserol 10% dimana ditinjau berdasarkan uji mekanik terbaik yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			5,66%		kuat tarik sebesar 11,12 Mpa, modulus young 353,11 Mpa, dan perpanjangan 3,14% dengan perpanjangan yang kurang baik maka penambahan gliserol akan memperbaikinya. Sedangkan untuk kadar air sebesar 11,39 % dan kadar abu sebesar 5,66 kuat tarik dan modulus young memenuhi standar edibe film. Sedangkan panjang, kadar air dan kadar abu tidak memenuhi
3.	Karakteristik dan pembuatan cangkang kapsul dari tepung pektin lidah buaya [*Aloe vera* (L)	Lidah buaya	**Jenis tanaman :** Daun lidah buaya **Kandungan tanaman yang berpotensi sebagai bahan**	➢ spesifikasi cangkang kapsul kapsul standar PT Kapsulindo Nusantara: • Berat	Lidah buaya berpotensi sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul, yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

	Burm. f] sebagai alternatif bahan pembuatan cangkang kapsul keras (Hidayana et al., 2017)		**baku dalam pembuatan cangkang kapsul:** Pektin 3,5526% **Karakteristik cangkang kapsul :** berat cangkang kapsul 188,8 mg, panjang kapsul total 2277 mm, diameter badan 0,278 mm, diameter tutup 0,819 mm dengan waktu hancur yang diperoleh 15 menit	kapsul 106,46731 mg • Panjang kapsul 70,71853442 mm • Diameter badan 0,0147573 mm • Diameter tutup 0,02132 mm. ➢ Dan waktu hancur tidak lebih dari 15 menit menurut farmakope edisi IV	mengandung pektin sebesar 3,5526% dengan konsentrasi pektin 1 %, CMC 8,5%, $CaCl_2$ 0,03% dan aquadest 90,47%. Dengan Hasil pengujian spesifikasi cangkang kapsul tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan. Sedangkan waktu hancur yang didapatkan memenuhi standar yang ditetapkan farmakope edisi IV.
4.	Karakterisasi dan formulasi cangkang kapsul dari tepung pektin kulit buah cokelat (*Theobroma cacao* L) (Suparman, 2019)	Buah coklat	**Jenis tanaman :** Kulit buah coklat **Kandungan tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul:** pektin **Karakteristik**	➢ Spesifikasi cangkang kapsul standar PT Kapsulindo Nusantara • Berat kapsul min 87, max 105 • Panjang kapsul total 21,00-22,00 mm	Kulit buah coklat berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul, yang mengandung pektin. Dengan variasi konsentrasi formulasi 1

			cangkang kapsul : berat kapsul 96,30 mg, panjang kapsul total 22,05 mm, diameter badan 7,24 mm, diameter tutup 7,65 mm dengan waktu hancur yang diperoleh 21 menit 30 detik.	• Diameter badan 7,290 ± 0,203 mm • Diameter tutup 7,569 ± 0,305 mm. ➢ Dan waktu hancur yang ditetapkan oleh farmakope edisi V yaitu kurang dari 30 menit.	pektin 0,84%, karagenan 0,73%, aquadest 98,43%. Pada formulasi 2 pektin 0,84%, karagenan 1,68%, aquadest 97,48%. Pada formulasi 3 pektin 0,78%, karagenan 5,00%, aquadest 94,22%. Pada formulasi1 dan formulasi 2 menghasilkan cangkang kapsul yang sangat tipis dan lunak. Sedangkan pada formula formulasi 3 cangkang kapsul yang terbentuk sedikit lebih tebal. Sehingga F3 dipilih sebagai formula terbaik. Spesifikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

					cangkang kapsul dan waktu hancur memenuhi standar yang ditentukan.
5.	Pengujian sifat fisik dan cemaran mikroba pada cangkang kapsul pati sagu rumbia (*Metroxylon sagu Rottb*) dan karagenan (Ihsan et al., 2019)	Sagu rumbia	**Jenis tanaman :** batang pohon rumbia **Kandungan tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul:** Pati **Karakteristik cangkang kapsul :** uji kekerasan 4,7 kg, kelarutan dalam air 2:13:06 menit, kelarutan suasana asam 1:57:83 menit, kelarutan suasana usus 7:22:45 menit, uji ALT $1,5x10^2$ cfu/g, E.coli $<1,0x10^0$ cfu/g, salmonella $<1,0x10^0$ cfu/g.	Kapsul komersial : • Kekerasan 6,5 kg • Kelarutan dalam air 0:51:32 menit • Kelarutan suasana asam 0:52:26 menit • Kelarutan suasana usus 3:28:21 menit • Uji ALT [1]sprider • E.coli $<1,0x10^0$ cfu/g • Salmonella $<1,0x10^0$ cfu/g.	Sagu rumbia berpotensi sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul, yang mengandung pati. Dengan formulasi pati sagu 8%; karagenan 2%; gliserol 2% dalam 100 ml campuran, memberikan hasil yaitu cangkang kapsul yang tidak rapuh dan proses pelepasan cangkang setelah dikeringkan tidak lengket. Spesifikasi cangkang kapsul memenuhi standar yang telah ditetapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

6.	*Physical and mechanical properties of plant-derived soft-shell capsules formulated with hydroxypropyl starches from different botanical sources* (Ock et al., 2020)	Jagung, jagung berlilin, kentang dan singkong	**Jenis tanaman :** jagung, jagung berlilin, kentang dan singkong **Kandungan tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul:** pati hidroksipropil jagung dan jagung berlilin 4%, pati hidroksipropil kentang 4%, pati hidroksipropil singkong 4%. **Karakteristik cangkang kapsul :** Panjang cangkang kapsul: jagung 16,24 mm, jagung berlilin 16,66 mm, kentang 16,23 mm, singkong 16,47 mm. Lebar : jagung 8,39 mm, jagung berlilin 8,39 mm, kentang 8,45 mm, singkong 8,41	Farmakope korea : Waktu hancur 1200 detik di bawah kondisi pengujian.	Jagung, jagung berlilin, kentang dan singkong berpotensi dalam pembuatan cangkang kapsul, yang memiliki kandungan pati hidroksipropil 4%. Dimana pati dari umbi-umbian, termasuk kentang dan singkong menunjukkan kekuatan tarik yang lebih tinggi, yang menghasilkan kekerasan yang lebih tinggi dari kapsul cangkang lunak dibandingkan dengan dari jagung dan pati jagung berlilin. Kapsul cangkang lunak yang dibuat dari pati jagung dan kentang mengalami

			mm. Kadar air: jagung 0,02%, jagung berlilin 0,32%, kentang 0,61%, singkong 0,60%. Kekerasan: jagung 1,30 N, jagung berlilin 1,57 N, kentang 3,31 N, singkong 2,60 N. Dengan waktu hancur: jagung 789 detik, jagung berlilin 855 detik, kentang 740 detik dan singkong 840 detik.		disintegrasi yang lebih cepat karena kandungan amilosa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapsul dari jagung dan pati singkong. tetapi semua kapsul hancur dalam waktu 1200 detik selama pengujian
7.	Karakterisasi dan pembuatan cangkang kapsul keras dari ekstrak daun cincau hijau (*Premna oblongifolia Merr*) (Amin, 2020)	**Cincau hijau**	**Jenis tanaman :** Daun cincau hijau **Kandungan tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul:** Pektin 14 gram **Karakteristik cangkang kapsul :**	Kapsul gelatin: • Bobot 146,4 mg • Waktu hancur 2 menit 44 detik • Uji swelling 43,9 %.	Daun cincau hijau berpotensi sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul, yang mengandung pektin 14 gram. Formulasi cangkang kapsul keras dibuat menggunakan bahan pektin daun

			Cangkang kapsul A: Bobot cangkang kapsul 552,5 mg dengan waktu hancur 19 menit 55 detik dan pada uji swelling 316,0%. Cangkang kapsul B: Bobot cangkang kapsul 444,3 mg dengan waktu hancur 18 menit 50 detik dan pada uji swelling 172,8 %. Cangkang kapsul C: Bobot cangkang kapsul 355,1 mg dengan waktu hancur 17 menit 01 detik dan pada uji swelling 138,8 %.		cincau hijau, NaCMC, sorbitol dan air dengan % perbandingan 4:2:1:93 dengan variasi bobot cangkang kapsul A, B, C sebesar 500 mg, 400 mg, 300 mg. pada cangkang kapsul C memiliki waktu hancur dan derajat swelling paling terkecil diantara kapsul A, B yaitu 17 menit 01 detik dengan swelling sebesar 138,8%. Spesifikais cangkang kapsul tidak memenuhi dengan kapsul gelatin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 *Cangkang kapsul*

4.1.1 Pengertian kapsul

Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin; tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai (Dirjen Pom, 2014). Menurut USP 35 NF 30, 2012, "*capsule are solid dosage forms in which the API and axcipients are enclosed within a soluble container or shell"* (kapsul adalah sediaan bentuk padat di mana bahan aktif dan bahan-bahan tambahan dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang larut atau cangkang) (Hadisoewignyo, 2016).

4.1.2 Jenis-jenis kapsul

Sediaan kapsul terdiri dari dua jenis yaitu kapsul cangkang keras (*capsulae durae, hard capsul*) dan kapsul cangkang lunak (*capsulae molles, soft capsul*) sebagai berikut:

a. Kapsul cangkang keras

Kapsul cangkang keras terdiri dari bagian wadah dan tutup yang dibuat dari metilselulosa, gelatin, pati, atau bahan lain yang sesuai. Biasanya cangkang kapsul diisi dengan bahan padat atau serbuk, butiran atau granul. Campuran serbuk yang cenderung meleleh dapat diisikan ke dalam kapsul cangkang keras jika menggunakan absorben, seperti MGCO, atau silikon dioksida. Kapsul cangkang keras ini hanya memiliki satu bentuk dengan pemakaian per oral (Syamsuni, 2006).

Gambar 2. Cangkang kapsul keras (Hadisoewignyo, 2016).



(a) (b)

(c) (d)

Gambar 3. Isi kapsul keras (a) bubuk, (b) butiran, (c) pelet, (d) tablet (Begum, 2018)

Spesifikasi dimensi ukuran cangkang kapsul keras terdapat pada tabel 6 berikut: (Kapsulindo., 2007).

Tabel 6. Spesifikasi berat kapsul cangkang keras (Kapsulindo, 2007).

Ukuran kapsul	Berat (mg)		
	Minimal	Rata-rata	Maksimum
00	110	120	130
0	87	96	105
1	67	74	81
2	55	61	67

3	46	50	54

Keuntungan dari kapsul keras sebagai berikut : (Hadisoewignyo, 2016).

1) Mempunyai bioavailabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan tablet
2) Memungkinkan untuk pelepasan yang sangat cepat
3) Mudah diformulasikan
4) *Multiple filling* sehingga memungkinkan untuk mencegah terjadinya inkompatibilitas dan dapat memudahkan untuk control pelepasan
5) cangkang kapsul keras merupakan *barrier* yang baik terhadap oksigen di atmosfer.

Kerugian dari kapsul keras antara lain sebagai berikut : (Hadisoewignyo, 2016).

1) Harga yang relatif mahal
2) Serbuk yang terlalu banyak (*very bulky material*) dapat menimbulkan masalah
3) Perlu perhatian terhadap kelembapan dari cangkang (kelembapan yang baik untuk cangkang adalah 13-15%), jika terlalu kering, cangkang akan rapuh dan jika terlalu basah maka cangkang akan melunak dan lengket satu sama lain
4) Dapat menyebabkan kesukaran pada waktu menelan, pada beberapa pasien.

Kapsul cangkang keras terbuat dari pati terdiri atas bagian tutup dan induk. Karena kedua bagian tersebut tidak melekat dengan baik, maka bagian-bagian tersebut dilekatkan menjadi satu pada saat pengisian, untuk menghindari pemisahan. Kapsul pati dilekatkan dengan mengoleskan campuran air alkohol pada rongga cangkang tutup, segera sebelum dilekatkan kecangkang induk (Dirjen Pom, 2014).

Pelekatan dengan cairan pada kapsul pati cangkang keras meningkatkan keamanan karena kapsul sukar dibuka tanpa kerusakan nyata dan meningkatkan stabilitas isi kapsul dengan membatasi masuknya oksigen. Kapsul bercangkang keras yang diisi di pabrik sering mempunyai warna dan bentuk berbeda atau diberi

tanda untuk mengetahui identitas pabrik. Pada kapsul seperti ini dapat dicantumkan jumlah zat aktif, kode produk dan lain-lain yang dicetak secara aksial atau radial. Tinta cetak kualitas farmasi memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai pigmen dan zat warna yang diizinkan (Dirjen Pom, 2014).

Penutupan cangkang kapsul gelatin keras dapat dilakukan dengan cara memberikan lekukan khas pada bagian tutup dan induk serta melakukan pemanasan langsung atau menggunakan energi ultrasonik; sedangkan penutupan cangkang kapsul pati keras dilakukan dengan cara pelekatan, yaitu dengan mengoleskan cairan campuran air alkohol kemudian dikeringkan (Syamsuni, 2006).

Langkah-langkah dalam pengisian kapsul keras meliputi tahap yaitu penentuan formula dan ukuran kapsul yang akan digunakan, kemudian dilakukan pengisian cangkang kapsul, penutupan kapsul, pembersihan dan pengkilapan kapsul (Hadisoewignyo, 2016).

Proses farmasetika yang terdapat dalam pembuatan kapsul adalah *blending* untuk mencapai homogenitas campuran, *comminution* pengecilan ukuran partikel dengan rentang ukurannya 50-100 µm dan *micronization* pengecilan ukuran partikel sampai diperoleh partikel dengan rentang ukuran 10-20 µm (Hadisoewignyo, 2016).

Ada beberapa metode pengisian kapsul yaitu:

1) *Punch method*
2) *Pouring method*, metode ini sesuai untuk granular material
3) *Hand operated capsule filling machine* (Gambar 3)
4) Mesin pengisi kapsul di industri (Gambar 4), tahap-tahap pengisian kapsul yang dilakukan yaitu memisahkan tutup dari induk kapsul, pengisian dari induk kapsul, menghilangkan serbuk yang berlebihan, penempatan tutup dari

kapsul, penutup kapsul dan pembersihan bagian luar dari kapsul. Kapasitas alatnya 165.000 kapsul/jam (Hadisoewignyo, 2016).



Gambar 4. Alat pengisi kapsul (Hadisoewignyo, 2016).

Gambar 5. Mesin pengisi kapsul di industri farmasi (Hadisoewignyo, 2016).

b. Kapsul cangkang lunak

Jenis kapsul ini merupakan satu kesatuan yang berbentuk bulat atau silindris (*pearl*) atau bulat telur (*globula*) yang dibuat dari gelatin atau bahan lain yang sesuai. Kapsul cangkang lunak ini lebih tebal daripada cangkang keras dan dapat diplastisasi dengan penambahan senyawa poliol, seperti sorbitol atau gliserin. Kapsul ini biasanya mengandung air 6-13%, disi dengan bahan cairan

bukan air seperti polietilenglikol (PEG) berbobot molekul rendah, atau dapat juga diisi dengan bahan padat, serbuk, atau zat padat kering (Syamsuni, 2006).

Kapsul cangkang lunak memiliki bermacan-macam bentuk dan biasanya dapat dipakai untuk rute oral, vaginal, rektal, atau topikal. Bila ditinjau dari segi formulasi, teknologi, dan biofarmasi, kapsul berisi cairan dari jenis kapsul apa pun lebih seragam daripada kapsul berisi serbuk kering dari jenis cangkang yang sama. Selain itu, terdapat sediaan tablet berbentuk kapsul yang disebut kapsitab atau kaplet (Syamsuni, 2006).

Gambar 6. Cangkang kapsul lunak (Ock et al, 2020)

Spesifikasi yang tepat untuk kapsul cangkang lunak antara lain: (Ansel, 1989).

1) Kekuatan gel 150-200 Bloom
2) Viskositas (60 °C/6-2/3% b/b dalam air) 2,8-4,5 MPa s
3) Ukuran partikel yang baik untuk memungkinkan disolusi yang cepat
4) Kapsul cangkang lunak digunakan untuk mengisi macam-macam jenis bahan baik itu kering maupun cair. Beberapa cairan yang dapat dimasukkan dalam kapsul cangkang lunak termasuk:
   a) Tidak tersatukan dengan air, cairan yang mudah menguap dan tidak menguap, seperti minyak nabati, hidrokarbon aromatik dan hidrokarbon alifatik.
   b) Tersatukan dengan air, cairan yang dapat menguap seperti polietilen glikol

dan surfaktan nonionic.

c) Tersatukan dengan air dan kelompok komponen yang tidak menguap seperti propilen glikol dan isopropil alkohol.

Keuntungan dari kapsul lunak sebagai berikut: (Hadisoewinyo, 2016).

1) Sesuai untuk obat dalam bentuk cair, obat mudah menguap dan obat dalam bentuk larutan atau suspensi, dengan pelepasan yang cepat dan dapat memperbaiki biovailabilitasnya.
2) Dapat ditutup kedap udara, sehingga sesuai untuk obat yang mudah teroksidasi
3) Mengurangi debu dalam pembuatannya
4) Memungkinkan untuk dapat mengurangi iritasi dari lambung (dibandingkan dengan tablet dan kapsul keras)
5) Tersedia dalam bentuk dan ukuran (*tube form* dan *bead form*)
6) Penampilannya lebih elegan
7) Dan mudah untuk ditelan.

Kerugian dari kapsul lunak sebagai berikut: (Hadisoewinyo, 2016).

1) Lebih mahal dari dibandingkan tablet dan kapsul keras, karena memerlukan mesin pengisian khusus dan keahlian khusus
2) Serta meningkatkan kemungkinan interaksi antara isi dan cangkang.

Bahan penyusun dari cangkang lunak terdiri dari beberapa bahan dasar dan bahan tambahan. Bahan dasarr yang digunakan yaitu polimer (PVA, potato pati, gelatin dan lain sebagainya), bahan pelunak atau *plasticizer* (golongan poliol) dan air (6-13%). Sedangkan untuk bahan tambahan yang digunakan yaitu antara lain bahan pewarna, bahan pengawet, bahan pembura, *flavooringa agent* dan penyalut enteric jika ingin dibuat sediaan kapsul salut enteric (Hadisoewinyo, 2016).

Dalam pemakaian kapsul lunak ditujukan untuk obat, kosmetik, bahan makanan serta sabun. Isi dari kapsul adalah cairan, yang meskipun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

memungkinkan untuk material kering. Material yang diisikan dapat berupa cairan tunggal, kombinasi 2 cairan yang tidak campur, larutan obat, suspense obat, dengan pembawa yang digunakan yaitu seperti *water immiscible* (mudah menguap atau tidak), misalnya minyak sayur, minyak mineral atau *water miscible, non volatile,* contohnya PEG 400 dan PEG 600. Persyaratan dari cairan yang diiisikan adalah kandungan air yang tidak lebih dari 5%, pH antara 2,5-7,5 dan senyawa aldehid tidak digunakan karena dapat menyebabkan *crosslinking* (Hadisoewinyo, 2016).

4.1.3 Keuntungan dan kerugian bentuk sediaan kapsul

Keuntungan pemberian bentuk sedian kapsul antara lain :

a. Bentuk menarik dan praktis
b. Cangkang kapsul tidak berasa sehingga dapat menutupi rasa obat yang berbau dan tidak enak
c. Ditelan dengan mudah dan cepat hancur atau larut dalam perut sehingga obat cepat diabsorpsi
d. Dokter dapat mengombinasikan beberapa jenis obat serta dosis yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pasien
e. Kapsul bisa diisi dengan cepat karena tidak memerlukan bahan zat tambahan atau penolong seperti pada pembuatan pil ataupun tablet (Syamsuni, 2006).

Kerugian pemberian bentuk sedian kapsul antara lain :

a. Tidak bisa digunakan untuk zat-zat yang mudah menguap karena pori-pori kapsul tidak dapat menahan penguapan
b. Tidak bia digunakan untuk zat-zat yang higroskopis (menyerap lembap)
c. Tidak bisa digunakan untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul
d. Tidak bisa digunakan untuk balita
e. Tidak bisa digunakan untuk dibagi-bagi (Syamsuni, 2006).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

4.1.4 Cara penyimpanan kapsul

Cangkang kapsul kelihatannya keras akan tetapi sebenarnya masih mengandung air dengan kadar 10-15% (FI edisi IV). Jika disimpan di tempat yang lambap, maka kapsul akan menjadi lunak dan melengket satu sama lainnya serta sukar dibuka karena kapsul dapat menyerap air dari udara yang lembap. Sebaliknya, jika disimpan ditempat yang terlalu kering, kapsul akan kehilangan airnya sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah (Syamsuni, 2006).

Oleh karena itu, penyimpanan kapsul sebaiknya dalam tempat atau ruangan yang tidak terlalu lembap atau dingin dan kering. Dan terbuat dari botol-gelas, tertutup rapat, dan diberi bahan pengering (silica gel). Terbuat dari wadah botol-plastik, tertutup rapat yang juga dapat diberi bahan pengering. Terbuat dari aluminium-foil dalam blister atau strip (Syamsuni, 2006).

4.1.5 Volume dan ukuran kapsul

Ukuran cangkang kapsul untuk manusia yaitu 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ukuran 000 adalah ukuran terbesar dan ukuran 5 adalah ukuran terkecil. Total obat pada masing-masing kapsul tidak dapat dijadikan sebagai faktor penentu dalam menentukan ukuran kapsul karena biasanya obat tersebut memiliki dosis yang kecil. Dengan mempertimbangkan kenyamanan pasien dapat digunakan kapsul dengan ukuran 0 hingga 3 dikarenakan ukuran yang cukup lebih kecil sehingga dapat dengan mudah ditelan oleh pasien dan tidak terlalu kecil sehingga tidak sulit untuk digunakan. Berikut adalah tabel volume dan ukuran kapsul yang digunakan untuk menentukan ukuran kapsul (Ansel, C, 2006: 77).

Bentuk standar kapsul adalah tradisional, simetris, bentuk peluru (Gousia Begum et al., 2018)



Gambar 7. Ukuran kapsul keras (Begum, 2018).

Tabel 7. Volume dan ukuran kapsul (Ansel. C., 2006)

Ukuran kapul	Perkiraan volume[1]	Perkiraan jumlah serbuk[2]
000	1,4 mL	0,43-1,8 g
00	0,95 mL	0,39-1,3 g
0	0,68 mL	325-900 mg
1	0,5 mL	227-650 mg
2	0,37 mL	200-520 mg
3	0,3 mL	120-390 mg
4	0,21 mL	100-260 mg
5	0,13 mL	65-130 mg

4.1.5 Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan kapsul

Persoalan yang sering dihadapi dalam pembuatan sediaan kapsul yaitu bahan yang dapat merusak cangkang kapsul, diantaranya, (Syamsuni, 2006)

a. Serbuk yang mempunyai bobot jenis yang ringan (*voluminous*) atau berbentuk kristal yang harus digerus terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kapsul. contohnya *garam kina, Na-salisilat,* dan *amidozon.*

b. Serbuk yang mudah mencair seperti KI, Nal, $NANO_2$, akan dapat merusak dinding kapsul sehingga mudah rapuh karena bahan obat tersebut bersifat higroskopis, yaitu menyerap air dari cangkang kapsul. Untuk itu dapat diatasi dengan menambahkan bahan yang inert misalnya laktosa, amilum.

c. Campuran bahan yang mempunyai titik lebur yang lebih rendah dari titik lebur masing-masing bahan obat (titik eutektikum) misalnya campuran asetosal dengan antipirin/heksamin campuran kamfer dengan salol/mentol/timol sehingga kapsul akan menjadi lembek serta dapat lengket satu sama lain. Hal ini dapat diatasi dengan menambahkan bahan yang inert, atau masing-masing bahan dimasukkan

dalam kapsul kecil, kemudian keduanya dimasukkan ke dalam kapsul yang lebih besar.

d. Bahan cairan kental dalam jumlah sedikit dapat dikeringkan dengan menambah bahan inert, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul. Tetapi, jika bahan tersebut jumlahnya besar atau banyak maka yang harus dibuat menjadi massa pil lebih dahulu, baru kemudian dimasukkan kedalam kapsul.

e. Minyak lemak, dapat langsung dimasukkan ke dalam kapsul kemudian ditutup. Tetapi, minyak yang mudah menguap seperti minyak atsiri, air, kreosot, dan alcohol akan merusak dinding kapsul. Hal inidapat diatasi dengan mengencerkan terlebih dahulu dengan minyak lemak sampai kadarnya di bawah 40% sebelum dimasukkan ke dalam kapsul.

4.1.6 Persyaratan kapsul menurut FI III

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi menurut FI III antara lain sebagai berikut, (Syamsuni, 2006).

a. Keseragaman bobot / karagaman bobot

Kelompok kapsul yang berisi bahan padat

1) Ditimbang 20 kapsul sekaligus, lalu ditimbang kembali satu persatu, dicatat bobotnya.
2) Semua isi kapsul dikeluarkan, kemudian ditimbang seluruh bagian cangkang kapsul.

Tabel 8. Keseragaman bobot (Syamsuni, 2006).

Bobot rata-rata tiap kapsul	Perbedaan bobot isi kapsul (%)	
	A	B
<120 mg	10	20
>120 mg	7,5	15

3) Dihitung bobot isi setiap kapsul dan dihitung bobot rata-rata isi tiap kapsul.

4) Dapat memenuhi syarat farmakope Indonesia, jika perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap isi kapsul tidak boleh lebih dari yang telah ditetapkan dalam kolom "A" dan untuk setiap 2 kapsul terhadap bobot rata-rata yang ditetapkan dalam kolom "B".

Kelompok kapsul yang berisi bahan cair atau setengah padat/pasta/salep

1) Ditimbang 10 kapsul sekaligus, kemudian timbang lagi satu persatu.
2) Dikeluarkan semua isi kapsul, dicuci cangkang kapsul dengan eter lalu dibuang cairan cucian, biarkan hingga tak berbau eter lagi.
3) Seluruh bagian cangkang kapsul ditimbang
4) Dihitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata isi tiap kapsulnya
5) Dapat memenuhi farmakope Indonesia, jika perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata disetiap isis kapsul tidak lebih dari 7,5%.

b. Waktu hancur

Ditentukan dengan suatu alat yang disebut dengan *disintegrator tester* yang terdiri atas lima buah tabung transparan dengan ukuran (p. 80-100 mm, d.d 28 mm, d.1 30 mm), ujung bawah dilengkapi dengan kawat kasa yang tahan karat dengan lubang pangayak No. 4. Bak yang berisi air dengan suhu 36-38^0 sebanyak 100 ml dengan kedalaman tidak kurang dari 15 cm sehingga dapat dinaik turunkan dengan teratur. Kedudukan kawat kasa pada posisi tertinggi berada tapat di atas permukaan air dan kedudukan terendah mulut keranjang tepat di bawah permukaan air.

Cara pengujian waktu hancur sebagai berikut:

1) Dimasukkan 5 butir kapsul kedalam keranjang (setiap tabung untuk satu kapsul)
2) Dinaik turunkan keranjang secara teratur sebanyak 30 kali dalam setiap menit
3) Kapsul dinyatakan hancur jika sudah tidak ada lagi bagian dari kapsul yang tertinggal diatas kasa
4) Wakttu yang terlama hancur diantara lima kapsul dinyatakan sebagai waktu hancur kapsul yang bersangkutan
5) Dapat memenuhi syarat yang ditetapkan farmakope Indonesia, jika waku hancurnya tidak lebih dari 15 menit.

c. *Drug Release* (Uji Kelarutan)

Drug Release merujuk pada proses dimana zat terlarut sebuah obat bermigrasi dari posisi awal (berada didalam sistem cangkang kapsul), menuju bagian luar permukaan cangkang kapsul (cangkang kapsul terpecah) setelah waktu tertentu akibat adanya suatu zat yang menyebabkan cangkang kapsul terlarut (hancur), sehingga obat dapat tersebar ke bagian luar cangkang kapsul dan terserap oleh tubuh. Skema *release* suatu obat dari cangkang kapsul ditunjukkan pada Gambar 8 berikut. (Fu dan Kao, 2010).



Gambar 8. Skema *Drug Release* Sebuah Obat dalam Kapsul

d. Uji disolusi

Uji disolusi bertujuan untuk dapat mengetahui berapa jumlah dari zat yang aktif dalam suatu obat yang dapat terlarut dalam waktu tertentu. Menggambarkan berapa presentasi zat yang aktif obat yang dapat terlarut dan teradsorpsi dalam tubuh. Jika disolusi memenuhi syarat, maka diharapkan obat akan memberikan khasiat secara *in vitro* (Syukri, 2002).

4.2 *Jenis tanaman yang berpotensi sebagai pembuatan cangkang kapsul*

Dari hasil analisis jurnal yang didapatkan ada beberapa jenis tanaman yang berpotensi dalam pembuatan cangkang kapsul. Jenis tanaman yaitu terdapat kulit buah coklat (*Theobroma cacao* L), jagung (*Zea mays L.*), jagung berlilin (*Zea mays ceratina*), kentang (*Solanum tuberosum*), lidah buaya (*Aloe vera* L), singkong (*Manihot esculenta*), daun cincau hijau (*Premnaoblongifolia Merr*), sagu rumbia (*Metroxylon sagu rottb*), sorgum (*Sorghum bicolor (L.)Moench*).

a. Kulit buah coklat

Klasifikasi tanaman coklat atau kakao (*Theobroma cacao L*) sebagai berikut: (Siregar, 2010).

Kerajaan : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Kelas : Dicotyledon
Bangsa : Malvales
Suku : Streculiceae
Marga : Theobroma
Jenis : *Theobroma cacao*

Tanaman Kakao (*Theobroma cacao L.)* merupakan salah satu jenis tanaman tahunan yang memiliki karakteristik diversifikasi produk yang luas karena dari buahnya dapat dihasilkan bermacam-macam produk yang dibutuhkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

bagi kepentingan hidup manusia. Buah Kakao segar terdiri dari bagian kulit 75.67%, plasenta 2.59% dan biji 21.74% (Asmanur, 2020).

Kakao adalah salah satu produk hasil pertanian yang sangat penting dalam ekonomi suatu wilayah. Di Aceh, kakao merupakan salah satu komoditi yang sangat unggulan daerah dan produksinya terus meningkat setiap tahunnya. Bagian buah kakao yang dapat mempunyai nilai ekonomis yaitu bijinya, sedangkan dari kulit buah yang merupakan limbah pengolahan dari biji kakao tidak dimanfaatkan. Setiap ton biji kakao kering akan menghasilkan sebanyak 10 ton kulit kakao berdasarkan berat basah. Peningkatan permintaan terhadap biji kakao akan menyebabkan peningkatan jumlah kulit kakao. Mollea et al., 2007 menyatakan bahwa kulit kakao mengandung 9% (basis kering) pektin (Erika et al, 2013).

Kulit buah coklat mengandung pektin sebanyak 10-12,75% yang bisa digunakan sebagai pengganti dari bahan gelatin sebagai bahan baku cangkang kapsul (Suparman, 2019).

b. Cincau hijau

Klasifikasi cincau hijau sebagai berikut: (Beaker, 1968).

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Subdivisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledone
Ordo : Lamiales
Famili : Verbenaceae
Genus : Premna
Spesies : *Premna oblongifolia* Merr

Cincau hijau (*Premna oblongifolia Merr*) merupakan bahan makanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

tradisional yang telah lama dikenal masyarakat dan digunakan sebagai isi minuman segar. Cincau hijau kaya akan karbohidrat, polifenol, saponin dan lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, dan B. Komponen utama ekstrak cincau hijau yang membentuk gel adalah polisakarida pektin yang bermetoksi rendah. Pektin tersebut merupakan kelompok hidrokoloid pembentuk gel yang mempunyai sifat amat rekat. Pektin termasuk bahan yang merupakan golongan karbohidrat yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembuatan cangkang kapsul keras (Amin, 2020).

c. Sagu rumbia

Klasifikasi sagu rumbia sebagai berikut (Ilham, 2021).

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Subdivisi : Angiospermae
Kelas : Monocotyledoneae
Ordo : Arcales
Famili : Arecaeae
Genus : Metroxylon
Spesies : *Metroxylon Sago*

Tanaman sagu adalah salah satu bahan baku pangan penting non-beras untuuk penduduk di kawasan timur Indonesia. Di Indonesia merupakan daerah asal sagu dan sentra penyebaran sagu di dunia. Sagu termasuk komoditas pangan local yang sangat melimpah di Sulawesi Tenggara. Saat ini, sagu yang dihasilkan di Sulawesi Tenggara menjadi sumber pangan local masyarakat. Potensi sagu yang sangat menjanjikan tersebut perlu diiringi dengan pengembangan Agroindustri sagu yakni pengolahan bahan baku mentah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi (Asriani, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Sagu adalah butiran (tepung) yang dapat diperoleh ddari batang pohon sagu (*Metroxylon Sago Rottb*), tepung sagu kaya akan karbohidrat atau pati. Dalam 100 gram sagu kering setara dengan 355 kalori. Didalamya rata-rata terkandung 94 gram karbohidrat, 0,2 gram protein dan 0,5 gram serat serta 10 mg kalsium, 1,2 mg besi dan lemak, tiamin, karote dan asam askorbat dalam jumlah kecil. Untuk serat pangan pada sagu memiliki zat yang bisa berfungsi untuk prebiotik, menjaga mikroflora usus, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi resiko rterjadinya kanker, mempermudah membuang air besar. Menurut kementrian kesehatan republic Indonesia sagu memiliki nilai gizi sebagai sumber karbohidrat tertinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya yakni sekitar 84, 70 %, kalori 353 kal, kalsium 11 mg, besi 1,50 mg, protein 0,70 gr dan lemak 0,20 gram (Asriani, 2021).

Bagian yang paling penting dari sagu adalah bagian tengah batang tempat akumulasi pati. Pati sagu terdiri atas amilosa dan amilopektin. Amilosa sebagai fraksi terlarut ada dalam pati sagu dengan kadar ±27% memiliki struktur linier. Sedangkan amilopektin sebagai fraksi tidak larut, ada dalam pati sagu dengan kadar ±73% memiliki struktur bercabang. Selain itu pati juga mengandung polisakarida yang tersusun atas unit-unit glukosa anhidrat dalam ikatan 1,4-α-D-glikosidik (Bantacut, 2011).

Dimana amilopektin mempunyai sifat granuler serta daya ikat yang sangat baik untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul (Ihsan et al, 2019).

d. Sorgum

Klasifikasi sorgum sebagai berikut : (Lestari, 2019)

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Kelas : Liliopsida

Ordo : Cyperales

Famili : Poaceae

Subfamili : Panicoideae

Genus : Sorghum

Spesies : *Sorghum bicolor* L. Moench

Sorgum adalah tanaman sereal terpenting kelima di dunia dan banyak ditanam di daerah beriklim sedang, tetapi didomestikasi di daerah tropis Afrika (Thurber et al., 2013). Tanaman sorgum berasal dari keluarga Poaceae dan marga Sorghum yang memiliki 32 spesies. Diantaranya, yang paling banyak dibudidayakan yaitu spesies Sorghum bicolor (japonicum). Tanaman yang lazim dikenal masyarakat Jawa dengan nama Cantel ini sekeluarga dengan tanaman serealia lainnya seperti padi, jagung, hanjeli dan gandum serta tanaman lain seperti bambu dan tebu. Tanaman sorgum ini memiliki proses budidaya yang mudah dengan biaya yang relatif murah (Rifa'i et al, 2015).

Biji sorgum dapat digunakan sebagai bahan pangan serta bahan baku industri pakan dan pangan. Misalnya industri gula, monosodium glutamate (MSG), asam amino dan industri minuman serta industri bahan bakar atau bioethanol. Prospek penggunaan dari biji sorgum yang terbesar yaitu pakan, yang sudah mencapai 26,63 ton untuk wilayah Asia-Australia dan diperkirakan masih terjadi kekurangan sekitar 6,72 juta ton. Dengan adanya kondisi ini bisa memberi peluang Indonesia untuk mengekspor sorgum. Kandungan dari sorgum memiliki karbohidrat yang tinggi, di Negara miskin di daerah beriklim kering, umumnya sorgum diusahakan sebagai tanaman pangan. Namun di Negara-negara maju yang persediaan bahan pangannya berlimpah, sorgum ditanam sebagai bahan pakan karena kandungan gizinya cukup tinggi setara dengan jagung dan sebagai bahan

baku industri (Prihandana, 2008).

Sebagai bahan industri, biji sorgum memiliki kandungan pati sebesar 71% yang dapat dihidrolisis menjadi gula sederhana. Dan biji sorgum ini juga dapatt dibuat gula atau glukosa cair atau sirup fruktosa yang sesuai dengan kandungan gula pada biji. Hasil dari olahan biji sorgum yang potensial adallah tepung sorgum yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan pembantu industri. Seperti, industry peleburan biji-biji alumunium, bahan perekat untuk pembuatan *hard board* dari gips (Prihandana, 2008).

Tanaman sorgum memiliki kandungan pati yang mencapai 80,42% yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul yaitu (Rakhman, 2017).

e. Lidah buaya

Klasifikasi tanaman lidah buaya (*Aloe barbadensis Miller*) yang mempunyai nama sinonim yakni, *Aloe vera* dan *aloe vulgari* (Furnawathi, 2002)

Kerajaan : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Kelas : Monocotyledoneae
Bangsa : Liliflorae
Suku : Liliaceae
Marga : Aloe
Jenis : *Aloe barbadensis Miller*

Tanaman lidah buaya merupakan tanaman asli dari Afrika, tepatnya Ethiopia. Tanaman ini mempunyai nama yang bervariasi, tergantung dari Negara atau wilayah tempat tumbuhnya. Di Jerman: aloe, Inggris: *crocodiles tongues*, Malaysia: jadam, Indonesia : lidah buaya, Cina: lu hui, Spanyol: sa'villa, Filipina: natau, India: musabbar. Lidah buaya mempunyai lebih dari 350 jenis tanaman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Lidah buaya dapat tumbuh di daerah kering seperti Asia, Afrika dan Amerika. Hal ini disebabkan karena lidah buaya dapat menutupi stomata daun sampai rapat pada musim kemarau untuk dapat menghindari kehilangan air pada daunnya. Lidah buaya juga dapat tumbuh di daerah beriklim dingin (Furnawathi, 2002).

Tanaman lidah buaya biasanya digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, serta perawatan kulit. Tanaman ini juga bermanfaat sebagai bahan baku dalam industry farmasi dan kosmetik (Furnawathi, 2002).

Lidah buaya memiliki kandungan pektin, glukomanan serta polisakarida lainnya yang bisa membentuk edible film. Pektin mempunyai manfaat diantaranya yaitu sebagai bahan pengental atau perekat pada jeli dan selai. Pektin termasuk bahan golongan karbohidrat selain dari alginat, pati, gum arab dan modifikasi karbohidrat lainnya, sehingga pektin mempunyai manfaat sebagai salah satu bahan pengganti gelatin (Hidayana et al, 2017).

f. Singkong

Klasifikasi singkong sebagai berikut: (Simanjuntak, 2019)

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Ordo : Malpighiales
Famili : Euphorbiaceae
Subfamili : Crotonoideae
Bangsa : Manihoteae
Genus : Manihot
Spesies : *Manihot esculenta*

Singkong sangat mudah dikembangkan di Indonesia karena penanaman dan pemeliharaan yang relative mudah serta memiliki tingkat produksi yang sangat tinggi. Singkong dapat menghasilkan 30-60 ton per hektar. Singkong dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

beradaptasi secara luas di daerah yang beriklim tropis. Singkong di Indonesia dapat tumbuh dan berproduksi di daerah dataran rendah sampai ke dataran tinggi, dari ketinggian 10-1.500 meter di atas permukaan laut. Singkong ini sangat cocok dikembangkan di lahan marjinal, kurang subur dan kurang sumber air. Lahan semacam ini jumlahnya puluhan juta hektar di luar jawa. Singkong dari berbagai produk olahannya memiliki nilai gizi yang bisa dibilang cukup tinggi dengan komposisi yang lengkap. Makan dari ubi kayu atau singkong ini dapat mampu menyediakan energi dalam jumlah yang cukup tinggi dan kandungan gizinya berguna bagi kesehatan tubuh (Prihandana, 2008).

Singkong adalah salah satu hasil perkebunan yang didalamnya mengandung pati yang sangat tinggi. Kandungan dari pati dalam singkong bisa mencapai 90 %. Tanaman singkong di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 23.936.921 ton. Jika dilihat kandungan dari pati pada singkong sebesar 90 %, maka pada tahun tersebut dapat menghasilkan 21.543.228 ton pati singkong. Produksi pati yang tinggi, penanamannya yang mudah dan mudah didapatkan di Indonesia menjadikan singkong sangat potensial dijadikan sebagai bahan baku pembuat cangkang kapsul (Christi et al, 2016).

g. Jagung

Klasifikasi jagung sebagai berikut: (Purwono, 2005).

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Subdivisi : Angiospermae
Kelas : Monocotyledoneae
Ordo : Graminae
Famili : Graminaceae
Genus : Zea

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Spesies : *Zea mays L*

Jagung atau *Zea mays L* telah dikenal dan ditanam oleh masyarakat Amerika Utara sejak 200 tahun sebelum masehi, akan tetapi asal tanaman jagung ini belum dapat diketahui secara pasti. Bangsa indian telah menanam jagung yang kemudian dikembangkan oleh penjajah dari Eropa pada abad 17 yang digunakan sebagai pekan ternak dan bahan makanan manusia. Pada era industry, jagung juga telah diusahakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan minyal jagung dan dapat pula dikembangkan sebagai bahan untuk pembuatan etanol (Aidah, 2020).

Jagung dapat digunakan sebagai bahan pakan dan konsumsi pada manusia. Tanaman jagung merupakan tanaman semusim dengan siklus hidup 80-150 hari dan termasuk sayuran yang tergolong sayuran biji-bijian yang berasal dari meksiko. Jagung yang masih satu keluarga dengan gandum dan padi merupakan bahan makanan pokok utama di Indonesia, yang memiliki kedudukan sangat penting setelah beras (Munarto et al, 2014).

Jagung berlilin atau *waxy corn* memiliki bentuk biji yang menyerupai lilin yang mengandung molekul pati jagung. Pati *waxy corn* mirip dengan glikogen yang menyerupai tepung tapioka. Jagung berlilin atau *waxy corn* disebut juga sebagai jagung pulut. Sebagian besar pati jagung hampir 100% terdiri dari amilopektin yang dalam pemaskaan menjadi lengket, pulen seperti ketan (Syamsia, 2019).

h. Kentang

Klasifikasi kentang sebagai berikut: (Gembong, 1994).

Kerajaan : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Dicotyledoneae

Bangsa : Tubiflorae

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Suku : Solanaceae

Marga : Solanum

Jenis : *Solanum tuberosum L.*

Kentang merupakan salah satu makanan pangan utama didunia. Kentang sering disajikan utuh atau dihaluskan sebagai sayuran yang dimasak dan juga digiling menjadi tepung kentang, digunakan dalam memanggang dan sebagai pengental untuk saus. Umbi sangat mudah dicerna dan menyediakan vitamin C, protein, thiamin, dan niaci (Alqumboz, 2019).

Kentang termasuk tanaman umbi-umbian yang tergolong tanaman setahun yang kaya akan karbohidrat. Di Indonesia merupakan penghasil kentang yang besar yaitu mencapai 1.060.805 ton pada tahun 2010 (BPS, 2010). Kentang memiliki sumber keanekaragaman jenis yang banyak, dan terdiri dari varietas jenis lokal dan beberapa varietas unggul. Berdasarkan warna kulit dan daging umbi, terdapat tiga golongan kentang yaitu kentang kuning, kentang putih, serta kentang merah. Kandungan pati kentang sebesar 15 % dengan kadar air 10%. Lebih dari 12,5% pati kentang merupakan *Resistant Starch type 2* (RS2). Pati resisten tidak dapat dicerna dan diserap dalam usus halus individu yang sehat, dan bersifat resisten terhadap hidrolisis enzim amilase. FAO (2007) melaporkan bahwa pati resisten merupakan salah satu kandidat prebiotic (Kurnia, 2013).

Tabel 9. Jenis tanaman yang berpotensi sebagai pembuatan cangkang kapsul

No.	Penulis dan Tahun	Jenis tanaman
1.	(Christi et al., 2016)	Singkong
2.	(Rakhman, 2017)	Biji sorgum
3.	(Hidayana et al., 2017)	Daun lidah buaya
4	(Suparman, 2019)	Kulit buah coklat
5.	(Ihsan et al., 2019)	Batang pohon sagu rumbia
6.	(Ock et al., 2020)	Jagung, jagung berlilin, kentang dan singkong
7.	(Amin, 2020)	Daun cincau hijau

4.3 *Kandungan tanaman yang berpotensi sebagai pembuatan cangkang kapsul*

Dalam pembuatan cangkang kapsul, bahan baku yang digunakan berasal dari bahan hewani yaitu gelatin dan bahan non hewani seperti bahan alam yang dapat diperoleh dari polisakarida. Polisakarida seperti pati, karagenan, alginat, pektin dan gum arab dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuat cangkang kapsul pengganti gelatin (Christi A et al, 2017).

Pati merupakan komponen karbohidrat yang tersebar dalam tanaman terutama tanaman yang berklorofil. Bagi tanaman, pati merupakan cadangan makanan yang terdapat dalam biji, batang dan pada bagian umbi tanaman. Pati telah lama digunakan sebagai bahan makanan maupun bahan tambahan dalam sediaan farmasi. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik yang terdiri dari dua fraksi yaitu amilopektin dan amilosa. Amilopektin memiliki sifat alir dan daya kopresibilitas yang kurang baik, tetapi memiliki sifat granuler yang mengembang dan daya pengikat yang baik, sehingga sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul pengganti gelatin (Oktavia et al, 2013).

Pektin adalah jenis polisakarida yang sering digunakan sebagai salah satu bahan tambahan pangan untuk memperbaiki stabilitas dan reologi pada koloid pangan, misalnya pada sistem emulsi *oil in water*, *emulsifier* dan *stabilizer*. Selain itu peran Pektin juga sebagai agen *thickening* (pengental), *gelling* dan creaming pada industry farmasi dan kosmetik (Aisyah, 2020).

Pektin merupakan senyawa polisakarida dengan bobot molekul yang banyak terdapat pada tumbuhan. Pektin termasuk golongan karbohidrat selain pati, alginate, gum arab dan modifikasi karbohidrat lainnya, pektin juga berfungsi sebagai pembentuk polimer film yang dapat meningkatkan sifat mekanik cangkang kapsul, sehingga pektin dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan

alternatif untuk pembuatan cangkang kapsul (Hidayana et al, 2017).

Karagenan merupakan senyawa yang termasuk kelompok polisakarida galaktos a hasil ekstraksi dari rumput laut. Sebagian besar karagenan mengandung natrium, magnesium, dan kalsium yang dapat terikat pada gugus ester sulfat dari galaktosa dan kopolimer 3,6- anhydro-galaktosa. Rumput laut dari jenis algae merah menghasilkan polisakarida dalam bentuk Agar dan Karagenan. Sedangkan Algae coklat menghasilkan alginate. Hasil metabolit sekunder jenis rumput laut di atas memiliki fungsi yang sama dalam dunia industri yaitu digunakan sebagai bahan pengental, pensuspensi, penstabil dan pengemulsi (Agustin, Anes, Aprillia Intan Saputri, 2017).

Penggunaan bahan baku pati dalam pembuatan cangkang kapsul dikombinasikan dengan karagenan memberikan sifat fisik yang baik, dimana jika hanya menggunakan pati tanpa penambahan hidrokoloid seperti karagenan, alginate dan pektin formula yang didapatkan jauh lebih baik (Christi A et al, 2017).

Dari jurnal yang telah dianalisis terdapat beberapa jenis tanaman dan kandungan yaitu terdapat pada kulit buah coklat (*Theobroma cacao* L) yang mengandung pektin, jagung (*Zea mays L.)* mengandung pati, jagung berlilin (*Zea mays ceratina*) mengandung pati, kentang (*Solanum tuberosum*) mengandung pati, daun lidah buaya (*Aloe vera* L) mengandung pektin, singkong (*Manihot esculenta*) mengandung amilopektin, daun cincau hijau (*Premnaoblongifolia Merr*) mengandung pektin, sagu rumbia (*Metroxylon sagu rottb*) mengandung pati, biji sorgum (*Sorghum bicolor (L.) Moench*) mengandung pati.

Tabel 10. Kandungan tanaman yang berpotensi sebagai pembuatan cangkang kapsul

No.	Penulis dan Tahun	Jenis tanaman	Kandungan tanaman
1.	(Christi et al., 2016)	Singkong	Amilopektin
2.	(Rakhman, 2017)	Biji sorgum	Pati
3.	(Hidayana et al., 2017)	Daun lidah buaya	Pektin
4	(Suparman, 2019)	Kulit buah coklat	Pektin
5.	(Ihsan et al., 2019)	Batang pohon sagu rumbia	Pati
6.	(Ock et al., 2020)	Jagung, jagung berlilin, kentang dan singkong	Pati
7.	(Amin, 2020)	Daun cincau hijau	Pektin

4.4 *Karakteristik cangkang kapsul dari bahan baku tanaman*

Tanaman singkong yang mengandung pati 90% dengan karakteristik cangkang kapsul meliputi kadar air dan kadar abu. Dimana kadar air yang dapatkkan sebesar 17.67% dan kadar abu 7.78%. Hasil dari kadar abu dan kadar air tidak memenuhi standar untuk kadar air berkisar antara 13% - 16% dan standar dari kadar abu adalah kurang dari 5% (Christi et al, 2016).

Tanaman biji sorgum mengandung pati yang memiliki karakteristik meliputi kuat tarik, perpanjangan, modulus young, kadar air dan kadar abu. Dimana kuat tarik 11.12 Mpa, perpanjangan 3.14% dan modulus young 353,11 Mpa dengan kadar abu 5.66%, kadar air 11.39%. Didapatkan hasil tidak memenuhi standar persyaratan *edible film* pada kadar air 12.5%-15% dan nilai perpanjangan tidak mencapai 40-50% dan kadar abu lebih dari 5%. Sedangkan pada kuat tarik dan modulus young didapatkan hasil yang memenehui standar *edible film* (Rakhman, 2017).

Tanaman daun lidah buaya yang mengandung pektin 3,5526% dengan karakteristik cangkang kapsul meliputi berat cangkang kapsul 188,8 mg, panjang kapsul total 2277 mm, diameter badan 0,278 mm, diameter tutup 0,819 mm. Pada

spesifikasi cangkang kapsul hasil pengujian tidak sesuai dengan syarat spesifikasi cangkang kapsul dari PT. Kapsulindo Nusantara, dikarenakan pengaruh dari pencelupan cetakan yang tidak merata sehingga dapat berpengaruh terhadap bobot setiap cangkang kapsul. Selain dari itu dapat juga dipengaruhi dari pemotongan cangkang kapsul yang tidak seragam dikarenakan tidak menggunakan alat pemotongan khusus sehingga dapat mempengaruhi pada bobot dari setiap cangkang kapsul (Hidayana et al, 2017).

Dimana waktu hancur pada cangkang kapsul sesuai dengan penetapan persyaratan menurut farmakope edisi IV yaitu tidak lebih dari 15 menit (Hidayana et al, 2017).

Tanaman kulit buah coklat mengandung pektin 10-12,75% dengan karakteristik cangkang kapsul meliputi Berat kapsul 96,30 mg, panjang kapsul total 22,05 mm, diameter badan 7,24 mm, diameter tutup 7,65 mm. Berat cangkang kapsul menggunakan naraca analitik sedangkan panjang kapsul, diameter badan dan diameter tutup menggunakan jangka sorong. Pada spesifikasi cangkang kapsul yang dapat memenuhi syarat yaitu diameter badan, diameter tutup dan berat kapsul. Dan untuk panjang kapsul total tidak memenuhi syarat karena pemotongan cangkang kapsul dilakukan secara manual (Suparman, 2019).

Dan untuk waktu hancur yang dihasilkan sesuai dengan rentang waktu hancur yang ditetapkan difarmakope yaitu kurang dari 30 menit. (Suptijah et al, 2012).

Tanaman sagu rumbia mengandung pati dengan karakteristik cangkang kapsul meliputi kekerasan 4,7 kg, kelarutan dalam air 2:13:06 menit, kelarutan suasana asam 1:57:83 menit, kelarutan suasana usus 7:22:45 menit, uji ALT $1{,}5x10^{2}$ cfu/g, E.coli $<1{,}0x10^{0}$ cfu/g, salmonella $<1{,}0x10^{0}$ cfu/g. Pengujian kelarutan cangkang kapsul pati sagu menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda

dengan produk cangkang kapsul komersial. Sedangkan pada pengujian cemaran mikroba dimana sangat dipengaruhi oleh tempat dan proses pembuatan cangkang kapsul sehingga nilai hasil pengujian ALT untuk cangkang pati sagu masih positif, untuk pengujian E. coli, dan Staphylococcus aureus, sedangkan untuk Salmonella telah sesuai standar (Ihsan et al, 2019).

Tanaman jagung, jagung berlilin, kentang dan singkong mengandung pati dengan karakteristik cangkang kapsul meliputi kadar air, panjang, lebar, kekerasan cangkang kapsul. Dengan waktu hancur yang sesuai dengan persyaratan yang diterapkan menurut farmakope korea yaitu 1200 detik (Ock et al, 2020).

Tanaman daun cincau hijau mengandung pektin 14 gram dengan karakteristik cangkang kapsul meliputi bobot cangkang kapsul 355,1 mg dengan waktu hancur 17 menit 01 detik dan pada uji swelling 138,8 %.

Cangkang kapsul pektin cincau hijau yang dihasilkan memiliki bobot yang baik sedangkan waktu hancur yang didapatkan tidak sesuai dengan persyaratan farmakope Indonesia edisi V dikarenakan melebihi batas spesifikasi yaitu lebih dari 15 menit. Dan pada uji *swelling*, cangkang kapsul pektin cincau hijau memiliki derajat *swelling* yang lebih besar dibandingkan dengan derajat *swelling* pada pembanding gelatin (Amin, 2020).

Tabel 11. Karakteristik cangkang kapsul

No.	Penulis dan Tahun	Jenis tanaman	Formula	Karakteristik cangkang kapsul	Persyaratan	Kesimpulan
1.	(Christi et al., 2016)	Singkong	Amilopektin: 3% Karagenan: 2% Gliserin : 2.90%	• Kadar air 17.67% • Kadar abu 7.78%	• Kadar air 13-16% • Kadar abu < 5%	Tidak memenuhi

2.	(Rakhman, 2017)	Biji sorgum	Pati rumput laut 60:40 CaCO3: 0,4% Gliserol : 10%	• Kuat tarik 11,12 Mpa • Perpanjangan 3,14% • Modulus young 353,11 Mpa • Kadar air 11,39%. • Kadar abu 5,66%	• Kuat tarik 10-45 Mpa • Perpanjangan 40-50% • Modulus young 100-400 Mpa • Kadar air 12,5%-15% • Kadar abu < 5%.	Memenuhi: kuat tarik, modulus young. Tidak Memenuhi: panjang, kadar air dan kadar abu.
3.	(Hidayana et al., 2017)	Daun lidah buaya	Pektin: 1% CMC: 8,5% $CaCl_2$: 0,03% Aquadest: 90,47%.	• Berat cangkang kapsul 188,8 mg • Panjang kapsul total 2277 mm • Diameter badan 0,278 mm • Diameter tutup 0,819 mm • Waktu hancur 15 menit	• Berat kapsul 106,46731 mg • Panjang kapsul 70,71853442 mm • Diameter badan 0,0147573 mm • Diameter tutup 0,02132 mm. • Waktu hancur tidak lebih dari 15 menit	Memenuhi: waktu hancur Tidak memenuhi: Berat, panjang, diameter badan, diameter tutup.
4.	(Suparman, 2019)	Kulit buah coklat	Pektin : 0,78%, karagenan: 5,00%, aquadest: 94,22%.	• Berat kapsul 96,30 mg • Panjang kapsul total 22,05 mm • Diameter badan 7,24 mm	• Berat kapsul min 87, max 105 • Panjang kapsul total 21,00-22,00 mm • Diameter	Memenuhi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

				• Diameter tutup 7,65 mm • Waktu hancur 21 menit 30 detik.	badan 7,290 ± 0,203 mm • Diameter tutup 7,569 ± 0,305 mm. • Waktu hancur kurang dari 30 menit	
5.	(Ihsan et al., 2019)	Batang pohon sagu rumbia	Pati sagu: 8%; Karagenan: 2% Gliserol : 2%	• Kekerasan 4,7 kg • Kelarutan dalam air 2:13:06 menit • Kelarutan suasana asam 1:57:83 menit • Kelarutan suasana usus 7:22:45 menit • Uji ALT $1,5x10^2$ cfu/g • E.coli $<1,0x10^0$ cfu/g • Salmonella $<1,0x10^0$ cfu/g.	•Kekerasan 6,5 kg •Kelarutan dalam air 0:51:32 menit •Kelarutan suasana asam 0:52:26 menit •Kelarutan suasana usus 3:28:21 menit •Uji ALT ^{1}sprider •E.coli $<1,0x10^0$ cfu/g •Salmonella $<1,0x10^0$ cfu/g.	Tidak Memenuhi
6.	(Ock et al., 2020)	Jagung, jagung berlilin, kentang dan singkong	Pati : 25.4% Gliserin : 18.6% D-sorbitol : 5.4% Iota-	Panjang cangkang kapsul: jagung 16,24 mm, jagung	• Waktu hancur 1200 detik di bawah kondisi pengujian.	Tidak memenuhi

			Karagenan : 8.8% Sodium karbonat: 0.14% Air suling: 41.66%.	berlilin 16,66 mm, kentang 16,23 mm, singkong 16,47 mm. Lebar : jagung 8,39 mm, jagung berlilin 8,39 mm, kentang 8,45 mm, singkong 8,41 mm. Kadar air: jagung 0,02%, jagung berlilin 0,32%, kentang 0,61%, singkong 0,60%. Kekerasan: jagung 1,30 N, jagung berlilin 1,57 N, kentang 3,31 N, singkong 2,60 N. Dengan waktu hancur: jagung 789 detik, jagung berlilin 855 detik, kentang 740 detik dan		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

				singkong 840 detik.		
7.	(Amin, 2020)	Daun cincau hijau	Pektin: 4% NaCMC: 2% Sorbitol: 1% Aquadest: 93%	• Bobot cangkang kapsul 355,1 mg • Waktu hancur 17 menit 01 detik • Uji swelling 138,8 %.	• Bobot 146,4 mg • Waktu hancur 2 menit 44 detik • Uji swelling 43,9 %	Tidak memenuhi

4.5 *Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tanaman*

Pada dasarnya alam semesta merupakan suatu tatanan yang bekerja dengan hukum serta potensi yang dianugerahkan Allah swt kepadanya. Manusia sebagai mandataris Allah ditantang untuk berusaha menemukan serta memahami dan menguasai hukum alam yang sudah digariskannya, sehingga dapat mengeksploitasikannya untuk tujuan yang lebih baik. Dengan demikian, alam semesta yang diciptakan Allah ini bukanlah alam yang siap pakai, tapi harus dipelajari, diolah dan dibangun oleh manusia menjadi suatu alam yang baik. Manusia adalah sosok yang dipilih Allah sebagai khalifah di bumi (*vice-gerent on the arth*) yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjaga keharmonisan dan kelestarian alam semesta ini (Rizal, 2020).

Al-Qur'an dalam sebagian ayatnya, memberikan dorongan-dorongan kepada manusia untuk mengadakan perjalanan di muka bumi, mengadakan pengamatan dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Perhatian Al-Quran dalam menyeru manusia untuk mengamati dan memikirkan alam ini dan makluk yang ada di dalamnya mengisyaratkan dengan jelas seruan Al-Qur'an supaya manusia belajar, baik melalui pengamatan terhadap berbagai hal, pengalaman praktis dalam kehidupan sehari-hari, ataupun melalui interaksi alam semesta dan peristiwa yang ada dan terjadi di alam ini (Rizal, 2020).

Manusia dan tumbuh-tumbuhan sangat erat kaitannya dalam kehidupan .Banyak sekali nilai manfaat yang didapatkan oleh manusia dari tumbuh-tumbuhan namun masih banyak pula tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar kita yang belum diketahui manfaatnya. Keberadaan tumbuh-tumbuhan merupakan berkah dan nikmat Allah swt yang diberikan kepada seluruh makhluknya (Rizal, 2020).

Dalam Q.S Asy Syu'araa'/26: 7 Allah swt berfirman :

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ

Terjemahnya:

> "Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?'' (Q. S Asy Syu'araa/26: 7) (Kementrian Agama, 2013, Al-qur'an terjemah).

Dalam tafsir Al-Misbah kata *ila* pada ayat ini mengandung makna yaitu batas akhir yang berarti memperluas suatu arah pandangan hingga batas akhir atau dengan kata lain ayat ini mengandung arahan kepada manusia untuk meperluas pandangannya terhadap keajaiban yang ada dimuka bumi ini termasuk didalamnya yaitu tumbuh-tumbuhan. Sedangkan kata karim dalam ayat tersebut digunakan untuk menggambarkan suatu hal yang baik pada setiap objek, dalam hal ini yang dimaksud adalah tumbuhan yang baik adalah adalah tumbuhan yang subur dan bermanfaat (Shihab M, 2002).

Ayat diatas menjelaskan tentang kuasa Allah swt menciptakan bumi beserta isi-isinya, salah satunya ialah tumbuhan. Dari tumbuhan itu ada yang memiliki kandungan yang dapat dibuat sebagai bahan baku cangkang kapsul. Tumbuhan yang diciptakan adalah tumbuhan yang subur seperti biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan serta rumput yang dapat dijadikan bahan makanan bagi manusia dan ternak dan bisa juga digunakan sebagai tanaman herbal atau tanaman obat bagi manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Az-Zumar/39: 21

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُۥ يَنَٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَٰمًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

Terjemahnya:

> "Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu Dia mengalirkannya menjadi mata air-mata air di bumi, kemudian Dia mengeluarkan dengannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian Dia menjadikannya hancur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi Ulil Albab. "(Q.S Az-Zumar/39: 21) (Kementrian Agama, 2013, Al-qur'an terjemah).

Dalam tafsir Al- Misbah akhir ayat yang lalu menegaskan bahwa Allah memenuhi janji-Nya. Salah satu janji Allah yang selalu diingkari oleh kaum musyrikin adalah janji tentang kebangkitan manusia setelah kematiannya untuk menerima sanksi dan ganjaran. Ayat di atas mengemukakan salah satu bukti tentang kuasa-Nya membangkitkan yang telah mati, Allah berfirman: Apakah engkau siapa pun engkau tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia mengalirkannya di tanah menjadi mata air-mata air di bumi, kemudian satu hal yang lebih hebat lagi adalah Dia mengeluarkan yakni menumbuhkan dengannya yakni disebabkan oleh air yang turun itu tanam-tanaman pertanian yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa dan warnanya walau air yang menumbuhkannya sama, lalu ia menjadi kering atau menguat dan tinggi lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan setelah sebelumnya segar kehijau-hijauan , kemudian Dia menjadikannya hancur layu berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu yakni proses yang silih berganti dari satu kondisi ke kondisi yang lain benar-benar terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi Ulil Jilbab (Shihab M, 2002).

Surah al-Zumar diatas menjelaskan bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia termasuk tanaman yang ada dibumi ini sangat penting dan bermanfaat baik bagi manusia, tumbuhan dan hewan. Seperti contohnya tanaman yang mengandung polisakarida yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul.

Dalam H.R. Muslim bersabda :

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ

Artinya:

> ‘‘Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla" (HR. Muslim: 4084).

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ setiap penyakit ada obatnya, karena itu, apabila suatu obat tepat mengenai penyakitnya, maka akan sembuh dengan seizin Allah), lafazh dawau’ (obat) hadist ini mengisyaratkan dianjurkannya obat. Madzhab (pendapat) para sahabat kami, mayoritas ulama salaf dan umumnya ulama khalaf. Hadist tersebut mengandung penjelasan yang terang, karena para tabib telah mengatakan bahwa penyakit adalah keluarnya tubuh dari aliran yang normal sedangkan pengobatan adalah mengembalikannya kepada kondisi semula. Jadi memeliharanya adalah dengan memperbaiki asupan makanan dan sebagainya sementara mengembalikannya adalah dengan tepat pengobatan yang dapat mematahkan penyakitnya (An- Nawawi, 2011; 485).

Hadist di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia ada obatnya. Terkadang ada orang yang menemukan obatnya, ada juga yang belum menemukan obatnya. Dan kami dapati banyak orang sakit yang berobat namun tidak sembuh, lalu dikatakan bahwa itu karena tidak diketahuinya hakikat pengobatan dan bukan karena tidak ada obatnyay. Oleh karena itu, seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk mencari obat ketika sakit sedang menimpanya (An- Nawawi, 2011: 487). Sehingga manusia dituntut untuk mempelajari dan meneliti tanaman yang dapat dijadikan obat khususnya yang dapat dijadikan sebagai cangkang kapsul untuk menggantikan bahan yang tidak halal bagi umat islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB V

PENUTUP

5.1 *Kesimpulan*

Dari hasil penelusuran jurnal terdapat 7 jurnal yang didalamnya terdapat tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul.

1. Jenis tanaman yang dapat berpotesi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul yaitu kulit buah coklat (*Theobroma cacao* L), jagung (*Zea mays L.*), jagung berlilin (*Zea mays ceratina*), kentang (*Solanum tuberosum*), lidah buaya (*Aloe vera* L), singkong (*Manihot esculenta*), daun cincau hijau (*Premnaoblongifolia Merr*), sagu rumbia (*Metroxylon sagu rottb*), sorgum (*Sorghum bicolor (L.)Moench*).
2. Kandungan tanaman yang berpotensi dalam pembuatan cangkang kapsul yang terdapat pada tanaman adalah polisakarida seperti pati, pektin dan karagenan.
3. Karakteristik cangkang kapsul dari bahan baku tanaman terdapat kadar air, kadar abu, kuat tarik, panjang kapsul, berat kapsul, diameter badan, diameter tutup dan waktu hancur.
4. Allah swt menyampaikan dalam al-qur'an tentang berbagai macam tanaman didunia ini yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik sebagai makanan dan obat-obatan. Serta dapat juga dijadikan sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul.

5.2 *Saran*

Diharapkan penelitian studi literatur dapat menjadi acuan atau referensi pada peneliti selanjutnya mengenai tanaman yang berpotensi dalam pembuatan cangkang kapsul.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Anes, Aprillia Intan Saputri, H. (2017). pendahuluan Rumput laut merupakan tumbuhan laut jenis alga, sejenis ganggang multi seluler golongan divisi. *Inovasi Teknik Kimia*, *2*(2), 42–47.

Aidah, Nur, Siti. (2020). Ensiklopedi jagung (filosofi, deskripsi, manfaat dan peluang bisnisnya). Penerbit: karya bakti makmur (KBM) indonesia. Jogjakarta.

Asriani, Dhian. (2021). Teknologi penolahan sagu. penerbit: NEM. Kolaka

Alqumboz, M. N. A., & Abu-naser, S. S. (2019). *Avocado Classification Using Deep Learning*. *3*(12), 30–34.

Amin, F., & Alam, D. N. (2020). karakterisasi dan pembuatan cangkang kapsul keras dari ekstrak daun cincau hijau (Premna. *Itekima*, *8*(2), 30–41.

Ansel, H. C. (1989). Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Ansel, C, H. (2006). *Kalkulasi Farmasetik. Panduan Untuk Apoteker* (W. Syarief, R (ed.)). Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Asmanur, A. J. (2020). Penentuan kualitas pektin dengan formulasi ph ekstraksi pada limbah kulit kakao (Theobrema cacao L.). *The Hokuriku Crop Science*, *3*(1), 1–3. https://doi.org/10.19016/jcshokuriku.3.0_1

Bantacut, T. (2011). Sagu: sumberdaya untuk penganekaragaman pangan pokok. *Jurnal Pangan*, *20*(1), 27–40. http://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/6

Backer, C.A., & Bakhuisen van den Brink R.C 1968. Flora of Java (Spermatophytes Only). Vol. III Wolters-Noordhoff, N.V. – Groningen-The Netherlands.

Begum, S. Gousia. A review on manufacturing and evaluation of capsules. Santhiram College of Pharmacy, Affiliated to Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur-, Nandyal, Kurnool Dist. A.P.-518501

Christi A, G. J., Ambarsari, L., & Purwoto, H. (2017). Optimization of Formula Film based on Amylopectin *Cassava* Starch and Carrageenan as a Raw Materials of Capsule Shell. *Current Biochemistry*, *3*(1), 20–32. https://doi.org/10.29244/cb.3.1.20-32

Christi, J., Ambarsari, L., & Purwoto, H. (2016). *Optimization of Formula Film based on Amylopectin Cassava Starch and Carrageenan as a Raw Materials of Capsule Shell*. *3*(1), 20–32.

Dirjen POM., (1979). Farmakope Indonesia. Edisi Ketiga. Departeman Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Dirjen POM., (1995). Farmakope Indonesia. Edisi Keempat. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Dirjen POM., (2014). Farmakope Indonesia. Edisi Kelima. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Dirjen POM., (2020). Farmakope Indonesia. Edisi Keenam. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Erika, C., Studi, P., Hasil, T., Pertanian, F., & Kuala, U. S. (2013). Ekstraksi Pektin dari Kulit Kakao (Theobroma cacao L.) Menggunakan Amonium Oksalat. *Jurnal Teknologi & Industri Pertanian Indonesia*, *5*(2), 2–7. https://doi.org/10.17969/jtipi.v5i2.1001

Fardhyanti, D. S., & Julianur, S. S. (2015). karakterisasi edible film berbahan dasar ekstrak karagenan dari rumput laut (Eucheuma cottonii). Jurnal Bahan Alam Terbarukan, 4(2), 68–73. https://doi.org/10.15294/jbat.v4i2.4127

FAO (Food and Agricultural Organization). 2007. Technical Meeting On Prebiotics [serial online]. http://www.fao.org/ag/agn/agns/files/Prebiotics TechMeetingReport.

Fu, Y., and Kao, W. J. (2010). Drug Release Kinetics and Transport Mechanisms of Non-Degradable and Degradable Polymetric Delivery Systems. Expert Opinion.

Furnawathi, Irni. (2002). Khasiat dan manfaat lidah buaya si tanaman ajaib. Agromedia. Jakarta.

Gadri, A., & Priani, S. E. (2012). *Stabilitas Kadar dan Laju Disolusi Ketoprofen Dalam Sediaan Kapsul Gelatin dan HPMC-Karagenan*. 87–94.

Gousia Begum, S., Hasmitha, Y., Girija Reddy, U., Deepa, M., Supraveena Reddy, K., & Susmitha, R. (2018). *World Journal of Pharmaceutical Sciences A review on manufacturing and evaluation of capsules*. *6*(8). http://www.wjpsonline.org/

Hanny, Purnomo. (2007). *Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul*. Niaga Swadaya. Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Hadisoewignyo, Lannie. (2016).Sediaan solida. Pustaka pelajar. Yogyakarta.

Hidayana, D. A., E, D. H., & W, H. A. (2017). *Karakterisasi dan Pembuatan Cangkang Kapsul dari Tepung Pektin Lidah Buaya [Aloe vera (L .) Burm . f] sebagai Alternatif Bahan Pembuatan Cangkang Kapsul Keras*. 592–597.

Ihsan, H., Prabawa, I. D. G. P., Harsono, D., Nintasari, R., Apriani, R., & Nurcahyo, A. B. (2019). Pengujian sifat fisik dan cemaran mikroba pada cangkang kapsul pati sagu rumbia (Metroxylon sagu Rottb) dan karagenan. *Jurnal Riset Industri*, *11*(1, Juni), 13–22.

Ilham, Ridwan, Ali., M. (2021). Diferensiasi Kulit Pelepah Rumbia Sebagai Leku Multifungsi. Penerbit: Media sains Indonesia. Bandung.

Kapsulindo, U. (2007). Analysis Report on Pharmaceutical Capsule.

Kementrian Agama RI, (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: Syamil Qur'an.

Kurniah, Sari, Fitrah. (2013). Ekstraksi pati resisten dari tiga varietas kentang lokal yang berpotensi sebagai kandidat prebiotik. Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember

Lestari, Tri, Eries. (2019). Teknologi Pengelolaan Lahan Pasca Tambang Tanah. Uwari inspirasi Indonesia. Ponorogo.

Madury, S. Al, Fakhrunnisa, F., & Amin., A. (2012). *Pemanfaatan Kulit Maggis (Garcinia mangostana L) Sebagai Formulasi Tablet Antikanker Yang Praktis dan Ekonomis*. *5*(11613095), 1–11.

Munarto, R., Permata, E., & Salsabilla, R. (2014). Klasifikasi Kualitas Biji Jagung Manis Berdasarkan Fitur Warna Menggunakan Fuzzy Logic. *Simposium Nasional RAPI XIII - 2014 FT UMS*, *August*, 5–12. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4227.3126

Nurminah. (2019). Formulasi dan karakterisasi pati bonggol pisang kepok (*Musa paradisiaca* L) sebagai bahan baku pembuatancangkang kapsul yang dikombinasikan dengan karagenan. Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas islam negeri alauddin makassar. Makassar.

Ock, S. Y., Lim, W. S., Park, G. D., Lee, M. H., & Park, H. J. (2020). Physical and mechanical properties of plant-derived soft-shell capsules formulated with hydroxypropyl starches from different botanical sources. *Polymer Testing*, *91*(September), 106871. https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.106871

Oktavia, A. D., Idiawati, N., & Lia, D. (2013). Studi awal pemisahan amilosa dan amilopektin pati ubi jalar (ipomoea. *jurnal kimia*, *2*(3), 153–156

Oktavia1, A. D., Idiawati1, N., & Destiarti, L. (2013). *Studi Awal Pemisahan Amilosa dan Amilopektin Pati Ubi Jalar (Ipomoea*. *2*(3), 153–156

Prihandana, Rama. (2008). Energi hijau. Penebar swadaya. Jakarta

Purwono, Rudi, Hartono., S.P. (2005). Bertanam Jagung Unggul. Penebar swadaya. Bogor.

Rakhman, F. A., & Darni, Y. (2017). Edible film application of seaweeds eucheumma cottoni and sorghum. *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, *05*(02), 172–183.

Rifa'i, H., Ashari, S., & Damanhuri. (2015). Keragaan 36 aksesi sorgum (Sorghum bicolor L .). *Jurnal Produksi Tanaman*, *3*(4), 330–337.

Rizal Syaiful. (2020). *Manfaat Alam dan Tumbuhan "Sumber Belajar Anak" Dalam Perspektif Islam*. *1*(2), 96–107.

Selpiana, Riansya, J. F., & Yordan, K. (2015). *Pembuatan Plastik Biodegradable dari Tepung Nasi Aking*. 130–138.

Shihab M, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.* Lentera hati.

Siregar, Tumpal, H.S. (2010). Budidaya cokelat. Penebar swadaya. Jakarta.

Simanjuntak, A. Y. M., & Subagyo, R. (2019). Analisis Hasil Fermentasi Pembuatan Bioetanol Dengan Variasi Waktu Menggunakan Bahan (Singkong, Beras Ketan Hitam Dan Beras Ketan Putih). *Scientific Journal of Mechanical Engineering Kinematika*, *4*(2), 79–90. https://doi.org/10.20527/sjmekinematika.v4i2.119

Suparman, A. (2019). Karakterisasi dan formulasi cangkang kapsul dari tepung pektin kulit buah cokelat (Theobroma cacao L). *Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa*, *2*(2), 77–83. https://doi.org/10.29313/jiff.v2i2.4646

Suptijah, P., Suseno, S. H., & Kurniawati. (2012). Aplikasi Karagenan Sebagai Cangkang kapsul Keras Alternatif Pengganti Kapsul Gelatin Application of Carrageenan as Hard Capsule for Gelatin Capsule Subtitute. *Jphpi*, *15*(3), 223–231.

Syamsia, Abubakar. (2019). Produksi benih jagung. Penerbit: Nas media pustaka. Makassar.

Syamsuni, H. (2006). Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi (W. Syarief, R (ed.)). Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta.

Syamsuni, H. A. (2006). Ilmu resep. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta

Syukri, Y. (2002). Biofarmasetika 1st Edition. Jakarta: UI Press.

Thurber, C. S., Ma, J. M., Higgins, R. H., & Brown, P. J. (2013). Retrospective genomic analysis of sorghum adaptation to temperate-zone grain production. *Genome Biology*, *14*(6), 0–12. https://doi.org/10.1186/gb-2013-14-6-r68

Tjitrosoepomo, Gembong. 1994. Taksonomi Tumbuhan Obat-Obatan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Ulung, Gagas. (2014). Sehat alami dengan herbal 250 tanaman berkhasiat obat. Penerbit: Gramedia pustaka utama. Jakarta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 1. Situs pencarian pustaka



Kata kunci : Cangkang kapsul dari bahan baku tanaman



Kata Kunci : *Manufacture of plant capsule shells*



Kata kunci : Cangkang kapsul dari bahan baku tanaman



Kata Kunci : *Manufacture of plant capsule shells*



Kata kunci : Cangkang kapsul dari bahan baku tanaman



Kata Kunci : *Manufacture of plant capsule shells*

Lampiran 2. *Screenshot* jurnal

Jurnal ITEKIMA
ISSN: 2548-947x
Vol.8, No.2, Agusutus 2020

KARAKTERISASI DAN PEMBUATAN CANGKANG KAPSUL KERAS DARI EKSTRAK DAUN CINCAU HIJAU (*Premna oblongifolia Merr*)

(Characterization and Production of Hard Capsule Shells from Green Grass Jelly Extract (Premna oblongifolia Merr))

Fauzan Amin* dan Desi Nur Alam

Program Studi Kimia, Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon-Banten
***E-mail: khotibkhottob@gmail.com**

ABSTRAK

Cincau hijau yang kaya akan karbohidrat memiliki kemampuan untuk membentuk gel dengan komponen utama berupa polisakarida pektin yang bermetoksi rendah. Pada penelitian ini ekstraksi pektin daun cincau hijau menggunakan pelarut air dan gel yang dihasilkan kemudian dikeringkan pada suhu 50 ^{0}C selama 5 jam. Hasil karakterisasi pektin daun cincau hijau pada penelitian ini memiliki bobot pektin sebesar 14 gram; kadar air, abu, metoksil, asam galakturonat, dan derajat esterifikasi masing-masing sebesar 9,26; 0,03; 4,94; 32,80; dan 85,57 % serta bobot ekivalen yaitu 3720,79 mg. Hasil karakterisasi cangkang kapsul pektin daun cincau hijau yang dihasilkan dengan variasi bobot cangkang kapsul A (500 mg), cangkang kapsul B (400 mg), dan cangkang kapsul C (300 mg) memiliki waktu hancur selama 19 menit 55 detik, 18 menit 50 detik,

Current Biochemistry
Volume 3 (1): 20 - 32, 2016

CURRENT BIOCHEMISTRY
ISSN: 2355-7877
Homepage: http://biokimia.ipb.ac.id
E-mail: current.biochemistry@gmail.com

Optimization of Formula Film based on Amylopectin *Cassava* Starch and Carrageenan as a Raw Materials of Capsule Shell

(Optimasi Formula Film Berbasis Amilopektin Pati Singkong dan Karagenan sebagai Bahan Baku Cangkang Kapsul)

G Jeni Christi A[1], Laksmi Ambarsari[1], Heri Purwoto[2]*

[1]Department of Biochemistry, Bogor Agricultural University, Bogor, 16680, Indonesia
[2]LAPTIAB, Indonesian Agency for the Assessment and Application of Technology, Tangerang

Received : 27 July 2016; Accepted: 5 January 2016

*Corresponding author: Dr. Ir. Heri Purwoto, M.Eng; Laboratoria Pengembangan Teknologi Industri Agro dan Biomedika BPPT, Kompleks Puspitek Gedung 610, Serpong; E-mail: otoverup@yahoo.com

ABSTRACT

Capsules are very important in the packaging of pharmaceutical preparations. Commercial capsule shell is generally made of gelatin from cows and pigs. Alternatives to gelatin from non-animal raw materials can be obtained from polysaccharides like starch and carrageenan. The purpose of this

Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa Volume 2 No 2 halaman 77 – 83 77

KARAKTERISASI DAN FORMULASI CANGKANG KAPSUL DARI TEPUNG PEKTIN KULIT BUAH COKELAT (*Theobroma cacao L)*

[1]Anan Suparman, [2]Diar Herawati, [3]Zahra Fitratul T.

[1,2,3]Program Studi Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 4016 Jawa Barat, Indonesia
email : [1]anan_multifarma@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kapsul adalah sediaan yang mengandung satu macam bahan obat atau lebih yang dimasukkan ke dalam cangkang atau wadah kecil yang umumnya dibuat dari gelatin. Struktur pektin yang berupa polimer sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti gelatin. Salah satu bahan pembuatan kapsul adalah tepung pektin dari kulit buah cokelat (*Theobroma cacao L.*). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kemungkinan pemanfaatan pektin dari kulit buah cokelat dengan memformulasi sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan cangkang kapsul keras. Metode yang digunakan 1. Metode design expert software untuk formulasi, 2. Metode pencetakan dengan pencetakan langsung terhadap film kapsul, 3. Metode pengujian disintegrator untuk melihat waktu hancur. Hasil optimasi formula yang baik yaitu formula F3 dengan konsentrasi pektin 0,78%, karagenan 5,00% dan aquades 94,22%. Hasil evaluasi cangkang kapsul menunjukkan spesifikasi cangkang kapsul memenuhi syarat industri kapsul dan waktu hancur cangkang kapsul memenuhi syarat yang ditetapkan Farmakope Indonesia edisi V tahun 2014 yaitu 15 menit atau kurang dari 30 menit.

Kata Kunci: gelatin, pektin, buah cokelat (*Theobroma cacao L.*), karagenan

ABSTRACT

Capsule is a preparation that consists of one kind or more substances with a shell which

Prosiding Farmasi ISSN: 2460-6472

Karakterisasi dan Pembuatan Cangkang Kapsul dari Tepung Pektin Lidah Buaya [*Aloe vera (L.) Burm.* f] sebagai Alternatif Bahan Pembuatan Cangkang Kapsul Keras

Characterization and Production of Capsule Shell from Aloe Pectin [*Aloe Vera (L.) Burm.* f] as an Alternative Material Of Capsule Shell Production

[1]Dwi Adha Hidayana, [2] Diar Herawati E., [3]Hilda Aprilia W.
[1,2,3]Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email : [1]adhadwi@rocketmail.com, [2]diarmunawar@gmail.com, [3]hilda.aprilia@gmail.com

Abstract. Capsules are a solid dosage forms in which one or more medicinal and inert ingridients are enclosed in a small shell or container usually made of gelatin. Other than gelatin, capsules also can be made from basic materials that come from nature, such as starch or any suitable materials. *Aloe vera L.* is one of the plants which can be made as a basic material of capsule shells because it contain pectin, glucomannan and other polysaccharides that can be made edible. This research was conducted to know the possibility of aloe pectin utilization as an alternative material of manufacturing hard gelatin capsule shell. This research was done by extracting pectin out of aloe vera, characterizing pectin the aloe vera, optimizing the formula of capsule shell, and capsule shell making. Capsule shell making is done by dipping method. The results showed the acceptable formulation of capsule shells is a formulation of capsule shell with 1% pectin concentration, 8,5% of CMC, 0,03% $CaCl_2$, and 90,47% aquades. Evaluation result of capsule shell showed that the capsule shell disintegration are qualified by Farmakope Indonesia Edition IV (1995) that is 15

Polymer Testing 91 (2020) 106871

Contents lists available at ScienceDirect

Polymer Testing

journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/polytest

Analysis Method

Physical and mechanical properties of plant-derived soft-shell capsules formulated with hydroxypropyl starches from different botanical sources

Seok Young Ock [a,b,1], Woo Su Lim [a,1], Geum Duck Park [b], Min Hyeock Lee [c,**], Hyun Jin Park [a,*]

[a] Department of Biotechnology, College of Life Science and Biotechnology, Korea University, Anam-dong, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Republic of Korea
[b] Sobang, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 17888, Republic of Korea
[c] Research Group of Food Processing, Korea Food Research Institute, Wanju-gun, Jeollabuk-do, 55365, Republic of Korea

ARTICLE INFO

Keywords:
Soft-shell capsule
Starch
Gelatin alternative
Disintegration
Physical property

ABSTRACT

Soft-shell capsules are prepared herein using hydroxypropyl starches from different botanical sources (maize, waxy maize, potato, and cassava) as a replacement for animal-based materials such as gelatin. The physical, mechanical, and morphological properties of the starch films are characterized to investigate the possibility of manufacturing soft-shell capsules. Starch films originating from tubers, including potato and cassava, exhibit higher tensile strength, resulting in higher hardness of the soft-shell capsules compared to those originating from maize and waxy maize starches. None of the starch-based soft-shell capsules broke in a brittleness test, and there are no distortion defects in the seams that seal the capsules. Disintegration and solubility tests over six months show that although the soft-shell capsules manufactured from maize and potato starch disintegrate faster than those from waxy maize and cassava starch, all of the capsules disintegrate within 1,800 s, which is acceptable for commercial applications.

1. Introduction

scale. It consists a mixture of water-soluble proteins (84–90%), mineral salts (1–2%), and water (8–15%). The protein fraction mainly comprises

ANFI

APLIKASI EDIBLE FILM DARI RUMPUT LAUT *Eucheumma cottoni* DAN PATI SORGUM DENGAN *PLASTICIZER* GLISEROL DAN *FILLER* $CaCO_3$ SEBAGAI BAHAN PEMBUAT CANGKANG KAPSUL

EDIBLE FILM APPLICATION OF SEAWEEDS Eucheumma cottoni *AND SORGHUM STARCH WITH GLYCEROL PLASTICIZER AND* $CaCO_3$ *FILLER AS COMPOSING MATERIALS FOR CAPSULE SHELL*

Fakih Aulia Rakhman dan Yuli Darni
Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung.
Email: fakih.aulia.rakhman@gmail.com

Abstrak

Edible film merupakan lapisan tipis yang digunakan untuk melapisi makanan yang berfungsi sebagai penahan terhadap transfer massa seperti kadar air, oksigen, lemak, dan cahaya atau berfungsi sebagai pembawa bahan tambahan pangan. Edible film digunakan dalam berbagai bidang, seperti bidang farmasi yang menggunakan edible film sebagai pelapis obat (cangkang kapsul). Dalam penelitian ini dilakukan studi mengenai pembuatan edible film untuk cangkang kapsul dari rumput laut Eucheumma cottoni dan pati sorgum dengan penambahan $CaCO_3$ sebagai *filler* dan gliserol sebagai *plasticizer* dan temperatur gelatinisasi yaitu pada t = 95 °C. Berat total pati dan rumput laut (9:1, 8:2, 7:3, 6:4) sebesar 10 g dengan penggunaaan gliserol sebagai plasticizer adalah 10 % (g/g) dan variasi $CaCO_3$ sebesar 0, 0,2, 0,4, dan 0,6 % (g/g). Waktu pengadukan selama 35 menit dengan kecepatan pengadukan sebesar 380 rpm. Menghasilkan komposisi terbaik pati dan rumput laut 60:40 dengan $CaCO_3$ 0,4 % yaitu kuat tarik 11,12 Mpa, perpanjangan 3,14 %, dan modulus Young 353,11 Mpa dengan kadar air 11,39 % dan kadar abu 5,66 %.

Kata kunci: edible film, *Eucheumma cottoni* kalsium karbonat ($CaCO_3$),

Pengujian sifat fisik dan cemaran mikroba pada cangkang kapsul pati sagu rumbia (*Metroxylon sagu* Rottb) dan karagenan

Testing of physical properties and microbial contamination of capsule shell made from starch sago rumbia (Metroxylon sagu Rottb) and carrageenan

Hamlan Ihsan*, I Dewa Gede Putra Prabawa, Dwi Harsono, Rinne Nintasari, Rina Apriani, Afandy Bayu Nurcahyo
Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru
Jalan Panglima Batur Barat No. 2, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70711 Indonesia
*Email : hamlan.ihsan@ymail.com

Diterima 18 Februari 2019 Direvisi 10 April 2019 Disetujui 01 Mei 2019

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kemampuan fisik dan cemaran mikroba dari pati sagu hasil modifikasi menggunakan propilena oksida dengan metode hidroksipropilasi. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dimana variabel tetap adalah pati sagu termodifikasi propilena oksida. Sedangkan variabel tidak tetap menggunakan *sodium tripolyphosphat* (STPP) pada konsentrasi 0,3%; 0,5%; 0,6% (b/b) dan karagenan pada konsentrasi 3%; 2% (b/b). Proses ini dilakukan dengan dua tahapan yaitu dengan penambahan *plasticizer* (gliserol) dan tanpa *plasticizer* dengan konsentrasi 2% (v/v). Sebagai pelarutnya digunakan aquadest dengan jumlah seluruhnya adalah 100% (b/v). Hasil pengujian sifat fisik pada proses uji FTIR menunjukkan adanya spektrum pada wilayah 3000 – 2500 cm^{-1} yang merupakan spesifikasi dari propilen

Polymer Testing 81 (2020) 106271

Contents lists available at ScienceDirect

Polymer Testing

journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/polytest

Analysis Method

Physical and mechanical properties of plant-derived soft-shell capsules formulated with hydroxypropyl starches from different botanical sources

Seok Young Ock [a,b,1], Woo Su Lim [a,1], Geum Duck Park [b], Min Hyeock Lee [c,**], Hyun Jin Park [a,*]

[a] Department of Biotechnology, College of Life Science and Biotechnology, Korea University, Anam-dong, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Republic of Korea
[b] Sobang, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13488, Republic of Korea
[c] Research Group of Food Processing, Korea Food Research Institute, Wanju-gun, Jeollabuk-do, 55365, Republic of Korea

ARTICLE INFO

Keywords:
Soft-shell capsule
Starch
Gelatin alternative
Disintegration
Physical property

ABSTRACT

Soft-shell capsules are prepared herein using hydroxypropyl starches from different botanical sources (maize, waxy maize, potato, and cassava) as a replacement for animal-based materials such as gelatin. The physical, mechanical, and morphological properties of the starch films are characterized to investigate the possibility of manufacturing soft-shell capsules. Starch films originating from tubers, including potato and cassava, exhibit higher tensile strength, resulting in higher hardness of the soft-shell capsules compared to those originating from maize and waxy maize starches. Some of the starch-based soft-shell capsules broke in a brittleness test, and there are no distortion defects in the seams that seal the capsules. Disintegration and solubility tests over six months show that although the soft-shell capsules manufactured from maize and potato starch disintegrate faster than those from waxy maize and cassava starch, all of the capsules disintegrate within 1,200 s, which is acceptable for commercial application.

1. Introduction

scale. It consists a mixture of water-soluble proteins (84–98%), mineral salts (1–2%), and water (8–15%). The protein fraction mainly comprises

Lampiran 3. Gambar tanaman

Gambar	Nama tanaman
(Siregar, 2010)	Kulit buah coklat
(Aidah, 2020)	Jagung
(Aidah, 2020)	Kentang
(Prihandana, 2008)	Singkong

ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

 (Ulung, 2014)	Daun cincau hijau
 (Asriani, 2021)	Batang pohon sagu rumbia
 (Furnawathi, 2002)	Daun lidah buaya
 (Prihandana, 2008)	Biji sorgum

ALAUDDIN MAKASSAR

 (Hanny, 2007)	Jagung berlilin / jagung pulut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP

Merupakan seorang anak yang bernama Firdha Rachmadhani yang sering disapa Firdha, lahir pada tanggal 27 Desember 1999 di Luwu. Merupakan buah hati dari pasangan bapak Kasmuddin dan ibu Nurnaeni panar. Ia anak pertama dari dua bersaudara.

Dia memulai jenjang pendidikan di TK Al-Iman Pattedong pada usia 5 tahun dan dilanjut di SDN 271 Saparu . pada tahun 2011, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Ponrang Selatan. Dan pada tahun 2014 memasuki jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 01 Belopa yang sekarang dikenal dengan SMA Negeri 01 Luwu. Dan pada tahun 2017 penulis mulai memasuki perguruan tinggi disalah satu Universitas Negeri yang ada di Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Prinsip hidup dari penulis adalah jadilah orang yang selalu bersyukur apapun yang terjadi tetap jalani dan jangan lupa berdoa serta berusaha. Karena doa tanpa usaha hasilnya nihil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR