

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN PERSALINAN PREMATUR

DI RSUD HAJI MAKASSAR TAHUN 2021



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada
Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

ISNADA RAHIM

NIM : 70600118019

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnada Rahim

NIM : 70600118019

Tempat/Tgl Lahir : Parigi, 8 Juli 1999

Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jalan Bangkala Raya, Blok F No. 147, BTP.

Judul : Analisis Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur Di
RSUD Haji Makassar Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Februari 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Penyusun

ALAUDDIN

M A K A S S A R Isnada Rahim

NIM:70600118019

PERSETUJUAN UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN

JUDUL : ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN PERSALINAN PREMATUR DI
RSUD HAJI MAKASSAR TAHUN 2021

TELAH MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN DAN DISETUJUI OLEH PEMBIMBING
UNTUK DIAJUKAN DALAM UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN KARYA
TULIS ILMIAH (KTI) MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

MAKASSAR, 21 JANUARI 2022

PEMBIMBING I



(dr. Rini Fitriani, M.Kes)

PEMBIMBING II



(dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur Di RSUD Haji Makassar Tahun 2021", yang disusun oleh Isnada Rahim, NIM 70600118019, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Februari 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 17 Februari 2022
16 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes (.....)

Sekretaris : dr. Andi Tihardimanto., M.Kes., MARS., Sp.JP (.....)

Pembimbing I : dr. Rini Fitriani, M.Kes (.....)

Pembimbing II: dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed (.....)

Penguji I : dr. Abd. Rahman, Sp.B., M.Kes (.....)

Penguji II : Dr. Zulfahmi Alwi, P.hD (.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kemudahan dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur Di RSUD Haji Makassar Tahun 2021”** dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi Rahmatan Lil'alam.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis alami. Namun berkat dukungan dan semangat dari berbagai pihak sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT. atas segala nikmat dan karunia yang diberikan.
2. Kedua orangtua saya yang tercinta, Ayahanda Abdul Rahim dan Ibunda Pahira atas doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan baik berupa materi dan non materi yang diberikan kepada saya hingga saat ini.
3. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staff dan jajarannya.
4. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penyusun selama menjalankan pendidikan.
5. dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Andi Tihardimanto K,M.Kes, MARS, Sp.JP. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan

Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penyusun menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar serta seluruh staf prodi kedokteran yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

6. dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku pembimbing I dan dr.Arlina Wiyata Gama, M.Biomed selaku pembimbing II, yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang tepat.
7. dr. Abd. Rahman, Sp.B., M.Kes selaku penguji kompetensi dan Dr. Zulfahmi Alwi, P.hD selaku penguji integrasi keislaman.
8. Staff RSUD Haji Makassar terutama staff tata usaha, bagian kamar bersalin, dan rekam medik yang telah dengan senang hati membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Responden yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan.
10. Teman-teman sejawat angkatan 2018, F18ron3ktin yang telah kebersamai dalam hari-hari saya.
11. Teman-teman Blanche yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman saudara se-PA saya Apriani Sahid, Shanun Shari Shakunti, dan Muthiaturrahmah Syafiuddin yang sama-sama berjuang dan memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.
13. Teman-teman saya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palu, 1 Agustus 2021

Isnada Rahim
70600118019

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Hipotesis	8
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	11
F. Tujuan Penelitian	17
G. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum	19
1. Tinjauan Umum Persalinan Prematur	19
2. Tinjauan Umum Faktor Risiko Persalinan Prematur	35
3. Integrasi Keislaman	47
B. Kerangka Teori	56
C. Kerangka Konsep	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	58
A. Desain Penelitian	58
B. Waktu dan Tempat Penelitian	58
C. Variabel Penelitian	59
D. Populasi dan Sampel Penelitian	59
E. Teknik Pengambilan Sampel	62
F. Teknik Pengumpulan Data	62
G. Instrumen Penelitian	63
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	63
I. Alur Penelitian.....	66
J. Penyajian Data	67

K. Etika Penelitian	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Hasil Penelitian.....	68
1. Analisis Univariat.....	68
2. Analisis Bivariat.....	70
3. Analisis Multivariat	78
B. Pembahasan.....	80
1. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Usia Ibu	80
2. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Paritas	82
3. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Jarak Kehamilan	83
4. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Status Gizi	85
5. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Anemia	87
6. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Kejadian Ketuban Pecah Dini	88
7. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Riwayat Abortus	90
8. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Tingkat Pendidikan	92
C. Keterbatasan Penelitian.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	103




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	8
Tabel 1.2 Kajian Pustaka	11
Tabel 4.1 Distribusi Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.....	67
Tabel 4.2 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Usia Ibu di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.....	69
Tabel 4.3 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Paritas di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.....	70
Tabel 4.4 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Jarak Kehamilan Di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.....	71
Tabel 4.5 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Status Gizi Di RSUD Haji Makassar.....	72
Tabel 4.6 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Anemia di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.....	73
Tabel 4.7 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.....	74
Tabel 4.8 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Riwayat Abortus di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.....	75
Tabel 4.9 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.....	76
Tabel 4.10 Hasil Uji Bivariat Variabel Independen yang Diikutkan Dalam Analisis Multivariat.....	77
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Logistik Faktor yang Paling Mempengaruhi Kejadian Persalinan Prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.....	78


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Angka Kematian Neonatal, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Balita	2
Gambar 1.2 Angka Kematian Bayi Di Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020	3
Gambar 1.3 10 Penyebab Utama Kematian Bayi Di Dunia	4
Gambar 2.1 : Kerangka Teori.....	49
Gambar 2.2 : Kerangka Konsep.....	50
Gambar 3.1. Desain Penelitian Case Control.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I (Surat Izin Penelitian PTSP).....	102
Lampiran II (Surat Permohonan Izin Penelitian RSUD Haji Makassar).....	103
Lampiran III (Surat Surat Permohonan Izin Penelitian PTSP).....	104
Lampiran IV (Surat Keterangan Layak Etik).....	105
Lampiran V (Master Table Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur).....	106
Lampiran VI (Hasil Output SPSS).....	107
Lampiran VII (Dokumentasi Penelitian).....	120



Analisis Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur Di RSUD Haji Makassar

Tahun 2021

Isnada Rahim⁽¹⁾, Rini Fitriani⁽²⁾, Arlina Wiyata Gama⁽³⁾,

Abdul Rahman⁽⁴⁾, Zulfahmi Alwi⁽⁵⁾

Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Persalinan prematur yaitu persalinan yang terjadi pada usia kehamilan antara 20 minggu hingga kurang dari 37 minggu yang diukur dari hari pertama haid terakhir. Berdasarkan data penyebab terjadinya kematian bayi, salah satu masalah global yaitu persalinan prematur. Persalinan prematur memiliki faktor risiko dari berbagai macam keadaan seperti faktor obstetri, faktor medik, dan sosiodemografi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar risiko usia, jarak kehamilan, paritas, status gizi, anemia, ketuban pecah dini, riwayat abortus, dan tingkat pendidikan serta faktor yang paling berisiko terhadap persalinan prematur. Penelitian ini menggunakan desain *Case Control* dengan teknik *purposive sampling*. Subyek penelitian adalah ibu bersalin prematur dan aterm di RSUD Haji Makassar berjumlah 96 responden dengan perbandingan 1:1. Analisis data bivariat menggunakan uji *Odd Ratio* (OR) dan uji multivariat menggunakan regresi logistic berganda. Hasil analisis statistik yaitu usia ibu OR 2,084 (CI 95% : 0,836-5,197), paritas OR 2,330 (CI 95% : 1,028-5,279), jarak kehamilan OR 0,625 (CI 95% : 0,289-1,471), status gizi OR 0,480 (CI 95% : 0,192-1,197), anemia OR 2,155 (CI 95% : 0,949-4,893), KPD OR 2,760 (CI 95% : 1,163-6,552), riwayat abortus OR 0,455 (CI 95% : 0,127-1,626), dan tingkat pendidikan OR 0,920 (CI 95% : 0,413-2,049) dan hasil uji multivariat yaitu kpd dengan OR 3,322 (CI 95% : 1,302-8,477) yang merupakan variabel yang paling berisiko terhadap kejadian persalinan prematur. ANC, edukasi, dan berbagai upaya berkaitan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak semasa kehamilan perlu untuk terus ditingkatkan agar menurunkan angka kelahiran prematur di Indonesia.

Kata kunci: *Usia, Jarak Kehamilan, Paritas, Status Gizi, Anemia, KPD, Riwayat Abortus, Tingkat Pendidikan, Persalinan Prematur.*

The Risk Analysis on the Factors for Premature Delivery at Haji Regional Public Hospital of Makassar in 2021

Isnada Rahim⁽¹⁾, Rini Fitriani⁽²⁾, Arlina Wiyata Gama⁽³⁾,

Abdul Rahman⁽⁴⁾, Zulfahmi Alwi⁽⁵⁾

Medical Education Department, Faculty of Medicine and Health Science

Alauddin State Islamic University of Makassar

ABSTRACT

Preterm labor occurs when regular contractions result in the opening of cervix after week 20 and before week 37 of pregnancy which is measured from the first day of the last menstrual period. Based on the previous research data, one of the main cause of infants' mortality was the premature delivery. A number of different factors and conditions may be the causes of the preterm delivery such as an obstetric factor, a medical condition, and sociodemographics. The major objective of this study was to investigate a number of different risks such as age, gestational distance, parity, nutritional status, anemia, premature rupture of membranes, abortion history, and the education level which are considered to be the risk factors for premature delivery. The methodology used for this study was a case control design. The samples of this research were taken by using a purposive sampling technique. The research samples were mothers with preterm delivery at RSUD Haji of Makassar amounting 96 patients. Those samples were chosen with a ratio of 1:1. Moreover, the Bivariate data analysis was conducted by utilizing Odd Ratio (OR) test and multivariate test using a multiple logistic regression. Based on the statistical data analysis, the findings of this study indicated that the maternal age OR was 2.084 (95% CI: 0.836-5.197); the parity OR was 2.330 (95% CI: 1.028- 5.279); the gestational space OR was 0.625 (95% CI: 0.289-1.471); the nutritional status OR was 0.480 (95% CI: 0.192-1,197); the anemia OR was 2.155 (95% CI: 0.949-4.893); the PROM OR was 2.760 (95% CI 1.163-6.552); the abortion history OR was 0.455 (95% CI:0.127-1.626); and the educational level OR was 0.920 (95% CI: 0.413-2.049). Moreover, the multivariate test results were on KPD with the OR was 3.322 (95% CI: 1.302-8.477) which was considered to be the riskiest variable for the occurrences of preterm labor. The ANC, education, and various related efforts were suggested to maintain the maternal and child health during pregnancy. Those kind of efforts need to be continuously done and improved in order to reduce the number of premature deliveries in Indonesia.

Key words: Age, Parity, Gestational Space, Nutritional Status, Anemia, PROM, Abortion History, Education level, Preterm Labor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu kesepakatan pembangunan global yang berisi 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara diseluruh dunia baik negara maju dan negara berkembang. Sektor kesehatan pada SDGs terdapat 4 goals dan 38 target. Terkhusus dalam SDGs goals ke 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia diantaranya dengan mengurangi AKI hingga 70 per 100000 kelahiran hidup, menurunkan angka kematian neonatal (AKN) hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) 25 per 1000 kelahiran hidup, serta mengurangi 1/3 kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental (Ermalena, 2017).

Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) periode 1991-2017 menunjukkan penurunan pada angka kematian neonatal, angka kematian bayi, dan angka kematian balita. Kematian neonatal menurun dari 19 per 1000 kelahiran hidup menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup. Kematian bayi menurun dari 32 per 1000 kelahiran hidup menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup, dan kematian balita menurun dari 40 per 1000 kelahiran hidup menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup. Meskipun terjadi penurunan pada tingkat kematian tersebut akan tetapi belum mencapai target pada SDGs (BPS, 2017).



Gambar 1.1 Angka Kematian Neonatal, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Balita, 1991-2017 (BPS, 2017).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka kematian bayi (AKB) dari tahun 2016-2020. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah. Bayi merupakan sumber daya manusia pada masa yang akan datang sehingga kualitas kehidupan bayi tersebut secara tidak langsung akan menjadi salah satu tolak ukur dari tingkat kualitas dan kesejahteraan kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Berikut adalah data mengenai angka kematian bayi (AKB) di Sulawesi Selatan tahun 2016-2020 (Dinkes Sulsel, 2020).

**ANGKA KEMATIAN BAYI DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2016-2020**


INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun	Orang	1.183	1.059	1.037	919	791
Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	148.216	150.220	150.624	152.680	154.733
AKB per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Angka (per 100.000 KH)	7	7	6	6	5

Gambar 1.2 Angka Kematian Bayi Di Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 (Dinkes Sulsel, 2020).

Angka kematian bayi (AKB) merupakan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Adapun penyebab kematian neonatal tertinggi disebabkan oleh komplikasi kejadian intrapartum tercatat 28,3%, akibat gangguan respiratori dan kardiovaskular 21.3%, BBLR dan prematur 19%, kelahiran kongenital 14, 8%, akibat tetanus neonatorum 1,2%, infeksi 7.3% dan akibat lainnya 8.2% (Kemenkes, 2019). Selain itu berdasarkan data dari Institute for Health Metrics and Evaluation menunjukkan penyebab kematian balita di dunia disebabkan oleh infeksi pernapasan, komplikasi bayi prematur, diare, asfiksia dan trauma neonatal, cacat lahir bawaan, malaria, gangguan neonatal lainnya, sepsis dan infeksi neonatal, meningitis, dan kekurangan gizi (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2018).

10 Penyebab Utama Kematian Bayi di Dunia

Sumber : ourworldindata.org, Februari 2018



Gambar 1.3 10 Penyebab Utama Kematian Bayi Di Dunia (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2018).

Berdasarkan data penyebab terjadinya kematian bayi, salah satu masalah global yang terjadi yang dapat meningkatkan angka kematian bayi yaitu persalinan prematur. Persalinan prematur yaitu persalinan yang terjadi pada usia kehamilan antara 20 minggu hingga kurang dari 37 minggu yang diukur dari hari pertama haid terakhir (WHO, 2010). Para ulama berpendapat bahwa bayi prematur adalah bayi yang dilahirkan sebelum berusia 6 bulan. Hal ini berdasarkan pada ayat Al-Qur'an :

الرَّضَاعَةَ يُتَمَّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْ لَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Q.S Al Baqarah 2:233)

شَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفِصَالُهُ وَحَمْلُهُ

Artinya : “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.”

(Q.S Al Ahqaf 46:15)

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, Q.S Al-Ahqaf menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan, penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, ketika itu masa penyusuannya adalah dua puluh empat bulan (Quraish Shihab, 2002).

Bayi dengan persalinan prematur akan berdampak merugikan bagi bayi karena organ tubuh belum terbentuk secara sempurna sehingga untuk jangka pendek bayi akan mengalami kelainan diantaranya *respiratory distress syndrome (RDS)*, *necrotizing enterocolitis (NEC)*, paten ductus arteriosus, sepsis, dan displasi bronkopulmonar. Sedangkan dampak jangka panjang dari kelahiran prematur yaitu mengalami gangguan perkembangan neurologi serta ketidakmampuan yang bersifat permanen yang dapat berdampak pada kesulitan dalam hal prestasi serta dalam dampak non medis yaitu berkaitan dengan biaya yang tinggi dalam perawatan bayi premature (WHO, 2012).

Berdasarkan data WHO menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 15 juta bayi lahir secara prematur dan sekitar 1 juta bayi prematur meninggal. Pada negara yang berpenghasilan rendah terdapat rata-rata 12% bayi lahir prematur. Sedangkan pada negara yang berpenghasilan tinggi terdapat rata-rata 9% bayi yang lahir prematur. Indonesia menempati urutan ke lima dari 10 negara yang memiliki angka kelahiran premature yang tinggi yaitu 15,5% per 100 kelahiran hidup (WHO, 2017). Berdasarkan data profil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 151.118 kelahiran bayi yang terdiri dari 160.136 bayi dengan lahir hidup dan 982 bayi meninggal serta terdapat 2853 (2,3%) bayi BBLR yang terdiri dari 1104 bayi prematur (39,9%) dari seluruh kelahiran di provinsi Sulawesi Selatan (Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2018).

Persalinan premature dapat disebabkan oleh berbagai faktor dari beberapa penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Fransiska pada tahun 2015 menunjukkan bahwa anemia dan jarak kehamilan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur (Fransiska, 2015). Penelitian oleh Margarita dan German tahun 2016 menunjukkan bahwa faktor risiko yang menyebabkan persalinan prematur diantaranya usia, paritas, riwayat prematur, anemia, preeklampsia, dan gemelli (Margarita & German, 2016). Faktor risiko penyebab persalinan prematur yaitu usia, riwayat persalinan premature sebelumnya, riwayat aborsi, ANC, dan diabetes gestasional (Temu, 2016). Berdasarkan penelitian oleh Paraskevi, dkk menunjukkan bahwa faktor risiko kejadian persalinan prematur yaitu status pendidikan, pekerjaan, status gizi ibu, merokok, depresi, dan diabetes gestasional (Paraskevi. etc, 2018).

Data kejadian persalinan premature di RSUD Haji Makassar pada tahun 2020 yaitu terdapat 244 persalinan dengan 55 (22,5 %) kejadian persalinan prematur. Pada tahun 2021 terdapat 295 persalinan dengan 86 (29,15%) kejadian persalinan prematur. Persalinan prematur merupakan salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas bayi di Indonesia dan berdampak secara jangka pendek dan jangka panjang pada bayi sehingga perlu adanya upaya dalam mengenali faktor risiko kejadian persalinan prematur sehingga dapat melakukan pencegahan sedini mungkin serta hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur Di RSUD Haji Makassar Tahun 2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar risiko usia ibu terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar tahun 2021?
2. Berapa besar risiko paritas terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar tahun 2021?
3. Berapa besar risiko jarak kehamilan terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar tahun 2021?
4. Berapa besar risiko status gizi ibu terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar tahun 2021?
5. Berapa besar risiko anemia terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar tahun 2021?
6. Berapa besar risiko ketuban pecah dini terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar tahun 2021?

7. Berapa besar risiko riwayat abortus terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar tahun 2021?
8. Berapa besar risiko tingkat pendidikan ibu terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar tahun 2021?
9. Apakah variabel yang paling berisiko terhadap kejadian persalinan prematur?

C. Hipotesis

1. H1 : Terdapat hubungan faktor risiko (usia, paritas, jarak kehamilan, status gizi, anemia, ketuban pecah dini, riwayat abortus, dan tingkat pendidikan) terhadap kejadian persalinan prematur.
2. H0 : Tidak terdapat hubungan faktor risiko (usia, paritas, jarak kehamilan, status gizi, anemia, ketuban pecah dini, riwayat abortus, dan tingkat pendidikan) terhadap kejadian persalinan prematur.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

NO	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Parameter	Skala Data
Variabel Independen					
1.	Usia Ibu	Usia ibu pada saat kehamilan terakhir (Purnama, 2017). Data diperoleh dari rekam medis dan wawancara.	Sesuai yang tercatat pada rekam medis dan melakukan wawancara.	1. Risiko tinggi (<20 dan >35 tahun) 2. Risiko rendah (20-35 tahun)	Nominal
2.	Paritas	Jumlah persalinan yang pernah dialami ibu tanpa	Sesuai yang tercatat pada rekam medis	1. Risiko tinggi (1 dan \geq 4 persalinan)	Nominal

		memperhatikan hasil persalinan tersebut hidup atau mati (Purnama, 2017). Data diperoleh dari rekam medis dan wawancara.	dan melakukan wawancara.	2. Risiko rendah (<4 persalinan)	
3.	Jarak Kehamilan	Jarak antara persalinan sebelumnya dengan kehamilan ibu saat ini (Hidayati 2016). Data diperoleh dari rekam medis dan wawancara.	Sesuai yang tercatat pada rekam medis dan melakukan wawancara.	1. Risiko tinggi (≤ 2 tahun dan >5 tahun) 2. Risiko rendah (>2 tahun)	Nominal
4.	Status Gizi	Status gizi ibu sebelum kehamilan ditentukan berdasarkan IMT yang dihitung dengan cara membagi berat badan (kg) dengan tinggi badan (m^2) (Niswah, 2016). Data diperoleh dari rekam medis.	Sesuai yang tercatat pada rekam medis.	1. Risiko tinggi (IMT $<18,5$ dan >25) 2. Risiko rendah (IMT 18,5-25).	Nominal
5.	Anemia	Konsentrasi hemoglobin dalam darah ibu dengan nilai <11 gr %. Data diperoleh dari rekam medis (Purnama,	Sesuai yang tercatat pada rekam medis.	1. Risiko tinggi (< 11 gr/dL) 2. Risiko rendah (≥ 11 gr/dL)	Nominal

		2017).			
6.	Ketuban Pecah Dini	Pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan dengan usia kehamilan <37 minggu (Prawirohardjo, 2010). Data diperoleh dari rekam medis dan wawancara.	Sesuai yang tercatat pada rekam medis dan melakukan wawancara.	1. Risiko tinggi (mengalami KPD sebelum permulaan persalinan) 2. Risiko rendah (ketuban pecah setelah permulaan persalinan)	Nominal
7.	Riwayat Abortus	Riwayat keguguran atau terminasi kehamilan pada trimester pertama (Niswah, 2016). Data diperoleh dari rekam medis dan wawancara.	Sesuai yang tercatat pada rekam medis dan melakukan wawancara.	1. Risiko tinggi (Pernah mengalami keguguran) 2. Risiko rendah (tidak pernah mengalami keguguran)	Nominal
8.	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang terakhir ditempuh. (Herman & Joewono, 2020) Data diperoleh dari rekam medis dan wawancara.	Sesuai yang tercatat pada rekam medis dan melakukan wawancara.	1. Risiko tinggi : Dasar (SD, SMP) 2. Risiko rendah : Menengah-tinggi (SMA, Perguruan Tinggi)	Ordinal
Variabel Dependen					
1.	Persalinan prematur	Persalinan yang terjadi pada usia kehamilan antara 20 minggu hingga kurang dari 37 minggu yang diukur	Sesuai yang tercatat pada rekam medis.	1. Prematur 2. Tidak prematur	Nominal

		dari hari pertama haid terakhir (WHO, 2010). Data diperoleh dari rekam medis.			
--	--	---	--	--	--

Tabel 1.1 Definisi Operasional

2. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah ilmu kesehatan ibu dan anak terkhususnya menganalisis faktor risiko yang dapat mempengaruhi kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar dengan melihat data pada rekam medis, dan melakukan wawancara.

E. Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Nofi Ita Purnamasari	Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur Di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor risiko yang mempengaruhi persalinan prematur adalah	a. Variabel penelitian pada literatur ini berjumlah 6 variabel. Sedangkan variabel penelitian yang	a. Penelitian mengenai faktor risiko kejadian persalinan prematur. b. Desain

		Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.	riwayat persalinan prematur, usia, jarak kehamilan, paritas, anemia, dan KPD.	saat ini digunakan berjumlah 8 variabel. b. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian pada literatur berada di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 2016. Sedangkan untuk penelitian saat ini di RSUD Haji Makassar tahun 2021. c. Jenis pengambilan data pada literatur yaitu data sekunder. Sedangkan penelitian ini menggunakan	penelitian yaitu case control.
--	--	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

				jenis data primer dan sekunder.	
2.	Delty Anggina	Determinan Kejadian Persalinan Bayi Prematur Di Rumah Sakit Umum Pusat DR.Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2016-2017.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko yang paling dominan berpengaruh terhadap kejadian persalinan prematur adalah Riwayat persalinan prematur setelah dikontrol oleh variabel pendarahan antepartum, jarak kehamilan, umur ibu, status pekerjaan, Riwayat abortus, KPD, dan	a. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian pada literatur berada di RSUP DR.Mohammad Hoesin Palembang pada tahun 2016-2017. Sedangkan untuk penelitian saat ini di RSUD Haji Makassar tahun 2021. b. Jenis pengambilan data pada literatur yaitu data sekunder. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis data primer	a. Penelitian mengenai faktor risiko kejadian persalinan prematur. b. Desain penelitian yaitu case control.

			paritas.	dan sekunder.	
3.	Annisa Luthfi Hanifah	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Persalinan Preterm Di RSUD Wonosari Tahun 2015-2016.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur ibu, pendidikan, KPD, dan gemelli memiliki hubungan terhadap kejadian persalinan preterm. Adapun faktor paritas, jarak kehamilan, dan Riwayat abortus tidak berhubungan dengan kejadian persalinan preterm.	a. Variabel penelitian pada literatur ini berjumlah 7 variabel. Sedangkan variabel penelitian yang saat ini digunakan berjumlah 8 variabel. b. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian pada literatur berada di RSUD Wonosari Tahun 2015-2016. Sedangkan untuk penelitian saat ini di RSUD Haji Makassar 2021. c. Jenis pengambilan	a. Penelitian mengenai faktor risiko kejadian persalinan prematurn. b. Desain penelitian yaitu case control.

				<p>data pada literatur yaitu data sekunder.</p> <p>Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder.</p>	
4.	<p>Margarita E.Ahumada & German F. Alvarado</p>	<p>Risk Factors For Premature Birth In A Hospital.</p> <p>Tahun penelitian 2016.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang termasuk dalam factor risiko kejadian persalinan premature yaitu riwayat persalinan preterm, preeklampsia, dan ANC yang tidak teratur dan inadkuat.</p>	<p>a. Variabel penelitian pada literatur ini berjumlah 3 variabel.</p> <p>Sedangkan variabel penelitian yang saat ini digunakan berjumlah 8 variabel.</p> <p>b. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian pada literatur berada di National Hospital</p>	<p>a. Penelitian mengenai faktor risiko kejadian persalinan premature.</p> <p>b. Desain penelitian yaitu case control.</p>

				<p>Sergio E. Bernales pada tahun 2016.</p> <p>Sedangkan untuk penelitian saat ini di RSUD Haji Makassar tahun 2021.</p> <p>c. Jenis pengambilan data pada literatur yaitu data sekunder.</p> <p>Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder.</p>	
5.	Theresia B. Temu, Gilead Masenga, Joseph Obure, Dominic Mosha, dan	Maternal and Obstetric Risk Factors Associated with Preterm Delivery At A Referral Hospital In	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko kejadian persalinan prematur yaitu tingkat	a. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian pada literatur berada Kilimanjaro Christian Medical Centre pada	a. Penelitian mengenai faktor risiko kejadian persalinan prematur.

Michael J. Mahande.	Northern-Eastern Tanzania. Penelitian tahun 2016.	pendidikan, pekerjaan, inadekuat ANC, preeklampsia, abrupcio plasenta, plasenta previa, gemelly, dan infeksi saluran kemih selama hamil	tahun 2014. Sedangkan untuk penelitian saat ini di RSUD Haji Makassar tahun 2021.	b. Desain penelitian yaitu case control.
---------------------	---	---	---	--

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum penelitian ini yaitu mengetahui faktor risiko kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar tahun 2021.

2. Tujuan Khusus Penelitian

- a. Mengetahui risiko usia ibu terhadap kejadian persalinan prematur.
- b. Mengetahui risiko jumlah paritas terhadap kejadian persalinan prematur.
- c. Mengetahui risiko jarak kehamilan terhadap kejadian persalinan prematur.
- d. Mengetahui risiko status gizi ibu terhadap kejadian persalinan prematur.
- e. Mengetahui risiko anemia terhadap kejadian persalinan prematur.
- f. Mengetahui risiko KPD terhadap kejadian persalinan prematur.
- g. Mengetahui risiko riwayat abortus terhadap kejadian persalinan prematur.

- h. Mengetahui risiko ibu yang berisiko terhadap kejadian persalinan prematur.
- i. Mengetahui faktor risiko yang paling berisiko terhadap kejadian persalinan prematur.

G. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Menambah informasi mengenai faktor risiko kejadian persalinan prematur.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperkaya informasi mengenai faktor risiko kejadian persalinan prematur serta menambah pengalaman dalam bidang penelitian sehingga dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi Instansi

Memberikan informasi mengenai faktor risiko kejadian persalinan prematur serta dapat menjadi bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor risiko kejadian persalinan prematur.

c. Bagi Masyarakat

Mengetahui informasi mengenai faktor risiko kejadian persalinan prematur sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari faktor penyebab persalinan prematur serta teratur dalam memeriksakan kehamilannya pada fasilitas kesehatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Tinjauan Umum Persalinan Prematur

a. Definisi

Persalinan prematur yaitu persalinan yang terjadi pada usia kehamilan antara 20 minggu hingga kurang dari 37 minggu yang diukur dari hari pertama haid terakhir (WHO, 2010). Sama halnya dengan The American College of Obstetricians and Gynecologist (1995) dalam Prawirohardjo (2020) mengatakan bahwa persalinan prematur atau persalinan preterm adalah persalinan yang berlangsung pada umur kehamilan 20-37 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir (Prawirohardjo, 2020).

b. Epidemiologi

Berdasarkan data WHO menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 15 juta bayi lahir secara prematur dan sekitar 1 juta bayi prematur meninggal. Komplikasi akibat kelahiran prematur adalah penyebab utama kematian anak dibawah usia 5 tahun. Pada negara yang berpenghasilan rendah terdapat rata-rata 12% bayi lahir prematur. Sedangkan pada negara yang berpenghasilan tinggi terdapat rata-rata 9% bayi yang lahir prematur. Indonesia menempati urutan ke lima dari 10 negara yang memiliki angka kelahiran prematur yang tinggi yaitu 15,5% per 100 kelahiran hidup (WHO, 2017). Persalinan prematur merupakan penyebab 75% dari kematian perinatal dan >50% menyebabkan morbiditas (Herman & Joewono, 2020).

Berdasarkan data profil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 151.118 kelahiran bayi yang terdiri dari 160.136 bayi dengan lahir hidup dan 982 bayi meninggal serta terdapat 2853 (2,3%) bayi BBLR yang terdiri dari 1104 bayi premature (39,9%) dari seluruh kelahiran di provinsi Sulawesi Selatan (Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2018).

c. Etiologi

Persalinan prematur merupakan suatu kelainan proses yang multifaktorial yang dapat disebabkan oleh beberapa kombinasi keadaan obstetrik, sosiodemografi, dan faktor medik sehingga dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur (Prawirohardjo, 2020). Banyak kasus persalinan prematur sebagai akibat proses patogenik yang merupakan mediator kimia yang mempunyai dampak terjadinya kontraksi rahim dan perubahan serviks, diantaranya :

- 1) Aktivasi aksis kelenjar hipotalamus-hipofisis-adrenal pada ibu maupun janin akibat stress pada ibu atau janin.
- 2) Inflamasi desidua-korioamnion atau sistemik akibat infeksi ascenden dari traktus genitourinaria atau infeksi sistemik.
- 3) Perdarahan desidua.
- 4) Peregangan uterus patologik.
- 5) Kelainan pada uterus atau serviks.

Sehingga untuk memprediksi kemungkinan terjadinya persalinan prematur perlu dicermati beberapa kondisi yang dapat menimbulkan kontraksi, menyebabkan persalinan prematur (Prawirohardjo, 2020).

Drife dan Magowan (2004) dalam Prawirohardjo (2020) menyatakan bahwa persalinan prematur terjadi oleh beberapa kondisi yaitu 35% persalinan prematur terjadi tanpa diketahui penyebabnya, 30% akibat persalinan elektif, 10% terjadi akibat kehamilan ganda, dan sebagian lainnya sebagai akibat kondisi ibu atau janinnya. Infeksi korioamnion merupakan salah satu penyebab terjadinya ketuban pecah dini dan persalinan prematur (Prawirohardjo, 2020).

Menurut Spong pada tahun 2007 menyatakan bahwa terdapat berbagai teori penyebab terjadinya persalinan prematur yaitu 70% terjadi secara spontan akibat infeksi, *preterm rupture of membrane* (PROM), kontraksi idiopatik, kehamilan multiple, disfungsi serviks, perdarahan ante partum, stress dan malnutrisi. Adapun 30% persalinan prematur terjadi akibat iatrogenic seperti hipertensi, diabetes, dan *intrauterine growth retardation* (IUGR) (Spong, 2007).

d. Klasifikasi

1) Menurut kejadiannya diklasifikasikan menjadi :

a) Idiopatik/Spontan

Terdapat sekitar 50% penyebab persalinan prematur tidak diketahui dan 12,5% persalinan prematur spontan didahului oleh ketuban pecah dini yang sebagian besar disebabkan faktor infeksi.

b) Iatrogenik/Elektif

Keadaan ibu yang dapat menyebabkan persalinan prematur elektif yaitu preeklampsia berat dan eklampsia, perdarahan antepartum, korioamnionitis, penyakit jantung berat, penyakit paru atau ginjal yang berat. Selain itu, keadaan janin yang dapat menyebabkan persalinan prematur yaitu terjadinya gawat janin (hipoksia, asidosis, atau gangguan jantung pada janin), infeksi intrauterine, dan pertumbuhan janin terhambat (Herman & Joewono, 2020).

2) Menurut Usia Kehamilan

- a) Preterm : Persalinan pada usia kehamilan 32- <37 minggu.
- b) Very preterm : Persalinan pada usia kehamilan 28- <32 minggu
- c) Extremely preterm : Persalinan pada usia kehamilan <28 minggu (WHO, 2015).

3) Menurut Berat Badan Lahir

- a) Berat badan lahir rendah : Berat badan bayi 1500-2500 gr.
- b) Berat badan lahir sangat rendah : Berat badan bayi 1000-1500 gr.
- c) Berat badan lahir ekstrim rendah : Berat badan bayi <1000 gr (WHO, 2015).

e. Patogenesis

Patogenesis persalinan prematur belum diketahui dengan pasti akan tetapi terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai terjadinya persalinan prematur yaitu :

1) Mekanisme Akibat Pencetus Stress dan HPA Axis

Mekanisme yang menghubungkan stress dengan kelahiran prematur adalah terjadinya pengeluaran neuroendokrin yang

menyebabkan aktivasi prematur aksis *hypothalamic-pituitary-adrenal* (HPA). Proses ini dimediasi oleh *corticotrophine releasing hormone* (CRH) plasenta. Dalam hasil penelitian Gravett (2010) dalam Niswah (2016) menyatakan bahwa pada sel plasenta manusia menunjukkan CRG dilepaskan dari kultur sel semua efektor biologi utama stress termasuk kortisol, katekolamin, oksitosin, angiotensin II, dan interleukin 1 (IL-1). Wanita yang melahirkan prematur memiliki kadar CRH yang meningkat secara signifikan dibandingkan wanita yang melahirkan cukup bulan (aterm) (Niswah, 2016).

Pada persalinan aterm, aktivasi CRH plasenta sebagian besar dipengaruhi oleh aksis HPA janin dalam suatu feedback positif pada pematangan janin. Sedangkan pada persalinan prematur, aksis HPA ibu dapat mendorong ekspresi CRH plasenta. Stress pada ibu dapat menyebabkan peningkatan kortisol dan epinefrin yang dapat menstimulasi janin untuk mengeluarkan kortisol dan dehydroepian drosterone synthase (DHEA-S) melalui aktivasi aksis HPA janin dan menstimulasi plasenta untuk memproduksi estriol dan prostaglandin sehingga mempercepat terjadinya persalinan prematur (Niswah, 2016).

2) Mekanisme Akibat Infeksi

Patogenesis persalinan prematur akibat infeksi belum jelas benar akan tetapi menurut teori diawali dengan aktivasi fosfolipase A2 yang melepaskan asam arakidonat dari selaput amnion janin sehingga asam arakidonat bebas meningkat untuk sintesis

prostaglandin. Endotoksin dalam air ketuban akan merangsang sel desidua untuk menghasilkan sitokin dan prostaglandin yang dapat menginisiasi proses persalinan. Terjadinya persalinan preterm akibat infeksi yaitu terjadi pengeluaran produk sebagai hasil dari aktivasi monosit. Beberapa sitokin seperti interleukin-1 (IL-1), *tumor necrosing factor* (TNF), dan interleukin-6 (IL-6) merupakan produk sekretorik yang dikaitkan dengan persalinan prematur. *Platelet Activating Factor* (PAF) dalam air ketuban terlibat pada aktivasi jalinan sitokin. PAF diduga dihasilkan dari paru dan ginjal janin. Dengan demikian, janin berperan dalam mengawali proses persalinan preterm yang disebabkan oleh infeksi (Prawirohardjo, 2020).

3) Mekanisme Perdarahan Desidua

Perdarahan desidua dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur yaitu adanya lesi vascular dari plasenta. Lesi ini dapat terjadi karena kegagalan dari transformasi fisiologi dari arteri spiralis, atherosclerosis, dan thrombosis arteri ibu dan janin. Mekanisme yang menghubungkan lesi vascular dengan persalinan prematur yaitu iskemi uteroplasenta. Meskipun patofisiologinya belum jelas tetapi teori mengatakan bahwa thrombin memiliki peran utama dalam hal ini. Thrombin merupakan protease multifungsi yang menyebabkan aktivitas kontraksi dari vascular, intestinal, dan otot halus myometrium. Selanjutnya *matrix metalloproteinase* (MMPs) memecah matriks ekstraseluler dari membran janin dan choriodesidua serta terlibat terhadap ketuban pecah dini. Thrombin meningkatkan

ekspresi protein MMP-1 , MMP-3, dan MMP-9 pada sel-sel desidua dan membrane janin serta meningkatkan IL-8 yaitu sebuah sitokin yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran neutrophil. Jika terjadi infiltrasi neutrophil pada desidua maka hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini sehingga dapat terjadi persalinan prematur (Niswah, 2016).

4) Mekanisme Peregangan Uterus

Peregangan atau distensi uterus yang berlebihan dapat menyebabkan persalinan prematur yang berhubungan dengan kehamilan multiple, polihidramnion, dan makrosomia. Mekanisme dari distensi uterus yang berlebihan yang dapat menyebabkan persalinan prematur masih belum jelas. Tetapi diketahui bahwa peregangan uterus akan menginduksi ekspresi protein gap junction seperti connexin-43 (CX-43) dan CX-26 serta menginduksi protein lainnya yang berhubungan dengan kontraksi seperti reseptor oksitosin. Berdasarkan penelitian gravett (2010) dalam Niswah (2016) bahwa regangan myometrium dapat meningkatkan prostaglandin H synthase 2 (PGHS-2) dan prostaglandin E (PGE). Regangan otot akan menunjukkan peningkatan produksi IL-8 yang dapat memfasilitasi pematangan serviks sehingga dapat menyebabkan terjadi persalinan prematur (Niswah, 2016).

f. Penegakkan Diagnosis

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam menentukan diagnosis ancaman persalinan prematur, yaitu :

- 1) Kontraksi yang berulang sedikitnya setiap 7-8 menit sekali atau 2-3 kali dalam 10 menit.
- 2) Terdapat nyeri pada punggung bawah (low back pain).
- 3) Perdarahan bercak.
- 4) Perasaan menekan daerah serviks.
- 5) Pada pemeriksaan serviks menunjukkan terjadi pembukaan sedikitnya 2 cm dan penipisan 50-80%.
- 6) Presentasi janin rendah hingga mencapai spina ischiadica.
- 7) Selaput ketuban pecah yang dapat merupakan tanda awal terjadinya persalinan preterm.
- 8) Terjadi pada usia kehamilan 22-37 minggu (Prawirohardjo, 2020).

Beberapa indikator yang digunakan dalam memprediksi terjadinya persalinan prematur, antara lain :

1) Indikator Klinik

Indikator klinik yang dapat dijumpai yaitu timbulnya kontraksi dan pemendekan serviks serta terjadinya ketuban pecah dini.

2) Indikator Laboratorik

Indikator laboratorik yang bermakna adalah antara lain jumlah leukosit dalam air ketuban (≥ 20 ml), pemeriksaan CRP ($>0,7$ mg/ml), dan pemeriksaan leukosit dalam serum ibu (>13000 /ml).

3) Indikator Biokimia

- a) Fibronektin janin : adanya peningkatan kadar fibronektin janin pada vagina, serviks, dan air ketuban yang memberikan indikasi adanya gangguan pada hubungan antara korion dan desidua. Pada usia kehamilan ≥ 24 minggu, kadar fibronektin janin ≥ 50 mg/ml yang mengindikasikan risiko persalinan prematur.
- b) *Corticotrophine releasing hormone* (CRH) : adanya peningkatan CRH pada trimester 2 merupakan indikator kuat terjadinya persalinan prematur.
- c) Sitokin inflamasi : beberapa sitokin seperti IL-1 β , IL-6, IL-8, dan TNF- α yang merupakan mediator yang mungkin berperan dalam sintesis prostaglandin.
- d) Isoferitin plasenta : kadar isoferitin pada keadaan normal (tidak hamil) sebesar 10 U/ml. Kadarnya meningkat secara bermakna selama kehamilan dan mencapai puncak trimester akhir yaitu $54,8 \pm 53$ U/ml. Penurunan kadar dalam serum akan berisiko terjadinya persalinan prematur.
- e) Ferritin : rendahnya kadar ferritin yang merupakan indikator sensitive untuk keadaan kurang zat besi. Peningkatan ekspresi ferritin berkaitan dengan berbagai keadaan reaksi fase akut termasuk kondisi inflamasi sehingga berpengaruh dalam terjadinya persalinan prematur (Saifuddin. dkk, 2020).

g. Pencegahan

Persalinan prematur merupakan masalah yang multifaktor, tidak ada faktor pasti yang dapat menyebabkan prematuritas sehingga langkah

pertama untuk mencegah persalinan prematur adalah mengurangi faktor risiko yang berhubungan dengan persalinan prematur. Terdapat tiga pencegahan dalam mencegah persalinan prematur diantaranya :

1) Pencegahan Primer

Pencegahan primer dilakukan dengan mengenal kelompok ibu yang berisiko tinggi mengalami persalinan prematur, dan melakukan intervensi obstetrik untuk mengurangi faktor risiko. Pencegahan yang dapat dilakukan terhadap faktor karakteristik ibu (riwayat persalinan, paritas, jarak antar kehamilan, riwayat pernah persalinan prematur), faktor lingkungan, faktor uterus, faktor paternal, faktor plasenta, faktor farmakologi, dan faktor fetus. Contoh pencegahan yang dapat dilakukan yaitu berikan dukungan yang optimal selama masa kehamilan dan batasi kehamilan ganda (Wijayanegara. dkk, 2009 ; Berghella, 2017).

2) Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder dilakukan dengan mendeteksi dini persalinan prematur dan terapi untuk menghambat terjadinya persalinan prematur. Strategi pencegahan ditujukan untuk mengidentifikasi kelompok ibu asymptomatic berisiko tinggi melalui skrining untuk memprediksi faktor risiko yang dapat menyebabkan persalinan prematur. Deteksi dini yang dapat dilakukan untuk mencegah persalinan prematur yaitu dengan memberikan informasi

yang baik mengenai bagaimana mengetahui terjadinya persalinan prematur, melakukan skrining infeksi dan diobati jika teridentifikasi, berhenti merokok, kaji riwayat kehamilan yang komprehensif dan berikan tindakan pencegahan seperti penggunaan progesterone, dan cerclage. Sedangkan terapi yang dapat dilakukan untuk menghambat terjadinya persalinan prematur yaitu istirahat (bedrest), hidrasi dan sedasi, penggunaan progesterone, pengikatan serviks (*emergency cervical cerclage*), pemberian antibiotika, dan inhibisi kontraksi (Wijayanegara. dkk, 2009 ; Berghella, 2017).

3) Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier adalah intervensi yang dilakukan apabila persalinan tidak dapat dicegah lagi. Tujuannya yaitu menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat persalinan prematur. Hal yang dapat dilakukan yaitu merujuk ibu, pemberian kortikosteroid antenatal untuk meningkatkan survival bayi prematur (Wijayanegara. dkk, 2009 ; Berghella, 2017).

h. Tatalaksana

Tatalaksana yang diberikan jika diagnosis persalinan prematur telah ditegakkan diantaranya :

1) Pemberian Tokolitik

Pemberian tokolitik terhadap perbaikan luaran persalinan prematur tetap mempunyai kontroversi. Pemberian tokolitik tidak memperpanjang usia kehamilan dan sediaan ini bekerja dengan

menghambat kontraksi myometrium dan memperpanjang interval antara diagnosis persalinan sampai terjadinya persalinan. Hal ini penting karena survival janin bertambah sekitar 3% dalam setiap perpanjangan hidup 24 jam dalam uterus sehingga dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas perinatal (Wijayanegara. dkk, 2009 ; POGI Surabaya, 2016).

Berikut beberapa rujukan tokolitik yang digunakan, yaitu :

a) Beta2-sympathomimetics

Beta2-sympathomimetics bekerja pada beta2 adrenoreceptors pada otot polos myometrium melalui mekanisme cAMP yang akan menurunkan kadar kalsium intraseluler sehingga terjadi relaksasi otot polos. Preparat yang biasa digunakan adalah ritodrine, terbutaline, salbutamol, fenoterol, dan hexoprenaline. Contoh pemberian yaitu ritodine dengan dosis 50 mg dalam 500 ml larutan glukosa 5 % dengan 10 tetes per menit dan ditingkatkan 5 tetes setiap 10 menit sampai kontraksi uterus menghilang. Selanjutnya diberikan dosis pemeliharaan (maintenance dose) satu tablet (10 mg) setiap 8 jam setelah makan (Herman & Joewono, 2020).

Efek samping yang terjadi pada ibu yaitu palpitasi, rasa panas pada wajah (flushing), mual, sakit kepala, nyeri dada, hipotensi, aritmia kordis, edema paru, hiperglikemia, dan hipokalemia. Efek samping pada janin yaitu fetal takikardi, hipoglikemia, hipokalemi, ileus, dan hipotensi. Adapun kontraindikasi pemberian yaitu penyakit jantung pada ibu,

hipertensi atau hipotensi, hipertiroid, diabetes, dan perdarahan antepartum (Wijayanegara, 2009).

b) Indomethacin

Indomethacin yaitu golongan obat antiinflamasi nonsteroid yang akan menghambat enzim COX (cyclo-oxygenase) sehingga mempengaruhi metabolisme prostaglandin. Hal tersebut akan meningkatkan kontraktilitas myometrium melalui peningkatan regulasi gap junctions antara sel myometrium, reseptor oksitosin, dan meningkatkan kadar kalsium intraseluler. Indomethacin jarang menyebabkan efek samping pada ibu hamil. Namun jika terjadi efek samping dapat berupa ulkus peptikum, perdarahan gastrointestinal, reaksi alergi, perdarahan antepartum, gagal ginjal, dan hipertensi berat apabila digunakan Bersama beta blockers. Efek samping pada fetus dapat berupa konstiksi atau penutupan dini ductus arteriosus, gangguan fungsi ginjal, penurunan output urin, enterocolitis nekrotikans, dan perdarahan intrentrikuler (Wijayanegara, 2009).

c) COX (cyclo-oxygenase)-2 inhibitors

COX-2 inhibitors merupakan enzim spesifik yang berperan dalam mekanisme persalinan prematur dengan efek samping yang lebih ringan dibandingkan dengan inhibitor COX yang tidak spesifik seperti indomethacin. Golongan ini memiliki efek samping yang berat bagi fetus yaitu gangguan fungsi ginjal dan penutupan

dini ductus arteriosus. Mekanisme kerja golongan ini belum jelas tetapi teori mengatakan bahwa adanya keterlibatan dalam kompetisi antara kalsium intraseluler dengan hiperpolarisasi membran sel. Adapun efek samping yang dapat terjadi pada ibu antara lain sakit kepala, nystagmus, rasa kering pada mulut, dizziness, rasa lelah, dan pada pasien dengan gangguan ginjal dapat terjadi gangguan neuromuskular (Wijayanegara. dkk, 2009 ; Berghella, 2017).

d) Atosiban

Atosiban merupakan suatu analog oksitosin yang bekerja pada reseptor oksitosin dan vasopressin. Golongan ini dipakai sebagai tokolitik lini pertama. Dosis awal pemberian yaitu 6,75 mg bolus dalam satu menit kemudian diikuti 18 mg/jam selama 3 jam IV dan 6 mg/jam selama 45 jam dengan dosis maksimal 330 mg (Wijayanegara, 2009 ; Herman & Joewono, 2020).

e) Nifedipin

Nifedipin merupakan suatu antagonis kalsium yang diberikan per oral. Efek samping yang dapat terjadi pada ibu lebih ringan namun dapat berefek terhadap pelunakan serviks. Kontraindikasi dari penggunaan nifedipine yaitu hipotensi, penyakit jantung, dan

alergi terhadap golongan *calcium channel blockers*. Dosis inisial 20 mg dilanjutkan 10-20 mg, 3-4 kali/hari, disesuaikan dengan aktivitas uterus sampai 48 jam dengan dosis maksimal 160 mg/hari (POGI Surabaya, 2016 ; Herman & Joewono, 2020).

2) Pemberian Steroid

Penggunaan kortikosteroid hampir semua direkomendasikan oleh pusat kedokteran fetomaternal. Hal ini dikarenakan pemakaian kortikosteroid dapat menurunkan kejadian sindroma gawat napas atau *respiratory distress syndrome* (RDS), kematian neonatal, dan perdarahan intraventrikuler. Pemberian steroid dianjurkan pada usia kehamilan 24-34 minggu dan dapat dipertimbangkan hingga usia kehamilan 36 minggu. Kontraindikasi pemberian golongan ini yaitu pada infeksi sistemik yang berat seperti tb dan korioamnionitis karena dapat memperpanjang usia kehamilan sehingga dapat meningkatkan kemungkinan infeksi atau sepsis bagi ibu dan janin (Herman & Joewono, 2020).

Betametason merupakan obat terpilih yang diberikan secara injeksi intramuscular dengan dosis 12 mg dan diulangi 24 jam kemudian. Efek optimal dapat dicapai pada 1-7 hari pemberian dan setelah 7 hari efek masih meningkat. Jika tidak terdapat betametason dapat diberikan dexamethasone dengan dosis 2x5 mg/hari IM selama 2 hari. Rekomendasi WHO (2015) mengenai kortikosteroid yang sebaiknya di berikan jika persalinan prematur akan segera terjadi dalam 7 hari sejak mulai terapi termasuk dalam 24 jam pertama. Diberikan

pada ibu dengan risiko persalinan preterm pada kehamilan tunggal atau multiple, ibu dengan kpd, tidak direkomendasikan pada ibu dengan korioamnionitis (WHO, 2015 ; Herman & Joewono, 2020).

3) Pemberian Antibiotik

Pemberian antibiotic pada persalinan tanpa infeksi tidak dianjurkan karena tidak dapat meningkatkan luaran persalinan. Pada ibu dengan ancaman persalinan prematur dan terdeteksi adanya vaginosis bacterial dapat diberikan klindamisin (2x300 mg/hari selama 7 hari) atau metronidazole (2x500 mg/hari selama 7 hari) atau eritromisin (2x500 mg/hari selama 7 hari) dan akan bermanfaat bila diberikan pada usia kehamilan <32 minggu (Herman & Joewono, 2020).

Rekomendasi WHO mengenai pemberian antibiotic yaitu tidak diberikan pada ibu yang mengalami persalinan prematur dengan membrane amnion yang intak dan tanpa tanda infeksi. Indikasi pemberian antibiotic jika terdapat ketuban pecah dini dengan tanda-tanda korioamnionitis (WHO, 2015).

4) Perencanaan Persalinan

Persalinan prematur harus dipertimbangkan kasus perkusus. Pada usia kehamilan <32 minggu sebaiknya ibu dirujuk ke tempat yang memiliki fasilitas *neonatal intensive care unit* (NICU). Kehamilan <24 minggu dilahirkan pervaginam dengan mempertimbangkan risiko obstetrik lainnya dan disamakan dengan aturan persalinan aterm serta

tidak dianjurkan dorseps atau episiotomy elektif (Herman & Joewono, 2020).

i. Komplikasi Pada Bayi Prematur

Komplikasi yang dapat terjadi bergantung pada usia kehamilan, dikatakan bahwa semakin bertambah usia kehamilan, semakin sedikit komplikasinya. Adapun komplikasi yang dapat terjadi : (Herman & Joewono, 2020).

- 1) Hipotermia <math> < 36,5^{\circ}\text{C}</math> sekitar 39-41%, - 2) Respiratory distress sekitar 93%.
- 3) Retinopathy of prematurity (ROP) sekitar 59%.
- 4) Patent ductus arteriosus sekitar 46%.
- 5) Bronchopulmonary dysplasia sekitar 42%.
- 6) Late-onset sepsis sekitar 36%.
- 7) Necrotizing enterocolitis (NEC) sekitar 11%.
- 8) Intraventricular hemorrhage (IVH) derajat III sekitar 7%.
- 9) Intraventricular hemorrhage derajat IV sekitar 9%.
- 10) Periventricular leukomalacia sekitar 3%.

2. Tinjauan Umum Faktor Risiko Persalinan Prematur

Terdapat beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan persalinan prematur, diantaranya :

- a. Faktor risiko persalinan prematur menurut Robinson dan Norwitz (2019) yaitu :

- 1) Riwayat obstetric sebelumnya : memiliki riwayat persalinan prematur, dan terdapat anomaly pada uterus.
- 2) Demografi ibu : usia <17 tahun atau >35 tahun, tingkat pendidikan rendah, status pernikahan single, status social ekonomi rendah, interval jarak kehamilan pendek (<6 bulan), dan faktor sosial lainnya (akses yang rendah ke pelayanan kesehatan, dan penganiayaan fisik).
- 3) Status gizi/ aktivitas fisik :BMI <19 kg/m² atau berat pra hamil <50kg, status gizi buruk, jam kerja lama (>80 jam/minggu), kerja fisik yang berat.
- 4) Karakteristik ibu/kehamilan saat ini : kehamilan multiple, gangguan janin, perdarahan vagina (plasenta previa, solusio plasenta), polihidramnion atau oligohidramnion, kondisi medis ibu (hipertensi, diabetes, penyakit tiroid, asma,dll), masalah psikologis (stress, cemas, depresi).
- 5) Perilaku buruk : merokok, konsumsi alcohol, kokain, dan heroin.
- 6) Infeksi : bacterial vaginosis, chlamydia, gonorrhea, sifilis, infeksi intrauterine.

b. Faktor risiko yang dapat menyebabkan persalinan prematur menurut beberapa penelitian, diantaranya :

- 1) Usia

Usia 20-35 tahun adalah usia reproduktif. Keadaan ini berkaitan dengan proses pematangan organ reproduksi serta kesiapan mental seorang ibu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada usia tersebut tidak rentan terjadi persalinan prematur yang bisa disebabkan oleh ibu

pada saat hamil dalam keadaan stress fisik dan mental sehingga dapat menyebabkan terjadinya persalinan sebelum waktunya (Purnama, 2017).

Usia ibu < 20 tahun atau > 35 tahun merupakan risiko tinggi dalam kehamilan. Pada usia < 20 tahun keadaan organ reproduksi belum siap untuk kehamilan. Selain itu ibu hamil dengan usia <20 tahun memiliki peredaran darah menuju serviks dan uterus yang belum sempurna sehingga menyebabkan pemberian nutrisi yang tidak adekuat ke janin. Demikian pula peredaran darah yang kurang pada saluran genital yang dapat menyebabkan peningkatan terjadinya infeksi sehingga dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur. Sedangkan wanita yang berusia >35 tahun mulai mengalami proses penuaan sehingga terjadi regresi atau kemunduran fungsi alat reproduksi (Purnama, 2017). Pada penelitian oleh Indrawati (2010) menyatakan bahwa ibu yang berusia < 20 tahun memiliki risiko 5,04 kali melahirkan prematur. Sedangkan ibu yang berusia > 35 tahun memiliki risiko 1,75 kali terjadi persalinan prematur dibandingkan dengan ibu hamil berusia 20-34 tahun (Irmawati, 2010).

2) Paritas

Paritas yaitu jumlah persalinan yang pernah dialami ibu tanpa memperhatikan hasil persalinan tersebut hidup atau meninggal. Jumlah paritas merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan persalinan prematur karena akan mempengaruhi keadaan kesehatan ibu dalam kehamilan. Paritas dapat diklasifikasikan antara lain nulipara (wanita

yang belum pernah menyelesaikan kehamilan melewati gestasi 20 minggu), primipara (wanita yang pernah satu kali melahirkan bayi hidup atau meninggal dengan perkiraan lama gestasi 20 minggu atau lebih), dan multipara (wanita yang pernah menyelesaikan dua atau lebih kehamilan hingga 20 minggu atau lebih) (Oxom, 2010 ; Purnama, 2017).

Paritas paling aman jika ditinjau dari sudut persalinan prematur yaitu paritas 2-3 kali. Paritas pertama dan keempat akan meningkatkan risiko terjadinya persalinan prematur dan akan meningkat lagi pada persalinan kelima dan setiap persalinan berikutnya. Hal ini disebabkan ibu yang pertama kali hamil dan melahirkan akan berisiko karena ibu belum siap secara medis dan mental. Sedangkan paritas lebih dari empat, ibu mengalami kemunduran dari segi fisik untuk menjalani kehamilan (Purnama, 2017).

3) Jarak Kehamilan

Jarak kehamilan yaitu jarak antara persalinan terakhir dengan awal kehamilan. Jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat membahayakan ibu dan janin. WHO merekomendasikan interval waktu minimal yaitu 24 bulan agar tubuh dapat pulih setelah melewati proses kelahiran. Jarak antar kehamilan yang terlalu dekat dapat mengurangi cadangan nutrisi ibu sehingga dapat meningkatkan risiko persalinan prematur (Purnama, 2017).

Penelitian oleh Smith, dkk (2003) bahwa risiko mengalami persalinan prematur <32 minggu akan meningkat 30-90% pada ibu yang mempunyai interval kehamilan <6 bulan dibandingkan dengan ibu yang mempunyai interval kehamilan >12 bulan. Selain itu, hasil penelitian oleh Hidayati (2016) menyatakan bahwa jarak kehamilan dengan interval <18 bulan atau >59 bulan berisiko menimbulkan persalinan prematur 20,1 kali lebih besar dibandingkan jarak kehamilan yang tidak berisiko (Smith. dkk, 2003 ; Hidayati, 2016).

4) Riwayat Prematur Sebelumnya

Persalinan prematur dapat terjadi pada ibu dengan riwayat preterm sebelumnya. Ibu yang tidak dapat melahirkan bayi hingga usia aterm dapat disebabkan karena uterus ibu yang lemah atau faktor lain yang belum diketahui jelas penyebabnya (Purnama, 2017). Ibu yang mempunyai riwayat satu kali persalinan prematur sebelumnya akan meningkatkan risiko mengalami persalinan prematur sebesar 2,2 kali, dan bila pernah mengalami 3 kali persalinan prematur risikonya meningkat hingga 4,9 kali. Semakin muda usia kehamilan persalinan prematur, maka semakin cepat terjadi prematuritas pada kehamilan berikutnya (Behrman & Butler, 2006).

5) Anemia

Anemia adalah kondisi yang ditandai dengan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah lebih rendah dari normal. Klasifikasi kadar Hb dalam darah pada wanita hamil menurut WHO (2010) yaitu normal jika Hb

11 gr %, anemia ringan jika Hb 8-11 gr % dan anemia berat dengan Hb <8 gr %. Penelitian oleh Irmawati (2010) menyatakan bahwa ibu hamil dengan anemia berisiko sebesar 4,38 kali untuk melahirkan prematur dibandingkan ibu yang tidak mengalami anemia pada saat kehamilannya (Irmawati, 2010 ; Purnama, 2017).

Fungsi dari Hb yaitu untuk mengantarkan oksigen ke jaringan dan mengembalikan CO₂ ke paru-paru untuk dieliminasi dari tubuh. Setiap kekurangan fungsi Hb atau penurunan kadar sel darah merah maka dapat menyebabkan anemia. Selama kehamilan total jumlah plasma dan jumlah sel darah merah akan meningkat dari kebutuhan awal. Namun peningkatan volume plasma lebih besar dibandingkan peningkatan massa sel darah merah sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi Hb yang akan mempengaruhi kadar O₂ yang masuk ke jaringan. Keadaan ini dapat menyebabkan hipoksia jaringan yang kemudian akan memproduksi kortisol dan prostaglandin sehingga dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur pada ibu dengan anemia (Herman & Joewono, 2020).

6) Ketuban Pecah Dini

Ketuban pecah dini adalah pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Apabila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia 37 minggu maka disebut ketuban pecah dini pada kehamilan prematur. Pecahnya selaput ketuban berhubungan dengan terjadinya perubahan proses biokimia yang terjadi dalam kolagen matriks ekstraseluler amnion, korion, dan apoptosis membrane janin. Membran janin dan desidua

bereaksi terhadap stimuli seperti infeksi dan peregangan selaput ketuban dengan memproduksi mediator yaitu prostaglandin, sitokin, dan protein hormone sehingga dapat mencetus terjadinya persalinan prematur (Prawirohardjo, 2010).

Berdasarkan penelitian oleh Greer dan Norman (2005) dalam Wijayanegara (2009) menyatakan bahwa risiko persalinan prematur pada ibu dengan riwayat ketuban pecah dini saat kehamilan <37 minggu (PPROM/preterm premature rupture of membrane) yaitu 34-44 %. Sedangkan risiko mengalami PPRM kembali yaitu sekitar 16-32 % (Wijayanegara, 2009).

7) Riwayat Abortus

Ibu dengan riwayat abortus dapat berisiko mengalami kejadian persalinan prematur 5,29 kali dibandingkan ibu yang tidak memiliki riwayat abortus. Abortus dapat menyebabkan perdarahan hingga menimbulkan shock serta gangguan neurologis. Perdarahan dapat menyebabkan infeksi pada alat reproduksi dan penipisan dinding uterus karena kuretase yang dilakukan tidak steril (Niswah, 2016).

8) Preeklampsia

Preeklampsia yaitu suatu kondisi dalam kehamilan. Ketika ibu memiliki tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu disertai proteinuria ≥ 300 mg/24 jam atau $\geq +1$. Keadaan ini akan berpengaruh kepada janin yaitu dapat menyebabkan terjadi penurunan aliran darah ke plasenta sehingga janin dapat

mengalami kekurangan nutrisi hingga terjadi gangguan pertumbuhan janin (Purnama, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Tresnaasih (2003) dalam Purnama (2017) yaitu responden yang mengalami preeklampsia/eclampsia pada masa kehamilan mempunyai risiko 9,26 kali untuk mengalami persalinan prematur dibandingkan dengan responden yang tidak mengalami preeklampsia/eclampsia (Purnama, 2017).

9) Gemelli

Gemelli atau kehamilan kembar adalah kehamilan dengan dua janin atau lebih intrauterine. Gemelli merupakan salah satu faktor risiko tinggi yang dapat menyebabkan persalinan prematur karena dapat menyebabkan komplikasi untuk mengalami hiperemis gravidarum, hipertensi dalam kehamilan, kehamilan dengan hidramnion, persalinan prematur, dan pertumbuhan janin terhambat (Herman & Joewono, 2020).

Persalinan prematur dapat terjadi akibat gemelli. Hal ini disebabkan oleh terjadinya overdistensi, retraksi akibat ketegangan otot uterus dini sehingga proses *braxton hicks* dan kontraksi makin sering terjadi sehingga menjadi HIS dalam persalinan. Risiko kejadian persalinan prematur pada gemelli adalah lebih tinggi terjadi pada multipara dengan kehamilan tunggal sebelumnya yaitu 67,3 %, dan

20,9% jika persalinan tunggal sebelumnya normal (Robinson & Norwitz, 2019).

10) Status Gizi

Status gizi ibu yang kurang sebelum dan selama kehamilan merupakan salah satu penyebab berbagai persoalan kesehatan pada ibu dan bayi yang dapat mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan rendah, kelahiran prematur, dan kematian neonatal. Status gizi dapat diukur dengan mengetahui nilai indeks massa tubuh (IMT). Ibu dengan IMT yang rendah mempunyai risiko 3,7 kali lebih tinggi mengalami persalinan prematur dibandingkan dengan ibu yang memiliki IMT normal (Niswah, 2016).

11) Infeksi

Infeksi merupakan salah satu faktor etiologi yang dapat menyebabkan persalinan prematur yaitu infeksi saluran kemih dan saluran genital. Infeksi pada umumnya terdapat di vagina kemudian menjangar secara ascendens menuju korion, amnion dan dapat menyebabkan ketuban pecah atau inisiasi persalinan. Sedangkan sumber infeksi yang berhubungan dengan intrauterine adalah penjalaran dari saluran genital melalui plasenta, darah, dan iatrogenic (Wijayanegara, 2009).

Infeksi yang berhubungan dengan persalinan prematur yaitu *Treponema pallidum*, *Streptococcus Group β* , *Neisseria gonorrhoea*, *Chlamydia trachomatis*, *Bacteroides fragilis*, dan *Bakterial vaginosis*.

Diperkirakan 90% dari pasien yang mengalami infeksi cairan amnion menunjukkan adanya mikroba dari vagina dan serviks. Namun, pada 1-2% kasus bakteri dapat menginvasi uterus melalui migrasi dari rongga abdomen ke tuba fallopi, iatrogenic melalui tusukan jarum saat amniosintesis atau melalui prosedur chorionic villus sampling dan penyebaran hematogen melalui plasenta (Wijayanegara, 2009).

12) Pekerjaan

Ibu yang bekerja selama hamil memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami persalinan prematur dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Penelitian oleh Araya (2017) menyatakan bahwa hubungan persalinan prematur dengan beban kerja ibu dipengaruhi oleh tingkat stress, depresi, dan kecemasan ibu yang ditimbulkan oleh beberapa jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang berpengaruh terhadap peningkatan kejadian prematuritas adalah bekerja terlalu lama, pekerjaan fisik yang berat, dan pekerjaan yang menimbulkan stress (Araya, 2017).

13) Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah jenjang terakhir pendidikan ibu. Pendidikan merupakan faktor yang berhubungan dengan terjadinya persalinan prematur karena berhubungan dengan tingkat pengetahuan ibu. Ibu yang berpendidikan SD lebih berisiko 3,33 kali dibandingkan

dengan ibu yang berpendidikan perguruan tinggi. Sedangkan ibu yang berpendidikan SMP berisiko 3,91 kali dibandingkan ibu yang berpendidikan di perguruan tinggi, serta ibu berpendidikan SMA secara statistik tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistik (Herman & Joewono, 2020).

14) Faktor Psikososial

Penelitian awal mengenai pengaruh psikososial terhadap kejadian persalinan prematur yaitu berkaitan dengan kecemasan dan depresi pada ibu yang dilakukan oleh Gorsuch dan Key dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 11 penelitian prospektif yang menghubungkan antara kecemasan dengan persalinan prematur yaitu terdapat 9 penelitian yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kecemasan dengan prematuritas. Sedangkan 2 penelitian lainnya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kecemasan dengan gangguan pertumbuhan janin, bukan dengan usia kehamilan (Wijayanegara, 2009).

15) Merokok

Penggunaan tembakau pada kehamilan merupakan salah satu penyebab terjadinya persalinan prematur. Penelitian yang dilakukan oleh Berghella (2017) menyatakan bahwa prevalensi tertinggi wanita hamil yang merokok terjadi pada usia <18-19 tahun (17,1%), dan >40 tahun (8%) dengan prevalensi tertinggi pada wanita Amerika (18,1%), wanita hispanik (2,7%), dan terendah wanita Asia (2,2%) (Berghella,

2017). Berdasarkan data dari BPS, Indonesia memiliki persentase tertinggi ibu dengan usia 15-49 tahun menghisap rokok <5 batang/hari sebesar 29,63%, menghisap 5-9 batang/hari sebesar 1,73% terjadi dengan persentase tertinggi di daerah perkotaan sebesar 1,86% dengan tingkat pendidikan dan status ekonomi yang tinggi (BPS, 2015).

Merokok dapat menyebabkan kerusakan pada material genetik janin yang mengakibatkan penghapusan dan translokasi kromosom. Selain itu, merokok juga dapat menyebabkan gangguan pengiriman oksigen janin sehingga mengakibatkan vasokonstriksi dan perubahan aliran darah intervillous yang berfungsi pada pertukaran gas dalam plasenta serta merokok berhubungan dengan terjadinya penurunan kemampuan makrofag, dan kadar asam askorbat yang rendah yang dapat meningkatkan peradangan dan infeksi yang dapat berhubungan dengan terjadinya persalinan prematur (Herman & Joewono, 2020).

16) Faktor Janin dan Plasenta

Pertumbuhan janin terhambat biasa disebut *Intrauterine Growth Restriction* (IUGR) dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur hal ini disebabkan oleh terjadinya terminasi kehamilan karena kurang adekuatnya pasokan nutrisi dan oksigen. Adapun faktor plasenta yaitu plasenta previa dan solusio plasenta, terlepasnya plasenta dan perdarahan yang banyak pada plasenta previa dapat mengakibatkan

terjadinya persalinan prematur hal ini disebabkan bayi dapat mengalami hipoksia.

3. Integrasi Keislaman

Terdapat dalil yang digunakan para ulama dalam menetapkan batasan bayi tersebut dikatakan prematur, diantaranya :

الرِّضَاعَةَ يُبَيِّنُ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Q.S Al Baqarah 2:233)

شَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفِصَالُهُ حَمْلُهُ

Artinya : “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.” (Q.S Al Ahqaf 46:15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.(Q.S Luqman 21:14).

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, Q.S Al-Ahqaf menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan, penyusuannya selama dua puluh

satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, ketika itu masa penyusuannya adalah dua puluh empat bulan (Quraish Shihab, 2002).

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata ketika menafsirkan surat Al-Ahqaf ayat 15 :

وقد استدل علي، رضي الله عنه، بهذه الآية مع التي في لقمان: {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] ، وقوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] ، على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وهو استنباط قوي صحيح. ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة، رضي الله عنهم.

“Ali radhiallahu ‘anhu berdalil bahwa ayat ini [Al-ahqaf: 15] bersama ayat dalam surat Luqman (“dan penyapihannya selama dua tahun”) dan surat firman-Nya (“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”) [Al-Baqarah: 223] **bahwa batasan minimal lama waktu kehamilan adalah 6 bulan.** Ini adalah kesimpulan yang kokoh dan shahih. Disepakati oleh Ustman dan sejumlah sahabat radhiallahu ‘anhu.” [Tafsir Al-Quran Al-Adzhim 7/280, Darul Thayyibah, cet. ke-2, 1420 H, Asy-Syamilah].

Selain itu, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur’an dan hadits yang menyangkut mengenai beberapa aspek terkait beberapa variabel yang pada kejadian persalinan prematur, diantaranya :

1) Fase Kehamilan Menurut Islam

Dalam perkembangan bayi sebelum dilahirkan terdapat beberapa fase yang dilalui dalam kandungan ibu sesuai dengan Firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىٓ رٰحِمٍ ۚ ثُمَّ نَضٰجًا ۚ ثُمَّ عَلَقَةً ۚ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۚ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ فَرَّارٍ مَّكِيًّا ۚ ثُمَّ عِظْمًا ۚ فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ اَنْشَاْنُهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۗ فَتَبٰرَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۙ

Artinya : “ Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat”. (Q.S Al-Mu'minun (23) : 12-16).

a) Fase Nutfah

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa nutfah yaitu sperma laki-laki yang memancar ke rahim perempuan sehingga terjadi pertemuan (fertilisasi) antara sperma laki-laki dan indung telur

perempuan yang akan berkembang membentuk zigot (Suwito, 2012).

b) Fase ‘Alaqah

Allah SWT ingin menjelaskan kebesaran nikmatNya pada manusia yaitu yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang hina, kemudian menjadikan manusia sempurna dan berakal sehingga mampu membedakan antara yang baik dan buruk. ‘Alaqah yaitu segumpal darah yang membeku yang tercipta dari campuran sperma laki-laki dan indung telur perempuan atau disebut dengan embrio. Tahap ini dimulai dari 2-8 minggu setelah pembuahan yang ditandai dengan adanya perubahan pada janin yaitu mulai terbentuknya organ tubuh tetapi ukurannya hanya sekitar 1 inci (Suwito, 2012)

c) Fase Mudghah

Mudghah dalam fase janin adalah sepotong daging yang seolah-olah seukuran kunyahan. Tahap ini dimulai dari usia 9 minggu hingga lahir. Setelah 8 minggu kehamilan, embrio akan berkembang menjadi fetus, Pada masa ini ciri-ciri fisik akan lebih terlihat. Pada bulan ketiga, janin secara spontan dapat menggerakkan kepala, tangan, dan kakinya serta jantung yang berdenyut (Suwito, 2012).

2) Pengetahuan Ibu Hamil

Pengetahuan ibu selama kehamilan adalah usaha sadar seorang ibu dalam menjaga fisik dan psikisnya selama kehamilan dengan tujuan mengoptimalkan kondisi ibu dan bayi yang akan dilahirkan kelak dalam hal ini mencegah dari kejadian persalinan prematur dan hal-hal lain yang menyangkut masalah kehamilan dan persalinan. Adapun pengetahuan ibu yang sedang hamil merupakan seorang yang harus menjaga kesehatannya sendiri sebagaimana dalam H.R Bukhari yaitu :

مَسْنُونٌ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ لَكُمْ

Artinya : Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. (H.R Bukhari 4789).

Dari hadits tersebut menjelaskan bahwa ibu yang hamil merupakan seorang yang memimpin atas kehamilannya yang akan dimintai pertanggungjawabannya sehingga ibu harus menjaga kesehatannya selama masa kehamilan agar anak yang dikandungnya tersebut dapat lahir dengan kondisi yang baik. Adapun usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya dalam hal ini persalinan prematur ataupun kondisi-kondisi lain selama kehamilan dan persalinan antara lain :

a) Menjaga Jarak Kehamilan

الرَّضَاعَةَ يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Q.S Al Baqarah 2:233)

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Pemberian ASI dapat berfungsi sebagai alat kontrasepsi dalam upaya untuk mengatur jarak kehamilan. Isapan bayi pada payudara ibu dapat merangsang hormone prolactin yang dapat menghambat terjadinya pematangan sel telur sehingga dapat menunda kesuburan. Kehamilan terjadi apabila terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur ibu. Ketika hormone prolactin dirangsang pada isapan bayi di payudara ibu maka akan menjadi penghambat dalam pematangan sel telur sehingga bisa meminimalisir sel telur untuk dibuahi (Suhaedah, 2013).

b) Menjaga Status Gizi

Pertumbuhan dan perkembangan janin dipengaruhi salah satunya oleh asupan makanan yang sehat oleh ibu hamil. Tubuh ibu yang sedang mengandung memerlukan makanan yang kaya akan protein, vitamin, mineral terutama zat besi. Dalam islam, konsep

makanan yang dikonsumsi bukan hanya bergizi tetapi halal dalam pengertian zat dan cara mendapatkan makanannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. :

ط
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِهَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (Q.S Al-Baqarah 2 : 168).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa makanlah dari makanan yang halal yaitu makanan yang tidak haram baik zatnya maupun cara memperolehnya. Selain itu makanan tersebut juga harus baik yaitu makanan yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan yang dimaksud adalah makanan terdapat di bumi yang diciptakan Allah SWT. Oleh karena itu, dalam memilih makanan sebaiknya memakan makanan yang halal dan baik yang bermanfaat untuk kesehatan ibu sehingga akan menunjang kesehatan bayi yang dikandungnya.

c) Menjaga Kondisi Psikis

Psikis anak dalam kandungan bergantung pada psikis ibu hal ini disebabkan oleh sistem saraf ibu mempengaruhi sistem saraf bayi. Oleh karena itu, ibu yang sedang mengandung diharapkan

menghindari hal-hal yang dapat mengganggu psikis ibu hamil seperti adanya tekanan sosial, dan lain-lain.

3) Faktor Ekonomi Yang Berhubungan Dengan Kehamilan

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kehamilan. Hal ini disebabkan pendapatan rumah tangga berhubungan dengan kehamilan risiko tinggi karena ekonomi yang rendah akan mempengaruhi pasangan dalam membuat skala prioritas terhadap kebutuhannya sehingga meningkatkan hambatan untuk mendapatkan prioritas kesehatan daripada prioritas dalam kebutuhan pokok. Hal ini berhubungan dengan Q.S An-Nisa 4 : 9 yaitu :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa orangtua yang memiliki kelemahan dalam hal ekonomi akan berpengaruh pada kekurangan makanan bergizi sehingga akan mempengaruhi kondisi fisik dan intelegensi anak. Sehingga orangtua diharapkan dapat

bertanggungjawab atas kebutuhan anak-anaknya sebab anak adalah suatu amanah dari Allah SWT yang harus kita jaga. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah SWT. :

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْنَتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Dari ayat tersebut Allah SWT menjelaskan kepada kaum Muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-larangan-Nya yang telah ditentukan dengan perantaraan wahyu serta mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka. Dalam hal ini seperti orangtua yang harus menjaga anaknya sebagai amanah dari Allah SWT.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

B. Kerangka Teori



Gambar 2.1 : Kerangka Teori

C. Kerangka Konsep




Keterangan :



: Variabel dependen



: Variabel independen (variabel yang diteliti)



: Variabel independen (variabel yang tidak diteliti)



: Hubungan yang diteliti


Gambar 2.2 Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian berupa penelitian observasional analitik dengan menggunakan pendekatan *case control* yaitu dengan mempelajari hubungan antara paparan (*exposure*) dan hasil (*outcome*) dengan cara membandingkan antara kelompok kasus dan control berdasarkan status paparannya (Masturoh & Anggita, 2018) . Kelompok kasus adalah ibu yang melahirkan secara prematur yang tercatat dalam rekam medik RSUD Haji Makassar. Sedangkan kelompok control adalah ibu yang melahirkan secara aterm yang tercatat dalam rekam medik RSUD Haji Makassar. Adapun skema penelitian kasus control sebagai berikut :



Gambar 3.1. Desain Penelitian Case Control

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021 hingga Januari 2022 di RSUD Haji Makassar.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian persalinan prematur.

2. Variabel Independen

Variabel independent dalam penelitian ini adalah faktor risiko (usia, paritas, jarak kehamilan, status gizi, anemia, ketuban pecah dini, riwayat abortus, dan tingkat pendidikan).

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

a. Populasi Kasus

Populasi kasus dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu yang didiagnosis mengalami kejadian persalinan prematur yang tercatat dalam rekam medik RSUD Haji Makassar.

b. Populasi Kontrol

Populasi kontrol dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu yang bersalin secara aterm yang tercatat dalam rekam medik RSUD Haji Makassar.

2. Sampel

a. Sampel Kasus

Sampel kasus dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu yang didiagnosis mengalami kejadian persalinan prematur yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi di RSUD Haji Makassar.

Adapun kriteria inklusi untuk sampel kasus adalah :

- 1) Ibu yang melahirkan pada usia kehamilan < 37 minggu di RSUD Haji Makassar.
- 2) Memiliki data rekam medik di RSUD Haji Makassar.
- 3) Ibu bersedia menjadi responden terkait penelitian yang akan dilakukan.
- 4) Tidak memiliki gangguan kejiwaan.

Sedangkan kriteria eksklusi untuk sampel kasus adalah :

- 1) Ibu yang mengalami (preeklampsia berat, eklampsia, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit ginjal, diabetes mellitus, pneumonia, perdarahan antepartum, polihidramnion, dan korioamnionitis).
- 2) Ibu dengan kehamilan multiple dan pertumbuhan janin terhambat.
- 3) Tidak bersedia menjadi responden terkait penelitian yang akan dilakukan.

b. Sampel Kontrol

Sampel kontrol dalam penelitian ini yaitu ibu yang bersalin secara aterm yang tercatat dalam rekam medik RSUD Haji Makassar tahun 2020 yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Adapun kriteria inklusi untuk sampel kontrol adalah :

- 1) Ibu yang melahirkan pada usia kehamilan \geq 37 minggu di RSUD Haji Makassar.
- 2) Memiliki data rekam medik di RSUD Haji Makassar.
- 3) Ibu bersedia menjadi responden terkait penelitian yang akan dilakukan.
- 4) Tidak memiliki gangguan kejiwaan.

Sedangkan kriteria eksklusi untuk sampel kontrol adalah :

- 1) Ibu yang mengalami (Preeklampsia berat, eklampsia, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit ginjal, diabetes mellitus, pneumonia, perdarahan antepartum, polihidramnion, dan korioamnionitis.).
- 2) Ibu dengan kehamilan multiple dan pertumbuhan janin terhambat.
- 3) Tidak bersedia menjadi responden terkait penelitian yang akan dilakukan.

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus besar sampel. Berikut rumus besar sampel menurut *Isaac dan Michael* (Sugiyono, 2013) :

$$S = \frac{\lambda^2 NP(1 - P)}{d^2(N - 1) + \lambda^2 P(1 - P)}$$

Keterangan :

S = Jumlah sampel

λ^2 = Chi kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Menggunakan derajat kebebasan 1 dengan taraf kesalahan 5%, chi kuadrat = 3,481.

N = Jumlah populasi

P = Peluang benar (0,5)

Q = Peluang salah (0,5)

d = Peluang rata sampel dengan rata-rata populasi. Perbedaan bias (0,05).

Pada penelitian ini, jumlah sampel yang dibutuhkan sebagai berikut :

$$S = \frac{3,481 \times 55 \times 0,5 \times 0,5}{0,0025 \times 54 + 3,481 \times 0,5 \times 0,5}$$
$$= \frac{47,86375}{1,00525} = 48 \text{ sampel}$$

Berdasarkan perhitungan jumlah sampel, maka ditentukan jumlah sampel kasus dan kontrol yaitu dengan perbandingan 1:1. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 96 sampel.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini baik dari sampel kasus dan sampel kontrol dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Tujuan dari *purposive sampling* adalah untuk memperoleh sampel dengan karakteristik yang dibutuhkan dan telah ditetapkan oleh peneliti (Masturoh & Anggita, 2018). Sampel kasus diperoleh dengan cara mengambil data ibu yang mengalami persalinan prematur melalui rekam medik RSUD Haji Makassar. Sama halnya dengan kasus kontrol yaitu dengan mengambil data ibu yang melahirkan secara aterm melalui rekam medik RSUD Haji Makassar. Sampel kasus dan kontrol diperoleh dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara pada ibu yang mengalami kejadian persalinan prematur dengan persalinan aterm untuk mendapatkan data usia, paritas, jarak kehamilan, berat badan dan tinggi badan ibu sebelum hamil, ketuban pecah dini, riwayat abortus, anemia, dan tingkat pendidikan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui catatan rekam medik ibu pada ibu yang mengalami kejadian persalinan prematur dengan persalinan aterm di RSUD Haji Makassar.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah daftar isian sesuai dengan data yang terdapat dalam rekam medik dan lembar wawancara berupa kuisioner yang terdiri dari identitas ibu dan hal-hal yang berkaitan dengan faktor risiko yang akan diteliti.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data terdiri dari langkah, yaitu (Masturoh & Anggita, 2018) :

a. *Editing*

Editing yaitu memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yang dicatat dalam daftar isian pengumpulan data.

b. *Coding*

Coding atau pemberian kode yaitu kegiatan mengubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk bilangan yang bertujuan untuk mempermudah pada saat analisis data serta mempercepat dalam entry data.

c. *Transferring*

Transferring yaitu kegiatan memindahkan data ke master table.

d. *Tabulating*

Tabulating yaitu kegiatan menyusun data dalam table distribusi frekuensi yang berfungsi untuk meringkas data yang masuk ke dalam table yang telah dipersiapkan sehingga memudahkan dalam proses analisis data.

2. Analisis Data

Pada tahap ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistic SPSS yang meliputi analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat.

a. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi, frekuensi, dan proporsi dari variabel dependen serta variabel independent (Heryana, 2020).

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji *Odds Ratio* yang bertujuan untuk membandingkan antara kasus dan kontrol terhadap faktor

Faktor Risiko	Kelompok Studi		Jumlah
	Kasus	Kontrol	
(+)	a	b	a+b
(-)	c	d	c+d
Total	a+c	b+d	t

risiko. *Odd Ratio* (OR) adalah ratio antara odd terpapar terhadap odd yang tidak terpapar. Rumus *Odds Ratio* (OR) yaitu sebagai berikut (Widarsa, dkk. 2016) :

$$OR = \frac{ad}{bc}$$

Tabel 3.1 Kontingensi 2x2 *Odds Ratio* Analisis Data Penelitian Kasus Kontrol

Keterangan :

a : Jumlah kasus dengan risiko (+)

b : Jumlah kontrol dengan risiko (+)

c : Jumlah kasus dengan risiko (-)

d : Jumlah kontrol dengan risiko (-)

a+b : Jumlah kasus dan kontrol dengan risiko (+)

c+d : Jumlah kasus dan kontrol dengan risiko (-)

a+c : Jumlah kasus dengan faktor risiko (+) dan (-)

b+d : Jumlah kasus dengan faktor risiko (+) dan (-)

t : Total Keseluruhan

Interpretasi nilai OR:

- a. Jika $OR > 1$, maka variabel independen merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur..
- b. Jika $OR = 1$, maka variabel independen bukan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur.
- c. Jika $OR < 1$, maka variabel independen merupakan faktor protektif kejadian persalinan prematur.

Uji kemaknaan nilai OR dilakukan dengan langkah sebagai berikut:


- a. Penentuan nilai *Confidence Interval* (CI)=95%
- b. Penentuan *Lower Limit* (LL) dan *Upper Limit* (UL)
- c. Interpretasi kebermaknaan:
 - 1) Jika nilai LL dan UL berada di bawah nilai 1 atau berada di atas nilai 1, maka nilai OR yang diperoleh mempunyai kebermaknaan.
 - 2) Jika nilai LL dan UL mencakup nilai 1, maka nilai OR yang diperoleh tidak mempunyai kebermaknaan.

c. Analisis Multivariat

Analisis multivariat bertujuan untuk mengetahui variabel independent yang lebih erat kaitannya dengan variabel dependen dengan uji statistik yang digunakan merupakan regresi logistik. Variabel independen dengan nilai OR terbesar yang akan ditetapkan sebagai faktor risiko paling dominan (Heryana, 2020).

I. Alur Penelitian

Menyusun proposal penelitian




Setelah proposal penelitian memperoleh persetujuan dari pembimbing dan penguji kemudian dilanjutkan dengan membuat perizinan penelitian dari pihak PSPD UINAM yang ditujukan kepada direktur RSUD Haji Makassar.



Peneliti memperoleh data calon responden dari RSUD Haji makassar



Peneliti melakukan proses mengambil sampel dengan teknik *purposive sampling* serta disesuaikan dengan kriteria inklusi dan tidak memiliki kriteria eksklusi.



Peneliti melakukan pengambilan data primer yang dilakukan dengan wawancara kepada responden dan pengambilan data sekunder berdasarkan catatan rekam medik dan buku KIA.



Peneliti memasukkan informasi dan data kemudian di analisis menggunakan SPSS.



Penyajian hasil data dalam bentuk table dan dijelaskan dalam bentuk narasi.



Peneliti membuat kesimpulan hasil penelitian.

J. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk table dan dijelaskan dalam bentuk narasi.

K. Etika Penelitian

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etika penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar yang terletak di Jl. Dg. Ngeppe, Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini menganalisis faktor risiko kejadian persalinan prematur yaitu usia, paritas, jarak kehamilan, status gizi, anemia, ketuban pecah dini, riwayat abortus, dan tingkat pendidikan. Dalam mencapai tujuan penelitian maka peneliti melakukan pengambilan data kemudian data dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi dari variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini jumlah responden yaitu 96 yang terdiri dari 48 responden pada kelompok kasus dan 48 responden pada kelompok kontrol.

**Tabel 4.1 Distribusi Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur di RSUD
Haji Makassar Tahun 2021**

Variabel	Frekuensi	
	N	%
Usia		
Risiko Tinggi	27	28,1
Risiko Rendah	69	71,9
Paritas		
Risiko Tinggi	48	50
Risiko Rendah	48	50
Jarak Kehamilan		
Risiko Tinggi	55	57,3
Risiko Rendah	41	42,7

Status Gizi	27	28,1
Risiko Tinggi	69	71,9
Risiko Rendah		
Anemia		
Risiko Tinggi	53	55,2
Risiko Rendah	43	44,8
Ketuban Pecah Dini (KPD)		
Risiko Tinggi	35	36,5
Risiko Rendah	61	63,5
Riwayat Abortus		
Risiko Tinggi	12	12,5
Risiko Rendah	84	87,5
Tingkat Pendidikan		
Risiko Tinggi	49	51
Risiko Rendah	47	49
Total	96	100

Sumber : Data Sekunder

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa jumlah responden yaitu 96 yang terdiri dari 48 responden pada kelompok kasus dan 48 responden pada kelompok kontrol. Terdapat delapan variabel pada penelitian ini. Ibu dengan usia yang berisiko tinggi berjumlah 27 orang (28,1%) dan usia ibu yang berisiko rendah berjumlah 69 orang (71,9%), ibu dengan paritas yang berisiko tinggi yaitu 48 orang (50%) dan paritas yang berisiko rendah berjumlah 48 orang (50%), ibu dengan jarak kehamilan yang berisiko tinggi yaitu 55 orang (57,3%) dan jarak kehamilan yang berisiko rendah berjumlah 41 orang (42,7%), ibu dengan status gizi yang berisiko tinggi yaitu 27 orang (28,1%) dan status gizi yang berisiko rendah berjumlah 69 orang (71,9%), Ibu yang mengalami anemia yaitu 53 orang (55,2%) dan ibu yang tidak mengalami anemia berjumlah 43 orang (44,8%), Ibu yang mengalami kejadian ketuban pecah dini yaitu 35 orang (36,5%) dan ibu yang tidak mengalami kejadian ketuban pecah

dini berjumlah 61 orang (63,5%), ibu dengan tingkat pendidikan yang berisiko tinggi berjumlah 49 orang (51%) dan tingkat pendidikan yang berisiko rendah berjumlah 47 orang (49%).

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian persalinan prematur.

a. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Usia Ibu

Tabel 4.2 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Usia Ibu di RSUD Haji Makassar Tahun 2021

Usia	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	17	35,4	10	20,8	27	28,1	0,173	2,084	0,836	5,197
Risiko Rendah	31	64,6	38	79,2	69	71,9				
Total	48	100,0	48	100,0	96	100,0				

Sumber : Data Sekunder

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa usia ibu yang berisiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 17 orang (35,4%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 10 (20,8%). Dari hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,084 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 0,836 dan *upper limit* (UL) sebesar 5,197. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan usia berisiko tinggi memiliki risiko 2,084 kali lebih besar untuk mengalami kejadian persalinan prematur dibandingkan ibu dengan usia risiko rendah. Nilai *lower limit* dan *upper limit* mencakup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 2,084 dianggap tidak bermakna secara statistik atau usia ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur.

b. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Paritas

Tabel 4.3 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Paritas di RSUD

Haji Makassar Tahun 2021

Paritas	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	29	60,4	19	39,6	48	50	0,066	2,330	1,028	5,279
Risiko Rendah	19	39,6	29	60,9	48	50				
Total	48	100,0	48	100,0	96	100,0				

Sumber : Data Sekunder

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa paritas yang berisiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 29 orang (60,4%) dibandingkan dengan kelompok kontrol berjumlah 19 (39,6). Berdasarkan hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,330 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 1,028 dan *upper limit* (UL) sebesar 5,279. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan paritas yang berisiko tinggi memiliki risiko 2,330 kali mengalami kejadian persalinan prematur dibandingkan ibu dengan paritas risiko rendah. Nilai Lower limit dan Upper limit dengan tingkat kepercayaan 95 % (CI 95% = 1,028-5,379) dengan $p = 0,066 > 0,05$ sehingga nilai 2,330 dianggap tidak bermakna secara statistik atau paritas bukan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur.

c. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Jarak kehamilan

Tabel 4.4 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Jarak

Kehamilan di RSUD Haji Makassar Tahun 2021

Jarak Kehamilan	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	25	52,1	30	62,5	55	57,3	0,409	0,625	0,289	1,471
Risiko Rendah	23	47,9	18	37,5	41	42,7				
Total	48	100,0	48	100,0	96	100,0				

Sumber : Data Sekunder

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa jarak kehamilan yang berisiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 30 orang (62,5%) dibandingkan dengan kelompok kasus yang berjumlah 25 (52,1%). Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,625 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 0,289 dan *upper limit* (UL) sebesar 1,471. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan jarak kehamilan yang berisiko tinggi merupakan faktor protektif mengalami kejadian persalinan prematur tetapi risiko ini tidak memiliki kebermaknaan.

d. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Status Gizi

Tabel 4.5 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Status Gizi di

RSUD Haji Makassar Tahun 2021

Status Gizi	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	10	20,8	17	35,4	27	28,1	0,173	0,480	0,192	1,197
Risiko Rendah	38	79,2	31	64,6	69	71,9				
Total	48	100,0	48	100,0	96	100,0				

Sumber : Data Primer dan Sekunder

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa status gizi yang berisiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 17 orang (35,4%) dibandingkan dengan kelompok kasus yang berjumlah 10 orang (20,8%). Dari hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,480 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 0,192 dan *upper limit* (UL) sebesar 1,197. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan status gizi yang berisiko tinggi merupakan faktor protektif mengalami kejadian persalinan prematur tetapi risiko ini tidak mempunyai kebermaknaan.

e. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Anemia

Tabel 4.6 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Anemia di RSUD Haji Makassar Tahun 2021

Anemia	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	31	64,6	22	45,8	53	55,2	0,101	2,155	0,949	4,893
Risiko Rendah	17	35,4	26	54,2	43	44,8				
Total	48	100,0	48	100,0	96	100,0				

Sumber : Data Primer dan Sekunder

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa anemia lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 31 orang (64,6%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 22 orang (45,8%). Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,155 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 0,949 dan *upper limit* (UL) sebesar 4,893. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 2,155 kali mengalami kejadian persalinan prematur dibandingkan ibu yang tidak mengalami anemia. Nilai Lower limit dan Upper limit dengan tingkat kepercayaan 95 % (CI 95% = 0,949-4,893) mencakup angka satu sehingga nilai 2,155 dianggap tidak bermakna secara statistik atau anemia bukan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur.

f. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Kejadian Ketuban Pecah Dini

Tabel 4.7 Risiko Kejadian Persalinan prematur Berdasarkan Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD Haji Makassar Tahun 2021

KPD	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	23	47,9	12	25	35	36,5	0,034	2,760	1,163	6,552
Risiko Rendah	25	52,1	36	75	61	63,5				
Total	48	100,0	48	100,0	96	100,0				

Sumber : Data Sekunder

Tabel 4.7 menjelaskan bahwa ketuban pecah dini lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 23 orang (47,9%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 12 orang (25%). Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,760 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 1,163 dan *upper limit* (UL) sebesar 6,552. Nilai OR 2,760 yang berarti ketuban pecah dini merupakan faktor risiko terhadap kejadian persalinan prematur. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan KPD memiliki risiko 2,760 kali mengalami kejadian persalinan prematur. Nilai Lower limit dan Upper limit dengan tingkat kepercayaan 95 % (CI 95% = 1,163-6,552) tidak mencakup angka satu sehingga nilai 2,155 dianggap bermakna secara statistik atau KPD merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur.

g. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Riwayat Abortus

Tabel 4.8 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Riwayat Abortus di RSUD Haji Makassar Tahun 2021

Riwayat Abortus	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	4	8,3	8	16,7	12	12,5	0,355	0,455	0,127	1,626
Risiko Rendah	44	91,7	40	83,3	84	87,5				
Total	48	100,0	48	100,0	96	100,0				

Sumber : Data Sekunder

Tabel 4.8 menjelaskan bahwa riwayat abortus yang berisiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 8 orang (16,7%) dibandingkan dengan kelompok kasus yang berjumlah 4 orang (8,3%). Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,455 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 0,127 dan *upper limit* (UL) sebesar 1,626. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan riwayat abortus merupakan faktor protektif mengalami kejadian persalinan prematur dan risiko ini tidak mempunyai kebermaknaan.

h. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.9 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Tingkat Pendidikan di RSUD Haji Makassar Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	24	50	25	52,1	49	51	1,000	0,920	0,413	2,049
Risiko Rendah	24	50	23	47,9	47	49				
Total	48	100,0	48	100,0	96	100,0				

Tabel 4.9 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang berisiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 25 orang (52,1%) dibandingkan dengan kelompok kasus yang berjumlah 24 orang (50%). Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,920 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 0,413 dan *upper limit* (UL) sebesar 2,049. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan yang berisiko tinggi merupakan faktor protektif mengalami kejadian persalinan prematur dan risiko ini tidak mempunyai kebermaknaan.

3. Analisis Multivariat

Analisis multivariat bertujuan untuk mengetahui variabel independen yang lebih erat kaitannya dengan variabel dependen dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik.

a. Penentuan Variabel Independen yang Diikutkan Dalam Uji Regresi Berganda Logistik

Variabel yang diduga merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur akan dijadikan calon uji multivariat. Variabel yang akan diikutkan adalah variabel dengan nilai $p < 0,25$. Ketentuan dari nilai $p < 0,25$ yaitu memberi peluang variabel independen yang mungkin secara bersamaan memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen. Berikut adalah table hasil uji bivariat dari masing-masing variabel independen yang diikutkan dalam analisis multivariat.

Tabel 4.10 Hasil Uji Bivariat Variabel Independen yang Diikutkan Dalam Analisis Multivariat

Variabel	OR	CI 95%		P-value	Keterangan
		LL	UL		
Usia	2,084	0,836	5,197	0,173	Diikutkan
Paritas	2,330	1,028	5,279	0,066	Diikutkan
Jarak Kehamilan	0,625	0,289	1,471	0,409	Tidak Diikutkan
Status Gizi	0,480	0,192	1,197	0,173	Diikutkan
Anemia	2,155	0,949	4,893	0,101	Diikutkan
KPD	2,760	1,163	6,552	0,034	Diikutkan
Riwayat Abortus	0,455	0,127	1,626	0,355	Tidak Diikutkan
Tingkat Pendidikan	0,920	0,413	2,049	1,000	Tidak Diikutkan

Sumber : Data Primer dan Sekunder

Berdasarkan table 4.10 menjelaskan bahwa dari 8 variabel yang diteliti terdapat 5 variabel yang memiliki nilai $p < 0,25$ sehingga diikutkan dalam uji regresi berganda logistic yaitu variabel usia, paritas, status gizi, anemia, dan ketuban pecah dini (KPD). Sedangkan untuk variabel yang tidak memiliki nilai $p < 0,25$ tidak diikutkan dalam uji tersebut.

b. Hasil Analisis Multivariat

Tabel 4.11 Tabel Hasil Analisis Regresi Berganda Logistik Faktor Yang Paling Mempengaruhi Kejadian Prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021

Variabel	P	OR	CI 95%
Usia	0,172	2,020	0,736-5,542
Paritas	0,085	2,226	0,895-5,537
Status Gizi	0,052	0,356	0,125-1,010
Anemia	0,080	2,269	0,907-5,674
KPD	0,012	3,322	1,302-8,477

Tabel 4.11 menjelaskan hasil uji multivariat dengan menggunakan uji regresi logistik yang menunjukkan bahwa 5 variabel yang diikutkan dalam uji regresi berganda logistic didapatkan hasil bahwa nilai variabel dengan nilai $p < 0,25$ yaitu variabel usia, paritas, status gizi, anemia, dan KPD. Oleh karena semua variabel memiliki nilai $p < 0,25$ maka untuk faktor risiko dengan nilai terbesar yaitu variabel KPD dengan nilai $p 0,012 < 0,25$ dengan nilai OR 3,322 (CI 95% = 1,302 – 8,477).

B. Pembahasan

Persalinan prematur adalah persalinan yang terjadi pada usia kehamilan <37 minggu yang dihitung pada hari pertama haid terakhir (WHO, 2010). Faktor risiko persalinan prematur yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu usia, paritas, jarak kehamilan, status gizi, anemia, ketuban pecah dini, riwayat abortus, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari hasil pengolahan data kemudian dijabarkan pembahasan dari masing-masing faktor risiko. Adapun pembahasan dari faktor risiko persalinan prematur tersebut sebagai berikut :

1. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Usia Ibu

Usia pada penelitian ini adalah usia ibu pada saat kehamilan terakhir. Dari hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,084 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 0,836 dan *upper limit* (UL) sebesar 5,197. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan usia berisiko tinggi memiliki risiko 2,084 kali lebih besar untuk mengalami kejadian persalinan prematur dibandingkan ibu dengan usia risiko rendah. Nilai *lower limit* dan *upper limit* mencakup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 2,084 dianggap tidak bermakna secara statistik atau usia ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) di RSUD. DR. Moewardi Surakarta dengan jumlah sampel 126 yang terdiri dari 63 sampel dan 63 kontrol yang menyatakan bahwa usia bukan merupakan faktor risiko dari persalinan prematur dengan nilai p 0,44. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Caroline dan Widiastuti (2019) di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan jumlah sampel penelitian yaitu 60 sampel dengan 30 sampel kasus dan 30 sampel kontrol

yang menyatakan bahwa usia ibu merupakan faktor risiko terhadap kejadian persalinan prematur dengan nilai OR 9,036 untuk melahirkan prematur dibandingkan dengan usia ibu yang berisiko rendah.

Berdasarkan teori, usia merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur. Hal ini disebabkan pada usia < 20 tahun keadaan organ reproduksi belum siap untuk kehamilan. Selain itu ibu hamil dengan usia <20 tahun memiliki peredaran darah menuju serviks dan uterus yang belum sempurna sehingga menyebabkan pemberian nutrisi yang tidak adekuat ke janin. Demikian pula peredaran darah yang kurang pada saluran genital yang dapat menyebabkan peningkatan terjadinya infeksi sehingga dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur. Sedangkan wanita yang berusia >35 tahun mulai mengalami proses penuaan sehingga terjadi regresi atau kemunduran fungsi alat reproduksi yang akan berpengaruh pada penerimaan kehamilan dan proses melahirkan. Usia 20-35 tahun adalah usia reproduktif. Keadaan ini berkaitan dengan proses pematangan organ reproduksi serta kesiapan mental seorang ibu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada usia tersebut tidak rentan terjadi persalinan prematur yang bisa disebabkan oleh ibu pada saat hamil dalam keadaan stress fisik dan mental sehingga dapat menyebabkan terjadinya persalinan sebelum waktunya (Prawirohardjo, 2010).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia tidak bermakna secara signifikan terhadap persalinan prematur sehingga usia bukan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur. Menurut peneliti, hal ini bisa saja terjadi jika ibu yang memiliki umur berisiko untuk mengalami persalinan prematur sudah melakukan pemeriksaan rutin ke dokter kandungan dan melakukan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya persalinan prematur. Selain itu, hal ini dapat dipengaruhi oleh proses pengambilan sampel yaitu dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam hal ini

sampel yang diambil yaitu sesuai kriteria yang diinginkan oleh peneliti sehingga jika terdapat ibu dengan usia berisiko tinggi tetapi pada ibu tersebut tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi maka data tersebut tidak diambil.

2. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Paritas

Paritas yaitu jumlah persalinan yang pernah dialami ibu tanpa memperhatikan hasil persalinan tersebut hidup atau meninggal Berdasarkan hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,330 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 1,028 dan *upper limit* (UL) sebesar 5,279. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan paritas yang berisiko tinggi memiliki risiko 2,330 kali mengalami kejadian persalinan prematur dibandingkan ibu dengan paritas risiko rendah. Nilai Lower limit dan Upper limit dengan tingkat kepercayaan 95 % (CI 95% = 1,028-5,379) dengan $p > 0,05$ sehingga nilai 2,330 dianggap tidak bermakna secara statistik atau paritas bukan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Suspimantari (2014) di RSUP Dr. Kariadi Semarang dengan jumlah sampel 82 yang terdiri dari 41 sampel kasus dan 41 sampel kontrol yang menyatakan bahwa paritas bukan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur dengan nilai OR 1,000 (CI 95% = 0,323-3,552) yang artinya nilai tersebut mencakup angka satu sehingga paritas ibu tidak bermakna secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Maita (2012) di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dengan jumlah sampel 490 terdiri dari 245 sampel kasus dan 245 sampel kontrol yang menyatakan bahwa paritas merupakan faktor risiko terhadap kejadian persalinan prematur dengan nilai OR 1,6 dengan *lower limit* 1,14 dan *upper limit* 2,34 yang menunjukkan hasilnya bermakna secara signifikan.

Paritas dapat menjadi faktor risiko kejadian persalinan prematur. Hal ini disebabkan risiko kesehatan ibu dan anak meningkat pada persalinan pertama, keempat dan seterusnya. Hal ini disebabkan karena kehamilan dan persalinan pertama meningkatkan risiko kesehatan yang timbul karena ibu belum pernah mengalami kehamilan sebelumnya, selain itu jalan lahir baru akan dicoba dilalui janin. Sebaliknya jika terlalu sering melahirkan rahim akan menjadi semakin lemah karena jaringan parut uterus akibat kehamilan berulang. Jaringan parut ini menyebabkan tidak adekuatnya persediaan darah ke plasenta sehingga plasenta tidak mendapat aliran darah yang cukup untuk menyalurkan nutrisi ke janin akibatnya pertumbuhan janin terganggu. Hal tersebut akan meningkatkan risiko terjadinya persalinan prematur (Prawirohardjo,2010).

Menurut peneliti, hasil penelitian ini menjadi tidak bermakna dimungkinkan karena adanya faktor lain seperti ibu yang sudah mempersiapkan kehamilannya yaitu dengan mematuhi ANC sehingga paritas tidak mempengaruhi kejadian persalinan prematur serta aktor kecemasan, stress, pekerjaan ibu, perilaku ibu, ataupun kondisi sosioekonomi, Adapun hal lain yang dapat menyebabkan tidak adanya kebermaknaan dalam hasil penelitian ini yaitu dalam jumlah sampel ibu yang sama dalam hal risiko tinggi dan risiko rendah sehingga dapat mempengaruhi hasil uji analisis yang dilakukan.

3. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Jarak Kehamilan

Jarak kehamilan dalam penelitian ini yaitu jarak antara persalinan sebelumnya dengan kehamilan ibu saat ini. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,625 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 0,289 dan *upper limit* (UL) sebesar 1,471. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan jarak kehamilan

yang berisiko tinggi merupakan faktor protektif mengalami kejadian persalinan prematur tetapi risiko ini tidak memiliki kebermaknaan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2017) di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan jumlah sampel 300 terdiri dari 100 sampel kasus dan 200 sampel kontrol yang menjelaskan bahwa jarak kehamilan merupakan faktor risiko terhadap kejadian persalinan prematur dengan nilai OR 2,4 (CI 95% : 1,1-5,1) nilai batas bawah dan batas atas tidak mencakup angka satu sehingga risiko yang ditimbulkan dinyatakan bermakna. Hasil penelitian ini juga searah dengan penelitian oleh Hidayati (2016) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan jumlah sampel 96 responden yang terdiri dari 48 sampel kasus dan 48 sampel kontrol menjelaskan bahwa jarak kehamilan yang berisiko menimbulkan persalinan prematur 20,1 kali lebih besar dibandingkan jarak kehamilan yang tidak berisiko.

Jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat membahayakan ibu dan janin. WHO merekomendasikan interval waktu minimal yaitu 24 bulan agar tubuh dapat pulih setelah melewati proses kelahiran serta jarak kehamilan yang lebih lama akan memberikan kesempatan pada ibu untuk memperbaiki gizi dan kesehatannya. Jarak antar kehamilan yang terlalu dekat pada saat itu rahim dan kesehatan ibu belum pulih dengan baik yang akan membawa dampak pada kesehatan dan gizi ibu sehingga dapat meningkatkan risiko persalinan prematur. Sebaliknya jika jarak kehamilan terlalu panjang membuat organ reproduksi membutuhkan proses adaptasi terhadap kehamilan sama seperti kehamilan pertama (Wijayanegara, dkk. 2009).

Pada penelitian ini jarak kehamilan merupakan faktor protektif terhadap kejadian persalinan prematur. Faktor protektif merupakan faktor pelindung yaitu jarak kehamilan yang berisiko tinggi dapat membuat ibu mencegah terjadinya kejadian

persalinan prematur dalam hal ini ibu akan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak hamil dalam waktu terlalu dekat yaitu ≤ 2 tahun dan >5 tahun. Tindakan pencegahan yang dilakukan seperti penggunaan kontrasepsi selama 18 bulan setelah kelahiran, hasilnya cakupan kontrasepsi pasca persalinan bersifat protektif terhadap persalinan prematur. Selain itu, hal yang dapat membuat paritas tidak bermakna signifikan terhadap kejadian persalinan prematur yaitu pada sampel ibu dengan kehamilan tunggal yang dimasukkan dalam kriteria risiko rendah sehingga mempengaruhi hasil uji spss.

4. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Status Gizi

Status gizi dalam penelitian ini yaitu status gizi ibu sebelum kehamilan ditentukan berdasarkan IMT yang dihitung dengan cara membagi berat badan (kg) dengan tinggi badan (m^2). Dari hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,480 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 0,192 dan *upper limit* (UL) sebesar 1,197. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan status gizi yang berisiko tinggi merupakan faktor protektif mengalami kejadian persalinan prematur dan risiko ini tidak mempunyai kebermaknaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Stylianou, et al (2018) di Cyprus menjelaskan bahwa nilai OR 0,96 (CI 95% = 0,92-1,01) hal ini menjelaskan bahwa status gizi merupakan faktor protektif terjadinya persalinan prematur. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Koniyo, dkk (2016) di RSUD Prof.Dr.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo dengan total sampel 192 responden yang terdiri dari 96 sampel kasus dan 96 sampel kontrol yang menjelaskan bahwa ibu dengan status gizi yang berisiko tinggi memberikan 4,4 kali secara signifikan terhadap kelahiran prematur.

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badannya dikenal dengan Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT normal bagi orang dewasa adalah $18,5-25,0 \text{ kg/m}^2$. Berat badan di bawah batas minimum dinyatakan sebagai *underweight* dan berat badan di atas batas maksimum dinyatakan sebagai *overweight*. Indeks Masa Tubuh (IMT) pada ibu sebelum hamil merupakan cerminan status gizi sebelum hamil. Status gizi ibu hamil akan menentukan status kesehatan bayi yang akan dilahirkan. Status gizi ibu sebelum hamil menandakan cadangan energy yang akan digunakan untuk masa kehamilan. Asupan gizi yang tidak cukup saat masa implantasi embrio dapat berakibat fatal bagi perkembangan janin di trimester selanjutnya. Sebelum dan saat hamil, ibu membutuhkan asupan gizi yang optimal untuk mempersiapkan dan menunjang pertumbuhan serta perkembangan janin, sehingga jika ibu mengalami kekurangan gizi maka asupan gizi yang diberikan untuk janin juga akan sulit untuk terpenuhi, akibatnya terjadi hambatan pertumbuhan janin dan berat bayi lahir yang rendah. Sedangkan Obesitas sebelum kehamilan dapat memberikan dampak merugikan bagi ibu dan bayi seperti diabetes gestasional, preeklampsia, operasi sesar darurat, perdarahan postpartum, infeksi, kelahiran prematur, besar untuk usia kehamilan (LGA), dan kematian janin dalam rahim. Saat ibu hamil terjadi peningkatan metabolisme energi zat gizi. Peningkatan energi dan zat gizi diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin (Herman.S & Joewono, 2020).

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan status gizi merupakan faktor protektif terjadinya persalinan prematur. Menurut peneliti, hal ini dapat disebabkan bahwa ibu telah memiliki kesiapan untuk mencegah terjadinya persalinan prematur yaitu dengan menjaga status gizi agar dapat mencapai nilai IMT yang normal. Selain itu, hal ini

dapat dipengaruhi oleh data penelitian yaitu jika data di rekam medik tidak lengkap maka peneliti menanyakan kepada responden terkait berat badan dan tinggi badan sehingga hal tersebut dapat menjadi bias dalam penelitian ini.

5. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Anemia

Anemia dalam penelitian ini yaitu konsentrasi hemoglobin dalam darah ibu dengan nilai <11 gr %. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,155 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 0,949 dan *upper limit* (UL) sebesar 4,893. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 2,155 kali mengalami kejadian persalinan prematur dibandingkan ibu yang tidak mengalami anemia. Nilai Lower limit dan Upper limit dengan tingkat kepercayaan 95 % (CI 95% = 0,949-4,893) mencakup angka satu sehingga nilai 2,155 dianggap tidak bermakna secara statistik atau anemia bukan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Paembonan, dkk (2014) di RSIA Siti Fatimah Kota Makassar dengan jumlah sampel 274 yang terdiri dari 137 sampel kasus dan 137 sampel kontrol yang menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan *odds ratio* (OR) yaitu 2,359 dengan nilai (CI 95% : 0,786-7,077). Hal ini berarti anemia tidak bermakna terhadap kejadian persalinan prematur sehingga bukan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Purnamasari (2017) di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan jumlah sampel 300 terdiri dari 100 sampel kasus dan 200 sampel kontrol yang menjelaskan bahwa hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 3.622 pada (CI 95% : 1,772-7,406) sehingga anemia merupakan faktor risiko terjadinya persalinan prematur.

Anemia yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan kadar Hb dalam darah yang lebih rendah dari normal. Fungsi dari Hb yaitu untuk mengantarkan oksigen ke jaringan dan mengembalikan CO₂ ke paru-paru untuk dieliminasi dari tubuh. Setiap kekurangan fungsi Hb atau penurunan kadar sel darah merah maka dapat menyebabkan anemia. Selama kehamilan total jumlah plasma dan jumlah sel darah merah akan meningkat dari kebutuhan awal. Namun peningkatan volume plasma lebih besar dibandingkan peningkatan massa sel darah merah sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi Hb yang akan mempengaruhi kadar O₂ yang masuk ke jaringan. Keadaan ini dapat menyebabkan hipoksia jaringan yang kemudian akan memproduksi kortisol dan prostaglandin sehingga dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur pada ibu dengan anemia (Saifuddin, 2010).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anemia bukan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur. Menurut peneliti hal ini dapat terjadi karena ibu telah melakukan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya anemia seperti melakukan ANC secara rutin. Adapun hal lain yang mempengaruhi ketidakbermaknaan hasil penelitian yaitu dalam proses pengambilan data jika pada berkas rekam medik tidak terdapat hasil lab maka peneliti akan bertanya kepada responden sehingga hal ini dapat mempengaruhi hasil penelitian yang akan dimasukkan dalam uji statistik.

6. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Kejadian Ketuban Pecah Dini

Ketuban pecah dini dalam penelitian ini yaitu pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan dengan usia kehamilan <37 minggu. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,760 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 1,163 dan *upper limit* (UL) sebesar 6,552. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan KPD memiliki risiko 2,760 kali mengalami kejadian persalinan prematur.

Nilai Lower limit dan Upper limit dengan tingkat kepercayaan 95 % (CI 95% = 1,163-6,552) tidak mencakup angka satu sehingga nilai 2,155 dianggap bermakna secara statistik atau KPD merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian oleh Purnamasari (2017) di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar dengan jumlah sampel 300 terdiri dari 100 sampel kasus dan 200 sampel kontrol yang menjelaskan bahwa hasil analisis diperoleh nilai OR 4,168 pada (CI 95% : 1,76-9,82). Ibu yang mengalami ketuban pecah dini berisiko 4.168 kali lebih besar mengalami persalinan prematur dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami ketuban pecah dini. Nilai batas bawah dan batas atas tidak mencakup angka satu, oleh karena itu maka risiko yang ditimbulkan dinyatakan bermakna. sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ibu yang mengalami KPD memiliki risiko yang bermakna terhadap kejadian persalinan prematur dan memiliki risiko untuk melahirkan dengan persalinan prematur sebanyak 4.168 kali. Begitu juga dengan penelitian oleh Hanifah (2017) di RSUD Wonosari dengan jumlah sampel 486 responden yang menjelaskan bahwa KPD merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur dengan nilai OR 1,753 pada (CI 95% ; 1,119-2,74)6 yang berarti ibu dengan KPD berisiko 1,7 kali mengalami kejadian persalinan prematur.

Menurut peneliti, KPD menyebabkan terjadinya persalinan preterm hal ini disebabkan fungsi air ketuban adalah sebagai pelindung bayi selama dalam kandungan, jika ketuban sudah pecah maka dapat mengakibatkan komplikasi infeksi pada ibu dan bayi yang dapat menyebabkan persalinan preterm. Ketuban pecah dalam persalinan secara umum disebabkan oleh kontraksi uterus dan peregangan berulang. Selaput ketuban pecah karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh. Pecahnya selaput ketuban berhubungan

dengan terjadinya perubahan proses biokimia yang terjadi dalam kolagen matriks ekstraseluler amnion, korion, dan apoptosis membrane janin. Membran janin dan desidua bereaksi terhadap stimulti seperti infeksi dan peregangan selaput ketuban dengan memproduksi mediyot yaitu prostaglandin, sitokin, dan protein hormone sehingga dapat mencetus terjadinya persalinan prematur. Ketuban pecah dini (KPD) pada persalinan preterm disebabkan oleh faktor eksternal, seperti infeksi yang menjalar dari vagina. Wanita dengan infeksi intrauterin akan melahirkan lebih awal dibandingkan pada wanita yang tidak memiliki infeksi intrauterin. Apabila hal ini dihubungkan dengan proses patogenik yang dapat menimbulkan persalinan preterm, maka infeksi mikroorganismenya akan memproduksi sitokin proinflamasi yang akan merangsang diproduksinya prostaglandin sehingga memicu persalinan lebih awal (Cunningham : 2006).

7. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Riwayat Abortus

Riwayat abortus dalam penelitian ini yaitu riwayat keguguran atau terminasi kehamilan pada trimester pertama. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,455 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 0,127 dan *upper limit* (UL) sebesar 1,626. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan riwayat abortus merupakan faktor protektif mengalami kejadian persalinan prematur dan risiko ini tidak mempunyai kebermaknaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Herdiman & Irwinda (2021) di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusomo menjelaskan bahwa hasil analisis OR diperoleh nilai 0,835 pada (CI 95% ; 0,554-1,258) berarti riwayat abortus merupakan faktor protektif terjadinya persalinan prematur. Hal ini disebabkan karena ibu yang pernah

mengalami abortus pada kehamilan sebelumnya menjadi lebih memperhatikan kesehatannya selama kehamilan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Sitio, dkk (2019) di RSUD Wonosari menjelaskan bahwa hasil analisis diperoleh nilai OR 4,752 pada (CI 95% : 1,946-9,11,605) oleh karena itu riwayat abortus merupakan faktor risiko terjadinya persalinan prematur. Ibu yang memiliki riwayat abortus berisiko 4,752 kali lebih besar mengalami persalinan prematur dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat abortus.

Ibu dengan riwayat abortus mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya persalinan prematur, abortus berulang dan berat badan lahir rendah (BBLR). Hal ini disebabkan oleh dinding rahim merupakan tempat melekatnya plasenta, salah satu fungsi dari plasenta adalah tempat untuk melekatnya hormon – hormon (korionik gonadotropin, esterogen dan progesteron) jika plasenta tidak bekerja dengan baik, maka pembuatan hormon akan terganggu, jika kadar progesteron menurun akan memicu kontraksi dan dapat mengalami kejadian persalinan prematur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa riwayat abortus merupakan faktor protektif dari

kejadian persalinan prematur. Menurut peneliti, hal ini bisa dipengaruhi oleh sikap ibu dalam mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya abortus

seperti pemeriksaan antenatal rutin dan teratur untuk memantau kondisi kehamilan.

8. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini yaitu pendidikan yang terakhir ditempuh oleh ibu. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,920 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 0,413 dan *upper limit* (UL) sebesar 2,049. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan yang berisiko tinggi merupakan faktor protektif mengalami kejadian persalinan prematur dan risiko ini tidak mempunyai kebermaknaan.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian oleh Trisa, dkk (2019) di RSUP Mohammad Hoesin Palembang dengan jumlah sampel 505 responden yang menjelaskan bahwa hasil analisis diperoleh nilai OR 1,226 pada (CI 95 % ; 0,992-1,516). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Eliza, dkk (2017) di RSUD Dr.Abdul Moeloek dengan jumlah sampel kasus 62 dan sampel kontrol 62 yang menjelaskan bahwa Dari hasil analisis diperoleh nilai OR sebesar 2,748 (95% CI: 1,316-5,737) yang artinya ibu hamil dengan tingkat pendidikan rendah berisiko 2,748 kali lebih tinggi untuk mengalami persalinan preterm dibandingkan dengan ibu hamil dengan dengan tingkat pendidikan tinggi.

Tingkat pendidikan ada kaitannya dengan luasnya wawasan yang dimiliki oleh seorang ibu. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka wawasan yang dimiliki ibu akan semakin tinggi sehingga memiliki pola pikir yang terbuka untuk menerima pengetahuan baru yang dianggap bermanfaat dalam masa kehamilannya. Pendidikan yang tinggi, ibu akan dapat memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kehamilannya antara lain pentingnya pemeriksaan kehamilan untuk

memproteksi dini dan mendapat intervensi yang tepat sejak awal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor protektif terhadap kejadian persalinan prematur. Faktor protektif merupakan faktor pelindung yaitu semakin rendah tingkat pendidikan seorang ibu maka semakin mencegah terjadinya kejadian persalinan prematur. Hal ini bisa saja terjadi karena pengetahuan ibu tidak hanya berpacu pada tingkat akademiknya akan tetapi dengan kemajuan zaman semua akses informasi baik itu mengenai kehamilan dapat terakses dengan mudah di internet serta peran bidan juga ikut serta dalam memberikan KIE pada ibu hamil.

9. Hasil Analisis Uji Multivariat

Berdasarkan hasil uji multivariat dengan menggunakan uji regresi logistik yang menunjukkan bahwa 5 variabel yang diikutkan dalam uji regresi berganda logistik didapatkan hasil bahwa nilai variabel dengan nilai $p < 0,25$ yaitu variabel usia, paritas, status gizi, anemia, dan KPD. Oleh karena semua variabel memiliki nilai $p < 0,25$ maka untuk faktor risiko dengan nilai terbesar yaitu variabel KPD dengan nilai $p 0,012 < 0,25$ dengan nilai OR 3,322 (CI 95% = 1,302 – 8,477).

KPD yaitu keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan, bila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu maka disebut ketuban pecah dini pada kehamilan prematur atau *preterm premature rupture*

of membrane (PPROM) Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan faktor utama penyebab infeksi pada kehamilan. Berdasarkan hal tersebut dapat

diperkirakan infeksi intrauterin akibat KPD dapat menyebabkan persalinan prematur.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini mengambil data dari berkas rekam medik sehingga validitas data sangat bergantung dengan validitas data yang terdapat dalam rekam medik.
2. Dalam pengumpulan data diperoleh catatan medik yang tidak lengkap datanya sehingga data tersebut dianggap sebagai missing cases dan tidak bisa diikutsertakan dalam penelitian.
3. Data yang digunakan adalah data sekunder, Adapun penggunaan data primer dilakukan dengan cara menghubungi responden via online hal ini dikarenakan terbatasnya waktu penelitian, dan kondisi pandemic sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan langsung dengan responden.
4. Jumlah sampel penelitian yang kurang mencukupi karena banyaknya variabel yang diteliti sehingga mempengaruhi kemaknaan hasil pengolahan data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yaitu analisis faktor risiko kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021, maka diperoleh kesimpulan antara lain :

1. Ibu dengan usia berisiko tinggi memiliki risiko 2,084 kali mengalami kejadian persalinan prematur dibandingkan dengan ibu dengan usia risiko rendah tetapi risiko ini tidak mempunyai kebermaknaan terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.
2. Ibu dengan paritas yang berisiko tinggi memiliki risiko 2,330 kali mengalami kejadian persalinan prematur dibandingkan dengan paritas berisiko rendah dan risiko ini bermakna terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.
3. Jarak kehamilan merupakan faktor protektif sebesar 0,625 tetapi tidak bermakna terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.
4. Status gizi merupakan faktor protektif sebesar 0,480 tetapi tidak bermakna terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.
5. Ibu dengan status anemia memiliki risiko 2,155 kali mengalami kejadian persalinan prematur dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami anemia tetapi risiko ini tidak bermakna terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.
6. Ibu yang mengalami ketuban pecah dini (KPD) memiliki risiko 2,760 mengalami persalinan prematur dibandingkan ibu yang tidak mengalami ketuban pecah dini (KPD) dan risiko ini bermakna terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.
7. Riwayat abortus merupakan faktor protektif sebesar 0,455 tetapi tidak bermakna terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.

8. Tingkat pendidikan merupakan faktor protektif sebesar 0,920 tetapi tidak bermakna terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021.
9. Faktor risiko yang paling berisiko terhadap kejadian persalinan prematur yaitu variabel ketuban pecah dini di RSUD Haji Makassar tahun 2021.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya yaitu menambahkan variasi variabel sehingga dapat diperoleh gambaran secara keseluruhan sehingga data yang didapat dapat dimanfaatkan oleh instansi kesehatan dalam merencanakan penyusunan strategi dalam menurunkan angka kejadian persalinan prematur.
2. Bagi petugas kesehatan agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta melakukan pencatatan dan pelaporan yang lengkap sehingga memudahkan peneliti untuk meneliti suatu kasus.
3. Bagi masyarakat terkhusus ibu hamil yang memiliki faktor risiko agar mampu mengenali faktor-faktor kejadian persalinan prematur sehingga dapat melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap kejadian persalinan prematur.

DAFTAR PUSTAKA

- Araya. BM. *Association Between Preterm Birth and Its Subtypes and Maternal Sociodemographic Characteristics During The Post-transitional Phase In A Developing Country With A Cery High Human Development Index Public Health*. Elsevier. Vol 147. 2017.
- Anggita.I. & Masturoh.N. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Profil Kesehatan Ibu dan Anak*. Badan Pusat Statistik, Jakarta. 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 – Laporan Pendahuluan*. Jakarta: BPS. 2017.
- Bahraen. R. *Tinjauan Bayi Prematur Dalam Islam*. *Kesehatan Islami*. 2013. Diakses melalui : <https://muslim.or.id/12017-tinjauan-bayi-prematur-dalam-islam.html>
- Behrman. RE & Butler. AS. *Preterm Birth : Causes, Consequences and Prevention*. Committee on Understanding Premature Birth and Assuring Healthy Outcomes Board on Health Sciences Policy. Institute of Medicine of National Academies. The National Academies Press. 2006.
- Berghella.V. *Obstetric Evidence Based Guidelines and Management*. Blackwell Publishing. Philadelphia. USA. 2017.
- Caroline. B.T & Widiastuti.I. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Persalinan Preterm Di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Kebayiran Baru*

Jakarta Selatan Periode Januari-Juni 2017. *Jurnal Ilmu Keperawatan Nasional* Vol 1(1). 2019.

Cunningham FG. *Obstetri William*. Jakarta: EGC. 2006.

Dinkes Sulsel. *Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020*. Sulawesi Selatan ; 2018.

Dinkes Sulsel. *Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020*. Sulawesi Selatan ; 2020.

Eliza. dkk. *Determinan Persalinan Prematur di RSUD Dr. Abdul Moeloek*. *Jurnal Kesehatan* Vol VIII(2). 2017.

Ermalena. *Indikator Kesehatan SDGs Di Indonesia*. The 4th ICTOH. 2017.

Fransiska, dkk. *Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur Di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun 2010-2013*. *Jurnal Departemen Epidemiologi FKM USU*. Vol 1 (1). 2015.

Hidayati.L. *Faktor Risiko Terjadinya Persalinan Prematur Mengancam di RSUD DR.Soetomo Surabaya*. Skripsi, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Surabaya. 2016.

Herdiman. J. & Irwinda R. *Karakteristik Maternal dan Faktor Obstetrik Terkait Persalinan Prematur di RSUPN Dr. Cipto Manunkusumo*. *Tarumanagara Medical Journal* Vol 3(2). 2021.

Herman.S & Joewono. H.T. *Buku Acuan Persalinan Kurang Bulan (Prematur)*. Kendari : Yayasan Avicenna Kendari. 2020.

Heryana.A. *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*. Researchgate : Universitas Esa Unggul. 2020.

Irmawati. *Pengaruh Anemia Ibu Hamil dengan Terjadinya Persalinan Prematur di Rumah Sakit ibu dan Anak Budi Kemuliaan Jakarta*. Tesis FKM UI. Jakarta. 2010.

Jayani, D.H. *10 Penyebab Utama Kematian Balita di Dunia*. Institute for Health Metrics and Evaluation. 2018. Diakses melalui : ourworldindata.org

Kemenkes RI. *Strategi Penurunan Aki dan Neonatal*. Dirjen Kesehatan : Jakarta. 2019. Diakses melalui : <http://www.kesmas.kemkes.go.id/portal/konten/~rilis-berita/021517-di-rakesnas-2019-dirjen-kesmas-paparkan-strategi-penurunan-aki-dan-neonatal>

Koniyo. M.A. dkk. *Determinan Kejadian kelahiran Bayi Prematur Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo*. Bagian Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. 2016.

Maita. L. *Faktor ibu Yang Mempengaruhi Persalinan Prematur di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru*. Jurnal Kesehatan Komunitas Vol 2(1). 2012.

Margarita & German. *Risk Factors for Premature Birth In a Hospital*. Rev. Latino Am.Enfermagem. 2016.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an*. Vol 12. Jakarta : Lentera Hati. 2002.

Niswah. F.I. *Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur Di RSUD Tugurejo Semarang*. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Universitas Negeri Semarang. 2016.

Oxom. H.F. Ilmu Kebidanan : Patologi dan Fisiologi Persalinan. Yogyakarta : Yayasan Essentia Medika. 2010.

Paembonan. N. dkk. *Faktor Risiko Kejadian Kelahiran Prematur Di RSIA Siti Fatimah Kota Makassar*. Bagian Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. 2014.

Paraskevi. etc. *Maternal Socioeconomic Factors and The Risk of Premature Birth and Low Birth Weight in Cyprus : a case control study*. Reproductive Health. 2018.

Purnamasari. N.I. *Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur Di RSUP Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin. 2017.

Prawirohardjo, S. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta K PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2010.

Prawirohardjo. S. *Ilmu Kebidanan*. Ed 4. Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2020.

Rahmawati. D. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Persalinan Preterm Di RSUD Dr.Moewardi Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.

Robinson. JN & Norwitz ER. *Preterm Birth : Risk Factors and Interventions for Risk Reduction*. CharLockwood CJ (ed). 2017. Diakses melalui : http://www.uptodate.com/contents/preterm-birth-risk-factors-and-interventions-for-risk-reduction/print?source=see_link>

Saifuddin, A.B. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*.

Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2010.

Safiuddin, Abdul B. dkk. *Kelainan dalam Lamanya Kehamilan*. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2020.

Sitio.S.F.C. dkk. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Persalinan Prematur Di RSUD Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2016-2017*. RG Gynecology and Obstetrics. Repository Poltekkesjogja. 2019.

Smith. GC . et.al. *Interpregnancy Interval and Risk of Preterm Birth and Neonatal Death : Retrospective Cohort Study*. Bmj. 2003.

Spong. CY. *Prediction and Prevention Of Recruitment Spontaneous Preterm Birth*. Obstetric and Gynecology, Vol 110. 2007.

Stylianou. R.P. et al. *Maternal Socioeconomic Factors And The Risk Of Premature Birth And Low Birth Weight In Cyprus : A Case-Control Study*. Reproductive Health 15. 2018.

Sugiyono. *Metode Peneitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung. 2013.

Suhaedah. *Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an*. Jurusan Tafsir Hadis UIN Alauddin Makassar. 2013.

Suspimantari. C. *Faktor Risiko Prematuritas Yang Berpengaruh Terhadap Luaran Maternal Dan Perinatal Berdasarkan Usia Kehamilan*. Jurnal Medika Muda. 2014.

Suwito. *Penciptaan dan Pembentukan Janin Menurut Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Ilmu Kedokteran*. The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 2(02). 2012.

Temu. etc. *Maternal and Obstetric Factors Associated with Preterm Delivery at a Referral Hospital In Northern-Eastern Tanzania*. Asian Pacific Journal of reproduction. Vol 5 (5). 2016.

Trisa. Y. dkk. *Prevalensi dan Faktor Risiko Persalinan Preterm di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Periode 1 Januari 2015-31 Desember 2017*. Sriwijaya Journal of Medicine Vol 2 (2). 2019.

Wijayanegara. H. dkk. *Prematuritas*. Bandung : Refika Aditama. 2009.

Widarsa, T. Dkk. *Analisis Data untuk Variabel Outcome Berskala Nominal Dua Kategori (Binary Outcome)*. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. 2016

WHO. *Born too Soon : The Global Action Report on Preterm Birth*. 2010. Diakses melalui : <http://www.who.int/>

WHO. *Kelahiran premature: Bayi premature*. 2017. Diakses melalui : http://www.who.int/qa/preterm_babies/en/

WHO. *Global Health Observatory Country Views: Indonesia Statistics Summary (2002-Present)*. 2017. Diakses melalui : <http://apps.who.int/gho/data/node.country.country-IDN>.

WHO. *WHO Recommendations on Interventions To Improve Preterm Birth*. WHO Press. WHO Library Cataloguing in Publication Data. Geneva Switzerland. 2015.

LAMPIRAN

A. Lampiran I



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 24352/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : **izin Penelitian**

Kepada Yth.
Direktur RSUD Haji Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4553/FKIK/PP.00.9/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ISNADA RAHIM**
Nomor Pokok : 70600118019
Program Studi : Pend. Dokter
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" **ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN PERSALINAN PREMATUR DI RSUD HAJI MAKASSAR TAHUN 2021** "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 Desember 2021 s/d 22 Januari 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 Desember 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringatan

SIMAP PTSP 13-12-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



B. Lampiran II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : B- 4553/Un.06/FKIK/PP.00.9/12/2021 Gowa, 13 Desember 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Direktur RSUD Haji Makassar
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Isnada Rahim
N I M : 70600118019
Fakultas/Jurusan : Pendidikan Dokter
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Mutiara Blok P No.19, BTN Baliase, RT 011/RW 004, Baliase,
Marawola, Sigi, Sulawesi Tengah

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Analisis Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur Di RSUD Haji Makassar Tahun 2021".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. dr. Rini Fitriani, M.Kes
2. dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di RSUD Haji Makassar, terhitung mulai 13 Desember 2021 s/d 22 Januari 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan,

Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa

C. Lampiran III



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : B- 4553/Un.06/FKIK/PP.00.9/12/2021 Gowa, 13 Desember 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan

Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Isnada Rahim
N I M : 70600118019
Fakultas/Jurusan : Pendidikan Dokter
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Mutiara Blok P No.19, BTN Baliase, RT 011/RW 004, Baliase,
Marawola, Sigi, Sulawesi Tengah

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Analisis Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur Di RSUD Haji Makassar Tahun 2021".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. dr. Rini Fitriani, M.Kes
2. dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di RSUD Haji Makassar, terhitung mulai 28 November 2021 s/d 31 Desember 2021.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan. 

Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa

D. Lampiran IV

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.177/KEPK/FKIK/XII/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : ISNADA RAHIM
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN PERSALINAN PREMATUR DI RSUD
HAJI MAKASSAR TAHUN 2021"**

*"ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR PREMATURE BIRTH AT THE HAJI HOSPITAL MAKASSAR IN
2021"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values. 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits. 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022.

This declaration of ethics applies during the period December 3rd, 2021 until December 3rd, 2022.

3 Desember 3rd, 2021
Chairperson.

DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

E. Lampiran V (Master Table)

No	No RM	Nama	Ura	Paritas	Jarak Kehamilan (thru)	Status Gluk	Anemia (g/dL)	KPD	Abortus	Pendidikan	Keberangan
1	160062	No K	32	5	8	26,67	15,6	tidak	tidak	SD	Prematur
2	93177	No H	26	5	1	22,36	10,9	tidak	tidak	SMA	Prematur
3	242638	No H	37	6	2	19,73	10,3	tidak	tidak	SMA	Prematur
4	243308	No K	27	1	0	22,82	10,6	ya	tidak	SMP	Prematur
5	201926	No S	44	6	2	25	7,3	tidak	tidak	SD	Prematur
6	255355	No SH	29	1	0	22,76	10,2	ya	tidak	S1	Prematur
7	255887	No Y	35	3	14	32,88	8,5	tidak	tidak	SMA	Prematur
8	256229	No Z	23	1	0	16	7,6	ya	tidak	S1	Prematur
9	256281	No Z	31	2	7	24,34	10,6	ya	tidak	SD	Prematur
10	245108	No H	21	1	0	21,5	11,7	ya	tidak	SMA	Prematur
11	246775	No H	23	2	2	22,67	12,3	ya	tidak	SD	Prematur
12	248274	No S	36	1	0	31,78	10,9	tidak	tidak	SMP	Prematur
13	248964	No P	18	1	0	21,5	11,2	ya	tidak	SMP	Prematur
14	240880	No M	36	5	2	31,57	11,2	tidak	tidak	SD	Prematur
15	225926	No No	18	2	1	22,95	11,1	ya	tidak	SMP	Prematur
16	252276	No S	18	1	0	17,89	8,6	ya	tidak	SMA	Prematur
17	165758	No S	22	3	13	23,43	12,9	ya	tidak	SMP	Prematur
18	255181	No S	24	2	2	22,34	11,5	tidak	tidak	SD	Prematur
19	207953	No RA	19	1	0	20,88	10,3	tidak	tidak	SMP	Prematur
20	259306	No S	40	5	5	21	11,5	tidak	tidak	SD	Prematur
21	259176	No H	25	2	2	18,3	10,8	ya	tidak	DI	Prematur
22	243509	No S	16	1	0	18,6	9,6	ya	tidak	SMP	Prematur
23	261575	No H	24	1	0	25	10,1	ya	tidak	S1	Prematur
24	263102	No V	34	1	0	24,14	11,4	tidak	tidak	SMA	Prematur
25	218574	No H	18	1	0	20	11,5	tidak	tidak	SMP	Prematur
26	266623	No M	21	2	2	22,2	9,1	ya	tidak	SMA	Prematur
27	269216	No M	41	4	6	25,39	10,4	tidak	tidak	SMA	Prematur
28	270864	No S	20	1	0	18,9	9,7	ya	tidak	SMP	Prematur
29	241640	No A	27	2	4	24,14	8,4	tidak	tidak	SMA	Prematur
30	271954	No AR	17	1	0	22,07	9,9	tidak	tidak	SMP	Prematur
31	163000	No H	29	5	1	27,26	10,2	ya	tidak	SMA	Prematur
32	259173	No PA	42	1	0	26,7	9,5	ya	tidak	SMA	Prematur
33	262605	No M	27	4	2	21,1	11,7	tidak	tidak	SD	Prematur
34	262740	No H	32	3	2	18,6	8,3	ya	tidak	SD	Prematur
35	264028	No Anis	21	2	1	20,7	9,5	ya	tidak	SMA	Prematur
36	224869	No RA	34	5	2	22,82	12,7	ya	tidak	SD	Prematur
37	170411	No R	31	3	7	24,44	11,6	tidak	tidak	SMA	Prematur
38	122381	No H	32	3	5	22,03	11,7	ya	tidak	SMA	Prematur
39	276783	No H	27	2	1	18,75	10,6	ya	tidak	SD	Prematur
40	122381	No H	32	4	3	24,44	11,1	ya	tidak	SMA	Prematur
41	251909	No A	19	2	1	20,5	8,2	tidak	tidak	SD	Prematur
42	137952	No M	29	3	2	23,42	9,1	tidak	tidak	DI	Prematur
43	278100	No H	25	1	0	21,92	10,3	tidak	tidak	S1	Prematur
44	280520	No V	18	1	0	19,22	12,3	tidak	tidak	SMP	Prematur
45	282375	No M	33	3	5	24,03	10,4	tidak	tidak	SMP	Prematur
46	270201	No S	25	3	1	22,06	10,3	tidak	ya	SMA	Prematur
47	283375	No D	33	2	6	23,3	9,1	tidak	ya	S1	Prematur
48	213832	No H	18	1	0	22,06	10,5	tidak	tidak	SMP	Prematur
49	255319	No Ad	16	1	0	29,47	10,1	tidak	tidak	SD	Matur
50	255353	No M	24	2	2	23,3	12,3	tidak	tidak	SMP	Matur
51	255361	No K	23	2	2	22,89	10,1	tidak	tidak	SMA	Matur
52	162877	No An	26	2	5	25,33	11,8	tidak	tidak	SMP	Matur
53	154897	No R	27	4	5	25,33	15,5	ya	tidak	SD	Matur
54	128838	No R	30	2	4	22,82	11,4	tidak	tidak	SMA	Matur
55	253286	No S	32	4	1	24,55	11,5	tidak	ya	SMP	Matur
56	255752	No Ad	30	1	0	31,3	10,4	ya	tidak	S1	Matur
57	254966	No Y	39	2	6	26	7,1	ya	tidak	SMP	Matur
58	255501	No H	33	5	2	29,96	10,3	ya	tidak	SD	Matur
59	255578	No S	22	2	2	28,61	11,2	tidak	tidak	SMA	Matur
60	238745	No S	30	5	1	24,89	12,1	tidak	ya	SMP	Matur
61	255627	No H	29	2	5	32,46	8,9	tidak	tidak	S1	Matur
62	97177	No M	37	3	3	24,52	11,1	tidak	tidak	S1	Matur
63	255835	No S	30	2	2	20,04	14,2	tidak	tidak	SMA	Matur
64	182165	No S	23	2	4	20,2	10,6	ya	tidak	SMA	Matur
65	256055	No S	19	2	2	20,66	8	tidak	tidak	SMP	Matur
66	254966	No No	39	2	6	25,8	7,1	tidak	tidak	SMP	Matur
67	248436	No S	42	6	3	21,11	10,7	tidak	tidak	SD	Matur
68	56242	No M	28	3	2	27,88	11,5	tidak	tidak	S1	Matur
69	256208	No S	35	4	6	32	11,3	tidak	tidak	SD	Matur
70	256255	No P	17	0	0	22,21	11	tidak	tidak	SMA	Matur
71	213826	No P	33	4	2	23,55	9,5	tidak	tidak	SMA	Matur
72	256370	No R	21	3	1	22,89	10,7	tidak	ya	SMA	Matur
73	256484	No W	34	3	1	24,77	11,6	ya	tidak	SD	Matur
74	211205	No H	32	4	8	27,55	12,2	tidak	tidak	SMP	Matur
75	253862	No S	34	5	3	25,1	8,1	tidak	tidak	SMP	Matur
76	151036	No H	29	2	6	26,91	10,2	tidak	tidak	SMP	Matur
77	256177	No H	34	2	9	26,67	10,9	tidak	tidak	S1	Matur
78	256988	No R	21	2	9	25,42	11,6	tidak	tidak	SMP	Matur
79	272452	No H	25	1	0	24,14	10,2	tidak	tidak	SMA	Matur
80	272618	No M	29	1	0	24,14	11	ya	tidak	SMA	Matur
81	211934	No R	26	4	2	24,21	8,4	tidak	tidak	SMP	Matur
82	272792	No R	29	4	2	23,55	10,6	tidak	tidak	SD	Matur
83	266013	No I	24	1	0	20,77	9,5	tidak	tidak	SMA	Matur
84	273426	No H	33	5	1	23,2	10,1	tidak	ya	SMP	Matur
85	273443	No H	20	2	3	22,93	9,7	ya	tidak	SMP	Matur
86	273498	No S	25	2	7	23,42	11,5	tidak	tidak	SMP	Matur
87	238099	No R	22	2	2	20,77	11	ya	tidak	SMA	Matur
88	190720	No H	30	3	3	24,34	12,7	tidak	tidak	S1	Matur
89	286672	No R	35	2	7	22,22	11,3	tidak	tidak	SMA	Matur
90	267438	No S	26	3	2	23,72	11,2	tidak	ya	SMP	Matur
91	286862	No S	37	3	12	25,88	9,7	ya	tidak	SMP	Matur
92	189885	No S	35	2	6	23,53	11,6	tidak	tidak	SMP	Matur
93	286928	No H	41	7	7	23,9	11,3	tidak	tidak	SD	Matur
94	286889	No A	19	2	1	19,14	12,7	ya	tidak	SMP	Matur
95	286897	No H	32	2	3	23,3	12,4	ya	tidak	S1	Matur
96	286835	No V	24	2	7	22,43	11,4	tidak	tidak	SMA	Matur

F. Lampiran VI

4. Analisis Univariat

Usia * Kejadian persalinan Prematur

Crosstab

		Kejadian persalinan Prematur			
		Persalinan Prematur	Persalinan Aterm	Total	
Usia	Risiko Tinggi	Count	17	10	27
		Expected Count	13.5	13.5	27.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	35.4%	20.8%	28.1%
	Risiko Rendah	Count	31	38	69
		Expected Count	34.5	34.5	69.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	64.6%	79.2%	71.9%
Total	Count	48	48	96	
	Expected Count	48.0	48.0	96.0	
	% within Kejadian persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%	

Paritas * Kejadian persalinan Prematur

Crosstab

		Kejadian persalinan Prematur			
		Persalinan Prematur	Persalinan Aterm	Total	
Paritas	Risiko Tinggi	Count	29	19	48
		Expected Count	24.0	24.0	48.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	60.4%	39.6%	50.0%
	Risiko Rendah	Count	19	29	48
		Expected Count	24.0	24.0	48.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	39.6%	60.4%	50.0%
Total	Count	48	48	96	
	Expected Count	48.0	48.0	96.0	
	% within Kejadian persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%	

Jarak Kehamilan * Kejadian persalinan Prematur

Crosstab

		Kejadian persalinan Prematur		Total	
		Persalinan Prematur	Persalinan Aterm		
Jarak Kehamilan	Risiko Tinggi	Count	25	27	52
		Expected Count	26.0	26.0	52.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	52.1%	56.3%	54.2%
	Risiko Rendah	Count	23	21	44
		Expected Count	22.0	22.0	44.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	47.9%	43.8%	45.8%
Total	Count	48	48	96	
	Expected Count	48.0	48.0	96.0	
	% within Kejadian persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%	

Status Gizi * Kejadian persalinan Prematur

Crosstab

		Kejadian persalinan Prematur		Total	
		Persalinan Prematur	Persalinan Aterm		
Status Gizi	Risiko Tinggi	Count	10	17	27
		Expected Count	13.5	13.5	27.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	20.8%	35.4%	28.1%
	Risiko Rendah	Count	38	31	69
		Expected Count	34.5	34.5	69.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	79.2%	64.6%	71.9%
Total	Count	48	48	96	
	Expected Count	48.0	48.0	96.0	
	% within Kejadian persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%	

Anemia * Kejadian persalinan Prematur

Crosstab

		Kejadian persalinan Prematur			
		Persalinan Prematur	Persalinan Aterm	Total	
Anemia	Risiko Tinggi	Count	31	22	53
		Expected Count	26.5	26.5	53.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	64.6%	45.8%	55.2%
	Risiko Rendah	Count	17	26	43
		Expected Count	21.5	21.5	43.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	35.4%	54.2%	44.8%
Total	Count	48	48	96	
	Expected Count	48.0	48.0	96.0	
	% within Kejadian persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%	

KPD * Kejadian persalinan Prematur

Crosstab

		Kejadian persalinan Prematur			
		Persalinan Prematur	Persalinan Aterm	Total	
KPD	Risiko Tinggi	Count	23	12	35
		Expected Count	17.5	17.5	35.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	47.9%	25.0%	36.5%
	Risiko Rendah	Count	25	36	61
		Expected Count	30.5	30.5	61.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	52.1%	75.0%	63.5%
Total	Count	48	48	96	
	Expected Count	48.0	48.0	96.0	
	% within Kejadian persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%	

Riwayat Abortus * Kejadian persalinan Prematur

Crosstab

		Kejadian persalinan Prematur			
		Persalinan Prematur	Persalinan Aterm	Total	
Riwayat Abortus	Risiko Tinggi	Count	4	8	12
		Expected Count	6.0	6.0	12.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	8.3%	16.7%	12.5%
	Risiko Rendah	Count	44	40	84
		Expected Count	42.0	42.0	84.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	91.7%	83.3%	87.5%
Total	Count	48	48	96	
	Expected Count	48.0	48.0	96.0	
	% within Kejadian persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%	

Tingkat Pendidikan * Kejadian persalinan Prematur

Crosstab

		Kejadian persalinan Prematur			
		Persalinan Prematur	Persalinan Aterm	Total	
Tingkat Pendidikan	Risiko Tinggi	Count	24	25	49
		Expected Count	24.5	24.5	49.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	50.0%	52.1%	51.0%
	Risiko Rendah	Count	24	23	47
		Expected Count	23.5	23.5	47.0
		% within Kejadian persalinan Prematur	50.0%	47.9%	49.0%
Total	Count	48	48	96	
	Expected Count	48.0	48.0	96.0	
	% within Kejadian persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%	

5. Analisis Bivariat

Usia * Kejadian persalinan Prematur

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	2.525 ^a	1	.112		
Continuity Correction ^b	1.855	1	.173		
Likelihood Ratio	2.547	1	.110		
Fisher's Exact Test				.173	.086
Linear-by-Linear Association	2.499	1	.114		
N of Valid Cases	96				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	2.084	.836	5.197
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Prematur	1.401	.949	2.069
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Aterm	.673	.393	1.149
N of Valid Cases	96		

Paritas * Kejadian persalinan Prematur

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	4.167 ^a	1	.041		
Continuity Correction ^b	3.375	1	.066		
Likelihood Ratio	4.197	1	.040		
Fisher's Exact Test				.066	.033
Linear-by-Linear Association	4.123	1	.042		
N of Valid Cases	96				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Paritas (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	2.330	1.028	5.279
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Prematur	1.526	1.005	2.318
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Aterm	.655	.431	.995
N of Valid Cases	96		

Jarak Kehamilan * Kejadian persalinan Prematur

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.168 ^a	1	.682		
Continuity Correction ^b	.042	1	.838		
Likelihood Ratio	.168	1	.682		
Fisher's Exact Test				.838	.419
Linear-by-Linear Association	.166	1	.684		
N of Valid Cases	96				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Jarak Kehamilan (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	.845	.378	1.888
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Prematur	.920	.617	1.371
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Aterm	1.088	.726	1.631
N of Valid Cases	96		

Status Gizi * Kejadian persalinan Prematur

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	2.525 ^a	1	.112		
Continuity Correction ^b	1.855	1	.173		
Likelihood Ratio	2.547	1	.110		
Fisher's Exact Test				.173	.086
Linear-by-Linear Association	2.499	1	.114		
N of Valid Cases	96				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Status Gizi (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	.480	.192	1.197
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Prematur	.673	.393	1.149
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Aterm	1.401	.949	2.069
N of Valid Cases	96		

Anemia * Kejadian persalinan Prematur

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	3.412 ^a	1	.065		
Continuity Correction ^b	2.696	1	.101		
Likelihood Ratio	3.433	1	.064		
Fisher's Exact Test				.100	.050
Linear-by-Linear Association	3.376	1	.066		
N of Valid Cases	96				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Anemia (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	2.155	.949	4.893
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Prematur	1.479	.959	2.283
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Aterm	.687	.460	1.025
N of Valid Cases	96		

KPD * Kejadian persalinan Prematur

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.441 ^a	1	.020		
Continuity Correction ^b	4.496	1	.034		
Likelihood Ratio	5.511	1	.019		
Fisher's Exact Test				.033	.017
Linear-by-Linear Association	5.384	1	.020		
N of Valid Cases	96				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for KPD (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	2.760	1.163	6.552
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Prematur	1.603	1.091	2.356
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Aterm	.581	.351	.962
N of Valid Cases	96		

Riwayat Abortus * Kejadian persalinan Prematur

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1.524 ^a	1	.217		
Continuity Correction ^b	.857	1	.355		
Likelihood Ratio	1.550	1	.213		
Fisher's Exact Test				.355	.178
Linear-by-Linear Association	1.508	1	.219		
N of Valid Cases	96				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Abortus (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	.455	.127	1.626
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Prematur	.636	.279	1.453
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Aterm	1.400	.885	2.215
N of Valid Cases	96		

Tingkat Pendidikan * Kejadian persalinan Prematur

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.042 ^a	1	.838		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.042	1	.838		
Fisher's Exact Test				1.000	.500
Linear-by-Linear Association	.041	1	.839		
N of Valid Cases	96				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.50.

b. Computed only for a 2x2 table

	Risk Estimate		
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Tingkat Pendidikan (Risiko Tinggi / Risiko Rendah)	.920	.413	2.049
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Prematur	.959	.643	1.431
For cohort Kejadian persalinan Prematur = Persalinan Aterm	1.043	.698	1.556
N of Valid Cases	96		


6. Analisis Multivariat

Block 1: Method = Enter

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a Usia	.703	.515	1.864	1	.172	2.020	.736	5.542
Paritas	.800	.465	2.961	1	.085	2.226	.895	5.537
Status Gizi	-1.033	.532	3.768	1	.052	.356	.125	1.010
Anemia	.819	.468	3.069	1	.080	2.269	.907	5.674
KPD	1.201	.478	6.311	1	.012	3.322	1.302	8.477
Constant	-3.773	1.578	5.717	1	.017	.023		

a. Variable(s) entered on step 1: Usia, Paritas, Status Gizi, Anemia, KPD.



G. Lampiran VII (Dokumentasi Penelitian)



Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Isnada Rahim
Tempat, Tanggal Lahir : Parigi, 8 Juli 1999
Alamat : Jalan Bangkala, BTP Blok F No. 147
Agama : Islam
Nomor HP : 0813 4377 3668
E-mail : isnadarahim578@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1. SDN INPRES BINANGGA, PALU, SULAWESI TENGAH (2005–2009)
2. SDN SIDOREJO, YOGYAKARTA (2009–2010)
3. SMPN 2 KALASAN, YOGYAKARTA (2010–2012)
4. SMPN 2 PALU, SULAWESI TENGAH (2012-2013)
5. SMA AL-AZHAR MANDIRI PALU, SULAWESI TENGAH (2014-2017)
6. UIN ALAUDDIN MAKASSAR, PRODI PENDIDIKAN DOKTER (2018)

Riwayat Prestasi

1. Juara 1 Storytelling tkt. Sekolah
2. Finalis Math Challenge tkt. Provinsi Sulawesi Tengah
3. 25 besar penulis cerpen terbaik tkt. Nasional by Kaifa Publishing
4. Juara II LCTB (Lomba Cepat Tepat Biologi) tkt. Provinsi Sulawesi Tengah

Riwayat Organisasi

1. OSIS SMPN 2 KALASAN (Div. Kesenian dan Kebudayaan)
2. RISMA (Remaja Islam Masjid)
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Fisioterapi
4. Anggota Divisi Hubungan Luar TBM An-Nafis
5. Anggota Divisi Pendidikan dan Penelitian Himpunan Mahasiswa Jurusan Kedokteran 2020-2021
6. Bendahara Alauddin Medical Research Club (AMRC) Periode 2020-2021
7. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Kedokteran 2021-2022

Pengalaman Mengikuti Ekstrakurikuler dan Pelatihan

1. Pramuka
2. Gamelan
3. Patroli Keamanan Sekolah
4. Basic Islamic Leadership I dan II HMJ-Kedokteran UINAM