


**HUBUNGAN LINGKAR LENGAN ATAS (LILA) IBU HAMIL
TERHADAP ANTROPOMETRI BAYI BARU LAHIR (BBL)
DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK ANANDA KOTA
MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada Program
Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

RIZKA AMALIA
NIM: 70600116009

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizka Amalia
NIM : 70600116009
Tempat/Tgl. Lahir : Bau-Bau, 20 Oktober 1998
Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Mannuruki II Lorong 5A, No. 2.
Judul : Hubungan Lingkar Lengan Atas (Lila) Ibu Hamil Terhadap Antropometri Bayi Baru Lahir (BBL) di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Februari 2020

Penyusun,



Rizka Amalia

NIM: 70600116009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Hubungan Lingkar Lengan Atas (Lila) Ibu Hamil Terhadap Antropometri Bayi Baru Lahir (BBL) di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar”, yang disusun oleh Rizka Amalia, NIM: 70600116009, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 24 Februari 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.


Makassar, 24 Februari 2020 M

30 Jumadil Akhir 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Andi Faradilah, Sp.GK., M.Kes	(.....)
Pembimbing I:	dr. Azizah Nurdin, Sp. OG., M. Kes	(.....)
Pembimbing II:	dr. Jelita Inayah Sari. M.Biomed	(.....)
Penguji I	: dr. Andi Irhamnia Sakinah	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Ahmad M. Sewang, M.A	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi sebagai *Rahmatan Lil'alam* beserta para sahabat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar, rasa hormat dan penghargaan atas semua bantuan dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penyusun selama menjalankan pendidikan.
3. Ibu dr. Darmawansyih, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan Ibu dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penyusun menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar serta seluruh staf prodi kedokteran yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Ibu dr. Azizah Nurdin, Sp.OG, M.Kes selaku pembimbing I dan Ibu dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed selaku pembimbing II, yang telah sabar dan

ikhlas meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang tepat.

5. Ibu dr. Andi Irhamnia Sakinah selaku penguji kompetensi dan Bapak Prof. Dr. Ahmad M. Sewang, M.A. selaku penguji integrasi keilmuan.
6. Kepada pimpinan seluruh staff Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar yang telah memberikan izin dan membantu peneliti dalam terlaksananya penelitian ini.
7. Kepada kedua orangtua saya, kakak, om, tante, dan saudara-saudara sepupu saya atas kasih sayang, doa beserta dukungan semangat dan bantuan moril maupun materilnya sehingga penyusun dapat meraih gelar Sarjana Kedokteran.
8. Kepada teman-teman Nucle1 angkatan 2016 PSPD UIN Alauddin Makassar, banyak hal yang telah kita lalui bersama semoga kita semua makin kompak.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt. Aamiin! Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Februari 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR SKEMA.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	5
C. <i>Hipotesis</i>	5
D. <i>Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian</i>	6
E. <i>Kajian Pustaka</i>	8
F. <i>Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian</i>	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. <i>Status Gizi Ibu Hamil</i>	12
B. <i>Antropometri Bayi Baru Lahir (BBL)</i>	18
C. <i>Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Terhadap Antropometri Bayi Baru Lahir (BBL)</i>	24
D. <i>Kerangka Pikir</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. <i>Jenis Penelitian</i>	28
B. <i>Lokasi dan Waktu Penelitian</i>	28

C. Pendekatan Penelitian.....	28
D. Populasi dan Sampel.....	28
E. Jenis dan Sumber Data	30
F. Metode Pengumpulan Data.....	30
G. Instrumen Penelitian	31
H. Metode Analisis Data	31
I. Alur Penelitian	32
J. Etika Penelitian	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan	39
C. Hambatan Penelitian.....	51
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	58




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Responden Berdasarkan Usia, Lama Pendidikan, Status Kerja, dan Paritas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar Tahun 2020.....	33
Tabel 4.2	Distribusi Antropometri Bayi Responden di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar Tahun 2020.....	35
Tabel 4.3	Analisis Bivariat Hubungan LILA Ibu dengan Berat Badan Lahir Bayi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar Tahun 2020.....	35



DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 Kerangka Teori.....	26
Skema 2.2 Kerangka Konsep.....	27
Skema 3.1 Alur Penelitian.....	31



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Uji Statistik
- Lampiran 2 Data Hasil Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Form Pengantar Penelitian
- Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian
- Lampiran 7 Dokumentasi
- Lampiran 8 Riwayat Hidup Peneliti



ABSTRAK

Nama : Rizka Amalia
NIM : 70600116009
Pembimbing I : dr. Azizah Nurdin, Sp. OG, M. Kes
Pembimbing II : dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed
Judul Skripsi : Hubungan Lingkar Lengan Atas (LILA) Ibu Hamil
Terhadap Antropometri Bayi Baru Lahir (BBL) di Rumah
Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar

Penilaian status gizi dapat diketahui dengan metode antropometri dengan menilai beberapa parameter. Parameter antropometri yang umum diukur pada bayi baru lahir (BBL) antara lain adalah berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada. Ukuran kelahiran BBL dipengaruhi oleh status gizi ibu selama kehamilan. Status gizi ibu hamil dapat diketahui dengan mengukur lingkar lengan atas (LILA). Karena LILA relatif stabil selama kehamilan dan tidak terpengaruh oleh edema, LILA dapat mencerminkan status gizi sejak awal kehamilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara LILA ibu hamil terhadap antropometri BBL di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Ananda Kota Makassar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik dengan rancangan *cross sectional*. Sebanyak 200 responden ibu hamil yang menjalani persalinan di RSIA Ananda Kota Makassar diambil dengan metode *purposive sampling*. Data penelitian bersumber dari data primer yaitu data demografi, LILA ibu hamil dan antropometri bayi yang meliputi berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada diukur segera setelah lahir. Analisis data menggunakan uji *Chi-Square* pada program komputer IBM SPSS 23.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LILA ibu hamil berhubungan bermakna dengan panjang badan ($p = 0,000$), lingkar kepala ($p = 0,000$), dan lingkar dada ($p = 0,013$), tetapi tidak ditemukan hubungan bermakna antara LILA ibu hamil dengan berat badan ($p = 0,127$) bayi baru lahir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa LILA ibu hamil berhubungan dengan panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada bayi baru lahir, tetapi LILA ibu hamil tidak berhubungan dengan berat badan bayi baru lahir.

Kata kunci : LILA, antropometri, bayi baru lahir

ABSTRACT

Nama : Rizka Amalia
Student ID Number : 70600116009
Supervisor I : dr. Azizah Nurdin, Sp. OG, M. Kes
Supervisor II : dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed
Thesis Title : Relationship of Maternal Mid Upper Arm Circumference (MUAC) to Anthropometry of Newborn at Ananda Woman and Children Hospital in Makassar City

Assessment of nutritional status can be determined through anthropometric methods by assessing several parameters. Anthropometric parameters commonly measured in newborns include body weight, body length, head circumference, and chest circumference. The newborn's body dimensions are influenced by maternal nutritional status. The maternal nutritional status can be determined by measuring mid upper arm circumference (MUAC). Because MUAC is relatively stable during pregnancy and not affected by edema, MUAC can reflect nutritional status since early pregnancy. The aim of this study was to determine relationship between maternal MUAC and anthropometry of newborn at Ananda Women and Children Hospital Makassar.

The method used in this study was analytic with cross sectional design. A total of 200 pregnant women underwent delivery at Ananda Women and Children Hospital Makassar were taken by purposive sampling method. The study data were sourced from primary data i.e. demographic data, maternal MUAC and newborn anthropometry which included weight, length, head circumference, and chest circumference that were measured immediately after birth. Data were analyzed using the Chi-Square test on the IBM SPSS 23.

The results of this study showed a significant relationship between maternal MUAC with body length ($p = 0,000$), head circumference ($p = 0,000$), and chest circumference ($p = 0,013$) of newborns, but no significant relationship was found between maternal MUAC with body weight of newborns ($p = 0.127$). This study conclude that maternal MUAC is related to body length, head circumference, and chest circumference of newborns, but maternal MUAC is not related to body weight of newborns.

Keywords : MUAC, anthropometry, newborn baby

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2030, dunia berkomitmen mencapai target *Sustainable Development Goals* atau SDG's yang di antaranya memuat tujuan pembangunan di bidang kesehatan. Salah satu target yang ingin dicapai adalah peningkatan status gizi ibu dan anak. Masalah kesehatan global di bidang gizi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang menjadi target perbaikan *World Health Organization* (WHO) dan juga *United Nations Children's Fund* (UNICEF) di antaranya adalah tingginya angka kejadian *stunting*, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), *overweight*, dan *wasting* (WHO, 2018).

Data WHO menunjukkan angka yang memprihatinkan terkait kondisi gizi kesehatan ibu dan anak di seluruh dunia. Pada tahun 2016, jumlah anak penderita *stunting* sebesar 155 juta, dengan 56% berada di Asia. Kejadian BBLR pada Bayi Baru Lahir (BBL) atau neonatus pada periode 2005-2010 sebesar 15%. Pada tahun 2016, jumlah anak di bawah usia 5 tahun (balita) yang mengalami *overweight* (berat badan lebih) diperkirakan sebanyak 41 juta anak. Adapun balita yang dikategorikan *wasting* pada tahun 2016 sebesar 52 juta anak, dengan 69% di antaranya adalah anak yang berasal dari Asia (WHO, 2018).

Di Indonesia sendiri, masalah gizi dan kesehatan ibu dan anak masih merupakan permasalahan kompleks. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2015, prevalensi Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 346 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup. Adapun prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada balita mencapai 19,5 % dan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) sebesar 32,9 %. Terkait kondisi kesehatan ibu,

Risikesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada wanita hamil sebesar 17,3%. Kisaran persentase tertinggi risiko KEK ini ditemukan pada wanita hamil dalam rentang usia 15-34 tahun. Data tersebut menandakan bahwa kondisi kesehatan di Indonesia khususnya ditinjau dari aspek gizi belum dalam keadaan baik (Kemenkes RI, 2018).

Jumlah bayi lahir hidup di kota Makassar sepanjang tahun 2018 sebesar 25.911 kelahiran hidup dengan 100% persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan. Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Ananda adalah salah satu rumah sakit ibu dan anak swasta di kota Makassar dengan jumlah persalinan yang cukup tinggi. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 4.906 persalinan ditolong rumah sakit ini (Dinkes Kota Makassar, 2018).

Tumbuh kembang seorang anak berlangsung sangat pesat pada periode seribu hari pertama kehidupan. Periode ini dimulai sejak konsepsi hingga anak berusia dua tahun. Status gizi ibu sejak konsepsi hingga melahirkan memengaruhi status gizi janin yang akan dilahirkan. Kerusakan yang timbul di periode ini bersifat *irreversible* atau tidak dapat dibenahi di fase kehidupan berikutnya serta memengaruhi kondisi kesehatan anak hingga usia dewasa (Herlina, 2018).

Penilaian status gizi dapat diketahui dengan antropometri. Pengukuran antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan menilai beberapa parameter. Parameter disini merupakan ukuran tunggal dari tubuh manusia. Parameter antropometri yang dapat diukur antara lain berat badan, panjang/tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, dan lingkar dada (Harjatmo, 2017).

Salah satu pengukuran status gizi ibu hamil yang lazim dilakukan adalah lingkar lengan atas (LILA). Dari LILA dapat diketahui adanya risiko menderita kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil atau wanita usia subur (WUS).

Ambang batas hasil pengukuran LILA WUS untuk menetapkan risiko KEK di Indonesia adalah 23,5 cm. Pengukuran status gizi dengan menggunakan lingkaran lengan atas direkomendasikan pada beberapa penelitian karena dianggap praktis, efisien, dan memerlukan alat yang mudah diperoleh (Safaa, 2016).

Wanita dengan status gizi rendah berisiko terhadap risiko anemia dalam kehamilan, hipertensi, keguguran dan kematian janin selama kehamilan, persalinan prematur dan kematian ibu. Untuk bayi baru lahir, gizi kurang dapat menyebabkan berat badan lahir rendah, retardasi pertumbuhan janin dalam rahim yang mungkin memiliki konsekuensi pada perkembangan bayi baru lahir, serta berefek buruk pada perkembangan sistem kekebalan tubuh bayi baru lahir (Safaa, 2016). Sedangkan wanita dengan status gizi berlebihan memiliki risiko tinggi terhadap berbagai komplikasi antenatal, intrapartum, postpartum dan neonatal seperti preeklampsia, persalinan prematur, induksi persalinan, seksio sesarea, perdarahan post partum, diabetes mellitus gestasional, hipertensi yang diinduksi kehamilan, dan anemia yang berkaitan dengan ibu. Sedangkan untuk neonatal adalah berupa mikrosomia, makrosomia, kecil atau besar untuk usia kehamilan, skor APGAR <7 yang rendah, masuk ke *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU), retardasi pertumbuhan intrauterin, kematian perinatal, dan kematian perinatal (Pawalia, 2015).

Dalam Al-Quran dijelaskan tentang kondisi seorang ibu hamil. Hal ini tertuang dalam QS. An-Nisa/4: 9 seperti yang tertulis di bawah ini.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka

khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat di atas menerangkan bahwa kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Di sini hukum Islam menjelaskan bahwa hendaknya orang tua merasa takut apabila meninggalkan atau menelantarkan keturunannya karena dapat mengancam kesejahteraan anak mereka. Yang termasuk kondisi meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah ini adalah orang tua yang membiarkan anaknya tidak memperoleh nutrisi yang adekuat sesuai kebutuhannya sehingga tumbuh kembang optimal anak tidak tercapai. Para orang tua ini hendaklah bertanggung jawab terhadap anaknya, bahkan sejak anak masih berupa janin di dalam kandungan. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman hendaklah bertakwa kepada Allah dan selalu berlindung dari hal-hal yang dimurkai Allah (Kemenag RI, 2015).

Terdapat keterkaitan antara status gizi ibu dengan ukuran kelahiran bayi baru lahir. Penelitian yang dilakukan oleh Nagmoti di India pada tahun 2015 terhadap 216 ibu yang menjalani persalinan menunjukkan bahwa status gizi ibu ditinjau dari Indeks Massa Tubuh (IMT) memengaruhi parameter antropometri bayi baru lahir yang meliputi pertumbuhan berat, panjang badan, lingkar dada, dan lingkar kepala neonatus. Penelitian yang dilakukan oleh Putri di Aceh pada tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara LILA ibu hamil dengan berat badan lahir bayi. Penelitian yang menilai LILA ibu dalam kaitannya dengan berat ibu dan berat neonatal sudah cukup banyak, namun belum banyak data yang diketahui terkait hubungan LILA dengan parameter antropometrik bayi baru lahir seperti berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan lingkar dada. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai hubungan antara status gizi ibu hamil ditinjau dari LILA terhadap

antropometri bayi baru lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Ananda Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara Lingkar Lengan Atas (LILA) ibu hamil terhadap antropometri Bayi Baru Lahir (BBL) di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H₀)

- a. Tidak ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan berat badan bayi baru lahir.
- b. Tidak ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan panjang badan bayi baru lahir.
- c. Tidak ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan lingkar kepala bayi baru lahir.
- d. Tidak ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan lingkar dada bayi baru lahir.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a. Ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan berat badan bayi baru lahir.
- b. Ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan panjang badan bayi baru lahir.
- c. Ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan lingkar kepala bayi baru lahir.
- d. Ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan lingkar dada bayi baru lahir.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Lingkar Lengan Atas (LILA)

Definisi : Lingkar lengan atas (LILA) adalah gambaran keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Ukuran LILA digunakan untuk skrining kekurangan energi kronis pada ibu hamil.

Alat ukur : Pita LILA

Cara ukur : Pada lengan tidak aktif, lingkarkan pita pada pertengahan lengan atas (jarak antara acromion dan olecranon dibagi dua) lalu baca hasilnya dan catat.

Skala ukur : Kategorikal

Kriteria objektif

Normal : $LILA \geq 23,5$ cm

KEK : $LILA < 23,5$ cm

b. Antropometri Bayi Baru Lahir

1. Berat Badan

Definisi : Berat badan bayi yang diukur segera setelah persalinan dalam satuan gram.

Alat ukur : Timbangan bayi

Cara ukur : Bayi ditempatkan di atas timbangan lalu dilakukan pembacaan berat badan kemudian dicatat hasilnya.

Skala ukur : Kategorikal

Kriteria objektif

Normal : ≥ 2500 gram

BBLR : < 2500 gram

2. Panjang Badan

Definisi : Satuan panjang dari pangkal kaki sampai ujung kepala yang dinyatakan dalam centimeter (cm).

Alat ukur : Infantometer

Cara ukur : Bayi ditempatkan pada alas yang datar, lalu ukur panjang badan dari kepala sampai tumit dengan kaki/badan bayi diluruskan, kemudian catat hasilnya.

Skala ukur : Kategorikal

Kriteria objektif

Normal : ≥ 48 cm

Tidak normal : < 48 cm

3. Lingkar Kepala

Definisi : Lingkar kepala bayi sejajar bagian kepala belakang (*protuberantia occipitalis*) dan *glabella* yang diukur segera setelah persalinan dalam satuan centimeter (cm).

Alat ukur : Pita lingkar kepala

Cara ukur : Lingkarkan pita pengukur melalui bagian paling menonjol di bagian kepala belakang (*protuberantia occipitalis*) dan dahi (*glabella*), lalu baca dan catat hasilnya.

Skala ukur : Kategorikal

Kriteria objektif

Normal : ≥ 32 cm

Tidak normal : < 32 cm

4. Lingkar Dada

Definisi : Lingkar dada bayi yang diukur segera setelah persalinan dalam satuan centimeter (cm).

Alat ukur : Pita pengukur

Cara ukur : Lingkarkan pita pengukur dari dada ke punggung kembali ke dada (melalui kedua puting susu), lalu baca dan catat hasilnya.

Skala ukur : Kategorikal

Kriteria objektif

Normal : ≥ 30 cm

Tidak normal : < 30 cm

2. Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing study*). Pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan sifat dan hubungan antar variabel yang akan diuji yang didasarkan dengan teori yang ada. Penelitian ini berupaya menganalisis hubungan antara LILA ibu hamil terhadap antropometri bayi baru lahir ditinjau dari berat badan, panjang badan, lingkaran kepala, dan lingkaran dada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar.

E. Kajian Pustaka

Ayu Rahma Putri dan Al Muqsith (2015). Penelitian analitik yang berjudul Hubungan Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil dengan Berat Badan Lahir Bayi di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dan Rumah Sakit Tk IV IM.07.01. Lhokseumawe Tahun 2015. Variabel independen yang digunakan adalah LILA ibu hamil, dan variabel dependen adalah berat badan lahir bayi. Dari 85 sampel, diperoleh hasil bahwa ibu hamil dengan LILA normal sebanyak 78

orang (91,8%) dan LILA <23,5 cm atau berisiko KEK sebanyak 7 orang (8,2%). Berat lahir bayi sebagian besar dikategorikan normal, yaitu sebanyak 74 bayi (87,1%). Sebanyak 8 bayi (9,4%) dikategorikan BBLR. Sehingga disimpulkan terdapat hubungan antara LILA ibu hamil dengan berat badan lahir bayi (nilai signifikansi $p = 0,006$).

Nagmoti, et al (2015). Studi analitik mengenai Hubungan Indeks Massa Tubuh Ibu dan Antropometri Bayi Baru Lahir di India. Variabel independen yang digunakan adalah IMT ibu hamil. Sedangkan variabel independen yang diteliti adalah IMT ibu hamil, sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah parameter antropometri bayi baru lahir, meliputi berat badan, panjang badan, lingkaran lengan atas, lingkaran kepala, dan lingkaran dada. Diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan antara IMT dan berat badan ibu dengan semua parameter antropometrik neonatal kecuali lingkaran lengan atas, namun tidak ada hubungan antara tinggi ibu dengan parameter antropometrik neonatal.

Rut CF Weku, et al (2016). Penelitian analitik-retrospektif yang berjudul Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) Awal Kehamilan dengan Luaran Maternal Neonatal. Variabel independen yang diteliti adalah IMT awal kehamilan, sedangkan variabel dependen yang diteliti di antaranya adalah berat badan bayi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan hubungan bermakna antara IMT awal kehamilan dengan berat badan lahir bayi.

Yusuf Tanri Liang (2017). Pada penelitian observasional berjudul Pengaruh Status Gizi Ibu Hamil Terhadap Hasil Luaran Bayi di kota Makassar, sampel sebanyak 96 ibu hamil diteliti. Variabel independen adalah status gizi ibu yang diukur dengan menggunakan indikator LILA. Sedangkan variabel dependen adalah hasil luaran bayi yang meliputi berat bayi lahir, usia kehamilan, dan asfiksia neonatorum. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan

antara status gizi ibu hamil dengan berat bayi lahir, usia kehamilan, dan asfiksia neonatorum.

F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Lingkar Lengan Atas (LILA) ibu hamil terhadap antropometri Bayi Baru Lahir (BBL) di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui karakteristik status gizi ibu hamil ditinjau dari LILA.
- 2) Mengetahui karakteristik antropometri BBL ditinjau dari berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada.
- 3) Membuktikan hubungan antara LILA ibu hamil terhadap berat badan BBL.
- 4) Membuktikan hubungan antara LILA ibu hamil terhadap panjang badan BBL.
- 5) Membuktikan hubungan antara LILA ibu hamil terhadap lingkar kepala BBL.
- 6) Membuktikan hubungan antara LILA ibu hamil terhadap lingkar dada BBL.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian serta menerapkan ilmu yang

telah didapat selama studi khususnya mengenai hubungan LILA ibu hamil terhadap antropometri bayi baru lahir.

b. Bagi pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan guna menambah pengetahuan dan dapat pula dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang akan datang di bidang kesehatan ibu dan anak.

c. Bagi instansi

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi Rumah Sakit dan instansi terkait dalam pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak serta mengarahkan kebijaksanaan perbaikan gizi masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Status Gizi Ibu Hamil

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi (Susilowati, 2016). Status gizi dapat diklasifikasikan menjadi status gizi normal dan malnutrisi. Status gizi normal merupakan keadaan tubuh yang mencerminkan keseimbangan antara konsumsi dan penggunaan gizi oleh tubuh (adekuat). Sedangkan malnutrisi merupakan keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif maupun absolut satu atau lebih zat gizi. Malnutrisi terdiri atas empat bentuk, yakni *undernutrition*, *specific deficiency*, *overnutrition*, dan *imbalance*. *Undernutrition* yaitu kekurangan konsumsi pangan secara relatif atau absolut untuk periode tertentu. *Specific deficiency* adalah kekurangan zat gizi tertentu. *Overnutrition* yaitu kelebihan konsumsi pangan untuk periode tertentu. Adapun *imbalance* adalah keadaan disproporsi zat gizi (Hasdianah, 2013).

1. Penilaian Status Gizi Ibu Hamil

Penentuan status gizi pada ibu hamil dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan memantau pertambahan berat badan selama hamil, mengukur Lingkar Lengan Atas (LILA), dan mengukur kadar Hb. Pengukuran LILA dimaksudkan untuk menentukan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada wanita hamil atau wanita usia subur (WUS). WUS adalah wanita usia 15 – 45 tahun (Kemenkes RI, 2014).

Lingkar Lengan Atas (LILA) adalah indikator klinis status gizi yang umum digunakan dalam penentuan resiko KEK. Sebagian besar pengukuran antropometrik didasarkan pada dua model kompartemen komposisi tubuh, yaitu massa bebas lemak dan massa lemak. Massa bebas lemak terdiri dari otot

rangka, otot non-rangka, jaringan lunak, dan kerangka. Massa bebas lemak ini terdiri dari campuran air, mineral, dan protein. Karena sebagian besar protein disimpan dalam otot, teknik untuk menilai massa otot dapat digunakan sebagai indikator cadangan protein tubuh. Lingkar lengan bagian atas (LILA) mengandung lemak subkutan dan otot, perubahan pada LILA dapat mencerminkan perubahan massa otot, perubahan lemak subkutan, atau keduanya. Individu cenderung memiliki jumlah lemak subkutan yang lebih kecil, sehingga dalam pengaturan sumber daya dalam tubuh, perubahan pada LILA lebih cenderung mencerminkan perubahan dalam massa otot. Dalam pengaturan ini, pengukuran LILA dapat berguna sebagai indikator kekurangan gizi atau kelaparan protein-energi (Tang, 2016).

Alat yang digunakan merupakan suatu pita pengukur yang terbuat dari *fiberglass* atau jenis ukuran kertas tertentu berlapis plastik. Pengukuran ini rutin dilakukan karena mudah dan dapat dilakukan oleh orang awam. Cara mengukurnya yaitu:

- a. Pengukuran dilakukan pada pertengahan lengan atas sisi yang tidak aktif.
- b. Titik tengah dihitung jarak dari acromion ke olecranon kemudian dibagi dua.
- c. Lengan dalam keadaan bergantung dengan bebas, tidak ditutupi dengan kain atau pakaian.
- d. Lingkarkan pita LILA pada titik tengah lengan tersebut dengan pita tidak boleh ditarik terlalu kencang ataupun longgar (Supariasa, 2016).

Pengukuran LILA pada kelompok wanita usia subur merupakan salah satu metode untuk mendeteksi secara dini risiko untuk KEK. Adapun tujuan pengukuran ini yakni sebagai berikut.

- a. Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi KEK.
- b. Meningkatkan partisipasi petugas lintas sektor dalam upaya meningkatkan gizi WUS yang menderita KEK.
- c. Mengetahui risiko KEK WUS, baik pada calon ibu dan ibu hamil, untuk skrining wanita yang berisiko melahirkan bayi BBLR.
- d. Mengembangkan ide-ide baru di masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.
- e. Memobilisasi layanan kesehatan untuk kelompok sasaran WUS yang menderita KEK (Supariasa, 2016).

Di Indonesia, ambang batas LILA dengan risiko KEK adalah 23,5 cm. Hasil ukur LILA pada bagian merah pita atau kurang dari 23,5 cm menunjukkan risiko KEK dan berisiko melahirkan BBLR (Putri, 2012).

2. Gizi Ibu Hamil

Status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan berpengaruh terhadap status gizi ibu dan bayi. Kebutuhan gizi janin berasal dari ibu, oleh karenanya pertumbuhan dan perkembangan janin sangat dipengaruhi oleh asupan gizi ibu. Beberapa faktor yang memengaruhi gizi ibu hamil antara lain adalah status gizi sebelum kehamilan, usia, paritas, jarak kehamilan, status sosial ekonomi, konsumsi makanan dan suplementasi, riwayat penyakit, riwayat konsumsi rokok (Supariasa, 2016).

Kebutuhan nutrisi ibu hamil meningkat selama kehamilan agar dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada saat ini pula terjadi perubahan-perubahan pada tubuh ibu terkait dengan struktur dan metabolisme dalam tubuh. Perubahan anatomi, fisiologi, dan biokimia pada tubuh ibu berdampak terhadap diet dan kebutuhan nutrisinya. Perubahan ini berguna

untuk mengatur metabolisme ibu, mendukung pertumbuhan janin, persiapan ibu untuk melahirkan, kelahiran, dan menyusui (Arisman, 2009).

Perubahan kebutuhan gizi ibu hamil tergantung dari kesehatannya. Dasar pengaturan gizi pada saat kehamilan adalah adanya penyesuaian faali selama kehamilan itu sendiri yakni sebagai berikut.

a. Perubahan metabolik

Pada trimester ketiga, laju metabolik basal meningkat 10 sampai 20 persen. Ini berkaitan dengan peningkatan kebutuhan energi total selama kehamilan yang mencapai 300 kkal per hari. Selama masa ini terjadi penambahan berat badan ibu yang rata-rata mencapai sekitar 12,5 kg.

b. Perubahan fungsi organ pencernaan

Akibat adanya perubahan hormonal, yaitu peningkatan estrogen, progesteron, dan HCG menyebabkan kondisi seperti mual muntah, penurunan motilitas lambung sehingga makanan diserap lebih lama, peningkatan absorpsi nutrien, dan motilitas usus yang menimbulkan masalah obstipasi.

c. Peningkatan faal ginjal

Peningkatan fungsi kerja ginjal menyebabkan pada pertengahan kehamilan banyak cairan yang disekresikan, sedangkan pada bulan-bulan akhir kehamilan cairan yang diekskresi lebih sedikit.

d. Peningkatan volume dan plasma darah

Hipervolemia pada minggu ke 32 sampai 34 kehamilan mencapai 40-45%, diatas volume darah tak hamil. Kondisi ini mengakibatkan penurunan hemodilusi dan konsentrasi hemoglobin (Kusmiyati, 2009)

Nutrisi yang adekuat dibutuhkan oleh ibu hamil dalam menunjang kehamilan. Makanan ibu diubah menjadi bentuk simpanan untuk memenuhi kebutuhan energi, perbaikan jaringan, dan pertumbuhan baru. Asupan nutrisi yang dianjurkan bagi ibu hamil meliputi:

a. Kalori

Ibu hamil memerlukan tambahan energi sebesar 80.000 kalori. Untuk itu, dianjurkan pada ibu hamil untuk meningkatkan asupan kalori 100 sampai 300 kkal perhari. Kalori dibutuhkan sebagai energi. Apabila asupan kalori kurang memadai maka tubuh akan memetabolisasi protein yang semestinya dipakai untuk peran vital dalam pertumbuhan dan perkembangan janin.

b. Protein

Protein yang dibutuhkan wanita hamil ditambah dengan kebutuhan pertumbuhan dan *remodelling* janin, uterus, plasenta, mammae, serta penambahan volume darah ibu.

c. Kalsium

Ibu hamil menahan sekitar 30 gram kalsium, yang sebagian besar disalurkan ke janin pada tahap lanjut kehamilan. Jumlah ini hanya menggambarkan 2,5 % dari kalsium total ibu, yang kebanyakan ada di tulang, dan mudah dimobilisasi untuk pertumbuhan janin. Sehingga ibu hamil membutuhkan suplementasi 1,5 – 2,0 gram kalsium per hari.

d. Zat besi

Selama kehamilan dibutuhkan sekitar 1000 mg besi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 mg besi secara aktif dipindahkan ke janin dan plasenta. Sebagian besar besi dipakai pada paruh kedua kehamilan, maka kebutuhan besi menjadi besar setelah pertengahan kehamilan

mencapai 6 sampai 7 mg per hari. Sebagian besar wanita tidak memiliki simpanan besi yang memadai untuk kebutuhan ini. Maka disarankan bahwa wanita hamil mendapat suplementasi besi fero sebanyak 30-60 mg per hari.

e. Asam folat

Suplementasi asam folat terbukti telah menurunkan kejadian cacat tabung saraf pada janin. Asam folat juga diperlukan bagi pematangan sel. Jumlah yang dibutuhkan oleh ibu hamil ialah 400 miligram per hari (Cunningham, 2017).

Ibu yang mengalami kekurangan gizi selama kehamilan akan mengalami berbagai masalah, baik pada ibu maupun janin.

a. Dampak kekurangan gizi pada ibu

Dapat terjadi risiko dan komplikasi pada ibu antara lain pendarahan, anemia, penambahan berat badan ibu tidak secara normal, dan mudah terserang penyakit infeksi.

b. Dampak kekurangan gizi pada persalinan

Dapat timbul masalah dalam persalinan, seperti persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (premature), pendarahan post partum, serta risiko sectio sesarea cenderung meningkat.

c. Dampak kekurangan gizi pada janin

Malnutrisi pada ibu hamil dapat memengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menyebabkan abortus, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, kematian janin dalam rahim, dan lahir dengan berat lahir rendah (BBLR) (Sulistyoningsih, 2012).

B. Antropometri Bayi Baru Lahir (BBL)

Secara asal kata, antropometri berasal dari bahasa Yunani, yakni *anthropos* yang artinya manusia, dan *metric* yang artinya ukuran, sehingga antropometri diartikan sebagai ukuran tubuh manusia. Antropometri (*anthropometric*) didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ukuran tubuh manusia. Metode antropometrik diartikan sebagai pengukuran bagian tubuh dan fisik manusia. Penilaian status gizi dengan menggunakan metode antropometrik ialah penentuan status gizi dengan melakukan pengukuran pada tubuh manusia. Parameter pengukuran antropometrik sering digunakan untuk status gizi antara lain adalah berat badan, tinggi atau panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, lapisan lemak di bawah kulit, lingkar lengan atas, dan lain-lain. Dalam penggunaan antropometri sebagai pengukuran status gizi, perlu dipahami terkait konsep dasar pertumbuhan (Wiyono, 2016).

1. Antropometri Sebagai Indikator Status Gizi

Status gizi dan indikator status gizi, keduanya mempunyai definisi berbeda. Status gizi adalah kondisi yang ditimbulkan oleh keseimbangan antara asupan gizi dan kebutuhan tubuh, sementara indikator status gizi tidak hanya mencerminkan asupan gizi tetapi juga terkait dengan pengaruh gizi eksternal, misalnya aktivitas atau penyakit. Sehingga, indikator status gizi dikategorikan sensitif namun tidak selalu spesifik (Nurlinda, 2014).

Ukuran tubuh dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetik. Faktor lingkungan yang berhubungan dengan status gizi meliputi asupan nutrisi dan penyakit infeksi, sedangkan faktor-faktor yang tidak berhubungan langsung adalah aktivitas fisik, pola pertumbuhan tubuh dan jenis kelamin. Di negara berkembang termasuk Indonesia, penyakit menular dan asupan nutrisi adalah faktor utama yang mempengaruhi status gizi anak di bawah 5 tahun

(balita). Gangguan nutrisi kronis yang timbul pada anak-anak akan terlihat akibatnya pada pertumbuhan di masa depan. Karenanya, pertumbuhan sangat berkaitan dengan masalah asupan energi dan protein, maka ukuran tubuh dapat dijadikan refleksi kondisi pertumbuhan dan nutrisi (Sulistyoningsih, 2012).

Antropometri digunakan sebagai indikator status gizi karena beberapa alasan yakni sebagai berikut.

- a. Agar pertumbuhan anak berlangsung baik diperlukan gizi seimbang antara kebutuhan dengan asupan gizinya.
- b. Gizi yang tidak seimbang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Kekurangan zat gizi dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, sebaliknya kelebihan gizi dapat menimbulkan kegemukan dan gangguan metabolisme tubuh (Supariasa, 2016).

Antropometri yang digunakan dalam penilaian status gizi memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Beberapa kelebihan dan kekurangan antropometri digunakan sebagai penentuan status gizi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kelebihan antropometri
 - 1) Prosedur pengukuran umumnya aman digunakan dan cukup sederhana.
 - 2) Proses pengukuran relatif cukup dengan pelatihan sederhana, tidak memerlukan tenaga ahli.
 - 3) Alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran harganya cukup terjangkau, tahan lama, dan mudah dibawa.
 - 4) Hasil pengukuran antropometri tepat dan akurat.
 - 5) Hasil pengukuran antropometri dapat mendeteksi riwayat asupan gizi pada waktu yang lalu.

- 6) Dapat mengidentifikasi tingkat status gizi, mulai dari status gizi baik, sedang, kurang dan buruk.
 - 7) Dapat dipakai untuk skrining dalam mendeteksi siapa saja yang berisiko mengalami gizi kurang atau gizi lebih (Harjatmo, 2017).
- b. Kekurangan antropometri
- 1) Hasil yang diperoleh tidak sensitif, sebab tidak dapat membedakan zat gizi apa yang mengalami defisiensi, terutama zat gizi mikro contohnya kekurangan zink. Apakah anak yang tergolong pendek karena kekurangan zink atau kekurangan zat gizi yang lain.
 - 2) Faktor selain nutrisi dapat mengurangi spesifikasi dan sensitivitas ukuran. Misalnya anak kurus dapat terjadi karena menderita infeksi, padahal asupan gizi normal. Atlet biasanya memiliki berat badan ideal, meskipun asupan nutrisinya lebih dari biasanya.
 - 3) Kesalahan pada saat pengukuran bisa memengaruhi hasil. Kesalahan dapat dikarenakan prosedur pengukuran yang salah, perubahan hasil pengukuran ataupun kesalahan analisis. Sebab kesalahan dapat bersumber dari alat pengukur, pengukur, dan kesulitan mengukur (Harjatmo, 2017).

2. Parameter Pengukuran Antropometri pada Bayi Baru Lahir

Beberapa parameter antropometri yang umumnya diukur pada tubuh manusia dalam menentukan status gizi yakni berat badan, tinggi badan, lingkaran dada, lingkaran kepala, lingkaran lengan atas, dan ukuran lainnya. Hasil ukur antropometri tersebut selanjutnya dirujuk pada standar atau rujukan pertumbuhan manusia (Nagmoti, 2015).

a. Berat Badan

Berat badan merupakan komposisi pengukuran ukuran total tubuh, yakni menggambarkan jumlah lemak, protein, air, dan mineral yang terdapat di dalam tubuh. Berat badan digunakan sebagai parameter antropometri karena beberapa alasan. Alasan tersebut di antaranya adalah pengukuran berat badan mudah dilakukan dan alat ukur untuk menimbang berat badan mudah diperoleh, perubahan berat badan dengan gampang terlihat dalam waktu singkat dan mencerminkan status gizi saat ini (Prawirohardjo, 2010).

Untuk mengukur berat badan dibutuhkan alat ukur yang hasilnya akurat. Agar memperoleh hasil ukur berat badan yang akurat, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki alat ukur, di antaranya alat ukur harus mudah didapat, harga alat relatif murah dan terjangkau, mudah digunakan dan dibawa, cukup aman digunakan, skala jelas dan mudah dibaca dengan ketelitian alat ukur sebaiknya 0,1 kg (terutama alat yang dipakai untuk memonitor pertumbuhan), serta alat selalu dikalibrasi. Beberapa jenis alat ukur berat yang umum digunakan dalam pengukuran berat badan adalah timbangan injak digital, timbangan *detecto*, dacin untuk menimbang berat badan balita, *bathroom scale* (timbangan kamar mandi), dan timbangan lainnya. Hasil pengukuran berat badan normal pada bayi baru lahir adalah 2500 – 4000 gram (Harjatmo, 2017).

b. Tinggi Badan atau Panjang Badan

Tinggi atau panjang badan merupakan satuan tinggi atau panjang dari pangkal kaki sampai ujung kepala. Tinggi badan atau panjang badan menggambarkan keadaan ukuran skeletal sebagai manifestasi dari asupan gizi. Sehingga tinggi atau panjang badan digunakan sebagai parameter

antropometri untuk menggambarkan pertumbuhan linier. Penambahan tinggi badan tidak seperti berat badan. Perubahan tinggi atau panjang badan terjadi dalam waktu yang lama. Sehingga defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan baru akan tampak pada saat yang cukup lama atau disebut akibat masalah gizi kronis (Wiyono, 2016).

Penyebutan tinggi badan dipakai pada anak yang diukur secara berdiri, sedangkan penggunaan istilah panjang badan dipakai pada anak yang belum mampu berdiri sehingga diukur dalam posisi berbaring. Panjang badan bayi baru lahir normal adalah 48-52 cm. Pengukuran pada anak 0-2 tahun menggunakan ukuran panjang badan, sedangkan untuk anak lebih dari 2 tahun menggunakan *microtoise*. Syarat alat ukur yang dipakai dalam mengukur tinggi atau panjang badan ialah harus memiliki ketelitian 0,1 cm. Tinggi badan diukur dengan memakai alat ukur *microtoise*. Kelebihan alat ukur ini adalah mudah digunakan, memiliki ketelitian 0,1 cm dan harganya relatif terjangkau. Kelemahannya yaitu harus dipasang pada dinding setiap kali akan melakukan pengukuran. Adapun panjang badan diukur dengan infantometer (alat ukur panjang badan) (Supariasa, 2016).

c. Lingkar kepala

Untuk mengetahui pertumbuhan otak dipakai lingkar kepala. Lingkar kepala pada bayi dan anak menggambarkan volume intrakranial. Meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan volume otak. Pengukuran ini adalah prediktor terbaik untuk mengetahui perkembangan saraf anak dan pertumbuhan otak secara keseluruhan (Wiyono, 2016).

Lingkar kepala lahir normal adalah kisaran pada 32-37 cm. Sesuai dengan rujukan *Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2000*,

lingkar kepala ideal bayi baru lahir laki-laki adalah 36 cm, bertambah pada umur 3 bulan mencapai 41 cm. Sedangkan ukuran lingkar kepala ideal bayi perempuan adalah 35 cm, meningkat menjadi 40 cm pada umur 3 bulan. Pada umur 4-6 bulan akan meningkat 1 cm per bulan, dan pada usia 6-12 bulan 0,5 cm bertambah per bulan (Supariasa, 2016).

Lingkar kepala diukur dengan cara melingkarkan pita pengukur melalui bagian paling menonjol di bagian belakang kepala (*protuberantia occipitalis*) ke dahi (*glabella*). Saat pengukuran lingkar kepala, sisi pita yang menunjukkan centimeter terletak di bagian dalam guna tidak meningkatkan kemungkinan subjektivitas dari pengukur. Selanjutnya sesuaikan dengan standar pertumbuhan lingkar kepala (Harjatmo, 2017).

d. Lingkar Dada

Menimbang bayi baru lahir adalah metode terbaik untuk deteksi dini berat bayi lahir rendah / BBLR. Tetapi, tidak selamanya tersedia alat penimbangan yang akurat tersedia di lapangan, sehingga pengukuran Lingkar Dada (LiDa) segera setelah kelahiran bayi dilakukan. Lingkar ini dapat digunakan sebagai pengganti hasil ukur berat lahir dalam mendeteksi BBLR. Ambang batas lingkar dada normal pada bayi baru lahir adalah 30 – 38 cm (Harjatmo, 2017).

Pengukuran lingkar dada memiliki manfaat lain yaitu: a) Rasio lingkar dada dan lingkar kepala pada balita dapat dijadikan indikator Kekurangan Energi dan Protein (KEP), b) Pada usia 6 bulan lingkar dada dan lingkar kepala sama, c) Setelah usia ini, lingkar dada tumbuh lebih cepat dibanding lingkar kepala, d) Pada anak-anak dengan KEP pertumbuhan lingkar dada berlangsung lambat, rasio lingkar dada dan lingkar kepala <1 (Wiyono, 2016).

C. Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Terhadap Antropometri Bayi Baru Lahir (BBL)

Status gizi seorang wanita sebelum dan selama kehamilan sangat mempengaruhi tumbuh kembang janin yang sedang dikandung. Seorang ibu dengan status gizi baik atau normal saat sebelum dan selama hamil, maka besar kemungkinan akan melahirkan bayi cukup bulan, sehat, dan berat lahir normal. (Arisman, 2009).

Pertumbuhan janin di dalam kandungan bergantung pada pasokan nutrisi ibu. Tubuh ibu beradaptasi untuk menyimpan dan mempertahankan nutrisi ke janin. Ibu hamil membutuhkan energi lebih, sehingga terjadi penyimpanan glukosa terutama sebagai bentuk glikogen dalam otot dan hati, retensi sebagian asam amino sebagai protein, dan sisanya sebagai lemak. Penyimpanan ini berfungsi untuk memastikan suplai nutrisi yang adekuat bagi tumbuh kembang janin. Plasenta berperan sebagai sensor nutrisi, yang mengatur pengangkutan pasokan nutrisi dari ibu (Cunningham, 2017).

Keliling lengan atas yang diukur pada LILA mengandung lemak subkutan dan otot. Perubahan pada LILA dapat mencerminkan perubahan massa otot, perubahan lemak subkutan, atau keduanya. Individu cenderung memiliki jumlah lemak subkutan yang lebih kecil sehingga dalam pengaturan sumber energi dalam tubuh, perubahan pada LILA lebih mencerminkan perubahan dalam massa otot. Teknik penilaian massa otot dapat digunakan sebagai indikator cadangan protein tubuh (Tang, 2016). LILA juga tidak terpengaruh oleh edema sehingga mencerminkan status gizi masa lalu dan sekarang. LILA berkorelasi dengan IMT namun LILA kurang responsif terhadap perubahan berat badan dalam jangka pendek. Karena itu relatif stabil sepanjang kehamilan, bahkan ketika diukur

terlambat dalam kehamilan, pengukuran LILA dapat lebih mencerminkan status gizi daripada pengukuran berat badan (Hediger, 2017).

Pengukuran ini sangat berguna sebagai indikator gizi pada kehamilan karena hasil ukur LILA pada ibu hamil dengan KEK menggambarkan kondisi defisit energi dan protein pada ibu tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakmampuan ibu untuk memberikan suplai nutrien yang mencukupi pada janin guna mendukung pertumbuhan janin yang optimal. Sehingga hasil ukur LILA ibu cenderung berkorelasi dengan keluaran bayi baru lahir (Hediger, 2017).

Ukuran bayi saat lahir terutama ditentukan oleh ibu, yang pengaruhnya terjadi melalui lingkungan intrauterin dan ditransmisikan ke bayinya. Ada keterkaitan antara fisik tubuh ibu, status gizi, kadar hemoglobin, kelas sosial ekonomi dan paparannya terhadap rokok selama kehamilan dan pertumbuhan intrauterin dengan ukuran kelahiran neonatus (Koepp, 2012).

Dari sebuah studi tentang konsekuensi jangka panjang anak-anak yang lahir dari wanita kekurangan gizi didapatkan bahwa pada ibu dengan kekurangan gizi selama kehamilan tahap pertengahan atau tahap lanjut berdampak pada bayi yang dilahirkan. Bayinya akan lebih ringan, lebih pendek, dan lebih kurus saat lahir (Cunningham, 2017).

Ibu hamil dengan risiko KEK diperkirakan akan melahirkan bayi BBLR. Bayi lahir dengan BBLR akan mempunyai risiko kematian, gizi kurang, gangguan pertumbuhan, dan gangguan perkembangan anak. BBLR merupakan faktor risiko dalam terjadinya peningkatan morbiditas, mortalitas, dan disabilitas neonatus, bayi dan anak yang akan memberikan dampak jangka panjang (Soetjningsih, 2014).


Terlihat korelasi positif yang signifikan antara status gizi ibu dan dimensi kelahiran neonatal yang meliputi berat badan, panjang badan, lingkar kepala,

lingkar dada, dan lingkar lengan atas. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan janin dalam rahim sebagian besar dipengaruhi oleh ukuran ibu (Nagmoti, 2015).

D. Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori

Kerangka teori berdasarkan tinjauan dapat digambarkan sebagai berikut.



Keterangan


LILA : lingkar lengan atas

KEK : kekurangan energi kronik

Skema 2.1 Kerangka Teori

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep berdasarkan rumusan masalah yang ada dan tinjauan pustaka dapat digambarkan sebagai berikut.



Skema 2.2 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu paradigma yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur analitik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 23 Januari 2020.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan *cross sectional*. Dalam penggunaan pendekatan *cross sectional*, pengukuran variabel dependen (antropometri bayi baru lahir) dan variabel independen (LILA ibu hamil) dilakukan secara simultan, satu kali saja dalam waktu yang bersamaan dan tidak dilakukan *follow up*.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil trimester ketiga yang melakukan persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar.

2. Sampel

a. Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang diteliti serta dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan teknik *non-probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Tidak semua pasien memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, terdapat kriteria-kriteria yang telah ditentukan peneliti sebelumnya yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun yang akan menjadi sampel penelitian ini yaitu ibu hamil yang menjalani persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar yang memenuhi kriteria berikut.

1) Kriteria Inklusi

- a) Ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar.
- b) Ibu hamil yang melahirkan cukup bulan.
- c) Ibu hamil yang melahirkan bayi lahir hidup.
- d) Ibu yang bersedia ikut dalam penelitian.

2) Kriteria Eksklusi

- a) Ibu dengan kehamilan ganda (*gemelli*).
- b) Ibu yang menderita penyakit infeksi, anemia berat, diabetes, hipertensi, jantung dan asma.
- c) Ibu yang merokok dan mengonsumsi alkohol saat hamil.

b. Besar Sampel

Besar sampel minimum dalam penelitian ini ditentukan dengan Rumus Lemeshow.

$$n = \frac{Z\alpha^2 \cdot P \cdot Q}{L^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel minimal yang dibutuhkan

Z_{α} : Nilai standar dari distribusi sesuai nilai $\alpha = 5\% = 1.96$

P : Prevalensi *outcome*, karena data belum didapat, maka dipakai 50%

Q : $1-P$

L : Tingkat ketelitian 10%

Berdasarkan rumus, maka:

$$n = \frac{(1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5}{(0.1)^2}$$

$$n = 96$$

Maka jumlah sampel minimum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebanyak 96.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan pengukuran langsung LILA ibu hamil dan antropometri bayi baru lahir.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari responden atau data yang dikumpulkan dari instansi/kantor sudah dalam bentuk informasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari rekam medik Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan setelah meminta perizinan dari pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda dengan mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda. Selanjutnya data dikumpulkan dengan pencatatan rekam medik dan pengukuran langsung pada

subjek penelitian. Setelah itu data dimasukkan ke dalam tabel observasi untuk dilakukan analisis data.

G. Instrumen Penelitian

Alat pengumpul data dan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa tabel-tabel tertentu untuk merekam atau mencatat data yang dibutuhkan.

H. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel yang disertai penjelasan serta disusun dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengolahan data dilakukan setelah pencatatan rekam medik dan pengumpulan kuesioner dengan menggunakan program komputer *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) 23. Pengujian hipotesis menggunakan uji *Chi-Square*. Data disajikan dalam tabel 2×2 . Hasil analisis diketahui dengan melihat nilai p pada uji *Continuity Correction/Yate's Correction* bila tidak terdapat sel yang memiliki nilai *expected count* kurang dari 5. Bila terdapat sel yang memiliki nilai *expected count* kurang dari 5, maka hasil analisis diketahui dengan melihat nilai p pada uji *Fisher Exact*.

Rumus uji *Yate's Correction* yakni sebagai berikut.

$$X^2 = \frac{n(|AD - BC| - \frac{n}{2})^2}{(A + B)(C + D)(A + C)(B + D)}$$

Rumus uji *Fisher Exact* yakni sebagai berikut.

$$P(a, b, c, d)^2 = \frac{(A + B)! (C + D)! (A + C)! (B + D)!}{n! (A)! (B)! (C)! (D)!}$$

Keterangan :


X^2 : nilai Chi-kuadrat

P : nilai probabilitas/signifikansi

n : jumlah sampel

A, B, C, dan D : sel hasil persilangan dua variabel

I. Alur Penelitian



Skema 3.1 Alur Penelitian

J. Etika Penelitian

Hal-hal yang terkait dengan etika penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Menyertakan surat rekomendasi etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.
2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian.
3. Menanyakan kesediaan subjek penelitian untuk terlibat dalam penelitian.
4. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian sehingga diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang dilakukan.
5. Menyampaikan tujuan penelitian dengan ramah kepada subjek penelitian.
6. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengumpulan data.

7. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait sesuai dengan manfaat penelitian yang telah disebutkan sebelumnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda (RSIA) Kota Makassar pada tanggal 13 – 23 Januari 2020. Dalam pengumpulan data, data primer diperoleh melalui pengukuran langsung pada LILA ibu dan antropometri bayi baru lahir. Data sekunder diperoleh dari catatan rekam medik ibu hamil berupa riwayat obstetrik dan data sosiodemografi responden. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel lengkap sebagai berikut.

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Usia, Lama Pendidikan, Status Kerja, dan Paritas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar Tahun 2020

Karakteristik Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Usia		
– < 20 tahun	7	3,50
– 20 – 35 tahun	178	89,00
– > 35 tahun	15	7,50
Lama pendidikan		
– ≤ 9 tahun	10	5,00
– > 9 tahun	190	95,00
Status kerja		
– Bekerja	87	43,50
– Tidak Bekerja	113	56,50
Paritas		
– Primipara	112	56,00
– Multipara	88	44,00
LILA ibu		
– < 23,3 cm (KEK)	16	8,00
– ≥ 23,5 cm (tidak KEK)	184	92,00
Total	200	100,00

Sumber : Data Primer

Data yang diperoleh sebanyak 200 ibu dan bayi lahir hidup. Pengukuran LILA dilakukan dalam rentang waktu ketika inpartu hingga 24 jam pertama pasca persalinan. Selanjutnya antropometri bayi yang meliputi berat badan, panjang badan, lingkar kepala dan lingkar dada diukur segera setelah lahir.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total 200 responden, mayoritas responden berada pada kelompok usia 20 – 35 tahun yakni sebanyak 178 orang (89,00%), diikuti kelompok usia > 35 tahun sebanyak 15 orang (7,50%) dan kelompok usia < 20 tahun sebanyak 7 orang (3,50%).

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total 200 responden, lama pendidikan mayoritas responden adalah > 9 tahun (Diploma, S1, dan S2), yakni sebanyak 190 orang (95,00%). Sedangkan responden dengan lama pendidikan \leq 9 tahun (SD dan SMP) sebanyak 10 orang (5,00%).

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total 200 responden, distribusi responden berdasarkan status kerja terbesar pada kelompok tidak bekerja yakni sebanyak 113 orang (56,50%), sedangkan responden yang bekerja sebanyak 87 orang (43,50%).

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total 200 responden, distribusi responden berdasarkan paritas terbesar pada kelompok ibu primipara yakni sebanyak 112 orang (56,00%), sedangkan pada kelompok ibu multipara sebanyak 88 orang (44,00%).

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total 200 responden, distribusi responden berdasarkan lingkar lengan atas terbesar pada ibu hamil yang dikategorikan tidak KEK (LILA \geq 23,5 cm). Sedangkan ibu yang dikategorikan mengalami KEK (LILA < 23,3 cm) sebanyak 16 ibu (8,00%).

Tabel 4.2
Distribusi Antropometri Bayi Responden di Rumah Sakit Ibu dan Anak
Ananda Kota Makassar Tahun 2020

Antropometri Bayi Baru Lahir	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Berat Badan (gram)		
– < 2500	8	4,00
– \geq 2500	192	96,00
Panjang Badan (cm)		
– < 48	37	18,50
– \geq 48	163	81,50
Lingkar Kepala (cm)		
– < 32	101	50,50
– \geq 32	99	49,50
Lingkar Dada (cm)		
– < 30	13	6,50
– \geq 30	187	93,50
Total	200	100,00

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa berdasarkan berat badan lahir dari total 200 bayi baru lahir, sebagian besar memiliki berat lahir \geq 2500 gram yakni sebanyak 192 bayi (96,00%), sedangkan bayi BBLR (< 2500 gram) sebanyak 8 bayi (4,00%).

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa berdasarkan panjang badan lahir dari total 200 bayi baru lahir, bayi dengan panjang badan lahir \geq 48 cm sebanyak 163 bayi (81,50%), sedangkan bayi dengan panjang badan < 48 cm sebanyak 37 bayi (18,50%).

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa berdasarkan lingkar kepala lahir dari total 200 bayi baru lahir, bayi dengan lingkar kepala lahir \geq 32 cm sebanyak 99 bayi (49,50%), sedangkan bayi dengan lingkar kepala < 32 cm sebanyak 101 bayi (50,50%).

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa berdasarkan lingkar dada lahir dari total 200 bayi baru lahir, bayi dengan lingkar dada normal \geq 30 cm sebanyak 187

bayi (93,50%), sedangkan bayi dengan lingkar dada < 30 cm sebanyak 13 bayi (6,50%).

Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan program *software* IBM SPSS Statistik 23. Pengujian hipotesis menggunakan uji *Chi-Square*. Hasil analisis diketahui dengan melihat nilai p pada uji *Continuity Correction/Yate's Correction* bila tidak terdapat sel yang memiliki nilai *expected count* kurang dari 5. Bila terdapat sel yang memiliki nilai *expected count* kurang dari 5, maka hasil analisis diketahui dengan melihat nilai p pada uji *Fisher Exact*.

Tabel 4.3
Analisis Bivariat Hubungan LILA Ibu dengan Berat Badan Lahir Bayi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar Tahun 2020

Antropometri Bayi Baru Lahir	LILA ibu hamil (cm)		Total n(%)	Nilai P
	< 23,5 n(%)	≥23,5 n(%)		
Berat Badan (gram)				
– < 2500	2(1,00%)	6(3,00%)	8(4,00%)	0,127
– ≥ 2500	14(7,00%)	178(89,00%)	192 (96,00%)	
Panjang Badan (cm)				
– < 48	9(4,50%)	28(14,00%)	37(18,50%)	0,000
– ≥ 48	7(3,50%)	156(78,00%)	156(81,50%)	
Lingkar Kepala (cm)				
– < 32	15(7,50%)	86(43,00%)	101(50,50%)	0,000
– ≥ 32	1(0,50%)	98(49,00%)	99(49,50%)	
Lingkar Dada (cm)				
– < 30	4(2,00%)	9(4,50%)	13(6,50%)	0,013
– ≥ 30	12(6,00%)	175(87,50%)	187(93,50%)	
Total	16(8,00%)	184(92,00%)	200(100,00%)	

Sumber : Data Primer

Tabel 4.3 menunjukkan analisis hubungan lingkar lengan atas ibu hamil terhadap berat badan lahir bayi. Mayoritas responden memiliki lingkar lengan atas ≥ 23,5 cm dengan berat badan bayi lahir ≥ 2500 gram yakni sebesar 178 responden atau 89,00% dari keseluruhan responden. Berdasarkan hasil uji *Chi-Square* diperoleh nilai p sebesar 0,127 ($p > 0,05$) sehingga diketahui bahwa tidak

terdapat hubungan yang signifikan antara lingkar lengan atas ibu terhadap berat badan lahir bayi.

Tabel 4.3 menunjukkan analisis hubungan lingkar lengan atas ibu hamil terhadap panjang badan bayi. Mayoritas responden memiliki lingkar lengan atas $\geq 23,5$ cm dengan panjang badan bayi ≥ 48 cm yakni sebesar 156 responden atau 78,00% dari total responden keseluruhan. Berdasarkan hasil uji *Chi-Square* diperoleh nilai p sebesar 0,000 ($p < 0,05$) sehingga diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkar lengan atas ibu terhadap panjang badan lahir bayi.

Tabel 4.3 menunjukkan analisis hubungan lingkar lengan atas ibu hamil terhadap lingkar kepala bayi. Mayoritas responden memiliki lingkar lengan atas $\geq 23,5$ cm dengan lingkar kepala bayi 32 – 37 cm yakni sebesar 98 responden atau 49,00% dari total responden keseluruhan. Berdasarkan hasil uji *Chi-Square* diperoleh nilai p sebesar 0,000 ($p < 0,05$) sehingga diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkar lengan atas ibu terhadap lingkar kepala lahir bayi.

Tabel 4.3 menunjukkan analisis hubungan lingkar lengan atas ibu hamil terhadap lingkar dada bayi. Mayoritas responden memiliki lingkar lengan atas $\geq 23,5$ cm dengan lingkar dada bayi 30 – 35 cm yakni sebesar 175 responden atau 87,50% dari total responden keseluruhan. Berdasarkan hasil uji *Chi-Square* diperoleh nilai p sebesar 0,013 ($p < 0,05$) sehingga diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkar lengan atas ibu terhadap lingkar dada lahir bayi.

B. Pembahasan

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa lingkaran lengan atas (LILA) dapat digunakan sebagai indikator perkembangan kehamilan dan keluarannya. LILA dapat ditetapkan sebagai parameter untuk merencanakan intervensi yang tepat untuk peningkatan kesehatan wanita hamil. Tidak seperti berat absolut atau kenaikan berat badan selama kehamilan, LILA cukup konstan pada ibu selama kehamilan dan karenanya jika berat tidak tersedia, lingkaran lengan yang diambil setiap saat selama kehamilan dapat berfungsi untuk memberikan gambaran berat badan sebelum hamil (Rani, 2017). Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pengukuran LILA di 3 trimester, yang menunjukkan bahwa pengukuran ini independen terhadap usia kehamilan (Okereke, 2013).

Korelasi LILA ibu dan antropometri neonatal akan membantu dalam memperkuat status kesehatan remaja karena LILA mencerminkan status gizi sebelum kehamilan. Lingkaran lengan ibu dapat digunakan untuk menilai status gizi wanita yang tidak hamil dan sebelum atau selama kehamilan untuk mengidentifikasi wanita yang berisiko mengalami BBLR dan kematian neonatal atau bayi (WHO, 2018).

Setelah dilakukan penelitian mengenai pengaruh LILA ibu hamil terhadap hasil antropometri bayi baru lahir dengan mengambil sampel sebanyak 200 orang ibu hamil yang menjalani persalinan di kamar bersalin di RSIA Ananda, maka hasil yang diperoleh yakni sebagai berikut.

1. Hubungan Lingkaran Lengan Atas (LILA) Ibu Hamil Terhadap Berat Badan (BB) Bayi Baru Lahir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 16 ibu yang dikategorikan KEK, ibu yang melahirkan bayi dengan berat badan lahir ≥ 2500 sebanyak 14 sampel dan ibu yang melahirkan bayi berat lahir rendah (< 2500 gram)

sebanyak 2 sampel. Sedangkan dari 184 ibu yang tidak dikategorikan KEK, ibu yang melahirkan bayi dengan berat lahir normal sebanyak 178 sampel, dan ibu yang melahirkan bayi berat lahir rendah sebanyak 6 sampel.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat sel dengan nilai *expected count* kurang dari 5, maka analisis hubungan LILA ibu hamil dengan berat badan lahir menggunakan uji *Chi-Square* dengan melihat nilai *p* pada uji *Fisher Exact*. Hasil analisis menunjukkan nilai *p* sebesar 0,127 ($p > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara LILA ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan.

Hasil ini ditemukan pula pada penelitian yang dilakukan oleh Liang di Makassar, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ukuran LILA ibu pada masa kehamilan dengan berat bayi pada saat lahir dengan nilai $p = 1,034$ (Liang, 2017). Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Winther di Nepal bahwa LILA menunjukkan efek negatif terhadap berat lahir dalam analisis regresi multivariat (koefisien korelasi -0,165). Efek LILA terhadap berat badan kecil dan tidak signifikan secara statistik dengan nilai $p = 0,084$ (Winther, 2013).

Hasil ini bertolakbelakang dengan penelitian di Aceh dan India yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara lingkaran lengan atas ibu hamil dengan berat badan lahir bayi ($p < 0,05$) (Putri, 2015 dan Rani, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nagmoti di India yang menunjukkan bahwa status gizi ibu ditinjau dari IMT dan berat badan berhubungan dengan berat badan bayi dengan nilai $p = 0,004$ dan $p = 0,001$ (Nagmoti, 2015).

Ververs et al menyimpulkan bahwa LILA adalah indikator yang paling dapat diandalkan untuk mengetahui risiko BBLR. Mereka juga menyimpulkan

bahwa pengukuran lingkaran lengan atas atas membutuhkan peralatan minimal dan telah ditemukan untuk memprediksi morbiditas dan mortalitas seakurat defisit berat badan (Ververs, 2013). Satu studi dilakukan oleh Islam di Bangladesh menunjukkan bahwa tingkat *cut-off* 23,5 cm menunjukkan sensitivitas dan spesifisitas tinggi untuk memprediksi berat badan lahir rendah (Islam, 2014).

Lingkar lengan atas ibu hamil sangat memengaruhi kesempurnaan perkembangan janin selama dalam kandungannya, tetapi belum tentu semua ibu hamil yang mengalami KEK (LILA < 23,5) selalu melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR). Banyak faktor yang memengaruhi kelahiran BBLR. Hal ini dikarenakan banyak faktor lain yang memengaruhi berat badan lahir bayi, seperti dari faktor internal ibu yaitu usia ibu hamil, jarak kehamilan dan kelahiran, paritas, kadar hemoglobin, pemeriksaan kehamilan, penyakit saat kehamilan. Faktor eksternal seperti faktor lingkungan meliputi kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal, faktor sosial dan ekonomi meliputi jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu hamil. Berat bayi lahir dipengaruhi oleh status gizi ibu sebelum kehamilan, dan juga penambahan berat badan ibu selama masa kehamilan. Asupan-asupan gizi seperti zat besi dan folat juga akan memengaruhi tumbuh kembang janin (Sulistyoningsih, 2012).

Pada penelitian ini tidak ditemukan hubungan bermakna antara LILA ibu dengan berat badan lahir bayi sebab dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini jumlah sampel ibu dengan KEK berjumlah 16 dari 200 sampel, dan hanya 2 diantaranya yang melahirkan bayi BBLR. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi berat lahir bayi yang tidak terjangkau dalam penelitian ini antara lain adalah kenaikan berat badan ibu hamil, asupan

nutrisi selama kehamilan, jarak kehamilan, kadar haemoglobin, pemeriksaan kehamilan, dan juga faktor lingkungan serta sosial ekonomi responden.

2. Hubungan Lingkar Lengan Atas (LILA) Ibu Hamil Terhadap Panjang Badan (PB) Bayi Baru Lahir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 16 ibu yang dikategorikan KEK, ibu yang melahirkan bayi dengan panjang badan lahir normal (≥ 48 cm) sebanyak 7 sampel dan panjang badan < 48 cm sebanyak 9 sampel. Sedangkan dari 184 ibu yang tidak dikategorikan KEK, ibu yang melahirkan bayi dengan panjang badan normal sebanyak 156 sampel dan panjang badan < 48 cm sebanyak 28 sampel.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Chi-Square* dengan melihat nilai p pada *Continuity Correction*, diketahui nilai p sebesar 0,000 ($p < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara lingkar lengan atas ibu dengan panjang badan bayi yang dilahirkan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani di India yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara LILA ibu dengan panjang badan bayi ($p < 0,0001$) (Rani, 2017). Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Nagmoti yang menunjukkan bahwa status gizi ibu ditinjau dari indeks massa tubuh dan berat badan berhubungan dengan panjang badan bayi ($p = 0,017$ dan $p = 0,001$) (Nagmoti, 2015). Penelitian lain yang dilakukan oleh Lamana di Palu juga mendukung hasil penelitian ini, yang menyimpulkan bahwa panjang badan bayi baru lahir berhubungan dengan tinggi badan ibu ($r = 0,26$ dan $p < 0,001$) dan LILA ibu ($r = 0,27$ dan $p < 0,001$) (Lamana, 2017).

Namun, temuan pada penelitian ini bertolakbelakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yustiana di Semarang yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan panjang badan bayi baru lahir antara ibu hamil KEK dan tidak KEK ($p = 0,132$) (Yustiana, 2014).

Panjang badan dianggap sebagai indikator kasar dari massa tanpa lemak yang mencerminkan pertumbuhan skeletal. Banyak faktor yang dapat memengaruhi panjang badan bayi ketika lahir yang masih belum terjangkau dalam penelitian ini, seperti status gizi ibu sejak sebelum kehamilan, infeksi, status anemia dan kadar mikronutrien di dalam tubuh ibu hamil (Pereira, 2012).

Ibu hamil KEK seharusnya mempunyai risiko melahirkan bayi stunting karena kejadian KEK pada trimester ketiga dapat menyebabkan penurunan suplai zat gizi dari ibu ke janin. Proses pertumbuhan yang tidak berjalan sempurna karena kurangnya suplai zat gizi dari ibu menyebabkan kecenderungan mengalami malnutrisi seperti stunting meningkat (Newman 2009).

Defisiensi mikronutrien selama masa kehamilan dapat menyebabkan janin mengalami pertumbuhan linear lebih lambat selama periode postnatal. Mikronutrien yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan linear adalah yodium dan seng. Mikronutrien lain yang juga berpengaruh adalah selenium, tembaga, molybdenum, kromium, vitamin A dan kalsium. Seorang ibu hamil yang menerima asupan energi yang adekuat masih dapat mengalami kekurangan berbagai mikronutrien. Hal ini terjadi karena makanan yang dikonsumsi dapat memiliki bioavailabilitas dan kandungan mikronutrien yang rendah (Yustiana, 2014)

3. *Hubungan Lingkar Lengan Atas (LILA) Ibu Hamil Terhadap Lingkar Kepala (LIKA) Bayi Baru Lahir*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu KEK yang melahirkan bayi dengan lingkar kepala normal (33 – 37 cm) sebanyak 1 sampel dan lingkar kepala <33 cm sebanyak 15 sampel. Sedangkan ibu yang tidak dikategorikan KEK yang melahirkan bayi dengan lingkar kepala normal sebanyak 98 sampel, lingkar kepala <33 cm sebanyak 86 sampel.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat sel dengan nilai *expected count* kurang dari 5, maka analisis hubungan LILA ibu hamil dengan lingkar kepala lahir menggunakan uji *Chi-Square* dengan melihat nilai *p* pada uji *Fisher Exact*. Hasil analisis menunjukkan nilai *p* sebesar 0,000 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara LILA ibu dengan lingkar kepala bayi yang dilahirkan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nagmoti di India yang menunjukkan hasil bahwa status gizi ibu ditinjau dari IMT dan berat badan berhubungan dengan lingkar kepala bayi baru lahir ($p = 0,039$ dan $p = 0,007$) (Nagmoti, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Thame di Jamaica menunjukkan bahwa nutrisi ibu yang buruk seperti ditunjukkan oleh berat badan, tinggi badan, dan IMT yang rendah dikaitkan ukuran kepala bayi yang lebih kecil (Thame, 1997). Namun, hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ricalde di Brazil, yang menyatakan bahwa LILA tidak berkaitan dengan lingkar kepala bayi yang dilahirkan ($p = 0,094$) (Ricalde, 1998).

Lingkar kepala yang mencerminkan lingkar oksipitofrontal menggambarkan pertumbuhan otak, meskipun itu bukan ukuran sensitif atau spesifik. Beberapa faktor harus dipertimbangkan ketika menginterpretasikan

pengukuran LIKA pada neonatus. Selama minggu pascanatal pertama, LIKA dapat menurun sekitar 0,5 cm karena kontraksi ruang cairan ekstraseluler. Jika nilai LIKA di atas atau di bawah batas referensi, terdapat kemungkinan masih menggambarkan variasi normal (Pereira, 2012).

Lingkar kepala lahir bayi yang besar berkaitan dengan terjadinya beberapa komplikasi maternal dan perinatal. Risiko terjadinya kala dua memanjang, persalinan dengan sectio caesarea, perdarahan postpartum, distosia bahu dan skor Apgar rendah pada 1 menit pertama meningkat seiring dengan meningkatnya lingkar kepala bayi (Vaarno, 2014).

Hasil ukur lingkar kepala digunakan sebagai pengganti pengukuran ukuran dan pertumbuhan otak tetapi tidak sepenuhnya berkorelasi dengan volume dan perkembangan otak. Penelitian yang dilakukan Shabariah di Bekasi menunjukkan terdapat hubungan antara lingkar kepala dengan perkembangan anak yang normal (Shabariah, 2016).

Studi yang menganalisis hubungan antara status gizi ibu dengan lingkar kepala neonatus hingga kini belum banyak dilakukan, terkhusus pada status gizi ibu yang ditinjau dari lingkar lengan atas. Oleh karena itu perlu lebih banyak penelitian diperlukan untuk memperjelas hubungan yang tepat dan melibatkan mekanisme yang mendasari.

4. Hubungan Lingkar Lengan Atas (LILA) Ibu Hamil Terhadap Lingkar Dada (LIDA) Bayi Baru Lahir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu KEK yang melahirkan bayi dengan lingkar dada normal (30 – 35 cm) sebanyak 12 sampel dan lingkar dada <30 cm sebanyak 4 sampel. Sedangkan ibu yang tidak KEK yang melahirkan bayi dengan lingkar dada normal sebanyak 175 sampel dan ibu

tidak KEK yang melahirkan bayi dengan lingkaran dada <30 cm sebanyak 9 sampel.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat sel dengan nilai *expected count* kurang dari 5, maka analisis hubungan LILA ibu hamil dengan lingkaran dada lahir bayi menggunakan uji *Chi-Square* dengan melihat nilai *p* pada uji *Fisher Exact*. Hasil analisis menunjukkan nilai *p* sebesar 0,013 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara LILA ibu dengan lingkaran dada bayi yang dilahirkan.

Penelitian dilakukan oleh Elshibly di Sudan menunjukkan hasil yang serupa, bahwa LILA ibu berhubungan kuat dengan LIDA bayi yang dilahirkan ($p < 0,001$) (Elshibly, 2009). Penelitian lain yang dilakukan oleh Nagmoti di India juga menunjukkan hasil yang mendukung penelitian ini, bahwa status gizi ibu ditinjau dari IMT berhubungan dengan lingkaran dada neonatus ($p = 0,001$) (Nagmoti, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Azevedo di Brazil menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara lingkaran dada dengan berat badan, panjang badan dan lingkaran kepala neonatus. Pengukuran lingkaran dada rutin dilakukan sebagai alat sensitif untuk mengidentifikasi status kesehatan bayi, misalnya pada kondisi kelainan rongga toraks pada periode neonatal. Ini sering dikaitkan dengan tulang rusuk kecil, sempit, dan memanjang yang khas dari perkembangan tulang rusuk abnormal (Azevedo, 2019).

Studi yang dilakukan oleh Ndu di Nigeria menyimpulkan bahwa pengukuran lingkaran dada bayi baru lahir dapat menjadi alternatif untuk mendeteksi BBLR karena pengukuran LIDA relatif mudah dilakukan dan menunjukkan korelasi paling baik dengan berat badan dibandingkan dengan parameter antropometri lainnya. Pengukuran LIDA direkomendasikan sebagai

pengganti berat badan pada daerah pedesaan dan pusat perawatan kesehatan primer di mana timbangan timbangan mungkin tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan (Ndu, 2014).

Korelasi secara spesifik antara status nutrisi ibu dengan lingkaran dada bayi yang dilahirkan belum banyak dibahas. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan hubungan yang tepat antara kedua variabel ini dan melibatkan mekanisme yang mendasarinya.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar ibu mempunyai status gizi yang baik. Begitu pula dengan bayi yang dilahirkan, sebagian besar bayi memiliki antropometri yang dikategorikan normal. Antropometri lahir bayi merupakan cerminan dari status kesehatan dan gizi ibu selama hamil serta pelayanan kesehatan antenatal yang diterima ibu. Ibu hamil dengan status gizi yang baik dan kondisi normal, dalam hal ini tidak sering menderita sakit dan tidak ada gangguan gizi pada masa pra hamil maupun saat hamil pada umumnya akan melahirkan bayi yang sehat (Putri, 2015).

Dalam Al-Quran surah Luqman/31: 14 dijelaskan tentang kondisi seorang ibu hamil yang sedang mengandung janinnya. Hal ini tertuang seperti yang tertulis di bawah ini.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي
عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”

Ayat di atas menerangkan perintah atau wasiat agar senantiasa berbuat baik, dalam maknanya yang luas, kepada orang tua, khususnya ibu. Demikian

ini, karena ibulah yang mengandung dan melahirkannya. Perbuatan baik kepada orang tua bisa dalam bentuk apa saja, dan inilah bentuk syukur yang dikehendaki oleh ayat di atas. Ibu secara langsung mengalami kondisi sulit selama mengandung dan melahirkan. Seorang ibu, akan mengalami rasa capek atau lemah karena tenaganya tidak mampu menanggung beban yang sangat berat. Artinya setiap perempuan yang hamil akan menanggung beban berat karena janin yang ada di dalam perutnya dan kondisi fisiknya cepat lemah karena makanannya harus dibagi antara dirinya dan janinnya. Kemudian seorang ibu menyapih anaknya dalam usia dua tahun, sebagaimana periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung hingga usia anak dua tahun (Kemenag, 2015).

Terkait dengan kondisi janin dalam rahim, hal ini termasuk salah satu kegaiban yang hanya diketahui oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* semata. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran surah Luqman/31: 34 sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْتُمِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha mengenal.”

Ayat ini pada mulanya dimaksudkan untuk menjawab keraguan orang-orang kafir atas keniscayaan hari kiamat. Lalu Rasulullah membaca ayat ini bahwa “kunci kegaiban itu ada lima”, yang hanya diketahui oleh Allah, yaitu pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat, turunnya hujan,

kondisi janin dalam kandungan, apa yang akan terjadi besok, di bumi mana seseorang akan mati. Melihat hal ini, kondisi janin dalam kandungan termasuk hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Meskipun dengan ditemukannya teknologi ultrasonografi (USG), namun persoalan kondisi janin dalam rahim tetap menjadi misteri Ilahi. Tidak ada seorang pun yang tahu, mengapa posisi bayi ada yang terbalik, sungsang, atau melintang. Siapa yang membalik posisi bayi yang awalnya kaki di bawah dan kepala di atas, tetapi menjelang kelahiran posisinya bisa terbalik, kalau bukan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Proses ini menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah (Kemenag, 2015).

Dalam Al-Quran QS. An-Nahl/16 : 78 dijelaskan tentang kondisi bayi yang baru dilahirkan ke dunia dari rahim ibunya, seperti yang tertuang di bawah ini.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”

Dalam ayat di atas, Allah swt menjelaskan kegaiban dan keajaiban yang sangat dekat dengan manusia. Mereka mengetahui fase-fase pertumbuhan janin, tetapi tidak mengetahui bagaimana proses perkembangan janin yang terjadi dalam rahim sehingga mencapai kesempurnaan. Sejak bertemunya sel sperma dan sel telur sampai menjadi manusia baru yang membawa sifat-sifat kedua orang tua dan leluhurnya. Dalam proses kejadian ini, terdapat rahasia hidup yang tersembunyi. Sesudah mencapai kesempurnaan, Allah mengeluarkan manusia dari rahim ibunya dalam

keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi sewaktu masih dalam rahim, Allah menganugerahkan potensi, bakat, dan kemampuan seperti berpikir, berbahagia, mengindra, dan lain sebagainya pada diri manusia. Setelah manusia lahir, dengan hidayah Allah segala potensi dan bakat itu berkembang. Akalnya dapat memikirkan tentang kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan, serta hak dan batil. Dengan pendengaran dan penglihatan yang telah berkembang itu, manusia mengenali dunia sekitarnya, mempertahankan hidupnya, dan mengadakan hubungan dengan sesama manusia. Dengan perantaraan akal dan indra, pengalaman dan pengetahuan manusia dari hari ke hari semakin bertambah dan berkembang. Semua itu merupakan rahmat dan anugerah Tuhan kepada manusia yang tidak terhingga. Oleh karena itu, seharusnya mereka bersyukur kepada-Nya, baik dengan cara beriman kepada keesaan Allah, dan tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain maupun dengan mempergunakan segala nikmat Allah untuk beribadah dan patuh kepada-Nya (Kemenag, 2015).

Berdasarkan ketiga ayat di atas diketahui bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam mendidik, mengasuh, dan membentuk karakter anak, serta menyediakan segala kebutuhan yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk zat gizi yang dibutuhkan oleh seorang anak. Oleh karena itu setiap orang tua dan pasangan suami istri yang akan memiliki keturunan hendaknya memiliki pengetahuan yang cukup terkait terkait hal-hal tersebut. Peneliti merekomendasikan kepada Kementerian Agama atau lembaga penyelenggara kursus pra nikah untuk memasukkan aspek kesehatan sebagai salah satu materi dalam kursus pra nikah agar setiap pasangan yang akan menikah dibekali dengan pengetahuan yang cukup terkait kesehatan keluarga.

C. Hambatan Penelitian

Adapun beberapa hal yang menjadi hambatan bagi peneliti dalam proses penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Peneliti kesulitan untuk memperkirakan waktu pengambilan data pada masing-masing responden sebab pasien yang akan melahirkan datang pada saat yang tidak bisa diprediksi.
2. Kondisi pasien obstetri yang dapat berubah setiap saat, sehingga beberapa responden batal menjadi subjek penelitian.
3. Peneliti kesulitan melakukan *informed consent* pada pasien inpartu yang telah mengalami rasa kesakitan menjelang persalinan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai hubungan lingkaran lengan atas ibu hamil terhadap antropometri bayi baru lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Sebagian besar ibu hamil memiliki status gizi normal atau tidak mengalami kekurangan energi kronik yakni sebanyak 184 responden (92%).
2. Sebagian besar bayi dilahirkan dengan antropometri normal, yakni bayi dengan berat badan lahir ≥ 2500 gram sebanyak 192 bayi (96%), bayi dengan panjang badan lahir ≥ 48 cm sebanyak 163 bayi (81,5%), bayi dengan lingkaran kepala lahir ≥ 32 cm sebanyak 99 bayi (49,5%), dan bayi dengan lingkaran dada lahir ≥ 30 cm sebanyak 187 bayi (93,5%).
3. Tidak terdapat hubungan bermakna secara statistik antara lingkaran lengan atas ibu hamil dengan berat badan bayi baru lahir.
4. Terdapat hubungan bermakna secara statistik antara lingkaran lengan atas ibu hamil dengan panjang badan bayi baru lahir.
5. Terdapat hubungan bermakna secara statistik antara lingkaran lengan atas ibu hamil dengan lingkaran kepala bayi baru lahir.
6. Terdapat hubungan bermakna secara statistik antara lingkaran lengan atas ibu hamil dengan lingkaran dada bayi baru lahir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini untuk membandingkan hasil temuannya dengan hasil penelitian ini.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain selain LILA sebagai indikator status gizi ibu hamil, seperti IMT, penambahan berat badan, dan variabel lainnya.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji status gizi ibu hamil dengan menanyakan secara detail riwayat konsumsi zat gizi selama kehamilan.
4. Bagi Kementerian Agama atau lembaga penyelenggara kursus pra nikah diharapkan untuk memasukkan aspek kesehatan sebagai salah satu materi dalam kursus pra nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Arisman MB. 2009. *Gizi Ibu Hamil, dalam Buku Ajar Ilmu Gizi: Gizi dalam Daur Kehidupan Edisi 2*. Jakarta: EGC.
- Azevedo, I. G., et al. 2019. Chest circumference in full-term newborns: how can it be predicted? *BMC Pediatrics*. Vol 19: 341.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cunningham, et al. 2017. *Obstetri Williams Edisi 23 Volume 1*. Jakarta: EGC.
- Dinkes Kota Makassar. 2019. *Profil Kesehatan Kota Makassar Tahun 2018*. Makassar: Dinkes Kota Makassar.
- Elshibly, E. M., Schmalisch, G. 2009. Relationship between maternal and newborn anthropometric measurements in Sudan. *Pediatrics International*. 51, 326–331.
- Fakier, A., et al. 2017. Mid-Upper Arm Circumference: A Surrogate for Body Mass Index in Pregnant Woman. *The South African Medical Journal*. Volume. 107, Number. 7: 606-610.
- Ferial, E. W. 2011. Hubungan Antara Status Gizi Ibu Berdasarkan Ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) dengan Berat Badan Lahir Bayi di RSUD Daya Kota Makassar. *Jurnal Alam dan Lingkungan*. Vol 2 (3).
- Ghosh, S. et al. 2019. Nutrition-Specific and Nutrition-Sensitive Factors Associated With Mid-Upper Arm Circumference As A Measure of Nutritional Status in Pregnant Ethiopian Women: Implications For Programming in The First 1000 Days. *Plos One*. doi.org/10.1371/journal.pone.0214358.
- Gomella, T. L. 2013. *Neonatology: Management, Procedures, On-Call Problems, Disease, and Drugs*. New York: McGraw-Hill Education
- Harjatmo, T.P., Par'i, H.M., Wiyono, S. 2017. *Bahan Ajar Gizi Penilaian Status Gizi*. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI.
- Hasdianah, H. R, et al. 2013. *Pemanfaatan Gizi, Diet, dan Obesitas*. Yogyakarta; Nuha Medika.
- Hediger, M.L., et al. 2017. Midupper Arm Circumference (MUAC) Changes in Late Pregnancy Predict Fetal Growth in Twins. *Twin Research and Human Genetics*. Volume 8 Number 3 pp. 267-270.
- Herlina, Sara. 2018. Faktor - Faktor yang Berhubungan Dengan Pertumbuhan Bayi 6-12 Bulan di Puskesmas Simpang Baru. *Jurnal Endurance*. 3(2) Juni 2018 (330-336).
- Islam MM, et al. 2104. Association of maternal body mass index (BMI) and mid upper arm circumference (MUAC) and birth weight of newborn in the southwest region of Bangladesh. *Int J Food Nutri Sci*. 3(1):1-4.

- Kemenag RI. 2015. *Tafsir Al-Quran Tematik Kesehatan dalam Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kemenkes RI. 2014. *Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI: Situasi dan Analisis Gizi*. Jakarta: Pusdatin Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. 2014. *Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI: Situasi Kesehatan Ibu*. Jakarta: Pusdatin Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. 2018. *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2018)*. Jakarta: Badan Litbangkes Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. 2010. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kliegman, R. M., et al. 2016. *Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition*. Philadelphia: Elsevier.
- Koepp UMS, et al W. 2012. Maternal Pre-Pregnant Body Mass Index, Maternal Weight Change and Offspring Birth Weight. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 91:243-49.
- Kumar, P., et al. 2018. Screening Maternal Acute Malnutrition Using Adult Mid-Upper Arm Circumference in Resource-Poor Settings. *Indian J Community Med*. 43(2): 132-134.
- Kusmiyati, Yuni, et al. 2009. *Perawatan Ibu Hamil*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Kusparlina, E. P., 2016. Hubungan antara Umur dan Status Gizi Ibu berdasarkan Ukuran Lengan Atas dengan Jenis BBLR. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*. Vol. VII No.1.
- Lamana, A., Julia, M., Dasuki, D. 2017. Korelasi Tinggi Badan Ibu dengan Panjang Badan Bayi Baru Lahir di Kota Palu. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*. Vol. 4, No. 2: 103-108.
- Liang, Yusuf Tanri. 2017. *Pengaruh Status Gizi Ibu Hamil Terhadap Hasil Luaran Bayi*. Makasar: FK UNHAS.
- Nagmoti, S.A., Walvekar, P.R., Mallapur, M.D. 2015. Association Between Body Mass Index of Mother And Anthropometry of Newborn. *Int J Med Res Health Sci*.4(4):796-79.
- Ndu, I. K., et al. 2014. Chest and Occipito-Frontal Circumference Measurements in the Detection of Low Birth Weight Among Nigerian Newborns of Igbo Ethnicity. *Italian Journal of Pediatrics*. Vol. 40: 81.
- Newman B.M., Newman P.R. 2009. *Development Through Life: A Psychosocial Approach, Tenth Edition*. USA: Wadsworth, Cengage Learning;. [Accessed Januari, 2020]. Available from: URL: <http://books.google.co.id/books>.
- Ningsih, Yuni Setia. 2007. *Birul Awlad VS Birrul Walidain Upaya Pendidikan Emosional Anak dalam Keluarga*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Nurlinda, Andi. 2014. *Gizi Dalam Daur Siklus Kehidupan Seri Baduta (Untuk Anak 1-2 Tahun)*. Yogyakarta: Andi.
- Okereke CE, et al. 2013. Evaluation of Some Anthropometric Indices for the Diagnosis of Obesity in Pregnancy in Nigeria: A Cross-Sectional Study. *Afr Health Sci*. 13 (4) :1034-40.

- Paulsen, C.B., et al. 2019. Anthropometric Measurements Can Identify Small for Gestational Age Newborns: A Cohort Study in Rural Tanzania. *BMC Pediatrics*. 19 (120).
- Pawalia, Alka, et al. 2015. Effect of Obesity on Pregnancy Outcomes – Indian Perspective: A Review. *International Journal of Scientific Research*. Volume: 4, Issue: 7.
- Pereira-da-Silva, L., Virella, D., Fusch, C. Neonatal anthropometry: A tool to evaluate the nutritional status, and to predict early and late risks. In *The Handbook of Anthropometry: Physical Measures of Human Form in Health and Disease*; Preedy, V.R., Ed.; Springer Science + Business Media: New York, USA, 2012; pp. 1079–1104.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2010. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Putri AR, Muqsith A. 2015. Hubungan Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil dengan Berat Badan Bayi di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dan Rumah Sakit Tk IV IM.07.01 Lhokseumawe Tahun 2015. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*. Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh.
- Rahmat, Mochamad. 2017. *Metodologi Penelitian Gizi & Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Rani N, et al. 2017. Correlation Between Maternal Mid Upper Arm Circumference and Neonatal Anthropometry. *International Journal of Medical Research and Review*. [Vol 5 No 7](#).
- Ricalde, A.E., et al. 1998. Mid-upper arm circumference in pregnant women and its relation to birth weight. *Rev. Saúde Pública*. 32 (2): 112-7.
- Safaa, Salem, et al. 2016. Effect of Malnutrition During Pregnancy on Pregnancy Outcomes. *J Nurs Care*. Volume 5, Issue 10 (Suppl).
- Shabariah, R., et al. 2019. Hubungan Ukuran Lingkar Kepala dengan Perkembangan Anak Usia 12 - 36 Bulan Berdasarkan Skala Denver Development Screening Test-II (DDST-II) di Posyandu RW 03 Mustika Jaya Bekasi Timur November 2016. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*. Vol. 15, No. 1; 46-55.
- Shrivastava, J., et al. 2016. Maternal Anthropometry in Relation to Birth Weight of Newborn: A Prospective Hospital Based Study. *Indian J Child Health*. Vol. 3, Issue 1: 59-63.
- Soetjiningsih. 2014. *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC.
- Sulistyoningsih, Haryani. 2012. *Gizi Untuk Kesehatan Ibu dan Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supariasa, I. N. 2016. *Penilaian Status gizi*. Jakarta: EGC.
- Tang, A.M., Chung, M., Dong, K., et al. 2016. *Determining a Global Mid-Upper Arm Circumference Cutoff to Assess Malnutrition in Pregnant Women*. Washington, DC: FHI 360/Food and Nutrition Technical Assistance III Project (FANTA).
- Thame, M, et al. 1997. Relationship between maternal nutritional status and infant's weight and body proportions at birth. [European Journal of Clinical Nutrition](#) volume 51, pages134–138.

- Tonder, E.V., et al. 2018. Mid-Upper Arm Circumference (MUAC) as a feasible tool in detecting adult malnutrition. *South African Journal of Clinical Nutrition*. DOI:10.1080/16070658.2018.1484622.
- Vaarno, Jenni. 2014. *Length and Head Circumference at Birth: Association With Birth Outcome and Morbidity in Macrosomic Finnish Infants*. University of Eastern Finland.
- Ververs, M.T., et al. 2013. Which Anthropometric Indicators Identify a Pregnant Woman as Acutely Malnourished and Predict Adverse Birth Outcomes in the Humanitarian Context? *PLoS Currents*. Volume 7, Number 5.
- Villar, J., Ismail, L.C., Victoria C.G., et al. 2014. International standards for newborn weight, length, and head circumference by gestational age and sex: the Newborn Cross-Sectional Study of the Intergrowth-21st Project. *Lancet*. Vol. 384: 857-868.
- Winther, I.I. 2013. *Maternal Anthropometry as a Predictor of Birth Weight: A study performed at Okhaldhunga Community Hospital in rural Nepal*. University of Oslo. [Accessed Januari, 2020]. Available from URL: <http://www.duo.uio.no/>.
- Wiyono, Sugeng. 2016. *Buku Ajar Epidemiologi Gizi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Sagung Seto.
- World Health Organization (WHO). 2017. *WHO Recommendations on Maternal Health: Guidelines Approved The WHO Guidelines Review Committee*. Geneva: WHO available on www.who.int.
- World Health Organization (WHO). 2018. Maternal, Infant and Young Child Nutrition - Comprehensive Implementation Plan on Maternal, Infant and Young Child Nutrition: Biennial Report. *Executive Board*. 142/22 2 January 2018.
- Yulinar, Budi Adhi. 2010. *Ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) Ibu Hamil dan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)*. Surakarta: FK UNS.
- Yustiana, Kurnia. 2014. Perbedaan Panjang Badan Bayi Baru Lahir Antara Ibu KEK dan Tidak KEK. *Journal of Nutrition College*. Vol. 3, No. 1, Hal.235-242.

LAMPIRAN 1
HASIL UJI STATISTIK

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
LILA1 * BB1	200	100,0%	0	0,0%	200	100,0%
LILA1 * PB1	200	100,0%	0	0,0%	200	100,0%
LILA1 * LK1	200	100,0%	0	0,0%	200	100,0%
LILA1 * LD1	200	100,0%	0	0,0%	200	100,0%
LILA1 * Usia	200	100,0%	0	0,0%	200	100,0%
LILA1 * Paritas	200	100,0%	0	0,0%	200	100,0%
LILA1 * Jenjang_Pendidikan	200	100,0%	0	0,0%	200	100,0%
LILA1 * Pekerjaan	200	100,0%	0	0,0%	200	100,0%

LILA * BB**Crosstab**

Count

		BB1		Total
		<2500	>=2500	
LILA1	<23,5	2	14	16
	>=23,5	6	178	184
Total		8	192	200

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	3,272 ^a	1	,070		
Continuity Correction ^b	1,308	1	,253		
Likelihood Ratio	2,241	1	,134		
Fisher's Exact Test				,127	,127
N of Valid Cases	200				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,64.

b. Computed only for a 2x2 table

LILA * PB**Crosstab**

Count

		PB1		Total
		<48	=>48	
LILA1	<23,5	9	7	16
	>=23,5	28	156	184
Total		37	163	200

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	16,438 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	13,829	1	,000		
Likelihood Ratio	12,689	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
N of Valid Cases	200				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,96.

b. Computed only for a 2x2 table

LILA * LK**Crosstab**

Count

		LK1		Total
		<33	>=32	
LILA1	<23,5	15	1	16
	>=23,5	86	98	184
Total		101	99	200

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	13,014 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	11,201	1	,001		
Likelihood Ratio	15,463	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
N of Valid Cases	200				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,92.

b. Computed only for a 2x2 table

LILA * LD

Crosstab

Count

		LD1		Total
		<30	>=30	
LILA1	<23,5	4	12	16
	>=23,5	9	175	184
Total		13	187	200

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	9,794 ^a	1	,002		
Continuity Correction ^b	6,765	1	,009		
Likelihood Ratio	6,338	1	,012		
Fisher's Exact Test				,013	,013
N of Valid Cases	200				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,04.

b. Computed only for a 2x2 table

LAMPIRAN 2
DATA HASIL PENELITIAN

No.	Nama (inisial)	Usia (tahun)	Paritas	Pendidikan	Pekerjaan	LILA				
						Ibu (cm)	BB (kg)	PB (cm)	LK (cm)	LD (cm)
1	AY	21	1	SMU	IRT	22	2200	45	30	28
2	IM	35	2	D3	Karyawan	25,5	3500	49	33	34
3	HK	23	2	SD	Petani	35	3200	50	33	34
4	RA	25	1	D3	IRT	30,5	3600	53	32	34
5	NA	32	2	S1	Karyawan	31,8	2900	48	32	32
6	IS	25	1	D3	Wiraswasta	20,8	2700	47	32	32
7	FN	35	1	SMU	Wiraswasta	33	3500	50	34	34
8	TJ	37	2	SD	Petani	25,5	2250	48	31	31
9	R	31	1	SD	IRT	28	3050	48	32	30
10	F	22	1	SMU	IRT	22,5	3300	48	32	30
11	SR	28	1	S1	IRT	30,5	3200	49	32	31
12	SF	32	3	SMU	IRT	29	3550	52	34	32
13	MH	29	2	S1	IRT	25,5	2550	47	32	30
14	A	26	1	S1	Karyawan	23,3	3200	50	33	31
15	SM	29	2	S1	IRT	21,5	3200	50	32	30
16	RM	28	2	SMU	IRT	29,5	2800	51	33	31
17	RF	35	3	D3	IRT	25	2900	48	32	33
18	SA	23	1	S1	IRT	34	3550	50	33	30
19	HK	25	1	D3	IRT	26,5	3100	49	33	34
20	RH	26	1	S1	IRT	27,5	2800	49	33	34
21	FS	30	1	SMU	IRT	25,5	3000	49	32	31
22	SE	34	3	S1	IRT	33	4200	53	34	36
23	FI	25	1	SMU	IRT	26	3300	48	32	30
24	FH	31	2	D3	Bidan	24	3100	49	33	34
25	SN	28	1	S1	Wiraswasta	32,5	2800	48	32	30
26	SM	40	3	SMP	IRT	30,5	3000	48	32	30
27	IM	23	1	D3	Karyawan	25	2550	45	30	29
28	DR	34	3	SMU	IRT	25	3200	50	33	32
29	BR	25	1	SMU	IRT	26,5	2300	46	30	27
30	R	29	3	SMP	IRT	30	3250	49	32	33
31	TF	22	1	SMU	Mahasiswa	33	3100	49	32	32
32	HN	25	1	D3	Perawat	27	3300	48	32	33
33	SN	26	1	SMU	IRT	26,5	3000	49	32	31

34	RS	24	2	SMU	Wiraswasta	27,5	3300	50	32	32
35	ED	24	3	SMU	IRT	25,5	3000	49	32	30
36	WS	31	3	S1	IRT	27,5	3500	50	34	33
37	SM	21	1	SMU	Mahasiswa	24,5	2500	48	32	30
38	IN	33	4	SMU	IRT	28	3600	50	35	34
39	IE	27	1	S1	Karyawan	29	2800	47	32	30
40	JA	32	3	S1	Guru	30,3	3300	50	34	33
41	H	40	2	SMU	Wiraswasta	26,5	3200	50	33	33
42	FM	29	1	S1	IRT	24	2700	49	32	30
43	EP	25	2	S1	IRT	25,5	3900	48	34	36
44	SS	28	1	S1	Wiraswasta	30	2800	46	30	30
45	TP	29	1	S1	PNS	24,5	3200	47	33	33
46	AN	28	2	S1	Karyawan	33,5	4200	51	35	35
47	ZW	31	3	D4	Honoror	28	3700	51	33	33
48	SA	23	1	S1	Wiraswasta	22	3000	50	32	31
49	AF	25	1	S1	Karyawan	26,5	2600	47	30	28
50	SB	24	1	S1	IRT	27,8	2350	45	30	28
51	NA	27	1	S2	Karyawan	23	2500	46	30	28
52	AW	30	1	S1	Karyawan	29	3200	49	32	30
53	RA	25	1	D3	Honoror	28,2	3550	50	34	33
54	SY	19	1	SMU	IRT	31	3800	50	32	30
55	IN	28	1	D4	PNS	26	2600	46	30	30
56	H	32	2	SMP	Wiraswasta	26	2200	46	30	30
57	EF	32	3	SMP	IRT	33,5	3000	49	32	34
58	NT	28	2	SMU	Wiraswasta	28	3400	51	33	30
59	NF	25	2	S1	IRT	28	2900	47	31	30
60	SA	21	1	S1	IRT	30,5	3500	50	33	34
61	NI	26	1	S1	Karyawan	25	2750	47	33	32
62	NB	25	1	S1	IRT	26	3250	51	33	32
63	AB	27	2	S1	Karyawan	36	3200	50	33	32
64	TR	23	1	S1	PNS	26,5	2900	50	33	31
65	NA	25	1	S1	IRT	29,2	2900	49	32	31
66	AS	20	1	SMU	Wiraswasta	28,5	3200	50	33	32
67	MA	25	1	S1	Wiraswasta	25	3100	51	33	31
68	MM	22	2	SMU	IRT	27,2	2900	50	33	31
69	SD	24	1	SMU	IRT	32	3300	50	33	32
70	RP	24	1	S1	Guru	25	2750	47	33	28
71	SF	22	1	D4	IRT	24,5	3000	47	31	32
72	AS	25	1	S1	IRT	32	3350	48	32	32
73	YA	27	1	S2	Guru	29,5	3400	50	34	34
74	NG	17	1	SMP	IRT	20	2750	47	31	32
75	AR	35	3	S1	PNS	28,5	3000	49	33	34

76	SR	23	3	SMU	IRT	26,5	3400	48	33	34
77	NW	29	1	SMU	IRT	25,5	2700	49	31	30
78	RD	26	1	S1	IRT	36	3350	48	31	34
79	IY	21	1	SMU	Mahasiswa	33	3100	50	32	31
80	AS	24	1	SMU	Mahasiswa	24	3150	49	32	31
81	AT	24	3	SMU	IRT	25	2950	48	32	31
82	NH	28	1	S1	Karyawan	28	3200	48	32	33
83	SS	36	3	SMU	IRT	29	3700	52	34	32
84	EA	36	2	S1	Karyawan	31	3200	49	33	33
85	NZ	27	2	S1	IRT	30,5	3250	49	33	31
86	KK	23	1	SMU	IRT	26,5	3300	50	33	30
87	NN	30	2	D3	Bidan	30,7	3400	50	32	32
88	WA	27	1	S2	IRT	29,8	3000	49	32	31
89	SM	40	4	D2	IRT	26	3450	49	33	32
90	FM	27	1	S1	IRT	25	2900	47	32	31
91	SP	19	1	SMU	IRT	25	3250	49	32	32
92	S	29	2	SMU	IRT	36	3200	48	33	32
93	MAC	19	1	SMU	IRT	33	3400	50	34	34
94	HF	27	3	S1	Guru	28,5	3650	52	34	34
95	AM	25	1	D1	PNS	32,5	2950	47	32	30
96	JA	25	1	SMU	IRT	35	2600	49	31	29
97	P	24	1	S1	Karyawan swasta	26	3000	48	32	30
98	I	25	1	S1	Karyawan swasta	24,5	2950	48	33	28
99	FI	25	1	SMU	IRT	26	3300	48	32	30
100	SM	21	1	SMU	IRT	24,5	2500	48	32	30
101	FI	29	1	SMP	IRT	35	3000	49	33	32
102	AA	25	1	S1	IRT	22,5	3200	49	32	30
103	MI	32	1	D4	IRT	23	2800	48	31	31
104	CA	25	1	S1	IRT	25,5	3150	50	34	32
105	UP	28	1	D4	IRT	29,5	3300	50	33	34
106	AE	24	3	D3	IRT	22,5	2700	46	30	28
107	RF	26	1	S1	Karyawan swasta	32,5	2950	48	32	31
108	AS	30	2	S1	Dokter	33	3100	50	33	32
109	RA	27	2	SMU	IRT	30,5	3300	49	33	30
110	MT	27	1	S1	Guru	25,5	3500	52	33	32
111	SH	27	2	SMU	IRT	27	3800	51	33	34
112	SA	27	3	D3	Karyawan swasta	23,3	2700	47	30	33
113	SY	36	3	S1	PNS	33,5	3500	49	33	33
114	GW	30	1	S1	IRT	28,5	3000	50	33	30

115	FS	27	2	D4	IRT	33	3500	49	34	30
116	AR	32	3	S1	IRT	24,5	3100	49	32	32
117	IR	30	2	S2	IRT	28	3300	49	32	33
118	S	27	1	S1	Guru	27	3250	48	33	33
119	NS	28	3	S1	IRT	26,5	2800	48	32	31
					Karyawan					
120	N	29	1	SMU	swasta	27,5	3100	49	32	33
121	I	24	2	SMU	IRT	24	3250	49	33	32
					Karyawan					
122	DD	24	1	SMU	swasta	20,5	2600	47	31	32
123	FA	26	2	D3	IRT	25	3050	48	31	30
124	R	26	1	S2	Dosen	26	2800	46	31	32
125	RS	22	1	SMU	IRT	32,5	3550	49	33	32
126	SA	27	1	S1	PNS	24	2700	48	32	30
127	FS	23	3	SMU	IRT	31,5	3100	49	33	30
128	EF	22	1	SMU	IRT	31	3000	47	31	30
129	WM	30	2	S1	Perawat	28	2750	48	33	30
130	SR	23	1	D3	IRT	29	2900	49	32	30
131	KN	29	2	S2	Dosen	22	2300	44	30	29
132	MA	41	5	SMU	IRT	33	3400	51	33	32
133	HK	29	1	S1	IRT	27	2750	46	31	31
					Karyawan					
134	JI	26	2	S1	swasta	29,5	3100	47	32	31
135	SP	29	2	SMU	IRT	30	3100	48	32	32
136	NA	21	1	D3	IRT	32	2950	50	34	34
137	AN	21	1	SMU	Mahasiswa	24,5	3200	50	34	33
138	MF	36	2	D3	Honorar	22	2900	48	32	30
139	MN	35	4	S1	PNS	26,5	3000	48	32	31
					Karyawan					
140	SF	25	1	SMU	swasta	21	2500	45	31	30
141	MB	28	1	S1	Wiraswasta	25,5	2800	49	33	30
142	AS	28	1	D3	IRT	29	3000	47	31	31
143	YI	30	2	SMU	IRT	33	3500	50	34	32
144	MI	23	3	SMU	IRT	29,5	3300	51	33	32
145	AF	28	1	D3	Wiraswasta	30,5	3800	49	33	32
146	KN	32	2	S1	IRT	29,5	3000	50	33	32
147	M	43	2	S1	IRT	33,5	4150	53	39	33
148	K	40	4	S2	PNS	27,5	3000	50	33	30
149	NF	30	1	SMU	Wiraswasta	28	3100	50	33	30
150	SH	24	2	SMU	IRT	25	2800	50	31	30
151	MR	26	2	SMP	IRT	24,5	3000	48	32	30
152	IP	27	1	S1	IRT	28,5	2800	49	32	32
153	DA	25	1	SMU	Karyawan	26,5	2600	48	30	30

					swasta					
154	PS	39	2	SMU	IRT	27,5	3300	48	31	30
					Karyawan					
155	NR	27	1	S1	swasta	24	2600	49	32	30
156	DS	30	3	SMU	IRT	32	3300	49	33	32
157	AM	25	1	S1	IRT	26	3000	49	33	30
158	NT	19	1	SMU	IRT	23,5	2400	47	30	27
159	NW	24	2	D3	IRT	25	2600	46	31	31
160	S	27	2	S1	IRT	27,5	2950	49	31	31
161	FH	22	1	SMU	IRT	32	3300	50	33	31
162	MS	27	1	D3	Honorar	26,5	2850	47	32	32
					Karyawan					
163	AT	37	3	SMU	swasta	28	3000	48	34	34
164	NA	24	1	SMU	IRT	27,5	2800	49	33	33
165	NA	29	1	S1	IRT	28	3100	49	31	31
166	SS	31	3	S1	IRT	24,5	3000	49	33	34
167	AZ	28	2	S2	IRT	29	3000	50	33	34
168	ID	23	1	SMU	IRT	36	3200	48	31	31
169	AA	35	2	S1	IRT	34	3600	50	33	34
170	AR	36	2	S1	IRT	24	2750	48	32	32
171	KP	17	1	S1	IRT	27,5	2800	49	33	33
172	FM	24	1	S1	Guru	25	2600	46	32	33
173	AT	28	1	S1	IRT	28	3100	49	33	32
174	AP	20	1	SMU	Mahasiswa	30	3250	49	33	34
175	JB	29	1	SMU	IRT	35	3400	49	33	34
176	FA	29	1	S1	Honorar	28,5	3150	50	32	31
					Karyawan					
177	YL	31	2	S1	BUMN	27	2900	49	31	33
178	RR	25	1	S1	PNS	30,5	3100	49	33	34
179	CG	18	1	SMU	Mahasiswa	33,5	3450	50	33	34
180	AS	26	1	S1	IRT	25	2700	46	30	28
181	NO	30	3	S1	Wiraswasta	32	3400	50	34	35
182	SN	27	1	S1	IRT	24	2600	49	33	32
183	FR	29	2	SMU	IRT	31,5	3500	49	33	33
					Karyawan					
184	NF	24	1	S1	swasta	29	3400	50	33	32
185	MI	23	1	SMU	Wiraswasta	28,5	3250	49	32	32
186	NN	25	2	SMU	IRT	29	3100	50	33	33
187	IA	23	1	SMU	IRT	24,5	2400	45	31	36
188	AS	27	1	SMU	IRT	32	3200	50	34	33
					Karyawan					
189	IP	27	1	S1	swasta	31,8	2500	47	32	31
190	MA	22	1	SMU	IRT	26,5	2800	50	33	30

191	NA	39	3	S1	Guru	27	3100	50	33	33
192	J	34	2	S1	Karyawan swasta	26	2500	48	33	30
193	SB	29	3	S1	Karyawan swasta	29,5	3300	50	34	33
194	FM	30	1	SMU	Karyawan swasta	27	3000	48	32	32
195	HA	31	2	SMU	IRT	25,5	3200	50	33	34
196	PS	29	3	S1	IRT	34	3100	49	33	32
197	NF	33	4	S1	PNS	26	3300	49	34	34
198	SS	30	2	S1	IRT	29,5	3300	48	32	32
199	AY	34	3	S1	Honorar	26	3200	49	33	32
200	SS	29	2	S2	IRT	31	3700	50	34	35



LAMPIRAN 3
LEMBAR REKOMENDASI ETIK

	<p>KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN</p> <p><small>Kampus 1 Jl. Sultan Alauddin No 53, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar Kampus 2 Jl. H.M. Yasin Limpo No. 26 Telp. (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400. Selayang, Gowa</small></p>													
LEMBAR REKOMENDASI ETIK														
Nomor	: E.007/KEPK/FKIK/XII/2019													
Judul Penelitian	: Hubungan Lingkar Lengan Atas (LILA) Ibu Hamil Terhadap Antropometri Bayi Baru Lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kora Makassar													
Nama Peneliti	: Rizka Amalia													
No. Register	: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>U</td><td>I</td><td>N</td><td>A</td><td>M</td><td>I</td><td>9</td><td>1</td><td>2</td><td>E</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td> </tr> </table>	U	I	N	A	M	I	9	1	2	E	0	0	7
U	I	N	A	M	I	9	1	2	E	0	0	7		
A	Rangkuman penelitian oleh reviewer terlampir													
B	Perlu full board : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)													
C	Catatan Rapat Etik (Full Board) Tgl/Asam/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi													
D	Hasil Penelitian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembar pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembar pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembar pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembar pertimbangan / saran / petunjuk)													
E	Pemugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat) Dr.dr. Syarifah, M.Kes., Sp.A													

11 Desember 2019



Dr. dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes
NIP. 198007012006042002

LAMPIRAN 4
SURAT IZIN PENELITIAN




1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 1 7 9 4

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 2665/S/5.01/PTSP/2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Direktur RSIA Ananda Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.2662/FKIK/PP.00.9/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : RIZKA AMALIA
Nomor Pokok : 70600116009
Program Studi : **Pend. Dokter**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. SR Alauddin No. 63, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

**" HUBUNGAN LINGKAR LINGGAN ATAS IBU HAMIL DENGAN ANTROPOMETRI BAYI BARU LAHIR DI
RSIA ANANDA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 16 Desember 2019 s.d 16 Januari 2020**

Selubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyambut dengan senang hati dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar
Pada tanggal : 12 Desember 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. N. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19810513 199002 1 002

Terdapat 2/3
1. Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar
2. Penanggung

SAMP-PTSP 12-12-2019



J. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448836
Website : <http://sinapi.sulawesiprov.go.id> Email : ptsp@sulawesiprov.go.id
Makassar 90231



LAMPIRAN 5
FORM PENGANTAR PENELITIAN



Rumah Sakit Ibu dan Anak ANANDA

Jl. Andi Djemma No. 57, Makassar – Indonesia
Telp. +62411 – 874596, Fax : +62411 – 853694

Email : sekretariat@anandahospital.com | Website : www.anandahospital.com

FORM PENGANTAR PENELITIAN

Kepada Yth. Kordinator Unit Perinatologi
Dengan hormat, Dengan ini menengngkan bahwa peneliti/mahasiswa berikut ini : Nama : Rizka Amalia Stambuk : 70600116009 Program Studi : Pendidikan Dokter Instansi Pendidikan : UTN ALAUDDIN MAKASSAR
Akan melakukan penelitian : Terhitung : 13 Januari 2020- 13 Februari 2020 Jenis Data : Kuesioner ke pasien Kelas I/II/III Untuk penelitian dengan judul : "Hubungan Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil dengan Antropometri Bayi Baru Lahir di RSIA ANANDA MAKASSAR" Harap dilakukan pembimbingan dan pendampingan sepeelunya. Mengetahui, Divisi SDM dan Diklat  Qalbia Muhammad N07, SKM., MARS



Rumah Sakit Ibu dan Anak ANANDA

Jl. Andi Djemma No. 57, Makassar – Indonesia
Telp. +62411 – 874596, Fnc : +62411 – 853694

Email : sekretariat@anandahospital.com | Website : www.anandahospital.com

FORM PENGANTAR PENELITIAN

Kepada Yth. Koordinator Unit	
Ruang Perawatan Lantai 6 dan Lantai 7	
Dengan hormat, Dengan ini menerangkan bahwa peneliti/mahasiswa berikut ini :	
Nama :	Rizka Amalia
Sambuk :	70600116009
Program Studi :	Pendidikan Dokter
Instansi Pendidikan :	UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Akan melakukan penelitian :	
Terhitung :	13 Januari 2020- 13 Februari 2020
Jenis Data :	Kuesioner ke pasien Kelas I/II/III
Untuk penelitian dengan judul : "Hubungan Lingkaran Atas Ibu Hamil dengan Antropometri Bayi Baru Lahir di RSIA ANANDA MAKASSAR"	
Harap dilakukan pembimbingan dan pendampingan seperlunya.	
Mengetahui, Divisi SDM dan Diklat	
 Qalbis Muhammad Nur, SKM, MARS	

LAMPIRAN 6

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN


Rumah Sakit Ibu dan Anak ANANDA

Jl. Andi Djemma No. 57, Makassar – Indonesia
 Telp. +62411 – 874596, Fax : +62411 – 853694
 Email : sekretariat@anandahospital.com | Website : www.anandahospital.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 019/RSIA-A/I/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qalbia Muhammad Nur, SKM, MARS
 Jabatan : Sekretaris Direktur

Menyerangkan bahwa:

Nama : Rizka Amalia
 Asal Institusi : FKIK UIN Alauddin Makassar
 Judul : *"Hubungan Lingkar Lengan Atas (LLA) Ibu Hamil Terhadap Antropometri Bayi Baru Lahir (BBL)"*

Adalah benar telah melakukan penelitian di RSIA ANANDA Makassar pada tanggal 13 – 23 Januari 2020 sebanyak 96 sampel.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 Januari 2020
 Sekretaris Direktur


 RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
ANANDA
 Jl. Andi Djemma No. 57, Makassar
 Qalbia Muhammad Nur, SKM, MARS

LAMPIRAN 7
DOKUMENTASI



M A K A S S A R



AL AUDDIN
S S A R

LAMPIRAN 8
RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama Lengkap : Rizka Amalia
 Nama Panggilan : Ika
 NIM : 70600116009
 Tempat, Tanggal Lahir : Bau-Bau, 20 Oktober 1998
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jurusan/Fakultas : Pendidikan Dokter/FKIK
 Nama Orangtua :
 Ayah : Ir. Hafid
 Ibu : Hj. Mastura
 Anak Ke : 2
 Alamat : Jalan Mannuruki 2 Lorong 5A No. 2
 Telepon : 082291572209
 Email : rizkaamalia2098@gmail.com
 Riwayat pendidikan : SMA Negeri 1 Pasarwajo



SD Negeri 2 Dongkala (2004-2010)
 SMP Negeri 3 Pasarwajo (2010-2013)
 SMA Negeri 1 Pasarwajo (2013-2016)
 Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar (2016 -
 sekarang)

Pengalaman Organisasi :

Pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter (2017)
 Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Kedokteran (2018)

Prestasi yang Pernah Diraih :

Juara 2 Hasanuddin Medical Student Quiz 2019 bidang Musculoskeletal