

**ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN ASFIKIA NEONATORUM DI
RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR TAHUN 2021**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

SHANUN SHARI SAKUNTI

NIM: 70600118018

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan kemudahan dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Faktor Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021**” dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi Rahmatan Lil' alamin.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis alami. Namun berkat dukungan dan semangat dari berbagai pihak sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT. atas segala nikmat dan karunia yang diberikan.
2. Kedua orangtua saya yang tercinta, Ayahanda Sabri dan Ibunda Nurwana atas doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan baik berupa materi dan non materi yang diberikan kepada saya hingga saat ini.
3. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staff dan jajarannya.
4. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penyusun selama menjalankan pendidikan.
5. dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Andi Tihardimanto K,M.Kes, MARS, Sp.JP. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penyusun menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar serta seluruh staf prodi kedokteran yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka

penyusunan skripsi ini.


6. dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku pembimbing I dan Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku pembimbing II, yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang tepat.
7. dr. Andi Tihardimanto K, M.Kes, MARS, Sp.JP. selaku penguji kompetensi dan Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I selaku penguji integrasi keislaman.
8. Staff RSUD Labuang Baji Makassar terutama staff tata usaha, diklat, dan rekam medik yang telah dengan senang hati membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya BUNI (Ilma, Andita, Yuyu, Tiara, Faridha, Namira, Bunga, Imma) yang senantiasa melewati hari-hari suka duka bersama di preklinik dan yang saling menguatkan satu sama lain dalam setiap proses preklinik ini.
10. Teman saudara se-PA saya Apriani Sahid, Isnada Rahim yang sama-sama berjuang dan memberikan doa, semangat, dan bantuannya untuk menyelesaikan studi ini.
11. Teman-teman sejawat angkatan 2018, F18ron3ktin yang telah kebersamai dalam hari-hari saya.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin*.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 18 Agustus 2021

Penyusun



Shanun Shari Sakunti

NIM : 70600118018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
D. Definisi Operasional	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Tujuan Penelitian	18
G. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Definisi Asfiksia Neonatorum.....	21
B. Epidemiologi Asfiksia Neonatorum.....	21
C. Etiologi Asfiksia Neonatorum.....	21
D. Faktor Risiko Asfiksia Neonatorum.....	22
E. Patofisiologi Asfiksia Neonatorum	31
F. Penegakan Diagnosis Asfiksia Neonatorum	33
G. Tatalaksana Asfiksia Neonatorum.....	35
H. Komplikasi Asfiksia Neonatorum.....	47
I. Integrasi Keislaman	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	57
A. Desain Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Waktu Penelitian.....	57
D. Variabel Penelitian.....	57
E. Populasi dan Sampel.....	57
F. Cara Pengumpulan Data	59
G. Kerangka Teori	60

H.	Kerangka Konsep.....	54
I.	Kerangka Kerja	55
J.	Pengolahan Data	55
K.	Analisis Data	55
L.	Penyajian Data	56
M.	Etika Penelitian	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		57
A.	Hasil Penelitian	57
B.	Pembahasan.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		85
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....		88
LAMPIRAN.....		93



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	9
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	12
Tabel 2.1 Apgar Skor	33
Tabel 2.2 Nilai Downe	41
Tabel 4.1 Karakteristik Sampel Penelitian.....	58
Tabel 4.2 Distribusi Faktor Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021	59
Tabel 4.3 Analisis Faktor Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021	61
Tabel 4.4 Hasil Uji Bivariat Variabel Independen yang Diikutkan Dalam Analisis Multivariat.....	66
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Logistik Berganda Faktor Risiko Paling Dominan Terhadap Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Labuang Baji Makasaar Tahun 2021	67




DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Proses Bernapas Bayi.....	31
Bagan 2.2 Patofisiologi Asfiksia.....	32
Bagan 2.3 Penilaian Awal VTP	43
Bagan 2.4 Penilaian Kedua VTP.....	43
Bagan 2.5 Alur Resusitasi.....	46
Bagan 2.6 Algoritme Resusitasi Neonatus.....	47



DAFTAR SINGKATAN

saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
swt.	= <i>subḥānahū wa ta’ālā</i>
QS	= Al-Quran surah
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I (Surat Izin Penelitian PTSP)	1
Lampiran II (Surat Izin Penelitian RSUD Labuang Baji Makassar).....	2
Lampiran III (Surat Keterangan Layak Etik)	3
Lampiran IV (Master Tabel Penelitian)	4
Lampiran V (Hasil Output SPSS)	5
Lampiran VI (Dokumentasi Penelitian)	6



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shanun Shari Sakunti

NIM : 70600118018

Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 06 Juni 2000

Jur/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan dokter

Fakultas/Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan


Alamat : Jl. Sultan Alauddin III, Komp. Griya Telkom B14

Judul : Analisis Faktor Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Februari 2022

Penyusun



Shanun Shari Sakunti

NIM:70600118018

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Shanun Shari Sakunti
NIM : 70600118018
Judul : Analisis Faktor Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD
Labuang Baji Makassar Tahun 2021

Karya tulis ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Makassar, 21 Februari 2022

Pembimbing I



dr. Rini Fitriani, M.Kes.

Pembimbing II



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021” yang disusun Shanun Shari Sakunti NIM 70600118018, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Februari 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.


Makassar, 21 Februari 2022 M
20 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr.dr. Rosdianah, M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: dr. Rini Fitriani, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Dr.dr. Syatirah, Sp.A, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Andi Tihardimanto, M.Kes., Sp.JP	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.L, M.Th.I	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN ASFIKSIA NEONATORUM DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR TAHUN 2021

Shanun Shari Sakunti¹, Rini Fitriani², Syatirah Jalaluddin³, Andi Tihardimanto⁴

Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

Asfiksia merupakan penyebab kedua terbanyak kematian neonatal di Indonesia pada tahun 2019 dengan kasus sebanyak 5.464 kasus. Asfiksia terjadi karena kurangnya aliran darah ataupun pertukaran gas dari atau ke janin pada bayi baru lahir. Jika keadaan ini tidak ditangani secara cepat dan tepat maka dapat menyebabkan kerusakan organ vital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor risiko yang mempengaruhi kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. Desain penelitian yang digunakan yaitu analitik observasional dengan pendekatan *case control*. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan data sekunder berupa rekam medik pasien. Dari sampel 47 kasus dan 47 kontrol dengan uji *chi square odd ratio* didapatkan usia ibu (OR=1,857; CI 95%= 0,809-4,264), ibu dengan preeklampsia (OR=2,179; CI 95%=0,848-5,603), paritas ibu (OR=0,652; CI 95%=0,262-1,623), dan metode persalinan dengan instrumen (OR=0,616; CI 95%=0,258-1,468) bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum dan ibu dengan anemia (OR=3,410; CI 95%=1,350-8,614), KPD (OR=3,872; CI 95%=1,364-10,989), BBL (OR=7,451; CI 95%=2,913-19,057), dan usia gestasi (OR=7,765; CI 95%=2,770-21,765) merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum. Hasil uji regresi logistik berganda menunjukkan BBL merupakan risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian asfiksia neonatorum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

THE RISK FACTORS ANALYSIS OF ASPHYXIA NEONATORUM IN LABUANG BAJI HOSPITAL OF MAKASSAR IN 2021

Shanun Shari Sakunti¹, Rini Fitriani², Syatirah Jalaluddin³, Andi Tihardimanto⁴

Medical Education Program of UIN Alauddin Makassar

Asphyxia was considered to be the second cause of neonatal death in Indonesia with 5,464 cases during the year of 2019. Asphyxia occurs due to the lack of blood flow and air exchanges from and to the fetus in newborns. If this situation is not treated quickly and properly, it may cause various damages to the vital organs of the fetus. Therefore, the major purpose of this study was to investigate the risk factors that influence the occurrences of asphyxia neonatorum in Labuang Baji Hospital of Makassar. The method used for this study was observational analytic by using a case control approach. The sampling method used in this research was a purposive sampling method. The research data were taken from the medical records of patients at the hospital. There were 47 selected samples of the study, and 47 selected samples for the controls. The data were analysed by using a chi square odd ratio test. From this research, it was apparent that the maternal age with (OR = 1.857; 95% CI = 0.809-4.264), the preeclampsia in mothers (OR = 2.179; 95% CI = 0.848-5.603), the maternal parity (OR=0.652; 95% CI=0.262-1.623), and the instrumental delivery method (OR=0.616; 95% CI=0.258-1.468) were not considered to be the factors on the occurrences of asphyxia neonatorum. In contrast, the variables of maternal anemia (OR=3.410; 95% CI = 1.350-8.614), the PROM (OR=3.872; 95% CI=1.364-10.989), the BBL (OR=7.451; 95% CI=2.913-19.057), and the gestational age (OR=7.765; 95% CI=2.770- 21,765) were considered to be the major factors on the occurrences of asphyxia neonatorum. Moreover, the results of multiple logistic regression test also showed that the BBL was the most influential factor causing the asphyxia neonatorum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian bayi (*infant mortality*) merupakan kematian pada bayi sebelum usianya menginjak satu tahun (CDC, 2018). Angka kematian bayi biasanya digunakan bukan hanya untuk mengukur perkembangan ekonomi, namun juga dapat mengukur taraf hidup maupun indikator kesehatan dari suatu bangsa (Popoola, 2019). Berdasarkan data global WHO terbaru tahun 2019 angka kematian bayi sebesar 28.23% per 1000 kelahiran hidup di dunia, terhitung sejak tahun 2009 sebanyak 38,28% per 1000 kelahiran hidup di dunia dan dalam 10 tahun terakhir angka ini mengalami penurunan sebanyak 10,05% (WHO, 2019).

Berdasarkan hasil dari Survei Demografi & Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 terdapat Angka Kematian Neonatal sebanyak 15/1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi 24/1.000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian Balita 32/1.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2019). Di Sulawesi Selatan sendiri terdapat 799 kasus kematian neonatal pada tahun 2018, dan angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup adalah 5,30. Pada tahun 2019 angka kematian neonatal adalah 714 kasus, lebih rendah dari tahun sebelumnya, dengan angka kematian neonatal 4,68 per 1.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Sulsel, 2020).

Berdasarkan laporan data yang masuk ke Direktorat Kesehatan Keluarga dalam komdat.kesga.kemkes.go.id, di tahun 2019 terdapat sebanyak 69% kematian neonatal dari total 29.322 kematian balita. Dari total kematian neonatal

tersebut, 80% (16.156 kematian) terjadi pada bayi baru lahir dalam enam hari pertama kehidupan (Kemenkes, 2019). Tingginya angka kematian neonatal ini terkait dengan kualitas dari pelayanan persalinan maupun penanganan bayi baru lahir yang belum optimal saat segera setelah lahir hingga minggu pertama setelah lahir (WHO, 2018).

Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan penyebab utama kematian neonatal di Indonesia pada tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 7.150 kasus, dan penyebab kedua terbanyak yaitu asfiksia dengan jumlah 5.464 kasus. Selama periode neonatal (0-28 hari), terjadi penyesuaian yang besar akibat perbedaan kehidupan intrauterin dan ekstrauterin, dan hampir semua sistem mengalami pematangan organ. Bayi yang berusia kurang dari satu bulan merupakan kelompok usia yang paling berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan yang apabila tidak ditangan dengan tepat bisa berakibat fatal (Kemenkes, 2019).

Asfiksia neonatorum merupakan salah satu sindrom distres pernapasan dimana terjadi kegagalan napas pada bayi baru lahir (Dorland, 2015). Asfiksia terjadi karena kurangnya aliran darah ataupun pertukaran gas dari atau ke janin pada bayi baru lahir. Jika keadaan ini tidak ditangani secara cepat dan tepat maka dapat menyebabkan kerusakan organ vital (otot, hati, jantung, dan paling parah otak) (Gillam-Krakauer & Gowen, 2020).

Adapun faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kejadian asfiksia neonatorum berupa: a) faktor prenatal, seperti usia ibu, preeklamsia dan eklamsia, faktor sosial ekonomi; b) faktor intranatal, seperti kelainan letak, operasi sesar, persalinan dengan ekstraksi vakum, forseps, prolaps tali pusat dan ketuban pecah

dini; c) Faktor bayi, termasuk berat badan lahir rendah, persalinan prematur (Aslam *et al.*, 2014).

Dalam Murniati, Taherong, dan Syatirah (2021) disebutkan bahwa prevalensi asfiksia di Indonesia karena faktor penyakit ibu antara lain preeklamsia dan eklamsia sebesar (24%), anemia (10%), infeksi berat (11%), sedangkan pada faktor persalinan diantaranya proses persalinan yang lama atau macet sebesar (2,8–4,9%), persalinan dengan komplikasi (seperti presentasi bokong, gemeli, distosia bahu, vakum ekstraksi, forsep) adalah (3 – 4%).

Proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim sangat didukung oleh faktor ibu, yaitu bagaimana cara agar ibu dapat memenuhi nutrisi janin untuk tumbuh kembang yang optimal, serta dapat melewati masa transisi dari intrauterin ke ekstrauterin. Allah swt. telah menjelaskan dalam QS al-Hajj/22: 5.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ^٥ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
خُرَجْنَاهُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ^٦ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَّىٰ^٧ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِهَا
الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا^٨ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأُنْبِتتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa

yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (QS al-Ḥajj/22: 5) (Kementerian Agama RI, 2019)

Dalam buku tafsir Ibnu Kaṣīr, ketika Allah swt. menceritakan manusia yang tidak percaya akan hari kebangkitan dan akhirat, Dia menunjukkan bukti kekuasaan-Nya sebagaimana yang dijelaskan pada awal penciptaan manusia. *“maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah”* yaitu asal manusia dimulai dari Adam as. yang dibentuk dari tanah tersebut. *“kemudian dari setetes mani”* yaitu Allah swt. menjadikan turunannya dari setetes air yang hina. *“kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging”* yaitu ketika air mani telah menetap di rahim wanita, maka akan tinggal di rahim itu selama 40 hari, begitu pula semua yang bersatu dengan air mani tersebut. Kemudian terbentuk segumpal darah merah atas izin Allah swt. dan tinggal didalam rahim seorang wanita selama 40 hari. Selanjutnya, segumpal darah itu berkembang membentuk *mudghah* (segumpal daging) yang belum ada rupa dan bentuknya. Kemudian, diberilah oleh Allah swt. bentuk dan rupa, seperti tangan, kepala, dada, perut, kaki, dan seluruh anggota badannya. *“kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna”* yaitu keguguran yang dapat terjadi baik setelah sempurna bentuk anggota badannya maupun yang belum sempurna bentuk dan rupanya. Ketika lewat dari 40 hari setelah terbentuk segumpal daging, maka Allah swt. meniupkan ruh kedalam *mudghah* serta memperkuatnya atas apa yang dikehendaki oleh Allah swt. berupa keelakan

maupun keburukan, jenis kelamin, serta menetapkan rizki, kapan ajalnya, celaka maupun bahagiannya. “kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi” yaitu bayi lemah tubuhnya, pendengaran, penglihatan, perasaan, gerak, dan juga akal nya. Kemudian Allah swt. berikan sedikit demi sedikit kekuatan kepadanya dan ditumbuhkan rasa kasih sayang pada kedua orang tuanya di siang dan malam (Kaṣīr, 2012).

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits al-Bukhārī, dari Zaid bin Wahhāb, Ibnu Mas’ūd berkata: “Rasulullah bersabda dan dia orang yang jujur dan dipercaya: sesungguhnya masing-masing diantara kalian dikumpulkan penciptaannya didalam perut ibunya selama 40 hari berupa *nutfah* (air mani), kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari juga, kemudian diutuslah kepada Malaikat untuk meniupkan kepadanya ruh dan diperintahkan untuk menuliskan empat perkara; ketentuan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan ketentuan akan celaka dan bahagiannya.” (Kaṣīr, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kardana (2016) terhadap 70 responden dengan menggunakan data rekam medik pasien dan metode *case control*, dari 35 kasus asfiksia didapatkan bayi yang mengalami asfiksia dilahirkan oleh 28,6% ibu dengan usia kehamilan risiko tinggi (usia <16 dan >35 tahun). Sedangkan faktor intranatal berupa cara persalinan dengan menggunakan instrumen didapatkan hasil 62,9% bayi mengalami asfiksia, dan 26,6% bayi mengalami asfiksia dengan riwayat persalinan yang lama.

Sedangkan faktor risiko lainnya dari faktor ibu seperti preklamsia, pada hasil penelitian oleh Lestari & Putri (2019) dengan 200 sampel menyatakan bahwa kejadian asfiksia berisiko 0,7 kali lebih tinggi pada ibu dengan preklamsia dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami preklamsia, selain itu asfiksia dominan dipengaruhi oleh faktor kelainan letak dengan presentase sebesar 51% kejadian asfiksia memiliki riwayat kelainan letak dalam kehamilan, sedangkan bayi dengan kelahiran prematur 25% mengalami asfiksia, selain itu bayi dengan BBLR berisiko 45,4% mengalami asfiksia.

Dari hasil survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengambil data awal kejadian asfiksia neonatorum pada tahun 2020-2021 di beberapa rumah sakit yaitu kejadian asfiksia di RSIA Pertiwi Makassar sebanyak 9 kasus, RSIA Ananda Makassar sebanyak 2 kasus, RSUD Haji Makassar sebanyak 6 kasus, dan RSUD Labuang Baji Makassar sebanyak 53 kasus. Dari pengambilan data awal diatas didapatkan tingkat kejadian asfiksia yang paling tinggi ada di RSUD Labuang Baji Makassar yaitu sebanyak 53 kasus oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian di RSUD Labuang Baji Makassar untuk menganalisis faktor yang menjadi risiko kejadian asfiksia neonatorum (Data Sekunder, 2021).

Asfiksia neonatorum merupakan penyebab kedua terbanyak kematian neonatus di Indonesia dan sebagian besar bayi dengan asfiksia mengalami gangguan pada susunan saraf, sedangkan penyebab pertama kematian neonatus yaitu BBLR juga sangat berisiko mengalami asfiksia neonatorum karena belum matangnya fungsi organ tubuh bayi, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait

hal yang menjadi faktor risiko asfiksia, salah satunya agar dapat dilakukan pengendalian yang tepat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terkait untuk mengurangi risiko asfiksia neonatorum. Salah satu cara pengendalian kejadian asfiksia yaitu memaksimalkan tugas tenaga kesehatan dalam mencegah masalah kematian neonatus ini yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan neonatus dasar (resusitasi, ASI eksklusif, mencegah infeksi dengan perawatan tali pusat, mata, kulit, dan melakukan imunisasi), diberikan vitamin K, Manajemen Terpadu Balita Muda (MTB) dan edukasi perawatan neonatus di rumah serta mengamati perkembangan dan pertumbuhan menggunakan buku KIA (Dinas Kesehatan Sulsel, 2020). Selain itu dibutuhkan juga edukasi yang tepat kepada ibu untuk mengurangi faktor risiko terjadinya asfiksia.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait asfiksia neonatorum, penelitian yang akan saya lakukan kali ini akan menganalisis beberapa variabel yang tidak diteliti secara bersamaan oleh penelitian terdahulu berupa faktor prenatal (usia ibu, hipertensi, paritas, dan status anemia), faktor intranatal (metode persalinan dan KPD), dan faktor bayi (BBLR dan prematur). Penelitian ini menggunakan metode *case control* untuk melihat seberapa signifikan faktor-faktor tersebut terhadap kejadian asfiksia dengan perbandingan *case* dan *control* yaitu 1:1, jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 94 sampel yang terbagi atas 47 *case* dan 47 *control*. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Faktor Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum” yang akan dilakukan di RSUD Labuang Baji yang memiliki angka kejadian Asfiksia paling tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian data yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah apakah faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar 2021?

C. Hipotesis

1) Hipotesis kerja

- a) Usia ibu merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- b) Preklamsia merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- c) Paritas merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- d) Anemia merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- e) Metode persalinan dengan instrumen merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- f) Ketuban pecah dini (KPD) merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- g) Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- h) Prematur merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.

2) Hipotesis nol

- a) Usia ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- b) Preklamsia bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- c) Paritas bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- d) Anemia bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- e) Metode bukan persalinan dengan instrumen merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- f) Ketuban pecah dini (KPD) bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- g) Berat badan lahir rendah (BBLR) bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- h) Prematur bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.

D. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Asfiksia Neonatorum	Asfiksia neonatorum mengacu pada kurangnya aliran darah atau pertukaran gas dengan janin sebelum, selama, atau setelah melahirkan, yang dinilai dengan APGAR skor.	APGAR Skor	Asfiksia: AS 5 menit \leq 7 Tidak Asfiksia: AS 5 menit $>$ 7	Nominal
Variabel Dependen					
2.	Usia Ibu	Usia ibu yang diukur mulai dari ibu lahir sampai usia ibu saat melakukan persalinan terakhir yang dinyatakan dalam tahun dan bulan.	Tanggal lahir dan waktu riwayat persalinan terakhir	Risiko tinggi: $<$ 20 tahun dan \geq 35 tahun Risiko rendah: 20-34 tahun	Nominal
3.	Preeklampsia	Kondisi saat naiknya tekanan darah ibu saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu beserta adanya proteinuria \geq 300mg/hari dan dituliskan sebagai diagnosis akhir dalam rekam medis.	Rekam Medis Pasien	Risiko tinggi: Positif preeklampsia Risiko rendah: Negatif preeklampsia	Nominal

4.	Paritas	Jumlah persalinan yang dialami ibu, baik itu kelahiran hidup ataupun mati.	Rekam Medis Pasien	Risiko tinggi: grandemultipara (paritas ≥ 4) dan primipara (paritas 1) Risiko rendah: multipara (paritas 2-3)	Nominal
5.	Anemia	Kurangnya jumlah eritrosit, kadar Hb, dan volume hematokrit per 100 ml darah yang dinyatakan dalam satuan gr/dL yang diperiksa selama masa kehamilan ibu.	Rekam Medis Pasien	Risiko tinggi: Hb < 11 gr/dL Risiko rendah: Hb \geq 11 gr/dL - <16gr/dL	Nominal
6.	KPD	Keluarnya cairan ketuban melalui jalan lahir sebelum adanya proses persalinan yang dinyatakan dalam jam, disebut KPD berkepanjangan bila terjadi diatas 12 jam.	Rekam Medis Pasien	Risiko tinggi: KPD \geq 12 jam Risiko rendah: KPD < 12 jam	Nominal
7.	Metode Persalinan	Cara yang digunakan dalam proses persalinan. Terbagi atas instrumen (dengan alat seperti Caesar, forceps, ekstraksi vakum) dan non instrumen (normal spontan).	Rekam Medis Pasien	Risiko tinggi: Instrumen (operasi sesar, vakum ekstraksi, dan forceps) Risiko rendah: Non instrumen:	Nominal

				lahir normal dan spontan	
8.	BBL	Berat badan bayi yang diukur dengan menggunakan timbangan bayi saat bayi baru lahir, yang dinyatakan dengan satuan gram.	Rekam Medis Pasien	Risiko tinggi: BB < 2.500gr- >4000gr Risiko rendah: BB ≥ 2.500gr- 4000gr	Nominal
9.	Usia gestasi	Usia gestasi adalah usia kehamilan yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir dan dinyatakan dalam satuan minggu.	Rekam Medis Pasien	Risiko tinggi: <37 minggu dan >42 minggu Risiko rendah: 37-42 minggu	Nominal

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil
1.	Mohammed Solayman, Sayama Hoque, Taslima Akber, Imtiajul Islam,	<i>Prevalence of Perinatal Asphyxia with Evaluation of Associated Risk Factors in a Rural Tertiary Level Hospital.</i>	<i>Cross-sectional</i>	211 sampel	Dengan menggunakan test <i>Chi-square</i> didapatkan Rasio asfiksia pada bayi laki-laki dan perempuan adalah 1,6: 1. Faktor risiko ibu-janin signifikan yang teridentifikasi adalah

	Anwarul Islam. (2017)				usia ibu muda ($p = .038$), kondisi sosial ekonomi rendah ($p = .000$) primiparitas ($p = .003$), cairan ketuban terkontaminasi mekonium ($p = .004$), persalinan macet ($p =$.019), berat badan lahir rendah ($p = .009$) dan persalinan pervaginam di rumah oleh bidan ($p =$.017).
2.	Novia Fajarwati, Pudji Andayani, Lena Rosida. (2016).	Hubungan Antara Berat Badan Lahir dan Kejadian Asfiksia Neonatorum	<i>Cross-</i> <i>sectional</i> dan pendekatan retrospektif.	334 sampel	BBL berisiko sebesar 17,4% dan BBL tidak berisiko sebesar 82,6%. Hasil uji statistik $p =$ 0,674, disimpulkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara berat badan lahir dan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Ulin Banjarmasin periode Juni 2014-Juni 2015.
3.	Hagos Tasew,	<i>Risk factors of birth</i> <i>asphyxia</i>	<i>Cross-</i> <i>sectional</i>	264 sample	Hubungan signifikan asfiksia dan faktor risiko

	Micheal Zemicheal, Girmay Teklay, Tekleweni Mariye, Ebud Ayale. (2018).	<i>among newborns in public hospitals of Central Zone, Tigray, Ethiopia 2018</i>	dan pendekatan retrospektif.		ditentukan menggunakan <i>Binary logistic regression</i> , menunjukkan faktor risiko independen dari asfiksia berupa ibu dengan buta huruf 6 kali lebih berisiko melahirkan bayi asfiksia, ibu primipara 3 kali lebih berisiko mengalami kelahir asfiksia dibandingkan dengan ibu multipara, bayi preterm/premature 2,2 kali lebih berisiko mengalami asfiksia, dan bayi dengan BBLR berisiko 6,9 kali mengalami asfiksia.
4.	Restu Duwi Lestari, Nurita Nilasari Bunga Kharisma Arifiana Putri. (2019)	Analisis Faktor Penyebab Kejadian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir.	<i>Cross sectional</i>	200 sampel	Analisis data bivariat dengan uji <i>chi square</i> dan multivariat dengan uji regresi logistik ganda. Hasil yang berpengaruh terhadap kejadian asfiksia berupa variabel solusio plasenta, lilitan

					tali pusat, simpul tali pusat, paritas dan BBLR.
5.	Dina Mariana, Ashriady. (2020)	Analisis Faktor Risiko Umur Kehamilan Ibu dan Jenis Persalinan terhadap Kejadian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir di Kabupaten Mamuju.	Studi analitik dengan desain <i>case control study</i> .	108 sampel	Metode persalinan dengan <i>section caesarea</i> memiliki risiko sebesar 2,469 kali mengalami asfiksia.
6.	Hadriani Irwan, Nila Meliana, Putri Alifa Muammir. (2019)	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2019.	<i>Cross Sectional</i>	180 sampel	Hasil uji <i>Chi-Square</i> didapatkan variabel partus lama (nilai $p = 0,914 > \text{dari } \alpha = 0,05$) yang berarti tidak berhubungan dengan kejadian asfiksia, untuk variabel bayi prematur ($p = 0,000 < \text{dari } \alpha = 0,05$) terdapat hubungan dengan kejadian asfiksia, untuk variabel jenis persalinan ($p = 0,004 < \alpha = 0,050$) artinya ada hubungan jenis persalinan dengan kejadian asfiksia pada

					bayi baru lahir.
7.	Nova Linda Rambe. (2018)	Hubungan Antara Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli	Rancangan analitik dengan pendekatan kohort retrospektif	344 sampel	Ibu yang melahirkan dengan KPD mengalami asfiksia sebanyak 56,9% dan yang tidak asfiksia 43,1%. Sedangkan ibu yang melahirkan dan tidak mengalami KPD, didapatkan yang mengalami asfiksia sebanyak 21% dan yang tidak asfiksia 79%. Terdapat hubungan yang signifikan antara ketuban pecah dini dengan kejadian asfiksia di RSUD Gunungsitoli.
8.	Subriah dan Agustina Ningsi. (2018)	Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Yang Menjalani Persalinan Spontan Dengan Angka Kejadian Asfiksia Neonatorum Di RSDKIA Pertiwi	Survey analitik dengan rancangan <i>Case Control</i> .	78 sampel	Terdapat hubungan yang bermakna antara untuk mengetahui hubungan anemia pada ibu hamil yang menjalani persalinan spontan dengan angka kejadian asfiksia neonatorum ($p =$

		Kota Makassar Tahun 2017.			0,000 < α = 0,005)
9.	Wubet Alebachew Bayih, Tadesse Gashaw Tezera, Abebaw Yeshambel Alemu, dkk. (2021)	<i>Prevalence and determinants of asphyxia neonatorum among live births at Debre Tabor General Hospital, North Central Ethiopia: a cross-sectional study.</i>	<i>Cross sectional</i>	240 sampel	Prevalensi asfiksia sebesar 6,7% berdasarkan skor Apgar menit kelima. Dari hasil uji <i>multivariable logistic regression</i> didapatkan faktor risiko yang signifikan berupa komplikasi obstetrik antenatal (AOR = 2.63, 95% CI: 3.75, 14.29), malpresentasi fetal (AOR = 3.17, 95% CI: 1.21, 15.20), KPD (AOR = 6.56, 95% CI: 3.48, 18.12).
10.	Moges Workneh Ayele dan Birhanu Demeke Workneh. (2019)	<i>Risk Factors of Birth Asphyxia among Neonates Born in Dessie Referral Hospital, North East, Ethiopia: Unmatched Case- Control Study.</i>	<i>Case control</i> tanpa matching.	409 sampel	Faktor yang terkait dengan asfiksia yaitu usia ibu > 36 tahun (AOR=7.8 ; 95% CI (1.80,34.41), riwayat perdarahan antepartum (AOR= 3.84 ; 95% CI (1.70,8.71), infeksi maternal (AOR= 13.51;

					95% CI(4.64-39.34), anemia maternal (AOR= 5.51; 95% CI (2.27, 13.33), KPD (AOR=3.10; 95% CI (1.04 -9.10), cairan ketuban mekonium (AOR=15.23;95% CI (5.88-39.56), neonatus laki-laki(AOR=2.73;95% CI (1.23-5.93), BBL < 1.500 gram (AOR=22.16; 95% CI(2.34-210.30), BBL 1.500-2.500 gram (AOR=10.87;95% CI (1.16-101.60) dan usia gestasi < 34 minggu (AOR=3.20;95% (1.16-8.83).
--	--	--	--	--	---

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor risiko yang mempengaruhi kejadian asfiksia neonatorum pada bayi baru lahir di RSUD Labuang Baji Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui faktor risiko usia ibu terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- b. Untuk mengetahui faktor risiko preeklamsia terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- c. Untuk mengetahui faktor risiko paritas terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- d. Untuk mengetahui faktor risiko anemia terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- e. Untuk mengetahui faktor risiko metode persalinan terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- f. Untuk mengetahui faktor risiko KPD terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- g. Untuk mengetahui faktor risiko BBL terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- h. Untuk mengetahui faktor risiko usia gestasi terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.
- i. Untuk mengetahui faktor yang paling berisiko terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi suatu wadah untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapatkan selama perkuliahan di instansi, dan untuk

menambah wawasan serta pengalaman tentang kejadian asfiksia yang ditemukan di lapangan.

2. Bagi Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan terbaru bagi peneliti lain kedepannya terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi baru bagi masyarakat untuk mengetahui tentang asfiksia neonatorum dan faktor risikonya, sehingga diharap dapat melakukan pencegahan yang tepat.

4. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan gambaran faktor risiko tentang kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar sehingga dapat digunakan dalam perencanaan program Kesehatan ibu dan anak terutama program 1000 HAK yang diselenggarakan oleh UIN Alauddin Makassar agar dapat membantu menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Asfiksia Neonatorum

Asfiksia neonatorum merupakan keadaan bayi baru lahir kesulitan atau bahkan tidak bernapas secara adekuat, spontan, dan teratur. Bayi baru lahir hingga umur 28 hari merupakan periode neonatal (Jodjana & Suryawan, 2020). Asfiksia ditandai dengan adanya hipoksemia (kadar $paCO_2$ menurun), hiperkarbia (kadar $paCO_2$ meningkat), dan asidosis (pH kurang dari 7). Asfiksia neonatorum merupakan *sequel* dari gawat janin atau fetal distress intrauterin yang disebabkan oleh banyak hal (Fanny, 2015).

B. Epidemiologi Asfiksia Neonatorum

Insiden kejadian Asfiksia Neonatorum 2 per 1000 kelahiran di negara maju, dan angka ini lebih tinggi 10 kali di negara berkembang, yang kemungkinan diakibatkan oleh terbatasnya akses dalam perawatan ibu dan anak. Dari bayi yang mengalami Asfiksia, 15-20% nya meninggal pada periode neonatal, dan 25% nya *survive* dengan mengalami defisit neurologis yang permanen (Gillam-Krakauer & Gowen, 2020).

C. Etiologi Asfiksia Neonatorum

Asfiksia neonatorum bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti gangguan hemodinamik pada ibu (emboli cairan ketuban), keadaan uterus (ruptur uteri), tali pusat (solusio plasenta & plasenta previa), dan infeksi. Asfiksia dapat terjadi baik sebelum maupun segera setelah kelahiran dan sangat diperlukan penanganan

berupa resusitasi. Mencari informasi mengenai riwayat obstetri dan peripartum dengan cermat sangat penting untuk menentukan etiologi (Gillam-Krakauer & Gowen, 2020).

D. Faktor Risiko Asfiksia Neonatorum

1. Faktor Prenatal

a. Usia Ibu

Usia ibu yang terlalu muda (dibawah 20 tahun) dan terlalu tua (diatas 35 tahun) lebih berisiko melahirkan bayi asfiksia dibandingkan dengan ibu yang usianya tidak berisiko. Fungsi organ tubuh pada ibu hamil dengan usia yang terlalu muda masih belum siap dan kurang sempurna, sedangkan ibu hamil dengan usia yang terlalu tua maka sistem reproduksi sudah tidak optimal seperti saat usia sebelumnya (Fajarriyanti, 2017).

Wiknjosastro (2010) dalam (Lestari & Putri, 2019) menjelaskan usia ibu yang kurang dari 20 tahun masih belum berfungsi sempurna organ reproduksinya, hal ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi pada saat kehamilan maupun persalinan. Selain itu, kekuatan otot perineum dan otot perut belum bekerja secara optimal. Hamil pada usia yang terlalu muda atau terlalu tua termasuk kedalam kehamilan dengan risiko tinggi yang akan meningkatkan angka kematian dan kesakitan baik bagi ibu maupun janin.

b. Preeklamsia

Preeklamsia merupakan sindrom kehamilan yang memiliki patogenesis yang kompleks dari insufisiensi plasenta hingga stress oksidatif yang mengakibatkan kerusakan jaringan endotel. Tanda dari preeklamsia berupa peningkatan tekanan darah pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, terdapat proteinuria ≥ 300 mg/hari, dan lebih dari satu tanda-tanda komplikasi maternal (El-Sayed, 2017). Asfiksia neonatorum merupakan salah satu komplikasi dari preeklamsia, diperkirakan 23% dari total kematian neonatal disebabkan oleh asfiksia neonatorum. Angka asfiksia neonatorum mencapai 3%, yaitu sekitar 3,6 juta, di mana 1 juta di antaranya meninggal (Mongdong *et al.*, 2021).

Asfiksia akibat preeklamsia terjadi karena disfungsi endotel, yang mengubah keseimbangan antara hormon vasokonstriktor (endotelin, tromboksan, angiotensin) dan vasodilator (nitritoksida, prostasiklin), sehingga mempengaruhi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida yang dialirkan ke janin melalui plasenta, sehingga menyebabkan asfiksia neonatorum. Selain itu, saat terjadinya hipoksia pada neonatus maka akan menyebabkan terjadinya perubahan metabolisme aerob ke anaerob sehingga menyebabkan meningkatnya karbon dioksida, cairan tubuh, dan terjadi asidosis darah (Mongdong *et al.*, 2021).

c. Paritas

Paritas merupakan jumlah kelahiran yang menghasilkan janin yang mamou hidup diluar rahim (28 minggu). Multipara atau paritas 2-3 adalah paritas yang tergolong aman jika ditinjau dari sudut kematian maternal dan neonatal. Primipara (paritas 1) dan grandemultipara (paritas >4) memiliki angka kematian maternal yang lebih tinggi. Makin tinggi paritas maka risiko kematian maternal juga meningkat. Risiko yang dapat terjadi akibat primipara dapat ditangani dengan asuhan obstetrik yang baik, sedangkan risiko yang dapat terjadi akibat grandemultipara dapat dicegah dengan menerapkan keluarga berencana (Lestari & Putri, 2019).

Ibu primipara biasanya tidak siap dalam menangani komplikasi yang terjadi dalam kehamilan, persalinan dan nifas. Ibu primipara berisiko karena belum siap secara medis maupun secara mental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu primipara merupakan faktor risiko yang berhubungan kuat terhadap mortalitas asfiksia, sedangkan ibu grandemultipara mengalami kemunduran secara fisik dalam proses kehamilan. Keadaan tersebut memberikan risiko untuk terjadi perdarahan, plasenta previa, ruptur uteri, solusio plasenta yang dapat berakhir dengan asfiksia neonatorum (Fajarriyanti, 2017).

Pada ibu grandemultipara terjadi kemunduran kelenturan jaringan akibat sudah berulang kali diregangkan selama kehamilan sebelumnya. Sehingga cenderung timbul komplikasi berupa kelainan

letak ataupun kelainan pertumbuhan plasenta dan pertumbuhan janin. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi suplai gizi dan oksigen dari ibu ke janin dan semakin tinggi paritas maka risiko untuk melahirkan bayi dengan asfiksia juga akan semakin tinggi (Fajarriyanti, 2017).

d. Anemia

Anemia merupakan keadaan kurangnya jumlah eritrosit atau sel darah merah, jumlah hemoglobin (Hb), dan volume hematokrit per 100 ml darah. Anemia dalam kehamilan yaitu kondisi ibu dengan kadar nilai hemoglobin < 11 gr/dL pada trimester satu dan tiga, atau kadar nilai hemoglobin kurang dari 10,5 gr/dL pada trimester dua (Darmawansyih, 2017). Keadaan kurangnya kadar Hb terjadi karena kurangnya nutrisi zat besi, asam folat, maupun perdarahan saluran cerna. Kurangnya nutrisi saat hamil menyebabkan hambatan sintesis Hb, oleh karena itu jumlah Hb tidak bisa mengimbangi naiknya volume plasma. Anemia yang terjadi pada kehamilan menyebabkan gangguan pada pengangkutan oksigen ke jaringan dan janin. Gangguan ini bisa menyebabkan hipoksia janin sehingga sewaktu kelahiran terjadi asfiksia neonatorum (Subriah & Ningsi, 2018).

Anemia saat kehamilan menyebabkan turunnya transportasi oksigen dari paru ke jaringan perifer. Kemampuan transportasi oksigen menurun sehingga konsumsi oksigen janin tidak terpenuhi, hal ini menyebabkan terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir (Aprilia, Surinati & Suratiah, 2019).

Rudiyanti dan Diana (2014) dalam Nurmawati, Saleha & Nadyah (2019) menjelaskan kurangnya kadar Hb dalam darah menyebabkan oksigen juga berkurang untuk dibawa ke sel tubuh maupun sel otak dan uterus. Kadar oksigen yang kurang menyebabkan disfungsi sel untuk meregenerasi. Anemia pada persalinan memiliki pengaruh berupa gangguan his, partus lama, dan perdarahan akibat atonia uteri. Anemia dapat membahayakan persalinan karena kurangnya kekuatan saat mengejan, kala I dan II bisa berlangsung lama sehingga bisa menyebabkan partus terlantar dan melelahkan, saat kala uri dapat diikuti retensio plasenta dan perdarahan postpartum karena atonia uteri, kala IV terjadi perdarahan postpartum sekunder dan atonia uteri.

2. Faktor Intranatal

a. Metode Persalinan

Setiap persalinan membawa risiko bagi ibu dan janin berupa kesakitan bahkan kematian. Jika ibu maupun janin berada dalam kondisi yang berisiko mengalami komplikasi dalam persalinan, maka untuk segera menyelamatkan keduanya, perlu segera dilakukan persalinan dengan tindakan yaitu persalinan dengan alat tertentu, seperti forsep, ekstraksi vakum, ataupun operasi sesar (Mariana & Ashriady, 2020).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mariana & Ashriady (2020), bayi yang dilahirkan melalui tindakan sesar memiliki risiko 2,468 kali lebih tinggi untuk mengalami asfiksia disbanding bayi yang dilahirkan

dengan persalinan normal. Dalam teori yang disebutkan oleh Dewi (2010) dalam Mariana & Ashriady (2020) juga dijelaskan bahwa bayi yang lahir dengan operasi sesar memiliki risiko asfiksia lebih besar daripada bayi yang lahir normal, hal ini dikarenakan terjadi perubahan fisiologis akibat proses persalinan yang mengakibatkan terganggunya sistem pernapasan bayi.

Helen Varney (2008) dalam Fajarriyanti (2017) menjelaskan bahwa bayi yang lahir dengan ekstraksi vakum dan operasi sesar tidak mengalami reduksi cairan paru dan kompresi dada, sehingga mengalami paru-paru basah yang lebih persisten yang dapat menyebabkan *transient tachypnea* pada bayi baru lahir.

Persalinan dengan operasi sesar akan menstimulasi pengeluaran hormon stres pada ibu sehingga terjadi pematangan paru-paru bayi yang diisi oleh cairan paru. Saat persalinan secara pervaginam maka akan terjadi peningkatan tekanan akibat kompresi dada ketika melewati jalan lahir, sehingga diperkirakan cairan paru terdorong sebanyak kurang lebih $\frac{1}{4}$ kapasitas residual fungsional. Oleh karena itu, pada bayi yang lahir dengan operasi sesar memiliki cairan paru lebih banyak dibandingkan dengan udara didalam paru selama 6 jam pertama setelah lahir (Fanny, 2015).

Berdasarkan cara persalinan, persalinan vakum memiliki kemungkinan 6,2 kali lebih tinggi dengan kejadian asfiksia neonatus dibandingkan dengan persalinan pervaginam spontan. Hal ini dapat

disebabkan karena persalinan vakum dapat mengakibatkan cedera hemoragik pada kranial seperti sefalhematoma dan perdarahan subgaleal, yang dapat disertai dengan asfiksia meonatorum. Selain itu, sifat menyakitkan dari prosedur vakum diklaim dapat menekan pusat pernapasan neonatus di batang otak (Bayih *et al.*, 2020).

b. KPD

Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan keluarnya cairan melalui jalan lahir sebelum adanya proses persalinan. KPD dapat terjadi karena lemahnya selaput ketuban, adanya infeksi bakteri, maupun peningkatan tekanan distensi rahim (Setiawati, 2020). KPD berpengaruh pada kehamilan juga persalinan, semakin lama jarak antara pecahnya selaput ketuban makin besar juga kemungkinan terjadi infeksi dalam rahim yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Terjadinya KPD dapat menimbulkan berbagai komplikasi, KPD menyebabkan hubungan langsung antara dunia luar dan dalam rahim sehingga infeksi maternal mudah terjadi. KPD bisa menyebabkan terjadinya 3 hal, salah satunya adalah infeksi maternal. Infeksi normalnya menyebabkan terbentuknya sel gram negatif, lalu berintegrasi dan menghasilkan suatu endotoksin, kemudian menyebabkan terjadinya vasospasmus yang kuat pada vena, akibatnya terjadi perembesan cairan dari intravaskular ke ruang ekstrasvaskular sehingga kurangnya volume darah yang beredar. Akibatnya aliran darah plasenta maternal berkurang, oksigen yang diterima janin pun

berkurang sehingga terjadi hipoksia dan ketika dilahirkan bayi mengalami asfiksia (Bayih *et al.*, 2020).

3. Faktor Bayi

a. BBLR

Bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan berat badan kurang dari 2.500gram seringkali mengalami asfiksia, karena sulit untuk beradaptasi dari kondisi dalam rahim menuju luar rahim. Proses transisi yang sulit ini membuat berbagai gangguan di sistem pernapasan, antara lain: alveolus fungsional yang berkurang, kadar surfaktan yang tidak mencukupi, penyempitan lumen saluran napas, kolaps dan obstruksi saluran napas, kapiler paru-paru rawan rusak karena tidak matur, otot-otot pernapasan yang lemah yang menyebabkan timbulnya apnea, asfiksia, dan *respiratory distress syndrome* pada bayi BBLR (Lestari & Putri, 2019). Kadar surfaktan yang rendah dan perkembangan paru yang belum sempurna pada BBLR menyebabkan bayi sulit untuk bernafas sehingga berakibat terjadinya asfiksia neonatorum (Wiadnyana & dkk, 2018).

Dari hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum, Murti & Prasetya (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh BBLR terhadap kejadian asfiksia neonatorum secara signifikan. BBLR lebih berisiko mengalami asfiksia dibandingkan bayi dengan berat badan normal (OR= 2.58; 95% CI= 3.80 to 46.15; $p < 0.001$). Maryunani (2009) dalam Kusumaningrum, Murti & Prasetya (2019) menerangkan

bahwa bayi yang dengan berat badan rendah kekurangan alveoli sehingga surfaktan yang dimiliki juga sedikit. Surfaktan berfungsi untuk menurunkan tekanan permukaan paru-paru dan membantu untuk menstabilkan dinding alveoli agar tidak terjadi kolaps di akhir pernafasan.

b. Prematur

Bayi prematur atau preterm yaitu bayi yang lahir saat usia gestasi diantara 28-36 minggu. Bayi dengan keadaan ini organ dan fungsi tubuhnya masih belum berfungsi dengan maksimal karena banyaknya jaringan tubuh yang belum terbentuk sehingga bayi prematur akan sulit untuk bertahan hidup karena sulit untuk bertahan hidup diluar rahim. Semakin muda usia gestasi maka fungsi dari organ tubuh bayi makin kurang sempurna dan prognosinya juga akan semakin buruk. Belum maksimalnya fungsi dari sistem pernafasan bayi prematur maka dapat menyebabkan terjadinya asfiksia (Lestari & Putri, 2019).

Bayi prematur memiliki banyak tantangan agar dapat bertahan. Masalah-masalah tersebut timbul karena masih belum maturnya organ tubuh sehingga fungsinya belum sempurna. Bayi prematur memiliki imunitas yang belum bekerja dengan baik sehingga rentan terhadap masalah di sistem pernapasan, kardiovaskular, pencernaan, hipotermia, hipoglikemia, dan rentan terhadap infeksi. Prognosis dapat memburuk jika sebelumnya memang sudah ada masalah sedari dalam kandungan (Jalaluddin, 2018).

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Tasew dkk (2018) bayi prematur memiliki risiko 2,2 kali lebih tinggi mengalami asfiksia dibandingkan bayi aterm [AOR = 2,20; 95% CI (1,02, 4,76)]. Hal ini disebabkan karena bayi prematur lebih rentan mengalami iskemia akibat pembentukan sawar darah otak yang belum sempurna. Selain itu, bayi prematur menghadapi berbagai morbiditas sistem organ, khususnya paru-paru yang imatur yang menyebabkan timbulnya gagal napas (Tasew *et al.*, 2018).

E. Patofisiologi Asfiksia Neonatorum



Bagan 2.1 Proses Bernapas Bayi

Sumber: Jodjana & Suryawan (2020).

Bayi baru lahir memiliki karakteristik yang unik. Terjadi perubahan atau transisi dari kehidupan janin intrauterin ke ekstrauterin. Alveoli paru-paru janin di dalam rahim diisi dengan cairan paru-paru. Saat bayi baru lahir dan bayi bernapas untuk pertama kalinya, udara masuk ke alveolus dan cairan paru-paru diabsorbsi ke dalam jaringan paru-paru. Pada napas kedua dan selanjutnya, oksigen masuk mengisi alveoli. Ekspansi paru-paru membutuhkan tekanan puncak inspirasi dan tekanan akhir ekspirasi yang lebih tinggi, oleh karena itu aliran darah ke paru-paru

meningkat tajam. Terjadi penurunan resistensi pembuluh darah paru dan meningkatnya aliran darah paru setelah lahir akibat ekspansi paru dan peningkatan tekanan oksigen alveoli. Jika resistensi pembuluh darah paru tidak menurun, bayi baru lahir dapat mengalami hipertensi pulmonal persisten, aliran darah paru yang tidak mencukupi, dan hipoksemia relatif. Ekspansi paru-paru yang tidak memadai dapat menyebabkan kegagalan pernapasan, yang disebut asfiksia (Jodjana & Suryawan, 2020).



Bagan 2.2 Patofisiologi Asfiksia

Sumber: Kemenkes (2019).

Pada asfiksia terjadi kekurangan O₂ karena aliran darah dari plasenta ke janin mengalami gangguan selama kehamilan, persalinan, atau sesaat setelah lahir, hal ini terjadi akibat kegagalan penyesuaian masa transisi. Ketika terjadi hipoksia akut, maka darah akan lebih mengalir ke organ vital contohnya batang otak dan jantung, dibandingkan ke cerebrum, plexus choroid, substansia alba, kelenjar adrenal, kulit, jaringan muskuloskeletal, organ-organ rongga toraks dan abdomen

lainnya seperti paru, hati, ginjal, dan traktus gastrointestinal. Hal tersebut terjadi akibat resistensi vaskular otak dan jantung yang menurun serta resistensi vaskular perifer yang meningkat. Hasil pemeriksaan USG Doppler dapat menunjang keadaan ini dan memperlihatkan adanya kaitan antara naiknya endotelin-1 (ET-1) ketika hipoksia dengan turunnya kecepatan aliran darah dan resistensi arteri ginjal dan mesenterika superior yang meningkat. Apabila hipoksia tidak segera ditangani maka akan terjadi kondisi hipo-iskemik pada organ vital (Kemenkes, 2019).

F. Penegakan Diagnosis Asfiksia Neonatorum

Sebelum masuk kedalam beberapa kategori penegakan diagnosis asfiksia neonatorum, pada umumnya dilakukan penilaian APGAR untuk membantu menegakan diagnosis asfiksia. Skor APGAR merupakan metode praktis untuk menilai bayi baru lahir secara sistematis segera setelah lahir (Kliegman, 2016).

Tabel 2.1 APGAR Skor

Tanda	0	1	2
Warna kulit (<i>appearance</i>)	Biru atau pucat	Tubuh kemerahan, ekstremitas biru	Seluruh tubuh kemerahan
Denyut jantung (<i>pulse</i>)	Tidak ada	<100 menit	>100 menit
Iritabilitas refleks (<i>grimace</i>)	Tidak merespon	Meringis	Menangis kuat
Tonus otot (<i>activity</i>)	Tidak ada	Ekstremitas fleksi sedikit	Gerak aktif
Usaha bernapas (<i>respiration</i>)	Tidak ada	Menangis lemah, hipoventilasi	Baik, menangis

Sumber: The American College Obstetrics & Gynecology (ACOG) (2015).

1. Klasifikasi asfiksia neonatorum berdasarkan ICD-11 WHO

- a. Asfiksia neonatorum berat: denyut nadi saat lahir <100 x/menit, tidak ada napas atau megap-megap, warna kulit pucat, tidak ada tonus otot. Apgar skor 0-3 pada menit ke-5.
- b. Asfiksia ringan-sedang: tidak bernapas normal dalam 1 menit, tetapi denyut jantung ≥ 100 x/menit, sedikit tonus otot, beberapa respon terhadap rangsangan. Apgar skor 4-7 pada menit ke-5 (World Health Organization, 2021).

2. *The American College Obstetrics & Gynecology (ACOG) & American Academy of Pediatric (AAP)*

Berikut merupakan susunan kriteria penegakan diagnosis asfiksia berdasarkan ACOG & AAP:

- a. Asidosis metabolik atau campuran ($\text{pH} < 7.0$) saat pemeriksaan darah tali pusat;
- b. Apgar skor 0-3 di menit ke-5;
- c. Manifestasi neurologis (kejang, hipotoni, atau koma); dan
- d. Disfungsi multiorgan, seperti gangguan kardiovaskular, gastrointestinal, hematologi, respirasi, atau renal.

Diagnosis dapat ditegakkan jika minimal 1 dari 4 kriteria diatas ditemukan pada bayi, namun hal ini sulit dipenuhi pada kondisi berbasis komunitas dan fasilitas terbatas (Kemenkes, 2019).

3. *World Health Organization (WHO)*

WHO dalam ICD-10 mengategorikan bayi mengalami asfiksia berat jika Apgar skor 0-3 di menit pertama ditandai dengan:

- a. Denyut jantung menurun atau menetap (<100 kali/menit) saat lahir;
- b. Tidak bernapas atau megap-megap; dan
- c. Kulit pucat dan tidak ada tonus otot (Kemenkes, 2019).

4. *National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)*

Kriteria berdasarkan NICHD adalah sebagai berikut:

- a. pH <7.0 atau defisit basa >16 mmol/L pada pemeriksaan darah tali pusat dalam satu jam setelah kelahiran, atau
- b. Riwayat episode hipoksik perinatal (deselerasi/bradikardia berat pada janin, prolaps tali pusat, ruptur tali pusat, solusio plasenta, ruptur uteri, trauma / perdarahan fetomaternal, atau *cardiorespiratory arrest*) dan salah satu dari :
 - 1) nilai Apgar ≥ 5 pada menit ke-10, atau
 - 2) bayi masih memerlukan bantuan ventilasi selama ≥ 10 menit jika pH darah tali pusat 7,01 – 7,15 dan defisit basa 10 – 15,9 mmol/L atau pada keadaan pemeriksaan gas darah tidak tersedia (Kemenkes, 2019).

G. *Tatalaksana Asfiksia Neonatorum*

Asfiksia adalah proses berkelanjutan yang dapat mencegah progresivitasnya dengan mengedukasi tentang faktor-faktor risiko asfiksia sebagai upaya pencegahan primer, tatalaksana dini yang tepat berupa resusitasi-

pasca resusitasi di ruang bersalin dan perawatan sebagai upaya pencegahan sekunder, dan juga pencegahan komplikasi lanjut dengan terapi hipotermia sebagai upaya pencegahan tersier.

1. Tatalaksana di ruang bersalin

Resusitasi dilakukan di ruang bersalin sebagai tatalaksana asfiksia.

Persiapan yang dilakukan terdiri atas pembentukan tim, persiapan ruang dan peralatan resusitasi, persiapan pasien, dan persiapan penolong.

a) Pembentukan dan persiapan tim

Adapun informasi yang perlu diketahui dalam proses persalinan, antara lain :

- 1) Informasi tentang ibu, seperti riwayat kehamilan (kondisi kesehatan dan riwayat obat-obatan), riwayat *antenatal care* dan hasil pemeriksaan USG antenatal (jika ada), serta risiko infeksi ibu (seperti : Streptococcus grup B, ISK, dan penyakit infeksi lainnya)
- 2) Informasi tentang janin, seperti usia kehamilan, jumlah janin (tunggal atau kembar), risiko membutuhkan resusitasi (misal: hernia diafragmatika, dll), cairan ketuban terdapat mekoneum, hasil pemantauan DJJ, serta kemungkinan adanya kelainan kongenital.

Diskusi dan kerja sama anggota tim resusitasi sangat penting untuk menyiapkan tindakan resusitasi. Setidaknya terdapat tiga anggota dalam tim resusitasi yang terdiri atas satu orang penolong terlatih pada

tiap resusitasi bayi dan dua orang penolong terlatih pada resusitasi bayi yang memiliki risiko tinggi. Minimal satu konsultan neonatologi atau dokter spesialis anak harus hadir pada tiap persalinan risiko yang sangat tinggi. Berikut pembagian tugas dalam tim resusitasi:

- 1) Penolong pertama, bertindak sebagai pemimpin resusitasi dengan memposisikan diri diatas kepala bayi. Kemampuan dan pengetahuan resusitasi penolong pertama diharapkan yang paling lengkap, dapat mengkoordinasi tugas anggota tim, memiliki tanggung jawab pada *airway* dan *breathing*. Penolong pertama memiliki tugas menangkap dan meletakkan bayi di *infant warmer*, membersihkan wajah bayi, memasang topi, mengeringkan tubuh bayi, memantau dan melakukan intervensi pada ventilasi (mengevaluasi pengembangan dada bayi, melakukan VTP, memasang *continuous positive airway pressure* (CPAP), dan intubasi jika perlu).
- 2) Penolong kedua, bertindak sebagai asisten *circulation*. Asisten sirkulasi memposisikan diri di sisi kiri bayi dan bertugas memantau sirkulasi bayi. Penolong membantu mengeringkan bayi, mengganti selimut bayi jika basah, mendengarkan denyut jantung bayi sebelum *pulse oxymetri* mulai terbaca, mengatur *peak inspiratory pressure*/tekanan puncak inspirasi (PIP) dan fraksi oksigen (FiO₂), melakukan kompresi dada, serta memasang kateter umbilikal. Selain itu, penolong kedua melakukan penilaian

denyut arteri radialis, akral, dan *capillary refill time* bayi untuk menentukan apakah sirkulasi bayi dalam keadaan baik atau buruk.

- 3) Penolong ketiga, bertindak sebagai asisten obat dan alat-alat. Penolong ketiga mengambil posisi disisi kanan bayi, dan bertugas untuk menyiapkan suhu ruangan 24°C-26°C, memasang *pulse oxymetri*, memasang sensor suhu dan mengaturnya agar suhu bayi mencapai suhu normal 36,5°C -37°C, menyalakan *stopwatch*, menyalakan monitor saturasi, serta menyiapkan obat-obatan dan juga peralatan, memasang infus perifer jika dibutuhkan, dan menyiapkan inkubator transpor yang telah dihangatkan.

c. Persiapan ruang resusitasi

Sebaiknya ruangan untuk melakukan resusitasi lokasinya dekat dengan ruang bersalin, agar tim resusitasi dapat dengan sigap memberi bantuan resusitasi. Ruang resusitasi dipersiapkan dengan suhu ruangan yang hangat untuk mencegah kehilangan panas dari tubuh bayi, pencahayaan yang memadai untuk menilai status bayi, dan cukup luas agar tim mudah untuk bekerja.

d. Persiapan peralatan resusitasi

- 1) Peralatan untuk mengatur suhu bayi, yaitu *infant warmer*, handuk untuk mengeringkan tubuh bayi, selimut bayi, topi, dan kantung plastic yang digunakan pada bayi usia < 32 minggu.
- 2) Peralatan untuk menolong jalan napas (*airway*) bayi, yaitu *suction* (pengisap lendir), kateter *suction*, aspirator mekoneum.

- 3) Peralatan untuk menolong ventilasi (*breathing*) bayi, yaitu balon mengembang sendiri (*BMS/self inflating bag*), balon tidak mengembang sendiri (*BTMS/flow inflating bag*), *T-piece resuscitator*, sungkup, alat intubasi (laringoskop, stilet, *endotracheal tube* (ETT)).
 - 4) Peralatan untuk menolong sirkulasi (*circulation*) bayi, yaitu kateter umbilical ukuran 3,5 dan 5-French (di fasilitas terbatas bisa menggunakan pipa umbilical / *orogastric tube* (OGT) ukuran 5 – French dengan set umbilical steril, dan *three way stopcocks*.
 - 5) Obat-obatan seperti epinefrin (1:10.000) dan cairan pengganti (NaCl 0,9% dan ringer laktat)
 - 6) *Pulse oxymetri*, monitor EKG (jika ada), stetoskop, spoit, jarum, dll.
- e. Persiapan pasien
- Memberikan *informed consent* tentang tindakan resusitasi yang akan dilakukan. Serta mengantisipasi faktor risiko ibu dan janin.
- f. Persiapan penolong
- Penolong perlu mencuci tangan serta menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) (Kemenkes, 2019).
- g. Resusitasi
- Apabila bayi tidak bernapas spontan dan adekuat segera setelah lahir maka perlu dilakukan resusitasi. Penilaian langkah awal perlu dilakukan untuk menentukan apakah bayi perlu diberi tindakan

resusitasi atau tidak. Yang perlu diperhatikan adalah apakah bayi dapat bernapas atau menangis, dan apakah bayi memiliki tonus otot yang baik. Setelah dilakukan penilaian awal, maka dilanjutkan untuk menyetabilkan dengan langkah awal. Apabila bayi dengan berat lahir sangat rendah (<1500gr) maka dapat digunakan plastik transparan yang menutupi hingga leher untuk mencegah kehilangan panas dari tubuh bayi. Selanjutnya dilakukan pengisapan dengan *suction* pada jalan napas jika terdapat obstruksi (Kemenkes, 2019).

Setelah langkah awal dilakukan, penolong kembali mengevaluasi usaha napas, denyut jantung, dan tonus otot bayi. Langkah awal perlu dilengkapi dalam 60 detik pertama setelah lahir, periode ini disebut menit emas. Hasil evaluasi setelah langkah awal sebagai berikut:

- 1) Jika napas bayi adekuat dan denyut jantung >100x/menit, bayi diberi perawatan rutin.
- 2) Jika napas bayi belum adekuat dan denyut jantung <100x/menit, dilanjutkan dengan resusitasi untuk membantu ventilasi bayi (*breathing*).
- 3) Jika bayi bernapas spontan namun saturasi O₂ dibawah target berdasarkan usia, maka dapat diberikan suplementasi O₂ dengan menggunakan balon tidak mengembang sendiri, *T-piece resuscitator*, atau ujung balo mengembang sendiri dengan reservoir terbuka.

4) Jika napas bayi spontan tapi disertai gawat napas, maka diperlukan CPAP dengan tekanan positif akhir ekspirasi (*positive end expiratory pressure* (PEEP)) secara kontinu (Kemenkes, 2019).

Untuk membantu penolong resusitasi menilai gawat napas dan kebutuhan ventilasi pada bayi maka dapat digunakan nilai Downe. Berikut interpretasi dari nilai downe:

Tabel 2.2 Nilai Downe

	0	1	2
Laju napas	<60x/menit	60-80x/menit	>80x/menit
Retraksi	Tidak ada retraksi	Retraksi ringan	Retraksi berat
Sianosis	Tidak sianosis	Sianosis hilang dengan O ₂	Sianosis menetap walaupun diberi O ₂
Air entry	Udara masuk	Penurunan udara masuk	Tidak ada udara masuk
Merintih	Tidak merintih	Dapat didengar dengan stetoskop	Dapat didengar tanpa alat bantu
Interpretasi nilai			
Nilai <4 : gawat pernapasan ringan (membutuhkan CPAP) Nilai 4-5 : gawat pernapasan sedang (membutuhkan CPAP) Nilai ≥ 6 : gawat pernapasan berat (pertimbangan intubasi)			

Sumber: Kemenkes (2019).


Selanjutnya dilakukan pemberian ventilasi (*breathing*). Pemberian VTP dilakukan bila bayi: tidak bernapas (apneu), megap-megap (*gaspings*), atau denyut jantung <100x/menit. Ventilasi dinilai efektif jika terlihat pengembangan dada dan abdomen bagian atas setiap pemberian ventilasi, disertai peningkatan denyut jantung >100x/menit

dan perbaikan oksigenasi jaringan. Jika dada tidak mengembang ketika pemberian ventilasi, perlu diperhatikan apakah tekanan yang diberikan sudah cukup. Evaluasi pemberian ventilasi bisa dilihat dengan urutan SR IBTA:

- 1) Sungkup rapat lekatannya.
- 2) Reposisi jalan napas, pastikan posisi kepala semi-ekstensi.
- 3) Isap mulut juga hidung jika ada lendir.
- 4) Buka mulut bayi dan berikan ventilasi sembari mengangkat dagu bayi kedepan.
- 5) Tekanan dinaikkan secara bertahap dan perhatikan Gerakan dan suara napas dikedua paru nampak simetris.
- 6) Alternatif jalan napas dengan intubasi endotrakeal atau LMA bisa dipertimbangkan.


Untuk menilai oksigenasi jaringan yaitu dengan melihat saturasi oksigen yang tertera pada *pulse oxymetri*. Pada bayi usia ≥ 35 minggu diberi oksigen dimulai dari 21%, sedangkan bayi usia < 35 minggu dimulai dari 21-30%. Untuk selanjutnya kebutuhan oksigen dapat disesuaikan dengan target saturasi.

Dalam melakukan VTP, penolong baiknya melakukan penilaian awal dan penilaian kedua untuk menilai keefektifan VTP sebagai berikut:



Bagan 2.3 Penilaian awal VTP

Sumber: American Academy of Pediatrics and American Heart Association (2016).



Bagan 2.4 Penilaian kedua VTP

Sumber: American Academy of Pediatrics and American Heart Association (2016).

Jika denyut jantung kurang dari 60x/menit setelah diberi VTP adekuat selama 30 detik, maka perlu dilakukan kompresi dada (*circulation*). Tujuan dari kompresi dada adalah mengembalikan perfusi, terutama ke otak, memperbaiki insufisiensi miokardium

terkait asidemia, vasokonstriksi perifer, dan hipoksia jaringan. Kompresi dada dengan ventilasi dilakukan dengan rasio 3:1 (Kemenkes, 2019).


Kompresi dada dilakukan dengan cara menaruh jari di 1/3 bawah sternum, dibawah garis imajiner yang menghubungkan kedua puting, dengan kedalaman 1/3 diameter anterior dada. Untuk melakukan kompresi dada dapat dilakukan dengan teknik dua ibu jari (*two thumb-encircling hands technique*) kemudian jari-jari tangan lainnya melingkari dada bayi sambil menyanggah tulang belakang. Teknik ini lebih dianjurkan karena dapat memberikan tekanan puncak sistolik dan perfusi koroner yang lebih baik pada bayi baru lahir. Setelah penolong selesai kompresi dada dan VTP selama 60 detik, kondisi bayi perlu dievaluasi kembali. Jika terjadi peningkatan denyut jantung, peningkatan saturasi oksigen, dan bayi nampak bernapas spontan maka bayi dinyatakan mengalami perbaikan. Apabila denyut jantung $>60x$ /menit maka kompresi dada dihentikan. Sebaliknya, jika denyut jantung tetap $<60x$ /menit, maka perlu dipertimbangkan untuk diberikan obat-obatan dan cairan pengganti volume (Kemenkes, 2019).

Pemberian obat-obatan perlu dipertimbangkan oleh tim resusitasi jika denyut jantung $<60x$ /menit setelah diberi VTP dengan oksigen 100% dan kompresi dada adekuat selama 60 detik. Obat-obatan dan cairan dapat diberikan melalui jalur vena umbilikal, endotrakeal,

atau intraseus. Dalam resusitasi, dapat diberikan obat-obatan dan cairan sebagai berikut:

- a) Epinefrin 1:10.000, melalui jalur intravena atau intraoseus dengan dosis 0,1-0,3 mL/kgBB (0,01-0,03 mg/kgBB).
- b) Cairan diberikan jika ada kecurigaan kehilangan darah fetomaternal akut. Cairan yang bisa digunakan seperti darah, albumin, dan kristaloid isotonis, sebanyak 10 ml/kgBB juga diberikan bolus selama 5-10 menit.
- c) Bikarbonat tidak digunakan sebagai terapi rutin dalam resusitasi neonatus.
- d) Nalokson diberikan dengan dosis 0,01-0,04 mg/kgBB secara IV atau IM dengan dosis 0,1 mg/kgBB. Tidak direkomendasikan diberikan melalui endotrakea. Nalokson diberikan jika bantuan ventilasi sudah optimal dilakukan.


Jika denyut jantung tidak terdengar 10 menit setelah resusitasi maka dapat dilakukan penghentian resusitasi (Kemenkes, 2019).



Bagan 2.5 Alur Resusitasi

Sumber: UKK Neonatologi IDAI (2017).

Neonatal Resuscitation Algorithm



Bagan 2.6 Algoritme resusitasi neonatus

Sumber: American Heart Association (2020).

H. Komplikasi Asfiksia Neonatorum

Asfiksia dapat menyebabkan gangguan baik di susunan saraf maupun di sistemik. Gangguan pada sistem saraf pusat sebesar 62%, gangguan sistemik

tanpa gangguan saraf sebanyak 16%, dan 20% kasus tidak terlihat ada kelainan. Disfungsi sistem saraf pusat hampir selalu disertai dengan disfungsi pada beberapa organ lainnya (*multiple organ failure*).

1. Sistem Saraf Pusat

Hipoksia otak dapat menyebabkan terjadinya ensefalopati hipoksik iskemik (EHI). Kemudian dapat mengakibatkan gangguan serebrovaskular dan oksigenasi, gangguan pada neurotransmitter, degenerasi sel-sel neuron, oedema serebral yang berujung kematian sel melalui apoptosis maupun nekrosis. Terjadi pelepasan *neuron specific enolase* (NSE) ke dalam darah atau cairan serebrospinal (CSS) akibat rusaknya sel neuron. *Neuron specific enolase* (NSE) merupakan enzim glikolitik sitoplasma yang ada di sel neuron dan sel neuroendokrin. Ketika terjadi kerusakan otak maka NSE akan dilepaskan dan masuk ke aliran darah dan CSS. NSE digunakan sebagai salah satu biomarker kerusakan otak (Wijata *et al.*, 2016).

Awal kerusakan dimulai akibat gagalnya terbentuk energi akibat hipoksia dan iskemia, kemudian akan terbentuk radikal bebas pada tahap lanjut. EHI yang menyebabkan cedera otak akan membentuk area infark di otak dengan area penumbra disekelilingnya. Nekrosis atau apoptosis dapat terjadi pada area penumbra setelah hipoksia berakhir. Kerusakan neuron pada area penumbra dapat dikurangi dengan memberikan tatalaksana suportif dalam periode 48 jam pertama pasca asfiksia (Kemenkes, 2019).

2. Sistem Respirasi

Asfiksia neonatorum dapat menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan, berupa peningkatan tekanan pembuluh darah paru (*persistent pulmonary hypertension of the newborn* / PPHN), perdarahan paru, disfungsi jantung yang menyebabkan oedema paru, *respiratory distress syndrome* (RDS) sekunder karena gagalnya produksi surfaktan, serta aspirasi meconium. Jika bayi membutuhkan bantuan ventilasi dengan kebutuhan $FiO_2 >40\%$ minimal 4 jam setelah lahir, maka bayi dinyatakan mengalami disfungsi pernapasan akibat asfiksia (Kemenkes, 2019).

3. Sistem Kardiovaskular

Terdapat sekitar 29% bayi asfiksia yang menderita gangguan sistem kardiovaskular, diantaranya *transient myocardial ischaemia* (TMI), *transient mitral regurgitation* (TMR), *transient tricuspid regurgitation* (TTR), *persistent pulmonary hypertension of the newborn* (PPHN). Jika bayi ketergantungan akan obat inotropik lebih dari 24 jam atau didapat adanya gambaran TMI pada elektrokardiografi, maka bayi dapat dianggap mengalami gangguan sistem kardiovaskular akibat asfiksia (Kemenkes, 2019).

4. Sistem Urogenital

Komplikasi asfiksia pada sistem urogenital salah satunya yaitu *hypoxic-ischemic acute tubular necrosis*. Terdapat kriteria yang dapat menyatakan bayi mengalami gagal ginjal, antara lain: *output* urin $<0,5$

mL/kg/jam, urea darah >40 mg/dL, kreatinin serum >1 mg/dL, serta hematuria atau proteinuria signifikan dalam 3 hari pertama kehidupan (Kemenkes, 2019).

5. Sistem Gastrointestinal

Hipoksia yang terjadi pada bayi asfiksia mengakibatkan aliran darah dialihkan dari usus sehingga akan meningkatkan risiko terjadi enterokolitis nekrotikan / EKN. Selain itu dapat terjadi juga gangguan fungsi hati akibat hipoksia. Kriteria gangguan sistem hepatic berupa nilai aspartat aminotransferase >100 IU/l atau alanin transferase >100 IU/l pada minggu pertama setelah kelahiran (Kemenkes, 2019).

I. Integrasi Keislaman

Bayi yang baru lahir memiliki ketahanan tubuh yang lemah sehingga sangat rentan untuk mengalami gangguan pada fungsi tubuhnya, hal ini diakibatkan karena proses adaptasi bayi pada lingkungan diluar janin. Allah swt. berfirman dalam QS ar-Rūm/30: 54.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾

Terjemahnya:

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS ar-Rum/30: 54) (Kementerian Agama RI, 2019)

Dari ayat ini dijelaskan bagaimana penciptaan manusia yang diciptakan dimulai dari keadaan lemah. Manusia berasal dari tanah, kemudian terbentuk

berupa *nutfah* (air mani), kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging hingga ditiupkan ruh ke dalamnya. Kemudian ia lahir dari rahim ibunya dalam keadaan *dha'if* dan kecil serta dalam keadaan lemah, lalu mulailah tumbuh dewasa sedikit demi sedikit hingga menjadi orang dewasa yang memiliki kekuatan. Setelah itu ia tumbuh menjadi lemah lagi ketika menjadi tua. Dan dari ayat ini Allah swt. melakukan dan mengatur hamba-hambanya sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya (Kašir, 2012).

Proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim sangat didukung oleh faktor ibu, yaitu bagaimana cara agar ibu dapat memenuhi nutrisi janin untuk tumbuh kembang yang optimal, serta dapat melewati masa transisi dari intrauterin ke ekstrauterin. Allah swt. telah menjelaskan dalam QS al-Hajj/22: 5.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ^ج وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ^ط وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا^ع وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبِتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu

sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (QS al-Hajj/22: 5) (Kementerian Agama RI, 2019)

Dalam buku tafsir Ibnu Kaṣīr, ketika Allah swt. menceritakan manusia yang tidak percaya akan hari kebangkitan dan akhirat, Dia menunjukkan bukti kekuasaan-Nya sebagaimana yang dijelaskan pada awal penciptaan manusia. *“maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah”* yaitu asal manusia dimulai dari Adam yang dibentuk dari tanah tersebut. *“kemudian dari setetes mani”* yaitu Allah swt. menjadikan turunannya dari setetes air yang hina. *“kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging”* yaitu ketika air mani telah menetap di rahim wanita, maka akan tinggal di rahim itu selama 40 hari, begitu pula semua yang bersatu dengan air mani tersebut. Kemudian terbentuk segumpal darah merah atas izin Allah swt. dan tinggal didalam rahim seorang wanita selama 40 hari. Selanjutnya, segumpal darah itu berkembang membentuk *mudghah* (segumpal daging) yang belum ada rupa dan bentuknya. Kemudian, diberilah oleh Allah swt. bentuk dan rupa, seperti tangan, kepala, dada, perut, kaki, dan seluruh anggota badannya. *“kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna”* yaitu keguguran yang dapat terjadi baik setelah sempurna bentuk anggota badannya maupun yang belum sempurna bentuk dan rupanya. Ketika lewat dari 40 hari setelah terbentuk segumpal daging, maka Allah swt. meniupkan ruh kedalam *mudghah* serta memperkuatnya atas apa yang dikehendaki oleh Allah swt. berupa keelokan maupun keburukan, jenis kelamin, serta menetapkan rizki, kapan ajalnya, celaka

maupun bahagiannya. “kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi” yaitu bayi lemah tubuhnya, pendengaran, penglihatan, perasaan, gerak, dan juga akal nya. Kemudian Allah swt. berikan sedikit demi sedikit kekuatan kepadanya dan ditumbuhkan rasa kasih sayang pada kedua orang tuanya di siang dan malam (Kaṣīr, 2012).

Dalam penggalan arti surah diatas yaitu “kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna”, hal ini menjelaskan bagaimana Allah menunjukkan kuasanya dalam menjadikan apapun yang Ia kehendaki sesuai dengan apa yang telah dituliskan pada tiap-tiap jalan hidup makhluk ciptaannya, yang sempurna kejadiannya yaitu ketika di sempurnakan kehidupan bagi janin itu dengan ditiupkan ruh kedalamnya dan dilengkapi fungsi fisik dan psikisnya, serta yang tidak sempurna kejadiannya dimana ketika janin tersebut tidak mampu bertahan dalam rahim ibunya maka ia akan keluar sebelum waktu persalinan menjadi gumpalan darah atau keguguran, dan yang tidak sempurna fungsi tubuhnya baik saat dalam rahim atau setelah lahir, seperti pada penjelasan kedokteran dalam skripsi ini tentang asfiksia dimana terjadi ketidaksempurnaan fungsi paru-paru dalam menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh.

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits al-Bukhārī, dari Zaid bin Wahhāb, Ibnu Mas’ūd berkata: “Rasulullah bersabda dan dia orang yang jujur dan dipercaya: sesungguhnya masing-masing diantara kalian dikumpulkan penciptaannya didalam perut ibunya selama 40 hari berupa *nutfah* (air mani), kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi

segumpal daging selama 40 hari juga, kemudian diutuslah kepada Malaikat untuk meniupkan kepadanya ruh dan diperintahkan untuk menuliskan empat perkara; ketentuan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan ketentuan akan celaka dan bahagiannya.” (Kašīr, 2012).

Asfiksia merupakan keadaan ketika kurangnya aliran oksigen keseluruhan tubuh sehingga terjadi proses sesak untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Dalam hal ini Allah Swt. menjelaskan tentang bagaimana ketika disempitkan dada seseorang dalam QS al-An‘ām/6: 125.

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ط وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ



Terjemahnya:

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. (QS al-An‘ām/6: 125) (Kementrian Agama RI, 2019)

Allah swt. berfirman: barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Swt. diberikan petunjuk, maka Allah swt. melapangkan dadanya memeluk agama Islam dengan memasukkan cahaya berupa iman kedalam hatinya sehingga tidak ada keraguan padanya. Dan adapula yang dikehendaki oleh Allah swt. untuk menetap dalam kesesatannya akibat menolak ajakan iman, sehingga dijadikan sempit dadanya tidak bisa menyimpan kebaikan dan kebenaran didalamnya sehingga sesaklah ia, dan tidak ada sekalipun kebaikan yang mau menghampirinya.

Keadaan inilah yang diumpamakan seperti sedang mendaki ke langit atau angkasa (Shihab, 2002).

Dalam ayat di atas dijelaskan bagaimana ketika dada seorang manusia disesakkan akibat kesesatan yang ia perbuat. Kesesatan dalam artian adanya pelanggaran yang diperbuat. Jika dikaitkan dengan topik asfiksia maka, ketika ibu yang melakukan pelanggaran seperti memakan makanan yang tidak dianjurkan ataupun tidak melakukan pemeriksaan rutin terhadap kehamilannya untuk menghindari risiko-risiko bahaya dalam kehamilan sehingga menyebabkan anak yang dilahirkan mengalami asfiksia akibat dari perbuatan ibunya. Namun hal ini tidak serta merta dipengaruhi oleh faktor ibu, adakala keadaan asfiksia ini berasal dari bagaimana kesempurnaan dari fungsi tubuh sang bayi itu sendiri seperti yang telah diuraikan dalam penjelasan QS al-Hajj/22: 5.

Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam bab ini tentang faktor risiko terjadinya asfiksia neonatorum, beberapa diantaranya yaitu penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan mengatur makanan yang baik yang menjadi sumber nutrisi bagi ibu dan janin yang dikandung selama masa kehamilan. Selain itu nutrisi sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin agar dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal ketika lahir. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS al-Baqarah/2: 168) (Kementerian Agama RI, 2019)

Meskipun anjuran memakan makanan halal yang ada di bumi namun tidak semua makanan halal otomatis baik bagi kondisi tiap orang. Adakalanya halal yang baik untuk A yang punya kondisi kesehatan tertentu, namun adapula yang kurang baik untuknya walaupun baik bagi orang lain. Ada makanan yang halal namun tidak bergizi, sehingga jadi kurang baik. Dan yang diperintahkan oleh ayat diatas adalah makanan yang halal dan yang baik. Dan janganlah kita diperdaya oleh setan atau mengikuti langkah setan karena tergoda akan nikmatnya makanan namun tidak baik bagi tubuh sehingga menjerumuskan kita kedalam kerugian (Shihab, 2002).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian analitik observasional dengan menggunakan desain *case control* untuk menganalisis faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di RSUD Labuang Baji Makassar.

C. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan Januari-Februari 2022.

D. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) yaitu faktor risiko asfiksia neonatorum berupa faktor prenatal (preeklampsia, usia ibu, paritas, dan anemia), faktor intranatal (metode persalinan dan KPD), dan faktor bayi (BBLR dan prematur).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) yaitu kejadian Asfiksia Neonatorum.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi kontrol dari penelitian ini yaitu seluruh bayi yang lahir pada periode Januari 2020 – Juli 2021 di RSUD Labung Baji Makassar.

Sedangkan populasi kasus dari penelitian ini yaitu bayi yang mengalami asfiksia pada periode Januari 2020 – Juli 2021 di RSUD Labung Baji Makassar yaitu sebanyak 53 kasus.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan menggunakan rumus Isaac & Michael sebagai berikut:

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 \cdot (N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan:

s = jumlah sampel

λ^2 = dengan derajat kebebasan 1 dan taraf kesalahan 5%, maka chi kuadrat = 3,841 (tabel chi kuadrat)

N = jumlah populasi

P = peluang benar (0,5)

Q = peluang salah (0,5)

d = 0,05

$$s = \frac{3,841 \cdot 53 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,05^2 \cdot (53 - 1) + 3,841 \cdot 0,5 \cdot 0,5}$$

$$s = \frac{50,89}{1,09} = 46,68 = 47$$

Dari 53 populasi kasus didapatkan sampel yang akan digunakan sebanyak 47. Dalam penelitian *case control* ini digunakan perbandingan 1:1 untuk kasus dan kontrol, sehingga total sampel keseluruhan adalah 94 yang terdiri atas 47 kasus dan 47 kontrol. Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi pada penelitian ini sebagai berikut:

a) Kriteria inklusi

- 1) Ibu yang melahirkan di RSUD Labuang Baji Makassar yang tercatat dalam rekam medis dari bulan Januari 2020 – Juli 2021.
- 2) Informasi dalam rekam medik jelas dan dapat dibaca (data yang mendukung penelitian ini berupa: No. RM, Identitas, Apgar skor, tekanan darah ibu, paritas, Hb ibu, lembar partograf, jenis persalinan, berat badan bayi saat lahir, dan usia kehamilan)
- 3) Ibu yang bersedia di wawancara jika data rekam medik tidak lengkap.


b) Kriteria eksklusi

- 1) Bayi memiliki kelainan bawaan.
- 2) Ibu dengan kehamilan ganda.
- 3) Ibu dengan riwayat penyakit penyerta (penyakit jantung, diabetes mellitus, pneumonia).

F. Cara Pengumpulan Data


Cara pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan data sekunder berupa data rekam medik bayi yang lahir pada periode Januari 2020 – Juli 2021 di RSUD Labuang Baji Makassar dan data primer dengan wawancara langsung jika data pada rekam medik tidak lengkap.

G. Kerangka Teori




Bagan 3.1 Kerangka teori

H. Kerangka Konsep



Bagan 3.2 Kerangka konsep



I. Kerangka Kerja

Bagan 3.3 Kerangka kerja

J. Pengolahan Data

Data yang telah didapat kemudian dimasukkan ke dalam tabel distribusi kemudian dilakukan pengolahan secara sistemik melalui tahap *editing*, *coding*, dan *tabulating*.

K. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Statistical for Social Science* (SPSS), kemudian dilakukan analisis univariat guna menjelaskan karakteristik dari sampel, uji bivariat juga dilakukan dengan uji *Odd Ratio* (OR)

untuk mengukur hubungan antara variabel faktor risiko dan kejadian asfiksia neonatorum, serta analisis multivariat dengan metode uji regresi logistik berganda untuk melihat variabel yang paling berisiko terhadap kejadian asfiksia.

L. Penyajian Data

Penyajian data akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi.

M. Etika Penelitian

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uin Alauddin Makassar.

Etika penelitian yang terkait dalam penelitian ini berupa:

1. Membawa surat pengantar kepada pihak terkait sebagai bentuk permohonan izin untuk melakukan penelitian.
2. Menjelaskan tujuan penelitian yang akan dilakukan dengan sopan dan santun.
3. Menjaga privasi kerahasiaan identitas pasien yang ada dalam data rekam medik sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan atas penelitian yang dilakukan.
4. Diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat kepada semua pihak yang terkait sesuai dengan manfaat yang telah disebutkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Makassar yang terletak Jl. DR. Ratulangi, Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis delapan variabel faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum berupa usia ibu, preeklampsia, paritas, anemia, KPD, metode persalinan, BBL, dan usia gestasi. Dalam penelitian ini, variabel-variabel tersebut dianalisis sebagai berikut:

1. Karakteristik Sampel Penelitian

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan distribusi dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 94 responden yang terdiri atas 47 responden kelompok kasus/*case* dan 47 responden kelompok control/*control* dengan menggunakan rasio 1:1.

Tabel 4.1 Karakteristik Sampel Penelitian

Karakteristik	Frekuensi	
	n	%
Agama		
Islam	76	80,8
Kristen	9	9,6
Katholik	4	4,3
Hindu	3	3,2
Budha	2	2,1
Pekerjaan		
IRT	59	62,8
PNS	14	14,9
Guru	8	8,5
Buruh	8	8,5
Pedagang	5	5,3
Pendidikan		
Tidak Sekolah	13	13,8
Tamat SMP	12	12,8
Tamat SMA	38	40,4
Tamat Perguruan Tinggi	31	33
Total	94	100

Sumber: Data Sekunder, 2021

**Tabel 4.2 Distribusi Faktor Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum di
RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021**

Variabel	Kasus		Kontrol	
	n	%	n	%
Usia				
Risiko Tinggi	23	48,9	16	34
Risiko Rendah	24	51,1	31	66
Preeklampsia				
Risiko Tinggi	16	34	9	19,1
Risiko Rendah	31	66	38	80,9
Paritas				
Risiko Tinggi	11	23,4	15	31,9
Risiko Rendah	36	76,6	32	68,1
Anemia				
Risiko Tinggi	21	44,7	9	19,1
Risiko Rendah	26	55,3	38	80,9
KPD				
Risiko Tinggi	17	36,2	6	12,8
Risiko Rendah	30	63,8	41	87,2
Metode Persalinan				
Risiko Tinggi	13	27,7	18	38,3
Risiko Rendah	34	72,3	29	61,7
BBL				
Risiko Tinggi	30	63,8	9	19,1
Risiko Rendah	17	36,2	38	80,9
Usia Gestasi				
Risiko Tinggi	25	53,2	6	12,8
Risiko Rendah	22	46,8	41	87,2

Sumber: Data Sekunder, 2021

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat distribusi dari delapan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Jumlah usia ibu yang memiliki risiko tinggi yaitu 39 orang (41,5%) dan yang memiliki risiko rendah berjumlah 55 orang (58,5%), ibu dengan risiko tinggi preeklampsia sejumlah 25 orang (26,6%) sedangkan ibu dengan risiko rendah preeklampsia 69 orang (73,4%), ibu yang memiliki paritas yang berisiko tinggi sejumlah 26 orang (27,7%) dan ibu dengan paritas yang berisiko rendah sebanyak 68 orang (72,3%), ibu dengan risiko tinggi anemia sebanyak 30 orang (31,9%) dan yang berisiko rendah sebanyak 64 orang (68,1%), ibu dengan risiko tinggi KPD sebanyak 23 orang (24,5%) dan ibu yang berisiko rendah KPD sebanyak 71 orang (75,5%), ibu yang melahirkan dengan metode persalinan risiko tinggi sebanyak 31 orang (33%) dan dengan metode persalinan risiko rendah sebanyak 63 orang (67%), BBL bayi risiko tinggi sebanyak 39 orang (41,5%) dan BBL bayi risiko rendah sebanyak 55 (58,5%), ibu yang memiliki usia gestasi risiko tinggi sebanyak 31 orang (33%) dan yang memiliki usia gestasi risiko rendah sebanyak 63 orang (67%).

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor risiko apa saja yang berhubungan dengan kejadian asfiksia neonatorum.

Tabel 4.3 Analisis Hubungan Faktor Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021

Variabel	Kasus		Kontrol		<i>p-value</i>	<i>OR</i>	<i>CI 95%</i>	
	n	%	n	%			LL	UL
Usia								
Risiko Tinggi	23	48,9	16	34	0,209	1,857	0,809	4,264
Risiko Rendah	24	51,1	31	66				
Preeklampsia								
Risiko Tinggi	16	34	9	19,1	0,161	2,179	0,848	5,603
Risiko Rendah	31	66	38	80,9				
Paritas								
Risiko Tinggi	11	23,4	15	31,9	0,479	0,652	0,262	1,623
Risiko Rendah	36	76,6	32	68,1				
Anemia								
Risiko Tinggi	21	44,7	9	19,1	0,015	3,410	1,350	8,614
Risiko Rendah	26	55,3	38	80,9				
KPD								
Risiko Tinggi	17	36,2	6	12,8	0,016	3,872	1,364	10,989
Risiko Rendah	30	63,8	41	87,2				
Metode Persalinan								
Risiko Tinggi	13	27,7	18	38,3	0,380	0,616	0,258	1,468
Risiko Rendah	34	72,3	29	61,7				
BBL								
Risiko Tinggi	30	63,8	9	19,1	0,000	7,451	2,913	19,057
Risiko Rendah	17	36,2	38	80,9				
Usia Gestasi								
Risiko Tinggi	25	53,2	6	12,8	0,000	7,765	2,770	21,765
Risiko Rendah	22	46,8	41	87,2				
Total	47	100	47	100				

Uji *Chi Square*. Sumber: Data Sekunder, 2021

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah usia ibu yang berisiko tinggi lebih banyak pada kelompok kasus yaitu 23 orang (48,9%)

dibandingkan dengan kelompok kontrol sebanyak 16 orang (34%). *Odds Ratio* dari hasil analisis sebesar 1,857 dengan CI 95% nilai *lower limit* (LL) sebesar 0,809 dan *upper limit* (UL) sebesar 4,264. Dari tabel ini disimpulkan usia ibu dengan usia risiko tinggi berisiko 1,857 kali lebih besar untuk melahirkan bayi dengan kejadian asfiksia neonatorum dibandingkan dengan usia ibu yang berisiko rendah. Dengan tingkat kepercayaan 95% nilai LL dan UL mencakup angka satu sehingga nilai OR 1,857 dianggap tidak bermakna secara statistik maka usia ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum.

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa preeklampsia lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yaitu sebanyak 16 orang (34%) jika dibandingkan dengan kelompok kontrol sebanyak 9 orang (19,1%). Dari hasil analisis didapat *odds ratio* (OR) sebesar 2,179 dengan *p-value* $0,161 > 0,05$ dan nilai LL dan UL pada CI 95% (0,848-5,603) mencakup angka satu sehingga dianggap faktor risiko ini tidak memiliki kebermaknaan dan tidak signifikan secara statistik. Artinya ibu dengan preeklampsia bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum.

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa paritas yang berisiko tinggi pada kelompok kasus lebih sedikit yaitu 11 orang (23,4%) jika dibandingkan dengan kelompok kontrol sebanyak 15 orang (31,9) dari hasil analisis bivariat yang dilakukan didapat OR sebesar 0,652

dengan CI 95% (0,262-1,623) mencakup angka satu sehingga tidak ada kebermaknaan, serta *p-value* $0,479 > 0,05$ yang artinya tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah paritas ibu bukan merupakan faktor risiko dari asfiksia neonatorum.

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat jumlah responden anemia yang berisiko tinggi lebih banyak pada kelompok kasus yaitu 21 orang (44,7%) dibanding dengan kelompok kontrol yaitu 9 orang (19,1%). Dari analisis bivariat ini didapatkan OR sebesar 3,410 yang artinya ibu yang mengalami anemia lebih berisiko 3,410 kali melahirkan bayi dengan keadaan asfiksia. OR=3,410 dengan CI 95% (1,350-8,614) tidak mencakup angka satu sehingga dianggap bermakna secara statistik dengan nilai $p < 0,05$ yang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum.

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat KPD yang berisiko tinggi lebih banyak terdapat dalam kelompok kasus yaitu sebanyak 17 orang (36,2%) jika dibandingkan dengan responden yang berada dalam kelompok kontrol yaitu hanya 6 orang (12,8%). Hasil analisis bivariat yang dituliskan dalam tabel berupa OR sebesar 3,872 dengan CI 95% (1,364-10,989) tidak mencakup angka satu sehingga menunjukkan adanya kebermaknaan. Artinya ibu yang mengalami KPD >12 jam berisiko 3,872 kali untuk melahirkan bayi dengan asfiksia. Hal ini berarti KPD merupakan faktor risiko terjadinya asfiksia neonatorum.

Pada Tabel 4.3 menunjukkan jumlah responden dengan metode persalinan yang berisiko tinggi lebih rendah pada kelompok kasus yaitu 13 orang (27,7%) dibanding dengan responden yang berada dalam kelompok kontrol yaitu 18 orang (38,3%). Dari hasil analisis bivariat *p-value* $0,380 > 0,05$ yang menunjukkan tidak signifikan secara statistik dan OR sebesar 0,616 CI 95% (0,258-1,468) mencakup angka satu sehingga dianggap tidak ada kebermaknaan dari hasil tersebut atau metode persalinan bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia.

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah BBL yang berisiko tinggi lebih banyak pada kelompok kasus yaitu 30 orang (63,8) dibandingkan dengan kelompok kontrol sebanyak 9 orang (19,1%). Dari analisis bivariat pada tabel 4.8 didapatkan hasil OR sebesar 7,451 dengan CI 95% (2,913-19,057) tidak mencakup angka satu yang artinya ada kebermaknaan atau BBL risiko tinggi merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum. Hal ini menunjukkan bayi yang memiliki BBL risiko tinggi berisiko 7,451 kali lebih besar mengalami asfiksia neonatorum.

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah responden dengan usia gestasi yang berisiko tinggi lebih banyak dalam kelompok kasus yaitu 25 orang (53,2%) dibandingkan dengan responden dalam kelompok kontrol sebanyak 6 orang (12,8%). Ibu dengan usia gestasi berisiko tinggi 7,765 kali lebih berisiko melahirkan bayi dengan asfiksia. Hasil

analisis menunjukkan $p\text{-value} < 0,05$; $OR=7,765$ CI 95% (2,770-21,765) tidak mencakup angka satu yang artinya ada hubungan bermakna antara usia gestasi terhadap kejadian asfiksia atau usia gestasi merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum.

3. Analisis Multivariat

Dalam penelitian ini dilakukan analisis multivariat yang bertujuan untuk mengetahui variabel independen mana yang lebih berpengaruh atau dominan terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji regresi logistic berganda dalam SPSS.

a. Hasil Uji Bivariat Variabel Independen yang Diikutkan Dalam Analisis Multivariat

Dari hasil analisis bivariat yang dilakukan, terdapat beberapa variabel independen yang dapat diikutkan kedalam uji analisis multivariat. Variabel independen yang diikutkan yaitu variabel yang memiliki $p\text{-value} < 0,25$.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Bivariat Variabel Independen yang
Diikutkan Dalam Analisis Multivariat**

Variabel	OR	CI 95%		P-value	Keterangan
		LL	UL		
Usia Ibu	1,857	0,809	4,264	0,209	Diikutkan
Preeklampsia	2,179	0,848	5,603	0,161	Diikutkan
Paritas	0,262	0,262	1,623	0,489	Tidak Diikutkan
Anemia	3,410	1,350	8,614	0,015	Diikutkan
KPD	3,872	1,364	10,989	0,016	Diikutkan
Metode Persalinan	0,616	0,258	1,468	0,380	Tidak Diikutkan
BBL	7,451	2,913	19,057	0,000	Diikutkan
Usia Gestasi	7,765	2,770	21,765	0,000	Diikutkan

Sumber: Data Sekunder, 2021

Dari Tabel 4.10 dapat dilihat dari 8 variabel independen yang diteliti, ada 6 variabel yang memiliki *p-value* <0,25 yaitu usia ibu, preeklampsia, anemia, KPD, BBL, dan usia gestasi, keenam variabel ini akan diikutkan dalam uji regresi logistic berganda.

b. Hasil Analisis Multivariat

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Logistik Berganda Faktor Risiko Paling Dominan Terhadap Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Labuang Baji Makasaar Tahun 2021

Variabel	<i>p-value</i>	OR	CI 95%
Usia Ibu	0,387	1,602	0,551 – 4,662
Preeklampsia	0,441	1,592	0,487 – 5,206
Anemia	0,005	5,676	1,679 – 19,190
KPD	0,205	2,361	0,626 – 8,906
BBL	0,004	8,397	1,944 – 36,261
Usia Gestasi	0,559	1,597	0,332 – 7,683

Sumber: Data Sekunder, 2021

Tabel 4.11 menunjukkan hasil dari uji regresi logistik berganda yang dilakukan pada 6 variabel dependen yang memenuhi nilai $p < 0,25$ yaitu usia ibu, preeklampsia, anemia, KPD, BBL, dan usia gestasi. Faktor risiko dengan nilai OR terbesar adalah BBL ($p\text{-value}=0,004$; $OR=8,397$; $CI\ 95\% = 1,944 - 36,261$).

B. Pembahasan

1. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Usia ibu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan besar *Odds Ratio* dari hasil analisis sebesar 1,857 dengan CI 95% nilai *lower limit* (LL) sebesar 0,809 dan *upper limit* (UL) sebesar 4,264. Sehingga

disimpulkan usia ibu dengan usia risiko tinggi berisiko 1,857 kali lebih besar untuk melahirkan bayi dengan kejadian asfiksia neonatorum dibandingkan dengan usia ibu yang berisiko rendah. Dengan tingkat kepercayaan 95% nilai LL dan UL mencakup angka satu sehingga nilai OR 1,857 dianggap tidak bermakna secara statistik maka usia ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Syalfina (2015) di Kabupaten Mojokerto dengan sampel sebanyak 40 kelompok kasus dan 40 kelompok kontrol didapatkan hasil *p-value* 0,317 > 0,05 yang berarti tidak ada hubungan bermakna, sehingga usia ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Sadanoer & Tyas (2020) di RSUD PARIAMAN dengan total sampel sebanyak 144 responden dengan menggunakan rasio 1:1 untuk kasus dan kontrol sehingga terdiri atas 72 sampel kasus dan 72 sampel kontrol, didapatkan hasil *p-value* 0,004 < 0,05 yang menunjukkan adanya hubungan bermakna antara usia ibu dengan kejadian asfiksia neonatorum, yang artinya tidak sejalan dengan hasil penelitian ini.

Usia ibu yang terlalu muda (dibawah 20 tahun) dan terlalu tua (diatas 35 tahun) lebih berisiko melahirkan bayi asfiksia dibandingkan dengan ibu yang usianya tidak berisiko. Fungsi organ tubuh pada ibu hamil dengan usia yang terlalu muda masih belum siap dan kurang sempurna, sedangkan ibu hamil dengan usia yang terlalu tua maka sistem reproduksi sudah tidak

optimal karena telah terjadi kemunduran fungsi dari alat reproduksi dibanding dengan saat usia sebelumnya (Fajarriyanti, 2017).

Wiknjosastro (2010) dalam (Lestari & Putri, 2019) menjelaskan usia ibu yang kurang dari 20 tahun masih belum berfungsi sempurna organ reproduksinya, hal ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi pada saat kehamilan maupun persalinan. Selain itu, kekuatan otot perineum dan otot perut belum bekerja secara optimal. Hamil pada usia yang terlalu muda atau terlalu tua termasuk kedalam kehamilan dengan risiko tinggi yang akan meningkatkan angka kematian dan kesakitan baik bagi ibu maupun janin.

Hasil penelitian menunjukkan usia ibu bukan merupakan faktor risiko terjadinya asfiksia neonatorum, yang artinya hal ini tidak sejalan dengan teori yang ada. Menurut peneliti, hal ini bisa saja terjadi jika ibu dengan usia yang berisiko tinggi rutin melakukan ANC sehingga monitoring kehamilan berjalan baik dan komplikasi dalam kehamilan dapat dicegah dengan deteksi dini saat pemeriksaan kehamilan. Selain itu hasil ini juga bisa dipengaruhi oleh cara pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* yang menyaring sampel dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi sehingga jika terdapat usia ibu yang berisiko tinggi namun tidak memenuhi kriteria maka sampel tersebut tidak diambil.

2. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Preeklampsia

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil *odds ratio* (OR) sebesar 2,179 dengan *p-value* $0,161 > 0,05$ dan nilai LL dan UL pada CI 95% (0,848-5,603) mencakup angka satu sehingga dianggap faktor risiko ini tidak memiliki kebermaknaan dan tidak signifikan secara statistik. Artinya ibu dengan preeklampsia bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochmaniah & Khofiyah (2021) di RSUD Kota Madiun dengan rasio 1:1 dan total sampel sebanyak 218 didapatkan *p-value* $>0,05$ dari tabulasi silang sehingga dianggap tidak ada hubungan antara preeklampsia sebagai faktor risiko dengan asfiksia neonatorum. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Mongdong dkk (2021) di RSUD Dr. Sayidiman Magetan, Jawa Timur dengan jumlah sampel sebanyak 326 orang, dari hasil uji chi square didapatkan *p-value* sebesar 0,000 dan OR sebesar 3,071 yang menyatakan ibu hamil dengan preeklampsia berisiko lebih besar melahirkan bayi dengan asfiksia.

Preeklampsia merupakan sindrom kehamilan yang memiliki patogenesis yang kompleks dari insufisiensi plasenta hingga stress oksidatif yang mengakibatkan kerusakan jaringan endotel. Tanda dari preeklampsia berupa peningkatan tekanan darah pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, terdapat proteinuria ≥ 300 mg/hari, dan lebih dari satu tanda-tanda komplikasi maternal (El-Sayed, 2017).

Dalam teori, asfiksia akibat preeklampsia terjadi karena disfungsi endotel, yang mengubah keseimbangan antara hormon vasokonstriktor (endotelin, tromboksan, angiotensin) dan vasodilator (nitritoksida, prostasiklin), sehingga mempengaruhi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida yang dialirkan ke janin melalui plasenta, sehingga menyebabkan asfiksia neonatorum. Selain itu, saat terjadinya hipoksia pada neonatus maka akan menyebabkan terjadinya perubahan metabolisme aerob ke anaerob sehingga menyebabkan meningkatnya karbon dioksida, cairan tubuh, dan terjadi asidosis darah (Mongdong *et al.*, 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preeklampsia bukan merupakan faktor risiko terjadinya asfiksia. Hal ini dapat terjadi jika ibu melakukan hal-hal yang dapat mencegah naiknya tekanan darah selama kehamilan dengan modifikasi gaya hidup yang sehat serta rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Selain itu dalam penelitian terdapat beberapa variabel yang juga dapat mempengaruhi satu sama lain. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Tyas dkk (2019) didapatkan hasil bahwa ibu dengan usia lanjut yang mengalami preeklampsia berisiko 4,263 kali melahirkan bayi yang asfiksia, hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara variabel usia dan preeklampsia, sehingga dalam penelitian ini bisa saja kedua variabel ini saling mempengaruhi sehingga menyebabkan hasil penelitian ini menjadi tidak signifikan.

3. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Paritas

Pada penelitian ini dilihat hasil analisis yang dilakukan didapat OR sebesar 0,652 dengan CI 95% (0,262-1,623) mencakup angka satu sehingga tidak ada kebermaknaan, serta *p-value* 0,479 > 0,05 yang artinya tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah paritas ibu bukan merupakan faktor risiko dari asfiksia neonatorum.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Syalfina (2015) di Kabupaten Mojokerto dengan sampel sebanyak 40 kelompok kasus dan 40 kelompok kontrol didapatkan hasil analisis bivariat antara paritas dengan kejadian asfiksia tidak memiliki hubungan dan kebermaknaan (OR= 0,684; CI 95%= 0,126-3,715; *p-value*=0,660) yang artinya paritas bukan suatu faktor risiko dari asfiksia. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliawati dkk (2016) di RSUD Panembahan Senopati Bantul dengan jumlah sampel sebanyak 80 orang yang terdiri dari 40 kasus dan 40 kontrol, dari penelitian ini didapatkan hasil analisis bivariat antara paritas dengan kejadian asfiksia yaitu sebesar OR = 3.43; CI 95% = 1.08 - 10.88; *p-value* = 0.036 yang memperlihatkan bahwa paritas merupakan faktor risiko terjadinya asfiksia neonatorum.

Paritas merupakan jumlah kelahiran yang menghasilkan janin yang mamou hidup diluar rahim (28 minggu). Multipara atau paritas 2-3 adalah paritas yang tergolong aman jika ditinjau dari sudut kematian maternal dan neonatal. Primipara (paritas 1) dan grandemultipara (paritas >4) memiliki angka kematian maternal yang lebih tinggi. Makin tinggi paritas maka

risiko kematian maternal juga meningkat. Risiko yang dapat terjadi akibat primipara dapat ditangani dengan asuhan obstetrik yang baik, sedangkan risiko yang dapat terjadi akibat grandemultipara dapat dicegah dengan menerapkan keluarga berencana (Lestari & Putri, 2019).

Ibu primipara biasanya tidak siap dalam menangani komplikasi yang terjadi dalam kehamilan, persalinan dan nifas. Ibu primipara berisiko karena belum siap secara medis maupun secara mental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu primipara merupakan faktor risiko yang berhubungan kuat terhadap mortalitas asfiksia, sedangkan ibu grandemultipara mengalami kemunduran secara fisik dalam proses kehamilan. Keadaan tersebut memberikan risiko untuk terjadi perdarahan, plasenta previa, ruptur uteri, solusio plasenta yang dapat berakhir dengan asfiksia neonatorum (Fajarriyanti, 2017).

Pada ibu grandemultipara terjadi kemunduran kelenturan jaringan akibat sudah berulang kali diregangkan selama kehamilan sebelumnya. Sehingga cenderung timbul komplikasi berupa kelainan letak ataupun kelainan pertumbuhan plasenta dan pertumbuhan janin. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi suplai gizi dan oksigen dari ibu ke janin dan semakin tinggi paritas maka risiko untuk melahirkan bayi dengan asfiksia juga akan semakin tinggi (Fajarriyanti, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan paritas bukan merupakan faktor risiko dari asfiksia. Menurut peneliti, hal ini dapat terjadi berhubungan dengan kesiapan ibu untuk mengandung, ibu yang mengandung anak

pertama dapat lebih memperhatikan kehamilannya dengan melakukan pemeriksaan kehamilan, sama halnya dengan ibu dengan riwayat grandemultipara. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Syalfina (2015) dijelaskan bahwa risiko kejadian asfiksia neonatorum lebih tinggi pada ibu hamil dengan kualitas ANC yang kurang baik dibanding ibu hamil dengan kualitas ANC yang baik. Paritas bukan merupakan faktor risiko terjadinya asfiksia neonatorum Selain itu hasil yang tidak signifikan ini juga dipengaruhi kurangnya jumlah variabel paritas yang berisiko tinggi dalam sampel yang diteliti.

4. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Anemia

Pada hasil penelitian ini didapatkan OR sebesar 3,410 yang artinya ibu yang mengalami anemia lebih berisiko 3,410 kali melahirkan bayi dengan keadaan asfiksia. OR=3,410 dengan CI 95% (1,350-8,614) tidak mencakup angka satu sehingga dianggap bermakna secara statistik dengan nilai $p < 0,05$ yang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiani dkk (2016) di di RSUP Sanglah dengan 172 sampel yang terdiri dari 86 kasus dan 86 kontrol didapatkan faktor risiko anemia merupakan faktor bermakna yang mempengaruhi kejadian asfiksia dengan besar OR=6,49 (95%CI: 2,21-19,03). Hasil ini juga sama dengan penelitian yang di

lakukan oleh Agustin (2017) dengan jumlah sampel sebanyak 152 yang terbagi atas 76 sampel kasus dan 76 sampel kontrol didapatkan besar OR=3,036; % CI 95=1,488-6,194; *p-value*=0.002 yang artinya ibu dengan anemia memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian asfiksia dan berisiko 3,036 kali lebih besar melahirkan bayi dengan asfiksia.

Anemia merupakan keadaan kurangnya jumlah eritrosit atau sel darah merah, jumlah hemoglobin (Hb), dan volume hematokrit per 100 ml darah. Anemia dalam kehamilan yaitu kondisi ibu dengan kadar nilai hemoglobin < 11 gr/dL pada trimester satu dan tiga, atau kadar nilai hemoglobin kurang dari 10,5 gr/dL pada trimester dua (Darmawansyih, 2017). Keadaan kurangnya kadar Hb terjadi karena kurangnya nutrisi zat besi, asam folat, maupun perdarahan saluran cerna. Kurangnya nutrisi saat hamil menyebabkan hambatan sintesis Hb, oleh karena itu jumlah Hb tidak bisa mengimbangi naiknya volume plasma. Anemia yang terjadi pada kehamilan menyebabkan gangguan pada pengangkutan oksigen ke jaringan dan janin. Gangguan ini bisa menyebabkan hipoksia janin sehingga sewaktu kelahiran terjadi asfiksia neonatorum (Subriah & Ningsi, 2018).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Manuaba (2008) dalam Agustin (2017) yang menyatakan bahwa aliran darah ke plasenta akan berkurang pada ibu dengan anemia sehingga distribusi oksigen dan nutrisi tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Transportasi oksigen yang terganggu menyebabkan konsumsi oksigen oleh janin juga

tidak terpenuhi. Dalam keadaan kekurangan oksigen ini maka metabolisme janin berubah menjadi metabolisme anaerob sehingga terjadi penumpukan asam laktat dan piruvat sehingga terjadi asidosis metabolik. Plasenta dapat mengalami hipertrofi sebagai kompensasi akibat hipoksia sehingga volume dan luas permukaan plasenta berkurang karena adanya infark, trombi intervili, dan kalsifikasi yang menyebabkan terganggunya kemampuan difusi plasenta sehingga terjadi insufisiensi sirkulasi antara uterus dan plasenta yang menyebabkan ketersediaan oksigen ke janin berkurang sehingga terjadi asfiksia neonatorum.

5. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan KPD

Hasil penelitian ini yang dituliskan dalam tabel berupa OR sebesar 3,872 dengan CI 95% (1,364-10,989) tidak mencakup angka satu sehingga menunjukkan adanya kebermaknaan. Artinya ibu yang mengalami KPD >12 jam berisiko 3,872 kali untuk melahirkan bayi dengan asfiksia. Hal ini berarti KPD merupakan faktor risiko terjadinya asfiksia neonatorum.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiradharma dkk (2016) yang dilakukan di RSUP Sanglah, Denpasar, dengan menggunakan 76 sampel yang terdiri atas 38 sampel kasus dan 38 sampel kontrol, didapatkan hasil bahwa KPD merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum dengan besar $p=0,002$; $OR=8,0$; $CI\ 95\% 2,0-30,4$. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Indrapermana dkk (2021) di RSUD Negara tentang hubungan KPD dengan asfiksia

neonatorum, dengan total sampel sebanyak 220 orang didapatkan hasil 15,4% pasien dengan KPD >24 jam dan 61,5% pasien dengan KPD >12-24 jam melahirkan bayi dengan asfiksia neonatorum ($p\text{-value} = <0,001$) yang disimpulkan bahwa semakin tinggi durasi KPD maka semakin tinggi risiko terjadinya asfiksia neonatorum.

Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan keluarnya cairan melalui jalan lahir sebelum adanya proses persalinan. KPD dapat terjadi karena lemahnya selaput ketuban, adanya infeksi bakteri, maupun peningkatan tekanan distensi rahim (Setiawati, 2020). 50%-70% pasien KPD akan mengalami persalinan secara spontan kurang dari 48 jam, 33% dapat mengalami sindrom gawat napas, 32%-76% mengalami kompresi tali pusat, 13%-60% mengalami khorioamnionitis, 4%-12% mengalami abruption plasenta, dan 1%-2% kemungkinan mengalami kematian janin. Semakin lama KPD, semakin besar kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi, sehingga meningkatkan risiko asfiksia (Wiradharma, 2016).

Secara teori, KPD berpengaruh pada kehamilan juga persalinan, semakin lama jarak antara pecahnya selaput ketuban makin besar juga kemungkinan terjadi infeksi dalam rahim yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Terjadinya KPD dapat menimbulkan berbagai komplikasi, KPD menyebabkan hubungan langsung antara dunia luar dan dalam rahim sehingga infeksi maternal mudah terjadi. KPD bisa menyebabkan terjadinya 3 hal, salah satunya adalah infeksi maternal. Infeksi normalnya menyebabkan terbentuknya sel

gram negatif, lalu berintegrasi dan menghasilkan suatu endotoksin, kemudian menyebabkan terjadinya vasospasmus yang kuat pada vena, akibatnya terjadi perembesan cairan dari intravaskular ke ruang ekstrasvaskular sehingga kurangnya volume darah yang beredar. Akibatnya aliran darah plasenta maternal berkurang, oksigen yang diterima janin pun berkurang sehingga terjadi hipoksia dan ketika dilahirkan bayi mengalami asfiksia (Bayih *et al.*, 2020).

6. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Metode Persalinan

Dalam penelitian ini didapatkan hasil analisis bivariat variabel metode persalinan *p-value* $0,380 > 0,05$ yang menunjukkan tidak signifikan secara statistik dan OR sebesar 0,616 CI 95% (0,258-1,468) mencakup angka satu sehingga dianggap tidak ada kebermaknaan dari hasil tersebut atau metode persalinan bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiani dkk (2016) di RSUP Sanglah dengan 172 sampel yang terdiri dari 86 kasus dan 86 kontrol didapatkan jenis persalinan bukan faktor risiko dari asfiksia (*p-value*=0,627; OR 1,15 CI 95% 0,62-2,13). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kardana (2020) di RSUP Sanglah dengan total 70 sampel didapatkan hasil analisis multivariat OR 5.51 (95%CI 1.24-24.48, $p=0.025$) yang artinya dalam penelitian ini, metode

persalinan dengan instrumen merupakan faktor risiko dari kejadian asfiksia neonatorum.

Helen Varney (2008) dalam Fajarriyanti (2017) menjelaskan bahwa bayi yang lahir dengan ekstraksi vakum dan operasi sesar tidak mengalami reduksi cairan paru dan kompresi dada, sehingga mengalami paru-paru basah yang lebih persisten yang dapat menyebabkan *transient tachypnea* pada bayi baru lahir. Persalinan dengan operasi sesar akan menstimulasi pengeluaran hormon stres pada ibu sehingga terjadi pematangan paru-paru bayi yang diisi oleh cairan paru. Saat persalinan secara pervaginam maka akan terjadi peningkatan tekanan akibat kompresi dada ketika melewati jalan lahir, sehingga diperkirakan cairan paru terdorong sebanyak kurang lebih $\frac{1}{4}$ kapasitas residual fungsional. Oleh karena itu, pada bayi yang lahir dengan operasi sesar memiliki cairan paru lebih banyak dibandingkan dengan udara didalam paru selama 6 jam pertama setelah lahir (Fanny, 2015).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode persalinan dengan risiko tinggi bukan merupakan faktor risiko terjadinya asfiksia neonatorum. Menurut peneliti, setiap persalinan membawa risiko bagi ibu dan janin berupa kesakitan bahkan kematian, baik persalinan dengan instrumen maupun non instrumen. Jika ibu maupun janin berada dalam kondisi yang berisiko mengalami komplikasi dalam persalinan, maka untuk segera menyelamatkan keduanya, perlu segera dilakukan persalinan dengan tindakan yaitu persalinan dengan alat tertentu, seperti forseps,

ekstraksi vakum, ataupun operasi sesar. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurdin dkk (2021) didapatkan hasil bahwa ibu yang melahirkan dengan KPD < 24 jam maka akan melahirkan secara spontan, 79% wanita melahirkan spontan < 12 jam dan 90% < 24 jam. Hal ini bisa saja mempengaruhi hasil dari penelitian ini jika dikaitkan dengan variabel lain yaitu KPD yang juga diteliti dalam penelitian ini, dimana KPD > 12 jam memberikan hasil yang signifikan. Sehingga ibu yang melahirkan dengan KPD > 12 jam namun masih < 24 jam maka kemungkinan 90% akan melahirkan secara spontan. Oleh karena jumlah variabel metode persalinan dengan instrumen dalam sampel kasus hanya sedikit maka hal ini dapat mempengaruhi hasil analisis data.

7. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan BBL

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada variabel BBL terhadap asfiksia didapatkan hasil OR sebesar 7,451 dengan CI 95% (2,913-19,057) tidak mencakup angka satu yang artinya ada kebermaknaan atau BBL risiko tinggi merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum. Hal ini menunjukkan bayi yang memiliki BBL risiko tinggi berisiko 7,451 kali lebih besar mengalami asfiksia neonatorum.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum, Murti & Prasetya (2019) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh BBLR terhadap kejadian asfiksia neonatorum secara signifikan. BBLR lebih berisiko mengalami asfiksia dibandingkan bayi dengan berat badan

normal (OR= 2.58; 95% CI= 3.80 to 46.15; $p < 0.001$). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiani dkk (2016) di RSUP Sanglah dengan 172 sampel yang terdiri dari 86 kasus dan 86 kontrol didapatkan dalam penelitian ini BBLR dijumpai meningkatkan risiko kejadian asfiksia neonatorum (AOR=3,85; 95%CI:1,61-9,18).

Bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan berat badan kurang dari 2.500gram seringkali mengalami asfiksia, karena sulit untuk beradaptasi dari kondisi dalam rahim menuju luar rahim. Proses transisi yang sulit ini membuat berbagai gangguan di sistem pernapasan, antara lain: alveolus fungsional yang berkurang, kadar surfaktan yang tidak mencukupi, penyempitan lumen saluran napas, kolaps dan obstruksi saluran napas, kapiler paru-paru rawan rusak karena tidak matur, otot-otot pernapasan yang lemah yang menyebabkan timbulnya apnea, asfiksia, dan *respiratory distress syndrome* pada bayi BBLR (Lestari & Putri, 2019). Maryunani (2009) dalam Kusumaningrum, Murti & Prasetya (2019) menerangkan bahwa bayi yang dengan berat badan rendah kekurangan alveoli sehingga surfaktan yang dimiliki juga sedikit. Surfaktan berfungsi untuk menurunkan tekanan permukaan paru-paru dan membantu untuk menstabilkan dinding alveoli agar tidak terjadi kolaps di akhir pernafasan. Kadar surfaktan yang rendah dan perkembangan paru yang belum sempurna pada BBLR menyebabkan bayi sulit untuk bernafas sehingga berakibat terjadinya asfiksia neonatorum (Wiadnyana & dkk, 2018).

8. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Usia Gestasi

Hasil penelitian menunjukkan ibu dengan usia gestasi berisiko tinggi 7,765 kali lebih berisiko melahirkan bayi dengan asfiksia. Hasil analisis menunjukkan $p\text{-value} < 0,05$; $OR=7,765$ CI 95% (2,770-21,765) tidak mencakup angka satu yang artinya ada hubungan bermakna antara usia gestasi terhadap kejadian asfiksia atau usia gestasi merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum.

Hasil yang sama juga didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tasew dkk (2018) bayi prematur memiliki risiko 2,2 kali lebih tinggi mengalami asfiksia dibandingkan bayi aterm [AOR = 2,20; 95% CI (1,02, 4,76)]. Laporan hasil penelitian oleh Rochmaniah & Khofiyah (2021) di RSUD Kota Madiun dengan rasio 1:1 dan total sampel sebanyak 218 didapatkan $p\text{-value} < 0,05$ dari tabulasi silang sehingga dianggap terdapat hubungan antara bayi lahir prematur dengan kejadian asfiksia.

Bayi prematur atau preterm yaitu bayi yang lahir saat usia gestasi diantara 28-36 minggu. Bayi dengan keadaan ini organ dan fungsi tubuhnya masih belum berfungsi dengan maksimal karena banyaknya jaringan tubuh yang belum terbentuk sehingga bayi prematur akan sulit untuk bertahan hidup karena sulit untuk bertahan hidup diluar rahim. Semakin muda usia gestasi maka fungsi dari organ tubuh bayi makin kurang sempurna dan prognosinya juga akan semakin buruk. Belum maksimalnya fungsi dari sistem pernafasan bayi prematur maka dapat menyebabkan terjadinya asfiksia (Lestari & Putri, 2019).

Bayi prematur memiliki banyak tantangan agar dapat bertahan. Masalah-masalah tersebut timbul karena masih belum maturnya organ tubuh sehingga fungsinya belum sempurna. Bayi prematur memiliki imunitas yang belum bekerja dengan baik sehingga rentan terhadap masalah di sistem pernapasan, kardiovaskular, pencernaan, hipotermia, hipoglikemia, dan rentan terhadap infeksi. Prognosis dapat memburuk jika sebelumnya memang sudah ada masalah sedari dalam kandungan (Jalaluddin, 2018). Hal ini disebabkan karena bayi prematur lebih rentan mengalami iskemia akibat pembentukan sawar darah otak yang belum sempurna. Selain itu, bayi prematur menghadapi berbagai morbiditas sistem organ, khususnya paru-paru yang imatur yang menyebabkan timbulnya gagal napas (Tasew *et al.*, 2018).

9. Hasil Analisis Multivariat

Berdasarkan hasil analisis multivariat menunjukkan hasil dari uji regresi logistik berganda yang dilakukan pada 6 variabel dependen yang memenuhi nilai $p < 0,25$ yaitu usia ibu, preeklampsia, anemia, KPD, BBL, dan usia gestasi. Faktor risiko dengan nilai OR terbesar adalah BBL ($p\text{-value} = 0,004$; $OR = 8,397$; $CI\ 95\% = 1,944 - 36,261$).

BBL bayi yang paling mempengaruhi kejadian asfiksia neonatorum yaitu BBLR, hal ini disebabkan kadar surfaktan yang rendah dan perkembangan paru yang belum sempurna pada BBLR menyebabkan

bayi sulit untuk bernafas sehingga berakibat terjadinya asfiksia neonatorum.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam pengumpulan data diperoleh catatan medik data yang tidak lengkap dalam berkas rekam medik sehingga masuk dalam kriteria eksklusi sampel dan tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian.
2. Jumlah sampel penelitian yang kurang mencukupi karena banyaknya variabel yang diteliti sehingga mempengaruhi kemaknaan hasil pengolahan data.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yaitu analisis faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021, maka diperoleh kesimpulan antara lain :

1. Usia ibu dengan usia risiko tinggi berisiko 1,857 kali lebih besar untuk melahirkan bayi dengan kejadian asfiksia neonatorum dibandingkan dengan usia ibu yang berisiko rendah namun risiko ini dianggap tidak bermakna terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021.
2. Ibu yang mengalami preeklampsia berisiko 2,179 kali melahirkan bayi dengan asfiksia namun risiko ini dianggap tidak bermakna terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021.
3. Ibu dengan paritas yang berisiko tinggi merupakan faktor protektif dengan $OR = 0,652$ kali terhadap kejadian asfiksia neonatorum, dan risiko ini tidak bermakna terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021.
4. Ibu yang mengalami anemia lebih berisiko 3,410 kali melahirkan bayi dengan keadaan asfiksia dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami anemia. Faktor ini dianggap bermakna secara statistik merupakan faktor

risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021.

5. Ibu yang mengalami KPD >12 jam berisiko 3,872 kali untuk melahirkan bayi dengan asfiksia. Faktor ini dianggap bermakna secara statistik dan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021.
6. Metode persalinan yang berisiko tinggi merupakan faktor protektif dengan $OR = 0,616$, faktor ini dianggap tidak ada kebermaknaan terhadap kejadian asfiksia di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021.
7. BBL risiko tinggi berisiko 7,451 kali untuk mengalami asfiksia dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan BBL risiko rendah. Faktor ini dianggap bermakna secara statistik dan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021.
8. Bayi dengan usia gestasi berisiko tinggi 7,765 kali lebih mengalami asfiksia dibandingkan dengan bayi dengan usia gestasi berisiko rendah. Faktor ini dianggap bermakna secara statistik dan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021.
9. Faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021 yaitu variabel BBL.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain agar didapat gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor risiko yang berpotensi mempengaruhi kejadian asfiksia sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi kesehatan sebagai langkah untuk menurunkan kejadian asfiksia neonatorum.
2. Bagi petugas kesehatan agar dapat memberikan edukasi secara rutin terutama kepada ibu hamil dan juga meningkatkan pelayanan terhadap ANC untuk mencegah risiko kejadian asfiksia.
3. Bagi masyarakat agar khususnya ibu hamil yang berisiko agar mampu mengetahui faktor-faktor kejadian asfiksia sehingga tindakan pencegahan dini dapat dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, K. A. (2017). Hubungan Anemia Ibu Hamil Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rsud Wonosari Gunungkidul Tahun 2015. Skripsi.
- American Academy of Pediatrics and American Heart Association. (2016). *Textbook of Neonatal Resuscitation (NRP)*. Ed. 7th. Chicago: American Academy of Pediatrics and American Heart Association.
- American Heart Association. (2020). *American Heart Association, AHA Journals*. Available at: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000902>.
- Aprilia, N. P. D., Surinati, I. D. A. K. dan Suratiah. (2019). Anemia Pada Kehamilan Dengan Tingkat Asfiksia Neonatorum Pada Ibu Bersalin. *Jurnal Gema Keperawatan*, 12(2), hal. 121–126. Available at: <https://ejournal.poltekkes-denpasar.ac.id/index.php/JGK/article/download/894/365>.
- Ashila. (2020). Hubungan Pendidikan Anak Dalam Kandungan Perspektif Islam dengan Perspektif Psikologi. Skripsi: *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Aslam, H. Muhammad *et al.* (2014). Risk factors of birth asphyxia. *Italian journal of pediatrics*, 40, hal. 94. doi: 10.1186/s13052-014-0094-2.
- Bayih W, Yitbarek G, Aynalem Y, et al. Prevalence and Associated Factors of Birth Asphyxia Among Live Births at Debre Tabor General Hospital, North Central Ethiopia. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(1). doi: <https://doi.org/10.1186/s12884-020-03348-2>
- CDC. (2018). *Infant Mortality, Official Website Centers for Disease Control and Prevention*. Available at: <https://www.cdc.gov/reproductivehealth/maternalinfanthealth/infantmortality.htm> (Accessed: May 18, 2021).
- Data Sekunder. (2021). *Rekam Medik RSUD Labuang Baji Makassar*. Makassar.
- Darmawansyah, (2017). Hubungan Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe Terhadap Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil di Kecamatan Patallassang Kabupaten Gowa Tahun 2016. *Alami Journal*, 1(1), hal. 51-59. Available at: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13983/1/Pdf%20laporan%20penelitian%20prodi%20ira%2012-1-2016.pdf>
- Dinas Kesehatan Sulsel. (2020). Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2020.
- Dorland, W. N. (2015). *Kamus Saku Kedokteran Dorland*. Edisi 29. Jakarta: Elsevier.

- El-Sayed, A. A. F. (2017). Preeclampsia: A review of the pathogenesis and possible management strategies based on its pathophysiological derangements. *Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology*, hal. 593–598. doi: 10.1016/j.tjog.2017.08.004.
- Fajarriyanti, I. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Asfiksia Neonatorum Di RSUD Muhammadiyah Bantul Tahun 2016-2017. *Naskah Publikasi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/299438008.pdf>.
- Fanny, F. (2015). Sectio Caesarea Sebagai Penyebab Kejadian Asfiksia Neonatorum. *Jurnal Majority*. Available at: <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1474>.
- Gillam-Krakauer, M. dan Gowen, J. (2020). *Birth Asphyxia Continuing Education Activity*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430782/?report=printable>.
- Indrapermana I. G. F, Duarsa V. S. P., Iswara S, D. (2021). Hubungan durasi ketuban pecah dini dengan asfiksia neonatorum di RSUD Negara tahun 2020. *Intisari Sains Medis*, 12(1), hal. 47-51. P-ISSN: 2503-3638, E-ISSN: 2089-9084
- Jalaluddin, Syatirah. (2018). *Transmisi Vertikal Virus Hepatitis B*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Jodjana, C. dan Suryawan, I. W. B. (2020). Hubungan jenis persalinan dengan kejadian asfiksia neonatorum di ruang perinatologi dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) RSUD Wangaya Kota Denpasar. *Intisari Sains Medis*, 11(1), hal. 393. doi: 10.15562/ism.v11i1.537.
- Kardana, I. M. (2016). Risk Factors of Perinatal Asphyxia in The Term Newborn at Sanglah General Hospital, Bali-Indonesia. *Bali Medical Journal*, 5(1), hal. 196. doi: 10.15562/bmj.v5i1.312.
- Katsir, Ibnu. (2012). *Tafsir Ibnu Katsir (Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir)*. Kairo: Mu-assaasah Daae al-Hilaal Kairo.
- Kemenkes. (2019). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Asfiksia*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- (2019). *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta.
- Kliegman, R. M. (2016). *Nelson Textbook of Pediatrics*. Philadelphia: Elsevier.

- Kusumaningrum, R. Y., Murti, B. dan Prasetya, H. (2019). Low Birth, Prematurity, and Pre-Eclampsia as Risk Factors of Neonatal Asphyxia. *Journal of Maternal and Child Health*, 4(1), hal. 49–54. doi: 10.26911/thejmch.2019.04.01.07.
- Lestari, R. D. dan Putri, N. N. B. K. A. (2019). Analisis Faktor Penyebab Kejadian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir. *Jurnal Ners dan Kebidanan*, 6(2), hal. 251–262. Available at: <https://jnk.phb.ac.id/index.php/jnk/article/download/429/451>.
- Lestariningsih, Y. Y. dan Ertiana, D. (2016). Hubungan Ketuban Pecah Dini dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Kabupaten Kediri Tahun 2016. *Jurnal Kebidanan Midwiferia*, hal. 1–10. Available at: <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/midwiferia/article/download/1467/1119>.
- Mariana, D. dan Ashriady. (2020). Analisis Faktor Risiko Umur Kehamilan Ibu dan Jenis Persalinan terhadap Kejadian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Kesehatan Terpadu*, hal. 58–64. Available at: <https://www.jurnalpoltekkesmaluku.com/index.php/JKT/article/download/74/45>.
- Mongdong, A. W. M. V. *et al.* (2021). Studi Faktor Risiko Preeklamsi terhadap Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD dr. Sayidiman Magetan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma*. Available at: http://repository.ubaya.ac.id/39132/1/Rivan%20Virlando_Studi%20Faktor%20Risiko%20Preeklamsi.pdf
- Muliawati D., Endang S., Uki R. (2016). Hubungan Riwayat Hipertensi Dan Paritas Dengan Asfiksia Neonatorum Pada Ibu Bersalin Preeklampsia Berat. *Jurnal Kesehatan Madani Medika*, 7(1), hal. 27-33.
- Murniati, L., Taherong, F. dan Syatirah. (2021). Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia. *Jurnal Midwifery*, 3(1), hal. 32–41. Available at: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmidwifery/article/viewFile/21028/11099>
- Nurdin, A. *et al.* (2021). Analysis of the relationship between premature rupture of membranes with delivery method and newborn asphyxia. *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology*, 10(12), hal. 4377-4382. doi: <https://dx.doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20214631>
- Nurmawati, Saleha, S. dan Nadyah. (2019). Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "R" Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Tanggal 05 Juli 2018. *Jurnal Midwifery*, 1(1), hal. 15–26. Available at: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmidwifery/article/view/7532>.

- Popoola, O. T. (2019). An Empirical Analysis of Infant Mortality. *Journal of Economics and Management Sciences*, 2(1), hal. 27. doi: 10.30560/jems.v2n1p27.
- Rochmaniah, D. A. dan Nihdatul Khofiyah. (2021). Correlation Between Preeclampsia and Preterm Labor with The Incidence of Asphyxia Neonatorum. *Jurnal Medical Health Science*, 15(3), hal. 1155-1158. Available at: <https://pjmhsonline.com/2021/march/1155.pdf>
- Sadanoer, I. M dan Dina Ayuning Tyas. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum. *Jurnal Bidan Komunitas*, 3(3), hal. 93-98. Available at: <http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jbk>
- Setiawati, Dewi. (2020). *Fisio-Patologi Kehamilan, Persalinan dan Kasih Sayang Universal; Bagaimana Proses Setetes Sperma Menjadi Makhluk Hidup Baru?*. Makassar: Alauddin University Press.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Jilid 01*. Jakarta: Lentera Hati.
- (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Jilid 04*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subriah dan Ningsi, A. (2018). Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Yang Menjalani Persalinan Spontan Dengan Angka Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rsdkia Pertiwi Kota Makassar Tahun 2017. *Global Health Science*, 3(2), hal. 101–105. Available at: <http://jurnal.csdforum.com/index.php/ghs>.
- Syalfina, A. D. dan Devy, S. R. (2015). Analisis Faktor Risiko Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Asfiksia Neonatorum. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 3(3), hal. 265–276. Available at: <http://repository.unair.ac.id/105484/1/8%20Full%20Text.pdf>.
- Tasew, H. *et al.* (2018). Risk factors of birth asphyxia among newborns in public hospitals of Central Zone, Tigray, Ethiopia 2018. *BMC Research Notes*, 11(1). doi: 10.1186/s13104-018-3611-3.
- The American College Obstetrics & Gynecology (ACOG). (2015, Oktober). *The Apgar Score. Official Website The American College Obstetrics & Gynecology*. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2015/10/the-apgar-score>
- UKK Neonatologi IDAI. (2017). *Resusitasi neonatus*. Jakarta: UKK neonatologi IDAI.

- WHO. (2018). *Newborns: reducing mortality*, Official Website World Health Organization. Available at: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-mortality>.
- (2019). *Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Ageing Data portal*, Official Website World Health Organization. Available at: [https://www.who.int/data/maternal-newborn-child-adolescent-ageing/indicator-explorer-new/mca/infant-mortality-rate-\(per-1000-live-births\)](https://www.who.int/data/maternal-newborn-child-adolescent-ageing/indicator-explorer-new/mca/infant-mortality-rate-(per-1000-live-births)).
- (2021). *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics*, Official Website World Health Organization. Available at: <https://icd.who.int>.
- Wiadnyana, I. B., Suryawan, I. W. dan Sucipta, A. M. (2018). Hubungan Antara Bayi Berat Lahir Rendah dengan Asfiksia Neonatorum di RSUD Wangaya Kota Denpasar. *Intisari Sains Medis*, hal. 95–99. Available at: <https://isainsmedis.id/index.php/ism/article/download/167/179>.
- Widiani N.N. A., Kurniati D.P. Y., Windiani, I.G.A. T. (2016). Faktor Risiko Ibu dan Bayi Terhadap Kejadian Asfiksia Neonatorum di Bali: Penelitian Case Control. *Public Health and Preventive Medicine Archive*, 4(2), hal. 120-126. Available at: https://elearning.uui.ac.id/publik/download/1547826_jurnal_asfiksia_1.pdf
- Wijata, A. *et al.* (2016). Kadar Neuron-Specific Enolase Serum dan Derajat Ensefalopati Hipoksik Iskemik pada Asfiksia Neonatorum. *Sari Pediatri*, 18(1), hal. 1–5. Available at: <https://saripediatri.org/index.php/saripediatri/article/download/2/17>.
- Wiradharma, Kardana I Md, Dharma Artana I Wyn. (2016). Risiko Asfiksia pada Ketuban Pecah Dini di RSUP Sanglah. *Sari Pediatri*, 14(5), hal. 316-319. Available at: <https://www.saripediatri.org/index.php/saripediatri/article/download/339/278>

LAMPIRAN

A. Lampiran I



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 24742/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur RSUD Labuang Baji Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4685/FK/PP.00.9/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SHANUN SHARI SAKUNTI
Nomor Pokok : 70600118018
Program Studi : Pend. Dokter
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" **ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN ASFIKZIA NEONATORUM DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR TAHUN 2021** "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 27 Desember 2021 s/d 05 Februari 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 24 Desember 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19820624 199303 1 003

Terdapat 10
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal

SIMP PTSP 24-12-2021



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulawesiprov.go.id> Email : ptsp@sulawesiprov.go.id
Makassar 90231



B. Lampiran II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No.30 Ronggeng Polong-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : B-4685/Un.06/FKIK/PP.00.9/12/2021 Gowa, 22 Desember 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Proposal
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Direktur RSUD Labuang Baji Makassar
Di
Tempat.

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Shanun Shari Sakuntl
N I M : 70600118018
Fakultas/Jurusan : Pendidikan Dokter
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Rangan, kec. Kuaru, Kab. Paser, Kalimantan Timur

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Analisis Faktor Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. dr. Rini Fitriani, M.Kes
2. Dr.dr. Syatirah, Sp.A, M.Kes

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian, terhitung mulai Desember 2021 s/d Januari 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan,

Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa

C. Lampiran III



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.E.045/KEPK/FKIK/I/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Shanun Shari Sakuntl
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Analisis Faktor Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rsud Labuang Baji Makassar
Tahun 2021"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023.

This declaration of ethics applies during the period January 27, 2022 until January 27, 2023.



January 27, 2022

Professor and Chairperson,

DR. Dr. Syarifah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes

E. Lampiran V
Analisis Univariat

usia ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	risiko tinggi	39	41.5	41.5	41.5
	risiko rendah	55	58.5	58.5	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

preeklampsia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	risiko tinggi	25	26.6	26.6	26.6
	risiko rendah	69	73.4	73.4	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	risiko tinggi	26	27.7	27.7	27.7
	risiko rendah	68	72.3	72.3	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

anemia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	risiko tinggi	30	31.9	31.9	31.9
	risiko rendah	64	68.1	68.1	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

KPD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	risiko tinggi	23	24.5	24.5	24.5
	risiko rendah	71	75.5	75.5	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

metode persalinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	risiko tinggi	31	33.0	33.0	33.0
	risiko rendah	63	67.0	67.0	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

BBL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	risiko tinggi	39	41.5	41.5	41.5
	risiko rendah	55	58.5	58.5	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

usia gestasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	risiko tinggi	31	33.0	33.0	33.0
	risiko rendah	63	67.0	67.0	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

asfiksia neonatorum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	asfiksia	47	50.0	50.0	50.0
	tidak asfiksia	47	50.0	50.0	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Analisis Bivariat

usia ibu * asfiksia nenonatorum

Crosstab

			asfiksia nenonatorum		Total
			asfiksia	tidak asfiksia	
usia ibu	risiko tinggi	Count	23	16	39
		Expected Count	19.5	19.5	39.0
		% within asfiksia nenonatorum	48.9%	34.0%	41.5%
	risiko rendah	Count	24	31	55
		Expected Count	27.5	27.5	55.0
		% within asfiksia nenonatorum	51.1%	66.0%	58.5%
Total	Count	47	47	94	
	Expected Count	47.0	47.0	94.0	
	% within asfiksia nenonatorum	100.0%	100.0%	100.0%	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	2.147 ^a	1	.143		
Continuity Correction ^b	1.578	1	.209		
Likelihood Ratio	2.157	1	.142		

Fisher's Exact Test				.209	.104
Linear-by-Linear Association	2.124	1	.145		
N of Valid Cases	94				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for usia ibu (risiko tinggi / risiko rendah)	1.857	.809	4.264
For cohort asfiksia nenonatorum = asfiksia	1.351	.907	2.013
For cohort asfiksia nenonatorum = tidak asfiksia	.728	.468	1.133
N of Valid Cases	94		

preeklampsia * asfiksia nenonatorum

Crosstab

			asfiksia nenonatorum		Total
			asfiksia	tidak asfiksia	
preeklampsia	risiko tinggi	Count	16	9	25
		Expected Count	12.5	12.5	25.0
		% within asfiksia nenonatorum	34.0%	19.1%	26.6%
	risiko rendah	Count	31	38	69
		Expected Count	34.5	34.5	69.0
		% within asfiksia nenonatorum	66.0%	80.9%	73.4%
Total	Count	47	47	94	
	Expected Count	47.0	47.0	94.0	
	% within asfiksia nenonatorum	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	2.670 ^a	1	.102		
Continuity Correction ^b	1.962	1	.161		
Likelihood Ratio	2.698	1	.100		
Fisher's Exact Test				.161	.080

Linear-by-Linear Association	2.642	1	.104	
N of Valid Cases	94			

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for preeklampsia (risiko tinggi / risiko rendah)	2.179	.848	5.603
For cohort asfiksia nenonatorum = asfiksia	1.425	.961	2.111
For cohort asfiksia nenonatorum = tidak asfiksia	.654	.372	1.149
N of Valid Cases	94		

paritas * asfiksia nenonatorum

Crosstab

			asfiksia nenonatorum		Total
			asfiksia	tidak asfiksia	
paritas	risiko tinggi	Count	11	15	26
		Expected Count	13.0	13.0	26.0
		% within asfiksia nenonatorum	23.4%	31.9%	27.7%
	risiko rendah	Count	36	32	68
		Expected Count	34.0	34.0	68.0
		% within asfiksia nenonatorum	76.6%	68.1%	72.3%
Total	Count	47	47	94	
	Expected Count	47.0	47.0	94.0	
	% within asfiksia nenonatorum	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.851 ^a	1	.356		
Continuity Correction ^b	.479	1	.489		
Likelihood Ratio	.853	1	.356		
Fisher's Exact Test				.490	.245

Linear-by-Linear Association	.842	1	.359	
N of Valid Cases	94			

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for paritas (risiko tinggi / risiko rendah)	.652	.262	1.623
For cohort asfiksia nenonatorum = asfiksia	.799	.484	1.320
For cohort asfiksia nenonatorum = tidak asfiksia	1.226	.810	1.856
N of Valid Cases	94		

anemia * asfiksia nenonatorum

Crosstab

			asfiksia nenonatorum		Total
			asfiksia	tidak asfiksia	
anemia	risiko tinggi	Count	21	9	30
		Expected Count	15.0	15.0	30.0
		% within asfiksia nenonatorum	44.7%	19.1%	31.9%
	risiko rendah	Count	26	38	64
		Expected Count	32.0	32.0	64.0
		% within asfiksia nenonatorum	55.3%	80.9%	68.1%
Total	Count	47	47	94	
	Expected Count	47.0	47.0	94.0	
	% within asfiksia nenonatorum	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	7.050 ^a	1	.008		
Continuity Correction ^b	5.924	1	.015		
Likelihood Ratio	7.200	1	.007		
Fisher's Exact Test				.014	.007

Linear-by-Linear Association	6.975	1	.008	
N of Valid Cases	94			

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for anemia (risiko tinggi / risiko rendah)	3.410	1.350	8.614
For cohort asfiksia nenonatorum = asfiksia	1.723	1.181	2.514
For cohort asfiksia nenonatorum = tidak asfiksia	.505	.282	.905
N of Valid Cases	94		

KPD * asfiksia nenonatorum

Crosstab

			asfiksia nenonatorum		Total
			asfiksia	tidak asfiksia	
KPD	risiko tinggi	Count	17	6	23
		Expected Count	11.5	11.5	23.0
		% within asfiksia nenonatorum	36.2%	12.8%	24.5%
	risiko rendah	Count	30	41	71
		Expected Count	35.5	35.5	71.0
		% within asfiksia nenonatorum	63.8%	87.2%	75.5%
Total	Count	47	47	94	
	Expected Count	47.0	47.0	94.0	
	% within asfiksia nenonatorum	100.0%	100.0%	100.0%	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	6.965 ^a	1	.008		
Continuity Correction ^b	5.756	1	.016		
Likelihood Ratio	7.194	1	.007		

Fisher's Exact Test				.015	.008
Linear-by-Linear Association	6.891	1	.009		
N of Valid Cases	94				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for KPD (risiko tinggi / risiko rendah)	3.872	1.364	10.989
For cohort asfiksia nenonatorum = asfiksia	1.749	1.215	2.519
For cohort asfiksia nenonatorum = tidak asfiksia	.452	.221	.924
N of Valid Cases	94		

metode persalinan * asfiksia nenonatorum

Crosstab

			asfiksia nenonatorum		Total
			asfiksia	tidak asfiksia	
metode persalinan	risiko tinggi	Count	13	18	31
		Expected Count	15.5	15.5	31.0
		% within asfiksia nenonatorum	27.7%	38.3%	33.0%
	risiko rendah	Count	34	29	63
		Expected Count	31.5	31.5	63.0
		% within asfiksia nenonatorum	72.3%	61.7%	67.0%
Total	Count	47	47	94	
	Expected Count	47.0	47.0	94.0	
	% within asfiksia nenonatorum	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1.203 ^a	1	.273		
Continuity Correction ^b	.770	1	.380		
Likelihood Ratio	1.207	1	.272		
Fisher's Exact Test				.380	.190

Linear-by-Linear Association	1.190	1	.275	
N of Valid Cases	94			

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for metode persalinan (risiko tinggi / risiko rendah)	.616	.258	1.468
For cohort asfiksia nenonatorum = asfiksia	.777	.484	1.247
For cohort asfiksia nenonatorum = tidak asfiksia	1.261	.845	1.884
N of Valid Cases	94		

BBL * asfiksia nenonatorum

Crosstab

			asfiksia nenonatorum		Total
			asfiksia	tidak asfiksia	
BBL	risiko tinggi	Count	30	9	39
		Expected Count	19.5	19.5	39.0
		% within asfiksia nenonatorum	63.8%	19.1%	41.5%
	risiko rendah	Count	17	38	55
		Expected Count	27.5	27.5	55.0
		% within asfiksia nenonatorum	36.2%	80.9%	58.5%
Total	Count	47	47	94	
	Expected Count	47.0	47.0	94.0	
	% within asfiksia nenonatorum	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	19.326 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	17.529	1	.000		
Likelihood Ratio	20.155	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000

Linear-by-Linear Association	19.120	1	.000	
N of Valid Cases	94			

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for BBL (risiko tinggi / risiko rendah)	7.451	2.913	19.057
For cohort asfiksia nenonatorum = asfiksia	2.489	1.617	3.829
For cohort asfiksia nenonatorum = tidak asfiksia	.334	.183	.608
N of Valid Cases	94		

usia gestasi * asfiksia nenonatorum

Crosstab

		asfiksia nenonatorum		Total	
		asfiksia	tidak asfiksia		
usia gestasi	risiko tinggi	Count	25	6	31
		Expected Count	15.5	15.5	31.0
		% within asfiksia nenonatorum	53.2%	12.8%	33.0%
	risiko rendah	Count	22	41	63
		Expected Count	31.5	31.5	63.0
		% within asfiksia nenonatorum	46.8%	87.2%	67.0%
Total	Count	47	47	94	
	Expected Count	47.0	47.0	94.0	
	% within asfiksia nenonatorum	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	17.375 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	15.594	1	.000		
Likelihood Ratio	18.333	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000

Linear-by-Linear Association	17.190	1	.000		
N of Valid Cases	94				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for usia gestasi (risiko tinggi / risiko rendah)	7.765	2.770	21.765
For cohort asfiksia nenonatorum = asfiksia	2.309	1.581	3.372
For cohort asfiksia nenonatorum = tidak asfiksia	.297	.142	.624
N of Valid Cases	94		

Analisis Multivariat

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	usia ibu	.471	.545	.748	1	.387	1.602
	preeklampsia	.465	.604	.593	1	.441	1.592
	anemia	1.736	.621	7.805	1	.005	5.676
	KPD	.859	.677	1.607	1	.205	2.361

BBL	2.128	.746	8.127	1	.004	8.397
usia gestasi	.468	.801	.341	1	.559	1.597
Constant	-10.190	2.363	18.602	1	.000	.000

Variables in the Equation

		95% C.I. for EXP(B)	
		Lower	Upper
Step 1 ^a	usia ibu	.551	4.662
	preeklampsia	.487	5.206
	anemia	1.679	19.190
	KPD	.626	8.906
	BBL	1.944	36.261
	usia gestasi	.332	7.683
	Constant		



F. Lampiran VI



M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Shanun Shari Sakunti
2. NIM : 70600118018
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Tempat/Tanggal Lahir : Batu Kajang/ 06 Juni 2000
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat : Komp. Griya Telkom B14
8. Orang Tua :
 - a. Ayah : Sabri
 - b. Ibu : Nurwana

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 001 Kuaro
2. SMP : SMP Plus Melati Samarinda
3. SMA : SMAN 2 Soppeng