

**STUDI LITERATUR
POTENSI BIJI KOPI (*Coffea sp.*) SEBAGAI ANTIKANKER**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SITTI MARWAH SAIN
NIM: 70100117065

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Marwah Sain

Nim 70100117065

Tempat, tanggal lahir : Luwuk, 05 September 1998

Jurusan : Farmasi

Alamat : Jl. HM. Yasin Limpo, Mutiara Indah Village

Judul : Studi Literatur Potensi Biji Kopi (*Coffea Sp.*) sebagai Anti
Kanker

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini tidak sah dan melanggar hukum.



Gowa, 14 Februari 2022

Penulis,

Sitti Marwah Sain

NIM: 70100117065

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Studi Literatur Potensi Biji Kopi (*Coffea sp.*) Sebagai Antikanker” yang disusun oleh Sitti Marwah Sain, NIM 70100117065 mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin, 14 Februari 2022**, yang bertepatan dengan **13 Rajab 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 14 Februari 2022

13 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A.	(.....)
Sekretaris	: Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si.	(.....)
Pembimbing 1	: Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing 2	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji 1	: Apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm	(.....)
Penguji 2	: Dra. St. Nasriah, M.Sos.I.	(.....)

Diketahui oleh:

**Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**



Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes.

NIP:19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil‘alaamiin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Literatur Potensi Biji Kopi (*Coffea* Sp.) sebagai Antikanker”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tak lupa pula shalawat serta salam penulis curahkan kepada bginda Nabi Muhammad saw. Nabi yang menghantarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Dalam proses penyelesaian skripsi, terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dilalui. Akan tetapi, berkat kerja keras dan dukungan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.


Terima kasih yang sebesar- besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak M.Sain dan Ibu Syafwa, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua keluarga besar atas doa dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT. selalu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita semua.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

3. Dr. Wahyuddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
6. Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
7. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
8. Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM, MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
10. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
11. Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
12. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. selaku pembimbing I yang rela meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.


13. Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si. selaku pembimbing II yang meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm. selaku penguji kompetensi yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis
15. Dra. St. Nasriah, M.Sos.I selaku penguji agama yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis.
16. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Farmasi, Staf jurusan Farmasi, dan laboran atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
Rumusan Masalah	4
Tujuan Penelitian.....	4
BAB II METODE	5
Strategi Pencarian Jurnal	5
<i>Framework</i> penelitian.....	5
Kata Kunci yang Digunakan.....	7
<i>Database</i> atau <i>Search Engine</i>	7
Kriteria Inklusi dan Eksklusi Jurnal	7
Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas	8
Hasil pencarian dan seleksi studi	8
Daftar artikel hasil pencarian.....	9
BAB III HASIL DAN ANALISIS.....	11
Hasil.....	11

Analisis	11
BAB IV PEMBAHASAN.....	16
Uraian Tanaman	16
Kanker	19
Pengujian antikanker	32
Aktivitas Antikanker	39
Jenis kanker yang dapat dihambat oleh biji kopi (<i>Coffea Sp.</i>).....	45
Tinjauan Islam	51
BAB V KESIMPULAN.....	55
Kesimpulan.....	55
Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Framework</i> penelitian	5
Tabel 2. Kriteria inklusi dan eksklusi.....	7
Tabel 3. Daftar Artikel Hasil Seleksi	9
Table 4. Hasil analisis artikel	11
Tabel 5. Komposisi kimia biji Kopi arabika (<i>Coffea arabica</i>) dan kopi robusta..	18
Tabel 6. Aktivitas antikanker biji kopi (<i>Coffea Sp.</i>)	40
Tabel 7. Kandungan senyawa dalam biji Kopi (<i>Coffea Sp.</i>).....	45
Tabel 8. Jenis kanker yang dapat dihambat oleh biji kopi (<i>Coffea Sp.</i>).....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Penelitian	6
Gambar 2. Hasil pencarian dan seleksi studi.....	8
Gambar 3. Kopi (<i>Coffea</i> Sp.)	16
Gambar 4. Biji kopi (<i>Coffea</i> Sp.)	18
Gambar 5. Struktur kimia asam klorogenat (CGA).....	41
Gambar 6. Struktur kimia kafestol.....	42
Gambar 7. Struktur kimia kafestol.....	42
Gambar 8. Struktur kimia asam kafeat.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Situs pencarian pustaka.....	62
Lampiran 2. Daftar artikel yang dianalisis	66
Lampiran 3. Gambar biji Kopi (<i>Coffea</i> Sp.).....	69



ABSTRAK

Nama : Sitti Marwah Sain
Nomor Induk Mahasiswa : 70100117065
Judul Penelitian : Studi Literatur Potensi Biji Kopi (*Coffea Sp.*)
sebagai Antikanker.

Kanker merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya pertumbuhan abnormal dari suatu sel yang tak terkendali dan mengganggu sel-sel atau jaringan yang berada disekitarnya. Beberapa kandungan senyawa yang dapat berpotensi sebagai antikanker seperti asam klorogenat, kafein, fenolik, kahweol, dan kafestol. Kandungan senyawa tersebut dapat ditemukan pada biji kopi. Dalam al-qur'an, dijelaskan berbagai macam tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti biji-bijian, salah satunya yaitu biji kopi sebagai antikanker. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas antikanker dari biji kopi (*Coffea sp.*), kandungan senyawa dari biji kopi (*Coffea sp.*) yang berpotensi sebagai antikanker, dan jenis-jenis kanker yang dapat dihambat oleh biji kopi (*Coffea sp.*). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*) dengan menggunakan database *Pubmed, Google Scholar, dan Science Direct* dengan kata kunci "*Coffee beans as anticancer*", "*Pharmacological activity of coffee beans as anticancer*", dan "*Compounds of coffee beans as anticancer*". Hasil dari analisis jurnal diperoleh sebanyak 207 jurnal yang kemudian diidentifikasi sesuai dengan kriteria inklusi dan diperoleh 6 jurnal yang dianalisis. Dari 6 jurnal tersebut, diperoleh bahwa kandungan senyawa biji kopi (*Coffea sp.*) berpotensi sebagai antikanker yaitu asam klorogenat, kahweol, kafestol, asam galat, asam kafeat. Jenis kanker yang dapat dihambat yaitu kanker payudara, kanker ginjal, kanker mulut, dan kanker usus besar.

Kata kunci : Biji Kopi (*Coffea sp.*), antikanker, kahweol, asam klorogenat, kafestol.

ABSTRACT

Name : Sitti Marwah Sain
Student ID Number : 70100117065
Research Title : *Literature Study of the Potential of Coffee Beans (Coffea Sp.) as Anticancer.*

Cancer is a disease characterized by the abnormal growth of a cell that is uncontrolled and disrupts the cells or tissues around it. Some compounds contain potential as anticancer such as chlorogenic acid, caffeine, phenolic, kahweol, and cafestol. The content of these compounds can be found in coffee beans. In the Qur'an, various kinds of plants that can be used as medicines are described, such as seeds, one of which is coffee beans as anticancer. The purpose of this study was to determine the anticancer activity of coffee beans (Coffea sp.), the content of compounds from coffee beans (Coffea sp.) which have the potential as anticancer, and the types of cancer that coffee beans (Coffea sp.) can inhibit. The research method used is the PICO method (Population, Intervention, Comparison, Outcome) using the Pubmed, Google Scholar, and Science Direct databases with the keywords "Coffee beans as anticancer", "Pharmacological activity of coffee beans as anticancer", and "Compounds of coffee beans as anticancer". The results of the journal analysis obtained as many as 207 journals which were then identified according to the inclusion criteria and 6 journals were analyzed. From these 6 journals, it was found that the compound content of coffee beans (Coffea sp.) has the potential as anticancer namely chlorogenic acid, kahweol, cafestol, gallic acid, caffeic acid. Types of cancer that can be inhibited are breast cancer, kidney cancer, oral cancer, and colon cancer.

Keywords: Coffee beans (Coffea Sp.), anticancer, chlorogenic acid, kahweol, cafestol.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kanker merupakan suatu penyakit kompleks serta berkembang yang berasal dari genetik atau lingkungan, yang terjadi karena adanya mutasi gen saat sel mengalami pertumbuhan (Gaascht et al., 2015). Sel kanker adalah sel dengan pertumbuhan abnormal dan tidak terkendali yang dapat merusak sel-sel normal disekitarnya (Masitoh & Sopyan, 2019).

Kanker merupakan salah satu penyakit penyebab kematian utama di negara berkembang dan termasuk masalah kesehatan utama di seluruh dunia (Hardjono et al., 2016). Di Amerika Serikat, National Cancer Institute memperkirakan 1.665.540 kasus baru kanker dan 585.720 kematian yang menyertainya pada tahun 2014. Sedangkan di Indonesia prevalensi kanker mencapai 135.000 kasus pertahun (Masitoh & Sopyan, 2019). Sebagai salah satu negara berkembang, di Indonesia penyakit kanker menjadi urutan kelima sebagai penyebab kematian terbanyak setelah penyakit jantung, stroke, saluran pernafasan, dan diare (Hardjono et al., 2016).

Kanker yang paling sering didiagnosis di seluruh dunia adalah paru-paru (12,7%), payudara (10,9%), kolorektal (9,7%) dan perut (7,81%). Faktor-faktor seperti etnis, usia, gaya hidup dan makanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspresi dan perkembangan penyakit. Menurut *World Health Organization* (WHO) 2007, diperkirakan 30% kematian akibat kanker disebabkan oleh lima faktor risiko perilaku dan pola makanan, indeks massa tubuh yang tinggi, kurangnya aktivitas fisik, merokok, asupan alkohol, dan asupan buah dan sayuran yang rendah (Hardjono et al., 2016).

Kopi merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia dan mengandung berbagai manfaat bagi kesehatan konsumen (Mojica et al., 2018). Kopi merupakan minuman terpopuler kedua di dunia dengan konsumsi kurang lebih dua miliar cangkir per hari. Selain dari penampilannya yang sederhana, secangkir kopi merupakan campuran kompleks yang mengandung ratusan molekul, komposisi dan konsentrasi yang sangat bervariasi. Meski konsumsi kopi yang berlebihan bisa berbahaya, banyak molekul dalam rebusan hitam ini memiliki sifat antikanker (Gaascht et al., 2015).

Hasil penelitian Gaascht et al (2015) senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dari bahan pangan berkhasiat sebagai antikanker pada biji kopi robusta (*Coffea robusta*). Biji kopi robusta (*Coffea robusta*) mengandung senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan. Senyawa di dalam kopi robusta (*Coffea robusta*) yang bertindak sebagai antioksidan kuat adalah *Chlorogenic acid* (CGA) yang merupakan senyawa golongan polifenol (Yusuf & Alyidrus, 2020).


Berdasarkan penelitian Cavin et al (2002) menunjukkan bahwa kopi juga memiliki aktivitas sebagai antikanker. Pada penelitian tersebut disebutkan bahwa kafestol dan Kahweol yang merupakan zat yang terkandung di dalam kopi ini secara spesifik memiliki aktivitas antikarsinogenik (Yusuf & Alyidrus, 2020).

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa potensi kopi sebagai antikanker. Dr. Thomas Hofmann, *Institute for Food Chemistry* di Universitas Manchester Jerman menyebutkan bahwa kopi espresso mengandung 2-3 kali lebih banyak komponen antikanker (Yusuf & Alyidrus, 2020).

Komponen bioaktif kopi sangat banyak, di antaranya yaitu kafein, asam klorogenat (CGA), trigonelin, alkali triptofan, diterpen dan metabolit sekunder

lainnya (Hu et al., 2019). Biji kopi merupakan sumber yang kaya akan fitokimia bioaktif seperti asam klorogenat (CGA) (Pedan et al., 2020). CGA adalah polifenol makanan penting dan aktif secara biologis, memainkan beberapa peran penting dan terapeutik seperti aktivitas antioksidan, antibakteri, hepatoprotektif, kardioprotektif, antiinflamasi, antipiretik, pelindung saraf, antiobesitas, antivirus, antimikroba, antihipertensi, pemulung radikal bebas dan saraf pusat system (CNS) stimulator, dan ekstrak CGA dari biji kopi memiliki potensi aktivitas sebagai antikanker dan antioksidan (Husniati et al., 2021)

Dengan adanya beberapa macam kandungan senyawa dalam biji kopi yang memiliki efek fitokimia terutama sebagai anti kanker, oleh karena itu dilakukan penelitian studi literatur mengenai aktivitas biji kopi (*Coffea* sp.) sebagai anti kanker.



1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana aktivitas antikanker dari biji kopi (*Coffea* sp.) ?
- 1.2.2 Apa saja kandungan senyawa yang berpotensi sebagai antikanker dalam biji kopi (*Coffea* sp.) ?
- 1.2.3 Apa saja jenis kanker yang dapat dihambat oleh biji kopi (*Coffea* sp.)?
- 1.2.4 Bagaimana pemanfaatan biji kopi (*Coffea* sp.) dalam perspektif islam?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas antikanker dari biji kopi (*Coffea* sp.)
- 1.3.2 Untuk mengetahui kandungan senyawa yang berpotensi sebagai antikanker.
- 1.3.3 Untuk mengetahui jenis kanker apa saja yang dapat dihambat oleh biji kopi (*Coffea* sp.).
- 1.2.5 Untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan biji kopi (*Coffea* sp.) dalam perspektif islam.

BAB II

METODE

2.1. Strategi Pencarian Jurnal

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Metode studi literatur merupakan metode yang memberikan gambaran beberapa kemungkinan jawaban untuk memecahkan masalah aktual (*up to date*) dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis, dan menginterpretasikannya (Ansori et al., 2019).


2.1.1. Framework penelitian

Pencarian dan analisis pustaka pada penelitian ini dilakukan berdasarkan metode PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*) sebagai berikut:

Tabel 1. *Framework* penelitian

P	I	C	O
<i>Population</i>	<i>Intervention</i>	<i>Comparison</i>	<i>Outcome</i>
Kandungan senyawa dalam biji kopi (<i>Coffea</i> sp.)	Metode pengujian, jenis kanker, dan kandungan senyawa.	Kontrol dalam setiap penelitian.	Aktivitas antikanker biji kopi, kandungan senyawa dari biji kopi, dan jenis kanker yang dihambat oleh biji kopi.

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan berdasarkan kerangka berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

2.1.2. Kata Kunci yang Digunakan

Kata kunci yang digunakan pada pencarian literatur yaitu *coffee beans as anti cancer*, *pharmacological activity of coffee beans as anticancer*, dan *compounds of coffee beans as anticancer*.

2.1.3. Database atau Search Engine

Database atau *search engine* yang digunakan dalam penulisan ini adalah *PubMed*, *Google Scholar*, dan *Science Direct*.

2.2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Jurnal

Kriteria yang digunakan dalam pencarian dan pengumpulan artikel disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Kriteria inklusi dan eksklusi.

Kriteria inklusi	Kriteria eksklusi
1. Rentang waktu publikasi jurnal maksimal 10 tahun terakhir (2011-2021)	1. Isi dari kajian jurnal tidak membahas tentang subjek penelitian.
2. Berbahasa Inggris	2. Metode penelitian tidak jelas
3. Subjek penelitian yaitu kopi (<i>Coffea</i> sp.)	
4. Ketersediaan naskah <i>free full text/ open access</i>	
5. Tipe jurnal termasuk <i>Original research artikel</i>	
6. Kriteria jurnal memiliki <i>International Standard Serial Number (ISSN/ DOI)</i>	
7. Tema pada artikel adalah aktivitas antikanker dari biji kopi (<i>Coffea</i> Sp.)	
8. Jurnal duplikasi (dipilih salah satunya)	

2.3. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas

2.3.1. Hasil pencarian dan seleksi studi

Hasil penelusuran literatur disajikan pada tabel dibawah ini yang memuat database, kata kunci, dan jumlah artikel.

Database	Kata Kunci	Jumlah Artikel		
		Inklusi	Ekslusi	Akhir
Google Scholar	Coffee beans as anticancer	30	28	2
	Pharmacological activity of coffee beans as anticancer	40	40	0
	Compounds of coffee beans as anticancer	11	10	1
Pubmed	Coffee beans as anticancer	4	3	1
	Pharmacological activity of coffee beans as anticancer	2	2	0
	Compounds of coffee beans as anticancer	2	2	0
Science Direct	Coffee beans as anticancer	30	29	1
	Pharmacological activity of coffee beans as anticancer	58	57	1
	Compounds of coffee beans as anticancer	20	20	0
Total pustaka yang akan dianalisis dan dibahas				6

Gambar 2. Hasil pencarian dan seleksi studi

2.3.2. Daftar artikel hasil pencarian

Artikel hasil pencarian yang telah diseleksi disajikan pada tabel dibawah ini yang memuat judul, penulisan dan tahun, ISSN/ DOI, dan kriteria jurnal.

Tabel 3. Daftar Artikel Hasil Seleksi

No	Judul	Penulis dan tahun	ISSN/ DOI	Data-base	Kriteria jurnal
1.	The Cytotoxicity of Kahweol in HT-29 Human Colorectal Cancer Cells is Mediated By Apoptosis and Suppression of Heat Shock Protein 70 Expression	(Choi et al., 2015)	http://dx.doi.org/10.4062/biomolther.2014.133	Google scholar	Q1
2	Chlorogenic Acid Complex (CGA7), Standardized Extract from Green Coffee Beans Exerts Anticancer Effects Against Cultured Human Colon Cancer HCT-116 Cells	(Gouthamchandra et al., 2017)	http://dx.doi.org/10.1016/j.fshw.2017.06.001	Science Direct	Q1
3.	The Impact of The Roast Levels of Coffee Extracts on Their Potential Anticancer Activities	(Mojica et al., 2018)	10.1111/1750-3841.14102	Google scholar	Q1
4.	Kahweol Inhibits Proliferation and Induces Apoptosis by Suppressing Fatty Acid Synthase in HER2-	(Oh et al., 2018)	10.1016/j.fct.2018.09.008	Science direct	Q1

	Overexpressing Cancer Cells				
5.	Anti Proliferative and Anti Migratory Properties of Cofee Diterpenes Kahweol Acetate and Cafestol in Human Renal Cancer Cells	(Makino et al., 2021)	https://doi.org/10.1038/s41598-020-80302-4	Pub-med	Q1
6.	Assessment of Anti Cancerous Effect of Green, Roasted and Decaffeinated Coffee on Oral Squamous Cell Carcinoma Cell Line (In Vitro Study)	(Rashad et al., 2021)	10.18311/jnr/2021/26862	Google scholar	Q2

BAB III
HASIL DAN ANALISIS

3.1 Hasil

Hasil penelusuran jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi yang diterapkan dari database *Google scholar*, *Pubmed*, dan *Science Direct* diperoleh sebanyak 207 jurnal. Sebanyak 197 jurnal dieklusi dan tersisa 6 jurnal. Diperoleh sebanyak 6 jurnal yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis.

3.2 Analisis

Hasil analisis artikel disajikan dalam tabel berikut:

Table 4. Hasil analisis artikel

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Population	Intervention	Comparison	Outcome
1.	The Cytotoxicity of Kahweol in HT-29 Human Colorectal Cancer Cells is Mediated By Apoptosis and Suppression of Heat Shock Protein 70 Expression (Choi et al., 2015).	Kahweol	Metode pengujian antikanker Viabilitas sel dengan uji MTT, uji LDH (<i>Lactate Dehydrogenase</i>) Jenis kanker: Kanker kolorektal (usus besar) Kandungan senyawa: Kahweol.	Kontrol penelitian: Nilai IC50 dari asam kafeat, kafein, asam klorogenat, dan kahweol	Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas antikanker dalam kandungan senyawa asam kafeat, kafein, asam klorogenat tidak memiliki sifat sitotoksik pada konsentrasi hingga 200 μ M, sedangkan untuk kandungan senyawa kahweol memiliki aktivitas kuat dengan nilai

					IC50= 100 μ M sebagai antikanker kolorektal (usus besar)
2.	Chlorogenic Acid Complex (CGA7), Standardized Extract from Green Coffee Beans Exerts Anticancer Effects Against Cultured Human Colon Cancer HCT-116 Cells (Gouthamchandra et al., 2017).	Chlorogenic acid complex (CGA7)	<p>Metode pengujian anti kanker: Sitotoksitas dengan uji MTT, uji LDH, dan uji apoptosis</p> <p>Jenis kanker: Kanker kolorektal (usus besar).</p> <p>Kandungan senyawa: Asam klorogenat kompleks (CGA7)</p>	<p>Kontrol penelitian: Sel HeLa, sel HepG2, sel HCT-115, sel HCT-116, sel MCF7, sel EAC, sel B16FI, dan sel STO.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa sel HCT-116 memiliki aktivitas penghambatan pertumbuhan kanker yang sangat kuat dari CGA7 dibandingkan dengan garis sel kanker manusia lainnya, dengan nilai IC50= 1 mg/ml dari kandungan senyawa asam klorogenat kompleks (CGA7) yang diperoleh dari ekstrak biji kopi (<i>Coffea Sp.</i>) hijau sebagai antikanker kolorektal (usus besar).</p>

3.	The Impact of The Roast Levels of Coffee Extracts on Their Potential Anticancer Activities (Mojica et al., 2018).	Biji kopi hijau (<i>Coffea</i> Sp.)	<p>Metode pengujian anti kanker: Viabilitas sel dengan uji MTT, uji folin-ciocalteu</p> <p>Jenis kanker: Mulut dan kolorektal</p> <p>Kandungan senyawa: Asam klorogenat (CGA), asam kafeat, dan asam galat</p>	<p>Kontrol Penelitian: <i>Green, Cinnamon roast, city roast, full city roast, full ciity plus roast.</i></p>	Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas antikanker biji kopi sangat lemah dengan nilai IC50= 500-1000 ppm) dengan kandungan senyawa asam klorogenat, asam kafeat, dan asam galat sebagai antikanker mulut dan kolorektal.
4.	Kahweol Inhibits Proliferation and Induces Apoptosis by Suppressing Fatty Acid Synthase in HER2-Overexpressing Cancer Cells (Oh et al., 2018).	Kahweol	<p>Metode pengujian anti kanker: Uji MTT, dan apoptosis</p> <p>Jenis kanker: Kanker payudara.</p> <p>Kandungan senyawa: Kahweol.</p>	<p>Kontrol penelitian: Kahweol</p>	Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas antikanker sangat kuat dengan nilai IC50=25 µM dari kandungan senyawa kahweol sebagai agen terapi tambahan dalam pengobatan antikanker payudara.

5.	Anti Proliferative and Anti Migratory Properties of Coffee Diterpenes Kahweol Acetate and Cafestol in Human Renal Cancer Cells (Makino et al., 2021).	Kahweol dan kafestol	<p>Metode pengujian anti kanker: Proliferasi sel, migrasi sel, dan apoptosis dengan uji TUNEL</p> <p>Jenis kanker: Kanker ginjal</p> <p>Kandungan senyawa: Kahweol dan Kafestol</p>	<p>Kontrol penelitian: Kahweol dan kafestol.</p>	Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas antikanker biji kopi sangat kuat dengan nilai $IC_{50} = 30 \mu M$, dari masing-masing kombinasi kandungan senyawa kahweol asetat dan kafestol yang dapat menghambat proliferasi sel ACHN dan Caki-1 pada sel kanker ginjal manusia.
6.	Assessment of Anti Cancerous Effect of Green, Roasted and Decaffeinated Coffee on Oral Squamous Cell Carcinoma Cell Line (In Vitro Study) (Rashad et al., 2021)	Biji kopi hijau, biji kopi panggang sedang, dan biji kopi tanpa kafein.	<p>Metode pengujian anti kanker: Uji viabilitas sel dan uji apoptosis</p> <p>Jenis Kanker: Karsinoma sel skuomosa mulut</p> <p>Kandungan senyawa: Fenolik</p>	<p>Kontrol penelitian: Kopi hijau, kopi panggang sedang, dan kopi tanpa kafein.</p>	Penelitian ini menunjukkan bioaktivitas antikanker yang berbeda-beda. Aktivitas paling kuat dengan nilai $IC_{50} = 17,1 \pm 0,69$ yaitu kopi hijau, aktivitas antikanker terkuat kedua yaitu kopi panggang sedang dengan nilai

					IC50= 57,95± 2,28, dan kopi tanpa kafein dengan aktivitas sedang memiliki nilai IC50= 103,32 ± 4,52 dari kandungan senyawa fenolik sebagai antikanker payudara.
--	--	--	--	--	---

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Uraian Tanaman

4.1.1 Klasifikasi tanaman

Klasifikasi tanaman kopi (*Coffea* Sp.) yaitu sebagai berikut (Rahardjo, 2017):



Gambar 3. Kopi (*Coffea* Sp.) (Edowai & Tahoba, 2018)

Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Subdivisi : Spermatophyta
Divisi : Magnoliophyta
Class : Magnoliopsida
Ordo : Rubiales
Family : Rubiaceae
Genus : Coffea
Spesies : *Coffea* Sp. (*Coffea arabica*, *Coffea canephora*,
Coffea liberica, *Coffea excels*).

Tanaman kopi merupakan tanaman yang berasal dari sebuah daerah pegunungan bernama Ethiopia di negara Afrika (Polamuri et al., 2020). Kopi dikenal luas di seluruh dunia karena memiliki banyak efek menguntungkan seperti efek stimulant, manfaat kesehatan, dan keperluan ekonomis dengan harga jual dan minat yang tinggi (Polamuri et al., 2020).

Tanaman kopi merupakan gabungan dari ribuan senyawa kimia kompleks yang bertanggung jawab atas rasa dan aroma, vitamin, mineral, lemak, karbohidrat, nitrogen, alkaloid, serta fenolik. Kopi kaya akan kandungan zat bioaktif seperti kafein, trigonelin, asam klorogenat, diterpen, dan lain- lain (Bolka & Emire, 2020).

4.1.2 Morfologi Tanaman

Tanaman kopi memiliki waktu 3- 4 tahun dari perkecambahan hingga menjadi tanaman berbunga yang menghasilkan buah kopi. Buah memiliki waktu 7-12 bulan untuk matang. Buah yang berbiji ini dikenal dengan sebutan ceri kopi yang awalnya berwarna hijau, lalu berubah menjadi warna merah tua lalu sobek (Polamuri et al., 2020). Kopi berbunga berwarna putih dan beraroma wangi yang muncul pada ketiak daun. Adapun buah kopi terdiri dari kulit buah (*epicarp*), daging buah (*mesocarp*), dan kulit tanduk (*endocarp*) (Rahardjo, 2017).

Ada empat jenis kopi yang dikenal yaitu kopi arabika (*Coffea arabica*), kopi robusta (*Coffea canephora*), kopi liberika (*Coffea liberica*), dan kopi ekselsa (*Coffea excelsa*) (Rahardjo, 2017).

Kopi termasuk dalam family *rubiaceae* dengan banyak genus seperti *Gardenia*, *Ixora*, *Rubia*, dan *Chincona*. Genus *coffea* hampir mencakup 70% spesies, tetapi hanya dua spesies terbesar yang ditanam di seluruh dunia, yaitu kopi arabika (*Coffea arabica*) dan kopi robusta (*Coffea canephora*). Dan sekitar 2% dari total produksi dunia berasal dari dua spesies kopi lainnya, yaitu kopi liberika (*Coffea liberica*) dan kopi ekselsa (*Coffea excelsa*) yang ditanam dalam jumlah terbatas di beberapa negara (Rahardjo, 2017).

Kopi arabika (*Coffea arabica*) memiliki cita rasa yang kaya dibanding kopi robusta (*Coffea robusta*) dan memiliki banyak varietas dengan ciri yang unik serta kadar kafein yang lebih rendah (Redaksi Health Secret, 2012).

Tabel 5. Komposisi kimia biji Kopi arabika (*Coffea arabica*) dan kopi robusta (*Coffea robusta*) (Redaksi Health Secret, 2012):

Komposisi Kimia	Kopi Arabika (<i>Coffea arabica</i>)	Kopi Robusta (<i>Coffea robusta</i>)
Protein	11- 13	11-13
Asam amino	2	2
Karbohidrat	50-55	37-47
Gula	6-8	6-7
Lipid	12-18	9-13
Kafein	0,9-1,2	1,6-2,4
Mineral	3-4,2	4-4,5
Trigonelin	1-1,2	0,6-0,75
Asam klorogenat	5,5-8,0	7-10
Asam alifatik	1,5-2	1,5-2

Tanaman kopi mengandung lebih dari seribu molekul senyawa yang berbeda-beda, seperti senyawa fenolik, vitamin, mineral, alkaloid, kafein, asam klorogenat, kafestol, kahweol, dan lain-lain (Zindany et al., 2017).



Gambar 4. Biji kopi (*Coffea Sp.*) (Edowai & Tahoba, 2018)

4.2 Kanker

4.2.1 Pengertian Kanker

Penyakit kanker adalah penyakit tidak menular yang kini menjadi salah satu penyakit berbahaya dan penyebab kematian utama di dunia. Kanker merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya pertumbuhan abnormal dari suatu sel dalam tubuh yang tidak terkendali hingga dapat menyerang sel sekitar seperti jaringan ikat, darah, dan organ-organ penting lainnya (Pangribowo, 2019).

Saat tubuh dalam keadaan normal, sel dalam tubuh akan membelah diri ketika terdapat penggantian sel yang mati atau rusak. Namun dalam kasus kanker, sel terus membelah diri walau tubuh tidak memerlukannya. Sehingga yang terjadi, adanya penumpukan sel baru yang disebut tumor ganas. Pertumbuhan tumor ganas akan mengganggu dan merusak jaringan normal yang terdapat pada organ yang ditempatinya (Chen, 2010).

Tumor adalah pertumbuhan tidak normal dalam tubuh atau jaringan yang biasa disebut sebagai benjolan. Tumor jinak biasanya tidak berbahaya karena tidak tumbuh membesar dan abnormal seperti tumor ganas (Hardjono et al., 2016).

Secara garis besar, jenis kanker terbagi atas (Mangan & Wulandari, 2009):

1. Karsinoma, yaitu kanker yang tumbuh dan berkembang di sel epitel.
2. Sarkoma, yakni kanker yang tumbuh dan berkembang di jaringan penunjang, seperti jaringan penunjang payudara.
3. Leukemia, yakni kanker yang menyerang jaringan yang menghasilkan darah,

4. Limfoma, yakni kanker yang menyerang jaringan limfa.

4.2.2 Sifat-sifat Kanker

1. Progresif

Kanker tumbuh progresif artinya yaitu kanker memiliki kecepatan tumbuh yang lebih cepat dibandingkan sel tubuh normal maupun tumor jinak. Tumor jinak juga memiliki karakter pertumbuhan yang berbeda dibandingkan sel normal, tetapi kecepatan tumbuhnya tidak secepat kanker (Ardhiansyah, 2019).

Pengukuran besar tumor menggunakan istilah *doubling time* yaitu waktu yang diperlukan suatu tumor membesar hingga volumenya menjadi dua kali lebih besar. Kecepatan tumbuh setiap kanker tidak memiliki kesamaan dengan semua jenis kanker, misalnya kanker payudara dikatakan progresif bila dalam 100 hari ukurannya membesar dua kali lipat. Sementara kanker kulit dengan jenis *basal cell carcinoma* memiliki kecepatan tumbuh yang lambat (Ardhiansyah, 2019).

2. Infiltratif

Infiltratif artinya kanker memiliki sifat menyebar ke jaringan atau organ disekitarnya dan mengakibatkan kerusakan. Hal ini dapat terlihat dari perubahan atau gejala yang terkait jaringan atau organ ditempat yang dicurigai terkena kanker (Ardhiansyah, 2019). Bila telah terdapat gejala infiltratif, berarti kanker sudah dapat dikatakan telah memasuki stadium lokal lanjut. Contoh dari sifat infiltratif adalah:

- a. Luka borok (ulkus) pada payudara
- b. Kencing berwarna merah (darah) pada kanker rektum (usus

besar)

c. Suara paru pada kanker kelenjar gondok (tiroid)

3. Metastasis

Metastasis adalah penyebaran kanker ke organ yang lebih jauh dari lokasi awal. Contohnya pada penderita kanker payudara yang merasakan nyeri pada tulang belakang. Organ yang sering menjadi tempat metastasis adalah hati, paru-paru, otak, dan tulang (Ardhiansyah, 2019).

a. Hati

Metastasis pada hati sering tidak menimbulkan gejala. Bila tumor metastasis menimbulkan sumbatan pada saluran dalam hati, dapat menyebabkan selaput mata (*sclera*) dan tubuh menjadi warna kuning (*icterus*). Bila tumor menyebabkan gangguan pada produksi albumin, akan menyebabkan perut kembung karena penumpukan cairan di dalam rongga perut (*asites*). Albumin adalah sejenis protein yang terdapat banyak di hati yang berfungsi untuk menahan cairan untuk tetap berada dalam pembuluh darah sehingga tidak keluar ke tempat lain seperti rongga perut (Ardhiansyah, 2019).

b. Paru-paru

Metastasis pada paru-paru dapat terjadi pada jaringan paru sendiri maupun pada selaput paru (*pleura*). Gejalanya dapat berupa sesak maupun batuk (Ardhiansyah, 2019).

c. Otak

Gejala metastasis otak dapat berupa nyeri kepala yang menetap dan bertambah hebat, muntah-muntah, kelumpuhan

separuh anggota tubuh, kejang, dan penurunan kesadaran (Ardhiansyah, 2019).

d. Tulang

Penyebaran kanker ke tulang dapat terjadi pada tulang manapun di dalam tubuh, tetapi paling banyak terjadi di tulang panjang pada tungkai dan tulang belakang. Gejala metastasis pada tulang panjang berupa nyeri yang progresif terus-menerus. Selain itu dapat terjadi patah tulang tanpa didahului riwayat trauma yang adekuat (fraktur fisiologis). Sedangkan gejala metastasis pada tulang belakang lebih kompleks, yaitu sebagai berikut (Ardhiansyah, 2019):

- 1) Nyeri pada tulang belakang
- 2) Gangguan rasa (sensorik) pada tubuh bagian bawah
- 3) Kelumpuhan pada kedua kaki yang diawali dengan gejala kaki terasa berat, sulit naik tangga, atau berdiri dari kursi
- 4) Gangguan buang air besar atau buang air kecil.

Gangguan ini dapat berupa tidak bisa berak atau kencing maupun tidak bisa menahan berak atau kencing (mengompol).

4.2.3 Bentuk Kanker

Bentuk kanker dapat bermacam-macam tergantung dari jenis kanker. Bentuk kanker antara lain (Ardhiansyah, 2019):

a. Benjolan

Benjolan dicurigai ganas bila bentuknya tidak teratur, rapuh, mudah berdarah, dan terkadang terlihat banyak pembuluh darah di

sekitar benjolan (Ardhiansyah, 2019).

b. Luka borok (*ulkus*)

Luka borok merupakan tanda keganasan, biasanya bentuknya tidak teratur, rapuh, mudah berdarah, dan sering merupakan bagian dari tumor yang lebih besar yang telah menginfiltrasi kulit. Luka juga dapat terjadi di dinding dalam (mukosa) rongga mulut dan lidah (Ardhiansyah, 2019).

c. Tanpa bentuk tertentu

Kanker dengan bentuk yang tidak jelas seperti kanker darah putih (*leukemia*) (Ardhiansyah, 2019).

4.2.4 Tahapan Pembentukan Kanker

Menurut *Yale Journal of Biology and Medicine* (2006), terdapat tiga tahapan terbentuknya sel normal menjadi sel kanker, yaitu sebagai berikut (Chen, 2010) :

1. Tahap prakarsa (*initiation phase*), yaitu tahap munculnya ciri-ciri perubahan sel normal menjadi sel kanker.
2. Tahap promosi (*promotion phase*), yaitu tahap perkembangan tumor yang tumbuh abnormal berhasil hidup dan membelah diri.
3. Tahap progresi (*progression phase*), yaitu tahapan terjadinya pertumbuhan sel-sel abnormal sehingga makin membesar atau merusak jaringan organ yang ditempati.

4.2.5 Gejala Kanker

Kanker biasanya belum menimbulkan keluhan atau rasa sakit saat stadium dini. Penderita menyadari dirinya terkena serangan kanker setelah timbul rasa nyeri atau rasa sakit, padahal hal tersebut telah menunjukkan bahwa kanker telah memasuki stadium lanjut. Pengenalan gejala kanker sebaiknya dilakukan sedini mungkin meskipun tidak terdapat keluhan atau

rasa sakit (Hardjono et al., 2016).

Gejala kanker yang dapat diamati sedini mungkin yaitu sebagai berikut (Hardjono et al., 2016):

- a. Waktu buang air besar atau kecil ada perubahan kebiasaan ataupun gangguan,
- b. Terganggunya alat pencernaan dan susah menelan,
- c. Suara serak dan batuk susah sembuh
- d. Terdapat benjolan di payudara atau tempat lain
- e. Tahi lalat berubah menjadi lebih besar dan gatal
- f. Darah atau lendir tidak normal keluar dari lubang- lubang tubuh
- g. Terdapat koreng atau borok yang tidak kunjung sembuh

4.2.6 Faktor Resiko Kanker

Setiap orang memiliki sel kanker dalam tubuhnya dan pola hidup yang tidak sehat akan memicu munculnya penyakit kanker tersebut. Berdasarkan data dari Ferlay et al. (2013), beberapa jenis kanker yang sering diderita oleh pria adalah kanker paru-paru, prostat, kolorektal, perut, hati, kandung kemih, esofagus, limfoma non-hodgkin, ginjal, dan leukimia. Sedangkan kanker yang sering diderita oleh perempuan adalah kanker payudara, kolorektal, leher rahim, paru, korpus uteri, perut, tiroid, ovarium, hati, dan *limfoma non-hodgkin* (Hardjono et al., 2016).

Beberapa faktor yang diduga menyebabkan kanker (Sudewo, 2012):

1. Faktor keturunan

Faktor keturunan merupakan penyebab beberapa keluarga memiliki risiko lebih tinggi terkena daripada keluarga lain. Contohnya, risiko wanita menderita kanker akan meningkat 1,5 sampai 3 kali jika ibunya atau saudara perempuannya menderita

kanker payudara. Jenis kanker yang cenderung dapat diturunkan dalam keluarga antara lain kanker payudara, kanker indung telur, kanker kulit, dan kanker usus besar (Sudewo, 2012).

2. Faktor Lingkungan dan Perilaku

Faktor lingkungan yang mampu meningkatkan risiko terjadinya kanker yaitu kendaraan bermotor yang mengandung radikal bebas, asap rokok, dan sinar ultraviolet dari matahari. Mampu meningkatkan risiko terjadinya kanker paru-paru, mulut, laring (pita suara), dan kandung kemih. Sinar matahari yang terik pada siang hari pukul 10 siang sampai 4 sore akan meningkatkan risiko kanker kulit. Sementara itu, faktor perilaku yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker adalah kebiasaan merokok, perilaku seksual di awal usia, dan sering berganti ganti pasangan (Sudewo, 2012).

3. Faktor Makanan

Pola makan maupun minum merupakan faktor penyebab kanker, terutama kanker pada saluran pencernaan. Berbagai makanan yang dapat menyebabkan kanker antara lain makanan yang diasapkan, mengandung zat pewarna, makanan cepat saji, makanan kalengan yang telah mengandung berbagai macam radikal bebas yang akan meningkatkan risiko kanker, juga meningkatkan risiko kanker kerongkongan (Sudewo, 2012).

4. Faktor Kejiwaan dan Emosional

Keadaan kejiwaan maupun emosi seseorang akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Keadaan tegang yang terus-menerus akan menyebabkan sel akan hiperaktif dan berubah menjadi ganas sehingga dapat menyebabkan kanker. Kanker merupakan

penyakit yang dipengaruhi oleh pikiran, tubuh, dan jiwa. Jiwa yang positif akan membantu mengurangi risiko kanker dan dapat membantu penderita kanker untuk sembuh. Perasaan, perasaan, dan pikiran negatif akan membuat tubuh kita menjadi tegang dan membuat penyakit akan semakin mudah muncul dalam tubuh. Cara mengatasinya adalah dengan belajar menjadi pemaaf dan berjiwa lembut yang akan membuat kita lebih menikmati hidup (Sudewo, 2012).

Faktor karsinogen disebabkan oleh paparan senyawa karsinogen, yaitu (Hardjono et al., 2016):

1. Karsinogen fisik, seperti radiasi senyawa radioaktif, sinar *ultra violet* (UV), sinar X, dan radiasi ion.
2. Karsinogen kimiawi seperti formalin, 2-naftilamin, kontaminasi makanan, asbes, dan lain-lain.
3. Karsinogen biologis yaitu akibat infeksi virus, bakteri serta parasit.

4.2.7 Pencegahan kanker

Kanker dapat dikatakan sebagai penyakit gaya hidup karena dapat dicegah dengan melakukan gaya hidup sehat dan menjauhi faktor risiko terserang kanker. Beberapa cara pencegahan kanker yaitu (Mangan & Wulandari, 2009):

1. Hindari makanan tinggi lemak, makanan instan yang mengandung bahan pewarna dan bahan pengawet, serta makanlah makanan dengan gizi seimbang.
2. Hindari hubungan seksual dengan pasangan yang bukan suami atau istri sendiri, atau berganti- ganti pasangan.

3. Hindari asap rokok atau berhenti merokok
4. Hindari stress dan konflik berkepanjangan
5. Hindari terkena sinar matahari yang berlebihan
6. Periksa kesehatan secara berkala
7. Minumlah air murni yang telah melalui proses penyaringan
8. Hindari terapi hormon sintetis
9. Hindari penggunaan hormon sintetis saat KB dalam jangka waktu lama
10. Rutin mengonsumsi vitamin A, C, E, B kompleks, dan suplemen yang bersifat antioksidan, peningkat daya tahan tubuh, dan detoksifikasi seperti minum klorofil.

4.2.8 Siklus sel kanker

Siklus sel kanker terdiri atas dua tahap, yaitu fase interfase dan mitosis. Tahap interfase terdiri atas fase G1 (prasintesis), fase S (sintesis DNA) dan fase G2 (pasca duplikasi DNA). Tahap mitosis terdiri atas empat fase, yaitu profase, metafase, anafase dan telofase. 4 Siklus sel dibagi menjadi 4 fase yang berlangsung selama 20-24 jam, yaitu fase G1 (Gap 1), Fase S (Sintesis), Fase G2 (Gap 2) dan fase mitosis (Medawati, 2013).

1. Fase G1

Pada fase G1 terjadi sintesis RNA yang kemudian diikuti oleh sintesis protein sehingga sitoplasma akan bertambah banyak dan sel akan tumbuh selama 9 jam (Medawati, 2013).

2. Fase S

Fase kedua adalah fase S, merupakan proses sintesis DNA dan terjadi pembentukan molekul histon yang pada umumnya berlangsung selama 10 jam (Medawati, 2013).

3. Fase G2

Fase G2 merupakan fase akhir dalam pertumbuhan sel, dalam fase ini masih terjadi sintesis RNA dan kemudian akan disusul oleh fase mitosis (Medawati, 2013).

4. Fase M (mitosis)

Fase terakhir dalam proses proliferasi adalah fase M (mitosis) yang merupakan fase tersingkat karena hanya berlangsung selama 30-60 menit (Medawati, 2013).

Diterpen kopi dapat mencegah kanker dengan memodulasi berbagai enzim yang terlibat dalam karsinogenesis dan detoksifikasi. Telah diketahui bahwa metabolit elektrofilik atau metabolit oksidatif yang dihasilkan oleh karsinogen teraktivasi akan mengakibatkan modifikasi DNA secara permanen dan akhirnya mengarah pada pembentukan tumor (Ren et al., 2019)..

Aktivasi enzim pengaktif fase I merupakan prasyarat untuk aktivasi beberapa karsinogen. Sitokrom P450s hati (CYP450s) memainkan peran penting dalam aktivasi berbagai karsinogen. Misalnya, amina heterosiklik, terutama PhIP, dapat diaktifkan oleh CYP1A2 dan SULT. Demikian pula, aktivasi nitrosamin dan karsinogen alkilasi lainnya biasanya relevan dengan CYP2E1 atau CYP2B1/CYP2B2 (Ren et al., 2019)..

Penelitian *in vivo* maupun *in vitro* telah menunjukkan bahwa kombinasi kafestol dan kahweol dapat menurunkan regulasi ekspresi CYP450 tersebut di atas atau secara langsung menghambat aktivitasnya. Selain itu, anggota enzim detoksifikasi Fase II bertindak dengan menghambat pembentukan zat antara elektrofilik atau oksidan

dan merangsang detoksifikasinya, sehingga mengurangi kerusakan DNA dan mencegah inisiasi tumor. Pengaturan kedua jenis enzim ini merupakan cara potensial untuk pengobatan anti-tumor. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi kafestol dan kahweol mempromosikan aktivasi *glutathione S-transferase* dan meningkatkan beberapa enzim metabolisme *xenobiotik* fase II lainnya seperti *uridine 5'-diphospho-glucuronosyl transferase* dan aktivitas kina *oksidoreduktase*1. Studi ekstensif telah mengkonfirmasi bahwa kafestol dan kahweol dapat mengintervensi jalur pensinyalan Keap1/Nrf2/ARE, dan menginduksi ekspresi enzim detoksifikasi fase II, protein antioksidan dan Nrf2, sehingga memblokir beberapa tahap karsinogenik yang disebutkan di atas. Efek detoksifikasi kafestol dan kahweol di hati ini telah diulas secara rinci oleh Tao et al., menunjukkan bahwa hal itu berpotensi untuk mencegah terjadinya berbagai karsinogenesis, khususnya kanker hati (Ren et al., 2019).

4.2.9 Antikanker

Menurut Kementerian Kesehatan RI 2015, terdapat lebih 30% penyakit kanker dapat dicegah dengan merubah faktor resiko berupa gaya hidup dan pola makan penyebab kanker. Kanker yang diketahui sejak dini memiliki kemungkinan penanganan yang lebih baik (Hardjono et al., 2016).

Secara umum, tujuan pengobatan kanker antara lain:

- a. Menyembuhkan (kuratif), yaitu membebaskan penderita dari kanker untuk selamanya. Penyembuhan ini dapat berhasil jika kanker masih dalam stadium dini, kanker yang masih kecil atau penyebarannya belum meluas.

b. Meringankan (paliatif), yang merupakan tindakan aktif guna meringankan beban penderita kanker, terutama yang tidak memiliki kemungkinan untuk sembuh. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup, mengatasi terjadinya komplikasi, mengurangi atau menghilangkan keluhan penderita misalnya nyeri (Hardjono et al., 2016).

Terapi antikanker melalui beberapa pendekatan dan bergantung dengan sifat kanker dan progresivitasnya. Terapi atau pengobatan utama untuk kanker meliputi (Hardjono et al., 2016);

1. Pembedahan

Tindakan operasi atau pembedahan merupakan peristiwa kompleks yang menegangkan, sehingga selain mengalami gangguan fisik akan memunculkan pula masalah psikologis yang dapat berakibat pada perubahan fisiologis pasien sebelum menjalani operasi. Dengan mengetahui berbagai informasi selama operasi maka diharapkan pasien menjadi lebih siap menghadapi operasi (Kurniawan et al., 2018).

Pembedahan atau operasi ini dilakukan jika letak kanker masih lokal atau lokoregional (Kurniawan et al., 2018).

2. Radioterapi

Radioterapi atau terapi radiasi adalah terapi non-bedah terpenting untuk pengobatan kuratif kanker. Dari 10,9 juta orang yang didiagnosis menderita kanker di seluruh dunia setiap tahun, sekitar 50% memerlukan radioterapi dan 60% di antaranya diobati dengan kuratif. Biaya untuk radioterapi juga sangat hemat, terhitung hanya 5% dari total biaya perawatan kanker (Fitriatuzzakiyyah et al., 2017).

Radioterapi dapat digunakan sebagai terapi kuratif, paliatif maupun profilaksis (preventif). Terapi kuratif biasanya berbentuk terapi tunggal untuk penyembuhan suatu kanker, contohnya digunakan dalam kasus limfoma Hodgkin tahap awal, kanker nasofaring, beberapa kanker kulit, dan kanker glotis awal (Fitriatuzzakiyyah et al., 2017).

Terapi paliatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara menghilangkan gejala-gejala kanker dengan menerapkan dosis radiasi paliatif. Penerapannya antara lain pada kasus maternal otak dan tulang serta sindroma venacava superior (Fitriatuzzakiyyah et al., 2017).

Terapi profilaksis (preventif) merupakan terapi yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan metastasis atau kejadian berulang melalui penerapan radioterapi, contohnya adalah *whole-barin radiotherapy* untuk leukemia limfoblastik akut dan kanker paru-paru sel kecil (Fitriatuzzakiyyah et al., 2017).

3. Kemoterapi

Kemoterapi adalah terapi anti kanker untuk membunuh sel-sel tumor dengan mengganggu fungsi dan reproduksi sel yang bertujuan untuk penyembuhan, pengontrolan, dan paliatif. Kemoterapi bisa menimbulkan dampak fisiologis maupun psikologis (Pratiwi et al., 2017). Dampak fisiologis yang bisa terjadi yaitu rasa lelah, lesu, kerontokan rambut, gangguan usus dan rongga mulut seperti mual muntah, mukositis rongga mulut, gangguan sumsum tulang belakang, kemandulan, gangguan menstruasi & menopause serta gangguan pada organ lain (Adamsen, L., et.al 2009).

Selain menimbulkan dampak fisiologis, kemoterapi juga bisa menimbulkan dampak negatif pada psikologis diantaranya gangguan harga diri, seksualitas, dan kesejahteraan pasien seperti kecemasan (Pratiwi et al., 2017).

4. Imunoterapi

Imunoterapi untuk kanker ditujukan untuk memodulasi dan menggunakan sistem imun pasien dengan target sel kanker dibandingkan menggunakan modalitas terapi ekstrinsik. Imunoterapi untuk kanker ditujukan untuk mengaktivasi atau meningkatkan pengenalan oleh sistem imun dan penghancuran sel-sel kanker (Lawrenti, 2018).

Terdapat beberapa pendekatan imunoterapi seperti vaksin kanker, virus onkolitik, transfer sel adoptif, antibodi monoklonal (Lawrenti, 2018)

4.3 Pengujian antikanker

4.3.1 Uji sitotoksik

Sitotoksik adalah suatu senyawa atau calon obat yang bekerja dapat membunuh dan menghambat pertumbuhan sel yang sedang berkembang (Tatiana & Ria, 2020).

Nilai IC₅₀ adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% populasi sel, sehingga dapat diketahui tingkat potensi sitotoksitas (Adawiyah et al., 2017)

1. Uji sitotoksik dengan MTT (*microtetrazolium*)

Uji microtetrazolium (MTT) assay dapat digunakan untuk mengukur proliferasi sel secara kolorimetri. Metode ini berdasarkan perubahan garam tetrazolium (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)- 2,5-

difeniltetrazolium bromida). MTT menjadi formazan dalam mitokondria yang aktif dalam sel hidup dan dipecah melalui reduksi oleh enzim reduktase dalam rantai respirasi mitokondria menjadi formazan yang selalu dalam SDS 10% berwarna ungu (Tatiana & Ria, 2020).

Berdasarkan hasil analisis jurnal, efek sitotoksik kompleks CGA7 ekstrak biji kopi hijau tanpa kafein pada EAC, B16F1, HeLa, HepG2, HCT-15, HCT-116 dan STO ditentukan oleh MTT (3-(4,5 dimethylthiazol-2-yl)-2, Uji 5-difenil tetrazolium bromida. Sel dihitung menggunakan hemositometer dan 4000 sel/sumur disemai di 96 piring sumur dalam 100 L media lengkap (mengandung 10% FBS). Sel diperlakukan dengan konsentrasi yang bervariasi (0,25, 0,5 1,0 dan 2,0 mg/mL) CGA7 selama 24 dan 48 jam. Setelah inkubasi selesai, larutan MTT (5 mg/mL) ditambahkan ke setiap sumur dan diinkubasi selama 2 jam pencampuran. Absorbansi warna masing-masing sumur dibaca pada 570 nm di multiscan EX reader dengan referensi yang berfungsi sebagai blanko. Kemudian, nilai IC50 dari CGA7 dihitung (Gouthamchandra et al., 2017).

Untuk menganalisis pengaruh perlakuan awal kahweol pada sitotoksitas H_2O_2 , sel-sel diperlakukan dengan kahweol pada konsentrasi uji yang berbeda selama 8 jam. Setelah itu, media kultur diubah, 2001 MH_2O_2 ditambahkan dan sel diinkubasi selama 12 jam. Setelah dicuci, media baru ditambahkan dan uji MTT dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan hidup sel. Untuk mengukur produksi H_2O_2 oleh kultur sel, kit uji ROS-Glo H_2O_2 (Promega) digunakan. Sel diunggulkan pada 20.000 sel / sumur di pelat dinding putih buram,

media kultur lengkap diganti dengan media tanpa serum dan dengan konsentrasi kahweol yang diuji berbeda. Setelah 2 jam inkubasi, reagen substrat yang disediakan ditambahkan. Setelah 6 jam inkubasi, reagen deteksi yang disediakan ditambahkan. Akhirnya, setelah 20 menit inkubasi, pendaran diukur (Oh et al., 2018).

Viabilitas sel ditentukan dengan uji 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT). Pertama, sel HT-29 (5×10^5) diinkubasi pada 12 well plate dan diberi perlakuan berbagai konsentrasi kahweol selama 20 jam pada suhu 37°C. Selanjutnya, MTT (5 mg/mL) ditambahkan ke masing-masing well dan diinkubasi selama 1 jam. Akhirnya, kristal formazan yang dihasilkan dilarutkan dalam DMSO dan kerapatan optik masing-masing sumur diukur pada 540 nm menggunakan pembaca lempeng. Hasilnya dinyatakan sebagai persentase sel yang bertahan hidup di atas sel control (Choi et al., 2015).

Sel diunggulkan (5000 sel per sumur) di piring 96-sumur dan dibiarkan menempel semalaman. Sel diperlakukan dengan pengenceran 1 sampai 50x larutan stok kopi atau diperlakukan dengan ekstrak padat yang ditimbang dan dilarutkan dalam media kultur sel. Dalam percobaan terpisah, sel Caco-2 dibedakan menjadi model sel normal yang sesuai. Sel Caco-2 dibiarkan berdiferensiasi selama 2 minggu setelah pertemuan, dan kemudian diperlakukan dengan 500 dan 1000 ppm dari masing-masing ekstrak kopi. Akhirnya, ketiga garis sel diperlakukan dengan berbagai konsentrasi akrilamida (0 hingga 1000 ppm). Viabilitas sel ditentukan secara spektrofotometri setelah 72 jam inkubasi menggunakan uji thiazolyl blue tetrazolium

bromide (MTT) ($\lambda=540$ nm) (Mojica et al., 2018).

Untuk pengujian, media pengobatan telah dihapus dan sel-sel dicuci dengan media segar. Sel kemudian diinkubasi dengan media MTT (1 mg/mL) selama 30 menit. Setelah 30 menit, media MTT diganti dengan dimetil sulfoksida (DMSO) dan absorbansi diukur. Blanko disiapkan dengan mengeluarkan media segar dari sumur tanpa sel, menambahkan media MTT, dan akhirnya menggantinya dengan DMSO sebelum pengukuran absorbansi (Mojica et al., 2018).

Uji *folin-ciocalteu*, kandungan polifenol total (TPC) ditentukan secara spektrofotometri dalam pelat 96-sumur, menggunakan standar asam galat. Ekstrak sampel atau standar yang telah diencerkan dipindahkan dengan volume 2 μ L ke dalam sumur yang berisi 158 μ L air dan 10 μ L reagen Folin-Ciocalteu. Setelah 5 menit, larutan 30 μ Lofasodiumcarbonate ditambahkan. Pelat kemudian dibiarkan berdiri pada suhu kamar selama 2 jam sebelum absorbansi pada 620 nm diukur terhadap air kosong. TPC dinyatakan sebagai setara asam galat (GAE) dalam ekstrak mg/g. Konsentrasi polifenol dalam sampel berasal dari kurva standar asam galat mulai dari 50 hingga 500 μ g/mL (Mojica et al., 2018).

Viabilitas garis sel OSCC-25 diperiksa dengan menggunakan reagen MTT (3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-dipheny ltetrazolium bromide. Sel dikultur dalam plat 24-sumur pada konsentrasi 1×10^6 sel/sumur. Kami menambahkan ekstrak GC, MRC dan DC dengan pengenceran serial (100 μ g/ml, 10 μ g/ml, 1 μ g/ml, 0,1 g/ml, dan 0,01 μ g/ml). Empat sumur yang tidak diberi perlakuan tetap sebagai kontrol. Uji MTT dilakukan 48 jam setelah perawatan. Larutan

pencampur dibuat dengan mencampur 1 ml PBS dengan 2 mg bubuk MTT. Media kultur diubah dengan 150 l media segar, di samping 50 l reagen MTT (2 mg/ml dalam PBS); sumur bebas sel dianggap sebagai kontrol kosong. Sel diinkubasi pada 37 0C dengan CO2 pada 5% dan suasana lembab selama 4 jam. Setelah itu, larutan MTT dihilangkan dan 200 l DMSO ditambahkan ke setiap sumur. Plate disimpan pada suhu 37 0 C selama 30 menit dan setelah itu OD (optical density) sumur diukur 570 nm melalui pembaca microplate (Thermo Scientific Multiskan Spectrum, Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA). Nilai IC 50 untuk ekstrak kopi pada garis sel OSCC-25 diinterpretasikan melalui Graph Pad Prism versi 3.00 (GraphPad, San Diego, CA) (Oh et al., 2018).

2. Uji LDH (*Lactate Dehydrogenase*)

Lactate dehydrogenase adalah enzim intraseluler yang dapat menandai adanya jejas pada sel dan jaringan (Novara et al., 2019). *Laktat dehidrogenase* (LDH) merupakan enzim intraseluler yang terlibat dalam glikolisis anaerobik yang mengkatalisis oksidasi piruvat menjadi laktat. Serum LDH diuji secara rutin pada berbagai penyakit secara klinis. Diketahui bahwa peningkatan kadar LDH serum berhubungan dengan prognosis yang buruk pada berbagai penyakit, terutama pada tumor dan inflamasi (Li et al., 2020).

Berdasarkan hasil analisis jurnal, aktivitas LDH diukur dalam media kultur sel dari setiap kelompok perlakuan menggunakan kit uji Aktivitas LDH, supernatan dari setiap sampel digunakan dalam uji LDH. Secara singkat, sel diperlakukan dengan CGA7 (0,25-1 mg) selama 24 dan 48 jam dan media kultur sel dari kelompok perlakuan

dan kontrol dikumpulkan dari 96 pelat sumur. Media kultur sel disentrifugasi dan 50 L supernatan dipindahkan ke 96 well plate yang baru dan dicampur dengan volume yang sama dari campuran reaksi yang mengandung buffer uji LDH dan substrat LDH, inkubasi pelat pada 37°C selama 10 menit. Absorbansi dibaca pada 450 nm menggunakan multiscan EX reader dan data direpresentasikan sebagai miliunit/liter (mU/L) (Gouthamchandra et al., 2017).

Pelepasan laktat dehidrogenase (LDH) adalah penanda in vitro toksisitas seluler. Sel HT-29 diperlakukan dengan berbagai konsentrasi kahweol selama 20 jam, dan kemudian supernatan digunakan untuk menguji aktivitas LDH (Choi et al., 2015).

3. Uji apoptosis

Analisis mikroskopis fluoresensi apoptosis menggunakan metode uji pewarnaan ganda acridine orange/ethidium bromide (AO/EB) untuk mendeteksi apoptosis. Secara singkat 1,5×10⁵ sel HCT-116 diunggulkan dalam piring 60 mm dan diinkubasi selama 24 jam diikuti dengan penggantian media yang mengandung 1 mg / mL kompleks CGA7. Setelah inkubasi 24 dan 48 jam, media diangkat dan dicuci dengan larutan buffer fosfat, sel dicampur dengan 400 L larutan AO/EB dan sel diamati di bawah mikroskop fluoresen (Gouthamchandra et al., 2017)

Apoptosis dan *downregulasi protein anti-apoptosis* dalam sel kanker ginjal manusia setelah pengobatan kahweol asetat dan kafestol. Uji *dUTP-biotin nick end labeling* (TUNEL) yang dimediasi TdT dari sel ACHN dan Caki-1 dilakukan untuk menilai apakah kahweol asetat dan kafestol dapat menginduksi apoptosis. Konsisten dengan hasil uji

proliferasi, kahweol asetat dan kafestol sangat menginduksi apoptosis, bahkan dengan 30 M masing-masing diterpen saja. Selanjutnya, analisis western blot dilakukan untuk menentukan perubahan protein kunci yang terlibat dalam proliferasi sel kanker, termasuk protein terkait apoptosis. Dengan demikian, kombinasi 30 M kahweol asetat dan 30 M kafestol menghambat aktivasi STAT3. Selain itu, kombinasi 30 M kahweol asetat dan 30 M kafestol mempromosikan ekspresi Bcl-2 dan Bcl-xL yang jauh lebih rendah, hilir STAT3, dibandingkan dengan sel yang tidak diobati. Selain itu, protein X terkait Bcl-2 (Bax) meningkat oleh kahweol asetat dan kafestol. Selanjutnya memeriksa protein apoptosis terkait caspase untuk memeriksa apakah apoptosis yang diinduksi oleh kahweol asetat dan kafestol bergantung pada caspase atau tidak, tidak ada fragmentasi caspase-3 dan PARP yang diamati terlepas dari konsentrasi kahweol acetate dan kafestol. Kombinasi 30 M diterpen menghambat protein terkait apoptosis yang disebutkan di atas sampai tingkat yang sebanding dengan konsentrasi tinggi (100 M) dari masing-masing diterpen saja (Makino et al., 2021).

Penilaian kuantitatif apoptosis dilakukan melalui Fluorescein Isothiocyanate (FITC) dan Annexin V Apoptosis Detection Kit (BD Biosciences, Waltham, MA). Pertama, sel dikultur dengan kepadatan ($1,5 \times 10^5$ sel) dan nilai IC 50 dari setiap ekstrak ditambahkan dan diinkubasi selama 72 jam. Kelompok kontrol dibiarkan tanpa perlakuan apapun. Setelah 72 jam, sel dikumpulkan, dicuci dua kali melalui PBS dingin, dan ditangguhkan kembali dengan buffer pengikat. Seratus mL sel dipindahkan ke dalam tabung dan diinkubasi

pada suhu kamar dengan 5 mL propidium iodida (PI) serta 5 mL FITC-conjugated Annexin V (Annexin V-FITC) selama 15 menit di ruangan gelap. Sel-sel yang diwarnai diencerkan dengan buffer pengikat dan dianalisis dengan flow cytometer (Oh et al., 2018).

4.4 Aktivitas Antikanker

Penggolongan aktivitas suatu senyawa diperoleh dengan berdasarkan nilai IC50. Menurut Badarinath et al (2010), suatu ekstrak dinyatakan memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat apabila nilai IC50 <50 ppm, nilai 50-100 ppm aktivitas antioksidan kuat, nilai 100-150 ppm aktivitas antioksidan sedang, nilai 150-200 ppm aktivitas antioksidan lemah, dan jika nilai IC50 >200 ppm aktivitas antioksidan sangat lemah (Sasmita et al., 2021).

Berdasarkan hasil analisis jurnal, aktivitas antikanker dari kandungan senyawa biji kopi berbeda- beda. Kandungan senyawa kahweol memiliki aktivitas antikanker yang kuat pada sel kanker usus besar (kolorektal) dengan nilai IC50 100 μ M. Kahweol secara signifikan menghambat pertumbuhan sel tumor kolorektal dengan mempromosikan apoptosis. Kahweol mengerahkan sifat pro-apoptosisnya dengan menekan ekspresi HSP70 (Choi et al., 2015)

Ekstrak biji kopi hijau dengan kandungan senyawa asam klorogenat (CGA) kompleks memiliki aktivitas antikanker sangat kuat pada sel kanker kolorektal (HCT-116) dibandingkan dengan garis sel kanker manusia lainnya dengan nilai IC50 1 μ g/ml (Gouthamchandra et al., 2017).

Aktivitas antikanker biji kopi yang mengandung senyawa asam klorogenat (CGA), asam galat, dan asam kafeat memiliki aktivitas antikanker yang sangat lemah dengan nilai IC50 500-1000 ppm. Aktivitas antikanker dalam konsumsi kopi dapat berpotensi jika diseimbangi dengan diet sehat dan seimbang (Mojica et al., 2018).

Aktivitas antikanker dari biji kopi yang mengandung senyawa kahweol memiliki aktivitas kuat sebagai antikanker payudara dengan nilai IC50 25 μ M (Oh et al., 2018).

Ekstrak biji kopi alami yang mengandung senyawa kahweol dan kafestol memiliki aktivitas antikanker yang sangat kuat sebagai antikanker sel ginjal dengan nilai IC50 30 μ M (Makino et al., 2021).


Ekstrak biji kopi yang mengandung senyawa fenolik khususnya ekstrak kopi hijau dan kopi panggang sedang memiliki aktivitas sangat kuat dengan nilai IC50 $17,1 \pm 0,69$ dan $57,95 \pm 2,28$. Sedangkan kopi tanpa kafein memiliki aktivitas antikanker kuat dengan nilai IC50 $103,32 \pm 4,52$. Kopi hijau memiliki aktivitas antikanker paling kuat di antara semua ekstrak kopi yang diteliti karena kandungan senyawa antioksidan bioaktif yang tinggi. Di amati bahwa pemanggangan kopi mengurangi jumlah total fenolik. Dekafeinasi kopi juga mengurangi persentase total senyawa fenolik yang secara signifikan melemahkan aksi antikanker kopi (Rashad et al., 2021).

Tabel 6. Aktivitas antikanker biji kopi (*Coffea Sp.*)

No.	Penulis dan tahun	IC50	Aktivitas
1.	Choi et al., 2015	100 μ M	Kuat
2.	Gouthamchandra et al., 2017	1 mg/ml	Sangat kuat
3.	Mojica et al., 2018	500-1000 ppm	Sangat lemah
4.	Oh et al., 2018	25 μ M	Sangat kuat
5.	Makino et al., 2021	30 μ M	Sangat kuat
6.	Rashad et al., 2021	$17,1 \pm 0,69$, $57,95 \pm 2,28$, dan $103,32 \pm 4,52$	Sangat kuat, kuat, dan sedang.

4.5 Kandungan Senyawa dalam biji kopi (*Coffea Sp.*)


Asam yang banyak pada biji kopi adalah asam klorogenat dengan kisaran 8% pada biji kopi dan 4,5% pada kopi sangrai. Asam klorogenat merupakan senyawa dalam biji kopi (*Coffea Sp.*) yang termasuk golongan polifenol (Yusuf & Alyidrus, 2020). Senyawa ini memiliki sifat larut air (Farhaty & Muchtaridi, 2016).



Gambar 5. Struktur kimia asam klorogenat (CGA)
(Mojica et al., 2018).


Golongan utama senyawa fenolik yaitu asam hidroksi sinamat yang banyak terkandung pada hampir setiap tanaman. Asam hidroksi sinamat merupakan asam kafeat yang membentuk esterifikasi dengan senyawa asam kuinat dan kemudian menghasilkan asam klorogenat (Husniati, 2021). Manfaat asam klorogenat bagi kesehatan yaitu antioksidan, antivirus, hepatoprotektif, serta berperan dalam antispasmodik (Yunika Sari et al., 2019).

Kahweol dan kafestol merupakan senyawa dalam biji kopi (*Coffea Sp.*) yang terkandung dalam biji kopi sebagai antikarsinogenik. Kahweol dan kafestol yang merupakan diterpen alami dari ekstrak biji kopi memiliki aktivitas menghambat perkembangan sel kanker (Makino et al., 2021). Diterpen kopi dapat mencegah kanker dengan memodulasi berbagai enzim yang terlibat dalam karsinogenesis dan detoksifikasi (Ren et al., 2019).



Gambar 6. Struktur kimia kahweol (Oh et al., 2018).

Kahweol merupakan senyawa dalam biji kopi yang larut dalam lemak dan merupakan senyawa yang dikenal sebagai molekul diterpen serta diperoleh dalam minyak yang terkandung dari biji kopi arabika (*Coffea arabica*) (Choi et al., 2015). Kahweol sebagai diterpene spesifik kopi telah diketahui menginduksi apoptosis pada sel kanker manusia (Park et al., 2016).




Gambar 7. Struktur kimia kafestol (Makino et al., 2021).

Kafestol merupakan bagian utama dari kopi dengan berat 0,2-0,6% dari berat kopi. Senyawa ini bersifat antikanker dan hepatoprotektif (Diarti et al., 2016).

Berdasarkan sebuah studi ekstensif, kahweol dan kafestol diketahui memiliki efek penghambatan pada berbagai tahap perkembangan kanker, termasuk mencegah inisiasi tumorigenesis, menghambat proliferasi sel tumor, serta metastasis tumor (Ren et al., 2019).


Asam galat merupakan senyawa yang ditemukan pada tanaman secara bebas ataupun dalam bentuk terikat (Fatmawati & Dkk, 2019). Senyawa ini telah diketahui dapat mencegah sejumlah penyakit termasuk kanker, penyakit kardiovaskular, infeksi, dan peradangan (Daduang et al., 2015).



Gambar 8. Struktur kimia asam galat
(Junaidi & Anwar, 2018)

Asam galat merupakan senyawa metabolit sekunder yang ditemukan pada beberapa produk alami dan memiliki beberapa aktivitas sitotoksik terhadap beberapa sel line seperti kanker payudara (Humaedi & Halimatushadyah, 2021).

Kopi memiliki kandungan senyawa yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Salah satunya yaitu asam kafeat. Asam kafeat merupakan turunan dari kelas *Hydroxycinnamic acids* kelompok asam fenolik (Bare et al., 2019)



Gambar 8. Struktur kimia asam kafeat
(Mojica et al., 2018).

Asam kafeat diketahui memiliki potensi sebagai anti inflamasi, antioksidan, dan menyembuhkan beberapa penyakit degeneratif (Bare et al., 2019).

Sumber antioksidan yang diperoleh dari golongan senyawa polifenol secara kimiawi bahwa senyawa ini mempunyai ketersediaan hidrogen untuk menangkal radikal bebas yang pada konsentrasi rendah dapat mencegah dan menghambat reaksi oksidasi. Senyawa polifenol bermanfaat sebagai pencegahan penyakit layaknya kanker, jantung koroner, stroke juga sebagai pereduksi vitamin C, vitamin

E, serta karetonoid (Husniati, 2021).

Radikal bebas berasal dari molekul oksigen yang secara kimia, strukturnya telah berubah akibat aktivitas lingkungan. Akitifitas lingkungan yang dapat memicu radikal bebas yaitu radiasi sinar ultraviolet, polusi udara, asap kendaraan bermotor, dan asap rokok. Selain itu, beberapa makanan dapat memicu radikal bebas, seperti makanan cepat saji (*fast food*), makanan kemasan, makanan kalengan karena mengandung lemak, pengawet dan sumber radikal bebas (Sudewo, 2012).

Radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan kerusakan pada DNA dan sel dalam tubuh. Penyakit yang dapat ditimbulkan oleh radikal bebas seperti kanker, diabetes, dan jantung koroner (Sudewo, 2012).

Antioksidan adalah istilah untuk zat yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan radikal bebas yang mudah menyerang ketika ketahanan tubuh menurun. Antioksidan memiliki peran yang sangat besar pada manusia dalam mencegah terjadinya penyakit, yaitu dengan menekan kerusakan sel yang terjadi akibat serangan radikal bebas (Sudewo, 2012).

Peranan antioksidan sangat penting dalam menetralkan dan menghancurkan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan juga merusak biomolekul, seperti DNA, protein, dan lipoprotein di dalam tubuh yang akhirnya dapat memicu terjadinya penyakit degeneratif seperti kanker, jantung, artritis, katarak, diabetes dan hati. Penyakit degeneratif ini disebabkan karena antioksidan yang ada didalam tubuh tidak mampu menetralsir peningkatan konsentrasi radikal bebas (Filbert et al., 2014).

Tabel 7. Kandungan senyawa dalam biji Kopi (*Coffea Sp.*)

No.	Penulis dan tahun	Kandungan
1.	Choi et al., 2015	Kahweol, asam klorogenat, asam kafeat, kafein.
2.	Gouthamchandra et al., 2017	Asam klorogenat kompleks (CGA7)
3.	Mojica et al., 2018	Asam klorogenat (CGA), asam galat, dan asam kafeat
4.	Oh et al., 2018	Kahweol
5.	Makino et al., 2021	Kahweol dan kafestol
6.	Rashad et al., 2021	Fenolik

4.6 Jenis kanker yang dapat dihambat oleh biji kopi (*Coffea Sp.*)

1. Kanker Payudara

Kanker payudara adalah kanker yang ditemui pada saluran, kelenjar, dan jaringan penunjang payudara tetapi bukan kulit payudara (Mangan & Wulandari, 2009). Kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor satu dari seluruh jenis kanker yang terjadi pada wanita. Kanker payudara umumnya menyerang wanita yang telah berumur lebih dari 40 tahun, namun wanita muda pun bisa terserang kanker payudara (Pratiwi et al., 2017).

Menurut penelitian Harianto (2005), faktor resiko yang dapat meningkatkan penyakit kanker payudara yaitu (Anggorowati, 2013):

- a. Genetik/ keturunan
- b. *Menarche* atau menstruasi dini
- c. *Nullipara* atau tidak pernah melahirkan anak
- d. Pemakaian pil yang mengandung estrogen dalam jangka panjang
- e. Menopause terlambat
- f. Riwayat pemberian ASI
- g. Obesitas
- h. Suka mengonsumsi makanan berlemak

- i. Mengonsumsi minuman beralkohol
- j. Merokok

Beberapa cara pencegahan kanker payudara yaitu (Mangan & Wulandari, 2009):

- a. Menghindari makanan berlemak tinggi,
- b. Menjaga kesehatan dan memperbanyak mengonsumsi buah dan sayuran,
- c. Menghindari mengonsumsi pil KB bagi beberapa wanita beresiko
- d. Tidak sembarangan mengonsumsi obat hormonal, dan
- e. Menjaga pola hidup sehat.

Pasien yang menderita kanker payudara perlu melakukan terapi pengobatan dalam upaya penyembuhannya. Salah satu pengobatan yang dianjurkan yaitu kemoterapi. Kemoterapi adalah terapi anti kanker untuk membunuh sel-sel tumor dengan mengganggu fungsi dan reproduksi sel yang bertujuan untuk penyembuhan, pengontrolan, dan paliatif (Pratiwi et al., 2017).

2. Kanker Usus Besar (Kolorektal)

Kanker usus besar atau kolorektal adalah kanker yang menyerang usus besar hingga dubur. Pertumbuhan kanker ini sangat lambat sehingga kadang tidak disadari oleh penggunanya sejak dini (Mangan & Wulandari, 2009).

Faktor risiko penyebab kanker kolorektal adalah faktor genetik, pernah menderita penyakit usus besar seperti polip, radang usus, pola makan yang tidak sehat, terutama banyak mengonsumsi lemak dan daging serta

tidak mengonsumsi sayuran, dan sering mengonsumsi makanan yang dibakar atau dipanggang, dan mengonsumsi makanan yang mengandung bahan pengawet (Mangan & Wulandari, 2009).

Gejala yang dapat dirasakan pada penderita kanker kolorektal yaitu (Mangan & Wulandari, 2009):

- a. Gejala stadium dini: buang air besar terdapat darah dan lendir, keadaan buang air besar yang berubah-ubah serta kadang tinja encer dan terkadang susah buang air besar.
- b. Gejala stadium lanjut: perut terasa nyeri, kembung, tegang, kadang terasa ada benjolan di perut, nafsu makan menurun, keluarnya darah dari dubur, dan adanya tanda-tanda penyempitan usus besar seperti susah buang air besar.

Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga pola makan dan makan- makanan yang berserat (sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian), mengurangi makan daging, menghindari mengonsumsi makanan yang berpengawet, bahan pewarna dan makanan yang diolah dengan cara dibakar atau dipanggang, dan makanan terapi enema yaitu kuras usus melalui dubur dengan memasukkan cairan kopi (Mangan & Wulandari, 2009).

Pengobatan yang dapat dilakukan seperti pembedahan/ operasi, radioterapi, dan obat pembunuh sel kanker (sitostika dan sel kanker) (Mangan & Wulandari, 2009).

3. Kanker Ginjal

Kanker ginjal merupakan penyakit kanker yang tumbuh pada jaringan ginjal. Beberapa gejala klinis umum yaitu anoreksia, kelelahan, penurunan

berat badan, dan demam yang tidak diketahui penyebabnya (Ng et al., 2008).

Karsinoma sel renal (KSR) atau kanker ginjal merupakan kasus dengan jumlah tinggi pada karsinoma traktus urinarius dibandingkan dengan keganasan yang lain pada organ tersebut (Made et al., 2018). Tumor atau kanker ginjal bisa berasal dari tumor primer di ginjal atau tumor sekunder dari metastatis keganasan organ lain (Melisa et al., 2016).

Faktor resiko terjadinya kanker ginjal yaitu merokok (aktif maupun pasif), dan hipertensi. Kanker ginjal juga sering ditemui pada penderita obesitas, *end-stage renal failure*, *tuberous sclerosis*, dan *acquired renal cystic disease* (Made et al., 2018).

Kemoterapi ataupun radioterapi. Sehingga banyak kasus tidak diketahui pada stadium awal dan baru terdeteksi pada stadium lanjut, bahkan 20-25% terdiagnosis pada stadium IV (Made et al., 2018). Sebuah statistik menunjukkan insiden kanker ginjal dua kali lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan pada wanita (Melisa et al., 2016).

Terapi atau pengobatan pilihan yang dapat diberikan apabila tumor belum menunjukkan tanda bermetastasis jauh yaitu radikal nefrektomi. Terapi ini dapat dilakukan jika ukuran tumor lebih dari 7 cm, yang meliputi pengangkatan ginjal dan fascianya, kelenjar adrenal yang saling berdekatan dan limfonodi regional. Sedangkan untuk tumor yang sudah bermetastasis, radikal nefrektomi dapat dijadikan sebagai terapi paliatif jika terdapat hematuria, nyeri, ataupun sindrom paraneoplastik dan terapi sistemik yang lain tetap dibutuhkan. Meskipun tumor ginjal bersifat radioresisten, akan tetapi radioterapi dapat bermanfaat dalam menghilangkan metastasis jauh seperti pada otak, tulang, serta paru (Made et al., 2018).

Surgical debulking tumor adalah suatu prosedur dimana tumor ganas diangkat secara parsial untuk mendapatkan terapi lanjutan berupa obat-obatan, radiasi, atau lainnya yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup. *Debulking* dianjurkan untuk beberapa jenis penanganan karsinoma seperti karsinoma testis, ovarium, subtype limfoma, sarkoma, karsinoma sel ginjal, tumor adrenal dan yang lainnya yang terkait endokrin, neoplasma sistem saraf pusat, dan lain-lain. Debulking dikenal juga dengan sebutan *cytoreductive surgery* (Made et al., 2018).

4. Kanker Mulut

Kanker mulut yaitu suatu pertumbuhan sel kanker pada rongga mulut yang meliputi bibir dan mukosa bibir, lidah, palatum, ginggiva, dasar mulut dan mukosa pipi (Septina et al., 2020). Daerah rongga mulut merupakan satu dari sepuluh organ tubuh yang sangat sering terkena kanker. Kanker mulut berada pada peringkat ketiga setelah kanker lambung dan leher rahim (Ramadhanu, 2019).

Kanker mulut bisa menyebar secara langsung ke jaringan-jaringan sekitar mulut ataupun kelenjar getah bening (Ramadhanu, 2019).

Karsinoma Sel Skuamosa Mulut (KSSM) adalah kasus keganasan yang paling banyak terjadi hingga mencapai 94% dari seluruh kasus dalam rongga mulut. Rata-rata angka keselamatan selama lima tahun untuk kanker tipe ini menunjukkan angka yang paling rendah yakni kurang dari 50% jika dibandingkan dengan jenis kanker lain dan kondisi ini tidak mengalami perubahan selama empat puluh tahun terakhir (Septina et al., 2020).

Berdasarkan penelitian Asceni dkk. menunjukkan bahwa lokasi yang paling sering terkena kanker rongga mulut adalah lidah (lateral posterior dan

ventral) diikuti dengan dasar mulut, gusi, mukosa bukal, retromolar pad, dan yang terakhir adalah palatum durum (Septina et al., 2020).

Karsinoma sel skuamosa mulut merupakan keganasan pada sel-sel keratinosit epitel rongga mulut yang kemungkinan untuk menyebar melalui jaringan limfatik atau pembuluh darah (Septina et al., 2020).

Saat ini perawatan kanker rongga mulut masih menggunakan cara yang konvensional, seperti kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, pembedahan dan terapi kombinasi. Terapi karsinoma sel skuamosa dapat melibatkan satu atau beberapa terapi sekaligus, terdiri dari : pembedahan, radioterapi dan kemoterapi (Medawati, 2013).

Lokasi dan luas dari lesi berpengaruh dalam pemilihan terapi yang tepat. Terapi yang paling sering digunakan adalah terapi menggunakan radioterapi. Kanker rongga mulut pada lidah mempunyai invasi lokal dan metastasis regional yang tinggi ke limfonodi servikal, dan sering menyebabkan rekurensi lokal setelah pembedahan radikal akibat terjadinya invasi dan metastasis mikro sel kanker dari lokasi primer (Medawati, 2013).

Tabel 8. Jenis kanker yang dapat dihambat oleh biji kopi (*Coffea Sp.*)

No.	Penulis dan tahun	Jenis kanker	Kandungan
1.	Choi et al., 2015	Kanker usus besar (kolorektal)	Kahweol
2.	Gouthamchandra et al., 2017	Kanker usus besar (kolorektal)	Asam klorogenat kompleks (CGA7)
3.	Mojica et al., 2018	Kanker mulut dan kanker usus besar	Asam klorogenat, asam kafeat, asam galat.
4.	Oh et al., 2018	Kanker payudara	Kahweol
5.	Makino et al., 2021	Kanker ginjal	Kahweol dan kafestol
6.	Rashad et al., 2021	Karsinoma sel skuosa mulut	Fenolik

4.7 Tinjauan Islam

Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah swt. dengan begitu banyak manfaat. Tanaman dapat digunakan sebagai obat alami yang tidak menimbulkan banyak efek samping kepada penggunanya. Tanaman obat juga sangat bermanfaat karena dengan hal tersebut, segala sesuatu yang dikonsumsi sesuai porsinya dapat mencegah atau menyembuhkan suatu penyakit.

Alquran merupakan mukjizat terbesar dari Allah swt. yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Di dalam Al- Qur'an, banyak ayat yang menyatakan tentang alam semesta terutama informasi mengenai khasiat tanaman maupun biji- bijian sebagai pengobatan untuk berbagai macam penyakit. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam ayat- ayat dan hadits berikut ini.

Allah swt. berfirman dalam QS. Thaha/20: 53 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى

Terjemahnya:

“Dia yang telah menjadikan bagimu sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam (Kementrian agama, 2013).

Dalam tafsir al mishbah, *Dia* Allah yang menjadikan bagi kamu, wahai Fir'aun dan seluruh manusia, sebagian besar bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi. Dan Dia yakni Tuhan itu juga, yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya perantara hujan itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa dan manfaat (Shihab, 2002).

Dari tafsir tersebut, dapat dipahami bahwa Allah menciptakan bumi dengan sebaik- baiknya bagi makhluk hidup serta saling berkesinambungan seperti air hujan yang turun dari langit sehingga terciptalah tumbuh- tumbuhan dengan beragam jenis, rasa dan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Allah swt. juga berfirman dalam QS. Al- A'raf/ 7: 31 yang berbunyi:

.... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“.....makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Kementrian Agama, 2013)

Dalam tafsir al mishbah, perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih-lebihan yaitu tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus di sesuaikan untuk kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang boleh jadi telah melampaui batas atau kurang untuk orang lain (Shihab, 2002).

Dalam konteks berlebih- lebihan ditemukan pesan Nabi saw: “Tidak ada wadah yang dipenuhi manusia lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi putra-putri Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus (memenuhi perut), maka hendaklah sepertiga untuk pernafasannya (Shihab, 2002).

Dari tafsir tersebut dapat pahami bahwa sikap tidak berlebih-lebihan dalam ilmu pengetahuan modern telah menetapkan bahwa tubuh tidak menyerap semua makanan yang masuk, tetapi hanya mengambil secukupnya, kemudian berusaha membuang yang tersisa lebih dari kebutuhan.

Di samping itu, lambung dan alat-alat pencernaan lainnya akan terpersir dan mengalami gangguan. Dengan begitu, seseorang akan menderita penyakit tertentu

yang berhubungan dengan organ tersebut. Ayat ini menganjurkan kita juga untuk makan yang baik-baik agar badan sehat sehingga kuat bekerja.

Mengonsumsi kopi 1-3 cangkir dalam sehari dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dan apabila mengonsumsi lebih dari tiga cangkir hingga sepuluh cangkir dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa segala sesuatu harus dikonsumsi secukupnya agar tidak memberi dampak yang buruk bagi tubuh terutama saat mengonsumsi kopi.

Allah swt. juga berfirman dalam QS. Al Isra'/ 17: 82 yang berbunyi:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ٨٢

Terjemahnya:

“Dan (sedangkan) Kami turunkan dari al-Qur’an sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian” (Kementerian agama, 2011)

Tafsir ayat di atas, kata *syifa'* biasa diartikan kesembuhan atau obat, dan digunakan juga dalam arti keterbatasan dari kekurangan atau ketiadaan aral dalam memperoleh manfaat. Dalam tafsir mishbah, ayat ini seakan-akan menyatakan bahwa al- Qur'an diturunkan oleh Allah Swt. sebagai rahmat bagi orang-orang beriman, di mana al- Qur'an sebagai obat keraguan dan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, akan tetapi hanya akan memberi kekufuran kepada orang-orang yang dzalim (Shihab, 2002).

Dari tafsir tersebut, dapat dimengerti bahwa al- Qur'an memberikan banyak manfaat kepada manusia. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dengan begitu macam banyak manfaat selain sebagai pangan juga sebagai obat-obatan yang diperoleh dari kandungan tanaman maupun biji-bijian. Seperti halnya biji kopi

yang memiliki banyak manfaat terutama sebagai anti kanker.

Dalam Islam, Allah swt. menganjurkan umatnya untuk selalu bertawakkal serta berikhtiar termasuk dalam hal kesembuhan atas suatu penyakit. Sebuah hadits

Riwayat Muslim, Rasulullah saw. beliau bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

"Harun bin Ma'ruf, Abu Ath-Thahir dan Ahmad bin Wahb menceritakan kepada kami, Amr (yaitu Ibnu Al-Harits) mengabarkan kepadaku dari Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim).

Berdasarkan tafsir di atas, hadis ini mengisyaratkan dianjurkannya obat. Al Qadhi berkata "Hadits-hadits ini mengandung sejumlah ilmu agama dan dunia, kebenaran ilmu pengobatan, bolehnya berobat secara global, dan dianjurkannya hal-hal yang disebutkan dalam hadits- hadits yang disebutkan oleh Imam Muslim ini. Hadits- hadits ini juga sebagai sanggahan terhadap orang yang mengingkari berobat, yaitu mereka dari kalangan sufi sesat dengan mengatakan, bahwa segala sesuatu tergantung qadha dan qadar sehingga tidak perlu berobat (Nawawi, 2011).

Hujjah para ulama adalah hadits-hadits mereka yakni bahwa Allah yang berkehendak, sementara berobat juga termasuk takdir Allah. Hal ini sama halnya dengan perintah untuk berdoa, dan memerangi hal- hal yang kafir, berlindung di dalam benteng dan tidak membiarkan diri terjerembab dalam kebinasaan kendatipun ajal tidak berubah, dan takdir tidak akan maju maupun mundur dari waktu yang telah ditetapkan, serta dipastikan (Shihab, 2002).

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa segala penyakit memiliki obat dan atas kehendak Allah swt. setiap penyakit dapat disembuhkan. Maka hendaklah kita berikhtiar atas kesembuhan bukan hanya pasrah terhadap keadaan. Dan berobat dengan herbal seperti menggunakan biji kopi memiliki banyak khasiat pengobatan terutama untuk antikanker.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Aktivitas antikanker dari ekstrak biji kopi (*Coffea Sp.*) menunjukkan sitotoksitas dan apoptosis antikanker yang berbeda-beda tergantung konsentrasi dan jenis kanker. Kandungan senyawa asam klorogenat, kahweol, kafestol, dan fenolik memiliki aktivitas yang sangat kuat. Aktivitas antikanker yang kuat yaitu kahweol, dan aktivitas antikanker yang sangat lemah yaitu asam klorogenat, asam kafeat dan asam galat.
2. Kandungan senyawa dalam biji kopi (*Coffea Sp.*) yang memiliki aktivitas sebagai anti kanker yaitu asam klorogenat, asam galat, asam kafeat, kafestol, dan kahweol.
3. Jenis kanker yang dapat dihambat oleh biji kopi (*Coffea Sp.*) adalah kanker ginjal, kanker usus besar (kolorektal), kanker mulut, karsinoma sel skuamosa mulut, dan kanker payudara.
4. Dalam al-qur'an, Allah swt memberi tahu hamba-Nya tentang berbagai macam tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti biji-bijian, salah satunya yaitu biji kopi sebagai antikanker.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi biji kopi (*Coffea Sp.*) sebagai antikanker agar data yang diperoleh akan lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Setiawan, A., & Nita, S. (2017). Pengaruh Fraksi Aktif Dari Ekstrak Daun Kenikir (*Cosmos Caudatus*Kunth) Terhadap Uji Sitotoksik, Apoptosis Dan Antiproliferasi Kanker Payudara Sel T47dSecara In Vitro. *Biomedical Journal of Indonesia*, 3(3).
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2011). *Departemen Agama RI*. CV. Darus Sunnah.
- Anggorowati, L. (2013). Faktor Risiko Kanker Payudara Wanita. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 121–126. <https://doi.org/10.15294/kemas.v8i2.2635>
- Ansori, Y. Z., Budiman, I. A., & Nahdi, D. S. (2019). Islam Dan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(2), 110–115. <https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370>
- Ardhiansyah, A. O. (2019). *Deteksi Dini Kanker*. Tim E-Book AUP.
- Baqi, M. F. A. (2014). *Shahih Al- Bukhari*. Darul Hadits Qahirar.
- Bare, Y., Helvina, M., Elizabeth, A., & Sari, D. R. T. (2019). Potensi Asam Kafeat Pada Kopi Sebagai Simultan Gen Peroxixme Proliferasi-Activated Receptor Gamma (Ppar- γ^3): Studi in Silico. *Saintek Lahan Kering*, 2(Vol 2 No 2 (2019): JSLK Desember 2019), 52–53. <http://savana-cendana.id/index.php/SLK/article/view/866>
- Bolka, M., & Emire, S. (2020). Effects of coffee roasting technologies on cup quality and bioactive compounds of specialty coffee beans. *Food Science and Nutrition*, 8(11), 6120–6130. <https://doi.org/10.1002/fsn3.1904>
- Chen, R. (2010). *Stop Kanker (I)*. PT AgroMedia Pustaka.
- Choi, D. W., Lim, man sup, Lee, jae won, & Chun, W. (2015). The Cytotoxicity of Kahweol in HT-29 Human Colorectal Cancer Cells Is Mediated by Apoptosis and Suppression of Heat Shock Protein 70 Expression. *Biomolecules & Therapeutics*, 128–133. [https://doi.org/10.1016/0951-8320\(90\)90051-N](https://doi.org/10.1016/0951-8320(90)90051-N)
- Daduang, J., Palasap, A., Daduang, S., Boonsiri, P., Suwannalert, P., & Limpiboon, T. (2015). Gallic acid enhancement of gold nanoparticle anticancer activity in cervical cancer cells. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 16(1), 169–174. <https://doi.org/10.7314/APJCP.2015.16.1.169>

- Diarti, M., Pauzi, I., & Sabariah Rifaah, S. (2016). Kadar Kolesterol Total Pada Peminum Kopi Tradisional Di Dusun Sembung Daye Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Total Cholesterol Levels in Traditional Coffee Drinkers Dusun Sembung Daye Narmada Lombok District West. *Jurnal Kesehatan Prima*, 10(1), 1626–1637. <http://poltekkes-mataram.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/8.-Maruni-Wiwin-D.pdf>
- Edowai, D. N., & Tahoba, A. E. (2018). Proses Produksi dan Uji Mutu Bubuk Kopi Arabika (*Coffea arabica* L) Asal Kabupaten Dogiyai, Papua. *Agriovet*, 1(1), 1–18.
- Farhaty, N., & Muchtaridi. (2016). Tinjauan Kimia Dan Aspek Farmakologi Senyawa Asam Klorogenat Pada Biji Kopi. *Falkultas Farmasi Universitas Padjadjaran*, 46(1), 247–249. <http://journal.unpad.ac.id/farmaka/article/viewFile/10769/5141>
- Fatmawati, S., & Dkk. (2019). *Bioaktivitas dan Konstituen Kimia Tanaman Obat Indonesia*.
- Filbert, Koleangan, H. S. J., Runtuwene, M. R. J., & Kamu, V. S. (2014). Penentuan Aktivitas Antioksidan Berdasarkan Nilai IC50 Ekstrak Metanol dan Fraksi Hasil Partisinya pada Kulit Biji Pinang Yaki (*Areca vestiaria* Giseke). *Jurnal MIPA*, 3(2), 149. <https://doi.org/10.35799/jm.3.2.2014.6002>
- Fitriatuzzakiyyah, Sinuraya, R. K., & Puspitasari, I. M. (2017). Cancer Therapy with Radiation: The Basic Concept of Radiotherapy and Its Development in Indonesia. *Indonesian Journal of Clinical Pharmacy*, 6(4), 311–320. <https://doi.org/10.15416/ijcp.2017.6.4.311>
- Gaascht, F., Dicato, M., & Diederich, M. (2015). Coffee provides a natural multitarget pharmacopeia against the hallmarks of cancer. *Genes and Nutrition*, 10(6), 1–17. <https://doi.org/10.1007/s12263-015-0501-3>
- Gouthamchandra, K., Sudeep, H. V., Venkatesh, B. J., & Shyam Prasad, K. (2017). Chlorogenic acid complex (CGA7), standardized extract from green coffee beans exerts anticancer effects against cultured human colon cancer HCT-116 cells. *Food Science and Human Wellness*, 6(3), 147–153. <https://doi.org/10.1016/j.fshw.2017.06.001>
- Hardjono, S., Siswandono, & Nuzul Wahyuning Diyah. (2016). *Obat Anti Kanker (I)*. Airlangga University Press.
- Hu, G. L., Wang, X., Zhang, L., & Qiu, M. H. (2019). The sources and mechanisms of bioactive ingredients in coffee. *Food and Function*, 10(6), 3113–3126. <https://doi.org/10.1039/c9fo00288j>

- Humaedi, A., & Halimatushadyah, E. (2021). *Studi Komputasi Hubungan Aktivitas Senyawa Turunan Asam Galat sebagai Inhibitor Reseptor Androgen pada Kanker Prostat Computational Studies on The Relationship of the Activity of Gallic Acid Derivatives as Androgen Receptor Inhibitors in Prostate Cancer*. 65–76.
- Husniati, H. (2021). Kajian : Karakterisasi Senyawa Aktif Dalam Kopi Robusta Sebagai Antioksidan. *Majalah TEGI*, 12(2), 34. <https://doi.org/10.46559/tegi.v12i2.6750>
- Husniati, H., Oktiani, D., Suhartati, T., Pratama, V. B., Devi, A. F., & Artanti, N. (2021). Anticancer activity of Lampung Robusta Coffee extract fractions. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1011(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1011/1/012040>
- Junaidi, E., & Anwar, Y. A. S. (2018). Aktivitas Antibakteri dan Antioksidan Asam Galat dari Kulit Buah Lokal yang Diproduksi dengan Tanase. *ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia*, 14(1), 131. <https://doi.org/10.20961/alchemy.14.1.11300.131-142>
- Kurniawan, A., Kurnia, E., & Triyoga, A. (2018). Pengetahuan Pasien Pre Operasi Dalam Persiapan Pembedahan. *Jurnal Penelitian Keperawatan*, 4(2). <https://doi.org/10.32660/jurnal.v4i2.325>
- Lawrenti, H. (2018). Perkembangan Imunoterapi untuk Kanker. *CDK Cermin Dunia Kedokteran*, 45(8).
- Li, C., Ye, J., Chen, Q., Hu, W., Wang, L., Fan, Y., Chen, J., Chen, Z., Chen, S., Tong, J., Xiao, W., Mei, J., & Lu, H. (2020). Elevated Lactate Dehydrogenase (LDH) level as an independent risk factor for the severity and mortality of COVID-19. 12(15), 15670–15681.
- Made, N., Adnyani, D., & Widiana, I. G. R. (2018). Diagnosis dan tatalaksana pasien karsinoma sel renal. *Jpdunud*, 2(2), 23–27.
- Makino, T., Izumi, K., Hiratsuka, K., Kano, H., Shimada, T., Nakano, T., Kadamoto, S., Naito, R., Iwamoto, H., Yaegashi, H., Shigehara, K., Kadono, Y., Nakata, H., Saito, Y., Nakagawa-Goto, K., Sakai, N., Iwata, Y., Wada, T., & Mizokami, A. (2021). Anti-proliferative and anti-migratory properties of coffee diterpenes kahweol acetate and cafestol in human renal cancer cells. *Scientific Reports*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-80302-4>
- Mangan, Y., & Wulandari, N. (2009). *Solusi Sehat Mencegah dan Mengatasi Kanker Terapi Herbal, Terapi Diet, Terapi Jus* (O. N. RIawan (ed.); Pertama). PT AgroMedia Pustaka.

- Masitoh, A., & Sopyan, I. (2019). Formulasi Nanopartikel Tanaman Herbal Untuk Terapi Kanker. *Farmasetika.Com (Online)*, 4(5), 165–172. <https://doi.org/10.24198/farmasetika.v4i5.23111>
- Medawati, A. (2013). Karsinoma Sel Skuamosa Sebagai Salah Satu Kanker Rongga Mulut Dan Permasalahannya. *Insisivia Dental Journal*, 1, 87–90.
- Melisa, J., Monoarfa, A., & Tjandra, F. (2016). Profil penderita karsinoma sel ginjal (renal cell carcinoma). *Jurnal E-Clinic (ECI)*, 4(2).
- Mojica, B. E., Fong, L. E., Biju, D., Muharram, A., Davis, I. M., Vela, K. O., Rios, D., Osorio-Camacena, E., Kaur, B., Rojas, S. M., & Forester, S. C. (2018). The Impact of the Roast Levels of Coffee Extracts on their Potential Anticancer Activities. *Journal of Food Science*, 83(4), 1125–1130. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.14102>
- Mpapa, B. L. (2019). *Kopi Saluan Local Coffee Khas Banggai* (1st ed.). Deepublish Publisher.
- Nawawi, A.-. (2011). *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, Terj. Misbah "Syarah Shahih Muslim."* Azzam, Pustaka.
- Ng, C. S., Wood, C. G., Silverman, P. M., Tannir, N. M., Tamboli, P., & Sandler, C. M. (2008). Renal cell carcinoma: Diagnosis, staging, and surveillance. *American Journal of Roentgenology*, 191(4), 1220–1232. <https://doi.org/10.2214/AJR.07.3568>
- Novara, T., Harini, I. M., & Sutrisno, S. (2019). Perbedaan Kadar Laktat Dehidrogenase (LDH) pada Berbagai Derajat Keparahan Preeklampsia. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 30(4), 272. <https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2019.030.04.7>
- Oh, S. H., Hwang, Y. P., Choi, J. H., Jin, S. W., Lee, G. H., Han, E. H., Chung, Y. H., Chung, Y. C., & Jeong, H. G. (2018). Kahweol inhibits proliferation and induces apoptosis by suppressing fatty acid synthase in HER2-overexpressing cancer cells. In *Food and Chemical Toxicology* (Vol. 121). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.fct.2018.09.008>
- Pangribowo, S. (2019). Beban Kanker di Indonesia. *Pusat Data Dan Informasi Kemeterian Kesehatan RI*, 1–16.
- Park, G. H., Song, H. M., & Jeong, J. B. (2016). Kahweol from Coffee Induces Apoptosis by Upregulating Activating Transcription Factor 3 in Human Colorectal Cancer Cells. *Biomolecules and Therapeutics*.

- Pedan, V., Stamm, E., Do, T., Holinger, M., & Reich, E. (2020). HPTLC fingerprint profile analysis of coffee polyphenols during different roast trials. *Journal of Food Composition and Analysis*, 94(July). <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2020.103610>
- Polamuri, D., Valentina, C. G., Suresh, R., & Islam, A. (2020). In-vitro Anticancer and Antioxidant Activity of Green Coffee Beans Extract. *Asian Food Science Journal*, 17(2), 24–35. <https://doi.org/10.9734/afsj/2020/v17i230188>
- Pratiwi, S. R., Widiati, E., & Solehati, T. (2017). Gambaran Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecemasan Pasien Kanker Payudara dalam Menjalani Kemoterapi. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 3(2), 167. <https://doi.org/10.17509/jpki.v3i2.9422>
- Rahardjo, P. (2017). *Berkebun Kopi* (A. Mu'min (ed.); I). Penebar Swadaya.
- Ramadhanu, A. (2019). Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kanker Mulut Pada Manusia Dengan Metode Forward Chaining Menggunakan Bahasa Pemrograman Visual Basic 2017. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 59–72. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.53>
- Rashad, A. E. E. M., Abdel Latif, M. K., & Abdul-Aziz, M. A. (2021). Assessment of anti-cancerous effect of green, roasted and decaffeinated coffee on oral squamous cell carcinoma cell line (In vitro study). *Journal of Natural Remedies*, 21(3), 235–244. <https://doi.org/10.18311/jnr/2021/26862>
- Redaksi Health Secret. (2012). *Khasiat Bombastis Kopi* (Redaksi Health Secret (ed.)). PT Elex Media Komputindo.
- Ren, Y., Wang, C., Xu, J., & Shuaiyu Wang. (2019). Cafestol and Kahweol: A Review on Their Bioactivities and Pharmacological Properties. *International Journal of Molecular Science*.
- Sasmita, F., Wientarsih, I., Prasetyo, B. F., & Priosoeryanto, B. P. (2021). Antiproliferation Activities of Ethanol Extract of Robusta Lampung Green Coffee Seeds on Dog Tumor Line Cells. *Jurnal Veteriner*, 22(1), 133–140. <https://doi.org/10.19087/jveteriner.2021.22.1.133>
- Septina, F., Mardiyantoro, F., Balbeid, M., & Wineas, S. (2020). *Mengenal Terapi Radiasi dan Kemoterapi Bagi Dokter Gigi*.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian dalam Al-Qur'an*. Lentera Hati.

- Sudewo, B. (2012). *Basmi Kanker dengan Herbal* (B. Sudewo (ed.); 1st ed.). Visimedia.
- Tatiana, W. S., & Ria, S. (2020). Uji aktivitas antioksidan dengan metode dpph dan uji sitotoksik terhadap sel kanker payudara t47d pada ekstrak daun kemangi. *Jurnal Farmasetis*, 9(1), 51–64.
- Yunika Sari, M., Suhartati, T., & Husniati, H. (2019). Analisis Senyawa Asam Klorogenat Dalam Biji Kopi Robusta (*Coffea Canephora*) Menggunakan Hplc. *Analit: Analytical and Environmental Chemistry*, 4(02), 86–93. <https://doi.org/10.23960/aec.v4.i2.2019.p86-93>
- Yusuf, M., & Alyidrus, R. (2020). Uji Antiangiogenesis Secara In Vivo Ekstrak Etanol Biji Kopi Robusta (*Coffea Robusta*) dengan Metode Chorio Allantoic Membrane (CAM). *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 6(1), 63–69. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2020.v6.i1.14975>
- Zindany, M. F., Kadri, H., & Almurdi. (2017). Pengaruh Pemberian Kopi terhadap Kadar Kolesterol dan Trigliserida pada Tikus Wistar (*Rattus novergicus*). *Jurnal Kesehatan Andalas*, 6, 370.

Lampiran1. Situs pencarian pustaka

The screenshot shows the ScienceDirect search interface. The search bar contains the text "pharmacological activity of coffee beans as anticancer". Below the search bar, there are options for "Year: 2011-2021 X" and "Advanced search". The results section shows "58 results" and is sorted by "relevance | date". The first result is a research article titled "Control of the extractable content of bioactive compounds in coffee beans by near infrared hyperspectral imaging" published on 12 September 2020, by Jho Higgins-Rivero, Betta Diaz-Rodríguez, and María Lourdes González-Viñe. The second result is a review article titled "A review on β -carbolase alkaloids and their distribution in foodstuffs: A class of potential functional components or not?" published on 14 January 2011, by Zhijun Gu, Ming Gu, and Changhong Wang.

Kata kunci : *Coffee beans as anticancer*

The screenshot shows the ScienceDirect search interface. The search bar contains the text "compounds of coffee beans as anticancer". Below the search bar, there are options for "Year: 2011-2021 X" and "Advanced search". The results section shows "199 results" and is sorted by "relevance | date". The first result is a research article titled "Control of the extractable content of bioactive compounds in coffee beans by near infrared hyperspectral imaging" published on 12 September 2020, by Jho Higgins-Rivero, Betta Diaz-Rodríguez, and María Lourdes González-Viñe. The second result is a research article titled "Chlorogenic acid complex (CGA) standardized extract from green coffee beans exerts anticancer effects against cultured human colon cancer HCT-116 cells".

Kata kunci : *Pharmacological activity of Coffee beans as anticancer*

The screenshot shows a Google Scholar search for "compounds of coffee beans as anticancer". The search results are displayed in a list format. The first result is titled "The impact of the roasting levels of coffee extracts on their potential anticancer activities" by Mulya IZ Prang, D Egi A Muhamad, et al., published in the Journal of Food in 2019. The abstract indicates that the levels of bioactive compounds in coffee are dependent on the degree of roasting, and the anticancer activity of coffee is higher in the green fraction of coffee beans. Other results include "Evaluation of the anticancer potential of coffee beans: An in vitro study" and "Anticancer activity of Lampung Robusta Coffee extract fractions".

Kata kunci : Compounds of *Coffee beans as anticancer*

The screenshot shows a PubMed search for "compounds of coffee beans as anticancer". The search results are displayed in a list format. The first result is titled "Supramolecular Caffeic Acid and Bortezomib Nanomedicine: Producing Inducing Reactive Oxygen Species and Inhibiting Cancer Cell Survival" by Agilar LE, Jiang DL, Park CH, Lee BM, published in Pharmaceutics in 2020. The abstract indicates that phenolics from plant materials have generated attention in nanomedicine research, due to their various medicinal properties. Caffeic acid, a phenolic compound that is abundant in coffee beans, has been proven to have anticancer effects due to its reactivity.



Kata kunci : *Compounds of Coffee beans as anticancer*

The screenshot shows the PubMed website interface. At the top, the NIH logo and 'National Library of Medicine' are visible. The search bar contains the query 'compounds of coffee beans as anticancer'. Below the search bar, there are options for 'Advanced', 'Crossref', and 'Create RSS'. The search results are displayed in a list format, with the first result highlighted. The result title is 'Supramolecular Caffeic Acid and Bortezomib Nanomedicine: Producing Inducing Reactive Oxygen Species and Inhibiting Cancer Cell Survival'. The authors listed are 'Agilar LF, Iang SR, Park CH, Lee BH'. The publication year is 2020. The journal is 'Pharmazie'. The PMID is 32147211. The abstract text is partially visible, mentioning 'Phenolic plant materials have generated attention in nanomedicine research, due to their various medical properties. Caffeic acid a phenolic compound that is abundant in coffee beans, has been proven to have anticancer effects due to its react...'. On the left side, there is a bar chart showing the number of results for the years 2017 and 2020. The chart shows a significant increase in results in 2020 compared to 2017. There are also buttons for 'Save', 'Email', 'Send to', 'Sorted by: Best match', and 'Display options'.

Kata kunci : *Pharmacological activity of Coffee beans as anticancer*



Lampiran2. Daftar artikel yang dianalisis



www.nature.com/scientificreports

scientific reports

[Check for updates](#)

OPEN **Anti-proliferative and anti-migratory properties of coffee diterpenes kahweol acetate and cafestol in human renal cancer cells**

Tomoyuki Makino¹, Keiji Izumi^{2,3}, Keoru Hinatazuka¹, Hiroshi Kano¹, Takeshi Shimada¹, Taito Nakano¹, Suguru Kadomoto¹, Renato Nakai¹, Hiroaki Iwamoto¹, Hiroshi Yaegeashi², Kazuyoshi Shigebara¹, Yoshifumi Kadono¹, Hiroki Nakata¹, Yohsei Saito¹, Kyoko Nakagawa-Goto⁴, Norihiko Sakai¹, Yasunori Iwata¹, Takashi Wada¹ & Atsushi Nishikami¹

Despite improvements in systemic therapy options for renal cancer, it remains one of the most drug-resistant malignancies. Interestingly, reports have shown that kahweol and cafestol, natural diterpenes extracted from coffee beans, exhibit anti-cancer activity. However, the multiple potential pharmacological actions of both have yet to be fully understood. This study therefore investigated the effects of kahweol acetate and cafestol on human renal cancer ACHN and Caki-3 cells. Accordingly, the combination of kahweol acetate and cafestol administration synergistically inhibited cell proliferation and migration by inducing apoptosis and inhibiting epithelial-mesenchymal transition. Mechanistic dissection revealed that kahweol acetate and cafestol inhibited Akt and ERK phosphorylation. Moreover, kahweol acetate and cafestol downregulated the expression of not only C-C chemokine receptors 2, 5, and 6 but also programmed death ligand 1, indicating their effects on the tumor microenvironment. Thus, kahweol acetate and cafestol may be novel therapeutic candidates for renal cancer considering that they exert multiple pharmacological effects.

Accepted Manuscript



Kahweol inhibits proliferation and induces apoptosis by suppressing fatty acid synthase in HER2-overexpressing cancer cells

Sook Hoon Oh, Yong Pil Hwang, Jae Ho Choi, Sun Woo Jin, Gi Ho Lee, Eun Hee Han, Young Ho Chung, Young Chul Chung, Hye Gwang Jeong

PII: S0275-6915(18)30652-5
DOI: [10.1016/j.fct.2018.09.008](https://doi.org/10.1016/j.fct.2018.09.008)
Reference: FCT 10034

To appear in: *Food and Chemical Toxicology*

Received Date: 29 January 2018
 Revised Date: 30 May 2018
 Accepted Date: 6 September 2018

Please cite this article as: Oh, S.H., Hwang, Y.P., Choi, J.H., Jin, S.W., Lee, G.H., Han, E.H., Chung, Y.H., Chung, Y.C., Jeong, H.G., Kahweol inhibits proliferation and induces apoptosis by suppressing fatty acid synthase in HER2-overexpressing cancer cells, *Food and Chemical Toxicology* (2018), doi: [10.1016/j.fct.2018.09.008](https://doi.org/10.1016/j.fct.2018.09.008).

This is a PDF file of an unedited manuscript that has been accepted for publication. As a service to our customers we are providing this early version of the manuscript. The manuscript will undergo

The Impact of the Roast Levels of Coffee Extracts on their Potential Anticancer Activities



Benigno E. Mojica, Lisa E. Fong, Denny Biju, Afeesh Maharani, Isabel M. Davis, Klarisse O. Vela, Diana Rios, Elena Osorio-Camarena, Rajit Kaur, Sebastian M. Rojas, and Sarah C. Forster

Abstract: Coffee is one of the most widely consumed beverages in the world and contains numerous phytochemicals that are beneficial to consumer health. The phytochemical profile of coffee, however, can be affected by the roast level. In this study, we compared the effect of roasting level on the growth inhibitory activity of HT-29 (colon) and SCC-25 (oral) cancer cell lines. The different roasting stages selected for this study were green, cinnamon/blonde, city/medium, full city/medium-dark, and full city plus/dark. Cancer cells were treated with various concentrations of coffee extracts for 72 hr. Cell viability was quantified using the thiazolyl blue tetrazolium bromide assay. It was found that the lighter roast extracts, Cinnamon in particular, reduced cell growth more than darker roast extracts. The Cinnamon extract had the greatest amount of total phenolic content and antioxidant activity. Relative levels of gallic, caffeic, and chlorogenic acid in the extracts were also compared. The Cinnamon coffee extract had the highest levels of gallic and caffeic acids, which have both been widely regarded as bioactive phytochemicals. In conclusion, the consumption of lighter roasted coffee, may contribute to the prevention of certain types of cancer such as oral and colon.

Keywords: cancer, coffee, phenolic compounds, roasting

Practical Application: Chemical compounds in coffee may reduce the risk for certain types of cancers. These compounds may be particularly abundant in lighter roasted coffee. Therefore, lighter roasted coffee could contribute to the prevention of cancer through a healthy diet.

Introduction

According to the American Cancer Society, colon cancer is the 3rd most common type of cancer in the United States for both men and women. Oral cancer is far less prevalent, yet incidence rates are more than double in men compared to women (Society, 2018). Coffee is a widely consumed beverage that has many beneficial

properties. Coffee is traditionally prepared by roasting coffee beans which are then ground and brewed in hot water. The concentration of the already mentioned phenolic compounds (Mills, Cruz-Cascha, Mozzoni, Gibson, & Spencer, 2015) and amino compounds (Kosmala-Rios et al., 2007a,b) are dependent on roast levels of coffee. The amount of total beneficial compounds present

1 / 6



JOURNAL OF NATURAL REMEDIES
DOI: 10.1001/jnr.2021.26862

RESEARCH ARTICLE

Assessment of Anti-Cancerous Effect of Green, Roasted and Decaffeinated Coffee on Oral Squamous Cell Carcinoma Cell Line (In Vitro Study)

Asmaa E. E. M. Rashad¹, Mohamed K. Abdel Latif and Manar A. Abdel-Aziz

Oral and Maxillofacial Pathology, Faculty of Dentistry, Cairo University, 12613, Egypt; asmaa.rashad@dentistry.cu.edu.eg, m.kazem@dentistry.cu.edu.eg, Mwanis@yahoo.com

Abstract

Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC) is one of the most prevailing malignancies of the head and neck area. In fact, treatment methods are associated with harmful effects which draw attention towards natural compounds such as coffee. The current study attempted to test the anti-cancerous effect of green coffee, medium roasted coffee and decaffeinated coffee in OSCC cell lines and correlate the obtained results with their total phenolic content. We prepared coffee extracts using soxhlet apparatus. Then, we purchased and sub-cultured OSCC-25 cell into four study groups. We subjected three of those groups to coffee extracts separately. We left the remaining group without any treatment as a control group. We assessed cell cytotoxic effect of each extract by MTT viability assay. Additionally, we evaluated the apoptotic effect of each extract on OSCC-25 cell lines using flowcytometric analysis. Finally, we measured the total phenolic content in each coffee extract. The results revealed that coffee extracts induced varying degrees of cell cytotoxicity and apoptosis. Green coffee

Lampiran3. Gambar biji Kopi (*Coffea* Sp.)

Gambar	Keterangan
	Biji Kopi (<i>Coffea</i> Sp.) (Mpapa, 2019)
	Kopi Robusta (<i>Coffea canephora</i>) (Mpapa, 2019)
	Kopi arabika (<i>Coffea Arabica</i>) (Mpapa, 2019)

M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sitti Marwah Sain yang akrab disapa Marwah. Dilahirkan di Luwuk Banggai, pada tanggal 05 september 1998. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak M. Sain, dan ibu Syafwa.

Dia memulai pendidikannya di RA. As'adiyah No.3 Belawa pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2006, kemudian melanjutkan studinya di MIA NO.1 Puteri Belawa tahun 2006 sampai tahun 2011, lalu melanjutkan studinya di SMP Negeri 1 Belawa pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan studinya di MAN Wajo dan dia berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2017.

Sekarang, penulis merupakan salah seorang Mahasiswi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di UIN Alauddin Makassar 2017 yang insyaa Allah akan segera Lulus. Hal ini merupakan suatu kebanggaan yang sangat besar bagi penulis karena penulis memang sudah bercita-cita menjadi seorang farmasis. Semoga kesuksesan akan diraihinya kelak. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR