

**IDENTIFIKASI DAN KARAKTERISASI ISOLAT FRAKSI AKTIF  
ANTIOKSIDAN RIMPANG LEMPUYANG GAJAH  
(*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi  
Jurusan Farmasi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Oleh:**

**SOFHIA NURAINI ZAHRA**

**70100117038**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sofhia Nuraini Zahra  
NIM : 70100117038  
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 10 Februari 2000  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Syech Yusuf Kompleks Kodam Katangka Blok D-12,  
Kota Makassar  
Judul : Identifikasi dan Karakterisasi Isolat Fraksi Aktif  
Antioksidan Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber  
zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 16 Februari 2022

Penulis,



**Sofhia Nuraini Zahra**

NIM: 70100117038


## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Identifikasi dan Karakterisasi Isolat Fraksi Aktif Antioksidan Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.)**” yang disusun oleh **Sofhia Nuraini Zahra, NIM. 70100117038**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 16 Februari 2022 M** yang bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

**Gowa, 16 Februari 2022 M**  
**15 Rajab 1443 H**

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes.  
Sekretaris : Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.  
Pembimbing I : Haeria, S.Si., M.Si.  
Pembimbing II : Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M.Si.  
Penguji I : Apt. Alwiyah Nur Syarif, S.Farm., M.Si.  
Penguji II : Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, LC., M.A.



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

**Diketahui oleh:**

**Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**



**Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes**  
**NIP. 19800701200604 2 002**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Identifikasi dan Karakterisasi Isolat Fraksi Aktif Antioksidan Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.)”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis ucapkan pada suri tauladan umat muslim yakni Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Skripsi ini diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam prosesnya, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa hambatan yang menyertai untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Namun, dengan tekad dan semangat yang penulis punya serta dukungan berupa doa dan motivasi dari keluarga dan teman-teman sekitar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang sangat berharga dan berperan penting dalam hidup penulis yakni kedua orang tua yang tercinta, ayahanda Catur Nugroho Widhy, S.E., dan Ibunda tersayang Dra. Harifah Nurni, yang tidak pernah berhenti dalam mendoakan serta memotivasi penulis untuk bisa bertahan dalam melewati tahapan penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Fachrurrozy dan Alya Soraya Anjani sebagai saudara dan saudari yang telah membantu dalam mendengarkan keluh kesah penulis serta kucing kesayangan penulis yaitu Dudung, Diding, Abu dan Mumun yang berperan besar dalam menghibur penulis.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut mendukung proses penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yakni:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D. yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag. sebagai Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M. Hum. sebagai Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag. sebagai Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M. Kes.,Sp. A. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Ibu Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S. Si., M. Si. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
8. Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, S. KM., MARS. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
10. Bapak Apt. Andi Asrul Ismail, S. Farm., M. Sc. yang merupakan Ketua Jurusan Farmasi dan Ibu Apt. Syamsuri Syakri, S. Farm., M. Si. sebagai Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

11. Ibu Haeria, S.Si., M. Si. yang merupakan Pembimbing Pertama penulis yang senantiasa mengarahkan, mendukung dan memberi masukan baik selama penelitian maupun selama proses penyelesaian skripsi ini
12. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. sebaga Pembimbing Kedua yang senantiasa membantu penulis dalam memahami dan menyelesaikan penelitian hingga mampu menyusun skripsi ini dengan baik dan benar
13. Ibu Apt. Alwiyah Nur Syarif, S.Farm., M.Si. yang merupakan Penguji Kompetensi yang senantiasa memberikan kritik serta saran yang membangun dan bermanfaat sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini
14. Ibu Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, LC., M. A. sebagai Penguji Agama yang banyak memberikan masukan serta pengarahan bagi penulis untuk melengkapi kekurangan yang ada.
15. Ibu Apt. Nur Azizah Syahrana, S. Farm., M. Farm.F sebagai Pelaksana Ujian Akhir yang sangat berkontribusi dalam memudahkan penulis untuk menyelenggarakan ujian akhir dalam proses perolehan gelar sarjana
16. Bapak dan Ibu dosen yang telah berperan besar dalam mengarahkan penulis dalam memperoleh ilmu serta minat di bidang farmasi tulus dan ikhlas dalam membagi seluruh ilmunya, semoga Allah SWT. membalas jasa-jasa beliau. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis
17. Kepada Laboran Laboratorium Kimia Organik, Laboratorium Kimia Anorganik dan Laboratorium Kimia Instrumen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang selalu dapat diandalkan dalam memberi masukan khususnya terkait penelitian laboratorium

18. Kepada teman-teman penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

19. Kepada teman-teman, saudara tak sedarah, sahabat seperjuangan di Jurusan Farmasi 2017, Kovalen, yang tiada henti-hentinya mendukung dan menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik serta teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan, semoga kebaikan selalu menyertai kalian

Penulis berharap semoga apa yang penulis kerjakan dapat menjadi motivasi dalam menyusun ide-ide baru sehingga lahir beberapa penelitian di bidang farmasi yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan khususnya bagi masyarakat. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT., Aamiin Allahumma Aamiin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gowa, 16 Februari 2022

Penulis




**Sofhia Nuraini Zahra**

NIM: 70100117038

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	9
A. Uraian Sampel.....	9
B. Metode Preparasi Sampel.....	12
C. Radikal Bebas.....	21
D. Antioksidan .....	22
E. Tinjauan Islam.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33

C. Sampel.....	33
D. Alat dan Bahan.....	34
E. Prosedur Kerja.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Hasil Penelitian .....	39
B. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN.....	68
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	86



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Partisi N-heksan Rimpang Lempuyang Gajah .....	39
Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia Rimpang Lempuyang Gajah.....	39
Tabel 3. Analisis Noda Lempeng KLT .....	41
Tabel 4. Analisis Penampakan Noda Setelah Ditetesi H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 10% .....	42
Tabel 5. Analisis Penampakan Noda dengan Aktivitas Antioksidan.....	43
Tabel 6. Hasil Analisis Spektrum FTIR Fraksi N-heksan Rimpang Lempuyang Gajah .....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rimpang Lempuyang Gajah.....	9
Gambar 2. Mekanisme Aksi Antioksidan yang Berasal dari Dalam Tubuh .....	24
Gambar 3. Identifikasi Lempeng KLT pada UV 254 nm .....	40
Gambar 4. Identifikasi Lempeng KLT pada UV 366 nm .....	40
Gambar 5. Penampakan Noda Setelah Ditetesi H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 10% .....	41
Gambar 6. Penampakan Noda Setelah Ditetesi DPPH .....	42
Gambar 7. Penampakan Noda Setelah Dielusi dan Ditetesi DPPH.....	43
Gambar 8. Spektrum FTIR Fraksi 2 (12 : 1).....	43
Gambar 9. Spektrum FTIR Fraksi 3 (10 : 1).....	44
Gambar 10. Spektrum FTIR Fraksi 4 (8 : 1).....	44
Gambar 11. Spektrum FTIR Fraksi 5 (8 : 2).....	45
Gambar 12. Spektrum FTIR Fraksi 6 (4 : 2).....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja .....	68
Lampiran 2. Perhitungan Rendemen dan Pembuatan Pereaksi.....	75
Lampiran 3. Perhitungan Nilai Rf.....	77
Lampiran 4. Gambar Penelitian .....	81



## ABSTRAK

Nama : SOFHIA NURAINI ZAHRA  
NIM : 70100117038  
Jurusan : FARMASI  
Judul Skripsi : IDENTIFIKASI DAN KARAKTERISASI ISOLAT FRAKSI  
AKTIF ANTIOKSIDAN RIMPANG LEMPUYANG GAJAH  
(*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.)

---

Penyakit degeneratif merupakan masalah utama yang diderita oleh masyarakat modern. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah radikal bebas yang masuk dalam tubuh sehingga menyebabkan kerusakan pada sel. Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.) merupakan salah satu jenis varietas jahe yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu bahan dalam obat tradisional. Bagian rimpang lempuyang gajah diketahui memiliki berbagai jenis metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antioksidan yang bekerja dengan menetralkan radikal bebas sehingga lebih stabil dalam tubuh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui karakter metabolit sekunder larut n-heksan pada rimpang lempuyang gajah yang berpotensi sebagai antioksidan aktif sehingga dapat digunakan sebagai landasan awal dalam sintesis obat baru yang berfokus pada pengobatan penyakit degeneratif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni identifikasi senyawa menggunakan KLT melalui penampakan noda pada UV 254 dan 366 nm serta penampak bercak H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10%. Skrining aktivitas antioksidan dengan metode KLT-bioautografi menggunakan DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhidrazil) dan dikarakterisasi menggunakan spektrofotometri FTIR (*Fourier Transform Infrared*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rimpang lempuyang gajah memiliki kandungan flavonoid, alkaloid, steroid dan terpenoid yang memiliki potensi sebagai antioksidan pada lima fraksi dengan kepolaran yang berbeda yakni dengan perbandingan eluen n-heksan : etil asetat (12:1, 10:1, 8:1, 8:2 dan 4:2). Karakterisasi yang dilakukan dengan FTIR diketahui cukup memberikan gambaran susunan gugus fungsi dari senyawa yang ada pada tiap fraksi sehingga cukup baik digunakan dalam memperoleh karakter dari senyawa antioksidan yang terkandung dalam sampel.

**Kata Kunci:** *Antioksidan, FTIR, KLT, Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.

## ABSTRACT

Name : SOFHIA NURAINI ZAHRA

NIM : 70100117038  
Department : PHARMACY  
Title : IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF  
ANTIOXIDANT ACTIVE FRACTION ISOLATES OF  
LEMPUYANG GAJAH RHIZOME (*Zingiber zerumbet* (L.)  
Roscoe ex Sm.)

---

Degenerative disease is a major problem suffered by modern people. This is caused by the increased number of free radicals that caused damage to human cells. Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.) is one of ginger variety that is often used by Indonesian people as an ingredient in traditional medicine. Lempuyang gajah rhizome is known to have various types of secondary metabolites that have the potential as antioxidants that work by neutralizing free radicals and make them more stable in human body.

This study was designed with the aim to identify and characterize secondary metabolites those soluble in n-hexane which has the potential as an active antioxidant and hopefully it can be used as an initial basis especially for the synthesis of new drugs that focus on treating degenerative diseases.

The method used were metabolites identification in lempuyang gajah rhizome using TLC with spots analysis on UV 254 and 366 nm, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10% spraying. TLC-bioautography to determine the antioxidant activity using DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil) and fraction characterized using FTIR (Fourier Transform Infrared) spectrophotometry.

The results showed that lempuyang gajah rhizome contain flavonoids, alkaloids, steroids and terpenoids that have potential as antioxidants in five fractions with different polarities, with the ratios of n-hexane : ethyl acetate (12:1, 10:1, 8:1, 8:2 and 4:2). The characterization carried out by FTIR is known to be sufficient to provide an overview of the composition of the functional groups of the compounds present in each fraction so that it is good enough to be used in obtaining the character of the antioxidant compounds contained in lempuyang gajah sample.

**Keywords:** *Antioxidant, FTIR, TLC, Zingiber zerumbet* (L.) *Roscoe ex Sm.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Seiring perkembangan zaman, intensitas kemunculan penyakit mematikan khususnya penyakit degeneratif seperti kanker, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, hingga stroke semakin meningkat. Salah satu penyebab penting timbulnya penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh adanya stres oksidatif. Stres oksidatif dapat terjadi akibat banyaknya radikal bebas yang bersifat toksik dan reaktif sehingga mengganggu metabolisme sel dalam tubuh. Asap rokok, sinar UV, maupun zat kimia yang didapatkan dari luar tubuh dapat menjadi sumber radikal bebas. Tidak hanya dari luar, radikal bebas juga dapat diproduksi dari dalam tubuh (Werdhasari, 2014).

*Species Oxygen Reactive* (ROS) adalah radikal bebas turunan oksigen yang diperoleh dari tubuh manusia. Akibat jumlah ROS dan antioksidan yang berbanding terbalik memicu terjadinya stres oksidatif sehingga menjadi awal timbulnya penyakit. Pada Studi Kesehatan Dasar 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dilaporkan terdapat prevalensi kanker yang meningkat dari 1,4% menjadi 1,8%, prevalensi hipertensi meningkat dari 25,8% menjadi 34,1% dan prevalensi diabetes meningkat dari 6,9% menjadi 8,5% (Sunarto, dkk., 2020).

Secara alami, tubuh memproduksi senyawa antioksidan endogen sebagai pertahanan dalam melawan efek radikal bebas seperti SOD, glutathione, hyperplasmin, transferin dan ferritin. Paparan radikal bebas dari luar tubuh secara terus menerus dapat berujung pada ketidakseimbangan jumlah antioksidan dan radikal bebas dalam tubuh sehingga diperlukan antioksidan eksogen yang

mendukung pertahanan dan perlindungan dari radikal bebas (Rudiana, dkk., 2018).

Saat ini antioksidan sintetik banyak digunakan sebagai zat tambahan dalam makanan (contohnya BHA dan BHT), namun terdapat dampak negatif yang ditimbulkan bagi kesehatan apabila dikonsumsi melebihi batas yang dianjurkan seperti gangguan pada usus, hati, ginjal hingga keracunan pada tubuh. Sebagai gantinya, antioksidan alami yang berasal dari tumbuhan dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai sumber antioksidan eksogen jangka panjang. Beberapa penemuan pun dilakukan demi mendapatkan variasi senyawa kimia dengan aktivitas antioksidan dari tumbuh-tumbuhan di berbagai belahan dunia (Sari, 2016).

Di Indonesia, terdapat sekitar 1.260 jenis tumbuhan berkhasiat obat yang dapat menghasilkan metabolit sekunder, dimana masing-masing metabolit tersebut memiliki struktur dan peranan yang berbeda-beda. Pada dasarnya, metabolit sekunder digunakan oleh tumbuhan sebagai alat pertahanan diri atau menjaga eksistensi tumbuhan tersebut di lingkungannya. Flavonoid, steroid, alkaloid, saponin, terpenoid dan tannin merupakan beberapa senyawa metabolit sekunder yang umum ditemukan pada tumbuhan dan dapat dimanfaatkan dalam pengobatan (Ergina, dkk., 2014).

Tumbuhan dengan sifat obat telah banyak ditemukan mengandung berbagai metabolit sekunder yang ada sebagai antioksidan untuk mekanisme pertahanan. Kemampuan antioksidan tersebut berhubungan dengan senyawa yang mampu melindungi sistem biologis terhadap potensi bahaya efek dari reaksi radikal bebas termasuk spesi oksigen reaktif. Beberapa senyawa yang terkandung dalam tumbuhan Zingiberaceae seperti flavonoid dan terpenoid memiliki aktivitas sebagai antioksidan (Wandita, dkk., 2018).

Tumbuhan dengan famili Zingiberaceae sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pembuatan obat tradisional dan rempah masakan seperti kunyit, lengkuas dan jahe. Pada suku Zingiberaceae terdapat genus tunggal Zingiber yang memiliki lebih dari satu spesies. Salah satu spesies Zingiber yang sejak dahulu sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan untuk jamu tradisional yakni lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) (Silalahi, 2018).

Lempuyang gajah terutama pada bagian rimpangnya secara luas digunakan dalam pengobatan tradisional sejalan dengan khasiatnya secara biologis dan farmakologis. Rimpang lempuyang gajah telah banyak digunakan dengan efek terapeutik yang luar biasa untuk pengobatan tradisional dalam mengatasi peradangan, diare, kram perut, infeksi bakteri, demam, perut kembung, alergi dan keracunan (Koga, dkk., 2016).

Ekstrak lempuyang gajah diketahui memiliki aktivitas antioksidan. Dalam penelitian terkait aktivitas antioksidan dan sitotoksitas rimpang lempuyang gajah oleh Nag, dkk. (2013), dilakukan evaluasi penentuan fenolik total (metode Folin Ciocalteu), kandungan flavonoid (kompleksasi dengan aluminium klorida) dan aktivitas antioksidan (DPPH dan radikal bebas hidroksil) dari ekstrak etanol rimpang jahe liar (*Zingiber zerumbet*). Aktivitas antioksidan menunjukkan nilai  $IC_{50}$  sebesar 417,14 (asam askorbat: 2,71  $\mu\text{g/ml}$ ) dan 13,24 mg/ml (kuarsetin: 2,46  $\mu\text{g/ml}$ ) pada pengujian dengan DPPH dan hidroksil. Adanya jumlah kaempferol yang cukup besar dilaporkan memiliki aktivitas pembersihan radikal hidroksil yang kuat.

Senyawa utama yang terdapat dalam lempuyang gajah yakni zerumbone juga diketahui memiliki aktivitas antioksidan. Hal ini telah dilaporkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tian, dkk. (2020), dimana nilai  $IC_{50}$  dari DPPH pemulungan radikal bebas kapasitas masing-masing adalah  $90293,12 \pm 3529,38$

$\mu\text{g/mL}$  untuk zerumbone, yang jauh lebih tinggi dari BHT ( $29,25 \pm 1,87 \mu\text{g/mL}$ ) dan asam askorbat ( $1,57 \pm 0,23 \mu\text{g/mL}$ ).

Dalam pandangan Islam, Allah SWT. dengan jelas telah menunjukkan betapa banyaknya tumbuh-tumbuhan bermanfaat yang ia ciptakan. Berbagai bentuk dan ukuran tumbuhan serta kompleksitas yang dimiliki oleh suatu tumbuhan sehingga membedakan ia dengan tumbuhan yang lain, baik itu ciri-ciri ataupun kandungan dalam tumbuhan tersebut, telah membuktikan betapa besarnya tanda-tanda kekuasaan yang ia miliki termasuk menciptakan tumbuhan lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.). Sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah SWT. yang telah dianugrahi akal, sudah sepantasnya kita menggunakan akal tersebut untuk berpikir dan mengkaji lebih dalam mengenai petunjuk-petunjuk yang Allah SWT. berikan baik dalam Al-Qur'an maupun lewat hadis-hadis yang ada sehingga manusia dapat lebih memahami dan bersyukur dalam memaknai kehidupan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa rimpang lempuyang gajah memiliki potensi sebagai antioksidan, namun dalam penelitian yang akan dilakukan lebih fokus dalam mengidentifikasi dan menentukan karakter dari senyawa antioksidan yang diambil dari ekstrak lempuyang gajah. Diharapkan dari penelitian ini, dapat dikembangkan obat baru yang dapat memberikan manfaat yang luas sebagai antioksidan bagi masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.) memiliki aktivitas antioksidan?
2. Apa golongan senyawa kimia yang memiliki aktivitas antioksidan dalam ekstrak lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.)?

3. Bagaimana karakteristik senyawa antioksidan dalam rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.) dengan menggunakan metode KLT dan FTIR?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### 1. Definisi Operasional

- a. Identifikasi senyawa ialah metode untuk mengetahui gambaran awal mengenai kandungan senyawa yang ada pada suatu tumbuhan yang dapat diperoleh dengan metode KLT (Kromatografi Lapis Tipis).
- b. Karakterisasi senyawa adalah metode yang dilakukan untuk menentukan ciri-ciri ataupun sifat dari suatu senyawa yang diteliti sehingga diketahui manfaatnya. Sifat dari senyawa akan diperoleh dalam bentuk gugus fungsi dengan bantuan instrumen Spektrofotometer FTIR (*Fourier Transform Infrared*).
- c. Senyawa antioksidan merupakan senyawa dengan struktur molekul yang dapat dengan bebas memberikan elektron ke molekul radikal bebas dan dapat memutus reaksi berantai radikal bebas.

#### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi identifikasi golongan senyawa pada ekstrak hasil partisi n-heksan serta penggunaan instrumen dalam karakterisasi senyawa yakni menggunakan Spektrofotometer FTIR (*Fourier Transform Infrared*).

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nag, dkk. (2013), dilakukan pengujian pada aktivitas antioksidan dan sitotoksisitas rimpang lempuyang gajah. Ekstrak sampel diperoleh dengan maserasi. Selanjutnya pada ekstrak dilakukan

penentuan kandungan polifenol total (TPC) dan penentuan total flavonoid (TFC), diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis. Hasilnya, diketahui bahwa TPC dari lempuyang gajah yaitu  $33,64 \pm 3,22$  mg GAE/g, sementara itu TFC lempuyang gajah ialah  $26,79 \pm 0,68$  mg quercetin equivalent/g (QUE/g). Dilakukan pula uji efek pembersihan radikal bebas DPPH juga dilakukan dengan asam askorbat sebagai kontrol positif, nilai  $IC_{50}$  lempuyang gajah yang diperoleh ialah  $417,14 \mu\text{g/ml}$ , lebih lemah efeknya dibandingkan asam askorbat yang memiliki nilai  $IC_{50}$   $2,71 \mu\text{g/ml}$ . Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat aktivitas antioksidan pada ekstrak lempuyang gajah yang diujikan.

Pada jurnal yang berjudul “*In Vitro Antioxidant and Antiglycation Activity of Zingiber zerumbet (Wild Zinger) Rhizome Extract*” oleh (Bhavesh, dkk., 2013), pengujian kandungan fenolik total, flavonoid total, uji DPPH, pemulungan radikal oksida nitrat serta hidrogen peroksida dilakukan pada ekstrak etil asetat, dengan menggunakan asam askorbat sebagai perbandingan. Dari penelitian didapatkan hasil yaitu kandungan fenolik total lempuyang gajah sebesar  $331,93 \pm 1,23$  mg GAE/g dan kandungan flavonoid total sebesar  $198 \pm 2,65$  mg QUE/g. Aktivitas antioksidan dari lempuyang gajah yang diuji dengan metode DPPH memperoleh nilai  $IC_{50}$  yaitu  $117,65 \pm 1,45 \mu\text{g/ml}$  dengan standar  $36,26 \pm 0,43 \mu\text{g/ml}$ . Nilai  $IC_{50}$  dari uji pemulungan radikal bebas superoksida dan hidroksil masing-masing  $185,49 \pm 0,97 \mu\text{g/ml}$  (standar  $27,25 \pm 0,56 \mu\text{g/ml}$ ) dan  $39,90 \pm 0,77 \mu\text{g/ml}$  (standar menggunakan quercetin  $85,01 \pm 0,33 \mu\text{g/ml}$ ). Nilai  $IC_{50}$  uji pemulungan radikal oksida nitrat dan hidrogen peroksidan masing-masing ialah  $89,87 \pm 1,02 \mu\text{g/ml}$  (standar  $48,73 \pm 0,85 \mu\text{g/ml}$ ) dan  $144,71 \pm 3,75 \mu\text{g/ml}$  (standar  $94,47 \pm 1,05 \mu\text{g/ml}$ ). Dari berbagai pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekstrak *Zingiber zerumbet* memiliki kemampuan sebagai antioksidan dengan

mendonasikan proton pada radikal bebas, mungkin karena adanya kandungan fenolik dan flavonoid yang tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mokhtar, dkk. (2018), pengujian kandungan total fenolik (TPC), total flavonoid (TFC) dan aktivitas pemulungan radikal bebas (RSA) dilakukan pada rimpang lempuyang gajah. Ekstraksi dilakukan pada dua sampel yang sama dengan masing-masing pelarut yang digunakan yaitu air (menggunakan *Subcritical Water Extraction* (SWE)) dan etanol (menggunakan sokhlet). Nilai  $IC_{50}$  dari ekstraksi yang menggunakan etanol yaitu TPC  $8,376 \pm 0,020$  mg GAE/g; TFC  $6,948 \pm 0,012$  mg QUE/g; dan RSA  $60,453 \pm 0,008$  % hambatan. Sedangkan untuk ekstraksi yang menggunakan SWE, diperoleh nilai TPC  $18,5233 \pm 0,0520$  mg GAE/g; TFC  $2,3403 \pm 0,0453$  mg QUE/g; dan RSA  $83,924 \pm 0,0683$  % hambatan.

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Untuk memperoleh senyawa antioksidan dari hasil isolasi ekstrak lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.)
- b. Untuk mengetahui golongan senyawa kimia yang memiliki aktivitas antioksidan pada ekstrak lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.)
- c. Untuk menentukan karakteristik senyawa antioksidan yang telah diidentifikasi menggunakan metode KLT dan spektrofotometri FTIR (*Fourier Transform Infrared*)

##### **2. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data ilmiah atau rujukan tentang senyawa yang berperan sebagai antioksidan pada rimpang

lempuyang gajah dimana kedepannya dapat dikembangkan menjadi sediaan farmasi yang bermanfaat bagi masyarakat.



## BAB II TINJAUAN TEORITIS

### A. Uraian Sampel

#### 1. Klasifikasi Lempuyang Gajah

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledonae
Ordo	: Zingiberales
Famili	: Zingiberaceae
Genus	: Zingiber
Spesies	: <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.

(Lianah, 2019)



**Gambar 1.** Rimpang Lempuyang Gajah (Zakaria, dkk., 2011)

## 2. Deskripsi dan Morfologi Lempuyang Gajah

Lempuyang gajah atau yang lebih dikenal sebagai jahe liar adalah tanaman berumpun dan tanaman terna tahunan (*perennial*). Batangnya semu, dapat mencapai tinggi 1-2 meter, berwarna hijau, terdiri atas beberapa pelepah daun dan dapat mencapai tinggi 1-2. Daun pada lempuyang gajah ialah daun tunggal berbentuk lanset dan memanjang, yang memiliki susunan berseling pada kanan kiri batang. Ujung daun meruncing (*acuminatus*), pangkal daun runcing (*acutus*), dan tepi daun rata. Panjang daun mencapai 25-40 cm dan lebar daun mencapai 10-15 cm. Jumlah helai daun 3-7 cm tiap batang dan berwarna hijau pucat hingga gelap, pertulangan daun menyirip, tangkai daun pendek dan berbulu halus. Bunga pada lempuyang gajah muncul dari rimpang, bunga berbentuk *pinecone*, tangkai bunga panjangnya  $\pm 12$  cm, bunga berwarna merah dan kelopak saling lepas satu sama lain. Rimpang utama lempuyang gajah berukuran cukup besar dan kuat serta bercabang, dagingnya berwarna kuning kecoklatan dan lebih pucat dibandingkan rimpang lempuyang wangi, bagian luar rimpang berwarna coklat (Lianah, 2019).

## 3. Kandungan Lempuyang Gajah

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dai, dkk. (2013) sebanyak 46 senyawa dapat diidentifikasi dari minyak atsiri yang terkandung dalam rimpang lempuyang gajah, mewakili 99,6% dari kandungan minyak. Monoterpenoid (76,1%) merupakan senyawa utama yang paling banyak terkandung dalam minyak atsiri, diikuti oleh (Z)-citral (26,1%), camphene (16,3%), sabinene (14,6%), zingiberene (7,2%) dan lavandulyl asetat (6,7%) dan zerumbone (1,2%). Lempuyang gajah banyak tumbuh di beberapa negara dan diketahui bahwa terdapat perbedaan persentase senyawa utama dari minyak esensial *Zingiber zerumbet* ditemukan bervariasi dari satu lokasi ke lokasi geografis lainnya. Senyawa utama pada rimpang lempuyang gajah di India yaitu zerumbone (76,3%

- 84,8%); di Malaysia ditemukan zerumbone (68,9%); di Bangladesh ditemukan senyawa utama zerumbone (46,8%), b-caryophyllene (19,0%), 1,5,5,8-tetramethyl-12-oxabicyclo[9.1.0]-dodeca-3,7-dien (4,3%). Sementara itu, minyak atsiri dari lempuyang gajah yang diteliti di Vietnam mengandung senyawa utama (Z)-nerolidol (16,8% - 22,3%) pada bagian batangnya; zerumbone (21,3% - 2,4%), trans-phytol (7,0% - 12,6%),  $\beta$ -caryophyllene (10,4% - 11,2%) pada bagian daun; dan (Z)-nerolidol (36,3%),  $\beta$ -caryophyllene (13,2%) pada bagian bunganya.

Pada penelitian lain yang menggunakan sampel lempuyang gajah yang diperoleh di Indonesia melaporkan bahwa terdapat beberapa senyawa yang terkandung pada minyak atsiri rimpang lempuyang gajah yakni  $\alpha$ -tujene (1,70%);  $\alpha$ -pinene (1,16%); camphene (0,98%); sabinene (32,96%);  $\delta$ -myrcene (13,27%);  $\alpha$ -terpinene (0,71%); limonene (0,86%);  $\gamma$ -terpinene (1,24%); kamfer (2,91%); linalool (0,77%); 1,8-sineol (4,23%);  $\delta$ -gurjunene (1,50%); trans-caryophyllene (3,73%);  $\alpha$ -humulene (2,72%); germacrene (3,04%); dan zerumbone (11,05%) (Batubara, dkk., 2013).

#### 4. Manfaat Lempuyang Gajah

Nenek moyang kita mengenal lempuyang sebagai bahan obat yang dapat dibuat menjadi jamu tradisional. Rimpang lempuyang muda, khususnya lempuyang gajah biasa dimanfaatkan sebagai lalapan. Banyak masyarakat yang meyakini bahwa rimpang lempuyang gajah memiliki berbagai manfaat, diantaranya yakni sebagai tonikum, obat luar, karminativa, penambah nafsu makan, stomakik, dan stimulant (Rejeki, dkk., 2017).

Dalam beberapa penelitian diketahui bahwa rimpang lempuyang gajah mempunyai aktivitas sebagai antiinflamasi, analgetik, antitumor, pengobatan luka

memar dari pukulan, sebagai ramuan untuk sakit perut, sebagai obat bius sakit gigi, serta untuk panu dan kurap (Lallo, dkk., 2018).

Lempuyang gajah memiliki manfaat yang lebih luas sebagai tanaman herbal khususnya pada bagian rimpang dapat digunakan untuk mengobati luka, sakit perut, batuk, asma, demam, wasir, kusta dan penyakit kulit lainnya. Air rebusan rimpang juga telah digunakan sebagai obat cacangan pada anak-anak (Chaudhuri, dkk., 2018).

## **B. Metode Preparasi Sampel**

Isolasi merupakan teknik pemisahan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam suatu bahan alam. Isolasi senyawa pada bahan alam terdiri dari beberapa tahap mulai dari ekstraksi, fraksinasi, kemudian pemurnian dan identifikasi (Ilyas, 2013).

### **1. Ekstraksi**

Tahap awal untuk mendapatkan bahan alam yakni melalui ekstraksi. Ekstraksi adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh materi yang terkandung dalam makhluk hidup baik hewan, tumbuhan ataupun mikroba. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perolehan materi alam, maka dikembangkan beberapa metode ekstraksi yang dapat disesuaikan dengan keinginan peneliti. Pemilihan metode yang sesuai dikaitkan dengan sifat senyawa ataupun bahan alam itu sendiri (Firdaus, dkk., 2013).

Secara umum, senyawa aktif yang terkandung dalam bahan alam dapat dikelompokkan menjadi dua yakni minyak atsiri dan non minyak atsiri (contohnya flavonoid). Tiap kelompok senyawa memiliki perbedaan struktur kimia yang mengakibatkan perbedaan dalam sifat masing-masing senyawa seperti stabilitas terhadap udara, cahaya, pemanasan serta, kelarutannya. Dengan diketahuinya jenis senyawa aktif yang terdapat dalam suatu bahan alam maka pemilihan cairan

penyari dapat lebih mudah serta proses ekstraksi yang dapat dilakukan dengan lebih cepat (Yasni, 2013).

Secara garis besar, proses ekstraksi terdiri atas beberapa tahapan yaitu: (Firdaus, dkk., 2013)

- a. Pengeringan
- b. Penghancuran bahan atau homogenisasi bagian tanaman
- c. Pemilihan pelarut
- d. Pemilihan metode ekstraksi

Pilihan utama cairan penyari yang digunakan dalam ekstraksi yakni metanol, etanol 70%, dan etanol 96%. Pelarut-pelarut ini memiliki daya ekstraksi yang luas, semua metabolit sekunder dapat tersari, sehingga sering digunakan dalam proses ekstraksi dimana belum diketahui struktur senyawa metabolit sekundernya. (Azis, 2014).

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam ekstraksi, diantaranya yaitu:

- a. Maserasi

Metode maserasi ialah salah satu metode ekstraksi dengan cara merendam sampel ke pelarut yang sesuai. Perendaman sampel pada pelarut mengakibatkan perbedaan tekanan di dalam dan luar sel sehingga dinding sel pecah dan metabolit sekunder yang terkandung dapat terlarut di cairan penyari. Dalam maserasi, semakin lama sampel melakukan kontak dengan cairan penyari maka semakin banyak metabolit yang terlarut akibat banyaknya dinding sel yang pecah. Proses ini akan berlanjut sampai terciptanya keseimbangan intrasel dan ekstrasel pada sampel. Metode maserasi memiliki keuntungan yaitu zat aktif yang diperoleh tidak akan rusak, namun kerugiannya yakni dibutuhkan cairan penyari yang cukup banyak dalam prosesnya (Chairunnisa, dkk., 2019).

#### b. Perkolasi

Perkolasi adalah salah satu metode ekstraksi yang dilakukan dengan melewatkan cairan penyari pada sampel sehingga senyawa organik akan ikut terbawa bersama dengan cairan tersebut (Hasrianti, dkk., 2016).

Proses ekstraksi dilakukan dalam perkolator, sampel dibasahi dengan perlahan dengan cairan penyari yang ditambahkan pada bagian atas sampel dan dibiarkan menetes perlahan di bagian bawah. Kelebihan dari penggunaan metode ini yaitu sampel bahan alam senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area serta membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya (Mukhriani, 2014).

#### c. Sokletasi

Metode ekstraksi ini dilakukan dengan penempatan serbuk simplisia dalam sarung selulosa (dapat diganti dengan kertas saring) pada klonsong yang diletakkan di bagian bawah kondensor dan di bagian atas labu. Cairan penyari yang sesuai kemudian dituangkan ke dalam labu kemudian diatur suhu penangas dengan suhu yang lebih rendah dari suhu reflux. Metode soxhlet memiliki keuntungan yakni proses ekstraksi yang berulang memungkinkan sampel dapat terekstraksi oleh cairan penyari hasil kondensasi pada reflux sehingga pelarut yang digunakan lebih hemat dan tidak membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya. Kerugian dari metode ini ialah senyawa yang memiliki sifat tidak stabil terhadap perubahan suhu dapat mengalami degradasi terus berada pada titik didih (Mukhriani, 2014).

#### d. Refluks

Refluks merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan dalam prosesnya. Pemanasan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses ekstraksi

dimana senyawa yang terkandung dapat lebih mudah ditarik oleh cairan penyari. Prinsip dalam metode ekstraksi ini ialah menguapkan pelarut pada suhu tinggi, uap dari pelarut yang mengembun pada dinding dalam kondensor akan menetes turun kembali ke wadah. Hasil ekstraksi yang didapatkan kemudian disaring dan dipisahkan menggunakan rotary evaporator (Susanty, dkk., 2016).

Kelebihan yang dimiliki metode ini ialah penggunaan waktu yang singkat dan hemat dalam penggunaan pelarut. Disamping kelebihan tersebut, kekurangan yang dimiliki metode ini ialah sampel yang digunakan harus tahan pada suhu panas (Kiswando, 2011).

e. *Ultrasound-Assisted Solvent Extraction*

Seperti namanya, teknik ekstraksi ini merupakan teknik yang telah dimodifikasi dengan penambahan ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz). Penambahan ultrasound dimaksudkan untuk memberi tekanan mekanik pada sel-sel di simplisa sehingga menghasilkan ruang antar sel dan senyawa kimia pun dapat diperoleh dengan mudah. Teknik ekstraksi ini dilakukan dengan memasukkan wadah yang berisi sampel ke dalam wadah ultrasound. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi (Mukhrani, 2014).

2. Fraksinasi dan pemurnian

Ekstrak yang diperoleh masih berupa bahan alam kasar yang terdiri atas berbagai elemen dan perlu dilakukan pemisahan antar komponennya melalui suatu metode yang disebut sebagai fraksinasi. Fraksinasi merupakan metode pemisahan komponen berdasarkan perbedaan polaritas dan ukuran molekul dari elemen penyusun yang terkandung dalam ekstrak. Fraksi-fraksi yang telah dipisahkan akan memiliki sifat fisik yang berbeda. Di awal fraksinasi tidak disarankan membuat banyak fraksi dengan alasan ditakutkan bahwa akan terjadi penyebaran

senyawa target dengan konsentrasi rendah di berbagai fraksi tersebut (Firdaus, dkk., 2013).

Teknik kromatografi adalah teknik yang secara khusus dipakai dalam pemisahan senyawa dari kumpulan komponen kimia berdasarkan bentuk, muatan dan ukurannya. Konsep yang diterapkan dalam teknik kromatografi yakni penggunaan fase gerak dan fase diam. Fase gerak yang dimaksud ialah pelarut ekstraksi, sedangkan fase diam digunakan silika gel ataupun sephadex yang dicampur dengan kalsium sulfat sebagai pengikat. Silika gel digunakan dalam pemisahan gula, asam amino, alkaloid, lipid dan alkaloid. Sephadex dapat digunakan dalam pengisolasian asam amino dan protein. Aluminium berguna dalam pemisahan fenol, steroid, vitamin, alkaloid dan karoten. Bubuk selulosa digunakan dalam pemisahan alkaloid, asam amino dan pewarna makanan. Celite dapat bermanfaat dalam steroid ataupun kation organik. Terdapat bermacam-macam teknik kromatografi, meliputi kromatografi kertas (KKt), kromatografi lapis tipis (KLT), kromatografi kolom (KK), kromatografi cair (KC), kromatografi gas (KG), dan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) (Rabiu, dkk., 2020).

#### a. Kromatografi Lapis Tipis

Teknik kromatografi lapis tipis juga melibatkan penggunaan mekanisme adsorpsi untuk memisahkan suatu senyawa dari suatu campuran. Pemisahan didasarkan pada interaksi antara senyawa dalam campuran dan fase diam. Ini berlaku dalam pemisahan senyawa dengan berat molekul rendah. Fase diam biasanya 100 g silika gel yang dilarutkan dalam akuades untuk membuat bubur. Silika gel kemudian dituang ke dalam plat kaca dengan ukuran 20 cm × 20 cm hingga menghasilkan ketebalan 1,5 mm. Kemudian disimpan selama 1 jam pada suhu 105°C untuk memadat. Setelah itu, 10 mL ekstrak disuntikkan ke bagian

bawah piring dan dibiarkan menyebar. Pelat kemudian dengan hati-hati dimasukkan ke dalam ruang pemisah yang berisi fase gerak dan didiamkan selama 30 menit. Senyawa yang terkandung dalam campuran akan naik ke berbagai posisi di atas pelat berdasarkan kelarutannya. Setiap senyawa yang dipisahkan diidentifikasi dengan menghitung faktor retardasinya yaitu perbandingan jarak yang ditempuh oleh senyawa dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut dan membandingkannya dengan senyawa yang diketahui). Senyawa yang terlihat pada posisi berbeda diambil menggunakan spatula dan akhirnya diekstraksi kembali menggunakan berbagai pelarut. Keunggulannya antara lain memakan waktu lebih sedikit, menghasilkan bintik-bintik bening, dan stabil menjadi asam sebagai pelarut (Rabiu, dkk., 2020).

### 3. Identifikasi dan Karakterisasi Senyawa

Beberapa metode digunakan dalam identifikasi senyawa dari ekstrak tumbuhan obat yang dimana metode-metode tersebut dilakukan untuk mendeteksi gugus fungsi, adanya beberapa ikatan dan cincin, hidrogen dan pengaturan karbon serta mengetahui structural dari senyawa yang diinginkan. Teknik yang digunakan antara lain spektroskopi massa (MS), spektroskopi ultraviolet (UV), spektroskopi resonansi magnetik nuklir (NMR), dan spektroskopi inframerah (IR) (Rabiu, dkk., 2020).

#### a. Spektroskopi massa

Spektroskopi massa merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi berat molekul serta struktur kimia suatu senyawa. Teknik ini dapat diaplikasikan dalam identifikasi peptida dan oligonukleotida. Pertama-tama dilakukan penembakan elektron pada molekul organik yang kemudian mengubahnya menjadi energi ion bermuatan. Energi ionisasi elektron 70 eV pertama kali mendeteksi sinyal, selanjutnya spektrum yang tertangkap dicatat

sebagai presentase puncak. Suatu senyawa yang diidentifikasi dengan memplot massa ion yang terfragmentasi terhadap muatan ion individu sehingga diketahui berat molekul dan massa relatif molekulnya. Spektroskopi massa memberikan banyak informasi khususnya terkait molekul senyawa organik (Rabiu, dkk., 2020).

#### b. Spektroskopi ultraviolet

Struktur senyawa organik dapat ditentukan melalui interaksi antar molekulnya dengan sinar ultraviolet dan sinar tampak. Elektron-elektron dari molekul senyawa organik akan tereksitasi dari tingkat dasar ke tingkat energi tinggi apabila terkena sinar UV maupun sinar tampak, eksitasi elektron tersebut akan direkam dan ditampilkan dalam spektrum berbentuk dua dimensi dengan panjang gelombang sebagai absis dan absorbansi sebagai ordinatnya. Semakin sulit elektron bereksitasi maka panjang gelombang yang diabsorpsi semakin kecil, semakin sedikit elektron yang bereksitasi maka makin rendah absorbannya (Suhartati, 2017).

Metode spektroskopi ultraviolet dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai metabolit sekunder, contohnya tannin, fenol, antosianin dan pewarna polimer yang dapat ditemukan pada frekuensi tertentu sehingga sesuai untuk analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak tumbuhan. Terdapat frekuensi-frekuensi tertentu yang dapat mendeteksi metabolit sekunder yang terkandung dalam tanaman yakni antosianin (520 nm), flavonoid (320 nm), fenolik (280nm), dan asam fenolik (360 nm) (Rabiu, dkk., 2020).

Prinsip dari spektroskopi UV-Vis ialah radiasi pada rentang panjang gelombang 200-700 nm dilewatkan melalui suatu larutan senyawa. Elektron-elektron pada ikatan di dalam molekul menjadi tereksitasi sehingga menempati keadaan kuantum yang lebih tinggi dan dalam proses menyerap sejumlah energi

yang melewati larutan tersebut. Semakin longgar elektron tersebut ditahan didalam ikatan molekul, semakin panjang gelombang (energi lebih rendah) radiasi yang diserap (Watson, 2013).

Spektrum UV-Vis memiliki fungsi dalam penentuan struktur senyawa organik yakni menentukan jenis kromofor yang dimiliki oleh molekul yang sedang diteliti. Penting untuk dicermati ialah absorbansi panjang gelombang maksimum pada spektrum UV-Vis apabila melebar hingga menuju ke daerah sinar tampak, dapat diartikan bahwa kromofor mengandung ikatan rangkap terkonjugasi panjang atau kromofor berupa aromatik polisiklik. Sementara itu, jika panjang gelombang maksimum kurang dari 300 nm dan hanya memiliki satu pita atau beberapa pita, dapat diartikan bahwa kromofor memiliki dua atau tiga ikatan rangkap terkonjugasi (Suhartati, 2017).

c. Spektroskopi resonansi magnetik nuklir

Spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau *nuclear magnetic resonance spectroscopy* atau spektroskopi NMR merupakan teknik yang lebih menampakkan sifat fisik molekul bioaktif seperti jumlah dan susunan atom karbon, keberadaan isotop karbon, atom hidrogen, dan proton (Rabiu, dkk., 2020).

d. Spektroskopi inframerah

Spektroskopi inframerah merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui gugus fungsi dari metabolit sekunder yang terkandung dalam senyawa. Gugus fungsi, mencakup ikatan tunggal maupun ganda yang diidentifikasi dapat mencerminkan sifat kimia dan fisika dari senyawa tersebut. Identifikasi dilakukan dengan bantuan radiasi inframerah yang kemudian diserap dalam frekuensi tertentu. Umumnya, preparasi sampel berbentuk cairan diidentifikasi menggunakan pelat NaCl, sedangkan sampel berbentuk padat ditentukan menggunakan KBr yang digiling bersama dan dikompresi menjadi

pelet tipis. Hasilnya dicatat sebagai spektrum yaitu persentase transmitansi. Terakhir, spektra dianalisis; puncak yang diperoleh pada bilangan gelombang tertentu dibandingkan dengan acuan standar (Rabiu, dkk., 2020).

Prinsip dari spektrofotometri inframerah yaitu rentang radiasi elektromagnetik yang berkisar antara  $400\text{ cm}^{-1}$  dan  $4000\text{ cm}^{-1}$  (2500 dan 20000 nm) dilewatkan pada suatu sampel dan diserap oleh ikatan-ikatan molekul didalam sampel sehingga molekul tersebut meregang atau menekuk. Panjang gelombang radiasi yang diserap merupakan ciri khas ikatan yang menyerapnya (Watson, 2013).

Terdapat dua jenis spektrofotometer IR, yaitu spektrofotometer IR klasik dan spektrofotometer IR transformasi Fourier (*Fourier Transform Infra Red* (FTIR)) dengan interferometer. Elemen utama pada instrumentasi klasik IR terdiri atas empat bagian yaitu sumber cahaya radiasi, elemen pendispersi berupa kisi difraksi atau prisma, detektor dan sistem optik cermin. Radiasi inframerah dari sumbernya lalu dipantulkan ke cermin datar melewati sampel dan monokromator kemudian terus ke sampel. Sinar direfleksikan pada cermin putar yang secara bergantian, yang mana sinar akan melewati sampel dan monokromator ke elemen pendispersi dan akhirnya ke detektor inframerah untuk spektrum yang dihasilkan. Saat sinar bergantian diteruskan, cermin berputar perlahan dan radiasi sinar inframerah dengan frekuensi yang berbeda lolos ke detektor (Theophanides, 2012).

Spektrofotometer inframerah dikembangkan lebih modern (Spektrofotometer FTIR) dengan mengganti monokromator dengan interferometer Michelson yang memungkinkan semua frekuensi mencapai detektor sekaligus. Keuntungan dari teknik ini ialah bahwa seluruh hasil pindai spektrum dapat diperoleh dalam waktu satu detik, dibandingkan dengan 2-3 menit yang

diperlukan agar suatu instrumen klasik mendapatkan satu spektrum (Watson, 2013).

Setiap ikatan yang berbeda memiliki sifat frekuensi vibrasi yang berbeda. Apabila terdapat dua molekul yang memiliki struktur yang berbeda maka serapan inframerah akan membentuk spektrum yang berbeda pula. Kedua senyawa yang diperkirakan mirip antara satu dengan yang lainnya dapat dibandingkan spektrum inframerahnya sehingga dapat ditetapkan apakah senyawa tersebut identik ataupun tidak (Sastrohamidjoji, 2018).

Pola puncak yang tampak pada daerah bilangan gelombang kurang dari  $1500\text{ cm}^{-1}$  biasanya sulit untuk ditentukan akibat adanya peregangan pada molekul sehingga daerah ini disebut sebagai daerah sidik jari yang dimana dapat dimanfaatkan ketika membandingkan dua senyawa yang diperkirakan identik karena adanya pola yang khas bagi senyawa yang tidak dimiliki senyawa lainnya (Cairns, 2008).

### **C. Radikal Bebas**

Radikal bebas merupakan molekul yang mengandung elektron tak berpasangan di orbital terluar dan sangat reaktif di dalam tubuh dengan mengoksidasi (melepaskan elektron) dari atom lain, atau terkadang mereduksi (mendonasikan elektronnya ke) atom lain. Sumber utama spesies oksigen reaktif adalah mitokondria, yang berkontribusi pada reaksi peradangan. Radikal bebas ini juga mendorong proliferasi sel (pembelahan mitosis) dari fibroblas, sehingga jaringan parut dapat terbentuk dan menstimulasi proliferasi limfosit dalam proses produksi klon. Radikal bebas juga berpengaruh pada peningkatan relaksasi otot polos pembuluh darah yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan aliran darah ke tempat peradangan (Adwas, dkk., 2019).

Dalam sel, oksigen digunakan untuk menghasilkan energi. ATP dibentuk oleh mitokondria dalam proses reduksi oksidasi seluler, menghasilkan produk samping yakni radikal bebas. Kurangnya pertahanan oleh antioksidan dan tingginya produksi ROS (*Reactive Oxygen Species*) dapat mengakibatkan stres oksidatif yang menyebabkan rusaknya struktur sel. Selain dapat menyebabkan kerusakan sel, stres oksidatif dapat menimbulkan gangguan pada regulasi makromolekul dalam tubuh seperti asam nukleat, lipid, protein (Arnanda dan Rina, 2019).

Sumber ROS endogen berasal dari mekanisme peradangan dan aktivasi sel kekebalan, latihan yang parah, iskemia, stres aktivitas mental, penyakit kanker dan infeksi, dan penuaan. Sumber ROS eksogen berasal dari pencemaran air dan udara, minuman beralkohol, merokok, logam berat, obat-obatan tertentu (tacrolimus dan siklosporin), radiasi, dan beberapa pelarut seperti benzena. Senyawa ini terurai menjadi ROS setelah menembus tubuh. Efek merusak dari ROS menyebabkan perubahan pada makromolekul seperti protein, lipid, dan asam nukleat. Pembentukan radikal bebas ini dapat menjadi awal mula dari perkembangan berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, aterosklerosis, penyakit hati, dan kanker (Adwas, dkk., 2019).

#### **D. Antioksidan**

Radikal bebas merupakan molekul yang berbahaya karena sifatnya yang reaktif sehingga cenderung menyerang molekul yang ada didekatnya. Agar bisa mempertahankan tubuh dari serangan radikal bebas, berbagai makhluk hidup termasuk manusia membuat mekanisme pertahanan tersendiri yakni dengan membentuk antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa-senyawa pemberi elektron (elektron donor) dimana dalam hal ini senyawa antioksidan dapat

menghalangi efek negatif dari radikal bebas, termasuk enzim-enzim dan protein pengikat logam (Yuslianti, 2018).

Untuk mempertahankan pensinyalan sel yang tepat, ada kemungkinan bahwa sejumlah enzim pemulung radikal bebas mempertahankan tingkat ambang ROS di dalam sel. Namun, ketika tingkat ROS melebihi ambang batas maka peningkatan produksi ROS dapat menyebabkan sinyal yang berlebihan ke sel. Selain kerusakan langsung pada komponen utama di jalur pensinyalan, stres oksidatif terjadi ketika keseimbangan antara pembentukan ROS dan detoksifikasi mendukung peningkatan kadar ROS sehingga menyebabkan fungsi seluler terganggu. ROS juga dapat merusak target makromolekul esensial seperti DNA, protein, dan lipid secara permanen, yang dapat memicu karsinogenesis. Oleh karena itu, konsentrasi ROS harus dikontrol oleh beberapa mekanisme pertahanan, yang melibatkan sejumlah enzim antioksidan dan detoksifikasi (Adwas, dkk., 2019).


Mekanisme antioksidan dalam pertahanan tubuh yaitu dengan pemblokiran produksi radikal bebas, pembersihan oksidan, pengubahan radikal bebas menjadi zat yang kurang beracun, pemblokiran produksi metabolit sekunder yang beracun dan mediator inflamasi, pemblokiran rantai propagasi oksidan sekunder, memperbaiki molekul yang terluka, dan meningkatkan sistem pertahanan antioksidan endogen. Semua mekanisme pertahanan ini bekerja untuk melindungi tubuh dari stres oksidatif (Adwas, dkk., 2019).

#### 1. Antioksidan Enzimatik dan Non Enzimatik

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu antioksidan enzimatik (antioksidan yang diperoleh dari dalam tubuh manusia) dan antioksidan non enzimatik yang terdiri atas antioksidan alami dan sintetik (Yuslianti, 2018).

a. Antioksidan enzimatik

Antioksidan enzimatik merupakan antioksidan yang diproduksi secara alami dari dalam tubuh manusia yang berupa enzim, diantaranya superoksida dismutase (SOD), glutathione peroksidase (GPx), dan katalase. Tubuh dapat menghasilkan antioksidan yang berupa enzim yang aktif bila didukung oleh nutrisi pendukung atau mineral yang disebut juga ko-faktor (Yuslianti, 2018).



**Gambar 2.** Mekanisme Aksi Antioksidan yang Berasal dari Dalam Tubuh (Werddhasari, 2014)

Dalam mempertahankan tubuh radikal bebas, terjadi suatu mekanisme aksi yang diprakarsai oleh antioksidan endogen. Radikal superoksida ( $O_2^-$ ) yang merupakan hasil dari respirasi dan juga dari lingkungan, diubah menjadi hidrogen peroksida ( $H_2O_2$ ) oleh enzim SOD. Enzim SOD dapat ditemukan di mitokondria serta sitosol.  $H_2O_2$  kemudian dikatalisis oleh enzim GPx dan katalase. Enzim katalase menjadikan masing-masing dua molekul  $H_2O_2$  sebagai substrat elektron donor dan elektron akseptor, sehingga terbentuk 2  $H_2O$  dan  $O_2$ . Enzim GPx yang terletak di sel darah merah (eritrosit) dan jaringan, mengkatalisis penghancuran  $H_2O_2$  dan lipid hidoperoxida menggunakan glutation (GSH) yang tereduksi, melindungi hemoglobin dan lipid membran sehingga tidak terjadi hemolysis akibat reaksi oksidasi oleh  $H_2O_2$ . GS-SG atau *oxidized glutathione* merupakan hasil oksidasi dari GSH. GSH diperlukan dalam membantu kinerja enzim GPx

sehingga dalam proses penyediaan GSH diperlukan enzim glutation reduktase (GRred) yang mengubah GS-SG menjadi GSH (Werddhasari, 2014).

b. Antioksidan non enzimatik

Antioksidan non enzimatik berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu antioksidan sintetis dan antioksidan alami. Antioksidan sintetis merupakan antioksidan yang didapatkan melalui proses reaksi kimia. Beberapa antioksidan sintetis yang telah diproduksi dan diizinkan penggunaannya secara luas yaitu tokoferol, *butylated hidroxytoluene* (BHT), *butylated hidroxyanisol* (BHA), DAN *tert-butylated hidroxyquinon* (TBHQ). Sedangkan antioksidan alami merupakan antioksidan yang diperoleh secara dari alam (Sayuti, dkk., 2015).

Sumber antioksidan alami dapat berasal dari molekul senyawa yang berasal dari satu atau lebih komponen makanan, molekul senyawa yang berasal dari hasil reaksi melalui proses pengolahan, molekul senyawa yang berasal dari sumber alami kemudian diisolasi untuk ditambahkan ke makanan sebagai bahan tambahan makanan (Yuslianti, 2018).

Antioksidan alami memiliki berbagai aksi biokimia seperti penghambatan produksi ROS dan pembersihan radikal bebas. Diketahui bahwa konsumsi bawang putih, kurkumin, delima, wijen, dan sejenisnya menunjukkan efek perlindungan terhadap penyakit ginjal dan agen nefrotoksik diinduksi disfungsi ginjal. Efek nefroprotektif mungkin disebabkan oleh penghambatan peroksidasi lipid jaringan dan peningkatan aktivitas antioksidan. Oleh karena itu, penelitian menunjukkan bahwa antioksidan ini mungkin berguna bagi orang yang terpapar agen nefrotoksik dan pasien yang menderita penyakit ginjal (Adwas, dkk., 2019).

Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat

(meliputi asam kafeat, asam ferulat, asam klorogenat, dan lain-lain), kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik polifungsional. Golongan flavonoid memiliki aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, kateksin, kalkon (Yuslianti, 2018).

Flavonoid bekerja sebagai antioksidan eksogen melalui mekanisme pengkelatan radikal bebas berupa elemen logam transisi, dimana flavonoid mengikat ion logam dengan cara menyumbangkan atom hidrogen atau dengan transfer elektron tunggal. Flavonoid juga berperan sebagai inhibitor enzim seperti xanthine oksidase yang dapat membantu pembentukan senyawa radikal bebas (Arnanda dan Rina, 2019).

#### 1. Uji Potensi Antioksidan

Saat ini telah banyak dikembangkan pengujian aktivitas antioksidan pada suatu bahan untuk mengetahui potensi bahan tersebut dalam menangkap ataupun menetralkan senyawa-senyawa turunan oksigen reaktif. Beberapa metode tersebut ialah sebagai berikut: (Santoso, 2021).

##### a. *Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC)*

Metode ORAC dilakukan dengan penambahan molekul fluoresen contohnya  $\beta$ -phicoerythrin atau fluorescein ke senyawa yang memproduksi radikal bebas seperti azo-initiator kemudian dipanaskan. Radikal bebas peroksil akan dihasilkan oleh azo-initiator yang kemudian molekul fluoresen akan dirusak sehingga sifat fluoresensinya menurun. Kurva intensitas fluoresensi versus waktu dicatat dan luas area di bawah kurva dengan atau tanpa antioksidan dihitung dan dibandingkan dengan kurva standar (Trolox) (Santoso, 2021).

##### b. *Total Radical-Trapping Antioxidant Parameter (TRAP)*

Dalam metode TRAP, diukur penurunan fluoresensi selama peroksidasi dengan spektrofotometer *luminescence*. Dihitung nilai TRAP melalui

perbandingan antara panjang *lag phase* (fase lag) akibat antioksidan dengan Trolox sebagai standar (Santoso, 2021).

c. *Trolox Equivalent Antioxidant Capacity* (TEAC)

Metode TEAC menggunakan prinsip yang sama dengan metode ORAC, dimana pengukuran perubahan warna ketika antioksidan ditambahkan ke kromofor biru-hijau ABTS<sup>•+</sup> (senyawa radikal bebas stabil yang tidak ditemukan pada manusia) dilakukan dengan *diode-array spectrophotometer*. Penambahan antioksidan akan membuat ABTS<sup>•+</sup> tereduksi menjadi ABTS, sehingga mengakibatkan terjadinya dekolonisasi. (Santoso, 2021).

d. *Peroxyl Radical Scavenging Capacity* (PSC)

Prinsip yang diterapkan pada metode ini sama dengan metode TEAC dan ORAC, yakni dengan penghambatan oleh antioksidan yang menangkap radikal peroksil terhadap oksidasi *dichlorofluorescin* (DCF) yang dihasilkan dari oksidasi termal 2,2'-azobis(amidinopropana) (Santoso, 2021).

e. *Ferric Reducing Antioxidant Power* (FRAP)

Pada metode FRAP, kemampuan yang diukur yakni aktivitas antioksidan dalam reduksi ion Fe<sup>3+</sup>. Ion Ferri (Fe<sup>3+</sup>) yang telah ditambahkan 2,4,6-tripyridyltriazine) direduksi menjadi ion ferro (Fe<sup>2+</sup>) di suasana asam. Dalam prosesnya, dilakukan pengawasan dan juga diukur perubahan absorbansi pada panjang gelombang 595 nm dengan alat *diode-array spectrophotometer* (Santoso, 2021).

f. Folin-Ciocalteu

Penentuan kandungan total fenolik dilakukan dengan metode ini melalui uji perubahan warna pada reduksi oksida logam dengan menggunakan reagen *phosphomolybdate-phosphotungstic acid*. Pada proses reduksi oleh antioksidan, terbentuk warna biru laut dengan absorbansi maksimum 765 nm. Pada metode ini

digunakan kurva standar dengan larutan katekin atau asam galat sebagai standar (Santoso, 2021).

g. *2,2-diphenyl picrylhydrazyl* (DPPH)

Metode DPPH merupakan metode yang paling sering digunakan karena prosedurnya yang mudah dilakukan, dimana pengujian diawali dengan menambahkan antioksidan pada DPPH yang merupakan radikal bebas berwarna ungu gelap yang berubah warna menjadi kuning apabila tereduksi selanjutnya dapat diukur absorbansinya pada 517 nm menggunakan alat spektrofotometer. Intensitas warna yang menurun dapat terjadi akibat ikatan rangkap terkonjugasi yang berkurang dikarenakan penangkapan elektron oleh zat antioksidan sehingga elektron tersebut tidak dapat beresonansi (Erlidawati, dkk., 2018).

Metode deteksi antioksidan dengan DPPH dapat secara luas digunakan untuk mendeteksi aktivitas antioksidan dalam suatu senyawa. DPPH dapat digunakan dalam skrining antioksidan metode bioautografi, dimana perubahan warna dari ungu menjadi kuning dengan penyemprotan DPPH pada plat KLT yang telah ditotolkan suatu sampel, dimana intensitas perubahan warna yang semakin meningkat menunjukkan potensi senyawa sebagai antioksidan yang menangkap radikal bebas (Praptiwi, dkk., 2015).

**E. Tinjauan Islam**

Allah SWT. menciptakan seluruh alam semesta termasuk bumi dan isinya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Proses penciptaan hal-hal yang terdapat di bumi tidak dapat dimengerti oleh logika manusia termasuk penciptaan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan yang memiliki banyak tujuan dan manfaat. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Thaha ayat 53:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَوَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ تَبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahan:

“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan” (Kementrian Agama RI, 2019).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. menunjukkan kuasa dan kebesaran-Nya melalui penciptaan-Nya yang sempurna termasuk bumi dan seisinya. Aneka nikmat yang Allah berikan termasuk menurunkan air dari langit berupa hujan, membentuk berbagai mata air serta sungai-sungai yang mengalir sehingga dengan air-air itu yang menjadi perantara Allah SWT. dalam menumbuhkan berbagai tumbuhan yang bervariasi antara bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Aneka tumbuhan tersebut tentunya tidak serta merta diciptakan secara sia-sia dan tanpa tujuan. Allah SWT. telah mengarahkan hamba-hambaNya untuk merenungi dan memahami makna dibalik penciptaan-Nya dengan menggunakan akal yang telah dianugerahkan kepada mereka untuk berpikir. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 191 yaitu:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ  
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ قَوْنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahan:

“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka” (Kementrian Agama RI, 2019).

Allah SWT. memberi hidayah kepada manusia untuk mempergunakan akal pikirannya dan mengambil kebaikan dari tumbuh-tumbuhan tersebut termasuk mempelajari fungsi dan manfaat dari tumbuhan yang diciptakan oleh Allah SWT. Hal ini berkesinambungan dengan banyaknya manusia yang melakukan penelitian

terhadap tumbuh-tumbuhan, mengingat betapa kompleksnya ciptaan Allah SWT. yang hanya tersusun atas kumpulan atom atau sel namun memiliki sistem yang begitu rumit (Shihab, 2002).

Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT. dengan bentuk sebaik-baiknya, sehingga sudah sepantasnya kita mensyukuri hal ini dengan menjaga tubuh dan menghindarkan diri dari penyakit. Dengan akal dan pemikiran yang dianugrahi pula, manusia dengan baik dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mencari cara untuk mengobati dirinya apabila terkena penyakit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary melalui sahabat Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ  
قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha' bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR Bukhari) (Al Asqalani, 2014).*

Hadis tersebut dengan jelas menerangkan bahwa Allah SWT. telah menurunkan obat bagi segala penyakit dan kita sebagai manusia tinggal menggunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah SWT. untuk mencari, meneliti dan mengolah sumber daya alam yang diberikan dengan bersungguh-sungguh sehingga dapat mengembangkan suatu bentuk obat yang dapat menjadi penawar dari bermacam jenis penyakit. Salah satu sumber daya alam yang Allah

berikan sebagai bahan baku obat, dimana jumlahnya sangat melimpah ruah yakni tumbuh-tumbuhan.

Terdapat begitu banyak variasi tumbuhan di permukaan bumi namun tidak semua tumbuhan dijelaskan manfaatnya dalam Al-Qur'an. Salah satu tumbuhan yang disebut memiliki kegunaan dalam berbagai bentuk pengolahan, baik itu dikonsumsi sebagai minuman ataupun makanan yakni jahe. Seperti yang diketahui bahwa jahe memiliki berbagai varian yang semuanya bermanfaat bagi masyarakat. Jahe liar atau disebut juga lempuyang gajah, khususnya pada bagian rimpang sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional dalam mengobati penyakit seperti demam, sakit perut, wasir, kusta, dan penambah nafsu makan.

Jahe disebutkan sebagai minuman penghuni surga dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 17 yaitu:

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا

Terjemahan:

*“Di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe”* (Kementrian Agama RI, 2019).

Abu Naim, dalam bukunya mengenai pengobatan nabi, menyebutkan tentang Sa'id Al-Khudri yang bercerita mengenai Raja Roma yang memberikan Nabi Muhammad SAW. semangkuk penuh jahe dan membagikannya pada semua orang untuk dimakan (Khater, 2014).

Terlepas dari berbagai variasi jahe yang ada, semua jenis jahe memiliki masing-masing manfaat yang sebagian besar telah digunakan dalam pengobatan sejak dahulu. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan manusia akan manfaat dan kegunaan dari tanaman terus berkembang sehingga banyak penelitian yang dilakukan dengan mengkaji kembali tumbuh-tumbuhan yang ada, berlandaskan catatan-catatan sejarah dan kitab suci umat manusia yaitu Al-Qur'an. Allah SWT. telah menunjukkan seberapa hebat ciptaannya sehingga manusia harus takut dan

senantiasa menyembah Allah SWT., menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental yang dilakukan di laboratorium berdasarkan metode deskriptif kuantitatif yang dimana dilakukan identifikasi dan karakterisasi pada tiap fraksi yang diduga memiliki aktivitas antioksidan menggunakan instrument spektrofotometer FTIR.

##### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia dan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

##### **3. Waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Juli – Oktober 2021.

#### ***B. Pendekatan penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimental yang dilakukan dengan beberapa tahap yakni ekstraksi, partisi, identifikasi dan karakterisasi pada rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.).

#### ***C. Sampel***

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.) yang didapatkan dari Desa Pucak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

#### **D. Alat dan Bahan**

##### **1. Alat**

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa alat yakni bejana maserasi, blender, botol cokelat, cawan porselen, *chamber*, corong Buchner, corong kaca, corong pisah, erlenmeyer, gelas kimia, gelas ukur, lampu UV 245 nm dan 366 nm, lemari asam, mangkuk kaca, oven, penangas, pengompres plat KBr, pipa kapiler, pisau, pompa vakum, spatel, spektrofotometer FTIR, timbangan analitik, toples kaca, *vacuum rotary evaporator* (rotavapor).

##### **2. Bahan**

Beberapa bahan yang dibutuhkan dalam penelitian yakni aquades, DPPH etil asetat, HCl 2N, HCl pekat, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10%, KBr (Kalium Bromida), lempeng KLT, lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.) metanol, n-heksana, pereaksi Dragendroff, pereaksi Lieberman-Burchard, serbuk Mg (Magnesium), serbuk *silica gel* 60 GF<sub>254</sub>.

#### **E. Prosedur Kerja**

##### **1. Preparasi sampel rimpang lempuyang gajah**

Seluruh tanaman lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) diperoleh dari daerah Kabupaten Maros, Makassar, Sulawesi Selatan, yang mana lempuyang gajah tumbuh pada ketinggian 500-1200 mdpl. Rimpang lempuyang gajah dipisahkan dengan bagian tumbuhan lainnya kemudian dicuci dengan air mengalir. Sampel dipotong kecil-kecil dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan kemudian dilanjutkan dengan sortasi kering dan digiling hingga menjadi serbuk simplisia (Lallo, dkk., 2018). Sampel kemudian diayak dengan ayakan no.20 (Subositi, 2014).

## 2. Ekstraksi dan partisi sampel rimpang lempuyang gajah

Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia rimpang lempuyang gajah yaitu dengan cara maserasi. Simplisia rimpang lempuyang gajah yang telah dikeringkan kemudian dimaserasi dengan pelarut metanol sebanyak 3 x 24 jam pada suhu kamar. Filtrat metanol yang diperoleh kemudian dipekatkan menggunakan *vacuum rotary evaporator* (Handayani, dkk., 2018).

Filtrat yang telah pekat kemudian melewati tahap partisi. Partisi pada sampel dilakukan dengan melarutkan ekstrak sebanyak 20 gram dalam 200 ml aquadest. Selanjutnya dimasukkan ke dalam corong pisah lalu ditambahkan 200 ml n-heksana, dikocok secara perlahan-lahan selama 5 menit, setelah itu didiamkan hingga terjadi pemisahan antara ekstrak n-heksana dan aquadest. Ekstrak n-heksana dipisahkan dengan lapisan air kemudian dipartisi kembali hingga hasil partisi n-heksan berwarna bening (terhitung 13 kali partisi) (Nuari, dkk., 2017).

Hasil partisi dirotavapor kemudian dihitung persentase rendemennya: (Fasya, dkk., 2018)

$$\% \text{ rendemen} = \frac{\text{berat ekstrak}}{\text{berat sampel}} \times 100\%$$

## 3. Skrining senyawa metabolit dari sampel rimpang lempuyang gajah

### a. Uji alkaloid

Hasil partisi n-heksan sebanyak 2 ml dimasukkan dalam tabung reaksi dan ditambahkan 3 ml HCl 2N. Larutan dibagi ke dalam 2 tabung, dimana tabung pertama ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer dan tabung kedua ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendorff. Positif mengandung alkaloid apabila terbentuk endapan putih keruh pada tabung pertama dan endapan jingga pada tabung kedua (Susanti, dkk., 2015).

b. Uji flavonoid

Sebanyak 2 mL larutan ekstrak ditambahkan 1 ml air panas, dididihkan selama 5 menit, kemudian disaring. Filtrat ditambahkan sedikit serbuk Mg dan 1 mL HCl pekat, kemudian dikocok. Uji positif ditunjukkan oleh terbentuknya warna merah, kuning atau jingga (Ilmiati, dkk., 2017).

c. Uji steroid dan triterpenoid

Diambil 2 ml larutan partisi n-heksan kemudian ditambahkan 5 tetes pereaksi Lieberman-Burchard. Hasil positif mengandung steroid ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau atau biru dan hasil positif terpenoid ditandai dengan perubahan warna menjadi merah atau violet (Susanti, dkk., 2015).

d. Uji Saponin

Sebanyak 1 ml hasil partisi n-heksan dimasukkan kedalam tabung reaksi lalu ditambahkan 9 ml aquadest, kemudian dikocok secara vertikal selama 10 detik lalu didiamkan selama 10 detik. Apabila terbentuk busa stabil setinggi 1-10 cm selama tidak kurang dari 10 detik maka disimpulkan bahwa larutan uji mengandung saponin. Busa yang terbentuk tidak hilang pada penambahan 1 tetes HCl 2N (Susanti, dkk., 2015).

e. Uji Tanin dan Polifenol

Sebanyak 2 ml larutan hasil partisi n-heksan dimasukkan dalam tabung reaksi kemudian dilakukan penambahan beberapa tetes larutan besi (III) klorida 10%. Sampel mengandung tanin dan polifenol ditandai dengan timbulnya warna hitam kehijauan (tanin) dan biru tua (polifenol) (Susanti, dkk., 2015).

4. Fraksinasi sampel rimpang lempuyang gajah

Sebelum dilakukan pemisahan senyawa, terlebih dahulu dilakukan orientasi eluen dengan secara kromatografi lapis tipis (KLT) dengan

menggunakan perbandingan eluen dari pelarut yang memiliki tingkat kepolaran berbeda (n-heksan : etil asetat). Dilakukan penotolan pada lempeng KLT kemudian diamati dibawah sinar UV 254 dan 366 nm dan dipilih perbandingan eluen dengan pola pemisahan yang baik (Utami, dkk., 2018).

Pemisahan senyawa ekstrak dilanjutkan dengan menggunakan metode kromatografi vakum cair (KCV). Sejumlah ekstrak yang telah dipekatkan dengan rotavapor kemudian dicampur dengan 4 gram silika gel lalu diaduk hingga homogen dan menjadi serbuk kering. Disambung pompa dengan corong Buchner dan dimasukkan silika gel sebanyak 16 gram untuk dimampatkan terlebih dahulu. Silika gel yang telah homogen dengan ekstrak kemudian dimasukkan ke dalam corong dan diratakan. Pada bagian atas serbuk silika diberi kertas saring agar mudah menuangkan pelarut dan tidak mengganggu serbuk silika. Tahap selanjutnya yakni dimasukkan berbagai pelarut sebagai fase gerak dengan perbandingan eluen (dimulai dengan pelarut yang memiliki kepolaran terendah hingga tertinggi) yang telah ditentukan berlandaskan hasil orientasi eluen. Eluen yang terpilih ditambahkan sebanyak 100 ml kemudian proses fraksinasi dilakukan dan dihasilkan berbagai fraksi. (Nuari, dkk., 2017).

#### 5. Karakterisasi senyawa

Berbagai fraksi yang diperoleh kemudian dikarakterisasi kandungan senyawanya dengan menggunakan metode KLT-bioautografi dan spektrofotometri FTIR.

##### a. KLT-bioautografi

Berbagai fraksi yang telah diperoleh terlebih dahulu diidentifikasi dengan melihat penampakan nodanya. Ditotolkan berbagai fraksi pada lempeng KLT, kemudian dielusi menggunakan perbandingan eluen yang telah didapatkan

sebelumnya. Lempeng KLT hasil elusi kemudian ditetesi dengan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10% lalu dipanaskan menggunakan oven (Forestryana, dkk. 2020).

Fraksi-fraksi tersebut dielusi kembali dengan lempeng KLT kemudian ditetesi menggunakan DPPH (2-2 Difenil-1-Pikrihidrazil) 0,45mM dan dilihat penampakan nodanya. Apabila terdapat bercak berwarna putih kekuningan maka dipastikan fraksi tersebut memiliki aktivitas antioksidan (Praptiwi, dkk., 2015). Bercak noda yang timbul kemudian dihitung nilai *Retention factor* (Rf)-nya dengan rumus:

$$R_f = \frac{\text{jarak yang ditempuh komponen}}{\text{jarak yang ditempuh pelarut}}$$

#### b. Spektrofotometri FTIR

Karakterisasi fraksi-fraksi yang dipastikan memiliki aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan spektrofotometri FTIR (*Fourier Transform Infrared*). Dilakukan penyiapan sampel dengan mencampur 2 mg isolat dengan 100 mg serbuk kering KBr hingga homogen. Dimasukkan campuran dalam alat kompres hingga terbentuk suatu *pellet disk* (Maryam, dkk., 2019). Dikarakterisasi sampel menggunakan spektrofotometer FTIR. Hasil pengujian didapatkan berupa pita adsorpsi gugus-gugus fungsional lalu dianalisis bilangan gelombang yang muncul (Putra, dkk., 2020).

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Rendemen Ekstrak Partisi N-heksan**

**Tabel 1.** Hasil Partisi N-heksan Rimpang Lempuyang Gajah

<b>Berat Ekstrak Metanol Kental</b>	<b>Berat Ekstrak N-heksan Partisi</b>	<b>% Rendemen</b>
20 gram	1,357 gram	6,785 %

**2. Skrining Fitokimia**

**Tabel 2.** Hasil Skrining Fitokimia Rimpang Lempuyang Gajah


<b>Senyawa</b>	<b>Pereaksi</b>	<b>Hasil</b>
Alkaloid	Ditambahkan 3 ml HCl 2N (+) Mayer (+) Dragendorff	Terbentuk endapan jingga dan coklat (+)
Flavonoid	(+) serbuk Mg (+) HCl pekat	Tidak ada perubahan warna (-)
Steroid dan Triterpenoid	(+) Lieberman-Burhcard	Tidak ada perubahan warna (-)
Saponin	(+) HCl 2N	Tidak berbuih (-)
Tanin dan Polifenol	(+) FeCl <sub>3</sub> 10%	Tidak ada perubahan warna (-)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


### 3. Identifikasi Fraksi pada Lempeng KLT

#### a. UV 254 nm dan 366 nm

Gambar 3. Identifikasi Lempeng KLT pada UV 254 nm



Gambar 4. Identifikasi Lempeng KLT pada UV 366 nm



**Tabel 3.** Analisis Noda Lempeng KLT

No.	Jenis Fraksi	Noda	Nilai Rf
1.	Fraksi 2	Noda 1	0,81
		Noda 2	0,76
		Noda 3	0,65
2.	Fraksi 3	Noda 1	0,65
		Noda 2	0,47
		Noda 3	0,4
		Noda 4	0,31
3.	Fraksi 4	Noda 1	0,4
		Noda 2	0,31
4.	Fraksi 5	Noda 1	0,25
		Noda 2	0,14
5.	Fraksi 6	Noda 1	0,14
6.	Fraksi 7	Noda 1	0,09
7.	Fraksi 8	Noda 1	0
8.	Fraksi 9	Noda 1	0
9.	Fraksi 10	Noda 1	0
10.	Metanol	Noda 1	0

**b. Noda Hasil Ditetesi  $H_2SO_4$  10%****Gambar 5.** Penampakan Noda Setelah Ditetesi  $H_2SO_4$  10%

**Tabel 4.** Analisis Penampakan Noda Setelah Ditetesi H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10%

No.	Fraksi	Noda	Warna Tampak	Nilai Rf
1.	Fraksi 2	Noda 1	Ungu	0,83
		Noda 2	Jingga	0,78
		Noda 3	Cokelat	0,72
2.	Fraksi 3	Noda 1	Cokelat pudar	0,54
		Noda 2	Ungu keabuan	0,45
3.	Fraksi 4	Noda 1	Ungu pudar	0,45
4.	Fraksi 5	Noda 1	Cokelat kehijauan	0,4
5.	Fraksi 6	Noda 1	Cokelat kehijauan	0,18
6.	Fraksi 7	Noda 1	Cokelat	0,09
7.	Fraksi 8	Noda 1	Cokelat kehijauan	0
8.	Fraksi 9	Noda 1	Hijau kekuningan	0
9.	Fraksi 10	Noda 1	Hijau kekuningan	0
10.	Metanol	Noda 1	Cokelat pudar	0

**c. Noda Hasil Penetesan DPPH**

**Gambar 6.** Penampakan Noda Setelah Ditetesi DPPH

**Gambar 7.** Penampakan Noda Setelah Dielusi dan Ditetesi DPPH




**Tabel 5.** Analisis Penampakan Noda dengan Aktivitas Antioksidan

No.	Fraksi	Nilai Rf N-heksan : Etil Asetat (8:2)
1.	Fraksi 2	0,78
2.	Fraksi 3	0,4
3.	Fraksi 4	0,38
4.	Fraksi 5	0,22
5.	Fraksi 6	0,16


#### 4. Analisis Data FTIR

##### a. Visualisasi Spektrum FTIR Hasil Fraksinasi


**Gambar 8.** Spektrum FTIR Fraksi 2 (12 : 1)




**Gambar 9.** Spektrum FTIR Fraksi 3 (10 : 1)




**Gambar 10.** Spektrum FTIR Fraksi 4 (8 : 1)



**Gambar 11.** Spektrum FTIR Fraksi 5 (8 : 2)



**Gambar 12.** Spektrum FTIR Fraksi 6 (4 : 2)



### b. Analisis Data Spektrum FTIR

**Tabel 6.** Hasil Analisis Spektrum FTIR Fraksi N-heksan Rimpang Lempuyang

Gajah

No.	Bilangan Gelombang ( $\text{cm}^{-1}$ )					Referensi	Gugus Fungsi
	Fraksi 2	Fraksi 3	Fraksi 4	Fraksi 5	Fraksi 6		
1		3855,30			3905,65	3300- 3850	O-H, C-H, N-H
2					3855,38		
3					3841,83		
4					3806,15		
5					3725,88		
6	3463,24	3410,07	3453,53	3434,67	3411,53	~3350	O-H (alkohol)
7	3283,87						
8	3025,56				3080,17	3100- 3300	=C-H (alkena)
9	2961,76		2956,68			~2962	Metil -CH <sub>3</sub> (asimetri)
10	2926,58		2925,25		2926,94	~2926	Metilena -CH <sub>2</sub> (asimetri)
11	2856,79	2854,30	2854,04	2854,79	2854,71	~2855	Metilena -CH <sub>2</sub> (simetri)
12	2730,35				2729,58	~2750	CH (Aldehida)
13	2633,42		2671,77	2671,00	2670,64	2500- 2700	SH (Sulfur)
14	2524,30						
15	2361,95		2361,84			2000- 2300	C≡C (alkuna)
16	2147,76						

17			1712,82	1712,16		~1700	C=O (Keton)
18	1735,46					~1740	C=O (Ester)
19		1653,18	1659,01	1654,82	1653,62	~1650	C=C (Alkena)
20				1627,97			
21				1603,80	1602,49	1540- 1640	CO ( $\beta$ - diketon)
						1575- 1630	-N=N- (Azo)
22		1597,66			1569,20	1575- 1630	-N=N- (Azo)
23		1509,15	1510,57		1512,30	~1550	-C-NO <sub>2</sub> (Nitro alifatik)
24	1454,94	1460,37	1463,47		1460,40	~1460	CH <sub>2</sub> bend (asimetri)
25	1385,73	1384,17	1386,76			~1375	CH <sub>3</sub> bend (simetri)
26	1363,99	1365,06	1367,39		1369,94		
27	1336,09						
28	1321,05						
29	1298,66	1300,54		1302,03	1305,35		
30	1264,13	1262,66	1265,01	1258,24	1258,00		
31	1211,75	1227,69	1201,00				

32	1183,36	1182,00	1180,97	1181,72		1000-1300	C-O
33		1160,43	1166,23		1169,43		
34	1130,65	1137,86					
35			1119,31	1117,07	116,69		
36	1104,81	1106,47					
37	1063,49	1087,77	1089,69	1084,42	1085,80		
38		1041,43	1060,57	1045,31	1034,67		
39		990,99	997,23	1005,80	1004,84		
40	967,03	971,12	974,62	978,33	976,77		
41	949,27	922,75	939,05				
42	905,25		907,49				
43	887,22			895,93	898,54		
44	847,19	835,82	842,94	837,91	837,39		
45	828,39						
46	779,66		799,03		774,12		
47	741,44	741,96	722,69	723,16	723,05		
48		701,55	703,76				
49	697,33		679,64	674,01	679,67		
50	628,46		634,21	637,92	636,60		
51	575,83		573,42	585,12	585,04		
52	554,57						
53	532,11		523,36		521,75		
54	510,81						
55	459,46		448,83				

## B. Pembahasan

Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.) banyak digunakan oleh masyarakat sebagai penambah nafsu makan, obat sakit perut, demam dan pereda nyeri (Hanwar dkk., 2015). Bagian rimpang lempuyang gajah diketahui mengandung berbagai metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol dan minyak atsiri (Rejeki, dkk., 2017). Beberapa metabolit sekunder dalam suatu tumbuhan termasuk lempuyang gajah memiliki manfaat sebagai antioksidan alami yang dapat meredam reaksi radikal bebas yang bersifat tidak stabil dengan menyumbang satu atau lebih elektron sehingga radikal bebas menjadi lebih stabil (Agustina, dkk., 2017).

Lempuyang gajah diketahui memiliki senyawa yang berpotensi sebagai antioksidan. Berbagai jenis tumbuhan yang diciptakan oleh Allah SWT. tidak ada yang sia-sia sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Asy-Syu'ara ayat 7 yaitu

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahan:

*“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?”* (Kementrian Agama RI, 2019).

Ayat tersebut cukup menjelaskan bahwa perlunya kita sebagai makhluk Allah SWT. yang telah diberi akal dan pikiran untuk menelaah dan mempelajari hasil ciptaan Allah SWT. termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam sehingga kita dapat mengambil manfaat daripadanya. Berbagai variasi tumbuhan dengan begitu banyak manfaat menandakan betapa besarnya kekuasaan Allah SWT. dengan anugrah-Nya yang tak terhingga kepada manusia sehingga sudah sepantasnya kita merenungi dan menyadari bahwa hanya Allah SWT. yang pantas untuk disembah (Shihab, 2002).

Tumbuh-tumbuhan disusun oleh berbagai jenis senyawa yang memiliki fungsi dan perannya tersendiri sehingga dengan itu suatu tumbuhan dapat terbentuk dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dalam bidang kesehatan, tumbuhan memegang peranan penting yakni pemanfaatannya dalam pengembangan obat-obatan bagi berbagai macam penyakit yang semakin lama semakin berevolusi dan bertambah jumlahnya. Kebesaran Allah SWT. telah ditunjukkan melalui penciptaan berbagai variasi tumbuhan termasuk lempuyang yang sering dimanfaatkan sebagai salah satu bahan obat tradisional. Adapun dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap potensi sebagai antioksidan yang dimiliki oleh lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.).

Penelitian ini dimulai dengan melakukan preparasi pada rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex. Sm). dengan cara dibersihkan dari kotoran yang masih menempel kemudian dicuci dengan air mengalir. Dilakukan perajangan lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan tanpa mengenai sinar matahari langsung. Sampel yang telah kering kemudian disortasi kering. Sampel diblender hingga berbentuk serbuk agar mempermudah difusi senyawa aktif menuju eluen. Sampel diayak dengan ayakan mesh 20 (halus sedang) dikarenakan rimpang termasuk simplisia keras dan sulit dihaluskan (Subositi, 2014) dan dengan pengayakan ini sudah cukup untuk memperluas permukaan dari simplisia sehingga mempermudah cairan penyari masuk ke dalam partikel. Simplisia lalu dimasukkan ke dalam toples kaca untuk selanjutnya melewati tahap ekstraksi.

Setelah simplisia dipreparasi, maka tahap berikutnya yakni dilakukan proses ekstraksi dengan metode maserasi. Ekstraksi merupakan teknik pemisahan komponen atau senyawa dari campurannya (simplisia) menggunakan eluen/pelarut tertentu. Metode maserasi dilakukan dengan merendam simplisia

dalam pelarut tanpa menggunakan pemanasan agar bahan alam yang terkandung tidak mengalami kerusakan ataupun terdegradasi akibat pemanasan. Pada maserasi, terjadi proses keseimbangan konsentrasi antar larutan di dalam dan di luar sel simplisia sehingga perlu dilakukan pergantian pelarut secara berulang (Hanani, 2015). Dalam penelitian ini, eluen metanol dipilih untuk mengekstraksi simplisia. Metanol diketahui dapat melarutkan senyawa-senyawa yang berbeda kepolarannya, baik polar ataupun non-polar, sehingga cocok digunakan dalam mengekstraksi lebih banyak jenis metabolit sekunder pada sampel (Muaja, dkk., 2017).

Hasil ekstraksi kemudian disaring dan dipekatkan menggunakan alat *rotary evaporator* pada suhu  $\pm 50^{\circ}\text{C}$ , penguapan pelarut dilakukan pada suhu tersebut agar mengurangi proses penguraian yang mungkin terjadi pada komponen kimia di dalamnya (Saputra, dkk., 2018).

Ekstrak metanol lempuyang gajah yang telah pekat diambil sebanyak 20 gram untuk dipartisi dengan menggunakan eluen n-heksan dan aquadest. Ekstrak metanol dilarutkan ke dalam 200 ml aquadest, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah. Sebanyak 200 ml n-heksan ditambahkan ke dalam corong pisah lalu dilanjutkan pengocokan secara perlahan selama 5 menit agar pelarut dapat menarik senyawa dengan sempurna. Metode partisi menggunakan corong pisah dengan dua pelarut yang tidak saling bercampur bertujuan agar senyawa-senyawa dalam sampel dapat terlarut pada pelarut yang sesuai dengan kepolarannya sehingga lebih mudah mengklasifikasikan metabolit sekunder yang didapatkan (Saputra, dkk., 2018). Dilakukan beberapa kali partisi dengan pergantian pelarut n-heksan secara berkala hingga pelarut n-heksan dalam corong pisah berubah warna menjadi bening yang dimana dalam penelitian ini partisi dengan pelarut n-heksan dilakukan sebanyak 13 kali. Hasil partisi kemudian kembali dipekatkan

menggunakan *rotary evaporator* hingga didapatkan ekstrak pekat n-heksan hasil partisi sebanyak 1,357 gram.

Skrining fitokimia dilakukan pada ekstrak n-heksan hasil partisi sebagai analisis kualitatif sebagai gambaran awal untuk mengetahui metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya (Wirdayanti, dkk., 2019). Dilakukan 5 pengujian yakni uji alkaloid, flavonoid, steroid dan triterpenoid, saponin, tanin dan polifenol. Pada pengujian senyawa alkaloid, hasil yang terbentuk setelah penambahan reagen Mayer adalah terbentuknya endapan jingga dan pada pengujian dengan penambahan reagen Dragendorff didapatkan hasil berupa endapan coklat. Intensitas warna yang lebih pekat ditunjukkan kemungkinan menandakan banyaknya kandungan alkaloid yang terkandung (Wirdayanti, dkk., 2019). Sedangkan pada pengujian flavonoid, steroid dan triterpenoid, serta tanin dan polifenol tidak menunjukkan perubahan warna yang berarti. Sama halnya dengan uji saponin tidak terbentuk buih pada sampel ekstrak n-heksan hasil partisi.

Sebelum menentukan tingkatan pelarut yang digunakan, dilakukan orientasi/gradiasi eluen untuk menentukan variasi fase gerak dalam kromatografi cair vakum (KCV) (Fadlilaturrahmah, dkk., 2015). Eluen yang akan digunakan yakni n-heksan dan etil asetat dengan berbagai perbandingan. Ekstrak n-heksan hasil partisi ditotolkan pada lempeng KLT berukuran 1x7 cm dengan batas atas 0,5 cm dan batas bawah 1 cm, dan diaktivasi dengan oven pada suhu 110°C selama 30 menit. Pada *chamber* kromatografi dilakukan penjuhan menggunakan eluen yang telah ditentukan terlebih dahulu agar tekanan uap dari eluen tersebar secara merata dalam *chamber* (Arsyinta, dkk., 2018). Orientasi eluen menunjukkan pemisahan yang baik pada perbandingan n-heksan : etil asetat (8 : 2).

Fraksinasi dilakukan dengan 10 variasi perbandingan pelarut n-heksan : etil asetat, dimulai dari varian dengan kopalaran terendah hingga tertinggi yakni n-heksanu Hasil fraksinasi diidentifikasi ulang penampakan nodanya dengan metode KLT menggunakan pelarut n-heksan : etil asetat (8 : 2) dan diamati menggunakan lampu UV/Vis 254 nm dan 366 nm. Pada lampu UV 254 nm, lempeng berflouresensi sehingga sampel terlihat gelap, sedangkan lampu UV 366 nm memberikan penampakan lempeng yang gelap dan noda berflourosensi akibat interaksi gugus kromofor dengan sinar UV. Selanjutnya penampakan noda diamati menggunakan menyemprotkan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10% pada lempeng KLT yang telah dielusi. Asam sulfat digunakan sebagai oksidator yang merusak gugus fungsi kromofor pada komponen senyawa sehingga panjang gelombang bergeser ke daerah yang lebih panjang, akibatnya noda yang terbentuk dapat terlihat oleh mata (Forestryana, dkk., 2020).

Lempeng KLT yang telah dielusi kemudian diamati dibawah sinar UV 254 nm dan 366 nm dan dihitung Rf tiap noda. Nilai Rf yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan nilai standar senyawa sehingga dapat digunakan sebagai uji penegasan terhadap hasil skrining fitokimia yang dilakukan (Novia, dkk., 2020). Pada fraksi 2 hingga 7 diduga mengandung alkaloid dilihat dari nilai Rf-nya yang sama ataupun mendekati range nilai Rf alkaloid umum yaitu 0,07 – 0,62 (Izzah, dkk., 2013). Pada fraksi 2 yang memiliki noda dengan nilai Rf 0,81 dan 0,74 dimana mendekati nilai Rf dari flavonoid (kuersetin) 0,79 (Yanty, dkk., 2019). Adapun pada fraksi 2 dan 3 terdapat kesamaan noda yang memilki nilai Rf 0,65 dimana nilai Rf ini mendekati nilai Rf standar steroid yaitu 0,53. Pada fraksi 3 juga terdapat 3 noda dengan nilai Rf 0,47; 0,4 dan 0,31 serta fraksi 4 yang memiliki 2 noda dengan nilai Rf 0,4 dan 0,31 dimana selain mendekati nilai dari

standar Rf steroid, ia juga mendekati nilai standar Rf untuk senyawa terpenoid yaitu 0,32 (Kandarpa, dkk., 2021).

Setelah penyemprotan dengan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10% pada lempeng KLT, dipanaskan lempeng hingga noda tampak jelas lalu dianalisis penampakan nodanya. Pada fraksi 2 didapatkan 3 noda dengan warna yang berbeda yakni noda pertama berwarna ungu dengan nilai Rf 0,83; noda kedua berwarna jingga dengan nilai Rf 0,78; dan noda ketiga berwarna coklat dengan nilai Rf 0,72. Pada fraksi 3 didapatkan 2 noda dengan yakni noda pertama berwarna coklat pudar dengan nilai Rf 0,54 dan noda kedua berwarna ungu dengan nilai Rf 0,45. Pada fraksi 4 didapatkan noda berwarna ungu pudar dengan nilai Rf 0,45. Pada fraksi 5, 6 dan 8 didapatkan noda berwarna coklat kehijauan dengan nilai Rf masing-masing 0,4; 0,18 dan 0 (tidak bergeser dari tempat penotolan). Pada fraksi 7 didapatkan noda berwarna cokelat dengan nilai Rf 0,09. Pada fraksi 9 dan 10 didapatkan noda berwarna hijau kekuningan dengan nilai Rf 0. Pada fraksi metanol didapatkan noda berwarna coklat pudar dengan nilai Rf 0.

Uji yang dilakukan menegaskan kandungan senyawa yang terkandung melalui penampakan warna. Noda tampak berwarna ungu pada plat KLT menunjukkan bahwa terdapat kandungan steroid ataupun terpen pada sampel. Warna ungu dan biru kehijauan pada lempeng KLT menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung steroid (Forestryana, dkk., 2020) serta bercak yang berwarna merah ataupun ungu diketahui mengandung terpenoid (Syarifuddin, dkk., 2019). Pada noda tampak berwarna jingga hingga kecoklatan menandakan adanya senyawa alkaloid dimana terlihat di fraksi 2 pada noda ketiga dengan nilai Rf 0,72; fraksi 3 pada noda pertama dengan nilai Rf 0,54; fraksi 5 dengan nilai Rf 0,4; fraksi 6 dengan nilai Rf 0,18; fraksi 7 dengan nilai Rf 0,09; fraksi 8 dan metanol dengan nilai Rf 0 (noda menempel pada batas bawah lempeng KLT).

Warna kekuningan yang terdapat pada fraksi 9 dan 10 dengan nilai Rf 0 kemungkinan diakibatkan karena adanya flavonoid yang dimana dengan pereaksi semprot H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ditandai dengan noda bewarna kuning (Forestryana, dkk., 2020).

Pada plat KLT, ditotolkan tiap fraksi pada plat yang telah diberi penanda. Lempeng dibiarkan kering kemudian ditetesi dengan DPPH 0,45 mM dalam metanol. Potensi aktivitas antioksidan yang terkandung dalam fraksi ditunjukkan melalui timbulnya bercak putih kekuningan. Fraksi-fraksi yang terdeteksi memiliki aktivitas antioksidan yaitu fraksi 2, fraksi 3, fraksi 4, fraksi 5 dan fraksi 6. DPPH juga ditetaskan pada lempeng KLT yang telah dielusi menggunakan eluen n-heksan : etil asetat (8 : 2) untuk melihat letak senyawa kimia yang bersifat antioksidan (Praptiwi, dkk., 2015). Penetesan lempeng KLT menggunakan DPPH menghasilkan 1 noda pada fraksi 2 dengan nilai Rf 0,78; fraksi 3 dengan nilai Rf 0,4; fraksi 4 dengan nilai Rf 0,38; fraksi 5 dengan nilai Rf 0,22; dan fraksi 6 dengan nilai Rf 0,16. Senyawa radikal bebas yakni 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) merupakan senyawa yang tidak stabil. Senyawa antioksidan mereduksi DPPH dengan menyumbangkan atom hidrogen sehingga terbentuk senyawa yang lebih stabil yaitu 1,1-difenil-2-pikrilhidrazilin (DPPH-H). Hal ini juga mengakibatkan terjadi perubahan warna dari ungu menjadi kuning oleh reagen DPPH (Bahriul, dkk., 2014).

Karakterisasi gugus fungsi yang terkandung pada sampel dilakukan menggunakan Spektrofotometer Fourier Transform Infra Red (FTIR). Pada fraksi 3 terdeteksi adanya serapan pada bilangan gelombang 3855,30 cm<sup>-1</sup> dan pada fraksi 6 terdeteksi serapan pada bilangan gelombang 3905,65; 3855,38; 3841,83; 3806,15; 3725,88 cm<sup>-1</sup>. Pada daerah bilangan gelombang 3300-38500 cm<sup>-1</sup> diduga terdapat gugus fungsi dengan ikatan kovalen tunggal O-H, N-H atau C-H (Sanjiwani, dkk., 2020). Penyerapan dalam bilangan gelombang yang tinggi

kebanyakan diakibatkan oleh adanya ikatan hidrogen terutama senyawa dengan gugus hidroksi seperti O-H atau N-H (Sastrohamidjoji, 2018). Sementara itu pada fraksi 2 terdeteksi serapan yang melebar dari 3463,24 hingga 3283,87; dan fraksi 3,4,5, dan 6 terdeteksi resonansi pada bilangan gelombang secara berurutan yaitu; 3410,07; 3453,53; 3434,67 dan 3411,53. Setiap fraksi diduga mengandung senyawa dengan gugus fungsi alkohol (O-H) yang berada pada lingkungan asam dikarenakan terdapat serapan yang lebar disekitar bilangan gelombang  $3400\text{ cm}^{-1}$  (Sastrohamidjoji, 2018). Alkena terdeteksi muncul pada fraksi 2 dan 6 pada serapan 3025,56 dan 3080,17 dimana serapan rentangan  $=\text{C-H}$  muncul dengan karakter lemah pada daerah tersebut (Sastrohamidjoji, 2018). Pada fraksi 2 dan 4 terdeteksi adanya vibrasi *stretching* ikatan C-H yaitu 2961,76 dan 2925,25 yang mana pada sekitar bilangan gelombang  $2962\text{ cm}^{-1}$  diketahui mengandung gugus metil  $-\text{CH}_3$  (Sastrohamidjoji, 2018). Vibrasi rentangan atau *stretching* gugus metilena  $-\text{CH}_2-$  dengan rentang 2855-2926 terdeteksi di setiap fraksi yaitu pada fraksi 2 terdapat serapan di bilangan gelombang 2926,58 dan 2856,79; fraksi 3 terdapat serapan di bilangan gelombang 2854,30; fraksi 4 terdapat serapan di bilangan gelombang 2854,04 dan 2925,25; fraksi 5 terdapat serapan di bilangan gelombang 2854,79; serta fraksi 6 terdapat serapan di bilangan gelombang 2854,71 dan 2916,94 (Sastrohamidjoji, 2018). Pada wilayah rentangan ikatan C-H, dapat muncul sejumlah serapan dari senyawa namun terdapat beberapa serapan khusus pada bilangan gelombang tertentu seperti senyawa yang mengandung gugus aldehida yang memiliki serapan pada daerah sekitar  $2750\text{ cm}^{-1}$  yang dimana gugus ini terdeteksi pada fraksi 2 dan 6 dengan serapan masing-masing 2730,35 dan  $2729,58\text{ cm}^{-1}$  (Sastrohamidjoji, 2018). Selanjutnya pada fraksi 2,4,5, dan 6 diduga mengandung senyawa sulfur dengan gugus fungsi SH di lingkungan ikatan ganda tiga karena serapan pada daerah frekuensi  $2500\text{-}2700\text{ cm}^{-1}$  yang dimana

pada fraksi 2 terdapat serapan di bilangan gelombang 2524,30 dan 2633,42; fraksi 4 terdapat serapan di bilangan gelombang 2671,77; fraksi 5 terdapat serapan di bilangan gelombang 2671,00; serta fraksi 6 yang memiliki serapan di bilangan gelombang 2670,64 (Sanjiwani, dkk., 2020). Pada fraksi 2 dan 4 diketahui memiliki ikatan alkuna  $C\equiv C$  dimana ikatan ini memiliki serapan sekitar frekuensi  $2250\text{ cm}^{-1}$  yang dimana pada fraksi 2 terdeteksi serapan pada bilangan gelombang 2361,95 dan 2147,76 serta fraksi 6 memiliki serapan pada  $2361,84\text{ cm}^{-1}$  (Sastrohamidjoji, 2018). Selanjutnya pada fraksi 2 terdeteksi adanya ikatan  $C=O$ , begitu pula dengan fraksi 4 dan 5 hanya yang membedakan ialah pada fraksi 2 ( $1735,46\text{ cm}^{-1}$ ) diduga mengandung senyawa ester yang memiliki absorpsi ikatan  $C=O$  pada frekuensi sekitar  $1740\text{ cm}^{-1}$ . Pada fraksi 4 dan 5 yang memiliki serapan masing-masing yaitu 1712,82 dan 1712,16 diduga mengandung senyawa keton yang memiliki absorpsi pada frekuensi sekitar  $1700\text{ cm}^{-1}$ . Perbedaan ini terjadi dikarenakan ikatan  $C=O$  gugus karbonil memiliki serapan khusus pada frekuensi 1680 hingga  $1750\text{ cm}^{-1}$  tergantung pada jenis senyawa yang terkandung (Dachriyanus, 2004). Pada fraksi 3, 4, 5 dan 6 diduga memiliki ikatan rangkap 2  $C=C$  yang memiliki frekuensi sekitar  $1650\text{ cm}^{-1}$  dimana masing-masing fraksi 3, 4, 5 dan 6 secara berurutan mempunyai serapan pada bilangan gelombang 1653,18; 1659,01; 1654,82 dan 1627,97; 1653,62 (Sastrohamidjoji, 2018). Selanjutnya pada fraksi 5 (serapan pada  $1603\text{ cm}^{-1}$ ) dan fraksi 6 (serapan pada 1602,49 melebar hingga  $1569,20\text{ cm}^{-1}$ ) diduga mengandung gugus fungsi C-O senyawa  $\beta$ -diketon yang memiliki frekuensi sekitar 1540 hingga 1640 atau senyawa azo dengan gugus fungsi  $-N=N-$  yang memiliki frekuensi serapan sekitar  $1575\text{-}1630\text{ cm}^{-1}$ . Senyawa azo juga diduga terdapat pada fraksi 3 yang memiliki serapan di daerah  $1597,66\text{ cm}^{-1}$  (Sanjiwani, dkk., 2020). Pada fraksi 3 ( $1509,15\text{ cm}^{-1}$ ), fraksi 4 ( $1510,57\text{ cm}^{-1}$ ), dan fraksi 6 ( $1512\text{ cm}^{-1}$ ) diduga

merupakan senyawa nitro alifatik dengan gugus fungsi  $-C-NO_2$  yang menyerap pada frekuensi sekitar  $1550\text{ cm}^{-1}$ . Konjugasi pada gugus fungsi tersebut dengan cincin atau adanya ikatan rangkap dua dapat menggeser serapan hingga bilangan gelombang yang lebih rendah (Sastrohamidjoji, 2018). Pada fraksi 2, 3, 4 dan 6 terdapat serapan secara berurutan yaitu pada frekuensi  $1454,94$ ;  $1460,37$ ;  $1463,47$ ;  $1460,40\text{ cm}^{-1}$ , yang diduga memiliki gugus metilen *bending*,  $-CH_2-$ , dikarenakan adanya serapan pada frekuensi sekitar  $1460\text{ cm}^{-1}$  (Sastrohamidjoji, 2018). Pada fraksi 2 (serapan  $1385,73$  dan  $1363,99\text{ cm}^{-1}$ ), fraksi 3 ( $1384,17$  dan  $1365,06\text{ cm}^{-1}$ ), fraksi 4 ( $1386,76$  dan  $1367,39\text{ cm}^{-1}$ ), dan fraksi 6 ( $1369,94\text{ cm}^{-1}$ ) diduga memiliki gugus metil *bending*,  $-CH_3$ , dikarenakan adanya serapan pada frekuensi sekitar  $1375\text{ cm}^{-1}$  (Sastrohamidjoji, 2018). Pada fraksi 2, 3, 4, 5 dan 6 yang memiliki serapan sekitar frekuensi  $1300\text{ cm}^{-1}$  hingga  $1000\text{ cm}^{-1}$  diduga mengandung gugus  $C-H$  *bending* namun sangat sulit untuk diketahui jenis senyawa yang mungkin terkandung dikarenakan serapan yang terlalu berdekatan sehingga sulit diketahui intensitas serapannya di daerah yang sama (Sastrohamidjoji, 2018). Pada spektrum inframerah, daerah di sebelah kanan spektrum memiliki absorbansi yang kompleks dikarenakan banyaknya molekul yang menyerap gelombang dan melakukan vibrasi di daerah ini sehingga sulit untuk menganalisis ikatan senyawa yang terkandung. Daerah kanan diagram disebut juga daerah sidik jari yang diketahui terdapat pada frekuensi  $1500 - 500\text{ cm}^{-1}$  (Dachriyanus, 2004). Daerah sidik jari biasa digunakan untuk identifikasi senyawa dengan membandingkan dua senyawa yang memiliki bentuk diagram yang mirip (Sastrohamidjoji, 2018).

Dalam penelitian yang telah dilakukan, hasil skrining awal menunjukkan hanya sedikit senyawa yang terkandung dalam simplisia yakni alkaloid. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada identifikasi sampel setelah melewati tahapan fraksinasi dengan KCV (Kromatografi Cair Vakum) dimana terdapat hasil yakni

adanya senyawa alkaloid, flavonoid, steroid dan terpen. Karakterisasi senyawa dalam fraksi-fraksi yang didapatkan dengan menggunakan FTIR (*Fourier Transform Infra Red*) juga menunjukkan kemungkinan adanya variasi senyawa yang terkandung dalam tiap fraksi yang ditunjukkan dari berbagai gugus fungsi yang terdeteksi sehingga tidak memungkinkan hanya ada satu varian senyawa dalam isolat yang didapatkan. Ketidaksesuaian yang didapatkan pada hasil skrining awal kemungkinan disebabkan oleh kualitas reagen yang digunakan sehingga hasil yang didapatkan kurang tepat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang diperoleh yaitu

1. Hasil identifikasi pada fraksi-fraksi dari ekstrak n-heksan hasil partisi yaitu terdapat kandungan senyawa alkaloid, flavonoid, steroid dan terpen;
2. Pada uji identifikasi menggunakan DPPH diketahui terdapat aktivitas antioksidan pada fraksi 2, 3, 4, 5, dan 6 dari hasil fraksinasi ekstrak kental n-heksan yang telah dipartisi;
3. Hasil karakterisasi senyawa menggunakan spektrofotometer FTIR menghasilkan kesimpulan yaitu:
  - a. Fraksi 2 menunjukkan adanya dugaan terdapat gugus fungsi OH (alkohol), =C-H, -CH<sub>3</sub>, -CH<sub>2</sub>, CH (aldehid), SH (sulfur), C≡C, C=O (ester), dan senyawa lain pada daerah sidik jari;
  - b. Fraksi 3 menunjukkan adanya dugaan terdapat gugus fungsi O-H, C-H, N-H, -CH<sub>3</sub>, -CH<sub>2</sub>, C=C, -N=N- (azo), -C-NO<sub>2</sub> (nitro alifatik) dan senyawa lain pada daerah sidik jari;
  - c. Fraksi 4 menunjukkan adanya dugaan terdapat gugus fungsi O-H, C-H, N-H, -CH<sub>3</sub>, -CH<sub>2</sub>, SH (sulfur), C≡C, C=O (keton), C=C, -C-NO<sub>2</sub> (nitro alifatik) dan senyawa lain pada daerah sidik jari;
  - d. Fraksi 5 menunjukkan adanya dugaan terdapat gugus fungsi O-H, -CH<sub>2</sub>, SH (sulfur), C=O (keton), C=C, CO (β-diketon), -N=N- (azo), -C-NO<sub>2</sub> (nitro alifatik) dan senyawa lain pada daerah sidik jari;

- e. Fraksi 6 menunjukkan adanya dugaan terdapat gugus fungsi O-H, C-H, N-H, =C-H, -CH<sub>3</sub>, -CH<sub>2</sub>, CH (aldehida), SH (sulfur), C=C, CO ( $\beta$ -diketon), -N=N- (azo), -C-NO<sub>2</sub> (nitro alifatik) dan senyawa lain pada daerah sidik jari.

### **B. Saran**

Disarankan untuk melakukan skrining ulang pada sampel ekstrak hasil partisi n-heksan dan melakukan isolasi kembali hasil fraksinasi KCV sehingga didapatkan senyawa murni yang memiliki aktivitas antioksidan pada penelitian selanjutnya dengan menggunakan rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.).



### DAFTAR PUSTAKA

- Adwas, A. A., Elsayed, A. S. I., Azab, A. E., & Quwaydir, F. A. (2019). Oxidative stress and antioxidant mechanisms in human body. *Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering*, 6(1), 43–47. <https://doi.org/10.15406/jabb.2019.06.00173>
- Agustina, W., Nurhamidah, & Handayani, D. (2017). Skrining Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Beberapa Fraksi Dari Kulit Banteng Jarak (*Ricinus communis L.*). *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kimia*, 1(2), Hlm. 117-122.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. (2019). *Kementrian Agama RI*. CV. Daurus Sunnah. Jakarta.
- Al Asqalani, I.H. (2014). *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*. Pustaka Azzam. Jakarta.
- Arnanda, Q. P., & Nuwarda, R. F. (2019). Review Article: Penggunaan Radiofarmaka Teknesium-99m Dari Senyawa Glutation dan Senyawa Flavonoid Sebagai Deteksi Dini Radikal Bebas Pemicu Kanker. *Farmaka*, 17, 236–243.
- Arsyinta, D. N. L., L.P.S., A., R.B.R., P., N.N.D., Y., J.I., M., & N.K., W. (2018). Pemisahan, Isolasi, dan Identifikasi Senyawa Saponin dari Herba Pegagan (*Centella asiatica L. Urban*). *Jurnal Farmasi Udayana*, 7(2), 68–76.
- Azis, S. (2014). *Senyawa Alam Metabolit Sekunder: Teori, Konsep, dan Teknik Pemurnian* (1 ed.). Deepublish.
- Bahriul, P., Rahman, N., & Diah, A. (2014). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Salam (*Syzygium polyanthum*) Dengan Menggunakan 1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil. *Jurnal Akademika Kimia*, 3(3), 143–149.
- Batubara, I., Suparto, I. H., Sadiyah, S., Matsuoka, R., & Mitsunaga, T. (2013). Effect of Zingiber zerumbet essential oils and Zerumbone Inhalation on body weight of Sprague dawley rat. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 16(19), 1028–1033. <https://doi.org/10.3923/pjbs.2013.1028.1033>
- Bhavesh, V. D., Nayak, Y., & BS, J. (2013). In vitro antioxidant and antiglycation activity of zingiber zerumbet (wild zin-ger) rhizome extract. *International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences*, 4(4), 482–489.
- Cairns, D. (2008). *Intisari Kimia Farmasi* (2 ed.). EGC.
- Chairunnisa, S., Wartini, N. M., & Suhendra, L. (2019). Pengaruh Suhu dan Waktu Maserasi terhadap Karakteristik Ekstrak Daun Bidara (*Ziziphus mauritiana L.*) sebagai Sumber Saponin. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri*, 7(4), 551–560.
- Chaudhuri, A., Sharma, S., & Khan, F. (2018). An Overview on the Advances of Zingiber zerumbet. *UK Journal of Pharmaceutical and Biosciences*, 6(5), 24–27.

- Dachriyanus. (2004). *Analisis Struktur Senyawa Organik Secara Spektroskopi*. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas.
- Dai, D. N., Thang, T. D., Chau, L. T. M., & Ogunwande, I. A. (2013). Chemical Constituents of the Root Essential Oils of *Zingiber rubens* Roxb., and *Zingiber zerumbet* (L.) Smith. *American Journal of Plant Sciences*, 04(01), 7–10. <https://doi.org/10.4236/ajps.2013.41002>
- Ergina, Nuryanti S, P., & Pursitasari, I. (2014). Uji Kualitatif Senyawa Metabolit Sekunder pada Daun Palado (*Agave angustifolia*) yang Diekstraksi dengan Pelarut Air dan Etanol. *Jurnal Akademika Kimia*, 3(3), 165–172.
- Erlidawati, Safrida, & Mukhlis. (2018). *Potensi Antioksidan Sebagai Antidiabetes* (1 ed.). Syiah Kuala University Press.
- Fadlilaturrahmah, Arnida, & Irzan, A. (2015). Isolasi dan Identifikasi Alkaloid Fraksi Kloroform Batang Tantaran Gayung Asal Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional dan Workshop Perkembangan Terkini Sains Farmasi dan Klinik*, 6–7.
- Fasya, A. G., Dinasti, A. R., Shofiyah, M., Rahmawati, L. M., Millati, N., Safitri, D. A., Handoko, S., Hanapi, A., & Ningsih, R. (2018). Ekstraksi, Hidrolisis dan Partisi Metabolit Sekunder dari Mikroalga *Chlorella* sp. *Alchemy*, 5(1), 5. <https://doi.org/10.18860/al.v5i1.3686>
- Firdaus, M., Awaludin P, A., & Nurdiani, R. (2013). *Tanaman Bakau; Biologi dan Bioaktivitas*. Tim UB Press.
- Forestryana, D., & Arnida. (2020). Skrining Fitokimia dan Analisis Kromatografi Lapis Tipis Ekstrak Etanol Daun Jeruju (*HYDROLEA SPINOSA* L.). *Jurnal Ilmiah Farmako Bahariri*, 11(2), 113–124.
- Hanani, E. (2015). *Analisis Fitokimia*. EGC. Jakarta.
- Handayani, S., Mursiti, S., & Wijayati, N. (2018). Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa Flavonoid dari Rimpang Temu Kunci (*Kaempferia pandurata* Roxb.) terhadap *Streptococcus mutans*. *Indonesian Journal of Chemical Science*, 7(2), 146–152.
- Hanwar, D., Dewi, M. S., Suhendi, A., & K, I. T. D. (2015). Analysis of Secondary Metabolites Profile of Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* Smith) Ethanol Extract Using Gas Chromatography Mass Spectroscopy with Derivatization. *Jurnal Tumbuhan Obat Indonesia*, 7(2), 1–8.
- Hasrianti, Nururrahmah, & Nurasia. (2016). Pemanfaatan Ekstrak Bawang Merah dan Asam Asetat Sebagai Pengawet Alami Bakso. *Jurnal Dinamika*, 07(1), 9–30.
- Ilmiati, I., Wulan, S., & Erfiana. (2017). Uji Fitokimia Ekstrak Buah Dengan. *Jurnal Dinamika*, 8(1), 66–84.
- Ilyas, A. (2013). *Kimia Organik Bahan Alam* (M. Baharuddin (ed.)). Alauddin

University Press.

- Izzah, N., Kadang, Y., & Permatasari, A. (2013). Uji Identifikasi Alkaloid Ekstrak Metanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk) Dari Kab. Ende Nusa Tenggara Timur Secara Kromatografi Lapis Tipis. *Jurnal Farmasi Sandi Karsa*, 5(1), 52–56.
- Kandarpa, T. I., Prasetyaningsih, A., & Prakasita, V. C. (2021). Uji Efektivitas Epikarpium Buah Nangka (*Artocarpus heterophyllus* lamarck.) Sebagai Sediaan Krim Tabir Surya UV-B. *Jurnal Pendidikan, Matematika dan Sains*, 6(1), 31–46.
- Khater, H. (2014). *Herbal and Horticultural Remedies: Gardening for The Elderly and Physically and Mentally Disabled*. Author House.
- Kiswandono, A. A. (2011). Skrining Senyawa Kimia dan Pengaruh Metode Maserasi dan Refluks Pada Biji Kelor (*Moringa oleifera*, Lamk) Terhadap Rendemen Ekstrak yang Dihasilkan. *Jurnal Sains Natural Universitas Nusa Bangsa*, 1(2), 126–134.
- Koga, A. Y., Beltrame, F. L., & Pereira, A. V. (2016). Several aspects of Zingiber zerumbet: A review. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, 26(3), 385–391. <https://doi.org/10.1016/j.bjp.2016.01.006>
- Lallo, S., Kasim, S., Tayeb, R., Hasan, A. D., Sere, H., Ismail, I., & Arifin, T. (2018). Analisis Zerumbone Dalam Zingiber zerumbet Dan Aktivitas Penghambatannya Terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 4(2), 126–132. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2018.v4.i2.11138>
- Lianah. (2019). *Biodiversitas Zingiberaceae Mijen Kota Semarang*. Deepublish.
- Maryam, S., Effendi, N., & Kasmah. (2019). Produksi dan Karakterisasi Gelatin dari Limbah Tulang Ayam dengan Menggunakan Spektrofotometer FTIR (Fourier Transform Infra Red). *Majalah Farmaseutik*, 15(2), 96. <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v15i2.47542>
- Mokhtar, N., Nordin, M. F. M., & Morad, N. A. (2018). Total phenolic content, total flavonoid content and radical scavenging activity from zingiber zerumbet rhizome using subcritical water extraction. *International Journal of Engineering, Transactions B: Applications*, 31(8), 1421–1429. <https://doi.org/10.5829/ije.2018.31.08b.34>
- Muaja, M. G. D., Runtuwene, M. R. J., & Kamu, V. S. (2017). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol dari Daun Soyogik (*Saurauia bracteosa* DC.). *Jurnal Ilmiah Sains*, 17.
- Mukhriani. (2014). Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Kesehatan UIN Alauddin*, 7(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24252/kesehatan.v7i2.55>
- Nag, A., Bandyopadhyay, M., & Mukherjee, A. (2013). Antioxidant Activities and Cytotoxicity of Zingiber zerumbet (L.) Smith Rhizome. *Journal of*

*Pharmacognosy and Phytochemistry*, 2(3), 102–108.  
<http://www.phytojournal.com/archives/2013/vol2issue3/PartB/30.1.pdf>


- Novia, D., Samudra, A. G., & Susanti, N. (2020). Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Jati dan Infusa Daun Jati (*Tectona grandis* L.S) dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). *Jurnal Ilmiah Pharmacy*, 7(2), 159–174. <https://doi.org/10.52161/jiphar.v7i2.188>
- Nuari, S., Anam, S., & Khumaidi, A. (2017). Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid Ekstrak Etanol Buah Naga. *Galenika Journal of Pharmacy*, 2(2), 118–125. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2017.v3.i2.118>
- Praptiwi, Jamal, Y., Wulansari, D., Fathoni, A., Palupi, K., Nurainas, & Agusta, A. (2015). Skrining Aktivitas Antioksidan Beberapa Tumbuhan Suku Zingiberaceae. *Prosiding SEMNAS Biodiversitas*, 4(MAY), 188–192.
- Putra, Y., Samirana, P. O., & Andhini, D. A. A. (2020). Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Flavonoid Potensial Antioksidan dari Daun Binahong (*Anredera scandens* (L.) Moq.). *Jurnal Farmasi Udayana*, 8(2), 85–94.
- Rabiu, A., & Haque, M. (2020). Preparation of Medicinal Plants: Basic Extraction and Fractionation Procedures for Experimental Purposes. *Journal of Pharmacy and BioAllied Sciences*, 12(January), 6–9. <https://doi.org/10.4103/jpbs.JPBS>
- Rejeki, S., & Priyandari, A. (2017). Uji Efek Tonikum Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* SM.) Terhadap Mencit Jantan Galur Swiss. *Indonesian Journal on Medical Science*, 4(2), 232–236.
- Rudiana, T., Fitriyanti, F., & Adawiah, A. (2018). Aktivitas Antioksidan dari Batang Gandaria (*Bouea macrophylla* Griff). *EduChemia (Jurnal Kimia dan Pendidikan)*, 3(2), 195. <https://doi.org/10.30870/educhemia.v3i2.3328>
- Sanjiwani, N. M. S., Paramitha, D. A. I., Wibawa, A. A. C., Ariawan, I. M. D., Megawati, F., Dewi, N. W. T., Mariati, N. P. A. M., & Sudiarsa, I. W. (2020). Pembuatan Hair Tonic Berbahan Dasar Lidah Buaya dan Analisis dengan Fourier Transform Infrared. *Jurnal Pendidikan*, 21(1), 249–262. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3756902>
- Santoso, U. (2021). *Antioksidan Pangan*. Gajah Mada University Press.
- Saputra, T. R., Ngatin, A., & Sarungu, Y. T. (2018). Penggunaan Metode Ekstraksi Maserasi dan Partisi pada Tumbuhan Cocor Bebek (*Kalanchoe pinnata*) dengan Kepolaran Berbeda. *Fullerene Journal of Chemistry*, 3(1), 5. <https://doi.org/10.37033/fjc.v3i1.26>
- Sari, A. N. (2016). Berbagai Tanaman Rempah Sebagai Sumber Antioksidan Alami. *Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology*, 2(2), 203. <https://doi.org/10.22373/ekw.v2i2.2695>
- Sastrohamidjoji, H. (2018). *Dasar-Dasar Spektroskopi* (T. U. Press (ed.); 1 ed.). Gajah Mada University Press.

- Sayuti, K., & Yenrina, R. (2015). *Antioksidan Alami dan Sintetik (I)*. Andalas University Press.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Mishbah*. Lentera Hati.
- Silalahi, M. (2018). Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith.). *Jurnal Pendidikan, Matematika, dan Sains*, 2(2), 147–160.
- Subositi, A. P. D. (2014). Analisis Ukuran Partikel Bahan Penyusun Ramuan Jamu Dan Volume Air Penyari Terhadap Mutu Ekstrak Yang Dihasilkan. *Jurnal Ilmu Farmasi dan Farmasi Klinik*, 111–115.
- Suhartati, T. (2017). *Dasar-Dasar Spektrofotometri UV-Vis dan Spektrofotometri Massa untuk Penentuan Struktur Senyawa Organik*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Sunarto, Choironi, N. A., & Syarifah, F. L. (2020). Aktivitas Antioksidan dan Kadar Flavonoid Total Lempuyang Wangi (*Zingiber aromaticum* Val.). *Acta Pharmaciae Indonesia*, 8(2), 61–68.
- Susanti, N. M. P., Budiman, I. N. ., & Warditiani, N. K. (2015). Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol 90 % Daun Katuk (*Sauropus androgynus* ( L .) Merr .). *Repository Universitas Udayana*, 83–86.
- Susanty, & Bachmid, F. (2016). Perbandingan Metode Ekstraksi Maserasi dan Refluks terhadap Kadar Fenolik dari Ekstrak Tongkol Jagung (*Zea mays* L.). *Jurnal Konversi Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 5(2), 87–93.
- Syarifuddin, A., & Sulistyani, N. (2019). Karakterisasi Fraksi Teraktif Senyawa Antibiotik Isolat Kp 13 Dengan Metode Densitometri Dan Klt-Semprot. *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina (JIIS): Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 4(1), 156–166. <https://doi.org/10.36387/jiis.v4i1.263>
- Theophanides, T. (2012). Introduction to Infrared Spectroscopy. In *Infrared Spectroscopy - Materials Science, Engineering and Technology*. InTech. <https://doi.org/10.5772/49106>
- Tian, M., Wu, X., Hong, Y., Wang, H., Deng, G., & Zhou, Y. (2020). Comparison of Chemical Composition and Bioactivities of Essential Oils from Fresh and Dry Rhizomes of *Zingiber zerumbet* (L.) Smith. *BioMed Research International*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/9641284>
- Utami, Y. P., Imrawati, & D., A. R. (2018). Isolasi dan Karakterisasi Ekstrak Etanol Daun Leilem (*Clerodendrum minahassae* Teijsm dan Binn.) Dengan Metode Spektrofotometri. *Pharmacy Medical Journal*, 1(2).
- Wandita, G. A., & Musrifoh, I. (2018). Review Artikel: Tanaman Suku Zingiberaceae yang Memiliki Aktivitas Sebagai Antioksidan. *Farmaka*, 16(2), 564–571.
- Watson, D. G. (2013). *Analisis Farmasi: Buku Ajar Untuk Mahasiswa Farmasi dan Praktisi Kimia Farmasi* (A. H. Hadinata (ed.); 2 ed.). EGC.


- Werdhasari, A. (2014). Peran Antioksidan Bagi Kesehatan. *Jurnal Biomedik Medisiana Indonesia*, 3(2), 59–68.
- Wirdayanti, & Sofiyanti, N. (2019). Skrining Fitokimia Lima Jenis Tumbuhan Paku Polypodiaceae Dari Provinsi Riau. *Jurnal Biota*, 4(2), 40–49. <https://doi.org/2527-323X>
- Yanty, Y. N., Sopianti, D. S., & Veronica, C. (2019). Fraksinasi dan Skrining Fraksi Biji Kebiul (*Caesalpinia bonduc* (L) Roxb) dengan Metode KLT (Kromatografi Lapis Tipis). *Borneo Journal of Phamascientech*, 3(1), 56–64.
- Yasni, S. (2013). *Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Produk Ekstraktif Rempah* (Y. HE Frandy, H. Baihaqi, & N. Tensai (ed.)). PT. Penerbit IPB Press.
- Yuslianti, E. R. (2018). *Pengantar Radikal Bebas dan Antioksidan* (1 ed.). Deepublish.
- Zakaria, Z. A., Yob, N. J., Jofry, S. M., Affandi, M. M. R. M. M., Teh, L. K., & Salleh, M. Z. (2011). Zingiber zerumbet (L.) Smith: A review of its ethnomedicinal, chemical, and pharmacological uses. *Evidence-based Complementary and Alternative Medicine*, 2011(March). <https://doi.org/10.1155/2011/543216>


### Lampiran 1. Skema Kerja

#### A. Preparasi sampel





#### B. Ekstraksi Sampel






### C. Partisi Ekstrak






#### D. Skrining Fitokimia

##### a. Uji Alkaloid




## b. Uji Flavonoid



## c. Uji Steroid dan Triterpenoid



## d. Uji Saponin



↓

Busa setinggi 1-10 cm yang terbentuk selama tidak kurang dari 10 detik menandakan adanya saponin dan busa tidak hilang dengan penambahan 1 tetes HCl 2N

e. Uji Tanin dan Polifenol

Disiapkan 2 ml hasil partisi n-heksan dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2 tetes FeCl 10%

↓

Hasil positif mengandung tanin ditandai dengan warna hitam kehijauan dan positif polifenol ditandai dengan warna biru tua

**E. Orientasi Eluen**

Disiapkan lempeng KLT, pelarut etil asetat dan n-heksan

↓

Disiapkan ekstrak n-heksan hasil partisi

↓

Diaktifkan lempeng KLT lalu dipotong dengan ukuran 1x7 cm dan dibagi batas atas dan bawah pada lempeng


↓

Ditolkan ekstrak menggunakan pipa kapiler


↓

Dijenuhkan chamber dengan eluen yang digunakan

↓




#### F. Fraksinasi Sampel





## G. Karakterisasi Senyawa

### 1. KLT-bioautografi



### 2. Spektrofotometri FTIR





## Lampiran 2. Perhitungan Rendemen dan Pembuatan Pereaksi

### A. Perhitungan Rendemen

Dihitung persentase rendemen ekstrak larut n-heksan dalam ekstrak metanol hasil maserasi

$$\% \text{ rendemen} = \frac{\text{berat ekstrak}}{\text{berat sampel}} \times 100\%$$

$$\% \text{ rendemen} = \frac{1,357 \text{ gram}}{20 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$\% \text{ rendemen} = 6,785\%$$

### B. Pembuatan Pereaksi

#### 1. Larutan HCl 2N

Diketahui konsentrasi HCl pekat 37%, berat jenis (bj) HCl 1,19 g/mol, berat molekul (BM) HCl 36,5 g/mol

$$\text{Normalitas (N)} = \frac{(10 \times \% \text{ konsentrasi HCl pekat} \times \text{bj})}{\text{BM}} \times \text{valensi}$$

$$\text{Normalitas (N)} = \frac{(10 \times 37\% \times 1,19)}{36,5} \times 1$$

$$\text{Normalitas (N)} = 12,06 \text{ N}$$

Dibuat larutan HCl 2N sebanyak 20 ml

$$N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2$$

$$2 \text{ N} \times 20 \text{ ml} = 12,06 \text{ N} \times V_2$$

$$V_2 = 3,3 \text{ ml}$$

Dibuat larutan HCl 2 N sebanyak 20 ml dengan mengambil 3,3 ml HCl pekat lalu dicukupkan hingga 20 ml dan disimpan dalam botol coklat.

## 2. Pembuatan FeCl<sub>3</sub> 10%

Dibuat larutan FeCl<sub>3</sub> 10% sebanyak 10 ml

$$N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2$$

$$10\% \times 10 \text{ ml} = 100\% \times V_2$$

$$V_2 = 1 \text{ ml}$$

Dibuat larutan FeCl<sub>3</sub> 10% sebanyak 10 ml dengan mengambil 1 ml FeCl<sub>3</sub> 100% lalu dicukupkan hingga 10 ml dan disimpan dalam botol coklat.

## 3. Pembuatan Pereaksi DPPH 0,45 Mm

Diketahui massa molekul relatif (Mr) dari DPPH ialah 394,32 dan larutan yang dibuat sebanyak 10 ml.

$$0,45 \text{ mM} = 0,00045 \text{ M}$$

$$\text{Molaritas (M)} = \frac{\text{massa (g)}}{\text{molekul relatif (Mr)}} \times \frac{1000}{\text{volume (V)}}$$

$$0,00045 = \frac{\text{massa (g)}}{394,32} \times \frac{1000}{10}$$

$$0,00045 = \frac{100 \times \text{massa (g)}}{394,32}$$

$$100 \times \text{massa (g)} = 394,32 \times 0,00045$$

$$\text{Massa (g)} = 0,00177 \text{ gram}$$

$$\text{Massa} = 1,77 \text{ mg} \approx 1,8 \text{ mg}$$

**Lampiran 3. Perhitungan Nilai Rf**

$$R_f = \frac{\text{jarak yang ditempuh komponen}}{\text{jarak yang ditempuh pelarut}}$$

**A. Nilai Rf Noda Di bawah Lampu UV**

1. Fraksi 2

$$\text{Noda 1} = \frac{4,5}{5,5} = 0,81$$

$$\text{Noda 2} = \frac{4,2}{5,5} = 0,76$$

$$\text{Noda 3} = \frac{3,6}{5,5} = 0,65$$

2. Fraksi 3

$$\text{Noda 1} = \frac{3,6}{5,5} = 0,65$$

$$\text{Noda 2} = \frac{2,6}{5,5} = 0,47$$

$$\text{Noda 3} = \frac{2,2}{5,5} = 0,4$$

$$\text{Noda 4} = \frac{1,7}{5,5} = 0,31$$

3. Fraksi 4

$$\text{Noda 1} = \frac{2,2}{5,5} = 0,4$$

$$\text{Noda 2} = \frac{1,7}{5,5} = 0,31$$

4. Fraksi 5

$$\text{Noda 1} = \frac{1,4}{5,5} = 0,25$$

$$\text{Noda 2} = \frac{0,7}{5,5} = 0,14$$

5. Fraksi 6

$$\text{Noda 1} = \frac{0,7}{5,5} = 0,14$$

6. Fraksi 7

$$\text{Noda 1} = \frac{0,5}{5,5} = 0,09$$

7. Fraksi 8

$$\text{Noda 1} = \frac{0}{5,5} = 0$$

8. Fraksi 9

$$\text{Noda 1} = \frac{0}{5,5} = 0$$

9. Fraksi 10

$$\text{Noda 1} = \frac{0}{5,5} = 0$$

10. Fraksi Metanol

$$\text{Noda 1} = \frac{0}{5,5} = 0$$

## B. Nilai Rf Noda Dengan Penetesan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10%

1. Fraksi 2

$$\text{Noda 1 (ungu)} = \frac{4,6}{5,5} = 0,83$$

$$\text{Noda 2 (jingga)} = \frac{4,3}{5,5} = 0,78$$

$$\text{Noda 3 (cokelat)} = \frac{4}{5,5} = 0,72$$

## 2. Fraksi 3

$$\text{Noda 1 (cokelat pudar)} = \frac{3}{5,5} = 0,54$$

$$\text{Noda 2 (ungu keabuan)} = \frac{2,5}{5,5} = 0,45$$

## 3. Fraksi 4

$$\text{Noda 1 (ungu pudar)} = \frac{2,5}{5,5} = 0,45$$

## 4. Fraksi 5

$$\text{Noda 1 (cokelat kehijauan)} = \frac{2,2}{5,5} = 0,4$$

## 5. Fraksi 6

$$\text{Noda 1 (cokelat kehijauan)} = \frac{1}{5,5} = 0,18$$

## 6. Fraksi 7

$$\text{Noda 1 (cokelat)} = \frac{0,5}{5,5} = 0,09$$

## 7. Fraksi 8

$$\text{Noda 1 (cokelat kehijauan)} = \frac{0}{5,5} = 0$$

## 8. Fraksi 9

$$\text{Noda 1 (hijau kekuningan)} = \frac{0}{5,5} = 0$$

## 9. Fraksi 10

$$\text{Noda 1 (hijau kekuningan)} = \frac{0}{5,5} = 0$$

## 10. Fraksi Metanol

$$\text{Noda 1 (cokelat pudar)} = \frac{0}{5,5} = 0$$

**C. Nilai Rf Noda Dengan Penetasan DPPH**

## 1. Fraksi 2

$$\text{Noda 1} = \frac{4,3}{5,5} = 0,78$$

## 2. Fraksi 3

$$\text{Noda 1} = \frac{2,2}{5,5} = 0,4$$

## 3. Fraksi 4

$$\text{Noda 1} = \frac{2,1}{5,5} = 0,38$$

## 4. Fraksi 5

$$\text{Noda 1} = \frac{1,2}{5,5} = 0,22$$

## 5. Fraksi 6

$$\text{Noda 1} = \frac{0,9}{5,5} = 0,16$$

*Lampiran 4. Gambar Penelitian*



**Gambar 10.** Sampel Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.)



**Gambar 11.** Perajangan Rimpang Lempuyang Gajah



**Gambar 12.** Penggunaan *Rotary Evaporator* Untuk Memekatkan Ekstrak




**Gambar 13.** Proses Pelarutan Ekstrak Metanol Kental ke Aquadest



**Gambar 14.** Proses Partisi Aquadest dan N-heksan




**Gambar 15.** Ekstrak Pekat N-heksan Hasil Partisi



**Gambar 16.** Skrining Fitokimia Ekstrak N-heksan Hasil Partisi



**Gambar 17.** Fraksinasi Ekstrak N-heksan Dengan Berbagai Perbandingan Eluen



**Gambar 18.** Penotolan Fraksi dan Pengelusian Lempeng KLT





**Gambar 19.** Preparasi dan Karakterisasi Tiap Fraksi Untuk Dianalisis Dengan Spektrofotometer FTIR



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sofhia Nuraini Zahra atau yang sering dipanggil Sofhia, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ia lahir di Makassar pada tanggal 10 Februari 2000. Penulis merupakan anak dari Catur Nugroho Widhy dan Harifah Nurni. Penulis memulai pendidikannya di TK Minasa Upa pada umur 3,5 tahun dan melanjutkan pendidikannya di SDN I Katangka pada umur 5 tahun. Pada pertengahan pendidikannya di sekolah dasar, ia memilih untuk pindah ke Kota Tarakan dan melanjutkan pendidikannya di SDS Patra Dharma. Pada umur 11 tahun, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Tarakan dan menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Tarakan. Pada tahun 2017, penulis lulus dan kembali melanjutkan pendidikan S1-nya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memilih jurusan Farmasi.

Penulis memiliki hobi menggambar dan menjelajahi alam sekitar. Penulis memiliki prinsip dalam menjalani kehidupannya yaitu selalu melakukan yang terbaik meskipun hasil yang didapatkan tidak sesuai yang diharapkan. Penulis berharap kedepannya dapat menjadi pribadi yang sukses dan mendapat kemudahan dalam mencapai cita-cita yakni sebagai apoteker.