INTERVENSI TERAPI RELAKSASI OTOT PROGRESIF PADA LANSIA YANG MENGALAMI SYNDROM GERIATRI *IMMOBILITY* DENGAN MASALAH NYERI

Tugas Akhir Ners

Oleh:

SRI WAHYUNI, S. Kep
NIM: 70900120006

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2021

INTERVENSI TERAPI RELAKSASI OTOT PROGRESIF PADA LANSIA YANG MENGALAMI SYNDROM GERIATRI *IMMOBILITY* DENGAN MASALAH NYERI

Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SRI WAHYUNI, S. Kep
NIM: 70900120006

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Sri Wahyuni, S. Kep
NIM	: 70900120006
Tempat/Tgl, Lahir	: Bulukumba, 09 Desember 1998
Jurusan	: Profesi Ners
Fakultas	: Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat	: BTN Antang Jaya Blok K 14
Judul	: Intervensi terapi relaksasi otot progresif pada lansia yang mengalami syndrom geriatri immobility dengan masalah nyeri

Dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tugas akhir ini benar adalah hasil karya tulis ilmiah penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari tugas akhir ini adalah duplikat, plagiat, tiruan dari hasil kerja orang lain, maka karya tulis dan gelar yang diperoleh tidak sah/batal dimata hukum.

Makassar, 24 Mei 2021

Penyusun

SRI WAHYUNI , S. Kep

NIM:70900120006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Nama: Sri Wahyuni Nim: 70900120006, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul "Intervensi terapi relaksasi otot progresif pada lansia yang mengalami syndrom geriatri *immobility* dengan masalah nyeri" memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 16 Juli 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Aidah Fitriani, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes
Pembimbing I	Pembimbing II

PENGESAHAN KTI

Tugas akhir Ners yang berjudul "Intervensi terapi relaksasi otot progresif pada lansia yang mengalami syndrom geriatri *immobility* dengan masalah nyeri" yang disusun oleh Sri wahyuni,S.Kep. Nim: 70900120006, mahasiswa program studi profesi Ners jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan di pertahankan dalam sidang *munaqasah* yang diselenggarakan pada hari jum'at 16 juli 2021 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam ilmu kesehatan, jurusan Keperawatan.

Makassar, 16 Juli 2021 M

Dzulqidah 1442 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekertaris	: Dr. Patimah. S.Kep.,Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Ns. Nurhidayah, S.Kep, M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Saleh Ridwan	(.....)
Pembimbing I	: Ns. Aidah Fitriani, S.Kep., Ns, M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Eny Sutria, S.Kep., Ns, M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP:198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapa menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat beserta salam kita limpahkan untunk junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir ners yang berjudul "Intervensi terapi relaksasi otot progresif pada lansia yang mengalami syndrom geriatri *immobility* dengan masalah nyeri" ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. dr. Syatirah,S.Ked.,M.Kes.,Sp.A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep dan Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Ners,Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ns. Aidah Fitriani, S.Kep.,M.Kep dan Ns. Eny Sutria, S.Kep.,M.Kes selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini
4. Ns. Nurhidayah, S.Kep.,M.Kep dan Dr. Saleh Ridwan selaku penguji I dan II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membangun bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ners ini.
5. Seluruh Dosen Jurusan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

6. Keluarga tercinta terimakasih yang tak terhingga atas doa dan dukungannya selama ini, untuk ibu saya terimakasih atas dukungan yang tak ternilai yang diberikan, kepada suami saya terimakasih yang setia mendampingi dalam proses perkuliahan selama ini
7. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang begitu banyak membantu dalan penyusunan tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat di rasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik diwaktu yang akan datang.

Gowa, 16 Juli 2021

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

Sampul ..... **i**
Halaman Sampul ..... **ii**
Halaman Pernyataan Keaslian ..... **iii**
Halaman Persetujuan ..... **iv**
Halaman Pengesahan ..... **v**
Kata Pengantar ..... **vi**
Daftar Isi ..... **vii**
Daftar Gambar ..... **viii**
Daftar Tabel ..... **ix**
Halaman Abstrak (Indonesia) ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian Umum dan Tujuan Khusus 3
D. Manfaat Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Teori Sindrom Geriatri 5
B. Konsep Keperawatan 13
C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan 29
D. *Evidence Based Nursing* (EBN) 31

BAB III LAPORAN KASUS
A. Pengkajian 41
B. Analisis Data 66
C. Diagnosis Keperawatan 68
D. Intervensi Keperawatan 69
E. Implementasi Keperawatan 74
F. Evaluasi Keperawatan 74

BAB IV PEMBAHASAN
A. Analisis Kasus 87
B. Analisis Intervensi 89
C. Alternatif pemecahan Masalah 93

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 95
B. Saran 96

Daftar Pustaka **97**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Pengkajian 53

Tabel 1.2 Analisis data..... 78

Tabel 1.3 Diagnosis Keperawatan..... 79

Tabel 1.4 Intervensi Keperawatan..... 80

Tabel 1.5 Implementasi Keperawatan..... 84

Tabel 1.6 Evaluasi Keperawatan..... 84

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Sri Wahyuni

Nim : 70900120006

Judul : "Intervensi terapi relaksasi otot progresif pada lansia yang mengalami syndrom geriatri *immobility* dengan masalah nyeri"

Kurang aktifitas fisik merupakan faktor risiko timbulnya berbagai penyakit pada populasi lansia. Proses menua akan menimbulkan masalah gangguan pada fungsi muskuluskeletal yang sering muncul yaitu nyeri pada sendi yang membuat para lansia mengalami ganguan dalam aktivitasnya. Salah satu tindakan keperawatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri sendi menggunakan teknik relaksasi otot progresif. Studi kasus ini menggunakan metode deskriptif. Sampel diambil dengan tehnik *Convenience Sampling* dan dikelola selama 3 hari dengan pemberian tindakan keperawatan berupa terapi relaksasi otot progresif dengan frekuensi 1 kali/hari selama 20 menit. Pengumpulan data menggunakan buku status PM, wawancara, observasi dan metode proses keperawatan. Alat untuk skala nyeri menggunakan *Visual Analog Scale* (VAS). Terdapat perubahan setelah diberikan terapi relaksasi otot progresif pada lansia yang mengalami nyeri sendi akan tetapi hasilnya belum teratasi dikarenakan durasi pemberian terapi ini cukup singkat hanya dilakukan selama 3 hari sedangkan klien Ny.R memiliki riwayat tirah baring yang cukup lama.

Keywords : Relaksasi otot progresif; Lansia; Nyeri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut *Aging Process* atau proses penuaan. Penuaan merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya, yaitu anak, dewasa, tua. Memasuki tua berarti mengalami kemunduran, msialnya kemunduran fisik yang di tandai dengan kulit mengendur, rambut memutih, gigi mulai ompong, pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat, dan figur tubuh yang tidak proposional. (Nugroho, 2008 dalam Hasrul & Muas, 2018)

Menurut data *World health Organization* (WHO) pada tahun 2020 di kawasan Asia Tenggara populasi Lansia sebesar 8% atau sekitar 142 juta jiwa. Pada tahun 2050 diperkirakan populasi Lansia meningkat 3 kali lipat dari tahun ini. Pada tahun 2000 jumlah Lansia sekitar 5,300,000 (7,4%) dari total populasi, sedangkan pada tahun 2010 jumlah Lansia 24,000,000 (9,77%) dari total populasi, dan tahun 2020 diperkirakan jumlah Lansia mencapai 28,800,000 (11,34%) dari total populasi. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2020 diperkirakan jumlah Lansia sekitar 80 juta jiwa. (Kemenkes, 2020).

Di Indonesia jumlah populasi lansia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 adalah sebesar 9,92% atau 26,82 juta jiwa dari total penduduk Indonesia. Sedangkan untuk jumlah lansia di provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 9,52% jiwa. Di kabupaten Gowa tercatat jumlahpenduduk lansia sebanyak 9,41 % atau 8,91 ribu jiwa di tahun 2020.

Penuaan menyebabkan penurunan fungsional organ dan system tubuh, salah satunya system muskuloskeletal. Berdasarkan *Data World Health Organization* (WHO) tahun 2020 ada sekitar 1,71 miliar di orang dunia

memiliki masalah pada system muskuloskeletal di seluruh dunia. Dengan prevelensi tertinggi yaitu sakit punggung 568 juta jiwa, patah tulang dengan 436 juta, osteoarthritis 343 juta jiwa, nyeri leher 222 juta jiwa, amputasi 175 juta dan rheumatoid arthritis 14 juta orang di seluruh duni. sedangkan di Indonesia berdasarkan data Riskasdes tahun 2018 nyeri sendi yang terjadi pada umur 55-64 tahun (15,5%), umur 65-74 tahun (18,6%) dan umur 75 tahun keatas (18,9%). Prevalensi penyakit sendi di Sulawesi selatan sebesar 6,85%, dan di kabupaten Gowa 5,46% jiwa.

Berdasarkan data yang diperoleh di BRSLU Gau Mabaji Kabupaten Gowa**,** Terdapat sebanyak 6 lansia pada tahun 2021 dengan jumlah laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan 3 orang. Lansia yang mengalami imobility sebanyak 4 orang, sedangkan 2 orang lainnya mengalami dimensia pendengaran.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang di lakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah pasien yang mengalami hambatan mobilitas fisik adalah tehnik relaksasi otot progresif dimana melakukan kegiatan yang terfokus dalam mempertahankan kondisi tetap relaksasi yang melibatkan kontraksi dan relaksasi berbagai kelompok otot tubuh mulai dari kepala ke arah bawah kaki kearah atas dengan cara ini maka akan terjadi dimana otot itu akan berada dan dalam hal ini akan meningkatkan kesadaran terhadap respon otot tubuh (Murniati, ririn isma, 2020).

Tehnik relaksasi otot progresif dapat mengurangi mengurangi kelelahan dan mengurangi nyeri, kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur (Kobayashi, S., & Koitabashi, 2016). tehnik ini merupakan salah satu terapi nonfarmakologi yang dapat diberikan dalam membantu mengurangi nyeri.

Dalam penelitian (Wijaya,Tri. 2020) mengatakan bahwa Penerapan terapi ROP mampu menurunkan nyeri sendi yang dialami lansia. Penelitian lainya juga mengatakan terapi ROP dan kompres hangat dapat digunakan untuk mengurangi skala nyeri sendi pada orang tua, meskipun secara statistik menunjukkan bahwa intervensi terapi ROP lebih efektif dalam mengurangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

nyeri (Selvia dyah, 2020). Dalam seminggu lansia mendapat terapi sebanyak 3 kali pertemuan. Dengan waktu sesuai kesepakatan dari responden. Didapatkan hasil adanya pengaruh terapi otot progresif mampu menurunkan nyeri pada Responden (Eva, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa penting untuk menganalisis terkait "Intervensi terapi relaksasi otot progresif pada lansia yang mengalami syndrom geriatri imobility dengan masalah nyeri"

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan "Intervensi terapi relaksasi otot progresif pada lansia yang mengalami syndrom geriatri *imobility* dengan masalah nyeri" ?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

   Untuk mengetahui pengaruh intervensi terapi relaksasi otot progresif terhadap nyeri pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *imobility* di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Gau Mabaji Gowa

2. Tujuan Khusus
   a. Untuk Mengetahui gambaran hasil pengkajian pada lansia yang mengalami syndrom geriatri *immobility*
   b. Untuk Mengetahui diagnosis keperawatan pada lansia yang mengalami syndrom geriatri *immobility.*
   c. Untuk Mengetahui intervensi keperawatan pada lansia yang mengalami syndrom geriatri *immobility.*
   d. Untuk mengetahui implementasi keperawatan pada lansia yang mengalami syndrom geriatri *immobility.*
   e. Untuk mengetahui evaluasi tindakan keperawatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan pada lansia yang mengalami syndrom geriatri *immobility.*
   f. Untuk Menganalisis intervensi terapi relaksasi otot progresif pada lansia yang mengalami syndrom geriatri *imobility* dengan masalah nyeri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis

   Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan praktik asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami syndrom geriatri *imobility* dengan masalah nyeri.

2. Manfaat aplikatif

   Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan sebagai intervensi pada lansia yang mengalami syndrom geriatri *imobility* dengan masalah nyeri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB II
TINJAUAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Sindrom geriatri

Sindrom geriatri merupakan kumpulan gejala dan atau tanda klinis, dari satu atau lebih penyakit yang sering dijumpai pada pasien geriatric. Tampilan klinis yang tidak khas sering membuat sindrom geriatri tidak terdiagnosis. Sindrom geriatri meliputi gangguan kognitif, depresi, inkontinensia, ketergantungan fungsional, dan jatuh.Sindrom geriatrik menampilkan banyak fitur-fitur umum. Keadaan lansia sangat umum yaitu lemah. Efeknya pada kualitas hidup dan cacat substansial. Sering gejala utama tidak berhubungan dengan kondisi patologis tertentu yang mendasari perubahan status kesehatan. Sebagai contoh, ketika infeksi yang melibatkan saluran kemih menyebabkan delirium, itu adalah perubahan fungsi saraf dalam bentuk perubahan kognitif dan perilaku yang memungkinkan diagnosis delirium dan menentukan hasil fungsional yang banyak. Karena sindrom ini melibatkan banyak sistem organ, diperlukan perencanaan dan pemberian perawatan klinis (Yulianti, 2015).

Dalam menilai kesehatan lansia perlu dibedakan antara perubahan akibat penuaan dengan perubahan akibat proses patologis. Beberapa problema klinik dari penyakit pada lanjut usia yang sering dijumpai. Pasien geriatri sering disertai penyakit kronis degeneratif. masalah yang muncul sering tumpang tindih dengan gejala yang sudah lama diderita sehingga tampilan gejala menjadi tidak jelas. Penyakit degeneratif yang banyak dijumpai pada pasien geriatri adalah hipertensi, diabetes melitus, dislipidemia, osteoartritis, dan penyakit kardiovaskular (Widiantari, 2019).

2. Klasifikasi sindrom geriatric

Adapun Klasifikasi sindrom geriatric menurut Rika Widiantari (2019):

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

a. Imobilisasi (kurang bergerak)

Didefinisikan sebagai keadaan tidak bergerak/tirah baring selama 3 hari atau lebih, dengan gerak anatomi tubuh menghilang akibat perubahan fungsi fisiologis. Berbagai faktor fisik, psikologis, dan lingkungan dapat menyebabkan imobilisasi pada usia lanjut. Penyebab utama imobilisasi adalah adanya rasa nyeri, lemah, kekakuan otot, ketidak seimbangan, dan masalah psikologis. Beberapa informasi penting meliputi lamanya menderita disabilitas yang menyebabkan imobilisasi, penyakit yang mempengaruhi kemampuan mobilisasi, dan pemakaian obat-obatan untuk mengeliminasi masalah iatrogenesis yang menyebabkan imobilisasi (Widiantari, 2019)

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia hingga dari sel darah hingga system pergerakan/muskuloskeletal. QS Al-Mu'minun (ayat 14) :

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَۗ

Terjemahnya :

> *"14. Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta."*

Ayat diatas menjelaskan betapa besar kuasa Allah swt yang telah menciptakan kita, dari sel terkecil hingga membentuk tulang sebagai system pergerakan yang menjadi struktur utama dalam mobilitas kita.

b. Instability (Instabilitas dan Jatuh)

Terdapat banyak faktor yang berperan untuk terjadinya instabilitas dan jatuh pada orang usia lanjut. Berbagai faktor tersebut dapat

diklasifikasikan sebagai faktor intrinsik (faktor risiko yang ada pada pasien) dan faktor risiko ekstrinsik (faktor yang terdapat di lingkungan) IWidiantari, 2019).

c. Incontinence (Inkontinensia Urin dan Alvi)

Inkontinensia urin didefinisikan sebagai keluarnya urin yang tidak dikehendaki dalam jumlah dan frekuensi tertentu sehingga menimbulkan masalah sosial dan atau kesehatan. Inkontinensia urin merupakan salah satu sindroma geriatrik yang sering dijumpai pada usia lanjut. Diperkirakan satu dari tiga wanita dan 15-20% pria di atas 65 tahun mengalami inkontinensia urin. Inkontinensia urin merupakan fenomena yang tersembunyi, disebabkan oleh keengganan pasien menyampaikannya kepada dokter dan di lain pihak dokter jarang mendiskusikan hal ini kepada pasien (Kane et al., 2008; Cigolle et al., 2007).

d. Intelectual Impairement (Gangguan Intelektual Seperti Demensia dan Delirium)

Keadaan yang terutama menyebabkan gangguan intelektual pada pasien lanjut usia adalah delirium dan demensia. Demensia adalah gangguan fungsi intelektual dan memori didapat yang disebabkan oleh penyakit otak, yang tidak berhubungan dengan gangguan tingkat kesadaran. Demensia tidak hanya masalah pada memori. Demensia mencakup berkurangnya kemampuan untuk mengenal, berpikir, menyimpan atau mengingat pengalaman yang lalu dan juga kehilangan pola sentuh, pasien menjadi perasa, dan terganggunya aktivitas (Geddes et al.,2005; Blazer et al., 2009).

e. Infection (infeksi)

Infeksi pada usia lanjut (usila) merupakan penyebab kesakitan dan kematian nomor 2 setelah penyakit kardiovaskular di dunia. Hal ini terjadi akibat beberapa hal antara lain: adanya penyakit komorbid kronik yang cukup banyak, menurunnya daya tahan/imunitas terhadap infeksi, menurunnya daya komunikasi usia sehingga sulit/jarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

mengeluh, sulitnya mengenal tanda infeksi secara dini. Ciri utama pada semua penyakit infeksi biasanya ditandai dengan meningkatnya temperatur badan, dan hal ini sering tidak dijumpai pada usia lanjut, 30-65% usia lanjut yang terinfeksi sering tidak disertai peningkatan suhu badan, malah suhu badan dibawah 36℃ lebih sering dijumpai. Keluhan dan gejala infeksi semakin tidak khas antara lain berupa konfusi/delirium sampai koma, adanya penurunan nafsu makan tiba-tiba, badan menjadi lemas, dan adanya perubahan tingkah laku sering terjadi pada pasien usia lanjut (Kane et al., 2008).

f. Impairement of hearing, vision and smell (gangguan pendengaran, penglihatan dan penciuman)

Gangguan penglihatan bisa disebabkan gangguan refraksi, katarak atau komplikasi dari penyakit lain misalnya DM, HT dll, penatalaksanaan dengan memakai alat bantu kacamata atan dengan operasi pada katarak. Gangguan pendengaran sangat umum ditemui pada lanjut usia dan menyebabkan pasien sulit untuk diajak komunikasi. Prevalensi gangguan pendengaran sedang atau berat meningkat dari 21% pada kelompok usia 70 tahun sampai 39% pada kelompok usia 85 tahun. Pada dasarnya, etiologi gangguan pendengaran sama untuk semua umur, kecuali ditambah presbikusis untuk kelompok geriatri. Penatalaksanaan untuk gangguan pendengaran pada geriatri adalah dengan cara memasangkan alat bantu dengar atau dengan tindakan bedah berupa implantasi koklea (Salonen, 2013).

g. Isolation (Depression)

Isolation (terisolasi) dan depresi, penyebab utama depresi pada usia lanjut adalah kehilangan seseorang yan disayangi, pasangan hidup, anak, bahkan binatang peliharaan. Selain itu kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan, menyebabkan dirinya terisolasi dan menjadi depresi. Keluarga yang mulai mengacuhkan karena merasa direpotkan menyebabkan pasien akan merasa hidup sendiri dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

menjadi depresi. Beberapa orang dapat melakukan usaha bunuh diri akibat depresi yang berkepajangan

h. Inanition (malnutrisi)

Kelemahan nutrisi merujuk pada hendaya yang terjadi pada usia lanjut karena kehilangan berat badan fisiologis dan patologis yang tidak disengaja. Anoreksia pada usia lanjut merupakan penurunan fisiologis nafsu makan dan asupan makan yang menyebabkan kehilangan berat badan yang tidak diinginkan (Kane et al., 2008). Pada pasien, kekurangan nutrisi disebabkan oleh keadaan pasien dengan gangguan menelan, sehingga menurunkan nafsu makan pasien.

i. Impecunity (kemiskinan)

Impecunity (kemiskinan), usia lansia dimana seseorang menjadi kurang produktif (bukan tidak produktif) akibat penurunan kemampuan fisik untuk beraktivitas. Usia pensiun dimana sebagian dari lansia hanya mengandalkan hidup dari tunjangan hari tuanya. Pada dasarnya seorang lansia masih dapat bekerja, hanya saja intensitas dan beban kerjanya yang harus dikurangi sesuai dengan kemampuannya, terbukti bahwa seseorang yang tetap menggunakan otaknya hingga usia lanjut dengan bekerja, membaca, dsb., tidak mudah menjadi “pikun” . Selain masalah finansial, pensiun juga berarti kehilangan teman sejawat, berarti interaksi sosialpun berkurang memudahakan seorang lansia mengalami depresi.

j. Iatrogenic (penyakit karena pemakaian obat-obatan)

Karakteristik yang khas dari pasien geriatri yaitu multipatologik, seringkali menyebabkan pasien tersebut perlu mengkonsumsi obat yang tidak sedikit jumlahnya. Akibat yang ditimbulkan antara lain efek samping dan efek dari interaksi obat-obat tersebut yang dapat mengancam jiwa. Pemberian obat pada lansia haruslah sangat hati-hati dan rasional karena obat akan dimetabolisme di hati sedangkan pada lansia terjadi penurunan fungsi faal hati sehingga terkadang terjadi ikterus (kuning) akibat obat. Selain penurunan faal hati juga terjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

penurunan faal ginjal (jumlah glomerulus berkurang), dimana sebagaian besar obat dikeluarkan melalui ginjal sehingga pada lansia sisa metabolisme obat tidak dapat dikeluarkan dengan baik dan dapat berefek toksik.

k. Insomnia (Sulit tidur)

Insomnia, dapat terjadi karena masalah-masalah dalam hidup yang menyebabkan seorang lansia menjadi depresi. Selain itu beberapa penyakit juga dapat menyebabkan insomnia seperti diabetes melitus dan hiperaktivitas kelenjar thyroid, gangguan neurotransmitter di otak juga dapat menyebabkan insomnia. Jam tidur yang sudah berubah juga dapat menjadi penyebabnya.

l. Immuno-defficiency (penurunan sistem kekebalan tubuh)

Immuno-defficiency (penurunan sistem kekebalan tubuh) banyak hal yang mempengaruhi penurunan sistem kekebalan tubuh pada usia lanjut seperti atrofi thymus (kelenjar yang memproduksi sel-sel limfosit T) meskipun tidak begitubermakna (tampak bermakna pada limfosit T CD8) karena limfosit T tetap terbentuk di jaringan limfoid lainnya. Begitu juga dengan barrier infeksi pertama pada tubuh seperti kulit dan mukosa yang menipis, refleks batuk dan bersin -yang berfungsi mengeluarkan zat asing yang masuk ke saluran nafas- yang melemah. Hal yang sama terjadi pada respon imun terhadap antigen, penurunan jumlah antibodi. Segala mekanisme tersebut berakibat terhadap rentannya seseorang terhadap agen-agen penyebab infeksi, sehingga penyakit infeksi menempati porsi besar pada pasien lansia.

m. Impotency (Impotensi)

Ketidakmampuan melakukan aktivitas seksual pada usia lanjut terutama disebabkan oleh gangguan organik seperti gangguan hormon, syaraf, dan pembuluh darah. Ereksi terjadi karena terisinya penis dengan darah sehingga membesar, pada gangguan vaskuler seperti sumbatan plak aterosklerosis (juga terjadi pada perokok) dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

menyumbat aliran darah sehingga penis tidak dapat ereksi. Penyebab lainnya adalah depresi.

n. Impaction (sulit buang air besar)

Faktor yang mempengaruhi: kurangnya gerak fisik, makanan yang kurang mengandung serat, kurang minum, akibat obat-obat tertentu dan lain-lain. o Akibatnya pengosongan usus menjadi sulit atau isi usus menjadi tertahan, kotoran dalam usus menjadi keras dan kering dan pada keadaan yang berat dapat terjadi penyumbatan didalam usus dan perut menjadi sakit.

3. Etiologi Sindrom Geriatri *Immobility*

Berbagai faktor baik fisik, psikologis, dan lingkungan dapat menyebabkan imobilisasi pada pasien usia lanjut. Beberapa penyebab utama imobilisasi adalah adanya rasa nyeri, lemah, kekakuan otot, ketidakseimbangan, dan masalah psikologis. Penyakit Parkinson, artritis reumatoid, gout, dan obat-obatan antipsikotik seperti haloperidol juga dapat menyebabkan kekakuan. Rasa nyeri, baik dari tulang (osteoporosis, osteomalasia, Paget's disease, metastase kanker tulang, trauma), sendi (osteoartritis, artritis reumatoid, gout), otot (polimalgia, pseudoclaudication) atau masalah pada kaki dapat menyebabkan imobilisasi. Efek samping beberapa obat misalnya obat hipnotik dan sedatif dapat pula menyebabkan gangguan mobilisasi.

Lansia yang terus-menerus berada ditempat tidur (disebut berada pada keadaan (bed rest). Berakiabat atrofi otot, decubitus, malnutrisi, serta pnemonia. Faktor resikonya dapat berupa osteortritis, gangguan penglihatan, fraktur, hipotensi postural, anemia, stroke, nyeri, demensia, lemah otot, vertigo, keterbatsan ruang lingkup, PPOK, gerak sendi hipotiroid dan sesak napas (Dini, A.A., 2013).

4. Manifestasi Klinis Sindrom Geriatric *Immobility*

Adapun manifestasi klinis sindrom *immobility* pada sistem muskuloskeletal meliputi (Widiantari, 2019), yaitu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

a. Gangguan imobilisasi permanen.
b. Keterbatasan mobilisasi
c. kehilangan daya tahan
d. penurunan massa otot
e. Terjadi atrofi
f. Penurunan stabilitas..

5. Pemeriksaan Diagnostik Sindrom Geriatri *Immobility*

Anamnesis dilengkapi dengan berbagai gangguan yang terdapat : menelan, masalah gigi, gigi palsu, gangguan komunikasi/bicara, nyeri/gerak yang terbatas pada anggota badan dan lain-lain.

a. Penilaian sistem : Penilaian system dilaksanakan secara urut, mulai dari system syaraf pusat, saluran nafas atas dan bawah, kardiovaskular, musculoskeletal, gastrointestinal (seperti inkontinensia alvi, konstipasi), urogenital (seperti inkontinensia urin).
b. Anamnesis tentang kebiasaan yang merugikan kesehatan (merokok, minum alkohol).
c. Anamnesis Lingkungan perlu meliputi keadaan rumah tempat tinggal.
d. Review obat-obat yang telah dan sedang digunakan perlu sekali ditanyakan, bila perlu, penderita atau keluarganya.
e. Anamnesis Nutrisi
f. Pemeriksaan Tambahan (Penunjang) Pemeriksaan tambahan disesuaikan dengan keperluan penegakan=kepastian diagnosis, tetapi minimal harus mencakup pemeriksaan rutin, seperti X-foto thorax, EKG, Laboratorium, dll.

6. Penatalaksanaan Sindrom Geriatri *Immobility*

a. Upaya non farmakologis yang dapat dilakukan adalah dengan beberapa terapi fisik dan latihan jasmani secara teratur. Pada pasien yang mengalami tirah baring total, perubahan posisi secara teratur dan latihan di tempat tidur Selain itu, mobilisasi dini berupa turun dari tempat tidur, berpindah dari tempat tidur ke kursi dan latihan fungsional dapat dilakukan secara bertahap. Untuk mencegah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

terjadinya dekubitus, hal yang harus dilakukan adalah menghilangkan penyebab terjadinya ulkus yaitu bekas tekanan pada kulit. Untuk itu dapat dilakukan perubahan posisi lateral, penggunaan kasur anti dekubitus, atau menggunakan bantal berongga. Pada pasien dengan kursi roda dapat dilakukan reposisi tiap jam atau diistirahatkan dari duduk. Melatih pergerakan dengan memiringkan pasien ke kiri dan ke kanan serta mencegah terjadinya gesekan juga dapat mencegah dekubitus. Pemberian minyak setelah mandi atau mengompol dapat dilakukan untuk mencegah maserasi. Kontrol tekanan darah secara teratur dan penggunaan obat-obatan yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah serta mobilisasi dini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya hipotensi. Monitor asupan cairan dan makanan yang mengandung serat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konstipasi. Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap kebiasaan buang air besar pasien. Pemberian nutrisi yang adekuat perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya malnutrisi pada pasien imobilisasi.

b. Tatalaksana farmakologis yang dapat diberikan terutama pencegahan terhadap terjadinya trombosis. Pemberian antikoagulan yaitu Low dose heparin (LDH) dan low molecular weight heparin (LMWH) merupakan profilaksis yang aman dan efektif untuk pasien geriatri denganimobilisasi namun harus mempertimbangkan fungsi hati, ginjal dan interaksi dengan obat lain (Stanley, Mickey.2006).

B. Konsep Keperawatan

1. Pengkajian

Pengkajian keperawatan pada lansia adalah suatu tindakan keperawatan dalam melakukan peninjauan situasi lansia untuk memperoleh data dengan maksud menegaskan situasi penyakit, diagnosis atau masalah,. Data yang dikumpulkan mencakup data subyektif dan data obyektif meliputi data bio, psiko, sosial, dan spiritual, data yang berhubungan dengan masalah lansia serta data tentang faktor-faktor yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

mempengaruhi atau yang berhubungan dengan masalah kesehatan lansia seperti data tentang keluarga dan lingkungan yang ada (Damanik, 2019).

Adapun hal-hal yang perlu dikaji pada pengkajian asuhan keperawatan adalah :

a. Data Demografi : Pada data demografi, akan didapatkan data-data terkait dengan identitas klien seperti nama lansia, umur, alamat, jenis kelamin. Kemudian data jumlah keturunan seperti jumlah anak dan cucu klien. Selanjutnya data terkait nama suami/istri dan umurnya.
b. Riwayat Keluhan
    1) Keluhan utama

       Keluhan utama yang sering ditemukan pada klien dengan sindrom imobility adalah klien mengeluh nyeri pada persendian, adanya keterbatasan gerak yang menyebabkan keterbatasan mobilitas.
    2) Riwayat penyakit sekarang

       Adanya keluhan nyeri dan kekakuan pada tangan atau kaki, perasaan tidak nyaman dalam beberapa waktu sebelum mengetahui dan merasakan adanya perubahan pada sendi.
c. Data perubahan Fisik, Psikologis dan Psikososial : Pada Perubahan Fisik Pengumpulan data dengan wawancara, terkait : Pandangan lanjut usia tentang kesehatan, kegiatan yang mampu di lakukan lansia, Kebiasaan lanjut usia merawat diri sendiri, Kekuatan fisik lanjut usia: otot, sendi, penglihatan, dan pendengaran, Kebiasaan makan, minum, istirahat/tidur, BAB/BAK, Kebiasaan gerak badan/ olahraga/ senam lansia, Perubahan-perubahan fungsi tubuh yang dirasakan sangat bermakna, Kebiasaan lansia dalam memelihara kesehatan dan kebiasaan dalam minum obat.
d. Pemeriksaan Fisik : Pemeriksaan dilakukan dengan cara inspeksi, palpilasi, perkusi, dan auskultasi untuk mengetahui perubahan sistem tubuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

1) Pengkajian sistem persyarafan: , tingkat kesadaran adanya perubahan-perubahan dari otak, kebanyakan mempunyai daya ingatan menurun atau melemah
   a) Kesimetrisan Raut Wajah
   b) Mata : pergerakan mata, kejelasan melihat, dan ada tidaknya katarak.
   c) Pupil: kesamaan, dilatasi, ketajaman penglihatan menurun karena proses pemenuaan
   d) Ketajaman pendengaran: apakah menggunakan alat bantu dengar, tinnitus, serumen telinga bagian luar, kalau ada serumen jangan di bersihkan, apakah ada rasa sakit atau nyeri ditelinga.
2) Sistem kardiovaskuler: auskultasi denyut nadi apical, periksa adanya pembengkakan vena jugularis
3) Sistem pencernaan: kesulitan mengunyah dan menelan), mual, muntah, status gizi (pemasukan diet, anoreksia, apakah perut kembung ada pelebaran kolon, apakah ada konstipasi (sembelit), diare, dan inkontinensia alvi.
4) Sistem perkemihan : distensi kandung kemih, inkontinensia (tidak dapat menahan buang air kecil), warna dan bau urine, frekuensi, tekanan, desakan, pemasukan dan pengeluaran cairan..
5) Sistem kulit: kulit (temperatur, tingkat kelembaban), , adanya jaringan parut, keadaan kuku,
6) Sistem Tulang: terjadinya pengecilan pada otot, tendon, gerakan sendi yang tidak adekuat, trjadi kekakuan sendi, bergerak dengan atau tanpa bantuan/peralatan.

e. Perubahan psikologis, data yang dikaji: Bagaimana sikap lansia terhadap proses penuaan, Apakah dirinya merasa di butuhkan atau tidak, Apakah optimis dalam memandang suatu kehidupan, Bagaimana mengatasi stres yang di alami, Apakah mudah dalam menyesuaikan diri, Apakah lansia sering mengalami kegagalan, Apakah harapan pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

saat ini dan akan datang. Perlu di kaji juga mengenai fungsi kognitif: daya ingat, proses pikir, alam perasaan, orientasi, dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah.

f. Perubahan sosial ekonomi, data yang dikaji: Darimana sumber keuangan lansia, Apa saja kesibukan lansia dalam mengisi waktu luang, Dengan siapa dia tinggal, Kegiatan organisasi apa yang diikuti lansia, Bagaimana pandangan lansia terhadap lingkungannya, Seberapa sering lansia berhubungan dengan orang lain di luar rumah, Siapa saja yang bisa mengunjungi, Seberapa besar ketergantungannya, Apakah dapat menyalurkan hobi atau keinginan dengan fasilitas yang ada.
g. Perubahan spiritual, data yang dikaji : Apakah secara teratur melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya, Apakah secara teratur mengikuti atau terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan, misalnya pengajian dan penyantunan anak yatim atau fakir miskin. Bagaimana cara lansia menyelesaikan masalah apakah dengan berdoa, Apakah lansia terlihat tabah dan tawakal.
h. Pengkajian psikososial, data yang dikaji : Bagaimana tingkat ketergantungan dengan orang lain, apakah klien fokus pada kesembuhannya, apakah klien mendapat perhatian dan kasih saying dari orang lain disekitarnya.
i. Pengkajian status fungsional dengan menggunakan Indeks Katz adalah Pemeriksaan kemandirian lansia
j. Pengkajian status kognitif dan afektif dengan *Short Portable Mental Status Questionnaire* (SPMSQ) adalah penilaian fungsi intelektual lansia
k. Pengkajian skala depresi geriatric (GDS) dengan *Short Form*
l. Pengkajian skala jatuh morse (*Morse Fall Scale/MFS)*
m. Pengkajian status social dengan menggunakan APGAR keluarga
n. Pengkajian Barthel Indeks
o. Penilaian potensi dekubitus (Skor Norton)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

p. Identifikasi aspek kognitif dan fungsi mental dengan menggunakan MMSE *(Mini Mental Status Exam)*

q. Pengkajian Keseimbangan

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis Keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang alaminya baik yang berlangsung actual maupun potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan (SDKI, 2017).

Adapun Diagnosis Keperawatan yang dapat terjadi pada lansia dengan sindrom geriatric *Immobility*, yaitu :

a. Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054**)**

1) Definisi

Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri

2) Penyebab

a) Kerusakan struktur tulang
b) Perubahan metabolisme
c) Ketidakbugaran fisik
d) Penurunan kendali otot
e) Penurunan massa otot
f) Kekakuan sendi
g) Kontraktur
h) Nyeri
i) Kecemasan gangguan sensoripersepsi

3) Gejala dan tanda mayor

Subjektif :

- Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas

Objektif

- Kekuatan otot menurun
- Rentang gerak (ROM) menurun

4) Gejala dan tanda minor

Subjektif

- Nyeri saat bergerak
- Enggan melakukan pergerakan
- Merasa cemas saat bergerak

Objektif

- Sendi kaku
- Gerakan tidak terkoordinasi
- Gerakan terbatas
- Fisik lemah

5) Kondisi klinis terkait

- Cedera medulla spinalis
- Trauma
- Fraktur
- Osteoarthritis
- Keganasan

b. Nyeri Kronis

1) Definisi

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung lebih dari 3 bulan

2) Penyebab

a) Kondisi musculoskeletal kronik

b) Kerusakan system saraf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

c) Ketidakseimbangan neurotransmitter, neuromodulator, dan reseptor
d) Gangguan imunitas
e) Gangguan fungsi metabolic
f) Kondisi pasca trauma
g) Tekanan emosional

3) Gejala dan tanda mayor

Subjektif :

- Mengeluh nyeri
- Merasa depresi (tertekan)

Objektif :

- Tampak meringis, gelisah
- Tidak mampu menuntaskan aktivitas

4) Gejala dan tanda minor

Subjektif ;

- Merasa takut mengalami mengalami cedera berulang

Objektif :

- Bersifat protektif (mis. waspada, posisi menghindari nyeri)
- Pola tidur berubah
- Anoreksia
- Berfokus pada diri sendiri

5) Kondisi klinis terkait

a) Kondisi kronik (mis. Arthritis reimatoid)
b) Infeksi
c) Cedera medulla spinalis
d) Kondisi pasca trauma
e) Tumor

c. Intoleransi Aktivitas (D.0056)

1) Definisi

Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

2) Penyebab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

a) Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen
b) Tirah baring
c) Kelemahand
d) Imobilitas

3) Gejala dan tanda mayor

Subjektif :

- Mengeluh lelah

Objektif :

- Frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat.

4) Gejala dan tanda minor

Subjektif :

- Dipsnea setelah beraktivitas
- Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas
- Merasa lemah

Objektif :

- Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat
- Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/setelah aktivitas
- Gambaran EKG menunjukkan iskemia, sianosis

5) Kondisi Klinis Terkait

a) Anemia
b) Gagal jantung kongestif
c) Penyakit jantung koroner
d) Gangguan musculoskeletal

d. Risiko Jatuh (D.0143)

1) Definisi

Berisiko mengalami kerusakan fisik dang gangguan kesehatan akibat terjatuh

2) Faktor Risiko

a) Usia ≥ 65 tahun
b) Riwayat jatuh
c) Penggunaan alat bantu berjalan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

d) Penurunan tingkat kesadaran
e) Perubahan fungsi kognitif
f) Lingkungan tidak aman (mis.licin, gelap, lingkungan asing)
g) Kekuatan otot menurun
h) Gangguan pendengaran
i) Gangguan keseimbangan
j) Gangguan penglihatan

3) Kondisi klinis terkait
a) Osteoporosis
b) Demensia
c) Anemia
d) Imobilisasi
e) Trauma
f) Stroke

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan merupakan segala bentuk terapi yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai peningkatan, pencegahan, dan pemulihan kesehatan klien individu, keluarga dan komunitas (SIKI, 2018).

Tabel 1.1 Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan Dan Kriteria Hasil	Intervensi
1	Gangguan mobilitas fisik	Setelah dilakukan asuhan keperwatan 3 x 24 jam maka diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil: 1. Pergerakan ekstremitas meningkat, 2. Rentang gerak ROM meningkat	**Dukungan Ambulasi** *Observasi* 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 3. Monitor frekuensi dan tekanan darah sebelum dan memulai mobilasis\ 4. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi *Terapeutik* 1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. Berpegang pada pagar tempat tidur)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			2. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu 3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan *Edukasi* 1. Jelaskan tujuan dan Prosedur Tindakan 2. Anjurkan mobilisasi dini 3. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan (mis. Duduk ditempat tidur, duduk disisi tempat tidur) 1)
2.	Nyeri Kronik	Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan pemenuhan kebutuhan pasien tercukupi dengan ekspektasi Nyeri Akut menurun dengan kriteria hasil: 1. Keluhan nyeri menurun 2. Meringis dapat menurun 3. Gelisah menurun 4. Tekanan darah membaik	**Manajemen Nyeri** *Observasi* 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi actor yang memperberat dan memperingan nyeri *Terapeutik* 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri *Edukasi* 1. Menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			2. Menjelaskan strategi mengatasi nyeri
3.	Intoleransi Aktivitas	Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam Respon fisiologis terhadap aktifitas yang membutuhkan tenaga dapat meningkat dengan kriteria hasil 1. Kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari meningkat 2. Kekuatan tubuh bagian atas meningkat 3. Kekuatan tubuh bagian bawah meningkat 4. Keluhan lelah menurun	**anajemen Energi** *Observasi* 1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan 2. Monitor kelelahan fisik dan emosional 3. Monitor pola dan jam tidur 4. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas *Terapeutik* 1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis. Cahaya, suara, kunjungan). 2. Lakukan latihan rentang gerak pasif/aktif (ROM) 3. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan 4. Fasilitasi duduk disisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan. *Edukasi* 1. Anjurkan tirah baring 2. Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap 3. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			4. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan *Kolaborasi* 1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan
4.	Risiko Jatuh	etelah dilakukan tindakan 3x24 jam Risiko jatuh menurun dengan kriteria hasil : 1. Jatuh dari tempat tidur menurun 2. Jatuh saat berdiri menurun 3. Jatuh saat duduk menurun 4. Jatuh saat berjalan menurun	**Pencegahan Jatuh** *Observasi* 1. Identifikasi faktor resiko jatuh (mis.usia >65 tahun, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, neuropati, dst) 2. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh 3. Hitung resiko jatuh dengan menggunakan skala 4. Monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya *Terapeutik* 1. Orientasikan ruang pada anggota keluarga 2. Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci 3. Pasang *handrail* tempat tidur 4. Tempatkan pasien beresiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan perawat/keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			5. Gunakan alat bantu berjalan *Edukasi* 1. Anjurkan memanggil perawat jika dibutuhkan bantuan untuk berpindah 2. Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin 3. Anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

4. Implementasi

Pelaksanaan tindakan merupakan langkah keempat dalam tahap proses keperawatan dengan melaksanakan berbagai strategi keperawatan (tindakan keperawatan), strategi ini terdapat dalam rencana tindakan keperawatan. Tahap ini perawat harus mengetahui berbagai hal, diantaranya bahaya-bahaya fisik dan pelindungan pada lansia, teknik komunikasi, kemampuan dalam prosedur tindakan, pemahaman tentang hak-hak dari lansia dan memahami tingkat perkembangan lansia. Pelaksanaan tindakan gerontik diarahkan untuk mengoptimalkan kondisi lansia agar mampu mandiri dan produktif (Damanik, 2019).

5. Evaluasi

Evaluasi keperawatan adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan perbandingan sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan keluarga. Evaluasi bertujuan untuk melihat kemampuan keluarga dalam mencapai tujuan. Evaluasi terbagi atas dua jenis, yaitu:

a. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif berfokus pada saat aktivitas atau proses keperawatan dan hasil tindakan keperawatan. Evaluasi ini dilakukan segera setelah perawat mengimplementasikan rencanan keperawatan guna menilai keefektifan tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan.

b. Evaluasi Sumatif

Evaluasi Sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah semua aktifitas proses keperawatan selesai dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan

1. Model Konseptual *Self Care* Orem

Pendekatan teori keperawatan yang digunakan dalam study kasus ini adalah konsep teori yang dikemukakan oleh Dorothea Elizabeth Orem atau yang lebih dikenal dengan "teori orem". Menurut Orem, untuk melakukan proses asuhan keperawatan maka harus dengan keyakinan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan pada dirinya sendiri sehingga akan membantu individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, memelihara kesehatannya dan mencapai kesejahteraan. Teori Orem ini dikenal sebagai self-care theory. Orem memberikan label pada teorinya sebagai teori umum yang terdiri atas 3 teori terkait (Asmadi, 2005 dalam Risnah, 2020), yaitu :

a. *Teori Self care*

Teori ini mengungkapkan hubungan antara tindakan untuk merawat diri dengan perkembangan fungsi individu. *Self care* adalah performance atau praktek kegiatan individu untuk berinisiatif dan membentuk perilaku mereka dalam memelihara kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan. Jika *self care* dilakukan secara efektif, upaya perawatan diri ini dapat memberi kontribusi bagi integritas struktural fungsi dan perkembangan manusia .

Kemampuan individu untuk melakukan *self care* dipengaruhi oleh *basic conditioning* seperti; umur, jenis kelamin, status perkembangan, status kesehatan, orientasi sosial budaya, sistem perawatan kesehatan (diagnostik, penatalaksanaan modalitas), sistem keluarga, pola kehidupan, lingkungan serta ketersediaan sumber.

b. *Teori Self care deficit*

Teori ini mengungkapkan tentang ketidakmampuan klien dalam hal ini lansia dalam merawat diri. Dalam teori ini

keperawatan diberikan jika seorang dewasa (pada kasus ketergantungan) tidak mampu atau terbatas dalam melakukan *self care* secara efektif. Asuhan keperawatan diberikan jika kemampuan merawat berkurang atau tidak dapat terpenuhi atau adanya ketergantungan.

c. *Teori nursing system*

Perawat menentukan, mendesain, dan menyediakan perawatan yang mengatur kemampuan individu dan memberikannya secara terapeutik sesuai dengan tiga tingkatan kemampuan, yaitu :

1) *Wholly Compensatory system*: Situasi dimana individu tidak dapat melakukan tindakan self care.
2) *Partly compensatory nursing system*: Perawat dan klien memiliki peran yang sama dalam melakukan tindakan self care.
3) *Supportive educative system*: Pada sistem ini orang dapat membentuk atau dapat belajar membentuk internal atau eksternal self care tetapi tidak dapat melakukannya tanpa bantuan.

2. Model Konseptual Adaptasi Callista Roy

Model adaptasi Roy merupakan salah satu teori keperawatan yang berfokus pada kemampuan adaptasi klien terhadap stressor yang dihadapinya. Dalam penerapannya Roy menegaskan bahwa individu adalah makhluk biopsikososial sebagai satu kesatuan utuh yang memiliki mekanisme koping untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Roy mendefinisikan lingkungan sebagai semua yang ada di sekeliling kita dan berpengaruh pada perkembangan manusia. Sehat adalah suatu keadaan atau proses dalam menjaga integritas diri, respon yang menyebabkan penurunan integritas tubuh menimbulkan adanya suatu kebutuhan dan menyebabkan individu berespon terhadap kebutuhan tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

melalui upaya atau prilaku tertentu. Menurutnya peran perawat adalah membantu pasien beradaptasi terhadap perubahn yang ada (Anggraini, 2015).

B. *Evidance Based Nursing* (EBN)

Konsep Nyeri

1. Defenisi nyeri

Definisi nyeri dalam kamus medis yaitu perasaan distres, kesakitan, ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari stimulasi ujung saraf tertentu. Tujuan nyeri terutama untuk perlindungan, nyeri berperan sebagai suatu sinyal peringatan dari tubuh terhadap jaringan yang sedang mengalami kerusakan dan meminta individu untuk meredakan atau menghilangkan nyeri dari sumber (Rosdahl & Kowalski, 2017).

2. Klasifikasi Nyeri

Menurut (International Association for the Study of Pain (IASP) telah mengidentifikasi beberapa kategori nyeri diantaranya yaitu:

a. Nyeri akut

Nyeri akut yaitu sensasi yang terjadi secara mendadak atau sebagai respons terhadap beberapa jenis trauma. Penyebab umum nyeri akut yaitu trauma akibat kecelakaan, infeksi, serta pembedahan. Nyeri akut terjadi dalam periode waktu yang singkat yaitu sekitar 6 bulan atau kurang dan biasanya bersifat intermiten (sesekali), tidak konstan. Apabila penyebab mendasar diterapi secara rutin nyeri akut cepat menghilang.

b. Nyeri kronik

Nyeri kronik atau disebut dengan nyeri neuropatik yaitu suatu ketidaknyamanan yang berlangsung dalam periode waktu yang lama yaitu (6 bulan atau lebih) dan kadang bersifat selamanya. Penyebab nyeri kronik sering kali tidak diketahui. Nyeri kronik terjadi akibat kesalahan sistem saraf dalam memproses input (asupan) sensori.

c. Nyeri alih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

d. Nyeri alih yaitu nyeri yang berasal dari satu bagian tubuh, namun dipersepsikan di bagian tubuh lain.

e. Nyeri kanker

Nyeri kanker yaitu disebut juga sebagai hasil dari beberapa jenis keganasan. nyeri yang menyerang sangat hebat dan dapat dianggap intractable (tidak dapat diatasi) dan bersifat kronik (Rosdahl & Kowalski, 2017).

3. Faktor yang mempengaruhi nyeri

a. Usia : perbedaan usia berespon terhadap nyeri. Anak kecil dalam mengekspresikan nyeri memiliki kesulitan untuk mengenal nyeri

b. Jenis kelamin : laki-laki harus lebih berani sehingga tertanamkan yang menyebabkan seorang laki-laki tahan terhadap nyeri disbanding wanita.

c. Ansietas : ansietas meningkat karena persepsi dapat meningkatkan ansietas

d. Gaya koping: klien klien banyak cara dalam mengembangkan koping terhadap efek fisiologis. Gaya ini berhubungan dengan pengalaman nyeri.

4. Alat Ukur nyeri

Dalam pengukuran nyeri dapat dinilai dengan menggunakan skala, sebagai berikut (Devi, 2017) :

a. Deskriptif

Skala deskritif merupakan alat pengukuran tingkat keparahan nyeri yang objektif. Skala pendeskripsi verbal (*Verbal descriptif scala VDS*) merupakan sebuah garis yang terdiri dari dari tiga sampai lima kata diskripsi yang tersusun dengan jarak yang sama disepanjang garis. Pendeskripsian yang diringking dari tidak terasa nyeri sampai nyeri tidak tertahankan dengan cara ini menunjukan ke pasien skala tersebut dan meminta klien untuk memilih nyeri terbaru yang dirasakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Keterangan:

0 : Tidak merasa nyeri

1-3 : Secara objektif klien dapat berkomunikasi

4-6 : Secara objektif klien mendesis atau menyeringai

7-9 : Secara objektif klien terkadang tidak dapat mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan

10 : Klien tidak mampu mengikuti perintah



Gambar 1.1 Skala Nyeri Deskriptif

b. Numerik

Skala penilaian numerik (*Numerical rating scala, NRS*) lebih digunakan sebagai penganti alat pendeskripsi kata. Dalam hal ini klien menilai nyeri dengan menggunakan skala 1-10, skala ini paling efektif digunakan saat mengkaji intesitas nyeri sebelum dan sesudah intervensi terapeutik.

Gambar 1.2 Skala Nyeri Numerik

c. *Visual analaog Scale (VAS)*

Skala analog visual adalah suatu garis lurus sepanjang 10 cm, yang mewakili intesitas nyeri yang terus menerus dan pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya, dengan cara klien dimintak untuk menunjuk titik pada garis yang menunjukan letak nyeri terjadi pada sepanjang garis yang menunjukan letak nyeri terjadi pada sepanjang garis tersebut. Pada ujung kiri tidak nyeri yang sebelahkanan nyeri hebat.

Gambar 1.3 Skala *VAS*



d. *Wong-baker faces pain ranting scale*

Skala ini biasanya dipakai untuk mengukur nyeri pada anak- anak karena biasanya anak-anak tidak bisa mengungkapkan rasa nyeri nya. Skala ini dengan penilaian dari ekspresi wajah. Keterangan nya adalah ekspresi wajah 0 tidak merasa nyeri, ekspresi wajah 2 nyeri hanya sedikit, ekspresi wajah 3 sedikit lebihnyeri, ekspresi wajah 4 jadi lebih nyeri, ekspresi wajah 6 sangat nyeri.

Gambar 1.4 *Wong Beker Faces Pain* ranting *scale*

5. Pentalaksanaan nyeri

Strategi penatalaksanaan nyeri adalah suatu tindakan untuk mengurangi nyeri (Devi, 2017) yaitu :

a. Strategi penatalaksanaan nyeri secara farmakologi dengan menggunakan analgesik yaitu non narkotik dan obat anti inflamasi non steroid (NSAID), analgesic narkotik atau opiate, dan obat tambahan.

b. Strategi penatalaksanaan nyeri secara non farmakologi, seperti :

1) Relaksasi otot
2) Terapi panas atau kompres hangat
3) Stimulasi sarafelektris transkutan atau TENS *(Transcutaneous electrical nerve timulation)*
4) Distraksi
5) Relaksasi otot
6) Imajinasi terbimbingatau guided imagery
7) Hypnosis
8) Akupuntur
9) Massase

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Konsep Relaksasi Otot Progresif

1. Definisi

Terapi relaksasi otot progresif adalah salah satu terapi relaksasi yang menggunakan otot dalam dimana terapi ini mengarahkan pada gerakan otot yang berfungsi untuk menurunkan ketegangan otot sehingga memberikan efek relaksasi serta terapi ini mudah dilakukan karena tidak menggunakan sugesti, imajinasi, dan ketekunan (Kushariyadi, 2011). Terapi ini juga mudah dipelajari karena tidak memerlukan waktu dan tempat tertentu, serta tidak memerlukan teknologi dan peralatan khusus (Liu dkk, 2020). Terapi relaksasi otot progresif ini dapat mengurangi rasa nyeri pada lansia karena dapat memicu aktifnya saraf parasimpatis dan mengaktifkan hormon endorfin yang berfungsi untuk memunculkan rasa bahagia dan mengembalikan tubuh ke kondisi normal sehingga tubuh menjadi relaks yang akhirnya dapat menurunkan nyeri, kecemasan dan stress (Yulidawarti, Hikmah, & Ma'rufa, 2020).

2. Tujuan teraoi relaksasi otot progresif

Tujuan dari teknik relaksasi otot progresif ini adalah untuk:

a. Dapat Menurunkan kecemasan, ketegangan otot, nyeri, hipertensii, frekuensi jantung dan peredaran darah
b. Dapat Mengurangi disritmia jantung, kebutuhan oksigen pada lansia yang dapat memeberikan udara ke otak .
c. Meningkatkan rasa kebugaran.
d. Memperbaiki kemampuan untuk mengatasi stres.
e. Mengatasi insomnia, depresi, kelelahan, iritabilitas, spasme otot, fobia ringan, gagap ringan

3. Indikasi

Setyoadi (2011), ada beberapa indikasi yang dapat diberikan terapi relaksasi otot progresif yaitu pada pasien yang memiliki riwayat nyeri, gangguan tidur (insomnia), sering mengalami stres, cemas dan depresi.

4. Kontra indikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Menurut setyoadi (2011), kontraindikasi pada relaksasi ini adalah pasien yang mengalami keterbatasan gerak, misalnya tidak bisa meggerakkan badannya dan yang mengalami perawatan tirah baring (bed rest).

5. Kriteria evaluasi

Setyoadi (2011), hal- hal yang perlu di evaluasi dalam melakukann tindakan terapi otot prrogresif adalah:

a. Klien mengalami penurunan rasa nyeri saat bergerak
b. Klien merasa lebih rileks saat beristrahat
c. Kebutuhan dasar klien terpenuhi seperti BAK, BAB
d. Tanda-tanda vital dalam batas normal.nadi normal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB III

LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

I. Data Demografi

Nama Lansia : Ny. R

Umur : 89 Tahun

Alamat : Sibula Dalam, Makassar

Jenis Kelamin : Perempua

Nama Suami/Istri : Tn. M (mantan suami)

Umur : -

Tanggal Pengkajian : Selasa, 20 April 2021

II. Pengkajian

Keluhan Utama : Nyeri lutut, pinggang dan bahu

a. **Fisik**

Wawancara

1) Pandangan *lansia terhadap* kesehatannya : Klien mengatakan bahwa dirinya tidak berdaya, semenjak 2 tahun yang lalu mengalami kesulitan bergerak, klien mengatakan penyakitnya membuat ia tidak bisa melakukan aktivitas/ kegiatan.
2) Kegiatan yang mampu dilakukan *Lanjut Usia :* Klien mengatakan ia dapat berpindah tempat dengan bantuan kursi dari tempat tidur ke kamar mandi.
3) Kebiasaan *Lanjut Usia* merawat diri sendiri :Klien memgatakan mandi 1x sehari, dibantu dalam memotong kuku, dan sesekali berhias.
4) Kekuatan fisik *Lanjut Usia*: otot, sendi, penglihatan dan pendengaran.: Klien mengatakan, ia tidak kuat dalam melakukan

aktivitas, karena terdapat patah tulang bagian paha sebelah kiri sampai ke lutut, persendian pada tangan kiri bagian kelingking juga patah, jari sulit digerakkan, penglihatan sudah mulai kabur, pendengaran juga mulai terganggu, klien tampak meringis saat banyak bergerak/ berpindah tempat, Kekuatan otot 4,4/ 3,3

5) Kebiasaan lansia dalam melakukan aktivitas seperti buang air besar/kecil , makan, minum ; Pasien mengatakan selama bulan puasa, klien makan dan minum pada saat sahur dan berbuka puasa, klien mengatakan mengalami kesulitan tidur pada siang dan malam hari, sulit memejamkan mata, buang air besar/ kecil baik, dengan bantuan kursi ke kamar mandi.
6) Kebiasaan labsia dalam melakukan gerak seperti badan/olah raga/senam *Lanjut Usia :*Pasien mengatakan ia tidak pernah lagi melakukan senam ataupun kegiatan lainnya
7) Perubahan-perubahan fungsi tubuh yang sangat bermakna dirasakan oleh lansia saat ini :Pasien mengatakan penglihatan mulai kabur (terdapat bintik putih') pendengaran mulai terganggu, kulit semakin keriput dan tidak bisa melakukan aktivitas secara bebas
8) Kebiasaan *Lansia* dalam pemeliharaan kesehatan dan kebiasaan dalam minum obat: pasien mengatakan jarang minum obat, jika pegal dia hanya mengoleskan balsem, jika gatal dia menaburkan bedak ke badannya
9) Masalah-masalah seksual yang dirasakan:Passien mengatakan tidak memiliki lagi hasrat karna telah *manepause*

Pemeriksaan Fisik

1) Pemeriksaan dilakukan dengan cara *inspeksi*, *palpilasi*, *perkusi* dan *auskultasi* untuk mengetahui perubahan sistem tubuh
2) Pendekatan yang digunakan dalam pemeriksaan fisik, yaitu: Head to toe.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

3) Sistem tubuh
   a) Temperatur : 36, 2 c
   b) Tempat pengukuran : Axila
   c) pulse (denyut nadi) : 74x/i
   ⇔ Irama : Reguler
   ⇔ Volume : -
   ⇔ Tempat Pengukuran : Nadi Radialis
4) Respirasi (Pernafasan) :
   a) Kecepatan : 22x/i
   b) Irama : Reguler
   c) Kedalaman : -+ 2 cm
   d) Bunyi : vesikuler
5) Tekanan Darah :
   a) Posisi pengukuran : lengan kiri
   b) Saat baring : 160/ 80 mmHg
6) Berat dan tinggi badan terakhir : -+ 40 kg / 150 cm
7) Tingkat orientasi:
   a) Waktu : klien mengetahui saat ini pagi hari
   b) Tempat : klien mengetahui keberadaanya saat ini di balai lansia
   c) Orang : klien mengatakan bahwa yang diajak berbicara adalah mahasiswa
   d) *Memory* (ingatan): klien masih mengingat masa lalunya, saat pertama kali dibawa kebalai dan saat hidup bersama suaminya
8) Tidur
   a) Kuantitas (Lama tidur) : _+ 3 jam dimalam hari, _+ 1 jam disiang hari
   b) Kualitas : Tidak baik, klien mengatakan tidurnya sering terganggu
   c) Pola : tidak teratur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

9) Istirahat
   a) Kuantitas (Lama tidur) : _+ 3 jam
   b) Kualitas : selalu terbangun
   c) Pola : tidak teratur
10) Penyesuaian psikososial : Klien mengatakan ia jarang berintraksi dengan orang lain dan waktunya dihabiskan untuk berbaring

Sistem Persyarafan

1) Kesemetrisan raut wajah : simetris
2) Tingkat kesadaran : Composmentis, GCS : 15
   a) Pikun : tidak pikun
   b) Daya ingatan masih kuat, mampu mengingat kejadian dimasa lalu
3) Mata
   a) Pergerakan : bergerak secara baik
   b) Penglihatan : mulai terganggu, klien mengatakan addea bayangan bintik' putih
   c) Penyakit penyerta : tidak ada penyakit lainnya
4) Pupil

Kesamaan : Isokor

5) Ketajaman penglihatan : klien masih mampu membaca dalam jarak 20 cm
6) Sensori deprivation (gangguan sensorik) : tidak ada
7) Ketajaman pendengaran : klien mengatakan pendengaran mulai berkurang
   a) Apakah menggunakan alat bantu dengar : tidak ada
   b) Tinitus : tidak ada
   c) Serumen : tidak ada
8) Rasa sakit atau nyeri :

   P : Jatuh sebanyak 8x selama 5 bulan

   Q : Tajam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

R : Paha, lutut kiri

S : 4 (NRS)

T : Hilang Timbul

Sistem Kardivaskuler

1) Sirkulasi periper : Terdistribusi dengan baik
   a) Warna : Merah Muda
   b) Kehangatan : Hangat
2) Denyut nadi apikal : Terdengar reguler
3) Pembengkakan vena jugularis : tidak ada
4) Pusing : Tidak ada
5) Nyeri dada : Tidak ada
6) Edema : Tidak ada

Sistem Gastrointestinal

1) Status gizi : Baik
2) Pemasukan diet : Tidak ada diet khusus
3) Anoreksia : tidak ada
4) Mual : tidak ada
5) Muntah : tidak ada
6) Mengunyah dan menelan : tidak ada masalah
7) Keadaan gigi : gigi bagian atas tidak lengkap
8) Rahang : tidak ada masala
9) Rongga mulut : tidak ada masalah
10) Bising usus : terdengar lambat
11) Keadaan perut : tidak ada asilus
12) Konstipasi (sembelit) : tidak ada
13) Diare :tidak ada
14) Inkontinesia alvi : tidak ada

Sistem Genitourinarius

1) Warna dan bau urine : warna kuning
2) Distensi kandung kemih : .tidak ada

3) Inkontinensia : tidak ada
4) Frekuensi : 2-6 kali/ hari
5) Tekanan/ desakan : tidak ada
6) Pemasukan cairan : teratur, setiap berbuka puasa dan sahur
7) pengeluaran cairan : melalui urinasoi
8) Disuria : tidak ada
9) Seksualitas
   a) Minat melaksanakan hubungan seks : Sudah tidak ada rasa keinginan
   b) Frekwensi : -

Sistem Kulit

1) Kulit
   a) Temperatur : Hangat
   b) Tingkat kelembaban : kering / keriput
   c) Keadaan luka
      - Luka terbuka/tertutup : terdapat patah tulang paha bagian dalam
      - Tidak ada robekan
   d) Turgor (kekenyalan kulit) : .kering
2) Jaringan parut : tidak ada
3) Keadaan kuku : Panjang
4) Keadaan rambut : bersih (beruban)
5) Gangguan-gangguan umum : tidak ada

Sistem Muskuloskeletal

1) Kontraktur : .pada persendian
   a) Otot : .lemah 44/33
   b) Tendon : lemah
   c) Gerakan sendi : terbatas
2) Tingkat mobilisasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

a) Ambulasi (Dengan atau tanpa bantuan/ peralatan) : menggunakan alat bantu kursi plastik
b) Gerakan : lemah/ terbatas
c) Kekuatan otot : lemah
d) Kemampuan melangkah atau berjalan : dengan bantuan kursi.

3) Gerakan sendi :terbatas
4) Paralisis : tidak ada
5) Kifosis : tidak ada

b. Psikologis

1. Pengenalan masalah-masalah utama : pasien mengatakan bosan berbaring terus
2. Sikap terhadap proses penuaan : pasien menganggap ini adalah ujian dari Allah SWT.
3. Perasaan dibutuhkan : pasien mengatakan sudah tidak dibutuhkan lagi
4. Pandangan terhadap kehidupan : pasien mengatakan hanya menunggu ajal
5. *Koping Stressor* : pasien hanya memendam dengan dirinya sendiri
6. Penyesuaian diri : pasien mengatakan hanya bisa bersabar
7. Kegagalan : pasien merasa gagal menjalani kehidupan keluarga
8. Harapan saat ini dan yang akan datang : pasien mengharapkan kesembuhan dan bisa beraktivitas secara bebas
9. fungsi kognitif
   1) Daya ingat : masih kuat
   2) Proses pikir : berputar-putar
   3) Alam perasaan : merasa sedih
   4) Orientasi : terorientasi
   5) Kemampuan dalam penyelesaian masalah : memendam dengan sendiri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

c. Masalah emosional

Pertanyaan tahap 1

1. Apakah klien mengalami susah tidur : pasien mengatakan susah tidur
2. Ada masalah atau banyak pikiran : pasien selalu berpikir akan bahaya di sekelilingnya
3. Apaka klien murung atau menangis sendiri : pasien tampak sedih
4. Apakah klien sering was was atau kuatir : pasien mengatakan khawatir dengan keadaanya



Pertanyaan tahap 2

1. Keluhan lebih dari 3 bulan atau lebih dari 1 bulan 1 kali dalam sebulan : pasien mengatakaan sedih, saat merepotkan orang lain
2. Ada masalah atau banyak pikiran : pasien mengatakan masalahnya saat ini hanya kaki dan hubungan dengan orang lain
3. Ada gangguan atau masalah dengan orang lain : tidak ada masalah dengan orang lain
4. Menggunakan obat tidur atau penenang atas anjuran dokter : pasien mengatakan tidak mengonsumsi obat
5. Cenderung mengurung diri : iya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

d. Sosial Ekonomi

1. Sumber keuangan : pasien mengatakan ia hanya diberi perawat
2. Kesibukan dalam mengisi waktu luang : pasien mengatakan kegiatannya selama berbaring, mengaji dan berdzikir
3. Teman tinggal : 2 lansia perempuan lain di dalam 1 asrama
4. Kegiatan organisasi : pasien mengatakan semenjak sakit tidak pernah mengikuti kegiatan
5. Pandangan terhadap lingkungannya : pasien mengatakan merasa bosan dan curiga di sekelilingnya
6. Hubungan dengan orang lain di luar rumah : pasien tidak pernah bergaul
7. Yang biasa mengunjungi : mahasiswa dan perawat petugas balai
8. Penyalurkan hobi/keinginan sesuai fasilitas yang ada pasien suka mengaji

e. Spiritual

1. Agama : pasien beragama islam
2. Kegiatan ibadah : pasien mengatakan selalu menjaga sholatnya
3. kegiatan keagamaan : sholat, berdzikir, berpuasa dibulan ramadhan dan berpuasa sunnah
4. Cara *Lanjut Usia* menyelesaikan masalah : berdoa dan berdzikir
5. Penampilan Lansia : bersih dan rapi

f. Psikososial

1. Tingkat ketergantungan : minumal *care*
2. Fokus diri : pasien selalu memperhatikan keadaan dirinya
3. Perhatian : pasien hanya perhatian dengan diri sendiri
4. Rasa Kasih sayang : pasien mengatakan menyanyangi orang-orang di sekelilingnya
5. Hubungan dengan orang lain dalam wisma : baik, tidak ada masalah
6. Hubungan dengan orang lain di luar wisma di dalam panti : tidak ada masalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

7. Motivasi menghuni panti : menanti kesembuhan
8. Frekuensi kunjungan keluarga pasien sudah tidak memiliki keluarga

g. Pengkajian Lingkungan

Pemukiman

1. Luas bangunan :_+ 2x3 m
2. Bentuk bangunan : permanen kotak (wisma)
3. Lantai : tegel
4. Kebersihan lantai : bersih
5. Ventilasi : terdapat jendela dan pintu
6. Pencahayaan : terang
7. Pengaturan penataan perabot : teratur
8. Kelengkapan alat rumah tangga : tidak lengkap (piring dan gelas)

Sanitasi

1. Penyediaan air bersih : tersedia melalui keran
2. Penyediaan air minum : terdapat dispenser
3. Pengelolaan jamban : terkelola dengan baik
4. Jenis jamban : keramik (duduk)
5. Jarak dengan sumber air : sangat dekat
6. Sarana pembuangan air limbah : melalui saluran tinja
7. Petugas sampah : selalu ada
8. Polusi udara : tidak ada
9. Pengelolaan binatang pengerat : baik
10. Fasilitas Umum : Terdapat wc, Kipas angin, ruang tamu, meja makan, lemari, wastafel,
11. Sikap terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan : pasien mengatakan pelayanan kesehataan yang diberikan oleh balai cukup bagus
12. Jaminan pemeliharaan kesehatan : pasien mengatakan jaminan berasal dari pemerintah, berupa pemeriksaan kesehatan dalam balai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

13. Sikap komunitas terhadap kelompok lansia : pasien mengatakan baik, tidak ada masalah .

PENGKAJIAN STATUS FUNGSIONAL

SCORE	Kriteria
	Kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah, ke kamar kecil, Berpakaian, dan mandi
B	Kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali satu dari fungsi Tersebut
C	Kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali mandi dan satu Fungsi tambahan
D	Kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, Berpakaian dan satu fungsi tambahan
E	Kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, Berpakaian, ke kamar kecil dan satu fungsi tambahan
F	Kemandirian dalam semua aktifitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, Berpakaian, berpindah dan satu fungsi tambahan
G	Ketergantungan pada enam fungsi tersebut

Interpretasi :
Beri tanda (√) pada point yang sesuai kondisi klien
Analisis hasil :

a) Mandiri dalam makan, kontinensia (bak dan bab), menggunakan pakaian, pergi ketoilet, berpindah, dan mandi.
b) Mandiri semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi di atas
c) Mandiri, kecuali mandi dan satu lagi fungsi yang lain
d) Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi yang lain
e) Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, dan satu fungsi yang lain
f) Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, berpindah, dan satu fungsi yang lain.
g) Ketergantungan untuk semua fungsi di atas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

h) Lain-lain (minimal ada 2 ketergantungan yang tidak sesuai dengan kategori di atas)

Keterangan :

Mandiri berarti pengawasan, pengarahan atau bantuan aktif dari orang lain. Seseorang yang menolak untuk melakukan suatu fungsi dianggap tidak melakukan fungsi, meskipun ia anggap mampu.

PENGKAJIAN STATUS KOGNITIF DAN AFEKTIF

Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)				
Score		No	Pertanyaan	Jawab
+	-			
	-	1	Tanggal berapa hari ini ?	Pasien tidak tahu
	-	2	Hari apa sekarang ini ? (hari, tanggal, tahun)	Pasien tidak tahu
+		3	Apa nama tempat ini ?	Panti jompo/ balai lansia
	-	4a	Berapa nomor telpon anda ?	Tidak ada
+		4b	Dimana alamat anda ? (tanyakan hanya bila klien tidak mempunyai no.telepon)	Jl. Cakalang
+		5	Berapa umur anda ?	89 tahun
	-	6	Kapan anda lahir ?	Pasien lupa
+		7	Siapa presiden sekarang ?	Jokowi
	-	8	Siapa presiden sebelumnya ?	Lupa
+		9	Siapa nama kecil ibu anda ?	Siti najwiah
	-	10	Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka baru, semua secara menurun	Tidak tahu

Penilaian :

- ❑ Kesalahan 0 – 2 fungsi intelektual utuh
- ❑ Kesalahan 3 – 4 fungsi intelektual ringan
- ❑ Kesalahan 5 – 7 fungsi intelektual sedang

- ❑ Kesalahan 8 – 10 fungsi intelektual beraT

SKALA DEPRESI GERIATRIK (*GERIATRIC DEPRESSION SCALE / GDS)*

(Short Form)

No	Pertanyaan	Ya	Tdk
1	Apakah pada dasarnya anda puas dengan kehidupan anda ?	0	✓1
2	Apakah anda telah banyak meninggalkan kegiatan dan Minat/kesenangan anda?	✓1	0
3	Apakah anda merasa kosong dengan kehidupan yang dijalani Saat ini?	✓ 1	0
4	Apakah anda sering bosan ?	✓ 1	0
5	Apakah anda mempunyai semangat yang baik setiap waktu ?	0	✓ 1
6	Apakah anda takut sesuatu akan terjadi pada anda ?	✓1	0
7	Apakah anda merasa bahagia di setiap waktu ?	0	✓ 1
8	Apakah anda merasa tidak berdaya?	✓1	0
9	Apakah anda lebih suka tinggal di rumah pada malam hari, Daripada pergi dan melakukan sesuatu yang baru ?	✓1	0
10	Apakah anda memiliki banyak masalah dengan daya ingat Dibandingkan kebanyakan orang	1	✓0
11	Apakah anda berfikir sangat menyenangkan hidup sekarang ini?	0	✓ 1
12	Apakah anda merasa saya sangat tidak berharga/ berguna?	1	✓0
13	Apakah anda merasa penuh semangat?	0	✓ 1
14	Apakah anda merasa tidak memiliki harapan?	1	✓0
15	Apakah anda berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada anda?	✓ 1	0
	Skor : Depresi	**12**	

Penilaian :

0 – 5 : Normal

6 – 10 : Kemungkinan depresi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

>10 : Depresi

SKALA JATUH MORSE (*MORSE FALL SCALE/ MFS)*

No.	Item	Skala		Skor
1	Riwayat jatuh Apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir?	Tidak	0	
		✓ Ya	25	**25**
2	Diagnosis sekunder Apakah lansia memiliki lebih dari satu penyakit?	Tidak	0	
		✓ Ya	15	**15**
3	Alat bantu pergerakan *Bed rest/* dibantu perawat		0	
	Walker/kruk/tongkat		15	-
	Berpegangan pada benda sekitar (kursi, meja, lemari)		30	**30**
4	Terapi intravena: Apakah saat ini lansia terpasang infus?	✓ Tidak	0	
		Ya	20	**20**
5	Gaya berjalan/cara berpindah Normal		0	
	Lemah		10	
	Gangguan/ tidak normal		20	**20**
6	Status mental Lansia menyadari kondisinya		0	**0**
	Lansia mengalami keterbatasan daya ingat		15	
Total nilai				**90**

Keterangan:

Tingkat Risiko	Nilai MPS	Tindakan

Tidak berisiko	0 -24	Perawatan dasar
Risiko rendah	25 – 50	Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh standar
Risiko tinggi	**≥ 51**	**Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi**

BARTHEL INDEKS

No.	Kriteria	Dengan Bantuan	Mandiri	Keterangan
1	Makan	5	✓ 10	Frekuensi : 2x sehari Jumlah : 3- 6 sendok Jenis :nasi, sayur, kecap
2	Minum	5	✓ 10	Frekuensi : 2-5x seharoi Jumlah : 2- 5 gelas Jenis :air putih
3	Berpindah dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya	5 – 10	✓ 15	
4	Personal toilet (cuci muka, menyisir rambut, gosok gigi)	0	✓ 5	Frekuensi : 2x sehari
5	Keluar masuk toilet (membuka pakaian, menyeka tubuh, menyiram)	5	✓ 10	
6	Mandi	5	✓ 15	Frekuensi : 1xsehari
7	Jalan di permukaan	✓ 0	5	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

	datar			
8	Naik turun tangga	✓ 0	10	
9	Mengenakan pakaian	5	✓ 10	
10	Kontrol bowel (BAB)	5	✓ 10	Frekuensi : 1x/i Konsistensi :padat
11	Kontrol bladder (BAK)	5	✓ 5	Frekuensi :2-5x/i Warna : kuning
12	Olahraga/latihan	✓ 5	10	Frekuensi : 1x/i Jenis :rom dan fisioterapi
13	Rekreasi/pemanfaatan waktu luang	5	10	Jenis : mengaji Frekuensi : setiap saat

Keterangan :

- 130 : Mandiri
- 60-125 : Ketergantungan sebagian
- 55 : Ketergantungan total

PENGKAJIAN KESEIMBANGAN

Komponen Utama Dalam Bergerak	Langkah-Langkah	Kriteria	Nilai
A. Perubahan posisi atau gerakan keseimbangan	(Mata terbuka) 1. Bangun dari kursi	1. Tidak bangun dari tempat duduk dengan satu gerakan, tetapi mendorong tubuhnya keatas dengan tangan atau bergerak kedepan kursi terlebih dahulu, tidak stabil pada saat berdiri pertama kali.	1
	2. Duduk ke kursi	2. Menjatuhkan diri kekursi, duduk ditengah kursi	1
	3. Menahan dorongan pada sternum	3. Pemeriksa mendorong sternum (perlahan-lahan sebanyak 3 kali). Klien menggerakkan kaki memegang objek untuk dukungan, kaki tidak menyentuh sisi-sisinya.	1

	(Mata ditutup) 4. Bangun dari kursi	4. Tidak bangun dari tempat duduk dengan satu gerakan, tetapi mendorong tubuhnya keatas dengan tangan atau bergerak kedepan kursi terlebih dahulu, tidak stabil pada saat berdiri pertama kali.	1
	5. Duduk ke kursi	5. Menjatuhkan diri kekursi, duduk ditengah kursi	1
	6. Menahan dorongan pada sternum	6. Pemeriksa mendorong sternum (perlahan-lahan sebanyak 3 kali). Klien menggerakkan kaki memegang objek untuk dukungan, kaki tidak menyentuh sisi-sisinya.	1
	(Klien sambil berdiri) 7. Perputaran leher	7. Menggerakkan kaki, memegang obyek untuk dukungan kaki tidak menyentuh sisi-sisinya, keluhan vertigo, pusing atau keadaan tidak stabil.	1
	8. Gerakan menggapai sesuatu	8. Tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi max, sementara berdiri pada ujung-ujung jari kaki tidak stabil, memegang sesuatu untuk dukungan.	1
	9. Membungkuk	9. Tidak mampu membungkuk untuk mengambil objek-objek kecil dari lantai, memegang objek untuk bisa berdiri, memerlukan usaha-usaha multiple untuk bangun.	1
B. Gaya berjalan/ bergerak	1. Minta klien untuk berjalan ketempat yang ditentukan	1. Ragu-ragu, tersandung, memegang objek untuk dukungan	1
	2. Ketinggian langkah kaki (saat berjalan)	2. Kaki tidak naik dari lantai secara konsisten (menggeser atau menyeret kaki), mengangkat kaki terlalu tinggi (>5 cm)	1
	3. Kontinuitas langkah kaki (diobservasi dari samping klien)	3. Setelah langkah-langkah awal, langkah menjadi tidak konsisten, memulai mengangkat satu kaki sementara yang lain menyentuh lantai.	1
	4. Kesimetrisan	4. Tidak berjalan pada garis lurus,	1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

	langkah (diobservasi dari samping klien)	bergelombang dari sisi ke sisi.	
	5. Penyimpangan jalur pada saat berjalan (diobservasi dari belakang klien)	5. Tidak berjalan pada garis lurus, bergelombang dari sisi ke sisi.	1
	6. Berbalik	6. Berhenti sebelum berbalik, jalan sempoyongan, bergoyang, memegang objek untuk dukungan.	1
			Jumlah nilai : 15

Interpretasi hasil

0-5 = resiko jatuh rendah

6-10 = resiko jatuh sedang

11-15 = resiko jatuh tinggi

Waktu duduk dan berdiri klien

No	Langkah
1.	Posisi klien duduk di kursi
2.	Minta klien berdiri dari kursi, berjalan 10 langkah (3 meter), kembali ke kursi, ukur waktu dalam detik

Interpretasi :

≤ 10 detik : Resiko jatuh rendah

11-19 detik : Resiko jatuh sedang

20-29 detik : Resiko jatuh tinggi

≥ 30 detik ; Gangguan mobilitas dan Resiko jatuh tingg

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

ANALISIS DATA

No	Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
1.	DS : 1. Klien mengeluh lututnya bengkak dan nyeri yang dirasakan sejak 5 bulan yang lalu 2. P: Nyeri dirasakan ketika bergerak sejak 5 bulan yang lalu Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk tajam R : Nyeri pada lutut kiri, S : Skala nyeri 6 (Sedang) T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-3 menit DO : 1. Klien tampak gelisah 2. Klien tampak meringis saat bergerak 3. Klien tampak memegang lututnya 4. Lutut sebelah kiri klien tampak bengkak 5. TTV : TD : 160/80 mmhg N : 74 x/I S : 36,2C P : 22 x/I	Gangguan Muskuloskeletal ↓ Kekakuan sendi ↓ Nyeri lebih dari 3 bulan ↓ Kondisi Muskuloskeletal Kronik ↓ **Nyeri Kronik**	**Nyeri Kronik**
2.	DS : a Klien mengatakan nyeri pada lutut, pinggang dan bahunya sehingga kesulitan untuk bergerak. b Klien juga mengeluh paha nya bengkak dan nyeri. c Klien mengatakan tidak mampu berjalan berdiri d klien merangkak dan berpegangan pada kursi ketika ingin ke toilet atau berpindah tempat. e Klien mengatakan nyeri ketika bergerak sehingga hanya mampu mengangkat sedikit kedua tangan dan kakinya secara perlahan DO : 2. Kekuatan otot : 3 4 3 4 3. Paha sebelah kiri klien tampak bengkak 4. Klien mengalami kontraktur pada lutut kirinya 5. Otot lemah 6. Gerakan sendi terbatas 7. Klien nampak ke toilet dengan cara merangkak dengan pelan-pelan sambil berpegangan pada kursi 8. TTV : TD : 160/80 mmhg N : 74x/i S : 36,℃ P : 22 x/i	Gangguan Muskuloskeletal ↓ Penurunan Kekuatan otot ↓ Kekakuan sendi ↓ Nyeri Kronik ↓ **Gangguan Mobilitas Fisik**	**Gangguan Mobilitas Fisik**
3.	Faktor Risiko :	Gangguan ↓	**Risiko Jatuh**

	a. Usia ≥ 65 tahun b. Riwayat Jatuh c. Penggunaan alat bantu jalan d. Lingkungan tidak aman (mis. Licin, gelap, lingkungan asing) e. Gangguan muskuloskeletal f. Gangguan penglihatan	Muskuloskeletal ↓ Kekuatan otot menurun ↓ Pergerakan terbatas ↓ **Risiko jatuh**	

B. Diagnosis Keperawatan

Penentuan diagnosis berdasarkan SDKI DPP PPNI, (2016)

1. Nyeri Kronik b/d kondisi muskuloskeletal kronik
2. Gangguan Mobilitas Fisik b/d nyeri, kekakuan sendi, penurunan kekuatan otot, dan gangguan muskuluskeletal
3. Resiko jatuh berhubungan dengan kekuatan otot menurun dan pergerakan terbatas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

C. Intervensi keperawatan

Penentuan intervensi keperawatan berdasarkan (SDKI DPP PPNI, 2016), (SLKI PPNI, 2018), dan (SIKI DPP PPNI, 2018)

Tabel 1. 2

No	Diagnosa Keperawatan	Kriteria Evaluasi	Intervensi	Rasional
1.	Nyeri Kronik	Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan pemenuhan kebutuhan pasien tercukupi dengan ekspektasi Nyeri Akut menurun dengan kriteria hasil: 1. Keluhan nyeri menurun 2. Meringis dapat menurun 3. Gelisah menurun 4. Tekanan darah membaik	**Manajemen Nyeri** *Observasi* 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi 56actor yang memperberat dan memperingan nyeri *Terapeutik* 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri *Edukasi* 1. Menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri 2. Menjelaskan strategi mengatasi nyeri	*observasi* 1. Untuk mengetahui tingkat nyeri 2. Mengetahui skala/tingkat nyeri 3. Meminimalkan gerakan yang memperberat nyeri *Terapeutik* 1. Mengurangi nyeri *Edukasi* 1. Memberikan informasi terkait nyeri 2. Untuk memandirikan pasien
2.	Gangguan mobilitas fisik	Setelah dilakukan asuhan keperwatan 3 x 24 jam maka diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil : 1. Pergerakan ekstremitas meningkat,	**Dukungan Ambulasi** *Observasi* 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 3. Monitor frekuensi dan tekanan darah sebelum dan memulai mobilasis\ 4. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi	**Dukungan Ambulasi** *Observasi* 1. Mengetahui keluhan lain pasien dan rencana tidakan berikutnya yang dapat dilakukan 2. Mengetahui kemampuan dan batasan pasien terkait latiahan/gerak yang akan dilakukan berikutnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		2. Rentang gerak ROM meningkat,	*Terapeutik* 1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. Berpegang pada pagar tempat tidur) 2. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu 3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan *Edukasi* 1. Jelaskan tujuan dan Prosedur Tindakan 2. Anjurkan mobilisasi dini 3. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan (mis. Duduk ditempat tidur, duduk disisi tempat tidur)	3. Mengetahui adanya perubahan status kerja frekuensi tekanan darah pasien 4. Mengetahui kondisi terkini pasien dan perubahan yang dapat terjadi selama melakukan mobilisasi *Terapeutik* 1. Memberikan bantuan kepada pasien saat akan melakukan mobilisasi dan mengurangi resiko jatuh/ sakit saat berpindah 2. Meningkatkan status mobilitas fisik pasien 3. Keluarga dapat secara mandiri membantu pasien melakukan latihan pergerakan *Edukasi* 1. Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan 2. Untuk mengurangi resiko kekakuan dan kelemahan otot yang berkepanjangan 3. Melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi.
4.	Risiko Jatuh	elah dilakukan tindakan 3x24 jam Risiko jatuh menurun dengan kriteria hasil : 1. Jatuh dari tempat tidur menurun	**Pencegahan Jatuh** *Observasi* 1. Identifikasi faktor resiko jatuh (mis.usia >65 tahun, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, neuropati, dst) 2. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan	*Observasi* 1. Untuk mengetahui penyebab resiko jatuh pada pasien 2. Untuk mengetahui kondisi lingkungan yang dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		2. Jatuh saat berdiri menurun 3. Jatuh saat duduk menurun 4. Jatuh saat berjalan menurun	resiko jatuh 3. Hitung resiko jatuh dengan menggunakan skala 4. Monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya *Terapeutik* 1. Orientasikan ruang pada anggota keluarga 2. Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci 3. Pasang *handrail* tempat tidur 4. Tempatkan pasien beresiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan perawat/keluarga 5. Gunakan alat bantu berjalan *Edukasi* 1. Anjurkan memanggil perawat jika dibutuhkan bantuan untuk berpindah 2. Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin 3. njurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri	membahayakan pasien 3. Mengetahui tingkat kemampuan atau keseimbangan pasien dalam bergerak 4. Mengetahu kemampuan pasien dalam bergerak *Terapeutik* 1. Agar anggota mengetahui hal-hal dalam ruangan yang dapat membahayakan pasien 2. Mencegah terjadinya cedera/jatuh pada pasien ketika berbaring atau duduk 3. Agar pasien tidak terjatuh ketika bergerak di tempat tidur 4. Agar pasien lebih mudah dan tetap selalu dipantau oleh perawat 5. Mencegah pasien terjatuh saat berjalan *Edukasi* 1. Memudahkan pasien ketika membutuhkan bantuan perawat 2. Agar klien tidak terjatuh ketika berjalan 3. Untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

D. Implementasi dan evaluasi Keperawatan

Rabu 13 April 2021

Tabel 1. 4 Implementasi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Hari, Tgl./ Jam	Implementasi	Evaluasi
1	Nyeri kronis berhubungan dengan kerusakan integritas tulang	**Rabu 21 april 2021** 09:15 09 : 25 09 : 20 09 : 35	*Observasi* 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas nyeri Hasil : P : Nyeri dirasakan ketika bergerak dirasakan sejak 5 bulan lalu Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk R : Nyeri pada pangkal paha sampai kelutut S : Skala nyeri 6 (sedang) T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-3 menit 2. Identifikasi skala nyeri Hasil : Skala nyeri 6 (sedang) 3. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil : klien mengatakan nyeri saat menggerakkan badannya dan lebih tenang ketika baring *Terapeutik* 1. Berikan tehnik nonfarmakolgi untuk mengurangi rasa nyeri Hasil : Melakukan terapi relaksasi otot progresif	**Rabu, 21 April 2021 (13:00 WITA)** S : pasien mengatakan nyeri masih sama yang dirasakan O : pasien nampak meringis saat menggerakkan kaki sebelah kiri Pasien senang mendengarkan murottal A : nyeri kronis belum teratasi P : lanjutkan Intervensi 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri : Terapi relaksasi otot progresif 2. Menjelaskan strategi mengatasi nyeri : memberikan terapi murottal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		09 : 40	*Edukasi* 1. Menjelaskan strategi mengatasi nyeri Hasil : Menjelaskan kepada klien beberapa teknik mengurangi nyeri yaitu dengan relaksasi otot progresif , dan mendengarkan murottal	**Kamis 22 april (15: 25)** **S :** klien mengatakan masih merasa nyeri saat digerakkan tetapi tidak terlalu tegang O : Klien tampak masih meringis saat mengangkat kaki nya Klien senang mendengarkan terapi murottal A : Nyeri kronik belum teratasi P : Lanjutkan Intervensi Pemberian terapi relaksasi otot progresif : Terapi murottal
		Kamis 22 april 2021 **13 : 15**	*Observasi* 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas nyeri Hasil : P : Nyeri dirasakan ketika bergerak Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk R : Nyeri pada pangkal paha sampai kelutut S : Skala nyeri 4 (NRS) T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-3 menit	
		13 : 20	2. Identifikasi skala nyeri Hasil : Skala nyeri 4 (NRS)	
		13 : 25	3. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil : klien mengatakan nyeri saat menggerakkan badannya dan lebih tenang ketika baring	
		13: 30	*Terapeutik* 4. Berikan tehnik nonfarmakolgi untuk mengurangi rasa nyeri	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		13 : 45	Hasil : Melakukan terapi relaksasi otot progresif *Edukasi* 2. Menjelaskan strategi mengatasi nyeri Hasil : Menjelaskan kepada klien beberapa teknik mengurangi nyeri yaitu dengan mendengarkan murottal	
2.	Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan pergerakan terbatas di tandai dngan agen cedera	**Jum'at 23 april 2021** **09 : 10** **09 : 15** **09 : 20**	**Dukungan Mobilisasi** 1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya hasil : pasien mengatakan nyeri pada kaki sebelah kiri saat di gerakkan 2. Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi hasil : pasien mampu bangun dan berjalan menggunakan bantuan kursi 3. Mengajarkan relaksasi otot progresif hasil : pasien tampak meringis saat mengangkat kaki kiri nya	**Jumat 23 april 2021 (11:30 WITA)** S : mengatakan nyeri masih sama pada kaki bagian kiri tapi tidak terlalu tegang O:- pasien mampu bangun dari tempat tidur secara perlahan pasien mampu menahan beban ekstremitas hingga 15 detik A: gangguan mobilitas fisik P : pertahankan intervensi dukungan ambulasi dengan terapi relaksasi otot progresif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

		Sabtu 24 april 2021 **09 : 15** **09 : 20** **09 : 30**	**Dukungan Mobilisasi** 1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya hasil : pasien mengatakan nyeri pada kaki sebelah kiri saat di gerakkan 2. mengidentifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi hasil : pasien mampu bangun dan berjalan menggunakan bantuan kursi 3. Memfasilitasi aktifitas ambulasi dengan alat bantu Hasil : Mengajak pasien ke luar ruangan 4. mengajarkan tehnik relaksasi otot progresif hasil : pasien sudah mengerti dan menggerakkan kaki nya secara perlahan untuk mencegah ke kakuan otot	**Sabtu 24 april 2021 (10: 30)** S: Pasien mengatakan senang duduk di luar Pasien mengerti tentang TROP mampu mengurangi ke kakuan otot O: pasien tampak senang dengan menghirup udara luar ruangan A: gangguan mobilitas fisik P : pertahankan intervensi Latihan relaksasi otot progresif
2.	Resiko jatuh berhubungan dengan kelemahaan otot di buktikan dengan penggunaan alat bantu jalan	**Sabtu, 24 april 2021** **13 : 15** **13 : 20** **13 : 25** **13 : 40**	**Pencegahan Jatuh** <u>Observasi</u> **1.** Mengidentifikasi faktor risiko jatuh Hasil : klien berisiko jatuh saat berpindah tempat menggunakan bantuan alat kursi **2.** Mengitung risiko jatuh menggunakan skala Hasil : skala jatuh Morse 90 (resiko tinggi) **3.** Memonitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke toilet Hasil : kemampuan klien berpindah tempat lambat namun cukup mandiri <u>Terapeutik</u> **4.** Menggunakan alat bantu berjalan	**Sabtu, 24/04/2021 (15 : 15 WITA)** S : klien mengatakan mampu berpindah dari tempat dengan bangtuan kursi kecil O : klien nampak menggunakan kursi kecil secara mandiri. Perpindahan klien menggunakan kursi berisiko jatuh. Klien berpindah tempat sangat lemah dan butuh bantuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			Hasil : klien berjalan menggunakan bantuan kursi kecil	A : risiko jatuh belum teratasi
		13 : 45	Edukasi	P : lanjutkan intervensi
			1. Menganjurkan memanggil perawat jika butuh bantuan	P : lanjutkan intervensi
			Hasil : klien selalu memanggil bantuan jika ada orang lain	**Pencegahan Jatuh**
		14 : 00	2. Menganjurkan konsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh	a. Identifikasi risiko jatuh sekali setiap shift
			Hasil : klien mendengarkan dan mengerti	b. Monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke toilet
				c. Anjurkan memanggil perawat jika butuh bantuan
				d. Anjurkan konsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus

Pengkajian study kasus ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) "Gau Mabaji" Kabupaten Gowa. Dengan total lansia berjumlah 6 orang ,laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan 3 orang. Lansia yang mengalami *immobility* sebanyak 4 orang dan 2 orang lainnya mengalami dimensia pendengaran.

Pengkajian yang dilakukan pada Ny. R di asrama 1 BRSLU dengan sindrom geriatrik *immobility*. Pengkajian dilakukan pada hari selasa, 21 April 2021. Sebelumnya, klien pernah jatuh sampai 8 kali sehingga mengalami gangguan pada persendian, saat dilakukan wawancara klien mengatakan nyeri pangkal paha, sampai kelutut sehingga kesulitan dalam bergerak dan ketika berpindah tempat menggunakan bantuan kursi kecil .

Dari hasil observasi penulis tampak lutut sebelah kiri klien tampak bengkak, dan lebam, terjadi kontraktur pada lutut sebelah kiri, tampak klien meringis saat mengerakkan kaki nya, aktivitas klien lebih banyak di tempat tidur , masih bisa ke toilet dengan bantan kursi kecil dengan sangat lambat karna nyeri pada bagian lutut dan pangkal paha, tampak kebersihan klien kurang , kuku tampak panjang dan kotor, kamar juga seringkali berbau pesing disebabkan karna klien mengalami kelemahan otot sehingga tidak mampu menjaga kebersihan nya. klien mengatakan bahwa dirinya susah bergerak disebabkan karna nyeri yang dirasakan , nyeri hilang timbul Kekuatan otot ekstremitas atas 4:4, ekstremitas bawah : 3:3 Tanda-tanda vital, didapatkan Tekanan Darah : 110/90 MmHg, Nadi : 74 x/m, Pernapasan : 22x/m, Suhu : 36,4˚C. Klien berharap kaki nya bisa sembuh sehingga mampu melakukan aktifitas secara bebas dan tidak terganggu lagi dengan adanya nyeri yang dirasakan.

Penurunan fungsi sistem musculosceletal pada lansia dapat menyebabkan kelemahan fisik dan menurunkan aktivitas fisik dan latihan yang dapat memengaruhi aktivitas kehidupan sehari-hari, Diagnosis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

keperawatan utama pada kasus ini adalah nyeri kronik sehingga klien mengalami gangguan mobilitas saat bergerak. Masalah ini ditemukan penulis sejak hari pertama dilakukan pengkajian. Klien mengatakan nyeri pada pangkal paha sampai ke lututnya seperti tertusuk-tusuk dengan skala 4(NRS) dalam durasi 1-3 menit dan hilang timbul,. Nyeri dirasaln sejak 5 bulaan yang lalu. Klien juga mengatakan sudah tidak mampu berjalan berdiri sehingga ketika ingin berpindah tempat klien berpegangan pada kursi kecil kemudian merangkak secara perlahan. Oleh karena itu mobilitas klien dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya menjadi terganggu.

Hal ini sesuai dengan teori yang di tuliskan oleh Dini AA (2013) dalam jurnalnya bahwa Imobilisasi didefinisikan sebagai keadaan tidak bergerak/tirah baring selama 3 hari atau lebih, dengan gerak anatomi tubuh menghilang akibat perubahan fungsi fisiologis. Berbagai faktor fisik, psikologis, dan lingkungan dapat menyebabkan imobilisasi pada usia lanjut. Penyebab utama imobilisasi adalah adanya rasa nyeri, lemah, kekakuan otot, dan ketidakseimbangan.

Dalam buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia tahun 2017 dituliskan bahwa nyeri kronik adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung lebih dari 3 bulan dan dapat disebabkan oleh kondisi muskuloskeletel kronik (mis.arthritis rheumatoid). Hal ini sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Ny.R.

B. Analisis Intervensi

Tindakan keperawatan utama yang penulis lakukan untuk mengatasi masalah keperawatan nyeri yang dialami Ny R yaitu Terapi Relaksasi Otot Progresif (ROP). Tehnik relaksasi otot progresif merupakan terapi yang terfokus untuk mempertahankan kondisi relaksasi dalam yang melibatkan kontraksi dan relaksasi berbagai kelompok otot mulai dari kaki kearah atas atau dari kepala ke arah bawah, dengan cara ini maka akan disadari dimana

otot itu akan berada dan dalam hal ini akan meningkatkan kesadaran terhadap respon otot tubuh (Murniati, ririn isma, 2020)

Tehnik relaksasi otot progresif dapat mengurangi nyeri, kecemasan dan depresi, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi kelelahan dan mengurangi nyeri (Kobayashi, S., & Koitabashi, 2016)..

Tehnik relaksasi otot progresif yang diberikan berikan selama 4 hari berturut- turut tanggal 21-24 mei 2021, tehnik ini merupakan salah satu terapi komplementer yang dapat diberikan untuk membantu mengendalikan dan mengurangi nyeri. hari pertama pemberian terapi ROP beserta terapi murottal klien mengatakan merasa nyaman dengan tingkat nyeri masih sama saat menggerakkan kaki sebelah kiri , kemudian pada hari kedua penulis kembali memberikan Tehnik relaksasi otot progresif hasil evaluasi setelah dilakukan tindakan klien mengatakan nyerinya tidak berkurang akan tetapi klien merasakan otot kaki sedikit ringan saat digerakkan sehingga pada hari ketiga penulis kembali memberikan Tehnik relaksasi otot progresif dengan hasil evaluasi klien mampu mengangkat kaki nya secara perlahan kurang lebih 5 detik .

Hasil evaluasi implementasi relaksasi otot progresif hasil pada hari ke empat klien mengatakan tidak ada perubahan nyeri yang dirasakan dari awal dilakukan TROP akan tetapi klien mampu menahan kekuatan otot selama 5-1 detik saat duduk di kursi roda). Hasil study kasus ini sejalan dengan penelitian (Wijaya, Tri, 2020) setelah diberikan implementasi selama 3 hari tidak terjadi penurunan skala nyeri. Asumsi penulis hal ini disebabkan karena durasi pemberian TROP ini cukup singkat karena hanya dilakukan selama 3 hari sedangkan klien Ny.R memiliki riwayat tirah baring yang cukup lama.

Teknik relaksasi otot progresif merupakan salah satu tindakan non-farmakologis dalam manajemen nyeri. Relaksasi otot progesif berpengaruh terhadap penurunan skala nyeri sendi pada lansia dengan izin Allah SWT seperti firman Allah dalam Qur’an surah Asy-Syu'ara :80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Artinya: "Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku" (Doa Nabi Ibrahim). (Kementerian Agama RI, 2018)

C. Alternatif pemecahan Masalah (Memberikan alternative selain intervensi utama berbasis EBN)

Alternatif pemecahan masalah atau tindak lanjut yang dapat dilakukan terhadap Ny.R adalah dengan melakukan intervensi Terapi Murottal. Murotal merupakan salah satu musik yang memiliki pengaruh positif bagi pendengarnya (Widayarti, 2011). Mendengarkan ayat-ayat Al-qur'an yang dibacakan secara tartil dan benar, akan mendatangkan ketenangan jiwa. Lantunan ayat -ayat Alqr'an secara fisik mengandung unsur unsur manusia yang merupakan instrumen penyembuhan dan alat yang paling mudah dijangkau. Suara dapat menurunkan hormon hormon stress, mengaktifkan hormon endofrin alami, meningkatkan perasaan rileks, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan nyeri yang dirasakan (Heru, 2008).

Pengobatan yang paling agung dan paling bermanfaat adalah Alquran al-Karim. Telah ditegaskan dalam banyak nas-nas syar'i bahwa Alquran merupakan media penyembuhan yang bermanfaat dan efektif untuk mengobati berbagai penyakit ruhani dan jasmani. Tentu saja syaratnya harus yakin dan tidak tergesa-gesa. Sebagaimana telah terbukti nyata dalam realita kehidupan manusia semenjak zaman Nabi Saw. hingga hari ini, dimana banyak umat manusia yang dapat mengambil manfaat melalui pengobatan dengan Alquran Firman Allah dalam QS Al-Isra (17) ayat 82, berbunyi :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

" *Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian*."

Dimaknakan sebagai penawar. Menurut al-Razi lafadz min di sini bukan mengandung pengertian li tab'îdh (untuk sebagian) akan tetapi mengandung makna untuk menyeluruh. Maka makna dari ayat tersebut

adalah “wa nunazzilu min haza al-jins allazi huwa Alquran ma huwa syifâ”. Maka seluruh ayat-ayat Alquran merupakan penyembuh dan penawar bagi seluruh orang-orang yang beriman. Dan Alquran menurutnya merupakan penawar bagi seluruh penyakit ruhani maupun jasmani (Ali, 2015)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil studi kasus yang dilakukan penulis pada Ny R di BRSLU Gau Mabaji Kabupaten Gowa maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil pengkajian pada Ny R didapatkan sindrom geriatrik *immobility* dengan masalah nyeri kronik
2. Adapun diagnosis keperawatan pada Ny R dengan geriatric *immobility* yaitu :
   a) Nyeri kronis berhubungan dengan kondisi *Muskuloskeletal* Kronis
   b) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang
   c) Resiko jatuh berhubungan dengan kekuatan otot menurun
3. Intervensi keperawatan yang dilakukan pada Ny.R dengan sindom geriatric *immobility*
   a) Manajemen nyeri : Terapi Relaksasi Otot Progresif, pemberian terapi murottal
      1) Dukungan mobilisasi
      2) Pencegahan jatuh
4. Implementasi keperawatan pada Ny.R dengan sindom geriatric *immobility* dilakukan selama 3 x24 jam, dan semua intervensi telah diimplementasikan kepada Ny.R selama 4 hari di BRSLU Gau Mabaji Kabupaten Gowa
5. Evaluasi tindakan keperawatan yang telah dilakukan di dapatkan bahwa diagnosis keperawatan nyeri kronik, gangguan mobilisasi, hasilnya belum teratasi dikarenakan durasi pemberian TROP ini cukup singkat hanya dilakukan selama 3 hari sedangkan klien Ny.R memiliki riwayat tirah baring yang cukup lama. Sedangkan diagnosis keperawatan risko jatuh hasilnya factor resiko tidak terjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

6. Hasil analisis intervensi didapatkan bahwa ada pengaruh Pemberian Terapi Relaksasi Otot Progresif pada lansia sindrom geriatri *immobility* dengan masalah nyeri.

B. Saran

1. Bagi Profesi Keperawatan karya akhir ini bisa dijadikan bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologi
2. Bagi Pelayanan Rumah Sakit karya akhir ini menjadi masukan bagi bidang keperawatan dan para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien lansia dengan masalah imobility dan melihat keefektifan pemberian terapi relaksasi otot progresif dalam penurunan skla nyeri
3. Bagi Institusi Pendidikan Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien lansia dengan imobility dengan masalah nyeri. Perlu dilakukannya penelitian yang lebih lanjut dengan kasus yang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya. Kementrian Agama RI : 2019

Abdillah, Awaluddin Jahid. 2020. *Pengaruh Back Massage Terapi Terhadap Penurunan Nyeri Reumatik Pada Lansia*. Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.38165/Jk. E-Issn: 2721-9518 P-Issn: 2088-0278

Adriani Marlina, 2016. *Pengaruh Kompres hangat serai Terhadap Penurunan Intesitas Nyeri Artritis Rhenatoid Pada Lanjut Usia*. Dari: Http: //Dx.Doi.Org/10.22216/Jit.2016.V10i1.431 ISSN: 1979-9292 E-ISSN: 2460-5611

Aini, N. (2018). *Teori Model Keperawatan : Beserta Aplikasinya Dalam Keperawatan.* Malang: UMM Press

Ali, Syamsuri. 2015. *Pengobatan Alternatif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-'Adalah Vol. Xii, No. 4, Desember 2015.

Badan Pusat Statik (BPS). 2020. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020*. ISSN : 2086-1036

Badan Pusat Statik Kabupaten Gowa, 2020. *Hasil Sensus Penduduk 2020*.

Damanik & Hasan. 2019. *Modul Bahan Ajar Keperawatan Gerontik. Universitas Kristen Indonesia* Bmp.Uki : Smd-36-Kg-Pk-Iv-2019

Dida, D., Batubara, S.O., Djogo, H.M.A. (2018*). Hubungan anara nyeri rheumatoid arthritis dengan tingkat kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pada pra lanjut usia diwilayah kerja Puskesmas Oesao Kabupaten Kupang*. STIKES Citra Husada Mandiri Kupang: CHMK Health jurnal Vol. II No.3.

Dini, A.A. 2013. *Sindrom Geriatric (Imobilitas, Instabilitas, Gangguan Intelektual, Inkontinensia, Infeksi, Malnutrisi, Gangguan Pendengara*n), Med.Unila,1(3):117-125

DOI: https://doi.org/10.32583/keperawatan.v13i1.1220

Eva, Erik, Ilham. (2021). *Terapi Relaksasi Otot Progresif Berpengaruh terhadap Tingkat Nyeri Sendi pada Lansia*

Hembing, W. 2007. *Atasi Asam Urat Dan Rematik Ala Hembing*. Jakarta : Puspaswara

Kementrian Kesehatan Ri. 2020. Profil Kesehatan Indonesia 2020. Http://Www.Kemenkes.Go.Id. Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2021

Kobayashi, S., & Koitabashi, K. (2016). *Effects of progressive muscle relaxation on cerebral activity: An fMRI investigation*. Complementary therapies in medicine, 26, 33-39

Kozier, Dkk. 2009. *Buku Ajar Keperawatan Klinis*, Jakarta: Egc.

Kusyanti, 2006. *Keterampilan Dan Prosedur Laboratorium Kesehatan Teknik Mengatasi Nyeri*. Jakarta: Egc.

Muhammad Pany A. & Elman Boy. 2019. *Prevalensi Nyeri Pada Lansia*. Literature Riview : Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Murniati, ririn isma, feti. (2020*). pelatihan relaksaasi otot progresif pada kader posyandulansia di posyandu lansia RW 05 Desa kalibagor*. Journal of

Community Engagement in Health, 3(1).

Mutaqin, Jejen Zainal. 2019. *Lansia Dalam Al-Qur'an Kajian Term (Tafsir Asy-Syaikh, Al-Kibar, Al-Ajuz, Ardzal Al-Umur).* Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Nugroho. (2008). Keperawatan Gerontik. Jakarta : ECG

Nurarif .A.H. dan Kusuma. H. (2015). *APLIKASI Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis & NANDA NIC-NOC*. Jogjakarta: MediAction

Perry, P. 2009. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Praktik*.

PPNI DPP SDKI Pokja Tim, 2017. *Standar Diagnosia Keperawatan Indonesia Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI

PPNI DPP SIKI Pokja Tim, 2018. *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI

PPNI DPP SLKI Pokja Tim, 2017. *Standar Luaran Keperawatan Indonesia Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI

Ramayanti, Eva Dwi, dkk. *Terapi Relaksasi Otot Progresif Berpengaruh Terhadap Tingkat Nyeri Sendi Pada Lansia*. E-ISSN 2549-8118; P-ISSN 2085-1049

Riskesdas. 2018. Lapaoran Nasional Riskesdas 2018 Kementrian Ri.

Selvia, Dyah. (2020). *Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif dalam menurunkannyeri sendi pada lansia di posyandu lansia*

Stanley, Mickey.2006. *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Jakarta: EGC

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Definisi dan Indikator Diagnostik*. Jakarta: Dewan Pengurus PPNI

Vina. 2015. LP Geriatric Syndrom. http://docslide.us/document/lp-geriatricsyndrome

Widiantari, Retika. 2019. *Asuhan Keperawatan Pada Klien Ny.D Dengan Sindrom Geriatri + Anoreksia Di Ruang Rawat Inap Interne Ambun Suri Lantai 3 Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2019*. SkripsI : Stikes Perintis Padang

Wijaya, Tri. (2020). *Penerapan Terapi Relaksasi Otot Progresif Dalam Menurunkan Skala Nyeri Sendi Lansia*. e-ISSN: 2723-8067

World Health Organization (WHO). Musculoskeletal Conditions (Who.Int)

World Health Organization. (2018, Mei 22). *Ageing and health.* Retrieved Juli 2021, 12, from who international: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-andhealth.

Yulianti. 2015. *Laporan Pendahuluan* Gerontology *"Geriatric Syndrome"*. Universitas Brawijaya Malang