

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN
DENGAN KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI
DI RSUD LAMADDUKELLENG KAB. WAJO**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada Program
Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

ANDI AYU NOVITASARI

NIM: 70600117047

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Ayu Novitasari
NIM : 70600117047
Tempat/Tgl Lahir : Tampangeng, 30 November 1997
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jalan Sultan Alauddin
Judul : Analisa Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan
Kejadian Ketuban Pecah Dini Di RSUD
Lamaddukelleng Kab.Wajo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 2 Maret 2022

Penyusun



Andi Ayu Novitasari

NIM:70600117047

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

**JUDUL : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI DI RSUD
LAMADDUKELLENG KAB.WAJO**

**TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING UNTUK DIAJUKAN DALAM
SEMINAR HASIL KARYA TULIS ILMIAH (KTI) MAHASISWA
KEDOKTERAN**

MAKASSAR, 2 MARET 2022

PEMBIMBING 1



dr. Andi Tihardimanto, Sp. Jp., M.Kes

PEMBIMBING 2



Dr. dr. Rosdianah, M.Kes

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Di RSUD Lamaddukelleng Kab.Wajo" yang disusun oleh Andi Ayu Novitasari, NIM 70600117047, mahasiswi program studi pendidikan dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Februari 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 2 Maret 2022

29 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Andi Tihardimanto, Sp.Jp., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: dr. Andi Tihardimanto, Sp.Jp., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Dr. dr. Rosdianah, M.Kes	(.....)
Penguji I	: Dr. dr. Sitti Musafirah, Sp. KK., FINS DV	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I	(.....)

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini pada Ibu Bersalin di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad saw, Nabi sebagai *Rahmatan Lil'alam*, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta peneliti yaitu ayahanda H. Andi Muhammad Yusuf dan ibunda Hj. Andi Tenri Ako atas setiap doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada peneliti, serta atas segala bentuk bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta Wakil Dekan dan staf akademik yang

telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta abntuan kepada peneliti selama menjalankan pendidikan.

3. dr. Rini Fitriani, M.Kes., selaku Ketua Prodi Pendidikan Dokter UIN Makassar beserta segenap dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah.
4. dr. Andi Tihardimanto, Sp.JP., M.Kes., selaku pembimbing I dan Dr. dr. Rosdianah, M.Kes., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis.
5. Dr. dr. Sitti Musafirah, Sp. KK, FINSDV. selaku penguji kompetensi dan Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I. selaku penguji integrasi atas kritik, saran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya yang bermanfaat.
6. dr. Fhirastika Annisha Helvian, MARS., selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis.
7. Kepada para staf tata usaha dan staf rekam medis di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo.
8. Kepada seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada peneliti.
9. Kepada para teman-teman saya yang telah memberikan masukan yang positif, semangat, motivasi, dan setia mendengar keluh kesah peneliti.
10. Kepada teman-teman Eu2tachus yang telah memberi semangat dan saran-saran yang positif kepada peneliti.

11. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi karya yang bermanfaat untuk semua pihak.

Makassar, 07 Februari 2022

Penyusun

Andi Ayu Novitasari

NIM: 70600117047



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12-36
A. Ketuban Pecah Dini KPD	12
B. Hubungan Faktor Risiko dengan Ketuban Pecah Dini	22
C. Integrasi Keislaman	27
D. Kerangka Teori.....	35
E. Kerangka Konsep	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37-42
A. Desain Penelitian	37

B. Waktu dan Tempat Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel.....	37
D. Variabel Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Alur Penelitian.....	40
G. Instrumen Penelitian.....	41
H. Teknik Pengolaan dan Analisis Data.....	41
I. Penyajian Data.....	42
J. Etika Penelitian.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43-55
A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56-57
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	56
C. Keterbatasan Penelitian	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	6
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	7
Tabel 4.1 Tabel Karakteristik Responden Ibu Hamil di RSUD Lammadukelleng Kab. Wajo.....	44
Tabel 4.2 Hubungan Usia Ibu Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo.....	45
Tabel 4.3 Hubungan Paritas Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo.....	46
Tabel 4.4 Hubungan Usia Kehamilan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo.....	47
Tabel 4.5 Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi Urogenitalia Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo.	47



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori	35
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	36
Bagan 3.1 Alur Penelitian	40



Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ketuban Pecah

Dini Di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo

Andi Ayu Novitasari¹, Andi Tihardimanto², Rosdianah Rahim³


^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan salah satu masalah penting dalam bidang obstetri yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada ibu dan bayi serta dapat meningkatkan kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi, penyebab KPD samapai saat ini belum jelas namun ada beberapa faktor yang berhubungan yakni usia ibu, paritas, usia kehamilan, riwayat penyakit infeksi urogenitalia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*, pada penelitian ini dianalisis univariat untuk mengetahui karakteristik sampel yang diteliti serta bivariat (*chi-square*) untuk mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini, jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 822 responden. Dari hasil penelitian didapatkan faktor yang berhubungan dengan kejadian KPD yakni usia kehamilan (p-value 0,001) dan riwayat penyakit infeksi urogenitalia (p-value 0,000). Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian KPD didapatkan faktor

usia kehamilan dan riwayat penyakit infeksi urogenitalia yang memiliki korelasi yang bermakna.

Kata Kunci : Ketuban Pecah Dini (KPD), Usia ibu, Usia kehamilan, Paritas, Riwayat penyakit infeksi urogenitalia



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan salah satu masalah penting dalam bidang obstetri yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada ibu dan bayi serta dapat meningkatkan kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi (Rohmawati and Fibriana, 2018). Ketuban pecah dini juga berkaitan dengan penyulit yang berdampak buruk terhadap kesehatan dan kesejahteraan maternal maupun terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan masalah kesehatan di Indonesia (Laili, Sudaryanti and Jihan, 2018). Salah satu fungsi ketuban adalah melindungi atau menjadi pembatas dunia luar dan ruangan dalam rahim sehingga mengurangi kemungkinan infeksi (Maria and Sari, 2016). Ketuban pecah dini adalah pecah ketuban yang terjadi sebelum waktunya melahirkan (Maharrani, 2017). Ketuban pecah dini biasanya ditandai dengan keluarnya cairan berupa air dari vagina setelah umur kehamilan berusia 22 minggu dan dikatakan ketuban pecah dini apabila terjadi sebelum proses persalinan (Aryunita, 2020).

Menurut *World Health Organization* (WHO), pada tahun 2013 angka kejadian KPD di dunia sebanyak 50-60% dari angka kematian ibu yaitu sebanyak 289.000 jiwa (WHO, 2014). Berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia masih tertinggi di ASEAN yaitu sebanyak 359 per 100.000 kelahiran hidup (Kesehatan, 2019). Pada tahun 2015, angka kematian ibu mengalami

penurunan yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup (*Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019, 2020*). Penyebab langsung kematian ibu terkait kehamilan dan persalinan terutama perdarahan (28%), preeklamsia dan eklamsia (24%), infeksi (11%), partus lama (5%), dan abortus (5%). Perdarahan, infeksi, dan partus lama termasuk dalam komplikasi yang disebabkan oleh KPD (Maria and Sari, 2016). Kejadian KPD berkisar antara 5-10% dari semua kelahiran. Pada kehamilan aterm atau kehamilan diatas 37 minggu sebanyak 8-10% sedangkan pada kehamilan preterm atau kehamilan dibawah 37 minggu sebanyak 1% akan mengalami KPD (WHO, 2018).

Berdasarkan data Riskesdas di Indonesia pada tahun 2010, kejadian ketuban pecah dini dengan presentase tertinggi yaitu pada Provinsi Sulawesi Selatan (98,47%). Adapun data jumlah kejadian KPD di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebanyak 602 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 1767 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 2652 kasus. Jumlah kejadian KPD di Kab. Wajo pada tahun 2018 didapatkan sebanyak 117 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 192 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 254 kasus (Dinas Kesehatan Sulsel, 2020). Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kejadian KPD mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya baik di Provinsi Sulawesi Selatan maupun di Kab. Wajo. Adapun jumlah kasus yang didapatkan di ruang bersalin RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo tercatat 472 kasus persalinan dengan KPD dari Januari 2020 – Juli 2021.

Penyebab KPD sampai saat ini masih belum jelas namun KPD ada hubungannya dengan usia, hipermotilitas rahim yang sudah lama, selaput

ketuban tipis, infeksi, multipara, dan serviks inkompeten (Mochtar, 2018). Faktor usia sangat berpengaruh terhadap perkembangan alat-alat reproduksi wanita. Usia yang terlalu muda kurang dari 20 tahun atau usia terlalu tua lebih dari 35 tahun mempunyai risiko terjadinya KPD. 20-30% KPD disebabkan oleh adanya infeksi. Infeksi tersebut dapat berasal dari vagina dan serviks yang dapat mengakibatkan kekuatan dari membran selaput ketuban berkurang. Dengan demikian, dapat menyebabkan selaput ketuban pecah sehingga dapat membahayakan ibu dan janinnya (Manuaba, 2010).

Ketuban pecah dini juga berhubungan dengan paritas. Semakin sering seseorang melahirkan maka dapat mengakibatkan endometrium menjadi rusak dan kelenturan leher rahim yang berkurang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pembukaan dini pada serviks (Prawirohardjo, 2020). Kejadian KPD juga dipengaruhi oleh usia kehamilan, usia kehamilan dibagi atas preterm dan aterm. Namun, kejadian KPD paling sering terjadi pada kehamilan aterm karena menjelang usia kehamilan cukup bulan, terjadi kelemahan fokal pada selaput janin di atas os serviks internal yang akan memicu terjadinya robekan pada lokasi tersebut (Maria and Sari, 2016). Disamping itu, jika usia kehamilan telah mendekati usia cukup bulan, ibu hamil akan sering mengalami kontraksi uterus atau yang sering disebut his pengiring (Zamilah, Aisyiyah and Waluyo, 2020).

Dari hasil penelitian terdahulu oleh Wahyuni dan Lestari (2019), mengatakan bahwa faktor yang erat kaitannya dengan kejadian KPD adalah usia dan paritas. Usia yang terlalu muda (kurang dari 20 tahun) dan terlalu tua

(lebih dari 35 tahun) berpengaruh terhadap kejadian KPD dikarenakan pada usia dibawah 20 tahun, dari segi biologis fungsi reproduksi masih belum berkembang sempurna untuk menerima keadaan janin dan untuk dari segi psikis, belum matang dalam menghadapi tuntutan beban moril, mental, dan emosional. Sedangkan pada usia diatas 35 tahun, fungsi reproduksi sudah mengalami kemunduran atau degenerasi dibandingkan fungsi reproduksi normal sehingga memungkinkan terjadinya komplikasi pasca persalinan terutama KPD. Paritas 1 dan paritas lebih dari 3 berpengaruh terhadap kejadian KPD dikarenakan pada paritas 1, alat-alat dasar panggul masih kurang elastik sedangkan pada paritas lebih dari 3, uterusnya cenderung bekerja tidak efisien dalam persalinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zamilah, Aisyiyah dan Waluyo (2020) mengatakan bahwa, usia yang berisiko mempunyai risiko tinggi mengalami KPD sebesar 3,3 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang berumur tidak berisiko karena usia merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kualitas kehamilan. Ibu dengan paritas multipara dan grandemultipara mempunyai risiko mengalami KPD sebesar 3,5 kali tinggi dibandingkan ibu dengan paritas primipara karena pada paritas multipara dan grandemultipara disebabkan karena secara anatomi sebagian besar kondisi serviks ibu bersalin multipara memang sudah membuka akibat proses persalinannya yang lalu sehingga tidak bisa menahan dan melindungi selaput ketuban baik terhadap trauma maupun terhadap infeksi, seiring dengan tuanya kehamilan selaput

ketuban akan mengalami pematangan dan penipisan, keadaan ini akan menyebabkan selaput ketuban mudah pecah.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Sari (2016), menunjukkan hasil terdapat hubungan antara KPD dengan usia kehamilan yaitu usia kehamilan aterm lebih berisiko daripada usia kehamilan preterm maupun post term dan paritas 1 dan lebih dari 3 lebih berisiko mengalami KPD dibandingkan dengan paritas 2-3. Hal tersebut dikarenakan pada paritas 1, adanya ketidaksiapan bagi ibu dalam menghadapi persalinan pertama sedangkan pada paritas lebih dari 3, terjadi pembesaran uterus dan peregangan berulang sehingga mudah terjadi KPD. Dari penelitian Marsaulina dan Mentari (2018), didapatkan hasil kejadian KPD paling banyak terjadi pada usia 20-35 tahun. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa usia <20 dan >35 tahun lebih berisiko mengalami KPD. Sedangkan paritas yang lebih rentan mengalami KPD yaitu multigravida.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ellen (2016), didapatkan hasil bahwa penelitian tidak sesuai dengan teori bahwa usia terlalu muda atau terlalu tua (<20 dan >35 tahun) berisiko tinggi mengalami KPD dan hasil penelitian juga tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa wanita yang terkena infeksi berisiko tinggi untuk mengalami KPD. Namun hasil penelitian ini sesuai mengenai teori paritas yang menyebutkan bahwa multipara dan grandemultipara memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami KPD.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa angka KPD yang masih tinggi dan masih terdapat perbedaan antara hasil

penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian ketuban pecah dini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo”.

B. Rumusan Masalah

Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Menurut (Sayito and Sodik, 2015) definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Kategori Objektif	Alat Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Paritas	Jumlah anak kandung yang telah dilahirkan oleh seorang ibu baik hidup maupun mati.	1. Nullipara : 0-1 2. Multipara : ≥ 2	Rekam medis	Nominal
2.	Usia ibu	Lama waktu hidup ibu yang diukur sejak ibu dilahirkan sampai saat ini.	1. Terlalu muda dan terlalu tua : <20 dan >35 tahun. 2. Usia 20-35 tahun.	Rekam medis	Nominal
3.	Usia Kehamilan	Masa sejak terjadinya konsepsi sampai janin mengalami perkembangan di dalam kandungan dihitung dari HPHT.	1. Preterm : <37 minggu. 2. Aterm : ≥ 37 minggu.	Rekam medis	Nominal
4.	Riwayat Penyakit Infeksi Urogenitalia	Terdapat riwayat penyakit infeksi urogenitalia yang diderita ibu saat hamil	1. Ya : Terdapat adanya riwayat penyakit infeksi urogenitalia.	Rekam medis	Nominal

		yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur	2. Tidak : Tidak terdapat adanya riwayat penyakit infeksi urogenitalia.		
Variabel Dependen					
5.	Ketuban Pecah Dini	Pecahnya selaput ketuban pada ibu hamil sebelum adanya tanda-tanda persalinan.	1. Ya : Terjadinya pecah ketuban sebelum tanda-tanda persalinan. 2. Tidak : Tidak terjadinya pecah ketuban sebelum tanda-tanda persalinan.	Rekam medis	Nominal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo.

Data pada penelitian ini diperoleh melalui data rekam medis.

D. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No.	Peneliti / Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Alat Ukur	Hasil
1.	Titi Maharrani, Evi Yunita Nugrahini / 2017	Hubungan usia, paritas dengan ketuban decah dini di Puskesmas Jagir Surabaya	Analitik observasional <i>cross sectional</i>	144 ibu bersalin	Lembar pengumpulan data	Hasil penelitian didapatkan dari 144 ibu bersalin terdapat sebagian besar (53,47%) dengan usia beresiko dan sebanyak 64,93% terjadi KPD, ibu bersalin multipara yang sebagian besar (57,38%) terjadi KPD dan pada ibu bersalin primipara sebagian besar (75,68%) tidak terjadi KPD.
2.	Ratna Zamilah,	Faktor-faktor yang	Kuantitatif dengan	148 ibu bersalin	Rekam medis	Terdapat pengaruh umur, paritas dan

	Nani Aisyiyah, Ari Waluyo / 2020	mempengaruhi kejadian ketuban pecah dini (KPD) pada ibu bersalin di RS. Betha Medika	rancangan penelitian <i>case control</i>			status pekerjaan terhadap kejadian KPD pada ibu bersalin.
3.	Torika Anggi Pradana, I Gede Ngurah Harry Wijaya Surya / 2020	Karakteristik ibu bersalin dengan ketuban pecah dini (Aterm dan Preterm) di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Periode Juli 2015 – Juni 2016	Deskriptif Retrospektif	166 ibu bersalin	Rekam medis	Ibu bersalin yang paling banyak mengalami KPD adalah pada kehamilan aterm. Ibu bersalin dengan KPD aterm terbanyak pada usia kehamilan 37-38 minggu, sedangkan pada KPD preterm mendapat hasil seimbang antara usia kehamilan <34 minggu dan 34-36 minggu. Ibu bersalin dengan KPD baik pada kehamilan aterm maupun preterm terbanyak pada usia 20- 35 tahun, dengan faktor risiko pendidikan sedang (SMP-SMA), pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, tanpa adanya riwayat KPD sebelumnya serta dengan gravida 1.
4.	Hasnia Nur Laili, Lestari Sudaryanti, Ahmad Syah Jihan / 2018	Hubungan paritas dengan ketuban pecah dini pada ibu bersalin	<i>Correlational</i> dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	133 orang	Rekam Medis	Terdapat hubungan antara paritas dengan ketuban pecah dini
5.	Titis Wahyuni dan Murni	Hubungan umur dan paritas dengan kejadian	Deskriptif pendekatan secara	95 ibu bersalin	<i>Checklist form</i>	Ibu bersalin yang mengalami ketuban pecah dini di RSUD Tangerang periode

	Lestari / 2018	ketuban pecah dini di RSUD Tangerang tahun 2018.	<i>cross sectional.</i>		<p>Oktober – Desember Tahun 2013 sebanyak 46 orang (48,4%) dan yang tidak mengalami ketuban pecah dini sebanyak 49 orang (51,6%). 35 ibu bersalin yang berumur <20 tahun dan >35 tahun yang mengalami KPD sebanyak 23 ibu bersalin (65,7 %) dan dari 60 ibu bersalin yang berumur 20 – 35 tahun yang mengalami KPD sebanyak 23 ibu bersalin (38,3 %). 34 ibu bersalin yang primipara yang mengalami KPD sebanyak 11 ibu bersalin (32,4 %) dan dari 61 ibu bersalin yang Multipara dan grandemulti yang mengalami KPD sebanyak 35 ibu bersalin (57,4 %). Dari hasil penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara umur dan paritas dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Tangerang.</p>
--	-------------------	--	-------------------------	--	---

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo.

b. Tujuan Khusus

1. Menganalisis hubungan antara usia dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo.
2. Menganalisis hubungan antara paritas dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo.
3. Menganalisis hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian ketuban pecah di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo.
4. Menganalisis hubungan antara riwayat penyakit infeksi urogenitalia dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti


Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam rangka penerapan teori.

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin.

c. Bagi Institusi

Diharapkan menjadi referensi dan bahan pembelajaran untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan judul diatas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketuban Pecah Dini KPD

1. Definisi

Ketuban Pecah Dini atau *Early Ruptur of Membrane* adalah pecahnya ketuban sebelum adanya tanda persalinan dan setelah satu jam ditunggu belum ada tanda persalinan (Syarwani, Tendea and Wantania, 2020). Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan (Soewarto, 2018). Menurut (Mochtar, 2018), KPD merupakan pecahnya ketuban sebelum in partu, yaitu pada primi pembukaannya kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm.

Ketuban pecah dini dapat terjadi pada akhir kehamilan maupun jauh sebelum waktu melahirkan. Persalinan terjadi secara spontan dalam beberapa jam, apabila persalinan tidak terjadi dalam 24 jam maka berisiko untuk terjadi infeksi intrauterin (Manuaba, 2010).

2. Epidemiologi

Menurut WHO, kejadian KPD berkisar antara 5-10% dari semua kelahiran. Pada kejadian KPD, sekitar 70% kasus terjadi pada kehamilan aterm sedangkan kasus KPD preterm terjadi sekitar 1% dari semua kehamilan. Pada 30% kasus KPD merupakan penyebab dari kelahiran prematur (WHO, 2018). Pervalensi kejadian KPD di Indonesia berkisar 12%. Faktor risiko yang dapat mempengaruhi kejadian KPD yaitu usia muda 2-5 kali lebih tinggi dari usia 20-35 tahun, paritas antara lain multipara

sekitar 37,59% dan grandemultipara sekitar 31,17%, infeksi 20-30%, dan anemia 37,1% (Rahayu and Sari, 2017).

3. Etiologi

Penyebab ketuban pecah dini belum diketahui secara pasti. Beberapa penelitian menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan dengan KPD, namun faktor yang lebih berperan sulit diketahui. Adapun faktor risiko pada KPD menurut (Manuaba, 2010), yaitu:

a. Faktor umum

Faktor umum yang mempengaruhi adalah:

1. Infeksi lokal pada saluran kelamin seperti infeksi bakterial vaginosis.
2. Faktor sosial seperti merokok, konsumsi alkohol, dan sosial ekonomi rendah.

b. Faktor keturunan

1. Faktor keturunan seperti kelainan genetik.
2. Faktor rendahnya vitamin C dan ion Cu dalam serum akibat asupan nutrisi dari makanan ibu kurang.

c. Faktor obstetrik

Faktor obstetrik yang mempengaruhi KPD adalah:

1. Overdistensi uterus akibat kehamilan kembar dan hidroamnion.
2. Serviks inkompeten yaitu ketidakmampuan serviks untuk mempertahankan suatu kehamilan karena defek fungsi maupun struktur dari serviks.
3. Serviks konisasi atau menjadi pendek.

4. Terdapat sefalopelvik disproporsi yaitu keadaan kepala janin belum masuk pintu atas panggul dan kelainan letak janin, sehingga ketuban bagian terendah langsung menerima tekanan intrauterin yang dominan.

d. Faktor yang tidak diketahui penyebabnya.

4. Klasifikasi

Menurut (Pradana and Surya, 2020), klasifikasi KPD dibagi atas usia kehamilan yaitu:

- a. Ketuban pecah dini preterm adalah pecahnya selaput ketuban secara spontan pada usia kehamilan <37 minggu dan terjadi pada saat belum inpartu.
- b. Ketuban pecah dini aterm adalah pecahnya selaput ketuban secara spontan pada usia kehamilan ≥ 37 minggu dan terjadi sebelum awal persalinan.

5. Patofisiologi

Pecahnya ketuban pada persalinan secara umum disebabkan oleh kontraksi uterus dan peregangan yang berulang. Pecahnya selaput ketuban disebabkan karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh (Prawirohardjo, 2020).

Pada KPD terjadi perubahan-perubahan seperti penurunan jumlah jaringan kolagen dan terganggunya struktur kolagen, serta peningkatan aktivitas kolagenolitik. Degradasi kolagen dimediasi oleh Matriks Metalloproteinase (MMP) yang dihambat oleh Inhibitor Jaringan Spesifik

dan Inhibitor Protease (TIMP-1). Matriks Metalloproteinase merupakan suatu grup enzim yang dapat memecah komponen-komponen matriks ekstraseluler. Enzim tersebut diproduksi di dalam selaput ketuban (Hasifah, Isnawati and Jumuriah, 2020).

MMP-1 dan MMP-8 berperan pada pembelahan triple helix dari kolagen fibril (tipe I dan III), dan selanjutnya didegradasi oleh MMP-2 dan MMP-9 yang juga memecah kolagen tipe IV. Pada selaput ketuban juga diproduksi penghambat metalloproteinase atau Tissue Inhibitor Proteinase (TIMP). Pada TIMP-1 juga menghambat aktivitas MMP-1, MMP-8, MMP-9 dan TIMPS-2 menghambat aktivitas MMP2 (Prawirohardjo, 2020).

Keutuhan dari selaput ketuban tetap terjaga selama masa kehamilan oleh aktivitas MMP yang rendah dan konsentrasi TIMP yang relatif lebih tinggi. Saat mendekati waktu persalinan, keseimbangan tersebut akan bergeser, yaitu didapatkan kadar MMP yang meningkat sedangkan pada TIMP akan mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga menyebabkan terjadinya degradasi matriks ekstraseluler selaput ketuban (Cunningham *et al.*, 2013).

Ketidakseimbangan dari kedua enzim tersebut akan menyebabkan degradasi patologis pada selaput ketuban yang mengakibatkan selaput ketuban menjadi rapuh dan pecah. Aktivitas dari kolagenase ini diketahui meningkat pada kehamilan aterm sedangkan pada kehamilan preterm didapatkan kadar protease yang meningkat terutama pada MMP-9 serta kadar TIMP-1 yang rendah (Cunningham *et al.*, 2013).

6. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala yang terjadi biasanya keluar cairan ketuban melalui vagina yang berbau amis yang berbeda dengan bau urin yang berbau pesing seperti amoniak dengan warna pucat. Cairan ketuban berwarna jernih dan kadang-kadang bercampur lendir darah. Cairan ini tidak habis atau kering karena akan terus diproduksi sampai melahirkan (Soewarto, 2018).

Apabila telah terjadi infeksi, maka akan terjadi demam, keluar bercak darah yang banyak pada vagina, nyeri perut, dan pada janin biasanya denyut jantung akan bertambah cepat. (Bainuan, 2018).

7. Penegakan diagnosa

Menegakkan diagnosis KPD secara tepat sangat penting. Jika diagnosis yang ditegakkan ternyata diagnosis positif palsu maka akan dilakukan intervensi seperti melahirkan bayi terlalu awal atau melakukan *sectio caesarea* yang sebenarnya tidak ada indikasinya. Sebaliknya jika diagnosis negatif palsu berarti akan membiarkan ibu dan janin mempunyai risiko infeksi yang akan mengancam keselamatan ibu, janin atau keduanya. Oleh karena itu, diperlukan diagnosis yang cepat dan tepat (Manuaba, 2010).

Menurut (Soewarto, 2018), diagnosis ketuban pecah dini dapat ditegakkan dengan cara:

a. Anamnesis

Dari hasil anamnesis didapatkan pasien mengeluarkan cairan yang banyak secara tiba-tiba dari vagina yang berbau khas. Jika tidak ada

cairan yang terlihat maka gerakkan sedikit bagian terbawah janin atau meminta pasien batuk atau mengedan. Lihat tanda-tanda infeksi jika suhu ibu lebih dari 38° C serta air ketuban keruh dan berbau.

b. Pemeriksaan Fisik

1. Ada cairan yang keluar yang biasanya berisi mekonium, vernik kaseosa, rambut lanugo serta kadang-kadang berbau jika ada infeksi.
2. Dari pemeriksaan inspekulo terlihat keluar cairan ketuban dari servikalis.
3. Pada pemeriksaan dalam didapatkan cairan di dalam vagina dan selaput ketuban sudah tidak ada. Pemeriksaan dalam dilakukan jika akan dilakukan penanganan aktif (terminasi kehamilan).

c. Pemeriksaan Penunjang

1. *Nitrazin test* atau kertas lakmus merah menjadi biru (basa) jika ketuban sudah pecah.
2. Lakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) bila perlu untuk menentukan usia kehamilan, letak janin, berat janin, letak plasenta dan jumlah air ketuban.
3. Pemeriksaan air ketuban dengan tes leukosit *esterase*, bila leukosit lebih dari 15.000/mm³ maka memungkinkan adanya infeksi.

8. Penatalaksanaan KPD

Menurut (Prawirohardjo, 2020), penatalaksanaan ketuban pecah dini sebagai berikut:

a. Penatalaksanaan Konservatif

1. Dilakukan perawatan di rumah sakit dengan beri antibiotik bila ketuban pecah diatas 6 jam berupa ampisilin 4 x 500 mg atau gentamisin 1 x 80 mg.
2. Jika usia kehamilan kurang dari 32 – 34 minggu dirawat selama air ketuban masih keluar sampai air ketuban tidak keluar lagi.
3. Bila usia kehamilan 32 – 37 minggu, belum inpartu, tidak ada infeksi, tes busa negatif beri deksametason, observasi tanda-tanda infeksi, dan keadaan janin.
4. Bila usia kehamilan 32 – 37 minggu sudah inpartu, tidak ada infeksi, berikan tokolitik (salbutamol), deksametason, dan induksi setelah 24 jam.
5. Bila usia kehamilan 32 – 37 minggu, ada infeksi berikan antibiotik dan lakukan induksi. Nilai tanda-tanda infeksi seperti suhu, leukosit, dan tanda-tanda intrauterin.
6. Terminasi jika usia kehamilan sudah 37 minggu.
7. Pada usia kehamilan 32 – 37 minggu, beri steroid 2 x 6 mg selama 2 hari untuk kematangan paru janin. Bila memungkinkan periksa kadar lesitin dan spingomielin tiap minggu.

8. Dosis untuk betametason 12 mg sehari dosis tunggal selama 2 hari, deksametason IM 5 mg setiap 6 jam sebanyak 4 kali.

b. Penatalaksanaan Aktif

Pada kehamilan diatas 37 minggu dilakukan:

1. Induksi oksitosin, jika gagal lakukan *sectio caesarea*.
2. Beri misoprosol 25 µg – 50 µg intravaginal tiap 6 jam, maksimal 4 kali pemberian, jika gagal dilakukan *sectio caesarea*.
3. Jika ada tanda-tanda infeksi berikan antibiotik dosis tinggi dan akhiri persalinan.
4. Bila skor pelvik kurang dari 5 lakukan pematangan serviks, kemudian lakukan induksi. Jika gagal, akhiri persalinan dengan *sectio caesarea*.
5. Bila skor pelvik diatas 5, lakukan induksi persalinan.
6. Cara induksi yaitu 5 UI oksitosin dalam dektrose 5% dimulai 4 tetes/menit, tiap 1/4jam dinaikkan 4 tetes maksimum 40 tetes/menit. Pada keadaan CPD (Cephalopelvic Disproportion), letak lintang harus dilakukan *sectio caesarea*.

9. Komplikasi

Menurut (Andalas *et al.*, 2019) komplikasi yang diakibatkan oleh KPD sebagai berikut:

a. Persalinan Prematur

Persalinan prematur dapat diakibatkan oleh KPD karena setelah pecahnya ketuban terjadi, biasanya akan segera timbul persalinan. Periode laten tergantung pada usia kehamilan. Pada kehamilan aterm

90% akan terjadi dalam 24 jam setelah ketuban pecah, pada kehamilan 28 – 34 minggu sekitar 50% persalinan terjadi dalam 24 jam dan pada kehamilan kurang dari 26 minggu persalinan terjadi dalam 1 minggu.

b. Infeksi

Risiko infeksi meningkat pada ibu hamil dan janin. Pada ibu dapat terjadi korioamnionitis sedangkan pada bayi dapat terjadi septikemia, pneumonia, dan pada umumnya sebelum janin terinfeksi akan terjadi korioamnionitis. Infeksi juga lebih rentang terjadi pada ketuban pecah dini prematur daripada aterm. Secara umum insiden infeksi sekunder pada KPD meningkat sebanding dengan lamanya periode laten.

c. Hipoksia dan Asfiksia

Asfiksia atau hipoksia dapat terjadi karena setelah ketuban pecah akan terjadi oligohidramnion yang dapat menekan tali pusat. Derajat oligohidramnion dan gawat janin memiliki hubungan karena semakin sedikit air ketuban maka janin akan semakin gawat.

d. Sindrom Deformitas Janin

Jika ketuban pecah terlalu dini maka akan menyebabkan pertumbuhan janin terhambat. Komplikasi yang sering terjadi pada KPD sebelum kehamilan 37 minggu yaitu sindrom distress pernafasan yang terjadi sekitar 10-40% bayi baru lahir. Risiko infeksi akan meningkat pada kejadian ketuban pecah dini, semua ibu hamil dengan ketuban pecah dini prematur sebaiknya dievaluasi untuk kemungkinan terjadinya korioamnionitis.

Selain itu, kejadian prolaps atau keluarnya tali pusat bisa terjadi pada ketuban pecah dini. Risiko kecacatan dan kematian janin meningkat pada ketuban pecah dini preterm, kejadiannya hampir 100% jika ketuban pecah dini preterm terjadi pada usia kehamilan kurang dari 23 minggu.

10. Prognosis

Prognosis ketuban pecah dini ditentukan oleh cara penatalaksanaan dan komplikasi yang mungkin muncul serta usia dari kehamilan. Semakin muda umur kehamilan, maka prognosis KPD terutama pada janin akan semakin buruk. Prognosis pada bayi yaitu lahir prematur yang berhubungan dengan risiko kecacatan dan kematian janin. (Nugrahani.R.Rosi, 2019).

11. Pencegahan

Menurut (Bainuan, 2018) pencegahan ketuban pecah dini dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pencegahan primer

Ibu hamil dianjurkan untuk mengurangi aktivitas dan tidak melakukan kegiatan yang dapat membahayakan kandungan selama kehamilan. Ibu hamil juga tidak boleh merokok serta mengonsumsi alkohol. Sebelum hamil, berat badan ibu juga harus cukup mengikuti Indeks Massa Tubuh (IMT) supaya terhindar dari komplikasi. Selain itu, pasien juga diberitahu untuk berhenti koitus pada trimester akhir kehamilan jika ada faktor predisposisi.

b. Pencegahan sekunder

Untuk mencegah infeksi inpartu dapat diberikan antibiotik spektrum luas seperti gentamicin intravena 2 x 80 mg, ampicilin intravena 4 x 1 mg, amoxicillin intravena 3 x 1 mg, penicilin intravena 3 x 1,2 juta IU, metronidazol drip.

B. Hubungan Faktor Risiko dengan Ketuban Pecah Dini

1. Usia

Usia adalah lamanya waktu hidup sejak seseorang dilahirkan. Usia ibu merupakan salah satu indikator untuk menentukan apakah kehamilan ibu termasuk faktor risiko kehamilan atau tidak. Usia sangat berpengaruh terhadap kehamilan dan persalinan. Usia yang baik untuk melahirkan yaitu antara 20 – 35 tahun karena usia tersebut organ-organ reproduksi pada wanita telah berkembang dan berfungsi secara baik (Hasifah, Isnawati and Jumuriah, 2020).

Kehamilan pada usia muda (<20 tahun) sering terjadi penyulit atau komplikasi bagi ibu maupun janin. Hal ini disebabkan perkembangan organ reproduksi belum sempurna untuk hamil, dimana rahim belum bisa menahan kehamilan dengan baik sehingga selaput ketuban belum matang dan mudah mengalami robekan sehingga dapat menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini (Cunningham *et al.*, 2013).

Sedangkan pada umur >35 tahun keadaan otot-otot dasar panggul tidak lagi elastis, sehingga mudah terjadi penyulit/komplikasi seperti serviks mudah berdilatasi sehingga dapat menyebabkan pembukaan serviks terlalu

dini sehingga dengan mudahnya terjadi ketuban pecah dini (Hasifah, Isnawati and Jumuriah, 2020). Selain itu, kondisi fisik juga akan melemah dan juga memungkinkan untuk munculnya berbagai risiko gangguan kesehatan lainnya seperti hipertensi, diabetes, dan berbagai penyakit lainnya yang akan mempengaruhi kehamilannya (Octavia and Fairuza, 2019).

2. Paritas

Paritas merupakan jumlah anak yang dimiliki oleh ibu mulai dari anak pertama sampai anak terakhir (Maharrani, 2017) Paritas terbagi atas primipara, multipara, dan grandemultipara. Menurut (Rifiana and Hasanah, 2018) primipara adalah ibu yang melahirkan seorang anak untuk pertama kali dan grandemultipara adalah ibu yang telah melahirkan lebih dari 5 kali. Sedangkan menurut (Prawirohardjo, 2020) multipara adalah ibu yang telah melahirkan beberapa kali atau lebih dari dua kali.

Pada multipara dan grandemultipara, kejadian KPD semakin besar karena adanya kelemahan intrinsik uterus yang disebabkan oleh trauma sebelumnya pada persalinan pervaginam, dilatasi serviks, dan kuretase. Pada multipara dan grandemultipara, susunan serviks lebih banyak daripada jaringan ikat dibandingkan pada serviks normal (Cunningham *et al.*, 2013).

Rusaknya dari jaringan serviks tersebut memungkinkan otot dasar dari uterus meregang. Proses peregangan tersebut terjadi secara mekanis yang merangsang beberapa faktor di selaput ketuban seperti prostaglandin E_2 (PGE₂) dan interleukin-8 (IL-8). Selain itu, peregangan juga merangsang aktivitas MMP-1 pada membran interleukin-8 (IL-8) yang diproduksi dari

sel amnion dan korionik yang bersifat kemotaktik terhadap neutrofil dan merangsang aktifitas kolagenase. Hal tersebut akan menyebabkan terganggunya keseimbangan proses sintesis dan degradasi matriks ekstraseluler yang akhirnya menyebabkan pecahnya selaput ketuban (Cunningham *et al.*, 2013).

Bagian terendah janin yang belum masuk pintu atas panggul juga berpengaruh. Pada primipara, bagian terendah janin belum masuk pintu atas panggul hingga akhir minggu ke-36 kehamilan, sedangkan pada multipara penurunan bagian terendah janin terjadi saat mulainya persalinan sehingga pada multipara tidak ada bagian dari terendah janin yang menutup pintu atas panggul yang dapat mengurangi ketahanan membran ketuban pada bagian bawah (Maharrani, 2017)

3. Usia Kehamilan

Menurut (Maria and Sari, 2016), usia kehamilan adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir sedangkan menurut (Mochtar, 2018), usia kehamilan adalah 280 hari atau 40 minggu atau 10 bulan (*lunar monts*).

Usia kehamilan preterm adalah 28-36 minggu (<37 minggu). Pada trimester ketiga selaput ketuban mudah pecah, melemahnya kekuatan selaput ketuban ada hubungannya dengan pembesaran uterus, kontraksi rahim dan gerakan janin. Hal ini dikarenakan pecahnya selaput ketuban berkaitan dengan perubahan proses biokimia yang terjadi dalam kolagen matriks ekstraseluler amnion, korion, dan apoptosis membran janin.

Membran dan desidua bereaksi terhadap stimuli seperti infeksi dan peranan selaput ketuban dengan memproduksi mediator seperti prostaglandin, sitokinin, dan protein hormon yang merangsang aktivitas *matrixs degrading enzyme*. Ketuban pecah dini pada kehamilan prematur disebabkan oleh adanya faktor-faktor eksternal misalnya infeksi yang menjalar dari vagina, polihidramnion, inkompeten serviks dan solusio plasenta (Prawirohardjo, 2020).

Pada kehamilan aterm, usia kehamilan yaitu ≥ 37 minggu. Ibu yang mengalami KPD 50% pada usia kehamilan cukup bulan (aterm) akan mulai mengalami proses persalinan dalam waktu 12 jam, 70% dalam waktu 24 jam, 85% dalam waktu 84 jam, 95% dalam waktu 72 jam. Menjelang usia kehamilan cukup bulan kelemahan fokal terjadi pada selaput janin diatas os serviks internal yang memicu robekan dilokasi ini (Maria and Sari, 2016)

4. Infeksi Urogenitalia pada Ibu Hamil

Pada ibu hamil terjadi perubahan anatomi dan fisiologi ginjal serta saluran kemih sehingga mempermudah terjadinya infeksi. Infeksi dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit yang penularannya dapat terjadi saat intrauterin, pasca persalinan, atau pasca lahir. Secara fisiologi sistem imun pada ibu hamil akan menurun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh toleransi sistem imun ibu terhadap bayi yang merupakan jaringan semi alogenis, meski tidak mempengaruhi secara klinis (Bainuan, 2018).

Enzim bakterial atau produk host yang disekresikan sebagai respon menyebabkan kelemahan dan ruptur pada kulit ketuban. Banyak flora

servikovaginal komensial dan patogenik mempunyai kemampuan memproduksi protease dan kolagenase yang menurunkan kekuatan dari tegangan kulit ketuban. Elastase leukosit polimorfonuklear secara spesifik dapat memecah kolagen tipe III pada manusia, hal ini membuktikan bahwa infiltrasi leukosit pada kulit ketuban yang terjadi karena kolonisasi bakteri atau infeksi dapat menyebabkan kolagen tipe III berkurang sehingga menyebabkan ketuban pecah (Bainuan, 2018).

Peningkatan mikroorganisme menghasilkan fosfolipid A2 dan fosfolipid C yang dapat meningkatkan konsentrasi asam arakhidonat secara lokal. Peningkatan tersebut menyebabkan pelepasan prostaglandin E (PGE2) dan prostaglandin F2 α (PGF2 α) dan menyebabkan kontraksi miometrium. Pada infeksi juga dihasilkan produk sekresi akibat aktivasi monosit atau makrofag, yaitu sitokin, interleukin 1 (IL-1), tumor nekrosis faktor (TNF), dan interleukin 6 (IL-6). Mikroorganisme tersebut yang akan merangsang sel-sel desidua untuk memproduksi sitokin dan prostaglandin yang mengakibatkan degradasi matrix ekstraseluler pada membran janin sehingga menimbulkan kontraksi rahim sehingga menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini (Cunningham *et al.*, 2013)

C. Integrasi Keislaman

Allah swt. berfirman dalam QS al-Rūm/30: 54.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (٥٤)

Terjemahnya:

“Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa.”

Di dalam ayat ini disampaikan perjalanan hidup manusia. Mereka berasal dari sesuatu yang tidak ada arti dan tidak punya daya apa-apa, yaitu nutfah (zygot) yang merupakan telur yang terbuahi sperma. Nutfah itu kemudian berkembang menjadi janin, dan kemudian lahir.

Dari kanak-kanak manusia kemudian menjadi remaja, dewasa, lalu matang, dan menjadi manusia yang perkasa dan berkuasa. Setelah itu manusia menginjak usia tua. Dalam usia tua itu manusia menjadi makhluk yang lemah kembali. Di samping lemah, manusia juga mengalami perubahan fisik, di antaranya rambut yang tadinya hitam menjadi uban, kulit menjadi keriput, daya penglihatan dan pendengaran semakin lemah, dan perubahan-perubahan lainnya. Setelah itu manusia pasti mati.

Demikianlah Allah swt. menciptakan makhluk yang dikehendaki-Nya, yaitu bahwa perjalanan hidup manusia di dunia pada umumnya demikian. Namun Allah swt. dapat menentukan lain, yaitu bahwa manusia

dapat saja wafat pada usia-usia yang dikehendaki-Nya sebelum usia tua tersebut. Demikianlah lemahnya manusia di depan Tuhan. Oleh karena itu, mereka hendaknya tidak menyombongkan diri, tetapi beriman dan patuh kepada-Nya (Kementerian Agama RI, 2017).

Allah swt. berfirman dalam QS al-Hajj/22: 5.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَجِيرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَّا فِي آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
نُخْرِجُكُمْ

طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ
بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاذًا ۖ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنۢبِتت مِنۢ مِّنۢ
كُلِّ زَوْجٍ ۖ بَهِيجٍ

(٥)

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.”

Allah swt. mengingatkan (manusia) akan fase-fase yang telah dilaluinya dalam penciptaannya, dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Asal mulanya manusia itu berasal dari tanah liat, kemudian dari air mani, kemudian menjadi 'alaqah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang yang dilapisi dengan daging, lalu ditiupkan roh ke dalam tubuhnya.

Setelah itu ia dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan lemah, kecil, dan tidak berkekuatan. Kemudian menjadi besar sedikit demi sedikit hingga menjadi anak, setelah itu berusia balig dan masa puber, lalu menjadi pemuda. Inilah yang dimaksud dengan keadaan kuat sesudah lemah. Kemudian mulailah berkurang dan menua, lalu menjadi manusia yang lanjut usia dan memasuki usia pikun; dan inilah yang dimaksud keadaan lemah sesudah kuat.

Di fase ini seseorang mulai lemah keinginannya, gerak, dan kekuatannya; rambutnya putih beruban, sifat-sifat lahiriah dan batinnya berubah pula. Karena itulah maka di sebutkan oleh firman-Nya: kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Yakni Dia berbuat apa yang dikehendaki-Nya dan mengatur hamba-hamba-Nya menurut apa yang dikehendaki-Nya. dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Mahakuasa (Kementerian Agama RI, 2017).

Allah swt. berfirman dalam QS Luqmān/31: 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامَيْنِ ۖ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ

إِلَى الْمَصِيرِ (١٤)

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”

Dari ayat diatas, Allah swt. memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Hal-hal yang menyebabkan seorang anak diperintahkan berbuat baik kepada ibu sebagai berikut (Kementerian Agama RI, 2017).

1. Ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Selama masa mengandung itu, ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat, mulai pada bulan-bulan pertama, kemudian kandungan itu semakin lama semakin berat, dan ibu semakin lemah, sampai ia melahirkan. Kekuatannya baru pulih setelah habis masa nifas.
2. Ibu menyusui anaknya sampai usia dua tahun. Banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami ibu dalam masa menyusukan anaknya. Hanya Allah yang mengetahui segala penderitaan itu.

Dalam ayat ini yang disebutkan hanya alasan mengapa seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada ibunya, tidak disebutkan apa

sebabnya seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada bapaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kesukaran dan penderitaan ibu dalam mengandung, memelihara, dan mendidik anaknya jauh lebih berat bila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami bapak dalam memelihara anaknya. Penderitaan itu tidak hanya berupa pengorbanan sebagian dari waktu hidupnya untuk memelihara anaknya, tetapi juga penderitaan jasmani dan rohani. Seorang ibu juga menyediakan zat-zat penting dalam tubuhnya untuk makanan anaknya selama anaknya masih berupa janin di dalam kandungan.

Allah swt. berfirman dalam QS al-Ra'd/13: 8.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزِدَادُ^{قُلُوبًا} ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (٨)

Terjemahnya:

“Allah mengetahui apa yang di kandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi-Nya”

Dari ayat di atas, Allah swt. menegaskan kekuasaan-Nya dan menguraikan ilmunya yang sangat luas mulai mencakup hal yang kecil dan besar. Salah satu pengetahuannya yaitu tentang kehamilan. Dalam tafsir Kemenag RI, Allah selalu mengetahui keadaan janin mulai dari berbentuk sperma, jenis kelamin, berat badan dan bentuk janin, tinggi badannya kelak semenjak dalam kandungan, keindahan dan keburukan, usia serta rezekinya, masa kini dan masa depannya. Allah swt. juga mengetahui apa yang kurang sempurna dari janin yang di dalam rahim yang dapat mengakibatkan janin

lahir cacat atau keguguran dan Allah swt. juga mengetahui apa yang bertambah dan bertumbuh atau dalam keadaan kembar dan segala sesuatu baik menyangkut kehidupan kandungan maupun selain dari kandungan (Kementerian Agama RI, 2017).

Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang firman Allah swt. yang artinya *“Dan janganlah kamu membunuh dirimu”* yaitu dengan melanggar perkara-perkara yang di haramkan oleh Allah swt. dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada-Nya, serta dengan memakan harta di antara kamu dengan cara batil. Menurut dari bunyi ayat *“Dan janganlah kamu membunuh dirimu”* yang dilarang dalam ayat ini adalah dilarang membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud adalah membunuh diri serta larangan membunuh orang lain, larangan melanggar larangan Allah swt. yang dapat berakibat kebinasaan bagi diri sendiri. Dilarang membunuh diri karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang

melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah (Ar-Rifa'i, 2017).

Dalam hadis Rasulullah saw. diterangkan bahwa amal yang tidak akan putus pahalanya diterima oleh manusia sekalipun ia telah meninggal dunia ialah doa dari anak-anaknya yang saleh yang selalu ditujukan untuk orang tuanya. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ؛
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya (HR Muslim).”


Dari hadis ini dapat dipahami bahwa orang tua hendaklah mendidik anaknya agar menjadi orang yang taat kepada Allah, suka beramal saleh, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangan-Nya. Pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, memberikan contoh yang baik, dan sebagainya. Hanya anak-anak yang saleh yang taat kepada Allah dan suka beramal saleh, yang dapat berbakti dan berdoa untuk orang tuanya. Pada ayat ini, Allah menerangkan secara khusus mengapa orang harus berbuat baik kepada ibunya. Pengkhususan itu menunjukkan bahwa ketika anak akan berbuat baik kepada orang tuanya, ibu harus didahulukan daripada ayah. Sebab perhatian, pengorbanan, dan penderitaan ibu lebih besar dan lebih banyak dalam memelihara dan mendidik anak dibandingkan dengan perhatian, pengorbanan, dan penderitaan yang dialami oleh ayah.

Di antara pengorbanan, perhatian, dan penderitaan ibu ialah:

1. Ibu mengandung anak dalam keadaan penuh cobaan dan penderitaan. Semula dirasakan kandungan itu ringan, sekalipun telah mulai timbul perubahan-perubahan dalam dirinya, seperti makan tidak enak, perasaan gelisah, kadang-kadang mual, muntah, dan sebagainya. Semakin lama kandungan itu semakin berat. Bertambah berat kandungan itu bertambah berat pula cobaan yang ditanggung ibu, sampai saat-saat melahirkan. Hampir-hampir cobaan itu tidak tertanggung lagi, serasa nyawa akan putus.
2. Setelah anak lahir, ibu memelihara dan menyusunya. Masa mengandung dan menyusui ialah 30 bulan.




D. Kerangka Teori





Bagan 2.1 Kerangka Teori

E. Kerangka Konsep



Bagan 2.2 Kerangka Konsep

Keterangan:

-  : Variabel Dependen
-  : Variabel Independen
-  : Variabel Perancu

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*. *Cross sectional* merupakan penelitian yang mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dengan cara pendekatan, observasional, atau pengumpulan data. Penelitian *cross sectional* hanya mengobservasi sekali dan pengukuran variabel dilakukan pada waktu bersamaan (Notoatmodjo, 2014)

B. *Waktu dan Tempat Penelitian*

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 – Januari 2022 di RSUD Lamadukelleng Kabupaten Wajo.

C. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sayito and Sodik, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang melahirkan periode Januari 2020 – Juli 2021 sejumlah 2.374 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga mewakili populasi (Sayito and Sodik, 2015). Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin yaitu

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{2374}{1 + 2374 \times (0,05)^2}$$

$$n = \frac{2374}{1 + 5,935}$$

$$n = \frac{2374}{6,935}$$

$$n = 342 \text{ sampel}$$

Keterangan:

N = Jumlah populasi

n = Jumlah sampel

e = Margin eror

Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebagai berikut:

a. Kriteria Inklusi

1. Ibu yang bersalin di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo.

b. Kriteria Eksklusi

1. Ibu dengan rekam medik yang tidak lengkap.
2. Ibu yang mengalami anemia.
3. Ibu yang melahirkan dengan kehamilan ganda.
4. Ibu yang melahirkan dengan adanya trauma.
5. Ibu yang melahirkan dengan adanya inkompetensi serviks.
6. Ibu yang melahirkan dengan hidroamnion

Besar sampel yang memenuhi kriteria yang dianjurkan pada penelitian ini adalah 822 ibu bersalin.

D. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

- a. Usia
- b. Paritas
- c. Usia kehamilan
- d. Riwayat penyakit infeksi urogenitalia

2. Variabel Dependen

Ketuban Pecah Dini

3. Variabel Perancu


- a. Pekerjaan
- b. Anemia
- c. Kelainan letak janin
- d. Riwayat KPD

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari catatan rekam medis pasien di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo. Subjek ini dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi kemudian dilakukan identifikasi terkait variabel yang diteliti.

F. Alur Penelitian

Bagan 3.1 Alur Penelitian



G. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah format pengumpulan data yang meliputi nomor responden, nomor rekam medis, tanggal lahir, usia, tanggal persalinan, usia kehamilan, paritas dan riwayat penyakit infeksi urogenitalia.

H. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolaan Data

Pengelolaan data dan tahap-tahap pengelolaan data meliputi:

a. *Editing*

Dilakukan pengecekan kembali terhadap kebenaran data yang telah diperoleh atau dikumpulkan.

b. *Coding*

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengelolaan data. Dalam langkah ini dilakukan pemberian kode pada data dengan cara memberi angka pada variabel penelitian.

c. *Tabulating*

Dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan tujuan dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang telah diberi kode sehingga mempermudah dalam pelaksanaan analisis data.

2. Analisis Data

Data pada penelitian ini dianalisis univariat untuk mengetahui karakteristik sampel yang diteliti serta bivariat (*chi-square*) untuk

mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini.

I. *Penyajian Data*

Data disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi.

J. *Etika Penelitian*

1. Perizinan

Peneliti mengurus perizinan penelitian sebelum mengambil data sekunder di RSUD Lamadukelleng Kabupaten Wajo.

2. Tanpa Nama

Dalam pengambilan data, peneliti tidak mencantumkan identitas subjek tetapi menggunakan nomor rekam medis dan kode subjek sebagai keterangan.

3. Kerahasiaan

Peneliti menjaga kerahasiaan dan privasi rekam medis yang didapatkan dengan tidak membicarakan data yang didapatkan kepada orang lain dan hanya data tertentu yang dilaporkan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis beberapa faktor risiko kejadian KPD, yaitu usia ibu, paritas, usia kehamilan dan riwayat penyakit infeksi urogenitalia. Untuk menjawab dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, peneliti melakukan pengumpulan data di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo kemudian dilakukan analisis.

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamaddukelleng Kab. Wajo yang terletak di jalan Kartika Chandra Kirana, kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Kota Sengkang, Provinsi Sulawesi Selatan. RSUD Lamaddukelleng adalah rumah sakit umum daerah milik pemerintah. RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo ini memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang didukung oleh layanan dokter spesialis serta ditunjang dengan fasilitas medis lainnya.

Adapun jumlah pegawai yang ada yaitu sekitar 287 orang yang terdiri dari 59 orang laki-laki dan 228 orang perempuan. Jumlah bidan yang ada yaitu sekitar 15 orang dan jumlah dokter spesialis obstetri dan ginekologi sekitar 2 orang. RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo memiliki pelayanan dan fasilitas yang cukup lengkap dan menjadikan RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo sebagai salah satu rumah sakit rujukan.

2. Analisis Univariat

Tabel 4.1 Tabel Karakteristik Responden Ibu Hamil di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo.

Parameter	Frekuensi (N)	Presentase (%)
Ketuban Pecah Dini (KPD)		
- Ya	412	50,1
- Tidak	410	49,9
Usia Ibu		
- Usia 20 – 35 tahun	618	75,2
- Terlalu muda dan terlalu tua (<20 dan >35 tahun)	204	24,8
Paritas		
- Nullipara (0-1)	203	24,7
- Multipara (≥ 2)	619	75,3
Usia Kehamilan		
- Preterm (<37 minggu)	134	16,3
- Aterm (≥ 37 minggu)	688	83,7
Riwayat penyakit infeksi urogenitalia		
- Ya	92	11,2
- Tidak	730	88,8
Total	822	100

Sumber : Data Sekunder, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 karakteristik responden ibu hamil di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo, didapatkan distribusi responden dengan kejadian KPD sebanyak 412 responden (50,1%) dan tidak mengalami KPD sebanyak 410 responden (49,9%) sedangkan distribusi data berdasarkan usia ibu, didapatkan ibu dengan usia berisiko sebanyak 204 responden (24,8%) dan ibu dengan usia tidak berisiko sebanyak 618 responden (75,2%)

sedangkan distribusi data berdasarkan paritas ibu, didapatkan ibu dengan paritas berisiko sebanyak 203 responden (24,7%) dan paritas tidak berisiko sebanyak 619 responden (75,3%).

Distribusi data berdasarkan usia kehamilan pada ibu didapatkan preterm sebanyak sebanyak 134 responden (16,3%) dan aterm sebanyak 688 responden (83,7%) sedangkan distribusi data berdasarkan riwayat penyakit urogenitalial pada ibu didapatkan ibu dengan riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 92 responden (11,2%) dan tidak memiliki riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 730 responden (88,8%).

3. Analisis Bivariat

Tabel 4.2 Hubungan Usia Ibu Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo.

KPD	Usia Ibu				Total	P-value
	Terlalu tua dan terlalu muda (<20 dan >35 tahun)		Usia 20-35 tahun			
	n	%	n	%		
Ya	114	14	298	35	412	49
Tidak	90	11	320	40	410	51
Total	204	25	618	75	822	100

Sumber : Data Sekunder, 2020

Berdasarkan tabulasi tabel 4.2, didapatkan ibu yang mengalami KPD dengan usia berisiko sebanyak 114 responden (14%) dan ibu dengan usia tidak berisiko sebanyak 298 responden (35%) sedangkan ibu yang tidak mengalami KPD dengan usia berisiko sebanyak 90 responden (11%) dan ibu dengan usia tidak berisiko sebanyak 320 responden (75%).

Uji *chi-square* merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi

yang signifikan jika $p\text{-value} < 0,005$. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value}$ 0.063 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara ketuban pecah dini dengan usia ibu.

Tabel 4.3 Hubungan Paritas Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo.

KPD	Paritas				Total		P-value
	Nullipara (0-1)		Multipara (≥ 2)		n	%	
	n	%	n	%			
Ya	311	38	101	12,2	412	50,2	0,936
Tidak	308	37,4	102	12,4	410	49,8	
Total	619	75,4	203	24,6	822	100	

Sumber : Data Sekunder, 2020

Berdasarkan tabulasi tabel 4.3, didapatkan ibu yang mengalami KPD dengan paritas berisiko sebanyak 311 responden (38%) dan ibu dengan paritas tidak berisiko sebanyak 101 responden (12,2%) sedangkan ibu yang tidak mengalami KPD dengan paritas berisiko sebanyak 308 responden (37,4%) dan ibu dengan paritas tidak berisiko sebanyak 102 responden (12,4%).

Uji *chi-square* merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika $p\text{-value} < 0,005$. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value}$ 0.936 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara KPD dengan paritas ibu.

Tabel 4.4 Hubungan Usia Kehamilan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo.

KPD	Usia Kehamilan				Total		P-value
	Preterm (<37 minggu)		Aterm (<u>></u> 37 minggu)				
	n	%	n	%	n	%	
Ya	85	11	325	40	448	51	0,001
Tidak	49	5	363	44	374	49	
Total	134	16	688	84	822	100	

Sumber : Data Sekunder, 2020

Berdasarkan tabulasi tabel 4.4, didapatkan ibu yang mengalami KPD dengan usia kehamilan preterm sebanyak 85 responden (11%) dan ibu dengan usia kehamilan aterm sebanyak 325 responden (40%) sedangkan ibu yang tidak mengalami ketuban pecah dini dengan usia kehamilan preterm sebanyak 49 responden (5%) dan ibu dengan usia kehamilan aterm sebanyak 363 responden (44%).

Uji *chi-square* merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* <0,005. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.001 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara KPD dengan usia kehamilan.

Tabel 4.5 Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi Urogenitalia Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo.

KPD	Riwayat penyakit infeksi urogenitalia				Total		P-value
	Ya		Tidak				
	n	%	n	%	n	%	
Ya	64	8,2	348	42	412	50,2	0,000
Tidak	28	3,4	382	46,4	410	49,8	
Total	92	11,6	730	88,4	822	100	

Sumber : Data Sekunder, 2020

Berdasarkan tabulasi tabel 4.5, didapatkan ibu yang mengalami KPD dengan riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 64 responden (8,2%)

dan ibu yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 348 responden (42%) sedangkan ibu yang tidak mengalami KPD dengan riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 28 responden (3,4%) dan ibu yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 382 responden (46,4%).

Uji *chi-square* merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* <0,005. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara KPD dengan riwayat penyakit infeksi urogenitalia.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolahan data yang telah dilakukan di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo periode Januari 2020 hingga Juli 2021 khususnya di bagian data sekunder (rekam medik), maka berikut pembahasan tentang hasil penelitian yang didapatkan.

Faktor risiko kejadian KPD yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain, yaitu usia ibu, paritas, usia kehamilan dan riwayat penyakit infeksi urogenitalia. Adapun pembahasan dari masing-masing faktor yang diteliti adalah sebagai berikut.

1. Usia Ibu

Berdasarkan penelitian yang didapatkan, jumlah ibu yang mengalami KPD dengan usia berisiko (<20 tahun dan >35 tahun) sebanyak 114 responden (14%) dan ibu dengan usia tidak berisiko (20-35 tahun) sebanyak

298 responden (35%) sedangkan ibu yang tidak mengalami ketuban pecah dini dengan usia berisiko (<20 tahun dan >35 tahun) sebanyak 90 responden (11%) dan ibu dengan usia tidak berisiko (20-35 tahun) sebanyak 320 responden (75%). Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai untuk hubungan usia dengan kejadian KPD yaitu $p\text{-value} = 0.063$ yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara usia ibu dengan kejadian KPD di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo periode Januari 2020 hingga Juli 2021.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Redowati (2018), pada uji statistik menggunakan *chi square* didapatkan nilai $p\text{-value}$ sebesar $0,086 > \alpha 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu bersalin dengan kejadian KPD di RSUD Jendral Ahmad Yani Kota Metro tahun 2016. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Markhmah, Ningrum dan Suryani (2021), dengan $p\text{-value} = 0,072$ ($p > 0,05$) yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara kejadian KPD dengan usia ibu.

Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian oleh Indang (2021), dengan hasil analisis statistik menggunakan uji *chi-square* diperoleh hasil nilai $p\text{-value} 0.002$ ($0,000 < 0,05$), berarti ada hubungan antara usia ibu terhadap kejadian KPD di puskesmas Buranga Kabupaten Buton Utara tahun 2020. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian oleh Netri dan Rahayu (2019), didapatkan nilai $p\text{-value} 0,009$ yang berarti terdapat hubungan antara usia dengan kejadian KPD di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.

Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan teori kemungkinan terjadi akibat dari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian KPD seperti riwayat KPD kehamilan sebelumnya, pekerjaan ibu, dan tingkat pendidikan ibu. Riwayat KPD dikehamilan sebelumnya dapat menjadi salah satu penyebab dari kejadian KPD dikarenakan komposisi dari membran yang menjadi rapuh dan kandungan dari kolagen yang semakin menurun pada kehamilan berikutnya. Pekerjaan juga dapat berpengaruh terhadap kejadian KPD karena apabila ibu hamil melakukan aktivitas fisik yang berat dan terlalu lama yaitu lebih dari 3 jam perhari maka dapat menimbulkan kelelahan. Kelelahan tersebut dapat menyebabkan korion amnion menjadi lemah sehingga timbul ketuban pecah dini karena tidak mampu lagi menahan kehamilannya.

Selain itu, perkembangan dan kematangan dari organ reproduksi wanita berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti status gizi, istirahat yang cukup, dan pemeriksaan *antenatal care* (ANC) secara teratur. Asupan gizi yang baik yang dikonsumsi oleh ibu selama hamil akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan ibu dan bayinya sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah faktor risiko khususnya pada usia ibu. Pemeriksaan ANC secara teratur juga dapat menurunkan risiko kejadian KPD karena ibu bisa mengetahui faktor-faktor risiko penyebab KPD agar dapat mengantisipasi atau meminimalisir faktor pencetus terjadinya KPD demi keselamatan ibu dan janinnya.

2. Paritas

Dari hasil penelitian didapatkan ibu yang mengalami KPD dengan paritas berisiko (paritas ≥ 2) sebanyak 311 responden (38%) dan ibu dengan paritas tidak berisiko (paritas 0-1) sebanyak 101 responden (12,2%) sedangkan ibu yang tidak mengalami KPD dengan paritas berisiko (paritas ≥ 2) sebanyak 308 responden (37,4%) dan ibu dengan paritas tidak berisiko (paritas 0-1) sebanyak 102 responden (12,4%). Berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil nilai *p-value* 0.936 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kejadian KPD dengan paritas ibu di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo periode Januari 2020 hingga Juli 2021.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita, Novianty dan Rahmadini (2021), yaitu diperoleh hasil uji *statistic chi-square* dengan nilai *p-value* $0,41 > 0,05$ yang artinya tidak ada hubungan paritas dengan kejadian KPD.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Yuria (2021), dengan hasil *p-value* sebesar 0,003 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan kejadian KPD. Begitu juga dengan hasil penelitian oleh Raydian dan Rodiani (2020), didapatkan nilai *p-value* = 0,031 ($p \leq 0,05$) bahwa terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian KPD.

Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan teori kemungkinan terjadi akibat dari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian KPD seperti status pekerjaan ibu, tingkat pendidikan ibu dan riwayat KPD

kehamilan sebelumnya. Status pekerjaan ibu juga berpengaruh terhadap kejadian KPD karena semakin berat pekerjaan atau aktivitas dari ibu maka hal tersebut dapat menyebabkan ketegangan yang meningkat pada otot-otot rahim sehingga selaput ketuban dapat menjadi lemah dan mudah pecah.

Tingkat pendidikan ibu yang rendah dapat berpengaruh terhadap kejadian KPD dikarenakan ibu mungkin tidak mengerti akan pentingnya melakukan pemeriksaan ANC pada saat hamil guna untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang dapat membahayakan ibu dan janinnya. Riwayat KPD dikehamilan sebelumnya dapat menjadi salah satu penyebab dari kejadian KPD dikarenakan komposisi dari membran yang menjadi rapuh dan kandungan dari kolagen yang semakin menurun pada kehamilan berikutnya. Ibu yang memiliki riwayat KPD dikehamilan sebelumnya mengindikasikan bahwa telah terjadi kerusakan serviks pada persalinan sebelumnya, sehingga kerusakan tersebut dapat bertambah pada kehamilan selanjutnya, terlebih jika ibu kurang bisa menjaga kesehatan dan *personal hygiene*.

3. Usia Kehamilan

Berdasarkan penelitian ini, ibu yang mengalami KPD dengan usia kehamilan preterm (<37 minggu) sebanyak 85 responden (11%) dan ibu dengan usia kehamilan aterm (≥ 37 minggu) sebanyak 325 responden (40%) sedangkan ibu yang tidak mengalami ketuban pecah dini dengan usia kehamilan preterm (<37 minggu) sebanyak 49 responden (5%) dan ibu dengan usia kehamilan aterm (≥ 37 minggu) sebanyak 363 responden (44%). Pada hasil uji *chi-square* didapatkan yaitu *p-value* 0.001 yang berarti terdapat

korelasi yang signifikan antara kejadian KPD dengan usia kehamilan di RSUD Lamadukelleng Kab. Wajo periode Januari 2020 hingga Juli 2021.

Selaput ketuban pada saat usia kehamilan diatas 37 minggu akan melemah. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya pembesaran uterus, kontraksi janin, dan pergerakan janin. Pada usia kehamilan diatas 37 minggu juga akan terjadi perubahan biokimia yang terjadi pada matriks ekstraseluler amnion, korion, dan apoptosis membran janin sehingga menyebabkan selaput ketuban menjadi mudah pecah. Hal ini juga bisa disebabkan karena kurangnya asupan nutrisi pada saat kehamilan dan kurang rutin untuk melakukan pemeriksaan ANC selama kehamilan. Pemeriksaan ANC sangat penting selama kehamilan, guna untuk mengetahui apabila terdapat faktor risiko yang dapat mencetus terjadinya KPD sehingga hal tersebut dapat menurunkan risiko kejadian KPD. Tingkat pendidikan ibu juga sangat berpengaruh, semakin tinggi tingkat pendidikan ibu semakin banyak pengetahuan yang didapatkan dan cenderung mengerti dengan kondisinya serta akan langsung mendatangi petugas kesehatan jika terdapat keluhan selama kehamilan. Berbeda pada kehamilan muda, selaput ketuban sangat kuat sehingga kejadian KPD lebih sering terjadi pada kehamilan aterm (<37 minggu) dibandingkan pada kehamilan preterm (≥ 37 minggu).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu, Febrianti dan Octaviani (2019), dengan hasil ada hubungan antara usia kehamilan terhadap kejadian KPD di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar dengan nilai $p(0,05) > \alpha(0,05)$. Begitu juga dengan penelitian oleh Barokah dan

Agustina (2021), yaitu dengan nilai $p = 0.035 < 0.05$ yang berarti ada pengaruh antara usia kehamilan dengan kejadian KPD.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2018), yang menyatakan bahwa umur kehamilan tidak ada hubungannya dengan kejadian KPD karena didapatkan nilai *p-value* $0,288 > 0,05$. Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah adanya perbedaan jumlah sampel yang diambil dan metode penelitian sehingga akan sangat berpengaruh terhadap jumlah faktor risiko.

4. Riwayat Penyakit Infeksi Urogenitalia

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ibu yang mengalami ketuban pecah dini (KPD) dengan riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 64 responden (8,2%) dan ibu yang tidak memiliki riwayat infeksi urogenitalia sebanyak 348 responden (42%) sedangkan ibu yang tidak mengalami ketuban pecah dini dengan riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 28 responden (3,4%) dan ibu yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi urogenitalia sebanyak 382 responden (46,4%). Berdasarkan hasil uji *chi-square* yang didapatkan yaitu *p-value* 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara KPD dengan riwayat penyakit infeksi urogenitalia di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo periode Januari 2020 hingga Juli 2021.

Infeksi menjadi salah satu penyebab dari KPD yang harus diantisipasi sejak awal kehamilan. Selaput ketuban yang mudah pecah dapat disebabkan oleh adanya infeksi pada vagina maupun serviks. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh *hygiene* yang kurang baik sehingga menyebabkan infeksi

asendens yaitu karena adanya pertumbuhan bakteri patogen atau terjadi perubahan flora normal yang ada pada vagina maupun serviks. Bakteri-bakteri yang menginfeksi saluran genitalia dapat memproduksi fosfolipase, kolagenase, dan protease. Adanya infeksi tersebut akan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi pada membran ketuban sehingga kekuatan dari membran dan selaput ketuban berkurang akibatnya selaput ketuban tidak dapat mempertahankan janin yang berada di dalam rahim.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2015), diketahui bahwa ada hubungan bermakna antara infeksi genitalia dengan kejadian KPD dengan nilai $p=0,000$. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani *et al.*, (2021), yaitu nilai p-value fisher's exact test $0.042 < \alpha$ yang memiliki makna adanya hubungan yang signifikan antara faktor infeksi dengan kejadian KPD.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh Wulandari, Irsam dan Kartika (2016), yaitu tidak ada perbedaan signifikan infeksi pada ibu hamil yang mengalami KPD dengan ibu hamil yang tidak mengalami KPD dengan hasil $p=0,195$. Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah adanya perbedaan jumlah sampel yang diambil dan metode penelitian sehingga akan sangat berpengaruh terhadap jumlah faktor risiko.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo periode Januari 2020 hingga Juli 2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan kejadian KPD di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo.
2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan kejadian KPD di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia kehamilan dengan kejadian KPD di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit infeksi urogenitalia dengan kejadian KPD di RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo.

B. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan jika melakukan penelitian agar memperluas faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian KPD dan menggunakan data primer agar hasil yang didapatkan lebih akurat.
2. Untuk petugas kesehatan agar memberikan pelayanan maksimal kepada ibu hamil yang mengalami KPD guna untuk mencegah terjadinya komplikasi serta melakukan penyuluhan mengenai KPD kepada ibu hamil guna untuk

mendeteksi secara dini faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejadian KPD.

3. Untuk masyarakat khususnya ibu hamil yang memiliki faktor risiko KPD untuk melakukan pemeriksaan *antenatal care* yang teratur dan bermutu serta menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya KPD.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Variabel yang diteliti terbatas dan kemungkinan terdapat beberapa faktor lain yang belum diteliti, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian KPD.
2. Kemampuan untuk membaca rekam medis terbatas.
3. Riwayat penyakit infeksi urogenitalia tidak dicantumkan secara signifikan di rekam medis sehingga peneliti tidak dapat mengetahui jenis dari riwayat penyakit infeksi urogenitalia ibu yang mengalami KPD.



DAFTAR PUSTAKA

- Andalas, M. *et al.* (2019) 'Ketuban pecah dini dan tatalaksananya', *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 19(3), pp. 188–192. doi: 10.24815/jks.v19i3.18119.
- Andriyani *et al.* (2021) 'Faktor yang Mempengaruhi Penyebab Terjadinya Ketuban Pecah Dini (KPD) Ibu Bersalin di RSUD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara', *Journal of Health, Nursing, and Midwifery Sciences Adpertisi.*, 2(1), pp. 14–19.
- Anggraeni, L. and Yuria, M. (2021) 'Faktor Predisposisi Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin Di Puskesmas Kecamatan Jatinegara', *Jurnal Kesehatan Medika Sainatika Volume*, 12(2), pp. 213–219.
- Ar-Rifa'i, M. N. (2017) *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani.
- Aryunita (2020) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketuban Pecah Dini pada Ibu Bersalin di Rumah Bersalin Novida Efrianti Str, Keb', 8(4), pp. 630–632.
- Ayu, I., Febrianti, M. and Octaviani, A. (2019) 'Faktor yang Berhubungan Terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSIA Sitti Khadijah I Makassar Tahun 2019', *Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia*, 3(1), pp. 52–61.
- Bainuan, L. D. (2018) 'Pencegahan Ketuban Pecah Dini (Premature Rupture of Membranes) Dengan Suplemen Vitamin C Pada Kehamilan', *Jurnal.Stikesbaptis.Ac.Id*, pp. 17–64. Available at: <http://jurnal.stikesbaptis.ac.id/index.php/PSB/article/view/259>.
- Barokah, L. and Agustina, S. A. (2021) 'Faktor Internal Kejadian Ketuban Pecah Dini di Kabupaten Kulonprogo', *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, 04(02), pp. 108–115.
- Cunningham, F. G. *et al.* (2013) *Obstetri William Vol. 2, Edisi 23*. Jakarta: EGC.
- Dinas Kesehatan Sulsel (2020) *Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020*.
- Hasifah, Isnawati and Jumuriah (2020) 'Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini pada Ibu Bersalin di RSUD Salewangang Maros'.
- Indang, W. O. (2021) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Ketuban Pecah Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Buranga Kabupaten Buton Utara Tahun 2020', 4(4), pp. 171-177,.
- Kementerian Agama RI (2017).
- Kesehatan, D. (2019) *Survei Demografi Kesehatan Indonesia*.
- Laili, H. D., Sudaryanti, L. and Jihan, A. S. (2018) 'Hubungan Paritas dengan Ketuban Pecah Dini pada Ibu Bersalin', *Jornal of Ners Community*, 9(2), pp. 183–189.
- Maharrani, T. (2017) 'Premature Rupture Of The Membrane', *jurnal penelitian*

kesehatan suara forikes, VIII(April), pp. 102–108.

- Manuaba, I. A. C. (2010) *Gadar Obstetri & Ginekologi & Obstetri Ginekologi Sosial Untuk Profesi Bidan*. Jakarta: EGC.
- Maria, A. and Sari, U. S. C. (2016) ‘Hubungan Usia Kehamilan dan Paritas Ibu Bersalin dengan Ketuban Pecah Dini’, *Jurnal Vokasi Kesehatan*, II(1), pp. 10–16.
- Markmah, S., Ningrum, E. W. and Suryani, R. L. (2021) ‘Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Islam Banjarnegara’, pp. 764–770. doi: 10.37337/jkdp.v1i2.37.
- Marsaulina, I. and Mentari, A. (2018) ‘Hubungan Karakteristik Ibu Bersalin Dengan Ketuban Pecah Dini Di Rumah Sakit Martha Friska’, 1(2).
- Mochtar, R. (2018) ‘Sinopsis Obstetri Fisiologi Patologi. Edisi 2. Jakarta’, 2.
- Netri, Y. and Rahayu, D. (2019) ‘Hubungan Usia Dan Paritas Ibu Bersalin Dengan Kejadian KPD’.
- Notoatmodjo (2014) *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugrahani.R.Rosi (2019) ‘Faktor Yang Mempengaruhi Ketuban Pecah Dini’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Octavia, R. and Fairuza, F. (2019) ‘Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Di Rumah Sakit Budi Asih Serang Periode Oktober Tahun 2018’, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Delima*, 3(2), pp. 220–229.
- Pradana, T. A. and Surya, I. G. N. H. W. (2020) ‘Karakteristik Ibu Bersalin dengan Ketuban Pecah Dini (Aterm & Preterm) di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Periode Juli 2015-Juni 2016’, *Jurnal Medika Udayana*, 9(1), pp. 92–97.
- Prawirohardjo, S. (2020) *Ilmu Kebidanan. Edisi Empat. Cetakan Enam*. doi: h. 140-5; 158; 177-9; 183-5; 213; 282-7.
- Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019* (2020). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Puspita, D. F., Novianty, K. and Rahmadini, A. F. (2021) ‘Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin Di BPM Sri Puspa Kencana, AMD.KEB. di Kabupaten Bogor’, *Keywords in Qualitative Methods*, 2(1), pp. 1–10. doi: 10.4135/9781849209403.n73.
- Rahayu, B. (2018) ‘Hubungan Faktor-Faktor Usia Ibu, Paritas, Umur Kehamilan, Dan Over Distensi Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Di Rumah Sakit Yogyakarta’, *Media Ilmu Kesehatan*, 7(2), pp. 137–142.
- Rahayu, B. and Sari, A. N. (2017) ‘Studi Deskriptif Penyebab Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) pada Ibu Bersalin’, *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 5(2), p. 134. doi: 10.21927/jnki.2017.5(2).134-138.
- Raydian, A. U. and Rodiani (2020) ‘Hubungan Paritas Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini DI RSUD Abdul Moeloek Periode Maret-Agustus 2017’,

- Medula*, 9(4), pp. 658–661.
- Redowati, T. E. (2018) ‘Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin Di Rsud Jendral Ahmad Yani Kota Metro Tahun 2016’, *Jurnal Kesehatan ‘Akbid Wira Buana’*, 3(2), pp. 1–14.
- Rifiana, A. J. and Hasanah (2018) ‘Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin di Puskesmas Tanggeung Cianjur’, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(60), pp. 7001–7018.
- Rohmawati, N. and Fibriana, I. A. (2018) ‘Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran’, *Higeia Journal Of Public Health Research and Development*, 2(1), pp. 23–32.
- Sayito, S. and Sodik, A. (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soewarto, S. (2018) ‘Ketuban Pecah Dini’, in *Ilmu Kebidanan*. VI. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, pp. 677–680.
- Susilawati (2015) ‘Analisis Faktor Risiko yang Berhubungan Dengan Ketuban Pecah Dini di RS Umum Daerah Dr.Abdul Moeloek Provinsi Lampung’, *Jurnal Dunia Kesmas*, 4(4), pp. 196–202.
- Syarwani, T. I., Tendean, H. M. M. and Wantania, J. J. E. (2020) ‘Gambaran Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Tahun 2018’, *Medical Scope Journal*, 1(2), pp. 24–29. doi: 10.35790/msj.1.2.2020.27462.
- Wahyuni, T. and Lestari, M. (2019) ‘Hubungan Umur Dan Paritas Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Di RSUD Tangerang Tahun 2018’, *Jurnal IMJ: Indonesia Midwifery Journal*, 3(1), pp. 18–23.
- WHO (2014) *Health for the World’s Adolescents: A Second Chance in the Second Decade*. Geneva: World Health Organization Departemen of Noncommunicable Disease Surveillance.
- WHO (2018) *Statistik Kematian Ibu Hamil, Applied Microbiology and Biotechnology*.
- Wulandari, E., Irsam, M. and Kartika, A. (2016) ‘Analisis Faktor Risiko Terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Melahirkan Di RSUD Tugurejo Semarang’.
- Zamilah, R., Aisyiyah, N. and Waluyo, A. (2020) ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) Pada Ibu Bersalin Di RS . Betha Medika’, 10(2), pp. 122–135.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

	
PTSPWJ IP594E33	
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Jalan Jend. Anmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0483) 329349, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan Website : dpmptsp.wajokab.go.id , Email : dpmpptsp.wajokab@gmail.com	
IZIN PENELITIAN / SURVEY NOMOR : 1146/IP/DPMTSP/2021	
Membaca	: Surat Pemohonan ANDI AYU NOVITASARI Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey
Mengingat	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.
Memperhatikan	: 1. Surat dari FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR Nomor : B-4688/Un.06/TKIK/PP.00.9/12/2021 Tanggal 22 Desember 2021 Perihal PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor 01157/IP/TIM-TEKNIS/XII/2021 Tanggal 28 Desember 2021 Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey
Menetapkan	: Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada : Nama : ANDI AYU NOVITASARI Tempat/Tanggal Lahir : Sengkang , 30 November 1997 Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Tempe UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR Perguruan Tinggi/Lembaga : MAKASSAR Jenjang Pendidikan : S1 Judul Penelitian : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI DI RSUD LAMADDUKELLENG KAB. WAJO Lokasi Penelitian : RSUD LAMADDUKELLENG KAB. WAJO Jangka Waktu Penelitian : 27 Desember 2021 s/d 27 Januari 2022
Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :	
1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan	
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diteliti, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.	
3. Menaatikan semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.	
Ditapkan di : Sengkang Pada Tanggal : 28 Desember 2021	
Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si, Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA NIP. : 19651128 199002 1 001	
	
No. Reg : 1218/IP/DPMTSP/2021 Retribusi : Rp.0.00	

LAMPIRAN II



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKKELLENG
Jalan Kartika Chandra Kirana No. 9 Telp./Fax 0485 21785 Sengkang Kab. Wajo 90915
Email : rsudlamaddukkelleng@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 070 / 2021 / UPT.RSUDL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. IDAR YANI. S.Sos., M.M.

N I P : 19660827 198703 2 007

Pangkat / Gol. : Pembina, IV/a

Menerangkan bahwa :

N a m a : Andi Ayu Novitasari

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Islam Negeri Makassar

Telah mengadakan Penelitian / Pengumpulan Data / Wawancara / Praktek Lapangan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng dengan judul penelitian **"ANALIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI DI RSUD LAMADDUKKELLENG KAB.WAJO"** Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 04 Februari 2022

an. DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LAMADDUKKELLENG KAB. WAJO
KEMERDEKAAN DAN PEMBANGUNAN LAYANAN,



HJ. IDAR YANI. S.Sos., M.M.
NIP. 19660827 198703 2 007

LAMPIRAN II
MASTER TABEL

No.	Inisial Pasien	KPD/tidak KPD	Usia	Paritas	Usia Kehamilan	Riwayat Penyakit Infeksi Urogenitalia
1	Ny. S	KPD	33 thn	2	38 minggu	tidak
2	Ny. I	KPD	36 thn	2	37 minggu	tidak
3	Ny. R	KPD	20 thn	0	37 minggu	tidak
4	Ny. A	KPD	28 thn	0	39 minggu	tidak
5	Ny. H	KPD	43 thn	0	41 minggu	tidak
6	Ny. A	KPD	24 thn	0	42 minggu	tidak
7	Ny. J	KPD	23 thn	0	39 minggu	tidak
8	Ny. R	KPD	29 thn	0	38 minggu	tidak
9	Ny. E	KPD	18 thn	0	38 minggu	tidak
10	Ny. R	KPD	28 thn	0	38 minggu	tidak
11	Ny. K	KPD	27 thn	0	41 minggu	tidak
12	Ny. I	KPD	19 thn	0	34 minggu	tidak
13	Ny. F	KPD	31 thn	0	36 minggu	tidak
14	Ny. S	KPD	31 thn	3	38 minggu	tidak
15	Ny. M	KPD	29 thn	1	38 minggu	ya
16	Ny. F	KPD	36 thn	3	40 minggu	tidak
17	Ny. E	KPD	25 thn	2	41 minggu	tidak
18	Ny. S	KPD	25 thn	1	38 minggu	tidak
19	Ny. R	KPD	26 thn	0	38 minggu	tidak
20	Ny. N	KPD	34 thn	2	38 minggu	ya
21	Ny. S	KPD	25 thn	0	40 minggu	tidak
22	Ny. N	KPD	23 thn	1	39 minggu	tidak
23	Ny. M	KPD	34 thn	0	38 minggu	tidak
24	Ny. N	KPD	20 thn	0	41 minggu	tidak
25	Ny. H	KPD	21 thn	0	34 minggu	tidak
26	Ny. I	KPD	20 thn	0	41 minggu	tidak
27	Ny. T	KPD	19 thn	0	41 minggu	tidak
28	Ny. R	KPD	37 thn	0	38 minggu	tidak
29	Ny. N	KPD	31 thn	0	40 minggu	tidak
30	Ny. I	KPD	27 thn	0	35 minggu	tidak
31	Ny. A	KPD	41 thn	1	38 minggu	tidak
32	Ny. N	KPD	35 thn	2	39 minggu	tidak
33	Ny. M	KPD	55 thn	2	40 minggu	tidak
34	Ny. R	KPD	25 thn	0	37 minggu	tidak
35	Ny. M	KPD	26 thn	0	38 minggu	tidak
36	Ny. R	KPD	27 thn	2	38 minggu	tidak
37	Ny. S	KPD	27 thn	0	39 minggu	tidak
38	Ny. M	KPD	18 thn	0	40 minggu	tidak
39	Ny. I	KPD	37 thn	2	38 minggu	tidak
40	Ny. R	KPD	34 thn	0	35 minggu	tidak
41	Ny. R	KPD	36 thn	1	29 minggu	tidak
42	Ny. F	KPD	16 thn	0	39 minggu	tidak
43	Ny. I	KPD	20 thn	0	41 minggu	tidak
44	Ny. D	KPD	24 thn	0	36 minggu	tidak
45	Ny. I	KPD	18 thn	0	40 minggu	tidak

46	Ny. S	KPD	24 thn	1	38 minggu	ya
47	Ny. W	KPD	22 thn	0	38 minggu	tidak
48	Ny. I	KPD	26 thn	0	41 minggu	tidak
49	Ny. N	KPD	16 thn	0	41 minggu	tidak
50	Ny. N	KPD	31 thn	2	34 minggu	tidak
51	Ny. I	KPD	28 thn	1	38 minggu	tidak
52	Ny. F	KPD	21 thn	1	42 minggu	tidak
53	Ny. N	KPD	36 thn	2	34 minggu	tidak
54	Ny. N	KPD	20 thn	0	38 minggu	tidak
55	Ny. D	KPD	27 thn	1	30 minggu	tidak
56	Ny. A	KPD	31 thn	2	38 minggu	tidak
57	Ny. H	KPD	28 thn	0	39 minggu	ya
58	Ny. R	KPD	42 thn	2	32 minggu	tidak
59	Ny. N	KPD	28 thn	1	38 minggu	tidak
60	Ny. I	KPD	22 thn	0	35 minggu	tidak
61	Ny. N	KPD	20 thn	0	37 minggu	tidak
62	Ny. H	KPD	18 thn	0	38 minggu	tidak
63	Ny. S	KPD	39 thn	3	37 minggu	tidak
64	Ny. R	KPD	17 thn	0	36 minggu	tidak
65	Ny. S	KPD	39 thn	3	37 minggu	tidak
66	Ny. T	KPD	38 thn	6	38 minggu	tidak
67	Ny. G	KPD	19 thn	0	39 minggu	tidak
68	Ny. M	KPD	20 thn	0	41 minggu	tidak
69	Ny. I	KPD	36 thn	2	38 minggu	tidak
70	Ny. M	KPD	37 thn	2	38 minggu	tidak
71	Ny. A	KPD	41 thn	2	36 minggu	tidak
72	Ny. M	KPD	42 thn	3	30 minggu	tidak
73	Ny. H	KPD	39 thn	1	38 minggu	tidak
74	Ny. I	KPD	16 thn	0	40 minggu	tidak
75	Ny. A	KPD	21 thn	0	38 minggu	tidak
76	Ny. S	KPD	18 thn	0	39 minggu	tidak
77	Ny. S	KPD	40 thn	4	39 minggu	tidak
78	Ny. F	KPD	28 thn	0	40 minggu	tidak
79	Ny. E	KPD	27 thn	0	38 minggu	tidak
80	Ny. B	KPD	40 thn	1	40 minggu	tidak
81	Ny. I	KPD	18 thn	0	37 minggu	tidak
82	Ny. I	KPD	27 thn	0	41 minggu	tidak
83	Ny. N	KPD	22 thn	0	38 minggu	tidak
84	Ny. S	KPD	27 thn	1	37 minggu	tidak
85	Ny. S	KPD	25 thn	0	37 minggu	tidak
86	Ny. F	KPD	29 thn	0	37 minggu	tidak
87	Ny. I	KPD	35 thn	1	41 minggu	tidak
88	Ny. H	KPD	23 thn	0	40 minggu	tidak
89	Ny. A	KPD	26 thn	1	37 minggu	tidak
90	Ny. A	KPD	36 thn	1	38 minggu	tidak
91	Ny. J	KPD	30 thn	1	42 minggu	tidak
92	Ny. N	KPD	29 thn	1	38 minggu	tidak
93	Ny. H	KPD	27 thn	0	41 minggu	tidak
94	Ny. S	KPD	27 thn	0	40 minggu	tidak
95	Ny. H	KPD	35 thn	2	42 minggu	tidak
96	Ny. Y	KPD	35 thn	2	32 minggu	tidak
97	Ny. F	KPD	21 thn	1	33 minggu	tidak
98	Ny. I	KPD	32 thn	1	40 minggu	tidak
99	Ny. R	KPD	20 thn	0	40 minggu	tidak
100	Ny. H	KPD	35 thn	0	37 minggu	tidak

101	Ny. H	KPD	34 thn	0	42 minggu	tidak
102	Ny. F	KPD	25 thn	0	38 minggu	tidak
103	Ny. A	KPD	22 thn	0	39 minggu	tidak
104	Ny. F	KPD	35 thn	0	41 minggu	tidak
105	Ny. S	KPD	32 thn	1	39 minggu	tidak
106	Ny. I	KPD	16 thn	0	37 minggu	ya
107	Ny. I	KPD	30 thn	0	39 minggu	tidak
108	Ny. I	KPD	22 thn	0	28 minggu	tidak
109	Ny. B	KPD	33 thn	0	39 minggu	tidak
110	Ny. S	KPD	33 thn	2	28 minggu	tidak
111	Ny. S	KPD	42 thn	4	38 minggu	tidak
112	Ny. Z	KPD	15 thn	0	38 minggu	tidak
113	Ny. J	KPD	19 thn	0	39 minggu	tidak
114	Ny. R	KPD	23 thn	1	39 minggu	tidak
115	Ny. T	KPD	24 thn	0	39 minggu	tidak
116	Ny. H	KPD	30 thn	1	38 minggu	tidak
117	Ny. H	KPD	26 thn	1	40 minggu	tidak
118	Ny. W	KPD	24 thn	0	38 minggu	tidak
119	Ny. W	KPD	26 thn	2	36 minggu	ya
120	Ny. H	KPD	37 thn	0	39 minggu	tidak
121	Ny. N	KPD	18 thn	0	37 minggu	tidak
122	Ny. H	KPD	24 thn	2	37 minggu	tidak
123	Ny. H	KPD	23 thn	0	40 minggu	tidak
124	Ny. I	KPD	25 thn	0	36 minggu	tidak
125	Ny. W	KPD	50 thn	2	41 minggu	tidak
126	Ny. A	KPD	22 thn	0	39 minggu	tidak
127	Ny. S	KPD	26 thn	1	41 minggu	tidak
128	Ny. M	KPD	30 thn	0	38 minggu	ya
129	Ny. J	KPD	27 thn	1	38 minggu	tidak
130	Ny. I	KPD	31 thn	2	36 minggu	tidak
131	Ny. N	KPD	36 thn	1	39 minggu	tidak
132	Ny. G	KPD	29 thn	1	38 minggu	ya
133	Ny. J	KPD	37 thn	1	39 minggu	tidak
134	Ny. K	KPD	37 thn	1	40 minggu	tidak
135	Ny. F	KPD	20 thn	0	40 minggu	tidak
136	Ny. Y	KPD	30 thn	0	38 minggu	tidak
137	Ny. I	KPD	29 thn	2	38 minggu	tidak
138	Ny. R	KPD	33 thn	1	40 minggu	tidak
139	Ny. F	KPD	30 thn	1	39 minggu	tidak
140	Ny. D	KPD	23 thn	0	38 minggu	ya
141	Ny. R	KPD	28 thn	0	38 minggu	tidak
142	Ny. G	KPD	28 thn	0	41 minggu	tidak
143	Ny. F	KPD	38 thn	1	38 minggu	tidak
144	Ny. R	KPD	29 thn	0	40 minggu	tidak
145	Ny. R	KPD	35 thn	1	41 minggu	tidak
146	Ny. F	KPD	19 thn	0	39 minggu	tidak
147	Ny. I	KPD	19 thn	0	41 minggu	tidak
148	Ny. D	KPD	36 thn	1	39 minggu	tidak
149	Ny. I	KPD	25 thn	1	41 minggu	tidak
150	Ny. S	KPD	21 thn	0	38 minggu	tidak
151	Ny. W	KPD	28 thn	2	38 minggu	tidak
152	Ny. I	KPD	43 thn	3	39 minggu	tidak
153	Ny. N	KPD	19 thn	0	39 minggu	ya
154	Ny. N	KPD	34 thn	0	35 minggu	tidak
155	Ny. I	KPD	39 thn	0	38 minggu	tidak

156	Ny. F	KPD	25 thn	0	38 minggu	tidak
157	Ny. A	KPD	35 thn	1	39 minggu	tidak
158	Ny. S	KPD	37 thn	1	32 minggu	tidak
159	Ny. U	KPD	38 thn	0	38 minggu	tidak
160	Ny. R	KPD	35 thn	3	37 minggu	tidak
161	Ny. S	KPD	36 thn	0	37 minggu	tidak
162	Ny. I	KPD	33 thn	0	38 minggu	tidak
163	Ny. N	KPD	36 thn	1	37 minggu	tidak
164	Ny. M	KPD	31 thn	0	38 minggu	tidak
165	Ny. H	KPD	19 thn	0	38 minggu	tidak
166	Ny. I	KPD	32 thn	1	40 minggu	tidak
167	Ny. H	KPD	32 thn	0	40 minggu	tidak
168	Ny. A	KPD	22 thn	0	36 minggu	ya
169	Ny. N	KPD	25 thn	0	38 minggu	tidak
170	Ny. I	KPD	32 thn	1	36 minggu	tidak
171	Ny. M	KPD	23 thn	0	32 minggu	tidak
172	Ny. K	KPD	21 thn	0	35 minggu	tidak
173	Ny. S	KPD	25 thn	0	37 minggu	tidak
174	Ny. A	KPD	19 thn	0	40 minggu	tidak
175	Ny. H	KPD	25 thn	2	39 minggu	tidak
176	Ny. A	KPD	38 thn	7	39 minggu	tidak
177	Ny. L	KPD	34 thn	1	35 minggu	tidak
178	Ny. N	KPD	25 thn	0	37 minggu	tidak
179	Ny. I	KPD	38 thn	0	41 minggu	tidak
180	Ny. F	KPD	34 thn	0	42 minggu	tidak
181	Ny. Y	KPD	25 thn	1	38 minggu	tidak
182	Ny. M	KPD	38 thn	1	36 minggu	tidak
183	Ny. R	KPD	23 thn	0	39 minggu	tidak
184	Ny. A	KPD	23 thn	0	39 minggu	tidak
185	Ny. K	KPD	39 thn	2	38 minggu	tidak
186	Ny. D	KPD	31 thn	1	38 minggu	tidak
187	Ny. H	KPD	42 thn	1	38 minggu	tidak
188	Ny. M	KPD	30 thn	1	36 minggu	tidak
189	Ny. I	KPD	32 thn	4	39 minggu	tidak
190	Ny. B	KPD	33 thn	0	41 minggu	tidak
191	Ny. V	KPD	24 thn	0	40 minggu	tidak
192	Ny. A	KPD	24 thn	0	39 minggu	tidak
193	Ny. U	KPD	21 thn	1	39 minggu	tidak
194	Ny. N	KPD	32 thn	0	38 minggu	tidak
195	Ny. S	KPD	24 thn	0	38 minggu	tidak
196	Ny. N	KPD	30 thn	2	39 minggu	tidak
197	Ny. N	KPD	27 thn	1	37 minggu	tidak
198	Ny. D	KPD	31 thn	1	39 minggu	tidak
199	Ny. R	KPD	47 thn	1	38 minggu	tidak
200	Ny. H	KPD	41 thn	0	37 minggu	tidak
201	Ny. R	KPD	29 thn	1	38 minggu	tidak
202	Ny. I	KPD	22 thn	1	37 minggu	tidak
203	Ny. J	KPD	24 thn	0	37 minggu	tidak
204	Ny. P	KPD	35 thn	1	39 minggu	tidak
205	Ny. K	KPD	36 thn	2	38 minggu	tidak
206	Ny. S	KPD	21 thn	0	40 minggu	tidak
207	Ny. D	KPD	23 thn	0	39 minggu	tidak
208	Ny. K	KPD	31 thn	0	41 minggu	tidak
209	Ny. F	KPD	29 thn	2	41 minggu	tidak
210	Ny. I	KPD	19 thn	0	39 minggu	tidak

211	Ny. N	KPD	26 thn	0	38 minggu	tidak
212	Ny. A	KPD	19 thn	0	38 minggu	tidak
213	Ny. N	KPD	26 thn	0	38 minggu	tidak
214	Ny. A	KPD	37 thn	2	38 minggu	tidak
215	Ny. H	KPD	22 thn	0	39 minggu	tidak
216	Ny. N	KPD	36 thn	1	38 minggu	tidak
217	Ny. N	KPD	25 thn	0	39 minggu	ya
218	Ny. H	KPD	16 thn	0	40 minggu	tidak
219	Ny. S	KPD	22 thn	0	39 minggu	tidak
220	Ny. R	KPD	27 thn	2	40 minggu	tidak
221	Ny. I	KPD	18 thn	0	39 minggu	tidak
222	Ny. R	KPD	23 thn	1	32 minggu	tidak
223	Ny. E	KPD	35 thn	2	40 minggu	tidak
224	Ny. I	KPD	26 thn	1	38 minggu	tidak
225	Ny. R	KPD	25 thn	0	38 minggu	tidak
226	Ny. S	KPD	24 thn	2	43 minggu	tidak
227	Ny. H	KPD	28 thn	1	39 minggu	tidak
228	Ny. S	KPD	34 thn	7	38 minggu	tidak
229	Ny. I	KPD	33 thn	2	38 minggu	tidak
230	Ny. S	KPD	25 thn	2	38 minggu	ya
231	Ny. N	KPD	37 thn	2	26 minggu	tidak
232	Ny. J	KPD	30 thn	2	37 minggu	tidak
233	Ny. I	KPD	35 thn	1	39 minggu	tidak
234	Ny. S	KPD	40 thn	2	38 minggu	tidak
235	Ny. N	KPD	38 thn	2	28 minggu	tidak
236	Ny. S	KPD	19 thn	0	39 minggu	tidak
237	Ny. S	KPD	25 thn	0	39 minggu	tidak
238	Ny. I	KPD	29 thn	0	37 minggu	tidak
239	Ny. I	KPD	36 thn	2	40 minggu	tidak
240	Ny. S	KPD	23 thn	2	40 minggu	tidak
241	Ny. S	KPD	20 thn	0	38 minggu	tidak
242	Ny. S	KPD	21 thn	0	38 minggu	tidak
243	Ny. I	KPD	21 thn	0	37 minggu	tidak
244	Ny. A	KPD	35 thn	0	40 minggu	tidak
245	Ny. D	KPD	24 thn	1	31 minggu	tidak
246	Ny. N	KPD	33 thn	2	29 minggu	tidak
247	Ny. I	KPD	31 thn	0	39 minggu	tidak
248	Ny. N	KPD	21 thn	0	39 minggu	tidak
249	Ny. H	KPD	28 thn	0	40 minggu	tidak
250	Ny. J	KPD	22 thn	1	41 minggu	tidak
251	Ny. H	KPD	31 thn	0	38 minggu	tidak
252	Ny. R	KPD	32 thn	0	43 minggu	tidak
253	Ny. P	KPD	22 thn	0	40 minggu	tidak
254	Ny. P	KPD	25 thn	1	36 minggu	tidak
255	Ny. S	KPD	30 thn	1	41 minggu	tidak
256	Ny. R	KPD	24 thn	0	38 minggu	tidak
257	Ny. S	KPD	22 thn	0	38 minggu	ya
258	Ny. S	KPD	27 thn	0	38 minggu	tidak
259	Ny. M	KPD	32 thn	1	39 minggu	tidak
260	Ny. D	KPD	23 thn	1	38 minggu	tidak
261	Ny. H	KPD	16 thn	0	41 minggu	tidak
262	Ny. S	KPD	31 thn	3	40 minggu	tidak
263	Ny. R	KPD	19 thn	1	40 minggu	tidak
264	Ny. M	KPD	25 thn	0	39 minggu	tidak
265	Ny. H	KPD	27 thn	0	40 minggu	tidak

266	Ny. S	KPD	34 thn	5	38 minggu	tidak
267	Ny. K	KPD	19 thn	0	41 minggu	tidak
268	Ny. N	KPD	37 thn	0	40 minggu	tidak
269	Ny. S	KPD	22 thn	0	35 minggu	tidak
270	Ny. I	KPD	20 thn	0	37 minggu	tidak
271	Ny. M	KPD	27 thn	1	29 minggu	tidak
272	Ny. H	KPD	22 thn	0	40 minggu	tidak
273	Ny. A	KPD	33 thn	2	39 minggu	tidak
274	Ny. H	KPD	29 thn	0	38 minggu	tidak
275	Ny. M	KPD	41 thn	1	39 minggu	tidak
276	Ny. Y	KPD	23 thn	1	38 minggu	tidak
277	Ny. A	KPD	38 thn	1	38 minggu	ya
278	Ny. M	KPD	37 thn	1	39 minggu	tidak
279	Ny. S	KPD	38 thn	0	38 minggu	tidak
280	Ny. E	KPD	34 thn	2	37 minggu	tidak
281	Ny. M	KPD	28 thn	0	39 minggu	tidak
282	Ny. D	KPD	37 thn	1	38 minggu	tidak
283	Ny. S	KPD	20 thn	2	37 minggu	tidak
284	Ny. T	KPD	34 thn	2	37 minggu	tidak
285	Ny. A	KPD	30 thn	1	37 minggu	tidak
286	Ny. Y	KPD	30 thn	0	38 minggu	tidak
287	Ny. D	KPD	24 thn	1	38 minggu	tidak
288	Ny. E	KPD	29 thn	0	39 minggu	tidak
289	Ny. S	KPD	25 thn	0	38 minggu	tidak
290	Ny. N	KPD	29 thn	0	39 minggu	tidak
291	Ny. S	KPD	25 thn	0	37 minggu	tidak
292	Ny. N	KPD	20 thn	0	39 minggu	tidak
293	Ny. S	KPD	22 thn	0	38 minggu	tidak
294	Ny. A	KPD	27 thn	0	40 minggu	tidak
295	Ny. N	KPD	25 thn	0	39 minggu	tidak
296	Ny. R	KPD	23 thn	0	38 minggu	tidak
297	Ny. T	KPD	20 thn	11	42 minggu	tidak
298	Ny. I	KPD	25 thn	0	38 minggu	tidak
299	Ny. D	KPD	26 thn	0	37 minggu	tidak
300	Ny. I	KPD	32 thn	1	39 minggu	tidak
301	Ny. A	KPD	24 thn	0	35 minggu	tidak
302	Ny. V	KPD	19 thn	0	38 minggu	tidak
303	Ny. R	KPD	33 thn	1	38 minggu	tidak
304	Ny. N	KPD	24 thn	0	36 minggu	tidak
305	Ny. N	KPD	23 thn	1	35 minggu	tidak
306	Ny. R	KPD	23 thn	0	32 minggu	tidak
307	Ny. S	KPD	23 thn	0	38 minggu	tidak
308	Ny. S	KPD	23 thn	1	32 minggu	tidak
309	Ny. R	KPD	28 thn	0	38 minggu	tidak
310	Ny. D	KPD	30 thn	1	42 minggu	tidak
311	Ny. J	KPD	22 thn	0	35 minggu	tidak
312	Ny. M	KPD	38 thn	0	38 minggu	tidak
313	Ny. D	KPD	19 thn	0	35 minggu	tidak
314	Ny. R	KPD	21 thn	0	38 minggu	tidak
315	Ny. U	KPD	24 thn	0	38 minggu	tidak
316	Ny. I	KPD	47 thn	2	35 minggu	tidak
317	Ny. C	KPD	43 thn	1	39 minggu	tidak
318	Ny. A	KPD	27 thn	2	40 minggu	tidak
319	Ny. M	KPD	36 thn	0	36 minggu	tidak
320	Ny. N	KPD	25 thn	0	38 minggu	tidak

321	Ny. H	KPD	19 thn	0	35 minggu	tidak
322	Ny. R	KPD	41 thn	5	39 minggu	tidak
323	Ny. F	KPD	15 thn	0	38 minggu	tidak
324	Ny. H	KPD	31 thn	0	38 minggu	tidak
325	Ny. N	KPD	26 thn	2	38 minggu	tidak
326	Ny. E	KPD	16 thn	0	39 minggu	ya
327	Ny. N	KPD	23 thn	1	39 minggu	tidak
328	Ny. S	KPD	21 thn	0	40 minggu	tidak
329	Ny. N	KPD	28 thn	1	38 minggu	tidak
330	Ny. N	KPD	37 thn	2	40 minggu	tidak
331	Ny. N	KPD	36 thn	2	39 minggu	tidak
332	Ny. E	KPD	25 thn	0	39 minggu	ya
333	Ny. A	KPD	29 thn	3	41 minggu	tidak
334	Ny. R	KPD	40 thn	1	40 minggu	tidak
335	Ny. A	KPD	22 thn	0	37 minggu	tidak
336	Ny. N	KPD	20 thn	0	40 minggu	tidak
337	Ny. S	KPD	28 thn	1	39 minggu	tidak
338	Ny. N	KPD	25 thn	0	38 minggu	tidak
339	Ny. B	KPD	24 thn	2	39 minggu	tidak
340	Ny. S	KPD	25 thn	0	38 minggu	tidak
341	Ny. M	KPD	36 thn	1	39 minggu	tidak
342	Ny. R	KPD	19 thn	0	38 minggu	tidak
343	Ny. E	KPD	25 thn	0	39 minggu	tidak
344	Ny. D	KPD	28 thn	0	38 minggu	ya
345	Ny. A	KPD	24 thn	2	40 minggu	tidak
346	Ny. R	KPD	35 thn	3	38 minggu	tidak
347	Ny. R	KPD	37 thn	0	39 minggu	tidak
348	Ny. A	KPD	21 thn	0	40 minggu	tidak
349	Ny. I	KPD	32 thn	2	39 minggu	tidak
350	Ny. T	KPD	24 thn	1	40 minggu	tidak
351	Ny. F	KPD	26 thn	0	41 minggu	ya
352	Ny. H	KPD	40 thn	3	40 minggu	tidak
353	Ny. S	KPD	18 thn	0	38 minggu	tidak
354	Ny. W	KPD	24 thn	1	39 minggu	tidak
355	Ny. J	KPD	31 thn	0	39 minggu	tidak
356	Ny. Y	KPD	28 thn	1	39 minggu	tidak
357	Ny. N	KPD	30 thn	0	38 minggu	tidak
358	Ny. L	KPD	31 thn	0	39 minggu	tidak
359	Ny. S	KPD	29 thn	0	37 minggu	tidak
360	Ny. F	KPD	36 thn	1	38 minggu	ya
361	Ny. A	KPD	33 thn	2	36 minggu	tidak
362	Ny. S	KPD	23 thn	0	31 minggu	tidak
363	Ny. Y	KPD	27 thn	0	39 minggu	tidak
364	Ny. H	KPD	22 thn	0	40 minggu	tidak
365	Ny. U	KPD	30 thn	0	22 minggu	tidak
366	Ny. M	KPD	32 thn	3	40 minggu	tidak
367	Ny. F	KPD	24 thn	0	35 minggu	tidak
368	Ny. H	KPD	24 thn	0	39 minggu	tidak
369	Ny. H	KPD	36 thn	1	38 minggu	tidak
370	Ny. W	KPD	23 thn	0	39 minggu	tidak
371	Ny. E	KPD	26 thn	0	38 minggu	tidak
372	Ny. E	KPD	25 thn	0	40 minggu	tidak
373	Ny. S	KPD	24 thn	0	40 minggu	tidak
374	Ny. S	KPD	30 thn	0	38 minggu	tidak
375	Ny. R	KPD	18 thn	0	38 minggu	tidak

376	Ny. N	KPD	38 thn	10	38 minggu	tidak
377	Ny. F	KPD	32 thn	1	40 minggu	ya
378	Ny. A	KPD	32 thn	1	40 minggu	tidak
379	Ny. F	KPD	33 thn	2	39 minggu	tidak
380	Ny. R	KPD	26 thn	0	37 minggu	tidak
381	Ny. G	KPD	31 thn	2	34 minggu	tidak
382	Ny. H	KPD	17 thn	0	39 minggu	tidak
383	Ny. G	KPD	24 thn	3	29 minggu	tidak
384	Ny. I	KPD	42 thn	2	38 minggu	tidak
385	Ny. H	KPD	31 thn	0	37 minggu	tidak
386	Ny. E	KPD	42 thn	2	38 minggu	tidak
387	Ny. T	KPD	35 thn	0	40 minggu	tidak
388	Ny. M	KPD	26 thn	0	37 minggu	tidak
389	Ny. M	KPD	34 thn	1	39 minggu	tidak
390	Ny. V	KPD	38 thn	2	38 minggu	tidak
391	Ny. S	KPD	38 thn	0	37 minggu	tidak
392	Ny. W	KPD	37 thn	2	36 minggu	tidak
393	Ny. H	KPD	26 thn	0	38 minggu	tidak
394	Ny. N	KPD	25 thn	0	38 minggu	tidak
395	Ny. M	KPD	24 thn	0	40 minggu	tidak
396	Ny. N	KPD	30 thn	0	38 minggu	tidak
397	Ny. W	KPD	24 thn	0	39 minggu	tidak
398	Ny. I	KPD	27 thn	1	36 minggu	tidak
399	Ny. S	KPD	27 thn	1	37 minggu	tidak
400	Ny. A	KPD	34 thn	0	39 minggu	tidak
401	Ny. F	KPD	34 thn	2	40 minggu	ya
402	Ny. M	KPD	29 thn	0	38 minggu	tidak
403	Ny. S	KPD	34 thn	0	40 minggu	tidak
404	Ny. A	KPD	33 thn	1	36 minggu	tidak
405	Ny. S	KPD	24 thn	1	39 minggu	tidak
406	Ny. H	KPD	23 thn	0	38 minggu	tidak
407	Ny. N	KPD	19 thn	0	31 minggu	tidak
408	Ny. S	KPD	23 thn	1	33 minggu	tidak
409	Ny. J	KPD	24 thn	1	39 minggu	tidak
410	Ny. S	KPD	25 thn	0	24 minggu	tidak
411	Ny. P	KPD	36 thn	2	40 minggu	tidak
412	Ny.U	KPD	20 thn	0	40 minggu	tidak
413	Ny. D	Tidak KPD	25 thn	1	37 minggu	tidak
414	Ny. D	Tidak KPD	30 thn	1	39 minggu	tidak
415	Ny. M	Tidak KPD	27 thn	0	35 minggu	tidak
416	Ny. J	Tidak KPD	27 thn	1	37 minggu	tidak
417	Ny. N	Tidak KPD	31 thn	3	37 minggu	tidak
418	Ny. A	Tidak KPD	25 thn	2	38 minggu	tidak
419	Ny. E	Tidak KPD	18 thn	0	38 minggu	tidak
420	Ny. A	Tidak KPD	19 thn	0	39 minggu	tidak
421	Ny. P	Tidak KPD	25 thn	1	38 minggu	tidak
422	Ny. W	Tidak KPD	24 thn	1	36 minggu	tidak
423	Ny. S	Tidak KPD	27 thn	1	36 minggu	tidak
424	Ny. I	Tidak KPD	23 thn	0	38 minggu	tidak
425	Ny.Y	Tidak KPD	26 thn	1	39 minggu	tidak
426	Ny. E	Tidak KPD	30 thn	1	40 minggu	tidak
427	Ny. F	Tidak KPD	37 thn	1	34 minggu	tidak
428	Ny. D	Tidak KPD	27 thn	3	40 minggu	tidak
429	Ny. S	Tidak KPD	22 thn	1	39 minggu	tidak
430	Ny. P	Tidak KPD	23 thn	1	31 minggu	tidak

431	Ny. A	Tidak KPD	28 thn	1	38 minggu	ya
432	Ny. E	Tidak KPD	18 thn	0	39 minggu	tidak
433	Ny. T	Tidak KPD	32 thn	1	41 minggu	tidak
434	Ny. I	Tidak KPD	19 thn	0	39 minggu	tidak
435	Ny. S	Tidak KPD	27 thn	1	37 minggu	tidak
436	Ny. A	Tidak KPD	33 thn	1	39 minggu	tidak
437	Ny. I	Tidak KPD	28 thn	1	37 minggu	tidak
438	Ny. I	Tidak KPD	25 thn	0	39 minggu	tidak
439	Ny. E	Tidak KPD	15 thn	0	39 minggu	tidak
440	Ny. J	Tidak KPD	26 thn	1	34 minggu	tidak
441	Ny. C	Tidak KPD	33 thn	1	30 minggu	tidak
442	Ny. E	Tidak KPD	18 thn	0	41 minggu	tidak
443	Ny. A	Tidak KPD	30 thn	4	37 minggu	tidak
444	Ny. I	Tidak KPD	28 thn	1	38 minggu	tidak
445	Ny. S	Tidak KPD	27 thn	3	39 minggu	tidak
446	Ny. N	Tidak KPD	25 thn	1	38 minggu	tidak
447	Ny. A	Tidak KPD	22 thn	0	39 minggu	tidak
448	Ny. L	Tidak KPD	29 thn	1	34 minggu	tidak
449	Ny. R	Tidak KPD	33 thn	1	28 minggu	tidak
450	Ny. N	Tidak KPD	26 thn	2	39 minggu	tidak
451	Ny. I	Tidak KPD	23 thn	1	38 minggu	tidak
452	Ny. E	Tidak KPD	17 thn	0	40 minggu	tidak
453	Ny. I	Tidak KPD	24 thn	1	41 minggu	tidak
454	Ny. I	Tidak KPD	29 thn	1	37 minggu	tidak
455	Ny. N	Tidak KPD	33 thn	1	38 minggu	tidak
456	Ny. A	Tidak KPD	19 thn	0	39 minggu	tidak
457	Ny. F	Tidak KPD	29 thn	1	35 minggu	tidak
458	Ny. I	Tidak KPD	28 thn	1	37 minggu	tidak
459	Ny. L	Tidak KPD	16 thn	0	40 minggu	ya
460	Ny. T	Tidak KPD	29 thn	3	28 minggu	tidak
461	Ny. A	Tidak KPD	33 thn	6	27 minggu	tidak
462	Ny. I	Tidak KPD	18 thn	0	38 minggu	tidak
463	Ny. E	Tidak KPD	19 thn	0	38 minggu	tidak
464	Ny. S	Tidak KPD	34 thn	1	39 minggu	tidak
465	Ny. I	Tidak KPD	26 thn	0	36 minggu	tidak
466	Ny. A	Tidak KPD	24 thn	1	39 minggu	ya
467	Ny. L	Tidak KPD	35 thn	0	40 minggu	tidak
468	Ny. N	Tidak KPD	25 thn	1	41 minggu	tidak
469	Ny. D	Tidak KPD	30 thn	3	40 minggu	tidak
470	Ny. A	Tidak KPD	26 thn	1	37 minggu	tidak
471	Ny. D	Tidak KPD	21 thn	0	38 minggu	tidak
472	Ny. N	Tidak KPD	36 thn	1	39 minggu	tidak
473	Ny. I	Tidak KPD	34 thn	5	40 minggu	tidak
474	Ny. N	Tidak KPD	30 thn	0	38 minggu	tidak
475	Ny. H	Tidak KPD	28 thn	1	38 minggu	tidak
476	Ny. J	Tidak KPD	37 thn	1	37 minggu	tidak
477	Ny. S	Tidak KPD	31 thn	1	39 minggu	tidak
478	Ny. I	Tidak KPD	20 thn	0	40 minggu	tidak
479	Ny. R	Tidak KPD	37 thn	1	37 minggu	tidak
480	Ny. A	Tidak KPD	28 thn	1	38 minggu	tidak
481	Ny. H	Tidak KPD	30 thn	1	36 minggu	tidak
482	Ny. A	Tidak KPD	22 thn	0	37 minggu	tidak
483	Ny. J	Tidak KPD	20 thn	0	37 minggu	tidak
484	Ny. R	Tidak KPD	36 thn	4	33 minggu	tidak
485	Ny. E	Tidak KPD	38 thn	5	38 minggu	tidak

486	Ny. R	Tidak KPD	28 thn	2	39 minggu	tidak
487	Ny. K	Tidak KPD	25 thn	1	38 minggu	tidak
488	Ny. A	Tidak KPD	31 thn	4	32 minggu	tidak
489	Ny. M	Tidak KPD	26 thn	2	37 minggu	tidak
490	Ny. I	Tidak KPD	28 thn	0	38 minggu	ya
491	Ny. B	Tidak KPD	19 thn	0	39 minggu	tidak
492	Ny. V	Tidak KPD	32 thn	1	40 minggu	tidak
493	Ny. A	Tidak KPD	27 thn	1	41 minggu	tidak
494	Ny. U	Tidak KPD	23 thn	2	41 minggu	tidak
495	Ny. N	Tidak KPD	22 thn	0	35 minggu	tidak
496	Ny.S	Tidak KPD	36 thn	1	37 minggu	tidak
497	Ny. N	Tidak KPD	31 thn	1	36 minggu	tidak
498	Ny. N	Tidak KPD	28 thn	0	37 minggu	tidak
499	Ny. D	Tidak KPD	26 thn	3	38 minggu	tidak
500	Ny. R	Tidak KPD	22 thn	2	39 minggu	ya
501	Ny. H	Tidak KPD	34 thn	5	39 minggu	tidak
502	Ny. R	Tidak KPD	28 thn	0	40 minggu	tidak
503	Ny. Y	Tidak KPD	22 thn	0	40 minggu	tidak
504	Ny. F	Tidak KPD	20 thn	0	28 minggu	tidak
505	Ny. I	Tidak KPD	37 thn	1	36 minggu	tidak
506	Ny. R	Tidak KPD	29 thn	1	37 minggu	tidak
507	Ny. H	Tidak KPD	18 thn	0	38 minggu	tidak
508	Ny. H	Tidak KPD	19 thn	0	40 minggu	tidak
509	Ny. F	Tidak KPD	35 thn	2	38 minggu	tidak
510	Ny. A	Tidak KPD	29 thn	2	37 minggu	tidak
511	Ny. F	Tidak KPD	26 thn	1	35 minggu	tidak
512	Ny. S	Tidak KPD	36 thn	1	38 minggu	tidak
513	Ny. I	Tidak KPD	29 thn	0	37 minggu	tidak
514	Ny. I	Tidak KPD	25 thn	0	40 minggu	tidak
515	Ny. I	Tidak KPD	22 thn	1	40 minggu	tidak
516	Ny. B	Tidak KPD	30 thn	2	37 minggu	tidak
517	Ny. S	Tidak KPD	38 thn	5	37 minggu	tidak
518	Ny. S	Tidak KPD	23 thn	1	38 minggu	tidak
519	Ny. Z	Tidak KPD	36 thn	1	39 minggu	tidak
520	Ny. J	Tidak KPD	20 thn	0	39 minggu	tidak
521	Ny. R	Tidak KPD	27 thn	0	41 minggu	tidak
522	Ny. A	Tidak KPD	26 thn	0	40 minggu	ya
523	Ny. M	Tidak KPD	31 thn	2	38 minggu	tidak
524	Ny. H	Tidak KPD	37 thn	5	37 minggu	tidak
525	Ny. I	Tidak KPD	18 thn	0	37 minggu	tidak
526	Ny. A	Tidak KPD	33 thn	2	39 minggu	tidak
527	Ny. S	Tidak KPD	19 thn	0	40 minggu	tidak
528	Ny. S	Tidak KPD	27 thn	1	41 minggu	tidak
529	Ny. F	Tidak KPD	30 thn	1	37 minggu	tidak
530	Ny. E	Tidak KPD	31 thn	1	38 minggu	tidak
531	Ny. B	Tidak KPD	23 thn	0	36 minggu	tidak
532	Ny. I	Tidak KPD	21 thn	0	39 minggu	tidak
533	Ny. I	Tidak KPD	34 thn	1	35 minggu	ya
534	Ny. N	Tidak KPD	34 thn	3	37 minggu	tidak
535	Ny. S	Tidak KPD	37 thn	1	39 minggu	tidak
536	Ny. S	Tidak KPD	24 thn	0	40 minggu	tidak
537	Ny. F	Tidak KPD	26 thn	1	30 minggu	tidak
538	Ny. I	Tidak KPD	18 thn	0	39 minggu	tidak
539	Ny. H	Tidak KPD	38 thn	2	38 minggu	tidak
540	Ny. A	Tidak KPD	28 thn	1	40 minggu	tidak

541	Ny. M	Tidak KPD	26 thn	0	41 minggu	tidak
542	Ny. R	Tidak KPD	19 thn	0	37 minggu	tidak
543	Ny. A	Tidak KPD	35 thn	2	38 minggu	tidak
544	Ny. K	Tidak KPD	22 thn	1	39 minggu	tidak
545	Ny. D	Tidak KPD	20 thn	0	32 minggu	ya
546	Ny. H	Tidak KPD	19 thn	0	38 minggu	tidak
547	Ny. M	Tidak KPD	36 thn	1	39 minggu	tidak
548	Ny. I	Tidak KPD	33 thn	0	41 minggu	tidak
549	Ny. B	Tidak KPD	23 thn	1	39 minggu	tidak
550	Ny. V	Tidak KPD	28 thn	0	37 minggu	tidak
551	Ny. A	Tidak KPD	32 thn	2	39 minggu	tidak
552	Ny. U	Tidak KPD	35 thn	3	37 minggu	tidak
553	Ny. N	Tidak KPD	29 thn	1	39 minggu	tidak
554	Ny. S	Tidak KPD	22 thn	0	39 minggu	tidak
555	Ny. N	Tidak KPD	16 thn	0	37 minggu	tidak
556	Ny. S	Tidak KPD	23 thn	0	35 minggu	ya
557	Ny. R	Tidak KPD	34 thn	4	37 minggu	tidak
558	Ny. I	Tidak KPD	28 thn	1	36 minggu	tidak
559	Ny. R	Tidak KPD	25 thn	1	38 minggu	tidak
560	Ny. E	Tidak KPD	17 thn	0	38 minggu	tidak
561	Ny. I	Tidak KPD	37 thn	0	39 minggu	tidak
562	Ny. R	Tidak KPD	27 thn	6	28 minggu	tidak
563	Ny. S	Tidak KPD	35 thn	3	37 minggu	tidak
564	Ny. H	Tidak KPD	21 thn	0	38 minggu	tidak
565	Ny. S	Tidak KPD	27 thn	0	39 minggu	tidak
566	Ny. I	Tidak KPD	29 thn	2	40 minggu	tidak
567	Ny. S	Tidak KPD	22 thn	1	41 minggu	tidak
568	Ny. N	Tidak KPD	19 thn	0	41 minggu	tidak
569	Ny. J	Tidak KPD	24 thn	1	35 minggu	tidak
570	Ny. I	Tidak KPD	20 thn	0	37 minggu	tidak
571	Ny. S	Tidak KPD	29 thn	1	34 minggu	ya
572	Ny. N	Tidak KPD	38 thn	3	38 minggu	tidak
573	Ny. R	Tidak KPD	18 thn	0	37 minggu	tidak
574	Ny. S	Tidak KPD	22 thn	0	39 minggu	tidak
575	Ny. S	Tidak KPD	26 thn	1	39 minggu	tidak
576	Ny. R	Tidak KPD	15 thn	0	37 minggu	tidak
577	Ny. D	Tidak KPD	20 thn	0	31 minggu	tidak
578	Ny. J	Tidak KPD	32 thn	2	40 minggu	tidak
579	Ny. M	Tidak KPD	33 thn	4	38 minggu	tidak
580	Ny. D	Tidak KPD	25 thn	1	39 minggu	tidak
581	Ny. R	Tidak KPD	20 thn	0	38 minggu	tidak
582	Ny. U	Tidak KPD	33 thn	2	41 minggu	tidak
583	Ny. I	Tidak KPD	34 thn	1	40 minggu	tidak
584	Ny. C	Tidak KPD	36 thn	1	41 minggu	tidak
585	Ny. A	Tidak KPD	20 thn	0	35 minggu	ya
586	Ny. M	Tidak KPD	22 thn	1	33 minggu	tidak
587	Ny. N	Tidak KPD	26 thn	0	37 minggu	ya
588	Ny. H	Tidak KPD	29 thn	0	39 minggu	tidak
589	Ny. R	Tidak KPD	38 thn	5	39 minggu	tidak
590	Ny. F	Tidak KPD	27 thn	1	37 minggu	tidak
591	Ny. J	Tidak KPD	30 thn	0	36 minggu	tidak
592	Ny. R	Tidak KPD	31 thn	0	41 minggu	tidak
593	Ny. E	Tidak KPD	28 thn	1	38 minggu	tidak
594	Ny. R	Tidak KPD	34 thn	2	40 minggu	tidak
595	Ny. K	Tidak KPD	20 thn	0	41 minggu	tidak

596	Ny. I	Tidak KPD	24 thn	2	39 minggu	tidak
597	Ny. F	Tidak KPD	16 thn	0	41 minggu	tidak
598	Ny. S	Tidak KPD	21 thn	0	39 minggu	tidak
599	Ny. M	Tidak KPD	24 thn	1	41 minggu	tidak
600	Ny. F	Tidak KPD	27 thn	0	38 minggu	tidak
601	Ny. E	Tidak KPD	25 thn	1	38 minggu	tidak
602	Ny. S	Tidak KPD	35 thn	4	39 minggu	tidak
603	Ny. R	Tidak KPD	18 thn	0	39 minggu	tidak
604	Ny. N	Tidak KPD	17 thn	0	39 minggu	tidak
605	Ny. S	Tidak KPD	26 thn	1	34 minggu	tidak
606	Ny. N	Tidak KPD	22 thn	0	37 minggu	tidak
607	Ny. M	Tidak KPD	28 thn	3	37 minggu	tidak
608	Ny. N	Tidak KPD	19 thn	0	37 minggu	tidak
609	Ny. H	Tidak KPD	21 thn	0	30 minggu	tidak
610	Ny. I	Tidak KPD	22 thn	0	38 minggu	tidak
611	Ny. T	Tidak KPD	33 thn	1	37 minggu	tidak
612	Ny. S	Tidak KPD	26 thn	1	39 minggu	tidak
613	Ny. F	Tidak KPD	20 thn	0	39 minggu	tidak
614	Ny. I	Tidak KPD	38 thn	4	41 minggu	tidak
615	Ny. H	Tidak KPD	29 thn	1	40 minggu	tidak
616	Ny. A	Tidak KPD	26 thn	1	33 minggu	tidak
617	Ny. A	Tidak KPD	38 thn	4	39 minggu	tidak
618	Ny. J	Tidak KPD	30 thn	2	37 minggu	tidak
619	Ny. N	Tidak KPD	33 thn	1	38 minggu	tidak
620	Ny. H	Tidak KPD	32 thn	1	38 minggu	tidak
621	Ny. S	Tidak KPD	20 thn	0	35 minggu	tidak
622	Ny. H	Tidak KPD	24 thn	0	38 minggu	tidak
623	Ny. Y	Tidak KPD	29 thn	1	39 minggu	tidak
624	Ny. F	Tidak KPD	30 thn	3	38 minggu	tidak
625	Ny. I	Tidak KPD	22 thn	0	33 minggu	tidak
626	Ny. R	Tidak KPD	19 thn	0	38 minggu	tidak
627	Ny. H	Tidak KPD	20 thn	0	39 minggu	tidak
628	Ny. H	Tidak KPD	28 thn	1	38 minggu	tidak
629	Ny. F	Tidak KPD	35 thn	2	28 minggu	ya
630	Ny. A	Tidak KPD	29 thn	1	39 minggu	tidak
631	Ny. F	Tidak KPD	22 thn	0	37 minggu	tidak
632	Ny. S	Tidak KPD	29 thn	1	36 minggu	tidak
633	Ny. I	Tidak KPD	23 thn	1	33 minggu	tidak
634	Ny. S	Tidak KPD	30 thn	1	28 minggu	tidak
635	Ny. Y	Tidak KPD	36 thn	5	38 minggu	tidak
636	Ny. H	Tidak KPD	34 thn	2	35 minggu	tidak
637	Ny. U	Tidak KPD	23 thn	0	38 minggu	tidak
638	Ny. M	Tidak KPD	27 thn	0	35 minggu	tidak
639	Ny. F	Tidak KPD	35 thn	3	34 minggu	tidak
640	Ny. H	Tidak KPD	21 thn	1	38 minggu	tidak
641	Ny. H	Tidak KPD	36 thn	0	37 minggu	ya
642	Ny. W	Tidak KPD	25 thn	1	39 minggu	tidak
643	Ny. E	Tidak KPD	22 thn	0	39 minggu	tidak
644	Ny. E	Tidak KPD	29 thn	3	41 minggu	tidak
645	Ny. S	Tidak KPD	16 thn	0	40 minggu	tidak
646	Ny. S	Tidak KPD	20 thn	0	38 minggu	ya
647	Ny. R	Tidak KPD	37 thn	1	39 minggu	tidak
648	Ny. N	Tidak KPD	27 thn	1	38 minggu	tidak
649	Ny. F	Tidak KPD	26 thn	2	37 minggu	tidak
650	Ny. A	Tidak KPD	24 thn	1	35 minggu	tidak

651	Ny. F	Tidak KPD	29 thn	0	37 minggu	tidak
652	Ny. R	Tidak KPD	30 thn	1	34 minggu	tidak
653	Ny. G	Tidak KPD	31 thn	4	38 minggu	tidak
654	Ny. H	Tidak KPD	33 thn	1	37 minggu	tidak
655	Ny. G	Tidak KPD	28 thn	1	28 minggu	tidak
656	Ny. R	Tidak KPD	19 thn	0	40 minggu	tidak
657	Ny. N	Tidak KPD	28 thn	0	39 minggu	tidak
658	Ny. I	Tidak KPD	25 thn	2	40 minggu	ya
659	Ny. N	Tidak KPD	30 thn	4	37 minggu	tidak
660	Ny. H	Tidak KPD	20 thn	0	39 minggu	tidak
661	Ny. S	Tidak KPD	31 thn	0	40 minggu	tidak
662	Ny. R	Tidak KPD	33 thn	1	36 minggu	tidak
663	Ny. S	Tidak KPD	26 thn	0	37 minggu	tidak
664	Ny. T	Tidak KPD	25 thn	3	37 minggu	ya
665	Ny. G	Tidak KPD	27 thn	1	39 minggu	tidak
666	Ny. M	Tidak KPD	17 thn	0	40 minggu	tidak
667	Ny. I	Tidak KPD	28 thn	1	37 minggu	tidak
668	Ny. M	Tidak KPD	30 thn	1	38 minggu	tidak
669	Ny. A	Tidak KPD	35 thn	6	40 minggu	tidak
670	Ny. M	Tidak KPD	22 thn	1	39 minggu	tidak
671	Ny. H	Tidak KPD	16 thn	0	40 minggu	tidak
672	Ny. I	Tidak KPD	30 thn	1	32 minggu	tidak
673	Ny. A	Tidak KPD	32 thn	1	33 minggu	tidak
674	Ny. S	Tidak KPD	30 thn	4	40 minggu	tidak
675	Ny. S	Tidak KPD	27 thn	3	40 minggu	tidak
676	Ny. F	Tidak KPD	36 thn	6	39 minggu	tidak
677	Ny. E	Tidak KPD	37 thn	1	39 minggu	tidak
678	Ny. B	Tidak KPD	20 thn	0	40 minggu	tidak
679	Ny. C	Tidak KPD	32 thn	1	37 minggu	tidak
680	Ny. E	Tidak KPD	22 thn	1	29 minggu	tidak
681	Ny. A	Tidak KPD	29 thn	2	40 minggu	tidak
682	Ny. I	Tidak KPD	29 thn	1	29 minggu	tidak
683	Ny. S	Tidak KPD	35 thn	1	30 minggu	tidak
684	Ny. N	Tidak KPD	26 thn	0	38 minggu	tidak
685	Ny. A	Tidak KPD	30 thn	1	39 minggu	tidak
686	Ny. L	Tidak KPD	24 thn	0	40 minggu	tidak
687	Ny. R	Tidak KPD	22 thn	0	37 minggu	tidak
688	Ny. N	Tidak KPD	25 thn	1	40 minggu	ya
689	Ny. I	Tidak KPD	18 thn	0	33 minggu	tidak
690	Ny. E	Tidak KPD	27 thn	2	39 minggu	tidak
691	Ny. I	Tidak KPD	26 thn	1	40 minggu	tidak
692	Ny. I	Tidak KPD	29 thn	1	39 minggu	tidak
693	Ny. N	Tidak KPD	30 thn	1	37 minggu	tidak
694	Ny. A	Tidak KPD	34 thn	0	40 minggu	tidak
695	Ny. F	Tidak KPD	31 thn	1	37 minggu	tidak
696	Ny. I	Tidak KPD	33 thn	4	35 minggu	tidak
697	Ny. L	Tidak KPD	36 thn	3	38 minggu	ya
698	Ny. T	Tidak KPD	37 thn	0	40 minggu	tidak
699	Ny. A	Tidak KPD	27 thn	0	37 minggu	tidak
700	Ny. I	Tidak KPD	24 thn	0	38 minggu	tidak
701	Ny. E	Tidak KPD	34 thn	1	37 minggu	tidak
702	Ny. S	Tidak KPD	22 thn	4	29 minggu	tidak
703	Ny. I	Tidak KPD	31 thn	1	40 minggu	tidak
704	Ny. A	Tidak KPD	26 thn	1	28 minggu	tidak
705	Ny. F	Tidak KPD	32 thn	0	39 minggu	tidak

706	Ny. R	Tidak KPD	25 thn	0	38 minggu	tidak
707	Ny. G	Tidak KPD	29 thn	0	29 minggu	tidak
708	Ny. H	Tidak KPD	30 thn	3	37 minggu	tidak
709	Ny. G	Tidak KPD	27 thn	2	37 minggu	tidak
710	Ny. I	Tidak KPD	40 thn	1	40 minggu	tidak
711	Ny. H	Tidak KPD	23 thn	0	39 minggu	tidak
712	Ny. E	Tidak KPD	31 thn	0	38 minggu	tidak
713	Ny. T	Tidak KPD	24 thn	0	33 minggu	tidak
714	Ny. M	Tidak KPD	24 thn	4	39 minggu	tidak
715	Ny. M	Tidak KPD	27 thn	1	38 minggu	ya
716	Ny. V	Tidak KPD	29 thn	0	40 minggu	tidak
717	Ny. S	Tidak KPD	30 thn	1	37 minggu	tidak
718	Ny. W	Tidak KPD	28 thn	1	37 minggu	tidak
719	Ny. H	Tidak KPD	19 thn	2	40 minggu	tidak
720	Ny. R	Tidak KPD	40 thn	0	39 minggu	tidak
721	Ny. A	Tidak KPD	25 thn	0	37 minggu	tidak
722	Ny. N	Tidak KPD	19 thn	1	36 minggu	tidak
723	Ny. S	Tidak KPD	29 thn	2	35 minggu	tidak
724	Ny. N	Tidak KPD	30 thn	2	39 minggu	tidak
725	Ny. B	Tidak KPD	24 thn	1	30 minggu	ya
726	Ny. S	Tidak KPD	37 thn	4	41 minggu	tidak
727	Ny. M	Tidak KPD	26 thn	1	36 minggu	tidak
728	Ny. R	Tidak KPD	19 thn	1	37 minggu	tidak
729	Ny. E	Tidak KPD	19 thn	1	40 minggu	tidak
730	Ny. D	Tidak KPD	23 thn	0	39 minggu	tidak
731	Ny. A	Tidak KPD	25 thn	1	38 minggu	tidak
732	Ny. R	Tidak KPD	29 thn	0	37 minggu	tidak
733	Ny. R	Tidak KPD	24 thn	5	37 minggu	tidak
734	Ny. A	Tidak KPD	26 thn	0	38 minggu	tidak
735	Ny. I	Tidak KPD	40 thn	0	38 minggu	ya
736	Ny. S	Tidak KPD	28 thn	0	37 minggu	tidak
737	Ny. A	Tidak KPD	27 thn	1	38 minggu	tidak
738	Ny. F	Tidak KPD	30 thn	0	35 minggu	tidak
739	Ny. M	Tidak KPD	24 thn	1	37 minggu	tidak
740	Ny. S	Tidak KPD	19 thn	1	38 minggu	tidak
741	Ny. A	Tidak KPD	24 thn	0	38 minggu	tidak
742	Ny. S	Tidak KPD	23 thn	3	28 minggu	ya
743	Ny. H	Tidak KPD	22 thn	1	35 minggu	tidak
744	Ny. N	Tidak KPD	27 thn	1	39 minggu	tidak
745	Ny. S	Tidak KPD	18 thn	0	39 minggu	tidak
746	Ny. J	Tidak KPD	37 thn	2	37 minggu	tidak
747	Ny. S	Tidak KPD	27 thn	0	40 minggu	tidak
748	Ny. P	Tidak KPD	24 thn	1	39 minggu	tidak
749	Ny. U	Tidak KPD	31 thn	0	39 minggu	tidak
750	Ny. D	Tidak KPD	24 thn	1	32 minggu	tidak
751	Ny. D	Tidak KPD	18 thn	1	29 minggu	tidak
752	Ny. M	Tidak KPD	24 thn	1	37 minggu	tidak
753	Ny. J	Tidak KPD	23 thn	1	30 minggu	tidak
754	Ny. S	Tidak KPD	25 thn	0	40 minggu	tidak
755	Ny. S	Tidak KPD	24 thn	0	38 minggu	tidak
756	Ny. R	Tidak KPD	26 thn	2	33 minggu	tidak
757	Ny. N	Tidak KPD	26 thn	1	37 minggu	tidak
758	Ny. F	Tidak KPD	36 thn	3	39 minggu	ya
759	Ny. A	Tidak KPD	37 thn	0	37 minggu	tidak
760	Ny. F	Tidak KPD	20 thn	1	40 minggu	tidak

761	Ny. R	Tidak KPD	23 thn	1	37 minggu	tidak
762	Ny. G	Tidak KPD	30 thn	0	40 minggu	tidak
763	Ny. H	Tidak KPD	29 thn	3	37 minggu	tidak
764	Ny. G	Tidak KPD	35 thn	5	37 minggu	tidak
765	Ny. I	Tidak KPD	34 thn	0	39 minggu	tidak
766	Ny. H	Tidak KPD	23 thn	1	40 minggu	tidak
767	Ny. W	Tidak KPD	15 thn	1	38 minggu	tidak
768	Ny. J	Tidak KPD	39 thn	0	37 minggu	tidak
769	Ny. Y	Tidak KPD	30 thn	2	32 minggu	tidak
770	Ny. N	Tidak KPD	27 thn	1	37 minggu	tidak
771	Ny. L	Tidak KPD	28 thn	0	40 minggu	tidak
772	Ny. S	Tidak KPD	35 thn	0	39 minggu	tidak
773	Ny. F	Tidak KPD	23 thn	1	38 minggu	tidak
774	Ny. A	Tidak KPD	32 thn	0	39 minggu	tidak
775	Ny. S	Tidak KPD	21 thn	4	40 minggu	tidak
776	Ny. Y	Tidak KPD	37 thn	1	28 minggu	tidak
777	Ny. H	Tidak KPD	32 thn	0	38 minggu	ya
778	Ny. U	Tidak KPD	24 thn	1	40 minggu	tidak
779	Ny. M	Tidak KPD	27 thn	1	39 minggu	tidak
780	Ny. F	Tidak KPD	35 thn	0	26 minggu	tidak
781	Ny. H	Tidak KPD	30 thn	3	40 minggu	tidak
782	Ny. H	Tidak KPD	31 thn	5	37 minggu	tidak
783	Ny. W	Tidak KPD	36 thn	0	39 minggu	tidak
784	Ny. E	Tidak KPD	21 thn	0	37 minggu	tidak
785	Ny. A	Tidak KPD	25 thn	1	37 minggu	tidak
786	Ny. Y	Tidak KPD	23 thn	0	40 minggu	tidak
787	Ny. D	Tidak KPD	15 thn	0	40 minggu	tidak
788	Ny. E	Tidak KPD	23 thn	1	39 minggu	tidak
789	Ny. S	Tidak KPD	17 thn	0	37 minggu	tidak
790	Ny. N	Tidak KPD	30 thn	1	36 minggu	tidak
791	Ny. S	Tidak KPD	38 thn	0	38 minggu	tidak
792	Ny. N	Tidak KPD	25 thn	1	39 minggu	tidak
793	Ny. S	Tidak KPD	32 thn	0	40 minggu	tidak
794	Ny. A	Tidak KPD	30 thn	0	38 minggu	tidak
795	Ny. N	Tidak KPD	24 thn	1	35 minggu	tidak
796	Ny. R	Tidak KPD	35 thn	0	41 minggu	tidak
797	Ny. T	Tidak KPD	26 thn	1	36 minggu	tidak
798	Ny. I	Tidak KPD	29 thn	1	37 minggu	tidak
799	Ny. D	Tidak KPD	21 thn	0	40 minggu	tidak
800	Ny. I	Tidak KPD	19 thn	0	39 minggu	ya
801	Ny. A	Tidak KPD	38 thn	0	38 minggu	tidak
802	Ny. I	Tidak KPD	22 thn	0	37 minggu	tidak
803	Ny. F	Tidak KPD	29 thn	1	37 minggu	tidak
804	Ny. A	Tidak KPD	30 thn	2	38 minggu	tidak
805	Ny. S	Tidak KPD	25 thn	1	38 minggu	tidak
806	Ny. U	Tidak KPD	33 thn	0	37 minggu	tidak
807	Ny. R	Tidak KPD	20 thn	1	38 minggu	tidak
808	Ny. S	Tidak KPD	31 thn	3	35 minggu	tidak
809	Ny. I	Tidak KPD	34 thn	2	40 minggu	tidak
810	Ny. N	Tidak KPD	26 thn	2	38 minggu	ya
811	Ny. M	Tidak KPD	24 thn	1	37 minggu	tidak
812	Ny. H	Tidak KPD	36 thn	1	37 minggu	tidak
813	Ny. I	Tidak KPD	40 thn	1	39 minggu	tidak
814	Ny. H	Tidak KPD	33 thn	4	40 minggu	tidak
815	Ny. A	Tidak KPD	40 thn	6	41 minggu	ya
816	Ny. N	Tidak KPD	38 thn	0	37 minggu	tidak
817	Ny. I	Tidak KPD	35 thn	7	38 minggu	tidak
818	Ny. M	Tidak KPD	40 thn	1	40 minggu	tidak
819	Ny. K	Tidak KPD	20 thn	0	32 minggu	tidak
820	Ny. S	Tidak KPD	29 thn	0	40 minggu	tidak
821	Ny. A	Tidak KPD	33 thn	1	38 minggu	tidak
822	Ny. H	Tidak KPD	20 thn	0	37 minggu	tidak

LAMPIRAN III

Analisis Univariat

KPD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	412	50.1	50.1	50.1
Tidak	410	49.9	49.9	100.0
Total	822	100.0	100.0	

Usia Ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Usia <20 dan >35 tahun	204	24.8	24.8	24.8
Usia 20-35 tahun	618	75.2	75.2	100.0
Total	822	100.0	100.0	

Paritas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Nullipara	203	24.7	24.7	24.7
Multipara	619	75.3	75.3	100.0
Total	822	100.0	100.0	

Usia Kehamilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid preterm	134	16.3	16.3	16.3
aterm	688	83.7	83.7	100.0
Total	822	100.0	100.0	

Riwayat Penyakit Infeksi Urogenitalia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	92	11.2	11.2	11.2
tidak	730	88.8	88.8	100.0
Total	822	100.0	100.0	

Analisis Chi-Square

1. Usia Ibu

KPD * Usia Ibu

		usia ibu		Total
		Usia <20 dan >35 tahun	Usia 20-35 tahun	
KPD	Ya	114	298	412
	Tidak	90	320	410
Total		204	618	822

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.602 ^a	1	.058		
Continuity Correction ^b	3.302	1	.069		
Likelihood Ratio	3.609	1	.057		
Fisher's Exact Test				.063	.035
Linear-by-Linear Association	3.597	1	.058		
N of Valid Cases	822				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 101.75.

b. Computed only for a 2x2 table

M A K A S S A R

2. Paritas

KPD * Paritas

		Paritas		Total
		nullipara	multipara	
KPD	Ya	101	311	412
	Tidak	102	308	410
Total		203	619	822

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.015 ^a	1	.904	.936	.484
Continuity Correction ^b	.002	1	.968		
Likelihood Ratio	.015	1	.904		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.015	1	.904		
N of Valid Cases	822				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 101.25.

b. Computed only for a 2x2 table

3. Usia Kehamilan

KPD * Usia Kehamilan

		usia kehamilan		Total
		preterm	aterm	
KPD	Ya	85	325	410
	Tidak	49	363	685
Total		134	688	822

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11.766 ^a	1	.001		
Continuity Correction ^b	11.127	1	.001		
Likelihood Ratio	11.887	1	.001		
Fisher's Exact Test				.001	.000
Linear-by-Linear Association	11.751	1	.001		
N of Valid Cases	822				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 66.84.

b. Computed only for a 2x2 table

4. Riwayat Penyakit Infeksi Urogenitalia

KPD * Riwayat Penyakit Infeksi Urogenitalia

		Riwayat Penyakit Infeksi Urogenitalia		Total
		ya	tidak	
KPD	Ya	64	348	412
	Tidak	28	382	410
Total		92	730	822

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15.666 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	14.802	1	.000		
Likelihood Ratio	16.050	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	15.647	1	.000		
N of Valid Cases	822				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45.89.

b. Computed only for a 2x2 table

LAMPIRAN IV



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Andi Ayu Novitasari
2. NIM : 70600117047
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Tempat/Tanggal Lahir : Tampangeng/ 30 November 1997
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin
8. Orang Tua
 - a. Ayah : H. Andi Muhammad Yusuf
 - b. Ibu : Hj. Andi Tenri Ako

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 9 Sitampae
2. SMP : SMPN 1 Sengkang
3. SMA : SMAN 3 Sengkang

Tahun 2017 melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.