

UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI HASIL FRAKSINASI DAUN BOBOAN

(*Cleome rutidospermae* D.C) TERHADAP BEBERAPA BAKTERI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:

AYU ASHARI
NIM. 70100114005

JURUSAN FARMASI

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2018


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Ashari
Nim : 70100114005
Tempat/Tgl.Lahir : Dadeko/ 17 Juli 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Tamalate II, Tidung VII, Setapak 8/167
Judul : Uji aktivitas antibakteri hasil fraksinasi daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) terhadap beberapa bakteri

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2018
Penyusun,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
AYU ASHARI
NIM: 70100114005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Uji Aktivitas Antibakteri Hasil Fraksinasi Daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) Terhadap Beberapa Bakteri”** yang disusun oleh **Ayu Ashari**, NIM: **70100114005**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 16 November 2018 M yang bertepatan dengan 8 Rabi’ul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 16 November 2018 M
8 Rabi’ul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing I	: Muh. Fjtrah, S.Si., M.Farm., Apt	(.....)
Pembimbing II	: Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt	(.....)
Penguji I	: Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Nurcahri Abbas, Lc, MA	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc.

NIP. 19530203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, shalawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia kearah yang lebih beradap dan manusiawi.

Skripsi dengan judul “Uji aktivitas antibakteri hasil fraksinasi daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) terhadap beberapa bakteri” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Sembah sujud kupersembahkan skripsi ini terkhusus kepada kedua orang tua, Ayahanda Awaluddin dan Ibunda Alm.Nurhani. Terkhusus juga untuk orang tuaku saat ini Ayahanda Sudirman S dan Ibunda Nurhayati. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasehat, kesabaran, dukungan sepenuhnya, baik berupa materi, semangat, dan doa restu di setiap langkah ini, yang tak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kiranya amanah yang diberikan kepada penulis tidak tersia-siakan. Terima kasih juga penulis berikan kepada keluarga besar yang memberikan kasih sayang dan perhatian yang senantiasa memberikan restu dan do'anya kepada penulis sehingga penulis dapat sampai menyelesaikan tahap

penyelesaian pendidikan sampai disini. Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababasari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Rektor Wakil I, Bapak Prof. H. Lombasultan, M.A., selaku wakil Rektor II, Ibu Prof. Siti Aisyah, M.A.,Ph.D., selaku Wakil Rektor III, Bapak Prof. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D, selaku wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku wakil Dekan I (Bidang Akademik), Ibu Dr. A. Susilawaty, S.Km., M.Kes., selaku wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan), Bapak Dr. Mukhtar Luthfi, M.Pd., selaku wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Haeria, S.Si., M.Si., Apt, selaku Ketua jurusan dan Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt, selaku Sekertaris jurusan Farmasi Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Bapak Muh. Fitrah, S.Si., M.Farm., Apt, selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan serta meluagkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan waktu luangnya untuk mengarahkan serta mengoreksi hal-hal yang

perlu dikoreksi dalam penulisan skripsi ini, yang sangat banyak memberi saran dan arahan selama penelitian,

8. Ibu Afrisusnawati Rauf,S.Si.,M.Si., Apt, selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberi arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Hj. Haniah, Lc.MA, selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
11. Para Laboran Farmasi UIN Alauddin Makassar Kak Azwar Nazir, S.Farm., Apt yang selalu sabar membimbing dan memberikan saran, Kak Sukri, S.Farm., Apt yang telah memberikan arahan dalam penelitian penulis.
12. Terima kasih Kakanda Andini Mulya Lestari, S.Farm dan kakanda Ayu Setiawati Irwan, S.Farm, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Keluarga GALENICA 2014, yang selama empat tahun terakhir telah mengukir banyak cerita, kisah yang tak akan habis untuk dikenang, tawa bersama, senang selalu, dukungan, nasehat, kebersamaan, kepedulian. Kalian luar biasa.
14. Teman-teman penelitianku di Lab. Biologi Farmasi dan Lab Mikrobiologi Farmasi A.Ayu lestari, Hajratul Aswad, Sri Ayu Ningsih. Dan terkhusus teman seperjuanganku Hartina Anggriani, kerjasama yang sangat baik selama penelitian dan penyusunan tugas akhir.
15. Sahabat setia penulis “BS”, Irmayani, Nadya Fazry, Mutia Fitri Amaidah, Andi Sri Muniati, Eka Trisnawati, Hasniar, Nurul Izzah, Jumasni telah menjadi saksi

Perjuangan dalam penelitian dan penyusunan skripsi, setia memberi curahan rohani, Motivasi, dukungan dan kasih sayangnya tiap hari kepada penulis, mereka penasehat paling ampuh. Terima kasih Sahabat Regobies, dan teman-teman selama KKN angkatan 57 Kab. Luwu, Kec.Ponrang selatan, Terkhusus teman posko Desa Bakti.

16. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, semoga Allah SWT senantiasa memberi imbalan pahala yang berlipat ganda.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini mendapat ridha dari Allah SWT dan memberi manfaat bagi masyarakat. *Aamiin ya Rabbil aalamin.*

Samata-Gowa, November 2018

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1. Defenisi Operasional.....	4
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
Bab II Tinjauan Teoritis	9
A. Uraian Tanaman.....	9
1. Klasifikasi	9
2. Morfologi Tanaman	9

B. Uraian Mikroba Uji.....	10
1. <i>Escherichia coli</i>	10
2. <i>Staphylococcus aureus</i>	11
3. <i>Streptococcus mutans</i>	11
4. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	12
C. Uraian Umum Antimikroba.....	13
1. Defenisi Antimikroba.....	13
2. Pembagian Antimikroba	13
3. Sifat Antimikroba.....	14
4. Prinsip Kerja Antimikroba.....	15
5. Metode Pengujian Antimikroba.....	16
D. Metode Sterilisasi	19
1. Pengertian	20
2. Cara-Cara Sterilisasi	20
E. Ekstraksi	21
1. Pengertian	21
2. Jenis-Jenis Ekstraksi	21
F. Fraksinasi	24
G. Metode Pemisahan Kromatografi Lapis Tipis.....	26
H. Kromatografi Kolom	28
I. KLT-Bioautografi	29
J. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Menjadi Obat	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Lokasi	36


1. Jenis Penelitian.....	36
2. Lokasi Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	36
1. Populasi Penelitian.....	36
2. Sampel Penelitian.....	36
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Instrumen Penelitian.....	37
1. Alat	37
2. Bahan.....	37
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data	38
1. Penyiapan Sampel	38
2. Ekstraksi Sampel.....	38
3. Sterilisasi Alat.....	39
4. Penyiapan Mikroba uji	39
5. Pembuatan Suspensi Kultur Mikroba Uji	40
6. Pengujian Skrining Antibakteri.....	40
7. Kromatografi Lapis Tipis.....	40
8. Fraksinasi Ekstrak Aktif Dengan Kromatografi Kolom	41
9. Pengujian Aktivitas Fraksi Aktif dan Uji Antibakteri Secara KLT- Bioautografi.....	42
10. Identifikasi Komponen Kimia.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil penelitian.....	44

1. Hasil Ekstraksi Daun Boboan	44
2. Hasil Pengujian Skrining Antibakteri	45
3. Hasil Identifikasi Kromatografi Lapis Tipis	46
4. Hasil Fraksi Ekstrak Etanol Melalui Kromatografi Kolom	47
5. Hasil Pengujian Skrining Aktivitas Hasil Fraksinasi	47
6. Hasil Uji KLT-Bioautografi Dan Identifikasi Senyawa	50
B. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian.....	58
KEPUSTAKAAN	59
LAMPIRAN.....	61
RIWAYAT HIDUP.....	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Ekstraksi Daun Boboan (<i>Cleome ruidospermae</i> D.C)	41
2. Hasil Skrining Aktivitas Antibakteri ekstrak Daun Boboan	42
3. Hasil Identifikasi KLT	43
4. Hasil Fraksinasi Ekstrak Etanol melalui Kromatografi Kolom	44
5. Hasil pengujian Aktivitas Hasil Fraksinasi	45
6. Hasil Uji KLT Bioautografi dan Identifikasi senyawa kimia	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tumbuhan Boboan	71
2. Preparasi Sampel	71
3. Uji Pendahuluan	71
4. Proses Ekstraksi	73
5. Hasil Uji Skrining aktivitas anktibakteri daun boboan	74
6. Hasil Identifikasi Profil KLT Ekstrak Etanol daun Boboan	75
7. Proses Kromatografi Kolom	76
8. Hasil Penggabungan Hasil Fraksinasi	76
9. Hasil Uji Fraksinasi Aktivitas Antibakteri Daun Boboan	78
10. Hasil Uji Klt-Bioautografi Fraksi Aktif Daun Boboan	81
11. Identifikasi Senyawa Fraksi Aktif	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Alur Penelitian.....	60
2. Skema Kerja Ekstraksi	61
3. Skema Kerja Pengujian Skrining aktivitas Antibakteri	
a. Penyiapan Larutan Sampel Uji	62
b. Skrining Aktivitas Antibakteri Ekstrak	63
4. Skema Kerja Fraksinasi Sampel	64
5. Skema Uji Aktivitas Hasil Fraksinasi	65
6. Skema Uji KLT-Bioautografi	66
7. Identifikasi Senyawa Kimia	67
8. Perhitungan Rendamen	68
9. Perhitungan Konsentrasi dan pengenceran	68
10. Perhitungan Nilai Rf	69



ABSTRAK

Nama : Ayu Ashari

NIM : 70100114005

Judul :Aktivitas antibakteri hasil fraksinasi daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) terhadap beberapa bakteri

Daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) merupakan tanaman yang belum dibudidayakan resmi karena keberadaannya yang di alam liar dan belum banyak digunakan, sehingga sebagian masyarakat ada yang memanfaatkan sebagai obat herbal untuk mengobati pembengkakan, nyeri, dan merah pada mata. kemampuan daun boboan untuk menyembuhkan pada mata disebabkan karena adanya zat antibakteri sehingga diduga berkhasiat sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji potensi aktivitas daun boboan dari hasil ekstrak dan hasil fraksi sebagai antibakteri. Sampel di ekstraksi menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat, etanol 96%, dan refluks menggunakan air. Kemudian dilakukan uji penghambatan pertumbuhan bakteri dengan metode KLT-Bioautografi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Fraksi 6 ekstrak etanol memberikan hambatan yang baik pada konsentrasi 250 ppm, 500 ppm, dan 750 ppm pada bakteri *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas aeruginosa*, menunjukkan bahwa daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) mengandung senyawa aktif yang bersifat antibakteri, seperti Flavanoid, Alkaloid, dan Fenol.

Kata kunci : Daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C), Antibakteri, Bioautografi KLT



ABSTRACT

Name : Ayu Ashari

NIM : 70100114005

Thesis title : **Antibacterial Activity of Fractionation Results on Boboan Leaves**
(*Cleome rutidospermae* D.C)

Boboan Leaf (*Cleome rutidospermae* D.C) is an officially cultivated plant because of its presence in the wild and not yet widely used, so that some people use it as an herbal medicine to treat swelling, pain, and redness in the eyes. the ability of boboan leaves to heal in the eye is caused by the presence of antibacterial substances that are thought to have efficacy as antibacterial. This study aims to examine the potential of boboan leaf activity from the extract and the results of the fraction as antibacterial. The sample was extracted using n-hexane, ethyl acetate, 96% ethanol, and reflux using water. Then the bacterial growth inhibition was tested using the KLT-Bioautography method. The results obtained showed that the ethanol extract 6 fraction gave good resistance at concentrations of 250 ppm, 500 ppm, and 750 ppm in *Escherichia coli* bacteria, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas aeruginosa*, indicating that Boboan leaves (*Cleome rutidospermae* D.C) contain active compounds antibacterial, such as Flavanoids, Alkaloids and Phenol.

Keywords : Boboan leaf (*Cleome rutidospermae* D.C), antibacterial, KLT Bioautography



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia akhir-akhir ini meningkat, bahkan beberapa bahan alam telah diproduksi secara pabrikasi dalam skala besar. Penggunaan obat tradisional dinilai memiliki efek samping yang lebih kecil dibandingkan dengan obat yang berasal dari bahan kimia, di samping itu harganya lebih terjangkau. Selain itu, keuntungan lain penggunaan obat tradisional adalah bahan bakunya mudah diperoleh dan harganya yang relatif murah (Putri, 2010).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati di dunia. Wilayah hutan tropika Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi ke-2 di dunia setelah Brazil. Sebanyak 40.000 jenis flora yang ada di dunia, terdapat 30.000 jenis dapat dijumpai di Indonesia dan 940 jenis diantaranya diketahui berkhasiat sebagai obat dan telah dipergunakan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun oleh berbagai etnis di Indonesia. Jumlah tumbuhan obat tersebut sekitar 90% dari jumlah tumbuhan obat yang terdapat dikawasan Asia (Maryati, 2010).

Bakteri patogen merupakan bakteri yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan penyakit pada manusia. Bakteri patogen dapat dihambat pertumbuhannya atau dibunuh dengan proses fisik (misalnya dengan pemanasan) atau bahan kimia (misalnya dengan antibiotika). Tetapi antibiotika beberapa tahun lalu dinyatakan berhasil dalam mengatasi penyebaran bakteri patogen. Permasalahan yang sedang dihadapi, penggunaan antibiotik dengan dosis dan waktu terapi yang tidak

tepat dapat menimbulkan resistensi bakteri (Liana, 2013).

Pengendalian bakteri patogen penting dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, serta membasmi bakteri patogen pada inang yang terinfeksi. Bakteri patogen merupakan bakteri yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan penyakit pada manusia. Bakteri patogen dapat dihambat pertumbuhannya atau dibunuh dengan proses fisik (misalnya dengan pemanasan) atau bahan kimia (misalnya dengan antibiotika) (Djide, 2008).

Dalam islam, pengobatan dengan menggunakan bahan alam terutama tumbuh-tumbuhan telah lama dikenal. Allah swt. tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Semua yang diciptakan Allah SWT di muka bumi ini mempunyai manfaat masing-masing tidak terkecuali tumbuh-tumbuhan. Selain sebagai bahan pangan, tumbuh-tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Asy-Syu'ara/26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”.

(Kementerian Agama, 2014).

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt. Senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an mengandung suatu zat/obat yang digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit, meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah swt. di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu.

Untuk menggali dan meningkatkan potensi tumbuh-tumbuhan sebagai obat dan sumber bahan aktif biologis perlu dilakukan penelitian terhadap tumbuhan yang berkhasiat obat. Salah satu alternatif dalam mencari senyawa baru adalah dengan melakukan penelitian secara fitokimia yang sekaligus sebagai langkah awal untuk mengetahui kandungan aktif biologis yang berasal dari tumbuhan obat.

Daun dari tanaman ini belum dibudidayakan resmi karena keberadaannya yang di alam liar dan belum banyak digunakan, karena bentuk daunnya yang mirip tanaman liar lainnya sehingga masyarakat lokal pun jarang ada yang ingin mengkomsumsi daun tersebut. Pemanfaatannya juga belum optimal karena hanya beberapa masyarakat lokal saja yang mampu mengkomsumsi. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan uji Pendahuluan daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) sehingga daun tidak hanya digunakan sebagai beberapa khasiat saja tetapi juga dapat digunakan sebagai obat.

Berdasarkan hal tersebut menjadi sangat penting untuk mengetahui kandungan fitokimia beberapa jenis tumbuhan lokal yang masih sering dijadikan obat oleh masyarakat. Uji kandungan kimia dilakukan melalui analisis fitokimia secara kualitatif. Uji kandungan ini masih merupakan suatu metode pengujian awal dalam upaya untuk mengetahui kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam tumbuhan obat lokal yang berperan penting dalam penyembuhan penyakit.

Secara empiris, tanaman ini yang memiliki manfaat yang digunakan masyarakat dan berpotensi dalam menyembuhkan penyakit yaitu daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) yang dikenal telah dapat mengatasi pembengkakan, nyeri, dan merah pada mata.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian uji aktivitas

antibakteri terhadap daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aktivitas antibakteri hasil ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat, etanol 96%, dan ekstrak air daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) terhadap bakteri *Escherichia coli*, *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* ?
2. Bagaimana aktivitas antibakteri hasil fraksi daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) terhadap bakteri *Escherichia coli*, *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* ?
3. Golongan senyawa apakah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada hasil fraksi dari daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup

1. Definisi Operasional
 - a. Aktivitas antibakteri

Merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh ekstrak tumbuhan baik dari daun, korteks, biji, bunga, akar, umbi dan buah yang dapat menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri.
 - b. Ekstrak

Ekstrak adalah suatu bahan atau sediaan yang diperoleh dari hasil ekstraksi tanaman obat
 - c. Fraksinasi

Fraksinasi adalah suatu proses pemisahan senyawa-senyawa berdasarkan tingkat

kepolaran.

d. Fraksi

Fraksi adalah hasil pemisahan senyawa dari proses fraksinasi berdasarkan tingkat kepolaran. Sehingga, fraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fraksi-fraksi tumbuhan daun boboan yang telah terpisah berdasarkan tingkat kepolarannya.

e. Bioautografi

Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram.

f. Bakteri patogen

Bakteri patogen adalah kelompok bakteri parasit yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan.

2. Ruang Lingkup penelitian

Penelitian ini menentukan daya hambat fraksi dari ekstrak daun Boboan (*Cleome rutidospermae*) terhadap beberapa bakteri.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya.

1. Berdasarkan jurnal skripsi Anisah dkk tahun 2014, yang berjudul Aktivitas antibakteri ekstrak rimpang Jeringau (*Acorus calamus* L.) terhadap pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*, dalam penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi aktivitas antibakteri *Acorus calamus* L untuk menghambat pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Etanol dan air yang digunakan sebagai pelarut untuk mengestrak rimpang jeringau ini. Metode yang digunakan untuk menguji kinerja aktivitas

antibakteri adalah kertas metode difusi disk 25%, 50%, 75% dan 100% v/v (ml/ml). Kontrol positif adalah cloramphenicol, dan control negative adalah aquades. Hasil uji fitokimia pada masing-masing ekstrak menunjukkan bahwa ekstrak rimpang jeringau mengandung beberapa golongan senyawa metabolit sekunder. Hasil pengujian menunjukkan bahwa masing-masing ekstrak memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri, Hasil pengukuran menunjukkan bahwa ekstrak etanol memiliki aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri lebih besar dibandingkan ekstrak air.

2. Berdasarkan Jurnal Wildan,dkk tahun 2015, dengan judul Identifikasi Senyawa Aktif Antibakteri dengan Metode Bioautografi KLT Terhadap Ekstrak Etanol Tangkai Daun Talas (*Colocasia Esculenta* (L.) Schott), dalam penelitian ini telah dilakukan ekstraksi dalam bentuk metode Maserasi dengan Fraksinasi menggunakan metode ekstraksi cair-cair dengan pelarut n-heksan, etil asetat, dan air. Dalam proses ekstraksi dilakukan dengan dua metode yaitu maserasi dan refluks. Pada hasil aktivitas antibakteri pada ekstrak menghasilkan zona hambat pada konsentrasi terendah yang diujikan pada 0,5% sebesar 1,37 cm dan hasil pada uji fraksinasi menunjukkan zona hambat pada semua konsentasi pada fraksi etil asetat yang bersifat semipolar. Kemudian fraksinat dengan zona hambat paling tinggi dilakukan pemantauan KLT, Hasil pemantauan KLT dilakukan pengujian aktivitas Antibakteri dengan metode Bioautografi KLT dengan selanjutnya menentukan karakterisasi bercak dengan penampak bercak $AlCl_3$.
3. Berdasarkan jurnal Silvia, dkk tahun 2017, dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pacar Kuku (*Lawsonia inermis* Linn) pada

Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*. Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode difusi cakram. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan mengukur zona hambat yang dihasilkan ekstrak etanol daun pacar kuku dengan 4 variasi konsentrasi 25%, 50%, 750%, dan 100%. Dalam uji aktivitas antibakteri memerlukan metode petri dish. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil ekstrak etanol daun pacar kuku memiliki daya hambat terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, pada konsentrasi 100% zona hambat paling besar yaitu 21,6 mm dengan kategori sangat kuat.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui aktivitas antibakteri hasil ekstrak daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) terhadap bakteri *Escherichia coli*, *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*.
- b. Mengetahui aktivitas antibakteri hasil fraksi daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) terhadap bakteri *Escherichia coli*, *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*.
- c. Mengetahui golongan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada hasil fraksi dari daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C).

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah informasi bagi masyarakat tentang pemanfaatan dan pengolahan khasiat penggunaan daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) sebagai alternatif untuk menghambat pertumbuhan bakteri.
- b. Memberikan data ilmiah mengenai aktivitas ekstrak dan fraksi daun

Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) terhadap aktivitas antibakteri sebagai salah satu alternatif pengobatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Tumbuhan Daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C)*

1. *Klasifikasi*

Berdasarkan determinasi tanaman yang dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas Negeri Makassar di dapatkan klasifikasi dari tanaman Boboan (*Cleome rutidospermae D.C*) adalah sebagai Berikut.

Kingdom : plantae
Divisi : Spermatophyta
Subdivisi : Angiospermae
Class : Dicotyledonae
Ordo : Capparidales
Family : Capparidaceae
Genus : Cleome
Spesies : *Cleome rutidospermae D.C*



2. *Nama Daerah*

Daun Boboan (*Cleome rutidospermae D.C*) dikenal di Indonesia dan negara lain dengan nama yang berbeda. Di Bulukumba khususnya, spesies ini dikenal dengan nama yang berbeda. Di Bulukumba khususnya, spesies ini dikenal dengan nama Sigerru. Beberapa daerah lain misalnya, memiliki nama tersendiri, Maman ungu atau Maman lelaki (Jawa).

3. *Morfologi*

Herba tegak, merambat atau tumbuh merangkak tinggi 0,15-0,80 m, daun

mahkota bunga dengan ujung runcing seperti cakar, panjang 9-12 mm; di Gowa berwarna keunguan; bulu-bulu halus yang pendek; tangkai buah 20-30 mm; helaian daun biasanya 3, bentuk daun memanjang atau bulat memanjang, tajam atau tumpul, dengan bulu-bulu tebal pendek; batang 0,5-2 cm dengan duri tipis.

4. *Habitat dan penyebaran*

Ditemukan di pinggir jalan, sawah, ladang. Juga ditemukan hidup sebagai epifit pada batu dan kayu, dan tempat-tempat lainnya.

B. *Uraian Mikroba Uji*

1. *Escherichia coli*

a. Klasifikasi (Garrity, 2004)

Domain : Bacteria
 Filum : Proteobacteria
 Kelas : Gammaproteobacteria
 Bangsa : Enterobacteriales
 Suku : Enterobacteriaceae
 Marga : Escherichia
 Jenis : *Escherichia coli*

b. Sifat dan morfologi

Escherichia coli adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus, 1,1-1,5 μm x 2,0-6,0 μm , motil dengan flagellum peritrikum atau non motil. Tumbuh dengan mudah pada medium nutrient sederhana. Laktosa difermentasi oleh sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas, ada pula yang tidak memfermentasi glukosa dan maltose. Dapat ditemukan dalam usus mamalia dan tumbuh optimal pada suhu 37°C (Pelczar, 2008).

2. *Staphylococcus aureus*

a. Klasifikasi (Garrity, 2004)

Domain : Bacteria
Filum : Firmicutes
Kelas : Bacilli
Bangsa : Bacillales
Suku : Staphylococcaceae
Marga : Staphylococcus
Jenis : *Staphylococcus aureus*

b. Sifat dan morfologi

Bakteri *Staphylococcus aureus* merupakan salah satu jenis peracunan makanan yang sering terjadi. Sel-sel *Staphylococcus aureus* berbentuk Gram positif tersusun dalam tandan khas. *Staphylococcus aureus* dapat tumbuh baik pada kondisi aerobik tetapi umumnya tidak mampu bersaing dengan mikroba lain yang ada dalam makanan. Strain tertentu dari *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan penyakit yaitu yang menghasilkan enterotoksin. Suatu enterotoksin yang dihasilkan oleh strain bakteri dapat dibentuk satu atau lebih dari lima tipe antigenik yang berbeda dari enterotoksin tersebut. Umumnya penularan oleh *Staphylococcus aureus* tidak di dalam tubuh tetapi nampak dipermukaan tubuh, biasanya di dalam hidung dan bisul-bisul (Ali, 2005).

3. *Streptococcus mutans*

a. Klasifikasi (Garrity, 2004)

Domain : Bacteria
Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli
 Bangsa : Lactobacillales
 Suku : Streptococcaceae
 Marga : Streptococcus
 Jenis : *Streptococcus mutans*

b. Sifat dan morfologi

Streptococcus mutans termasuk bakteri Gram positif berbentuk bola sampai lonjong, berdiameter 0,5-1,5 μm , kolom bulat cembung dengan permukaan licin atau sedikit kasar dan tepi seluruhnya atau sebagian tidak beraturan. Koloni buram berwarna biru terang, bersifat fakultatif aerob, dapat tumbuh pada suhu 45°C dan suhu optimumnya. Dinding sel terdiri dari 4 komponen antigenik yaitu peptidoglikan, polisakarida, protein dan asam lipokoat (Pelczar. Michael J. and Chan.E.C.S 2008: 955).

4. *Pseudomonas aeruginosa*

a. Klasifikasi (Garrity, 2004 ; 24-95)

Domain : Bacteria
 Filum : proteobacteria
 Kelas : Gammaproteobacteria
 Bangsa : Pseudomonadaceae
 Suku : Pseudomonadaceae
 Marga : Pseudomonas
 Jenis : *Pseudomonas aeruginosa*

b. Sifat dan morfologi

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri gram negatif berbentuk sel

tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada umumnya berukuran 0,5 - 1,0 μm . Motil dengan flagelum polar, monotrikus atau multitrikus. Tidak menghasilkan selongsong prosteka. Tidak dikenal adanya stadium istirahat. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi, tidak pernah fermentatif. Beberapa merupakan kemolitotrof fakultatif, dapat menggunakan H_2 sebagai sumber energi. Oksigen molekuler merupakan penerima elektron universal, beberapa dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan nitrat sebagai penerima pilihan (Pelczar, Michael J. and Chan. E.C.S 2008: 952).

C. Uraian umum antimikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia, termasuk golongan ini yang akan dibicarakan yang berhubungan dengan bidang farmasi antara lain antibiotika, antiseptika, desinfektansia, preservatif (Djide, 2008: 339).

Obat-obatan yang digunakan untuk infeksi mikroorganisme yang penyebab infeksi pada manusia, hewan, maupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksik terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi tidak toksik terhadap jasad inang atau hospes (Djide, 2008).

1. Pembagian Antimikroba

Antimikroba berdasarkan spektrum atau kisaran kerja antimikroba dapat dibedakan menjadi:

- a. Spektrum sempit yaitu antimikroba yang hanya mampu menghambat satu golongan bakteri saja, contohnya hanya mampu membunuh atau menghambat bakteri dari Gram negatif saja atau Gram positif saja.
- b. Spektrum luas yaitu antimikroba yang dapat menghambat atau membunuh

bakteri baik gram negatif, maupun gram positif (Pratiwi, Sylvia T. 2008).

2. Sifat antimikroba

a. Bakteriostatik

Yaitu zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroba (bakteri). Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, tidak dapat lagi multiplikasi atau berkembang biak.

b. Bakteriosida

Yaitu zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau bahkan habis, tidak dapat lagi melakukan multiplikasi atau berkembang biak (Djide, M, Natsir & Sartini, 2008).

Obat-obat yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan maupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksik terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relative tidak toksik terhadap mikroorganisme jasad inang atau herpes (Djide, M.N, Sartini, 2008: 399).

3. Prinsip kerja Antimikroba

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, obatnya lebih toksis terhadap mikroorganisme daripada sel hospes. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau karena obat pada reaksi-reaksi biokimia penting dalam sel parasit lebih unggul dari pada pengaruhnya terhadap sel hospes. Disamping itu juga struktur sel mikroorganisme berbeda dengan struktur sel pada manusia (Djide M.N, 2008: 340).

Antimikroba mempunyai mekanisme kerja utama ada lima cara antara lain sebagai berikut:

1) Mengganggu metabolisme sel mikroba

Pada umumnya mikroba membutuhkan asam folat untuk kelangsungan hidupnya yang disintesis dari asam amino para benzoat (PABA) (Ganiswara, 2012).

Antimikroba bersifat sebagai antimetabolit dimana antimikroba bekerja memblokir terhadap metabolit spesifik mikroba, seperti sulfonamida. Sulfonamida menghambat pertumbuhan sel dengan menghambat sintesis asam folat oleh bakteri. Sulfonamida secara struktur mirip dengan asam folat, asam amino para benzoat (PABA), dan bekerja secara kompetitif untuk enzim-enzim yang langsung mempersatukan PABA dan sebagian tetrahidrofolat menjadi asam dihidrofolat (Djide, 2008).

2) Penghambatan terhadap sintesis dinding sel

Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan yaitu suatu kompleks polimer mukopeptida. Beberapa antibiotik seperti sikloserin menghambat reaksi paling dini dari proses sintesis dinding sel diikuti oleh basitrasin, vankomisin dan diakhiri oleh penisilin dan sefalosporin yang menghambat reaksi terakhir (transpeptidasi) (Ganiswara, 2012).

3) Penghambatan terhadap fungsi membran sel

Antimikroba bekerja secara langsung pada membran sel yang mempengaruhi permeabilitas dan menyebabkan keluarnya senyawa intraseluler mikroorganisme. Membran sel adalah lapisan di bawah dinding sel yang mempunyai sifat permeabilitas selektif dan berfungsi mengontrol keluar masuknya substansi dari dalam dan luar sel, serta memelihara tekanan osmotik internal dan ekskresi. Beberapa antibiotik bersatu dengan membran yang berfungsi sebagai ionophores yaitu senyawa

yang memberi jalan masuknya ion abnormal. Proses ini dapat mengganggu biokimia sel, misalnya gramicidin. Antibiotik polimiksin dapat merusak membran sel setelah bereaksi dengan fosfat pada fosfolipid membran sel. Polimiksin lebih aktif terhadap bakteri gram negatif (Djide, 2008).

4) Penghambatan terhadap sintesis protein

Hidupnya suatu sel tergantung pada terpeliharanya molekul-molekul dalam keadaan alamiah. Suatu kondisi atau substansi mengubah keadaan ini yaitu mendenaturasi protein dengan merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu tinggi atau konsentrasi beberapa zat dapat mengakibatkan koagulasi kerusakan total komponen seluler yang vital.

5) Penghambatan terhadap sintesis asam nukleat

Asam nukleat merupakan bagian yang sangat vital bagi perkembangbiakan sel. Untuk pertumbuhannya, kebanyakan sel tergantung pada sintesis DNA, sedangkan RNA diperlukan untuk transkripsi dan penentuan informasi sintesis protein dan enzim. Begitu pentingnya DNA dan RNA dalam proses kehidupan sel. Hal ini berarti bahwa gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan total pada sel. Dalam hal ini mempengaruhi metabolisme asam nukleat, seperti berikatan dengan enzim DNA dependen RNA-polymerase bakteri, memblokir helix DNA. Contohnya seperti antibiotik quinolon, pyrimethamin, sulfonamida, trimethoprim, dan trimetrexat, sedangkan metronidazole menghambat sintesis DNA (Djide, 2008 dan Pelczar, 2008).

4. Metode Pengujian Antimikroba

a. Metode difusi

Pada metode ini, penentuan aktivitas didasarkan pada kemampuan difusi dari

zat antimikroba dalam lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan mikroba uji. Hasil pengamatan yang akan diperoleh berupa ada atau tidaknya zona hambatan yang akan terbentuk di sekeliling zat antimikroba pada waktu tertentu masa inkubasi (Brooks dkk, 2007). Pada metode ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1) Cara Cakram (*Disc*)

Cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan untuk menentukan kepekaan kuman terhadap berbagai macam obat-obatan. Pada cara ini, digunakan suatu cakram kertas saring (*paper disc*) yang berfungsi sebagai tempat menampung zat antimikroba. Kertas saring tersebut kemudian diletakkan pada lempeng agar yang telah diinokulasi mikroba uji, kemudian diinkubasi pada waktu tertentu dan suhu tertentu, sesuai dengan kondisi optimum dari mikroba uji. Pada umumnya, hasil yang didapat bisa diamati setelah inkubasi selama 18-24 jam dengan suhu 37 oC. Hasil pengamatan yang diperoleh berupa ada atau tidaknya daerah bening yang terbentuk di sekeliling kertas cakram yang menunjukkan zona hambat pada pertumbuhan bakteri. Metode cakram disk atau cakram kertas ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus dan relatif murah, sedangkan kelemahannya adalah ukuran zona bening yang terbentuk tergantung oleh kondisi inkubasi, inokulum, predifusi dan preinkubasi serta ketebalan medium.

2) Cara Parit (*Ditch*)

Suatu lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji dibuat sebidang parit. Parit tersebut berisi zat antimikroba, kemudian diinkubasi pada waktu dan suhu optimum yang sesuai untuk mikroba uji. Hasil pengamatan akan

berupa ada tidaknya zona hambat yang akan terbentuk di sekitar parit.

3) Cara Sumuran (*hole/cup*)

Pada lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji dibuat suatu lubang yang selanjutnya diisi dengan zat antimikroba uji. Kemudian setiap lubang itu diisi dengan zat uji. Setelah diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai dengan mikroba uji, dilakukan pengamatan dengan melihat ada atau tidaknya zona hambatan di sekeliling lubang.

b. Metode dilusi

Pada metode ini dilakukan dengan mencampurkan zat antimikroba dan media agar, yang kemudian diinokulasikan dengan mikroba uji. Hasil pengamatan yang akan diperoleh berupa tumbuh atau tidaknya mikroba di dalam media. Aktivitas zat antimikroba ditentukan dengan melihat konsentrasi hambat minimum (KHM) yang merupakan konsentrasi terkecil dari zat antimikroba uji yang masih memberikan efek penghambatan terhadap pertumbuhan mikroba uji (Pratiwi, 2008). Metode ini terdiri atas dua cara, yaitu:

1) Pengenceran serial dalam tabung

Pengujian dilakukan dengan menggunakan sederetan tabung reaksi yang diisi dengan inokulum kuman dan larutan antibakteri dalam berbagai konsentrasi. Zat yang akan diuji aktivitas bakterinya diencerkan sesuai serial dalam media cair, kemudian diinokulasikan dengan kuman dan diinkubasi pada waktu dan suhu yang sesuai dengan mikroba uji. Aktivitas zat ditentukan sebagai kadar hambat minimal (KHM) (Pratiwi, 2008).

2) Penapisan lempeng agar

Zat antibakteri diencerkan dalam media agar dan kemudian dituangkan ke

dalam cawan petri. Setelah agar membeku, diinokulasikan kuman kemudian diinkubasi pada waktu dan suhu tertentu. Konsentrasi terendah dari larutan zat antibakteri yang masih memberikan hambatan terhadap pertumbuhan kuman ditetapkan sebagai konsentrasi hambat minimal (KHM) (Pratiwi, 2008).

c. Metode difusi dan dilusi

E-test atau biasa disebut juga *epsilometer* adalah metode tes dimana huruf (E) dalam nama *E-test* menunjukkan simbol *epsilon* (ϵ). *E-test* merupakan metode kuantitatif untuk uji antimikroba. Metode ini termasuk gabungan antara metode dilusi antibakteri dan metode difusi antibakteri ke dalam media. Metode ini dilakukan dengan menggunakan strip plastik yang sudah mengandung agen antibakteri dengan konsentrasi terendah sampai konsentrasi tertinggi diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme. Hambatan pertumbuhan mikroorganisme bias diamati dengan adanya area jernih di sekitar strip tersebut. *E-test* dapat digunakan untuk menentukan kadar hambat minimum (KHM) untuk bakteri seperti *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus -hemolitik*, *Neisseria gonorrhoeae* dan lain-lain. Dapat juga digunakan untuk bakteri gram negatif seperti *Pseudomonas sp* (Pratiwi, 2008).

D. Metode sterilisasi

1. Pengertian

Sterilisasi dalam mikrobiologi adalah proses penghilangan semua jenis organisme hidup, dalam hal ini adalah mikroorganisme (Protozoa, Fungi, *mycoplasma*, virus) yang terdapat di dalam suatu benda. Proses ini melibatkan aplikasi biocidal agent atau proses fisik dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme (Pratiwi, 2008;136).

2. Cara-cara sterilisasi

Pada prinsipnya sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu secara mekanik, fisik, dan kimiawi.

a. Sterilisasi secara mekanik (filtrasi) menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil (0,22 mikron atau 0,45 mikron) sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang tahan panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik.

b. sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran :

1) Pemanasan

a) Pemijaran (dengan api langsung) : membakar alat pada api secara langsung, contoh alat : jarum inokulum, pinset.

b) Panas kering : pada proses ini terjadi dehidrasi sel mikroorganisme, sterilisasi dengan oven kira-kira 160-180°C selama 1,5-2 jam dengan sistem udara yang statis. Sterilisasi panas kering cocok untuk alat yang terbuat dari kaca misalnya Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan petri.

c) Uap air panas : konsep ini mirip dengan mengukur. Air mendidih atau uap air pada suhu 100°C dapat membunuh bentuk vegetatif dari mikroorganisme dan virus dalam waktu 5 menit. Masih banyak spora bakteri yang tahan terhadap pemanasan ini dan masih tetap hidup setelah dilakukan perebusan selama beberapa jam.

d) Uap air panas bertekanan : menggunakan autoklaf pada suhu 121° selama 15 menit. Ini dilakukan untuk membunuh spora bakteri yang paling tahan panas. Cara ini dilakukan untuk mensterilkan alat-alat yang tidak tahan pemanasan seperti spuit.

2) Penyinaran dengan UV

Sinar Ultra Violet juga dapat digunakan untuk proses sterilisasi, misalnya untuk

membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior Safety cabinet dengan disinari lampu UV. Radiasi UV menyebabkan kesalahan dalam replikasi DNA dan mempunyai aktivitas mutagenik pada sel-sel yang masih hidup. Sinar Ultra Violet (UV) yang dipancarkan dari lampu uap merkuri sering digunakan untuk menyinari ruangan-ruangan tertentu, sehingga dapat mengurangi kontaminasi mikroorganisme di udara dalam ruang bedah di rumah sakit dan ruang pengolahan di pabrik-pabrik obat

b. Sterilisasi secara kimiawi

Biasanya menggunakan senyawa antiseptik dan desinfektan contohnya antara lain Alkohol dan formalin (Anonim, 2008 ;Djide,2008;190-194).

E. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi bau yang telah ditetapkan (Dirjen POM. 1995;10).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu (Dirjen POM, 2000).

Jenis-jenis ekstraksi:

a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan.

Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. Secara teknologi maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan atau kamar (Ditjen POM, 2000).

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit di ekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Agoes, 2007).

b. Sokletasi

Soxkletasi merupakan proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus soxklet sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik. Caranya, serbuk bahan ditempatkan pada selongsong dengan pembungkus kertas saring, lalu ditempatkan pada alat soxklet yang telah dipasang labu dibawahnya. Tambahkan pelarut sebanyak 12 kali sirkulasi. Pasang pendingin balik, panaskan labu, ekstraksi berlangsung minimal 3 kali jam dengan interval sirkulasi kira-kira 15 menit (Atun,2014).

Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas

labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih.

c. Destilasi uap

Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Seidel, 2006).

d. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Ditjen POM, 2000). Pada metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu.

e. Perkolasi

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran bagian bawahnya). Pelarut

ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Mukhriani, 2014).

F. *Fraksinasi*

Fraksinasi pada prinsipnya adalah proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Pelarut yang umumnya dipakai untuk fraksinasi adalah n-heksan, etil asetat, dan metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa non polar digunakan n-heksan, etil asetat untuk menarik senyawa semi polar, sedangkan metanol untuk menarik senyawa-senyawa polar. Dari proses ini dapat diduga sifat kepolaran dari senyawa yang akan dipisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa yang bersifat non polar akan larut dalam pelarut yang non polar sedangkan senyawa-senyawa yang bersifat polar akan larut dalam pelarut yang bersifat polar juga (Mutiasari, 2012).

Kromatografi vakum cair merupakan modifikasi dari kromatografi kolom gravitasi. Metode ini lebih banyak digunakan untuk fraksinasi sampel dalam jumlah besar (10-50 g). Kolom yang digunakan biasanya terbuat dari gelas dengan lapisan berpori pada bagian bawah. Ukuran kolom bervariasi tergantung ukurannya. Kolom disambungkan dengan penampung eluen yang dihubungkan dengan pompa vakum. Pompa vakum akan menghisap eluen dalam kolom, sehingga proses pemisahan berlangsung lebih cepat. Penggunaan tekanan dimaksudkan agar laju aliran eluen meningkat sehingga meminimalkan terjadinya proses difusi karena ukuran silika gel yang biasanya digunakan pada lapisan kromatografi KLT sebagai fasa diam dalam

kolom yang halus yaitu 200-400 mesh. Kolom yang digunakan berukuran lebih pendek dari pada kolom kromatografi gravitasi dengan diameter yang lebih besar (5-10 cm). Kolom KVC dikemas kering dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Sampel yang akan dipisahkan biasanya sudah diadsorbsikan ke dalam silika kasar terlebih dahulu (ukuran silika kasar 30-70 mesh) agar pemisahannya lebih teratur dan menghindari sampel langsung menerobos ke dinding kaca tanpa melewati adsorben terlebih dahulu, yang dapat berakibat gagalnya proses pemisahan. Pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penyerap yang sebelumnya sudah dimasukkan sampel. Kolom dihisap perlahan-lahan ke dalam kemasan dengan memvakumkannya. Kolom dielusi dengan campuran pelarut yang cocok, mulai dengan pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolaran ditingkatkan perlahan-lahan. Kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi, sehingga kromatografi vakum cair disebut juga kolom fraksinasi (Atun, 2014).

Kromatografi kolom merupakan salah satu contoh kromatografi adsorpsi. Senyawa yang dipisahkan dengan kromatografi kolom memiliki mekanisme yang sama dengan jenis kromatografi lain yaitu berkaitan dengan perbedaan gaya-gaya antarmolekul dalam sampel dengan fase gerak dan antara komponen dengan fasa diam. Prinsip kerja kromatografi kolom yaitu zat cair sebagai fasa gerak akan membawa cuplikan senyawa mengalir melalui fasa diam sehingga terjadi interaksi berupa adsorpsi senyawa-senyawa tersebut oleh padatan dalam kolom. Kecepatan bergerak suatu komponen dalam cuplikan tergantung pada seberapa besar/lama komponen tersebut tertahan oleh padatan penyerap dalam kolom. Hasil yang diperoleh berupa fraksi-fraksi senyawa (eluat) yang ditampung pada bagian bawah kolom (Rubiyanto, 2016).

G. Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik pemisahan komponen-komponen campuran suatu senyawa yang melibatkan partisi suatu senyawa diantara padatan penyerap (adsorbent, fase diam) yang dilapisi pada pelat kaca atau aluminium dengan suatu pelarut (fasa gerak) yang mengalir melewati adsorbent (padatan penyerap). Pengaliran pelarut dikenal sebagai proses pengembangan oleh pelarut (elusi). KLT mempunyai peranan penting dalam pemisahan senyawa organik maupun senyawa anorganik, karena relatif sederhana dan kecepatan analisisnya. Di dalam analisis dengan KLT, sampel dalam jumlah yang sangat kecil ditotolkan menggunakan pipa kapiler di atas permukaan pelat tipis fasa diam (adsorbent), kemudian pelat diletakkan dengan tegak dalam bejana pengembang yang berisi sedikit pelarut pengembang. Oleh aksi kapiler, pelarut mengembang naik sepanjang permukaan lapisan pelat dan membawa komponen-komponen yang terdapat pada sampel (Atun, 2014).

Fase diam seringkali disebut dengan penjerap atau adsorben. Untuk melakukan KLT kita perlu memahami 2 aspek yaitu fase diam tipe normal dan fase diam terbalik. Pertama, fase diam tipe normal. Fase diam yang banyak diandalkan digunakan adalah silika. Interaksi dasar yang terjadi adalah ikatan hidrogen. Untuk fase diam silika maka fase gerak harus dipilih antara kombinasi metanol-kloroform atau heksan-etilasetat. Kedua, fase diam terbalik (Saifudin, 2014).

KLT dapat digunakan jika :

1. Senyawa tidak menguap atau tingkat penguapannya rendah.
2. Senyawa bersifat polar, semi polar, non polar, atau ionik.
3. Sampel dalam jumlah banyak harus dianalisis secara simultan, hemat biaya, dan dalam jangka waktu tertentu.

4. Sampel yang akan dianalisis akan merusak kolom pada Kromatografi Cair (KC) ataupun Kromatografi Gas (KG).

5. Pelarut yang digunakan akan meng-ganggu penjerap dalam kolom Kromatografi Cair.

6. Senyawa dalam sampel yang akan dianalisis tidak dapat dideteksi dengan metode KC ataupun KG atau memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.

7. Setelah proses kromatografi, semua komponen dalam sampel perlu dideteksi (berkaitan dengan nilai R_f).

8. Komponen dari suatu campuran dari suatu senyawa akan dideteksi terpisah setelah pemisahan atau akan dideteksi dengan berbagai metode secara bergantian (misalnya pada *drug screening*).

9. tidak ada sumber listrik.

Pemilihan fase gerak yang tepat merupakan langkah yang sangat penting untuk keberhasilan analisis dengan KLT. Umumnya fasa gerak dalam KLT ditemukan dengan coba-coba dan jarang sekali yang didasarkan pada pengetahuan yang mendalam. Sifat-sifat pelarut pengembang juga merupakan faktor dominan dalam penentuan mobilitas komponen-komponen campuran. Umumnya kemampuan suatu pelarut pengembang untuk menggerakkan senyawa pada suatu adsorben berhubungan dengan polaritas pelarut (Atun, 2014).

Bercak pemisahan pada KLT umumnya merupakan bercak yang tidak berwarna. Berikut adalah cara-cara kimiawi untuk mendeteksi bercak (Rohman, 2007):

1. Menyemprot lempeng KLT dengan reagen kromogenik yang akan bereaksi secara kimia dengan seluruh solut yang mengandung gugus fungsional

tertentu sehingga bercak menjadi berwarna. Kadang-kadang lempeng dipanaskan terlebih dahulu untuk mempercepat reaksi pembentukan warna dan intensitas warna bercak.

2. Mengamati lempeng di bawah lampu UV 254 atau 366 untuk menampakkan solut sebagai bercak yang gelap atau bercak yang berfluoresensi terang pada dasar yang berfluoresensi seragam.
3. Menyemprot lempeng dengan asam sulfat pekat atau asam nitrat pekat lalu dipanaskan untuk mengoksidasi solut-solut organik yang akan nampak sebagai bercak hitam sampai kecoklat-coklatan.
4. Memaparkan lempeng dengan uap iodium dalam chamber tertutup
5. Melakukan scanning pada permukaan lempeng dengan sitometer, suatu instrumen yang dapat mengukur intensitas radiasi yang direfleksikan dari permukaan lempeng ketika disinari dengan lampu UV atau lampu sinar tampak.

Parameter pada KLT yang digunakan untuk identifikasi adalah nilai R_f (retention factor). Dua senyawa dikatakan identik jika mempunyai nilai R_f yang sama jika diukur pada kondisi KLT yang sama. Harga R_f ditentukan oleh jarak rambat senyawa dari titik awal dan jarak rambat fase gerak dari titik awal. Penentuan harga R_f adalah sebagai berikut:

$$R_f = \frac{\text{Jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik asal sampai noda yang terbentuk}}{\text{Jarak yang ditempuh oleh eluen dari titik asal sampai batas atas}}$$

(Rohman, 2007).

H. Kromatografi Kolom

Kromatografi adalah metode pemisahan dengan memanipulasi sifat fisik penyusun campuran dimana komponen-komponen yang dipisahkan di distribusikan

diantara dua fase, salah satu fase tersebut adalah suatu lapisan stasioner dengan permukaan yang luas, yang lainnya sebagai fase gerak atau mobile. Fase stasioner dalam kromatografi dapat berupa padatan maupun cairan, sedangkan fase gerak dapat berupa cairan maupun gas. Molekul yang terlarut dalam fase gerak, akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Molekul yang memiliki ikatan yang kuat dengan fase diam akan cenderung bergerak lebih lambat dibanding molekul yang berikatan lemah (Sastrohamidjojo, 2004).

Selama proses pengemasan, tabung dapat diketuk-ketuk pada semua sisi secara perlahan-lahan dengan sumbat karet atau bahan yang lunak agar diperoleh lapisan yang seragam. Kran dapat dibuka atau ditutup selama penambahan, namun tetap memperhatikan permukaan pelarut agar tetap merendam seluruh permukaan penjerap. Hal ini untuk mencegah masuknya udara dalam ruang antar partikel silika gel yang dapat menyebabkan gangguan pada proses isonasi.

I. KLT – Bioautografi

Bioautografi, berasal dari kata *bio* yang berarti makhluk hidup dan *autografi* berarti melakukan aktivitas sendiri. Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode ini memanfaatkan pengertian kromatografi lapis tipis (KLT). Pada bioautografi ini didasarkan atas efek biologi berupa antibakteri, antiprotozoa, antitumor, dan lain-lain dari substansi yang teliti. Ciri khas dari prosedur bioautografi adalah didasarkan pada metode difusi agar, dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan dari lapisan KLT ke medium agar yang telah diinokulasi dengan merata bakteri uji yang peka. Dari hasil inkubasi pada suhu dan waktu tertentu akan terlihat zona hambatan di sekeliling

dari spot dari KLT yang telah ditempelkan pada media agar. Zona hambat di tampilkan oleh aktivitas senyawa aktif yang terdapat di dalam bahan yang di periksa terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji (Djide,dkk. 2006: 299-302).

Metode bioautografi merupakan metode sederhana yang digunakan untuk menunjukkan adanya aktivitas antibakteri atau antikapang. Metode ini menggabungkan penggunaan teknik kromatografi lapis tipis dengan respon mikroorganisme yang diuji berdasarkan aktivitas biologi dari suatu analit yang dapat berupa antibakteri, antikapang, dan antiprotozoa. Bioautografi dapat digunakan untuk mencari antibakteri atau antikapang yang terkandung dalam suatu sampel tumbuhan atau tanaman, dan juga dengan metode ini kita dapat mendeteksi golongan senyawa.

KLT- Bioautografi dapat dibagi atas 3 kelompok yaitu :

a. Bioautografi Langsung

Prinsip kerja dari metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji peka dalam medium cair disemprotkan pada permukaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang telah dihilangkan sisa-sisa eluen yang menempel pada lempeng kromatografi. Setelah itu dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu.

b. Bioautografi kontak

Metode ini didasarkan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis (KLT) atau kromatografi kertas. Lempeng kromatografi tersebut ditempatkan diatas permukaan medium Nutrien Agar yang telah diinokulasikan dengan mikroorganisme yang sensitif terhadap senyawa antimikroba yang dianalisis. Setelah 15-30 menit, lempeng kromatografi tersebut dipindahkan diangkat dari permukaan medium. Senyawa antimikroba yang telah berdifusi dari lempeng kromatografi kedalam media agar dan akan menghambat pertumbuhan

bakteri setelah di inkubasi pada suhu dan waktu tertentu sampai noda yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme uji tampak pada permukaan membentuk zona yang jernih.

c. Bioautografi Pencelupan

Pada prakteknya metode ini dilakukan sebagai berikut yaitu bahwa lempeng kromatografi yang telah dielusi, diletakkan dalam cawan petri, sehingga permukaannya tertutup oleh medium agar yang berfungsi sebagai “base layer”. Setelah medium agar memadat, selanjutnya dituangkan medium yang telah disuspensikan mikroba uji yang berfungsi sebagai “seed layer”. Kemudian diinkubasi pada suhu dan waktu sesuai.

J. Tinjauan Islam Tentang Tumbuhan dalam Bidang Kesehatan

Allah SWT menciptakan manusia dan alam semesta bukanlah tanpa sebab, melainkan agar manusia dapat mengambil hikmah dan manfaat semaksimal mungkin dari alam semesta. Manfaat tersebut baik digunakan untuk dikonsumsi maupun sebagai pengobatan. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* yang menyatakan bahwa segala ciptaanNya dapat dimanfaatkan untuk manusia tertuang dalam QS. Al-An'am/6:99.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا
مُتْرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَبِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya.

Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.

(Kementerian Agama, 2014).

Berkenaan ayat diatas M.Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al- Misbah, menyatakan ayat tersebut terlebih dahulu menyebut tumbuh-tumbuhan kemudian menyebut empat jenis buah, yaitu kurma, anggur, zaitun dan delima. Selanjutnya dari keempat jenis buah, yang pertama disebut adalah kurma karena kurma dalam masyarakat Arab- dimana Al-Quran turun- merupakan makanan yang dapat menggantikan makanan pokok. Sesudah kurma, anggur karena ia merupakan buah istimewa dan dapat dimanfaatkan begitu muncul serta manfaatnya berlangsung terus-menerus. Zaitun adalah buah yang sangat banyak manfaatnya, darinya diperoleh minyak yang sangat jernih, disamping buahnya yang lezat. Terakhir adalah delima, satu buah yang sangat mengagumkan (Shihab. 2009).

Dialah yang menurunkan air hujan dari awan untuk menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Dia mengeluarkan buah-buahan segar dari bermacam tumbuhan dan berbagai jenis biji-bijian. Dari pucuk pohon korma, Dia mengeluarkan pelepah kering, mengandung buah yang mudah dipetik. Dengan air itu, Dia menumbuhkan berbagai macam kebun anggur, zaitun dan delima. Ada kebun-kebun yang serupa bentuk buahnya, tetapi berbeda rasa, aroma dan kegunaannya. Amatilah buah-buahan yang dihasilkannya, dengan penuh penghayatan dan semangat mencari pelajaran. Juga, amatilah proses kematangannya yang melalui beberapa fase. Sungguh, itu semua mengandung bukti yang nyata bagi orang-orang yang mencari, percaya dan tunduk kepada kebenaran.

Ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase, hingga sampai pada fase

kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau, terutama pada daun. Daun itu ibarat pabrik yang mengolah komposisi zat-zat tadi untuk didistribusikan ke bagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah. Lebih dari itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan..

Di dunia kedokteran ditemukan bahwa klorofil, ketika diasimilasi oleh tubuh manusia, bercampur dengan sel-sel manusia. Percampuran itu kemudian memberikan tenaga dan kekuatan melawan bermacam bakteri penyakit. Dengan demikian, ia berfungsi sebagai benteng pertahanan tubuh dari serangan segala macam penyakit. Di bagian akhir ayat ini disebutkan "*Unzhurû ilâ tsamarihi idzâ atsmara wa yan'ih*" (amatilah buah- buahan yang dihasilkannya). Perintah ini mendorong perkembangan Ilmu Tumbuh-tumbuhan (Botanik) yang sampai saat ini mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah *Subhanahu wa ta'ala* menciptakan langit dan bumi untuk menunjukkan kekuasaannya yang meliputi segala-galanya dan menunjukkan kepada makhluknya betapa banyak karunia yang telah Dia berikan dengan menjadikannya sebagai bekal dan persediaan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai obat, seperti daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) yang dimanfaatkan sebagai obat antibakteri alami yang dapat menghambat antibakteri yang ada dalam tubuh manusia. Dari beberapa penjelasan dapat menyadarkan kita betapa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya,

dapat menurunkan air hujan yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan makhluk hidup di bumi, menumbuhkan dan memperkembangbiakan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, terkhusus untuk bagian daun yang diistimewakan dalam surah Al an'am ayat 99 memiliki kandungan bermanfaat didalamnya yang dapat dimanfaatkan potensinya sebagai obat.

Agar pemanfaatan tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya diperlukan penelitian ilmiah yang bersumber dari bacaan-bacaan yang memiliki validitas yang tinggi. Perintah membaca pun tertuang dalam QS. Al-Alaq/96:1,

Terjemahnya :

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan”

(Kementerian Agama,2014).

Kata *iqra'* berasal dari kata *qara'a* yang pada mulanya berarti *menghimpun*. Hal ini berarti pula *menyampaikan, menelaah, membaca, memahami, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu*, dan sebagainya yang bermuara pada arti *menghimpun* (Shihab, 2009: 454). Penggalan ayat ini merupakan salah satu dari banyak ayat yang senantiasa menyeru manusia untuk mendalami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an sehingga menjadi acuan kehidupan termasuk dalam mengobati berbagai penyakit.

Allah SWT dalam segala kekuasaannya mampu menurunkan penyakit kepada hambaNya, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Atas keadilan dari Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada makhlukNya pula, Allah *subhanahuwa ta'ala* menurunkan obat sebagai penawar dari penyakit tersebut melalui Al-Qur'an. Al-

Qur'an merupakan obat yang paling sempurna untuk berbagai macam penyakit. Penyakit tidak akan sanggup menanggung kalamullah (Al- Qur'an) bagi orang-orang yang yakin dan memahami kandungan Al-Qur'an sebab dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat ketauhidan, puji-pujian, kesempurnaan tawakkal, segala kekuasaannya, dan permasalahan yang akhirnya berpulang hanya kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* serta berisikan permohonan kebahagiaan dunia dan akhirat, salah satunya kesembuhan dari penyakit. Dari uraian beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan kekuasaannya menurunkan penyakit kepada makhlukNya, dan atas kekuasaannya pula Allah *subhanahu wata'ala* yang menyembuhkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental laboratorium.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi, laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah lebih mendekati kearah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Eksperimental merupakan metode penelitian yang ingin mengetahui hubungan sebab-akibat antara suatu variabel dengan variabel lainnya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tumbuhan Boboan yang berada di Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan..

2. Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel dari bahan tanaman yaitu daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) yang telah kering.

D. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Arikanto,2006;150). Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi. Observasi merupakan suatu teknik cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap proses yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan dengan dua cara yaitu mengamati dan melakukan pencatatan hasil secara teliti dari gejala yang ada (Sukmadinata,2005;220).

E. Instrumen penelitian

1. Alat-alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoklaf, batang pengaduk, cawan petri, cawan porselin, chamber, eksikator, gelas erlenmeyer 250 ml, gelas kimia 250 ml, gelas ukur 5 ml, 10 ml, 50 ml, hotplat, inkubator, *Laminar Air Flow* (LAF), lampu spiritus, lampu UV 254 dan 366 nm, mikropipet 10-100 μ l, lemari pendingin, ose bulat, oven, penangas air, pipa kapiler, pipet tetes, rak tabung, rotavapor, spatula, seperangkat alat kromatografi kolom, spoit 10 ml, refluks, tabung reaksi, timbangan analitik, vial, vortex, waterbath, dan wadah maserasi.

2. Bahan-bahan yang digunakan

Bahan-bahan yang digunakan adalah aluminium foil, aquadest, biakan murni (*Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*), DMSO (Dimetil Sulfoksida), etanol 96%, etil asetat, HCl, H₂SO₄ 10%, lempeng silica gel GF₂₅₄, medium Nutrient Agar (NA), sampel daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C), N-heksan, Aluminium klorida, besi (III) klorida (FeCl₃), dragendorf, H₂SO₄, Liebermann-Burchard.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Penyiapan Sampel (Daun Boboan)

a. Pengambilan Sampel

Sampel daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) diperoleh di kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari.

b. Determinasi tanaman

Bagian tumbuhan secara keseluruhan diambil dan dibuat herbarium dilakukan di Divisi Botani di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar.

c. Pengolahan Sampel

Sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk memisahkan sampel dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Kemudian sampel dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan tanah atau pengotor lainnya yang melekat pada daun. Setelah itu sampel dirajang kecil-kecil, lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, terlindung dari sinar matahari kemudian diserbukkan hingga menjadi simplisia.

2. Ekstraksi Sampel

Sampel diekstraksi dengan pelarut n-heksan, etil asetat, dan etanol 96%. Sampel daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) yang telah kering dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan pelarut n-heksan hingga terendam seluruhnya. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam ditempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan n-heksan yang baru sebanyak yang digunakan. Hal ini dilakukan selama 3x24 jam. Filtrat n-

heksan yang diperoleh kemudin dikumpulkan dan diuapkan cairan penyarinya dengan rotary evaporator sampai diperoleh ekstrak n-heksan kental.

Dengan cara yang sama, ampas yang telah diperoleh dari proses ekstraksi pertama dimaserasi kembali dengan etil asetat dengan cara yang sama seperti n-heksan hingga diperoleh ekstrak etil asetat kental. Selanjutnya, dimaserasi kembali dengan pelarut etanol 96%. Filtrat etanol 96% yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyarinya dengan rotary evaporator sampai diperoleh ekstrak etanol 96% kental. Ampas dari maserat ketiga etanol direfluks dengan air. kemudian saring dan keringkan.

3. *Sterilisasi alat*

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan detergen, wadah mulut lebar dibersihkan dengan larutan detergen selama 15-30 menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCl 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik diudara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dengan gelas Erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan dalam oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat suntik seperti spoit yang tidak tahan dalam pemanasan tinggi, disterilkan pada autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum inokulasi atau ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

4. *Penyiapan mikroba uji*

Mikroba uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Escherichia coli*, *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeroginosa*. Mikroba yang berasal dari kultur koleksi Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar yang diremajakan dalam medium Nutrient Agar (NA) miring dan diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37⁰C.

5. *Pembuatan Suspensi Kultur Mikroba Uji*

Mikroba uji yang telah diremajakan dalam medium Nutrient Agar (NA) miring, kemudian disuspensikan dalam 10 ml larutan NaCl fisiologis (NaCl 0,9 %) kemudian diukur serapannya 25% T pada spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 580 nm.

6. *Pengujian Skrining aktivitas antibakteri*

a. Pembuatan larutan stok

Sebanyak 20 mg ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat, ekstrak etanol 96%, dan ekstrak air masing-masing dilarutkan dalam 0,2 ml DMSO, kemudian ditambahkan dengan 9,8 ml air steril hingga volume akhir 10 ml (2000ppm) kemudian dibuat dalam konsentrasi 250 ppm, 500 ppm, dan 750 ppm.

b. Uji aktivitas ekstrak

Sebanyak 20 µl mikroba uji ditambahkan 10 ml medium NA untuk bakteri. Campuran dibuat dalam botol coklat lalu dituangkan ke dalam cawan petri secara aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat. Sampel diteteskan diatas paper disk dengan konsentrasi 750 ppm, 500 ppm dan 250 ppm, kemudian diletakkan diatas medium yang telah diinokulasi bakteri kemudian diinkubasi pada suhu 37^oC selama 1 x 24 jam.

7. *Kromatografi Lapis Tipis*

a. Penjenuhan Chamber

Cairan pengelusi yang digunakan dimasukkan ke dalam chamber sebanyak 3 ml, kemudian diberi kertas saring. Kejenuhan chamber ditandai dengan naiknya cairan

pengelusi pada kertas saring hingga melewati kaca penutup.

b. Penotolan Sampel pada Lempeng

Ekstrak teraktif dari sampel ditotolkan pada lempeng bagian batas bawahnya. Lempeng dielusi dengan eluen dalam chamber, sampai cairan pengelusi mengelusi lempeng sampai batas atas. Lempeng dikeluarkan dan diangin-anginkan, lempeng siap untuk diamati penampakan nodanya.

c. Penampakan Noda pada Lampu UV 254 nm dan 366 nm.

Lempeng yang telah dielusi diamati penampakan noda yang terbentuk dibawah sinar lampu UV 254 nm dan 366 nm.

d. Penampakan Noda dengan serum sulfat

Setelah diamati di bawah lampu UV, lempeng disemprot dengan larutan serum sulfat, kemudian dipanaskan pada pemanas listrik.

8. *Fraksinasi ekstrak aktif dengan kromatografi kolom*

Ekstrak etanol ditimbang sebanyak 11 gram, kemudian difraksinasi dengan menggunakan kromatografi kolom. Kolom-kromatografi disiapkan dengan membuat bubuk silika yang dimasukkan ke dalam kolom kromatografi secara perlahan-lahan. Ekstrak dilarutkan dengan pelarutnya lalu dihomogenkan dengan selit kemudian dimasukkan ke dalam kolom. Kemudian dibuat fase gerak dengan gradin kepolaran yang semakin meningkat yaitu berturut-turut heksan : etil asetat {(9:1), (7:1), (6:1), (5:1), (3:1), (2:1), (1:1)}. Langkah pertama dilakukan dengan mengaliri kolom, pelarut yang menetes dari kolom ditampung dalam vial yang sebelumnya telah ditimbang dan diberi nomor. Penggantian gradient fase gerak dilakukan ketika fase gerak gradien sebelumnya telah habis digunakan untuk mengaliri kolom.

Fraksi-fraksi hasil pengoloman ditampung dan kemudian diuapkan. Seluruh fraksi yang diperoleh diidentifikasi dengan kromatografi lapis tipis (KLT) dengan eluen heksan : etil (2:1). Kemiripan bercak yang timbul pada lempeng dapat diamati baik secara langsung maupun dibawah sinar UV 254 nm dan UV 366 nm. Fraksi yang mempunyai kemiripan bercak dijadikan satu.

9. *Uji aktivitas Fraksi teraktif dan pengujian antibakteri secara KLT-Bioautografi*

a. Uji Aktivitas Fraksi Teraktif

Pengujian fraksi dengan cara menggunakan sebanyak 20 µl bakteri uji ditambahkan 10 ml medium Na untuk bakteri, lalu dituangkan kedalam cawan petri secara aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat. Penanaman bakteri dilakukan menggunakan paperdisk dengan konsentrasi 750 ppm, 500 ppm, dan 250 ppm kedalam medium yang sudah dibuat. Kemudian diinkubasi pada suhu 37⁰C selama 1x 24 jam, zona hambat terbentuk diukur diameternya. Fraksi yang paling banyak menghambat aktivitas antibakteri selanjutnya,dilanjutkan pada KLT Bioautografi.

b. Pengujian antibakteri secara KLT-Bioautografi

Sebanyak 20 µl mikroba uji ditambahkan 10 ml medium NA untuk bakteri. Lalu dituangkan ke dalam cawan petri secara aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat. Kromatogram hasil pemisahan senyawa secara KLT kemudian diletakkan di atas permukaan medium yang memadat. Setelah 30 menit lempeng (kromatogram) diangkat dan dikeluarkan dari medium. Selanjutnya diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37⁰C.

10. *Identifikasi bercak aktif dengan beberapa penampakan bercak*

Kromatogram disemprot dengan menggunakan pereaksi semprot sebagai berikut :

a. Alkaloid

Pereaksi yang digunakan yaitu Dragendorf, jika sampel positif mengandung alkaloid, maka timbul warna jingga dengan latar belakang kuning.

b. Steroid

Pereaksi yang digunakan yaitu Liebermann-Buchard sampel terlebih dahulu dipanaskan setelah disemprot pereaksi. Jika sampel positif mengandung steroid maka timbul noda berfluoresensi coklat atau biru menunjukkan senyawa triterpen. Kromatogram diamati pada lampu UV 254 dan 366.

c. Flavonoid

Pereaksi yang digunakan yaitu aluminium klorida. Diamati di lampu UV, jika sampel mengandung senyawa flavonoid maka noda akan berfluoresensi hijau.

d. Fenol

Pereaksi yang digunakan adalah Besi (III) klorida, jika sampel positif mengandung fenol akan dihasilkan warna hijau atau biru.

e. Kumin

Pereaksi yang digunakan adalah KOH etanolik, jika sampel positif mengandung senyawa kumin akan dihasilkan warna merah terang.

f. Penampak bercak H_2SO_4

Kromatogram disemprotkan pereaksi H_2SO_4 10% dipanaskan pada suhu $105^\circ C$ selama 5 menit dan diamati. Banyak senyawa organik memberi warna kuning, coklat, dan hitam .

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil ekstraksi Daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C)

Penelitian yang dilakukan menggunakan 600 gram simplisia daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) yang dimaserasi dengan menggunakan metode maserasi bertingkat dengan diperoleh ekstrak kering. Hasil ekstraksi yang diperoleh dengan pelarut n-heksan, etil asetat, etano 96%, dan air. Data dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil ekstraksi Daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C).

Sampel	Berat Sampel	Pelarut	Berat Ekstrak	% Rendamen
Daun Boboan	600 gram	N-heksan	7,05 gram	1,175
		Etil Asetat	7,9 gram	1,31
		Etanol 96%	38,4 gram	6,4
		Air	39,7 gram	6,61

2. Hasil pengujian aktivitas antibakteri

Pada pengujian aktivitas antibakteri ekstrak daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) dengan menggunakan ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat, ekstrak etanol 96%, dan ekstrak air terhadap bakteri *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas epidemidis*. Data dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil skrining aktivitas antibakteri ekstrak daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) terhadap bakteri uji.

Ekstrak	Bakteri	konsentrasi	Diameter 1 (cm)	Diameter 2 (cm)	Diameter 3 (cm)	Rata-rata
N-Heksan	EC	750 ppm	0,95	0,95	0,9	0,93
		500 ppm	0,89	0,91	0,89	0,89
		250 ppm	-	-	-	-
	SA	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SM	750 ppm	0,70	0,72	0,81	0,74
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	PA	750 ppm	0,91	0,90	0,85	0,90
		500 ppm	0,90	0,85	0,85	0,86
		250 ppm	0,80	0,75	0,81	0,78
Etil Asetat	EC	750 ppm	0,82	0,80	0,82	0,81
		500 ppm	0,80	0,75	0,81	0,78
		250 ppm	-	-	-	-
	SA	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SM	750 ppm	0,76	0,75	0,72	0,74
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	PA	750 ppm	0,81	0,82	0,82	0,81
		500 ppm	0,70	0,82	0,82	0,81
		250 ppm	-	-	-	-
Etanol	EC	750 ppm	0,78	0,77	0,74	0,76
		500 ppm	0,69	0,67	0,67	0,67
		250 ppm	-	-	-	-
	SA	750 ppm	0,82	0,81	0,85	0,82
		500 ppm	0,67	0,65	0,68	0,66
		250 ppm	-	-	-	-
	SM	750 ppm	0,91	0,84	0,82	0,85
		500 ppm	0,82	0,81	0,70	0,77
		250 ppm	0,75	0,75	0,77	0,75
	PA	750 ppm	0,82	0,80	0,82	0,813
		500 ppm	0,80	0,75	0,81	0,78
		250 ppm	-	-	-	-
EC	750 ppm	-	-	-	-	
	500 ppm	-	-	-	-	
	250 ppm	-	-	-	-	

Air	SA	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SM	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	PA	750 ppm	0,80	0,75	0,81	0,78
		500 ppm	0,75	0,75	0,74	0,74
		250 ppm	-	-	-	-

Keterangan : EC : *Escherichia coli*

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

SA : *Staphylococcus aureus*

SM : *Streptococcus mutans*

3. Identifikasi KLT

Tabel 3. Hasil identifikasi KLT ekstrak etanol daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C)

Ekstrak	UV 254 nm		UV 366 nm		perbandingan
	Noda	Rf	Noda	Rf	
Etanol 96%	1	0,09	1	0,09	Heksan : Etil 9 : 1
	2	0,18	2	0,18	
	3	0,27	3	0,27	
			4	0,45	

4. Hasil Fraksi Ekstrak Etanol melalui Kromatografi Kolom

Fraksinasi ekstrak etanol 96% daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) melalui kromatografi kolom menggunakan campuran perbandingan eluen hasil profil KLT yang telah diperoleh sebelumnya. Berdasarkan hasil kromatografi kolom, diperoleh 345 hasil fraksi dengan bobot berbeda-beda (lihat pada tabel 4), kemudian dielusi dengan campuran eluen Heksan : Etil sehingga diperoleh 7 gabungan fraksi yang sama melalui lampu UV 254 nm dan 366 nm.

Tabel 4. Hasil Fraksinasi daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C)

No.	Fraksi	Vial	Berat (gram)
1.	F1	1-101	328,9 mg
2.	F2	102-141	402,3 mg
3.	F3	142-192	133,8 mg
4.	F4	193-243	135,9 mg
5.	F5	244-263	234,7 mg
6.	F6	264-311	214,7 mg
7.	F7	312-345	60,1 mg

5. Pengujian Aktivitas Hasil Fraksinasi

Pengujian aktivitas antibakteri hasil fraksinasi dengan mengamati zona bening. Hasil fraksinasi dilakukan pengujian terhadap bakteri *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*. Diperoleh hasil bahwa dari hasil gabungan fraksi tersebut, fraksi yang memberikan aktivitas antibakteri yang paling baik dibandingkan dengan fraksi lain. dapat dilihat pada tabel.

Tabel 5. Hasil Skrining fraksinasi etanol 96% ekstrak Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C)) Terhadap Bakteri Uji.

Fraksi	Bakteri	konsentrasi	Diameter 1 (cm)	Diameter 2 (cm)	Diameter 3 (cm)	rata-rata
Fraksi 1	EC	750 ppm	1,12	1,12	1,22	1,15
		500 ppm	0,97	1,18	1,12	1,09
		250 ppm	-	-	-	-
	SA	750 ppm	0,93	1,21	1,13	1,09
		500 ppm	0,91	0,82	0,98	0,90
		250 ppm	0,91	1,12	0,92	0,98
	SM	750 ppm	0,83	0,91	0,89	0,88
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
			750 ppm	-	-	-

	PA	500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
Fraksi 2	EC	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SA	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SM	750 ppm	0,91	1,19	1,12	1,07
		500 ppm	1,12	1,78	1,18	1,36
		250 ppm	0,97	0,92	1,18	1,02
	PA	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
Fraksi 3	EC	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SA	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SM	750 ppm	0,97	0,87	0,72	0,85
		500 ppm	0,81	0,91	0,81	0,84
		250 ppm	0,71	0,87	0,72	0,76
	PA	750 ppm	1,19	0,91	1,24	1,11
		500 ppm	0,89	0,78	0,72	0,79
		250 ppm	-	-	-	-
Fraksi 4	EC	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SA	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SM	750 ppm	0,72	0,73	0,72	0,72
		500 ppm	0,81	0,81	0,82	0,81
		250 ppm	0,91	0,81	0,91	0,87
	PA	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	EC	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SA	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-

Fraksi 5	SM	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	PA	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
Fraksi 6	EC	750 ppm	2,31	2,18	2,17	2,22
		500 ppm	1,52	1,48	1,51	1,50
		250 ppm	1,19	1,18	1,12	1,16
	SA	750 ppm	1,71	1,61	1,73	1,68
		500 ppm	1,72	1,69	1,68	1,69
		250 ppm	0,93	1,19	1,19	1,10
	SM	750 ppm	1,78	1,61	1,71	1,7
		500 ppm	2,13	2,47	2,38	2,32
		250 ppm	1,22	1,37	1,18	1,25
	PA	750 ppm	0,82	0,72	0,98	0,84
		500 ppm	0,71	0,71	0,88	0,76
		250 ppm	0,87	0,71	0,72	0,76
Fraksi 7	EC	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SA	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SM	750 ppm	2,42	2,31	2,21	2,31
		500 ppm	2,21	1,91	2,12	2,08
		250 ppm	1,82	1,98	1,71	1,83
	PA	750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-

Keterangan :

EC : *Escherichia coli*

SA : *Staphylococcus aureus*

SM : *Streptococcus mutans*

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

6. Hasil uji KLT-Bioautografi dan Identifikasi Senyawa

Lempeng kromatografi Fraksi 6 kemudian diuji dengan KLT-Bioautografi kontak pada 4 bakteri uji (*Escherichia coli*, *Pseudomonas*

aeruginosa, *Staphylococcus aureus*, *streptococcus mutans*). Hasil pengujian menunjukkan Fraksi 6 mampu menghambat pertumbuhan dari empat jumlah bakteri yang ditandai dengan adanya zona hambat bening pada area sekitar noda pada lempeng yang diinokulasi pada medium. Fraksi paling efektif kemudian diidentifikasi komponen senyawanya menggunakan pereaksi warna semprot Lieberman Buchardat, Dragendorf, Besi (III) klorida, Aluminium klorida, dan penampak bercak H₂SO₄. Hasil dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil uji KLT-Bioautografi fraksi etanol 96% Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) terhadap bakteri uji.

Bakteri	Rf	Senyawa
<i>Escherichia coli</i>	0,21	(+) Fenol
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0,34	(+) Alkaloid
<i>Streptococcus mutans</i>	0,6	(+) Flavanoid
	0,34	(+) Alkaloid
<i>Staphylococcus aureus</i>	0,34	(+) Alkaloid
	0,21	(+) Fenol

B. Pembahasan

Antibakteri adalah suatu senyawa yang digunakan untuk menghambat bakteri. Antibakteri biasanya terdapat dalam suatu organisme sebagai metabolit sekunder. Mekanisme senyawa antibakteri secara umum dilakukan dengan cara merusak dinding sel, mengubah permeabilitas membran, mengganggu sintesis protein, dan menghambat kerja enzim (Pelczar dan Chan, 2008). Senyawa yang berperan dalam merusak dinding sel antara lain fenol, flavonoid, dan alkaloid.

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi bertingkat menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat, etanol, dan air. Prinsip dari metode maserasi adalah penyarian komponen zat aktif dari simplisia, dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan masuk ke rongga sel menembus dinding sel dan melarutkan zat aktif yang ada dalam sel. Karena

perbedaan konsentrasi zat aktif didalam dan di luar sel menyebabkan terjadinya difusi zat aktif yang ada dalam sel akan keluar sel. Demikian seterusnya sampai terjadi kesetimbangan (Ditjen POM,2000). Maserasi bertingkat ini bertujuan agar ekstrak yang didapatkan terpisah antara ekstrak polar, ekstrak semi polar dan ekstrak non polar. Setelah dimaserasi kemudian sampel di refluks. Adapun prinsip dari metode refluks yaitu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama dengan cairan penyari lalu dipanaskan, uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat, demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyarin sempurna, refluks dilakukan selama 3-4 jam (Ditjen POM, 2000).

Dari hasil maserasi yang dilakukan diperoleh ekstrak n-heksan sebanyak 7,05 gram, ekstrak etil asetat sebanyak 7,9 gram, ekstrak etanol 96% sebanyak 38,4 gram, dan ekstrak air sebanyak 39,7 gram (lihat pada tabel 1).

Pada tahap selanjutnya dilakukan uji skrining aktivitas antibakteri ekstrak n-heksan, etil asetat, dan ekstrak etanol 96% terhadap bakteri uji *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*. Pengujian skrining ini dilakukan untuk mengetahui ekstrak yang aktif sebagai inhibitor pada pertumbuhan bakteri dengan cara mengamati zona hambat bening disekitar paperdisk yang telah di tetesi 20 μ l sampel pada konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 750 ppm, 500 ppm, 250 ppm. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui ekstrak etanol 96% merupakan ekstrak paling aktif dimana mampu memberikan aktivitas penghambatan pertumbuhan terhadap keempat bakteri yang digunakan, sedangkan ekstrak n-heksan pada bakteri *Escherichia coli* hanya menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 750 ppm dan 500 ppm, bakteri *Streptococcus mutans* hanya menghambat pertumbuhan bakteri pada

konsentrasi 750 ppm, bakteri *Pseudomonas aeruginosa* menghambat ketiga konsentrasi yang digunakan, dan bakteri *Staphylococcus aureus* tidak menghambat pertumbuhan bakteri pada ketiga konsentrasi tersebut. Pada Ekstrak Etil asetat pada bakteri *Escherichia coli* dan *Pseudomonas aeruginosa* hanya menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 750 ppm dan 500 ppm, bakteri *Streptococcus mutans* hanya menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 750 ppm, bakteri dan bakteri *Staphylococcus aureus* tidak menghambat pertumbuhan bakteri pada ketiga konsentrasi tersebut. Dan Ekstrak Air hanya sebagian bakteri saja yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri yaitu pada bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dengan konsentrasi 750 ppm dan 500 ppm. (Lihat pada tabel 2.). Menurut septiani (2017), pemanfaatan etanol 96% sebagai pelarut pada ekstraksi senyawa bioaktif banyak dilakukan karena etanol baik untuk mengekstrak senyawa antibakteri tanin, alkaloid, steroid, terpenoid, fenol, dan flavanoid, karena etanol lebih mudah untuk menembus membran sel untuk mengekstrak bahan intraseluler dari bahan tumbuhan. Jadi, berdasarkan hasil dan literatur sesuai dengan pernyataan bahwa pelarut etanol 96% merupakan pelarut universal sehingga berbagai senyawa baik polar dan nonpolar yang terkandung pada daun Boboan dapat tertarik kedalam pelarut.

Selanjutnya pencarian eluen profil KLT ekstrak etanol 96%. Prinsip dari KLT yaitu perpindahan analit pada fase diam karena pengaruh fase gerak (Rohman,2007). Jika pada penampakan noda belum didapat atau jika posisi noda yang terlalu ke atas maka kepolaran eluen diturunkan atau jika posisi noda terlalu dibawah maka kepolaran eluen perlu ditingkatkan. Ekstrak ditotolkan pada lempeng, selanjutnya lempeng dielusi dalam chamber yang telah jenuh. Penjenuhan chamber ini dimaksudkan agar proses elusi dari eluen hanya berasal dari eluen dari dasar chamber dan bukan dari eluen yang menguap jika chamber

tidak jenuh. Setelah itu lempeng dimasukkan dalam chamber yang telah dijenuhkan.

Pada tahap selanjutnya, lempeng yang telah dielusi dikeluarkan dari chamber setelah itu dibiarkan sampai kering. Selanjutnya noda-noda pada lempeng diamati di bawah lampu UV 254 nm dan UV 366 nm, kemudian di semprot dengan serum sulfat dan dipanaskan di atas pemanas. Pada UV 254 nm, lempeng akan berfluoresensi sedangkan sampel akan tampak berwarna gelap. Penampakan noda pada lampu UV 254 nm adalah karena adanya daya interaksi antara sinar UV dengan indikator fluoresensi yang terdapat pada lempeng. Pada UV 366 nm noda akan berfluoresensi dan lempeng akan berwarna gelap. Penampakan noda pada lampu UV 366 nm adalah karena adanya daya interaksi antara sinar UV dengan gugus kromofor yang terikat oleh ausokrom yang ada pada noda tersebut. Sehingga noda yang tampak pada lampu UV366 terlihat terang karena silika gel yang digunakan tidak berfluoresensi pada sinar UV 366 nm. Sedangkan penampakan noda oleh serum sulfat adalah karena bersifat reduktor sehingga dapat memutuskan ikatan rangkap yang akan mengakibatkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih panjang sehingga dapat terlihat oleh mata.

Selanjutnya, hasil identifikasi KLT ekstrak etanol 96% pada daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C), dengan eluen heksan : etil (9:1) pada penampakan noda UV₂₅₄ nm diperoleh 3 noda dengan nilai Rf-nya yaitu 0,09; 0,18; dan 0,27; sedangkan pada UV₃₆₆ nm di peroleh 4 noda dengan perbandingan pengelusi heksan : etil (9:1), dan nilai Rf-nya yaitu 0,09; 0,18; 0,27; dan 0,45 (Lihat pada tabel 3). Menurut Hanani (2014), Nilai Rf dapat didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh pelarut dari titik asal. Oleh karena itu, bilangan Rf selalu lebih kecil dari 1,0. Harga Rf terletak antara 0,2-0,8 untuk memaksimalkan pemisahan. Jadi berdasarkan hasil nilai Rf yang diperoleh dengan literatur bahwa Nilai Rf

yang didapatkan pada hasil identifikasi KLT ekstrak etanol 96% daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) termasuk batas nilai Rf yang ditentukan yang selalu lebih kecil dari 1,0.

Setelah identifikasi KLT ekstrak daun Boboan (*Cleome rutidosperma* D.C) yaitu dilakukan Fraksinasi dengan menggunakan kromatografi kolom (KK). Ekstrak etanol 96% yang di fraksinasi yaitu 11 gram. Prinsip kerja kromatografi kolom perbedaan daya serap dari masing-masing komponen campuran yang akan diuji, dilarutkan dengan sedikit pelarut lalu dimasukkan lewat pucuk kolom dan dibiarkan mengalir. senyawa yang lebih polar akan terserap lebih kuat sehingga turun lebih lambat dari senyawa non polar yang terserap lebih lemah dan turun lebih cepat (Sastrohamidjojo,2014). Metode ini dipakai karena hasil partisi yang diperoleh sangat bagus, sebab elusi terjadi secara wajar tanpa ada tekanan dari alat lain serta waktu kontak antara eluen. Metode ini dilakukan menggunakan fase diam silika gel 60F₂₅₄ dan fase gerak dengan gradien kepolaran yang semakin meningkat yang berturut-turut heksan : etil {(9:1), (7:1), (6:1), (5:1), (3:1), (2:1), (1:1)}. Hasil fraksi tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode kromatografi lapis tipis (KLT).

Pada proses fraksinasi, berdasarkan hasil dari ekstrak daun boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) diperoleh sebanyak 345 fraksi yang kemudian di KLT dengan fase gerak heksan : etil (2 :1), sehingga pada Kromatogram fraksi yang memiliki bercak warna yang sama digabungkan dengan diperoleh 7 gabungan fraksi yang diperoleh dengan bobot yang berbeda-beda kemudian dilanjutkan dengan skrining aktivitas hasil dari fraksinasi untuk mendapatkan fraksi teraktif (lihat tabel 4).

Pada hasil penggabungan fraksi yang didapatkan yaitu 7 gabungan fraksi kemudian dilakukan skrining aktivitas hasil fraksinasi dengan tujuan mendapatkan

fraksi teraktif, dengan mengamati zona bening pada medium agar. Hasil pengamatan yang didapatkan bahwa pada pengujian aktivitas hasil dari fraksinasi bahwa Fraksi 6 yang menunjukkan bahwa memiliki daya hambat yang baik dengan mengamati hasil zona bening pada tiap penghambatan dari keempat bakteri yang telah diujikan. Berdasarkan hasil pengamatan, Pada Fraksi 1 pada bakteri *Escherichia coli* hanya menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 750 ppm dan 500 ppm, bakteri *Streptococcus mutans* hanya menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 750 ppm, bakteri *Pseudomonas aeruginosa* tidak menghambat ketiga konsentasi yang digunakan, dan bakteri *Staphylococcus aureus* menghambat pertumbuhan bakteri pada ketiga konsentrasi tersebut, Pada Fraksi 2 pada bakteri *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* *Pseudomonas aeruginosa* tidak menghambat ketiga konsentasi yang digunakan, dan bakteri *Streptococcus mutans* menghambat pertumbuhan bakteri pada ketiga konsentrasi tersebut, Pada Fraksi 3 pada bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* tidak menghambat ketiga konsentasi yang digunakan, bakteri *Pseudomonas aeruginosa* hanya menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 750 ppm, dan bakteri *Streptococcus mutans* menghambat ketiga konsentasi tersebut, Pada Pada Fraksi 4 pada bakteri *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan *Pseudomonas aeruginosa* tidak menghambat ketiga konsentasi yang digunakan, sedangkan bakteri *Streptococcus mutans* menghambat ketiga konsentasi tersebut, Pada Fraksi 5 tidak ada yang menghambat pertumbuhan keempat bakteri uji yang digunakan pada ketiga konsentrasi tersebut, Pada Pada Fraksi 7 pada bakteri *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan *Pseudomonas aeruginosa* tidak menghambat ketiga konsentasi yang digunakan, sedangkan bakteri *Streptococcus mutans* menghambat ketiga konsentasi tersebut. Menurut Elgayyar (2001), menyatakan bahwa aktivitas

antibakteri dikatakan kuat jika DDH (Diameter Daya Hambat) yang muncul disekitar cakram berukuran lebih dari 8 mm, sedang bila DDH 7-8 mm dan bila daerah hambatan kurang dari 7 mm diaanggap lemah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada fraksi 6 aktivitas antibakterinya kuat dan sedang (lihat pada tabel 5).

Pada hasil Fraksi teraktif yaitu Fraksi A yang terlebih dahulu di elusi bersamaan dengan 4 mikroba dan untuk 6 identifikasi senyawa, kemudian dilakukan tahap pengujian metode KLT-Bioautografi. Metode KLT-Bioautografi dilakukan untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Pada metode ini didasarkan pada difusi agar dimana senyawa antimikrobanya akan berdifusi dari lapisan lempeng kromatogram ke medium agar yang masing-masing telah diinokulasi dengan bakteri uji yang peka, bakteri *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*. Selanjutnya lempeng kromatografi tersebut diletakkan diatas permukaan medium agar yang telah memadat yang sebelumnya diinokulasi dengan bakteri sensitif terhadap senyawa antibakteri yang dianalisis, bagian ujung pada kromatogram yang telah dielusi dibengkokkan hingga garis batas bawah untuk memudahkan pada saat lempeng dikeluarkan. Setelah 15-30 menit, lempeng kromatografi diangkat dari permukaan medium kemudian diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°C. Berdasarkan hasil uji KLT-Bioautografi, fraksi 6 dapat menghambat bakteri yang digunakan dalam penelitian, hal ini ditandai dengan adanya zona bening pada permukaan medium agar dan mengandung senyawa Flavanoid, Fenol, dan Alkaloid (lihat pada tabel 6).

Profil KLT Fraksi 6 menggunakan eluen Heksan : Etil perbandingan (2:1) memberikan pemisahan senyawa yang tampak jelas terpisah dengan baik, setelah itu identifikasi komponen kimia dengan menggunakan pereaksi Aluminium

klorida untuk menunjukkan hasil senyawa Flavanoid, pereaksi Besi (III) klorida untuk menunjukkan senyawa Fenolik, pereaksi Dragendorf untuk menunjukkan hasil senyawa Alkaloid, pereaksi Liebermann-Burchard untuk menunjukkan hasil Steroid dan terpenoid, pereaksi KOH untuk menunjukkan hasil khumarin, pereaksi H₂SO₄ untuk menunjukkan hasil senyawa organik. Adapun hasil yang diperoleh dari pengujian KLT-Bioautografi untuk bakteri *Pseudomonas aeruginosa* mengandung senyawa Alkaloid dengan nilai Rf = 0,34; Bakteri *Streptococcus mutans* mengandung senyawa Flavanoid dan Alkaloid dengan nilai Rf= 0,6 dan Rf= 0,34, Bakteri *Staphylococcus aureus* mengandung senyawa Alkaloid dan Fenol dengan nilai Rf= 0,34 dan Rf= 0,21, Bakteri *Eschericia coli* mengandung senyawa Fenol dengan nilai Rf= 0,21 (lihat pada tabel 6).

Adapun hasil Identifikasi dari Profil KLT dari fraksi gabungan 6 dengan menggunakan eluen Heksan : Etil (2:1) yang memberikan pemisahan senyawa yang tampak jelas terpisah dengan baik, pada penyemprotan pereaksi dragendorf ditandai dengan warna jingga dengan latar kuning untuk senyawa Alkaloid dengan perlakuan foto langsung, Pereaksi Liebermann-Burchard ditandai dengan adanya warna hijau untuk senyawa Steroid dengan diamati UV 366 dengan noda berfluoresensi coklat dengan perlakuan dipanaskan, Besi (III) klorida dengan ditandai warna hijau kebiruan untuk senyawa Fenolik dengan perlakuan foto langsung, Aluminium klorida menunjukkan senyawa Flavanoid dengan ditandai warna kuning dan diamati di UV 254 dengan warna noda yang berfluoresensi hijau dengan perlakuan dipanaskan, penyemprotan Pereaksi warna H₂SO₄ 10 % menunjukkan warna cokelat untuk menandakan adanya senyawa organik dengan perlakuan dipanaskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. Pada hasil pengujian Aktivitas antibakteri ekstrak n-Heksan, etil asetat, etanol 96 %, dan air menunjukkan bahwa Ekstrak Etanol 96% daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* dengan zona hambat paling besar pada konsentrasi 750 ppm..

2. Pada hasil pengujian Hasil Fraksinasi teraktif yaitu Fraksi gabungan 6 menunjukkan bahwa Fraksi gabungan 6 daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) memiliki Aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*.

3. Pada hasil identifikasi Fraksinasi daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C) menunjukkan bahwa yang berperan sebagai antibakteri yaitu senyawa Alkaloid, Flavanoid, dan Fenol.


B. Saran


Untuk menambah data ilmiah dari tanaman daun Boboan (*Cleome rutidospermae* D.C), sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan mengenai isolasi komponen kimia dan elucidasi struktur senyawa yang memberikan aktivitas antibakteri.

KEPUSTAKAAN

- Agoes, G. *Teknologi Bahan Alam*. ITB Press Bandung. 2007.
- Ali, A. *Mikrobiologi Dasar Jilid 1*. Makassar: Jurusan Biologi UNM. 2005.
- Anisah, Khotimah, Siti, dkk. *Aktivitas antibakteri ekstrak rimpang Jeringau (Acorus calamus L.) terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli* : Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura. Jurnal Protobiont. 2014.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2006.
- Atun, Sri. *Metode Isolasi dan Identifikasi Struktur Senyawa Organik Bahan Alam. Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, 8(2), 53-61. 2014.
- Bose, A., Gupta, J.K., Dask, G.K., Ghosh, T., Panda, D.S., **Indian J. Pharm. Sci.**, 2007, 69.
- Brooks GF, Butel JS, Carroll KC, Morse SA. Jawetz, Melnick dan Adelberg's *Medical microbiology*, 24th ed. USA: Mc Graw Hill. 2007.
- Devi, Silvia., Mulyani, Tuty., *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pacar Kuku (Lawsonia inermis Linn) pada bakteri Pseudomonas aeruginosa. J. Current Pharm. Sci* Vol.1(1). Banjarmasin: Fakultas Farmasi. 2017.
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. 1995.
- Djide, M. N, Sartini, Kadir, SH. *Dasar-dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin. 2008.
- Djide, M. Natsir, dkk. *Analisis Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin. 2008.
- Fadlila, Wildan Nur. dkk. *Identifikasi Senyawa Aktif Antibakteri dengan Metode Bioautografi KLT terhadap Ekstrak Etanol Tangkai Daun Talas (Colocasia esculenta (L.) Schott)*. Bandung : Fakultas MIPA, Universitas Bandung. Prosiding Penelitian SPeSIA. 2015.
- Ganiswara, Sulistia G. *Farmakologi dan Terapi Edisi IV*. R. Setiabudy dan Vincent H. S. Gan. Pengantar Antimikroba. Jakarta: Gaya Baru, 2012.
- Garrity. G. *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. 2th Edition*. United States of America, Springer, New York Berlin Heidelberg. 2004.
- Gritter, R. J, Schwerting, A, E. *Pengantar Kromatografi, Edisi Kedua*. Terjemahan Kosasih Panwawita, Bandung: Penerbit ITB. 2001.
- Harborne, J.B. *Metode Fitokimia. Edisi kedua*, Terjemahan Kosasih Pamawinata, Bandung : Penerbit ITB. 1987.
- Liana, I. *Aktivitas Antimikroba Fraksi dari Ekstrak Metanol Daun Senggani (Melastoma candidum D. Don) Terhadap Staphylococcus aureus Dan Salmonella typhimurium Serta Kromatografi Lapis Tipis Fraksi Teraktif*. Yogyakarta: Fakultas Teknobiologi Program Studi Biologi Universitas Atmajaya . 2013.


- Maryati, Abd Gafar. "Isolasi Dan Identifikasi Senyawa Flavonoid dari Daun Jamblang (*Syzygium Cumini*)". vol. 1, no. 1. 2010.
- Mukhriani. *Ekstraksi, Pemisahan senyawa, dan Identifikasi senyawa aktif*. Fakultas ilmu kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jurnal Kesehatan 7 (2). 2014.
- Mutiasari, IR. Identifikasi Golongan senyawa Kimia Fraksi Aktif, journal. Jakarta: FMIPA-UI. 2012
- Pelczar, Michael J. and Chan. E.C.S. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Terjemahan oleh Hadioetomo, Ratna sari dkk. Jakarta: Universitas Indonesia. 2008.
- Pratiwi, Sylvia T. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2008.
- Putri, Z.F. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Sirih (*Piper bettle L.*) Terhadap *Propionibacterium acne* dan *Staphylococcus aureus* Multiresisten*. Surakarta : Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah. 2010.
- Rohman, Abdul. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Rubiyanto, Dwiwarso. *Teknik Dasar Kromatografi*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Saifuddin A, Rahayu, Yuda Hilwan. *Standarisasi Bahan Obat Alam*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2014.
- Sastrohadmijojo, H. *Kromatografi*. Yogyakarta: Liberty. 2004.
- Seidel V. Initian and bulk extraction, In : Sarker SD, Latif Z, & Gray AI, editors. *Natural Products Isolation*. 2nded. Totowa (New Jersey). Humana Press Inc. 2006.
- Septiani., Nurcahya, eko dewi, dkk. Aktivitas antibakteri ekstrak lamun (*Cymodocea rotundata*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Fakultas perikanan dan ilmu kelautan, Universitas Diponegoro. Jurnal saintek perikanan 13 (01). 2017.
- Shihab, Quraish, M. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Quran*, Vol 9. Jakarta Pusat: Lentera Hati. 2009.
- Shihab, Quraish, M. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Quran*, Vol 3. Jakarta Pusat: Lentera Hati. 2009.

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian


Lampiran 2. Skema Kerja Ekstraksi Daun Boboan (*Cleome rutidospermae***D.C)**


Lampiran 3. Skema Kerja Pengujian Skrining Antibakteri


1. Penyiapan Stok Larutan Uji




2. Skrining Aktivitas Antibakteri




Lampiran 4. Skema Kerja Fraksinasi Sampel

Lampiran 5. Skema Kerja Uji Aktivitas Hasil Fraksinasi

Lampiran 6. Skema Kerja KLT-Bioautografi

Lampiran 7. Skema Kerja Identifikasi Senyawa Kimia



Lampiran 9. Perhitungan Rendamen

Ekstrak n-Heksan daun Boboan (*Cleome rutidospermae D.C*) = 7,05 g

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{7,0 \text{ g}}{6 \text{ g}} \times 100 \% = 1,175 \%$$

Ekstrak Etil asetat daun Boboan (*Cleome rutidospermae D.C*) = 7,9 g

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{7,9 \text{ g}}{6 \text{ g}} \times 100 \% = 1,316 \%$$

Ekstrak Etanol 96% daun Boboan (*Cleome rutidospermae D.C*) = 38,4 g

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{3,4 \text{ g}}{6 \text{ g}} \times 100 \% = 6,4 \%$$

Ekstrak Etanol 96% daun Boboan (*Cleome rutidospermae D.C*) = 39,7 g

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{3,7 \text{ g}}{6 \text{ g}} \times 100 \% = 6,61 \%$$

Lampiran 10. Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran dari Ekstrak Dan Fraksi n-Heksan, Etil Asetat, Etanol 96%, Air

Dik : 20 mg (20x1.000) -20.000 μ l

10 ml (n-heksan, Etil asetat, Etanol 96%, ekstrak air) /

(F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)

$$\text{ppm} = \frac{2 \cdot 0 \text{ } \mu\text{g}}{1 \text{ m}} = 2000 \text{ ppm}$$

Untuk 250 ppm $V_1 \times N_1 = V_2 \times V_2$

$$V_1 \times 2000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 250 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{1 \text{ } \mu\text{l} \cdot \text{m}}{2 \text{ } \mu\text{l}} = 0,6 \text{ mL}$$

Untuk 500 ppm $V_1 \times N_1 = V_2 \times V_2$

$$V_1 \times 2000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 500 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{2 \text{ } \mu\text{l} \cdot \text{m}}{2 \text{ } \mu\text{l}} = 1,25 \text{ mL}$$

Untuk 750ppm $V_1 \times N_1 = V_2 \times V_2$

$$V_1 \times 2000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 750 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{3 \text{ ml}}{2} = 1,87 \text{ mL}$$

Lampiran 11. Perhitungan Nilai Rf

$$R_f = \frac{\text{jarak di atas}}{\text{jarak}}$$

1. Nilai Rf ekstrak etanol 96% hasil maserasi

$$UV_{254} \quad R_{f1} = \frac{0,5 \text{ cm}}{5,5 \text{ cm}} = 0,09 \text{ cm}$$

$$R_{f2} = \frac{1 \text{ cm}}{5,5 \text{ cm}} = 0,18 \text{ cm}$$

$$R_{f3} = \frac{1,5 \text{ cm}}{5,5 \text{ cm}} = 0,27 \text{ cm}$$

$$UV_{366} \quad R_{f1} = \frac{0,5 \text{ cm}}{5,5 \text{ cm}} = 0,09 \text{ cm}$$

$$R_{f2} = \frac{1 \text{ cm}}{5,5 \text{ cm}} = 0,18 \text{ cm}$$

$$R_{f3} = \frac{1,5 \text{ cm}}{5,5 \text{ cm}} = 0,27 \text{ cm}$$

$$R_{f4} = \frac{2,5 \text{ cm}}{5,5 \text{ cm}} = 0,45 \text{ cm}$$

2. Nilai Rf hasil KLT-Bioautografi dan identifikasi Fraksi 6 daun Boboan

(*Cleome ruidospermae* D.C)

1. *Pseudomonas aeruginosa*

$$R_{f1} = \frac{1,8 \text{ cm}}{5,5 \text{ cm}} = 0,34 \text{ cm}$$

2. *Staphylococcus aureus*

$$R_{f1} = \frac{1,8 \text{ cm}}{5,5 \text{ cm}} = 0,34 \text{ cm}$$

$$R_{f2} = \frac{1,2 \text{ cm}}{5,5 \text{ cm}} = 0,21 \text{ cm}$$

3. *Streptococcus mutans*

$$Rf1 = \frac{3,3 \text{ c}}{5,5 \text{ c}} = 0,6 \text{ cm}$$

$$Rf2 = \frac{1,8 \text{ c}}{5,5 \text{ c}} = 0,34 \text{ cm}$$

4. *Eschericia coli*

$$Rf2 = \frac{1,2 \text{ c}}{5,5 \text{ c}} = 0,21 \text{ cm}$$



Lampiran 12. Gambar



Gambar 1. Tumbuhan boboan (*Cleome rutidospermae* D.C)

Keterangan :

A : Morfologi tumbuhan boboan

B : Morfologi daun boboan




Gambar 2. Preparasi sampel

Keterangan

A : Pencucian sampel

B : Sampel dikeringkan





Gambar 3. Uji pendahuluan

A : Penyiapan simplisia

B : Penimbangan simplisia

C : Pembagian simplisia tiap tabung reaksi

D : Pengambilan pereaksi

(Dragendorf, H_2SO_4 , $FeCl_2$, $AlCl_3$, LB, KOH)

E : Hasil Uji Pendahuluan

F : Hasil Dragendorf

G : Hasil H_2SO_4

H : Hasil $FeCl_2$

I : Hasil $AlCl_3$


J : Hasil LB

K : Hasil KO



Gambar 4. Proses Ekstraksi


- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| A. Penimbangan simplisia | F. Ekstrak N-Heksan |
| B. Proses Ekstraksi | G. Ekstrak etil asetat |
| C. Penyaringan hasil maserasi | H. Ekstrak etanol 96% |
| D. Proses rotavapor | I. Ekstrak Air |
| E. Proses Refluks | |



Escherichia coli

Streptococcus mutans

Staphylococcus aureus



Pseudomonas aeruginosa

Streptococcus mutans

Escherichia coli



Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa


Escherichia coli



Streptococcus mutans

Staphylococcus aureus


Pseudomonas aeruginosa



Escherichia coli

Streptococcus mutans

Staphylococcus aureus



Pseudomonas aeruginosa

Gambar 5. Hasil uji skrining aktivitas antibakteri daun boboan (*Cleome rutidosperma* D.C) Konsetrasi 750 ppm, 500 ppm, 250 ppm pada bakteri uji

- A. Hasil uji skrining aktivitas antibakteri ekstrak n-heksan
- B. Hasil uji skrining aktivitas antibakteri ekstrak Etil asetat
- C. Hasil uji skrining aktivitas antibakteri ekstrak Etanol 96%
- D. Hasil uji skrining aktivitas antibakteri ekstrak Air



Gambar 5. Kromatografi Lapis Tipis

- A. Proses pencarian Profil KLT
- B. Profil KLT dilihat pada UV $_{254}$ nm
- C. Profil KLT dilihat pada UV $_{366}$ nm
- D. Profil KLT setelah disemprot serim sulfat
 - Fase gerak : Heksan : Etil (9:1)
 - Fase diam : Silika gel GF $_{254}$



Gambar 6. Proses kromatografi kolom


- A. Penyiapan alat dan bahan
- B. Penyiapan Eluen
- C. Penambahan bubuk silika
- D. Penambahan sampel
- E. Proses fraksinasi menggunakan Kromatogrfi kolom
- F. Hasil fraksinasi




Vial 1-77




Vial 81-157



Vial 161-237




Vial 241-317




Vial 1-77



Vial 81-157



Vial 161-237



Vial 241-317



Vial 321-345




Vial 1-77




Vial 81-157




Vial 161-237




Vial 241-317




Vial 321-345





Gambar 8. Penggabungan hasil Fraksinasi


- A. Penjenuhan lempeng
- B. Profil KLT fraksi dilihat pada UV 254 nm
- C. Profil KLT fraksi dilihat pada UV 366 nm
- D. Penyemprotan serum sulfat
- E. Profil KLT setelah disemprot serum sulfat
- F. Hasil penggabungan




Escherichia coli

Staphylococcus aureus


Pseudomonas aeruginosa




Streptococcus mutans



Eschericia coli




Pseudomonas aeruginosa




Streptococcus mutans



Stapylococcus aureus




Pseudomonas aeruginosa




Eschericia coli




Stapylococcus aureus



Streptococcus mutans




Streptococcus mutans




Pseudomonas aeruginosa




Stapylococcus aureus




Escherichia coli



Streptococcus mutans




Staphylococcus aureus




Pseudomonas aeruginosa



Escherichia coli




Escherichia coli




Streptococcus mutans




Staphylococcus aureus




Pseudomonas aeruginosa




Escherichia coli



Streptococcus mutans




Staphylococcus aureus



Pseudomonas aeruginosa

Gambar 9. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri daun boboan (*Cleome rutidospermae D.C*) Konsetrasi 750 ppm, 500 ppm, 250 ppm pada bkateri uji

- A. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri Fraksi 1
- B. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri Fraksi 2
- C. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri Fraksi 3
- D. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri Fraksi 4
- E. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri Fraksi 5
- F. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri Fraksi 6
- G. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri Fraksi 7




Streptococcus mutans




ALK



FLA



Gambar 10. Hasil Uji KLT-Bioautografi Fraksi Aktif daun boboan, (*Cleome rutidospermae* D.C) pada Bakteri *Streptococcus mutans*, *taphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*



Gambar 11. Identifikasi senyawa Fraksi Aktif

A : Dragendorf

B : H_2SO_4

C : Besi (III) Klorida

D : Aluminium Klorida

E : Liebermann-Buchard

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap **Ayu Ashari** yang biasa dipanggil Ayu dilahirkan di Luwu tepatnya di Desa Dadeko pada tanggal 17 juli 1995, anak dari pasangan Sudirman S. dan Nurhayati. Pada tahun 2002 mulai masuk pada pendidikan Dasar tepatnya SDN 03 Sampano dan berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar pada Tahun 2008. Pada tahun yang sama (2008) melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 135 Sampano (2008- 2011). Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Larompong selatan (2011-2014). Lalu dilanjutkan menempuh Perguruan Tinggi Negeri program tepatnya Sarjana Farmasi (S.Farm) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2014-sekarang).

