

**HUBUNGAN FAKTOR RISIKO DENGAN KEJADIAN *ANEMIA*
PADA IBU HAMIL TRIMESTER KETIGA DI WILAYAH
KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2021**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Kedokteran pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh:

HUSNUL KHATIMAH

70600117019

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Khatimah
NIM : 70600117019
Tempat/Tgl Lahir : Kalosi, 07 Februari 1998
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Budidayaraya Blok G.18 Antang
Judul : Hubungan Faktor Risiko Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimeser Ketiga Di Wilayah Kecamatan Alla Kabuoaten Enrekang Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Februari 2022

Penyusun


Husnul Khatimah

NIM: 70600117019

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

JUDUL : HUBUNGAN FAKTOR RISIKO KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL TRIMESTER KETIGA DI WILAYAH KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021

TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING UNTUK DIAJUKAN DALAM SEMINAR HASIL KARYA TULIS ILMIAH (KTI) MAHASISWA KEDOKTERAN


MAKASSAR, 18 FEBRUARI 2022

PEMBIMBING 1



DR. dr. Dewi Setiawati, SpOG. M.Kes

PEMBIMBING 2



DR. dr. Nadyah Haruna, M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Hubungan Faktor Risiko Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester Ketiga Di Wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021", yang disusun oleh Husnul Khatimah, NIM 70600117019, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 18 Februari 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 18 Februari 2021

19 Rajab 1442 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|---|---------|
| Ketua | : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes | (.....) |
| Sekretaris | : dr. Rini Fitriani, M.Kes | (.....) |
| Pembimbing I | : DR. dr. Dewi Setiawati Sp. OG., M.Kes | (.....) |
| Pembimbing II | : DR. dr. Nadyah Haruna, M.Kes | (.....) |
| Penguji I | : dr. Rini Fitriani, M.Kes | (.....) |
| Penguji II | : Prof. Siti Aisyah, MA., Ph.D | (.....) |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hubungan Faktor Risiko Kejadian *Anemia* Pada Ibu Hamil Trimester Ketiga di Wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Pada Tahun 2021 ”** dalam rangka penyelesaian salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT. Yang atas izin-Nya lah skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Kepada orang tua tercinta yang selama ini telah memberikan dukungan tak terhingga kepada peneliti dalam melaksanakan studi.
3. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.

5. dr. Rini Ritriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
6. Kepada dr. Dewi Setiawati, SpOg, M, Kes selaku pembimbing I dan DR. dr Nadyah Haruna, M. Kes selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
7. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Enrekang, 14 Maret 2021

Husnul Khatimah

NIM : 706001170

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| <i>A.KATAPENGANTAR</i> | 2 |
| <i>DAFTAR ISI</i> | 4 |
| <i>DAFTAR TABEL</i> | 6 |
| <i>DAFTAR GAMBAR</i> | 7 |
| <i>BAB I PENDAHULUAN</i> | 8 |
| A. Latar Belakang | 8 |
| B. RumusanMasalah | 15 |
| C. Hipotesis | 15 |
| D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian..... | 16 |
| E. Kajian Pustaka | 19 |
| F. Tujuan Penelitian | 22 |
| G. Manfaat Penelitian..... | 22 |
| <i>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</i> | 24 |
| A. Anemia kehamilan..... | 24 |
| B. Kehamilan..... | 39 |
| C. Usia..... | 40 |
| D. Paritas | 41 |
| E. Frekuensi ANC | 42 |
| F. Pengetahuan | 43 |
| G. Pendidikan..... | 44 |
| H. Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe | 45 |

ALAUDDIN
M A K A S S A R

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 48 |
| A. Desain penelitian | 48 |
| B. Lokasi Penelitian | 48 |
| D. Variabel Penelitian | 48 |
| E. Populasi dan Sampel..... | 48 |
| F. Cara Pengumpulan Data..... | 50 |
| G. Instrumen Penelitian..... | 50 |
| H. Kerangka Teori..... | 48 |
| J. Kerangka Kerja..... | 53 |
| K. Pengolahan dan Analisis Data..... | 54 |
| L. Penyajian Data | 54 |
| M. Etika Penelitian..... | 54 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 55 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 55 |
| B. Hasil Penelitian..... | 55 |
| 1. Analisis Univariat..... | 56 |
| 2. Analisis Bivariat..... | 58 |
| C. Pembahasan..... | 62 |
| BAB V PENUTUP..... | 70 |
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 71 |
| Lampiran..... | 76 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Definisi Operasional..... | 12 |
| Tabel 1.2 Kajian Pustaka Penelitian..... | 16 |
| Tabel 3.1 Distribusi Karakteristik Responden | 56 |
| Tabel 3.2 Distribusi Hubungan antara Usia Ibu Hamil dengan Anemia Ibu Hamil..... | 58 |
| Tabel 3.3 Distribusi Hubungan antara Pendidikan Ibu Hamil dengan Anemia Ibu Hamil..... | 58 |
| Tabel 3.4 Distribusi Hubungan antara Usia Ibu Hamil dengan Anemis Ibu Hamil..... | 58 |
| Tabel 3.5 Distribusi Hubungan antara Frekuensi ANC Ibu Hamil dengan Anemia Ibu Hamil..... | 59 |
| Tabel 3.6 Distribusi Hubungan LILA bu Hamil dengan Anemia Ibu Hamil..... | 60 |
| Tabel 3.7 Distribusi Hubungan antara Pengetahuan dengan Anemia Ibu Hamil..... | 60 |
| Tabel 3.8 Distribusi Hubungan antara Kepatuhan Konsumsi Fe dengan Anemia Ibu Hamil..... | 61 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Kerangka Teori | 40 |
| Gambar 1.2 Kerangka Konsep | 41 |
| Gambar 1.3 Kerangka Kerja | 42 |

HUBUNGAN FAKTOR RISIKO KEJADIAN *ANEMIA* PADA IBU HAMIL TRIMESTER KETIGA DI WILAYAH KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021

Husnul Khatimah⁽¹⁾, Dewi Setiawati⁽²⁾, Nadyah Haruna⁽³⁾, Rini Fitriani⁽⁴⁾

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Anemia merupakan kondisi dimana eritrosit kurang dalam sirkulasi darah atau masa hemoglobin yang rendah sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen keseluruhan jaringan, sehingga memiliki dampak pada kehamilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor resiko yang memengaruhi anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional* menggunakan data kuantitatif untuk mengetahui hubungan faktor-faktor resiko kejadian *anemia* pada ibu hamil trimester ketiga. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel yaitu 63 ibu hamil trimester ketiga. Data diolah dan dianalisis menggunakan Uji *Chi-Square* $p < 0,05$ pada program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia, paritas, frekuensi antenatal care (ANC), pendidikan, pengetahuan, status gizi dan kepatuhan mengonsumsi tablet Fe dengan kejadian Anemia pada ibu hamil trimester ketiga .

Kata Kunci : *Anemia ibu hamil*, Usia, paritas, frekuensi antenatal care (ANC), pendidikan, pengetahuan, status gizi dan kepatuhan mengonsumsi tablet Fe.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RISK FACTORS OF PREGNANCY AND THE OCCURRENCES OF ANEMIA IN PATIENTS AT THEIR THIRD TRIMESTER

Husnul Khatimah⁽¹⁾, Dewi Setiawati⁽²⁾, Nadyah Haruna⁽³⁾, Rini Fitriani⁽⁴⁾ Medical Education Program, Faculty of Medicine and Health Sciences Alauddin State Islamic University of Makassar

ABSTRACT

Anemia in pregnancy is a condition in which a pregnant woman is lack enough healthy red blood cells to carry adequate oxygen to the body tissues which could influence the health of both the mother and the fetus. The major purpose of this study was to investigate the relationships between the risk factors of pregnancy and the occurrences of anemia in pregnant women, particularly during their third trimester. This research was conducted in Alla' district of Enrekang regency in 2021. The method used for this study was a quantitative descriptive analytical study by using a cross sectional study approach. The sampling technique used in this research was a purposive sampling method with a total sample of 63 pregnant women. The data were analyzed by using the Chi-Square test of $p < 0.05$ where the SPSS application was also utilized. The findings of this study indicated that there was significant relationships between various factors such as ages, parity, the frequency of antenatal care (ANC), mothers' education level, knowledge, mothers' nutritional status, and the adherence of Fe tablets consumption and the occurrences of anemia in third trimester pregnant women in Alla district of Enrekang regency in 2021.

Key Words: Anemia in pregnancy, ages, parity, the frequency of antenatal care (ANC), educational level, knowledge, nutritional status, and the adherence of Fe tablets consumption.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan adalah sebuah metamorphosis atau proses perkembangan pada kehidupan. Saat jutaan sperma memasuki sistem reproduksi seorang perempuan, tahap demi tahap gerombolan sperma berlomba untuk menuju satu tujuan yang sama, yaitu membuahi ovum sehingga terjadilah pembuahan yang disebut Zigot (Setiawati, 2020). Masa kehamilan ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan janin menuju masa kelahiran sehingga gangguan gizi yang terjadi pada masa kehamilan akan berdampak besar bagi kesehatan ibu maupun janin. Masa kehamilan membutuhkan asupan makanan yang maksimal pada ibu hamil. Ibu hamil yang kurang asupan makanan biasanya mengeluh sering letih, kepala pusing, sesak nafas, wajah pucat dan berbagai macam keluhan lainnya. Semua keluhan tersebut merupakan indikasi bahwa ibu hamil tersebut sedang menderita anemia pada masa kehamilan (Sari,2019)

Anemia merupakan kondisi dimana kurangnya sel darah merah (eritrosit) dalam sirkulasi darah atau masa hemoglobin yang rendah sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen keseluruhan jaringan, hal ini disebut sebagai anemia (Sari, 2020). Anemia pada kehamilan terjadi akibat adanya perubahan fisiologis normal pada kehamilan yang mempengaruhi hematokrit dan meter tertentu lainnya, seperti hemoglobin, retikulosit, feritin plasma, dan kapasitas pengikatan zat besi tak jenuh. Anemia yang paling umum adalah anemia defisiensi besi dan anemia megaloblastik defisiensi folat (Care *et al.*, 2020). Anemia ini lebih sering terjadi pada wanita yang memiliki pola makan yang tidak memadai dan yang tidak menerima suplemen zat besi dan folat prenatal. Hal ini disebabkan kurangnya asupan zat besi dalam makanan karena gangguan absorpsi, gangguan penggunaan atau perdarahan. Faktor- faktor tersebut akan mempengaruhi status kesehatan ibu hamil (Leny, 2019).

Anemia pada ibu hamil disebut sebagai “*potensial danger to mother and child*” (potensi membahayakan ibu dan anak), sehingga perlu penanganan yang tepat dan komprehensif oleh semua pihak terkait dari keluarga sampai dengan pemerintah. Anemia selama kehamilan dilaporkan memiliki efek negatif pada kesehatan ibu dan anak dan meningkatkan risiko kematian ibu dan perinatal. Dampak negatif bagi ibu diantaranya kelelahan, kapasitas kerja yang buruk, gangguan fungsi kekebalan, peningkatan risiko penyakit jantung, dan kematian (Sari, 2019).

Penyebab kematian ibu dengan presentase tertinggi adalah perdarahan. Anemia pada ibu hamil merupakan penyebab utama terjadinya perdarahan. Menurut WHO (World Health Organization), dikatakan anemia apabila kondisi ibu hamil dengan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah < 11,0 g %. Anemia pada ibu hamil trimester I dan III adalah 11 gr/dl sedangkan pada trimester II kadar Hb adalah <10,5 gr/dl. Kehamilan trimester ke III merupakan masa kritis dimana kebutuhan zat besi meningkat. Wanita hamil sangat rentan mengalami anemia defisiensi besi karena pada kehamilan kebutuhan oksigen meningkat sehingga memicu peningkatan produksi eritropoietin. Akibatnya, volume plasma bertambah dan eritrosit meningkat. Namun peningkatan volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan eritrosit sehingga penurunan konsentrasi hemoglobin (Hb) (Pada *et al.*, 2020).

Berdasarkan data badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO) tahun 2018 melaporkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil di dunia adalah 41,8%. Diketahui, prevalensi anemia pada ibu hamil di dunia yaitu diperkirakan Afrika sebesar 57,1%, Asia 48,2% , Eropa 25,1% dan Amerika 24,1% (WHO, 2018). Data WHO kematian ibu di negara berkembang berkaitan dengan anemia dalam kehamilan. Rata-rata kehamilan yang disebabkan karena anemia di Asia diperkirakan sebesar 72,6 %. Tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil merupakan masalah yang tengah dihadapi Indonesia (Andita, 2018).

Indonesia masih termasuk ke dalam negara dengan tingkat kesehatan yang rendah, karena masih tingginya angka kematian pada ibu hamil. Ibu hamil yang mengalami anemia memiliki resiko kematian hingga 3,6 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak mengalami anemia. Anemia dalam kehamilan memiliki keterkaitan yang erat dengan keadaan janin, abortus, cacat bawaan, berat bayi lahir rendah, cadangan zat besi yang berkurang pada anak atau anak lahir dalam keadaan anemia gizi. Selain itu, dapat juga mengakibatkan perdarahan pada saat persalinan yang merupakan penyebab utama kematian ibu hamil/bersalin di Indonesia.

Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun (Riskesdas,2018). Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan persentase ibu hamil yang mengalami anemia di Indonesia yakni sebesar 48,9% dan sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 (Kemenkes RI,2020).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 orang yang mengalami anemia ringan berjumlah 74.541 orang (62,54%) anemia sedang berjumlah 67.470 (58,12%) dan anemia berat berjumlah 10.768 (9,15%). Data pada tahun 2019 tercatat 91.020 (87,29%), sedangkan ibu hamil yang menderita anemia dari 104.271 ibu hamil yang memeriksakan diri diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu anemia ringan 3.467 (3,18%), anemia sedang 4127 (27,26%) dan anemia berat 417 (2,75%) (Dinas Kesehatan Kota Makassar,2020).

Dari Dinas Kesehatan Enrekang tercatat pada tahun 2018 sebanyak 1221 ibu hamil yang mengalami anemia, pada tahun 2019 sebanyak 1084 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu terdata sebanyak 964. Sedangkan, data terbaru pada tahun 2021 tercatat hingga bulan Mei didapatkan sebanyak 380 ibu hamil yang mengalami anemia kehamilan. Terdapat 8 kecamatan di wilayah Duri Kabupaten Enrekang yaitu (Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Curio, Kecamatan Baraka, Kecamatan Baroko, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Malua, Kecamatan Masalle). Di

kecamatan Alla sendiri terdapat 2 puskesmas, dari hasil survei daerah tersebut memiliki kasus anemia tertinggi yang terjadi pada ibu hamil yaitu di Puskesmas Kalosi dan Puskesmas Sudu (Dinas Kesehatan Kota Enrekang,2020).

Data di atas menunjukkan bahwa anemia pada kehamilan patut mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Maka dari itu setiap pihak pada pelayanan kesehatan juga memiliki peran yang besar dalam menurunkan angka anemia pada ibu hamil. Dengan masalah ini, pemerintah telah berupaya dalam menurunkan kejadian anemia dengan pemberian suplementasi besi atau Tablet Tambah Darah (TTD) dan dianggap efektif dalam meningkatkan kadar Hb (hemoglobin) pada ibu hamil. Upaya ini pula telah direkomendasikan secara global di negara berkembang. Merujuk pada Permenkes No 88 Tahun 2014 tentang standar tablet tambah darah bagi wanita usia subur dan ibu hamil yakni untuk melindungi wanita usia subur dan ibu hamil dari kekurangan gizi dan mencegah terjadinya anemia gizi besi maka perlu mengonsumsi tablet tambah darah (Care *et al.*, 2020).

Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya anemia pada ibu hamil. Tingginya tingkat anemia pada ibu hamil ini didukung dengan rendahnya tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet tambah darah, juga disebutkan rendahnya konsumsi suplemen zat besi antara lain : usia muda, tingkat pendidikan rendah, ekonomi rendah, multiparitas, *Antenatal care (ANC)* yang tidak memadai, kurangnya panduan terhadap penggunaan suplemen, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya asupan zat besi dan suplementasi zat besi selama kehamilan (Fatonah *et al.*, 2019).

Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan. Kepatuhan dalam mengonsumsi tablet besi adalah ketaatan ibu hamil melaksanakan anjuran petugas kesehatan untuk mengonsumsi tablet zat besi. Ketidapatuhan dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya asupan zat besi dan suplementasi zat besi selama kehamilan, ibu hamil meminum tablet zat besi dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk terkena anemia

(Yanti, 2017). Dari hal tersebut ibu hamil sangat disarankan agar menjaga kesihatannya karena nutrisi yang baik akan mendukung pertumbuhan janin yang baik pula. Hal ini dilakukan demi melahirkan seorang mukmin yang kuat (Putri,2018).

Ibu hamil sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan bayi yang telah di titipkan Allah swt kepadanya. Mengingat bahwa Al- Qur'an dengan sains tidak dapat dipisahkan. Pada teori biologi, telah dijelaskan bahwa manusia berasal dari bertemunya antara sperma seorang laki-laki dengan sel ovum seorang perempuan yang berlangsung pada *tuba fallopi* pada saat terjadinya ovulasi pada tubuh wanita yang disebut dengan pembuahan. Selanjutnya akan dihasilkan *zygot* yang akan bergerak kedalam rahim dan mengalami nidasi. Setelah itu *zygot* akan berkembang menjadi embrio kemudian menjadi janin. Selama didalam rahim sampai lahir, asupan makanan akan diperoleh dari plasenta. Janin akan siap lahir setelah melalui masa tertentu dalam perkembangan selanjutnya. Gambaran diatas dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai kalamullah, Proses penciptaan manusia yang sangat unik ini dijelaskan pada surah Al- Mu'minin ayat 12-14 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ
خَلْقًا آخَرَ ۝ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

Terjemahnya :

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh(rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulangbelulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (QS. Al-Mukminun :12-14).

Ayat di atas memberikan gambaran bahwasanya periodisasi janin dari tahap setetes air mani lalu dijadikan dia makhluk yang berbentuk lain yaitu manusia, hal ini kemudian dijelaskan secara terperinci dalam ilmu sains. M. Quraish Shihab menafsirkan kata nutfah

dalam bahasa arab berarti setetes yang dapat membasahi atau hasil petertemuan sperma dan ovum. Penggunaan kata ini menyangkut proses kejadian manusia sejalan dengan penemuan ilmiah yang menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria mengandung sekitar dua ratus juta benih manusia, sedang yang berhasil bertemu dengan indung telur wanita hanya satu saja. Kemudian kami menciptakan nutfah itu menjadi alaqah, yaitu gumpalan darah merah. Lalu selepas empat puluh hari, kami ciptakan alaqah itu menjadi mudhghah, yaitu gumpalan daging sebesar satu suapan yang dikunyah. Kemudian kami menciptakan gumpalan daging yang lunak itu menjadi tulang-tulang, lalu kami membungkus tulang-tulang itu dengan daging, dan setelah itu kami ciptakan dia menjadi makhluk (dalam bentuk) yang berbeda dengan meniupkan ruh padanya. Maha berkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu.

Q.S. Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ

Terjemahnya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.

Selama mengandung, Ibu menahan dengan sabar segala penderitaan yang cukup berat. Mulai dari bulan pertama hingga kandungan itu semakin berat dan ibu semakin lemah hingga melahirkan. Kekuatannya baru pulih setelah habis masa nifas. Kemudian Ibu menyusui anaknya hingga usia dua tahun. Tidak sedikit penderitaan dan kesukaran yang dialami dalam masa menyusui. Pada kondisi ini ibu sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatannya agar dapat memenuhi kebutuhan sang buah hati. Dari tafsir ini menyimpulkan bahwa nikmat yang paling besar yang diterima seorang manusia adalah nikmat dari Allah SWT, kemudian nikmat kemudian nikmat yang diterima dari ibu bapaknya. Segala perbuatan akan mendapatkan balasannya masing-masing. Perbuatan baik akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda berupa surga.

QS. Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dari penafsiran mufassir di atas dapat dipahami bahwa anjuran tentang makanan dan minuman yang halal lagi baik pada ayat 168 surah al-Baqarah ini mengandung ajaran kepada seluruh ummat manusia di bumi ini tak terkecuali non muslim, makanan yang halal adalah seluruh makanan yang tidak diharamkan Allah sedangkan yang baik adalah makanan dan minuman yang mengandung gizi yang baik itu untuk seseorang. Thayyib itu terkandung makna kesehatan jiwa dan rasa yang terdapat dari barang tersebut misalnya daging, buah-buahan, sayuran dll yang mengandung berbagai gizi, protein, vitamin, kalori dll yang diperlukan oleh tubuh manusia. M. Hasbi Ashshiddieqy menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang baik adalah makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan, yaitu yang mengandung gizi dan tidak memudharatkan. Konsep halalan thayyiban merupakan sebuah konsep tentang makanan dan minuman yang akan menyehatkan fisik manusia, karena dalam makanan dan minuman yang halalan thayyiban hanya terdapat yang menyehatkan badan, dan menenangkan jiwa manusia. Fisik dan jiwa yang sehat tentunya merupakan modal utama untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Q.S Al-An'am/6: 142.

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ ۖ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“ dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah

kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ibu hamil yang menderita anemia memerlukan asupan nutrisi dan gizi dengan makan makanan yang telah diberikan Allah. Berdasarkan isi kandungan Al-qur'an Surat Al An'am bahwa memakan hewan ternak yang telah disembelih. Hewan ternak yang merupakan sumber protein hewani yang didalamnya mengandung zat besi yang dibutuhkan bagi ibu hamil agar tidak terjadi anemia. Selain itu, pengetahuan dalam memilih makanan yang baik juga diperlukan. Sejatinya, pola hidup sehat sudah diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Di mana, Rasulullah SAW memberi contoh kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan sehat. Seperti apa yang ada dalam hadits berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى : وَقَالَ تَعَالَى :

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِينُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعَدْيِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ. [رواه مسلم]

Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik, tidak menerima kecuai yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada Rasul-Nya dan dia berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian”. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit seraya berkata:“ Ya Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan. (HR. Muslim).

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ
إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

“Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)”.

Makna ayat di atas yaitu Allah memberikan hikmah, artinya ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang mumpuni, akal yang terus, pemikiran yang matang dan terciptanya kebenaran dalam perkataan maupun perbuatan. Inilah seutama-utamanya pemberian dan sebaik-baiknya karunia. Kandungan ayat ini berkaitan dengan hikmah yang diberikan Allah berupa pengetahuan dapat berguna untuk ibu hamil untuk memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga hikmah itu akan menuntunnya pada kebaikan berupa kesehatan.

Betapa pentingnya menjaga kesehatan selama kehamilan, namun ada berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya anemia pada ibu hamil. Dari pengamatan awal yang penulis lakukan di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, terdapat 2 puskesmas di kecamatan ini dan telah terjadwal waktu posyandu, peran posyandu ini untuk melayani masyarakat yang mengalami masalah kesehatan khususnya bagi ibu hamil, bayi dan balita. Setiap satu bulan posyandu mengadakan pemeriksaan pada ibu hamil, bayi dan balita. Setiap bulannya petugas Posyandu memeriksa kandungan ibu hamil, memberi vitamin dan juga memberikan arahan apa saja yang harus dilakukan oleh ibu hamil untuk menjaga kesehatan bayi yang ada dalam kandungannya. Namun, ada beberapa ibu hamil yang hanya datang beberapa kali ke posyandu untuk memeriksa kandungannya, dan

ketika ditanya alasannya adalah saran yang diberikan selalu saran yang sama dengan bulan yang lalu, dan alasan lainnya dia sangat sibuk bekerja sehingga tidak sempat untuk memeriksakan kandungannya setiap bulan. Disinilah perlunya bimbingan kepada ibu hamil agar mereka lebih tahu bagaimana menjaga kesehatan kehamilan sampai ia melahirkan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti sangat termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “*Hubungan Faktor risiko kejadian Anemia pada Ibu Hamil Trimester Ketiga di Wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang*”. Sangat diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi dasar penerapan maupun pengembangan instrumen dalam standar asuhan antenatal care, serta dapat mengembangkan intervensi yang sesuai dengan faktor penyebab anemia pada kehamilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas adapun perumusan suatu masalah yang diambil pada penelitian ini adalah “Bagaimana hubungan faktor-faktor risiko kejadian *anemia* pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kabupaten Enrekang pada Tahun 2021.

C. Hipotesis

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara usia, paritas, Frekuensi Antenaral Care (ANC), Pendidikan, Pengetahuan , Status gizi dan kepatuhan mengonsumsi tablet Fe terhadap kejadian *Anemia* pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kabupaten Enrekang pada Tahun 2021.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

| No. | Variabel | Definisi operasional | Cara ukur | Hasil ukur | Skala |
|---------------------|---------------|--|---|--|---------|
| Variabel Independen | | | | | |
| 1. | Faktor Usia | Usia adalah jumlah lamanya kehidupan yang dihitung berdasarkan tahun kelahiran sampai dengan ulang tahun terakhir pada saat hamil. | Menggunakan 2 item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner pertama. | 1. Risiko tinggi (<20 dan >35 tahun) 2. Risiko Rendah (20-30 tahun) | Nominal |
| 2. | Paritas | Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup yang dipunyai oleh seorang wanita (BKKBN, 2008). | Menggunakan 2 item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner pertama. | 1. Primigravida 2. Multigravida | Nominal |
| 3. | Frekuensi ANC | Frekuensi ANC adalah berapa banyak ibu diberikan Ante natal care/ pelayanan yang diberikan oleh ibu hamil secara berkala untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya | Menggunakan item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dan melihat pada buku pemeriksaan kehamilan. | 1. Kurang (< 4 kali) 2. Cukup (= / > 4 kali) | Nominal |

Tabel 1.1 Definisi Operasional

| No. | Variabel | Definisi operasional | Cara ukur | Hasil ukur | Skala |
|---------------------|------------------------------|---|--|---|---------|
| Variabel Independen | | | | | |
| 3. | Pendidikan | Pendidikan formal yang didapatkan dan dihitung berdasarkan ijazah terakhir yang diperoleh pada saat ibu hamil diberi kuisisioner. | Menggunakan 5 item pertanyaan yang terdapat pada kuisisioner pertama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sekolah 2. Tamat SD/ sederajat 3. Tamat SMP/ sederaja 4. Tamat SMA/ Sederajat 5. Perguruan tinggi/ S1/ sederajat, atau lebih | Nominal |
| 4. | Pengetahuan | Segala sesuatu yang diketahui ibu hamil tentang anemia dan tablet tambah darah (tablet Fe) | Menggunakan 2 item pertanyaan yang terdapat pada kuisisioner pertama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tinggi 2. Rendah | Nominal |
| 5. | Kepatuhan konsumsi tablet Fe | Kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet zat besi adalah ketaatan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet zat besi sesuai dengan dosis, waktu, tujuan pemberian dan anjuran dari petugas kesehatan. | Menggunakan 2 item pertanyaan yang terdapat pada kuisisioner pertama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Patuh 2. Patuh | Nominal |
| 6. | Status Gizi | Satus gizi ibu hamil adalah suatu keadaan keseimbangan dalam tubuh ibu hamil sebagai akibat pemasukan konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi yang digunakan oleh tubuh untuk kelangsungan hidup dalam mempertahankan fungsi-fungsi organ tubuh. | Menggunakan item pertanyaan pada kuisisioner dan juga melakukan pemeriksaan gizi secara langsung dengan mengukur LILA (lingkar lengan atas) ibu hamil. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gizi Baik (LILA \geq 23.5 cm) 2. Gizi Kurang (LILA $<$ 23,5 cm) | Nominal |

Tabel 1.1 Definisi Operasional

| Variabel Dependen | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--|---|---|---------|
| 1. | <i>Anemia kehamilan</i> | Anemia merupakan penurunan kadar hemoglobin, hitung eritrosit, dan hematokrit sehingga jumlah eritrosit atau kadar hemoglobin yang beredar tidak dapat memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. | Menggunakan Data Rekam Medik kadar Hemoglobin ibu hamil dari puskesmas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anemia ringan bila kadar Hb 9-10 gr % 2. Anemia sedang bila kadar Hb 7-8 gr % 3. Anemia berat bila kadar Hb <7gr % 4. Tidak anemia bila kadar Hb 11- >12 gr % | Ordinal |

Tabel 1.1 Definisi Operasional

2. Ruang Lingkup Penelitian

Menganalisis hubungan faktor-faktor resiko yang mempengaruhi kejadian *Anemia* pada ibu hamil trimester tiga menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan pengisian kuesioner.

E. Kajian Pustaka

| No. | Peneliti/ Tahun | Judul | Metode | Jumlah sampel | Cara pengukuran | Hasil |
|-----|------------------------------|---|--|------------------|--|---|
| 1. | Nurdina Takdir (2017) | Analisis Faktor Resiko Anemia Pada Ibu hamil Trimester Ketiga | <i>Deskriptif analitik</i> dengan pendekatan cross sectional. | 50 sampel | Pengisian kuisisioner dan pengambilan data ibu hamil di RS | Terdapat hubungan antara faktor usia, paritas, Frekuensi ANC, Pendidikan, pengetahuan dan kepatuhan mengonsumsi tablet Fe dengan kejadian Anemia pada ibu hamil trimester ketiga. |
| 2. | Misriani (2018) | Hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan kepatuhan konsumsi tablet besi (Fe) di puskesmas Hamn Perak Kabupaten DeliSerdang | Bersifat analitik menggunakan metode korelasional dengan rancangan pendekatan cross sectional | 59 sampel | Diukur dengan memberikan lembar kuisisioner | Terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan kepatuhan mengonsumsi tablet besi (Fe) |
| 3. | Fitriana Andita (2018) | Analisis Faktor- faktor yang mempengaruhi Anemia kehamilan di Puskesmas Padang Bulan | Deskriptif analitik | 38 sampel | Menggunakan kuisisioner data demografi, pen- getahuan, dan kepatuhan | Terdapat hubungan bermakna antara umur dengan anemia kehamilan, tidak terdapat hubungan bermakna antara paritas dengan anemia kehamilan. Tidak ada hubungan antara jarak kehamilan, Pendidikan, pengetahuan dan kepatuhan dengan anemia |

| No. | Peneliti/ Tahun | Judul | Metode | Jumlah sampel | Cara pengukuran | Hasil |
|-----|-----------------------------------|---|--|------------------|--|--|
| 4. | Dita Purnama sari (2017) | Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil dengan Kepatuhan Mengonsumsi Fe di Wilayah Puskesmas Sam Kabupaten Konawe tahun 2017. | Deskriptif analitik | 38 sampel | Menggunakan kuisisioner data demografi,pen getahuan, dan kepatuhan | Terdapat hubungan bermakna antara umur dengan anemia kehamilan,tidak terdapat hubungan bermakna antara paritas dengan anemia kehamilan.Tidak ada hubungan antara jarak kehamilan ,Pendidikan,pengetahuan dan kepatuhan dengan anemia kehamilan. |
| 5. | Indah Fitrisari (2018) | Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III di puskesmas Tegalrejo tahun 2018 | Survey analitik dengan <i>Cross Sectional</i> | 66 sampel | Instrumen penelitian menggunakan ceklist pada lembar pendokumenta sian peneliti. Dengan Metode uji korelasi Kendall's Tau. | Terdapat hubungan tingkat pendidikan, paritas, usia ibu, frekuensi ANC dengan kejadian anemia dan usia ibu memiliki keeratan hubungan paling erat dengan kejadian anemia di Puskesmas Tegalrejo tahun 2016 |

| No. | Peneliti/ Tahun | Judul | Metode | Jumlah sampel | Cara pengukuran | Hasil |
|-----|-----------------------------------|---|---|------------------|---|---|
| 6. | Indah Dzil Arsy (2019) | Pengaruh frekuensi konsumsi the dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Pembina Palembang pada tahun 2019 | Penelitian ini merupakan penelitian observasion al analitik dengan design cross sectional | 39 sampel | Menggunakan kuisisioner dan data sekunder mengenai hasil pemeriksaan Hb | Terdapat hubungan yang bermakna antara frekuensi konsumsi teh dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Pembina Palembang. |
| 7. | Nisa Kartika Wati (2020) | Faktor- faktor Yang berhubungan dengan anemia pada ibu hamil di puskesmas Sangkrah Surakarta | Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan crosssectiona l | 123 sampel | Dengan teknik exhaustive sampling menggunakan instrumen kuesioner dan Hb meter. | Hasilnya ada hubungan pendidikan , konsumsi makanan Fe, vitamin C, serta kebiasaan minum teh dan tidak ada hubungan pendapatan, paritas , umur ibu hamil ,serta jarak kehamilan dengan anemia pada ibu hamil |

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan faktor risiko yang memengaruhi anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021.

2. Tujuan Khusus Penelitian

- a. Mengetahui hubungan faktor umur terhadap kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021.
- b. Mengetahui hubungan faktor paritas terhadap kejadian anemia ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021.
- c. Mengetahui hubungan faktor frekuensi Antenatal Care (ANC) terhadap kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021.
- d. Mengetahui hubungan faktor pendidikan terhadap kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021.
- e. Mengetahui hubungan faktor pengetahuan terhadap kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021.
- f. Mengetahui hubungan faktor status gizi terhadap kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021.
- g. Mengetahui hubungan faktor kepatuhan mengonsumsi tablet besi terhadap kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti sendiri yaitu memperoleh suatu pengalaman luar biasa, menambah wawasan serta meningkatkan khasanah ilmu kesehatan tentang faktor risiko anemia yang terjadi pada ibu hamil trimester ketiga.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan kepastakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan informasi mengenai faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil dengan variabel yang lebih luas.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan informasi tambahan mengenai faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Anemia kehamilan

a. Definisi Anemia

Anemia kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin (Hb) dalam darahnya kurang dari 12 gr% (Winkjosastro, 2007). Anemia adalah kondisi dimana anemia dalam kehamilan yaitu kondisi ibu dengan kadar haemoglobin di bawah 11 gr% pada trimester 1 dan 3 atau kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gr % pada trimester 2. Nilai batas tersebut dan perbedaannya dengan wanita tidak hamil terjadi karena hemodilusi, terutama pada trimester 2 (Leny, 2019).

Anemia merupakan suatu kondisi atau keadaan ditandai dengan penurunan kadar hemoglobin (Hb), hematokrit atau jumlah sel darah merah. Kadar Hb dan sel darah sangat bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, ketinggian suatu tempat, serta keadaan fisiologi tertentu (Tamrin, Masud and Ramadani, 2019). Pada anemia jumlah sel darah merah berkurang, kualitas hemoglobin, dan volume hematokrit dibawah nilai normal per 100 ml darah. Ketika seseorang memiliki kadar hemoglobin kurang dari 12 g/100ml dalam darahnya, maka dia dikatakan menderita anemia. Sel darah merah atau Hb (hemoglobin menurun, sehingga daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi berkurang. Selama masa kehamilan, terjadi perubahan-perubahan dalam darah dan sumsum tulang serta kebutuhan zat-zat makanan pun bertambah, oleh karena itu anemia lebih sering dijumpai dalam kehamilan:

Tabel 1.1 *Anemia dalam kehamilan sesuai kadar Hb*

| Status Anemia | Kadar Hb |
|---|-------------|
| Trimester I (0-12 minggu) | <11 gr/dl |
| Trimester II (13-28 minggu) | <10,5 gr/dl |
| Trimester III (29 minggu-persalinan) | <11 gr/dl |

Sumber : (Price and Wilson, 2006)

b. Epidemiologi Anemia Kehamilan

Sumber data *The Nutrition Impact Model Study* didapatkan bahwa dari 257 sumber data yang mewakili populasi dari 107 negara, prevalensi global anemi pada ibu hamil sebesar 43% pada tahun 1995 dan 38% pada tahun 2011 dengan kisaran bervariasi dari 17% di negara maju dan 56,4% di negara berkembang (Fitriasari, 2018). Menurut World Health Organization telah dilaporkan bahwa prevalensi ibu hamil yang mengalami defisiensi besi sekitar 35-75% dan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan (Arsy, 2020).

Defisiensi besi dapat menyebabkan terjadinya anemia, berdasarkan data dari WHO sebanyak 40% kematian ibu dinegara berkembang berkaitan dengan anemia pada kehamilan dan kebanyakan anemia pada kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan perdarahan akut, bahkan dapat terjadi akibat keduanya saling berinteraksi (Proverawati, 2017). Berdasarkan data badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO) tahun 2018 melaporkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil di dunia adalah 41,8%. Diketahui, prevalensi anemia pada ibu hamil di dunia yaitu diperkirakan Afrika sebesar 57,1%, Asia 48,2% , Eropa 25,1% dan Amerika 24,1% (WHO, 2018)

Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun (Riskesdas, 2018). Sejalan dengan hal itu Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan pada tahun 2018 orang yang mengalami anemia ringan berjumlah 74.541 orang (62,54%) anemia sedang berjumlah 67.470 (58,12%) dan anemia berat berjumlah 10.768 (9,15%). Data pada tahun 2019 tercatat 91.020 (87,29%), sedangkan ibu hamil yang menderita anemia dari 104.271 ibu hamil yang memeriksakan diri diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu anemia ringan 3.467 (3,18%), anemia sedang 4127 (27,26%) dan anemia berat 417 (2,75%) (Dinas Kesehatan Kota Makassar,2020). Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan (Riskesdas, 2018)

c. Klasifikasi Anemia

Klasifikasi anemia dalam kehamilan menurut Wiknjosastro (2007), adalah sebagai berikut:

1) Anemia Defisiensi Besi

Anemia defisiensi besi adalah anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah. Menurut Irianto, etiologi anemia defisiensi besi pada kehamilan yaitu gangguan pencernaan dan absorpsi, hipervolemia, menyebabkan terjadinya pengenceran darah, kebutuhan zat besi meningkat, kurangnya zat besi dalam makanan, dan penambahan darah tidak sebanding dengan penambahan plasma.



Sumber : (Manuaba 2010)

Ibu hamil dengan anemia defisiensi besi dapat ditegakkan dengan diagnosis: konsentrasi Hb <10 gr%, hematokrit <30%, serum besi 50-60 mg/100ml dan saturasi transferrin <15-16. Untuk menegakkan diagnose anemia defisiensi besi dapat dilakukan dengan anamnesa. Hasil anamnesa didapatkan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang dan keluhan mual muntah pada hamil muda. Pemeriksaan darah dilakukan minimal dua kali selama kehamilan yaitu pada trimester I dan trimester III dengan pertimbangan bahwa sebagian ibu hamil mengalami anemia. Kebutuhan zat besi

pada ibu hamil yaitu mendekati 900 mg (Di *et al.*, 2020). Kebutuhan zat besi dari sekitar 300 mg diperlukan untuk janin dan plasenta 500 mg lagi digunakan untuk meningkatkan massa hemoglobin maternal, kurang lebih 200 mg akan di eksresikan melalui usus, urin dan kulit (Fatonah *et al.*, 2019). Pada pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat dilakukan minimal 2 kali selama kehamilan yaitu trimester I dan III. Hasil pemeriksaan Hb, dapat digolongkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penggolongan Anemia

| Nilai Hb | Kriteri |
|----------|---------------|
| >11 gr% | Tidak Anemia |
| 9-10 gr% | Anemia Ringan |
| 7-8 gr% | Anemia Sedang |
| <7 gr% | Anemia Berat |

Sumber : (WHO, 2011)

Penatalaksanaan pada ibu hamil dengan anemia defisiensi besi adalah mengatasi penyebab anemia seperti perdarahan, cacangan dan pemberian nutrisi yang banyak mengandung unsur zat besi, pemberian tablet besi selama kehamilan minimal 90 tablet sampai masa nifas selesai (Leny, 2019). Pengobatannya yaitu, keperluan zat besi untuk wanita hamil, tidak hamil dan dalam laktasi yang dianjurkan adalah pemberian tablet besi seperti terapi oral adalah dengan memberikan pret besi yaitu ferosulfat, feroglukonat atau Natrium ferobisitat, pemberian pret besi 60mg/hari dapat menaikkan kadar Hb sebanyak 1 gr% tiap bulan. Saat ini program nasional menganjurkan kombinasi 60 mg besi dan 50 nanogram asam folat untuk profilaksis anemia terapi parenteral baru diperlukan apabila penderita tidak tahan akan zat besi per oral, dan adanya gangguan penyerapan, penyakit saluran pencernaan atau masa kehamilannya tua (Andita, 2018).

Pemberian pret parenteral dengan ferum dextran sebanyak 1000 mg (20 mg) intravena atau 2x10ml/ IM pada gluteus, dapat meningkatkan Hb lebih cepat yaitu 2 gr% (Manuaba, 2010). Pemberian tablet besi sebaiknya dilakukan pada jeda makan, dimana lambung tidak banyak makanan sehingga mudah diserap. Akibat anemia zat besi pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan sel-sel termasuk sel otak, berat badan lahir rendah, lahir prematur, dan perdarahan (Fatonah *et al.*, 2019).

2) Anemia Megaloblastik

Anemia megaloblastik adalah anemia dalam kehamilan disebabkan karena defisiensi asam folik, jarang sekali karena defisiensi B12. Hal itu erat kaitannya dengan defisiensi makanan. Asam folat merupakan satu-satunya vitamin yang kebutuhannya berlipat dua ketika kehamilan. Kekurangan asam folat mengakibatkan peningkatan kepekaan, lelah berat, dan gangguan tidur. Kekurangan asam folat yang besar mengakibatkan anemia megaloblastik atau megalositik karena asam folat berperan dalam metabolisme normal makanan menjadi energi, pematangan sel darah merah, sintesis DNA, pertumbuhan sel, dan pembentukan heme (S and Triska, 2018).

Gejala anemia megaloblastik adalah diare, depresi, lelah berat, ngantuk berat, pucat, dan perlambatan frekuensi nadi Pengobatannya yaitu Konsumsi asam folat 15-30 mg /hari sulfus ferosus 3x1 tablet per hari. Pada kasus berat dan pengobatan per oral hasilnya lambat sehingga dapat diberikan transfusi darah (Fitriasari, 2018).

3) Anemia Hipoplastik

Anemia hipoplastik adalah anemia yang disebabkan oleh hipofungsi sumsum tulang yang kurang mampu membuat sel-sel darah baru. Untuk diagnostiknya diperlukan pemeriksaan pemeriksaan diantaranya adalah pemeriksaan darah tepi lengkap, pemeriksaan fungsi eksternal dan pemeriksaan retikulosit (Manuaba, 2012).

4) Anemia Hemolitik

Anemia hemolitik adalah anemia yang disebabkan oleh penghancuran sel darah merah yang lebih cepat dari pembuatannya. Wanita dengan anemia hemolitik sukar

menjadi hamil; apabila ia hamil, maka anemianya biasanya menjadi lebih berat. Gejala utama adalah anemia dengan kelainan- kelainan gambaran darah, kelelahan, kelemahan, serta gejala komplikasi bila terjadi kelainan pada organ-organ vital. Pengobatannya tergantung pada jenis anemia hemolitik dan beratnya anemia. Obat-obat penambah darah tidak memberi hasil. Tranfusi darah, kadang dilakukan berulang untuk mengurangi penderitaan ibu dan menghindari bahaya hipoksia janin (Ristica, 2018).

d. Penyebab Anemia

Penyebab anemia gizi besi dikarenakan kurang masuknya unsur zat besi dalam makanan, kebutuhan ibu hamil akan zat besi meningkat untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah sebesar 200-300%. Karena itu, suplementasi zat besi perlu sekali diberlakukan, bahkan pada wanita yang bergizi baik (Fitriasari, 2018). Penyebab langsung seperti berpantangan makanan tertentu selagi hamil dapat memperburuk keadaan anemia gizi besi, biasanya ibu hamil enggan makan daging, ikan, hati atau pangan hewani lainnya dengan alasan yang tidak rasional (Care *et al.*, 2020).

Selain karena adanya pantangan terhadap makanan hewani faktor ekonomi merupakan penyebab pola konsumsi masyarakat kurang baik, tidak semua masyarakat dapat mengkonsumsi lauk hewani dalam setiap kali makan. Padahal pangan hewani merupakan sumber zat besi yang tinggi absorsinya. Kekurangan besi dalam tubuh tersebut disebabkan karena kekurangan konsumsi makanan kaya besi, terutama yang berasal dari sumber hewani, bisa saja karena meningkatnya kebutuhan zat besi selama kehamilan, masa tumbuh kembang serta pada penyakit infeksi (malaria dan penyakit kronis lainnya seperti TBC), kehilangan zat besi yang berlebihan pada pendarahan termasuk pada saat haid, sering melahirkan dan adanya infeksi cacing serta ketidak seimbangan antara kebutuhan tubuh akan zat besi dibandingkan dengan penyerapan makanan (Leny, 2019).

Bahaya anemia yang dapat terjadi saat persalinan adalah gangguan his atau kekuatan mengejan, kala I berlangsung lama, kala II berlangsung lama yang menyebabkan kelelahan sehingga memerlukan tindakan operasi, pada kala III dapat diikuti retensio

plasenta serta perdarahan postpartum karena atoniauteri, dan pada kala IV dapat terjadi perdarahan postpartum sekunder serta atonia uteri. Pada masa nifas, dampak anemia dapat menyebabkan terjadinya subinvolusi uteri yang menimbulkan perdarahan postpartum, memudahkan terjadinya infeksi puerperium, pengeluaran ASI yang berkurang, terjadi dekompensasi kordis mendadak setelah persalinan, dan mudah terjadi infeksi mammae. Bahaya anemia terhadap janin, walaupun janin tampaknya dapat menyerap semua kebutuhan dari ibu, tetapi anemia tetap mengurangi kemampuan metabolisme tubuh sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Anemia dapat menyebabkan gangguan pada janin seperti abortus, kematian intrauterine, persalinan prematur, BBLR, kelahiran dengan anemia, cacat bawaan, bayi mudah mendapat infeksi, sampai kematian perinatal dan intelegensi yang rendah (Prawirohardjo, 2016).

e. Fisiologi Anemia Kehamilan

Perubahan fisiologis alami yang terjadi selama kehamilan akan mempengaruhi jumlah sel darah merah normal pada kehamilan, peningkatan volume darah ibu terutama terjadi akibat peningkatan plasma, bukan akibat peningkatana sel darah merah, walaupun ada peningkatan jumlah sel darah merah dalam sirkulasi, tetapi jumlahnya tidak seimbang dengan peningkatan volume plasma, ketidakseimbangan ini akan terlihat dalam bentuk penurunan kadar hemoglobin (Hb) (Prawirahardjo, 2010).

Pengenceran darah (hemodilusi) pada ibu hamil sering terjadi dengan peningkatan volume plasma 30%-40%, peningkatan sel darah merah 18%-30% dan hemoglobin 19%, secara fisiologi hemodilusi membantu meringankan kerja jantung. Hemodilusi terjadi sejak kehamilan 10 minggu dan mencapai puncaknya pada kehamilan 32-34 minggu. Kehamilan dapat meningkatkan kebutuhan zat besi sebanyak dua sampai tiga kali lipat. Zat besi diperlukan untuk produksi sel darah merah ekstra, untuk enzim tertentu yang dibutuhkan untuk jaringan, janin, plasenta dan untuk mengganti peningkatan kehilangan harian yang normal. Zat besi yang terkandung dalam makanan hanya diasorbsi kurang dari 10% dan diet bisa tidak dapat mencukupi kebutuhan zat besi ibu hamil. Kebutuhan

zat besi yang tidak terpenuhi selama kehamilan dapat menimbulkan konsekuensi anemia defisiensi besi sehingga dapat membawa pengaruh buruk pada ibu maupun janin, hal ini dapat menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan (St *et al.*, 2020).

f. Patofisiologi Anemia Kehamilan

Pada kehamilan terjadi perubahan fisiologi yang akan dialami ibu hamil, salah satunya perubahan sirkulasi darah. Peredaran darah ibu dipengaruhi oleh :(1) meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga dapat memenuhi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim, (2) terjadi hubungan langsung antara arteri dan vena pada sirkulasi darah retro-plasenter, (3) pengaruh hormon estrogen dan progesteron semakin meningkat. Akibat dari faktor tersebut dijumpai beberapa perubahan peredaran darah, yaitu volume darah dan sel darah. Kehamilan berhubungan dengan perubahan fisiologis yang berakibat pada peningkatan volume cairan dan sel darah merah serta penurunan konsentrasi protein pengikat zat gizi dalam sirkulasi darah, termasuk penurunan zat gizi mikro. Peningkatan produksi sel darah merah ini terjadi sesuai dengan pertumbuhan tubuh yang cepat dan penyempurnaan susunan organ tubuh. Adanya kenaikan volume darah pada saat kehamilan akan meningkatkan kebutuhan zat besi. Selama kehamilan terjadi peningkatan volume darah (*hypervolemia*) (Guyton and Hall, 2016).

Hypervolemia merupakan hasil dari peningkatan volume plasma dan eritrosit (sel darahmerah) yang berada dalam tubuh tetapi peningkatan ini tidak seimbang yaitu volume plasma peningkatannya jauh lebih besar sehingga memberi efek yaitu konsentrasi hemoglobin berkurang dari 12 gr/100 ml. Besi tidak hanya untuk pembentukan hemoglobin namun juga untuk elemen penting lainnya seperti, mioglobin, sitokrom, sitokrom oksidase, peroksidase, katalase. Rata-rata total jumlah besi dalam tubuh sebesar 4-5 gram, dan terdapat sekitar 65% dijumpai dalam bentuk hemoglobin. Sekitar 4% dalam bentuk mioglobin, 1% dalam bentuk berbagai macam senyawa *heme* yang memicu oksidasi intrasel; 0,1% bergabung dengan protein transferin dalam plasma darah, dari 15-30% disimpan untuk penggunaan selanjutnya terutama di sistem retikuloendotelial dan

sel parenkim hati, khususnya dalam bentuk *ferritin* (Sari, 2020).


Besi diabsorpsi di usus halus yang sebagian besar melalui mekanisme yang dimulai dari hati yang menyekresi *apotransferin* dalam jumlah sedang ke dalam empedu yang mengalir melalui duktus biliaris ke dalam duodenum. Di tempat ini, *apotransferin* berikatan dengan besi bebas dan juga dengan senyawa besi tertentu seperti hemoglobin dan mioglobin dari daging, yaitu dua sumber besi terpenting dalam diet. Kombinasi ini disebut *transferin*. Kombinasi ini selanjutnya tertarik dan berikatan dengan reseptor pada membran sel epitel usus. Kemudian, dengan cara pinositosis, molekul *transferin* yang membawa besi bersamanya, akan diabsorpsi ke dalam sel epitel dan kemudian dilepaskan ke dalam kapiler darah yang berada di bawah sel ini dalam bentuk transferin plasma. Absorpsi besi dari usus berlangsung sangat lambat, dengan kecepatan maksimum hanya beberapa mg/hari. Ini berarti bahwa meskipun dalam makanan terdapat sejumlah besar besi, hanya sebagian kecil saja yang dapat diabsorpsi (Guyton and Hall, 2016).

Pada trimester pertama kehamilan, zat besi yang dibutuhkan sedikit karena peningkatan produksi eritropoetin sedikit, karena tidak terjadi menstruasi dan pertumbuhan janin masih lambat. Sedangkan pada awal trimester kedua pertumbuhan janin sangat cepat dan janin bergerak aktif, yaitu menghisap dan menelan air ketuban sehingga lebih banyak membutuhkan oksigen. Akibatnya, kebutuhan zat besi semakin meningkat untuk mengimbangi peningkatan produksi eritrosit dan karena itu rentan untuk terjadinya anemia terutama anemia defisiensi besi (Fitriasari, 2018).

Darah akan bertambah banyak dalam kehamilan yang lazim disebut hidremia atau hipervolemia. Akan tetapi, bertambahnya sel darah kurang dibandingkan dengan bertambahnya plasma sehingga terjadi pengenceran darah. Perbandingan tersebut adalah sebagai berikut: plasma 30%, sel darah 18% dan haemoglobin 19%. Bertambahnya darah dalam kehamilan sudah dimulai sejak kehamilan 10 minggu dan mencapai puncaknya dalam kehamilan antar 32 dan 36 minggu. Secara fisiologis, pengenceran darah ini untuk membantu meringankan kerja jantung yang semakin berat dengan adanya kehamilan.

Penyebab anemia pada umumnya adalah karena kurang gizi (malnutrisi), kurang zat besi dalam diit, malabsorpsi, kehilangan darah banyak seperti persalinan yang lalu, haid dan lain-lain , penyakit kronik seperti TBC paru, cacing usus, malaria dan lain- lain. Perubahan fisiologi pada kehamilan terjadi ekspansi volume plasma relatif lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah sel darah merah (Guyton and Hall, 2016). Volume plasma naik sebanyak 40-45%, disproporsi ini paling besar saat trimester kedua. Pada trimester ketiga, volume plasma menurun dan masa hemoglobin meningkat. Diperkirakan selama kehamilan volume plasma meningkat tiga kali lebih banyak dibandingkan peningkatan eritrosit. Anemia pada kehamilan mempengaruhi vaskularisasi plasenta. Angiogenesis, yang terjadi pada masa awal kehamilan menjadi tidak optimal (Fitriasari, 2018).

Patofisiologi anemia



(Sumber : Guyton and Hall, 2016)

Gambar 1.1 Patofisiologi Anemia

h. Gejala Anemia

Tanda dan gejala ibu hamil dengan anemia adalah keluhan lemah, pucat, mudah pingsan, sementara tensi masih dalam batas normal (perlu dicurigai anemia defisiensi). Ibu hamil yang Mengalami malnutrisi akan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, malaise, lidah luka, nafsu makan turun (anoreksia), konsentrasi hilang, nafas pendek yaitu anemia sudah h dan keluhan mual, muntah lebih hebat pada hamil muda (Proverawati, 2017).

Gejala anemia defisiensi besi dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar yaitu gejala umum anemia, gejala khas akibat defisiensi besi, dan gejala penyakit dasar:

1. Gejala umum anemia berupa badan lemah, lesu, cepat lelah, mata berkunang-kunang, serta telinga berdenging. Anemia bersifat simptomatik jika hemoglobin telah turun dibawah 7 g/dl. Pada pemeriksaan fisik dijumpai pasien yang pucat, terutama pada konjungtiva dan jaringan dibawah kuku.
2. Gejala Khas defisiensi besi, gejala yang khas dijumpai pada defisiensi besi, tetapi tidak dijumpai pada anemia jenis lain adalah koilonychia, atrofi papil lidah, stomatitis angularis, disfagia, atrofi mukosa gaster sehingga menimbulkan akhloridia, pica.
3. Gejala penyakit dasar. Pada anemia defisiensi besi dapat dijumpai gejalagejala penyakit yang menjadi penyebab anemia defisiensi besi tersebut. Misalnya pada anemia akibat cacing tambang dijumpai dispepsia, parotis membengkak, dan kulit telapak tangan berwarna kuning seperti jerami.

Gejala anemia pada kehamilan yaitu ibu mengeluh cepat lelah, sering pusing, palpitasi, mata berkunang-kunang, malaise, lidah luka, nafsu makan turun (anoreksia), konsentrasi hilang, nafas pendek (pada anemia h) dan keluhan mual muntah lebih hebat pada hamil muda, perubahan jaringan epitel kuku, gangguan sistem neuromuskular, lesu, lemah, lelah, disfagia dan pembesaran kelenjar limpa (Andita, 2018).

i. Dampak Anemia Kehamilan

Anemia pada ibu hamil bukan tanpa risiko, melainkan tingginya angka kematian ibu berkaitan erat dengan anemia. Anemia juga menyebabkan rendahnya kemampuan jasmani karena sel - sel tubuh tidak cukup mendapatkan pasokan oksigen. Pengaruh anemia pada kehamilan, persalinan dan masa nifas adalah:

1. Pada wanita hamil, anemia meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Resiko kematian maternal, dapat terjadi abortus angka prematuritas, mudah terjadi infeksi, dan hyperemesis gravidarum. Pendarahan antepartum dan postpartum lebih sering dijumpai pada wanita yang anemia dan lebih sering berakibat fatal, sebab wanita yang anemia tidak dapat terhindar dari kehilangan darah (Fitriasari, 2018).
2. Bahaya saat persalinan seperti, gangguan his-kekuatan mengejan, kala pertama dapat berlangsung lama dan terjadi partus lama, Kala dua berlangsung lama, sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan serta kala empat dapat terjadi perdarahan postpartum sekunder dan atonia uteri (Yani, 2020).
3. Bahaya pada masa nifas yaitu, memudahkan infeksi mammae, pengeluaran ASI berkurang, terjadi dekompensasi kordis mendadak setelah persalinan dan terjadi anemia kala nifas (Ainy, 2019).
4. Dampak yang timbulkan akibat anemia gizi besi bagi janin menurut Ros dan Horton bahwa anemia gizi besi berdampak pada menurunnya kemampuan motorik anak, menurunnya skor IQ, menurunnya kemampuan kognitif, menurunnya kemampuan mental anak, menurunnya produktivitas kerja pada orang dewasa, yang akhirnya berdampak pada keadaan ekonomi , berat badan lahir rendah, bayi lahir premature, bayi mudah mendapat infeksi sampai kematian perinatal dan dapat terjadi cacat bawaan (Agustina, 2019).

j. Diagnosis Anemia pada Kehamilan

Beberapa ahli merekomendasikan skrining untuk anemia selama kehamilan pada trimester pertama (atau saat pemesanan) diikuti oleh 24-28 minggu dan pada 36 minggu

kehamilan. Untuk mendiagnosis anemia perlu dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin terlebih dahulu kemudian mencari penyebab anemia (Tandon, 2018).

Diagnosis anemia dalam kehamilan dapat ditegakkan dengan :

Anamnesa

Pada anamnesa akan didapatkan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, keluhan mual muntah, lebih berat pada hamil muda. Bila terdapat keluhan lemah, nampak pucat, mudah pingsan sementara tensi dalam batas normal, maka perlu dicurigai anemia defisiensi besi.

Pemeriksaan Fisik

Pada pemeriksaan fisik didapatkan :

1. Pada inspeksi wajah, ibu tampak lemah, kulit pucat, mudah pingsan, sementara tensi masih dalam batas normal, pucat pada membran mukosa dan konjunktiva karena kurangnya sel darah merah pada pembuluh kapiler dan pucat pada kuku serta jari.
2. Pada pemeriksaan palpasi kemungkinan di dapatkan splenomegali dan takhikardi.
3. Pada pemeriksaan auskultasi dapat terdengar bising jantung.

Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan darah dilakukan minimal 2 kali selama kehamilan yaitu pada trimester I dan III. Dengan melihat hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik maka diagnosa dapat dipastikan dengan pemeriksaan kadar Hb.

k. Penatalaksanaan Anemia

1. Terapi non medika mentosa yaitu :
 - a. Konsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi: hati, daging merah, sayuran hijau.
 - b. Selain itu meningkatkan konsumsi *enhancer* penyerapan besi: buah-buahan dan sayuran (vitamin c)
 - c. Menghindari atau menghambat penyerapan besi seperti kopi dan teh.
 - d. Edukasi mengenai gizi pada ibu hamil dengan anemia yang terbukti dapat meningkatkan kadar hemoglobin ibu.

2. Terapi medika mentosa yaitu :

- a. Pemberian pret besi oral perosulfat, peropumarat, atau peroglukonat. Dengan frekuensi pemberian satu kali sehari dilanjut sampai tiga bulan setelah melahirkan untuk mengembalikan cadangan besi, apabila obat oral tidak bisa ditoleransi dapat diberikan secara suntikan diberikan kepada pasien anemia berat hb <8 g/dl, pemberian tablet vitamin C (Fatonah *et al.*, 2019).
- b. Pemberian 120 mg *elemental iron* dan 0,4 mg asam folat pada wanita hamil yang terdiagnosa anemia. 30 mg *elemental iron* setara dengan 150 mg *ferrous sulfate*, 90 mg *ferrous fumarate* atau 250 mg *ferrous gluconate*.
- c. Terapi oral dengan konsumsi tablet besi atau TTD. Pemberian pret 60 mg/hari dapat menaikkan kadar Hb sebanyak 1 gr% per bulan. Konsumsi TTD sebaiknya dilanjutkan selama 2-3 bulan setelah kadar Hb mencapai nilai normal, untuk memperbaiki cadangan besi. Efek samping dari terapi ini adalah mual, muntah, dan konstipasi.
- d. Terapi parenteral dapat dilakukan jika pasien tidak dapat mentoleransi dengan konsumsi zat besi peroral, adanya gangguan penyerapan, atau penyakit saluran pencernaan. Rute parenteral bertujuan untuk mengembalikan kadar Hb dan mengisi besi hingga 50-100 mg. Pemberian pret parenteral dengan iron dextran sebanyak 1000 mg (20 mg) intravena atau 2x10 ml/IM pada gluteus, dapat meningkatkan Hb lebih cepat yaitu 2 g%.

Efek samping dari terapi ini adalah nyeri, inflamasi, demam dan hipotensi (Putri, 2018). Efek samping dari pemberian table besi peroral adalah mual, ketidaknyamanan epigastrium, kejang perut, konstipasi dan diare (Soebroto, 2015). Efek ini tergantung dosis yang diberikan dan dapat diatasi dengan mengurangi dosis dan meminum tablet segera setelah makan atau bersamaan dengan makanan. Efek samping dari pemberian besi feroral adalah mual, ketidaknyamanan epigastrium, kejang perut, konstipasi dan diare. Efek ini tergantung dosis yang diberikan dan dapat diatasi dengan mengurangi dosis dan meminum tablet segera setelah makan atau

bersamaan dengan makanan (Arsy, 2020).

1. Pencegahan Anemia

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan komunikasi yang efektif kepada semua ibu hamil tentang diet dan nutrisi merupakan bagian integral dari pencegahan anemia dalam kehamilan. Namun, penambahan zat besi sering kali tidak dapat dipenuhi oleh diet rutin, suplementasi zat besi secara teratur direkomendasikan oleh sebagian besar ahli selama kehamilan. Rekomendasi untuk suplementasi zat besi bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, CDC merekomendasikan agar semua wanita hamil memulai suplemen zat besi 30 mg per hari pada kunjungan prenatal pertama (Tandon, Jain and Malhotra, 2018).

Ibu hamil juga disarankan untuk banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, asam folat dan vitamin B12, untuk membentuk kembali sel-sel darah merah. Makanan yang dianjurkan adalah daging merah, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau, hati, ikan teri, daun pepaya, buah-buahan, dan susu) Pada ibu hamil, dengan rutin memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali selama hamil untuk mendapatkan Tablet Besi dan vitamin yang lainnya pada petugas kesehatan, serta makan makanan yang bergizi 3x1 hari dengan porsi 2 kali lipat lebih banyak (Giovanni, Prabowo and Fatmaningrum, 2019).

2. Kehamilan

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau proses menyatunya spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Berdasarkan kalender internasional kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 - 10 bulan bila dihitung dari saat terjadinya fertilisasi hingga lahirnya bayi. Kehamilan di bagi atas menjadi 3 trimester, yang dimana pada trimester satu akan berlangsung selama 12 minggu, trimester kedua akan berlangsung dalam 15 minggu (minggu ke-13 sampai minggu ke-27), dan trimester tiga selama 13 minggu (minggu ke- 28 sampai minggu ke-40) (St *et al.*, 2020).

Kehamilan trimester ketiga dikenal dengan waktu persiapan yang aktif dalam menanti kelahiran buah hati Fokus utama dari kehamilan trimester tiga ialah janin yang akan dilahirkan. Pergerakan janin dan penambahan ukuran uterus keduanya terus mengingatkan keberadaan bayi. Dampaknya, wanita yang sedang hamil akan menjadi over protektive terhadap bayinya, lebih fokus pada perawatan, dan spekulasi terhadap jenis kelamin atau wajah calon bayinya. Pada trimester ketiga, kecemasan akan muncul menjelang persalinan. Ibu akan sering membayangkan dan bertanya apakah dapat bersalin secara normal, cara mengejan, apakah akan terjadi sesuatu saat melahirkan, apakah bayinya lahir dehan selamat, akan sering muncul dalam benak ibu yang sedang hamil. Rasa nyeri saat melahirkan sudah menjadi pokok perbincangan dikalangan wanita. Oleh sebab itu terkhususnya calon ibu muda akan mengalami perasaan takut dan cemas dalam menghadapi kelahiran (S and Triska, 2018).

3. Usia

Usia adalah lama ukuran waktu untuk hidup atau adanya seseorang, terhitung sejak dilahirkan atau dia ada. Semakin dewasa usia seseorang maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih baik dalam berfikir maupun bekerja, hal ini dikarenakan dari pengalaman jiwa yang dialami akan mempengaruhi perilaku seseorang (Yanti, 2017). Usia juga mempengaruhi resiko kehamilan pada seorang wanita. Rentang usia yang memiliki resiko tinggi dalam kehamilan adalah kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, pada usia kurang dari 20 tahun kebutuhan zat besi meningkat dan pengetahuannya masih rendah tentang kehamilan sampai menyusui, demikian pula pada usia lebih dari 35 tahun kondisi fisik sudah menurun dan daya tahan tubuh juga tidak lagi optimal serta rentan terhadap komplikasi penyakit sehingga akan lebih beresiko untuk hamil. Usia yang aman untuk kehamilan dikenal juga dengan istilah reproduksi sehat yaitu dan antara 20 hingga 30 tahun, dikatakan aman karna kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada rentang usia tersebut ternyata 2 sampai 5 kali lebih rendah daripada kematian maternal yang terjadi di rentang usia kurang dari 20 atau pun lebih dari 30 tahun. Menurut Amiruddin (2007), bahwa ibu hamil yang berumur kurang dari 20 tahun dan

lebih dari 35 tahun yaitu 74,1% menderita anemia dan ibu hamil yang berumur 20 –35 tahun yaitu 50,5% menderita anemia. Wanita yang berumur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, mempunyai risiko yang tinggi untuk hamil, karena akan membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil maupun janinnya, beresiko mengalami pendarahan dan dapat menyebabkan ibu mengalami anemia (S and Triska, 2018).

Usia yang sudah matang akan mempengaruhi pola pikir seorang ibu, sehingga ibu akan patuh dalam perawatan kehamilan. Ibu hamil yang berusia 20 hingga 30 tahun telah masuk dalam rentang usia dewasa awal, dimana ibu mulai mengalami proses kematangan emosional dan mampu menerima informasi dengan baik serta mengambil keputusan yang tepat mengenai perilaku kesehatan seperti manfaat perawatan payudara selama kehamilan, sehingga ibu hamil akan semakin sadar untuk melakukan perawatan kehamilan (Prawirahardjo, 2016).

4. Paritas

Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang wanita. Menurut Manuaba (2008) paritas merupakan peristiwa dimana seorang wanita pernah melahirkan bayi dengan lama masa kehamilan antara 38 hingga 42 minggu. Paritas menurut Prawirahardjo (2009) dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- a. Primigravida yaitu wanita yang telah melahirkan seorang bayi dengan cukup umur dan hidup sehat
- b. Multi/multigravida yaitu wanita yang telah melahirkan seorang bayi hidup lebih dari satu kali
- c. Grandemulti yaitu wanita yang pernah melahirkan sebanyak lima kali atau lebih dan biasanya mengalami kesulitan dalam kehamilan dan persalinannya.

Kehamilan yang berulang dengan rentang waktu yang singkat akan menyebabkan cadangan besi di dalam tubuh ibu belum pulih dengan sempurna dan kemudian kembali terkuras untuk keperluan janin yang dikandung. Risiko ibu mengalami anemia dalam kehamilan salah satu penyebabnya adalah ibu yang sering melahirkan dan pada

kehamilan berikutnya ibu kurang memperhatikan asupan nutrisi yang baik dalam kehamilan. Hal ini disebabkan karena dalam masa kehamilan zat gizi akan terbagi untuk ibu dan untuk janin yang dikandung (Ristica, 2018).

Kecenderungan bahwa semakin banyak jumlah kelahiran (paritas), maka akan semakin tinggi angka kejadian anemia. Kehamilan yang berulang dengan rentang waktu yang singkat akan menyebabkan cadangan besi di dalam tubuh ibu belum pulih dengan sempurna dan kemudian kembali terkuras untuk keperluan janin yang dikandung. Jarak kehamilan juga merupakan hal penting untuk diperhatikan, Jarak kehamilan yang optimal adalah lebih dari 36 bulan kehamilan sebelumnya, sedangkan jarak kehamilan yang dekat adalah kurang dari 2 tahun (Sari, 2019). Jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat mengurangi manfaat yang diperoleh dari kehamilan sebelumnya, seperti uterus yang sudah membesar dan meningkatnya aliran darah ke uterus, sedangkan jika jaraknya terlalu pendek akan membuat ibu tidak memiliki waktu untuk pemulihan, kerusakan sistem reproduksi atau masalah postpartum (Prawirohardjo, 2016).

5. Frekuensi ANC (Antenatal Care)

Antenatal Care (ANC) adalah pengawasan sebelum persalinan terutama pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Pemeriksaan ANC secara rutin akan mendeteksi keadaan anemia ibu akan lebih dini, sebab pada tahap awal anemia pada ibu hamil jarang sekali menimbulkan keluhan bermakna. Keluhan timbul setelah anemia sudah ketahap yang lanjut. (Leny, 2019).

Pemeriksaan ANC selama hamil sedikitnya 4x pelayanan antenatal yaitu 1x untuk trimester I, 1x untuk trimester II, dan 2x untuk trimester III. melalui pemeriksaan ANC ibu dapat memperoleh penyuluhan kesehatan yang berhubungan dengan kehamilan seperti penyuluhan gizi dan makanan, serta mendapatkan tablet tambah darah dari petugas kesehatan. Pemeriksaan meliputi anamneses dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Bidan juga harus mengenal kehamilan resiko tinggi khususnya anemia kurang gizi, hipertensi.

Bidan juga memberikan nasehat dan penyuluhan kesehatan serta tugas terkait lainnya. Dalam setiap kunjungan ANC, bidan menonjolkan kepada ibu hamil apakah persediaannya cukup. Pemeriksaan ANC mempengaruhi tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet Fe (Sari, 2019).

6. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden ke dalam pengetahuan yang ingin diketahui atau diukur dan dapat disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pengetahuan (Arsy, 2020).

Pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya pada waktu penginderaan sehingga menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran (telinga), dan indra penglihatan (mata).

Pengetahuan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata tahu yang berarti mengerti sesudah (melihat, mengalami). Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman langsung maupun dari pengalaman orang lain yang sampai kepadanya. Selain itu, dapat juga melalui media komunikasi, seperti: radio, televisi, majalah atau surat kabar. Pengetahuan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal, salah satunya yaitu informasi/media massa. Informasi dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari data dan pengamatan terhadap dunia sekitar melalui komunikasi. Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (immediate impact)

sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan (S and Triska, 2018).

7. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha dalam mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan diluar sekolah (baik formal maupun nonformal) yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah proses untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok serta merupakan usaha untuk mendewasakan seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan mempengaruhi perilaku seseorang akan proses belajar, pola hidup, makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut menerima informasi. Pendidikan yang dijalani seseorang memiliki pengaruh pada peningkatan kemampuan berpikir, dengan kata lain seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan dapat mengambil keputusan yang lebih rasional, umumnya terbuka untuk menerima perubahan atau hal baru dibandingkan dengan individu yang berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan ibu hamil yang rendah mempengaruhi penerimaan informasi sehingga pengetahuan tentang anemia dan faktor-faktor yang berhubungan dengannya menjadi terbatas, terutama pengetahuan tentang pentingnya zat besi (Manuaba, 2010).

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki ibu. Pendidikan akan mempengaruhi terbentuknya pengetahuan, sikap maupun perilaku seseorang menjadi lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu hamil maka semakin baik pula tingkat kesadaran mengenai pentingnya kesehatan sehingga perilaku kesehatan juga akan semakin membaik. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dalam menerima informasi gizi, semakin tinggi pendidikan maka mempengaruhi terbentuknya pengetahuan, sikap, maupun perilaku menjadi lebih baik. Ibu hamil yang memiliki pendidikan tinggi akan memilih makanan yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Pendidikan dapat mengubah pola pikir manusia dalam memilih bahan makanan yang dikonsumsi. Ibu dengan tingkat pendidikan yang memadai dapat memilih makanan sumber zat besi untuk mencegah terjadinya anemia. Kepatuhan

Konsumsi Tablet Fe (Taye, Abeje and Mekonen, , 2019).

8. Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe

Kata kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti suka menurut (perintah), taat (aturan), dan berdisiplin (KBBI, 2015). Kepatuhan merupakan tindakan yang berkaitan dengan perilaku seseorang sendiri. Kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe, meliputi kepatuhan jumlah tablet yang dikonsumsi, cara mengkonsumsi tablet fe, waktu mengkonsumsi tablet fe, frekuensi tablet fe yang dikonsumsi. Suplementasi besi atau pemberian tablet Fe merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah dan menanggulangi anemia, khususnya anemia kekurangan besi. Suplementasi besi merupakan cara efektif karena kandungan besinya yang dilengkapi asam folat yang dapat mencegah anemia karena kekurangan asam folat (Khosman, 2013). Ibu hamil minimal mendapatkan 90 tablet dan bermanfaat bila diminum secara teratur,, tablet tambah darah diminum dengan air putih jangan diminum dengan air teh, susu, kopi karena dapat menurunkan penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya menjadi berkurang (Prawirohardjo, 2016).

9. Status Gizi Ibu Hamil

Status gizi ibu hamil adalah suatu keadaan keseimbangan dalam tubuh ibu hamil sebagai akibat pemasukan konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi yang digunakan oleh tubuh untuk kelangsungan hidup dalam mempertahankan fungsi-fungsi organ tubuh. Gizi ibu hamil di dapatkan dari makanan sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi ibu selama kehamilannya, dengan porsi dua kali makan orang yang tidak hamil (Fatonah *et al.*, 2019).

Status gizi ibu sebelum dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Bila status gizi ibu normal pada masa sebelum dan selama hamil kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan dengan berat badan normal. Dengan kata lain, kualitas bayi yang dilahirkan sangat bergantung pada keadaan gizi ibu sebelum dan selama hamil. Jika masukan gizi untuk ibu hamil dari

makanan tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh maka akan terjadi defisiensi zat gizi. Kekurangan zat gizi dan rendahnya derajat kesehatan ibu hamil masih sangat rawan, hal ini ditandai masih tingginya angka kematian ibu yang disebabkan oleh perdarahan karena anemia gizi dan KEK selama masa kehamilan (Leny, 2019).

Status gizi ibu hamil dapat diketahui dengan melakukan pengukuran lingkaran lengan atas (LILA). Pengukuran LILA cukup representatif, dimana ukuran LILA ibu hamil erat dengan IMT ibu hamil yaitu semakin tinggi LILA ibu hamil diikuti pula dengan semakin tinggi IMT. Ibu hamil dikatakan mengalami masalah gizi Kurang Energi Kronis (KEK) jika LILA-nya lebih kecil dari 23,5 cm. Penentuan status gizi pada ibu hamil menurut Kemenkes, RI (2015) adalah normal jika LILA $\geq 23,5$ cm dan KEK jika LILA $< 23,5$ cm. Selain status gizi perlu diperhatikan kondisi ibu hamil yang berisiko. Disebut ibu hamil risiko tinggi bila TB < 145 cm dan atau, BB < 45 kg pada seluruh usia kehamilan, Anemia bila Hb < 11 g/dl (Kesehatan, Vol and Tinggede, 2019).

Status gizi ibu hamil sangat mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungan, apabila status gizi ibu buruk, baik sebelum kehamilan atau pada saat kehamilan akan menyebabkan berat badan lahir rendah (BBLR) (Juliana, 2019). Disamping itu akan mengakibatkan terlambatnya pertumbuhan otak janin, anemia pada bayi baru lahir, bayi baru lahir mudah terinfeksi, abortus dan sebagainya. Untuk memperoleh anak yang sehat, ibu hamil perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi selama kehamilannya. Makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan janin yang dikandungnya (Farida, 2019). Dalam keadaan hamil, makanan yang dikonsumsi bukan untuk dirinya sendiri tetapi ada individu lain yang ikut mengkonsumsi makanan yang dimakan. Penambahan kebutuhan gizi selama hamil sangat penting seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, dan juga vitamin untuk menghindari penyakit pada kehamilan (Kesehatan, Vol and Tinggede, 2019).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain pendekatan *cross sectional* dengan menggunakan data kuantitatif untuk mengetahui hubungan faktor-faktor risiko kejadian *anemia* pada ibu hamil trimester ketiga.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Sudu dan Puskesmas Kalosi yaitu, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang, Kecamatan Alla.

3. Waktu Penelitian

Perkiraan waktu pada penelitian ini yaitu pada Mei 2021 – Juni 2021.

4. Variabel Penelitian

Variabel independen : Usia, Paritas, Frekuensi ANC, Pendidikan, Pengetahuan, Kepatuhan dan Status Gizi

Variabel dependen : Anemia pada kehamilan

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimester ketiga di Wilayah Puskesmas Kecamatan Alla yaitu Puskesmas Kalosi dan Puskesmas Sudu, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Desember - April tahun 2021.

b. Sampel

Sampel adalah populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak memenuhi kriteria eksklusi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan mengambil subjek tanpa memandang strata, random atau daerah tetapi

berdasarkan atas adanya pertimbangan tertentu atau tujuan tertentu dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilapangan (Sugiyono, 2013).

Cara pengambilan sampel dengan rumus *Slovin*

Jumlah populasi : Puskesmas kalosi 76 dan puskesmas sudu 94 populasi

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat signifikansi (p)

$$n = \frac{170}{1 + 170 (0,1^2)}$$

n = 62,9 sampel dibulatkan menjadi 63 sampel

Sehingga sampel pada penelitian ini adalah 63 ibu hamil trimester tiga di Wilayah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian.

1. Kriteria inklusi:

- a. Ibu hamil trimester ketiga (28-40 minggu) yang mengalami anemia
- b. Ibu yang berdomisili di kab Enrekang
- c. Ibu yang memeriksakan kehamilannya wilayah Puskesmas Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
- d. Bersedia menjadi responden dengan menyetujui lembar inform consent

2. Kriteria eksklusi:

- a. Ibu hamil yang mengalami kelainan darah lainnya
- b. Ibu hamil dengan kelainan ginjal, jantung, dan penyakit keganasan
- c. Ibu hamil yang menolak menjadi responden.

F. Cara Pengumpulan Data

a. Data Primer

Menggunakan data variabel independent yaitu seperti usia, paritas, frekuensi ANC, pendidikan, pengetahuan, kepatuhan mengonsumsi tablet Fe dan status gizi yang nantinya akan diperoleh dari kuesioner.


b. Data Sekunder

Dalam hal ini mencakup gambaran umum yang terkait dengan angka kejadian anemia yang terjadi pada ibu hamil trimester ketiga dilihat dari data rekam medik yang ada di puskesmas Kalosi dan puskesmas Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

G. Instrumen Penelitian


Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner tentang data demografi ibu hamil.

H. Kerangka Teori



Gambar 1.1 Kerangka Teori

I. Kerangka Konsep




Keterangan :

: Variabel Independen

: Variabel Dependen

Gambar 1.2 Kerangka Konsep

J. Kerangka Kerja



Gambar 1. 3 Kerangka Kerja

K. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang didapatkan dibuat dalam bentuk presentasi dan tabel distribusi frekuensi dengan pengolahan tabel kemudian dilakukan pengolahan secara sistematis dan harus melalui Langkah-langkah sebagai berikut :

a. Seleksi

Bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kategori

b. Editing

Dilakukan pengecekan kembali pada data yang telah didapatkan sebagai usaha untuk melengkapi data identitas responden

c. Koding

Memberikan kode-kode pada hasil data yang telah terkumpul.

Contoh dengan memberi kode atau tanda pada kuesioner yang telah terjawab oleh responden .

d. Tabulasi

Tabulasi dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan tujuan dan kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan sehingga mempermudah dalam analisis data

2. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi *Statistical for Social Science (SPSS)* yaitu dengan uji *Chi Square* untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat hubungan antar variable.

L. Penyajian Data

Data akan dijelaskan dalam bentuk narasi dan disajikan dalam tabel dan gambar.

M. Etika Penelitian

Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Puskesmas Sudu merupakan salah satu puskesmas yang berada di kecamatan Alla tepatnya di kelurahan Kambiolangi. Puskesmas Sudu berada di jalan poros Enrekang – Toraja Kel.Kambiolangi , Kec.Alla, Enrekang. Puskesmas Sudu merupakan faskes tingkat pertama BPJS kesehatan di kabupaten Enrekang. Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak ± 235 Km sebelah utara Makassar. Secara geografi Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara 3°14'36" sampai 3°50'00" Lintang Selatan dan 119°40'53" sampai 120°06'33" Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² yang secara topografi bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47–3.293 meter dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai.

Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47–3.293 meter dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah Enrekang didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Kabupaten Enrekang memiliki beberapa puncak gunung seperti Gunung Bambapuang, Gunung Latimojong, Gunung Sinaji, dan lain-lain.

Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2020 adalah sebanyak 194.401 jiwa yang terdiri dari 98.791 penduduk laki-laki dan 97.610 penduduk perempuan dengan sex ratio sebesar 101,21. Kepadatan penduduk Kabupaten Enrekang mencapai 109,97 jiwa/km². Terkhusus di wilayah kecamatan Alla sendiri terdapat 21.365 penduduk. Mayoritas warga di kecamatan Alla mempunyai pekerjaan sebagai petani dan juga wiraswasta. Secara administratif terdiri dari 5 desa dan 3 kelurahan, yaitu : Desa Bolang, Desa Mata Allo, Desa Pana, Desa Sumillan, Kelurahan Buntu Sugi, Kelurahan Kalosi dan Kelurahan Kambiolangi.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Sudu dan Puskesmas Kalosi di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Mulai Mei 2021 – Juni 2021.



Gambar 1.4 Peta Lokasi Penelitian

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 63 sampel. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. dengan menggunakan data kuantitatif untuk mengetahui faktor-faktor resiko kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga. Analisis data yang dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji *Chi Square*. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut:

M A K A S S A R

1. Analisis Univariat

Karakteristik Responden

Tabel 3.1 Distribusi Karakteristik Responden

| Karakteristik | Jumlah | |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| | n | % |
| Usia | | |
| Risiko Tinggi | 17 | 27.0 |
| Risiko Rendah | 46 | 73.0 |
| Pendidikan | | |
| Tidak Sekolah | 0 | 0 |
| SD | 3 | 4.8 |
| SMP | 9 | 14.3 |
| SMA | 27 | 42.9 |
| PT | 24 | 38.1 |
| Pekerjaan | | |
| IRT | 41 | 65.1 |
| Pegawai | 11 | 17.5 |
| Wiraswasta | 11 | 17.5 |
| Paritas | | |
| Primigravida | 39 | 61.9 |
| Multigravida | 24 | 38.1 |
| ANC (Antenatal care) | | |
| < 4 kali | 24 | 38.1 |
| = / > 4 Kali | 39 | 61.9 |
| Status gizi (LILA) | | |
| Buruk | 4 | 6.3 |
| Baik | 59 | 93.7 |
| Kadar Hb | | |
| Anemia Ringan | 25 | 39.7 |
| Anemia Sedang | 0 | 0 |
| Anemia Berat | 0 | 0 |
| Tidak Anemia | 38 | 60.3 |
| Pengetahuan tentang Hb | | |
| Tinggi | 50 | 79.4 |
| Rendah | 13 | 20.6 |
| Kepatuhan konsumsi tablet fe | | |
| Tinggi | 41 | 65.1 |
| Rendah | 22 | 34.9 |
| Total | 100 | 100,0 |

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan tabel di atas didapatkan distribusi usia responden terbagi menjadi 2 yaitu usia risiko tinggi dan usia risiko rendah. Pada penelitian ini usia risiko tinggi sebanyak 17 orang (27%) dan usia risiko rendah sebanyak 46 orang (73%) sehingga dari hasil tersebut ditemukan distribusi usia mayoritas pada penelitian ini yaitu usia risiko rendah.

Karakteristik pendidikan pada penelitian ini terbagi atas tingkatan SD, SMP, SMA dan PT. Distribusi pendidikan pada tingkatan SD sebanyak 3 orang (4,8%), SMP sebanyak 9 orang (14,3%), SMA sebanyak 27 orang (42,9%), dan PT sebanyak 24 orang (38,1%). Sehingga ditemukan distribusi pendidikan mayoritas pada tingkatan pendidikan SMA.

Karakteristik pekerjaan pada penelitian ini terbagi atas IRT, pegawai dan wiraswasta. Distribusi pekerjaan sebagai IRT sebanyak 41 orang (65%), Pegawai sebanyak 11 orang (17,5%), dan Wiraswasta sebanyak 11 orang (17,5%). Sehingga ditemukan distribusi pekerjaan mayoritas sebagai IRT.

Karakteristik paritas pada penelitian ini terbagi 2 yaitu paritas primi dan multi. Menurut Prawihardjo (2009) Primi yaitu wanita yang telah melahirkan seorang bayi dengan cukup umur dan hidup sehat. Sedangkan multi/multigravida yaitu wanita yang telah melahirkan seorang bayi hidup lebih dari satu kali. Pada penelitian ini distribusi Paritas Primi sebanyak 39 orang (61,9%) dan multi sebanyak 24 orang (38,1%). Sehingga ditemukan distribusi Paritas mayoritas pada Primi.

Karakteristik antenatal care atau ANC pada penelitian ini terbagi 2 berdasarkan jumlah kunjungan yaitu < 4 kali dan > 4 kali. Distribusi ANC pada penelitian ini yang < 4 Kali sebanyak 24 orang (38,1%) dan > 4 Kali sebanyak 39 orang (61,9%). Sehingga ditemukan distribusi ANC pada penelitian ini mayoritas > 4 Kali.

Karakteristik lingkaran lengan atas atau LILA pada penelitian ini terbagi 2 yaitu LILA buruk dan LILA baik. Adapun distribusi LILA buruk sebanyak 4 orang (6,3%) dan distribusi LILA baik sebanyak 59 orang (93,7%). Sehingga ditemukan distribusi LILA pada penelitian ini mayoritas baik.

Karakteristik Hb pada penelitian ini terbagi berdasarkan anemia ringan dan tidak anemia dengan perbandingan 1:1,5 untuk ibu hamil trimester ketiga. Adapun distribusi Hb berdasarkan anemia ringan sebanyak 25 orang (39,7%), anemia sedang sebanyak 0 orang (0%) sedangkan distribusi anemia berat sebanyak 0 orang (0%) dan distribusi Hb berdasarkan tidak anemia sebanyak 38 orang (60,3%). Sehingga ditemukan distribusi Hb pada penelitian ini mayoritas tidak anemia.

Karakteristik Pengetahuan tentang Hb dan tablet fe pada penelitian ini terbagi 2 yaitu tinggi dan rendah berdasarkan hasil penilaian kuisionernya. Adapun distribusi Pengetahuan tentang Hb dan tablet fe yang tinggi sebanyak 50 orang (79,4%) dan distribusi Pengetahuan tentang Hb dan tablet fe yang rendah sebanyak 13 orang (20,6%). Sehingga ditemukan distribusi Pengetahuan pada penelitian ini mayoritas memiliki pengetahuan yang tinggi.

Karakteristik Kepatuhan mengonsumsi tablet Fe pada penelitian ini terbagi 2 yaitu tinggi dan sedang. Adapun distribusi Kepatuhan mengonsumsi tablet Fe pada penelitian ini yaitu tinggi sebanyak 41 orang (65,1%) dan sedang sebanyak 22 orang (34,9%). Sehingga ditemukan distribusi Kepatuhan pada penelitian ini mayoritas tingkat kepatuhannya tinggi.

2. Analisis Bivariat

Tabel 3.2 Hubungan antara usia ibu hamil dengan anemia ibu hamil

| Variabel | Anemia | | Jumlah | Nilai p | | |
|----------|---------------|--------------|--------|---------|--------|-------|
| | Anemia | Tidak anemia | | | | |
| Usia | Risiko tinggi | n | 11 | 6 | 17 | 0,029 |
| | | % | 64,7% | 35,3% | 100,0% | |
| | Risiko rendah | n | 14 | 32 | 46 | |
| | | % | 30,4% | 69,6% | 100,0% | |

Sumber :Data Primer 2021

Pada hasil analisis data yang didapatkan yakni pasien trimester 3 yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 63 orang dengan total pasien yang beresiko tinggi (<20 tahun & >35 tahun) sebanyak 17 orang yang dimana termasuk anemia sebanyak 11 orang dan yang tidak anemia sebanyak 6 orang. Pada hasil di resiko rendah didapatkan jumlah pasien sebanyak 46 orang dengan pembagian 14 orang menderita anemia dan 32 orang tidak anemia.

Dari hasil analisis diatas itu dapat diketahui bahwa usia yang beresiko tinggi (<20 tahun & >35 tahun) dari sampel yang diteliti mayoritas menderita anemia dengan kategori anemia ringan dengan persentase (64,7%) sedangkan pada resiko rendah mayoritas tidak menderita anemia dengan persentase (69,6%).

Adapun nilai p yang didapatkan yakni 0,029 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada korelasi antara usia dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3 yang diteliti karena mencakup syarat $p < 0,05$ (terdapat kolerasi bermakna).

Tabel 3.3 Hubungan antara pendidikan ibu hamil dengan Anemia ibu hamil

| Variabel | | | Anemia | | Jumlah | Nilai p |
|------------|-----|---|--------|--------------|--------|---------|
| | | | Anemia | Tidak anemia | | |
| Pendidikan | SD | n | 3 | 0 | 3 | 0,007 |
| | | % | 100,0% | 0,0% | 100,0% | |
| | SMP | n | 2 | 7 | 9 | |
| | | % | 22,2% | 77,8% | 100,0% | |
| | SMA | n | 15 | 12 | 27 | |
| | | % | 55,6% | 44,4% | 100,0% | |
| | PT | n | 5 | 19 | 24 | |
| | | % | 20,8% | 79,2% | 100,0% | |

Sumber: Data primer 2021

Pada hasil analisis diatas menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan SD memiliki anemia ringan sebanyak 3 orang, untuk ibu dengan tingkat pendidikan SMP didapatkan 2 ibu menderita anemia dan 7 orang tidak anemia. Pada tingkat pendidikan SMA didapatkan ibu yang mengalami anemia 15 orang dan 12 orang tidak anemia serta pada ibu hamil dengan tingkat pendidikan terakhir perguruan tinggi didapatkan ibu anemia ringan sebanyak 5 orang dan tidak anemia sebanyak 19 orang.

Adapun nilai p yang didapatkan adalah 0,007 yang menandakan terdapat korelasi bermakna antara tingkat pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil terkhusus dengan sampel pada penelitian ini karena mencukupi syarat $p < 0,05$ yang menandakan adanya hubungan antara variabel.

Tabel 3.4 Hubungan antara paritas ibu hamil dengan Anemia ibu hamil

| Variabel | | | Anemia | | Jumlah | Nilai p |
|----------|--------------|---|--------|--------------|--------|---------|
| | | | Anemia | Tidak anemia | | |
| Paritas | Primigravida | n | 20 | 19 | 39 | 0,033 |
| | | % | 51,3% | 48,7% | 100,0% | |
| | Multigravida | n | 5 | 19 | 24 | |
| | | % | 20,8% | 79,2% | 100,0% | |

Sumber: Data primer 2021

Distribusi Paritas pada penelitian ini yaitu Primigravida sebanyak 39 orang (61,9%) dan multigravida sebanyak 24 orang (38,1%). Sehingga ditemukan distribusi Paritas mayoritas pada Primigravida. Adapun hubungan antara paritas dan terjadinya anemia ringan

adalah terdapat hubungan bermakna diantara keduanya karena mencukupi $p < 0,05$ yang menunjukkan ada korelasi antar kedua variabel.

Tabel 3.5 Hubungan antara frekuensi kunjungan ANC ibu hamil dengan Anemia ibu hamil

| Variabel | | Anemia | | Jumlah | Nilai p | |
|----------|------------|--------|--------------|--------|---------|-------|
| | | Anemia | Tidak anemia | | | |
| ANC | < 4 Kali | n | 14 | 10 | 24 | 0,035 |
| | | % | 58,3% | 41,7% | 100,0% | |
| | >=> 4 Kali | n | 11 | 28 | 39 | |
| | | % | 28,2% | 71,8% | 100,0% | |

Sumber : Data Primer 2021

Distribusi ANC pada penelitian ini yaitu < 4 Kali sebanyak 24 orang (38,1%) dan => 4 Kali sebanyak 39 orang (61,9%). Sehingga ditemukan distribusi ANC pada penelitian ini mayoritas => 4 Kali.

Adapun pada penelitian hubungan ANC dengan anemia ringan didapatkan ada korelasi bermakna karena mendapatkan hasil 0,035 yang mencakup syarat terdapat hubungan $< 0,05$.

Tabel 3.6 Hubungan antara status gizi (LILA) dengan Anemia ibu hamil

| Variabel | | Anemia | | Jumlah | Nilai p | |
|----------|-------|--------|--------------|--------|---------|-------|
| | | Anemia | Tidak anemia | | | |
| LILA | Buruk | n | 4 | 0 | 4 | 0.021 |
| | | % | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | Baik | n | 21 | 38 | 59 | |
| | | % | 35.6% | 64.4% | 100.0% | |

Sumber: Data Primer 2021

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan hubungan antara LILA dengan Hb ibu hamil. Hasil menunjukkan bahwa ibu hamil dengan LILA yang buruk disertai anemia kategori ringan sebanyak 4 responden (100%) dan tidak ada responden yang tidak anemia disertai. Sedangkan ibu hamil dengan LILA yang baik disertai anemia ringan sebanyak 24 responden (35.6%) dan 38 responden (64.4%) yang tidak anemia. Hasil uji *Chi Square* menunjukkan nilai P-Value sebesar 0.021 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara LILA dengan Hb ibu hamil.

Tabel 3.7 Hubungan antara Pengetahuan dengan Anemia ibu hamil

| Variabel | | Anemia | | Jumlah | Nilai p | |
|-------------|--------|--------|--------------|--------|---------|-------|
| | | Anemia | Tidak anemia | | | |
| Pengetahuan | Tinggi | n | 16 | 34 | 50 | 0.033 |
| | | % | 32.0% | 68.0% | 100.0% | |
| | Rendah | n | 9 | 4 | 13 | |
| | | % | 69.2% | 30.8% | 100.0% | |

Sumber : Data Primer 2021

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan hubungan antara pengetahuan anemia dan tablet fe dengan Hb ibu hamil. Hasil menunjukkan bahwa ibu hamil dengan pengetahuan yang tinggi disertai anemia dengan kategori anemia ringan sebanyak 16 responden (32%) dan sebanyak 34 responden (68%) yang tidak anemia. Sedangkan ibu hamil dengan pengetahuan yang rendah disertai anemia ringan sebanyak 9 responden (69.2%) dan 4 responden (30.8%) yang tidak anemia. Hasil uji *Chi Square* menunjukkan nilai P-Value sebesar 0.033 yang lebih kecil dari 0.05. hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara Pengetahuan dengan anemia pada ibu hamil.

Tabel 3.8 Hubungan antara Kepatuhan Konsumsi tablet Fe dengan Anemia ibu hamil

| Variabel | | Anemia | | Jumlah | Nilai p | |
|-----------|--------|--------|--------------|--------|---------|-------|
| | | Anemia | Tidak anemia | | | |
| Kepatuhan | Tinggi | n | 7 | 34 | 41 | 0.000 |
| | | % | 17.1% | 82.9% | 100.0% | |
| | Rendah | n | 18 | 4 | 22 | |
| | | % | 81.8% | 18.2% | 100.0% | |

Sumber : Data Primer 2021

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan Hb ibu hamil. Hasil menunjukkan bahwa ibu hamil dengan kepatuhan yang tinggi disertai anemia ringan sebanyak 7 responden (17.1%) dan sebanyak 34 responden (82.9%) yang tidak anemia. Sedangkan ibu hamil dengan kepatuhan yang rendah disertai anemia ringan sebanyak 18 responden (81.8%) dan 4 responden (18.2%) yang tidak anemia. Hasil uji *Chi Square* menunjukkan nilai P-Value sebesar 0.00 yang lebih kecil dari 0.05. hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan Hb ibu hamil.

3. Pembahasan

A. Hubungan antara Usia dengan anemia pada ibu hamil

Usia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usia ibu pada saat kehamilan terakhir. Pada penelitian ini, risiko anemia pada ibu hamil berdasarkan usia dibagi 2 yaitu usia resiko tinggi <20 tahun & >35 tahun dan usia risiko rendah 20-35 tahun. Usia <20 tahun & >35 tahun dikategorikan kedalam usia risiko tinggi karena ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun diketahui bahwa organ dalam tubuh masih dalam proses pematangan dan perkembangan, salah satunya adalah sistem reproduksi. Untuk memenuhi perkembangan reproduksi tubuh, pasokan berbagai nutrisi tetap dibutuhkan, sehingga jika seorang ibu hamil di usia ini, tentu kebutuhan nutrisi akan meningkat dibandingkan dengan wanita yang hamil di atas usia 20 tahun. Jika nutrisi yang dibutuhkan tubuh tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan anemia..

Berdasarkan hasil penelitian pada ibu hamil yakni pasien trimester ketiga yang dilakukan dengan total pasien yang beresiko tinggi (<20 tahun & >35 tahun) sebanyak 17 orang yang termasuk anemia sebanyak 11 orang dan yang tidak anemia sebanyak 6 orang. Pada hasil di resiko rendah didapatkan jumlah pasien sebanyak 46 orang dengan pembagian 14 orang menderita anemia dan 32 orang tidak anemia. Mayoritas menderita anemia dengan kategori anemia ringan dengan persentase (64,7%) sedangkan pada resiko rendah mayoritas tidak menderita anemia dengan persentase (69,6%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pernikahan sudah berada direntang usia 20-35 tahun sehingga mayoritas kehamilan berada pada usia tinggi dan sebagian besar mengalami anemia dengan kategori anemia ringan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Andini Majidah (2017) menjelaskan bahwa pada tingkat umur yang berbeda, terdapat varian kebutuhan zat besi setiap hari. Konsentrasi HB yang rendah berhubungan dengan usia ibu yang akstrime (terlalu tua atau terlalu muda). Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan (Susianty,2017) yang menjelaskan bahwa pada ibu hamil trimester III (Ketiga) dengan kategori usia berapapun yaitu saat kehamilan mencapai 8-10 bulan (28-40 minggu), masa kematangan, peningkatan kualitas gizi sangat penting karena pada tahap ini ibu mulai menyiapkan lemak dan zat gizi lain sebagai cadangan pembentukan air susu ibu (ASI). Masa ini penambahan berat badan mencapai kurang lebih 3 kg. Wanita hamil cenderung terkena anemia pada trimester III karena pada masa ini janin menimbun cadangan zat besi untuk dirinya sendiri sebagai persediaan bulan pertama setelah lahir atau kadar Hb dibawah 11 gr%.

Berdasarkan teori, bahwa ibu hamil dengan umur 15-24 tahun merupakan salah satu presiktor independen anemia pada ibu hamil. Sedangkan pada ibu hamil di atas usia 35 tahun cenderung mengalami anemia disebabkan karena pengaruh turunnya cadangan zat besi dalam tubuh. Pada kehamilan pertama pada wanita berusia di atas 35 tahun juga akan mempunyai risiko penyulit persalinan dan mulai terjadinya penurunan fungsi-fungsi organ reproduksi (Andini Majidah, 2017). Usia yang aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-35 tahun. Komplikasi maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia dibawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Dampak dari usia yang kurang, dapat menimbulkan komplikasi selama kehamilan (Andini Majidah, 2017).

Menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia ibu hamil bermakna secara signifikan terhadap kejadian anemia sehingga usia merupakan faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga. Menurut peneliti, hal ini terjadi karena ibu yang memiliki umur berisiko tinggi yaitu dengan usia <20 tahun berisiko anemia karena pada kelompok umur tersebut perkembangan biologis yaitu reproduksi belum optimal atau belum matang sepenuhnya sedangkan kehamilan pada usia > 35 tahun merupakan kehamilan yang berisiko tinggi. Sejalan dengan teori, wanita hamil dengan umur >35 tahun juga akan rentan mengalami anemia. Hal ini dikarenakan daya tahan tubuh mulai menurun pada usia 35 tahun keatas dan mudah terkena berbagai infeksi selama masa kehamilan. Kondisi biologis maupun psikologis ibu menjadi alasan utamanya. Dalam usia reproduksi yaitu 20-35 tahun tubuh akan mudah kehilangan zat besi oleh banyak sebab yaitu haid dan nifas, jika dalam usia ini mengalami kehamilan, tuntutan pemenuhan zat besi didalam kehamilan menjadi salah satu faktor pencetus untuk ibu dalam usia reproduksi mengalami anemia dalam kehamilannya.

B. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan anemia pada ibu hamil

Tingkat pendidikan yaitu pendidikan terakhir yang pernah ditempuh oleh seorang ibu. Pendidikan adalah suatu proses belajar, yang artinya terjadi suatu proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan dalam pendidikan menuju individu, kelompok atau masyarakat yang lebih matang, lebih baik dan lebih dewasa. Berdasarkan hasil penelitian pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla dengan tingkat pendidikan SD memiliki anemia ringan sebanyak 3 orang, untuk ibu dengan tingkat pendidikan SMP didapatkan 2 orang (22,2%) menderita anemia dan 7 orang (77,8%) tidak anemia. Pada

tingkat pendidikan SMA didapatkan ibu yang mengalami anemia 15 orang (22,6%) dan 12 orang (44,4%) tidak anemia, serta pada ibu hamil dengan tingkat pendidikan terakhir perguruan tinggi didapatkan ibu anemia ringan sebanyak 5 orang (20,8%) dan tidak anemia sebanyak 19 orang (79,2%). Penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian anemia lebih tinggi pada ibu hamil dengan pendidikan rendah daripada ibu dengan pendidikan tinggi.

Berdasarkan teori, pendidikan berkaitan dengan peningkatan kemampuan berpikir seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin luas juga wawasannya untuk menerima suatu informasi termasuk informasi kesehatan. Pada penelitian ini meneliti tingkat pendidikan seorang ibu karena tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang karena kemampuan seseorang untuk menerima dan memahami sesuatu ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Orang dengan pendidikan tinggi menerima dan memahami lebih baik daripada orang dengan pendidikan rendah. tingkat pendidikan seseorang dapat menunjang atau mempengaruhi tingkat pengetahuan, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya. Pengetahuan adalah kumpulan informasi yang digunakan dan diperoleh melalui suatu proses dalam kehidupan sebagai sarana penyesuaian diri dan lingkungan (Ermawati, 2019).

Menurut (Edison, 2019). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memengaruhi pengetahuan dan pemahaman informasi yang lebih baik mengenai gizi dibandingkan dengan seseorang yang memiliki pendidikan lebih rendah. Tingkat pendidikan seseorang akan memengaruhi pemilihan makanan sehari-hari, baik sikap maupun perilakunya. Pemilihan yang dilakukan seringkali berdampak pada asupan yang dikonsumsi setiap hari sehingga memengaruhi keadaan gizi individu yang bersangkutan, termasuk status anemia.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariza (2016) yang melakukan analisis menggunakan chi-square, dengan hasil P-Value 0,026 sehingga P-Value $< \alpha$ (0,05) H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat Pendidikan dengan anemia. Pendidikan ibu tingkat pendidikan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang untuk bertindak dan mencari penyebab serta solusi dalam hidupnya. Orang yang berpendidikan tinggi biasanya akan bertindak lebih rasional. Oleh karena itu orang yang berpendidikan akan lebih mudah menerima gagasan baru. Demikian halnya dengan ibu yang berpendidikan tinggi akan memeriksakan kehamilannya secara teratur demi menjaga keadaan kesehatan dirinya dan anak dalam kandungannya (Mariza,2017).

Menurut peneliti, hasil penelitian ini memiliki hubungan yang bermakna terhadap kejadian anemia sehingga pendidikan merupakan faktor risiko kejadian anemia. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu ibu hamil dengan Pendidikan rendah kurang memperhatikan kesehatan kehamilannya. Wanita yang memiliki pendidikan menengah atau lebih tinggi lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi anemia dibandingkan dengan yang lainnya karena ibu dengan pendidikan tinggi memperhatikan keteraturan kunjungan pemeriksaan ANC dan memperhatikan asupan gizi yang di butuhkan ibu hamil. Ibu hamil akan lebih mudah menyeimbangkan pola konsumsi dan pemenuhan gizinya jika pendidikan yang ditempuh semakin tinggi. Asupan gizi yang diperoleh akan tercukupi apabila pola konsumsinya sesuai sehingga memiliki kemungkinan yang besar untuk terhindar dari anemia dalam kehamilannya.

C. Hubungan antara paritas dengan anemia pada ibu hamil

Paritas merupakan jumlah janin yang pernah dilahirkan dengan berat badan lebih 500 gram atau umur kehamilan lebih 24 minggu. Pada penelitian ini menilai jumlah paritas seorang ibu karena semakin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan kelahiran akan semakin banyak kehilangan zat besi. Berdasarkan hasil penelitian ini pada ibu hamil Primigravida sebanyak 39 orang (61,9%) dan multigravida sebanyak 24 orang (38,1%). Sehingga ditemukan paritas yang mayoritas mengalami anemia yaitu pada primigravida. Hal ini menunjukkan bahwa Paritas mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, semakin sering seorang wanita hamil dan melahirkan maka risiko mengalami anemia semakin besar karena kehamilan menguras cadangan zat besi dalam tubuh.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Wiwin (2016) didapatkan bahwa persentase tertinggi paritas primi sebanyak 48 orang (53,3%), kelompok kontrol dan kelompok kasus masing-masing sebanyak 45 orang (50%). Paritas 1 dan paritas tinggi (lebih dari 3) mempunyai angka kematian maternal lebih tinggi. Lebih tinggi paritas, lebih tinggi kematian maternal. Risiko pada paritas 1 dapat ditangani dengan asuhan obstetrik lebih baik, sedangkan risiko pada paritas tinggi dapat dikurangi atau dicegah dengan keluarga berencana. Paritas menunjukkan hubungan sebab akibat dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Paritas >3 orang menyebabkan anemia kehamilan 3,2 kali dibandingkan dengan paritas 1-3 orang. Hasil penelitian ini ditunjang oleh teori yang menyebutkan bahwa seorang

ibu yang sering melahirkan mempunyai risiko mengalami anemia pada kehamilan berikutnya apabila tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi, karena selama hamil zat-zat gizi akan berbagi untuk ibu dan janin yang dikandungnya. Semakin sering seorang wanita melahirkan maka semakin besar risiko kehilangan darah dan berdampak pada penurunan kadar Hb. Setiap kali wanita melahirkan, jumlah zat besi yang hilang diperkirakan sebesar 250mg (Wikjosastro, 2009).

Menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paritas bermakna secara signifikan terhadap kejadian anemia sehingga merupakan faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Menurut peneliti, hal ini terjadi karena sejalan dengan teori yaitu semakin sering seseorang mengalami kehamilan akan semakin banyak kehilangan zat besi yang diakibatkan oleh kehamilan dan persalinan sebelumnya. Selain itu, kehamilan berulang dalam waktu singkat menyebabkan cadangan zat besi ibu yang belum pulih akhirnya terkuras untuk keperluan janin yang dikandung bukan anak per pertama, jarak kelahiran yang pendek mengakibatkan fungsi alat reproduksi masih belum optimal. Ibu hamil yang sering melahirkan dan pada kehamilan berikutnya ibu kurang memperhatikan asupan nutrisi yang baik dalam kehamilan. Hal ini disebabkan karena dalam masa kehamilan zat gizi akan terbagi untuk ibu dan untuk janin yang dikandung.

D. Hubungan antara frekuensi kunjungan ANC dengan anemia pada ibu hamil

Frekuensi kunjungan ANC merupakan banyaknya kunjungan ibu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Pada penelitian ini menilai jumlah kunjungan ibu karena ANC dapat menilai mengetahui dan mengidentifikasi masalah yang timbul selama kehamilan, sehingga kesehatan selama kehamilan dapat dipelihara dan yang terpenting ibu dan bayi dalam kandungan akan baik dan sehat sampai saat persalinan (Nurmasari, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian pada ibu hamil trimester ketiga dengan kunjungan ANC < 4 Kali berjumlah 24 orang (38,1%) dan ibu hamil dengan kunjungan ANC \geq 4 Kali berjumlah 39 orang (61,9%). Sehingga didapatkan ibu hamil yang mengalami anemia yaitu ibu hamil yang melakukan kunjungan < 4 Kali. Sehingga dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ibu hamil yang tidak teratur melakukan kunjungan antenatal care (ANC) beresiko mengalami anemia. Hal ini dikarenakan ibu hamil akan mendapatkan pemeriksaan anemia secara dini, mendapatkan konseling gizi yang tepat dan mendapatkan

suplemen besi dan asam folat yang lengkap serta pendidikan kesehatan yang memadai, sehingga faktor risiko anemia dapat ditekan. Pelayanan ANC yang baik dan teratur akan mempermudah ibu hamil untuk memperoleh tablet Fe.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Veni (2019) menunjukkan bahwa ibu hamil yang tidak teratur melakukan kunjungan ANC mengalami kejadian anemia (80%), sedangkan ibu hamil yang melakukan kunjungan ANC secara teratur tidak mengalami anemia (80%). Ketidakteraturan ibu melakukan ANC dikarenakan banyak ibu hamil yang baru memeriksakan kehamilannya di trimester II dan III. Berdasarkan dari hasil analisis hubungan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keteraturan kunjungan ANC dengan kejadian anemia ($p=0,001$), dengan korelasi cukup ($r=0,514$) dan dari penelitian ini juga diketahui bahwa responden yang tidak teratur melakukan kunjungan ANC memiliki risiko 4 kali lebih besar untuk terjadi anemia daripada responden yang teratur melakukan kunjungan ANC. Ibu hamil yang melakukan pelayanan ANC lengkap akan memiliki risiko anemia lebih rendah.

Menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan frekuensi kunjungan antenatal care (ANC) merupakan faktor risiko terjadinya anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Menurut peneliti ibu hamil yang malas melakukan kunjungan ANC memiliki resiko lebih besar mengalami anemia daripada ibu hamil yang teratur melakukan kunjungan antenatal care (ANC). Penelitian ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang tidak teratur melakukan kunjungan ANC mengalami kejadian anemia (80%), sedangkan ibu hamil yang melakukan kunjungan ANC secara teratur tidak mengalami anemia (80%). Sejalan dengan teori, pelayanan ANC yang baik dan teratur akan mempermudah ibu hamil untuk memperoleh tablet Fe. Melalui pemberian tablet Fe dapat meningkatkan kadarhemoglobin darah selama masa kehamilan sehingga apabila dilakukan ANC secara teratur dengan ketaatan konsumsi tablet Fe pada akhirnya akan mencegah terjadinya anemia.

E. Hubungan antara status gizi (LILA) dengan anemia pada ibu hamil

Pada penelitian ini untuk pengukuran status gizi menggunakan indikator LILA. Pengukuran berdasarkan LILA untuk mendeteksi dini KEK terutama pada ibu hamil. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hubungan antara LILA dengan anemia ibu hamil trimester ketiga dengan LILA yang buruk disertai anemia kategori ringan sebanyak 4 responden (100%) dan tidak ada responden yang tidak anemia disertai. Sedangkan ibu hamil

dengan LILA yang baik disertai anemia ringan sebanyak 24 responden (35.6%) dan 38 responden (64.4%) yang tidak anemia . Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan antara status gizi. Dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah Kecamatan Alla.

Sejalan dengan teori bahwa, kebutuhan nutrisi pada kehamilan di setiap periode trimester sangat berbeda-beda, semakin bertambah usia kehamilan semakin tinggi kebutuhan nutrisi, sehingga sangat pentingnya intervensi untuk menjangkau wanita sebelum dan selama kehamilan agar kebutuhan nutrisinya terkontrol dan menargetkan untuk menekan terjadinya malnutrisi selama tahapan 1000 hari pertama. Selama kehamilan masalah gizi sangat berdampak pada ibu dan janin, sehingga sangat diperlukan perhatian khusus. Pola makan yang tidak memadai selama kehamilan dapat menyebabkan ibu hamil kekurangan gizi yang akan berdampak terjadi anemia.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini yang berjudul “Hubungan lingkaran lengan atas (LILA) dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester I di wilayah kerja puskesmas Dukuh Klopo Kecamatan peterongan Kabupaten Jombang” pada penelitian tersebut menemukan bahwa dari 25 responden dengan LILA > 23,5 cm juga memiliki Hb > 11 gr/dL sedangkan responden dengan LILA < 23,5 sebanyak 5 orang dengan kadar hb < 11 gr/dL sebanyak 2 orang dan hb>11gr/dL sebanyak 3 orang dengan hasil uji *Chi-Square* seberar 0,001 (Aini, 2017).

Menurut peneliti, hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan status gizi merupakan faktor resiko terjadinya kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla. Menurut peneliti, hal ini dapat disebabkan ibu yang tidak menjaga gizi selama kehamilannya lebih mudah mengalami anemia dibanding ibu hamil dengan status gizi yang baik yaitu dengan memperhatikan asupan kebutuhan gizi selama hamil tidak mudah untuk mengalami anemia. Berdasarkan teori, faktor-faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil sehingga mempengaruhi pengukuran LILA diantaranya umur, berat badan, suhu lingkungan, aktivitas, status kesehatan, pengetahuan zat gizi dalam makanan, kebiasaan dan pandangan wanita terhadap makanan, dan status ekonomi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi anemia pada kehamilan diantaranya umur, paritas, jarak kehamilan, frekuensi ANC, dan status gizi. Didapatkan faktor-faktor yang sama dapat mempengaruhi status lingkaran lengan atas maupun kadar hemoglobin. Menurut peneli, gizi kurang pada ibu hamil dapat mengakibatkan terjadinya risiko dan komplikasi pada ibu seperti anemia.

F. Hubungan antara Pengetahuan dengan anemia pada ibu hamil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hubungan antara pengetahuan dengan anemia ibu hamil dengan pengetahuan yang tinggi disertai anemia ringan sebanyak 16 responden (32%) dan sebanyak 34 responden (68%) yang tidak anemia. Sedangkan ibu hamil dengan pengetahuan yang rendah disertai anemia ringan sebanyak 9 responden (69.2%) dan 4 responden (30.8%) yang tidak anemia. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu hamil memengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.

Pada penelitian ini bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku kesehatan. Apabila ibu hamil mengetahui dan memahami akibat anemia dan cara mencegah anemia akan mempunyai perilaku kesehatan yang baik sehingga diharapkan dapat terhindar dari berbagai akibat atau risiko terjadinya anemia kehamilan. Perilaku yang demikian dapat berpengaruh terhadap penurunan kejadian anemia pada ibu hamil (Ni Made, 2021).

Berdasarkan teori, pengetahuan yang kurang tentang anemia mempunyai pengaruh terhadap perilaku kesehatan khususnya khususnya pada ibu hamil, akan berakibat pada kurang optimalnya perilaku kesehatan ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia kehamilan. Ibu hamil yang mempunyai pengetahuan kurang tentang anemia dapat berakibat pada kurangnya konsumsi makanan yang mengandung zat besi selama kehamilan yang dikarenakan oleh ketidaktahuannya, sehingga pengetahuan mengenai anemia penting diketahui oleh ibu hamil. Pengetahuan ibu hamil dapat dikatakan sangat penting terutama yang berkaitan dengan ANC yang mana didalamnya mencakup seputar masalah kehamilan baik itu masalah pertumbuhan janin, perawatan selama masa kehamilan, deteksi dini tanda bahaya dimasa kehamilan, dll. Jadi, jika tingkat pengetahuan seorang ibu hamil kurang maka mereka tidak tahu langkah yang seharusnya diambil untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri dan janin selama masa kehamilan (Safitri & Lubis, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitaningrum (2018) yang berjudul “Hubungan pengetahuan tentang anemia, pendidikan ibu, konsumsi tablet Fe dengan kadar Hb pada ibu hamil trimester iii di Rumah bersalin Bhakti Ibu Kota Semarang” pada penelitian tersebut didapatkan data Berdasarkan diagram scatter menunjukkan hubungan kuat dengan arah hubungan positif, semakin tinggi pengetahuan tentang anemia akan diikuti dengan semakin tinggi kadar Hb ibu hamil trimester III. Ada

kecenderungan terjadi kenaikan kadar hemoglobin searah dengan makin bertambahnya pengetahuan pada ibu hamil. Pada penelitian tersebut mengatakan bahwa Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan ibu hamil khusus dengan anemia semakin berkurang resiko ibu mengalami anemia.

Menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan bermakna secara signifikan terhadap kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah kecamatan Alla dan merupakan faktor risiko kejadian anemia., Pengetahuan ibu hamil sangat penting terutama yang berkaitan dengan kunjungan ANC yang mana didalamnya mencakup seputar masalah kehamilan baik itu masalah pertumbuhan janin, perawatan selama masa kehamilan, deteksi dini tanda bahaya dimasa kehamilan. Sehingga disimpulkan bahwa jika tingkat pengetahuan seorang ibu hamil kurang maka perhatian untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri dan janin selama masa kehamilan kurang baik.

G. Hubungan antara Kepatuhan Konsumsi tablet Fe dengan anemia ibu hamil

Kepatuhan mengonsumsi tablet Fe adalah sikap yang diambil oleh ibu hamil sesuai anjuran dan petunjuk petugas medis dalam mengonsumsi tablet Fe. Pencegahan dan penatalaksanaan anemia dapat dilakukan dengan pemberian suplementasi tablet Fe selama kehamilan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan zat besi meningkat dan tidak bisa hanya tercukupi dari asupan saja, sehingga perlu adanya suplementasi selama kehamilan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan proporsi anemia pada ibu hamil dengan kepatuhan yang tinggi disertai anemia ringan sebanyak 7 responden (17.1%) dan sebanyak 34 responden (82.9%) yang tidak anemia. Sedangkan ibu hamil dengan kepatuhan yang rendah disertai anemia ringan sebanyak 18 responden (81.8%) dan 4 responden (18.2%) yang tidak anemia. Hasil uji *Chi Square* menunjukkan nilai P-Value sebesar 0.00 yang lebih kecil dari 0.05. hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan Hb ibu hamil.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pulungan (2019) yang berjudul “Hubungan kepatuhan mengonsumsi tablet fe dengan anemia pada ibu hamil trimester iii di puskesmas tanjung langkat kecamatan salapian tahun 2018” pada penelitian ini menemukan hasil Analisa uji statistik dengan menggunakan uji *Chi-square* didapatkan nilai $P(0,000) < \alpha(0,05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan anemia pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Tanjung Langkat Kecamatan Salapian. Pada penelitian tersebut mengemukakan bahwa ibu hamil

yang patuh dalam mengonsumsi tablet Fe cenderung akan terhindar dengan kejadian anemia pada ibu hamil.

Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2021) yang berjudul “Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Mengonsumsi Tablet Fe (Ferrum) Terhadap Kejadian Anemia Di Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana” pada penelitian ini menemukan hasil nilai p (value) $0,229 \geq 0,05$ yang artinya tidak ada hubungan dengan tingkat kejadian anemia. Menurut penelitian ini menjelaskan bahwa pada Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana ibu hamilnya sering diberikan informasi tentang anemia oleh petugas kesehatan sehingga responden patuh mengonsumsi tablet Fe dan juga mengonsumsi makanan-makanan untuk menjaga Hbnya. Oleh karena itu pada penelitian ini tidak ditemukannya hubungan antara kepatuhan dengan kadar Hb ibu hamil.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kepatuhan mengonsumsi tablet Fe merupakan faktor risiko terjadinya anemia pada ibu hamil di wilayah Kecamatan Alla. Menurut peneliti hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan mengonsumsi tablet Fe sangat penting karena ibu hamil membutuhkan zat besi selama kehamilannya. Melalui pemberian tablet Fe dapat meningkatkan kadar hemoglobin darah selama masa kehamilan sehingga apabila dilakukan ANC secara teratur dengan kepatuhan mengonsumsi tablet Fe pada akhirnya akan mencegah terjadinya anemia. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan zat besi meningkat dan tidak bisa hanya tercukupi dari asupan makanan saja, sehingga perlu adanya suplementasi selama kehamilan. Suplementasi akan dapat membantu menekan kejadian anemia apabila ibu hamil patuh dan teratur dalam mengonsumsi tablet Fe..

Berdasarkan teori, kepatuhan mengonsumsi tablet Fe sangat penting karena sel darah merah membutuhkan zat besi dalam proses sintesisnya. Pengangkutan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh merupakan peran penting sel darah merah dalam tubuh serta sel membantu proses metabolisme tubuh untuk menghasilkan energy. Jika ibu hamil kekurangan zat besi dalam tubuhnya, maka akan mempengaruhi pembentukan sel darah merah. Kekurangan oksigen akan timbul apabila sel darah merah dalam tubuh mengalami kekurangan, sehingga timbul gejala anemia yang ditandai dengan penurunan kadar Hb

C. Kekurangan Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak kekurangan dikarenakan adanya keterbatasan pada penulis, kekurangan tersebut diantaranya adalah :

1. Proses pengambilan data dilakukan dalam 2 cara yaitu secara online (telepon) dan terjun

langsung ke puskesmas maupun mendatangi rumah responden secara langsung. Adapun keterbatasan pengambilan data secara online adalah beberapa nomor telepon responden tidak aktif ataupun tidak di angkat, sedangkan pada pengambilan data secara langsung ke puskesmas kurangnya responden yang datang ke puskesmas karena disebabkan oleh wabah Covid 19.

2. Faktor dukungan keluarga atau daya dukung keluarga pada penelitian ini tidak diteliti karena keterbatasan dalam kuisionernya.
3. Kejujuran responden dalam menjawab kuisioner tidak dapat dipastikan pada responden yang online.



BAB V PENUTUP

A. Ringkasan Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Sudu Wilayah kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang , Sulawesi Selatan terkait faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga maka di dapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan antara usia ibu hamil dengan Hb ibu hamil kejadian *anemia* pada ibu hamil trimester 3 dengan nilai *p-value* 0.029 ($<0,05$).
2. Terdapat hubungan antara pendidikan ibu hamil dengan Hb ibu hamil dengan nilai *p-value* 0,007 ($<0,05$).
3. Terdapat hubungan antara paritas dan kejadian *anemia* pada ibu hamil dengan nilai *p-value* 0,033 ($<0,05$).
4. Terdapat hubungan antara frekuensi kunjungan ANC ibu hamil dengan anemia ringan didapatkan korelasi bermakna dengan nilai *p-value* 0,035 ($<0,05$).
5. Terdapat hubungan antara status gizi dengan anemia pada ibu hamil dengan nilai *p-value* 0.021 (<0.05).
6. Terdapat hubungan antara pengetahuan anemia dan tablet Fe dengan kejadian *anemia* ibu hamil dengan nilai *p-value* 0.033 (<0.05).
7. Terdapat hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan dengan kejadian anemia pada ibu hamil dengan nilai *p-value* 0.00 (<0.05).

B. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa terdapat hubungan antara faktor- faktor risiko (Usia, Pendidikan, Paritas, Frekuensi Antenatal Care (ANC), Status Gizi, Pengetahuan dan Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Fe) dengan kejadian Anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

C. Saran

1. Bagi instansi kesehatan dan tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pemantauan secara rutin terhadap pemberian tablet Fe dan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya tablet Fe untuk menghindari terjadinya anemia pada ibu hamil, serta pelatihan kader posyandu tentang dampak yang akan ditimbulkan pada ibu hamil yang mengalami anemia agar kader lebih terampil dan dapat menyebar luaskan informasi tentang anemia pada ibu hamil .

2. Bagi ibu hamil diharapkan untuk meningkatkan kesadaran terkhusus pada pemeriksaan antenatal care (ANC) secara rutin untuk kesehatan ibu dan janin.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel dukungan keluarga pada penelitian selanjutnya dan agar lebih memperhatikan variabel-variabel lain yang lebih kompleks yang dapat mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, W. (2019) 'Perbandingan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Besi di Wilayah Kerja Puskesmas Langsa Lama Tahun 2019', *JNIK*, 2.
- Aini, I. (2017). Hubungan lingkaran lengan atas (lila) dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester I di wilayah kerja puskesmas dukuh klopo kecamatan peterongan kabupaten jombang. *Midwifery Journal Of STIKes Insan Cendekia Medika Jombang*, 13(1), 13–19.
- Ainy, N. (2019) 'Hubungan Status Nutrisi dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil di Puskesmas Buntan Barat', 8(5), p. 55.
- Andita, F. (2018) 'Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anemia Kehamilan di Puskesmas Padang Bulan', *Jurnal Kesehatan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7409>.
- Arsy, I. D. (2020) 'Pengaruh frekuensi konsumsi teh terhadap kejadian anemia pada ibu hamil di puskesmas pembina Palembang tahun 2019'
- Astriana. W. (2017) 'Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Ditinjau dari Paritas Dan usia pada populasi ibu hamil di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Agung Kabupaten OKU. *Jurnal kesehatan*.(Online)2 (2).(<https://media.neliti.com/media/publications/217394-kejadian-anemia-pada-ibu-hamil-ditinjau.pdf> diakses 14 februari 2019).
- Care, J. H. *et al.* (2020) 'Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian anemia ibu hamil di wilayah kerja puskesmas mandiingin kotabukittinggi', 5(1), pp. 281–284.
- Di, H. *et al.* (2020) 'Gambaran karakteristik anemia defisiensi besi pada ibu hamil di rsup sanglah tahun 2017', 9 (2), pp. 40–45.
- Edison, E. (2019). *Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil*. *Jurnal Jkft: Universitas Muhammadiyah Tangerang* 4(2): 65-71.

- Farida, L. N. (2019) 'Penanganan Anemia Pada Ibu Hamil dengan Pemberian Edukasi dan Suplementasi Tablet Besi', *JIKO (Jurnal Ilmiah Keperawatan Orthopedi)*, 3(2), pp. 64–69. doi: 10.46749/jiko.v3i2.31.
- Fatonah *et al.* (2019) 'Kajian Asupan Zat Besi, Vitamin C dan Status Anemia pada Ibu Hamil di Kabupaten Bantul', *Kebidanan*, pp. 8–25.
- Fatimah. (2016) 'Pelaksanaan Antenatal Care Berhubungan Dengan Anemia Pada Kehamilan Trimester III Di Puskesmas Sedayu 1 Yogyakarta', *Jurnal Ners.dan Kebidanan Indonesia* 3(3):134-39
- Fitriasari, I. (2018) 'Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Tegal Rejo Tahun 2018', *Jurnal Kesehatan*. at: <http://digilib2.unisayogya.ac.id/xmlui/handle/123456789/1790>.
- Giovanni, M., Prabowo, G. I. and Fatmaningrum, W. (2019) 'Infant Birth Weight in Mothers with Maternal Anemia at Dupak Public Health Center Surabaya Working Area in 2017', 02(01), pp. 53–56. doi: 10.20473/bhsj.v2i1.13239.
- Irianto, S.S. (2018). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Minum Tablet Fe Terhadap Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester di Puskesmas Pejeruk, 2017. *Jurnal Kedokteran Yarsi*.
- Juliana, D. (2018) '*Factors Associated with Anaemia Status of Pregnant Women in Puskesmas Koto Tangah Padang*'. *Jurnal Obstetika Scientia*, 4, pp. 368–380.
- Kesehatan, J., Vol, T. and Tinggede, D. I. P. (2019) 'Status kesehatan terutama status gizi pada ibu hamil sangat berpengaruh kepada status bayi yang akan dilahirkan, 201', 5(2), pp. 42–48.
- Khosman, H. (2013) '*Pengetahuan, Sikap dan Perilaku tentang Anemia pada Peserta dan Bukan Peserta Program Suplementasi Tablet Besi pada Ibu Hamil*'. *Media Gizi dan Keluarga*.
- Leny (2019) '1035325 'Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil', *Jurnal Kebidanan : Jurnal Medical Science Ilmu Kesehatan Akademi Kebidanan Budi Mulia Palembang*, 9(2), pp. 161–167. doi: 10.35325/kebidanan.v9i2.195.

- Majidah, Andini. 2018. *Hubungan Antara Paritas dan Umur Ibu dengan Anemia Pada Ibu Hamil Trimester III di Kota Yogyakarta tahun 2017*.
- Manuaba (2010) *'Ilmu Kebidanan, Penyakit kandungan dan KB untuk Pendidikan Bidan'*. Jakarta: EGC.
- Manuaba (2012) *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC.
- Muslim, Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, S. M. (n.d.). *Kitab tentang takdir, Bab perintah untuk menjadi kuat dan meninggalkan perasaan lemah dan meminta pertolongan kepada Allah Swt* (Edisi Kedu). Terbitan Elektronik Al-Maktabah al-Syamilah.
- Natalia, S., Sumarmi, S. & Nadhiroh, S. R. *Cakupan Anc Dan Cakupan Tablet Fe Hubungannya Dengan Prevalensi Anemia Di Jawa Timur*. Media Gizi Indones. 11, 70 (2017).
- Nurhidayati, R. (2013). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Anemia Pada Ibu Hamil Diwilayah Kerja Puskesmas Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. *E-Journal UMS*: <http://eprints.ums.ac.id/24138/12/02>.
- Pada, A. *et al.* (2020) 'Analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di puskesmas dana dan puskesmas pasir putih kabupaten muna *', 5(1), pp. 84–89.
- Prawirahardjo (2010) *Ilmu Kandungan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka - Sarwono Prawiroharjo.
- Pratiwi, Y., & Safitri, T. (2021). Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Mengonsumsi Tablet Fe (Ferrum) Terhadap Kejadian Anemia Di Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana. *Lambung Farmasi: Jurnal Ilmu Kefarmasian*, 2(1), 49–53. <https://doi.org/10.31764/lf.v2i1.3857>
- Pulungan, W. H. (2019). *Hubungan kepatuhan mengonsumsi tablet fe dengan anemia pada ibu hamil trimester iii di puskesmas tanjung langkat kecamatan salapian tahun 2018*. Institut Kesehatan Helvetia Medan.
- Puspitaningrum, D., & Fratika, N. M. (2018). *Hubungan pengetahuan tentang anemia, pendidikan ibu, konsumsi tablet fe dengan kadar hb pada ibu hamil trimester iii*

di rb bhakti ibu kota semarang. 1–20.

- Prawirohardjo, S. (2016) *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*. Ke-4. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka - Sarwono Prawiroharjo.
- Proverawati (2017) *Buku ajar Gizi Untuk Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Raudathul A. , Tri W. (2021). *Hubungan Paritas dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Puskesmas Trauma Center Samarinda*. Universitas Muhammadiyah Kaltim.
- Ristica, O. D. (2018) ‘Faktor Risiko Kejadian Anemia pada Ibu Hamil’, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 2(2), pp. 78–82. doi: 10.25311/keskom.vol2.iss2.49.
- Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). (2018). *Hasil Utama Riskesdas 2018: Proporsi Anemia Ibu Hamil 2018*. Kementerian Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan: Jakarta.
- S, P. W. and Triska, T. (2018) ‘Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Anemia dengan Kepatuhan Mengkonsumsi Tablet Fe di Wilayah Puskesmas RI Karya Wanita Pekanbaru Tahun 2017’, *Jurnal Maternity and Neonatal*, 2(5), pp. 300–308.
- Sab’ngatun, & Novitasari, A. (2018). Hubungan antara status gizi dengan kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester III. *Avicenna Journal of Health Research*, 1(1), 55–65.
- Sari, A. P. (2020) ‘Konsumsi tablet besi terhadap kadar hemoglobin ibu hamil trimester ketiga’. 15(1), pp. 45–51. doi: 10.36086/jpp.v15i1.466.
- Sari, D. K. (2019) ‘Hubungan Antara Pendidikan dan Kepatuhan Mengkonsumsi Tablet Fe Terhadap Kader Hb Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Setiawati, D. (2020) *Fisio-Patologi Kehamilan, Persalinan dan Kasih Sayang Universal*. Makassar: Alauddin University Press.
- Soebroto, I. (2015) *Cara Mudah Mengatasi Problem Anemia*. Jakarta: Bangkit.
- St, R. *et al.* (2020) ‘Pencegahan dan Tata Laksana Awal Penyakit Anemia pada Ibu

- Hamil di', 1(1), pp. 12–16.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: CV Alfa Beta.
- Suria, R. N. (2017). Hubungan antara pengetahuan tentang anemia, tingkat konsumsi protein, zat besi, dan vitamin c dengan kadar hemoglobin pada siswa sekolah menengah atas di sman 3 Ponorogo. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Susianti, (2017). *Hubungan Usia Kehamilan Dan Paritas Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016*. Poltekkes Kendari.
- Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*. Cetakan ketiga, Tahun 1425 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Dar Tsuraya.
- Stephen, G., Mgongo, M., Hashim, T.H., Katanga, J., Stray-Pedersen, B., and Msuya, S.E. (2018). *Anaemia in Pregnancy: Prevalence, Risk Factors, and Adverse Perinatal Outcomes in Northern Tanzania*. Hindawi.
- Tandon, R. (2018) 'Management of Iron Deficiency Anemia in Pregnancy in Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion.', *Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion*. Springer India.
- Veni, M., Sri S. (2019). *Hubungan Keteraturan Kunjungan Antenatal Care dan Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Trimester III di Kecamatan Maron Probolinggo*.
- Wiwin T. (2017). *Hubungan Paritas Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Godean Ii Sleman Yogyakarta*. Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- Winkjosastro (2007) *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka - Sarwono Prawiroharjo.
- Yani, N. (2020) 'Status Gizi dan Anemia pada Ibu Hamil', 10(1), pp. 57–62.
- Yani, A., Suriah, S. and Jafar, N. (2018) 'Pengaruh SMS Reminder Terhadap Perilaku Ibu Hamil Mengonsumsi Tablet Fe', *Media Kesehatan Masyarakat Indo-nesia*.
- Yanti (2017) 'Panduan Asuhan Kebidanan Kehamilan. Jakarta : EGC.

Lampiran

Kuesioner Penelitian

Identifikasi Faktor Risiko Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester Ketiga di
Wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

Nama / Inisial Responden :

Umur :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

Umur Kehamilan :

Paritas Ibu Hamil :

Frekuensi ANC (Antenatal care) :

Data ANC (Antenatal care) :

- BB :
- TB :
- TFU :
- LILA :
- Hb :
- Riw.Penyakit penyerta :
- Riw.Penyakit sebelumnya:
- Riwayat kehamilan sebelumnya :

(dengan penyulit kehamilan)

A. Pernyataan tentang pengetahuan responden


Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar!

1. Menurut ibu apakah yang disebut dengan anemia....
 - a. Kelebihan darah
 - b. Kekurangan darah
2. Ibu hamil dikatakan anemia apabila hasil pemeriksaan cek darah
 - a. Hb lebih 13 gr %
 - b. Hb kurang dari 11 gr%
3. Menurut ibu, anemia kekurangan zat besi disebabkan karena berkurangnya
 - a. Cadangan karbohidrat dalam tubuh
 - b. Cadangan zat besi dalam tubuh
4. Anemia dalam kehamilan disebut juga dengan anemia kekurangan
 - a. Lemak
 - b. Zat besi
5. Anemia pada ibu hamil dapat dicegah dengan banyak mengonsumsi
 - a. Makanan yang berlemak seperti protein
 - b. Makanan sumber besi, seperti sayur- sayuran, daging sapi dll
6. Selain makanan, ibu hamil membutuhkan tambahan zat besi, berupa
 - a. Tablet tambah darah (tablet Fe)
 - b. Vitamin A
7. Apakah yang dimaksud dengan tablet Fe?
 - a. Tablet penambah darah
 - b. Obat darah tinggi
8. Apabila ibu hamil kekurangan zat besi, maka dapat mengakibatkan.....
 - a. Anemia/kurang darah
 - b. Darah tinggi
9. Efek samping meminum tablet Fe adalah sebagai berikut

- a. Mual muntah
 - b. Feses/ kotoran kehitaman
10. Meminum tablet Fe sebaiknya pada saat.....
- a. Malam hari
 - b. Pagi hari

Pilihlah jawaban yang menurut anda paling sesuai di bawah ini !

1. Anemia disebut penyakit kurang darah
 - a. Benar
 - b. Salah
2. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah
 - a. Benar
 - b. Salah
3. Ibu hamil lebih berisiko mengalami anemia dibandingkan dengan ibu tidak hamil
 - a. Benar
 - b. Salah
4. Konsumsi tablet tambah darah dapat mencegah anemia
 - a. Benar
 - b. Salah
5. Tanda-tanda anemia adalah pusing, lemah, letih, lesu, dan pandangan berkunang-kunang terutama jika bangkit dari duduk
 - a. Benar
 - b. Salah
6. Anemia bisa menyebabkan perdarahan saat persalinan
 - a. Benar
 - b. Salah
7. Banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan dapat mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil
 - a. Benar
 - b. Salah
8. Jumlah tablet tambah darah yang sebaiknya di minum selama masa kehamilan adalah 90 tablet

- 
- a. Benar
b. Salah
9. Tablet Fe sebaiknya mulai diberikan pada usia kehamilan Trimester II (4 – 6 bulan)
- a. Benar
b. Salah
10. Tablet Fe dapat mencegah terjadinya anemia atau kurang darah pada ibu hamil
- a. Benar
b. Salah
11. Berat bayi lahir rendah adalah dampak yang terjadi pada janin bila ibu hamil kurang zat besi
- a. Benar
b. Salah
12. Efek samping yang dirasakan ibu setelah meminum tablet Fe adalah mual
- a. Benar
b. Salah
13. Tablet tambah darah sebaiknya diminum dengan kopi, susu atau teh
- a. Benar
b. Salah
14. Anemia pada ibu hamil terjadi karena asupan zat besi yang kurang
- a. Benar
b. Salah
15. Anemia pada kehamilan tidak membahayakan ibu dan janin
- a. Benar
b. Salah

B. Pernyataan tentang kepatuhan responden dalam mengonsumsi tablet Fe

1. Saya mengonsumsi tablet penambah darah secara rutin 1 hari 1 tablet selama kehamilan berlangsung
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Saya minum tablet penambah darah pada malam hari sebelum tidur
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Saya mengonsumsi tablet zat besi 1 jam setelah makan
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Ketika saya mengonsumsi tablet penambah darah, saya meminumnya dengan air putih
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Saya selalu tepat waktu saat minum tablet zat besi di waktu yang sama
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Saya mengonsumsi tablet penambah darah agar Hb saya tidak rendah
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Saya malas mengonsumsi tablet tambah darah karena rasanya tidak enak
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Saya mengonsumsi tablet tambah darah bersamaan dengan mengonsumsi teh agar tidak merasa mual
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Saya mengonsumsi tablet zat besi (Fe) hanya ketika merasakan lemas dan lesu
 - a. Ya

b. Tidak

10. Saya meminum tablet penambah darah karena anjuran petugas kesehatan/bidan/dokter

a. Ya

b. Tidak



Lampiran
Master Tabel

| No | Usia | Kat.Usia | Didik | Kerja | Paritas | Kat Paritas | ANC | LILA | Kat LILA | Hb | Kat Hb | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | Skor Tahu | Skor Patuh | Kat Tahu | Kat patuh |
|----|------|---------------|-------|----------|---------|-------------|--------|------|----------|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 36 | Risiko tinggi | PT | Pegawai | 1 | Primi | 4 Kali | 29 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | |
| 2 | 25 | Risiko rendah | PT | IRT | 0 | Primi | 3 Kali | 28 | Baik | 9 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | Tinggi | 90 Table t | |
| 3 | 22 | Risiko rendah | SMA | IRT | 0 | Primi | 3 Kali | 26 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | Rendah | <90 Table t |
| 4 | 23 | Risiko rendah | SMA | IRT | 0 | Primi | 3 Kali | 28 | Baik | 9 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | Tinggi | <90 Table t |
| 5 | 22 | Risiko rendah | SMA | IRT | 1 | Primi | 3 Kali | 26 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | Rendah | <90 Table t |
| 6 | 32 | Risiko rendah | PT | IRT | 2 | Multi | 4 Kali | 33 | Baik | 11 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | |
| 7 | 34 | Risiko rendah | PT | Pegawai | 2 | Multi | 4 Kali | 29 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | |
| 8 | 27 | Risiko rendah | SMA | IRT | 1 | Primi | 4 Kali | 31 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | |
| 9 | 35 | Risiko rendah | SMA | IRT | 2 | Multi | 4 Kali | 31 | Baik | 11 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | Tinggi | 90 Table t | |
| 10 | 21 | Risiko rendah | SMP | IRT | 1 | Primi | 3 Kali | 26 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | Rendah | <90 Table t |
| 11 | 37 | Risiko tinggi | PT | IRT | 1 | Primi | 3 Kali | 25 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | Rendah | <90 Table t |
| 12 | 24 | Risiko rendah | SMA | IRT | 1 | Primi | 2 Kali | 25 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | Rendah | <90 Table t |
| 13 | 27 | Risiko rendah | SMA | IRT | 3 | Multi | 4 Kali | 25 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | Rendah | <90 Table t |
| 14 | 24 | Risiko rendah | SMA | IRT | 0 | Primi | 3 Kali | 25 | Baik | 9 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | Tinggi | <90 Table t |
| 15 | 28 | Risiko rendah | SMP | IRT | 1 | Primi | 4 Kali | 29 | Baik | 11 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | Rendah | <90 Table t |
| 16 | 27 | Risiko rendah | SMP | IRT | 1 | Primi | 4 Kali | 30 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | Rendah | 90 Table t | |
| 17 | 21 | Risiko rendah | SMA | W.swasta | 0 | Primi | 3 Kali | 24 | Baik | 9 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | Tinggi | <90 Table t | |
| 18 | 28 | Risiko rendah | PT | Pegawai | 0 | Primi | 4 Kali | 29 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | |
| 19 | 28 | Risiko rendah | PT | W.swasta | 0 | Primi | 4 Kali | 29 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | |
| 20 | 28 | Risiko rendah | SMA | Pegawai | 0 | Primi | 3 Kali | 27 | Baik | 11 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | Tinggi | <90 Table t |
| 21 | 22 | Risiko rendah | SMA | IRT | 0 | Primi | 3 Kali | 26 | Baik | 11 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | |
| 22 | 24 | Risiko rendah | PT | IRT | 1 | Primi | 4 Kali | 28 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | Tinggi | 90 Table t | |
| 23 | 42 | Risiko tinggi | SMA | IRT | 3 | Multi | 4 Kali | 34 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | Tinggi | <90 Table t | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------------|-----|----------|---|-------|--------|----|-------|----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 24 | 35 | Risiko rendah | SMP | IRT | 2 | Multi | 3 Kali | 34 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | Tinggi | 90 Table t | | |
| 25 | 47 | Risiko tinggi | SMP | W.swasta | 3 | Multi | 4 Kali | 34 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | Tinggi | 90 Table t | | |
| 26 | 36 | Risiko tinggi | SMA | IRT | 1 | Primi | 4 Kali | 32 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | Tinggi | <90 Table t | |
| 27 | 43 | Risiko tinggi | SD | IRT | 3 | Multi | 4 Kali | 36 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | Rendah | <90 Table t | |
| 28 | 35 | Risiko rendah | PT | IRT | 2 | Multi | 4 Kali | 34 | Baik | 11 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | Tinggi | 90 Table t | | | |
| 29 | 35 | Risiko rendah | PT | Pegawai | 2 | Multi | 4 Kali | 41 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | Tinggi | 90 Table t | | | |
| 30 | 25 | Risiko rendah | SMA | IRT | 1 | Primi | 5 Kali | 24 | Baik | 11 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | Tinggi | 90 Table t | | | |
| 31 | 25 | Risiko rendah | SMA | IRT | 0 | Primi | 4 Kali | 23 | Buruk | 11 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | Tinggi | 90 Table t | | |
| 32 | 35 | Risiko rendah | PT | Pegawai | 1 | Primi | 4 Kali | 25 | Baik | 11 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | Tinggi | 90 Table t | | | |
| 33 | 42 | Risiko tinggi | SMA | IRT | 0 | Primi | 4 Kali | 21 | Buruk | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | Tinggi | <90 Table t | |
| 34 | 25 | Risiko rendah | PT | IRT | 2 | Multi | 4 Kali | 28 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | Tinggi | 90 Table t | | |
| 35 | 35 | Risiko rendah | SMA | IRT | 2 | Multi | 4 Kali | 29 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | Tinggi | 90 Table t | | |
| 36 | 35 | Risiko rendah | PT | W.swasta | 2 | Multi | 4 Kali | 31 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | | | |
| 37 | 21 | Risiko rendah | SMA | IRT | 0 | Primi | 5 Kali | 25 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | Rendah | <90 Table t |
| 38 | 29 | Risiko rendah | PT | IRT | 1 | Primi | 4 Kali | 29 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | | | |
| 39 | 34 | Risiko rendah | SMA | W.swasta | 2 | Multi | 4 Kali | 27 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | | | |
| 40 | 26 | Risiko rendah | SMP | IRT | 2 | Multi | 3 Kali | 24 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | Tinggi | 90 Table t | | |
| 41 | 41 | Risiko tinggi | SMP | IRT | 0 | Primi | 3 Kali | 25 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | Tinggi | 90 Table t | | |
| 42 | 40 | Risiko tinggi | SD | IRT | 3 | Multi | 4 Kali | 28 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | Tinggi | <90 Table t | | |
| 43 | 45 | Risiko tinggi | SMA | W.swasta | 3 | Multi | 4 Kali | 25 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | Rendah | 90 Table t | | | |
| 44 | 26 | Risiko rendah | SMA | IRT | 0 | Primi | 2 Kali | 24 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | | | |
| 45 | 17 | Risiko tinggi | SMP | IRT | 0 | Primi | 3 Kali | 35 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | Tinggi | <90 Table t | | |
| 46 | 27 | Risiko rendah | PT | IRT | 1 | Primi | 3 Kali | 35 | Baik | 13 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | | | |
| 47 | 45 | Risiko tinggi | SMA | W.swasta | 3 | Multi | 4 Kali | 27 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | | | |
| 48 | 26 | Risiko rendah | SMA | IRT | 1 | Primi | 4 Kali | 26 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | Tinggi | 90 Table t | | | |
| 49 | 32 | Risiko rendah | PT | W.swasta | 2 | Multi | 3 Kali | 37 | Baik | 11 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | Tinggi | <90 Table t | | |
| 50 | 36 | Risiko tinggi | SMA | IRT | 1 | Primi | 3 Kali | 35 | Baik | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | Tinggi | <90 Table t | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------------|-----|----------|---|-------|--------|----|-------|----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--------|------------|--------------|--------------|
| 51 | 26 | Risiko rendah | PT | Pegawai | 0 | Primi | 3 Kali | 23 | Buruk | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | Tinggi | < 90 Table t |
| 52 | 34 | Risiko rendah | PT | Pegawai | 1 | Primi | 4 Kali | 27 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | |
| 53 | 42 | Risiko tinggi | SMA | IRT | 2 | Multi | 4 Kali | 26 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | | |
| 54 | 16 | Risiko rendah | SD | IRT | 0 | Primi | 3 Kali | 21 | Buruk | 10 | Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | Rendah | < 90 Table t | |
| 55 | 23 | Risiko rendah | SMA | W.swasta | 0 | Primi | 3 Kali | 26 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | Tinggi | 90 Table t | | |
| 56 | 28 | Risiko rendah | SMA | IRT | 1 | Primi | 3 Kali | 25 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | |
| 57 | 24 | Risiko rendah | PT | IRT | 0 | Primi | 3 Kali | 25 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | | |
| 58 | 28 | Risiko rendah | PT | W.swasta | 1 | Primi | 4 Kali | 24 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | Rendah | 90 Table t | | |
| 59 | 37 | Risiko tinggi | PT | IRT | 3 | Multi | 4 Kali | 29 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | Tinggi | 90 Table t | |
| 60 | 31 | Risiko rendah | SMP | W.swasta | 3 | Multi | 4 Kali | 29 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | | |
| 61 | 27 | Risiko rendah | PT | Pegawai | 0 | Primi | 4 Kali | 26 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | | |
| 62 | 35 | Risiko rendah | PT | Pegawai | 2 | Multi | 4 Kali | 27 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | | |
| 63 | 38 | Risiko tinggi | PT | Pegawai | 2 | Multi | 4 Kali | 27 | Baik | 12 | Tidak anemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Tinggi | 90 Table t | | |

Hasil Olah Data

Case Processing Summary

| | Valid | | Cases Missing | | Total | |
|--------------------------|-------|---------|---------------|---------|-------|---------|
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Kat.Usia * Kat.Hb | 63 | 100.0% | 0 | 0.0% | 63 | 100.0% |
| Pendidikan * Kat.Hb | 63 | 100.0% | 0 | 0.0% | 63 | 100.0% |
| Kat.Paritas * Kat.Hb | 63 | 100.0% | 0 | 0.0% | 63 | 100.0% |
| ANC * Kat.Hb | 63 | 100.0% | 0 | 0.0% | 63 | 100.0% |
| Kat.LILA * Kat.Hb | 63 | 100.0% | 0 | 0.0% | 63 | 100.0% |
| Kat.Pengetahuan * Kat.Hb | 63 | 100.0% | 0 | 0.0% | 63 | 100.0% |
| Kat.Kepatuhan * Kat.Hb | 63 | 100.0% | 0 | 0.0% | 63 | 100.0% |

Hubungan Usia * Anemia

Crosstab

| | | | Kat.Hb | | Total |
|----------|---------------|-------------------|--------|--------------|--------|
| | | | Anemia | Tidak anemia | |
| Kat.Usia | Risiko tinggi | Count | 11 | 6 | 17 |
| | | % within Kat.Usia | 64.7% | 35.3% | 100.0% |
| | Risiko rendah | Count | 14 | 32 | 46 |
| | | % within Kat.Usia | 30.4% | 69.6% | 100.0% |
| Total | | Count | 25 | 38 | 63 |
| | | % within Kat.Usia | 39.7% | 60.3% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | 6.091 ^a | 1 | .014 | | |
| Continuity Correction ^b | 4.743 | 1 | .029 | | |
| Likelihood Ratio | 6.026 | 1 | .014 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .020 | .015 |
| Linear-by-Linear Association | 5.994 | 1 | .014 | | |
| N of Valid Cases | 63 | | | | |

Hubungan pendidikan * anemia

Crosstab

| | | Kat.Hb | | Total | |
|------------|-----|---------------------|--------------|-------|--------|
| | | Anemia | Tidak anemia | | |
| Pendidikan | SD | Count | 3 | 0 | 3 |
| | | % within Pendidikan | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| | SMP | Count | 2 | 7 | 9 |
| | | % within Pendidikan | 22.2% | 77.8% | 100.0% |
| | SMA | Count | 15 | 12 | 27 |
| | | % within Pendidikan | 55.6% | 44.4% | 100.0% |
| | PT | Count | 5 | 19 | 24 |
| | | % within Pendidikan | 20.8% | 79.2% | 100.0% |
| Total | | Count | 25 | 38 | 63 |
| | | % within Pendidikan | 39.7% | 60.3% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) |
|------------------------------|---------------------|----|--|
| Pearson Chi-Square | 12.111 ^a | 3 | .007 |
| Likelihood Ratio | 13.440 | 3 | .004 |
| Linear-by-Linear Association | 4.062 | 1 | .044 |
| N of Valid Cases | 63 | | |

Hubungan Paritas *anemia

Crosstab

| | | Kat.Hb | | Total | |
|-------------|-------|----------------------|--------------|-------|--------|
| | | Anemia | Tidak anemia | | |
| Kat.Paritas | Primi | Count | 20 | 19 | 39 |
| | | % within Kat.Paritas | 51.3% | 48.7% | 100.0% |
| | Multi | Count | 5 | 19 | 24 |
| | | % within Kat.Paritas | 20.8% | 79.2% | 100.0% |
| Total | | Count | 25 | 38 | 63 |
| | | % within Kat.Paritas | 39.7% | 60.3% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | 5.755 ^a | 1 | .016 | | |
| Continuity Correction ^b | 4.553 | 1 | .033 | | |
| Likelihood Ratio | 6.031 | 1 | .014 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .019 | .015 |
| Linear-by-Linear Association | 5.663 | 1 | .017 | | |
| N of Valid Cases | 63 | | | | |

Hubungan Antenatal care (ANC) * Anemia Crosstab

| | | Kat.Hb | | | |
|-------|----------|--------------|--------------|-------|--------|
| | | Anemia | Tidak anemia | Total | |
| ANC | < 4 Kali | Count | 14 | 10 | 24 |
| | | % within ANC | 58.3% | 41.7% | 100.0% |
| | > 4 Kali | Count | 11 | 28 | 39 |
| | | % within ANC | 28.2% | 71.8% | 100.0% |
| Total | | Count | 25 | 38 | 63 |
| | | % within ANC | 39.7% | 60.3% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | 5.634 ^a | 1 | .018 | | |
| Continuity Correction ^b | 4.446 | 1 | .035 | | |
| Likelihood Ratio | 5.633 | 1 | .018 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .033 | .018 |
| Linear-by-Linear Association | 5.545 | 1 | .019 | | |
| N of Valid Cases | 63 | | | | |

Hubungan status gizi (LILA) *Anemia

Crosstab

| | | | Kat.Hb | | Total |
|----------|-------|-------------------|--------|--------------|--------|
| | | | Anemia | Tidak anemia | |
| Kat.LILA | Buruk | Count | 4 | 0 | 4 |
| | | % within Kat.LILA | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| | Baik | Count | 21 | 38 | 59 |
| | | % within Kat.LILA | 35.6% | 64.4% | 100.0% |
| Total | | Count | 25 | 38 | 63 |
| | | % within Kat.LILA | 39.7% | 60.3% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | 6.492 ^a | 1 | .011 | | |
| Continuity Correction ^b | 4.080 | 1 | .043 | | |
| Likelihood Ratio | 7.812 | 1 | .005 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .021 | .021 |
| Linear-by-Linear Association | 6.389 | 1 | .011 | | |
| N of Valid Cases | 63 | | | | |

Hubungan Pengetahuan *Anemia

Crosstab

| | | | Kat.Hb | | Total |
|-----------------|--------|--------------------------|--------|--------------|--------|
| | | | Anemia | Tidak anemia | |
| Kat.Pengetahuan | Tinggi | Count | 16 | 34 | 50 |
| | | % within Kat.Pengetahuan | 32.0% | 68.0% | 100.0% |
| | Rendah | Count | 9 | 4 | 13 |
| | | % within Kat.Pengetahuan | 69.2% | 30.8% | 100.0% |
| Total | | Count | 25 | 38 | 63 |
| | | % within Kat.Pengetahuan | 39.7% | 60.3% | 100.0% |

M A K A S S A R

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | 5.975 ^a | 1 | .015 | | |
| Continuity Correction ^b | 4.521 | 1 | .033 | | |
| Likelihood Ratio | 5.899 | 1 | .015 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .024 | .017 |
| Linear-by-Linear Association | 5.880 | 1 | .015 | | |
| N of Valid Cases | 63 | | | | |

Hubungan Kepatuhan *Anemia

Crosstab

| | | | Kat.Hb | | Total |
|---------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|
| | | | Anemia | Tidak anemia | |
| Kat.Kepatuhan | Tinggi | Count | 7 | 34 | 41 |
| | | % within Kat.Kepatuhan | 17.1% | 82.9% | 100.0% |
| | Rendah | Count | 18 | 4 | 22 |
| | | % within Kat.Kepatuhan | 81.8% | 18.2% | 100.0% |
| Total | | Count | 25 | 38 | 63 |
| | | % within Kat.Kepatuhan | 39.7% | 60.3% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------------|---------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | 25.075 ^a | 1 | .000 | | |
| Continuity Correction ^b | 22.443 | 1 | .000 | | |
| Likelihood Ratio | 26.295 | 1 | .000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .000 | .000 |
| Linear-by-Linear Association | 24.677 | 1 | .000 | | |
| N of Valid Cases | 63 | | | | |

Lampiran Administrasi


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 20 Desember 2021

| | | | |
|----------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| Nomor | : 638/DPMPTSP/IP/XII/2021 | Kepada | |
| Lampiran | : - | Yth.1. Kepala Puskesmas Kalosi | |
| Perihal | : <u>Izin Penelitian</u> | 2. Kepala Puskesmas Sudu | |
| | | Di_ | |
| | | | Kec. Alla |

Berdasarkan surat dari Ketua Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nomor: B- 4623/Un.06/FKIK/PP.00.9/12/2021 tanggal 17 Desember 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Nama | : Husnul Khatimah |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kalosi, 07 Februari 1998 |
| Instansi/Pekerjaan | : Mahasiswi |
| Alamat | : Kalosi Kel. Kalosi Kec. Alla |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: *"Identitas Faktor Resiko Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester Ketiga di Wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021."*

Dilaksanakan mulai, Tanggal 20 Desember 2021 s/d 201 Januari 2022

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPMPTSP Kab. Enrekang


Dr. Ir. CHAIDAR BUKU, ST, MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBANG POL. Kab. Enrekang.
03. Kepala DINKES Kab. Enrekang.
04. Camat Alla.
05. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
06. Yang bersangkutan (Husnul Khatimah).
07. Bertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUDU
Jl.Poros Makassar Makale Kec. Alla Kabupaten Enrekang

SURAT KETERANGAN UIN PENELITIAN

Nomor : 1001/PKMS/XII/2021 Kepada
Lampiran : - Yth. Dekan Fakultas Kedokteran UIN Alauddin
Perihal : Balasan Surat Permohonan Makassar
Penelitian Di_
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Sabir, S.Kep.Ns.M.Adm.Kes
NIP : 19721231 199403 1 019
JABATAN : Kepala UPT Puskesmas Suda
ALAMAT : Belajen Utara, Kel.Kambiolangi, Kec.Alla Kab.Enrekang


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

NAMA : Husnul Khatimah
STAMBUK : 70600117019
TEMPAT/TGL LAHIR : Kalosi, 07 Februari 1998
JABATAN : Mahasiswi
ASAL UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ALAMAT : Kalosi, Kel. Kalosi, Kec. Alla Kab.Enrekang

Berdasarkan surat yang kami terima dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Mahasiswa yang bersangkutan telah disetujui untuk melakukan penelitian di UPT Puskesmas Suda sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

"Identitas Faktor Resiko Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Trimester Ketiga di Wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUDU
Jl.Poros Makassar Makale Kec. Alla Kabupaten Enrekang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 38 / PKMS / 1 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Sabir, S.Kep.Ns.M.Adm.Kes
NIP : 19721231 199403 1 019
JABATAN : Kepala UPT Puskesmas Suda
ALAMAT : Belajen Utara, Kel.Kambiolangi, Kec.Alla Kab.Enrekang

Mencrangkan dengan sesungguhnya bahwa :

NAMA : Husnul Khatimah
STAMBUK : 70600117019
TEMPAT/TGL LAHIR : Kalosi, 07 Februari 1998
JABATAN : Mahasiswi
ASAL UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ALAMAT : Kalosi, Kel. Kalosi, Kec. Alla Kab.Enrekang

Telah melakukan penelitian tentang : Identitas Faktor Resiko Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Trimester Ketiga di Wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 di UPT Puskesmas Suda Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Selama 1 Bulan, mulai tanggal 20 Desember 2021 s/d 20 Januari 2022.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dokumentasi



1
NEGERI
DIN
M A K A S S A R



EGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : HUSNUL KHATIMAH
Nama Panggilan : Husnul
NIM : 70600117019
Tempat, Tanggal Lahir: Enrekang, 07 Februari 1998
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Fakultas : Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Budidayaraya Blok G 18
Telepon : 082259054397
Email : husnulkhatimah0111@gmail.com



Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Pramuka
2. Anggota Osis
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Kedokteran UIN Alauddin Makassar
Periode 2019-2020
4. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Kedokteran UIN Alauddin
Makassar Periode 2020-2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R