

**ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA TERAPI ANTIDIABETES PADA
PASIEN PROLANIS DIABETES MELITUS TIPE 2 PUSKESMAS
SALEWANGENG KAB. WAJO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

MUHAMMAD AKMIL APRIANDY

NIM : 70100117032

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Akmil Apriandy
NIM : 70100117032
Tempat/Tgl. Lahir : Sengkang, 24 April 2000
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Pepabri Blok I No. 21, Sengkang
Judul : Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antidiabetes Pada Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bawa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 15 Februari 2022

Penulis,


Muhammad Akmil Apriandy

NIM: 70100117032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antidiabetes Pada Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo**” yang disusun oleh **Muhammad Akmil Apriandy, NIM.70100117032**, Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, **15 Februari 2022 M** yang bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 15 Februari 2022 M
14 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI


Ketua	: Dr. dr. Syatirah Sp. A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Apt. Syamsuri Syakri, S.SI., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Apt. Khaerani, S.Farm.,M.Farm.Klin.	(.....)
Peguji I	: Apt. Asrul Ismail, S.Farm.M.Sc.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A	(.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah Sp. A., M.Kes.

NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai *rahmatan lil'alam* beserta para sahabat.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintangan. Namun atas dukungan dari berbagai pihak yang terus memberikan motivasi sehingga penelitian ini bisa terselesaikan.

Terima kasih yang sebesar besarnya kami persembahkan kepada kedua orang tua kami yang tak henti-hentinya memanjatkan doa memberikan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril maupun dalam bentuk materil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M. Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Wahyuddin, M. Hum. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag. selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

7. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
11. Apt. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan, nasehat, serta motivasi yang membangun penulis selama menjalani masa kuliah di Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar. Serta selaku penguji akademik yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
12. Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
13. Apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si. selaku pembimbing pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin. selaku pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
16. H. Huslan, S.ST., M.Kes. & HJ. Besse Illang, S.Pd. selaku kedua Orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang yang tidak terukur sehingga selalu menjadi motivasi bagi penulis.
17. Bapak dan ibu dosen yang telah memabantu dan membimbing selama perkuliahan.
18. Serta berbagai pihak yang sudah membantu dalam pengarjaan penelitian ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, khususnya di bidang farmasi.

Gowa, 15 Februari 2022

Penyusun



Muhammad Akmil Apriandy

NIM : 70100117032



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup.....	4
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Farmakoekonomi	10
B. Diabetes Melitus	14
C. Diagnosis Diabetes Melitus	22
D. Penatalaksanaan Diabetes Melitus.....	25
E. Tinjauan Keislaman	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian	41

B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
D. Populasi Dan Sampel.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Variabel Penelitian	43
G. Instrumen Penelitian	43
H. Langkah Analisis Data.....	43
I. Alur Penelitian	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian.....	49
B. Pembahasan	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	62
KEPUSTAKAAN	63
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rumus Besar Sampel	42
Gambar 2 Rumus Perhitungan Efektivitas	44
Gambar 3 Rumus Perhitungan Nilai ACER.....	45
Gambar 4 Rumus Perhitungan Nilai ICER	45
Gambar 5 Cost-effectiveness Plane Terapi Antidiabetes Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019- Juni 2021.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Metode Analisis dalam Kajian Farmakoekonomi (Kemenkes RI. 2013)	12
Tabel 2 Grid Efektivitas Biaya (Andayani.2013)	14
Tabel 3 Definisi Glikemia Normal dan Abnormal (Dipiro. 2020)	23
Tabel 4 Kriteria Diagnosis Diabetes Melitus (Dipiro. 2020)	24
Tabel 5 Farmakodinamik Sediaan Insulin (Dipiro. 2020)	31
Tabel 6 Perhitungan Biaya Non Medik Langsung	46
Tabel 7 Perhitungan Biaya Medik Langsung	46
Tabel 8 Format Tabel Hasil Perhitungan Total Biaya Medik Langsung	46
Tabel 9 Format Tabel Hasil Perhitungan Efektivitas Terapi	46
Tabel 10 Format Tabel Hasil Perhitungan Nilai ACER	46
Tabel 11 Format Tabel Hasil Perhitungan Nilai ICER	47
Tabel 12 Profil Penggunaan Terapi Antidiabetes Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021	49
Tabel 13 Biaya Non Medik Langsung Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021	49
Tabel 14 Biaya Medik Langsung Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021	50
Tabel 15 Total Biaya Medik Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021	50
Tabel 16 Efektivitas Terapi Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021	51
Tabel 17 Nilai ACER Terapi Antidiabetes Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021	51
Tabel 18 Grid Efektivitas Biaya Terapi Antidiabetes Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021	52
Tabel 19 Nilai ICER Terapi Antidiabetes Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Pengambilan Data Awal (Validitas Kuisisioner).....	66
Lampiran 2 Kode Etik Penelitian.....	67
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	68
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	69
Lampiran 5 Naskah Penjelasan.....	70
Lampiran 6 Informend consent (Persetujuan yang diberikan responden)	72
Lampiran 7 Kuisisioner Penelitian.....	73
Lampiran 8 Hasil Skoring Data Responden Uji Validitas.....	75
Lampiran 9 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner.....	77
Lampiran 10 Data Hasil Penelitian.....	78
Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian.....	84



ABSTRACT

Name : MUHAMMAD AKMIL APRIANDY
NIM : 70100117032
Departement : PHARMACY
Title : Cost Effectiveness Analysis of Antidiabetic Therapy in Patients with Prolanis Diabetes Mellitus Type 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo.

Type 2 Diabetes Mellitus in recent years has become a category of non-communicable disease whose prevalence percentage continues to increase, especially in Indonesia, which ranks 7th out of 10 countries with the highest prevalence in the world. Prevalence data in Kab. Wajo amounted to 9.27% which is the highest number in South Sulawesi Province. The increase in cases of non-communicable diseases, especially Diabetes Mellitus Type 2 which is quite large, adds to the burden on the community and the government because it requires money to handle it. In Indonesia, the handling of health services is borne by the Social Security Administering Agency (BPJS) where one of the programs, namely Prolanis (Chronic Disease Service Program) aims to encourage patients with chronic diseases to achieve a normal quality of life. One of the chronic diseases handled by Prolanis is Diabetes Mellitus Type 2. Given the large economic burden for people with Type 2 Diabetes Mellitus, it is necessary to make the costs incurred pharmacoeconomically effective. Based on the results of the research conducted, the results of the calculation of the Average Cost Effectiveness Ratio (ACER) value indicate that the choice of therapy with the best cost effectiveness is the combination therapy of Metformin & Glimepirid. And the calculation of the value of the Incremental Cost Effectiveness Ratio (ICER) shows other alternative therapy options that can be used, namely the combination therapy of Insulin Levemir & Novorapid. Therefore, it can be concluded that the antidiabetic therapy with the best cost effectiveness is the combination therapy of Metformin & Glimepirid.

Keywords: Diabetes Mellitus Type 2, Prolanis, ACER, ICER

ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : MUHAMMAD AKMIL APRIANDY
NIM : 70100117032
Jurusan : Farmasi
Judul : Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antidiabetes Pada Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo

Diabetes Melitus Tipe 2 beberapa tahun belakangan ini menjadi kategori penyakit tidak menular yang persentase prevalensinya terus meningkat terutama di Indonesia yang menempati urutan ke-7 dari 10 Negara dengan prevalensi tertinggi di dunia. Data prevalensi di Kab. Wajo sebesar 9,27% yang mana jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan kasus penyakit tidak menular khususnya Diabetes Melitus Tipe 2 yang cukup besar menambah beban masyarakat dan pemerintah karena membutuhkan biaya dalam penanganannya. Di Indonesia, penanganan pelayanan kesehatan ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimana salah satu programnya yaitu Prolanis (Program Pelayanan Penyakit Kronis) bertujuan untuk mendorong pasien penyandang penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup normal. Salah satu penyakit kronis yang ditangani oleh Prolanis yaitu Diabetes Melitus Tipe 2. Dengan adanya beban ekonomi yang cukup besar bagi penderita Diabetes Melitus Tipe 2, maka perlu agar biaya yang dikeluarkan efektif secara farmakoekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hasil perhitungan nilai Average Cost Effectiveness Ratio (ACER) menunjukkan bahwa pilihan terapi dengan efektivitas biaya yang paling baik yaitu terapi kombinasi Metformin & Glimepirid. Dan perhitungan nilai Incremental Cost Effectiveness Ratio (ICER) menunjukkan pilihan alternatif terapi lain yang dapat digunakan yaitu terapi kombinasi Insulin Levemir & Novorapid. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terapi antidiabetes dengan efektivitas biaya yang paling baik yaitu terapi kombinasi Metformin & Glimepirid.

Keywords: Diabetes Melitus Tipe 2, Prolanis, ACER, ICER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, epidemiologi penyakit yang ada di Indonesia sedang berada dalam periode transisi, dimana penyakit tidak menular (PTM) telah menggeser dominasi penyakit menular. Lingkungan, perubahan demografi, ekonomi, perilaku masyarakat, perubahan teknologi, dan sosial budaya menjadi faktor pendorong berubahnya pola penyakit tersebut. Meningkatnya paparan penyakit tidak menular, akan sejalan dengan meningkatnya etiologi penyakit yaitu tekanan darah, kadar gula dalam plasma darah, IMT, kurangnya aktivitas fisik, memiliki kebiasaan konsumsi asupan yang kurang sehat, sering merokok, dan mengonsumsi minuman keras (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2019).

Dalam beberapa dekade terakhir, Diabetes Melitus (DM) merupakan satu dari sekian penyakit tidak menular yang cukup menyita fokus dalam dunia kesehatan. Diabetes melitus merupakan jenis penyakit metabolik. Meski ada banyak penyebab, gangguan produksi insulin, fungsi insulin (sensitivitas), atau keduanya, dapat menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah dan perubahan metabolisme lemak dan protein (Dipiro. 2020). Menurut *International Diabetes Federation* (IDF) tahun 2019, jumlah penderita diabetes akan menjadi 436 juta dan diprediksikan akan meningkat sampai 710 juta tahun 2045 mendatang (IDF, 2019). Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara dengan tingkat diabetes tertinggi dan diproyeksikan naik ke urutan ke-6 pada tahun 2040. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Kemenkes RI Tahun 2018, Jumlah penderita diabetes dari hasil diagnostik dokter yaitu sebanyak 2% dari total penduduk Indonesia (Kemenkes-RI, 2018). Untuk Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 34.958 kasus diabetes dimana kabupaten dengan tingkat penderita diabetes tertinggi yaitu Kabupaten Wajo dengan nilai 9,27% (Kemenkes-RI, 2019).

Dengan adanya peningkatan kasus PTM yang cukup besar, pemerintah dan masyarakat mengeluarkan banyak biaya dan teknologi yang mumpuni untuk menanganinya (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2019). Biaya medis global untuk diabetes meningkat setiap tahun. Pada 2013, angka ini mencapai 548 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat menjadi 617 miliar dolar AS pada 2015, dan mencapai 727 miliar dolar Amerika Serikat pada 2017, menyumbang 12% dari dana Dana Kesehatan Dunia untuk pengobatan diabetes (IDF, 2019). Di Indonesia sendiri, pengobatan diabetes seperti penggunaan obat-obatan atau suntik insulin dan beberapa pengobatan diabetes lainnya ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu solusi yang dikeluarkan oleh BPJS dalam membantu mengendalikan biaya kesehatan yaitu Prolanis (Bappenas, 2019). Prolanis adalah serangkaian program kesehatan dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan dengan cara holistik. Peserta, instansi medis dan BPJS Kesehatan berpartisipasi dalam proses pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan dengan penyakit kronis sehingga dapat mencapai pelayanan kesehatan yang hemat biaya dan efisien. Tujuan dari prolanis yaitu memberikan pasien penderita penyakit kronis kualitas hidup yang lebih baik hingga taraf indikator sebesar 75%, dimana pasien memperoleh hasil yang baik pada hasil analisis pemeriksaan terhadap progresif penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 dan pada akhirnya dapat menurunkan resiko terkena komplikasi penyakit (BPJS, 2014).

Selain menimbulkan beban ekonomi bagi sistem layanan kesehatan dan perekonomian nasional, diabetes juga dapat menimbulkan beban ekonomi yang sangat besar bagi penderita diabetes dan keluarganya. Beban ini termasuk biaya pengobatan baik yang ditanggung oleh pasien maupun keluarganya, potensi hilangnya pendapatan selama menjalani proses pengobatan sehingga sumber

penghasilan bagi keluarga menurun bahkan hilang, serta cacat dan kematian dini bagi pasien. Hubungan antara diabetes dan risiko biaya pengobatan akibat penyakit fatal (penyakit dengan biaya yang mahal) bagi individu dan keluarga telah dipelajari di 35 negara berkembang. Studi ini menemukan bahwa dibandingkan dengan orang serupa tanpa diabetes, penderita diabetes memiliki peluang lebih besar untuk menanggung biaya pengobatan yang lebih tinggi (WHO, 2016).

Penderita diabetes harus dikontrol agar biaya yang dikeluarkan lebih rendah dan tetap memberikan hasil pengobatan yang memuaskan secara farmakoekonomi. *Cost effectiveness analysis* (CEA) merupakan satu dari beberapa jenis yang dapat digunakan. Analisis biaya manfaat atau disebut *cost effectiveness analysis* adalah metode analisis ekonomi komprehensif yang menganalisis perbandingan konsekuensi sumber daya (*input*) dengan layanan (*output*) yang digunakan antara dua atau lebih alternatif. ACER dan ICER menggambarkan nilai perhitungan *cost-benefit*. ACER difungsikan sebagai penggambaran biaya total rencana atau jenis alternatif dibagi dengan hasil klinis, sedangkan penggunaan ICER untuk meningkatkan hasil dengan satu unit dibandingkan perbandingan (Andayani, 2013).

Menurut (Pribadi & Permana, 2018) dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa terapi oral kombinasi Sulfonilurea dan Biguanid yang merupakan kombinasi terapi anti diabetes oral yang merupakan pengobatan yang paling hemat biaya dengan nilai ICER (Incremental Cost-Effectiveness Ratio) Rp -170.208.

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Norhalimah et al., 2018) dalam penelitiannya, dimana antidiabetik dengan intensitas penggunaan paling banyak yaitu jenis kombinasi insulin sebesar 68%. Analisis biaya minimal dan efikasi superior pengobatan pada rawat inap diabetes mellitus tipe 2 dengan nilai ACER sebesar Rp22.984,00 yaitu insulin tipe 2 yang dikombinasikan dengan

Ezellin dan Novorapide. Sehingga dianjurkan untuk menggunakan antidiabetik jenis tersebut dilihat dari segi biaya dan keefektifannya.

Berdasarkan uraian diatas dari data RISKESDAS yang menunjukkan tingginya angka prevalensi Diabetes Melitus tipe 2 di Kabupaten Wajo disertai dengan tingginya pengeluaran biaya terhadap penanggulangan penyakit Diabetes membuat pentingnya dilakukan evaluasi mengenai efektivitas biaya pengobatan untuk menjamin pasien Diabetes Melitus tipe 2 mendapatkan pengobatan dengan hasil yang efektif dengan biaya yang terjangkau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Berapa besar persentase efektivitas terapi dari penggunaan obat antidiabetes pada pasien Prolanis Diabetes Melitus tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo?
2. Antidiabetes manakah yang paling efektif dengan biaya yang rendah pada pasien Prolanis Diabetes Melitus tipe 2 rawat jalan berdasarkan *Average Cost Effectiveness Ratio (ACER)* dan *Incremental Cost Effectiveness Ratio (ICER)* ?

C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup

1. Definisi Operasional

a. Analisis Efektivitas Biaya

Analisis efektivitas biaya adalah analisis perbandingan antara biaya medik langsung dengan biaya non medik langsung perbulan dengan efektivitas terapi

b. Terapi Anti Diabetes

Terapi antidiabetes merupakan obat yang digunakan atau dikonsumsi oleh pasien Diabetes untuk menurunkan kadar gula darah dengan tujuan mencapai target terapi. Terapi yang digunakan berupa Antidiabetik oral dan insulin.

c. Pasien Prolanis

Pasien Prolanis merupakan pasien yang ikutserta dalam program Prolanis, dimana dalam penelitian ini yang diteliti adalah pasien dengan diagnosis diabetes melitus tipe 2.

d. Diabetes Melitus Tipe 2

Diabetes melitus tipe 2 merupakan gangguan kesehatan yang tandanya dapat dilihat dengan adanya peningkatan kadar gula darah dalam tubuh yang disebabkan oleh menurunnya kinerja maupun menurunnya produksi insulin oleh sel beta di pankreas.

e. Puskesmas

Puskesmas atau singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan badan pelaksana teknis pelayanan kabupaten/kota yang memiliki tanggung jawab atas pembangunan kesehatan di bidang kegiatannya. Puskesmas Salewangeng berada di Kel. Siengkang, Kec. Tempe, Kab. Wajo.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu Penelitian ini termasuk penelitian lapangan untuk mengetahui terapi antidiabetes yang memiliki efektivitas yang baik dan harga yang terjangkau bagi pasien Diabetes Melitus tipe 2 di Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo sehingga dengan hasil yang didapatkan dari penelitian dapat meningkatkan efektivitas pelayanan puskesmas dalam memberikan terapi Diabetes Melitus tipe 2 terhadap masyarakat.

D. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan penelitian (Norhalimah. 2018) *Analisis Biaya Minimal dan Efektifitas Terapi Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUD Panglima Sebaya Paser* (Proceeding of the 7th Mulawarman Pharmaceuticals Conferences tahun 2018), Penelitian tersebut melaporkan perlunya menemukan obat antidiabetes di RSUD Panglima Sebaya Paser dengan biaya yang minimal dan efektif. Penelitian ini dilakukan secara retroaktif pada rekam medis. Sebagai hasil dari survei terhadap 95 pasien, agen hipoglikemik yang paling umum digunakan adalah Insulin Novorapide dan Levemir, serta terapi kombinasi Novorapide dan Ezerin. Penggunaan obat yang efektif dalam pengobatan diabetes adalah kombinasi insulin Ezerin dan Novorapid dengan nilai ACER sebesar Rp 22.984,00.

2. Berdasarkan penelitian (Warnaya. 2020) *Evaluasi Efektivitas Biaya Penggunaan Terapi Kombinasi Obat Antidiabetes-Antihipertensi pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 dengan Hipertensi di RSUP Sanglah* (Jurnal Farmasi Udayana, Vol 9, No 1, Tahun 2020, 26-30), penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi obat yang terbaik dan mencapai hasil pengobatan yang memberikan hasil yang memuaskan guna meningkatkan harapan hidup pasien. Berdasarkan hasil penelitian ini, kami menghitung rasio efektivitas biaya rata-rata (ACER) dan rasio efektivitas biaya tambahan (ICER), dan menemukan bahwa pilihan pengobatan yang paling hemat biaya adalah menggunakan kelompok pengobatan anti-diabetes untuk meningkatkan insulin. Ini menunjukkan bahwa itu. Perlawanan dengan mengikuti kelas CCB (*calcium channel blocker*) dan insulin kerja panjang. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa kombinasi obat antidiabetes serta antihipertensi yang paling efektif berdasarkan nilai ACER dan ICER ialah kombinasi obat antidiabetes serta antihipertensi CCB yg bisa mempertinggi sensitivitas terhadap insulin dan insulin kerja lama.

3. Berdasarkan penelitian (Ambiyanti. 2019) *Analisis Biaya Penyakit Diabetes Melitus Sebagai Pertimbangan Perencanaan Pembiayaan Kesehatan* (Jurnal Farmasi Galenika Tahun 2019; 5(1): 73 – 83), diterangkan tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mendapatkan total biaya diabetes melitus (DM) dan menggunakannya menjadi pertimbangan untuk perencanaan keuangan medis terkait menggunakan terapi serta efektivitas biaya pasien. yang akan terjadi penelitian menunjukkan jumlah pasien yang memenuhi kriteria seleksi artinya 1.689 kunjungan pasien, terdiri berasal 1.531 kunjungan rawat jalan dan 158 kunjungan rawat inap. Pendapatan rumah sakit selama 6 bulan adalah Rp1.203.799.389. asal segi jumlah komplikasi terdapat disparitas yang signifikan antara biaya pengobatan langsung rawat jalan ($p = 0,004$). ada perbedaan yang signifikan pada biaya pengobatan langsung bagi pasien yang diukur dari jumlah komplikasi, lama rawat inap, dan jenis rawat inap. Perbedaannya signifikan ($p = 0,000$).

4. Berdasarkan penelitian (Ningrum. 2019) *Analisis Biaya Pengobatan Pasien Diabetes Melitus Rawat Jalan Di Rsud Kraton Pekalongan* (Jurnal PENA Vol.33 No.1 Edisi Maret 2019), Hasilnya, kriteria inklusi adalah 1.689 penderita, 1.531 pasien rawat jalan, dan 158 pasien rawat inap. Pendapatan fasilitas kesehatan selama 6 bulan menjadi Rp 1.203.799.389. ada perbedaan besar dalam variasi sakit kepala antara biaya langsung rawat jalan ($p=0,004$). Ada perbedaan besar antara biaya langsung untuk merawat pasien dalam hal jenis sakit kepala, masa hidup, dan bentuk rawat inap. Selisihnya diubah menjadi ukuran penuh ($p = 0,000$).

5. Berdasarkan penelitian (Pribadi. 2018) *Analysis Of The Cost-Effectiveness Of Antidiabetic Drugs Among Self Paid Participant Of The Indonesia National Security Service (NSS) With Type 2 Diabetes Melitus* (Jurnal Farmasi Vol. 5 No. 2 tahun 2019 Int J Med. Public Health Tahun 2018; 8(3):108-111). Studi ini

menjelaskan bahwa perawatan medis untuk penderita diabetes tipe 2 bisa mahal, terutama ketika komplikasi terjadi. Di era sistem Jaminan Kesehatan Nasional, efektivitas dan efisiensi perawatan medis menjadi yang paling penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan *cost-effectiveness* antara regimen terapi antidiabetik oral, oral dan oral, insulin, oral dan insulin, dan oral, oral dan insulin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi terapi antidiabetes oral dan oral, kombinasi sulfonilurea dan biguanida, merupakan pengobatan yang paling *cost-effective* dengan nilai ICER (*incremental cost-effectiveness ratio*) sebesar Rp 170.208.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan gambaran besarnya persentase efektivitas terapi dari penggunaan obat antidiabetes pada pasien Prolanis Diabetes Melitus tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo.

2. Untuk mendapatkan gambaran antidiabetes yang paling efektif dengan biaya yang rendah pada pasien Prolanis Diabetes Melitus tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo berdasarkan *Average Cost Effectiveness Ratio* (ACER) dan *Incremental Cost Effectiveness Ratio* (ICER).

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi informasi ilmiah di bidang pendidikan dan penelitian serupa, yang dapat dilakukan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi system pelayanan kesehatan masyarakat, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk peningkatan pelayanan, dan juga dapat digunakan sebagai tambahan basis pengetahuan untuk analisis biaya guna meningkatkan pelayanan kedepannya, dan

hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan serta menerima gambaran umum tentang analisis biaya-manfaat, penggunaan, pengadaan, dan pengetahuan tentang rencana pengobatan untuk pengobatan Diabetes Melitus tipe 2.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Farmakoekonomi

Farmakoekonomi merupakan gambaran dari suatu observasi tentang biaya penggunaan obat-obatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi sosial. Observasi tentang farmakoekonomi merupakan proses identifikasi, pengukuran dan perbandingan harga (diberikan oleh konsumen) dan keefektifan (klinis, ekonomi, humanistik) obat dan jasa (Indrayathi, P.A & Noviyanti, 2016).

Penelitian farmakoekonomi selalu memperhatikan dua aspek yaitu biaya dan hasil. Padahal, dalam studi yang meneliti keekonomian obat atau suatu pengobatan, faktor biaya akan selalu sebanding dengan kemanjuran, kegunaan dan kemanfaatan dari terapi yang dianjurkan (Kemenkes-RI, 2013).

Efektivitas mengacu pada fungsi suatu obat untuk memberikan kebugaran (hasil) orang yang terkena dampak yang lebih tinggi dalam praktik ilmiah kebiasaan (digunakan hari demi hari, sekarang tidak lagi berada pada kondisi penelitian yang paling sesuai). Berkenaan dengan ekonomi (biaya), studi ekonomi farmakologis dapat menawarkan tanda-tanda keunggulan biaya yang mencerminkan setiap indikator kebugaran (misalnya, biaya penurunan (tingkat mg/dL), LDL dan/atau kolesterol LDL darah umum karena penggunaan narkoba. Untuk mencapai unit indikator kebugaran tertentu (ilmiah atau non-ilmiah), unit keuangan yang dibayar semakin kecil maka akan semakin baik efektivitas biaya obat (Kemenkes-RI, 2013).

1. Biaya

Dalam penelitian farmakoekonomi, biaya akan menjadi pertimbangan utama karena keterbatasan sumber daya (terutama dana). Dalam penelitian ekonomi, biaya peluang diartikan sebagai sebuah dari nilai peluang karena menggunakan sumber daya dalam suatu kegiatan. Harap dipahami bahwa harga belum tentu termasuk penukaran mata uang. Ahli farmakologi percaya bahwa biaya

pengobatan tidak hanya mencakup biaya layanan medis, tetapi juga termasuk biaya yang dibutuhkan pasien dan biaya lainnya (Kemenkes-RI, 2013).

Biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pemberian pelayanan medis merupakan pengertian dari biaya medik langsung. Biaya tersebut meliputi biaya pengobatan, tenaga medis, biaya laboratorium, pemantauan khasiat serta efek samping (Indrayathi, P.A & Noviyanti, 2016).

Biaya pengobatan tidak langsung (*direct non medical costs*) merupakan biaya yang harus dikeluarkan secara langsung dan tidak berkaitan langsung dengan perolehan barang atau jasa medis. Harga sudah termasuk transportasi ke dan dari rumah sakit dan makan untuk keluarga pasien (Indrayathi, P.A & Noviyanti, 2016).

2. Metode Kajian Farmakoekonomi

Ada empat metode analisis dalam studi farmakoekonomi. Keempat metode analisis tersebut mempertimbangkan efikasi, keamanan, dan kualitas komparator, serta aspek ekonomis. Dari aspek ekonomi, atau satuan moneter, merupakan tujuan utama penelitian farmakoekonomi, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi untuk menentukan penggunaan sumber daya medis terbatas yang paling efisien (Kemenkes-RI, 2013).

Metode Analisis	Karakteristik Analisis
Analisis minimalisasi biaya (AMiB)	Efek dua intervensi sama (atau setara), valuasi/biaya dalam rupiah
Analisis efektivitas biaya (AEB)	Efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan diukur dalam unit alamiah/indicator kesehatan, valuasi/biaya dalam rupiah
Analisis utilitas biaya (AUB)	Efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan dalam <i>quality-</i>

	<i>adjusted life years (QALY),</i> valuasi/biaya dalam rupiah
Analisis manfaat biaya (AMB)	Efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan dinyatakan dalam rupiah, valuasi/biaya dalam rupiah

Tabel 1 Metode Analisis dalam Kajian Farmakoekonomi (Kemenkes RI, 2013)

3. Analisis Efektivitas Biaya (AEB)


Analisis biaya-manfaat (AEB) termasuk lugas. Ini banyak dipakai dalam penelitian farmakoekonomi yang bertujuan sebagai perbandingan antara dua atau lebih campur tangan kesehatan yang memberikan berbagai tingkat efektivitas. Melalui penjabaran ukuran biaya dan memprediksi hasil, penggunaan dapat menentukan bentuk campur tangan kesehatan yang efektif, dan bentuk intrusi ini memerlukan biaya hasil pengobatan yang paling rendah (Kemenkes-RI, 2013).

Saat menggunakan metode AEB, akan dihitung rasio biaya rata-rata dan rasio manfaat biaya tambahan (RIEB = rasio manfaat biaya tambahan / ICER). Dengan menggunakan RIEB, dapat dilihat bahwa setiap kali unit hemat biaya diubah, akan ada biaya tambahan. Selain itu, agar lebih mudah menarik kesimpulan tentang opsi pengobatan mana yang memberikan efektivitas terbaik secara biaya, tabel biaya-manfaat dapat digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode AEB (Kemenkes-RI, 2013).

Evaluasi nilai-manfaat adalah teknik analitis yang digunakan untuk dua atau lebih total biaya pemulihan dengan efektivitas pemulihan. Efek CEA dinyatakan sebagai proporsi dan rasio perolehan harga rata-rata (ACER), atau kenaikan biaya (rasio harga-keuntungan ekstra/ICER). Tujuan dari CEA adalah untuk gelar ICER. Hasil ACER didefinisikan sebagai biaya umum menurut unit dampak, seperti biaya umum penurunan rentang gula darah. Setelah menganalisis biaya rata-rata dan

kinerja rata-rata, langkah selanjutnya adalah menghitung efektivitas biaya umum (ACER). Nilai adalah bagian dari harga untuk mencapai hasil yang sangat baik pada nilai minimum. Panggilan paling efektif untuk perawatan yang tepat, tetapi juga perlindungan dengan harga terjangkau (Fathurrahman, 2020).

4. Langkah-langkah dalam melakukan CEA



Tabel 2 Grid Efektivitas Biaya (Andayani.2013)

Grid efektivitas biaya dapat dijadikan sebagai pendemonstrasian definisi “efektivitas biaya”. Untuk menggambarkan obat atau penyedia ini adalah biaya-kuat, setiap biaya dan efektivitas perlu diukur. Jika peluang pengobatan baru lebih kuat dan murah (sel G), lebih kuat untuk harga yang sama (sel H), atau sama kuatnya untuk lebih sedikit (sel D), maka obat baru itu sangat efektif. tetapi, jika

Efektivitas biaya	Biaya lebih rendah	Biaya Sama	Biaya lebih tinggi
Efektivitas lebih rendah	A Perhitungan ICER	B	C Didominasi
Efektivitas sama	D	E <i>Arbitrary</i>	F
Efektivitas lebih tinggi	G Dominan	H	I Perhitungan ICER

peluang pengobatan baru jauh lebih kuat dan lebih mahal (sel C), efektivitas yang sama tetapi lebih mahal (sel F), atau mengurangi efektivitas dengan menggunakan biaya yang sama (sel B), maka yang baru kesempatan pengobatan tidak selalu sangat kuat (Andyani. 2013).

Ada tiga pilihan munculnya alternatif pengobatan terkini. Ekstra mahal tapi lebih efektif (se 1), murah tapi kurang kuat (sel A), atau sama dalam biaya dan efektivitas obat standar (sel E). Untuk sel E, elemen lain yang diperlukan harus dipertimbangkan untuk menentukan perawatan mana yang berkualitas tinggi. Untuk dua sel alternatif, perhitungan ICER diperlukan untuk memutuskan biaya tambahan untuk setiap unit output tambahan (Andayani. 2013).

B. Diabetes Melitus

1. Definisi Diabetes Melitus

Diabetes tidak dapat ditanggapi secara ringkas dan dapat didefinisikan dalam frasa yang disukai sebagai serangkaian pertanyaan anatomi dan kimia, yang mana merupakan campuran dari banyak faktor. Kekurangan insulin secara

konsisten dan penurunan fungsinya merupakan kondisi umum yang menandai terjadinya diabetes melitus (Decroli, 2019).

Diabetes secara sederhana ditentukan oleh konsentrasi glukosa darah yang sangat tinggi. Tingkat diagnostik glukosa darah ditentukan berdasarkan studi alamiah yang telah menentukan ambang batas glukosa darah di mana komplikasi klinis terkait hiperglikemia mulai terjadi. Segala bentuk variasi dari diabetes, insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas tidak dapat mencapai jumlah yang normal (Semple, 2018).

IDF (*International Diabetes Federation*) memperkirakan ada 352 juta orang berusia antara 20 dan 64 tahun dengan diabetes melitus pada 2019 secara global. Jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi 417 juta orang pada tahun 2030 dan 486 juta pada tahun 2045. Untuk usia antara 65 dan 99 tahun, terdapat 111 juta di tahun 2019, diprediksi akan meningkat menjadi 195 juta pada tahun 2030 dan 276 juta pada tahun 2045 (Reddy & Tan, 2020).

Badan Pusat Statistik mengeluarkan data pada tahun 2003, prevalensi diabetes untuk masyarakat yang berusia 20 tahun diprediksi sebesar 14,7% dari 133 juta orang untuk daerah perkotaan dan akan bertambah menjadi 194 juta di tahun 2030, sedangkan 7,2% atau 8 juta orang untuk daerah terpencil dan bertambah menjadi 13,7 juta orang pada tahun 2030 (PERKENI, 2019).

2. Diabetes Melitus Tipe 2

Diabetes Melitus Tipe 2 adalah penyakit yang dapat disebabkan oleh berbagai jenis faktor risiko terutama faktor genetik dan lingkungan memainkan peran yang cukup krusial dalam patogenesisnya. Penyebab utamanya adalah defek kerja insulin, output glukosa hati, dan sekresi insulin (Sudagani & Hitman, 2012).

Dua patofisiologi utama kasus bawaan Diabetes Melitus Tipe 2 adalah resistensi insulin dan terjadinya defekasi pada fungsi sel beta pankreas. Pada orang

yang menderita obesitas, resistensi insulin adalah kondisi umum yang sering ditemukan. Insulin tidak dapat menjalankan peran terbaiknya dalam jaringan otot, lemak, dan sel-sel hati, sehingga memaksa pankreas untuk berkompensasi menghasilkan lebih banyak insulin. Pada saat insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas tidak cukup untuk mengimbangi peningkatan resistensi insulin, kadar gula darah akan meningkat dan hiperglikemia kronis sangat berisiko dapat terjadi. Hiperglikemia kronis pada Diabetes Melitus Tipe 2 di satu perspektif dapat merusak sel beta secara berkelanjutan, dan di perspektif lain dapat memperburuk kondisi resistensi insulin, sehingga penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan penyakit yang bersifat progresif (Decroli, 2019).

Sebelum dikenal sebagai Diabetes Melitus tipe 2, sel beta pankreas bekerja dengan memproduksi insulin yang cukup untuk meningkatkan resistensi insulin. Pada saat analisis Diabetes Melitus tipe 2, fitur sel beta pankreas berkurang dengan bantuan 50%, sehingga negara resistensi insulin mendominasi perkembangan kerusakan kerangka karena diabetes mellitus tipe 2. Secara klinis mirip dengan Diabetes Melitus tipe 1, dimana Diabetes Melitus tipe 2 adalah defisiensi insulin absolut (Decroli, 2019).



Gambar 1 Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 2 (Kemenkes RI, 2020)

Peningkatan prevalensi diabetes tipe 2 terutama disebabkan oleh peningkatan insiden diabetes di negara berkembang. Lonjakan insiden diabetes tipe 2 sebelumnya adalah peningkatan insiden obesitas, terkait dengan berkurangnya aktivitas fisik dan peningkatan asupan kalori (Reddy & Tan, 2020).

Sekitar 90-95% dari semua kasus diabetes terdiri dari Diabetes Melitus Tipe 2. Di Amerika Serikat, sebesar 12,1% prevalensi diabetes tipe 2 terjadi pada orang dewasa, dan terus meningkat. Variasi antara ras dan kelompok etnis serta seiring bertambahnya usia meningkatkan risiko terkena Diabetes Melitus Tipe 2. Meskipun prevalensi Diabetes Melitus tipe 2 meningkat seiring bertambahnya usia, angka diagnosis penyakit ini semakin tinggi pada remaja dan dewasa muda. Ini mungkin karena meningkatnya kejadian obesitas dan kurangnya latihan fisik secara teratur. Faktor genetik memainkan peran penting dalam perkembangan Diabetes Melitus Tipe 2, dan kebanyakan kasus Diabetes Melitus Tipe 2 tampaknya poligenik (DiPiro et al., 2020).

3. Gejala Klinik Diabetes Melitus

Gejala dari diabetes bisa menjadi akut dan kronis. Gejala diabetes akut antara lain: *polifagia* (frekuensi makan meningkat), *polidipsia* (frekuensi minum meningkat), *poliuria* (sering kencing/buang air kecil di malam hari), nafsu makan meningkat, tetapi berat badan turun dengan cepat (510 kg pada 24 minggu, cepat lelah (Fatimah, 2015).

Gejala diabetes kronis meliputi: kesemutan, rasa terbakar atau tertusuk jarum, kesemutan pada kulit, kram, kelelahan, kemudahan penanganan, penglihatan kabur, gigi mudah lepas dan rontok, dan fungsi seksual yang buruk. Pria juga bisa mengalami disfungsi ereksi, dan kematian janin yang dialami oleh ibu hamil atau berat bayi pada saat lahir seberat 4 kg (Fatimah, 2015).

4. Faktor Resiko Diabetes Melitus

Faktor bahaya penyebab Diabetes Melitus tipe 2 dibagi menjadi faktor bahaya yang dapat dipilih, elemen peluang yang tidak dapat dikendalikan, dan elemen bahaya yang berbeda. Catatan keluarga, umur >45 tahun, ras, berat badan awal >4 kg, catatan diabetes gestasional, dan catatan berat badan awal <2,5 kg

merupakan faktor bahaya yang tidak dapat diaktifkan. Faktor risiko yang harus diperhatikan adalah masalah berat badan dengan BMI 25 kg/m² atau lingkar perut delapan puluh cm untuk perempuan dan 90 cm untuk laki-laki, kurang olahraga, tekanan darah tinggi, dislipidemia dan pola makan yang buruk (Fatimah, 2015).

Berbagai faktor risiko untuk diabetes terdiri dari *Polycystic Ovarian Syndrome* (PCOS), *Impaired Glucose Tolerance* (IGT) atau Gangguan Glukosa Puasa (IFG), stroke, penyakit jantung koroner atau *Perifer Arterial Disease* (PAD), penggunaan alkohol, stres, dan merokok, jenis kelamin, asupan kopi dan kafein (Fatimah, 2015).

5. Komplikasi Diabetes Melitus

Karena masalah metabolisme yang terkait dengan diabetes memengaruhi seluruh tubuh, orang lanjut usia dengan penyakit ini menghadapi berbagai potensi komplikasi yang memengaruhi banyak sistem organ yang berbeda. Jika penyakit tidak terkontrol dengan baik, tidak diobati tepat waktu atau terlambat didiagnosis, komplikasi serius dapat terjadi. Selain itu, kontrol glukosa darah yang buruk pada pasien diabetes merupakan faktor risiko utama untuk komplikasi stadium akhir penyakit ini (Bermudez, 2018).

Komplikasi seperti *makrovaskular* dan *mikrovaskular* sering menjadi penyebab terjadinya diabetes melitus. Komplikasi *makrovaskular* disebabkan karena terjadinya resistensi insulin (Decroli, 2019). Diabetes, apapun jenisnya, dapat menyebabkan berbagai komplikasi sistemik, yang sebagian besar adalah penyakit pembuluh darah, dan berhubungan dengan penurunan harapan hidup dan kualitas hidup. Ini termasuk komplikasi mikrovaskular, yang terutama terdiri dari *retinopati*, *nefropati*, dan *neuropati*, yang semuanya unik untuk diabetes, dan Penyakit Kardiovaskular (CVD), yang terdiri dari Penyakit Jantung Koroner (PJK), stroke, dan *Perifer Artery Disease* (PAD) (Sone, 2018).

a. Komplikasi Mikrovaskular

Komplikasi *mikrovaskuler*, komplikasi *mikrovaskuler* terutama terjadi pada penderita Diabetes Melitus tipe 1 seperti *retinopati*, *nefropati*, *neuropati*, dan amputasi (Fatimah, 2015).

1) Retinopati

Perubahan ekspresi berbagai faktor pertumbuhan lokal di retina diperkirakan menjadi perantara perubahan pembuluh darah di retina. Edema makula juga lebih sering terjadi pada pasien diabetes, dan dapat terjadi dengan atau tanpa *retinopati proliferatif*. Bila didiagnosis diabetes tipe 2, maka pasien diabetes harus dirujuk ke dokter mata, jika *asimtomatik*, harus dirujuk ke dokter mata 5 tahun setelah diagnosis diabetes tipe 1. Faktor risiko terpenting untuk retinopati termasuk Durasi diabetes, Kontrol glikemik, Hipertensi (Reddy & Tan, 2020).

2) Nefropati

Nefropati diabetik atau biasa disebut dengan Penyakit Ginjal Diabetik (PGD) adalah penyakit pada organ ginjal yang disebabkan oleh diabetes. PGD merupakan hasil interaksi antara faktor hemodinamik dan metabolik. Elemen hemodinamik mendorong peningkatan PID melalui peningkatan tekanan sistemik dan glomerulus, sehingga mengaktifkan jalur hormon vasoaktif yang mencakup perangkat Renin-Angiotensin "RAS". Dan endotelin. Elemen hematogen terdiri dari berbagai sel GF bersama dengan protein kinase C (%), Mitogen-Activated Protein (MAP Kinase), NF, dan *sitokin sclerosing*, TGF β , faktor peningkatan permeabilitas (PEGF), dan pembuluh darah. Hal pertumbuhan intrinsik (VEGF) meningkatkan utusan ke-2 internal (Decroli, 2019).

3) Neuropati

Neuropati adalah komplikasi yang memengaruhi sistem saraf sensorik, motorik, dan otonom. Gejala nyeri atau parestesia dapat terjadi pada beberapa

penderita diabetes (Reddy & Tan, 2020). Diabetes kronis dikaitkan dengan aterosklerosis yang dipercepat.

Risiko kejadian kardiovaskular yang fatal (stroke dan infark miokard) pada diabetes meningkat dua hingga empat kali lipat. Karena efek samping aterosklerosis dan hiperglikemia dalam meningkatkan ukuran dan keparahan infark, diabetes dikaitkan dengan infark serebral yang lebih sering dan lebih parah (stroke). Penyebab paling umum dari stroke adalah *stenosis arteri aterosklerotik (erosi)* (menghasilkan gumpalan darah yang tidak stabil, yang disebut pembekuan emboli lebih jauh ke hilir) atau menghalangi pembuluh darah besar yang memasok otak (Zochodne, 2014).

b. Komplikasi Makrovaskular

Penyakit vaskuler *aterosklerotik* merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien diabetes. Untuk penderita diabetes tipe 1, lebih dari sepertiga angka kematian disebabkan oleh penyakit jantung dan *serebrovaskular*; untuk diabetes tipe 2, dua pertiga dari angka kematian adalah akibat penyakit makrovaskular. Usia dan tekanan darah adalah faktor risiko terkuat yang terkait dengan kematian berikutnya akibat penyakit jantung koroner. Dislipidemia, hiperinsulinemia, dan merokok juga termasuk etiologi umum yang penting untuk diabetes (Reddy & Tan, 2020).

Komplikasi *Cardiovascular Disease* pada penderita Diabetes Melitus Tipe 2 disebabkan oleh adanya penurunan fungsi endotel dan hiperglikemia kronik akibat resistensi insulin yang dapat menyebabkan *aterosklerosis kardiovaskuler*. Penurunan potensi insulin memainkan peran penting dalam patofisiologi Diabetes Melitus tipe 2 dan sakit kepala CVD. Elemen genetik dan lingkungan memainkan peran penting dalam peningkatan prevalensi resistensi insulin dan gangguan kardiovaskular. Pasien yang menderita obesitas dengan Diabetes Melitus Tipe 2,

peningkatan resistensi insulin disebabkan oleh akibat dari pelepasan asam lemak bebas dan sitokin inflamasi pada jaringan adiposa (Decroli, 2019).

c. Ulkus Kaki Diabetik (UKD)

Diabetic Foot Ulcer (DFU) atau Ulkus Kaki Diabetik adalah komplikasi kronis yang paling umum dari Diabetes Melitus Tipe 2. DFU adalah masalah kesehatan yang terjadi pada bagian kaki pasien diabetes yang ditandai dengan kelainan sensorik, motorik, otonom dan/atau vaskular pada ekstremitas bawah. Unsur yang berperan dalam patogenesis DFU antara lain hiperglikemia kronis, neuropati perifer, restriksi sendi dan deformitas (Decroli, 2019).

d. Komplikasi Pada Tulang

Pasien diabetes memiliki peningkatan risiko patah tulang yang rapuh. Dibandingkan dengan kelompok kontrol, *Bone Mineral Density* (BMD) berkurang pada diabetes tipe 1, padahal biasanya normal atau bahkan sedikit meningkat pada diabetes tipe 2. Namun, kedua jenis diabetes ini dikaitkan dengan penurunan perombakan tulang dan perubahan struktur mikro, terutama dengan komplikasi mikrovaskuler. Hiperglikemia, stres oksidatif dan akumulasi *Advanced Glycation End Products* (AGEs) berhubungan dengan perubahan kolagen, peningkatan lemak sumsum tulang, pelepasan adipokin inflamasi, dan perubahan fungsi sel tulang. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan termasuk potensi bahaya hipoglikemia yang dapat meningkatkan risiko jatuh, dan efek langsung pengobatan (seperti Thiazolidinedion) pada tulang. Komplikasi umum diabetes, seperti *neuropati*, keseimbangan yang buruk, *sarcopenia*, gangguan penglihatan, dan kejadian penurunan gula darah yang sering, semuanya meningkatkan risiko jatuh dan patah tulang (Reddy & Tan, 2020).

f. Komplikasi Pada Gigi

Ada bukti kuat bahwa pasien periodontitis memiliki peningkatan risiko gula darah dan resistensi insulin, dan oleh karena itu juga meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Diabetes dapat meningkatkan *periodontitis* melalui respon inflamasi yang berlebihan pada *flora periodontal*.

Perubahan pola makan yang meningkatkan kandungan gula sederhana dan mengurangi kandungan karbohidrat kompleks dan serat dapat menyebabkan lingkungan mikro mulut yang tidak sehat. Glukosa yang dilepaskan ke air liur dapat dimetabolisme menjadi asam laktat melalui plak. Hal ini menyebabkan penurunan pH air liur dan peningkatan bakteri *asidofilik*. Oleh karena itu, mikrobioma oral dapat berubah. Diperkirakan bahwa perubahan biofilm gigi selanjutnya akan menyebabkan karies gigi dan penyakit *periodontal* (Reddy & Tan, 2020).

g. Komplikasi Muskuloskeletal

Manifestasi diabetes muskuloskeletal sangat umum. Meskipun tidak mengancam jiwa, ini merupakan penyebab penting morbiditas, nyeri, dan kematian. Komplikasi muskuloskeletal yang sering terjadi pada pasien diabetes antara lain *capsulitis* bahu, keterbatasan mobilitas sendi, kontraktur *Dupuytren*, *carpal tunnel syndrome*, dan *trigger finger*. Kerusakan pembuluh darah dan saraf, *glikosilasi protein*, dan peningkatan kolagen di kulit dan jaringan ikat muskuloskeletal adalah beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan penyakit tulang dan tulang pada pasien diabetes (Prakasa, 2020).

C. Diagnosis Diabetes Melitus

Diagnosis diabetes memerlukan penggunaan titik potong glukosa darah untuk membedakan pasien dengan gula darah normal dan gula darah abnormal (DiPiro et al., 2020). Diagnosis dari penyakit diabetes berdasarkan standar glukosa plasma, *Fasting Plasma Glucose* (FPG)/Gula Darah Puasa (GDP) atau *2-h Plasma*

Glucose (2-h PG)/Gula Darah 2 Jam Postprandial (GD2PP) nilai selama 75 g *Oral Glucose Tolerance Test (OGTT)/Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO)* atau kriteria A1C/HbA1c (ADA, 2018).

Gula Darah Puasa (GDP)	
Gula Darah Puasa Normal	70-99 mg/dL (3,9-5,5 mmol/L)
Gula Darah Puasa Terganggu	100-125 mg/dL (5,6-6,9 mmol/L)
Diabetes Melitus	≥126 mg/dL (≥7,0 mmol/L)
Gula Darah 2 Jam Postprandial (GD2PP)	
Toleransi Gula Darah Normal	<140 mg/dL (<7,8 mmol/L)
Toleransi Gula Darah Terganggu	140-199 mg/dL (7,8-11,0 mmol/L)
Diabetes Melitus	≥200 mg/dL (≥11,1 mmol/L)
Hemoglobin Glikosilat A1C (HbA1c)	
Normal HbA1c	4%-6,4% (0,04-0,055; 39-46 mmol/mol Hb)
Pradiabetes	5,7%-6,4% (0,057-0,064; 39-46 mmol/mol Hb)
Diabetes Melitus	≥6,5% (≥0,065; ≥48 mmol/mol Hb)

Tabel 3 Definisi Glikemia Normal dan Abnormal (Dipiro. 2020)

1. HbA1c ≥6,5% (0,065; 48 mmol / mol Hb). Tes harus dilakukan di laboratorium dengan menggunakan metode yang bersertifikat <i>National Glycohemoglobin Standardization Program</i> (NGSP) dan distandarisasi dengan uji DCCT.
2. Glukosa plasma puasa ≥126 mg / dL (7,0 mmol / L). Puasa diartikan puasa sebagai tidak ada asupan kalori selama minimal 8 jam.

3. Glukosa plasma dua jam ≥ 200 mg / dL (11,1 mmol / L) selama OGTT. Tes harus dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menggunakan beban glukosa yang mengandung setara dengan 75 g glukosa anhidrat yang dilarutkan dalam air.
4. Pada pasien dengan gejala klasik hiperglikemia krisis hiperglikemik, konsentrasi glukosa plasma acak ≥ 200 mg / dL (11,1 mmol / L).

Tabel 4 Kriteria Diagnosis Diabetes Melitus (Dipiro. 2020)

Jika metode *National Glycohemoglobin Standardization Program* (NGSP) digunakan, A1C adalah tes logis untuk diagnosis diabetes karena dapat mengukur paparan glukosa darah dalam rentan waktu 2 sampai 3 bulan terakhir, daripada pengukuran glukosa darah satu titik satu hari. Selain itu, pasien tidak perlu berpuasa, dan A1C adalah tes yang tersedia dengan mudah. A1C sebesar 6,0% hingga 6,4% (0,06-0,064; 42-46 mmol / mol Hb) menunjukkan peningkatan risiko diabetes 10 kali lipat, tetapi pasien dengan gangguan glukosa darah puasa atau gangguan toleransi glukosa tidak dapat diidentifikasi secara konsisten. Ada sedikit perbedaan etnis pada tingkat A1C normal. Dengan menggunakan ambang A1C $\geq 6,5\%$ (0,065; 48 mmol / mol Hb) dibandingkan dengan ambang batas FPG ≥ 126 mg / dL (7,0 mmol / L), pasien diabetes mengurangi A1C lebih tinggi dari tingkat FPG hingga sepertiganya. ADA terus merekomendasikan tiga standar glukosa lainnya untuk mendiagnosis diabetes pada orang dewasa yang tidak hamil (DiPiro et al., 2020).

Hasil tes yang menunjukkan hasil yang tidak normal atau Diabetes Melitus tergolong dalam kondisi pradiabetes, dimana meliputi gangguan toleransi glukosa (TGT) dan glukosa puasa terganggu (GDPT). GDPT: Hasil tes glukosa darah puasa antara 100-125 mg/dL dan OGTT plasma 2 jam < 140 mg/dL. Toleransi Glukosa Terganggu (TGT): Glukosa plasma antara 140–199 mg/dL dan glukosa puasa < 100

mg/dL 2 jam setelah TTGO. Kami mendapatkan GDPT dan TGT bersama-sama. Diagnosis pradiabetes bisa 5,7~6,4% bahkan dengan hasil tes HbA1c (PERKENI, 2019).

D. Penatalaksanaan Diabetes Melitus

Dalam hal ini membutuhkan kontrol gula darah dan kontrol komorbiditas dan faktor risiko kardiovaskular. Kontrol glukosa darah telah terbukti mengurangi komplikasi jangka panjang, tetapi kontrol glukosa darah yang berlebihan juga dapat menyebabkan prognosis yang buruk. Oleh karena itu, tujuan penurunan glukosa darah harus dipersonalisasi untuk setiap pasien, dan harus dipertimbangkan berdasarkan keseimbangan antara bukti uji klinis dan faktor khusus bagi pasien (DiPiro et al., 2020).

Semua pasien diabetes menerima diet plus terapi olahraga, dan sebagian besar pasien juga perlu menggunakan obat hipoglikemik untuk pengobatan guna mencapai dan mempertahankan kontrol gula darah yang baik (Reddy & Tan, 2020).

1. Terapi Non-Farmakologi

Terapi Non-farmakologi merupakan terapi tanpa menggunakan atau melibatkan obat-obatan. Terapi non-farmakologis, seperti Diet atau *Medical Nutrition Therapy* (MNT), latihan fisik, dan *Diabetes Self-Management Education* (DSME), adalah landasan pengobatan untuk semua pasien diabetes.

a. Diet atau *Medical Nutrition Therapy* (MNT)

MNT adalah bagian penting dari perawatan kompleks diabetes tipe 2. Kunci keberhasilan adalah kontribusi penuh dari pelaku pemberi kesehatan (dokter, ahli gizi, profesional kesehatan lainnya, pasien dan keluarga). Agar MNT tercapai, mesti diberikan secara adil sesuai dengan kebutuhan pasien diabetes (PERKENI, 2019).

Diet harus individual, karena diet yang memberikan batasan kalori yang sama namun berbeda kandungan protein, karbohidrat, dan lemaknya sama efektifnya dalam menurunkan berat badan. Untuk pasien dengan tujuan penurunan berat badan jangka pendek, rencana pemeliharaan berat badan komprehensif jangka panjang (> 1 tahun) harus dikembangkan. Rencana semacam itu harus memberikan kontak setidaknya sebulan sekali, dan sering melakukan pemantauan berat badan terus menerus (mingguan atau lebih sering), asupan terus menerus dari diet rendah kalori, dan latihan fisik tingkat tinggi (200-300 menit / minggu). Untuk mengurangi berat badan hingga 0,5%, praktisi perawatan kesehatan terlatih dapat meresepkan intervensi jangka pendek (3 bulan) untuk pasien yang dipilih dengan cermat. Intervensi ini harus mengadopsi pasien yang dipilih dengan cermat dan menggunakan diet sangat rendah kalori (setiap hari 800 kkal / hari) dan pengaturan makanan pengganti makanan lengkap dan pemantauan medis ketat. Untuk mempertahankan penurunan berat badan, rencana tersebut harus menyertakan konseling pemeliharaan berat badan komprehensif jangka Panjang (ADA, 2018).

Dianjurkan untuk mengembangkan rencana makan sehat dengan kandungan kalori dan karbohidrat sedang, kandungan lemak jenuh rendah (yaitu, kurang dari 7% dari total kalori), dan mengandung semua vitamin dan mineral yang diperlukan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa diet Mediterania yang kaya lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda mungkin memiliki manfaat glukosa dan Kardiovaskular dan harus dipertimbangkan (Decroli, 2019).

b. Aktivitas Fisik

Latihan fisik merupakan kunci untuk mengontrol diabetes, terutama mengontrol kadar gula dalam darah dan meningkatkan etiologi penyakit. Latihan fisik yang terjaga dan sedang dapat menurunkan angka kematian pasien diabetes

tipe II sekitar 45-70%, dan menurunkan tingkat HbA1c ke tingkat yang dapat mencegah komplikasi (Purnama & Sari, 2019).

Namun olah raga mesti dilakukan secara rutin dan mencakup berbagai variasi olah raga untuk memberikan manfaat jangka panjang. Selama tindakan pencegahan tertentu dilakukan, kebanyakan penderita diabetes tipe 2 dapat berolahraga dengan aman (Kurniawan & Wuryaningsih, 2016).

c. *Diabetes Self-Management Education (DSME)*

Pendidikan tidak hanya berfokus pada pencegahan kesehatan tetapi juga pada implementasi dan promosi kehidupan sebagai bagian penting dari manajemen DS secara keseluruhan (PERKENI, 2019).

Diabetes Self-Management Education (DSME) atau pendidikan kesehatan independen untuk manajemen diabetes dapat digunakan untuk mempromosikan pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan yang diperlukan untuk swamanajemen diabetes. DSME mengikuti budaya dan otorisasi pasien untuk mencapai kesehatan yang optimal, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kebutuhan biaya perawatan (AADE, 2018).

2. Terapi Farmakologi

Pengobatan diberikan bersamaan dengan pengaturan pola makan dan latihan fisik (gaya hidup sehat). Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan suntikan (PERKENI, 2019).

a. Terapi Insulin

Terapi insulin bekerja berdasarkan pola fisiologis dari sekresi insulin. Kekurangan insulin dapat berupa defisiensi insulin basal, insulin postprandial atau keduanya. Kekurangan insulin basal dapat mengakibatkan gula darah tinggi dalam kondisi puasa, sementara kekurangan insulin sebelum makan dapat menyebabkan gula darah tinggi setelah makan (Decroli, 2019).

Berdasarkan (PERKENI, 2019) Insulin diperlukan pada keadaan :

- 1) HbA1c > 9% insufisiensi metabolic
- 2) Penurunan berat badan yang cepat
- 3) Hiperglikemia berat yang disertai *ketosis*
- 4) Krisis Hiperglikemik
- 5) Kegagalan dosis optimal kombinasi OHO
- 6) Stres berat (infeksi sistemik, operasi besar, infark miokard akut, stroke)
- 7) Diabetes Melitus dengan kehamilan/rencana makan dengan diabetes gestasional yang tidak terkontrol
- 8) Disfungsi ginjal atau hati yang parah
- 9) Kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO
- 10) Kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi

Farmakokinetik dan farmakodinamik produk insulin ditandai dengan penampilan dan onset, *peak* dan durasi kerja. Absorpsi insulin oleh *reservoir* subkutan bergantung pada beberapa unsur, antara lain sumber insulin, konsentrasi insulin, aditif sediaan insulin (seperti seng dan protamin), aliran darah ke tempat tersebut (menyeka tempat suntikan, kenaikan suhu kulit, dan Olah raga (DiPiro et al., 2020). Berdasarkan lama kerja, insulin terbagi menjadi 5 jenis, yakni :

- 1) Insulin kerja cepat (Rapid-acting insulin)

Setelah menggunakan insulin ini, insulin akan mulai bekerja dalam waktu 15 menit. Setelah beberapa jam, sebagian besar akan hilang dari tubuh. Ini harus diambil sebelum atau sesudah makan (FDA, 2018).

- 2) Insulin kerja pendek (Short-acting insulin)

Setelah menggunakan insulin, insulin akan mulai bekerja dalam waktu 30 menit hingga 1 jam. Setelah beberapa jam, sebagian besar akan hilang dari tubuh. Insulin jenis ini digunakan 30-45 menit sebelum makan (FDA, 2018).

3) Insulin kerja menengah (Intermediate acting insulin)

Setelah menggunakan insulin ini, insulin akan mulai bekerja dalam 2-4 jam. Ini mencapai tingkat tertinggi dalam darah Anda sekitar 6 hingga 8 jam setelah digunakan. Biasanya digunakan di pagi hari atau waktu tidur untuk membantu mengontrol gula darah di antara waktu makan (FDA, 2018).

4) Insulin kerja panjang (Long-acting insulin)

Setelah menggunakan insulin ini, insulin akan mulai bekerja dalam 2-4 jam. Ini mencapai tingkat tertinggi dalam darah Anda sekitar 6 hingga 8 jam setelah digunakan. Biasanya digunakan di pagi hari atau waktu tidur untuk membantu mengontrol gula darah di antara waktu makan (FDA, 2018).

5) Insulin kerja ultra panjang (Ultra longacting insulin)

Insulin basal kerja ultra-panjang dirancang untuk memperpanjang penyerapan ke dalam sirkulasi sistemik, sehingga memperpanjang durasi kerja. Penyerapan insulin basal kerja ultra-panjang jangka panjang ini juga mengarah pada kurva farmakokinetik yang halus dan konsisten dengan penurunan konsentrasi puncak, yang lebih menyerupai sekresi fisiologis insulin basal di pankreas dalam kondisi puasa. Konsentrasi serum puncak yang kabur juga dapat mengurangi risiko hipoglikemia (Davis et al., 2018).

6) Insulin campuran tetap, kerja pendek dengan menengah dan kerja cepat dengan menengah (Premixed insulin)

Ini adalah kombinasi dari dua jenis insulin. Ini termasuk satu jenis yang dapat membantu Anda mengontrol gula darah selama makan, dan jenis lain yang dapat membantu di antara waktu makan (FDA, 2018).

Insulin disuntikkan melalui di bawah kulit. Tempat suntikan biasanya di perut, bokong, paha dan lengan atas. Dilakukan dengan cara memutar tempat

suntikan, penderita dapat terhindar dari lemak berlebih, yaitu bertambahnya atau bertambahnya ukuran sel lemak di bawah kulit (Afifah, 2016).

Sediaan (U-100 dinyatakan sebaliknya)	Onset	Peak	Durasi
Ultra-rapid Acting			
Insulin Aspart (Flasp)	15-20 menit	90-120 menit	5-7 jam
Insulin humanis-inhaled (Afrezza)	12 menit	35-55 menit	1,5-4,5 jam
Rapid-acting			
Insulin aspart (Novolog)	10-20 menit	30-90 menit	3-5 jam
Insulin lispro U-100, U-200 (Humalog)			
Insulin Glulisin (Apidra)			
Short-acting			
Regular (Novolin R, Humulin R)	30-60 menit	2-4 jam	5-8 jam
Intermediate-acting			
NPH (Humulin N, Novolin N)	2-4 jam	4-10 jam	10-24 jam
Regular U-500 (Humulin R 500)	15 menit	4-8 jam	13-24 jam
Long-acting			
Insulin detemir (Levemir)	1,5-4 jam	6-14 jam	16-20 jam
Insulin Glargine (Lantus, Basaglar)	2-4 jam	-	20-24 jam
Insulin glargine U-300 (Toujeo)	6 jam	-	36 jam
Insulin degludec U-100, U-200 (Tresiba)	1 jam	-	42 jam

Produk Kombinasi			
70% NPH / 30% Regular (Humulin 70/30, Novolin 70/30)	30-60 menit	Dual	10-16 jam
75% NPL, 25% Lispro (Humalog 75/25)	5-15 menit		
50% NPL, 50% Lispro (Humalog 50/50)			
70% insulin aspart protamine, 30% insulin aspart (Novolog 70/30)			15-18 jam

Tabel 5 Farmakodinamik Sediaan Insulin (Dipiro. 2020)

Hipoglikemia merupakan efek samping utama yang biasa terjadi. Efek samping lainnya adalah respon imun terhadap insulin, yang bisa menyebabkan alergi insulin. Untuk menurunkan potensi etiologi hipoglikemia, semua orang dengan diabetes tipe 2 pada terapi insulin harus diberitahu tentang tanda-tanda hipoglikemia. Jika pasien mengalami gejala hipoglikemia setelah pemberian insulin, petugas akan segera memeriksa kadar gula darahnya, dan jika kadar gula darah <70 mg/dl, pasien harus memenuhi asupan air manis dan menurunkan tingkat gula darah dengan cepat. Dosis insulin untuk injeksi insulin berikutnya (Decroli, 2019).

b. Terapi Obat Hipoglikemik Oral (OHO)

Jika kadar glukosa pada plasma darah tidak mencapai tingkat target, pengobatan dengan agen Hipoglikemik Oral (HGO) dan/atau semprotan insulin harus dilakukan. Pemilihan alternatif pengobatan bagi penderita diabetes tipe 2 membutuhkan banyak pertimbangan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dicatat, untuk beberapa alasan OHO dapat diberikan sendiri atau dalam kombinasi (Decroli, 2019).

1) Golongan Sulfonilurea

Mekanisme kerja utama dari obat ini yaitu meningkatkan sekresi insulin dari sel β pankreas (PERKENI, 2019). Obat ini meningkatkan sekresi insulin dengan menjalin ikatan dengan reseptor sulfonilurea spesifik (SUR1) pada sel beta pankreas. Pengikatan menyumbat saluran K^+ yang bergantung pada adenosin trifosfat, menghasilkan aliran kalium yang berkurang dan depolarisasi membran selanjutnya. Saluran Ca^{+2} yang bergantung pada tegangan terputus, dan aliran masuk Ca^{+2} diperbolehkan. Peningkatan Ca^{+2} intraseluler berikatan dengan kalmodulin pada butiran yang mensekresi insulin, menyebabkan butiran yang mensekresi insulin bergeser ke permukaan sel dan menyebabkan *eksositosis* butiran insulin. Peningkatan produksi insulin di pankreas disalurkan melalui vena portal dan selanjutnya menghambat produksi glukosa hati (DiPiro et al., 2020).

Sulfonilurea dengan cepat diserap di saluran pencernaan dan dalam waktu 15 menit dapat mencapai kadar darah setelah pemberian oral. Sulfonilurea diolah di hati dan dikeluarkan melalui urin melalui ginjal (Gumantara & Oktarlina, 2017). Obat-obat yang termasuk dalam golongan Sulfonilurea antara lain, Glibenklamid, Gliclazid, Glimepirid, Glipizid, Tolbutmid (BNF, 2020).

2) Golongan Biguanid

Efek utama metformin adalah menurunkan sekresi glukosa di hati (*glukoneogenesis*) dan meningkatkan pengambilan glukosa di jaringan sekitarnya. Dalam kebanyakan kasus Diabetes Melitus Tipe 2, Metformin adalah pilihan pertama (PERKENI, 2019). Di tingkat sel, metformin mengaktifkan AMP kinase. Metformin telah terbukti mengurangi produksi glukosa hati, tetapi tidak semua efek dapat dijelaskan dengan mekanisme ini, dan semakin banyak bukti bahwa mekanisme ini ada di usus. Selain itu, kerja metformin mungkin sebagian disebabkan oleh peningkatan sensitivitas insulin di jaringan perifer (otot), yang

meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel otot. Pada metformin, konsentrasi insulin menurun seiring dengan meningkatnya sensitivitas insulin (DiPiro et al., 2020).

Metformin sangat efektif dalam menurunkan berat badan pada penderita diabetes dengan kondisi obesitas. Protein dalam plasma tidak dapat diikat oleh metformin yang bersirkulasi dan sepenuhnya kemudian diekskresikan dalam urin. Waktu paruh obat metformin sekitar 2 jam. Karena tidak memiliki efek hipoglikemik, metformin aman untuk digunakan oleh orang tua (Decroli, 2019). Yang termasuk dalam golongan biguanid yaitu Metformin, Fenformin, dan Buformin (BNF, 2020).

3) Golongan Meglitinid

Meglitinida mirip dengan obat Sulfonilurea, kecuali bahwa mereka memiliki onset kerja yang cepat dengan durasi kerja yang singkat. Dengan mengikat ke situs yang berdekatan dengan reseptor Sulfonilurea, Nateglinid, dan Repaglinid membuat sel pankreas untuk mensekresi insulin, mirip dengan Sulfonilurea, efek samping utama adalah hipoglikemia dan dapat menyebabkan penambahan berat badan (DiPiro et al., 2020). Glikoprotein dapat digunakan di bawah pengawasan orang tua. Meglitinid dimetabolisme dan diekskresikan oleh kandung empedu, sehingga relatif aman digunakan pada orang lanjut usia dengan insufisiensi ginjal ringan hingga sedang (Decroli, 2019). Obat yang termasuk dalam golongan ini yaitu Nateglinide dan Repaglinide (BNF, 2020).

4) Penghambat Glukosidase

Mekanisme kerja glukosidase inhibitor bekerja dengan memperlambat penyerapan glukosa dalam darah, sehingga dapat menurunkan kadar gula darah setelah makan (PERKENI, 2019). Acarbose praktis tidak diserap dan bekerja pada permukaan di dalam saluran pencernaan. Acarbose dimetabolisme di saluran

pencernaan melalui peningkatan mikroba, hidrolisis usus, dan enzim pencernaan. Menghambat gerakan enzim ini dengan benar dapat menurunkan kisaran gula darah postprandial pada orang dengan diabetes tipe 2. Hasil faset termasuk tanda dan gejala gastrointestinal yang meliputi perut kembung dan diare. Acarbose dikontraindikasikan pada sindrom iritasi usus besar, obstruksi gastrointestinal, sirosis hati dan gagal ginjal berat, dengan biaya filtrasi glomerulus 30 ml / menit / 1,73 m (Decroli, 2019).

5) Golongan Tiazolidinedion (TZD)

Thiazolidinedion bekerja dengan mengaktifkan reseptor ketika berikatan dengan reseptor *Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma* (PPAR- γ), yang merupakan reseptor inti yang ditemukan di otot, lemak, dan sel-sel hati (PERKENI, 2019). Thiazolidinedione menurunkan konsentrasi glukosa hati dan menurunkan asam lemak bebas plasma. Thiazolidinedion menurunkan kadar HbA1c (11,5%), menaikkan kadar HDL, dan mungkin memiliki berbagai efek pada lemak trigliserida dan LDL. Itu tidak mempengaruhi masalah makan (Decroli, 2019).

TZD juga memengaruhi keadaan *adipokin* (misalnya *angiotensinogen*, faktor nekrosis jaringan- α , interleukin 6, PAI-1), yang secara signifikan dapat memengaruhi sensitivitas insulin, fungsi endotel, dan peradangan. Perlu dicatat bahwa obesitas dan diabetes akan mengurangi kandungan *adiponektin*, tetapi dengan peningkatan pengobatan TZD, *adiponektin* akan meningkat, sehingga meningkatkan fungsi endotel, sensitivitas insulin, dan memiliki efek antiinflamasi yang efektif (DiPiro et al., 2020). Yang termasuk dalam golongan ini yaitu Pioglitazone (BNF, 2020).

6) DPP-4 Inhibitor

Enterokinin adalah peptida yang dikeluarkan oleh usus kecil sebagai respon terhadap makanan di usus. Ada 2 jenis peptida yang diklasifikasikan sebagai inkretin yang memengaruhi pengolahan glukosa: GLP1 (peptida mirip glukagon 1) dan GIP (peptida insulinotropik bergantung glukosa). Dari keduanya, GLP1 adalah yang peran utama dalam metabolisme glukosa. GLP1 berperan dalam menaikkan produksi insulin terutama pada sekresi insulin fase 1, karena glukosa intraseluler menghambat sekresi glukagon. Keduanya menyebabkan penurunan gula darah (Decroli, 2019).

Penghambat DPP-4 dapat ditoleransi dengan sangat baik. Reaksi yang merugikan jarang terjadi, tetapi mungkin termasuk hidung tersumbat, pilek; sakit kepala; atau infeksi saluran pernapasan bagian atas. Bahaya keamanan yang disebabkan oleh penghambat DPP-4 setelah pemasaran meliputi gagal jantung, pankreatitis, dan nyeri sendi (DiPiro et al., 2020). Alogliptin, Linagliptin, Saxagliptin, Sitagliptin dan Vidagliptin termasuk dalam golongan ini (BNF, 2020).

7) SGLT-2 Inhibitor

Inhibitor SGLT2 adalah kelas baru agen hipoglikemik oral yang menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus distal dengan menghambat fungsi transporter glukosa SGLT2 (Decroli, 2019). Meskipun SGLT-2 inhibitor mencegah reabsorpsi 90% dari beban glukosa yang difiltrasi, secara teori, hal ini dapat menyebabkan kehilangan glukosa harian dalam urin setinggi 170-g, tetapi ekskresi glukosa urin (UGE) tidak akan melebihi 75 hingga 85 g / hari, karena saat bekerja pada kapasitas maksimum, SGLT-1 mulai mengimbangi dan dapat menyerap kembali hingga 30% hingga 40% beban glukosa yang telah difiltrasi. Oleh karena itu, ketika SGLT-2 dihambat, SGLT-1 dapat segera meningkatkan reabsorpsi glukosa dan menonaktifkan efek diabetes dari inhibitor SGLT-2 (DiPiro et al.,

2020). Obat yang termasuk dalam golongan ini yaitu Canaglifozin, Dapaglifozin, Empaglifozin, dan Ertuglifozin (BNF, 2020).

8) Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists

Kelas ini meniru efek GLP-1 endogen. Mereka merangsang sel beta pankreas untuk mengeluarkan insulin sebagai respons terhadap glukosa. Selain itu, selama periode hiperglikemia, GLP1 RA dapat menurunkan produksi glukosa hati dengan mengurangi kadar glukagon yang meningkat secara tidak tepat. Obat-obatan ini juga memiliki efek langsung pada lambung melalui sistem saraf otonom untuk memperlambat pengosongan lambung dan mengurangi ekskresi glukosa terkait makanan (DiPiro et al., 2020). Dulaglutide, Exenatide, Liraglutide, Lixisenatide, dan Semaglutide masuk ke dalam golongan obat ini (BNF, 2020).

E. Tinjauan Keislaman

Islam adalah agama yang utuh. Dalam Islam tidak hanya dijelaskan tauhid dan cara hidup sosial, tetapi juga menjelaskan masalah kesehatan. Pada hukumnya Al-Qur'an adalah pangkal dari segala hukum dan ilmu Islam, dan sebenarnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Seperti yang dijelaskan didalamnya yaitu :

وَالْمَذَلِّدِينَ هُوَ قُلٌّ ۖ وَعَرَبِيٌّ عَجَمِيٌّ ۚ آيَةٌ فَصَّلَتْ لَوْ لَا لَقَالُوا أَعْجَمِيًّا أَنَا قُرْ جَعَلْنَاهُ وَلَوْ
عِيدِبَ إِنَّمَا مِنْ يُنَادُونَ أَوْلِيكَ عَمِّي عَلَيْهِمْ وَهُوَ وَقُرْ أَدَانِهِمْ فِي يُؤْمِنُونَ لَا ۚ وَالَّذِينَ وَشِقَاءَ هُدَى

Terjemahnya :

“Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".” (Q.S. Fussilat: 44).

Tafsir Quraish Shihab menjelaskan ayat diatas bahwa Apabila al-Qur'an Kami turunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sebagaimana diusulkan oleh para pembangkang itu, pasti mereka, dengan sikap ingkar, akan mengatakan, "Mengapa ayat-ayat al-Qur'an tidak diterangkan dengan bahasa yang dapat kami mengerti? Mengapa al-Qur'an tidak berbahasa Arab padahal diturunkan di kalangan bangsa Arab?" Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Al-Qur'an itu hanya dapat dijadikan petunjuk, penyembuh, dan penyelamat dari kebingungan dan keraguan bagi orang-orang Mukmin saja, bukan yang lain. Sedang orang-orang yang tidak mempercayainya, seolah-olah menjadi tuli dan buta karena hanya melihat bagian al-Qur'an yang, menurut mereka, dapat dijadikan bahan fitnah. Mereka ini bagaikan orang yang diseru kepada keimanan dari tempat yang jauh dan tidak bisa mendengarnya".

Terkait dengan ayat tersebut, Allah SWT berfirman bahwasanya Al-Qur'an diturunkan tidak hanya dijadikan sebagai bacaan semata, tetapi dengan Al-Qur'an kita jadikan sebagai landasan dalam melakukan pengobatan. Jadi, selain dengan menambahkan keimanan kita kepada Allah SWT juga menjadikan sebagai sumber pengetahuan bagi kita. Selain dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT ke Bumi sebagai pemberi petunjuk menjelaskan dalam Haditsnya bahwa kita dianjurkan melakukan pengobatan terhadap penyakit yang diderita.

وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ ذُنُوبًا بَرَأَ، الدَّاءَ الدَّوَاءُ أَصَابَ فَإِذَا، دَوَاءٌ دَاءٍ لِكُلِّ اللَّهُ عِبَادٌ بِنِجَابٍ رِ عَنِ

Artinya :

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala.” (HR. Muslim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang muslim diperbolehkan mengobati penyakitnya. Karena setiap penyakit pasti disembuhkan. Jika obat yang

digunakan tepat untuk sumber penyakitnya, maka dengan izin Allah SWT penyakitnya akan hilang dan orang yang sakit akan sembuh. Namun, jika penyebab penyakit tidak diketahui atau obatnya tidak ditemukan, pertumbuhan terkadang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dalam hadits lain diterangkan bahwa :

رَسُولَ يَا : فَقَالَ ، الْأَعْرَابُ وَجَاءَتْ ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ ُ عِنْدَ كُنْتُ : ا سَامَةَ ن ع
 وَضَعَ إِلَّا دَاءً يَضَعُ لَمْ ُ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ نَّ فَا ، تَدَاوُوا ، اللَّهُ عِبَادَ يَا نَعَمْ : فَقَالَ أَنْتَدَاوَى ؟ ، اللَّهُ
 الهَرَمَ : قَالَ هُوَ ؟ مَا : قَالُوا . دِ وَاحٍ دَاءٍ غَيْرَ فَاءً شَ لَهُ

Artinya :

“Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta’ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: “Penyakit tua.” (HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, beliau berkata bahwa hadits ini hasan shahih)

Kandungan di atas memperlihatkan bahwa setiap penyakit/masalah kesehatan bisa disembuhkan kecuali penyakit lama. Rasulullah melihatnya. Pikirkan usia tua adalah penyakit. Karena penyakit tersebut menghancurkan ihwal seseorang, sama seperti penyakit lain yang biasanya berujung pada kematian atau kesulitan bertahan hidup seseorang.

Ungkapan “setiap penyakit bisa disembuhkan” artinya bisa universal. Maka dari itu termasuk penyakit yang fatal dan berbagai jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter karena tidak ada obatnya. Ibnu Qayyim berkata: "Allah telah menciptakan obat-obatan untuk mengobati semua penyakit ini. Namun, ilmu tentang obat-obatan ini tidak diturunkan kepada umat manusia." Hal ini dikarenakan ilmu yang dimiliki manusia terbatas pada ilmu yang diajarkan oleh

Tuhan. Olehnya Rasulullah menegaskan bahwa kesembuhan atas suatu penyakit bergantung pada kemampuan adaptasi obat terhadap penyakit tersebut. Dikarenakan setiap ciptaan Allah memiliki kebalikannya, maka setiap penyakit pasti memiliki kebalikannya, yaitu obat yang berlawanan dengan penyakit.

Dengan beberapa penjelasan tentang melakukan pengobatan dalam perspektif Islam, dengan itu dalam melakukan pengobatan perlu dilakukan secara tepat dan cermat. Artinya kita sebaiknya memilih pengobatan yang sesuai dan tentunya efektif terhadap penyakit yang diderita.

Saat ini, di era modern dalam pengobatan diperlukan pengeluaran biaya dalam prosesnya. Namun dalam mengeluarkan biaya dalam pengobatan harus diperhatikan. Dalam islam pun dijelaskan bahwa kita harus cermat dalam melakukan pengeluaran biaya.

Sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah SWT bahwa :

كُفُورًا لِرَبِّهِ الشَّيْطَانُ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانَ كَانُوا الْمُبَدِّرِينَ إِنَّ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra: 27)..

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini bahwa sebab orang-orang yang menghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara- saudara setan. Mereka menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya, akan sama seperti sifat setan.

Jika dihubungkan dengan penelitian ini, bahwa dalam Islam diberikan petunjuk dalam melakukan pengobatan, namun kita juga dianjurkan untuk memperhatikan biaya dalam melakukan pengobatan. Oleh karena itu secara tidak

langsung bahwa dalam melakukan pengobatan kita mesti memilih pengobatan yang efektif untuk kita dan menawarkan biaya yang tidak terlalu banyak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian non eksperimental dengan desain penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang diambil ialah data primer dengan metode kuisisioner dan sekunder berupa data rekam medik dengan metode retrospektif periode Januari 2019 – Juni 2021 dari *baseline* hingga bulan pertama untuk menilai efektivitas biaya penggunaan terapi obat antidiabetes.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis terapi yang paling efektif dan menentukan pengobatan yang paling efektif dengan biaya yang rendah terhadap pasien diagnosa Diabetes Melitus tipe 2.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Salewangeng, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021 – Agustus 2021.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu pasien Prolanis yang didiagnosa Diabetes Melitus tipe 2 di Puskesmas Salewangeng, Kabupaten Wajo.

2. Sampel

Cara penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive sampling* yaitu pasien Prolanis yang didiagnosa Diabetes Melitus tipe 2 di

Puskesmas Salewangeng, Kabupaten Wajo yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

a. Besar Sampel yang Digunakan

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan rumus berikut :

$$n = \frac{z\alpha^2PQ}{d^2}$$

Gambar 1 Rumus Besar Sampel

Keterangan : n = Jumlah sampel

α = Kesalahan Generalisasi ditetapkan sebesar 5%

$z\alpha$ = Nilai standar alpha 5% yaitu 1,96

P = Prevalensi jumlah populasi

Q = 1-P

d = Presisi penelitian, yaitu kesalahan prediksi proporsi yang masih dapat diterima.

b. Kriteria Sampel

Kriteria Sampel dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1) Kriteria Inklusi :

Adapun yang menjadi kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:

a) Pasien yang menderita diabetes melitus tipe 2 baik laki-laki maupun perempuan umur ≥ 35 tahun

b) Pasien diabetes melitus tipe 2 tanpa penyakit penyerta atau tanpa komplikasi

c) Data rekam medis lengkap.

d) Pasien yang sudah memberikan persetujuan untuk dijadikan objek penelitian

e) Pasien yang sudah mengisi kuisisioner penelitian

2) Kriteria Eksklusi :

Adapun yang menjadi kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah

a) Pasien diabetes melitus tipe 2 yang meninggal selama proses pengobatan

b) Pasien dengan Diabetes melitus pada ibu hamil

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan secara kuisisioner untuk mendapatkan data biaya non medik langsung dan pengumpulan data secara dokumentasi berupa data rekam medik pasien, data biaya medik langsung.

F. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas atau variabel independent pada penelitian ini adalah biaya medik langsung dan biaya non medik langsung.

2. Variabel terikat atau variabel dependen adalah hasil analisis efektivitas biaya.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa hasil kuisisioner biaya non medik langsung dan data rekam medik pasien, billing pasien sebagai data biaya medik langsung.

H. Langkah Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Data primer didapatkan menggunakan kuisisioner memperoleh data mengenai biaya tidak langsung (transportasi, biaya pendamping dan biaya hilangnya produktivitas). Biaya transportasi bergantung pada jenis kendaraan yang digunakan serta jarak rumah responden ke Puskesmas. Hilangnya produktivitas pasien maupun keluarga bergantung pada jenis pekerjaan serta lama rawatan.

Sedangkan biaya pendamping bergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi serta lama perawatan .pasien yang di dampingi

Untuk data sekunder diperoleh dari bagian ruang rekam medis, instalasi farmasi dan registrasi. Data yang terekam pada formulir pendataan meliputi nomor rekam medis, identitas pasien (umur, jenis kelamin, riwayat kesehatan, diagnosa, tekanan darah, kadar gula darah dan pemeriksaan lain, dan cara pengobatan).

2. Perhitungan Biaya Medik

Perhitungan biaya medik dilakukan dengan menjumlahkan rata-rata masing-masing biaya medik non langsung dari hasil kuisisioner dan biaya medik langsung dari billing/kwitansi pasien. Biaya medik non langsung meliputi biaya transportasi, biaya pendamping, dan hilangnya produktivitas. Biaya medik langsung meliputi informasi detail obat antidiabetes, biaya registrasi, biaya pemeriksaan, biaya konsultasi, dan biaya laboratorium untuk setiap pasien. Data biaya medik digunakan untuk menghitung *Average Cost-Effectiveness Ratio* (ACER) dan *Incremental Cost-Effectiveness Ratio* (ICER).

3. Perhitungan Efektivitas Terapi

Perhitungan efektivitas terapi dihitung berdasarkan banyaknya pasien yang mencapai target gula darah dibagi dengan total pasien yang mendapatkan terapi yang sama ditulis dengan rumus :

$$\text{Efektivitas (\%)} = \frac{\text{Total pasien yang mencapai target terapi}}{\text{Total pasien dengan terapi yang sama}} \times 100$$

Gambar 2 Rumus Perhitungan Efektivitas

4. Perhitungan Nilai ACER

ACER diperhitungkan untuk setiap terapi peluang dan perbandingan telah diperoleh dari variasi relatif antara obat baru dan obat pembanding. Hasil tersebut ditafsirkan sebagai nilai bersama sesuai dengan satuan efektivitas atau harga umum

yang diperlukan untuk menuai tujuan penyembuhan (diskon dalam tahap gula darah). Perhitungan ini digunakan rumus :

$$\text{ACER} = \frac{\text{Rata-rata total biaya medik}}{\text{Efektivitas (\%)}}$$

Gambar 3 Rumus Perhitungan Nilai ACER

5. Perhitungan Nilai ICER

ICER didefinisikan karena perbedaan antara harga dari dua terapi peluang dan perbedaan efektivitas antara alternatif. Hasil ICER menunjukkan biaya yang diperlukan untuk memperoleh ledakan untuk satu unit hasil relatif (penurunan kadar gula darah) untuk evaluasi, yaitu terapi peluang dengan biaya ACER terendah. Perhitungan ini digunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{ICER} &= \frac{\Delta \text{ biaya}}{\Delta \text{ efektivitas}} \\ &= \frac{\text{biaya terapi yang dibandingkan} - \text{biaya terapi pembanding}}{\text{efektivitas terapi yang dibandingkan} - \text{efektivitas terapi pembanding}} \end{aligned}$$

Gambar 4 Rumus Perhitungan Nilai ICER

6. Pengolahan Data dengan Tabulasi

Hasil dari tiap perhitungan analisis data disajikan dalam bentuk tabel. Untuk tabel dari perhitungan total biaya medik 1 per terapi disajikan dengan format berikut :

No.	Jenis Biaya	biaya non medik langsung	Persentase %
1.	Hilangnya Produktivitas	xa	% xa
2.	Transportasi	xb	% xb
3.	Biaya Pendamping	xc	% xc

Total Biaya Rata-rata	x1	100%
-----------------------	----	------

Tabel 6 Perhitungan Biaya Non Medik Langsung

No.	Pola Terapi	Jumlah Pasien (N)	Rata-rata biaya medik langsung
1.	Obat X	N	x2

Tabel 7 Perhitungan Biaya Medik Langsung

No.	Pola Terapi	Jumlah Pasien (N)	Rata-rata biaya medik
1.	Obat X	N	x

Tabel 8 Format Tabel Hasil Perhitungan Total Biaya Medik Langsung

Tabel hasil perhitungan nilai efektivitas disajikan dengan format berikut :

No.	Pola terapi	Jumlah pasien (N)	Jumlah pasien yang mencapai target terapi (n)	Efektivitas (%)
1.	Obat X	N	n	y

Tabel 9 Format Tabel Hasil Perhitungan Efektivitas Terapi

Tabel hasil perhitungan nilai ACER disajikan dengan format berikut :

No.	Pola Terapi	Rata-rata Biaya Medik	Efektivitas (%)	Nilai ACER
1.	Obat X	x	y	a

Tabel 10 Format Tabel Hasil Perhitungan Nilai ACER


Tabel hasil perhitungan nilai ICER disajikan dengan format berikut :


No.	Pola Terapi	Rata-rata biaya medik	Efektivitas (%)	Δ Biaya	Δ Efektivitas	Nilai ICER
1.	Obat Pemanding	x1	y1	x1	y1	a

2.	Obat yang dibandingkan	x2	y2	Δx	Δy	b
----	------------------------	----	----	------------	------------	---

Tabel 11 Format Tabel Hasil Perhitungan Nilai ICER

I. Alur Penelitian





BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada penelitian dikumpulkan data primer dan sekunder dari responden yakni pasien prolans diabetes melitus tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo dan juga data sekunder dari rekam medik pasien dan *billing* pembayaran pasien. Jumlah pasien yang terlibat dalam penelitian ini yaitu sebanyak 73 orang.

1. Profil Penggunaan Terapi Antidiabetes

Tabel 12 Profil Penggunaan Terapi Antidiabetes Pasien Prolans Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021

Pola Terapi	Jumlah Pasien	Persentase %
Metformin	20	27,4 %
Glimepirid	8	11%
Metformin & Glimepirid	36	49,3 %
Insulin Levemir & Novorapid	9	12,3%
Total	73	100%

2. Perhitungan Biaya Non Medik Langsung

Tabel 13 Biaya Non Medik Langsung Pasien Prolans Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021

No.	Jenis Biaya	biaya non medik langsung	Persentase %
1.	Hilangnya Produktivitas	Rp. 1.649.315	96%
2.	Transportasi	Rp. 37.192	2,2%
3.	Biaya Pendamping	Rp. 31.932	1,8%
Total Biaya Rata-rata		Rp. 1.718.439	100%

3. Perhitungan Biaya Medik Langsung

Tabel 14 Biaya Medik Langsung Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021

No.	Pola Terapi	Jumlah Pasien (N)	Rata-rata biaya medik langsung
1.	Metformin	20	Rp. 75.000
2.	Glimepirid	8	Rp. 52.800
3.	Metformin & Glimepirid	36	Rp. 82.800
4.	Insulin Levemir & Novorapid	9	Rp. 1.245.000

4. Perhitungan Total Biaya Medik

Tabel 15 Total Biaya Medik Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021

No.	Pola Terapi	Jumlah Pasien (N)	Rata-rata biaya medik
1.	Metformin	20	Rp. 1.793.439
2.	Glimepirid	8	Rp. 1.771.239
3.	Metformin & Glimepirid	36	Rp. 1.801.239
4.	Insulin Levemir & Novorapid	9	Rp. 2.963.439

5. Perhitungan Efektivitas Terapi

Tabel 16 Efektivitas Terapi Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021

No.	Pola terapi	Jumlah pasien (N)	Jumlah pasien yang mencapai target terapi (n)	Efektivitas (%)
1.	Metformin	20	9	45%
2.	Glimepirid	8	5	62,5%
3.	Metformin & Glimepirid	36	30	83,3%
4.	Insulin Levemir & Novorapid	9	9	100%

6. Perhitungan Nilai ACER

Tabel 17 Nilai ACER Terapi Antidiabetes Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021

No.	Pola Terapi	Rata-rata Biaya Medik	Efektivitas (%)	Nilai ACER
1.	Metformin	Rp. 1.793.439	45%	Rp. 39.854
2.	Glimepirid	Rp. 1.771.239	62,5%	Rp. 28.340
3.	Metformin & Glimepirid	Rp. 1.801.239	83,3%	Rp. 21.624
4.	Insulin Levemir & Novorapid	Rp. 2.963.439	100%	Rp. 29.634

7. Grid Efektivitas Biaya

Tabel 18 Grid Efektivitas Biaya Terapi Antidiabetes Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021

Efektivitas biaya	Biaya lebih rendah	Biaya Sama	Biaya lebih tinggi
Efektivitas lebih rendah	A 1. Metformin 2. Glimpiride (Perhitungan ICER)	B	C Didominasi
Efektivitas sama	D	E <i>Arbitrary</i>	F
Efektivitas lebih tinggi	G Dominan	H	I 1. Insulin Levemir & Novorapid (Perhitungan ICER)

8. Perhitungan Nilai ICER

Tabel 19 Nilai ICER Terapi Antidiabetes Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021

No.	Pola Terapi	Rata-rata biaya medik	Efektivitas (%)	Δ Biaya	Δ Efektivitas	Nilai ICER
1.	Obat Pemanding	Rp. 1.801.239	83,3%	Rp. 1.801.239	83,3%	Rp. 21.624

	(Metformin & Glimepirid)					
2.	Obat yang dibandingkan (Metformin)	Rp. 1.793.439	45%	Rp. - 7.800	-38,3%	Rp. 204
3.	Obat yang dibandingkan (Glimepirid)	Rp. 1.771.239	62,5%	Rp. - 30.000	-20,8%	Rp. 1.442
4.	Obat yang dibandingkan (Insulin Levemir & Novorapid)	Rp. 2.663.439	100%	Rp. 862.200	16,7%	Rp. 51.629

B. Pembahasan

Penelitian farmakoekonomi yang menganalisis evaluasi faktor klinis (efektivitas) dan ekonomi (biaya) dapat membantu pembuat kebijakan mencapai solusi objektif untuk keempat pertanyaan ini. Karenanya, farmakoekonomi dapat membantu memilih pil secara rasional untuk menawarkan tingkat keuntungan terbaik. Penelitian farmakoekonomi biasanya mempertimbangkan dua komponen: biaya dan hasil akhir pengobatan (*final result*). Pada kenyataannya, dalam penelitian yang menganalisis keekonomian suatu obat/produk penyembuhan, komponen biaya selalu berkaitan dengan khasiat, kegunaan atau keuntungan dari obat yang diberikan. (Kemenkes RI. 2013).

Khasiat mengacu pada kemampuan obat untuk secara positif mempengaruhi kesehatan pasien dalam praktik klinis rutin (penggunaan sehari-hari di dunia nyata, tidak dalam kondisi penelitian yang optimal). Penelitian farmakoekonomi dapat memberikan indikator keuntungan yang diperoleh dalam pelaksanaan terapi, menunjukkan biaya (jumlah rupiah yang harus dikeluarkan) untuk setiap unit metrik kesehatan dengan menggabungkannya dengan ekonomi. Hal ini terjadi karena penggunaan obat, baik klinis maupun non klinis. Semakin kecil jumlah uang yang dibayarkan untuk mendapatkan satuan metrik kesehatan yang diinginkan (klinis atau non-klinis), semakin murah obatnya (Kemenkes RI. 2013). Dalam penelitian ini merujuk pada analisis efektivitas terapi antidiabetes terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pasien prolans Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo.

Dari penjelasan diatas terkait aspek yang dianalisis dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan dari sumber yang telah ditetapkan yakni data primer dan sekunder dijelaskan secara tabulasi. Pada **Tabel 12** diterangkan statistik penggunaan terapi yang diresepkan kepada pasien prolans diabetes melitus tipe 2. Dimana terapi yang paling sering digunakan yaitu terapi kombinasi Metformin & Glimepirid dengan persentase sebanyak 49,3%, kemudian terapi tunggal Metformin yaitu 27,4%, lalu terapi kombinasi Insulin Levemir & Novorapid sebesar 12,3%, dan yang paling sedikit digunakan yaitu terapi tunggal Glimepirid sebesar 11%. Data tersebut dikumpulkan dari data rekam medik pasien yang bersumber dari pengelola pasien prolans Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo. Dari hasil data tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan biaya non medik langsung yang berasal dari kuisioner dan biaya medik langsung yang berasal dari *billing* pembayaran pasien.

Berdasarkan gambaran penggunaan antidiabetes tersebut, sesuai dengan penjelasan dari literatur (DiPiro et al., 2020) bahwa terapi farmakologi Diabetes

Melitus Tipe 2 dapat diberikan obat antidiabetes oral maupun insulin. Hal tersebut juga sejalan menurut (Decroli, 2019) dan penelitian yang dilakukan oleh (Wulan Agustin Ningrum, Ainun Muthoharoh, 2019) bahwa terapi antidiabetes oral yang paling sering digunakan yaitu golongan biguanid dan Sulfonilurea.

Pada **Tabel 13** dijelaskan hasil dari kuisioner terkait pengumpulan data biaya non medik langsung. Dimana total rata-rata biaya non medik langsung sebesar Rp. 1.718.439. Total biaya non medik langsung merupakan hasil dari tiga aspek pengukuran yaitu biaya hilangnya produktivitas sebesar Rp. 1.649.315 dengan persentase 96%, kemudian biaya transportasi sebesar Rp. 37.192 dengan persentase 2,2%, dan biaya pendamping sebesar Rp. 31.932 dengan persentase 1,8%.

Menurut (Indrayathi, P.A & Noviyanti, 2016) biaya non medik langsung (*direct non medical cost*) adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan secara langsung dan tidak berhubungan langsung dengan pembelian suatu produk atau jasa kesehatan. Biaya ini sudah termasuk transportasi ke dan dari rumah sakit dan makan untuk keluarga pasien. Biaya non medik langsung diukur dengan menggunakan kuisioner dikarenakan data biaya tersebut tidak tercatat oleh pihak pelayanan kesehatan atau puskesmas. Biaya non medik langsung bersifat secara keseluruhan atau hasilnya tidak dibedakan berdasarkan jenis terapi yang diberikan. Biaya tersebut diukur dari pengeluaran biaya non medik langsung dari seluruh pasien kemudian dirata-ratakan.

Perbedaan persentase yang cukup besar pada pengeluaran biaya non medik langsung dimana persentase tertinggi berada pada pengeluaran biaya hilangnya produktivitas, hal tersebut dikarenakan biaya tersebut dipengaruhi dari terganggunya atau terhambatnya penghasilan dari pekerjaan tiap pasien. Dimana penghasilan dari pasien merupakan salah satu sumber yang digunakan untuk

membayar biaya penanganan kesehatan. Biaya transportasi dipengaruhi oleh jenis kendaraan yang dipakai oleh pasien untuk pergi ke Puskesmas. Baik transportasi umum maupun transportasi pribadi pasien mengeluarkan biaya yang hampir sama namun untuk transportasi umum pengeluarannya sebagai pembayaran untuk jasa transportasi sedangkan untuk transportasi pribadi pengeluarannya digunakan untuk membeli bahan bakar kendaraan. Untuk biaya pendamping, pasien biasanya mengeluarkan biaya konsumsi ataupun biaya kebutuhan lainnya untuk pendamping yang menemani pasien pergi ke Puskesmas.

Pada *Tabel 14* dijelaskan biaya medik langsung yang terdiri dari biaya administrasi, biaya pemeriksaan laboratorium, dan biaya obat yang digunakan. Untuk pasien dengan terapi tunggal metformin yakni sebanyak 20 pasien membutuhkan biaya rata-rata sebesar Rp. 75.000, untuk pasien dengan terapi tunggal glimepirid dengan jumlah pasien yaitu 8 sebesar Rp. 52.800, untuk pasien dengan terapi kombinasi Metformin & Glimepirid yakni sebanyak 36 pasien sebesar Rp. 82.800, dan pasien dengan terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid dengan jumlah pasien sebanyak 9 orang yaitu Rp. 1.245.000. Berdasarkan data tersebut bahwa biaya medik langsung yang paling banyak dikeluarkan yaitu pasien dengan terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid.

Biaya medik langsung didapatkan pada bagian pengelola Prolanis dan administrasi Puskesmas data yang didapatkan berupa billing untuk masing-masing pelayanan serta dilakukan pencocokan menggunakan data resep yang tertera pada rekam medik. Data biaya medik langsung berbeda-beda untuk masing-masing jenis terapi, hal itu dikarenakan adanya perbedaan harga satuan obat untuk masing-masing terapi. Data harga obat didapatkan pada apotik dimana harga obat pasien prolanis berdasarkan data harga obat PRB (Pasien Rujuk Balik) yang diatur oleh BPJS Kesehatan. Untuk biaya administrasi pasien, biaya konsultasi dokter dan

biaya pemeriksaan gula darah didapatkan pada bagian administrasi puskesmas berupa daftar harga pelayanan pasien. Biaya tersebut sama untuk semua pasien Prolanis diagnosa Diabetes Melitus Tipe 2 dikarenakan pelayanan dan jadwal pemeriksaan kesehatan pasien sama yang mana mengikuti berdasarkan program yang telah diatur oleh pihak pengelola Prolanis Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo. Pasien melaksanakan kunjungan rutin ke Puskesmas sebanyak 3 kali dalam satu bulan dan pemeriksaan GDP atau GDS dilaksanakan satu kali dalam satu bulan. Obat yang diberikan kepada pasien, telah diresepkan untuk penggunaan selama satu bulan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat hasil perkembangan efektivitas terapi yang diberikan selama satu bulan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suardhika et al., 2020) bahwa biaya pengobatan langsung meliputi harga obat, biaya pemeriksaan dan konsultasi dokter, biaya pemeriksaan, dan biaya administrasi.

Biaya medik merupakan hasil dari penjumlahan seluruh total biaya yang digunakan pasien dalam menjalankan terapi pengobatan diabetes melitus tipe 2. Jumlah biaya tersebut merupakan hasil dari penjumlahan biaya non medik langsung dengan biaya medik langsung. Biaya non medik langsung sama untuk semua jenis terapi yang diberikan dikarenakan sumber pengeluaran berasal dari pasien maupun keluarga pasien, berbeda dengan biaya medik langsung yang di golongan berdasarkan jenis terapi yang diberikan dikarenakan merupakan tanggungan BPJS yang dibayar berdasarkan jenis terapi. Oleh karena itu seluruh pasien mengeluarkan biaya non medik langsung dengan jumlah yang sama. Pada **Tabel 15** dijelaskan jumlah biaya medik yang diperlukan untuk tiap jenis terapi. Untuk pasien dengan terapi tunggal metformin mengeluarkan biaya medik sebesar Rp. 1.793.439, kemudian pasien dengan terapi tunggal Glimepirid sebesar Rp. Rp. 1.771.239, biaya medik untuk terapi kombinasi Metformin & Glimepirid yaitu sebesar Rp.

1.801.239, dan biaya medik untuk terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid yaitu sebesar Rp. 2.963.439. Dengan hasil tersebut jenis terapi yang membutuhkan biaya yang paling kecil yaitu terapi tunggal metformin dan yang paling besar yaitu terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid.


Terkait dengan efektivitas terapi, data yang diambil merupakan data sekunder dari data rekam medik pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi penelitian. Dimana yang menjadi parameter efektivitas suatu alternatif terapi dilihat berdasarkan hasil tes GDP (Gula Darah Puasa) pasien dimana pegukurannya dilakukan sebulan sekali. Target efektivitasnya ditunjukkan dengan adanya penurunan gula darah yang mencapai target terapi yaitu <126 mg/dL ($<7,0$ mmol/L). Parameter tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam literatur (Dipiro, 2020) yakni nilai GDP seseorang yang dinyatakan diabetes melitus yaitu ≥ 126 mg/dL ($\geq 7,0$ mmol/L). Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat dilihat pada **Tabel 16** bahwa efektivitas dari terapi tunggal Metformin yaitu dari total 20 orang pasien yang mengalami penurunan gula darah sesuai target yaitu sebanyak 9 orang satau dengan persentase sebesar 45%, terapi tunggal Glimepirid memiliki total pasien sebanyak 8 orang dengan jumlah pasien yang mencapai target yaitu sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 62,5%, untuk terapi kombinasi Metformin & Glimepirid dengan jumlah pasien sebanyak 36 orang dengan jumlah pasien yang mencapai target terapi yaitu sebanyak 30 orang dengan persentase sebesar 83,3%, untuk terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid yaitu dengan jumlah pasien sebanyak 9 orang dan semua pasien mencapai target terapi atau dengan persentase efektivitas sebesar 100%. Dengan hasil tersebut, alternatif terapi paling efektif yaitu terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid dan terapi yang kurang efektif yaitu terapi tunggal Metformin.

Perhitungan nilai ACER didapatkan dengan cara membagi jumlah biaya medik dengan efektivitas terapi. Pada **Tabel 17** didapatkan hasil perhitungan tiap alternatif terapi yaitu, untuk terapi tunggal metformin didapatkan hasil Rp. 39.854, untuk terapi tunggal Glimepirid sebesar Rp. 28.340, untuk terapi kombinasi Metformin & Glimepirid sebesar Rp. 21.624, dan untuk terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid yaitu sebesar Rp. Rp. 29.634. Dengan hasil tersebut terapi yang paling efektif untuk pasien diabetes melitus tipe 2 pada pasien prolanis berdasarkan perhitungan ACER yaitu terapi kombinasi Metformin & Glimepirid dengan nilai ACER yaitu Rp. 21.624 hal tersebut dikarenakan terapi tersebut paling *cost effective* dari semua jenis alternatif terapi yang diberikan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Norhalimah. 2018) bahwa Hasil efektivitas dinyatakan dalam ACER (*Average Cost Effectiveness Ratio*) bertujuan untuk membandingkan antara biaya obat antidiabetik yang digunakan selama terapi dengan penurunan gula darah pasien. Hasil perhitungan ACER menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk sebuah pengobatan mencapai hasil yang efektif atau mencapai target terapi (Andayani. 2013).

Setelah hasil perhitungan nilai ACER ditentukan, maka alternatif dengan nilai ACER paling rendah ditetapkan sebagai terapi standar yang ditetapkan dalam penanganan penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 pada pasien Prolanis Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo. Dengan adanya beberapa pilihan alternatif terapi, maka dapat digambarkan menggunakan tabel Grid Efektivitas Biaya/*Cost-effectiveness Grid* dan *Cost-effectiveness plane*. Berdasarkan **Tabel 18** Hasil perbandingan dari Terapi Kombinasi Metformin & Glimepirid dengan terapi lainnya didapatkan dua hasil perbandingan. Hasil perbandingan pertama antara terapi kombinasi Metformin & Glimepirid dengan terapi tunggal Metformin dan terapi tunggal Glimepirid, dimana kedua alternatif terapi tersebut memiliki efektivitas lebih rendah dan biaya

lebih rendah dibanding terapi standar sehingga masuk ke dalam sel A. Hasil perbandingan kedua antara terapi kombinasi Metformin & Glimepirid dengan terapi kombinasi Insulin Levemir & Novorapid, dimana alternatif terapi tersebut memiliki efektivitas lebih tinggi dan biaya lebih tinggi dibanding terapi standar sehingga masuk ke dalam sel I. Menurut (Andayani.2013) apabila alternatif terapi yang dibandingkan masuk ke dalam sel A dan sel I pada Grid Efektivitas Biaya maka diperlukan perhitungan nilai ICER.

Dalam bidang efektivitas biaya dijelaskan di mana pada pertemuan sumbu x dan sumbu y merupakan tempat untuk memulai harga dan efektivitas obat pilihan. Faktor dalam pesawat untuk pilihan pengobatan alternatif dibandingkan dengan pengobatan konvensional, menunjukkan seberapa besar perbedaan nilai dibandingkan dengan garis start dan seberapa besar perbedaan titik awal (sumbu x) (Andayani.2013).



Gambar 5 *Cost-effectiveness Plane* Terapi Antidiabetes Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019- Juni 2021

Pada **Gambar 5** dapat dilihat bahwa perbandingan antara terapi standar dengan alternatif terapi, perbandingan terhadap terapi tunggal Metformin dan terapi tunggal Glimepirid terletak pada kuadran III yang menunjukkan bahwa alternatif terapi ini lebih murah dan kurang efektif. Perbandingan terhadap terapi kombinasi Insulin Levemir & Novorapid terletak pada kuadran I yang menunjukkan bahwa alternatif terapi ini lebih mahal dan lebih efektif. Menurut (Andayani, 2013) bahwa poin alternatif terapi yang menunjukkan berada pada kuadran I perlu dipertimbangkan terkait peningkatan biaya untuk peningkatan efektivitas.

Perhitungan ICER merupakan hasil perhitungan yang penting dalam analisis efektivitas biaya. Saat menggunakan metode AEB, perlu dihitung rasio biaya rata-rata dan rasio manfaat biaya tambahan (RIEB = rasio manfaat biaya tambahan / ICER). Dengan adanya perhitungan ICER, dapat dilihat bahwa setiap kali unit hemat biaya diubah, akan ada biaya tambahan. Selain itu, agar lebih mudah menarik kesimpulan tentang alternatif mana yang memberikan efektivitas biaya terbaik (Kemenkes-RI, 2013). Pada **Tabel 19** dapat dilihat hasil dari perbandingan alternatif terapi, dimana alternatif yang memiliki nilai ICER paling rendah berdasarkan penentuan menggunakan Grid Efektivitas Biaya dan *Cost-effectiveness Plane* yaitu terapi kombinasi Metformin & Glimepirid sebesar Rp. 21.624. Terapi yang dijadikan sebagai pembanding yaitu terapi dengan nilai ACER paling rendah dan yang dijadikan pembanding adalah alternatif terapi yang terletak pada Sel I Grid Efektivitas Biaya dan Kuadran III *Cost-effectiveness Plane* (terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid). Hal tersebut menjelaskan bahwa untuk penggunaan terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid yaitu perlu adanya tambahan biaya sebesar Rp. 51.629.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Terapi antidiabetes yang digunakan untuk pasien prolans diabetes melitus tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo meliputi terapi tunggal Metformin dengan persentase penggunaan sebesar 27,4% dengan efektivitas sebesar 45%, terapi tunggal Glimepirid dengan persentase penggunaan sebesar 11% dengan efektivitas sebesar 62,5%, terapi kombinasi Metformin & Glimepirid dengan persentase sebesar 49,3% dengan efektivitas sebesar 83,3%, dan terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid dengan persentase sebesar 12,3% dengan efektivitas sebesar 100%.

2. Terapi antidiabetes yang paling efektif dengan biaya yang rendah pada pasien Prolans Diabetes Melitus tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo berdasarkan *Average Cost Effectiveness Ratio* (ACER) dan *Incremental Cost Effectiveness Ratio* (ICER) yaitu terapi kombinasi Metformin & Glimepirid.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya untuk lebih mengkaji lebih lanjut terkait beberapa aspek farmakoekonomi lainnya terkait terapi antidiabetes. Hal tersebut dikarenakan peninjauan pemberian terapi melalui perspektif farmakoekonomi sangat dibutuhkan demi peningkatan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Perlu diingat bahwa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga bergantung dengan kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri.

KEPUSTAKAAN

- AADE. (2018). *American Association of Diabetes Educators : FALL 2018*.
- ADA. (2018). Updates to the Standards of Medical Care in Diabetes-2018.
- Afifah, H. N. (2016). Mengenal Jenis-Jenis Insulin Terbaru untuk Pengobatan Diabetes.
- Andayani, Tri Murti. (2013). Farmakoekonomi Prinsip dan Metodologi: *Bursa Ilmu*. Yogyakarta.
- Bappenas. (2019). *Pembiayaan Kesehatan Dan JKN*. Bappenas.
- Bermudez, O. I. (2018). Diabetes mellitus; diagnosis and treatment in the elderly. In *Encyclopedia of Endocrine Diseases* (2nd ed., Issue March). Elsevier Inc.
- BNF. (2020). *British National Formulary 80*.
- BPJS. (2014). Panduan praktis Prolanis (Program pengelolaan penyakit kronis). *BPJS Kesehatan*.
- Davis, C. S., Fleming, J. W., Malinowski, S. S., Brown, M. A., & Fleming, L. W. (2018). Ultra-long-acting insulins: A review of efficacy, safety, and implications for practice. *Journal of the American Association of Nurse Practitioners*.
- Decroli, E. (2019). *Diabetes Melitus Tipe 2*. Pusat Penerbitan Bagian Ilmu Penyakit Dalam.
- DiPiro, J. T., Yee, G. C., Posey, L. M., Haines, S. T., Nolin, T. D., & Ellingrod, V. (2020). *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Eleventh Edition* (11th ed.). McGrawHill.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (2019). Buku Pedoman Penyakit Tidak Menular. *Kementerian Kesehatan RI*.
- Fathurrahman, M. H. (2020). Analisis Efektivitas Biaya Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) Terhadap Penyakit Hipertensi Di Puskesmas Kota Bandung. *Jurnal Sains Dan Teknologi Farmasi Indonesia*,.
- Fatimah, R. N. (2015). Diabetes Melitus Tipe 2. *J MAJORITY*.
- FDA. (2018). *Insulin Booklet*. 1–12.
- Gumantara, M. P. B., & Oktarlina, R. Z. (2017). Perbandingan Monoterapi dan Kombinasi Terapi Sulfonilurea-Metformin terhadap Pasien Diabetes Melitus Tipe 2.
- IDF. (2019). IDF Diabetes Atlas Ninth Edition. In *The Lancet* (Vol. 266, Issue 6881).
- Indrayathi, P.A & Noviyanti, R. (2016). Cost of Illness (Beban Ekonomi Penyakit Dalam Pembangunan Kesehatan). *Universitas Udayana*.

- Kemenkes-RI. (2013). *Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi* (Vol. 4, Issue 3). Kemenkes RI.
- Kemenkes-RI. (2018). *Hasil Utama RISKESDAS 2018*.
- Kemenkes-RI. (2019). Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Riskesdas 2018. In *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* (Vol. 110, Issue 9).
- Kurniawan, A. A., & Wuryaningsih, Y. N. S. (2016). Rekomendasi Latihan Fisik Untuk Diabetes Melitus Tipe 2. *Berkala Ilmiah Kedokteran Duta Wacana*, 1(3), 197.
- Norhalimah, N., Agustina, R., & Rusli, R. (2018). Analisis Biaya Minimal dan Efektivitas Terapi Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUD Panglima Sebaya Paser. *Proceeding of Mulawarman Pharmaceuticals Conferences*, 7, 63–69.
- PERKENI. (2019). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa Di Indonesia. *Nursing Management*, 19(4).
- Prakasa, D. Y. (2020). Komplikasi Muskuloskeletal pada Pasien Diabetes Melitus. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 12(2), 1009–1016.
- Pribadi, F., & Permana, I. (2018). Analysis of the Cost-Effectiveness of Antidiabetic Drugs Among Self Paid Participant of the Indonesia National Security Service (NSS) with Type 2 Diabetes Mellitus. *International Journal of Medicine and Public Health*, 8(3), 108–111.
- Purnama, A., & Sari, N. (2019). Aktivitas Fisik dan Hubungannya dengan Kejadian Diabetes Mellitus. *Window of Health : Jurnal Kesehatan*, 2(4), 368–381.
- Reddy, S. S. K., & Tan, M. (2020). Diabetes mellitus and its many complications. In *Diabetes Mellitus*. Elsevier Inc.
- Semple, R. K. (2018). Carbohydrate metabolism: Diabetes mellitus, genomic aberrations. *Encyclopedia of Endocrine Diseases*, 1(October 2015), 141–147.
- Sone, H. (2018). Diabetes Mellitus. In *Encyclopedia of Cardiovascular Research and Medicine*. Elsevier Inc.
- Suardhika, I. M., Warnaya, P. C. I., Budiarta, P. B. P. P., Arwanawati, N. N. S. M., & Sarasmita, M. A. (2020). Evaluasi Efektivitas Biaya Penggunaan Terapi Kombinasi Obat Antidiabetes-Antihipertensi Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Dengan Hipertensi Di RSUP Sanglah. *Jurnal Farmasi Udayana*, 9(1), 27.
- Sudagani, J., & Hitman, G. A. (2012). Diabetes Mellitus: Etiology and Epidemiology. *Encyclopedia of Human Nutrition*, 2–4(2000), 40–46.
- WHO. (2016). Global Report on Diabetes. *Isbn*, 978, 6–86.

Wulan Agustin Ningrum, Ainun Muthoharoh, M. Q. (2019). ANALISIS BIAYA PENGOBATAN PASIEN DIABETES MELLITUS RAWAT JALAN DI RSUD KRATON PEKALONGAN. *STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan*, 33(1), 15–21.

Zochodne, D. W. (2014). *Diabetes Mellitus. 1*, 992–994.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Pengambilan Data Awal (Validitas Kuisisioner)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus 1: Jalan Sultan Alauddin No. 43 Makassar
Kampus 2: Jalan Ulu' Tappa Lingsi No. 34 Pampang Padang-Cawir 94111/941879 Fax: 0411) 8221400
Email: fak.un-alaudindin.ac.id

Nomor : B- 1759 /UH DMFK/IPP 00 9/05/2021
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Gowa, 11 Mei 2021

Kepada Yth
Kepala Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini

Nama : Muhammad Akmal Aprizandy
NIM : T0100117032
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Farmasi
Semester : VIII (Delapan)
Data :
- Data Rekam Medik Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2
- Data Pengobatan Pasien DM Tipe 2
- Data Biaya Pelayanan Pasien DM Tipe 2

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antidiabetes Pada Pasien Prolanis Diabetes Mellitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo"

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk mengambil data awal.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Gguy Saadly Handayany

Tembusan:
- Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)

Lampiran 2 Kode Etik Penelitian



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No. A.063/KEPK/FKIK/VIII/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Muhammad Akmil Aprianly
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA TERAPI ANTIDIABETIK PADA PASIEN PROLANIS
DIABETES MELLITUS TIPE 2 PUSKESMAS SALEWANGENG KAB. WAJO"**

*"Cost-effectiveness analysis of antidiabetic therapy in patients with Prolanis diabetes mellitus type 2
in puskesmas Salewangeng kab. Wajo"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemertanian Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bukukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang mengacu pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022

This declaration of ethics applies during the period August 10, 2021 until August 10, 2022

August 10, 2021
Professor and Chairperson,


DR. Dr. Syatrah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus 1: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar Telepon (0411) 868720 Faksimil (0411) 864923
 Kampus 2: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa Telepon 1300362 (0411) 841879 Faksimil (0411) 8271466
 Email: fak.un-diauddin.ac.id

Nomor : B- 3246/UM.06/FKIK/PP.00.9/08/ 2021 Gowa, 27 Agustus 2021
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
 Kepala Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo
 Di
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Akmi Apriandy
 N I M : 70100117032
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Farmasi
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : BTN, Pepabri Blok I No.21

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antidiabetes Pada Pasien Prolanis Diabetes Mellitus Tipe 2 - Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. apt. Afrisunawati Rauf, S.Si., M.Si
 2. apt. Alfa Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm.,Klin

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo, waktu penelitian 29 Agustus 2021

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam


 Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,

 Syabrah

Tembusan :
 -Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa

Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SALEWANGENG
 Jl. Mangga No. 1 Sengkang Tjo. (0485) 22103 Kode Pos 90914
 Email : puskesmasalewangeng@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 440 / 285 / Pusk.Slwg

Yang bertanda tangan di bawah ini : Kepala UPTD Puskesmas Salewangeng Kec. Tempe,
 Menerangkan bahwa :

Nama	: MUHAMMAD AKMIL APRIANDY
Nim	: 70100117032
Jurusan	: Ilmu Kesehatan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat	: BTN Pepabri Blok I No.21

Benar telah melakukan PENELITIAN dari tanggal 29 Agustus 2021 s.d 13 September 2021 di UPTD Puskesmas Salewangeng, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA TERAPI ANTIDIABETES PADA PASIEN PROLANIS DIABETES MELITUS TIPE 2 PUSKESMAS SALEWANGENG KABUPATEN WAJO

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sengkang, 14 September 2021
 Kepala UPTD Puskesmas Salewangeng

 drg. ANDI ARIANI MARS
 NIP. 196402002 20060 2 031

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 5 Naskah Penjelasan



Contoh

Lampiran 1.

NASKAH PENJELASAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI SUBJEK PENELITIAN

Assalamuallikum wr.wb

Saya Muhammad Akmil Apriandy, NIM : 70100117032 mahasiswa program studi (Farmasi) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul (Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antidiabetes Pada Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo) Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran besarnya persentase efektivitas terapi dari penggunaan obat antidiabetes pada pasien Prolanis DM tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo dan untuk mendapatkan gambaran antidiabetes yang paling efektif dengan biaya yang rendah pada pasien Prolanis DM tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo berdasarkan *Average Cost Effectiveness Ratio (ACER)* dan *Incremental Cost Effectiveness Ratio (ICER)*.

Saya membutuhkan waktu dan kesediaan saudara(i) agar bersedia mengisi lembar kuesioner untuk menjawab pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian saya. Saya akan menjamin jawaban anda akan dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan. Hanya peneliti yang akan mengetahui informasi ini. Anda berhak menolak jika tidak bersedia menjadi informan. Namun sangat kami harapkan kesediaan anda sekalian untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan kami menghampakan jawaban jujur anda atas pertanyaan yang kami berikan. Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban para informan jika bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Rongga 1 : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Tello (Jat I) 904924 Fm. (Jat I) 804923 Makassar
 Rongga 2 : Jl. H.A. Yasin Limoo. No. 36 Tello. (Jat I) 841879 Fax (Jat I) 8227400 Selayati, Gowa

- Demi menjaga kerahasiaan informan, peneliti tidak mencantumkan nama informan, tetapi lembar tersebut hanya di diberi simbol atau kode tertentu, sebagai pengganti identitas informan.
- Keikutsertaan secara sukarela, informan dapat mengundurkan diri kapan saja dan tidak mempengaruhi kualitas.
- Pengisian kuesioner di lakukan kepada informan sekitar 10-15 menit untuk mengetahui persepsi masyarakat makassar tentang pre eklampsia.

Apabila informan ingin mengundurkan diri selama proses penelitian ini berlangsung atau jika ada hal – hal yang kurang berkenan maka responden dapat mengungkapkan langsung atau menghubungi saya. Jika bersedia mengikuti penelitian ini, silahkan menandatangani lembar persetujuan informan. Apabila terdapat hal – hal yang kurang jelas, dapat menghubungi saya melalui nomor ini (082225547903/085825512262). Demikian penyampaian dari saya, atas segala perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Gowa, 16 Juni 2021

Muhammad Akmal Apriandy

Penanggung jawab : apt. Afrisunawati Rauf, S.St., M.Si.
 Peneliti utama : Muhammad Akmal Apriandy
 Nama : Muhammad Akmal Apriandy
 Alamat : BTN Pepabri Blok i No. 21, Sengkang
 No. HP : 082225547903/085825512262

ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 7 Kuisisioner Penelitian

**“Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antidiabetes Pada Pasien Prolanis
Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo”**

Kode Responden

A. Karakteristik Responden

Petunjuk : Responden diharapkan untuk mengisi data pribadi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dan memberi tanda checklist (√) pada jawaban yang dipilih.

1. Nama :
2. Jenis kelamin : () laki-laki
() perempuan
3. Alamat :
4. Umur :
6. Pekerjaan : () Tidak bekerja/ belum bekerja
() Petani/ nelayan
() Pegawai Negeri/ TNI/ Polri
() Pegawai swasta
() Wiraswasta
() Lainnya,

B. Biaya Hilangnya Produktivitas

1. Selama anda menjalani proses penyembuhan penyakit diabetes melitus tipe 2, apakah anda mempunyai pekerjaan ?
() Ya, Sebutkan.....
() Tidak
2. Apakah anda memperoleh gaji/penghasilan dari pekerjaan anda ?
() Ya, Sebutkan.....pertahun/perbulan/perhari

Tidak

3. Dalam pekerjaan anda, apakah ada waktu yang dibutuhkan untuk bekerja

(Dalam 1 minggu) ?

Ya, Sebutkan,.....Hari tiap 1 minggu

Tidak

C. Biaya Transportasi

1. Apakah anda mengeluarkan biaya untuk transportasi ke puskesmas (Pulang – pergi puskesmas) ?

Ya, Sebutkan.....

Tidak

D. Biaya Pendamping

1. Selama anda pergi ke Puskesmas untuk pemeriksaan, apakah ada keluarga yang mendampingi ?

Ya, Sebutkan.....

Tidak

2. Selama anda pergi ke Puskesmas untuk pemeriksaan, apakah ada biaya yang anda keluarkan untuk keluarga yang mendampingi (Makanan/Minuman/Kebutuhan Lainnya) ?

Ya, Sebutkan.....

Tidak

Lampiran 8 Hasil Skoring Data Responden Uji Validitas

Responden	BIAYA HILANGNYA PRODUKTIVITAS (A)			BIAYA TRANSPORTASI (B)	BIAYA PENDAMPING C	
	A1	A2	A3	B1	C1	C2
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	1
4	0	0	0	1	0	0
5	1	1	1	1	1	1
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	1	1	1	1	0	0
9	0	0	0	1	0	0
10	1	1	1	0	0	0
11	1	1	1	1	0	0
12	1	1	1	1	1	1
13	0	0	0	0	0	0
14	1	1	1	1	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	0	0
18	0	0	0	1	1	1
19	0	0	0	0	0	0
20	0	1	0	0	0	0
21	1	1	1	1	1	1

22	1	1	1	1	0	0
23	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	1	0	0
25	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	1	1
27	1	1	1	1	0	0
28	0	0	0	0	0	0
29	1	1	1	1	0	0
30	1	1	1	1	0	0

Keterangan : 0 = Tidak

1 = Ya

Lampiran 9 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
A1	.43	.504	30
A2	.50	.509	30
A3	.47	.507	30
B1	.60	.498	30
C1	.27	.450	30
C2	.27	.450	30

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	2.10	3.128	.723	.783
A2	2.03	3.068	.755	.776
A3	2.07	2.961	.832	.758
B1	1.93	3.375	.573	.815
C1	2.27	3.789	.389	.847
C2	2.27	3.789	.389	.847

Scale Statistics			
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
2.53	4.671	2.161	6

➤ **Reliability**

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.834	6

ISLAM NEGERI

JDDIN

ASSAR

Lampiran 10 Data Hasil Penelitian

a. Data Kuisisioner Biaya Non Medik Langsung

Responden	BIAYA HILANGNYA PRODUKTIVITAS (A)			BIAYA TRANSPORTASI (B)	BIAYA PENDAMPING ©	
	A1	A2	A3	B1	C1	C2
1	1	1	1	1	0	0
2	0	0	0	1	0	0
3	1	1	1	1	0	0
4	1	1	1	1	0	0
5	1	1	1	1	0	0
6	1	1	1	1	0	0
7	1	1	1	1	0	0
8	1	1	1	1	0	0
9	0	0	0	1	0	0
10	1	1	1	1	1	1
11	0	0	0	0	1	1
12	0	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	0	0
14	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1
16	0	1	1	1	0	0
17	1	1	1	1	0	0
18	1	1	1	1	0	0
19	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	0	0
21	1	1	1	0	1	1
22	1	1	1	1	0	0
23	1	1	1	0	1	1
24	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	0	1	1
26	1	1	1	1	0	0
27	0	0	0	0	1	1
28	1	1	1	1	0	0
29	1	1	1	1	0	0
30	1	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1
33	0	0	0	1	0	0
34	0	0	0	1	1	1
35	1	1	1	1	1	1
36	0	0	0	1	0	0
37	1	1	1	1	0	0
38	0	0	0	1	1	1
39	0	0	0	1	0	0
40	1	1	1	1	1	1
41	0	1	1	1	0	0
42	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1
44	0	0	0	1	1	1
45	0	0	0	1	0	0
46	0	0	0	1	0	0
47	0	1	1	1	1	1
48	0	0	0	0	1	1
49	0	0	0	1	0	0
50	0	0	0	1	0	0
51	0	0	0	1	1	1
52	1	1	1	1	0	0
53	0	0	0	1	1	1
54	1	1	1	1	1	1
55	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	1	0	0
57	1	1	1	1	0	0
58	0	0	0	1	0	0
59	0	0	0	1	0	0
60	0	0	0	1	1	1
61	0	0	0	1	0	0
62	0	0	0	1	1	1
63	0	0	0	1	1	1
64	1	1	1	1	1	1
65	1	1	1	1	0	0
66	0	0	0	1	1	1
67	0	0	0	1	1	1
68	0	0	0	1	0	0
69	1	1	1	1	0	0
70	0	0	0	0	1	1
71	0	0	0	0	1	1
72	1	1	1	1	0	0
73	0	0	0	1	0	0

b. Hasil Perhitungan Biaya Non Medik Langsung

RESPONDEN	BIAYA HILANGNYA PRODUKTIVITAS	BIAYA TRANSPORTASI	BIAYA PENDAMPING	
1				
2	500,000	30,000	0	
3	0	60,000	0	
4	4,700,000	30,000	0	
5	3,000,000	30,000	0	
6	3,000,000	30,000	0	
7	3,600,000	30,000	0	
8	1,500,000	30,000	0	
9	2,100,000	30,000	0	
10	0	30,000	0	
11	4,900,000	30,000	60,000	
12	0	0	75,000	
13	1,200,000	30,000	30,000	
14	4,500,000	30,000	0	
15	1,500,000	30,000	60,000	
16	1,500,000	60,000	75,000	
17	1,200,000	60,000	0	
18	1,500,000	60,000	0	
19	5,500,000	30,000	0	
20	1,000,000	30,000	60,000	
21	1,000,000	60,000	0	
22	600,000	0	30,000	
23	4,700,000	30,000	0	
24	3,000,000	0	30,000	
25	3,600,000	30,000	60,000	
26	700,000	0	111,000	
27	1,500,000	30,000	0	
28	0	0	60,000	
29	1,200,000	30,000	0	
30	3,000,000	30,000	0	
31	4,500,000	150,000	300,000	
32	1,500,000	45,000	30,000	
33	5,000,000	45,000	90,000	
34	0	90,000	0	
35	0	30,000	30,000	
36	4,700,000	30,000	60,000	
37	0	60,000	0	
38	2,800,000	30,000	0	
39	0	30,000	60,000	
40	0	60,000	0	
41	4,500,000	30,000	90,000	
42	1,000,000	30,000	0	
43	4,700,000	60,000	60,000	
44	4,900,000	30,000	60,000	
45	0	90,000	90,000	
46	0	30,000	0	
47	0	30,000	0	
48	1,200,000	30,000	60,000	
49	0	0	30,000	
50	0	60,000	0	
51	0	75,000	0	
52	0	30,000	75,000	
53	4,500,000	30,000	0	
54	0	30,000	30,000	
55	3,800,000	30,000	60,000	
56	0	0	0	
57	0	60,000	0	
58	3,800,000	30,000	0	
59	0	30,000	0	
60	0	90,000	0	
61	0	60,000	60,000	
62	0	60,000	0	
63	0	60,000	60,000	
64	0	30,000	135,000	
65	3,000,000	30,000	90,000	
66	2,100,000	30,000	0	
67	0	30,000	30,000	
68	0	30,000	60,000	
69	0	60,000	0	
70	4,500,000	30,000	0	
71	0	0	60,000	
72	0	0	60,000	
73	3,400,000	30,000	0	
74	0	30,000	0	
	1,649,315	37,192	31,932	572,813

c. Data Biaya Medik Langsung

RESPONDEN	BIAYA MEDIK LANGSUNG
1	82,800
2	75,000
3	82,800
4	82,800
5	75,000
6	75,000
7	82,800
8	82,800
9	82,800
10	1,245,000
11	1,245,000
12	75,000
13	75,000
14	82,800
15	82,800
16	82,800
17	52,800
18	1,245,000
19	75,000
20	52,800
21	82,800
22	82,800
23	82,800
24	52,800
25	75,000
26	1,245,000
27	82,800
28	82,800
29	75,000
30	52,800
31	82,800
32	82,800
33	75,000
34	82,800
35	82,800
36	82,800
37	82,800
38	82,800
39	1,245,000
40	82,800
41	75,000
42	82,800
43	1,245,000
44	1,245,000
45	75,000
46	1,245,000
47	52,800
48	1,245,000
49	52,800
50	52,800
51	75,000
52	82,800
53	75,000
54	82,800
55	52,800
56	82,800
57	75,000
58	82,800
59	82,800
60	75,000
61	75,000
62	82,800
63	82,800
64	75,000
65	82,800
66	75,000
67	82,800
68	75,000
69	82,800
70	82,800
71	82,800
72	82,800
73	75,000



d. Data Efektivitas Obat

RESPONDEN	OBAT YANG DIGUNAKAN	EFEKTIVITAS OBAT
1	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
2	METFORMIN	TIDAK
3	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
4	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
5	METFORMIN	YA
6	METFORMIN	YA
7	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
8	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	TIDAK
9	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
10	LEVEMIR & NOVORAPID	YA
11	LEVEMIR & NOVORAPID	YA
12	METFORMIN	TIDAK
13	METFORMIN	TIDAK
14	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	TIDAK
15	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
16	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
17	GLIMEPIRIDE	YA
18	LEVEMIR & NOVORAPID	YA
19	METFORMIN	YA
20	GLIMEPIRIDE	TIDAK
21	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
22	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
23	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
24	GLIMEPIRIDE	YA
25	METFORMIN	TIDAK
26	LEVEMIR & NOVORAPID	YA
27	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
28	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA

29	METFORMIN	TIDAK
30	GLIMEPIRIDE	TIDAK
31	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	TIDAK
32	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
33	METFORMIN	YA
34	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
35	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
36	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
37	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
38	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
39	LEVIMIR & NOVORAPID	YA
40	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
41	METFORMIN	YA
42	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	TIDAK
43	LEVIMIR & NOVORAPID	YA
44	LEVIMIR & NOVORAPID	YA
45	METFORMIN	YA
46	LEVIMIR & NOVORAPID	YA
47	GLIMEPIRIDE	TIDAK
48	LEVIMIR & NOVORAPID	YA
49	GLIMEPIRIDE	YA
50	GLIMEPIRIDE	YA
51	METFORMIN	YA
52	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	TIDAK
53	METFORMIN	YA
54	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	TIDAK
55	GLIMEPIRIDE	YA
56	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
57	METFORMIN	TIDAK
58	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA

59	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
60	METFORMIN	TIDAK
61	METFORMIN	TIDAK
62	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
63	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
64	METFORMIN	TIDAK
65	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
66	METFORMIN	TIDAK
67	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
68	METFORMIN	TIDAK
69	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
70	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
71	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
72	METFORMIN & GLIMEPIRIDE	YA
73	METFORMIN	YA
KET.		
METFORMIN (20)	9 EFEKTIF 45%	
GLIMEPIRIDE (8)	5 EFEKTIF 62.5%	
METFORMIN & GLIMEPIRIDE (36)	30 EFEKTIF 83,3%	
LEVEMIR & NOVORAPID (9)	9 EFEKTIF 100%	

e. Daftar Harga Pelayanan Kesehatan

BIAYA ADMINISTRASI	15,000	
BIAYA PEMERIKSAAN GULA	30,000	
HARGA OBAT		1 BULAN
METFORMIN	5,000	30,000
GLIMEPIRIDE	2,600	7,800
LEVEMIR	200,000	600,000
NOVORAPID	200,000	600,000

Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Akmil Apriandy, atau biasa disapa Akmil/Amme merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan H. Huslan, S.ST., M.Kes. dan Hj. Besse Illang, S.Pd. yang lahir di Jalang pada tanggal 24 April 2000. Saat ini penulis berdomisili di BTN Pepabri Blok I No. 21 Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2004 penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pertama di Taman Kanak-kanak Ratu Alam, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 199 Maddukkelleng pada tahun 2006. Setelah menempuh pendidikan dasar selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2012 penulis kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 6 Sengkang selama 2 tahun melalui program akselerasi. Setelah lulus pada tahun 2014, penulis kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA Negeri 3 Sengkang hingga tahun 2017. Dan pada tahun itu juga, penulis melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi dan dinyatakan lulus di Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selama berkuliah, penulis pernah aktif dalam lembaga kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi periode 2018/2019, periode 2019/2020, dan periode 2020/2021. Selain Organisasi Intra Kampus, penulis juga berkarir di lembaga ekstra kampus yaitu Tim Bantuan Farmasi (TBF) Alauddin pada tahun 2018-2022 dan sempat menjabat menjadi ketua pada tahun 2019-2022 dimana organisasi ini berlatar Relawan Kemanusiaan dalam bidang Kesehatan khususnya keilmuan Farmasi.