

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN REMAJA
DENGAN BENJOLAN PADA PAYUDARA**

(Literature Review)



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya
Diploma Kebidanan di Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar**

Oleh

CINDY ASRIDA

NIM :70400117001

JURUSAN DIII KEBIDANAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2021

PERNYATAAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cindy Asrida
Nim : 70400117001
Tempat/Tanggal Lahir : Ranteangin, 15 Mei 2000
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl.HM.Yasin Limpo, Samata, Kec.Somba
opu, Kab. Gowa
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja dengan
Benjolan pada Payudara

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh keyakinan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini adalah benar adanya hasil karya pikiran sendiri. Jika kemudian hari bahwa karya tulis ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan, bahkan plagiat baik Sebagian maupun seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diterima batal demi hukum.

Samata, 15 November 2021

Penyusun



Cindy Asrida
70400117001

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Cindy Asrida
Nim : 70400117001
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja dengan Benjolan Pada
Payudara (*Literature Riview*)

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 15 November 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Firdayanti, S.SiT., M.Keb
NIP : 19751113 200604 2 001

Dr.dr. Svaticah, Sp.A., M. Kes
NIP : 19780417 200801 2 018

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan kebidanan Remaja dengan Benjolan Pada Payudara (*Literature Review*)". Yang disusun oleh Cindy Asrida Nim: 70400117001, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Senin, 15 November 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 15 November 2021
10 Rabiul Akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S. SI., M. SI.
Sekretaris : Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S. ST., M. Keb
Pembimbing I : Firdayanti, S. SiT., M. Keb
Pembimbing II : Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M. Kes
Penguji I : Zelna Yuni Andryani S. ST., M. Keb
Penguji II : Prof. Sitti Aisyah Kara, Ph. D

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A. M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala Yang Maha Pengasih yang selalu mengasihi dan mengiringi jalan kita dalam semangat menuntut ilmu. Salam dan taslim semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menuntun keislaman bagi umat manusia di muka bumi ini. Semoga rasa semangat ini menjadi abadi.

Dengan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja dengan Benjolan pada Payudara" merupakan hasil kemampuan penulis sebagai bakti terhadap semangat menuntut ilmu, kritik dan saran dalam nuansa akademis menjadi pemicu agar karya yang saya hasilkan mampu di kembangkan dan tentunya semoga menjadi benih yang bermanfaat bagi kebaikan orang banyak.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada

1. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad As'Ad dan Ibunda Nurida yang berkat do'a, dukungan, serta nasehatnya penulis dapat semangat dalam menyelesaikan perkuliahan selama ini.
2. Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph. D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. dr. Syatirah, Sp(A)., M. Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sekaligus selaku pembimbing kedua penulis yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan saran yang sangat membangun dalam Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
4. Firdayanti, S. ST., M. Keb selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sekaligus selaku pembimbing pertama saya yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan banyak saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

5. Anieq Mumti'ah Al-Kautsar, S.ST., M. Keb selaku Sekertaris Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M. Keb selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan dukungan serta meluangkan waktunya untuk memberikan saran yang membuat penulis berada di posisi sekarang ini.
7. Zelna Yuni andryani, S.ST., M. Keb selaku penguji pertama yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan banyak saran yang membangun dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Prof. Sitti Aisyah Kara. MA., Ph. D selaku penguji agama yang senantiasa meluangkan banyak waktunya untuk memberikan saran yang bersifat islamiah dalam Karya Tulis Ilmiah sehingga penulis dapat mengetahui.
9. Segenap civitas akademik terkhususnya para dosen prodi Kebidanan dan para staf akademik Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan dan pembuatan surat menyurat Karya Tulis Ilmiah ini berlangsung.
10. Kepada adik, Irwan Arisandi dan Muhammad Al-Hafizi yang selalu memberikan dukungan baik secara fisik maupun secara emosional.
11. Kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan sehingga penulis bisa semangat dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
12. Kepada sahabat penulis A. Nurfajri Jihan dan Srirezki Adriani yang selalu memberikan dukungan dan hiburan untuk penulis sehingga penulis bisa terhibur.
13. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
14. Kepada teman-teman AVIDITAS 2017 yang telah menjadi keluarga di kampus.
15. Serta terima kasih kepada diri sendiri yang senantiasa kuat hingga bisa menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Samata, 15 November 2021
Penyusun



Cindy Asrida
70400117001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Remaja.....	8
B. Tinjauan Khusus Tentang Khusus Tentang Benjolan Payudara...	11
C. Manajemen Kebidanan Asuhan Kebidanan.....	29
D. Tinjauan Umum Benjolan Payudara Pada Remaja Menurut Pandangan Agama Islam.....	38
BAB III TELUSURAN <i>EVIDANCE BASED LEARNING</i>	43
A. Matriks Langkah I.....	43

B. Matriks Langkah II.....	58
C. Matriks Langkah III.....	65
D. Matriks Langkah IV.....	72
E. Matriks Langkah V.....	81
F. Matriks Langkah VI.....	94
G. Matriks Langkah VII.....	108
BAB IV PEMBAHASAN.....	117
A. Pembahasan Hasil telaah <i>Evidance Based</i> Asuhan 7 langkah Varney berdasarkan Hasil penelusuran Referensi.....	117
B. Implikasi Kebidanan.....	133
BAB V PENUTUP.....	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	139
RIWAYAT HIDUP	148

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
LITERATUR REVIEW, OKTOBER 2021

Nama : Cindy Asrida
NIM : 70400117001
Pembimbing 1 : Firdayanti. S.SiT., M.Keb
Pembimbing 2 : Dr.dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja dengan Benjolan Pada Payudara

Benjolan payudara merupakan gambaran keadaan payudara yang abnormal, mulai dari benjolan yang jinak hingga benjolan yang ganas. Fibroadenoma merupakan kelainan perkembangan normal dari satu lobulus di payudara, biasanya di temukan pada kelompok usia 15-25 tahun dan kadang-kadang dapat ditemukan pada usia tua. Berdasarkan data dari subdit Kanker Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) kemenkes RI terdapat sekitar 36.761.000 perempuan di seluruh Indonesia yang berumur 30-50 tahun. Sebanyak 644.951 (1,75%) perempuan pada tahun 2007-2013 yang telah melakukan deteksi dini dengan penemuan benjolan (Tumor) payudara 1.682 orang. Pada kasus remaja dengan benjolan payudara di RSUD Syekh Yusuf di dapatkan data dari rekam medik yang menunjukkan jumlah kasus benjolan payudara pada tahun 2018 terdapat 170 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 222 kasus serta tahun 2020 dari bulan januari hingga februari sebanyak 38 kasus.

Karya Tulis Ilmiah ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan serta pengumpulan referensi yang kemudian dibuat menjadi Literatur Review dengan menggunakan metode asuhan 7 langkah varney.

Berasarkan hasil penelitian untuk mendiagnosa Benjolan Payudara yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan penunjang. Penatalaksanaan Benjolan payudara ada dua yakni penanganan konservatif dan penanganan operatif dengan mengikuti indikasi intervensi bedah meliputi pertumbuhan cepat, ukuran lebih dari 2 cm dan atas dasar permintaan pasien.

Kesimpulan dari kasus ini yakni penanganan fibroadenoma yang di lakukan sesuai indikasi intervensi menggunakan teknik eksisi bedah dengan konservasi payudara menghasilkan kosmesis yang sangat baik, sehingga setelah operasi di lakukan tindakan rutin selama 6 bulan dan hasilnya pasien tidak mengalami kekambuhan.

Kata kunci : Asuhan Kebidanan Remaja , Benjolan Payudara, Fibroaenoma, 7 langkah Varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT UIN ALAUDDIN MAKASSAR LITERATUR REVIEW, OKTOBER 2021

Name : Cindy Asrida
Student Reg. No. : 70400117001
Supervisor 1 : Firdayanti. S.SiT., M.Keb
Supervisor 2 : Dr.dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
Title : A Midwifery Care for An Adolescent with a Breast Lump

A breast lump is an abnormal breast condition in which a benign or malignant lump manifest. Fibroadenoma is one kind of disorders where one breast lobule is found in the age group of 15-25 years even though sometimes in older age group. The data from the Indonesia's Ministry of Health sub-directorate of the Directorate of Non-Communicable Disease Control (PPTM), 36,761,000 women throughout Indonesia are within age group of 30-50 years. Out of 644,951 (1.75%) of women who had carried out early cancer detection, 1,682 of them discovered breast lumps. The data from Sheikh Yusuf Hospital show 170 adolescence breast lump cases in 2018, 222 cases in 2019, and 38 cases alone during January and February 2020.

This study investigated the issue by using a literature review research design. The midwifery care procedures were conducted by following the 7-stage Varney method.

As parts of this research, a series of examinations, including physical examinations, laboratory examinations, and other complementary examinations were conducted to diagnose the breast lump, namely anamnesis, as well as to plan the treatments deemed fit to the condition. In this case, this study conducted a conservative and operative treatment since the indications, such as the rapid growth of the lump with more than 2 cm in size, and per patient's request, suggest an immediate surgical intervention.

This study concluded that the treatment for fibroadenoma using an excision technique that was carried out based on the intervention indications resulted in excellent cosmesis. This procedure was followed up by a six-month routine where the patient did not experience any recurrences.

Keywords: Midwifery Care of Adolescents, breast lumps, Fibroadenoma, 7-stage Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa dimana pertumbuhan dan perkembangannya telah mengarah kepada kematangan seksual dengan memantapkan identitas dirinya sebagai individu yang terpisah dari keluarganya dan persiapan dalam menentukan masa depannya. Usia remaja menimbulkan berbagai dampak terhadap dirinya baik dampak positif maupun dampak negatif seperti adanya benjolan payudara yang terjadi diusia remaja (Yulina, D, 2016: 61).

Benjolan payudara adalah gambaran yang paling sering di jumpai pada kanker payudara. Meskipun kebanyakan benjolan di payudara tidak bersifat kanker, tetapi semua benjolan payudara harus dianggap serius sampai hasil pemeriksaan dinyatakan benjolan tersebut bukan kanker (Nurul, 2018: 109).

Berdasarkan data dari Subdit Kanker Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) Kemenkes RI Terdapat sekitar 36.761.000 perempuan di seluruh Indonesia yang berumur 30-50 tahun. Sebanyak 644.951 (1, 75%) perempuan pada tahun 2007-2013 yang telah melakukan deteksi dini dengan penemuan benjolan (Tumor) Payudara 1.682 orang (2,6 per 1000 penduduk) (Alvita, 2017: 144).

Fibroadenoma ditemukan sebagai penyakit payudara jinak yang paling umum yaitu 53% dan dengan usia antara 21 hingga 30 tahun, kemudian diikuti oleh Fibroadenosis sebanyak 27%, Sedangkan menurut kelompok umur diikuti oleh 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Mastalgia dan Abses payudara masing-masing 20%, 11% dan 9% (Goyal, 2019: 81).

Dari total 3845 biopsi payudara jinak yang di lakukan pada kelompok ras penduduk Amerika-Afrika, 1798 orang atau (47%) diantaranya di diagnosis

mengalami fibroadenoma mammae. Wanita yang mengalami fibroadenoma mammae pada saat di biopsi rata-rata usianya di bawah 40 tahun dibandingkan wanita tanpa fibroadenoma hanya sekitar (18,9%) (Shaik, dkk, 2018).

Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan, atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang di bentuk pada tahun 2015 oleh negara- negara anggota PBB, pemeriksaan payudara (SADARI) di lakukan untuk mendeteksi dini benjolan payudara termasuk dalam SDG's 2030 goal ke 3 yakni menjamin kehidupan sehat serta mendukung kesejahteraan bagi seluruh kalangan usia. Target yang berhubungan dengan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan ini yakni pada tahun 2030. Termasuk Menjamin akses universal terhadap layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, Keluarga berencana, informasi dan pendidikan, serta integrasi kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional (United, 2015).

Adapun implementasi dari kerangka kerja konvensi WHO mengenai SDG's 2030 goal ke 3 ini yakni mendukung riset dan pengembangan vaksin serta obat-obatan dasar dan vaksin yang terjangkau, sesuai pernyataan "Doha" mengenai perjanjian TRIPS dan kesehatan publik yang menegaskan bahwa hak dari negara-negara berkembang untuk menggunakan secara penuh imbalan dalam perjanjian aspek yang terkait perdagangan hak properti intelektual mengenai fleksibilitas untuk melindungi kesehatan publik, terutama akses obat-obatan secara menyeluruh. Serta secara substansial meningkatkan pendanaan dan perekrutan, pengembangan, training dan daya serap tenaga kerja kesehatan di negara-negara berkembang (International NGO Forum on Indonesian Development, 2017).

Penyakit Fibrokistik yang biasanya di kenal juga dengan perubahan fibrokistik atau *fibrocystic change* (FCC) merupakan kelainan yang sering di temui pada wanita usia 20-50 tahun dan frekuensinya menurun saat maupun setelah

menopause. Di perkirakan lebih dari 50-60% prevalensi FCC (*Fibrocystic change*) akan terjadi pada wanita. Menurut laporan dari *The Nurses Healty Study II* di temukan sekitar 30,9 per 1000 perempuan (3,1%) jenis kelainan payudara jinak pertahun. Dalam studi tersebut melaporkan bahwa insiden ini juga mengalami peningkatan saat bertambahnya usia yakni 25-29 tahun dari 22,6 per 1000 orang (2,3%) pertahun hingga 35,6 per 1000 perempuan (3,6%) pertahun untuk usia 40-44 tahun (Cesariana, 2019: 113).

WHO menyatakan bahwa 10-12% wanita akan mengalami kanker payudara, hal ini menjadikan kanker payudara banyak menyerang wanita. setiap tahun lebih dari 270.000 kasus baru kanker payudara yang terdiagnosa di Eropa, lalu sekitar 175.000 kasus kanker payudara di Amerika Serikat. Ada sekitar 1,2 juta wanita yang terdiagnosis Kanker Payudara dan jumlah yang meninggal akibat kanker payudara yakni lebih dari 700.000 jiwa. Pada umumnya kasus kanker 70 persen kanker baru berkunjung ke fasilitas kesehatan pada saat stadium akhir (WHO, 2020: 99).

Jumlah penderita kanker di dunia kian meningkat. Laporan terbaru yang di rilis *International Agency For Research On Cancer*, WHO mengatakan terdapat 18,1 juta kasus kanker terbaru dan 9,6 juta kematian yang terjadi pada tahun ini. WHO memprediksi kanker dapat menjadi penyebab kematian terbesar pada akhir abad ini. Kanker akan menjadi penghambat terbesar untuk meningkatkan harapan hidup manusia. Hasil laporan ini di dapatkan setelah peneliti melihat 36 jenis kanker lebih dalam di 185 negara didunia (Shaik, dkk, 2018).

Berdasarkan data tersebut, di temukan 1 dari 5 pria dan 1 dari 6 wanita yang memiliki potensi terkena kanker. Sebanyak 1 dari 8 pria dan 1 dari 11 wanita yang akan meninggal akibat kanker. Jumlah angka kejadian kanker payudara di dunia menyebabkan kematian 627 ribu jiwa (Pertiwi, 2019: 188).

Kasus remaja dengan benjolan pada payudara berdasarkan data yang diperoleh dari salah satu rumah sakit rujukan yaitu RSUD Syekh Yusuf Gowa mengenai kasus benjolan payudara pada remaja di dapatkan data yang diperoleh dari ruangan rekam medik RSUD Syekh Yusuf Gowa, menunjukkan jumlah kasus benjolan payudara pada remaja pada tahun 2018 terdapat 170 kasus dan pada 2019 sebanyak 222 kasus serta tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Februari sebanyak 38 kasus (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf Gowa 2020).

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup dalam *literature review* adalah manajemen asuhan kebidanan pada remaja dengan benjolan pada payudara tahun 2020.

C. Tujuan

Adapun tujuan penulisan *literature review* asuhan kebidanan pada remaja dengan benjolan payudara sebagai berikut:

1. Telah didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai data subjektif dan data objektif dari tanda dan gejala pada remaja dengan benjolan pada payudara.
2. Telah didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai diagnosis tentang remaja dengan benjolan pada payudara.
3. Telah didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai komplikasi yang dapat terjadi pada remaja dengan benjolan pada payudara.
4. Telah didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai kondisi emergensi yang dapat terjadi serta penanganan pada remaja dengan benjolan pada payudara.
5. Telah didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai simpulan dari berbagai sumber tentang intervensi apa saja/penatalaksanaan yang tepat pada remaja dengan benjolan pada payudara.

6. Telah didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai penjelasan adanya intervensi pada remaja dengan benjolan pada payudara.
7. Telah didapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber yang menjadi dasar evaluasi pada remaja dengan benjolan pada payudara.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan *literature review* sebagai berikut:

1. Manfaat institusi

Sebagai bahan pembelajaran dan sumber pengetahuan untuk penulis berikutnya.

2. Manfaat bagi penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai asuhan pada remaja dengan benjolan pada payudara berdasarkan *Avidence Based*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam *literature review* ini sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN KTI

HALAMAN PERSETUJUAN

KARYA TULIS ILMIAH

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR ISTILAH

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penulisan
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Remaja
- B. Tinjauan Khusus Tentang Khusus Tentang Benjolan Payudara
- C. Manajemen Kebidanan Asuhan Kebidanan
- D. Tinjauan Umum Benjolan Payudara Pada Remaja Menurut Pandangan Agama Islam

BAB III TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING

- A. Matriks Langkah I
- B. Matriks Langkah II
- C. Matriks Langkah III
- D. Matriks Langkah IV
- E. Matriks Langkah V
- F. Matriks Langkah IV
- G. Matriks Langkah VII

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pembahasan Hasil Telah *Evidence Based* Asuhan 7 langkah Varney
Berdasarkan Hasil penelusuran Referensi
- B. Implikasi Kebidanan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Remaja

1. Remaja dan Batasannya

Remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung (*dependence*) terhadap orang tua kearah kemandirian (*independence*), minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral. Di Negara Barat istilah remaja dikenal dengan "*adolescence*" yang berasal dari kata bahasa latin "*adolescence*" (kata benda *adolenscentia* = remaja), yang berarti tumbuh menjadi dewasa (Karyanti, 2018: 2).

Remaja di defenisikan sebagai periode transisi perkembangan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang mencakup aspek biologi, kognitif, dan perubahan sosial yang berlangsung antara 10-19 tahun (Mighwar, 2006).

Masa remaja terdiri dari masa remaja awal (10-14 tahun), masa remaja pertengahan (14-17 tahun), dan masa remaja akhir (17-19 tahun).

- a. Remaja awal (*early adoolescence*) adalah masa yang di tandai dengan berbagai perubahan tubuh yang cepat, sering mengakibatkan kesulitan dalam penyusaian diri, dan pada saat ini remaja dalam pencarian identitas diri.
- b. Remaja menengah (*middleadolescence*) di tandai dengan berbagai perubahan bentuk tubuh yang sudah menyerupai tubuh orang dewasa.
- c. Remaja akhir (*late adolescence*) di tandai dengan pertumbuhan biologis yang sudah melambat, tetapi masih berlangsung di tempat-tempat lain. Emosi, minat, konsentrasi, dan cara berpikir remaja akhir mulai stabil. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah sudah mulai meningkat (Sarwono, 2012: 198).

2. Karakteristik Masa Remaja

Karakteristik perkembangan yang normal terjadi pada remaja dalam menjalankan tugas perkembangannya mencapai identitas diri antara lain menilai diri secara objektif dan merencanakan dalam mengaktualisasikan kemampuannya. Dengan demikian, pada fase ini, seorang remaja akan:

- a. Menilai rasa identitas diri.
- b. Meningkatkan minat pada lawan jenis
- c. Menggabungkan perubahan seks sekunder dalam citra tubuh.
- d. Memulai perumusan tujuan okupasional.
- e. Memulai pemusatan diri dari otoritas keluarga (Desta, 2019: 88).

Pubertas secara klinis dimulai dari adanya ciri-ciri kelamin sekunder serta berakhir jika kemampuan produksi telah berfungsi. Pada wanita, tahap pra puberdi usia 10-13 tahun, puber 13-17 tahun, dan pasca puber 17-21 tahun. Pada pria, tahap pra puber 14-16 tahun, puber 14-17 tahun, dan pasca puber 17-21 tahun. Datangnya menstruasi pertama merupakan salah satu peristiwa penting pada masa pubertas remaja putri sekaligus pertanda biologis dari kematangan seksual (Nurul, 2018: 11).

Adapun perubahan fisik yang terjadi pada remaja putri saat terjadi menstruasi yaitu penambahan tinggi badan, pertumbuhan rambut di sekitar alat kelamin dan ketiak kulit menjadi lebih halus suara menjadi lebih halus dan tinggi, payudara mulai membesar, pinggul semakin membesar, paha membulat, mengalami menstruasi pertama (Menarche) (Desta, 2019: 104).

Menstruasi pertama atau menarche adalah menstruasi awal yang biasa terjadi pada masa pubertas dalam rentang usia sepuluh tahun sampai 16 tahun yang menjadi pertanda biologis kematangan seksual wanita, pada permulaan menstruasi hanya hormon estrogen saja yang dominan, Coad dan Dunstal (2006). Hormon estrogen dominan inilah yang berperang sangat penting untuk terjadinya

pertumbuhan dan perkembangan tanda seks sekunder pada seorang wanita, Manuaba dkk (2009) (Nurul, 2018: 14).

Macam-macam masa remaja yaitu :

a. Masa remaja adalah masa peralihan

Yaitu peralihan dari satu tahap perkembangan ke perkembangan berikutnya secara berkesinambungan. Pada masa ini remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan seorang yang dewasa. Masa ini merupakan masa strategis karena memberikan waktu kepada remaja untuk membentuk gaya hidup dan menentukan pola perilaku, nilai-nilai, dan sifat-sifat yang sesuai dengan yang di inginkan (Dewi Marfu'ah, dkk. 2019: 12).

b. Masa remaja adalah masa terjadi perubahan

Sejak awal remaja, perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku sikap juga berkembang. Ada perubahan besar yang terjadi pada remaja, yaitu perubahan emosi, peran, minat, pola perilaku (perubahan sikap menjadi ambivalen) (Rahman dkk, 2013: 11).

c. Masa remaja adalah masa yang penuh masalah

Masa remaja sering menjadi masalah yang sangat sulit untuk di atasi. Hal ini terjadi karena remaja belum terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Akibatnya, terkadang terjadi penyelesaian masalah yang tidak sesuai dengan yang di harapkan (Qalbi et al, 2014: 35).

d. Masa remaja adalah masa mencari identitas

Pada remaja identitas diri yang di cari yakni kejelasan siapa dirinya serta apa perannya dalam masyarakat. Remaja akan merasa dirinya tidak puas jika di samakan dengan orang lain. Remaja ingin menunjukkan dirinya sebagai individu, sementara pada waktu yang bersamaan, remaja ingin mempertahankan dirinya dengan kelompok sebaya (Rosyida, 2019, 67).

e. Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan kekuatan

Dalam masyarakat ada stigma bahwa remaja merupakan anak yang tidak rapi, tidak dapat di percaya, tidak jarang pula melakukan hal yang negatif, akibatnya kehidupan remaja harus di bimbing serta di awasi oleh orang dewasa. Pandangan ini akan membuat orang tua selalu mencurigai remaja hingga menimbulkan pertentangan serta membentuk jarak antara remaja dan orang tua, hal inilah yang akan membuat masa peralihan remaja kedewasa semakin sulit. (Karyanti, 2018: 2).

f. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis

Remaja lebih sering memandang kehidupan melalui kacamatanya sendiri, baik dalam melihat dirinya ataupun melihat orang lain, mereka belum melihat apa adanya, namun remaja menginginkan sesuai yang di harapkan (Achmad Asrori, 2015: 18).

g. Masa remaja adalah ambang masa dewasa

Dengan berlalunya usia belasan, remaja yang semakin matang berkembang dan berusaha memberi kesan sebagai seseorang yang hampir dewasa. Remaja akan memusatkan dirinya pada perilaku yang di hubungkan dengan status orang dewasa, misalnya dalam berpakaian dan bertindak (Riska, K, 2012: 10-11).

B. Tinjauan Khusus Tentang Benjolan Payudara


1. Pengertian

Benjolan payudara di artikan sebagai setiap massa yang terdapat pada payudara. Benjolan payudara merupakan gambaran keadaan payudara yang abnormal, mulai dari benjolan yang jinak sampai benjolan yang ganas (Grace, dkk. 2006: 17).

Budding (Tumbuhnya Payudara) merupakan tahap awal perkembangan masa pubertas pada wanita. Namun, sekitar 15% pada wanita normal lebih dulu mengalami perkembangan rambut pubis dari pada perkembangan payudara. Rambut pubis mulai tumbuh pada usia sekitar 11 tahun, bersamaan dengan hal itu maka tumbuh pula rambut ketiak. Maka sangatlah penting kedua tahap tersebut di klasifikasikan ketika terdapat ketidaksesuaian antara dua tahap tersebut. Pertama perkembangan payudara yang dikendalikan oleh sekresi estrogen dari ovarium dan kedua pertumbuhan rambut pubis yang di pengaruhi oleh sekresi androgen dan adrenal (Yusuf Y, 2014).

Tahap perkembangan payudara pada wanita bersifat tidak mutlak, ada beberapa wanita dewasa yang hanya mengalami perkembangan langsung dari tahap 3 ke 5 dan tidak pernah mencapai tahap 4 pada awal pubertas perkembangan payudara unilateral masih normal dan kemungkinan menetap sekitar 6 bulan sebelum tumbuhnya tunas payudara. Pada wanita, tahap akhir pubertas adalah terjadinya menstruasi, seiring berjalannya haid secara periodik, maka pertumbuhan fisik pada perempuan akan berakhir. Maka untuk mempersiapkan psikologi remaja sangat penting di lakukan sejak dini agar dapat menimbulkan respon positif, sehingga pada saat proses menarche dapat dihadapi dengan tenang (Yusuf Y, 2014).

Payudara merupakan jaringan yang sensitif dan responsif dalam perubahan siklus bulanan serta pertumbuhan usia. Jaringan kelenjar yakni kelenjar sekretorik tubuloalveolaris serta saluran nya yang membentuk 15-20 buah lobus bersekat yang menyebar di sekeliling puting susu (papilla mammae). Kemudian di dalam setiap lobus terdapat banyak lobules yang ukurannya lebih kecil. Lobulus inilah yang menjadi tempat untuk mengalirkan ASI ke dalam duktus dan sinus yang memproduksi ASI yang akan bermuara ke permukaan areola atau puting susu (Bickley, 2014: 304).



Gambar
(Anatomi

1.1

Payudara)

(Sumber :Kementrian Kesehatan, 2010)

Bagian payudara terdiri dari lobus, lobules dan bulbus yang terhubung oleh duktus. Didalam payudara juga terdapat darah dan pembuluh-pembuluh getah bening. Pembuluh-pembuluh kelenjar getah bening tersebut berkumpul pada satu struktur yang di kenal dengan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening ini di temukan pada lengan bawah, di atas tulang selangka, pada dada, serta pada bagian tubuh lainnya (Naviri. 2016: 83).

Remaja merupakan masa peralihan yang diawali pada saat anak memperlihatkan tanda-tanda pubertas yang dilanjutkan dengan adanya perubahan-perubahan dari yang bukan seksual menjadi seksual. Di antaranya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya pubertas yakni Nutrisi, genetik, kondisi kesehatan, sosial, faktor lingkungan serta perilaku. Faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi pubertas yakni nutrisi. Pada umumnya pubertas terjadi pada usia 9-12 tahun. Peningkatan kebutuhan zat besi pada remaja putri terjadi karena

percepatan pertumbuhan dan menstruasi (Peroverawati 2011: 78).

Fibroadenoma mammae yakni tumor jinak yang cenderung dapat tumbuh dengan menekan daerah sekitarnya sehingga dapat membesar akibat tekanan pada lingkungannya sehingga daerah yang di tempatinya dapat menimbulkan masalah mulai dari masalah ringan hingga masalah yang serius yang menyebabkan penderita mengalami keluhan (Perbedaan Tingkat Pengetahuan Siswi SMA 2 Palembang Terhadap Fibroadenoma Mammae Sebelum dan Sesudah Pemberian Intervensi Perilaku Sadari). Fibroadenoma mammae sering terjadi pada wanita usia muda, biasanya usianya kisaran 21-25 tahun (NSW *Breast Cancer Institute*) (Elizabeth, 2017: 59).




Gambar 1.2 (Benjolan Payudara)

(Sumber : Kementrian Kesehatan,2010)

Tumor payudara adalah suatu benjolan Non-kanker yang terdapat pada jaringan payudara, walaupun tumor payudara ini sering terjadi tumor payudara ini dapat menjadi pemicu faktor resiko kanker payudara, dimana tumor dapat meningkat hingga sepertiga menjadi kanker payudara (Naviri, 2016: 226).

Kanker payudara adalah urutan kedua penyebab kematian wanita. Pada pria kanker payudara juga dapat terjadi namun jumlahnya lebih kecil di bandingkan wanita (Naviri, 2016: 83).

Salah satu cara yang dilakukan untuk deteksi dini *fibroadenoma mammae* yakni dengan melakukan SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) yang di lakukan dengan teknik tertentu dan dilakukan secara berkala tiap bulan (Floreska, dkk, 2014: 11).



Gambar 1.3 (Pemeriksaan Payudara Sendiris)

(Sumber :Kementrian Kesehatan,2010)

Benjolan atau Tumor adalah sekelompok jaringan abnormal, yang disebabkan oleh sel-sel tua dan rusak yang tidak mati seperti seharusnya, ada dua jenis tumor yang terdapat pada payudara, yakni tumor yang dapat menyebabkan kanker dan tumor yang tidak menyebabkan kanker (Naviri, 2016: 92)

Tumor yang tidak menyebabkan kanker umumnya tidak berbahaya karena jarang menyerang jaringan sekitarnya, tidak berkembang ke daerah tubuh lainnya, serta bisa di angkat dan tidak tumbuh kembali. Berbeda halnya dengan tumor yang dapat menyebabkan kanker yang dapat mengancam kehidupan, menyerang jaringan sekitar bahkan dapat menyebar ke tubuh lainnya dan sering kali bisa di angkat

namun kadang-kadang tumbuh kembali (Naviri, 2016: 92-93).

Kanker payudara adalah tumor ganas yang diawali pada sel-sel payudara. Tumor ganas adalah sekumpulan sel kanker yang dapat tumbuh dan berkembang menyerang jaringan tubuh hingga dapat menyebar ke tubuh yang lainnya (Naviri, 2016: 87).

2. Macam-macam benjolan Payudara

a. Kista

Kista adalah benjolan pada payudara yang biasanya muncul di akhir siklus menstruasi, biasanya benjolan ini akan hilang dengan sendirinya setelah siklus menstruasi berakhir. Kista merupakan kantung yang berisi cairan ketika tubuh menahan lebih banyak air yang cenderung membesar pada akhir siklus menstruasi. Ukuran kista ini bermacam-macam, mulai dari yang kecil hingga ukuran sebesar telur. Sebagian besar kista bisa bergerak di bawah kulit. Pada wanita usia 40 tahunan atau beberapa tahun sebelum masa menopause kista juga dapat muncul (Naviri, 2016: 158).

b. Kelainan Fibrokistik

Fibrokistik merupakan benjolan yang terdapat pada payudara, benjolan ini biasanya berhubungan dengan rasa nyeri yang tidak menetap disebabkan oleh pengaruh siklus menstruasi dan memburuk hingga pada saat menopause (Cesariana, 2019: 113).

c. Fibroadenoma

Fibroadenoma adalah gumpalan yang terdapat pada payudara yang bukan kista ataupun kanker, tumor jinak ini selalu berkembang pada tahun-tahun pertengahan usia reproduktif. Ciri-ciri fibroadenoma yakni seperti massa yang padat, licin, kuat dan elastis dengan bentuk yang jelas. Fibroadenoma ini berkembang ketika jaringan ikat tumbuh dalam kelanjar penghasil susu atau lobule

payudara (Naviri, 2016: 158). Berikut adalah tanda dan gejala Fibroadenoma:

- 1) Pada usia 20 tahun biasanya fibroadenoma ini terjadi yang berawal dari adanya penemuan benjolan atau massa yang tidak terasa sakit ketika di raba saat mandi.
- 2) Benjolan ini biasanya tumbuh dengan lambat.
- 3) Fibroadenoma dapat multipel.
- 4) Diameter benjolan yang kebanyakan di temukan yakni 2-3 cm, tapi fibroadenoma ini dapat tumbuh dengan ukuran yang lebih besar jika di biarkan (*Giant Fibroadenoma*).
- 5) Pada tahap pemeriksaan, Benjolan fibroadenoma teraba kenyal dan halus. Benjolan tersebut tidak menimbulkan efek samping seperti merah, nyeri ataupun panas. Fibroadenoma juga dapat di gerakkan dan tidak menyebabkan pengkerutan kulit payudara ataupun retraksi puting, benjolan tersebut berlobus-lobus.
- 6) Pada pemeriksaan mamografi menghasilkan gambaran yang jelas yang merupakan benjolan tersebut adalah benjolan yang jinak dan rata serta memiliki batasan yang jelas.
- 7) Wanita dengan fibroadenoma simpel tanpa penampakan histologi komplek dan tanpa penyakit proliferaatif pada prenkim payudara tidak memiliki peningkatan resiko kanker payudara (Tony Hollingworth, 2012: 262).

d. Papilloma Intraduktal

Papilloma intraduktal merupakan tumor jinak akibat dari proliferasi lokal pada epitel duktus. Papilloma intraduktal yakni tumor yang terdapat pada duktus laktiferous mayor (Suyatno, 2015: 21).

Biasanya benjolan ini tidak teraba karena ukurannya yang berdiameter <5 mm. Sebaiknya di lakukan mamogram untuk menyingkirkan keganasan, karena

keganasan ini biasanya memiliki gejala keluhan keluarnya darah dari puting (Wiley Blackwell, 2017: 23).

e. Nekrosis Lemak

Terjadi akibat trauma hebat pada daerah atau jaringan yang banyak mengandung lemak. Tanda dan gejala nekrosis lemak yakni berupa benjolan yang keras, bulat, kulit disekitar benjolan biasanya memerah atau memar dan dimple. Benjolan tersebut tidak menjadi ganas serta dapat terjadi pada wanita di setiap tingkatan usia (Cahyasari dan Sakti, 2014: 65).

f. Kanker payudara

Kanker payudara adalah tumor ganas yang diawali pada sel-sel payudara. Tumor ganas adalah sekumpulan sel kanker yang dapat tumbuh dan berkembang menyerang jaringan tubuh hingga dapat menyebar ke tubuh yang lainnya (Naviri, 2016: 87).

3. Penyebab terjadinya Benjolan payudara

Penyebab terjadinya benjolan payudara atau tumor payudara belum diketahui secara pasti, namun benjolan tersebut berkaitan dengan hormon Reproduksi, Tumor payudara rentan terjadi selama masa reproduksi. Ukurannya akan meningkat selama kehamilan atau pun terapi estrogen dan cenderung mengecil setelah menopause karena stimulasi estrogen menurun (Sari, 2012: 123)

4. Faktor Resiko

Ada beberapa faktor resiko yang telah teridentifikasi yakni :

a. Jenis Kelamin

Dari prevalensi tumor payudara di dunia hanya ada 1% laki-laki terkena tumor payudara, ini berarti wanita lebih beresiko menderita tumor payudara di banding laki-laki. Hal ini karena pada menarche lebih awal dan menopause yang lebih lama akan meningkatkan durasi pajanan terhadap estrogen pada tahun

reproduksi seorang perempuan. Namun pada perkembangan kanker payudara terdapat kolaborasi antara faktor genetik dan lingkungan (Prawihardjo, 2014).

b. Usia Menarche

Usia menarche yang lebih awal berhubungan dengan lamanya paparan hormon estrogen dan progesteron pada wanita yang berpengaruh terhadap proses proliferasi jaringan termasuk jaringan payudara. Risiko payudara menurun pada perempuan yang melahirkan umur kurang dari 20 tahun dibandingkan umur lebih dari 30 tahun. Pada perempuan umur kurang dari 20 tahun yang hamil cukup bulan dan jumlah kehamilan lebih dari satu kali akan mengurangi risiko kanker payudara separuhnya dibandingkan yang tidak pernah melahirkan anak. Hal ini dikarenakan tingkat estrogen yang lebih rendah pada kehamilan dan pada perempuan yang memiliki anak banyak (Prawihardjo, 2014).

c. Lama menyusui

Lama menyusui 4-6 bulan memiliki risiko kanker payudara lebih besar dibandingkan dengan ibu yang menyusui dengan lama menyusui 7-24 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama menyusui dapat mengurangi risiko terjadinya kanker payudara dari pada tidak pernah menyusui. Menyusui merupakan salah satu faktor yang tidak bisa ditolak oleh setiap wanita yang mempunyai anak. Wanita yang sudah menyusui anaknya memiliki risiko kecil terkena kanker, terutama kanker payudara. Semakin lama menyusui dapat menurunkan risiko terkena kanker payudara. Wanita yang memiliki riwayat menyusui anaknya lebih lama (lebih dari 2 tahun) dapat menurunkan paparan estrogen dalam payudara sehingga menurunkan faktor risiko terhadap kanker (Prawihardjo, 2014).

d. Riwayat Keluarga

Wanita memiliki resiko 3 kali lebih besar menderita tumor payudara ketika memiliki riwayat keluarga penderita tumor payudara. Faktor genetik memiliki andil yang besar. Seseorang yang keluarganya pernah menderita penyakit kanker, ada kemungkinan penyakit tersebut juga dialami oleh keturunannya. Wanita dengan riwayat keluarga yang menderita kanker payudara pada ibu, saudara perempuan ibu, saudara perempuan, adik/kakak, resikonya 2 hingga 3 kali lebih tinggi. Apabila dilakukan pemeriksaan genetik terhadap darah dan hasilnya positif, maka dapat meningkatkan peluang terkena kanker payudara pada keturunannya, 2 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak mempunyai riwayat keturunan (Prawihardjo, 2014).

e. Faktor usia

Resiko menderita tumor payudara semakin meningkat seiring bertambahnya usia, risiko terjadinya kanker payudara juga akan meningkat. Risiko terjadinya kanker payudara pada wanita berumur kurang dari 30 tahun cenderung lebih rendah dari pada usia 40 tahun ke atas. Pada usia >40 tahun disebut masa pramenopause. Pada masa ini hormon progesteron tidak dapat dihasilkan dengan jumlah yang cukup sehingga produksi hormon estrogen tidak dapat ditangkal. Hal inilah yang memicu untuk terjadinya kanker payudara (Prawihardjo, 2014).

f. Faktor Hormonal

Jika kadar hormon terlalu tinggi pada usia reproduktif, terutama jika tidak di selingi oleh perubahan hormon akibat kehamilan dapat meningkatkan resiko tumor payudara. Pada usia >40 tahun disebut masa pramenopause. Pada masa ini hormon progesteron tidak dapat dihasilkan dengan jumlah yang cukup sehingga produksi hormon estrogen tidak dapat ditangkal. Hal inilah yang

memicu untuk terjadinya kanker payudara. Selain itu pada wanita yang berumur di atas 40 tahun terutama yang masih mengalami masa reproduksi, setiap bulan akan mengalami menstruasi namun tidak mengalami ovulasi sehingga hormon progesteron yang dihasilkan tidak cukup menangkal hormon estrogen yang merupakan pemicu terjadinya kanker payudara (Prawihardjo, 2014).

g. Riwayat Obesitas/Kegemukan

Riwayat obesitas/kegemukan memiliki resiko lebih besar untuk terkena kanker payudara dikarenakan adanya hubungan yang signifikan antara riwayat kegemukan yang pernah dialami responden. Peningkatan lemak dalam tubuh berkorelasi dengan peningkatan peradangan dalam tubuh. Peningkatan peradangan meningkatkan risiko kerusakan DNA yang kemudian mengarahkan ke kondisi pertumbuhan sel yang tidak normal atau kanker. Jaringan lemak yang menumpuk banyak di dalam tubuh juga menghasilkan hormon estrogen yang tinggi. Tingginya kadar estrogen berhubungan terhadap peningkatan risiko kanker payudara, kanker endometrium, dan kanker ovarium. Jadi, itulah alasan mengapa wanita obesitas cenderung berpeluang tinggi mengidap penyakit-penyakit serius. Selain meningkatkan risiko kanker, kondisi obesitas juga menyulitkan dokter untuk mendeteksi kanker (Prawihardjo, 2014).

h. Pola Diet

Faktor diet dan nutrisi serta aktivitas fisik saat ini menjadi faktor utama dalam penelitian mengenai gaya hidup yang mempengaruhi kejadian kanker payudara yang berfokus pada pengaruh aktivitas fisik serta diet dan nutrisi dalam kejadian kanker payudara dikarenakan gaya hidup mengkonsumsi diet dan nutrisi yang baik serta melakukan aktivitas yang teratur (Prawihardjo,

2014).

i. Usia saat kehamilan pertama

Pada wanita hamil pertama di usia 30 tahun memiliki resiko 2 kali lebih besar menderita tumor payudara di bandingkan hamil pada usia kurang dari 20 tahun. Perubahan payudara sering merupakan gejala awal kehamilan. Benjolan payudara merupakan salah satu gejala pertama kehamilan. Jika melihat benjolan ini sebaiknya mengonfirmasi kehamilan pada tenaga kesehatan.

Kemudian pada kehamilan, mungkin melihat peningkatan benjolan pada puting saat tubuh bersiap untuk menyusui. Namun perubahan pada saat terjadi kehamilan terkadang benjolan di payudara ini bisa menjadi tersumbat, meradang, atau terinfeksi sehingga menyebabkan komplikasi pada ibu (Prawihardjo, 2014).

j. Aktivitas Fisik

Wanita dengan aktivitas fisik yang rendah memiliki resiko lebih besar untuk terkena kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang memiliki kebiasaan berolahraga atau aktivitas fisik yang tinggi. Dengan aktivitas fisik atau berolahraga yang cukup akan dapat dicapai keseimbangan antara kalori yang keluar. Karena kurangnya aktivitas fisik menjadi faktor resiko dari kanker karena aktivitas fisik berhubungan dengan insulin yang tinggi pada tubuh dapat membentuk IGF-1 atau insulin Growth factor-1, IGF-1 merupakan prokarsinogen dengan cara mengurangi kematian sel dan mendorong pertumbuhan sel. Aktivitas fisik dapat mempengaruhi kesehatan orang yang terkena kanker setelah terdiagnosa, data menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat mencegah kematian akibat kanker (Prawihardjo, 2014).

k. Pemakaian Kontrasepsi Oral

Pemakaian kontrasepsi oral juga merupakan salah satu faktor yang

membuat resiko peningkatan terjadinya tumor payudara, penggunaan kontrasepsi oral pada wanita dengan usia kurang dari 20 tahun lebih beresiko di bandingkan penggunaan kontrasepsi oral pada usia lebih tua (Frisca Tresnawati, 2013: 192).

1. Makanan yang dikonsumsi

Ada pun beberapa makanan yang dapat memicu dan peyebab benjolan payudara:

1) Daging merah

Daging merah mengandung lemak jenuh dan dan kolestrol jahat sehingga beresiko mengalami obesitas yang merupakan salah satu faktor pemicu terbentuknya sel kanker atau benjolan payudara dalam tubuh.

2) Gula

Pada kondisi ini tubuh tidak dapat merespins insulin yang dibutuhkan untuk mengontrol gula darah. Hal ini kemudian menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak hormon estrogen dan progesteron yang bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker.

3) Makanan yang dibakar

Pemakaran daging ini dapat memicu terbentuknya senyawa *heterocyclic amine (HCA)* dan *polycyclic aroma hydrocarbon (PAH)* yang tergolong sebagai zat karsinogen. Adapun zat karsinogen dalam makanan dapat menjadi penyebab terjadinya berkembang sel kanker termasuk payudara.

4) Makanan kalengan

Makanan kalengan juga dapat mejadi faktor pemicu berkembangnya kanker payudara. Hal tersebut karena sisi bagian

dalam kaleng pada umumnya dilapisi oleh bisphenol-A (BPA).

5) Makanan yang mengandung lemak trans dan jenuh

Makanan yang mengandung lemak trans dan lemak jenuh perlu dihindari atau batasi karena kurang baik bagi tubuh. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung dua lemak jahat ini dapat menjadi penyebab terjadinya kanker payudara. (Sukfitrianty, dkk, 2016: 85).

Manajemen Asuhan yang diberikan selain pendidikan mengenai pola istirahat juga harus memberikan pendidikan mengenai makanan yang harus dihindari oleh ibu dengan benjolan payudara. Untuk itu, perlu menjaga kesehatan dengan memperbaiki pola makan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam (QS Al Araf ayat 31).

يٰۤاِبْنِيۤ اٰدَمَ خُذُوۡا زِيۡنَتَكُمْ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا وَلَا تُسۡرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسۡرِفِيۡنَ

Terjemahan :

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Hai anak Adam, pakailah hiasan-hiasan yang berupa pakaian materi yang menutupi aurat dan pakaian moril yaitu berupa takwa, di setiap tempat salat, waktu melaksanakan ibadah dan menikmati makanan dan minuman. Semua itu kalian lakukan dengan tanpa berlebih-lebihan. Maka jangan mengambil yang haram. Dan jangan melampaui batas yang rasional dari kesenangan tersebut. Allah tidak merestui orang-orang yang berlebih-lebihan. Islam mengharuskan pemeluknya menjaga penampilan dan kebersihan. Apalagi pada setiap pertemuan. Inilah cara-

cara yang ditetapkan ilmu kesehatan (*hygiene*). Adapun sikap tidak berlebihan, ilmu pengetahuan modern telah menetapkan bahwa tubuh tidak menyerap semua makanan yang masuk, tetapi hanya mengambil secukupnya, kemudian berusaha membuang yang tersisa lebih dari kebutuhan.

Di samping itu, lambung dan alat-alat pencernaan lainnya akan terpersir dan mengalami gangguan. Dengan begitu, seseorang akan menderita penyakit tertentu yang berhubungan dengan alat-alat tersebut. Di antara bentuk sikap berlebihan, mengkonsumsi suatu zat makanan tertentu dalam jumlah besar melebihi zat-zat lain yang juga diperlukan. Seperti mengkonsumsi lemak dengan kadar yang mengalahkan albumen yang dibutuhkan tubuh. Di samping itu, ayat ini menganjurkan kita untuk makan yang baik-baik agar badan sehat sehingga kuat bekerja. Demikian pula, sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dapat menyebabkan kelebihan berat badan. Tubuh menjadi terpersir dan mudah terkena tekanan darah tinggi, gula dan kejang jantung (*angina pectoris*) (Shihab, 2012).

Al-Qur'an merupakan penuntun bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupannya di muka bumi sehingga menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk menyebarkan dan mempelajarinya. Al-Qur'an menuntun kita untuk bersikap moderat (seimbang) dalam segala hal, salah satunya itu mengkonsumsi makanan tidak secara berlebihan. Menurut penelitian di dunia kesehatan jika mengkonsumsi makanan secara berlebihan akan menyebabkan masalah dalam kesehatan seperti hipertensi. Disini Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas semua perihal yang

telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT. Maka tidak ada kesenjangan antara Al-Qur'an dengan teori kebidanan.

5. Patofisiologi

Tumor payudara sering kali ditemukan pada kuadran luar atas dengan lobus yang berbatas jelas, mudah digerakkan dari jaringan sekitarnya. Pada gambaran histologis menunjukkan stroma dengan poliferasi fibroblast yang mengelilingi kelenjar dan rongga kistik yang dilapisi epitel dengan bentuk dan struktur yang berbeda (Elizabeth, 2005).

Menurut Sarjadi (2007) secara hisologis fibroadenoma mammae di bagi menjadi dua yakni :

a. Intracanalicular fibroadenoma

Fibroadenoma pada payudara yang secara tidak teratur terbentuk dari pemecahan antara stroma fibrosa yang mengandung serat jaringan epitel. Rongga mirip duktus serta kelenjar yang dilapisi oleh satu atau lebih lapisan sel yang regular dengan membran basal jelas dan utuh, dimana sebagian lesi rongga duktus terbuka, bundar hingga oval dan cukup teratur (Manuaba, 2012: 12).

b. Pericanalicular fibroadenoma

Pada payudara fibroadenoma menyerupai kelenjar atau kista yang kelilingi oleh jaringan epitel pada satu atau banyak lapisan. Sebagian lainnya tertekan oleh poliferasi ekstensif stroma sehingga pada potongan melintang rongga tersebut tampak sebagai celah atau struktur irregular mirip bintang (Razfan, dkk, 2020: 42).

6. Tanda dan gejala benjolan payudara

- a. Benjolan payudara dapat multipel
- b. Benjolan berdiameter 2-3 cm
- c. Benjolan tidak menimbulkan reksi radang, mobile dan tidak menyebabkan pengerutan kulit payudara

- d. Benjolan berlobus – lobus
- e. Pada pemeriksaan mammografi, gambaran jelas jinak berupa rata dan memiliki batas jelas (Sari, 2012: 133).

7. Pemeriksaan Diagnostik

- a. Ultrasonografi

Dapat membedakan antara benjolan yang padat dan kista pada jaringan payudara keras.

- b. Mammografi

Memperlihatkan struktur internal payudara, serta dapat mendeteksi tumor yang terjadi pada tahap awal.

- c. Scan CT dan MRI

Teknik ini dapat mendeteksi segala penyakit pada payudara (Doengest, 2000).

- d. Pemeriksaan Biopsi

Untuk mendiagnosisi tumor dan Ca Mammae dapat juga dilakukan dengan pemeriksaan biopsy. Untuk menentukan tingkat keganasan pada tumor payudara dilakukan pemeriksaan histology dengan mengangkat jaringan pada tumor payudara (Razfan, dkk, 2020: 1).

Biopsi terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

- 1) Fine Needle Aspiration Cytology (FNAC)

Pada FNAC akan diambil sel dari fibroadenoma dengan menggunakan penghisap berupa sebuah jarum yang dimasukkan pada suntikan. Dari alat tersebut kita dapat memperoleh sel yang terdapat pada fibroadenoma, lalu hasil

pengambilan tersebut dikirim ke laboratorium patologi untuk diperiksa di bawah mikroskop (Pamungkas, 2011: 88).

Di bawah mikroskop tumor tersebut tampak seperti berikut :

- a) Tampak jaringan tumor yang berasal dari mesenkim (jaringan ikat fibrosa) dan berasal dari epitel (epitel kelenjar) yang berbentuk lobus-lobus
- b) Lobuli terdiri atas jaringan ikat kolagen dan saluran kelenjar yang berbentuk bular (perikanalikuler) atau bercabang (intrakanalikuler)
- c) Saluran tersebut dibatasi sel-sel yang berbentuk kuboid atau kolumnar pendek uniform (Taufan, 2011).

2) Core needle biopsy (biopsi jarum inti)

Prosedur yang digunakan untuk mengambil jaringan yang kecil dari area yang tidak normal pada payudara dengan menggunakan jarum yang sedikit lebih besar (Smeltzer, dkk, 2002).

3) Biopsy stereotaktis

Pada biopsy ini digunakan sinar X dan komputer untuk melihat gambar. Teknik ini dapat menemukan benjolan yang tidak teraba, namun terlihat saat pemeriksaan mammogram (Sari, 2012: 102).

4) Biopsy terbuka atau pembedahan

Pembedahan dilakukan untuk mengeluarkan bagian dari benjolan kemudian dilihat dengan mikroskop (Wiley Blackwell, 2017: 20).

8. Penatalaksanaan

a. Pembedahan

Mastektomi persial (eksisi tumor lokal dan penyinaran). mulai dari

lumpektomi sampai pengangkatan segmental (pengangkatan jaringan yang luas dengan kulit yang terkena).

- b. Mastektomi total dengan diseksi aksial rendah seluruh payudara, semua kelenjar limfe dilateral otocpectoralis minor.
- c. Mastektomi radikal yang dimodifikasi
 - 1) Mastektomi radikal seluruh payudara, semua atau sebagian besar jaringan aksila
 - 2) Mastektomi radikal yang diperluas sama seperti mastektomi radikal ditambah dengan kelenjar limfe mamaria interna (Wiley Blackwell, 2017: 43).
- d. Non pembedahan
 - 1) Penyinaran, pada payudara dan kelenjar limfe regional yang tidak dapat direseksi pada kanker lanjut pada metastase tulang, metastase kelenjar aksila.
 - 2) Kemoterapi, adjuvan sistematis setelah mastektomi, paliatif pada penyakit yang lanjut.
 - 3) Terapi hormon dan endokrin, kanker yang telah menyebar, memakai estroge, androgen, antiestrogen, ooforektomi, adrenaektomi hipofisektomi (Smeltzer, dkk, 2002).

C. *Manajemen Asuhan Kebidanan*

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan yakni upaya pendekatan yang dilakukan oleh bidan untuk menerapkan metode-metode pemecahan masalah secara sistematis, yang di

mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan serta yang terakhir yakni evaluasi(Rukiyah Yeyeh Al, Lia Yulianti. 2011. Hal: 82).

a. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

1) Langkah 1 : Identitas Data Dasar

Pada langkah pertama pengumpulan seluruh data yang di kumpulkan untuk mengevaluasi kondisi klien secara lengkap. Pada langkah ini bidan mengumpulkan seluruh informasi yang terkait dengan kondisi klien, suami, keluarga serta dari catatan/dokumentasi klien untuk mendapatkan data subjektif. Selanjutnya data objektif di dapatkan dari melakuka observasi dan pemeriksaan terhadap klien (Yulifa & Surachmindary, 2013: 128).

Data subjektif adalah mengumpulkan semua data yang di butuhkan untuk keadaan pasien dan mengumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien. Dari hasil baca dari referensi yang sudah di kumpulkan didapatkan tanda dan gejala benjolan payudara yang dialami oleh ibu yaitu pasien merasakan adanya benjolan pada payudara, benjolan tersebut nyeri saat di tekan dan dapat di gerakkan serta benjolan tersebut berlobus-lobus (Tony Hollingworth, 2012: 262).

Data objektif adalah data yang sesungguhnya dapat di observasi dan di lihat oleh tenaga kesehatan. Dari berbagai macam sumber yang ada, untuk mendapat data objektif pada pasien dengan benjolan payudara dapat dilihat dari hasil pemeriksaan generalis, keadaan umum baik, kesadaran composmentis dan di lakukan pemeriksaan penunjang pada kasus benjolan payudara. Pemeriksaan yang dilakukan yakni pemeriksaan USG, mammografi, scan CT dan MRI serta pemeriksaan biopsy (Razfan, dkk, 2020: 1).

2) Langkah Ke II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah ini, bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah

berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasi sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik.

Diagnosis kebidanan adalah diagnosis yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnosis kebidanan (Atik Purwandari, 2008).

Dari referensi yang dikumpulkan benjolan payudara ini berawal dari penemuan massa yang tidak sakit ketika di raba saat mandi, benjolan ini biasanya tumbuh dengan lambat, fibroadenoma dapat multiple. Diameter benjolan yang kebanyakan di temukan yakni 2-3 cm, tapi fibroadenoma ini dapat tumbuh dengan ukuran yang lebih besar jika di biarkan (*Giant Fibroadenoma*) (Suyatno, 2015:21)

Pada referensi yang ada, tahap pemeriksaan benjolan fibroadenoma teraba kenyal dan halus. Benjolan tersebut tidak menimbulkan efek samping seperti merah, nyeri ataupun panas. Fibroadenoma juga dapat di gerakkan dan tidak menyebabkan pengkerutan kulit payudara ataupun retraksi puting, benjolan tersebut berlobus-lobus. Pada pemeriksaan mamografi menghasilkan gambaran yang jelas yang merupakan benjolan tersebut adalah benjolan yang jinak dan rata serta memiliki batasan yang jelas (Naviri, 2016: 87).

Wanita dengan fibroadenoma simpel tanpa penampakan histologi komplek dan tanpa penyakit proliferaatif pada prenkim payudara tidak memiliki peningkatan resiko kanker payudara. Ada pun ciri-cirinya berdasarkan referensi yang di dapatkan yakni seperti massa yang padat, licin, kuat dan elastis dengan bentuk yang jelas. Pada pemeriksaan USG terdapat massa yang padat dan kista pada pada jaringan payudara keras (Sari, 2012: 123).

3) Langkah III:Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada tahap ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial

berdasarkan beberapa rangkaian masalah dan diagnosa yang telah diidentifikasi. Pada langkah ini di butuhkan antisipasi, atau bila perlu dilakukan pencegahan serta memantau klien, pada tahap ini bidan sangat diharapkan siap sedia jika sewaktu-waktu diagnosa/masalah potensial ini benar terjadi.

Dari berbagai macam referensi terkait benjolan payudara diagnosa potensial yang dapat terjadi pada kasus benjolan payudara yaitu terjadi Ca Mammae. Ca Mammae adalah kejadian keterlambatan pemeriksaan dengan gejala penemuan benjolan (tumor) payudara yang ukurannya terus meningkat, dan semakin kecil tumor maka semakin kecil potensi Ca Mammae (Naviri, 2016: 87).

4) Langkah IV:Tindakan Segera/Kolaborasi

Pada tahap ini yakni langkah ke IV perlunya tindakan segera oleh bidan dan untuk di konsultasikan bersama anggota kesehatan yang lain yang sesuai dengan kondisi klien.

Pada kasus gangguan reproduksi dengan benjolan payudara yang tidak bersifat ganas maka tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan referensi yang ada yaitu mengajurkan atau mengarahkan ibu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada dokter untuk melihat perkembangan penyakitnya agar tidak terjadi komplikasi pada ibu (Smeltzer, dkk, 2002).

Jika benjolan payudara bersifat ganas maka tindakan yang dilakukan berdasarkan referensi yang dikumpulkan yaitu melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis bedah, bila tidak terjadi keganasan bisa di obati secara operasi atau obat-obatan, bila terjadi keganasan harus di lakukan pengangkatan payudara dengan cara operasi serta pemberian obat-obatan anti kanker (Smeltzer, dkk, 2002).

5) Langkah V:Rencana Asuhan Kebidanan

Pada tahap ini kita melakukan pencanaan asuhan atau tindakan secara menyeluruh pada langkah ini informasi/data dasar yang belum lengkap dapat di

lengkapi.

Dari referensi yang ada rencana tindakan yang di lakukan tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi atau masalah pasien tetapi juga antisipasi terhadap pasien tersebut, apakah kebutuhan pasien tersebut konseling, penyuluhan, pengangkatan tumor payudara, dan apakah pasien perlu di rujuk karena ada masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah kesehatan lainnya (Manuaba, 2012: 42).

Selain itu tindakan yang diberikan yaitu melakukan pemeriksaan fisik terutama pada bagian payudara untuk adanya benjolan pada payudara, memberikan dukungan psikologi pada ibu dan menjelaskan bahwa benjolan payudara yang tidak menyebabkan kanker umumnya tidak berbahaya karena jarang menyerang jaringan sekitarnya, tidak berkembang ke daerah tubuh lainnya, serta bisa di angkat dan tidak tumbuh kembali. Berbeda halnya dengan tumor yang dapat menyebabkan kanker yang dapat mengancam kehidupan, menyerang jaringan sekitar bahkan dapat menyebar ke tubuh lainnya dan sering kali bisa di angkat namun kadang-kadang tumbuh kembali (Tempali, 2019: 66).

Memberikan dukungan spiritual kepada pasien dan keluarga agar tetap berdoa dan berserah kepada Allah Swt agar proses pengobatan ibu berjalan dengan normal tanpa menimbulkan komplikasi apapun serta mengajurkan untuk mengonsumsi makanan yang tinggi kandungan zat besi seperti daging, hati, sayuran hijau (bayam, kangkung, brokoli), dan bahan makanan peningkat penyerapan zat besi, seperti protein (ayam, ikan, telur) dan vitamin C (jeruk, nanas, tomat, kiwi, dan

lain-lain) (Setyowati: 2017: 19).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al- Baqarah ayat 168 tentang makanan halal:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Kementrian Agama RI, 2011: 25)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai suatu kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sa’sa’ah, Khuza’ah dan Bani Mudli. Mereka mengharamkan menurut kemauan mereka sendiri, memakan beberapa jenis binatang seperti bahirah yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya, dan wasilah yaitu domba yang beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah tidak mengharamkan memakan jenis binatang itu, bahkan telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan memakannya (Shihab, 2012).

Selain itu menjaga pola nutrisi pemberian edukasi juga dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan gizi peserta. Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya dilakukan metode lain dalam edukasi gizi dengan media yang digunakan juga berbeda. Edukasi gizi juga perlu dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Selain itu, edukasi gizi juga perlu dilakukan kepada orang tua dan guru agar saling

bekerja sama dalam penurunan angka anemia pada remaja (Willy, A, dkk, 2017: 87).

Dapat dikatakan bahwa, asuhan terhadap wanita tersebut telah mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan seluruh aspek asuhan. Setiap perencanaan aspek asuhan harus di setujui oleh kedua belah pihak, yakni antara bidan dan klien, agar dapat dilaksanakan secara efektif.

6) Langkah VI:Implementasi Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini, berdasarkan sumber yang diperoleh maka rencana asuhan secara menyeluruh yang telah di buat pada langkah V dilaksanakan secara efisien dan aman. pada langkah ini bisa dilakukan sepenuhnya oleh bidan ataupun anggota tim medis lainnya, meski bidan tidak melakukannya sendirian, bidan masih tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Selain itu, edukasi gizi juga perlu dilakukan kepada orang tua dan guru agar saling bekerja sama dalam penurunan angka anemia pada remaja (Jannah, 2016: 73).

Dapat dikatakan bahwa, asuhan terhadap wanita tersebut telah mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan seluruh aspek asuhan. Setiap perencanaan aspek asuhan harus di setujui oleh kedua belah pihak, yakni antara bidan dan klien, agar dapat dilaksanakan secara efektif (Rahma, 2017: 23).

7) Langkah VII:Implementasi Asuhan Kebidanan

Pada tahap ini rencana asuhan yang menyeluruh yang telah di buat pada langkah V dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan sepenuhnya oleh bidan ataupun anggota tim medis lainnya, meski bidan tidak

melakukannya sendirian, bidan masih tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya.

Pada langkah ini berdasarkan referensi yang didapatkan maka asuhan menyeluruh di tentukan dengan langkah-langkah sebelumnya. Pada kasus benjolan payudara penatalaksanaan di lakukan sesuai dengan perencanaan yang telah di buat yaitu melakukan pengangkatan (biopsy eksisional) jika terjadi keganasan harus di lakukan pengangkatan payudara dengan cara operasi serta pemberian obat-obatan anti kanker namun bila tidak terjadi keganasan bisa di obati dengan cara non pembedahan seperti penyinaran dan terapi hormon serta endokrin (Rofiqoh, 2014: 54).

8) Langkah VIII: Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosis (Jannah, 2016: 88).

Pada prinsip tahapan berdasarkan sumber yang ada, tindakan evaluasi merupakan pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai ke efektifan tindakan yang diberikan, bidan dapat menyimpulkan jumlah kadar Hb dengan melakukan pemeriksaan laboratorium kembali (Pratiwi, 2013: 8).

Mengevaluasi perencanaan tindakan yang telah diberikan yaitu evaluasi pola makan wanita usia subur sesuai dengan kebutuhan gizi sehingga dapat mencegah dan mengatasi masalah dialami oleh wanita usia subur yaitu benjolan

payudara, evaluasi hasil pembedahan yang telah dilakukan, evaluasi pendidikan yang telah diberikan kepada wanita usia subur yang disertai dengan benjolan payudara dan evaluasi asuhan yang telah diberikan dengan menilai kepatuhan ibu untuk melakukan kunjungan atau pemeriksaan serta mengevaluasi kondisi payudara ibu setelah dilakukan pembedahan (Putri, 2014: 65).

Berdasarkan sumber tindakan evaluasi mengenai edukasi gizi dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan gizi peserta. Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya dilakukan metode lain dalam edukasi gizi dengan media yang digunakan juga berbeda. Edukasi gizi juga perlu dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Selain itu, edukasi gizi juga perlu dilakukan kepada orang tua dan guru agar saling bekerja sama dalam pencegahan benjolan payudara pada remaja (Qalbi, 2014: 11).

Pada prinsip tahapan evaluasi berdasarkan referensi adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai ke efektifan tindakan yang diberikan dan keberhasilan dapat dilihat dari kondisi pasien dalam keadaan yang normal dengan melakukan pemeriksaan kembali mulai dari pemeriksaan fisik, USG dan laboratorium. Apabila terjadi perubahan setelah diberikan tindakan dan keadaan membaik dan tidak ada masalah yang terjadi pada ibu maka dapat dipastikan penderita mengalami perubahan (Rahma, 2016: 43).

b. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Varney menyatakan bahwa alur berfikir bidan saat menghadapi klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain apa yang telah dilakukan oleh

seseorang bidan melalui proses berfikir sistematis, maka dilakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yaitu:

1. Subjektif (S)

Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa.

2. Objektif (O)

Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien (keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik), hasil laboratorium dan uji diagnosis lain yang merumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan.

3. *Assessment* (A)

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan juga data objektif dalam suatu identifikasi.

- a) Diagnosis masalah.
- b) Antisipasi diagnosis/masalah potensial.
- c) Tindakan segera.

4. *Planning* (P)

Pendokumentasian tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assessment*.

D. Tinjauan Umum Benjolan Payudara Pada Remaja Menurut Pandangan Agama Islam

Remaja adalah fase dimana pertumbuhan dan perkembangannya telah mengarah kepada kematangan seksual dengan memantapkan identitas dirinya sebagai individu yang terpisah dari keluarganya dan persiapan dalam menentukan masa depannya. Pada masa pertumbuhan pada remaja tidak semua perkembang

berjalan dengan normal namun ada pula kendala pada masa pertumbuhan seperti kasus remaja dengan benjolan payudara.

Kelainan yang dialami ibu bisa membuat tubuhnya semakin lemah, maka islam memberikan tuntunan bagi para ibu untuk senantiasa berdzikir dan berdoa kepada Allah meminta kesembuhan darinya Sesuai dengan HR Bukhari dan Muslim:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Artinya:

Ya Allah Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembukanlah ia. (Hanya) Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. (HR. Bukhari, no. 5742; Muslim, no. 2191).

Do'a di atas mengajarkan kepada kita untuk tawakkal dalam menghadapi penyakit, dengan menyadari bahwa Allah adalah Tuhan segala manusia, Allah adalah yang mampu menyembuhkan penyakit, maka kita meminta kesembuhan pada-Nya. Setelah itu kita pun menyatakan bahwa hanya diri-Nya saja yang dapat memberi kesembuhan, bukan yg lain, ini adalah tauhid. Dan kita minta pada-Nya supaya menyembuhkan si sakit dengan tanpa menyisakan bekas penyakit sedikit pun.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya diatas mengenai benjolan payudara pada remaja, ada beberapa metode yang digunakan untuk mengangkat benjolan payudara tersebut yaitu operasi, penyinaran kemoterapi dan terapi hormon. Sehingga sangatlah tepat jika dalam sebuah hadits Rosulullah menegaskan bahwa setiap suatu penyakit tidak diturunkan oleh Allah SWT kecuali Dia menurunkan

penyembuhannya.

Sebagaimana Rosulullah saw, yang beliau ucapkan kepada seseorang badui Arab yang bertanya kepada-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً, عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهَلَهُ مَنْ جَهَلَهُ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri menshahihkan hadits ini dalam Zawa'id-nya. Lihat takhrij Al-Arnauth atas Zadul Ma'ad, 4/1213)”

Sebagai kesimpulan, Al-Qur'an dan hadits sebagai gudang ilmu pengetahuan yang sangat komplit karena sebelum ilmu kedokteran berkembang dan mengungkapkan semua yang berkaitan dengan suatu penyakit, baik itu penyebab maupun pengobatannya Islam sudah lebih dahulu mengetahuinya dan mengajarkan kita untuk bagaimana mencegah dan mengobati penyakit tersebut.

Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran: 190

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَا خْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ

Artinya: *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal (Q.S Ali Imran: 190)*

Allah SWT menciptakan segala sesuatu tentu dengan beragam manfaat yang terkandung di dalamnya, sekalipun manusia tidak mengetahuinya. Di antara mukjizat Alquran adalah informasi yang diberikan terkait segala benda sudah pasti memiliki khasiat dan rahasia tersendiri.

Ayat diatas menerangkan bahwa dalam setiap peristiwa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Sedangkan manusia adalah ciptaan Allah yang berakal. Melalui segala sesuatu yang ditetapkan dan diciptakan oleh Allah, manusia dituntut menggunakan akal nya untuk berpikir terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut. Bagi orang yang berakal ia akan melihat betapa besar kekuasaan Allah SWT dan akan menggunakan akal nya untuk hal kebaikan dan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Salah satu tanda kebesaran Allah SWT adalah telah menciptakan segala sesuatu dengan manfaatnya masing-masing. Manusia hanya tinggal menggunakan akal nya untuk berpikir dan memanfaatkan serta menjaga apa yang telah Allah SWT ciptakan.

Berdasarkan ayat diatas, manusia diperintahkan untuk berpikir. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kekurangan dan kelebihan nya masing. Salah satunya adalah brokoli. brokoli merupakan sayuran yang bermanfaat bagi kesehatan, namun brokoli memiliki kelemahan yaitu umur simpan yang singkat sehingga brokoli harus dimanfaatkan dengan tepat. Salah satu perintah yang tersirat dalam ayat diatas adalah manusia yang diperintahkan berpikir. Maka dalam hal ini adalah tentang pengelolaan brokoli agar memiliki umur simpan lebih panjang dan terjaga kualitas brokoli..

Kebutuhan makanan yang dibutuhkan pada tubuh pada kondisi seperti ini berbeda-beda. Adapun jenis makanan yang dapat membantu proses penyembuhan pasien yang terdapat benjolan pada payudara yaitu brokoli. Adapun manfaat brokoli bagi kesehatan yaitu sebagai anti-oksidan dan membantu metabolisme dan mencegah inflamasi pada tingkat sel yang merupakan fase awal dari perkembangan

kanker.

Selain itu, antioksidan di dalam brokoli hijau juga berpengaruh dalam mengurangi peradangan. Efek ini dapat menjaga kesehatan sel tubuh dan mencegahnya berubah menjadi kanker dan mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sistem imunitas tubuh yang kuat dapat membantu tubuh melawan infeksi.

Beberapa penelitian bahwa terhadap 5.000 perempuan berusia 20 - 75 tahun yang didiagnosa menderita benjolan payudara menemukan, mereka yang sering mengasup sayuran golongan cruciferous seperti brokoli, kubis, atau sawi, risikonya untuk meninggal akibat benjolan payudara 62 persen lebih rendah. Manfaat lainnya, risiko kekambuhan penyakit juga 35 persen lebih rendah.

BAB III

TELUSURI EVIDANCE BASED LEARNING

A. Matriks Langkah I

Pada langkah ini bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua kondisi klien yang bersangkutan dengan kondisi klien . Di langkah ini akan menjelaskan terkait pengertian tumor payudara.

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Pengetahuan, Sikap, dan Motivasi Terhadap Pemeriksaan Payudara Sendiri Pada Mahasiswi FKM UNHAS.	Basri, A	2018	Benjolan Payudara	Benjolan atau Tumor adalah sekelompok jaringan abnormal, yang disebabkan oleh sel-sel tua dan rusak yang tidak mati seperti seharusnya.	Jurnal ini tidak menjelaskan secara detail tentang komplikasi yang akan timbul pada benjolan payudara.	Jurnal ini membantu untuk mendiagnosa benjolan pada payudara melalui tanda dan gejala yang telah dijelaskan dalam buku tersebut.	Meskipun kebanyakan benjolan dipayudara tidak bersifat kanker, tetapi semua benjolan payudara harus dianggap serius sampai hasil pemeriksaan dinyatakan benjolan tersebut bukan kanker.

2.	Analisis asuhan tumor Mammae dengan kecemasan di ruang teratai RSUD Dr. Soediman Kebumen	Erlin Retno Setyowati	2017	Analisis Asuhan Tumor Mammae	Tumor Mammae merupakan adanya ketidak seimbangan yang terjadi pada suatu selatau jaringan pada mammae yang tumbuh secara liar dan tidak dapat di kontrol.	Pada penelitian ini tidak menjelaskan secara detail terkait tumor mammae.	Kita bisa mendapatkan pengertian tentang Tumor Mammae serta kita juga dapat mengetahui terapi murottal dan dzikir untuk menghilangkan kecemasan yang diberikan oleh pasien pre operasi Tumor mammae.	Penelitian Sutrisno tahun 2006 dan di RSUD Swadana Pare Kediri dan Faradisi (2012) dipekalongan telah membuktikan bahwa adanya perubahan yang signifikan pada tingkat kecemasan pasien preoperasi yang di beri terapi murotal dan tidak.
----	--	-----------------------	------	------------------------------	---	---	--	--

3.	Gambaran Karakteristik Wanita dengan Kasus Kanker Payudaradi RSUD Karawang Februari 2012-Februari 2013	Marini Iskandar	2015	Benjolan payudara	Pada penelitian ini di dapatkan: Responden pada usia diatas 40 tahun lebih banyak mengalami kanker payudara sekitar (77,1%) dan responden dengan paritas lebih dari 2 anak (multipara) sebagian besar mengalami kanker payudara (75,7%) serta sebanyak (72,9%) responden dengan usia menarache diatas 12 tahun mengalami kanker payudara.	Tidak menjelaskan secara lengkap tentang benjolan payudara	Materi lebih mengarah ke kanker payudara.	Tidakdi dapatkan perbandingan tentang benjolan payudara
----	--	-----------------	------	-------------------	--	--	---	---

4.	Pengetahuan Fibroadenoma Mammae Pada Mahasiswi Fakultas Non Kesehatan Di Universitas Hasanuddin.	Puspita Ningrum	2016	Benjolan payudara	Benjolan payudara merupakan neoplasma jinak yang di sering di temukan pada perempuan diusia muda, teraba sebagai benjolan bulat atau berbenjol-benjol dan konsistensi kenyal.	Jurnal ini tidak menjelaskan secara detail tentang benjolan payudara	Materi yang di sajikan cukup lengkap.	Pada saat ukuran benjolan payudara terlalu besar biasanya ditemukan focuslobulus konglomerasi yang bersifat tumor filodes biasa dan mengandung fokus ganas unsur stroma dan unsur epithelial.
5.	Fibroadenoma in Axillary Tail of Breast	Vinod Kumar, dkk	2020	Benjolan	Benjolan payudara merupakan kelainan perkembangan normal dari satu lobulus di payudara, biasanya di temukan pada kelompok usia 15-25 tahun dan kadang-kadang dapat di temukan pada wanita yang usianya lebih tua.	Penelitian ini Hanya menggunakan 1 sampel.	Kita dapat mengetahui pengertian benjolan payudara	Benjolan ini tidak melekat pada kulit, jaringan di sekitarnya atau struktur dibawahnya mobile dan tergelincir di bawah jari pemeriksaan.

6.	Akses Informasi dan Dukungan Keluarga pada Kasus Fibroadenoma Mammae Kecamatan Tuminting	Rorimpandey, dkk	2016	Klasifikasi benjolan payudara	Fibroadenoma <i>Intracanalicular</i> (unsur stroma tubuh mendesak kanalikulus yang terbentuk). Fibroadenoma <i>pericanalikular</i> (stroma proliferative tetap mengintari system kanalikulus yang terbentuk).	Penelitian ini tidak menjelaskan secara detail tentang benjolan payudara	Materi yang disajikan cukup lengkap.	Pada saat ukuran benjolan payudara terlalu besar biasanya ditemukan focus lobulus konglomerasi yang bersifat tumor filodes biasa dan mengandung fokus ganas unsur stroma dan unsur epithelial.
----	--	------------------	------	-------------------------------	--	--	--------------------------------------	--

Selain pengertian tumor payudara terdapat juga tanda dan gejala serta etiologi yang dapat menyebabkan tumor payudara yaitu sebagai berikut :

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Gambaran Karakteristik Wanita dengan Kasus Kanker Payudara di RSUD Karawang Februari 2012- Februari 2013	Marini Iskandar	2015	Karakteristik wanita dengan kasus kanker payudara.	Usia di atas 40 tahun lebih beresiko terkena kanker payudara. Wanita dengan paritas lebih dari 2 anak. Usia menarache di atas 12 tahun.	Tidak menjelaskan secara lengkap tentang benjolan payudara	Materi lebih mengarah ke kanker payudara.	Tidak didapatkan perbandingan tentang benjolan payudara

2.	Asuhan Keperawatan Post Operasi	Jitowiyono dan Kristiyanasari	2012	Penyebab Terjadinya benjolan payudara	Peningkatan Homon estrogen yang absolute atau relative. Genetik dari epidemiologi tampak bahwa kemungkinan besar dua smpai tiga kali lebih besarwanita beresiko terkena tumor payudara pada wanita yang ibu atau saudara kandungnya memiliki riwayat tumor payudara.	Tidak didapatkan kelemahan pada referensi terkait.	Mampu mengetahui penyebab terjadinya benjolan payudara	Benjolan payudara lebih sering terjadi pada perempuan yang telah menikah dengan alasan yang mungkin karena penikahan usia dini serta paritas.
3.	Hubungan Antara Pemakaian KB Hormonal dengan Kejadian Kanker Payudara di Poli onkologi Satu Atap RSUD dr. Soetomo, Februari-April 2015	Ditya Ayu Intan Setiowati, Eddy Herman Tanngo, Roostantia Indrawati Soebijanto	2016	Cara Estrogen dan Progesteron menyebabkan Kanker Payudara	Resiko mutasi sel saat membela meningkat karena poliferasi sel oleh peningkatan Estrogen dan Progesteron juga meningkat. Estrogen dan Progesteron merangsang pertumbuhan sel-sel Punca Kanker Payudara	Penelitian ini tidak membahas lebih spesifik tentang benjolan payudara	Penelitian ini membuktikan bahwa adanya hubungan antara peningkatan resiko tumor dan atau kanker payudara dengan pemakaian KB hormonal.	Faktor resiko terjadinya kanker payudara yaitu usia yang semakin tua, obesitas, diet tinggi lemak, riwayat keluarga, hamil pertama di usia tua dan hormon.

4.	Diagnosis dan Penatalaksanaan Fibroadenoma Mammae	NiPutu Yudiartini Putri, Johannes Hudyono	2014	Patofisiologi benjolan payudara	Penyebab pasti terjadinya benjolan payudara belum di ketahui.	belum diketahui secara pasti penyebab benjolan payudara	Meskipun penyebab benjolan payudara ini belum diketahui tetapi pada referensi ini menjelaskan sedikit tentang faktor yang berkaitan dengan penyakit ini antara lain peningkatan mutlak aktivitas estrogen yang di perkirakan berperan dalam proses pembentukannya.	Namun terdapat beberapa faktor yang di kaitkan dengan penyakit ini, antara lain peningkatan mutlak aktivitas estrogen yang di perkirakan berperan dalam pembentukannya.
----	---	---	------	---------------------------------	---	---	--	---

5.	Gambaran Klinis dan Karakteristik Penderita Fibroadenoma Mammar (FAM) yang di rawat inap di RSUD Palembang Bari Periode 1 Januari 2012smpai 31Desember 2013	Marhama Oktaria	2013	Etiologi FAM	Etiologi dari FAM belum diketahui dengan pasti tetapi dikatakan bahwa hipersensitivitas terhadap estrogen pada lobul dianggap menjadi penyebabnya.	Pada penelitian ini tidak didapatkan faktor- faktor penyebab terjadinya benjolan payudara	Penelitian ini menggunakan 104 sampel	Benjolan payudara terjadi akibat poliferasi abnormal jaringan periduktus ke Dalam lobulus, oleh karena itu sering ditemukan pada kuadran lateral atas karena di bagian ini distribusi kelenjar paling banyak.
----	---	-----------------	------	--------------	--	---	---------------------------------------	---

6.	Chances of Breast Cancer with Fibroadenoma	Rihanna Begum P, Rejitha Thomus, Niranjan Babu	2017	Etiologi benjolan payudara	Penyebab pasti dari pertumbuhan benjolan payudara belum di ketahui, namun beberapa study menunjukkan bahwa estrogen mempengaruhi pertumbuhan benjolan payudara	Penelitian ini tidak menjelaskan secara detail terkait benjolan payudara	Peneitian ini dapat membantu mengetahui penyebab terjadinya benjolan payudara	Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Marhama Oktaria(2013).
----	--	--	------	----------------------------	--	--	---	---

7.	Hubungan Riwayat Reproduksi dengan Tumor Payudara pada Perempuan Usia Muda di Indonesia	Rizqy Fauzia Ahsani, Putri Bungsu Machmud	2019	Hubungan riwayat reproduksi dengan tumor payudara	Pengaruh usia menarche berhubungan lama paparan hormon terhadap tubuh. Perempuan yang tidak/belum menikah lebih beresiko karena berpengaruh pada kejadian kehamilan dan menyusui yang berpengaruh pada pengaturan hormonal, riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal 5 tahun lebih.	Penelitian ini menggunakan pendekatan observasional analitik dengan metode kuantitatif menggunakan desain studi <i>cross Sectional</i> .	Pada penelitian ini dilakukan dengan sampel perempuan usia muda di bawah 40 tahun.	Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Marhama Oktaria(2013).
----	---	---	------	---	--	--	--	---

8.	Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Tumor Payudaradi RSUD DR.Zainoel Abidin Banda Aceh	Mauliza Nasyari, Husnah, Fajriah	2020	Faktor resiko terjadinya tumor payudara	Usia, mutasi genetik, faktor reproduksi, dan faktor hormonal.	Tidak menjelaskan secara detail tentang faktor resiko terjadinya tumor payudara.	Mengetahui faktor-faktor resiko terjadinya tumor payudara.	Faktor resiko kejadian tumor payudara yang dapat diubah yaitu gaya hidup, aktivitas fisik serta obesitas.
----	--	----------------------------------	------	---	---	--	--	---

9.	Buku Ajaran Obstetri Untuk Mahasiswa Kebidanan	Taufan Nugroho	2011	Tanda dan Gejala benjolan payudara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benjolan payudara dapat multiple 2. Benjolan berdiameter 2-3 cm 3. Benjolan tidak menimbulkan reaksi radang, mobile dan tidak menyebabkan pengerutan pada kulit. 4. Benjolan berlobus-lobus 5. Pada pemeriksaan Mammografi, gambaran jelas jinak berupa rata dan memiliki batas jelas. 	Buku ini tidak menjelaskan secara lengkap teori tentang benjolan payudara	Dapat mengetahui tanda dan gejala benjolan payudara	Tidak ada perbandingan yang di dapatkan.
----	---	----------------	------	---------------------------------------	---	---	---	--

10.	Gambaran Kejadian Tumor Payudaradi RSUD Serang Tahun 2013	Helviah Septarini	2014	Salah satu penyebab benjolan payudara	Salah satu akibat dari aktivitas hormon estrogen pada masa reproduksi remaja putri adalah dapat menimbulkan terjadinya benjolan payudara yaitu tumor payudara jinak. Tumor jinak ini sering di temukan pada usia reproduksi, disebabkan oleh beberapa kemungkinan yaitu akibat sensitivitas jaringan setempat yang berlebihan terhadap estrogen.	Penelitian ini menggunakan teknik observasional deskriptif.	Penelitian ini menggunakan 1 sampel dengan usia pasien 18 tahun.	Tumor jinak ini sering ditemukan pada usia reproduksi, di sebabkan oleh beberapa kemungkinan yaitu akibat sensitivitas jaringan setempat yang berlebihan terhadap estrogen.
-----	---	-------------------	------	---------------------------------------	--	---	--	---

11.	Faktor-faktor yang menyebabkan Kejadian Fibroadenoma Mammae (FAM) pada Pasien Wanita yang Berkunjung di Poliklinik Spesialis Bedah Umum RSUD Bengkalis	Alini, Lise Widya	2018	Faktor penyebab benjolan payudara	Riwayat tidak menyusui anak, riwayat keluarga dan penggunaan kontrasepsi hormonal.	Tidak menjelaskan secara lengkap bagaimana riwayat tidak menyusui anak, riwayat keluarga yang menderita tumor payudara dan penggunaan kontrasepsi Hormonal memicu pertumbuhan benjolan payudara	Dapat mengetahui beberapa faktor penyebab benjolan payudara	Tidak semua benjolan pada payudara bersifat ganas dan juga tidak semua benjolan harus mendapatkan tindakan pembedahan.
-----	--	-------------------	------	-----------------------------------	--	---	---	--

B. Matriks Langkah 2 Identifikasi Masalah Aktual

Pada langkah ke 2 ini bidan melakukan idenifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data- data yang telah di kumpulkan.

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Breast Fibroadenoma	Maleeha Ajmal, Kelly Van Fossen	2020	Ciri-ciri benjolan payudara	Tidak lembut atau tidak nyeri, seluler, tersendiri benjolan padat yang dan padat tumbuh cepat.	Penelitian ini hanya menggunakan sampel.	Penelitian ini mampu menjelaskan terkait tumor payudara.	Benjolan payudara yaitu benjolan padat, tidak berisi cairan dan sering terjadi pada wanita berusia 4 hingga 35 tahun.

2.	Diagnosis and Manajemen of Fibroadenomas in the Adolescent Breast	Feelecia cerrato, Brian I. Labow	2013	Tanda dan gejala benjolan payudara	Fibroadenoma ada dengan massa yang tegas, tidak nyeri tekan, dengan batassampel jelas biasanya berukuran 2 sampai 3 cm, meskipun dapa berkisar lebih kecil dari 1 cm hingga 10, tidak ada perubahan pada putting dan kulit payudara.	Penelitian ini tidak menggunakan sampel	Mampu menjelaskan secara detail terkait benjolan payudara	Perlu dilakukan pemeriksaan terkait payudara sebelumnya, riwayat keganasan atau radiasi mantel dan gejala konstitusional.
3.	Diagnosis dan Penatalaksanaan Fibroadenoma Mammae	Ni Putu Yudiartini Putri, dkk	2014	Tanda dan gejala benjolan payudara	Tanda dan gejala benjolan payudara yakni benjolan yang permukaannya licin dan merah, tidak nyeri namun terkadang jika ditekan terasa nyeri, secara morfologi fibroadenoma ditemukan sebagai nodu diskret, biasanya soliter, dapat digerakkan secara bebas dan berukuran 1-10 cm.	Penelitian ini hanya membahas tentang teori benjolan payudara.	Kitadapat mengetahui tanda dan gejala benjolan payudara	benjolan payudara dapat membesar pada akhir siklus menstruasi dan selama kehamilan.

4.	Peran Pembedahan Tumor jinak Payudara	Suyatno	2015	Ciri-ciri benjolan payudara	Ultrasonografi payudara rutin dilakukan, Mammografi dilakukan jika usia lebih dari 35 tahun, FNAB/Biopsy Core (tidak rutin/atas indikasi).	Materi yang disajikan kurang lengkap.	Penelitian ini menjelaskan secara detail terkait benjolan payudara.	Benjolan payudara tidak meningkatkan risiko keganasan tapi perubahan genetik terlihat pada tumor dengan ukuran yang besar dan tumor phyllodes.
5.	Nonsurgical Management of Fibroadenoma and Virginal Breast Hyperthrophy	Sandhya Pruhi and Katie N. Jones	2013	Ciri-ciri benjolan payudara	Biasanya muncul sebagai massa yang berbatas tegas, kenyal, dan kokoh. Fibroadenoma mayoritas tumbuh secara perlahan dan bisa berukuran 2-3 cm saa di deteksi oleh remaja, kemudian ukurannya akan statis atau hilang secara spontan.	Penelitian ini tidak menggunakan sampel dan Populasi.	Penelitian ini menjelaskan secara singkat terkait benjolan payudara.	Untuk menentukan pertumbuhan massa memerlukan evaluasi seperti pemeriksaan USG pada payudara.

6.	Ductal Carcinoma in Situ (DCIS) in Breast Fibroadenoma	Manar EIEssawy, dkk	2020	Ciri-ciri benjolan payudara dalam pemeriksaan MRI	benjolan payudara tampak sebagai massa, berbentuk oval atau bulat dengan tepi halus.	Penelitian ini tidak menggunakan sampel dan Populasi.	Penelitian ini Banyak yang membahas teori terkait benjolan payudara	Benjolan payudara yaitu neoplasma payudara jinak yang paling umum pada wanita muda.
----	--	---------------------	------	---	--	---	---	---

7.	Asuhan Kebidanan pada Remaja Nn. H Usia 20 tahun dengan Fibroadenoma Mammae di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan	Stella Stevanie Angelina Ginting	2018	Tanda dan gejala fibrodenoma mammae	Benjolan payudara dapat Multiple biasanya terjadi pada wanita muda, kebanyakan berdiameter 10-15 cm, namun benjolan payudara dapat tumbuh dengan ukuran yang lebih besar (Giant Fibroadenoma), pada pemeriksaan fibroadenoma tampak kenyal dan halus, tidak menimbulkan reaksi radang (merah, nyeri, panas), mobile, tidak menyebabkan pengkerutan pada kulit payudara, maupun retraksi puting, tampak ada batas tegas ada penekanan pada jaringan sekitar, ada yang menonjol kepermukaan, pertumbuhannya lambat, bila segera ditangani tidak menyebabkan kematian.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.	Penelitian ini mampu menjelaskan asuhan kebidanan pada remaja yang mengalami benjolan payudara	Pada benjolan payudara tersebut terasa lembut, kenyal dan tidak akan ada rasa nyeri. Jika ditekan benjolan akan berpindah dengan mudah.
----	--	----------------------------------	------	-------------------------------------	---	---	--	---

8.	Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Kelas XI Tentang Fibroadenoma Mammae di SMA Masehi Kudus	Linda Puspita Jati, dkk	2016	Ciri-ciri benjolan payudara	Tumor ini dapat berbentuk siliter atau multiple, mudah digerakkan, tampak licin ukurannya berubah-ubah sesuai siklus haid.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.	Penelitian ini menggunakan 35 sampel yakni siswi SMA Masehi Kudus.	Tumor ini termasuk tumor jinak, berbatas jelas dan berbentuk benjolan yang dapat digerakkan.
9.	Rivew on Fibroadenoma	Sanjay Kumar Verma, dkk	2019	Ciri-ciri Benjolan payudara	Tidak lunak atau tidak nyeri, mobile, Soliter, berupa benjolan padat yang tumbuh cepat dengan konsisten Kenyal dan batas teratur.	Penelitian ini tidak menggunakan populasi.	Dengan Penelitian ini membuat kita mengetahui ciri-ciri benjolan payudara	Benjolan payudara lebih sering menyerang pada remaja dikarenakan pada masa ini remaja mudah mengalami stress atau depresi.

10.	Pendidikan dan Perilaku Kesehatan Mengenai Fibroenoma Mammae	Notoatmodjo S	2018	Ciri-ciri Fibroenoma Mammae	Sering di jumpai pada masa usia muda, teraba sebagai benjolan bulat atau berbenjol, dengan permukaan licin, bebas digerakkan, konsisten kenyal dan padat, biasanya tidak nyeri tetapi kadang terasa nyeri, kadang ada yang tumbuh banyak dan berpotensi kambuh saat rangsangan estrogen meninggi.	Tidak menjelaskan secara lengkap tentang bagaimana rangsangan estrogen yang tinggi menimbulkan kekambuhan.	Kitadapat mengetahui ciri- ciri benjolan payudara	Pada benjolan payudara kadang menimbulkan nyeri namun pada umumnya tidak nyeri.
-----	--	---------------	------	-----------------------------	---	--	---	---

C. Matriks Langkah III Diagnosa Potensial

Pada langkah ke 3 penulis akan mengidentifikasi masalah potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi.

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Diagnosis dan Penatalaksanaan Fibroadenoma Mammae	NiPutu Yudiartini Putri, Johannes Hudyono	2014	Komplikasi benjolan payudara	Penderita benjolan payudara memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menderita kanker payudara pada waktu yang akan datang.	Penelitian ini hanya membahas tentang teori benjolan payudara.	Kita dapat mengetahui tanda dan gejala benjolan payudara mammae.	Benjolan payudara dapat membesar pada akhir siklus menstruasi dan selama kehamilan.
2.	Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Tumor Payudara di RSUD DR. Zaenoel Abidin Banda Aceh	Mauliza Nasyari, dkk	2020	Dampak tumor payudara jinak	kejadian tumor jinak tidak mengancam nyawa tetapi dapat meningkatkan resiko kanker payudara di kemudian hari.	Peneitianini menggunakan pendekatan cross sectional.	Peneitian ini menggunakan 90 responden.	Kejadian tumor jinak lebih sering, walaupun tumor jinak namun dapat beresiko menjadi kanker payudara di kemudian hari.

3.	Analisis Hubungan Pengetahuan tentang Deteksi Dini Kanker Payudara pada Remaja Putri melalui Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS)	Sri Restu Tempali	2019	Dampak benjolan payudara	Tumor payudara sudah banyak di temukan pada usia muda bahkan pada usia 14 tahun dimana tumor dapat berpotensi menjadi kanker bila tidak terdeteksi lebih awal, meskipun tumor payudara tidak semuanya ganas namun kejadian tumor payudara menunjukkan bahwa saat ini sudah ada tren gejala kanker payudara yang semakin tinggi di usia remaja.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif (observasional) dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	penelitian ini menggunakan 73 sampel.	Walaupun tidak semuanya ganas tetapi ini menunjukkan bahwa saat ini telah ada tren gejala kanker payudara yang semakin tinggi di usia remaja.
----	--	-------------------	------	--------------------------	--	--	---------------------------------------	---

4.	Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) dengan Perilaku SADARI pada Mahasiswi Non Kesehatan di Uiversitas Muhammadiyah	Rizki Hafidzah Baswedan, Ekorini Listiowati	2014	Dampak wanita terkena benjolan payudara	Wanita yang memiliki riwayat benjolan payudara memiliki peningkatan terserang kanker payudara 8,95 kali lebih tinggi.	Pada penelitian ini desain yang digunakan pada penelitian ini yakni deskriptif analitik dengan rancangan <i>Cross Sectional</i> .	Jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian ini yakni sebanyak 209 mahasiswa.	peningkatan resiko ini berhubungan dengan riwayat tumor jinak dimana pernah terjadi poliferasi berlebihan.
5.	Asuhan Kebidanan pada Remaja Nn. H Usia 20 tahun dengan Fibroadenoma Mammae di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan	Stella Stevanie Angelina Ginting	2018	benjolan payudara bukanlah kanker dan jarang berubah menjadi kanker	Resiko kanker payudara kemungkinan dapat meningkat jika penderita mengalami fibroadenoma kompleks, yakni fibroadenoma yang berisi kista abnormal atau jaringan berwarna keruh yang disebut klasifikasi.	Pada penelitian ini bahasa yang digunakan kurang mudah untuk di pahami.	Kita bisa mengetahui dampak benjolan payudara	Benjolan payudara bisa saja tidak di angkat, namun jika terjadi pembesaran terus menerus dokter akan menyarankan untuk biopsy atau tindakan insisi pengangkatan.

6.	Perbedaan Tingkat Pengetahuan Siswi SMA PGRI 2 Palembang Terhadap <i>Fibroadenoma Mammae</i> Sebelum dan Sesudah Pemberian Intervensi Perilaku SADARI	Assyifa Salsabila	2020	Dampak terjadinya benjolan payudara	Jika benjolan payudara dibiarkan tumbuh akan memiliki resiko tinggi terjadinya kanker payudara dan apabila fibroadenoma tidak di angkat secara sempurna akan terjadi kekambuhan.	Pada penelitian ini menggunakan bahasa yang kurang mudah untuk di pahami.	Penelitian ini menggunakan 86 sampel.	Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh American Cancer Society (revised 2016) didapatkan bahwa wanita yang pernah terdiagnosis Fibroadenoma Mammae beresiko 1,5-2 kali lipat terkena kanker payudara dibanding dengan wanita dengan payudara normal.
----	---	-------------------	------	-------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--

7.	Rivew on Fibroadenoma	Sanjay Kumar Verma, dkk	2019	Diagnosa potensial benjolan payudara	Benjolan payudara merupakan tumor payudara jinak yang tidak berbahaya bagi dirinya sendiri akan tetapi cenderung menjadi ganas. Resiko kanker payudara mungkin meningkat pada pasien dengan benjolan payudara kompleks.	Penelitian ini tidak menggunakan populasi.	Dapat mengetahui diagnosa potensial benjolan payudara serta indikasi pembedahan.	ada 2 proses pengangkatan benjolan payudara yakni: Lumpektomi atau Biopsi eksisi dan Cryoablasi.
8.	A Clinicopathologic Review of Fibroadenoma in Makurdi, North-Central Nigeria	Ngbea JA, dkk	2018	Dampak benjolan payudara	Meskipun benjolan payudara adalah tumor jinak, namun memiliki resiko 2,17 kali lebih tinggi untuk terkena kanker payudara.	Tidak menjelaskan secara lengkap mengapa benjolan payudara dapat meningkatkan resiko terkena kanker payudara.	Penelitian ini menggunakan 110 sampel.	Angka kejadian keganasan yang timbul akibat benjolan payudara jarang terjadi dan berkisa antara 0,002 - 0,125%.

9.	Faktor-faktor yang menyebabkan Kejadian Fibroadenoma Mammae (FAM) pada Pasien Wanita yang Berkunjung di Poliklinik Spesialis Bedah Umum RSUD Bengkulu	Alini, Lise Widya	2018	Resiko Fibroadeenoma mammae	Penderita FAM memiliki resiko 2 kali lebih tinggi untuk menderita kanker payudara pada masa yang akan datang.	Desain penelitian yang digunakan yakni deskriptif analitik dengan rancangan <i>Cross sectional</i> .	Penelitian ini menggunakan 36 sampel.	Tidak semua benjolan pada payudara bersifat ganas dan juga tidak semua benjolan juga harus mendapatkan tindakan pembedahan.
----	---	-------------------	------	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	---

10.	Gambaran Klinis dan Karakteristik Penderita Fibroadenoma Mammae (FAM) yang di rawat inap di RSUD Palembang Baru Periode 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2013	Marhama Oktaria	2013	Dampak terjadinya benjolan payudara	Benjolan payudara merupakan tumor jinak tetapi dalam beberapa kasus menggambarkan bahwa seseorang yang terdiagnosis FAM mengalami peningkatan resiko <i>carcinoma mammae</i> .	Pada penelitian ini tidak didapatkan faktor- faktor penyebab terjadinya benjolan payudara	Penelitian ini menggunakan 104 sampel.	Benjolan payudara mammae terjadi akibat poliferasi abnormal jaringan periduktus ke dalam lobulus, oleh karena itu sering ditemukan pada kuadran lateral atas karena di bagian ini distribusi kelenjar paling banyak.
-----	--	-----------------	------	-------------------------------------	--	---	--	--

D. Matriks Langkah IV

Pada langkah ini bidan maupun dokter melakukan identifikasi yang memungkinkan terdapat kondisi yang memerlukan kolaborasi dan tindakan segera dengan tim medis lainnya sesuai dengan kondisi klien.

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kekurangan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Asuhan Kebidanan pada Remaja Nn. H Usia 20 tahun dengan Fibroadenoma Mammae di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan	Stella Stevanie Angelina Ginting	2018	Tindakan segera	Benjolan payudara sebetulnya tidak perlu diangkat, akan tetapi jika terus membesar, dokter mungkin akan menyarankan biopsy atau tindakan insisi pengangkatan.	Penelitian ini tidak menjelaskan tentang indikasi biopsy benjolan payudara.	Kita dapat mengetahui antisipasi tindakan benjolan payudara.	Benjolan payudara bisa saja tidak diangkat, namun jika terjadi pembesaran terus menerus dokter akan menyarankan untuk biopsy atau tindakan insisi pengangkatan.

2.	Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi pada Ny. S Umur 31 Tahun dengan Fibroadenoma Mammae di RSUD Assalam Gemolong Sragen	Putri Awalina Purnata	2016	Tindakan kolaborasi pada Kasus benjolan payudara	Kolaborasi dengan dokter bedah, bila tidak terjadi keganasan bisa diobati secara operasi ataupun dengan obat-obatan, bila terjadi keganasan harus segera dilakukan pengangkatan benjolan payudara dan diberikan obat-obatan.	Tidak menjelaskan secara lengkap tentang obat-obatan yang diberikan pada pasien yang mengalami tumor jinak.	Kita dapat mengetahui tindakan antisipasi fibroadenoma mammae.	Penanganan tumor jinak berbeda dengan penanganan tumor ganas.
----	--	-----------------------	------	--	--	---	--	---

3.	Rivewon Fibroadenoma	Sanjay Kumar Verma, dkk	2019	Tindakan segera	Sebagian besar kasus benjolan payudara tidak memerlukan pengobatan, tumor tersebut akan menghilang seiring waktu, namun jika pertumbuhannya membesar serta menekan jaringan payudara lainnya, maka tindakan pengangkatan harus dilakukan. Dokter mungkin akan memutuskan untuk melakukan pengangkatan tumor jika ukurannya massif dan terus membesar. Indikasi intervensi bedah meliputi pertumbuhan cepat, ukuran lebih dari 2 cm.	Penelitian ini tidak menggunakan populasi.	Dapat mengetahui tindakan antisipasi benjolan payudara serta indikasi pembedahan.	Ada 2 proses pengangkatan benjolan payudara yakni: Lumpektomi atau Biopsi Eksisi dan Cryoablasi.
----	----------------------	-------------------------	------	-----------------	---	--	---	--

4.	Deteksi Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara	Sjamsuhidajat R, dkk	2019	Tindakan segera benjolan payudara	Benjolan payudara harus di eksisi karena jika tidak tumor jinak ini akan bertambah besar. jika tidak di tangani segera.	Pada penelitian ini tidak dijelaskan secara lengkap tentang fibroadenoma, seperti indikasi pengangkatan.	Mengetahui tindakan antisipasi benjolan payudara	Benjolan payudara biasanya tidak nyeri namun tidak menutup kemungkinan bisa saja nyeri.
5.	Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi pada Nn. M umur 18 Tahun dengan Fibroadenoma Mammae di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta	H.Septarini	2014	Tindakan segera benjolan payudara	Antisipasi yang akan dilakukan yakni melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis bedah, jika tidak terjadi keganasan bisa diobati dengan operasi atau pemberian obat-obatan, namun jika terjadi keganasan, harus dilakukan dengan pengangkatan payudara serta di berikan obat- obatan anti kanker.	Pada penelitian ini tidak di jelaskan secara lengkap jenis-jenis obat-obatan yang di gunakan untuk mengobati benjolan payudara.	Penelitian ini menggunakan 1 sampel berusia 18 tahun.	Tumor jinak ini sering ditemukan pada usia reproduksi, disebabkan oleh beberapa kemungkinan yaitu akibat sensitivitas jaringan setempat yang berlebihan terhadap estrogen.

6.	Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi <i>Fibroadenoma Mammae</i> Pada Ny .R Umur 24 Tahun dengan Post Lumpectomy di RSUD Karanganyar	Ratna Sari Nur Janah	2016	Tindakan kolaborasi Benjolan payudara	Kolaborasi dengan dokter bedah, jika tidak terjadi keganasan bisa di obati dengan operasi atau menggunakan obat- obatan, namun jika Terjadi keganasan dilakukan pengangkatan/operasi dan diberikan obat-obatan anti kanker yakni Alkilator, Antimetabolit, Golongan Antibiotik, Inhibitor Protein Mikotubuli, Inhibitor Tomoisomerae, Golongan Hormon dan golongan target molekuler.	Tidak menjelaskan secara lengkap tentang obat- obatan yang di gunakan untuk pengobatan tumor jinak.	Mengetahui Antisipasi untuk benjolan payudara.	Perlunya tindakan segera oleh bidan dan dokter untuk konsultasi atau ditangani bersama dengan tim kesehatan lainnya.
----	---	----------------------	------	---------------------------------------	--	---	--	--

7.	Faktor-faktor yang menyebabkan Kejadian Fibroadenoma Mammar (FAM) pada Pasien Wanita yang Berkunjung di Poliklinik Spesialis Bedah Umum RSUD Bengkalis	Alini, Lise Widya	2018	Tindakan kolaborasi Benjolan payudara	Dari 10 pasien wanita yang berkunjung dan berobat, dokter melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang seperti <i>Ultrasonografi</i> (USG) dan <i>Fine Needle Aspiration Cytology</i> (FNAC), setelah menjalani pemeriksaan tersebut selanjutnya pasien dianjurkan untuk tindakan operasi.	Pada penelitian ini tidak menjelaskan lebih lengkap tentang teknik USG dan FNAC.	Penelitian ini menggunakan 36 sampel.	Tidak semua benjolan pada payudara bersifat ganas dan juga tidak semua benjolan juga harus mendapatkan tindakan pembedahan.
----	--	-------------------	------	---------------------------------------	---	--	---------------------------------------	---

8.	Gambaran Klinis dan Karakteristik Penderita Fibroadenoma Mammariae (FAM) yang Dirawat Inap di RSUD Palembang Bari Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2013	Marmah Oktaria	2013	Tindakan Kolaborasi	Pada benjolan payudara dengan ukuran >5 cm operasi pengangkatan sangat dianjurkan walau lesi sepenuhnya jinak. Namun teknik minimal invasive seperti USG menjadi pilihan pengobatan yang sangat baik untuk wanita penderita benjolan payudara yang menghindari operasi.	Pada penelitian Ini tidak menjelaskan secara lengkap tentang bagaimana teknik penggunaan USG bisa menjadi pengobatan yang sangat baik bagi penderita benjolan payudara.	Penelitian ini disertai gambar bentuk benjolan payudara setelah di lakukan pengangkatan.	Beberapa dokter menyarankan untuk eksisi namun terapi Konservatif dapat menggantikan perawatan bedah dalam waktu dekat atas dasar, usia muda pasien, temuan gambar jinak, karakteristik klinis serta temuan jinak pada hasil FNA biopsi.
----	---	----------------	------	---------------------	---	---	--	--

9.	Asuhan Pada Wanita/Ibu dengan Gangguan Saluran Repeoduksi	Fiky Rofiqoh	2014	Tindakan kolaborasi Benjolan payudara	FAM adalah tumor jinak maka pengobatan yang dilakukan tidak perlu dengan pengangkatan mammae, yang perlu diperhatikan yakni bentuk dan ukurannya, namun jika ukuran dan lokasi tumor tersebut menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman pada pasien maka perlu dilakukan pengangkatan.	Pada penelitian ini tidak menjelaskan secara lengkap tindakan yang dilakukan pada penderita benjolan payudara	Kita dapat Mengetahui bahwa pengobatan benjolan payudara tidak selamanya dilakukan dengan pengangkatan tumor.	Pada pengangkatan tumor tersebut, biasanya dilakukan general <i>anaesthetic</i> , pada pengangkatan tumr ini tidak akan merubah bentuk payudara tetapi hanya meninggalkan bekas luka parut yang akan memudar secara perlahan.
----	---	--------------	------	---------------------------------------	--	---	---	---

10.	Giant Fibroadenoma of the Breast: A Rare Case in a Mature Women	Xiangyue, dkk	2019	Tindakan kolaborasi benjolan payudara	Fibroadenoma mammae dapat ditindak lanjuti dengan aman atau hanya dienukleasi atau tindakan pengangkatan tanpa memotong atau membedahnya.	Penelitian ini tidak menjelaskan secara lengkap tentang tindak lanjut penanganan benjolan payudara	Penelitian ini dilengkapi dengan gambar Giant benjolan payudara yang membuat kita lebih paham bentuk dan ukurannya.	Skin grafting atau operasi pelastik mungkin diperlukan untuk pasien yang menjalani mastektomi untuk benjolan payudara raksasa.
-----	---	---------------	------	---------------------------------------	---	--	---	--

E. Matriks Langkah V

Pada langkah ini perencanaan asuhan dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan masalah aktual dan masalah potensial yang telah diidentifikasi danantisipasi.

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kekurangan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi Pada Nn. M Umur 18 Tahun dengan Fibroadenoma mammae di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta	H.Septarini	2014	Rencana Asuhan yang di berikan pada pasien benjolan payudara	Memberikan <i>informed consent</i> untuk tindakan operasi pengangkatan benjolan payudara (Biopsy Eksisional), memberikan terapi yakni: Infuse RL 20 tpm/menit dan antibiotic, Berikan <i>ceftriaxon</i> 1 gram/ 12 jam untuk antibiotik, Metronidasol 500 mg / 8 jam untuk antiinfeksi, ketrolac 1 ampul/ 8 jam untuk antinyeri, injeksi <i>dexamethasone</i> 1 ampul untuk mengetahui alergi pada obat, mual dan peradangan.	Penelitian ini menggunakan teknik observasional deskriptif.	Penelitian ini menggunakan 1 sampel dengan usia pasien 18 tahun.	Tumor jinak ini sering ditemukan pada usia reproduksi, di sebabkan oleh beberapa kemungkinan yaitu akibat sensitivitas jaringan setempat yang berlebihan terhadap estrogen.

2.	Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi pada Ny. S Umur 31 Tahundengan Fibroadenoma Mammae di RSUD Assalam Gemolong Sragen.	Putri Awalin Purnata	2016	Perencanaan Asuhan benjolan payudara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi Keadaan Umum dan Tanda- Tanda Vital 2. Memberikan dukungan mental dan spiritual 3. mengajarkan klien teknik relaksasi jika merasa nyeri 4. Biopsi <ol style="list-style-type: none"> 1) Biopsi Insisional yakni mengambil sebagian jaringan pada payudara pasien untuk di periksa secara patologis 2) Biopsi Eksisional bila tumor jinak dilakukan tahap <i>kuratif</i> yakni terapi medis, namun jika tumor ganas dilakukan pengangkatan dengan cara pembedahan. 	Tidak menjelaskan secara lengkap tentang terapi medis yang dilakukan untuk tumor jinak.	Mengetahui perencanaan asuhan benjolan payudara.	Penanganan tumor jinak berbeda dengan penanganan tumor ganas.
----	--	----------------------	------	--------------------------------------	--	---	--	---

3.	Faktor-faktor yang menyebabkan Kejadian Fibroadenoma Mammar (FAM) pada Pasien Wanita yang Berkunjung di Poliklinik Spesialis Bedah Umum RSUD Bengkalis	Alini, Lise Widya	2018	Perencanaan pengangkatan benjolan payudara	Dari 10 pasien wanita yang berkunjung dan berobat, dokter melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang seperti <i>Ultrasonografi</i> (USG) dan <i>Fine Needle Aspiration Cytology</i> (FNAC), setelah menjalani pemeriksaan tersebut selanjutnya pasien dianjurkan untuk tindakan operasi.	Pada penelitian ini tidak menjelaskan lebih lengkap tentang teknik USG dan FNAC.	Penelitian ini menggunakan 36 sampel.	Tidak semua Benjolan pada payudara bersifat ganas dan juga tidak semua benjolan juga harus mendapatkan tindakan pembedahan.
----	--	-------------------	------	--	---	--	---------------------------------------	---

4.	Gambaran Klinis dan Karakteristik Penderita Fibroadenoma Mammariae (FAM) yang Dirawat Inap di RSUD Palembang Baru Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2013	Marmah Oktaria	2013	Perencanaan Tindakan benjolan payudara	Pada benjolan payudara dengan ukuran >5 cm operasi pengangkatan sangat dianjurkan walau lesi jinak. Namun teknik minimal invasive seperti USG menjadi pilihan pengobatan yang sangat baik untuk wanita penderita benjolan payudara yang menghindari operasi. Lesi juga dapat diobati dengan observasi dan ditindak lanjuti secara berkala.	Pada penelitian ini tidak menjelaskan secara lengkap tentang bagaimana teknik penggunaan USG bisa menjadi pengobatan yang sangat baik bagi penderita benjolan payudara.	Penelitian ini disertai gambar bentuk benjolan payudara setelah dilakukan pengangkatan.	Beberapa dokter menyarankan untuk eksisi namun terapi konservatif dapat menggantikan perawatan bedah dalam waktu dekat atas dasar, usia muda pasien, temuan gambar jinak, karakteristik klinis serta temuan jinak pada hasil FNA biopsi.
----	---	----------------	------	--	--	---	---	--

5.	Breast Fibroadenoma	Maleeha Ajmal	2020	Perencanaan tindakan benjolan payudara	Pada sebagian besar kasus benjolan payudara , FAM tidak memerlukan pengobatan, mereka akan menyusut dan menghilang seiring waktu, tetapi jika ukurannya besar serta menekan jaringan payudara yang lain maka itu harus dilakukan pengangkatan, ada 2 prosedur pengangkatan yakni lumpektomi atau biopsy eksisi dan cryoablasi.	Pada penelitian ini tidak menjelaskan secara lengkap tentang pengobatan benjolan payudara.	Mengetahui perencanaan tindakan benjolan payudara.	Banyak wanita memutuskan untuk tidak menjalani operasi karena tumor tidak berbahaya dan tidak melibatkan resiko keganasan jangka panjang serta pembedahan juga mengubah bentuk payudara.
----	------------------------	---------------	------	--	--	--	--	--

6.	Buku Ajaran Obstetri Untuk Mahasiswa Kebidanan	Taufan Nugroho	2011	Perencanaan benjolan payudara	Terapi benjolan payudara dapat dilakukan dengan melihat dari beberapa hal yakni ukuran, terdapat rasa nyeri atau tidak, usia pasien, hasil biopsi. Setelah itu terapi benjolan payudara dapat dilakukan dengan Operasi pengangkatan tumor tersebut, biasanya dilakukan general anaesthetic pada operasi.	Pada buku ini tidak menjelaskan secara lengkap terapi yang di berikan	Pada buku ini menjelaskan perencanaan benjolan payudara	benjolan payudara dapat di terapi namun dengan melihat beberapa aspek yakni tingkat nyeri, usia pasien dan hasil biopsy.
----	--	----------------	------	-------------------------------	--	---	---	--

7.	Peran Pembedahan Tumor jinak Payudara	Suyatno	2015	Perencanaan benjolan payudara	<p>1. Pembedahan: Eksisi dengan indikasi yakni wanita usia > 40 tahun dan lesi berukuran > 3 cm</p> <p>2. Terapi Hormonal Pemberian terapi hormonal pada pasien benjolan payudara dengan menggunakan tamoxifein, danazol dan gestogen</p> <p>3. Pembedahan Biopsy care dengan indikasi usia < 40 tahun dan ukuran lesi < 3 cm.</p>	<p>Penelitian ini tidak menjelaskan secara lengkap tentang hormon estrogen yang berperan penting dalam pertumbuhan lesi jinak.</p>	<p>Kita dapat mengetahui penatalaksanaan benjolan payudara.</p>	<p>Dari 62 pasien premenopause terdapat pengecilan lesi yang diberi tamixifen 20 mg selama 50 hari.</p>
----	---------------------------------------	---------	------	-------------------------------	--	--	---	---

8.	Rivewon Fibroadenoma	Sanjay Kumar Verma, dkk	2019	Perencanaan benjolan payudara	Indikasi intervensi bedah meliputi pertumbuhan cepat, ukuran lebih dari 2 cm, serta atas permintaan pasien. Ada 2 prosedur pembedahan yang di lakukan untuk pengangkatan benjolan payudara mammae yakni: 1.Lumpektomi/Biopsy eksisi 2.Cryoablasi	Penelitian ini tidak menggunakan populasi.	Dapat mengetahui indikasi penatalaksanaan benjolan payudara serta indikasi pembedahan.	Tumor tersebut akan menghilang seiring waktu, namun jika pertumbuhannya membesar serta menekan jaringan payudara lainnya, maka tindakan pengangkatan harus dilakukan.
----	-------------------------	-------------------------------	------	----------------------------------	--	--	--	---

9.	Treatment of Fibroadenoma by Ultrasound-Guided Vacuum Assisted Breast Biopsy at Ho Chi Minh City Oncology Hospital	Phoung Viet the Trai, dkk	2018	Perencanaan benjolan payudara	Dengan teknik VABB (Vacuum Assisted Breast Biopsy) yakni teknik yang menggunakan jarum yang besar (7G,8G,11G) serta dapat melakukan biopsy atau pengangkatan tumor jinak kecil < 3 cm.	Penelitian ini tidak menggunakan populasi.	Pada penelitian ini kita bisa mengetahui penatalaksanaan benjolan payudara di Vietnam.	Penelitiandi Negara Vietnam menggunakan teknik VABB untuk mengobati benjolan payudara.
----	--	---------------------------	------	-------------------------------	--	--	--	--

10.	Breast Fibroadenomas in Adolescents: Current Perspectives	Michelle Lee, Hootman T Soltanian	2015	Perencanaan benjolan payudara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik invasive minimal Biopsi Perkutan dengan bantuan vakum biopsi eksisi perkutan 2. Teknik prosedur Ablatif seperti Cryotheraphy 3. Eksisi Bedah 	Penggunaan Bahasa yang digunakan sulit di pahami.	Mengetahui tentang penatalaksanaan benjolan payudara.	Fibroadenoma kecil dengan diameter kurang dari 3 cm dapat diobati dengan metode invasive minimal sedangkan benjolan payudara yang lebih besar dapat di angkat secara endoskopi ataupun dengan operasi terbuka.
-----	---	-----------------------------------	------	-------------------------------	--	---	---	--

11.	Gambaran Karakteristik Kejadian Fibroadenoma Mammae di Rumah Sakit Islam Siti Khadija Palembang Tahun 2014	Eka puspita sari	2015	Perencanaan benjolan payudara	Dengan teknik Biopsy Eksisi.	Penelitian ini tidak menjelaskan secara lengkap indikasi Biopsy Eksisi misalnya ukuran tumor.	Kita mengetahui penatalaksanaan benjolan payudara	Teknik Biopsy Eksisi ini tidak akan merubah bentuk payudara namunakan meninggalkan jaringan parut yang akan digantikan oleh jaringan normal secara perlahan.
-----	--	------------------	------	-------------------------------	------------------------------	---	---	--

12.	Asuhan Kebidanan pada Remaja Nn. H Usia 20 tahun dengan Fibroadenoma Mammae di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan	Stella Stevanie Angelina Ginting	2018	Perencanaan benjolan payudara	<p>1. Modified Radical Mastectomy yakni pengangkatan seluruh payudara, jaringan payudara pada tulang dada, tulang selangka, tulang iga dan benjolan di sekitar ketiak.</p> <p>2. Radical Mastectomy, yakni operasi pengangkatan sebagian payudara, biasanya di sebut lumpectomy yaitu pengangkatan hanya pada jaringan yang mengandung kelenjar bukan keseluruhan payudara.</p> <p>3. Terapi penyinaran (Radio terapi) yakni penggunaan sinar X untuk membunuh atau memperkecil sel.</p>	<p>Penelitian ini tidak menjelaskan tentang indikasi penatalaksanaan fibroadenoma mammae.</p>	<p>Kita dapat mengetahui penatalaksanaan benjolan payudara .</p>	<p>Benjolan payudara bisa saja tidak di angkat, namun jika terjadi pembesaran terus menerus Dokter akan menyarankan untuk biopsy atau tindakan insisi pengangkatan.</p>
-----	--	----------------------------------	------	-------------------------------	--	---	--	---

15.	Analisis Asuhan Keperawatan Pre Operasi Lumpectomy pada Pasien Tumor Mammae dengan Kecemasan di Ruang Teratai RSUD Dr. Soediman Kebumen	Erlin Retno Setyowati	2017	Perencanaan tumor mammae	Untuk menangani kecemasan pada pasien Tumor mammae dilakukan terapi murottal dan dzikir.	Pada penelitian ini tidak menjelaskan secara detail terkait tumor mammae.	Kita bisa mendapatkan pengertian tentang Tumor Mammae serta kita juga dapat mengetahui terapi murottal dan dzikir untuk menghilangkan kecemasan yang di berikan oleh pasien preoperasi Tumor mammae.	Penelitian Sutrisno tahun 2006 dan di RSUD Swadana Pare Kediri dan Faradisi (2012) dipekalongan telah membuktikan bahwa adanya perubahan yang signifikan pada tingkat kecemasan pasien preoperasi yang di beri terapi murottal dan tidak.
-----	---	-----------------------	------	--------------------------	--	---	--	---

F. Matriks Langkah VI Penatalaksanaan

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kekurangan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi pada Ny. S Umur 31 Tahun dengan Fibroadenoma Mammae di RSUD Assalam Gemolong Sragen.	Putri Awal Purnata	2016	Penatalaksanaan Asuhan Benjolan payudara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi Keadaan Umum dan Tanda-Tanda Vital 2. Memberikan dukungan mental dan spiritual 3. mengajarkan klien teknik relaksasi jika merasa nyeri 4. Biopsi <ol style="list-style-type: none"> 1) Biopsi Insisional Yakni mengambil sebagian jaringan pada payudara pasien untuk diperiksa secara patologis 2) Biopsi Eksisional bila tumor jinak dilakukan tahap <i>kuratif</i> yakni terapi medis, namun jika tumor ganas dilakukan pengangkatan melalui pembedahan. 	Tidak menjelaskan secara lengkap tentang terapi medis yang dilakukan untuk tumor jinak.	Mengetahui perencanaan asuhan benjolan payudara	Penanganan tumor jinak berbeda dengan penanganan tumor ganas.

2.	Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi <i>Fibroadenoma Mammae</i> Pada Ny. R Umur 24 Tahun dengan Post Lumpectomy di RSUD Karanganyar	Ratna Sari Nur Janah	2016	Penatalaksanaan Asuhan benjolan payudara	<p>1. Bidan merumuskan rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana bersama klien serta keluarga klien, kemudian memberikan <i>Informed Consent</i>, sebelum melaksanakannya.</p> <p>2. lakukan Tindakan pembedahan atau <i>Lumpectomy</i> yakni pengangkatan hanya pada jaringan yang mengandung sel kanker.</p> <p>3. Pemberian terapi relaksasi pereda nyeri dengan teknik genggam jari (<i>Finger Hold</i>) yakni teknik relaksasi dengan jari tangan serta aliran energi dalam tubuh.</p>	Tidak menjelaskan secara detail tentang teknik terapi Genggam jari (<i>Finger hold</i>).	mengetahui perencanaan asuhan benjolan payudara	Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang telah teridentifikasi dari kondisi klien, namun juga di lihat dari pedoman antisipasi terhadap klien, apakah membutuhkan konseling, penyuluhan serta apakah pasien perlu di rujuk terkait masalah kesehatan yang lain.
----	---	----------------------	------	--	---	--	---	---

3.	Faktor-faktor yang menyebabkan Kejadian Fibroadenoma Mammar (FAM) pada Pasien Wanita yang Berkunjung di Poliklinik Spesialis Bedah Umum RSUD Bengkalis	Alini, Lise Widya	2018	Penatalaksanaan pengangkatan benjolan payudara	Dari 10 pasien wanita yang berkunjung dan berobat, dokter melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang seperti <i>Ultrasonografi</i> (USG) dan <i>Fine Needle Aspiration Cytology</i> (FNAC), setelah menjalani pemeriksaan tersebut selanjutnya pasien dianjurkan untuk tindakan operasi.	Pada penelitian ini tidak menjelaskan lebih lengkap tentang teknik USG dan FNAC.	Penelitian ini menggunakan 36 sampel.	Tidak semua Benjolan pada payudara bersifat ganas dan juga tidak semua benjolan juga harus mendapatkan tindakan pembedahan.
----	--	-------------------	------	--	---	--	---------------------------------------	---

4.	Gambaran Klinis dan Karakteristik Penderita Fibroadenoma Mammariae (FAM) yang Dirawat Inap di RSUD Palembang Baru Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2013	Marmah Oktaria	2013	Penatalaksanaan Tindakan benjolan payudara	Pada benjolan payudara dengan ukuran >5 cm operasi pengangkatan sangat dianjurkan walau lesi jinak. Namun Teknik minimal invasive seperti USG menjadi pilihan pengobatan yang sangat baik untuk wanita penderita benjolan payudara yang menghindari operasi. Lesi juga dapat diobati dengan observasi dan ditindak lanjuti secara berkala.	Pada penelitian ini tidak menjelaskan secara lengkap tentang bagaimana teknik penggunaan USG bisa menjadi pengobatan yang sangat baik bagi penderita benjolan payudara.	Penelitian ini disertai gambar bentuk benjolan payudara setelah dilakukan pengangkatan.	Beberapa dokter menyarankan untuk eksisi namun terapi Konservatif dapat menggantikan perawatan bedah dalam waktu dekat atas dasar, usia muda pasien, temuan gambar jinak, karakteristik klinis serta temuan jinak pada hasil FNA biopsi.
----	---	----------------	------	--	--	---	---	--

5.	Breast Fibroadenoma	Maleeha Ajmal	2020	Penatalaksanaan tindakan benjolan payudara	<p>Pada sebagian besar kasus benjolan payudara, FAM tidak memerlukan pengobatan, mereka akan menyusut dan menghilang seiring waktu, tetapi jika ukurannya besar serta menekan jaringan payudara yang lain maka itu harus dilakukan pengangkatan, ada 2 prosedur pengangkatan yakni lumpektomi atau biopsy eksisi dan Cryoablasi.</p>	<p>Pada penelitian ini tidak menjelaskan secara lengkap tentang pengobatan benjolan payudara.</p>	<p>Mengetahui perencanaan tindakan benjolan payudara.</p>	<p>Banyak wanita memutuskan untuk tidak menjalani operasi karena tumor tidak berbahaya dan tidak melibatkan resiko keganasan jangka panjang serta pembedahan juga mengubah bentuk payudara.</p>
----	---------------------	---------------	------	--	--	---	---	---

6.	Peran Pembedahan Tumor Jinak Payudara	Suyatno	2015	Penatalaksanaan benjolan payudara	<p>1. Pembedahan: Eksisi dengan indikasi yakni wanita usia >40 tahun dan lesi berukuran >3 cm</p> <p>2. Terapi Hormonal Pemberian terapi hormonal pada pasien fibroadenoma dengan menggunakan tamoxifein, danazol dan gestogen</p> <p>3. Pembedahan Biopsy care dengan indikasi usia < 40 tahun dan ukuran lesi < 3 cm.</p>	<p>Penelitian ini tidak menjelaskan secara lengkap tentang hormon estrogen yang berperan penting dalam pertumbuhan lesi jinak.</p>	<p>Kitadapat mengetahui penatalaksanaan benjolan payudara.</p>	<p>Dari 62 pasien premenopause terdapat pengecilan lesi yang diberi tamixifen 20 mg selama 50 hari.</p>
----	---------------------------------------	---------	------	-----------------------------------	---	--	--	---

7.	Rivew on Fibroadenoma	Sanjay Kumar Verma, dkk	2019	Penatalaksanaan benjolan payudara	Indikasi intervensi bedah meliputi pertumbuhan cepat, ukuran lebih dari 2 cm, serta atas permintaan pasien. Ada 2 prosedur pembedahan yang dilakukan untuk pengangkatan benjolan payudara yakni: 1. Lumpektomi/Biopsy eksisi 2. Cryoablasi.	Penelitian ini tidak dilengkapi gambar benjolan payudara untuk mempermudah pembaca.	Dapat mengetahui indikasi penatalaksanaan fibroadenoma serta indikasi pembedahan.	Tumor tersebut akan menghilang seiring waktu, namun jika pertumbuhannya membesar serta menekan jaringan payudara lainnya, maka tindakan pengangkatan harus dilakukan.
----	-----------------------	-------------------------	------	-----------------------------------	---	---	---	---

8.	A Clinicopathological Study to Determine age Specific Rate of Benign Breast Lumps	Noor Hassan Hussian, dkk	2019	Penatalaksanaan Tumor Jinak	<p>Dengan Teknik FNAC (Fine Needle Aspiration Cytology), keuntungan menggunakan teknik ini yakni memungkinkan kepastian awal dan penghindaran operasi yang tidak perlu pada pasien dengan penyakit payudara jinak ini sekaligus mendeteksi karsinoma payudara. Setelah di lakukan pemeriksaan FNAC kemudian di lakukan eksisi/pembedahan sederhana.</p>	<p>Pada penelitian ini tidak menjelaskan secara lengkap teknik FNAC (Fine Needle Aspiration Cytology).</p>	<p>Dalam penelitian ini kita dapat mengetahui perencanaan tindakan benjolan payudara.</p>	<p>Teknik FNAC untuk mendeteksi bentuk tumor sehingga menghindari operasi yang tidak perlu.</p>
----	---	--------------------------	------	-----------------------------	---	--	---	---

9.	Treatment of Fibroadenoma by Ultrasound-Guided Vacuum Assisted Breast Biopsy at Ho Chi Minh City Oncology Hospital	Phoung Viet the Trai, dkk	2018	Penatalaksanaan benjolan payudara	Dengan teknik VABB (Vacuum Assisted Breast Biopsy) yakni teknik yang menggunakan jarum yang besar (7G, 8G, 11G) serta dapat melakukan biopsy atau pengangkatan tumor jinak kecil < 3 cm.	Pada penelitian ini gambar proses VABB (Vacuum Assisted Breast Biopsy) yang disajikan kurang jelas.	pada penelitian ini kita bisa mengetahui penatalaksanaan fibroadenoma di Vietnam.	Peneliti di Negara Vietnam menggunakan teknik VABB untuk mengobati Fibroadenoma.
----	--	---------------------------	------	-----------------------------------	--	---	---	--

10.	Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi Pada Nn. M Umur 18 Tahun dengan Fibroadenoma mammae di RS PKU Muhammadiyah Yoyakarta	H. Septarini	2014	Penatalaksanaan benjolan payudara	Memberikan perawatan luka bekas jahitan yakni dengan membuka kasa yang menutupi luka kemudian memberikan terapi obat sesuai anjuran dokter yakni injeksi ceftriaxon 1 grm/ 12 jam, ketrolac 1 ampul/8 jam, metronidasol 500 m/jam, asam tranexamat 500 mg/8 jam.	Penelitian ini menggunakan teknik observasional deskriptif.	Penelitian ini menggunakan 1 sampel dengan usia pasien 18 tahun.	Tumor jinak ini sering ditemukan pada usia reproduksi, di sebabkan oleh beberapa kemungkinan yaitu akibat sensitivitas jaringan setempat yang berlebihan terhadap estrogen.
-----	---	--------------	------	-----------------------------------	--	---	--	---

11.	Breast Fibroadenomas in Adolescents: Current Perspectives	Michelle Lee, Hootman T Soltanian	2015	Penatalaksanaan benjolan payudara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik invasive minimal Biopsi Perkutandengan bantuan vakum biopsi eksisi perkutan 2. Teknik prosedur Ablatif seperti Cryotheraphy 3. Eksisi Bedah. 	Penelitian ini tidak menyajikan gambar fibroadenoma.	Mengetahui tentang penatalaksanaan benjolan payudara.	Fibroadenoma kecil dengan diameter kurang dari 3 cm dapat diobati dengan metode invasive minimal sedangkan fibroadenoma yang lebih besar dapat di angkat secara endoskopi ataupun dengan operasi terbuka.
-----	---	-----------------------------------	------	-----------------------------------	--	--	---	---

12.	Gambaran Karakteristik Kejadian Fibroadenoma Mammae di Rumah Sakit Islam Siti Khadija Palembang Tahun 2014	Eka puspita sari	2015	Penatalaksanaan benjolan payudara	Dengan teknik Biopsy Eksisi.	Penelitian ini tidak menjelaskan secara lengkap indikasi Biopsy Eksisi misalnya ukuran tumor.	Kita mengetahui penatalaksanaan benjolan payudara.	Teknik Biopsy Eksisi ini tidak akan merubah bentuk payudara namun akan meninggalkan jaringan parut yang akan digantikan oleh jaringan normal secara perlahan.
-----	--	------------------	------	-----------------------------------	------------------------------	---	--	---

13.	Asuhan Kebidanan pada Remaja Nn. H Usia 20 tahun Dengan Fibroadenoma Mammae di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan	Stella Stevanie Angelina Ginting	2018	Penatalaksanaan benjolan payudara	<p>1. Modifiled Radical Masectomy yakni pengangkatan seluruh payudara, jaringan payudara pada tulang dada, tulang selangka, tulang iga dan benjolan di sekitar ketiak.</p> <p>2. Radical Masectomy, yakni operasi pengangkatan sebagian payudara, biasanya di sebut lumpectomy yaitu pengangkatan hanya pada jaringan yang mengandung kelenjar bukan keseluruhan payudara.</p> <p>3. Terapi penyinaran (Radio terapi) yakni penggunaan sinar X untuk membunuh atau memperkecil sel.</p>	Penelitian ini tidak menjelaskan tentang indikasi penatalaksanaan benjolan payudara.	Kita dapat mengetahui penatalaksanaan benjolan payudara.	Fibroadenoma bisa saja tidak diangkat, namun jika terjadi pembesaran terus menerus dokter akan menyarankan untuk biopsy Atau tindakan Insisi pengangkatan.
-----	--	----------------------------------	------	-----------------------------------	---	--	--	--

14.	Management of Benign Breast Diseasesata Tertiary Care Hospital	E Chinnaiah dan Tejus V Nagireddy	2020	Penatalaksanaan Fibroadenoma	Teknik yang digunakan yakni FNAC (Fine Needle Aspiration Cytology)	Bahasa yang digunakan dalam penelitian ini kurang mudah untuk di pahami.	Pada penelitian ini menggunakan 50 sampel.	Meskipun jinak, namun benjolan payudara biasanya sulit di bedakan dengan Tumor Phyllodes.
15.	Analisis Asuhan Keperawatan Pre Operasi Lumpectomy pada Pasien Tumor Mammae dengan Kecemasan di Ruang Teratai RSUD Dr. Soediman Kebumen	Erlin Retno Setyowati	2017	Perencanaan tumor mammae	Pada penelitian ini untuk menangani kecemasan pada pasien tumor mammae dilakukan terapi murottal dan dzikir.	Pada penelitian ini tidak menjelaskan secara detail terkait tumor mammae.	Kita bisa mendapatkan pengertian tentang Tumor Mammae serta kita juga dapat mengetahui terapi murottal dan dzikir untuk menghilangkan kecemasan yang di berikan oleh pasien pre operasi Tumor mammae.	Penelitian Sutrisno tahun 2006 dan di RSUD Swadana Pare Kediri dan Faradisi (2012) di pekalongan telah membuktikan bahwa adanya perubahan yang signifikan pada tingkat kecemasan pasien preoperasi yang di beri terapi murottal dan tidak.

G. Matriks Langkah VII Evaluasi

No	Judul	Nama	Tahun	General Idea	Hasil	Kekurangan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Ruccurent Juvenile Fibroadenoma of the Breast in an Adolescent	Ching Huang, dkk	2018	Eksisi benjolan payudara	Pada penelitian ini seorang gadis 17 tahun sebelumnya telah melakukan eksisi fibroadenoma 3 bulan yang lalu kemudian mengalami keluhan adanya benjolan payudara pada sebelah kiri, setelah 2 tahun pengamatan massa tersebut menjadi lunak dan membesar, kemudian peneliti melakukan eksisi luas tumor, setelah 4 bulan masa tindak lanjut pasien dalam kondisi umum baik dan tidak mengalami kekambuhan.	Pada penelitian ini tidak menjelaskan tindakan eksisi luas tumor secara lengkap.	Kita dapat mengetahui bahwa setelah 4 bulan masa tindak lanjut melakukan eksisi luas tumor, pasien dalam kondisi baik dan tidak mengalami kekambuhan.	Pada eksisi fibroadenoma bulan kemudian pasien mengalami kekambuhan, kemudian setelah di lakukan eksisi luas tumor, 4 bulan masa tindak lanjut pasien tidak mengalami kekambuhan.

2.	Fibroadenoma in Axillary Tail of Breast	Vinod Kumar, dkk	2020	Eksisi Fibroadenoma	<p>Hasil eksisi Fibroadenoma dengan TIVA (Total Anastesi Intra-Vena) pada seorang pasien dengan benjolan aksila berukuran 3,5 x 3 cm di potong melalui sayatan longitudinal 3cm di atasnya, pemulihan pasca operasi berjalan lancar dan pasien di pulangkan setelah satu hari rawat inap observasi, Tidak ada bukti yang menunjukkan keganasan. Pasien di tindak lanjuti pada dua dan enam bulan dan tidak ada komplikasi atau kekambuhan.</p>	<p>pada penelitian ini tidak di jelaskan secara spesifik pemberian obat pasca eksisi.</p>	<p>Penyajian materi cukup lengkap.</p>	<p>Benjolan ini tidak melekat pada kulit, jaringan di sekitarnya atau struktur di bawahnya. Mobile dan tergelincir dibawah jari pemeriksaan.</p>
----	---	------------------	------	---------------------	--	---	--	--

3.	A Study of Management of Benign Breast Lesions: A Prospective Study	Krishnareddy YNavalli, dkk	2020	Eksisi fibroadenoma	Pada penelitian ini telah dilakukan operasi dalam bentuk Biopsy eksisi, kemudian setelah pasien pasca operasi diberikan antibiotic dan analgesik. Jahitan dilepas setelah 7 hari pasca operasi dan tidak ada kasus yang mengalami infeksi luka atau menganga. Kekambuhan lesi tidak ditemukan pada pasien yang datang untuk follow up hingga 6 bulan.	Penelitian ini tidak menyajikan contoh gambaran fibroadenoma.	Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa setelah dilakukan operasi biopsi eksisi, kekambuhan lesi tidak di temukan pada pasien yang datang untuk followup hingga 6 bulan.	kekambuhan fibroadenoma terkait dengan eksisi primer yang tidak adekuat atau perkembangan lesi baru dan waktu rata-rata perkembangan lesi baru yakni 4 tahun.
----	---	----------------------------	------	---------------------	---	---	--	---

4.	Treatment of Fibroadenoma by Ultrasound- Guided Vacuum Assisted Breast Biopsy at Ho Chi Minh City Oncology Hospital	Phoung Viet the Trai, dkk	2018	Teknik VABB	Pada teknik VABB ini didapatkan pasien tidak mengalami nyeri selama prosedur, setelah dan 1 minggu setelah di lakukan prosedur, kemudian setelah 10 hari dilakukan prosedur USG payudara menunjukkan jika tidak ada resi dua atau sisa fibroadenoma.	Penelitian ini tidak menggunakan populasi.	pada penelitian ini kita bisa mengetahui penatalaksanaan fibroadenoma di Vietnam.	Penelitian di Negara Vietnam menggunakan teknik VABB untuk mengobati Fibroadenoma.
5.	A Prepubertal Giant Juvenile Fibroadenoma in a 12-year-old girl: Case Report and Brief Literature Review	Aris Giannos, dkk	2017	Eksisi Bedah	Teknik eksisi bedah Memiliki tingkat komplikasi dan kekambuhan yang rendah.	Pada penelitian ini teknik eksisi bedah masih memiliki peluang kekambuhan.	Kitadapat mengetahui eksisi bedah memiliki tingkat komplikasi dan kekambuhan yang rendah.	Namun kekambuhan dapat terjadi sekitar 33% pada follow up 5 tahun setelah eksisi bedah.

6.	Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi Pada Nn. M Umur 18 Tahun dengan Fibroadenoma mammae di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta	H.Septarini	2014	Penatalaksanaan benjolan payudara	Pada penelitian ini pengangkatan benjolan payudara pada pasien usia 18 tahun dengan teknik Biopsi Eksisional tidak mengalami komplikasi setelah prosedur dilakukan.	Penelitian ini menggunakan teknik observasional deskriptif.	Penelitian ini menggunakan 1 sampel dengan usia pasien 18 tahun.	Tumor jinak ini sering di temukan pada usia reproduksi, di sebabkan oleh beberapa kemungkinan yaitu akibat sensitivitas jaringan setempat yang berlebihan terhadap estrogen.
----	--	-------------	------	-----------------------------------	---	---	--	--

7.	Asuhan Kebidanan pada Remaja Nn. H Usia 20 tahun dengan Fibroadenoma Mammae di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan	Stella Stevanie Angelina Ginting	2018	Penatalaksanaan benjolan payudara	Pada penelitian ini mengatakan penggunaan terapi penyinaran (Radio Terapi) setelah operasi mengurangi angka kekambuhan sebesar 5,75 %.	Penelitian ini tidak menjelaskan tentang indikasi penatalaksanaan benjolan payudara.	Kita dapat mengetahui hasil penatalaksanaan benjolan payudara.	Fibroadenoma bisa saja tidak di angkat, namun jika terjadi pembesaran terus menerus dokter akan menyarankan untuk biopsy atau tindakan insisi pengangkatan.
----	--	----------------------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	---

8.	A Pre-Pubertal Girl with Giant Juvenile Fibroadenoma: A Rare Case Report	Kumar Gaurav, dkk	2015	Pengangkatan benjolan payudara	Eksisi bedah dengan konservasi payudara menghasilkan kosmesis yang sangat baik, kemudian pasien mengikuti tindak lanjut rutin setelah 6 bulan operasi dan dalam keadaan baik-baik saja.	Dalam penelitian ini tidak menjelaskan tentang tindakan yang di lakukan saat menindak lanjuti pasien post operasi selama 6 bulan tersebut.	Penelitian ini dilengkapi gambar untuk mengetahui keadaan payudara sebelum dan setelah dilakukan operasi.	Beberapa lesi diobati dengan masektomi, tetapi beberapa lesi mungkin hanya memerlukan eksisi lokal, aspirasi, atau manajemen konservatif.
9.	Manajemen Luka	Moya J. Marison	2004	Infeksi Luka	Tampak tanda dan gejala infeksi seperti pireksia, nyeri setempat, dan eritema, edema lokal, eksudat yang berlebihan, pus, dan bau busuk, maka berarti luka terinfeksi secara klinik.	Penggunaan bahasa yang kurang mudah untuk dipahami.	Materi yang disajikan cukup lengkap.	Pada infeksi tahap awal mungkin tidak tampak tanda-tanda klinis tetapi organisme telah memicu memori imunologi.

10.	Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Reproduksi: Post Lumpektomi Fibroadenoma Mammae (FAM) Sinistra di Ruang Multazam RS PKU Muhammadiyah Surakarta	Yuyun Pratiwi	2013	Evaluasi operasi Lumpektomi	Setelah dilakukan tindakan pengukuran tanda-tanda vital dan memberikan injeksi ceftriaxone 1 g/IV, didapatkan hasil bahwa belum ada tanda-tanda infeksi, di sekitar luka teraba hangat, tidak ada rembesan darah maupun cairan luka, keadaan pembalut luka bersih. Suhu masih dalam batas normal. Intervensi dilanjutkan oleh keluarga di rumah, dan untuk perawatan luka akan dilakukan pada saat Pasien kontrol dipoliklinik.	Dalam penelitian ini penulis tidak menyajikan kunjungan ulang pasien setelah melakukan operasi lumpektomi.	Pada penelitian ini kita dapat mengetahui keadaan pasien benjolan payudara setelah melakukan operasi lumpektomi.	Meskipun tidak tampak tanda-tanda infeksi pada luka bekas lumpektomi namun pasien belum bisa menerima keadaan tubuhnya saat ini, dalam hal ini peran keluarga sangat dibutuhkan, maka untuk tindakan selanjutnya diharapkan keluarga mampu membangun semangat pasien.
-----	---	---------------	------	-----------------------------	---	--	--	---

11.	Analisis Asuhan Keperawatan Pre Operasi Lumpectomy pada Pasien Tumor Mammae dengan Kecemasan di Ruang Teratai RSUD Dr. Soediman Kebumen	Erlin Retno Setyowati	2017	Evaluasi terapi murottal	Sebelum dilakukan operasi dilakukan terapi murottal kepada pasien dan hasilnya kecemasan dapat teratasi.	Pada penelitian ini tidak menjelaskan secara detail terkait tumor mammae.	Kita bisa mendapatkan pengertian tentang Tumor Mammae serta kita juga dapat mengetahui terapi murottal dan dzikir untuk menghilangkan kecemasan yang diberikan oleh pasien preoperasi Tumor mammae	Penelitian Sutrisno tahun 2006 dan di RSUD Swadana Pare Kediri dan Faradisi (2012) dipekalongan telah membuktikan bahwa adanya perubahan yang signifikan pada tingkat kecemasan pasien preoperasi yang di beri terapi murottal dan tidak.
-----	---	-----------------------	------	--------------------------	--	---	--	---

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telaah Evidence Based Learning Asuhan 7 Langkah Varney Berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan pada remaja dengan benjolan payudara berdasarkan referensi yang telah di temukan. Dalam hal ini pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan asuhan kebidanan dengan 7 langkah varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potesial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan mengumpulkan semua referensi yang berkaitan dengan data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien, riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium (Mangkuji, 2012: 5).

Data yang diperoleh untuk kasus pada remaja dengan benjolan payudara dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi lengkap mengenai remaja dengan benjolan payudara. Masa remaja merupakan masa dimana pertumbuhan dan perkembangannya telah mengarah kepada kematangan seksual dengan memantapkan identitas dirinya sebagai individu yang terpisah dari keluarganya dan persiapan dalam menentukan

masa depannya (Nurul, 2018:11)

Karakteristik perkembangan yang normal terjadi pada remaja yaitu adanya perubahan fisik yang terjadi pada remaja putri saat terjadi menstruasi, adanya penambahan tinggi badan, pertumbuhan rambut di sekitar alat kelamin dan ketiak kulit menjadi lebih halus suara menjadi lebih halus dan tinggi, payudara mulai membesar, pinggul semakin membesar, paha membulat, mengalami menstruasi pertama (Menarche) (Desta, 2019: 104).

Benjolan atau tumor payudara adalah sekelompok jaringan abnormal, yang disebabkan oleh sel-sel tua dan rusak yang tidak mati seperti seharusnya, ada dua jenis tumor yang terdapat pada payudara, yakni tumor yang dapat menyebabkan kanker dan tumor yang tidak menyebabkan kanker (Naviri, 2016: 92).

Benjolan payudara adalah gambaran yang paling sering dijumpai pada kanker payudara. Meskipun kebanyakan benjolan di payudara tidak bersifat kanker, tetapi semua benjolan payudara harus dianggap serius sampai hasil pemeriksaan dinyatakan benjolan tersebut bukan kanker (Nurul, 2018: 109).

Adapun penyebab terjadinya benjolan payudara atau tumor payudara belum diketahui secara pasti, namun benjolan tersebut berkaitan dengan hormon reproduksi, Tumor payudara rentan terjadi selama masa reproduksi. Ukurannya akan meningkat selama kehamilan atau pun terapi estrogen dan cenderung mengecil setelah menopause karena stimulasi estrogen menurun (Sari, 2012: 123).

Sampai saat ini penyebab benjolan payudara belum diketahui. Namun, ada berbagai faktor resiko yang berhubungan dengan benjolan

payudara beberapa diantaranya adalah faktor hormon. Faktor hormon yang diduga memegang peranan dalam proses kejadian tumor ini adalah faktor hormon estrogen. Namun, bagaimana mekanisme kejadiannya belum jelas diketahui (Desta, 2019: 104).

Akan tetapi pemberian hormon estrogen dan progesteron pada pengguna alat kontrasepsi belum terbukti berpengaruh meningkatkan angka kejadian benjolan payudara, kecuali pemakaian pil kontrasepsi pada usia muda. Penelitian membuktikan bahwa wanita usia dini (remaja) yang memakai alat kontrasepsi oral (pil) sangat beresiko tinggi terserang benjolan atau pun kanker payudara (Nurul, 2018: 119).

Selain dari faktor hormon penyebab benjolan payudara yaitu faktor usia. Wanita berusia di atas 30 tahun, wanita yang mendapatkan haid pertama pada umur kurang dari 10 tahun, dan wanita yang mengalami menopause (mati haid) setelah usia 50 tahun, mempunyai kemungkinan lebih besar mendapatkan benjolan atau kanker payudara (Tim, N, 2016: 18).

Wanita yang tidak pernah melahirkan anak, wanita yang melahirkan anak pertama sesudah usia 35 tahun, wanita yang tidak pernah menyusui anak dan ada riwayat keluarga seperti beberapa riwayat keluarga yang dianjurkan untuk deteksi dini yaitu ibu atau saudara perempuan terkena benjolan atau kanker yang berhubungan dari ibu atau ayah, kanker ovarium, endometrium, kolorektal, prostat, tumor otak, leukemia, dan sarkoma. Wanita yang terlalu banyak mengonsumsi alkohol serta peningkatan berat badan yang signifikan pada usia dewasa (Desta, 2019: 104).

Konsumsi makanan berlemak dan berprotein tinggi tetapi rendah

serat yang terlalu banyak dan sering, karena mengandung zat karsinogen yang dapat merangsang terjadinya benjolan payudara serta wanita bekerja pada malam hari. Pusat penelitian kanker Fred Hutchison Cancer di Seattle Amerika Serikat, menyebutkan bahwa 22 wanita yang bekerja malam hari mempunyai peluang 60% terkena benjolan payudara bahkan kanker payudara. Cahaya lampu yang kusam pada malam hari dapat menekan produksi melatonin nocturnal pada otak sehingga hormon estrogen yang diproduksi oleh ovarium meningkat. Padahal diketahui melatonin dapat menekan pertumbuhan sel kanker payudara (Th. Endang Purwoastuti, 2008, hal 14-17).

2. Langkah II: Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan semua referensi yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosa atau masalah (Mangkuji, 2012: 5).

Benjolan atau tumor adalah sekelompok jaringan abnormal, yang disebabkan oleh sel-sel tua dan rusak yang tidak mati seperti seharusnya. Meskipun kebanyakan benjolan di payudara tidak bersifat kanker, tetapi semua benjolan payudara harus dianggap serius sampai hasil pemeriksaan dinyatakan benjolan tersebut bukan kanker (Tim, N, 2016: 18).

Tumor mammae merupakan adanya ketidakseimbangan yang terjadi pada suatu sel atau jaringan pada mammae yang tumbuh secara liar dan tidak dapat di kontrol. Salah satu penyebab terjadinya tumor jinak payudara yakni pertumbuhan jaringan payudara yang sangat sensitif terhadap hormon Estrogen (Erlin, R, 2017: 74).

Benjolan payudara di artikan sebagai setiap massa yang terdapat pada payudara. Benjolan payudara merupakan gambaran keadaan

payudara yang abnormal, mulai dari benjolan yang jinak sampai benjolan yang ganas (Grace, dkk. 2006: 17).

Benjolan payudara dapat menjadi masalah diagnostik sehari-harinya. Sebelumnya, biopsi eksisi merupakan pilihan dalam memastikan benjolan tersebut, Saat ini dengan berkembangnya radioimaging, maka kombinasi dengan biopsi aspirasi jarum halus (BAJH) memungkinkan untuk mengurangi eksisi bedah yang tidak perlu pada lesi jinak. Pemeriksaan BAJH dan radioimaging (mammografi, USG) melengkapi pemeriksaan fisik merupakan *Triple Diagnostic* untuk nodul payudara (Nosa, H, 2015: 1).

Pengambilan sampel yang umum digunakan untuk diagnosis lesi payudara dapat dilakukan preoperatif, intraoperatif dan postoperatif. Diagnosis patologi preoperatif dapat ditegakkan melalui pemeriksaan BAJH, *Core Needle Biopsy* (CNB) dan *Open Surgical Biopsy*. Diagnosis intraoperatif dilakukan melalui pemeriksaan potong beku (*frozen section*) sedangkan diagnosis postoperatif didapat melalui eksisi, lumpektomi ataupun mastektomi (Tim, N, 2016: 68).

Berdasarkan pengolahan sampel, maka pemeriksaan patologi untuk lesi payudara ini dibagi atas pemeriksaan berbasis sel (sitopatologi) pada sampel BAJH, imprint, dan sekresi payudara serta pemeriksaan berbasis jaringan (histopatologi) pada sampel CNB, open surgical biopsy, insisi, eksisi, lumpektomi dan mastektomi (Widyastuti, dkk, 2019: 92).

Benjolan payudara awalnya tidak ada keluhan sama sekali hanya seperti fibroadenoma atau penyakit fibrokistik yang kecil saja, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, permukaan tidak rata, konsistensi pada

keras. Benjolan payudara dapat terjadi di bagian mana saja dalam payudara, tetapi mayoritas terjadi pada kuadran atas terluar dimana sebagian besar jaringan payudara terdapat benjolan payudara umum terjadi pada payudara sebelah kiri (Floreska, dkk, 2016: 17).

Umumnya tidak terasa nyeri, terfiksasi dan keras dengan batas yang tidak teratur, keluhan nyeri yang menyebar pada payudara dan nyeri tekan yang terjadi pada saat menstruasi biasanya berhubungan dengan penyakit payudara jinak. Namun nyeri yang jelas pada bagian yang ditunjuk dapat berhubungan dengan benjolan payudara pada kasus yang lebih lanjut (Bickley, 2014. Hal: 304).

Meningkatnya penggunaan mammografi lebih banyak wanita yang mencari bantuan medis pada penyakit tahap awal. Wanita-wanita ini bisa saja tidak mempunyai gejala dengan tidak mempunyai benjolan yang dapat diraba, tetapi lesi abnormal dapat terdeteksi pada pemeriksaan mammografi. Metastasis di kulit dapat dimanifestasikan oleh lesi yang mengalami ulserasi dan berjamur. Tanda-tanda dan gejala klasik ini jelas mencirikan adanya benjolan payudara pada tahap lanjut. Namun indeks kecurigaan yang tinggi harus dipertahankan pada setiap abnormalitas payudara dan evaluasi segera harus dilakukan (Manar, 2020: 109).

3. Langkah III: Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini merupakan langkah ketika melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan harus waspada menghadapi diagnosis/masalah potensial yang benar-benar terjadi (Jannah, 2012: 206-207). Diagnosa potensial yang dapat terjadi pada kasus benjolan payudara yaitu terjadi Ca

Mammae. Ca Mammae adalah kejadian keterlambatan pemeriksaan dengan gejala penemuan benjolan (tumor) payudara yang ukurannya terus meningkat, dan semakin kecil tumor maka semakin kecil potensi Ca Mammae (Manar, 2020: 129).

Selain masalah diatas menurut Sjamsuhidayat, komplikasi yang dapat terjadi pada benjolan payudara adalah gangguan neurovaskuler, metastasis, otak, paru, hati, tulang tengkorak, vertebra, iga, tulang panjang. Fraktur patologi dan Fibrosis payudara dan bahkan dapat terjadi kematian (Floreska, dkk, 2016: 17).

Benjolan payudara adalah gambaran yang paling sering di jumpai pada kanker payudara. Meskipun kebanyakan benjolan di payudara tidak bersifat kanker, tetapi jika benjolan payudara tidak di tangani dengan tepat dan cepat maka akan mengakibatkan hal yang serius seperti terjadi kanker payudara atau bahkan dapat menyebabkan kematian (Nurul, 2018: 109).

Benjolan payudara bersifat Non-kanker yang terdapat pada jaringan payudara, walaupun tumor payudara ini sering terjadi. Tumor payudara ini dapat menjadi pemicu faktor resiko kanker payudara, dimana tumor dapat meningkat hingga sepertiga menjadi kanker payudara (Naviri, 2016: 226).

Benjolan atau Tumor adalah sekelompok jaringan abnormal, yang disebabkan oleh sel-sel tua dan rusak yang tidak mati seperti seharusnya, ada dua jenis tumor yang terdapat pada payudara, yakni tumor yang dapat menyebabkan tidak kanker dan tumor yang menyebabkan kanker (Naviri, 2016: 92).

Tumor payudara sudah banyak di temukan pada usia muda bahkan pada usia 14 tahun dimana tumor dapat berpotensi menjadi kanker bila

tidak terdeteksi lebih awal, meskipun tumor payudara tidak semuanya ganas namun kejadian tumor payudara menunjukkan bahwa saat ini sudah ada tren gejala kanker payudara yang semakin tinggi di usia remaja. Walaupun tidak semuanya ganas tetapi ini menunjukkan bahwa saat ini telah ada tren gejala kanker payudara yang semakin tinggi di usia remaja (Sri, 2019: 110).

Wanita yang memiliki riwayat fibroadenoma mammae memiliki peningkatan resiko terserang kanker payudara 8,95 kali lebih tinggi. Peningkatan resiko ini berhubungan dengan riwayat tumor jinak dimana pernah terjadi poliferasi berlebihan. Kejadian tumor jinak lebih sering, walaupun tumor jinak namun dapat beresiko menjadi kanker payudara di kemudian hari (Mauliza, 2020: 27).

4. Langkah IV: Identifikasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi

Pada langkah ini, yang dilakukan oleh bidan adalah mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk konsultasi atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien (Mangkuji, 2012: 6).

Mengenai tindakan segera yang dapat dilakukan pada kasus benjolan payudara adalah sebagian besar kasus fibroadenoma mammae tidak memerlukan pengobatan, tumor tersebut akan menghilang seiring waktu, namun jika pertumbuhannya membesar serta menekan jaringan payudara lainnya, maka tindakan pengangkatan harus dilakukan, ada 2 proses pengangkatan tumor yakni Lumpektomi atau Biopsi eksisi dan Cryoablasi. Dokter mungkin akan memutuskan untuk melakukan pengangkatan tumor jika ukurannya massif dan terus membesar. Indikasi intervensi bedah meliputi pertumbuhan cepat, ukuran lebih dari 2 cm, serta

atas permintaan pasien (Sanjay, 2019: 88).

Pada kasus benjolan payudara tindakan yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan dokter bedah, bila tidak terjadi keganasan bisa diobati secara operasi ataupun dengan obat-obatan, bila terjadi keganasan harus segera dilakukan pengangkatan benjolan payudara dan diberikan obat-obatan. Tindakan atau penanganan tumor jinak berbeda dengan penanganan tumor ganas, semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan indikasi atau sesuai dengan standar asuhan agar tidak terjadi komplikasi atau hal-hal yang tidak diinginkan (Putri, 2016:88).

Tumor yang tidak menyebabkan kanker umumnya tidak berbahaya karena jarang menyerang jaringan sekitarnya, tidak berkembang ke daerah tubuh lainnya, serta bisa di angkat dan tidak tumbuh kembali. Berbeda halnya dengan tumor yang dapat menyebabkan kanker yang dapat mengancam kehidupan, menyerang jaringan sekitar bahkan dapat menyebar ke tubuh lainnya dan sering kali bisa di angkat namun kadang-kadang tumbuh kembali. Maka tindakan yang perlu dilakukan yaitu kolaborasi dengan dokter bedah, jika tidak terjadi keganasan bisa di obati dengan operasi atau menggunakan obat-obatan, namun jika terjadi keganasan dilakukan pengangkatan/operasi dan diberikan obat-obatan anti kanker (Naviri, 2016: 92-93).

Selain melakukan pengangkatan/operasi dan diberikan obat-obatan pada kasus banjolan payudara, tindakan lain yang perlu dilakukan yaitu menganjurkan ibu untuk tetap menjaga pola nutrisinya seperti mengkonsumsi buah dan sayur, menghindari makanan yang terbuat dari daging merah, makanan yang mengandung lemak trans dan jenuh, makanan yang mengandung gula, makanan kolagen dan menghindari

makanan yang dibakar serta hindari minuman beralkohol (Lehyun Jho, dkk, 2020: 23).

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pasien dengan kasus benjolan payudara yang sering mengkonsumsi alkohol memiliki resiko kanker payudara yang sangat tinggi karena alkohol meningkatkan estrogen dalam darah.

Adapun firman Allah SWT dalam Q.S. al- Maidah (5): 90-91 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum keras (khamar) berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Seungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Adapun pendapat Dr. Ahmad Asy-Syarbashi bahwa khamar merupakan bahaya yang dapat merusak akal, menghilangkan harta, dan merendahkan kemuliaan manusia. Karena itu tidak layak bagi seorang yang berakal untuk mendekatinya, apalagi meminumnya. Begitu juga dengan obat-obat bius. Iman Ahmad telah meriwayatkan bahwa Rasulullah telah melarang segala yang memabukkan dan yang membius, karena ia dapat

menyebabkan kelemahan dan keadaan terbius pada anggota-anggota tubuh manusia dan sumber segala penyakit (Ahmad Asy-Syarbashi, 2007, hal 77-78).

Khamar mempunyai dampak yang sangat kuat pada saraf manusia, yang akan menyebabkan orang yang meminumnya menjadi ketagihan dan selalu ingin minum lebih banyak lagi. Khamar akan menimbulkan ketenangan dan rileks yang berlebihan. Namun ketika pengaruh itu telah hilang segeralah timbul perasaan yang tak terkendalikan, yang hanya bisa dihilangkan dengan kembali meminum khamar dan mabuk. Bila keinginan itu diikuti, maka dorongan untuk selalu mengulangi minum khamar akan menjadi semakin kuat. Bila seseorang 54 telah mencapai tahap itu berarti dia telah kecanduan, dia akan terus meneruskan meminum khamar (Ahmad Asy-Syarbashi, 2007, hal 180-181).

Dalam Q.S. al-Maidah di atas dijelaskan tentang larangan meminum minuman keras (khamar) karena minuman yang mengandung alkohol dapat merusak diri dan merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan maka dari itu Allah sangat melarang orang-orang yang mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.

5. Langkah V: Rencana Tindakan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh berdasarkan langkah sebelumnya. Semua perencanaan yang dibuatkan harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori *Up To Date*, perawatan berdasarkan bukti (*evidence based care*) (Jannah, 2012: 208-209).

Strategi pencegahan benjolan payudara dikelompokkan dalam tiga

kelompok besar, yaitu pencegahan pada lingkungan, pejamu, dan *milestone*. Hampir setiap epidemiologi sepakat bahwa pencegahan yang paling efektif bagi kejadian penyakit tidak menular adalah promosi kesehatan dan deteksi dini (Floreska, dkk, 2016: 27).

Pencegahan benjolan payudara dapat dilakukan dengan promosi kesehatan karena dilakukan pada orang yang sehat melalui upaya menghindarkan diri dari keterpaparan pada berbagai faktor risiko dan melaksanakan pola hidup sehat. Pencegahan primer ini juga bisa berupa pemeriksaan SADARI (pemeriksaan payudara sendiri) yang dilakukan secara rutin sehingga bisa memperkecil faktor resiko terkena benjolan atau kanker payudara ini (Mahannad Shadine, 2009, hal 59-62).

Penanganan dan pencegahan pada kasus dengan benjolan payudara dilakukan terhadap individu yang memiliki risiko tinggi. Pada sebagian besar kasus benjolan payudara tidak memerlukan pengobatan, mereka akan menyusut dan menghilang seiring waktu, tetapi jika ukurannya besar serta menekan jaringan payudara yang lain maka itu harus dilakukan pengangkatan, ada 2 prosedur pengangkatan yakni lumpektomi atau biopsy eksisi dan *cryoablasi* (Maleeha, 2020: 88).

Mengonsumsi makanan-makanan yang berasal dari kedelai banyak mengandung estrogen tumbuhan (fitoestrogen). Seperti halnya “tamoksifen“, senyawa ini mirip dengan estrogen tubuh tapi lebih lemah. Fito/estrogen terikat pada reseptor sel yang sama dengan estrogen tubuh, mengikatnya keluar dari sel payudara sehingga mengurangi efek pemicu kanker payudara. Selain menghalangi estrogen tubuh 28 untuk mencapai sela reseptor, makanan berkedelai juga mempercepat pengeluaran estrogen dari tubuh (Heru, 2019, hal 106-107).

Konsumsi buah dan sayuran. Semakin banyak buah dan sayuran yang dimakan, semakin berkurang resiko terjadinya benjolan payudara. Makanan dari tumbuh-tumbuhan mengandung anti oksidan yang tinggi. Diantaranya vitamin A, C, E, dan mineral selenium, yang dapat mencegah kerusakan sel yang bisa menjadi penyebab terjadinya benjolan payudara. *National cancer institute* (NCI) merekomendasikan mengkonsumsi buah dan sayuran paling tidak 5 (lima) dalam sehari. Tapi harus dihindari buah dan sayuran yang mengandung banyak lemak, seperti kentang goreng atau pai dengan krim pisang (Nugraheny, 2010: 29).

Adapun firman Allah dalam Q.S. al-Mukminun (23): 19 yang berbunyi:

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاقِحُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ[۝]

Terjemahnya:

Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Adapun pendapat M. Quraish Shihab tentang Q.S. al-Mukminun Allah mengemukakan bahwa: lalu setelah Kami menurunkan air dari langit 55 dan menyimpannya di bumi, Kami tumbuhkan untuk kamu wahai umat manusia, yakni dengan perantaraan air itu aneka ragam kebun seperti kebun-kebun kurma dan anggur dan kamu peroleh didalamnya yaitu didalam kebun-kebun itu buah-buahan yang banyak dan sebagian darinya kamu makan.

Dalam Q.S. Al-Mukminun di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan kebun-kebun yang begitu luas yang di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan yang begitu banyak untuk kita nikmati

hasilnya. Maka dari itu perbanyaklah makan buah-buahan agar kita tidak terkena benjolan payudara.

Pada langkah perencanaan yang dilakukan adalah pemberian edukasi gizi yang cukup. Edukasi gizi sangat perlu diberikan kepada remaja dan orang tua dalam hal pemberian makanan sehari-hari. Berbagai penelitian yang menyatakan bahwa edukasi efektif dalam mengatasi dan sebagai langkah preventif terjadinya benjolan payudara terkhusus remaja putri.

6. Langkah VI: Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang diuraikan pada langkah kelima di atas dilaksanakan secara efisien dan aman. Realisasi dari perencanaan dapat dilakukan oleh bidan, pasien, atau anggota keluarga lain. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab atas terlaksananya seluruh perencanaan (Jannah, Nurul, 2012: 209).

Adapun intervensi upaya pencegahan benjolan payudara yang dapat dilakukan dengan menjaga asupan gizi dan berolahraga secara teratur. Penelitian menunjukkan bahwa sejalan meningkatnya aktifitas, maka resiko terjadinya benjolan payudara akan berkurang. Berolahraga akan menurunkan kadar estrogen yang diproduksi tubuh sehingga mengurangi resiko terjadinya benjolan dan kanker payudara (Heru, 2019, hal 106-107).

Selain berolahraga dapat membantu mengurangi resiko terjadinya benjolan payudara, dengan mengkonsumsi makanan yang berlemak juga dapat membantu mencegah benjolan dan kanker payudara serta konsumsi suplemen anti-oksidan. Suplemen tidak dapat menggantikan buah dan sayuran tetapi suatu permulah anti-oksidan bisa merupakan tambahan makanan yang dapat mencegah kanker payudara (Heru, 2019: 113).

Melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Lebih dari 90% tumor payudara dideteksi oleh wanita itu sendiri. Perhatikan setiap perubahan pada payudara menjadi bagian penting perawatan kesehatan wanita. Ini berarti wanita harus tahu seperti apa payudara mereka di depan cermin dan rasakan pada saat mandi atau terlentang pada periode berbeda setiap bulan sehingga jika ada perubahan yang tidak normal dapat diketahui segera (Floreska, dkk, 2016: 7).

Menghindari rokok karena kandungan nikotin dan berbagai zat yang terbakar bersamaan tembakau akan menghasilkan serangkaian zat radikal karsinogenik yang sangat aktif. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan seseorang merokok beresiko menumbuhkan sel kanker di setiap bagian tubuh. Meski paru- paru sering disebut sebagai organ yang paling banyak mendapat resiko buruk dari asap rokok, tetapi radikal bebas dari asap tembakau yang tersebar oleh sel darah ke seluruh tubuh berpotensi mengganggu kinerja sel diberbagai organ, termasuk dipayudara (Jalu Nurcahyo, 2017, hal 94).

Pencegahan pada benjolan payudara ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup penderita serta mencegah komplikasi penyakit dan meneruskan pengobatan. Tindakan pengobatan dapat berupa operasi. Teknik invasif minimal Biopsi Perkutan dengan bantuan vakum biopsi eksisi perkutan, teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan benjolan payudara hingga ukuran 3 cm, jaringan payudara di sedot melalui hisap vakum, massa payudara diangkat secara radiografik (Mahannad Shadine, 2016, hal 59-62).

7. Langkah VII: Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosis. Pada prinsip tahapan evaluasi adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai ke efektifan tindakan yang diberikan, bidan dapat menyimpulkan dengan melakukan

pemeriksaan pada payudara kembali.

Mengevaluasi perencanaan tindakan yang telah diberikan yaitu evaluasi pola makan sesuai dengan kebutuhan gizi sehingga dapat mencegah dan mengatasi masalah dialami oleh remaja yaitu benjolan payudara. Evaluasi pendidikan yang telah diberikan kepada remaja dengan benjolan payudara dan evaluasi asuhan yang telah diberikan dengan menilai kepatuhan ibu untuk melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan terdekat dan melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) (Devy Qurrotu Ainy, 2019).

Melakukan Pemantauan status gizi secara berkala sangat penting untuk menjaga status gizi tetap normal. Menjaga status gizi tetap normal dan stabil merupakan upaya pencegahan benjolan payudara (Amartami, dkk, 2018).

Evaluasi mengenai Edukasi gizi dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan gizi peserta. Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya dilakukan metode lain dalam edukasi gizi dengan media yang digunakan juga berbeda. Edukasi gizi juga perlu dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Selain itu, edukasi gizi juga perlu dilakukan kepada orang tua dan guru agar saling bekerja sama dalam penurunan angka kejadian benjolan payudara pada remaja putri (Abiyyi dan Rendy, 2020).

Tindakan selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan biopsi juga dapat di pakai untuk diagnosis Tumor dan Ca mammae. Pemeriksaan histologi ini dilakukan dengan mengangkat jaringan dari massa payudara yang terjangkit tumor untuk ditentukan tingkat keganasannya. Biopsi terdiri dari beberapa jenis, yaitu *Fine Needle Aspiration Cytology* (FNAC),

Core needle biopsy (biopsi jarum inti), *Biopsy stereotaktis* dan Biopsi terbuka atau pembedahan (Smeltzer, dkk, 2002).

Pada prinsip tahapan evaluasi adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai ke efektifan tindakan yang diberikan dan keberhasilan dapat dilihat dari keadaan payudara remaja yang normal dengan melakukan pemeriksaan kembali benjolan payudara dan menilai keadaan umum penderita dengan pemeriksaan fisik. Apabila terjadi perubahan setelah diberikan tindakan dan keadaan membaik dan tidak ada masalah yang terjadi pada ibu maka dapat dipastikan penderita mengalami perubahan.

B. Implikasi Kebidanan

Remaja merupakan masa peralihan yang diawali pada saat anak memperlihatkan tanda-tanda pubertas yang dilanjutkan dengan adanya perubahan-perubahan dari yang bukan seksual menjadi seksual. Di antaranya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya pubertas yakni Nutrisi, genetik, kondisi kesehatan, sosial, faktor lingkungan serta perilaku. Faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi pubertas yakni nutrisi.

Masa remaja adalah masa peralihan yaitu peralihan dari satu tahap perkembangan ke perkembangan berikutnya secara berkesinambungan. Pada masa ini remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan seorang yang dewasa. Masa ini merupakan masa strategis karena memberikan waktu kepada remaja untuk membentuk gaya hidup dan menentukan pola perilaku, nilai-nilai, dan sifat-sifat yang sesuai dengan yang diinginkannya.

Benjolan payudara adalah suatu benjolan Non-kanker yang terdapat pada jaringan payudara, walaupun tumor payudara ini sering terjadi tumor payudara ini dapat menjadi pemicu faktor resiko kanker payudara, dimana tumor dapat meningkat hingga sepertiga menjadi kanker payudara.

Benjolan payudara adalah sekelompok jaringan abnormal, yang disebabkan oleh sel-sel tua dan rusak yang tidak mati seperti seharusnya, ada dua jenis tumor yang terdapat pada payudara, yakni tumor yang dapat menyebabkan kanker dan tumor yang tidak menyebabkan kanker.

Diagnosa potensial yang dapat terjadi pada kasus benjolan payudara yaitu terjadi Ca Mammae. Ca Mammae adalah kejadian keterlambatan pemeriksaan dengan gejala penemuan benjolan (tumor) payudara yang ukurannya terus meningkat, dan semakin kecil tumor maka semakin kecil potensi Ca Mammae.

Selain masalah diatas komplikasi yang dapat terjadi pada benjolan payudara adalah gangguan neurovaskuler, metastasis, otak, paru, hati, tulang tengkorak, vertebra, iga, tulang panjang. Fraktur patologi dan Fibrosis payudara dan bahkan dapat terjadi kematian.

Pencegahan benjolan payudara pada remaja yaitu dengan memberikan penyuluhan mengenai pemeriksaan payudara sendiri dan pemberian nutrisi yang baik yaitu dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Semakin banyak buah dan sayuran yang dimakan, semakin berkurang resiko terjadinya benjolan payudara. Makanan dari tumbuh-tumbuhan mengandung anti oksidan yang tinggi. Diantaranya vitamin A, C, E, dan mineral selenium, yang dapat mencegah kerusakan sel yang bisa menjadi penyebab terjadinya benjolan payudara serta

menghindari alkohol dan berolahraga secara teratur.

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penulisan literatur review pada remaja dengan benjolan payudara serta menghubungkan dengan teori dan *Avoidance Based* maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu :

A. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan referensi maka untuk melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dengan mendapatkan data subjektif dan objektif dari tanda dan gejala, faktor penyebab berbagai referensi mengenai remaja dengan benjolan payudara. Dari referensi didapatkan tanda dan gejala yaitu benjolan payudara dapat multipel, benjolan berdiameter 2-3 cm, benjolan tidak menimbulkan reksi radang, mobile dan tidak menyebabkan pengerutan kulit payudara. Faktor penyebab didapatkan yaitu jenis kelamin, riwayat keluarga, faktor usia dan faktor hormonal.
- 2) Untuk mengetahui diagnosis benjolan payudara berdasarkan hasil referensi yang didapatkan yaitu melakukan pemeriksaan seperti Ultrasonograf, mammografi, Scan CT dan MRI, Pemeriksaan Biopsi
- 3) Masalah potensial yang bisa terjadi pada remaja dengan benjolan payudara berdasarkan hasil referensi yaitu CaMammae, gangguan neurovaskuler, metastasis, otak, paru, hati, tulang tengkorak, vertebra, iga, tulang panjang. Fraktur patologi dan Fibrosis payudara dan bahkan dapat terjadi kematian. Komplikasi tersebut dapat terjadi jika pasien tidak mendapatkan perawatan secara intensif dan tindakan segera jika mengalami diantara komplikasi diatas. Tindakan segera dan kolaborasi

dengan dokter berdasarkan referensi diatas yaitu kolaborasi dengan dokter spesialis bedah, bila tidak terjadi keganasan bisa di obati secara operasi atau obat-obatan, bila terjadi keganasan harus di lakukan pengangkatan payudara dengan cara operasi serta pemberian obat-obatan anti kanker.

- 4) Rencana tindakan pada remaja dengan benjolan payudara yaitu SADARI, berolahraga teratur, diet, pemberian obat-obatan atau operasi. Rencana tersebut berguna untuk pasien agar dapat terhindar dari berbagai komplikasi yang dapat mengancam jiwa.
- 5) Tindakan yang dilakukan pada remaja dengan benjolan payudara sesuai dengan intervensi yaitu diet makanan yang berlemak, mengkonsumsi buah dan sayur, pemberian obat-obatan atau operasi, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan laboratorium.
- 6) Tindakan evaluasi pada remaja dengan benjolan payudara untuk mengetahui keadaan pasien dengan maksimal serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dapat teratasi. Kondisi klien baik dan tidak mengalami komplikasi serta kembali normal.

B. Saran

Melihat besarnya efek yang ditimbulkan dengan adanya masalah pada remaja dengan benjolan payudara yang akan berdampak pada buruknya keadaan ibu, maka perlu diberikan tindakan yang tepat dan segera untuk mengantisipasi masalah tersebut. Oleh karena itu, adapun saran dari penulis sebagai berikut :

- 1) Untuk mencegah terjadinya benjolan payudara pada remaja maka perlu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap remaja dan pertolongan yang cepat dan tepat, sehingga dapat segera di antisipasi kemungkinan masalah lain yang dapat terjadi.
- 2) Seorang bidan harus dapat menilai dan mengetahui tanda bahaya benjolan payudara yang terjadi pada remaja serta memberikan tindakan yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyyi, P. (2020) *Pengaruh Benjolan Payudara Terhadap Remaja*. Jurnal Kesehatan Komunitas. e-ISSN 2715-6885; p-ISSN 2714-9757
- Ahamd. (2017). *Gizi prakonsepsi, kehamilan, dan menyusui*. Jakarta: Trans Info Medika.
- Ahsani Fauziah Rizqy, Machmud Bungsu Putri. 2019. *Hubungan Riwayat Reproduksi dengan Tumor pada Payudara Perempuan usia Muda di Indonesia (Analisis Riset PTM 2016)*. Jurnal MKMI, Vol.15 No:3. DOI:<http://dx.doi.org/10.30597/mkmi.v15i3.6278>
- Ai Yeyeh, Rukiyah, Yulianti, Lia. 2010. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: Trans Info Medika.
- Ajmal Maleeha, Fossen Van Kelly. 2020. *Breast Fibroadenoma*.
- Alini, Widya, L. 2018. *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kejadian Fibroadenoma mammae (FAM) Pada Pasien Wanita yang Berkunjung di Poliklinik Spesialis Bedah Umum RSUD Bengkalis*. Jurnal Ners, Vol. 2, No.2 .Universitas Pahlawan.
- Alvita Brilliana R.Arafah, Hari Basuki Notobroto. 2017. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Ibu Rumah Tangga Melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)*
- Amartami. 2018. *Faktor Penyebab Terjadinya Benjolan Payudara Pada Remaja*. Jurnal keperawatan.
- Baswedan Hafidzah Rizki, Listiowati Ekorini. 2014. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Dengan Perilaku SADARI pada Mahasiswi Non Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Biomedika vol.6 No 1. <https://doi.org/10.23917/biomedika.v6i1.280>
- Bare & Smeltzer. 2002. *Buku Ajaran Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddart (Alih Bahasa Agung Waluyo)*. Edisi 8. Vol. 3. Jakarta :EGC
- Bickley Lynn S, Peter G. Szilagy. 2014. *Pemeriksaan Fisik & Riwayat Kesehatan* Ed:8. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Cesariana Vindy, CitraDewi, Dalilah. 2019. *Prevalensi, Insidensi, dan Karakteristik Klinikohistopatologi Fibrocystic Change*. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Cerrato Felicia and Labow. I Brian. 2013. *Diagnosis and Management of Fibroadenomas Adolescent Breast*. Semin plast surg Vol 27(1), 23-25.

DOI:10.1015/s-0033-1343992

Chinnaiah E dan Nagireddy V Tejus. 2020. *Management of Benign Breast Disiases at a Tertiary Care Hospital.*

Cholifah Noor,Rusnoto,Kiki Afinita.2019.*Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap wanita Subur dengan kejadian Fibroadenoma mammae (FAM) di klinik DR.HANDY SS,Sp.B KUDUS).*

Darmawansyih. *Penyakit Kronik Dalam Kehamilan.* Makassar-Gowa: Alauddin University Press, 2014.

Darmawansyih. *Farmakologi Kebidanan.* Makassar-Gowa: Alauddin University Press, 2011.

Desta (2019).*Pemberian Pendidikan Kesehatan Reproduksi Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Seks Bebas Pada Remaja Kelas X dan XI Di SMK Muhammadiyah II Bantul.*

Devy (2019). *Wanita Tidak Menikah Lebih Berisiko.* Jurnal Kesehatan Masyarakat

Dewi (2019). *Penyakit Kandungan dan Keluarga berencana untuk Pendidikan Bidan.* EGC: Jakarta

Doengoes, Marilyn, E, 2000, *Rencana Asuhan Keperawatan,* EGC, Jakarta.

El-Essawy Manar, dkk. 2020. *Ductal Carcionoma in Situ (DCIS) in Breast Fibroadenoma.*

Endang, dkk. *Profil Konsumsi Zat Gizi Pada Remaja.* Mgmi Vol. 11, No. 1, Desember 2019: 39-48

Erlin. *Karsinoma Payudara, Buku Saku Obstetri Dan Genekologi.* Penerbit Buku Kodekteran EGC, Jakarta.

Fitriani, Rini. *Penyakit Sistemik pada Kehamilan.* Makassar-Gowa: Alauddin University Prees, 2014.

Floreska (2014). *Penyuluhan Deteksi Dini Kanker Payudara Dengan Periksa Payudara Sendiri (Sadari) Di Dusun Candirejo, Tegaltirto, Berbah, Sleman.*

Gaurav Kumar, dkk. 2015. *A Pre-Pubertal Girl With Giant Juvenile Fibroadenoma: A Rare Case Report.* International Journal of Surgery Case

Report 16: 87-89. Doi:10.1016/j.ijscr.2015.09.026

Ginting Angelina Stevanie Stella. 2019. *Asuhan Kebidan Pada Remaja Nn.H Usia 20 Tahun dengan Fibroadenoma Mammae di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 2018.*

Goyal Dayal Rameshwar,Akhles Kumar Srivastava. 2019. *Study of Clinicopatologic Profiles of Patients With Beginning Breast Disease.*

Grace,Pierce A. dkk. 2006. *At a Glance Ilmu Bedah Ed. 11.* Jakarta:Penerbit Erlangga.

Huang I-Ching, dkk. 2018. *Recurrent Juvenile Fibroadenoma of the Breast in an Andolescent.* Medicine Vol.97(20). Doi:10.1097/MD0000000000010765

Hussian Hassan Noor, dkk. 2019. *A Clinicopathological Study to Determine Age Specific Prevalance Rate of Benign Breast Lumps.* International Surgery Journal Vol.6 (10). DOI:10.18203/2349-2902.isj20194420

International NGO Forum on Indonesian Development.2017. *Sustainable Development Goals (SDG's) 2030.* <https://www.Sdg2030indonesia.Org/page/11-tujuan-tiga>.

Iskandar Junaidi. 2007. *Kanker* .Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Iskandar Marini. 2015. *Gambaran Karakteristik Wanita dengan Kasus Kanker Payudara di RSUD Karawang Februari 2012- Februari 2013.*

Janah Nur Sari Ratna. 2016. *Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi Fibroadenoma Mammae pada Ny.R Umur 24 Tahun dengan Post Lumpectomy di RSUD Karanganyar.*

J A Ngabea, dkk. 2018. *A Clinicopathologic Review of Fibroadenoma in Makurdi, North Central-Nigeria.* Journal of BIomedikal Research and Clinical Practice Vol.1 No:1. <https://doi.org/10.46912/jbrcp.38>

Japp G Alan, dkk.2018. *Diagnosis Klinis Macleod Edisi 2.* Singapura

Jati Puspita Linda, dkk. 2016. *Tingkat pengetahuan Remaja Putri Kelas XI Tentang Fibroadenoma mammae di SMA Masehi Kudus.*

- Jaya Tamar Firda, Usman, Ayu Dwi Putri RUSman .2020.*Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Sebagai Deteksi Dini Kanker Payudara Pada Remaja Putri di SMA Negeri 1 Parepare.*
- Jitowiyono S dan Kristiyanasari W. 2012. *Asuhan Keperawatan Post Operasi.* Yogyakarta: Nuamedika.
- Karyanti (2018).*Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Keterampilan Remaja Putri Dalam Melakukan Sadari Sebagai Upaya Deteksi Dini Kanker Payudara Di SMA Kartikatama Metro Tahun 2016.*
- Kumar Vinod, dkk. *Fibroadenoma in Axillary Tail of Breast.A case Report.* Int J Med Rev Case Rep. 2020: 4(10): 42-43. Doi:10.5455/IJMRCR.Fibroadenoma-Axillary-Tail-Breast.
- Lee Michelle, Soltanian T Hooman. 2015. *Breast Fibroadenomas in Andolecents: Current Perspectives.* Andolecent Health, Medicine and Therapeutics Vol 6. Doi:10.2147/AHMT.S55833
- Mansel RE, Webster DJT, Sweetland HM. 2010. *Benign Disorders and Bisease of the Breast.*
- Meng Xiangyue, dkk. 2019. *Giant Fibroadenoma of the Breast: A Rare Case in Mature Women.* International Journal of Surgery Case Report Vol.63. doi:10.1016/j.ijscr.2019.09.015
- Morison, Moya J. 2004. *Manajemen Luka.* Jakarta: EGC
- Nasar, dkk. 2010. *Buku Ajaran Patologi II (Khusus). Edisi 1.* Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Nasyari Mauliza, dkk. 2020. *Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Tumor Payudara di RSUD dr.Zaenoel Abidin Banda Aceh.* Jurnal Averrous Vol 6 No.1. DOI:<https://doi.org/10.29103/averrous.v6i1.2659>
- Navally Y Krishnareddy, dkk. 2019. *A Study of Management of Benign Breast Lesions:A Prospective Study*
- Naviri,*Buku Pintar Kesehatan dan Kecantikan Payudara,*Jakarta:PT Elex Media Komputindo;2016.
- Norwitz. 2008. *At a Glance Obstetri dan Ginekologi.* Edisi 2.Jakarta; Erlangga.
- NSW Breast Cancer Institute. 2005. *Fibrioadenoma of the Breast.*<http://www.bci.org.au>.

- Nugroho, Taufan. 2011. *Buku Ajaran Obstetric untuk Mahaiswa Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Nurul (2018). *Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi Fibroadenoma Mammae Pada Ny. R Umur 24 Tahun Dengan Post Lumpectomy di RSUD Karanganyar, Surakarta; 2018*
- Oktariani Marmah. 2015. *Gambaran Klinis dan Karakteristik Penderita Fibroadenoma Mammae (FAM) yang di Rawat Inap di RSUD Palembang Bari Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2013*.
- P Begum Rihana, Thomus Rejita dan Nianjan Babu. 2017. *Chance of Breas Cancer with Fibroadenoma – Review*. 6(2): 84-86
- Pamungkas (2011) *Obsgyn Obstetric Dan Ginekologi Untuk Kenidanan Dan Keperawatan*. Yogyakarta : Nuha Medika; 2011.
- Proverawati.2011 *Anemia dan Kehamilan*.Yogyakarta:Nuha Media.
- Pertiwi Widyaning Herdini, Shafira kaesa.2019. *Hubungan Pengetahuan Dengan Perilaku Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Pada Mahasiswi Kebidanan Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo*.
- Pratiwi Yuyun. 2013. *Asuhan Keperawatan Pada Klien dengan Gangguan Sistem Reproduksi : Post Lumpektomi Fibroadenoma Mammae (FAM) Sinistra di Ruang Multazam RS PKU Muhammadiyah Surakarta*.
- Pruthi Sandhya, Jones. N Katie. 2013. *Nonsurgical Management of Fibroadenoma and virginial Breast hypertrhopy*. Seminars in Plastic Sugery Vol 27(1). DOI:10.1055/s-0033-1343997
- Purnata Awaln Putri. 2016. *Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi Pada Ny.S Umur 31 Tahun dengan Fibroadenoma Mammae di RSU Assalam Gemolong Sragen*.
- Putri Yudiartini Putu Ni dan Hudyono Johannes. 2014. *Diagnosis dan Penatalaksanaan Fibroadenoma Payudara*. Jurnal Kedokteran Meditek. Vol.20, No:53.
- Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf Gowa 2020.
- Riska, K . (2012). *Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Dan Persalinan Di SMA Neg 1 Sinjai Utara Tahun 2012*.

- Rofiqoh Fiky. 2014. *Asuhan Pada Wanita dengan Gangguan Sistem Reproduksi*.
- Rukmana H. Rahmat. 1999. *Anggur, Budidaya & Penanganan Pasca Panen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Salsabila Assyifa. 2020. *Perbedaan Tingkat Pengetahuan Siswi SMA PGRI 2 Palembang Terhadap Fibroadenoma Mammae Sebelum dan Sesudah Pemberian Intervensi Perilaku SADARI*.
- Sari Puspita Eka. 2015. *Gambaran Karakteristik Kejadian Fibroadenoma di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang Tahun 2014*.
- Sari Wening, Lili Indrawati, Basuki Dwi Harjanto. 2012. *Panduan Lengkap Kesehatan Wanita*. Depok: Penebar Plus+.
- Sarjadi. 2003. *Patologi Umum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sarjadi. 2007. *Buku Ajaran Patologi Robbins*. Jakarta: EGC.
- Sarwono. (2014). *Ilmu Kandungan Edisi Ketiga*. PT Bina Pustaka: Jakarta.
- Saryono, dkk. (2009). *Asuhan Kebidanan Postpartum*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Savitri, Astrid, dkk. 2015. *Kupas Tuntas Kanker Payudara, Leher Rahim dan Rahim*. Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Septarini Helvia. 2014. *Gambaran Kejadian Tumor Payudara di RSUD Serang Tahun 2013*.
- Setiowati Intan Ayu Ditya, dkk. 2016. *Hubungan Antara Pemakaian KB Hormonal dengan Kejadian Kanker Payudara di Poli Onkologi Satu Atap RSUD dr. Soetomo, Februari-April 2015*. Indonesia Journal of Cancer, Vol: 10, No.1, Hal:11-16
- Setyowati Retno Erlin. 2017. *Analisis Asuhan Keperawatan Pre Operasi Lumpectomy pada Pasien Tumor Mammae dengan Kecemasan di Ruang Teratai RSUD Dr. Soediman Kebumen*.
- Shaik, Asra N., Ruterbusch JJ, Abdulfatah E, dkk. 2018. *Breast Fibroadenomas are not Associated with Increased Breast Cancer Risk in an African American Contemporary Cohort of Women with Benign Breast Disease*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6085691/>
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sjamsuhidajat R, Jong De, dkk. 2013. *Buku Ajaran Ilmu Bedah Edisi ke 3*. Jakarta: EGC

- Smeltzer. *Kanker Payudara Dan Pencegahannya*. DechaCare. <http://dechacare.com/kanker-payudara-pengertian-dan-penyembyhan-1319.html>
- Suyatno. 2015. *Peran Pembedahan Pada Tumor Jinak Payudara*. Medan: Majalah Kedokteran Andalas.
- Tempali Restu Sri. 2019. *Analisis Hubungan Pengetahuan Tentang Deteksi Dini Kanker Payudara Pada Remaja Putri Melalui Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS)*. Jurnal Bidan Cerdas Vol 1 No:2. <https://doi.org/10.33860/jbc.v1i2.127>
- Tran The Viet Phoung, dkk. 2018. *Treatment of Fibroadenoma by Ultrasound-Guided Vacuum Assisted Breast Biopsy at Ho Chi Minh City Oncology Hospital*. Vietnam. Vol:1 :1046.
- United Cities and Local Governments Asia Pacific. 2015. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah*. Jakarta: UCLG ASPAC.
- Verma Kumar Sanjay, dkk. 2019. *Review on Fibroadenoma*.
- Vijayakumar Abhishek. 2013. *A Systematic Study on Fibroadenoma Of the Breast*. International Journal of Biomedical and Advance Research vol 3(12). DOI:10.7439/ijbar.v3i12.826
- Wu Kang Yung, dkk. 2005. *Management of Breast Fibroadenomas by Ultrasound-Guided Vacuum-Assisted Biopsy-Three Years Experience*.
- Yulifah, R, Surachmindari. 2013. *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan*. Salemba Medika. Jakarta.
- Yulina, (2015). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang*
- Yusuf Y, Kundre R, Rompas.S. (2014). *Hubungan pengetahuan Menarche Dengan Kesiapan Remaja Putri Menghadapi Menarche di SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan*. Manado: Universitas Sam Ratulangi .
- Setyowati Retno Erlin. 2017. *Analisis Asuhan Keperawatan Pre Operasi Lumpectomy pada Pasien Tumor Mammae dengan Kecemasan di Ruang Teratai RSUD Dr. Soediman Kebumen*.
- Shaik, Asra N, Ruterbusch JJ, Abdulfatah E, dkk. 2018. *Breast Fibroadenomas are not Associated with Increased Breast Cancer Risk in an African American Contemporary Cohort of Women with Benign Breast Disease*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6085691/>.

- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sjamsuhidajat R, Jong De, dkk. 2018. *Deteksi Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara*. Jakarta:EGC
- Suyatno. 2015. *Peran Pembedahan Pada Tumor Jinak Payudara*. Medan:Majalah Kedokteran Andalas.
- Sukfitrianty, dkk. *Fakor-Faktor Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar*. Public Health Science Journal Volume 8 Nomor 1 Tahun.journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Sihah/article/view/2086, 2016. (Diakses Tanggal 28 Februari 2019).
- Taufan. *Ilmu Obstetri dan Ginekologi Sosial untuk Kebidanan*. Pustaka Baru Press:Yogyakarta: 2012
- Tempali Restu Sri. 2019. *Analisis Hubungan Pengetahuan Tentang Deteksi Dini Kanker Payudara Pada Remaja Putri Melalui Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS)*. Jurnal Bidan Cerdas Vol 1 No:2. <https://doi.org/10.33860/jbc.v1i2.12>
- Tony Hollingworth, *Diagnosis Banding Dalam Obstetri & Ginekologi*, Jakarta, 2012.
- Tran The Viet Phoung, dkk. 2018. *Treatment of Fibroadenoma by Ultrasound-Guided Vacuum Assisted Breast Biopsy at Ho Chi Minh City Oncology Hospital*. Vietnam. Vol:1 :1046.
- United Cities and Local Governments Asia Pacific.2015. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah*. Jakarta: UCLG ASPAC.
- Verma Kumar Sanjay, dkk. 2019. *Review on Fibroaenoma*. Social Science Everant Journal Humanities Journal Vol. 3 No. 5
- Vijayakumar Abhishek. 2013. *A Systematic Study on Fibroadenoma Of the Breast*. International Journal of Biomedical and Advance Research vol 3(12). DOI:10.7439/ijbar.v3i12.826
- World Health Organization, 2020.
- Wiley Blackwell. *Hubungan Aktivitas Fisik Dengan kualitas hidup Kejadian Pada Pasien Kankerserviks Yang Menjalani Kemoterapi Di RSUD DR Moewardi: Surakarta*.Hal : 14 url:<http://eprint.ums.ac.id/eprint/53713>
- Willy, A, dkk. *Hubungan Usia dan Paritas dengan Kejadian Benjolan Payudara di RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang Periode Januari 2016-- Januari 2017*. Syifa'MEDIKA, Vol. 4 (No.1), September 2017.
- Wu Kang Yung, dkk. 2005. *Management of Breast Fibroadenomas by Ultrasound- Guided Vacuum--Assisted Biopsy-Three Years Experience*.
- Yulifah, R, Surachmindari. 2013. *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan*. Salemba Medika. Jakarta
- Yulina, (2015). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang*. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh Vol. 2 No. 2.
- Yusuf Y,Kundre R,Rompas.S.(2014).*Hubungan pengetahuan Menarche Dengan*

Kesiapan Remaja Putri Menghadapi Menarche di SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan Manado'Umversiitas Sam Ratulangi . Jurnal Keperawatan Vol. 9 No. 2.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : Cindy Asrida
Nim : 70400117001
Tempat/Tanggal Lahir : Ranteangin, 15 Mei 2000
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : Desa Rantebaru, Kec. Ranteangin,
Kab. Kolaka Utara, Prov.Sultra

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2004 – 2005 : TK Samaturu Rantebaru
2. Tahun 2005 – 2011 : SD Negeri 1 Rantebaru
3. Tahun 2011 – 2014 : SMP Negeri 3 Ranteangin
4. Tahun 2014 – 2017 : M.A Al-Hikmah Ranteangin
5. Tahun 2017 – 2022 : UIN Alauddin Makassar, Jurusan
Kebidanan, Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan