

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN LAMA
MENYUSUI ANAK TAHUN 2020**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

Oleh:

FITRI NENGSI ASTUTI

NIM: 70600116029

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitri Nengsi Astuti
NIM : 70600116029
Tempat/Tgl. Lahir : Jenepono / 18 April 1997
Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Mannuruki II
Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Lama Menyusui Anak Tahun 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Februari 2020

Penyusun,

Fitri Nengsi Astuti
NIM: 70600116029

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Lama Menyusui Anak Tahun 2020", yang disusun oleh Fitri Nengsi Astuti, NIM: 70600116029, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 22 Februari 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 20 Februari 2020 M

26 Jumadil Akhir 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : dr. Rini Fitriani, M.Kes (.....)

Pembimbing I: dr. Andi Faradillah, Sp.GK., M.Kes (.....)

Pembimbing II: dr. Purnamaniswaty Yunus, M.Kes (.....)

Penguji I : dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes (.....)

Penguji II : Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag (.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN LAMA
MENYUSUI ANAK TAHUN 2020**

Fitri Nengsi Astuti¹, Andi Faradillah², Purnamaniswaty Yunus³

¹Program Studi Pendidikan Dokter, UIN Alauddin Makassar

^{2,3}Departemen Biomedik, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin
Makassar

Corresponding Author : Telp: +6282349917314

Email : 70600116029@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

ASI merupakan makanan ideal untuk bayi dengan berbagai faktor protektif dan nutrisi yang penting. Pemberian ASI merupakan salah satu upaya kesehatan primer yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi khususnya pada anak. Lama pemberian ASI yang sesuai dengan anjuran WHO yaitu selama 2 tahun penuh, termasuk 6 bulan pemberian secara eksklusif akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Namun, cakupan pemberian ASI tahun 2015 hanya 37,3%, yang masih jauh dari target pemerintah tahun 2018 sebesar 75%. Beberapa faktor yang berhubungan dengan lama menyusui yaitu usia, pekerjaan, pengetahuan ASI, pengetahuan agama, kesehatan ibu, produksi ASI, paritas, berat lahir anak, kesehatan anak, jenis persalinan, promosi susu formula, teknik menyusui, dukungan keluarga, anggota keluarga merokok, dan riwayat antenatal care. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan lama menyusui anak. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian ini ditemukan nilai p pada masing-masing faktor yaitu, usia ($p=0,157$), pekerjaan ($p=0,180$), pengetahuan ASI ($p=0,525$), pengetahuan agama ($p=0,250$), kesehatan ibu ($p=0,021$), produksi ASI ($p=0,000$), paritas ($p=0,515$), berat lahir anak ($p=0,210$), kesehatan anak ($p=0,000$), jenis persalinan ($p=0,004$), promosi susu formula ($p=0,005$), Teknik menyusui ($p=0,021$), dukungan keluarga ($p=1,000$), anggota keluarga merokok ($p=0,003$), dan riwayat

antenatal care ($p=0,013$). Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kesehatan ibu, produksi ASI, kesehatan anak, jenis persalinan, promosi susu formula, teknik menyusui, dukungan keluarga, anggota keluarga merokok, dan riwayat antenatal care. Tidak terdapat hubungan antara usia, pekerjaan, pengetahuan ASI, pengetahuan agama, berat badan lahir anak, paritas, dan dukungan keluarga.

Kata Kunci:ASI, predisposing factor, enabling factor, reinforcing factor, lama menyusui.



**ANALYSIS OF FACTORS RELATED TO BREASTFEEDING DURATION IN
2020**

Fitri Nengsi Astuti¹, Andi Faradillah², Purnamaniswaty Yunus³

¹Medical Education Study Program, UIN Alauddin Makassar

^{2,3}Department of Biomedic, Faculty of Medicine and Health Science UIN Alauddin
Makassar

Corresponding Author : Telp: +6282349917314

Email : 70600116029@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

Breast milk is the ideal food for babies with a variety of important protective and nutritional factors. Breastfeeding is one of the primary health efforts that can improve the quality of human resources with a high level of survival, especially in children. The duration of breastfeeding in accordance with WHO recommendations, namely for 2 full years, including 6 months of exclusive giving will affect the child's growth and development optimally. However, the coverage of breastfeeding in 2015 was only 37.3%, which is still far from the 2018 government's target of 75%. Several factors related to duration of breastfeeding are age, occupation, breastfeeding knowledge, religious knowledge, maternal health, breast milk production, parity, child birth weight, child health, type of delivery, promotion of formula milk, breastfeeding techniques, family support, smoking family members, and antenatal care history. The purpose of this study was to determine the description of the factors associated with the length of breastfeeding a child. This research is an observational research with cross sectional approach. The results of this study found p values in each factor, namely, age ($p = 0.157$), occupation ($p = 0.180$), ASI knowledge ($p = 0.525$), religious knowledge ($p = 0.250$), maternal health ($p = 0.021$), milk production ($p = 0,000$), parity ($p = 0.515$), child birth weight ($p = 0.210$), child health ($p = 0,000$), type of delivery ($p = 0.004$), promotion of formula milk ($p = 0.005$), Breastfeeding techniques ($p = 0.021$), family

support ($p = 1,000$), family members smoking ($p = 0,003$), and antenatal care history ($p = 0,013$). The conclusion of this study is that there is a relationship between maternal health, milk production, child health, type of delivery, promotion of formula milk, breastfeeding techniques, family support, smoking family members, and antenatal care history. There is no relationship between age, occupation, breastfeeding knowledge, religious knowledge, birth weight of children, parity, and family support.

Keywords: breast milk, predisposing factor, enabling factor, reinforcing factor, duration of breastfeeding.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan limpahan syukur kehadirat Allah swt atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul, "Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Lama Menyusui Anak Tahun 2020". Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Pendidikan Dokter Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw, Nabi sebagai *Rahmatan Lil'alam* beserta para sahabat.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih, terkhusus dan teristimewa setelah Allah swt dan Rasul-Nya, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H.Sunu dan Ibunda Hj. Sitti (Almh) yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan dengan hormat oleh penulis terhadap semua pihak, terutama yaitu :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar serta jajarannya wakil rektor I, II, III, dan IV,
2. Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta jajarannya wakil dekan I, II, III, dan IV
3. dr. Darmawansyih, M.Kes, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. dr. Andi Faradillah, Sp.GK.,M.Kes, dr. Purnamaniswaty Yunus, S.Ked.,M.Kes, sebagai dosen pembimbing penelitian yang yang senantiasa meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing penulis dalam merampungkan skripsi ini.

5. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes, Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M. Ag sebagai dosen penguji kompetensi dan penguji integrasi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Pendidikan Dokter, para staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah membantu dalam proses pengurusan administrasi.
7. Teman-teman Angkatan 2016 "Nucle1" yang senantiasa menjadi teman seperjuangan.

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, karena tanpa bantuan mereka penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.



Makassar, 20 Februari 2020

Penulis

Fitri Nengsi Astuti

NIM : 70600116029

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Hipotesis	3
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
E. Kajian Pustaka	11
F. Tujuan Penelitian	16
G. Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS	18
A. Air Susu Ibu (ASI).....	18
B. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Lama Menyusui.....	23
C. Kerangka Teori.....	30
D. Kerangka Konsep.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
D. Pendekatan Penelitian	34
E. Populasi dan Sampel	34
F. Metode Pengumpulan Data.....	35
G. Instrumen Penelitian	37
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
I. Alur Penelitian	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39

A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan.....	61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
<i>Lampiran 1</i>	85



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	4
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	12
Tabel 2.1 Lama Menyusui	21
Tabel 4.1 Distribusi frekuensi Karakteristik Responden.....	46
Tabel 4.2 Hubungan Usia Ibu dengan Lama Menyusui	50
Tabel 4.3 Hubungan Pekerjaan Ibu dengan Lama Menyusui.....	51
Tabel 4.4 Hubungan Pengetahuan ASI Ibu dengan Lama Menyusui	52
Tabel 4.5 Hubungan Pengetahuan Agama Ibu dengan Lama Menyusui	53
Tabel 4.6 Hubungan Kesehatan Ibu dengan Lama Menyusui.....	54
Tabel 4.7 Hubungan Produksi ASI Ibu dengan Lama Menyusui.....	55
Tabel 4.8 Hubungan Paritas Ibu dengan Lama Menyusui	56
Tabel 4.9 Hubungan Berat Lahir Anak dengan Lama Menyusui.....	57
Tabel 4.10 Hubungan Kesehatan Anak dengan Lama Menyusui	58
Tabel 4.11 Hubungan Jenis Persalinan dengan Lama Menyusui	59
Tabel 4.22 Hubungan Promosi Susu Formula dengan Lama Menyusui	60
Tabel 4.33 Hubungan Teknik Menyusui Ibu dengan Lama Menyusui	61
Tabel 4.44 Hubungan Dukungan Keluarga dengan Lama Menyusui	62
Tabel 4.55 Hubungan Anggota Keluarga Merokok dengan Lama Menyusui.....	63
Tabel 4.66 Hubungan Riwayat <i>Antenatal Care</i> dengan Lama Menyusui	64
Tabel 4.77 Hubungan Usia Ibu dengan Lama Menyusui	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kajian Teori.....	32
Gambar 2.2 Kerangka Konsep.....	33
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	40



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air susu ibu (ASI) adalah makanan yang penting untuk kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. ASI merupakan makanan pokok dan penting untuk memenuhi nutrisi bayi (Hamzah, 2018). ASI menjadi nutrisi yang ideal untuk bayi sebab mengandung beberapa komponen, seperti lipid, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. ASI juga dikenal sebagai cairan hidup karena mengandung komponen bioaktif, faktor pertumbuhan, hormone, sitokin, kemokin, dan imunoglobulin yang merupakan faktor protektif untuk bayi (Bardanzellu *et al.*, 2018).

Faktor protektif dan nutrisi yang terkandung dalam ASI dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian serta menjamin tingkat status gizi yang baik untuk bayi. ASI dapat memproteksi bayi dari beberapa penyakit, baik penyakit infeksi maupun alergi (Kemenkes, 2014). Kandungan asam lemak tidak jenuh pada ASI penting dalam perkembangan otak bayi serta dapat memproteksi bayi dari penyakit infeksi dan alergi (Veghari, *et al* 2011). Sehingga, ASI sangat penting untuk diberikan kepada bayi.

Pemberian ASI merupakan bentuk dari upaya kesehatan primer, sebab berperan dalam membangun sumber daya manusia dengan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, khususnya pada bayi dan anak. Semakin lama pemberian ASI oleh seorang ibu, maka akan meningkatkan jarak untuk kelahiran selanjutnya. Selain itu, bayi yang mendapat ASI sesuai dengan lama pemberian yang dianjurkan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal (Astridya, 2017).

Menurut anjuran Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), lama menyusui yaitu selama 6 bulan secara eksklusif kemudian dilanjutkan dan diberi makanan pendamping sampai anak berusia dua tahun. Ketika diberikan bersama makanan pendamping yang tepat dan adekuat, ASI tetap menjadi sumber nutrisi dan cairan yang penting untuk

pertahanan tubuh bagi anak usia di atas 6 bulan (*World Health Organization*, 2003). Hal ini, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2012 yang menjelaskan mengenai pemberian ASI eksklusif yang dilanjutkan sampai anak berusia dua tahun dan di berikan bersama dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI) (Kementrian Hukum dan HAM RI, 2012).

Dalam ajaran Islam juga telah dijelaskan tentang lama menyusui. Hal ini, terdapat dalam QS Luqman/31 : 14, yaitu :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ وَالْهَيْئَةُ كَمَالٌ إِذْ يُدْرِكُ الْهَيْئَةَ الْبَالِغَةَ وَأُمُّهُ رَضَىٰ ۖ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْحَمْدِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ ۗ ذَٰلِكُمْ يَتَذَكَّرُ لِي وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْقِسْطِ ۗ أَلَيْسَ بِالْمُصِيرِ إِلَىٰ أَمْرٍ ۗ (١٤)

Terjemahnya :

“Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”

Ayat di atas menandakan betapa pentingnya penyususan dilakukan oleh ibu kandung. Tujuan penyusuan ini bukan sekadar untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga untuk menumbuhkembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima. Kata *fi* (di dalam) mengisyaratkan bahwa masa itu (penyapihan di dalam dua tahun) tidak mutlak demikian. Di sisi lain, dalam QS Al-Baqarah/2 : 233 ditegaskan bahwa masa dua tahun adalah bagi siapa yang hendak menyempurnakan penyusuan. Dalam QS Al-Ahqaf/46 : 15 juga menjelaskan bahwa masa mengandung dan menyusui adalah 30 bulan. Sehingga, apabila masa mengandung selama 9 bulan, maka masa menyusui selama 21 bulan. Selain itu, perintah akan pentingnya menyusui anak juga dijelaskan dalam QS Al-Qashash/28 : 7 (Shihab, 2016).

Meski telah dijelaskan dalam Islam dan terdapat dalam peraturan pemerintah, namun di Indonesia sendiri cakupan pemberian ASI pada tahun 2015 hanya sebesar

37,3 % (Riche, 2018), dimana jumlah tersebut masih jauh dari target pemerintah pada tahun 2018 yaitu sebesar 75 %. Hal ini menandakan rendahnya cakupan pemberian ASI di Indonesia. (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Menurut Paramita A dan Pramono MS dalam penelitiannya, terdapat tujuh faktor yang dapat secara signifikan mempengaruhi lama menyusui yaitu, status pendidikan ibu, jumlah balita di dalam rumah, status ekonomi, pemberian MP-ASI sebelum enam bulan, tempat persalinan, pemakaian botol / dot sebelum enam bulan, dan tempat tinggal (Astridya, P. 2017). Penelitian tentang faktor yang berhubungan dengan lama menyusui sangat kurang. Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji faktor lain yang dapat berhubungan secara signifikan terhadap lama menyusui.

Data Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (2016) menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif di beberapa Kabupaten belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan dan belum juga mencapai target dari WHO, dimana pada tahun 2025 pencapaian pemberian ASI eksklusif di dunia mencapai 50%. Data pemberian ASI eksklusif pada tiap-tiap kabupaten adalah Makassar 72,42%, Takalar 56,75%, Jeneponto 67,31%, Barru 70,93%, dan Maros 79,77%. Data tersebut menunjukkan bahwa dua kabupaten dengan pemberian ASI eksklusif terendah adalah kabupaten Jeneponto dan Takalar. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengkaji tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan lama menyusui pada anak di daerah Jeneponto dan Takalar.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian, berdasarkan dari latar belakang dalam penelitian ini yaitu, faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan lama menyusui pada anak di daerah Jeneponto dan Takalar?

C. Hipotesis

1. H_0 : tidak terdapat hubungan antara faktor predisposisi (usia, pekerjaan, pengetahuan, kesehatan ibu, produksi ASI ibu, dan paritas ibu) dengan perilaku lama menyusui.

H_a : terdapat hubungan antara faktor predisposisi (usia, pekerjaan, pengetahuan, kesehatan ibu, produksi ASI ibu, dan paritas ibu) dengan perilaku lama menyusui

2. H_0 : tidak terdapat hubungan antara faktor pemungkin (kesehatan anak, berat bayi saat lahir, jenis persalinan, teknik menyusui, dan promosi susu formula) dengan perilaku lama menyusui.

H_a : terdapat hubungan antara faktor pemungkin (kesehatan anak, berat bayi saat lahir, jenis persalinan, teknik menyusui, dan promosi susu formula) dengan perilaku lama menyusui.

3. H_0 : tidak terdapat hubungan antara faktor penguat (dukungan keluarga, anggota keluarga yang merokok, dan riwayat *antenatal care*) dengan perilaku lama menyusui.

H_a : terdapat hubungan antara faktor penguat (dukungan keluarga, anggota keluarga yang merokok, dan riwayat *antenatal care*) dengan perilaku lama menyusui.

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Table 1.1 Defenisi Operasional

No.	Variabel	Defenisi Operasional	Alat ukur	Cara ukur	Hasil ukur	Skala
Variabel independen						
1.	Usia ibu	Lama hidup sampai ulang tahun terakhir (Kemendikbud, 2016)	Kuesioner	Wawancara	1 = < 20 dan > 35 tahun 2 = 20-35 tahun (Rahmayani, Isgianto and	Rasio

					Wulandari, 2016)	
2.	Pekerjaan	Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan / uang (Kemendikbud, 2016)	Kuesioner	Wawancara	1 = bekerja, jika ibu memiliki pekerjaan lain, seperti PNS, pedagang, dll. 2 = tidak bekerja, jika ibu hanya melakukan tugas pekerjaan rumah tangga	Ordinal
3.	Pengetahuan ibu tentang ASI	Persepsi dan pemahaman ibu tentang ASI berdasarkan hasil kuesioner	Kuesioner	Wawancara	1 = pengetahuan kurang, apabila jumlah skor ≤ 5 2 = Pengetahuan baik, apabila jumlah skor > 5 Skor : - Jawaban benar = 1 - Jawaban salah = 0	Ordinal
4.	Pengetahuan agama	Pengetahuan agama ibu mengenai	Kuesioner	Wawancara	1 = pengetahuan kurang jika jumlah skor ≤ 3	Ordinal

		dalil, lama, dan aturan tentang menyusui menurut pandangan Islam berdasarkan hasil kuesioner			2 = Pengetahuan baik jika jumlah skor > 3 Skor : - Jawaban benar = 1 - Jawaban salah = 0	
5.	Kesehatan ibu	Kondisi fisik ibu yang bebas dari penyakit selama menyusui anaknya (Kemendikbud, 2016)	Kuesioner	Wawancara	1 = sakit, jika ibu mengaku pernah sakit selama menyusui 2 = tidak sakit, jika ibu mengaku tidak pernah sakit selama menyusui	Ordinal
6.	Produksi ASI	ASI yang dihasilkan oleh ibu berdasarkan jawaban yang diberikan	Kuesioner	Wawancara	1 = tidak lancar, jika jumlah jawaban ya \leq 4 2 = lancar, jika jawaban ya > 4 (Simamora MF, 2015)	Ordinal

7.	Paritas ibu	Keadaan banyaknya jumlah anak yang dilahirkan oleh responden sampai saat dilakukan penelitian	Kuesioner	Wawancara	1 = Primipara 2 = Multipara	Nominal
8.	Berat bayi saat lahir	Berat badan bayi saat lahir dalam gram	Kuesioner	Wawancara	1 = BB lahir tidak normal 2 = BB lahir normal	Rasio
9.	Kesehatan anak	Kondisi fisik anak yang bebas dari penyakit selama menyusui (Kemendikbud, 2016)	Kuesioner	Wawancara	1 = sakit, jika ibu mengaku pernah sakit selama menyusui 2 = tidak sakit, jika ibu mengaku tidak pernah sakit selama menyusui	Ordinal
10.	Jenis persalinan	Cara yang digunakan responden	Kuesioner	Wawancara	1 = Operasi Sesar 2 = Spontan	Nominal

		untuk melahirkan anaknya berdasarkan jawaban yang diperoleh dari kuesioner				
11.	Promosi susu formula	Pernah atau tidak ibu mendapat promosi produk susu formula yang diterima menurut pengakuan ibu	Kuesioner	Wawancara	1 = ada promosi susu formula, jika jawaban ya > 1 2 = tidak ada promosi susu formula, jika jawaban ya = 1	Ordinal
12.	Teknik menyusui ibu	Cara atau praktek menyusui yang dilakukan responden saat	Kuesioner	Wawancara	1 = Teknik menyusui kurang, apabila jumlah skor ≤ 5 2 = Teknik menyusui baik, apabila jumlah skor > 5	Ordinal

		menyusui anaknya			Skor : - Jawaban benar = 1 - Jawaban salah = 0	
13.	Dukungan keluarga	Pengaruh positif yang diberikan oleh keluarga berupa anjuran atau perhatian tentang pemberian ASI menurut pengakuan ibu	Kuesioner	Wawancara	1 = tidak mendukung, jika jumlah jawabannya ≤ 4 0 = mendukung, jika jumlah jawabannya > 4	Ordinal
14.	Anggota keluarga yang merokok	Ada atau tidaknya anggota keluarga yang merokok dan berada disekitar ibu saat	Kuesioner	Wawancara	1 = ada anggota keluarga yang merokok jika jawabannya > 1 2 = tidak ada anggota keluarga yang	Ordinal

		menyusui anaknya berdasarkan jawaban yang diperoleh			merokok jika jawaban ya = 0	
15.	Riwayat <i>antenatal care</i>	Riwayat pemeriksaan ibu berupa observasi, edukasi, dan penanganan medik selama kehamilan	Kuesioner	Wawancara	1 = baik, jika jumlah jawaban ya = 1 2 = tidak baik, jika jumlah jawaban ya = 0	Ordinal
Variabel dependen						
1.	Lama menyusui	Lama waktu menyusui anak sejak lahir sampai berhenti menyusui dari ibunya	Kuesioner	Wawancara	1 = < 6 bulan 2 = 6-24 bulan 3 = >24 bulan	Ordinal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini dijelaskan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun. Penelitian ini dilakukan di daerah lingkup kerja Puskesmas Rumbia Kecamatan Rumbia. Subjek dari penelitian ini yaitu ibu yang

memiliki anak usia 1-3 tahun. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian *cross sectional*. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner.

E. Kajian Pustaka

Table 1.2 Kajian Pustaka

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Cara Pengukuran	Hasil
1.	Afnan HS, Joan C, dan Christine K / 2015	<i>Practices of Breastfeeding Among Arab Mothers Living in the United States</i>	Observasional dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	90 orang arab	Survey yang telah dilihat oleh tiga orang ahli masing-masing dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan statistik	86,7 % ibu menyusui anaknya. Alasan utama ibu yaitu, 86,1 % mengatakan bahwa ASI bermanfaat untuk bayi, 74,7 % mengatakan menyusui dianjurkan oleh Islam, dan 39,2 % mengatakan mereka didukung oleh keluarga
2.	Paramita A dan pramono	Analisis Pola dan Faktor	Observasional dengan	Jumlah sampel mengikut	Melalui data Riskesdas	Terdapat 7 faktor yang secara signifikan

	MS / 2015	Lama Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Tahun 2013	pendekatan <i>cross sectional</i>	i jumlah sampel penelitian Riskesdas 2010 (1.371 baduta) dan 2013 (4.632 baduta)	2010 dan 2012	mempengaruhi lama menyusui, yaitu pemberian MP-ASI di bawah usia 6 bulan, status ekonomi, jumlah balita yang ada dalam rumah tangga, tempat persalinan, status pendidikan, tempat tinggal, dan pemakaian botol/dot sebelum 6 bulan
3.	Li Tang, Andy H Lee, Colin W Binns / 2015	<i>Factors associated with breastfeeding duration: a prospective cohort study in Sichuan Province, China</i>	Observasional dengan pendekatan <i>cohort</i> prospektif	695 perempuan	Wawancara kemudian di <i>follow up</i> dengan telepon pada 1, 3, 6, 12 bulan postpartum. Metode yang digunakan untuk menghitung	Durasi rata-rata lama menyusui di provinsi Sichuan, Cina adalah 8 bulan. Hal ini dipengaruhi oleh ibu yang kembali bekerja dalam 6 bulan postpartum, ibu yang melakukan persalinan di rumah sakit dan

					durasi menyusui yaitu, Kaplan meier	diperkenalkan makanan padat. Adapun yang ragu menentukan lama menyusunya rata-rata berhenti dalam 1 tahun.
4.	Giedra Levinienne, dkk / 2013	<i>Factors associated With breastfeeding Duration</i>	Observasional dengan pendekatan cross sectional	195 ibu	Kuesioner	53,8 % ibu dari responden menyusui selama 3-5 bulan, 29,7 % selama 6 bulan ,dan 16,5 % kurang dari 3 bulan. Ibu usia 31-40 tahun lebih lama menyusui anaknya dibanding ibu usia 20 tahun. Status pendidikan perbandingan lurus dengan lama menyusui ibu, ibu yang memberi ASI eksklusif menyusui lebih

						lama dibandingkan yang memberi ASI noneksklusif. Mayoritas ibu dengan luka di putingnya, ASI yang statis, dan mastitis hanya menyusui anaknya lebih dari 3 bulan.
5.	Olang, dkk / 2012	<i>Reasons given by mothers for discontinuing breastfeeding in Iran</i>	Observasional dengan pendekatan retrospektif	63,071 ibu dengan anak usia 0-24 bulan yang dibagi menjadi dua populasi yaitu ibu dengan anak usia kurang dari 6	Kuesioner	Ditemukan beberapa alasan mengapa ibu menghentikan pemberian ASI yaitu: 54% rekomendasi dokter dan 11% anak disusui sampai rata-rata 13,8 bulan, dengan beberapa alasan diantaranya : produksi ASI yang kurang

				<p>bulan dan ibu dengan anak usia 6 bulan ke atas</p>	<p>mencukupi (45%), ibu sakit (10%), anak sakit (6%), dan ibu kembali bekerja (3%).</p> <p>Penggunaan botol susu berkorelasi dengan penghentian pemberian ASI. Sedangkan, usia ibu dan pengetahuan tidak berhubungan secara signifikan. Penggunaan dot dan susu formula/cairan lain dapat meningkatkan berhentinya proses menyusui.</p>
--	--	--	--	---	---

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan lama menyusui pada anak di daerah Jeneponto dan Takalar.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan faktor usia ibu dengan lama menyusui pada anak
- b. Mengetahui hubungan faktor pekerjaan ibu dengan lama menyusui pada anak
- c. Mengetahui hubungan faktor pengetahuan ibu dengan lama menyusui pada anak
- d. Mengetahui hubungan faktor kesehatan ibu dengan lama menyusui pada anak
- e. Mengetahui hubungan faktor produksi ASI ibu dengan lama menyusui pada anak
- f. Mengetahui hubungan faktor paritas ibu dengan lama menyusui pada anak
- g. Mengetahui hubungan faktor berat bayi saat lahir dengan lama menyusui pada anak
- h. Mengetahui hubungan faktor kesehatan anak dengan lama menyusui pada anak
- i. Mengetahui hubungan faktor jenis persalinan dengan lama menyusui pada anak
- j. Mengetahui hubungan faktor promosi susu formula terhadap lama menyusui pada anak
- k. Mengetahui hubungan faktor Teknik menyusui ibu dengan lama menyusui pada anak
- l. Mengetahui hubungan faktor dukungan keluarga terhadap lama menyusui pada anak
- m. Mengetahui hubungan faktor anggota keluarga yang merokok dengan lama menyusui pada anak
- n. Mengetahui hubungan faktor riwayat *antenatal care* dengan lama menyusui pada anak
- o. Mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan lama menyusui pada anak usia

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman dan pembelajaran berharga untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan khususnya dalam bidang penelitian.

2. Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan kepastakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset maupun penelitian selanjutnya dengan variabel yang lebih luas.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat tentang faktor-faktor yang dapat berhubungan dengan lama menyusui pada anak. Sehingga masyarakat dapat lebih peduli untuk menghindari faktor-faktor tersebut demi tercapainya optimalisasi lama pemberian ASI sebagai bentuk upaya kesehatan primer sehingga membantu pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Air Susu Ibu (ASI)

ASI merupakan emulsi lemak yang larut dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang dihasilkan dari kelenjar yang ada dalam payudara ibu (Toto Sudargo, 2018). Air susu ibu menjadi makanan khusus dengan zat gizi kompleks dalam bentuk cair yang diproduksi oleh kelenjar pada payudara ibu setelah melahirkan anaknya (Hull, 2018). ASI mengandung nutrisi yang ideal untuk memenuhi kebutuhan bayi sampai 6 bulan kemudian dapat dilanjutkan hingga bayi mencapai usianya 2 tahun (Toto Sudargo, 2018).

Air susu ibu (ASI) menjadi standar baku emas nutrisi untuk bayi. ASI merupakan nutrisi yang kompleks secara kuantitas dan kualitas dengan beberapa komponen yaitu, air, protein, glukosa, lipid, faktor pertumbuhan, mineral, vitamin, antibody immunoglobulin A, sel leukosit, dan beragam molekul bioaktif (Monks, 2013).

1. Jenis ASI menurut Stadium Laktasi

Menurut waktu produksinya, ASI pada masa laktasi dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu:

a. ASI Kolostrum

ASI yang diproduksi pada hari 1 - 4/5 setelah melahirkan (postpartum) berupa cairan kental kekuningan dengan kandungan lemak, beta karoten, sel darah putih, dan antibody yang dibutuhkan bayi (Wahyuningsih, 2019). Kolostrum mengandung lebih banyak protein, antibody, vitamin larut lemak, dan mineral dibandingkan ASI matur. Namun, lebih sedikit mengandung lemak dan karbohidrat dibandingkan dengan ASI matur. ASI kolostrum ini memiliki volume yang berkisar antara 150 – 300 ml/24 jam dengan total energi hanya 58 kkal/100 ml (Setyawati, 2018).

b. ASI Peralihan

ASI peralihan merupakan ASI yang diproduksi di hari ke-4 sampai ke-10 setelah melahirkan. Pada masa ini, produksi ASI pada payudara ibu mulai stabil dan terjadi peningkatan volume ASI dibandingkan kolostrum. ASI ini memiliki kadar protein yang lebih rendah, namun memiliki kadar lemak dan karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan ASI kolostrum (Setyawati, 2018).

c. ASI Matur

Setelah masa transisi, ASI kemudian menjadi matur dan diproduksi setelah hari ke-10 postpartum berupa cairan putih kekuningan dan mengandung antibodi, hormon, enzim, dan antimikroba. Kadar karbohidrat lebih tinggi dibanding ASI kolostrum, dengan volume 300 – 850 ml/24 jam (Setyawati, 2018).

2. Manfaat Menyusui

Pada negara berkembang, menyusui dapat melindungi bayi dari infeksi, dan mengurangi risiko obesitas serta penyakit metabolik (Monks, 2013). Bayi yang mendapatkan ASI dapat terlindungi dari berbagai penyakit infeksi, otitis media, dan gastroenteritis (Brandtzaeg, 2013). Selain itu menyusui juga bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi (Gluckman *et al.*, 2014). Secara psikologis, menyusui juga bermanfaat untuk anak, yaitu anak menjadi mandiri secara psikologis dan lebih menguasai dirinya secara emosional dibandingkan anak yang diberi susu formula (Lawrence, 2011).

Manfaat menyusui tidak hanya dirasakan oleh bayi, tetapi juga dirasakan oleh ibu. Untuk ibu, ASI bermanfaat dalam mengurangi risiko kanker payudara terutama ibu yang memperpanjang lama menyusuinya. Selain itu, juga dapat meningkatkan ikatan emosional ibu dengan anak (Gluckman *et al.*, 2014). Menyusui lebih dari enam bulan dapat menurunkan risiko kanker payudara dan meningkatkan kadar antibody dalam serum sehingga mencegah infeksi postpartum pada ibu (Barria, 2018) (IDAI, 2010). Menyusui juga mencegah terjadinya perdarahan setelah postpartum dengan merangsang uterus berkontraksi agar kembali ke ukuran seperti semula saat sebelum

hamil. Menyusui sebagai kontrasepsi telah diketahui sebab selama menyusui ovulasi terhambat. Namun, hal ini masih perlu dilakukan kajian lebih (IDAI, 2010).

Selain untuk ibu dan bayinya, menyusui juga bermanfaat untuk keluarga dan negara secara keseluruhan. Keluarga akan menghemat dana untuk pengeluaran sampai ratusan ribu bahkan jutaan untuk membeli susu formula. Angka kematian bayi menurun seiring dengan meningkatnya ibu yang menyusui anaknya sehingga berguna untuk Negara (IDAI, 2010).

3. Lama Pemberian ASI

Pemberian ASI adalah salah satu upaya dalam kesehatan primer dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas. Berikut rekomendasi lama menyusui (Lawrence, 2011).

Table 2.1 Lama Menyusui

	Rekomendasi waktu untuk lama menyusui	
WHO (<i>World Health Organization</i>)	Diberikan hanya ASI sampai bayi berusia 6 bulan	Diteruskan sampai bayi berusia 2 tahun atau dapat lebih
AAP (<i>American Academy of Pediatrics</i>)	Diberikan hanya ASI sampai bayi berusia 6 bulan	Kemudian, diteruskan sampai bayi berusia 1 tahun dan selama ibu dan anak inginkan
AAFP (<i>American Academy of Family Practice</i>)	Diberikan hanya ASI sampai bayi berusia 6 bulan	Kemudian, diteruskan sampai bayi berusia 1 tahun dan atas keinginan satu sama lainnya.
ACOG (<i>American College of</i>	Diberikan hanya ASI sampai bayi berusia 6 bulan	Selama mungkin

<i>Obstetrics and Gynecology</i>)		
<i>Healthy People</i> 2010	75 % saat lahir	25 % saat 6 bulan
<i>Healthy People</i> 2020	Eksklusif selama 6 bulan	Dilanjutkan sampai 1 tahun

Berdasarkan kriteria lama menyusui menurut WHO (*World Health Organization*), lama menyusui pada anak dapat dikategorikan menjadi 4 tingkatan yaitu :

- Kurang, jika lama menyusui anak dalam 0-17 bulan usia anak,
- Sedang, jika lama menyusui anak dalam 18-20 bulan usia anak,
- Baik, jika lama menyusui anak dalam 21-22 bulan usia anak, dan
- Sangat baik jika lama menyusui anak dalam 23-24 bulan usia anak

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam tentang lama menyusui anak, yang terdapat dalam QS Al-Baqarah/2 : 233, yaitu :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۳۳)

Terjemahnya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Para ibu diperintahkan menyusui anaknya sejak lahir hingga berusia dua tahun. Walaupun diperintahkan, menyusui bukanlah suatu kewajiban, melainkan anjuran yang sangat ditekankan seolah merupakan perintah yang wajib dilaksanakan bagi para ibu. Dua tahun adalah batas maksimal untuk menyusui anak, sebab masa tersebut dianggap sempurna oleh Allah (Shihab, 2016). Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa masa penyusuan yang sempurna yaitu selama dua tahun. Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tidak ada penyusuan setelah penyapihan yakni setelah dua tahun. Adapun jika masih ada yang menyusui anaknya setelah dua tahun, maka itu tidak mempunyai pengaruh apapun seperti yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari ad-Darawardi dari Tsaur, dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas (Ibu Katsir, 2016).

Namun, ulama lain berpendapat bahwa diwajibkan kepada kaum ibu baik yang masih berstatus istri maupun yang tertalak, untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Diperbolehkan kurang dari dua tahun jika keduanya memandang ada kemaslahatan. Adapun sebab diwajibkan menyusui bagi ibu, karena air susu ibu merupakan yang terbaik untuk bayi sesuai dengan yang dianjurkan dokter (Maraghi, 1993).

Penjelasan tentang lama menyusui juga terdapat dalam QS Al-Ahqaaf/46 : 15, yaitu :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
 وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥١﴾

Terjemahnya :

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwa masa mengandung setidaknya berlangsung selama enam bulan. Disebutkan bahwa masa mengandung dan masa menyusui (sampai dengan masa saphi) berlangsung selama 30 bulan. Sementara, dalam surat QS Luqman/31 : 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24 bulan), dalam dalam QS Al-Baqarah/2 : 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun penuh. Maka, kalau masa mengandung dan masa menyusui--yaitu 30 bulan--itu dikurangi masa menyusui saja, yaitu 24 bulan, dapat diketahui bahwa masa mengandung adalah enam bulan. Dan hal ini sesuai dengan penemuan ilmiah bahwa seorang bayi yang lahir pada usia kehamilan enam bulan dapat hidup (Shihab, 2016).

B. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Lama Menyusui

1. Usia Ibu

Usia merupakan lama hidup ibu sejak lahir sampai sekarang (Kemendikbud, 2016). Gizaw *et al* dalam penelitiannya, mengatakan bahwa usia ibu berkorelasi dengan status menyusui anak pada 6 bulan pertama kelahirannya (Gizaw *et al*, 2017). Sehingga, usia dapat mempengaruhi lama menyusui pada anak. Pada beberapa penelitian, dikatakan bahwa ibu dengan usia yang lebih tua (> 20 tahun) menyusui anaknya lebih lama dibandingkan ibu dengan usia < 20 tahun (Leviniené *et al.*, 2013). Namun ibu dengan usia >35 tahun memiliki risiko tantangan untuk menyusui dibandingkan dengan ibu yang usianya lebih muda (Soares *et al.*, 2017).

2. Pekerjaan Ibu

Ibu yang banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah akan menambah peningkatan waktu perawatan ibu kepada anaknya secara kompleks (Gizaw *et al*, 2017). Ibu yang memiliki pekerjaan di luar rumah akan meningkatkan peluang pemberian makanan tambahan dalam 3 bulan pertama kelahiran anak yang adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terhentinya pemberian ASI (Tang, Lee and Binns, 2015). Pekerjaan dapat mempengaruhi lama pemberian ASI pada anak, sebab pekerjaan ibu dapat mempengaruhi produksi ASI jika menimbulkan penundaan pemberian ASI kepada anak, stress, dan ketegangan (Hardiani, 2017)

3. Pengetahuan Ibu Tentang ASI

Pengetahuan merupakan faktor penentu dalam terbentuknya perilaku seseorang. Seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuannya. Sehingga, Jika seorang ibu mempunyai pengetahuan yang baik tentang lama pemberian ASI, maka kemungkinan ibu tersebut akan menyusui anaknya sesuai dengan apa yang diketahuinya tentang durasi / lama menyusui (Raharjo, 2014). Ibu dengan pengetahuan tinggi cenderung memberikan anaknya ASI eksklusif dibandingkan dengan ibu yang pengetahuannya cukup dan rendah. Pemberian ASI secara eksklusif dapat meningkatkan durasi atau lama menyusui pada anak (Subur Widiyanto, 2012).

4. Pengetahuan agama ibu tentang ASI

Pengetahuan agama juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lama menyusui ibu. Hal ini sesuai dengan QS Az-Zumar/39 : 9 yaitu :

﴿أَمْ مَنْ هُوَ قُنُوتًا إِذَا نَادَى السَّاجِدِينَ وَنَحْوَهُمْ رُكُوعًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ رُكُوعًا ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِيَ وَسَوْغَاءُ الْعُوقُلِ كَمَا يَجِئُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ لَا يَشْفَعُونَ لَإِخْوَتِهِمْ إِذَا هُمْ فِي عَذَابٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

“Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”.

Kata *ya'lamuun* dalam ayat di atas, beberapa ulama memahaminya sebagai kata yang tidak memerlukan objek. Maksudnya, siapa yang memiliki pengetahuan (apapun pengetahuan itu) pasti tidak sama dengan yang tidak memiliki pengetahuan. Namun, harus digarisbawahi bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud di ayat tersebut yaitu ilmu yang bermanfaat yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuannya itu (Shihab, 2016). Dalam ayat di atas juga dikatakan bahwa tidaklah sama orang yang mengikuti perintah Allah dengan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya yang engetahui perbedaan antara keduanya hanyaah orang yang memiliki inti pemikiran, yaitu akal (Ibnu Katsir, 2016).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Afnan dan Cristine 2015. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa sebesar 74,7 % ibu menyusui anaknya dengan alasan islam menganjurkannya. Sehingga apabila seorang ibu muslim memiliki pengetahuan yang baik tentang lama menyusui, maka ibu tersebut akan melakukan

sesuai dengan apa yang diketahuinya dalam anjuran Islam tentang lama menyusui anak (Saaty, Cowdery and Karshin, 2015).

5. Kesehatan Ibu

Kesehatan ibu merupakan kondisi fisik ibu yang bebas dari penyakit selama menyusui anaknya (Kemendikbud, 2016). Ibu dengan kondisi fisik yang sehat dapat menyusui anaknya lebih lama dibandingkan ibu dengan kondisi fisik yang sakit. Hal ini disebabkan karena, sebagian besar ibu dengan kondisi fisik sakit akan berhenti menyusui anaknya dengan alasan ASI tidak keluar atau sedikit. Sehingga, kesehatan dapat berpengaruh terhadap keputusan dan perilaku ibu untuk menyusui anaknya secara penuh dan mempengaruhi lama menyusui pada anak. Selain itu kondisi fisik ibu dapat mempengaruhi produksi ASI. Hal ini mempunyai dampak terhadap lama pemberian ASI (Abdullah, Maidin and Amalia, 2013).

6. Produksi ASI

Produksi ASI ibu pada hari pertama setelah melahirkan yaitu sekitar 10-100 ml / hari, jika produksi ASI terus bertambah sampai 6 bulan pertama yaitu sekitar 700-800 ml / hari, dikatakan produksi tersebut efektif. Produksi ASI akan menjadi 500-700 ml setelah di atas 6 bulan. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam produksi ASI yaitu usia ibu, status gizi dan kebutuhan nutrisi ibu, dan kondisi kesehatan baik fisik maupun psikis ibu (Rahmawati dan Prayogi, 2017). Produksi ASI berpengaruh dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi. Apabila produksi ASI tidak dapat memenuhi kebutuhan anak atau produksi berkurang maka akan mengakibatkan terhentinya pemberian ASI pada anak. Berdasarkan penelitian oleh *veghari et al*, ketidakcukupan produksi ASI ibu merupakan alasan paling banyak yang dikemukakan oleh ibu untuk menghentikan pemberian ASI yaitu sebesar 30 % (Veghari, et al 2011).

7. Paritas Ibu

Durasi menyusui didefinisikan sebagai waktu (hari) dari lahir sampai ibu benar-benar berhenti memberikan ASI kepada anaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hackman selama 6 bulan, didapatkan perbandingan durasi menyusui

antara ibu primipara dengan ibu multipara dalam periode 6 bulan secara keseluruhan sebanyak 51% ibu primipara berhenti menyusui dengan alasan mengalami kesulitan dalam pengeluaran ASI. Sedangkan ibu multipara sebanyak 66% memenuhi durasi menyusui 6 bulan (Hackman *et al.*, 2015).

8. Berat Bayi Saat Lahir

Berat bayi saat lahir mempengaruhi kemampuan mengisap bayi saat proses menyusui. Bayi dengan berat badan lahir rendah atau kurang dari 2500 gram akan mengalami gangguan koordinasi refleks mengisap menelan dan bernapas. sehingga ibu dengan bayi berat badan lahir rendah cenderung mengalami produksi ASI yang singkat. Hal ini dapat mempengaruhi lama pemberian ASI pada anak.

9. Kesehatan Anak

Kesehatan anak yang dimaksud adalah kondisi fisik anak yang bebas dari penyakit selama masa menyusui (Kemendikbud, 2016). Kesehatan anak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhentinya pemberian ASI pada anak (Ramiro González *et al.*, 2018). Sebuah penelitian yang dilakukan pada 52.637 anak usia di atas 6 bulan, penyakit pada anak merupakan salah satu penyebab ibu berhenti menyusui anaknya. Sehingga penyakit pada anak dapat mempengaruhi lama menyusui anak (Olang *et al.*, 2012). Veghari *et al* dalam penelitiannya mengatakan bahwa, masalah kesehatan anak berperan sebesar 6 % dalam terhentinya pemberian ASI pada anak (Veghari, *et al* 2011).

10. Jenis Persalinan

Pada persalinan dengan sectio caesarea tingkat kecemasan yang dirasakan ibu pada saat persalinan SC lebih tinggi dibandingkan dengan ibu dengan persalinan normal, hal ini diakibatkan oleh karena ibu yang belum pernah mengalami operasi ataupun ketidaktahuan ibu tentang tindakan yang akan dilakukan (Hastuti, 2015). Masalah khusus dalam menyusui bayi datang dari kenyataan bahwa banyak faktor psikogeik atau bahkan rangsangan sistem saraf simpatif umum di seluruh tubuh ibu

dapat menghambat sekresi oksitosin dan akibatnya menekan ejeksi air susu. Seperti yang telah dijelaskan dalam teori sebelumnya, psikologis ibu memiliki efek yang signifikan dalam produksi kolostrum. Pengaturan hipotalamus terhadap sekresi Prolaktin (PRL) terutama menghambat, dan dopamin merupakan faktor penghambat terpenting. Respon emosional seperti rasa tidak percaya diri, konsentrasi yang terlalu tinggi serta rasa cemas akan meningkatkan produksi dopamin. Pengaruh stres dalam persalinan SC juga akan menyebabkan terjadinya blokade terhadap refleks let down. Ini disebabkan adanya pelepasan epinefrin yang akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah alveoli, sehingga oksitosin mengalami hambatan untuk mencapai organ target di mioepitelium (Baskara, 2015). Pemberian anastesi pada saat persalinan juga memberikan efek negatif terhadap proses laktasi.

11. Promosi Susu Formula

Promosi susu formula merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak produsen susu formula dalam memberikan informasi mengenai manfaat dari produknya yang bertujuan untuk membujuk dan mengingatkan konsumen dalam membeli produk susu yang dipromosikan tersebut. Media promosi yang dilakukan adalah iklan diberbagai media dan promosi di beberapa toko. Salain itu, produsen juga mulai ikut berperan aktif dalam berpromosi di rumah sakit dan melalui tenaga kesehatan. Di sisi lain, banyak ibu yang bekerja di kantor, pabrik, atau menjalankan usaha pribadi untuk menambah penghasilan keluarga yang banyak menyita waktu ibu di luar rumah, tertarik untuk memberikan susu formula kepada anaknya. Banyaknya iklan susu formula, membuat ibu-ibu terlebih pada ibu dengan pengetahuan tentang ASI kurang, menganggap bahwa susu formula lebih baik daripada ASI karena lebih praktis dan ekonomis. Berdasarkan penelitian Yumni *et al*, promosi susu formulam dengan pemberian ASI eksklusif berhubungan secara signifikan. Sehingga promosi susu formula dapat mempengaruhi lama menyusui pada anak (Yumni and Wahyuni, 2018).

12. Teknik Menyusui

Teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI pada bayi yang terdiri dari posisi dan pelekatan pada payudara yang tepat. Teknik menyusui merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan pengeluaran ASI secara maksimal. Kenyamanan dalam menyusui bukan hanya terletak pada kenyamanan ibu, melainkan juga pada kenyamanan bayi yang berdampak pada pengeluaran ASI yang maksimal. Kenyamanan dan pengeluaran ASI yang maksimal ini dapat tercipta apabila ibu memiliki teknik menyusui yang baik dan merupakan kunci keberhasilan dalam menyusui. Sehingga Teknik menyusui dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lama menyusui (Rusyanita A, 2017).

13. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga baik dukungan emosional, informasi, instrumental, dan penghargaan merupakan salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif (Suharti Mamangkey, 2018). Semakin besar dukungan keluarga kepada ibu untuk menyusui anaknya, maka semakin besar juga keinginan ibu untuk menyusui anaknya dan semakin lama pula durasi / lama anak menyusu (Sarina, 2017). Pada pelaksanaan pemberian ASI eksklusif, dukungan keluarga dapat menentukan keberhasilan ibu menyusui anaknya. Hal ini disebabkan karena, dukungan keluarga memberikan rasa nyaman kepada ibu sehingga dapat mempengaruhi produksi ASI ibu, membuat ibu nyaman saat menyusui anaknya, dan meningkatkan semangat ibu (Mamuroh and Nurhakim, 2019). Sehingga faktor dukungan keluarga dapat mempengaruhi lama menyusu anak.

14. Anggota Keluarga merokok

Terdapatnya anggota keluarga yang merokok pada ibu yang sedang menyusui dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lama menyusui ibu. Kandungan nikotin rokok dapat menurunkan kadar prolactin sehingga mengurangi produksi ASI. Selain itu, efek vasokonstriksinya dapat mengganggu proses pengeluaran ASI. Paparan

asap rokok juga dapat memberikan efek negative pada praktik menyusui. Paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko infeksi pernapasan yang kemudian dapat mengganggu proses menyusui. Sehingga ibu dengan anggota keluarga yang merokok cenderung memiliki waktu singkat dalam menyusui anaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh lok *et al*, bahwa ibu yang terpapar asap rokok di lingkungan rumah tangganya berisiko besar untuk menghentikan penyusuannya (loke *et al*, 2018).

15. Riwayat *Antenatal Care*

Pemeriksaan *antenatal care* (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan berupa observasi, edukasi, dan penanganan medik serta mengoptimalkan kesehatan mental ibu hamil. Sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, dan pemberian ASI. Riwayat ANC yang baik dapat mempengaruhi pemberian ASI, sebab ibu menjadi tahu tentang pentingnya pemberian ASI kepada anak, cara perawatan payudara untuk produksi ASI yang optimal, serta teknik menyusui yang baik.

C. Kerangka Teori


Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori PRECEDE (*Predisposing, Reinforcing, and Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation*) yang dikembangkan oleh Lawrence Green dan Kreuter tentang faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Di mana ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang yaitu:

1. Faktor predisposisi (*predisposing factor*), merupakan faktor yang memberikan motivasi terhadap perilaku. Adapun yang termasuk dalam faktor ini, antara lain : usia, pekerjaan, pengetahuan, kesehatan ibu, produksi ASI ibu, dan paritas ibu.

2. Faktor pemungkin (*enabling factor*), merupakan faktor yang memungkinkan motivasi atau aspirasi untuk direalisasikan mencakup skill personal dan fasilitas-fasilitas kesehatan. Adapun yang termasuk faktor ini, antara lain : kesehatan anak, berat bayi saat lahir, jenis persalinan, teknik menyusui, dan promosi susu formula.
3. Faktor penguat (*reinforcing factor*), merupakan faktor yang memberikan dukungan untuk perilaku yang dilakukan. Adapun yang termasuk dalam faktor ini, antara lain : dukungan keluarga, anggota keluarga yang merokok, riwayat *antenatal care*, dukungan petugas kesehatan, dan peraturan pemerintah.




Gambar 2.1 Kerangka Teori



D. Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teori penelitian, adapun kerangka konsep penelitian ini yaitu :

Gambar 2.1 Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian observasional

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dua daerah di Sulawesi Selatan, yaitu di Puskesmas Bontomate'ne Kabupaten Jeneponto dan di Puskesmas Bulukunyi Kabupaten Takalar.

C. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Februari 2020

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *cross sectional*, yaitu penelitian yang melakukan observasi atau pengukuran variable pada satu saat tertentu.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah, semua ibu yang mempunyai anak usia 1-3 tahun yang berada pada lokasi penelitian, yaitu Puskesmas Bulukunyi (Takalar) 284 ibu dan Puskesmas Bontomate'ne (Jeneponto) 80 ibu, jadi total populasi penelitian adalah 364 ibu yang mempunyai anak usia 1-3 tahun.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 132 ibu dengan anak usia 1-3 tahun, dengan metode *purposive sampling*, yaitu peneliti mengambil sampel sesuai dengan yang dikehendaki dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut :

a) Kriteria inklusi :

- Ibu yang mempunyai anak usia 1-3 tahun dan bersedia menjadi responden
- Ibu yang beragama Islam
- Ibu yang berdomisili di daerah penelitian

b) Kriteria eksklusi:

- Ibu dengan anak yang menderita cacat lahir
- Ibu yang tidak dapat mengenali huruf

- Ibu yang tidak pernah memberikan ASI pada anaknya
- Ibu yang tidak mengingat berapa lama menyusui anaknya

F. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Kuesioner merupakan salah-satu teknik pengumpulan data primer dengan cara memberi sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti. Adapun kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu responden menjawab pertanyaan dengan jawaban yang telah tersedia. Kuesioner ini juga memuat daftar pertanyaan mengenai informasi pribadi ibu dan anak. Adapun, sebelum melakukan penelitian ini peneliti terlebih dahulu akan menguji validasi untuk menjamin validitas dari kuesioner yang akan digunakan.

Untuk menjamin validitas jawaban responden, maka peneliti memberikan penjelasan lisan secara ringkas dan jelas sebelum melakukan pengisian kuesioner dan memberikan waktu yang cukup kepada responden untuk mengisi kuesioner. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan secara manual pada setiap jawaban.

a. Data usia ibu

Data didapatkan dari pengisian kuesioner usia ibu dengan wawancara langsung.

b. Data pekerjaan ibu

Data didapatkan dari pengisian kuesioner pekerjaan ibu dengan wawancara langsung.

c. Data pengetahuan ibu

Data didapatkan dari pengisian kuesioner pengetahuan agama dan pengetahuan umum ibu tentang menyusui dengan wawancara langsung.

d. Data kesehatan ibu

Data didapatkan dari pengisian kuesioner kesehatan ibu dengan wawancara langsung.

e. Data produksi ASI

Data didapatkan dari pengisian kuesioner produksi ASI ibu dengan wawancara langsung.

f. Data paritas ibu

Data didapatkan dari pengisian kuesioner paritas ibu dengan wawancara langsung.

g. Data berat bayi saat lahir

Data didapatkan dari pengisian kuesioner berat bayi saat lahir dengan wawancara langsung.

h. Data kesehatan anak

Data didapatkan dari pengisian kuesioner kesehatan anak dengan wawancara langsung.

i. Data jenis persalinan

Data didapatkan dari pengisian kuesioner jenis persalinan dengan wawancara langsung.

j. Data promosi susu formula

Data didapatkan dari pengisian kuesioner promosi susu formula dengan wawancara langsung.

k. Data teknik menyusui

Data didapatkan dari pengisian kuesioner teknik menyusui dengan wawancara langsung.

l. Data dukungan keluarga

Data didapatkan dari pengisian kuesioner dukungan keluarga dengan wawancara langsung.

m. Data anggota keluarga merokok

Data didapatkan dari pengisian kuesioner anggota keluarga merokok dengan wawancara langsung.

n. Data riwayat *antenatal care*

Data didapatkan dari pengisian kuesioner *antenatal care* dengan wawancara langsung.

o. Data lama menyusui

Data didapatkan dari pengisian kuesioner lama ibu menyusui anaknya dengan wawancara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari puskesmas di lokasi penelitian, berupa data nama, usia, dan alamat yang tercatat dalam lingkup kerja puskesmas tersebut.

G. Instrumen Penelitian

Instrument yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar kuesioner dan dilakukan dengan wawancara kepada responden.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SPSS (*statistical package for the social sciences*) untuk Windows dengan tahapan :

- a. *Coding*, memeriksa kelengkapan data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasi dan diberi kode.
- b. *Editing*, yaitu penyuntingan data dengan memeriksa kesinambungan dan keseragaman data
- c. *Entry*, yaitu memasukkan data kemudian diolah dengan perangkat lunak pada komputer
- d. *Cleaning*, yaitu melakukan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan. Kemudian hasilnya dianalisis dengan perangkat lunak pada komputer

2. Analisis data

a. Analisis Univariat

Analisis Univariat dilakukan untuk mendeskripsikan atau memperoleh gambaran masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian ini dengan melihat distribusi frekuensi.


b. Analisis Bivariat

Analisis Bivariat menggunakan uji statistic *Chi-square* untuk melihat hubungan antara variabel independen dan dependen.

Analisi data pada penelitian ini dengan menggunakan Statistical for Social Science (SPSS) yaitu uji Chi Square untuk menguji hipotesis dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel.

I. Alur Penelitian

Gambar 3.1 Alur Penelitian



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Kab. Takalar dan Kab. Jeneponto mulai tanggal 10 Januari sampai 10 Februari sampel dalam penelitian ini berjumlah 132. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observasional* dengan pendekatan *cross sectional*. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat berhubungan dengan lama menyusui anak. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS, yang terlebih dahulu dilakukan analisis univariat kemudian dilanjutkan analisis bivariat dengan uji *crosstab* untuk melihat nilai *Chi-Square*, tetapi apabila kriteria uji *Chi-Square* tidak terpenuhi maka akan dilihat nilai *Fisher's Exact Test*.

1. Analisis univariat

Analisis univariat adalah langkah awal yang perlu dilakukan peneliti untuk mengetahui gambaran data yang telah dikumpulkan. Analisis univariat bertujuan untuk mendeskripsikan karakter masing-masing variabel yang diteliti. Analisis ini juga untuk menyederhanakan kumpulan hasil pengukuran sehingga data-data tersebut menjadi informasi yang berguna (Hastono, 2006). Analisis ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dari masing-masing variabel yang diteliti baik dependen maupun independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah usia ibu, pekerjaan, pengetahuan ibu tentang ASI, pengetahuan agama ibu, kesehatan ibu, produksi ASI ibu, parita, berat bayi saat lahir, kesehatan anak, jenis persalinan, promosi susu formula, teknik menyusui, dukungan keluarga, anggota keluarga merokok, dan riwayat *antenatal care*. Berikut ini merupakan hasil analisis univariat gabungan dari semua variabel yang diteliti.

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Karakteristik	n (%)
Usia	
< 20 Tahun	5(3,8%)
>35 Tahun	29(22%)
20 – 35 Tahun	98(74,2%)
Pekerjaan	
Bekerja	21(15,9%)
Tidak Bekerja	111(84,1%)
Pengetahuan ASI	
Kurang	7(5,3%)
Baik	125(94,7%)
Pengetahuan Agama	
Kurang	41(31,1%)
Baik	91 (68,9%)
Kesehatan Ibu	
Sakit	99(75%)
Tidak Sakit	33(25%)
Produksi ASI	

Tidak Lancar	9(6,8%)
Lancar	123(93,2%)
Paritas	
Primipara	36(27,3%)
Multipara	96(72,7%)
BB Anak Saat Lahir	
Tidak Normal	7(5,3%)
Normal	125(94,7%)
Kesehatan Anak	
Sakit	116(87,9%)
Tidak Sakit	16(12,1%)
Jenis Persalinan	
Sesar	15(11,4%)
Normal	117(88,6%)
Promosi Susu Formula	
Ada Rpromosi	32(24,2%)
Tidak Ada Promosi	100(75,8%)
Teknik Menyusui	
Tidak Baik	39(29,5%)

Baik	93(70,5%)
Dukungan Keluarga	
Tidak Mendukung	1(0,8%)
Mendukung	131(99,2%)
Anggota Keluarga Merokok	
Ada	107(81,1%)
Tidak Ada	25(18,9%)
Riwayat ANC	
Tidak Baik	64(48,5%)
Baik	68(51,5%)
Lama Menyusui	
< 6 Bulan	11(8,3%)
6 – 24 Bulan	119(90,2%)
> 24 Bulan	2(1,5%)
Total	132(100%)

Sumber: Hasil Analisis Statistik 2020

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui, Usia ibu dikategorikan menjadi 3 yaitu usia <20 tahun, >35 tahun, dan 20-35 tahun. Diantara 132 responden, terdapat 5 (3,8%) yang berusia <20 tahun, 29(22%) responden yang berusia >35 dan 98 responden (74,2%) yang berusia 20-35 tahun. Untuk pekerjaan, dibagi menjadi 2 kategori yaitu bekerja dan tidak bekerja. Terdapat 21 responden (15,9%) yang dikategorikan

bekerja dan 111 responden (84,1%) yang tidak bekerja. Pengetahuan ibu dikategorikan menjadi 2 yaitu pengetahuan kurang dan pengetahuan baik. Untuk pengetahuan ibu tentang ASI, 7 responden (5,3%) yang memiliki pengetahuan kurang dan 125 responden (94,7%) yang memiliki pengetahuan baik. Sedangkan untuk pengetahuan agama terdapat 41 responden (31,1%) yang memiliki pengetahuan kurang dan 91 responden (68,9%) yang memiliki pengetahuan baik. Kesehatan ibu dikategorikan menjadi 2 yaitu sakit dan tidak sakit. Terdapat 99 responden (75%) yang pernah sakit selama menyusui anaknya dan 33 responden (25%) yang tidak pernah sakit selama menyusui anaknya. Produksi ASI dikategorikan menjadi 2 yaitu lancar dan tidak lancar. Sebagian besar dari 132 responden yaitu 123 (93,2%) responden memiliki produksi ASI yang lancar dan 9 (6,8%) responden yang memiliki produksi ASI tidak lancar. Paritas ibu dikategorikan menjadi 2 yaitu primipara dan multipara. 36 (27,3%) responden dikategorikan primipara atau telah melahirkan 1 kali dan 96 (72,7%) responden dikategorikan multipara atau telah melahirkan 2 kali atau lebih.

Berat saat lahir dikategorikan menjadi 2 yaitu berat lahir normal dan berat lahir tidak normal. Diantara 132 responden, sebagian besar yaitu sebanyak 125 responden (94,7%) yang mempunyai anak dengan berat saat lahir normal dan 7 responden (5,3%) yang mempunyai anak dengan berat saat lahir tidak normal. Kesehatan anak dikategorikan menjadi 2 yaitu sakit dan tidak sakit. Diantara 132 responden sebagian besar yaitu 116 responden (87,9%) yang mempunyai anak yang pernah sakit selama pemberian ASI dan 16 responden (12,1%) yang mempunyai anak yang tidak pernah sakit selama masa pemberian ASI. Jenis persalinan dibagi menjadi 2 kategori yaitu normal dan sesar. Sebagian besar dari total responden (132) yaitu sebanyak 117 responden (88,6%) yang melahirkan secara normal dan 15 responden (11,4%) yang melahirkan secara sesar. Promosi susu formula dikategorikan menjadi ada atau tidak adanya promosi. Sebanyak 100 responden (75,8%) yang tidak mendapat promosi susu formula dari tenaga kesehatan dan 32 responden (24,2%) yang mendapat promosi susu formula. Teknik menyusui dibagi menjadi 2 kategori yaitu baik dan tidak baik.

Diantara 132 responden, Sebanyak 93 (70,5%) responden memiliki teknik menyusui yang baik sedangkan 39 (24,2%) responden memiliki teknik menyusui yang tidak baik.

Dukungan keluarga dibagi menjadi 2 kategori yaitu mendukung dan tidak mendukung. Diantara 132 responden hampir semua responden yaitu sebanyak 131 (99,2%) responden yang mendapat dukungan dari keluarganya selama masa pemberian ASI dan hanya 1 (0,8%) responden yang tidak mendapat dukungan dari keluarga. Anggota keluarga yang merokok dikategorikan menjadi 2 yaitu ada dan tidak ada. Sebagian besar yaitu 107 (81,1%) responden yang mempunyai anggota keluarga yang merokok dan tinggal dalam rumah yang sama sedangkan sebanyak 25 (18,9%) responden yang tidak memiliki anggota keluarga yang merokok. Riwayat *antenatal care* dikategorikan menjadi 2 yaitu baik dan tidak baik. Sebanyak 68 (51,5%) responden memiliki riwayat *antenatal care* yang baik dan 64 (48,5%) responden memiliki riwayat *antenatal care* yang tidak baik.

Lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori, yaitu <6 bulan, 6–24 bulan, dan >24 bulan. Berdasarkan tabel 4.1, ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan sebanyak 11 responden (8,3%), sebanyak 119 responden (90,2%) yang menyusui anaknya selama 6–24 bulan, dan sebanyak 2 responden (1,5%) menyusui anaknya selama 23-24 bulan atau lebih.

2. Analisis bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel dependen dan independen. Analisis ini menggunakan *crosstab* dengan melihat nilai *Chi square*. Namun, apabila kriteria *Chi square* tidak terpenuhi maka akan dilihat nilai *p Fisher's Exact Test*. Berikut ini tabel gabungan analisis bivariat hubungan antara variabel independen (usia ibu, pekerjaan ibu, pengetahuan ASI, pengetahuan agama, kesehatan ibu, produksi ASI, paritas ibu, berat bayi saat lahir, kesehatan anak, jenis persalinan, promosi susu formula, teknik menyusui ibu, dukungan keluarga, anggota keluarga merokok, dan riwayat *antenatal care*) dengan variabel dependen (lama menyusui).

a. Hubungan Usia Ibu dengan Lama Menyusui

Tabel 4.2 Hubungan Usia Ibu dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
Usia					
<20 tahun	1(20%)	4(80%)	0(0%)	5(3,8%)	0,157
>35 tahun	4(13,8%)	24(82,8%)	1(3,4%)	29(74,2%)	
20-35 tahun	6(6,1%)	91(92,9%)	1(1%)	98(74,2%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	2(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.2 menunjukkan hasil analisis hubungan usia ibu dengan lama menyusui. Usia dibagi menjadi 3 kategori yaitu usia <20 tahun, >35 tahun, dan kelompok usia 20-35 tahun. Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-24 bulan, dan >24 bulan. Untuk kelompok usia <20 tahun, dari 132 responden terdapat 1(20%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan dan 4(80%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan. Untuk kelompok >35 tahun, terdapat 4(13,8%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 24(82,8%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 1(3,4%) ibu yang menyusui selama >24 bulan. Sedangkan untuk kelompok usia 20-35 tahun, sebanyak 6(6,1%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 91(92,9%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 1(1%) ibu yang menyusui selama >24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun mayoritas usia sampel pada penelitian ini yaitu usia 20-35 tahun sebanyak 98(74,2%).

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 0,157 > \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 diterima yang berarti tidak terdapat hubungan antara usia ibu dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

b. Hubungan Pekerjaan Ibu dengan Lama Menyusui

Tabel 4.3 Hubungan Pekerjaan Ibu dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
Pekerjaan					
Bekerja	3(14,3%)	17(81%)	1(4,3%)	21(15,9%)	0,180
Tidak bekerja	8(7,2%)	102(91,9%)	1(0,9%)	111(84,1%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	1(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.3 menunjukkan hasil analisis hubungan pekerjaan ibu dengan lama menyusui. Pekerjaan dibagi menjadi 2 kategori yaitu bekerja dan tidak bekerja. Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-24 bulan, dan >24 bulan. Untuk kategori ibu yang bekerja, dari 132 responden terdapat 3(14,3%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 17(81%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 1(4,3%) ibu yang menyusui selama >24 bulan. Sedangkan kategori ibu yang tidak bekerja, sebanyak 8(7,2%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 102(91,8%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 1(0,9%) ibu yang menyusui selama >24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini tidak bekerja dengan jumlah 111(84,1%) dari 132 sampel.

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 0,180 > \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 diterima yang berarti tidak terdapat hubungan antara pekerjaan ibu dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

c. Hubungan Pengetahuan ASI ibu dengan Lama menyusui

Tabel 4.4 Hubungan Pengetahuan ASI Ibu dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
Pengetahuan ASI					
Kurang	1(14,3%)	6(85,7%)	0(0%)	7(5,3%)	0,525
Baik	10(8%)	113(90,4%)	2(1,6%)	125(94,7%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	2(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.4 menunjukkan hasil analisis hubungan pengetahuan ASI ibu dengan lama menyusui. Pengetahuan ibu dibagi menjadi 2 kategori yaitu kurang dan baik. Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-24 bulan, dan >24 bulan. Untuk kategori ibu dengan pengetahuan kurang, dari 132 responden terdapat 1(14,3%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan dan 6(85,7%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan. Sedangkan kategori ibu dengan pengetahuan ASI yang baik, didapatkan sebanyak 10(8%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 113(90,4%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 2(1,6%) ibu yang menyusui selama >24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini memiliki pengetahuan ASI yang baik dengan jumlah 125(94,7%) dari 132 sampel.

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 0,525 > \alpha = 0,5$. Sehingga H_0 diterima yang berarti tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ASI ibu dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

d. Hubungan Pengetahuan Agama Ibu dengan Lama Menyusui

Tabel 4.5 Hubungan Pengetahuan Agama Ibu dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
Pengetahuan agam					
Kurang	1(2,4%)	40(97,6%)	0(0%)	41(31,1%)	0,250
Baik	10(11%)	79(86,8%)	2(2,2%)	91(68,9%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	2(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.5 menunjukkan hasil analisis hubungan pengetahuan agama ibu dengan lama menyusui. Pengetahuan agama ibu dibagi menjadi 2 kategori yaitu pengetahuan baik dan pengetahuan kurang. Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-24 bulan, dan >24 bulan. Untuk kategori ibu dengan pengetahuan agama yang kurang, dari 132 responden didapatkan 1(2,4%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan dan 40(97,6%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan. Sedangkan kategori ibu dengan pengetahuan agama yang baik, didapatkan sebanyak 10(11%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 79(86,8%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 2(2,2%) ibu yang menyusui selama >24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini memiliki pengetahuan agama yang baik dengan jumlah 91(68,9%) dari 132 sampel.

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 0,250 > \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 diterima yang berarti tidak terdapat hubungan antara pengetahuan agama ibu dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

e. Hubungan Kesehatan Ibu dengan Lama Menyusui

Tabel 4.6 Hubungan Kesehatan Ibu dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
Kesehatan ibu					
Sakit	5(5,1%)	93(93,9%)	1(1%)	99(75%)	0,021
Tidak sakit	6(18,2%)	26(78,8%)	1(3%)	33(25%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	2(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.6 menunjukkan hasil analisis hubungan kesehatan ibu dengan lama menyusui. Kesehatan ibu dibagi menjadi 2 kategori yaitu sakit dan tidak sakit. Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-24 bulan, dan >24 bulan. Untuk kategori ibu yang pernah sakit selama menyusui anaknya, dari 132 responden didapatkan 5(5,1%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 93(93,9%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 1(1%) ibu yang menyusui anaknya >24 bulan. Sedangkan kategori ibu yang tidak pernah sakit, didapatkan sebanyak 6(18,2%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 26(78,8%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 1(3%) ibu yang menyusui selama >24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%)

responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini memiliki riwayat sakit pada masa menyusui dengan jumlah 99(75%) dari 132 sampel.

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 0,021 < \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kesehatan ibu dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

f. Hubungan Produksi ASI Ibu dengan Lama Menyusui

Tabel 4.7 Hubungan Produksi ASI Ibu dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
Produksi ASI					
Lancar	6(4,9%)	115(93,5%)	2(1,6%)	123(93,2%)	0,000
Tidak lancar	5(55,6%)	4(44,4%)	0(0%)	9(6,8%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	2(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.7 menunjukkan hasil analisis hubungan produksi ASI ibu dengan lama menyusui. Produksi ASI ibu dibagi menjadi 2 kategori yaitu lancar dan tidak lancar. Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-24 bulan, dan >24 bulan. Untuk kategori ibu dengan produksi ASI lancar, dari 132 responden didapatkan 6(4,9%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 115(93,5%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 2(1,6%) ibu yang menyusui anaknya >24 bulan. Sedangkan ibu dengan produksi ASI yang tidak lancar, didapatkan sebanyak 5(55,6%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan dan 4(44,4%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%)

responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini memiliki produksi ASI lancar dengan jumlah 123(93,2%) dari 132 sampel.

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 0,000 < \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara produksi ASI ibu dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

g. Hubungan Paritas Ibu dengan Lama Menyusui

Tabel 4.8 Hubungan Paritas Ibu dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
Paritas					
Primipara	2(5,6%)	33(91,7%)	1(2,8%)	36(27,3%)	0,515
Multipara	9(9,4%)	86(89,6%)	1(1%)	96(72,7%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	2(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.8 menunjukkan hasil analisis hubungan paritas ibu dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun. Paritas ibu dibagi menjadi 2 kategori yaitu primipara dan multipara. Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-24 bulan, dan >24 bulan. Untuk kategori ibu primipara, dari 132 responden didapatkan 2(5,6%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 33(91,7%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 1(2,8%) ibu yang menyusui anaknya >24 bulan. Sedangkan pada kategori ibu multipara, didapatkan sebanyak 9(9,4%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 86(89,6%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 1(1%) ibu yang menyusui anaknya >24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya

selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini berdasarkan status paritasnya yaitu multipara (ibu yang telah melahirkan 2 kali atau lebih) dengan jumlah 96(72,7%) dari 132 sampel.

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 0,515 > \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 diterima yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peritas ibu dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

h. Hubungan Berat Lahir Anak dengan Lama Menyusui

Tabel 4.9 Hubungan Berat Lahir Anak dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
BB anak saat lahir					
Tidak normal	2(28,6%)	5(71,4%)	0(0%)	7(5,3%)	0,201
Normal	9(7,2%)	114(91,2%)	2(1,6%)	125(94,7%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	2(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.9 menunjukkan hasil analisis hubungan berat lahir anak dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun. Berat lahir anak dibagi menjadi 2 kategori yaitu berat lahir normal dan berat lahir tidak normal. Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-24 bulan, dan >24 bulan. Untuk kategori ibu yang mempunyai anak dengan berat badan tidak normal saat lahir, dari 132 responden didapatkan 2(28,6%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan dan 5(71,4%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan. Sedangkan pada kategori ibu yang mempunyai anak dengan berat badan tidak normal saat lahir, didapatkan sebanyak 9(7,2%) ibu yang

menyusui anaknya selama <6 bulan, 114(91,2%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 2(1,6%) ibu yang menyusui anaknya >24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini memiliki anak yang berat badan saat lahirnya normal dengan jumlah 125(94,7%) dari 132 sampel.

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 0,201 > \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 diterima yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan anak saat lahir dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

i. Hubungan Kesehatan Anak dengan Lama Menyusui

Tabel 4.10 Hubungan Kesehatan Anak dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
Kesehatan anak					
Sakit	3(2,6%)	111(95,7%)	2(1,7%)	116(87,9%)	0,000
Tidak sakit	8(50%)	8(50%)	0(0%)	16(12,1%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	2(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.10 menunjukkan hasil analisis hubungan kesehatan Anak dengan lama menyusui. Kesehatan anak dibagi menjadi 2 kategori yaitu sakit dan tidak sakit. Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-24 bulan, dan >24 bulan. Untuk kategori ibu dengan anak yang pernah sakit selama masa menyusui, dari 132 responden didapatkan 3(2,6%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 111(95,7%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 2(1,7%) ibu yang menyusui

anakanya >24 bulan. Sedangkan pada kategori ibu yang dengan anak yang tidak pernah sakit selama masa menyusui, didapatkan sebanyak 8(50%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan dan 8(50%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini memiliki anak yang pernah sakit pada masa menyusui dengan jumlah 116(87,9%) dari 132 sampel.

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 0,000 < \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kesehatan anak dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

j. Hubungan Jenis Persalinan dengan Lama Menyusui

Tabel 4.11 Hubungan Jenis Persalinan dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
Jenis persalinan					
Sesar	5(33,3%)	10(66,7%)	0(0%)	15(11,4%)	0,004
Normal	6(5,1%)	109(93,2%)	2(1,7%)	117(88,6%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	2(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.11 menunjukkan hasil analisis hubungan jenis persalinan dengan lama menyusui. Jenis persalinan dibagi menjadi 2 kategori yaitu normal/spontan dan sesar. Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-24 bulan, dan >24 bulan. Untuk kategori ibu dengan jenis persalinan sesar, dari 132 responden

didapatkan 5(33,3%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan dan 10(66,7%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan. Sedangkan pada kategori ibu dengan jenis persalinan normal, didapatkan sebanyak 6(5,1%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 109(93,2%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 2(1,7%) ibu yang menyusui anaknya >24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini memiliki riwayat persalinan terakhirnya secara normal dengan jumlah 117(88,6%) dari 132 sampel.

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 0,004 > \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara jenis persalinan ibu dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

k. Hubungan Promosi Susu Formula dengan Lama Menyusui

Tabel 4.12 Hubungan Promosi Susu Formula dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
Promosi susu formula					
Ada	7(21,9%)	25(78,1%)	0(0%)	32(24,2%)	0,005
Tidak ada	4(4%)	94(94%)	2(2%)	100(75,8%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	2(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.12 menunjukkan hasil analisis hubungan promosi susu formula dengan lama menyusui. Promosi susu formula dibagi menjadi 2 kategori yaitu ada promosi dan tidak ada. Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-

24 bulan, dan >24 bulan. Untuk kategori ibu yang mendapat susu formula, dari 132 responden didapatkan 7(21,9%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan dan 25(78,1%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan. Sedangkan pada kategori ibu yang tidak mendapat promosi susu formula, didapatkan sebanyak 4(4%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 94(94%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 2(2%) ibu yang menyusui anaknya >24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini tidak mendapat promosi susu formula dengan jumlah 100(75,8%) dari 132 sampel.

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 0,005 < \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara promosi susu formula dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

1. Hubungan Teknik Menyusui Ibu dengan Lama Menyusui

Tabel 4.13 Hubungan Teknik Menyusui dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
Teknik menyusui					
Tidak baik	7(17,9%)	32(82,1%)	0(0%)	39(29,5%)	0,021
Baik	4(4,3%)	87(92,5%)	2(2,2%)	93(70,5%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	2(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.13 menunjukkan hasil analisis hubungan teknik menyusui dengan lama menyusui. Teknik menyusui dibagi menjadi 2 kategori yaitu baik dan tidak baik.

Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-24 bulan, dan >24 bulan. Untuk kategori ibu dengan Teknik menyusui yang baik, dari 132 responden didapatkan 7(17,9%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan dan 32(82,1%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan. Sedangkan pada kategori ibu dengan Teknik menyusui yang tidak baik, didapatkan sebanyak 4(4,3%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 87(92,5%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 2(2,2%) ibu yang menyusui anaknya >24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini memiliki teknik menyusui yang baik dengan jumlah 93(70,5%) dari 132 sampel.

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 0,021 < \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara teknik menyusui dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

m. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Lama Menyusui

Tabel 4.14 Hubungan Dukungan Keluarga dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
Dukungan keluarga					
Tidak mendukung	0(0%)	1(0,8%)	0(0%)	1(,8%)	1,000
Mendukung	11(8,4%)	118(90,1%)	2(1,5%)	131(99,2%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	2(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.14 menunjukkan hasil analisis hubungan dukungan keluarga dengan lama menyusui. Dukungan keluarga dibagi menjadi 2 kategori yaitu mendukung dan tidak mendukung. Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-24 bulan, dan >24 bulan. Hanya terdapat 1(0,8%) ibu yang tidak mendapat dukungan dari keluarga dan menyusui anaknya selama <6 bulan. Sedangkan sebagian besar lainnya mendapat dukungan dari keluarga selama masa menyusui, diantaranya 11(8,4%) ibu menyusui anaknya selama <6 bulan, 118(90,1%) ibu menyusui selama 6-24 bulan, dan 2(1,5%) ibu menyusui anaknya >24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini mendapat dukungan dari keluarganya pada masa menyusui dengan jumlah 131(99,2%) dari 132 sampel.

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 1,000 > \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 diterima yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

n. Hubungan Anggota Keluarga yang Merokok dengan Lama Menyusui

Tabel 4.15 Hubungan Anggota Keluarga yang Merokok dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
Keluarga merokok					
Ada	5(4,7%)	101(94,4%)	1(0,9%)	107(81,8%)	0,003
Tidak ada	6(24%)	18(72%)	1(4%)	25(18,9%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	2(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.15 menunjukkan hasil analisis hubungan anggota keluarga yang merokok dengan lama menyusui. Variabel anggota keluarga yang merokok dibagi menjadi 2 kategori yaitu ada dan tidak ada. Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-24 bulan, dan >24 bulan. Untuk kategori ibu dengan anggota keluarga yang merokok, dari 132 responden didapatkan 5(4,7%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 101(94,4%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 1(0,9%) ibu yang menyusui anaknya >24 bulan. Sedangkan pada kategori ibu yang tidak memiliki anggota keluarga yang merokok, didapatkan sebanyak 6(24%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 18(72%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 1(4%) ibu yang menyusui anaknya >24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini memiliki anggota keluarga yang merokok dengan jumlah 107(81,8%) dari 132 sampel.

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 0,003 < \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara anggota keluarga yang merokok dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

o. Hubungan Riwayat *Antenatal Care* dengan Lama Menyusui

Tabel 4.16 Hubungan Riwayat ANC dengan Lama Menyusui

Variabel	Lama Menyusui			Total n=132	Nilai p
	<6 bulan	6-24 bulan	>24 bulan		
Riwayat ANC					
Tidak baik	1(1,6%)	63(98,4%)	0(0%)	64(48,5%)	0,013
Baik	10(14,7%)	56(82,4%)	2(2,9%)	68(51,5%)	
Total n=132	11(8,3%)	119(90,2%)	2(1,5%)	132(100%)	

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel 4.16 menunjukkan hasil analisis hubungan riwayat ANC dengan lama menyusui. Variabel Riwayat ANC dibagi menjadi 2 kategori yaitu ada dan tidak ada. Sedangkan lama menyusui dibagi menjadi 3 kategori yaitu <6 bulan, 6-24 bulan, dan >24 bulan. Untuk kategori ibu dengan riwayat ANC yang baik, dari 132 responden didapatkan 10(14,7%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan, 56(82,4%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan, dan 2(2,9%) ibu yang menyusui anaknya >24 bulan. Sedangkan pada kategori ibu dengan riwayat ANC yang tidak baik, didapatkan sebanyak 1(1,6%) ibu yang menyusui anaknya selama <6 bulan dan 19(98,4%) ibu yang menyusui selama 6-24 bulan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini memiliki riwayat ANC yang baik dengan jumlah 68(51,5%) dari 132 sampel.

Hasil uji statistik didapatkan bahwa nilai $p = 0,013 < \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat ANC dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun.

B. Pembahasan

1. Hubungan Usia Ibu dengan Lama Menyusui

Usia adalah lama waktu hidup seseorang sejak dilahirkan (KBBI,2016). Kelompok usia terbanyak dalam penelitian ini yaitu usia 20-35 tahun. Usia ibu antara 20-35 tahun dianggap sebagai usia dewasa muda yang mempunyai organ reproduksi yang matang dan berkaitan dengan lancarnya produksi ASI sehingga diduga pada usia tersebut merupakan usia yang ideal dalam pemberian ASI.

Adapun pada usia <20 tahun dikaitkan dengan kondisi psikologis ibu yang belum siap mempunyai anak dan organ reproduksi yang belum matang. Sedangkan untuk usia >35 tahun dikaitkan dengan penurunan fungsi organ reproduksi. Berdasarkan hasil uji statistik pada penelitian ini, didapatkan nilai $p = 0,157$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan lama menyusui anak usia 1-3 tahun.

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gizaw *et al* (2017) dimana terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan status menyusui ibu. Menurut Leviene *et al* (2013) dan Soares *et al* (2017) ibu dengan usia > 20 tahun menyusui anaknya lebih lama dibandingkan ibu usia < 20 tahun, namun ibu usia >35 tahun berisiko memiliki tantangan untuk menyusui dibandingkan ibu usia yang lebih muda. Perbedaan hasil yang ditemukan dari penelitian ini, kemungkinan disebabkan oleh perbedaan jumlah sampel, ras, dan lokasi penelitian.

Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riche *et al* (2018) tentang pemberian ASI di Tanah Merah Kabupaten Tangerang dengan jumlah sampel sebanyak 93 ibu. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antar usia dengan pemberian ASI dengan nilai $p = 0,500$. Selain itu, Penelitian lain juga yang dilakukan di Puskesmas Kaluku Baddoa

Kecamatan Tallo Kota Makassar oleh Abdullah *et al* (2013) tentang lama pemberian ASI secara penuh, mengatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan lama pemberian ASI secara penuh (Abdullah, Maidin and Amalia, 2013). Penelitian lain yang dilakukan oleh Septiani *et al* (2017) mengatakan bahwa usia ibu tidak dapat dihubungkan dengan lama menyusui. Sebab untuk tercapainya proses menyusui yang ideal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari ibu sendiri. Namun, ada hal lain yang juga dapat mempengaruhi lama menyusui seperti kondisi kesehatan anak dan dukungan keluarga (Septiani *et al.*, 2017).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa usia bukan menjadi satu-satunya faktor yang berhubungan dengan lama menyusui anak. Namun, terdapat faktor lain yang berhubungan dengan lama menyusui anak, seperti faktor produksi ASI, kesehatan ibu dan anak, dan teknik menyusui ibu yang ditemukan dalam hasil penelitian ini secara signifikan berhubungan.

2. Hubungan Pekerjaan Ibu dengan Lama Menyusui

Pekerjaan ialah sekumpulan kedudukan atau posisi yang memiliki persamaan kewajiban dan tugas-tugas pokok. Istilah pekerjaan digunakan untuk tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk uang. Di Indonesia, waktu bekerja adalah selama 8 jam yang artinya ibu tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusui (Bulan, Months and Hardiani, 2017).

Hasil uji statistik dalam penelitian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status bekerja ibu dengan lama menyusui. hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2017) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status bekerja dengan lama menyusui dengan nilai OR = 0,396, hal ini menunjukkan bahwa ibu yang tidak bekerja berpeluang sebesar 0,396 lebih besar untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada anaknya dibandingkan ibu yang bekerja (Bahriyah, Putri and Jaelani, 2017).

Namun, penelitian ini sejalan oleh penelitian yang dilakukan Simanungkalit (2018) dengan nilai $p = 0,976$ yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan ibu dengan pemberian ASI (Simanungkalit, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani (2016) didapatkan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara status pekerjaan ibu dengan pemberian ASI ($p = 0,72$) (Rahmayani, 2016).

Adapun proses menyusui tidak hanya dapat dilihat dari status pekerjaan ibu. Faktor lain disebutkan memiliki dampak terhadap proses menyusui adalah niat ibu dalam proses menyusui yang diperoleh dari stimulus lingkungan. Niat adalah kehendak atau keinginan dalam hati seseorang terhadap keinginannya melakukan sesuatu perilaku. Terdapat dua penentu dasar terhadap niat seseorang yaitu sikap dan norma subyektif (Yusrina and Devy, 2017).

Norma subyektif biasanya berasal dari faktor sosial yang menghasilkan tekanan sosial terhadap ibu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku yang bersumber dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan lingkungan sosial terkait proses menyusui. Hal tersebut dapat mempengaruhi ibu menyusui terhadap lama menyusui ibu kepada anak sekalipun ibu tersebut berstatus pekerja (Yusrina and Devy, 2017).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa status pekerjaan ibu yang menyebabkan kurangnya atau tidak adanya waktu ibu untuk menyusui anaknya bukan menjadi satu-satunya faktor yang berhubungan dengan lama menyusui anak. namun, terdapat faktor lain yang berhubungan yaitu salah satunya produksi ASI. Apabila produksi ASI ibu lancar, ibu dapat memompa ASI dan menyimpannya untuk diberikan kepada anak selama waktu kerja ibu. Selain itu, juga terdapat banyak fasilitas menyusui untuk ibu yang bekerja sehingga meskipun ibu bekerja tetap dapat memberikan ASI kepada anaknya selama yang dianjurkan untuk menyusui.

3. Hubungan Pengetahuan ibu dengan Lama menyusui

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan lama menyusui. Hal ini tidak sesuai dengan teori bahwa pengetahuan merupakan faktor penentu dalam terbentuknya perilaku seseorang. Hal ini dapat disebabkan karena, dalam proses menyusui, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi lama menyusui. Sehingga, terdapat faktor lainnya yang dapat mempengaruhi lama pemberian ASI pada anak walaupun ibu memiliki tingkat pengetahuan yang baik. Hal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) bahwa pengetahuan ibu mengenai ASI dan menyusui dengan lama menyusui tidak berhubungan, dimana nilai $P = 0,120$ (raharjo,2014;Lestari, 2018).

Pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia terhadap suatu objek melalui indera yang dimilikinya. Pengetahuan ibu yang rendah tentang pemberian ASI akan memberikan bentuk penilaian negatif, sehingga akan merubah perilaku ibu dalam menyusui. Sedangkan pengetahuan yang baik tentang Pemberian ASI akan membentuk penilaian positif dengan melakukan tindakan untuk mengatasi masalah dalam pemberian ASI, karena ibu tahu bahwa ASI memberikan banyak manfaat dan menyusui merupakan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Yang dimaksud dengan pengetahuan ibu dalam penelitian ini yaitu tingkat pengetahuan ibu tentang ASI yang diukur melalui hasil jawaban dari kuesioner dan wawancara (Fricilia and Agustiansyah, 2018).

Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Narula (2015) didapatkan hasil bahwa sebagian besar (64,7%) ibu menyusui memiliki tingkat pengetahuan yang kurang tidak berhasil melakukan laktasi yang benar. Dimana secara bivariat diperoleh nilai $P = 0,000$ ($P < 0,05$) yang berarti bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan keberhasilan menyusui (Narula, 2015). Adapun penelitian yang dilakukan Nurmawati (2015) terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu tentang menyusui dengan perilaku menyusui.

Hal ini terlihat pada nilai $p < 0,05$ yang artinya ibu yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik akan mempunyai perilaku menyusui yang benar (Nurmawati *et al.*, 2015).

Salah satu faktor dalam menentukan pencapaian menyusui adalah tingkat keyakinan diri ibu dalam menghadapi kewajiban menyusui atau disebut sebagai *Breastfeeding self-efficacy*. Istilah *Breastfeeding self-efficacy* adalah keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk berhasil menyusui anaknya. Selain itu, adanya dukungan dari lingkungan terdekat seperti keluarga atau tenaga kesehatan juga dapat berkorelasi terhadap tingginya keyakinan diri ibu untuk mencapai keberhasilan dalam proses pemberian ASI kepada anaknya yaitu dari IMD hingga anak berusia dua tahun (Suksesty *et al.*, 2017).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat pengetahuan tidak menjadi satu-satunya faktor yang berhubungan dengan lama menyusui. Sehingga meskipun seorang ibu memiliki tingkat pengetahuan yang baik, belum tentu dia akan melakukan atau merealisasikan apa yang diketahuinya. Sebab, meskipun ibu tersebut mempunyai pengetahuan yang baik, tetapi memiliki produksi ASI yang kurang maka ibu tersebut tidak mampu untuk memberikan ASI sesuai dengan pengetahuannya.

4. Hubungan Pengetahuan Agama Ibu dengan Lama Menyusui

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan agama ibu dengan lama menyusui. Terkait dengan lamanya pemberian ASI, WHO menganjurkan pemberian ASI selama 6 bulan pertama oleh ibu kepada anak, terhitung sejak hari pertama kelahiran dan dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun dengan makanan pendamping ASI. Hal tersebut, sejalan dengan ajaran agama Islam dalam QS Al Baqarah/2 : 233. Anjuran pemberian ASI secara tegas disampaikan kepada para ibu sehingga ibu dapat menyusui anaknya sampai berusia dua tahun sesuai perintah ayat tersebut.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Yustina (2019) didapatkan survey awal yaitu 30 ibu (100%) telah mengetahui anjuran agama tentang pemberian ASI kepada anak, namun sebesar 13,4% yang memberikan ASI hingga dua tahun dan 86,6% tidak meneruskan pemberian ASI hingga anak berusia dua tahun sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal tersebut disebabkan oleh persepsi tentang produksi ASI yang tidak lancar atau tidak mencukupi kebutuhan anak dan saran dari keluarga tentang pemberhentian ASI pada ibu yang hamil serta sosial-budaya pada masyarakat (Yustina, Sudaryati, 2019).

Budaya (*culture*) merupakan sesuatu yang diwariskan oleh pendahulu, namun masih diterapkan dalam kehidupan individu atau kelompok tertentu. Budaya dapat menjadi sebuah tradisi lokal atau kebiasaan masyarakat yang mencakup unsur-unsur meliputi konsep atau norma, aktivitas serta tindakan manusia, dan berupa karya yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pengetahuan agama ibu, termasuk pengetahuan ibu tentang pemberian ASI terhadap lama menyusui pada anak (Monto, 2014).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat pengetahuan tidak menjadi satu-satunya faktor yang berhubungan dengan lama menyusui. Sehingga meskipun seorang ibu memiliki tingkat pengetahuan yang baik, belum tentu dia akan melakukan atau merealisasikan apa yang diketahuinya. Sebab, meskipun ibu tersebut mempunyai pengetahuan yang baik, tetapi memiliki produksi ASI yang kurang maka ibu tersebut tidak mampu untuk memberikan ASI sesuai dengan pengetahuannya.

5. Hubungan Kesehatan Ibu dengan Lama Menyusui

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kesehatan ibu dengan lama menyusui. Kesehatan ibu merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap durasi lama pemberian ASI kepada anak. Proses menyusui merupakan proses produksi dan sekresi ASI sehingga dalam tujuan pemberiannya yang efektif diperlukan kondisi fisik dan psikis ibu yang baik dan sehat,

jika kondisi kesehatan ibu baik maka akan berpengaruh pada produksi serta pengeluaran ASI selama proses menyusui (Dewi Kartika Sari, Didik Gunawan Tamtomo, 2017).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinanti, (2018) dimana keadaan fisik ibu yang sehat sebanyak 79,5%, psikologis ibu yang mendukung 63,6%, sosial ibu yang mendukung sebanyak 75,0% dan spiritual ibu mendukung 93,2% yang artinya sebagian pemberian ASI dipengaruhi oleh status kesehatan ibu, dimana hasil uji statistik dengan menggunakan *chi-square* didapatkan nilai *p-value* < 0,05 yang artinya terdapat hubungan antara status kesehatan ibu dengan pemberian ASI (Nurmawati, 2015).

Sedangkan dalam penelitian ini didapatkan hasil yang tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irawati, 2014 dimana dengan total sampel yaitu 129 sebanyak 9 orang (6,98%) ibu yang sakit tidak bisa memberi ASI yang ideal dan sebanyak 120 orang (93,02%) ibu yang sehat dapat memberi ASI kepada anaknya dengan nilai $P = 0,14$ yang artinya tidak terdapat hubungan antara kesehatan ibu dengan menyusui (Irawati, Hakimi and Emilia, 2014).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa status kesehatan ibu berhubungan dengan lama pemberian ASI. Sebab ibu menyusui membutuhkan kondisi fisik yang sehat.

6. Hubungan Produksi ASI Ibu dengan Lama Menyusui

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara produksi ASI ibu dengan lama menyusui. Pada normalnya, produksi jumlah ASI yang dihasilkan ibu selalu mengikuti kebutuhan dari bayi. Produksi ASI yang dihasilkan oleh ibu tergantung pada beberapa faktor eksternal maupun internal. Adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi produksi ASI seperti inisiasi menyusui dini (IMD) dan frekuensi menyusui, sedangkan faktor internal seperti kondisi fisik, psikologis,

pengetahuan ibu dan faktor fisik bayi. Jumlah produksi ASI yang optimal, umumnya tercapai setelah hari ke 10-14 setelah kelahiran, dimana pada hari-hari pertama setelah kelahiran ibu dapat memproduksi ASI sekitar 10-100 ml sehari. Sebanyak 58% dari ibu nifas mengalami masalah dengan proses menyusui, hal ini disebabkan oleh persepsi ibu (faktor internal) terkait dengan produksi ASI yang sedikit sehingga berdampak pada kepercayaan diri dalam pemberian ASI kepada anak menjadi berkurang. Selain itu jumlah produksi ASI oleh ibu tergantung pada frekuensi pemberian hari terhitung sejak hari pertama kelahiran memberikan pengaruh terhadap kelancaran produksi ASI setelah hari-hari kelahiran sehingga dapat menentukan lama pemberian ASI atau proses menyusui pada anak (Kent, Gardner and Geddes, 2016; Rahmawati and Prayogi, 2017).

Hasil uji statistik pada penelitian ini didapatkan nilai $p = 0,000$ yang menunjukkan terdapatnya hubungan yang sangat signifikan dengan lama menyusui. penelitian ini membuktikan teori dan penelitian sebelumnya bahwa produksi ASI berpengaruh terhadap lama pemberian ASI.

7. Hubungan Paritas Ibu dengan Lama Menyusui

Hasil dari penelitian ini didapatkan nilai $p = 0,515$ yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara paritas ibu dengan lama menyusui. Paritas merupakan istilah yang menggambarkan klasifikasi ibu berdasarkan kelahiran dengan usia gestasi lebih dari 24 minggu. Status paritas tidak dapat secara langsung berhubungan dengan lama pemberian ASI pada anak, karena produksi ASI biasanya terjadi pada usia reproduksi yang matang seperti > 20 tahun dengan frekuensi pemberian yang baik dapat membantu dalam pemberian ASI hingga sesuai dengan durasi ideal pemberian ASI (Hardiani, 2017).

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mursyida W (2014) yang mempunyai nilai $p = 0,004$ yang berarti terdapat hubungan signifikan antara paritas ibu dengan lama menyusui (Mursyida, 2013).

Perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan jumlah sampel dan variabel lama menyusui. Di mana pada penelitian sebelumnya paritas ibu dihubungkan dengan pemberian ASI secara eksklusif, tetapi pada penelitian ini paritas ibu dihubungkan dengan lama menyusui secara penuh. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa paritas tidak menjadi faktor determinan dalam hubungannya dengan lama menyusui.

8. Hubungan Berat Lahir Anak dengan Lama Menyusui

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari 132 responden, sebagian besar responden mempunyai anak dengan berat badan lahir normal yaitu sebanyak 125 dan 7 ibu mempunyai anak dengan berat badan lahir tidak normal. Hasil uji statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan lahir anak dengan lama menyusui.

Berat badan lahir adalah berat badan bayi saat lahir yang menggambarkan status gizi selama kehamilan. Berdasarkan studi pendahuluan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015 pada ibu post partum, terdapat satu pasien melahirkan bayi dengan berat badan 2450 gram mengatakan ASI nya belum keluar setelah 9 jam setelah melahirkan sehingga produksi ASI tidak maksimal dan berdampak pada waktu lamanya menyusui (Diati, 2015).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Flaherman (2013) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara berat lahir anak dengan lama menyusui selama 3 bulan. Meskipun dalam beberapa penelitian mengatakan bahwa berat lahir bayi berhubungan dengan onset laktasi, tetapi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara berat lahir anak dengan lama menyusui (Flaherman, McKean and Cabana, 2013).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa berat badan saat anak lahir bukan tidak menjadi faktor yang berhubungan dengan lama menyusui. Kurangnya penelitian

tentang berat badan anak saat lahir dengan lama menyusui anak, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya dengan jumlah sampel yang lebih besar.

9. Hubungan Kesehatan Anak dengan Lama Menyusui

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan bahwa terdapat hubungan antara kesehatan anak terhadap lama menyusui. Proses menyusui dapat dicapai dengan maksimal bergantung pada faktor ibu dan faktor anak, salah satu faktor anak dalam proses menyusui yaitu kesehatan anak. Keadaan kesehatan anak yang mengalami sakit cenderung akan mempengaruhi keadaan fisik, yang berdampak pada nafsu makan menurun sedangkan anak tetap membutuhkan nutrisi yang cukup. Maka ibu cenderung memberikan makanan selain ASI sebagai cara memenuhi kebutuhan dalam keadaan tersebut. Terganggunya kesehatan anak juga mempengaruhi psikologis anak yang cenderung rewel dan sering menangis, hal ini menjadi alasan ibu menghentikan pemberian ASI sebelum waktunya sehingga menentukan lama menyusui (Proverawati dan Eni, 2014).

Penelitian ini membuktikan bahwa status kesehatan anak dapat berhubungan dengan lama menyusui anak. Kurangnya penelitian tentang status kesehatan anak dengan lama menyusui anak secara penuh. Sehingga penelitian ini merupakan hal yang baru.

10. Hubungan Jenis Persalinan dengan Lama Menyusui

Hasil uji statistik dalam penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara jenis persalinan ibu dengan lama menyusui. Jenis persalinan diantaranya persalinan normal, persalinan buatan termasuk section caesarea. Pengeluaran ASI pada ibu dengan jenis persalinan section biasanya mengalami keterlambatan dibandingkan persalinan normal. Diduga terlambatnya pengeluaran ASI disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah posisi menyusui, nyeri setelah

operasi, mobilisasi, rawat gabung ibu-anak dan masih terdapat intervensi tindakan dari pihak kesehatan kepada ibu. Sehingga kurangnya frekuensi menyusui pada ibu dan menyebabkan stimulus kepada payudara berkurang dan berdampak pada produksi ASI yang dapat menentukan durasi atau lama waktu menyusui (Rosmawaty and Sukarta, 2018).

Hasil penelitian ini didukung oleh dengan penelitian yang dilakukan oleh Warsini (2015) yang mengatakan terdapat hubungan antara jenis persalinan dengan keberhasilan pemberian ASI dengan nilai OR = 2,53 yang menunjukkan bahwa ibu dengan persalinan normal memiliki peluang sebesar 2,53 kali lebih berhasil dalam pemberian ASI secara eksklusif (Warsini, Aminingsih and Fahrunnisa, 2015). Selain itu, dalam penelitian lain juga didapatkan hubungan yang signifikan antara jenis persalinan dengan onset laktasi. Seperti yang dilakukan oleh Rosmawaty *et al* (2018) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis persalinan dengan onset laktasi dimana ibu dengan persalinan normal mengalami pengeluaran ASI lebih cepat dibandingkan dengan ibu dengan persalinan sesar. Jenis persalinan dapat mempengaruhi produksi ASI sehingga dapat mempengaruhi lama pemberian ASI.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jenis persalinan menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan lama menyusui. Persalinan normal memiliki peluang menyusui anaknya lebih lama dibandingkan dengan ibu yang melakukan persalinan secara sesar. Hal ini dikarenakan pada ibu dengan persalinan sesar membutuhkan waktu untuk memberikan inisiasi menyusui dini dibandingkan dengan ibu yang melakukan persalinan secara normal. Selain itu jenis persalinan juga dikaitkan dengan onset laktasi dimana onset laktasi pada persalinan normal lebih baik dibandingkan dengan ibu yang melakukan persalinan sesar.

11. Hubungan Promosi Susu Formula dengan Lama Menyusui

Hasil dari penelitian ini didapatkan 32 ibu yang mendapat promosi susu formula dan sebanyak 100 ibu yang tidak mendapat promosi susu formula. Hasil uji statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara promosi susu formula dengan lama menyusui. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al* (2019) yang dilakukan pada 96 responden (Dewi, Gustiwarni and Wahyuni, 2019).

Promosi merupakan bentuk dari komunikasi pemasaran dengan serangkaian-serangkaian aktivitas menyeluruh untuk memasarkan sesuatu dalam hal ini adalah susu formula. Secara umum promosi susu formula merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menarik minat dan mengingatkan bahwa konsumen membutuhkan produk dari susu formula tersebut. Dalam penelitian Nurmawati, 2015 tingginya pemberian susu formula oleh ibu pada anak disebabkan oleh gencarnya promosi susu formula yang melibatkan tenaga persalinan dan tenaga kesehatan lainnya. Gencarnya promosi susu formula bukan hanya oleh perusahaan tetapi melibatkan tenaga persalinan sehingga berdampak pada durasi pemberian ASI oleh ibu yang sering terpapar dengan iklan susu formula (Nurmawati *et al.*, 2015).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa promosi susu formula dapat menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan lama pemberian ASI.

12. Hubungan Teknik Menyusui Ibu dengan Lama Menyusui

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara Teknik menyusui dengan lama menyusui. Teknik menyusui merupakan cara atau praktek menyusui ibun. Semakin baik teknik menyusui maka proses menyusui berjalan lancar dikarenakan manajemen menyusui terutama Teknik menyusui. Adapun dalam pelaksanaan dan teknik menyusui yang tidak benar maka akan berdampak pada kondisi fisik ibu khususnya payudara ibu, seperti lecet pada area sekitar payudara. Hal tersebut dapat menyebabkan rasa sakit pada puting sehingga lama pemberian ASI akan dihentikan sebelum waktunya (Dewi, 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Suhartika, 2015 terdapat hubungan yang signifikan antara Teknik menyusui dengan perilaku menyusui, dimana nilai $p < 0,05$ yang artinya Teknik menyusui yang baik memiliki hubungan dengan perilaku menyusui yang benar termasuk waktu pemberian ASI (Suhartika and Djamilus, 2015)

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Teknik menyusui ibu berhubungan dengan lama menyusui. Dari penelitian didapatkan bahwa mayoritas sampel dalam penelitian ini menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun mayoritas sampel pada penelitian ini memiliki teknik menyusui yang baik dengan jumlah 93(70,5%) dari 132 sampel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Teknik menyusui yang baik dapat berhubungan dengan lama menyusui anak.

13. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Lama Menyusui

Hasil uji statistik dalam penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan lama menyusui. pada penelitian ini didapatkan hanya 1 ibu yang tidak mendapat dukungan dari keluarganya selama menyusui sedangkan 131 ibu yang mendapat dukungan.

Hal ini berbeda dari teori-teori sebelumnya. Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap setiap anggota (Kristianti, 2017). Dukungan keluarga baik dukungan emosional, informasi, instrumental, dan penghargaan merupakan salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif (Suharti Mamangkey, 2018). Semakin besar dukungan keluarga kepada ibu untuk menyusui anaknya, maka semakin besar juga keinginan ibu untuk menyusui anaknya dan semakin lama pula durasi / lama anak menyusu (Sarina, 2017). Pada pelaksanaan pemberian ASI eksklusif, dukungan keluarga dapat menentukan keberhasilan ibu menyusui anaknya. Hal ini disebabkan karena, dukungan keluarga memberikan rasa nyaman kepada ibu sehingga dapat

mempengaruhi produksi ASI ibu, membuat ibu nyaman saat menyusui anaknya, dan meningkatkan semangat ibu (Mamuroh and Nurhakim, 2019).

Namun, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Oktalina, 2015 hasil analisis menunjukkan nilai $p = 0,090$ yang berarti tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku menyusui eksklusif (Oktalina, Muniroh and Adiningsih, 2015).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dukungan keluarga tidak menjadi satu-satunya faktor yang berhubungan dengan lama menyusui anak.

14. Hubungan Anggota Keluarga yang Merokok dengan Lama Menyusui

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan bahwa sebagian besar sampel dalam penelitian ini memiliki anggota keluarga yang merokok dengan jumlah 107(81,8%) dari 132 sampel. Sebagian besar sampel pada penelitian ini juga menyusui anaknya selama 6-24 bulan yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai $p = 0,003 < \alpha = 0,05$ yang berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara anggota keluarga yang merokok dengan lama menyusui. Hal ini dapat disebabkan karena merokok dapat mempengaruhi kadar hormon pada wanita. Aktivitas hormon yang berperan terhadap siklus menstruasi dapat dipengaruhi oleh kandungan yang terdapat didalam rokok (Ayu Lestari and Armayah, 2016).

Adapun senyawa yang terkandung dalam rokok seperti nikotin dan kotinin dapat menyebabkan vasokonstriksi dan hipoksia sehingga menghasilkan neurotoksin. Paparan asap rokok pada wanita dapat menyebabkan peningkatan kadar kotinin dalam darah yang akan menyebabkan vasokonstriksi dan penurunan aliran darah di payudara serta pengurangan kadar oksitosin sehingga dapat mengurangi produksi ASI pada wanita yang sedang menyusui. Selain itu, paparan tersebut dapat menyebabkan penurunan volume ASI, perubahan pada laktasi dan durasi menyusui yang memendek (Firouzbakht *et al.*, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lok *et al* (2018) dengan sampel sebanyak 1.240 dengan hasil yang didapatkan yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara anggota keluarga yang merokok dengan lama menyusui. Pada penelitian tersebut ibu dengan anggota keluarga yang merokok memiliki risiko sebesar 64% untuk menghentikan pemberian ASI lebih cepat dibandingkan ibu yang tidak memiliki anggota keluarga yang merokok.

Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa paparan dari asap rokok juga mempunyai substansi yang berefek negatif dengan pemberian ASI. Selain itu oleh Baidi *et al* (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa anggota keluarga yang merokok secara signifikan lebih memilih untuk memberikan susu formula dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki anggota keluarga merokok. selain itu, penelitian yang dilakukan Basit *et al* (2017) mengatakan bahwa balita dengan anggota keluarga yang merokok memiliki risiko sebesar 16,782 kali terkena ISPA dibandingkan dengan balita dengan anggota keluarga yang tidak merokok.

Hasil penelitian ini membuktikan teori bahwa paparan asap rokok memberikan efek negatif pada lama menyusui anak dan anggota keluarga yang merokok memiliki risiko penghentian pemberian ASI lebih cepat dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki anggota keluarga merokok. sehingga dapat dikatakan bahwa adanya anggota keluarga yang merokok di lingkungan rumah dapat berhubungan dengan lama menyusui anak. Penelitian tentang hubungan anggota keluarga merokok dengan lama menyusui masih sangat kurang, sehingga diharapkan penelitian ini menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

15. Hubungan Riwayat Antenatal Care dengan Lama Menyusui

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas sampel dalam penelitian memiliki riwayat ANC yang baik yaitu sebanyak ini menyusui 68(51,5%) dari 132 sampel dan sebagian sebagian sampel menyusui anaknya selama selama 6-24 bulan

yaitu sebanyak 119(90,2%) responden. Adapun berdasarkan hasil uji statistik dengan uji fisher didapatkan nilai $p = 0,013 < \alpha = 0,05$, hal ini sehingga H_0 ditolak yang berarti terdapat hubungan antara riwayat ANC dengan lama menyusui.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Primanagara (2015) dengan jumlah sampel 44 dengan 34(77,3%) responden memiliki riwayat ANC yang baik dan 10(22,7%) responden memiliki riwayat ANC yang kurang. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat ANC dengan pemberian ASI eksklusif dan memberikan pengaruh sebesar 3,4 kali terhadap pemberian ASI eksklusif. Noormanty (2013) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa terdapat hubungan antara frekuensi pemeriksaan kehamilan dengan pemberian ASI eksklusif. Hal ini dikaitkan dengan frekuensi seringnya terpapar informasi pada ibu selama masa kehamilan dan menambah pengetahuan serta keterampilan ibu, sehingga ibu mampu memahami dan mempraktikkan untuk memberikan ASI dengan lama masa pemberian ASI sesuai dengan yang dianjurkan. Hasil penelitian ini memperkuat teori yang sudah ada bahwa jika seseorang sering terpapar dengan suatu informasi atau pengetahuan (dalam hal ini melalui kunjungan *antenatal care* ibu pada masa kehamilan) maka dia akan mampu memahami dan mempraktikkannya. Hasil penelitian yang signifikan ini relevan juga dengan penelitian sebelumnya di Turki oleh Gol Ilknur (2018).

Program ANC (*Antenatal Care*) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga profesional kepada ibu hamil selama masa kehamilan berdasarkan standar pelayanan ANC yang telah diterapkan dalam SPK (Standar Pelayanan Kebidanan). Dalam program ANC, ditetapkan frekuensi kunjungan dilakukan paling sedikit empat kali selama kehamilan, satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali di trimester ketiga. Adapun pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil salah satunya adalah temu wicara atau konseling termasuk informasi terkait persiapan pemberian ASI. Berdasarkan hal tersebut, kunjungan ANC dapat

mempengaruhi lama menyusui oleh ibu kepada anaknya yang karena telah mengetahui manfaat dan teknik menyusui (Rachmawati, 2017).

Hasil yang signifikan dalam penelitian ini membuktikan bahwa, seringnya ibu mendapat informasi akan mempengaruhi ibu untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan yang diperoleh selama kunjung ANC. Di mana pada kunjungan ANC tersebut, ibu akan memperoleh informasi tentang menyusui dan berapa lama harus menyusui anaknya, sehingga ibu akan terpengaruh untuk menyusui anaknya sesuai dengan lama pemberian ASI yang dianjurkan. Hasil dalam penelitian ini didapatkan 2 (2,9%) responden dengan riwayat ANC yang baik dapat menyusui anaknya lebih lama dibandingkan dengan responden yang memiliki riwayat ANC yang kurang. Sehingga dapat dikatakan riwayat ANC ibu yang baik dapat membuat ibu menyusui anaknya lebih lama dibandingkan dengan ibu yang memiliki riwayat ANC kurang.

16. Kelebihan dan Kekurangan Penelitian

Kelebihan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu, terdapat 15 variabel yang diteliti dengan 132 sampel. selain itu, penelitian ini dilakukan di dua daerah. Penelitian ini juga merupakan penelitian baru dengan variabel lama menyusui secara penuh dan bukan pemberian ASI secara eksklusif seperti yang dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini juga terdapat integrasi keislaman tentang lama menyusui secara penuh yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2 : 233, QS Luqman/31 : 14, QS Al-Qashash/28 : 7, dan QS Al-Ahqaf/46 : 15.

Kekurangan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel kesehatan ibu dan kesehatan anak kurang detail sehingga didapatkan jumlah ibu ataupun anak yang sakit lebih banyak dibandingkan jumlah ibu ataupun anak yang sehat. Sehingga hal ini, dapat menjadikan hasil penelitian menjadi bias.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tidak terdapat perbedaan proporsi antara ibu yang berusia <20 tahun, 20-35 tahun, dengan >35 tahun dalam hal lama menyusui anaknya.
2. Tidak terdapat perbedaan proporsi antara ibu yang bekerja dengan tidak bekerja dalam hal lama menyusui anaknya.
3. Tidak terdapat perbedaan proporsi antara ibu yang memiliki pengetahuan ASI yang baik dengan ibu yang memiliki pengetahuan ASI kurang dalam hal lama menyusui anaknya.
4. Tidak terdapat perbedaan proporsi antara ibu yang memiliki pengetahuan agama yang baik dengan ibu yang memiliki pengetahuan agama kurang dalam hal lama menyusui anaknya.
5. Terdapat perbedaan proporsi antara kondisi fisik ibu yang sakit dengan ibu yang sehat dalam hal lama menyusui anaknya.
6. Terdapat perbedaan proporsi antara ibu yang memiliki produksi ASI lancar dengan ibu yang memiliki produksi ASI kurang dalam hal lama menyusui anaknya.
7. Tidak terdapat perbedaan proporsi antara ibu yang primipara dengan ibu multipara dalam hal lama menyusui anaknya.
8. Tidak terdapat perbedaan proporsi antara ibu yang memiliki anak dengan berat lahir normal dengan anak berat bayi lahir tidak normal dalam hal lama menyusui anaknya.

9. Terdapat perbedaan proporsi antara ibu yang memiliki anak dengan kondisi fisik yang sakit dan sehat dalam hal lama menyusui anaknya.
10. Terdapat perbedaan proporsi antara ibu yang memiliki riwayat persalinan terakhir secara normal dengan ibu yang persalinan terakhirnya secara sesar dalam hal lama menyusui anaknya.
11. Terdapat perbedaan proporsi antara ibu yang mendapat promosi susu formula dengan ibu yang tidak mendapat promosi dalam hal lama menyusui anaknya.
12. Terdapat perbedaan proporsi antara ibu yang memiliki teknik menyusui yang baik dengan yang tidak baik dalam hal lama menyusui anaknya.
13. Tidak terdapat perbedaan proporsi antara ibu yang memiliki dukungan keluarga selama menyusui dengan yang tidak mendapat dukungan dari keluarga dalam hal lama menyusui anaknya.
14. Terdapat perbedaan proporsi antara ibu yang memiliki anggota keluarga yang merokok dengan ibu yang tidak memiliki anggota keluarga merokok dalam hal lama menyusui anaknya.
15. Terdapat perbedaan proporsi antara ibu yang memiliki riwayat ANC baik dengan ibu yang memiliki riwayat ANC tidak baik dalam hal lama menyusui anaknya.

B. Saran

1. Setelah diketahui beberapa faktor yang berhubungan secara signifikan, diharapkan pemerintah ataupun petugas kesehatan melakukan atau memberikan edukasi terkait faktor-faktor tersebut agar dapat dihindari oleh para ibu yang akan menyusui anaknya sehingga dapat tercapai lama waktu menyusui secara optimal.

2. Diharapkan karya ini dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian ataupun penulisan selanjutnya
3. Adapun sampel dalam penelitian ini memiliki kekurangan karena masih tergolong rendah untuk penelitian yang bersifat epidemiologis.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Abdullah, M. T., Maidin, A. And Amalia, A. D. L. (2013) 'Kondisi Fisik, Pengetahuan, Pendidikan, Pekerjaan Ibu, Dan Lama Pemberian ASI Secara Penuh', *Kesmas: National Public Health Journal*, 8(5), P. 210. Doi: 10.21109/Kesmas.V8i5.386.
- Astridya, P. (2017, Juni). Analisis Pola Dan Faktor Lama Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Tahun 2013. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, XIV(2), 157-170.
- Bardanzellu, F. *Et Al.* (2018) 'Human Breast Milk: Exploring The Linking Ring Among Emerging Components', *Frontiers In Pediatrics*, 6(August). Doi: 10.3389/Fped.2018.00215.
- Kementerian Agama RI. (2015). *Al Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. 2017. Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Provinsi Sulawesi Selatan 2017. Makassar.
- Gizaw, Z., Woldu, W. And Bitew, B. D. (2017) 'Exclusive Breastfeeding Status Of Children Aged Between 6 And 24months In The Nomadic Population Of Hadaleala District, Afar Region, Northeast Ethiopia', *International Breastfeeding Journal*. *International Breastfeeding Journal*, 12(1), Pp. 1-7. Doi: 10.1186/S13006-017-0129-6.
- Gluckman, P. *Et Al.* (2014) 'Nutrition And Lifestyle For Pregnancy And Breastfeeding', 27, P. 432. Available At: <https://books.google.com/books?id=Qkapbqaaqbaj&pgis=1>.
- Hamzah, D. F. (2018). Pengaruh Pemberian ASI Eksklusif Terhadap Berat Badan Bayi Usia 4-6 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Langsa Kota. *Jurnal Jumantik*, III(2), 8-15.
- Hardiani, R. S. (2017). Status Paritas Dan Pekerjaan Ibu Terhadap Pengeluaran ASI Pada Ibu Menyusui 0-6 Bulan. *Nurseline Journal*, 44-51.

- Kemendikbud . (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Kemenkes. (2014). *Infodatin: Situasi Dan Analisis ASI Eksklusif*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Hukum Dan HAM RI. (2012). *Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Hasil Utama Riskesdas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Levinienè, G. *Et Al.* (2013) 'Associated Factor with Breastfeeding Duration'. *Public Health*, 49(9), Pp. 415–421.
- Lawrence, R. A. (2011). *Breastfeeding : A Guide For the Medical Profession* . USA: Elsevier.
- Mamuroh, L. And Nurhakim, F. (2019) 'Pemberdayaan Keluarga Dan Kader Kesehatan Dalam Pemanfaatan ASI Eksklusif Pendahuluan Makanan Pertama Dan Utama Bayi Adalah Air Susu Ibu (ASI) . ASI Cocok Sekali Untuk Memenuhi Kebutuhan Bayi Dalam Segala Hal , Karbohidrat Dalam ASI Berupa Laktosa , Lem', 2(1), Pp. 1–10.
- Maraghi, A. M. Al (1993) *Tafsir Al Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Muhammad, A. bin (2016) *tafsir ibnu katsir jilid 1. IX*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Olang, B. *Et Al.* (2012) 'Reasons Given By Mothers For Discontinuing Breastfeeding In Iran', Pp. 1–7.
- Raharjo, B. B. (2014). Profil Ibu Dan Peran Bidan Dalam Praktik Inisiasi Menyusui Dini Dan ASI Eksklusif. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 53-63.
- Rahmawati, A. And Prayogi, B. (2017) 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Air Susu Ibu (Asi) Pada Ibu Menyusui Yang Bekerja (Analysis Of Factors Affecting Breastmilk Production On Breastfeeding Working Mothers)', *Jurnal Ners Dan Kebidanan*, 4(2), Pp. 134–140. Doi: 10.26699/Jnk.V4i2.ART.P134-

140.

- Ramiro González, M. D. *Et Al.* (2018) 'Prevalence Of Breastfeeding And Factors Associated With The Start And Duration Of Exclusive Breastfeeding In The Community Of Madrid Among Participants In The ELOIN', *Anales De Pediatría*, 89(1), Pp. 32–43. Doi: 10.1016/J.Anpedi.2017.09.002.
- Riche (2018) 'Indonesian Journal Of Human Nutrition', *Indonesian Journal Of Human Nutrition*, 1(1), Pp. 14–22. Doi: 10.21776/Ub.Ijhn.2016.003.Suplemen.5.
- Saaty, A. H., Cowdery, J. and Karshin, C. (2015) 'Practices of Breastfeeding among Arab Mothers Living in the United States', *world journal of medical sciences*, 12(2), pp. 183–188. doi: 10.5829/idosi.wjms.2015.12.2.1149.
- Sarina, A. D. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Lama Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi (0-6 Bulan) Di Wilayah Kerja Puskesmas Mokoau Kota Kendari. *Jurnal Ampibi*, 2(1), 11-20.
- Shihab, Q. (2016). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Soares, D. *Et Al.* (2017) 'Breastfeeding Duration And Associated Factors Between 1960 And 2000, *Jornal De Pediatría*. Sociedade Brasileira De Pediatría, 93(2), Pp. 130–135. Doi: 10.1016/J.Jped.2016.05.005.
- Subur Widiyanto, D. A. (2012). Hubungan Pendidikan Dan Pengetahuan Ibu Tentang ASI Eksklusif Dengan Sikap Terhadap Pemberian ASI Eksklusif. *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah*, 1(1), 25-29.
- Suharti Mamangkey, S. R. (2018). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Di Puskesmas Ranotana Weru. *Journal Keperawatan*, 6(1), 1-6.
- Abdullah, M. T., Maidin, A. and Amalia, A. D. L. (2013) 'Kondisi Fisik, Pengetahuan, Pendidikan, Pekerjaan Ibu, dan Lama Pemberian ASI Secara Penuh', *Kesmas: National Public Health Journal*, 8(5), p. 210. doi: 10.21109/kesmas.v8i5.386.
- Tang, L., Lee, A. H. and Binns, C. W. (2015) 'Factors associated with breastfeeding duration: a prospective cohort study in Sichuan Province, China', 11(3), pp.

232–233. doi: 10.1007/s12519-014-0520-y.

Veghari, G., Mansourian, A. and Abdollahi, A. (2011) 'Breastfeeding status and some related factors in Northern Iran', *Oman Medical Journal*, 26(5), pp. 342–348. doi: 10.5001/omj.2011.84.

World Health Organization (2003) 'Infant and Young Child Feeding A tool for assessing national practices ', p. 158.

Yumni, F. L. and Wahyuni, C. T. (2018) 'Hubungan Promosi Iklan Susu Formula Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Desa Pandanarum Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto', *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 3(2). doi: 10.30651/jkm.v3i2.1779.



*Lampiran 1***KUESIONER PENELITIAN****FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN LAMA MENYUSUI ANAK TAHUN 2020**

Yth. Saudari

Saya Fitri Nengsi Astuti, merupakan mahasiswi S1 Reguler Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai apa saja yang dapat berhubungan dengan lama menyusui pada anak usia 1-3 tahun di wilayah kerja Puskesmas Bontomate'ne Jeneponto dan Puskesmas Bulukunyi Takalar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang berhubungan dengan lama menyusui anak usia 1-3 tahun.

Maka dari itu, demi kelancaran penelitian ini saya membutuhkan informasi sebagai data penelitian dengan memohon kesediaan saudara untuk mengisi kuesioner ini. Semua jawaban yang saudara tuliskan sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini, dan tidak dapat mencapai sasaran jika jawaban saudara tidak sesuai dengan apa yang dialami saudara. Semua data akan dirahasiakan dan hanya digunakan dalam keperluan penelitian ini.

Mohon untuk membaca instruksi sebelum mengisi kuesioner dan diharapkan untuk memeriksa kembali sebelum dikembalikan. Atas bantuan dan kerjasama saudara, saya mengucapkan terima kasih.

Hari/Tanggal Pengisian Kuesioner :

Ttd. Persetujuan Menjadi Responden

()



KUESIONER

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Lama Menyusui Anak Tahun 2020

Kode responden : (diisi oleh peneliti)

Tanggal Pengisian :

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Bacalah pertanyaan pada setiap kuesioner dengan teliti dan pilihlah jawaban yang sesuai dengan pengetahuan ibu dan keadaan yang ibu rasakan
2. Lingkarilah jawaban yang menurut ibu benar atau sesuai dengan keadaan ibu
3. Ibu diharapkan mengisi dengan pulpen dan tidak diperkenankan menggunakan pensil atau *tipe-x* dalam mengisi dan menghapus jawaban pada lembar kuesioner
4. Apabila jawaban salah dan ibu ingin mengganti pilihan jawaban, coret jawaban yang salah dengan dua garis mendatar (=) dan pilihlah jawaban lain yang sesuai
5. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi dengan satu jawaban, kecuali untuk pertanyaan yang memerlukan jawaban tulisan yang sesuai dengan pengetahuan atau kondisi ibu
6. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas atau tidak dimengerti, ibu dapat menanyakan kepada peneliti untuk menjelaskan maksud dari pertanyaan tersebut
7. Segera serahkan kembali kepada peneliti setelah ibu selesai mengisi lembar kuesioner

LEMBAR KUESIONER
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN LAMA MENYUSUI
ANAK TAHUN 2020

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Suku :
5. Pendidikan terakhir ibu :
 1. Tidak Tamat SD
 2. Sekolah dasar (SD)
 3. SMP
 4. SMA
 5. Perguruan Tinggi
6. Pekerjaan :
 1. Ibu rumah tangga
 2. Wiraswasta
 3. Buruh
 4. Pegawai swasta
 5. Pegawai negeri / TNI / POLRI
7. Jenis persalinan :
 1. Normal
 2. Sesar
8. Paritas ibu :
 1. Berapa kali ibu pernah melahirkan ? kali
9. Usia Bayi :
10. Berat bayi saat lahir :



PENGETAHUAN TENTANG ASI

1. Apakah yang dimaksud dengan ASI ?
 - a. ASI adalah sejenis makanan yang dicampur dengan buah yang sudah dihaluskan
 - b. ASI adalah air susu ibu yang merupakan makanan serta minuman bagi bayi.
 - c. ASI adalah sejenis minuman yang dicampur dengan madu
 - d. ASI adalah cairan yang banyak mengandung zat gizi yang diperlukan Ibu
2. Kapan bayi harus segera diberikan ASI pertamanya ?
 - a. Setelah bayi diberi susu formula untuk latihan menghisap, baru kemudian diberi ASI
 - b. Segera setelah bayi lahir atau maksimal 1 jam setelah lahir
 - c. Menunggu ibu benar-benar siap memberikan ASI
 - d. Ketika bayi menangis
3. Bagaimana peran kolostrum (ASI yang pertama kali keluar) dalam proses menyusui ?
 - a. Kolostrum harus tetap diberikan, karena mubazir jika dibuang
 - b. Kolostrum harus tetap diberikan, karena kolostrum banyak mengandung zat gizi untuk imunitas bayi
 - c. Kolostrum harus dibuang, karena merupakan susu yang telah basi
 - d. Kolostrum hari pertama dibuang dan kolostrum hari kedua dan seterusnya boleh diberikan kepada bayi.
4. Apakah manfaat ASI bagi Ibu ?
 - a. Membantu ibu untuk membentuk ikatan batin yang baik
 - b. Menghemat pengeluaran untuk membeli susu formula
 - c. Mencegah perdarahan setelah persalinan, mempercepat pengecilan rahim, serta sebagai metode keluarga berencana
 - d. Agar payudara tidak bengkak

5. Apakah manfaat ASI bagi bayi ?
 - a. ASI mudah diberikan/ praktis diberikan kepada bayi
 - b. ASI tidak mudah basi, lebih higienis bila dibandingkan dengan susu lainnya
 - c. ASI memiliki semua kandungan zat gizi penting yang dibutuhkan bayi dan sebagai imunitas alami bagi bayi agar bayi tidak mudah sakit
 - d. Semua jawaban benar
6. Apakah manfaat ASI dari segi ekonomi ?
 - a. Ibu bisa berhemat karena tidak perlu membeli susu formula
 - b. Ibu bisa berhemat karena ASI praktis diberikan
 - c. Menghemat devisa negara
 - d. Semua benar
7. Apa saja kandungan zat gizi yang terkandung dalam ASI ?
 - a. Vitamin dan mineral
 - b. Karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin
 - c. Kolostrum
 - d. Protein dan Lemak
8. Kapan bayi diberikan makanan dan minuman tambahan ?
 - a. Saat bayi menangis
 - b. Saat usia bayi >4 bulan
 - c. Saat usia bayi >6 bulan
 - d. Saat bayi merasa lapar, tidak cukup setelah diberikan ASI
9. Sampai usia berapa bayi diberi ASI ?
 - a. Sampai bayi tidak mau lagi menyusu
 - b. Sampai ibu tidak mau lagi menyusui
 - c. Sampai bayi usia 2 tahun
 - d. Sampai bayi usia 6 bulan

10. Manakah pernyataan yang benar dibawah ini ?

- a. ASI dapat membuat payudara ibu turun
- b. ASI dapat membentuk ikatan batin antara ibu dan bayi
- c. ASI dapat disimpan dalam lemari pendingin selama mungkin
- d. ASI dapat menjadi alat kontrasepsi yang alami walaupun pemberian ASI tidak teratur

PENGETAHUAN AGAMA

1. Menurut ibu apakah hukum menyusui bayi menurut pandangan Islam ?

- a. Wajib
- b. Sunnah
- c. Mubah
- d. Makruh

2. Berapa lama waktu yang disarankan menyusui bayi menurut ajaran Islam ?

- a. 6 bulan
- b. 1 tahun
- c. 1,5 tahun
- d. 2 tahun

3. Apakah ibu harus meminta persetujuan suami apabila ingin menghentikan pemberian ASI ?

- a. Harus
- b. Tidak harus

4. Mengapa ibu ingin membicarakan hal tersebut kepada suami ?

- a. Tuliskan alasan ibu :
- b. Tidak harus

5. Apakah ada yang menjadi pertimbangan ibu jika ingin menghentikan pemberian ASI ?

- a. Ada, tuliskan :
- b. Tidak ada

6. Hal apakah yang dibenarkan agama Islam jika ingin menghentikan pemberian ASI ?
- Sakit
 - Ibu bekerja
 - Malas menyusui lagi
 - tidak tau

KESEHATAAN IBU

1. Selama menyusui apakah ibu pernah sakit selama menyusui ?
- Ya
 - Tidak

PRODUKSI ASI IBU

1. Apakah ibu menyusui bayi ≥ 8 X dalam 24 jam?
- Ya
 - Tidak
2. Apakah ibu menyusui bayi ≥ 10 menit, pada tiap-tiap payudara?
- Ya
 - Tidak
3. Sebelum menyusui, apakah kedua payudara ibu terasa tegang?
- Ya
 - Tidak
4. Apakah ASI keluar dengan sendirinya dari puting ibu?
- Ya
 - Tidak
5. Apakah bayi buang air kecil paling sedikit 6 kali atau lebih dalam 24 jam?
- Ya
 - Tidak
6. Apakah bayi buang air besar 2 kali atau lebih dalam 24 jam?
- Ya
 - Tidak

7. Apakah warna BAB bayi kuning keemasan, tidak terlalu encer, dan tidak terlalu pekat?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Setelah menyusui, Apakah bayi ibu tertidur tenang selama 2 jam atau lebih?
 - a. Ya
 - b. Tidak

KESEHATAN ANAK

1. Selama menyusui apakah anak pernah sakit selama menyusui ?
 - c. Ya
 - d. Tidak

PROMOSI SUSU FORMULA

1. Apakah ibu pernah ditawari susu formula oleh bidan atau dokter ditempat persalinan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah ibu pernah melihat poster, kalender atau lainnya yang menuliskan atau menggambarkan merek salah satu susu formula bayi ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah bayi ibu pernah meminum susu formula yang ditawarkan oleh petugas di tempat persalinan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

DUKUNGAN KELUARGA

1. Apakah keluarga memberi tahu ibu bahwa ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan harus diberikan kepada bayi ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

2. Apakah keluarga mengingatkan ibu untuk memberikan ASI kepada bayi ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah keluarga menemani ibu berkonsultasi pada petugas kesehatan untuk mendapat informasi tentang pemberian ASI ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah keluarga menanyakan kepada ibu masalah apa yang dihadapi selama memberikan ASI kepada bayi ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah keluarga menyediakan makanan bergisi untuk ibu selama masa pemberian ASI ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Apakah keluarga membantu ibu melakukan tugas-tugas rumah tangga selama ibu memberika ASI kepada bayi ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah keluarga memberikan semangat kepada ibu selama masa pemberian ASI ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah keluarga membantu ibu bila memerlukan sesuatu selama memberika ASI kepada bayi ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

ANGGOTA KELUARGA MEROKOK

1. Apakah ada anggota keluarga atau seseorang dalam lingkungan rumah tangga ibu yang merokok ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

RIWAYAT ANTENATAL CARE

1. Apakah ibu pernah memeriksakan kehamilan selama masa kehamilan?
 - c. Ya
 - d. Tidak
2. Di mana ibu memeriksakannya?
 - a. Puskesmas
 - b. Posyandu
 - c. Rumah sakit
 - d. Dukun beranak

LAMA MENYUSUI ANAK

1. Berapa lama ibu menyusui anaknya ?
 - a. 0 – 17 bulan
 - b. 18 – 20 bulan
 - c. 21 – 22 bulan
 - d. 23 – 24 bulan

Lampiran 2

Usia

umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid usia <20 dan >35 tahun	98	74.2	74.2	74.2
usia 20-35 tahun	34	25.8	25.8	100.0
Total	132	100.0	100.0	

Pekerjaan

pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid bekerja	21	15.9	15.9	15.9
tidak bekerja	111	84.1	84.1	100.0
Total	132	100.0	100.0	

Pengetahuan Ibu

pengetahuan asi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid pengetahuan kurang	7	5.3	5.3	5.3
pengetahuan baik	125	94.7	94.7	100.0
Total	132	100.0	100.0	

Pengetahuan Agama Ibu

pengetahuan agama

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid pengetahuan kurang	41	31.1	31.1	31.1
pengetahuan baik	91	68.9	68.9	100.0
Total	132	100.0	100.0	

Kesehatan ibu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

kesehatan ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sakit	99	75.0	75.0	75.0
tidak sakit	33	25.0	25.0	100.0
Total	132	100.0	100.0	

Produksi ASI

produksi asi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak lancar	9	6.8	6.8	6.8
lancar	123	93.2	93.2	100.0
Total	132	100.0	100.0	

Paritas Ibu

paritas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid primipara	36	27.3	27.3	27.3
multipara	96	72.7	72.7	100.0
Total	132	100.0	100.0	

Berat Lahir

berat badan lahir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid bb lahir tidak normal	7	5.3	5.3	5.3
bb lahir normal	125	94.7	94.7	100.0
Total	132	100.0	100.0	

Kesehatan Anak

kesehatan anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sakit	116	87.9	87.9	87.9
	tidak sakit	16	12.1	12.1	100.0
	Total	132	100.0	100.0	

Jenis Persalinan

persalinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesar	15	11.4	11.4	11.4
	spontan/normal	117	88.6	88.6	100.0
	Total	132	100.0	100.0	

Promosi Susu Formula

promosi susu formula

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ada promosi sufor	32	24.2	24.2	24.2
	tidak ada promosi sufor	100	75.8	75.8	100.0
	Total	132	100.0	100.0	

Teknik Menyusui Ibu

teknik menyusui

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	teknik menyusui tidak baik	39	29.5	29.5	29.5
	teknik menyusui baik	93	70.5	70.5	100.0
	Total	132	100.0	100.0	



Dukungan Keluarga

dukungan keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak mendukung	1	.8	.8	.8
	Mendukung	131	99.2	99.2	100.0
	Total	132	100.0	100.0	

Anggota Keluarga Merokok

keluarga yang merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ada keluarga merokok	107	81.1	81.1	81.1
	tidak ada keluarga merokok	25	18.9	18.9	100.0
	Total	132	100.0	100.0	

Riwayat ANC

riwayat ANC

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	68	51.5	51.5	51.5
	tidak baik	64	48.5	48.5	100.0
	Total	132	100.0	100.0	

umur * lama menyusui

Crosstab

Count		lama menyusui			Total
		< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
umur	usia <20 dan >35 tahun	6	91	1	98
	usia 20-35 tahun	5	28	1	34
Total		11	119	2	132

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	3,155 ^a	2	,206	,157		
Likelihood Ratio	2,831	2	,243	,278		
Fisher's Exact Test	3,587			,157		
Linear-by-Linear Association	1,185 ^b	1	,276	,332	,217	,137
N of Valid Cases	132					

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,52.

b. The standardized statistic is -1,089.

pekerjaan * lama menyusui

Crosstab

Count		lama menyusui			Total
		< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
pekerjaan	bekerja	3	17	1	21
	tidak bekerja	8	102	1	111
Total		11	119	2	132

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	3.034 ^a	2	.219	.180		
Likelihood Ratio	2.403	2	.301	.273		
Fisher's Exact Test	3.638			.180		
Linear-by-Linear Association	.193 ^b	1	.660	.697	.458	.262
N of Valid Cases	132					

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,32.

b. The standardized statistic is ,440.

pengetahuan asi * lama menyusui

Crosstab

Count		lama menyusui			Total
		< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
pengetahuan asi	pengetahuan kurang	1	6	0	7
	pengetahuan baik	10	113	2	125
Total		11	119	2	132

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	.442 ^a	2	.802	1.000		
Likelihood Ratio	.496	2	.780	1.000		
Fisher's Exact Test	1.574			.525		
Linear-by-Linear Association	.436 ^b	1	.509	.490	.429	.331
N of Valid Cases	132					

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11.

b. The standardized statistic is ,660.

pengetahuan agama * lama menyusui

Crosstab

Count		lama menyusui			Total
		< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
pengetahuan agama	pengetahuan kurang	1	40	0	41
	pengetahuan baik	10	79	2	91
Total		11	119	2	132

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	3.743 ^a	2	.154	.191		
Likelihood Ratio	4.920	2	.085	.135		
Fisher's Exact Test	3.183			.250		
Linear-by-Linear Association	1.206 ^b	1	.272	.364	.216	.141
N of Valid Cases	132					

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .62.

b. The standardized statistic is -1,098.

kesehatan ibu * lama menyusui

Crosstab

Count		lama menyusui			Total
		< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
kesehatan ibu	sakit	5	93	1	99
	tidak sakit	6	26	1	33
Total		11	119	2	132

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	6.418 ^a	2	.040	.041		
Likelihood Ratio	5.579	2	.061	.122		
Fisher's Exact Test	6.341			.021		
Linear-by-Linear Association	3.232 ^b	1	.072	.100	.072	.053
N of Valid Cases	132					

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

b. The standardized statistic is -1,798.

ALRODDIN
MAKASSAR

produksi asi * lama menyusui

Crosstab

Count		lama menyusui			Total
		< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
produksi asi	tidak lancar	5	4	0	9
	lancar	6	115	2	123
Total		11	119	2	132

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	28,230 ^a	2	.000	.003		
Likelihood Ratio	15,547	2	.000	.000		
Fisher's Exact Test	16,532			.000		
Linear-by-Linear Association	24,264 ^b	1	.000	.000	.000	.000
N of Valid Cases	132					

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,14.

b. The standardized statistic is 4,926.

paritas * lama menyusui

Crosstab

Count		lama menyusui			Total
		< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
paritas	primipara	2	33	1	36
	multipara	9	86	1	96
Total		11	119	2	132

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	.992 ^a	2	.609	.746		
Likelihood Ratio	.974	2	.615	.891		
Fisher's Exact Test	1.256			.515		
Linear-by-Linear Association	.855 ^b	1	.355	.525	.277	.175
N of Valid Cases	132					

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .55.

b. The standardized statistic is -.924.

berat badan lahir * lama menyusui

Crosstab

Count		lama menyusui			Total
		< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
berat badan lahir	bb lahir tidak normal	2	5	0	7
	bb lahir normal	9	114	2	125
Total		11	119	2	132

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	4.033 ^a	2	.133	.201		
Likelihood Ratio	2.824	2	.244	.201		
Fisher's Exact Test	4.244			.201		
Linear-by-Linear Association	3.699 ^b	1	.054	.100	.098	.086
N of Valid Cases	132					

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11.

b. The standardized statistic is 1,923.

kesehatan anak * lama menyusui

Crosstab

Count		lama menyusui			Total
		< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
kesehatan anak	sakit	3	111	2	116
	tidak sakit	8	8	0	16
Total		11	119	2	132

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	41.463 ^a	2	.000	.000		
Likelihood Ratio	25.968	2	.000	.000		
Fisher's Exact Test	25.840			.000		
Linear-by-Linear Association	35.906 ^b	1	.000	.000	.000	.000
N of Valid Cases	132					

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24.

b. The standardized statistic is -5,992.

persalinan * lama menyusui

Crosstab

Count		lama menyusui			Total
		< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
persalinan	sesar	5	10	0	15
	spontan/normal	6	109	2	117
Total		11	119	2	132

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	13.984 ^a	2	.001	.015		
Likelihood Ratio	9.645	2	.008	.010		
Fisher's Exact Test	10.093			.004		
Linear-by-Linear Association	12.583 ^b	1	.000	.003	.003	.002
N of Valid Cases	132					

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .23.

b. The standardized statistic is 3,547.

promosi susu formula * lama menyusui

Crosstab

Count		lama menyusui			Total
		< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
		ada promosi sufor	7	25	
tidak ada promosi sufor	4	94	2	100	
Total		11	119	2	132

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	10.613 ^a	2	.005	.005		
Likelihood Ratio	9.450	2	.009	.007		
Fisher's Exact Test	8.795			.005		
Linear-by-Linear Association	10.128 ^b	1	.001	.003	.003	.003
N of Valid Cases	132					

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48.

b. The standardized statistic is 3,182.

teknik menyusui * lama menyusui

Crosstab

Count		lama menyusui			Total
		< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
		teknik menyusui: teknik menyusui tidak baik	7	32	
teknik menyusui baik	4	87	2	93	
Total		11	119	2	132

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	7.383 ^a	2	.025	.016		
Likelihood Ratio	7.262	2	.026	.040		
Fisher's Exact Test	6.400			.021		
Linear-by-Linear Association	7.253 ^b	1	.007	.011	.009	.008
N of Valid Cases	132					

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,59.

b. The standardized statistic is 2,693.

dukungan keluarga * lama menyusui

Crosstab

Count		lama menyusui			Total
		< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
dukungan keluarga	tidak mendukung	0	1	0	1
	mendukung	11	118	2	131
Total		11	119	2	132

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.110 ^a	2	.946	1.000	
Likelihood Ratio	.208	2	.901	1.000	
Fisher's Exact Test	3.325			1.000	
Linear-by-Linear Association	.050	1	.824	^b	^b
N of Valid Cases	132				

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,02.

b. Cannot be computed because there is insufficient memory.

keluarga yang merokok * lama menyusui

Crosstab

Count		lama menyusui			Total
		< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
keluarga yang merokok	ada keluarga merokok	5	101	1	107
	tidak ada keluarga merokok	6	18	1	25
Total		11	119	2	132

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	11.468 ^a	2	.003	.003		
Likelihood Ratio	9.076	2	.011	.010		
Fisher's Exact Test	10.154			.003		
Linear-by-Linear Association	5.668 ^b	1	.017	.029	.025	.021
N of Valid Cases	132					

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38.

b. The standardized statistic is -2,381.

riwayat ANC * lama menyusui

riwayat ANC * lama menyusui Crosstabulation

Count	lama menyusui			Total
	< 6 bulan	6-24 bulan	> 24 bulan	
riwayat ANC baik	10	56	2	68
tidak baik	1	63	0	64
Total	11	119	2	132

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	9.663 ^a	2	.008	.003		
Likelihood Ratio	11.611	2	.003	.003		
Fisher's Exact Test	9.522			.003		
Linear-by-Linear Association	3.629 ^b	1	.057	.086	.050	.038
N of Valid Cases	132					

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,97.

b. The standardized statistic is 1,905.

ALRODDY
MAKASSAR