

**HUBUNGAN ANTARA DURASI KETUBAN PECAH DINI (KPD) DENGAN
APGAR SKOR NEONATUS DI RSUD. SYEKH YUSUF GOWA PERIODE
JANUARI - DESEMBER 2018**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NOVIA ANGGRAENI

NIM: 70600116041

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Hubungan Antara Durasi Ketuban Pecah Dini dengan Appar Skor Neonatus di RSUD Syekh Yusuf Gowa Periode Januari – Desember 2018**", yang disusun oleh **Novia Anggraeni, NIM: 70600116041**, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 21 Februari 2020**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 20 Februari 2020 M

26 Jumadil Akhir 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes (.....) 

Sekretaris : dr. Darmawansyih M.Kes (.....) 


Pembimbing I: dr. Asriani Sp.PD (.....) 

Pembimbing II: dr. Raully Ramadhani M.Kes (.....) 

Penguji I : dr. Jelita Inayah Sari M.Biomed (.....) 

Penguji II : Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag (.....) 

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Novia Anggraeni
NIM : 70600116041
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 29 November 1998
Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Pelita Teng Gantarang
Judul : Hubungan Antara Durasi Ketuban Pecah Dini dengan Apgar Skor Neonatus di RSUD Syekh Yusuf Gowa Periode Januari – Desember 2018

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Februari 2020

Penyusun,

Novia Anggraeni
NIM: 70600116041

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan limpahan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan proposal penelitian dengan judul, **“Hubungan Antara Durasi Ketuban Pecah Dini (KPD) dengan APGAR Skor Neonatus di RSUD Syekh Yusuf Gowa Periode Januari – Desember 2018”** Salam serta shalawat tiada henti dicurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan dunia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penelitian dan penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Maka sepatutnyalah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar terkhusus untuk ibu dan nenek tercinta, Rahmawati dan Nursiah yang telah membesarkan, mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Keduanya senantiasa memotivasi penulis juga memberikan dorongan moral dan material serta doa bagi penulis.

Penulis juga menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasinya dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis MA PhD. Selaku rektor UIN Alauddin Makassar, beserta pembantu Rektor I, II, III, dan IV yang selama ini memberikan bantuan fisik maupun material dan memberikan fasilitas dalam perkuliahan.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta pembantu Dekan I, II, dan III yang selama ini membantu dalam penyelesaian perkuliahan.
3. dr. Darmawansyah Syakir, M.Kes dan dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Pendidikan Dokter yang selama ini selalu memberikan motivasi dan dukungan atas perkuliahan kami dan juga pada penyelesaian skripsi ini.
4. dr. Asriani Sp.PD Selaku pembimbing I dan dr. Raully Ramadhani M.Kes selaku pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan penulis sampai taraf penyelesaian.
5. dr. Jelita Inayah Sari M.Biomed selaku penguji kompetensi dan Prof. Dr. H. Muh. Dahlan M. Ag selaku penguji agama yang telah membantu memberikan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Yusril Ihsanul Mukarram yang telah membantu selama penyusunan skripsi ini berupa tenaga dan semangat.
7. Teman-teman angkatan Pendidikan Dokter 2016 (NUCLE1) yang telah meberi dukungan dan batuan selama proses penyusunan skripsi.

Makassar, 04 Februari 2020

Penulis,

Novia Anggraeni

DAFTAR ISI

JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKIRPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipotesis.....	4
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	4
E. Kajian Pustaka	7
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ketuban Pecah Dini	10
B. APGAR Skor.....	18
C. Hubungan Ketuban Pecah Dini dengan Apgar Skor Neonatus	21
D. Kerangka Teori.....	25
E. Kerangka Konsep.....	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Metode Pengumpulan Data	29
F. Instrumen Penelitian	29
G. Pengolahan dan Analisis Data.....	29
H. Alur Penelitian.....	31
I. Etika Penelitian.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil.....	33
B. Pembahasan.....	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA	47
----------------------	----

LAMPIRAN	50
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penilaian Apgar Skor.....	19
Tabel 4.1 Nilai Apgar Skor Neonatus pada Ibu yang Mengalami Ketuban Pecah Dini	33
Tabel 4.2 Frekuensi Durasi KPD pada Ibu	34
Tabel 4.3 Hubungan Durasi KPD dengan Apgar Skor Neonatus.....	34
Tabel 4.4 Hubungan Durasi KPD dengan Denyut Jantung Neonatus	35
Tabel 4.5 Hubungan Durasi KPD dengan Pernapasan Neonatus.....	36
Tabel 4.6 Hubungan Durasi KPD dengan Tonus Otot Neonatus.....	37
Tabel 4.7 Hubungan Durasi KPD dengan Respon Reflex Neonatus.....	38
Tabel 4.8 Hubungan Durasi KPD dengan Warna Kulit Neonatus	38



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori	25
Bagan 2.2 Kerangka Konsep	26
Bagan 3.1 Alur Penelitian	31



ABSTRAK

Nama : Novia Anggraeni
Nim : 70600116041
Jurusan : Pendidikan Dokter
Judul : Hubungan Antara Durasi Ketuban Pecah Dini dengan Apgar Skor Neonatus di RSUD Syekh Yusuf Gowa Periode Januari – Desember 2018
Pembimbing I : dr. Asriani Sp.PD
Pembimbing II : dr. Raully Ramadhany M.Kes

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan kondisi pecahnya selaput ketuban sebelum adanya tanda persalinan. Durasi KPD menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi bayi baru lahir, semakin lama perlangsungan KPD maka akan menyebabkan hipoksia pada janin yang nantinya dapat dinilai menggunakan Apgar skor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan Apgar skor neonatus. Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan design penelitian *Cross-sectional*. Populasi penelitian ini ialah seluruh ibu yang didiagnosis KPD berdasarkan data rekam medik RSUD Syekh Yusuf Gowa periode januari – desember 2018.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang memiliki beberapa kriteria dan yang memenuhi sebagai sampel sebanyak 112 ibu dengan KPD yang kemudian dibagi dalam dua katogori penilain yakni <12 jam dan >12 jam. Hasil penelitian menunjukkan ibu dengan durasi KPD <12 jam didapatkan skor apgar sedang 12 kasus (10.71%) dan skor apgar normal sebanyak 64 kasus (57.14%), sedangkan KPD dengan durasi >12 jam didapatkan skor apgar berat 2 kasus (1.79%), skor apgar sedang 24 kasus (21.43%) dan skor apgar normal sebanyak 36 kasus (32.14%). Analisis bivariate menggunakan uji Chi-square diperoleh nilai $p=0,000$ ($p > 0,05$). Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa durasi ketuban pecah dini berpengaruh terhadap Apgar skor neonatus.

Kata kunci: Durasi KPD, Apgar skor.

ABSTRACT

Nama : Novia Anggraeni
Nim : 70600116041
Jurusan : Pendidikan Dokter
Judul : Hubungan Antara Durasi Ketuban Pecah Dini dengan Apgar Skor Neonatus di RSUD Syekh Yusuf Gowa Periode Januari – Desember 2018
Pembimbing I : dr. Asriani Sp.PD
Pembimbing II : dr. Raully Ramadhany M.Kes

Premature rupture of membranes (PROM) is rupture of the membranes before the signs of childbirth. The duration of PROM is one of the factors that can affect the condition of the newborn, the longer the PROM will continue to cause hypoxia in the fetus which can later be assessed using the Apgar score. This study aims to determine whether there is a relationship between the duration of premature rupture of membranes with Apgar neonatal scores. This research is an analytic observational research with cross-sectional design. The population of this study was all mothers diagnosed by PROM based on medical record data of RSUD Syekh Yusuf Gowa in the January-December 2018 period. The sampling technique used purposive sampling which had several criteria and that fulfilled as many as 112 mothers with PROM which were then divided into two categories of assessment. i.e. <12 hours and >12 hours. The results showed that mothers with PROM duration <12 hours obtained moderate Apgar scores 12 cases (10.71%) and normal Apgar scores 64 cases (57.14%), whereas PROM with duration > 12 hours obtained severe Apgar scores 2 cases (1.79%), moderate Apgar score was 24 cases (21.43%) and normal apgar score was 36 cases (32.14%). Bivariate analysis using Chi-square test obtained p value = 0,000 ($p > 0.05$). The conclusion from this study is duration of premature rupture of membranes has an effect on the neonatal Apgar scores.

Keyword: Duration of PROM, Apgar scores

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan ibu dan anak di Indonesia menjadi salah satu fokus kesehatan utama, termasuk diantaranya ibu hamil yang mencakup mulai dari masa awal kehamilan hingga lahirnya bayi (Colti, 2014). Pada rentan periode ini ada berbagai kondisi yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas ibu terjadi yakni perdarahan, infeksi, tekanan darah tinggi selama kehamilan, partus lama dan abortus (Depkes RI, 2015). Kemudian, salah satu penyebab partus lama ialah ketuban pecah dini (KPD).

Ketuban pecah dini (KPD) adalah suatu kondisi dimana selaput ketuban pecah sebelum waktunya melahirkan dan tidak disertai dengan adanya tanda-tanda persalinan (Legawati, 2018). Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) didapatkan dari semua kelahiran ada sekitar 5-10% kejadian KPD. Dari semua kelahiran didapatkan 1% kasus KPD terjadi pada usia kehamilan preterm dan 70% kasus KPD terjadi pada kehamilan aterm (WHO, 2014). Kemudian, kasus KPD di Indonesia belum ada data yang dilaporkan secara nasional, namun dari beberapa rumahsakit menunjukkan angka KPD masih cukup tinggi seperti di RSUP Dr. M. Djamil Padang diperoleh 230 kejadian ketuban pecah dini (KPD) dari 2839 persalinan pada tahun 2011 dan di RSUP Dr. Hasan Sadikin ada 248 kasus KPD dari 1812 persalinan tahun 2015 (Hanifa, 2017). Kemudian di Sulawesi Selatan belum ada

data pasti terkait KPD, berdasarkan data di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 didapatkan 219 kasus KPD dari 3494 persalinan.

Sebanyak 30% kasus KPD merupakan penyebab kelahiran prematur dan masalah pernafasan seperti asfiksia yang dapat dinilai dengan Apgar skor yang mencakup penilaian terhadap denyut jantung, pernafasan, tonus otot, respon reflex dan warna kulit (Saputra,2014). Kondisi asfiksia dapat berujung pada kematian jika tidak tertangani, berdasarkan Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan angka kematian neonatus (AKN) sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2017). Kemudian, berdasarkan Provil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 menunjukkan total 838 kasus AKN dengan peresentasi 5.64 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data ini, Bone menjadi kabupaten dengan AKN tertinggi dengan 94 kasus dan kedua ialah Kab.Gowa dengan 82 kasus di tahun 2016. Masalah pernafasan yang timbul akibat KPD menjadi salah satu penyebab AKN sesuai dengan data Kemenkes RI tahun 2012 yakni penyebab kematian neonatal 0–6 hari adalah gangguan pernapasan (37%), prematurias (34%), sepsis (12%), hipotermi (7%), ikterus (6%) dan kelainan kongenital (1%). Angka kematian neonatus yang masih tinggi, menjadi dasar pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menargetkan pada tahun 2030 setiap negara adalah menurunkan angka kematian bayi baru lahir setidaknya serendah 12 per 1000 kelahiran hidup (You et al, 2015).

Kejadian KPD dapat mempengaruhi janin dalam rahim, yang dimana Al-Quran menyebutkan bahwa Rahim adalah tempat teraman bagi janin. Adapun hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mu'minūn/23: 13.

ثُمَّ جَعَلْنَا هُنَّ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

Terjemahannya :

“Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)” (Q.S Al-Mu'minūn/23: 13).

Tergambar dalam surah ini, bahwa rahim adalah tempat yang aman bagi janin. Namun saat terjadi kondisi tertentu di dalam rahim seperti selaput ketuban pecah sebelum waktu persalinan maka tempat yang aman ini (rahim) berubah menjadi tempat yang membahayakan bagi bayi, hal ini berefek pada kondisi setelah kelahirnya yang dapat dinilai pada Apgar skor bayi.

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menunjukkan angka KPD yang cukup tinggi di RSUD Syekh Yusuf Gowa dan kegawat daruratan yang ditimbulkan terhadap neonatus akibat KPD pada ibu, berdasarkan data Gowa juga menjadi Kabupaten ke dua tertinggi dengan AKN, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk menilai Apgar skor neonatus di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan ibu yang mengalami ketuban pecah dini dengan menyingkirkan berbagai faktor yang dapat mengintervensi nilai Apgar neonatus seperti penyakit ibu (hipertensi, anemia dan penyakit jantung), masalah plasenta bayi seperti solusio, polihidramnion, bayi kembar dan lainnya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini (KPD) dengan Apgar skor neonatus di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018 ?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan Apgar skor neonatus.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan Apgar skor neonatus.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Ketuban Pecah Dini

a. Definisi :

Ketuban pecah dini adalah suatu kondisi dimana pecahnya selaput ketuban sebelum waktunya melahirkan yang tanpa ditandai adanya tanda-tanda persalinan (Prawirohardjo, 2016).

b. Kriteria Objektif :

- 1) < 12 Jam : Durasi KPD cepat
- 2) > 12 Jam : Durasi KPD lama

2. *Apgar Skor Neonatus*

a. Definisi :

Apgar skor merupakan suatu lembaran penilaian yang mencakup beberapa hal untuk menilai kondisi bayi baru lahir apakah normal atau neonatus mengalami asfiksia (Prawirohardja, 2016).

b. Kriteria Objektif :

- 1) Asfiksia berat : Jika nilai APGAR 0-3.
- 2) Asfiksia sedang : Jika nilai APGAR 4-6.
- 3) Bayi normal atau sedikit asfiksia : Jika nilai APGAR 7-10.

3. *Penilaian dalam Apgar Skor*

a. Denyut jantung

1) Definisi

Denyut jantung adalah detakan yang dapat didengar menggunakan stetoskop, dimana suara tersebut berasal dari proses pemompaan dan pengisian jantung.

2) Kriteria Objektif :

- a) Nilai 0 : Tidak terdengar
- b) Nilai 1 : <100/ menit
- c) Nilai 2 : >100/ menit

b. Pernafasan

1) Definisi

Pernafasan adalah proses untuk pengangkutan O_2 menuju paru-paru yang disebut inspirasi dan pengeluaran CO_2 dari paru yang disebut ekspirasi, hal ini merupakan mekanisme tubuh untuk memenuhi kebutuhan sel.

2) Kriteria Objektif :

- a) Nilai 0 : Hilang atau tidak ada
- b) Nilai 1 : Lambat/ takteratur/ lemah
- c) Nilai 2 : Normal atau bayi menangis

c. Tonus otot

1) Definisi

Tonus otot adalah proses kontraksi otot yang sedang berlangsung yang dapat dinilai pada pergerakan dan perabaan.

2) Kriteria Objektif :

- a) Nilai 0 : Lemah atau tidak ada gerakan
- b) Nilai 1 : Lengan dan kaki dalam posisi fleksi dengan sedikit gerak
- c) Nilai 2 : Bergerak aktif dan spontan

d. Respon reflex

1) Definisi

Respon reflex adalah gerakan yang terjadi segera setelah adanya rangsangan dan hal ini terjadi tanpa sadar.

2) Kriteria Objektif :

- a) Nilai 0 : Tidak ada respon terhadap stimulasi

- b) Nilai 1 : Wajah meringis saat distimulasi
 - c) Nilai 2 : Meringis, batuk, menangis atau bersin saat stimulasi
- e. Warna kulit

1) Definisi

Warna kulit merupakan suatu penilaian untuk mengetahui kondisi sirkulasi tubuh.

2) Kriteria Objektif :

- a) Nilai 0 : Biru seluruh tubuh
- b) Nilai 1 : Badan merah muda, ekstremitas biru
- c) Nilai 2 : Seluruh badan merah muda

E. Kajian Pustaka

1. Andini Kartika Sari, Yudhiakuari Sincihu, B. Triagung Ruddy (2018) *Tingkat Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Lamanya Ketuban Pecah Dini pada Persalinan Aterm*, memberikan kesimpulan bahwa semakin lama ketuban pecah maka semakin rendah skor Apgar yang menggambarkan tingkat asfiksia yang semakin buruk.
2. Nur Rohmawati, Arulita Ika Fibriana (2018) *Ketuban Pecah Dini di RS Umum Daerah Ungaran*, memberikan kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini yakni kelainan letak, paritas ibu, riwayat KPD, anemia selama kehamilan, paparan asap rokok, jenis pekerjaan ibu dan faktor yang tidak menjadi penyebab dari KPD ini ialah kehamilan kembar, genetik maupun riwayat keguguran berulang.

3. Hanifa Hafni, Syahredi SA, Finny Fitry Yani (2017) *Hubungan antara Lama Ketuban Pecah Dini dengan Skor Apgar Neonatus di RSUP Dr. M Djamil Padang*, memberikan kesimpulan bahwa tidak didapatkan hubungan antara lama ketuban pecah dini dan apgar skor neonatus. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti proses persalinan, kelengkapan ANC dan komplikasi kehamilan.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Mengetahui hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan Apgar skor neonatus di RSUD Syekh Yusuf Gowa periode Januari – Desember 2018.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui nilai Apgar skor pada neonatus dengan ibu yang mengalami KPD di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- b. Mengetahui frekuensi kejadian ketuban pecah dini di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- c. Mengetahui hubungan durasi KPD dengan denyut jantung neonatus.
- d. Mengetahui hubungan durasi KPD dengan pernapasan neonatus.
- e. Mengetahui hubungan durasi KPD dengan tonus otot neonatus.
- f. Mengetahui hubungan durasi KPD dengan respon reflex neonatus.
- g. Mengetahui hubungan durasi KPD dengan warna kulit neonatus.

G. Kegunaan Penelitian

1. Bagi institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan, dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang bermanfaat dan dapat menjadi sumber motivasi bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Pendidikan Dokter.

2. Bagi praktisi

Merupakan salah satu sumber informasi bagi Rumah Sakit dalam menanggulangi kasus ketuban pecah dini, hal ini merupakan informasi yang berharga untuk melakukan program upaya pencegahan. menjadi bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

3. Bagi peneliti

Menjadi pengalaman berharga dalam memperluas wawasan keilmuan dalam penelitian serta menerapkan ilmu yang telah didapat selama studi khususnya mengenai hubungan antara ketuban pecah dini dengan Apgar skor neonatus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketuban Pecah Dini

1. Definisi

Ketuban pecah dini (KPD) adalah keadaan dimana selaput ketuban pecah dan tidak ada tanda persalinan (Prawirohardjo, 2016). Ketuban pecah dini didefinisikan juga sebagai suatu kondisi pecahnya selaput ketuban sebelum waktunya tanpa terjadi proses persalinan dan hal ini dapat terjadi pada usia kehamilan aterm ataupun preterm (Leveno, 2015). Ketuban pecah dini juga didefinisikan sebagai kondisi pecahnya ketuban secara spontan 1 jam atau lebih sebelum dimulainya persalinan (Hakimi, 2003). Kemudian KPD ini dikategorikan berdasarkan usia kehamilan yakni KPD usia aterm dan KPD preterm yakni ketika usia kehamilan <37 minggu (Prawirohardjo, 2016).

2. Epidemiologi

Menurut WHO, kejadian ketuban pecah dini (KPD) berkisar antara 5-10% dari semua kelahiran. KPD preterm terjadi 1% dari semua kehamilan dan 70% kasus KPD terjadi pada kehamilan aterm. Pada 30% kasus KPD merupakan penyebab kelahiran prematur (WHO, 2014).

Di Indonesia sendiri, untuk data nasional terkait dengan ketuban pecah dini (KPD) belum ada data yang secara terperinci terkait angka kejadian kasus ini, namun dari beberapa penelitian sebelumnya ada beberapa data yang

didapatkan terkait dengan Insiden KPD di Indonesia yakni berkisar 4,5% - 6% dari seluruh kehamilan. Ketuban Pecah Dini (KPD) di beberapa Rumah Sakit di Indonesia cukup bervariasi yakni diantaranya: di RS Sardjito sebesar 5,3%, RS Hasan Sadikin sebesar 5,05%, RS Cipto Mangunkusumo sebesar 11,22%, RS Pringadi sebesar 2,27% dan RS Kariadi yaitu sebesar 5,10% (Sudarto, 2016).

3. *Etiologi dan Faktor Resiko*

Penyebab dari ketuban pecah dini (KPD) belum jelas secara pasti, karena ada banyak faktor yang terlibat dalam kasus KPD dan untuk masing-masing individu yang mengalami kejadian ini biasanya memiliki faktor pemicu yang berbeda, adapun faktor resiko yang terlibat dalam KPD yakni: (Manuaba, 2012 dan Prawirohardjo, 2016).

a. Faktor Umum

Infeksi genitalial selama kehamilan, hal ini dapat menyebabkan segmen bawah dari selaputan terinfeksi dan mengalami kerapuhan sehingga dapat timbul KPD. Infeksi ini dapat disebabkan oleh karena ibu hamil kurang memperhatikan kebersihannya, sedangkan dalam islam kebersihan adalah sesuatu yang utama seperti dalam hadis di bawah ini :

أَلْتَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya:

“Kebersihan sebagian dari iman” (HR. Al-Tirmidzi).

b. Faktor Sosial

Sosial ekonomi rendah ini terkait dengan faktor rendahnya vitamin C dan ion Cu dalam serum. Dalam masa kehamilan kecukupan nutrisi bagi ibu hamil harus tercukupi dan wilayah tinggal juga berpengaruh karena dapat memudahkan infeksi. Sudah semestinya suami semestinya mengupayakan hal ini seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Al- Baqarah/2: 233, di bawah ini :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahannya:
 “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”. (Q.S Al- Baqarah/2: 233)

c. Faktor Genetik

Faktor genetik turut berpengaruh, namun sampai saat ini belum ada penelitian terkait pembuktian hal ini.

d. Faktor Obstetrik

Faktor obstetri yang mempengaruhi terjadinya ketuban pecah dini yaitu:

- 1) Overdistensi uterus oleh karena kehamilan kembar (gemeli) dan polihidramnion, hal ini akan menyebabkan tingginya tekanan yang menimbulkan peregangan sehingga rentan terjadi KPD.
- 2) Serviks inkompeten yaitu, ini terkait dengan defek serviks baik dari segi fungsi dan strukturnya sehingga kehamilan susah dipertahankan.
- 3) Kelainan letak janin, contohnya letak lintang.

4. Mekanisme Ketuban Pecah Dini

Ketuban pecah dini secara umum disebabkan oleh karena kontraksi uterus dan peregangan yang terjadi secara berulang. Secara fisiologis diawal kehamilan selaput ketuban sangat kuat, hal ini dipengaruhi oleh komponen kolagen yang mempertahankan kekuatan membran. Sedangkan pada saat mendekati persalinan kolagen akan mengalami degradasi oleh matriks metalloproteinase (MMP) yang sebelumnya di awal kehamilan selalu di hambat oleh inhibitor jaringan spesifik dan inhibitor protease (TIMP-1) agar kolagen tetap dapat mempertahankan kekuatan selaput ketuban. Salah satu faktor penyebab terjadinya ketuban pecah dini ialah adanya defisiensi asam askorbat sebagai komponen kolagen, kembali lagi ke fisiologi awal yang terjadi pada selaput ketuban yang kekuatannya dipertahankan oleh kolagen. Ketika terdapat faktor pemicu, seperti kehamilan kembar ataupun polihidramnion maka tekanan uterus meningkat dan terjadilah peregangan yang dapat menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini. Kemudian, infeksi assenderen dari vagina juga dapat mengenai selaput ketuban yang akan menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh dan menyebabkan ketuban pecah dini (Prawirahardjo, 2016).

5. Diagnosis

Secara prosedural, diagnosis ketuban pecah dini ditegakkan dengan cara:

- a. Anamnesis

Didapatkan pasien mengeluhkan merasa basah pada vagina atau didapatkan pelepasan cairan secara tiba-tiba dari jalan lahir. Cairan berbau khas, dan perlu juga diperhatikan warna keluarnya cairan tersebut, his belum teratur atau belum ada dan pengeluaran lendir darah tidak ada (Prawirahardjo, 2016).

b. Pemeriksaan fisik

- 1) Dilakukan pemeriksaan TTV, hal ini untuk memastikan kondisi umum pasien. Apabila didapatkan takikardi ini bisa menandakan ada infeksi yang terjadi dan harus dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- 2) Inspeksi vulva, untuk melihat apakah ada cairan yang keluar dan bila ada maka diperhatikan pula warna, jumlah dan baunya.
- 3) Palpasi pada perut ibu agar dapat menentukan usia kehamilan, letak janin, jumlah janin, presentasi, taksiran berat jani dan menilai kontraksi uterus.
- 4) Auskultasi pada perut ibu untuk mendengarkan DJJ agar dapat menentukan kondisi janin apakah normal, gawat janin atau janin mati (Prawirahardjo, 2016).

c. Pemeriksaan dalam

Pemeriksaan dalam perlu dipertimbangkan karena jari pemeriksa dapat mengakumulasi segmen bawah rahim dengan flora vagina yang normal. Pemeriksaan dalam biasanya hanya dilakukan saat penanganan kala aktif (terminasi kehamilan) dan pada pemeriksaan ini didapatkan

cairan pada vagina dan selaput ketuban sudah tidak ada (Prawirahardjo, 2016).

d. Pemeriksaan penunjang Menurut Norwitz (2008), pemeriksaan penunjang dalam menegakkan diagnosis ketuban pecah dini antara lain:

- 1) Analisis urin dan kultur untuk infeksi saluran kemih.
- 2) USG untuk menentukan usia kehamilan dan kondisi janin.
- 3) Pemeriksaan serviks atau kultur Chlamydia trachomatis atau Neisseria Gonorrhoea untuk menilai apakah terdapat infeksi atau tidak.
- 4) Pemeriksaan vagina untuk vaginosis bacterial (VB) dan trikomoniasis.
- 5) Pemeriksaan pH dengan kertas nitriazin, pH yang rendah atau asam akan menimbulkan warna merah dan pH yang basa tampak warna biru.
- 6) Pemeriksaan mikroskopik akan tampak kristalisasi cairan amnion saat mengering.

6. *Penatalaksanaan*

Adapun penanganan ketuban pecah dini menurut Prawirahardjo (2016), dapat dilakukan dengan 2 hal :

a. Konservatif

- 1) Dilakukan rawat inap dan pemberian Antibiotik (ampisilin 4 x 500 mg atau eritromisin) dan juga metronidazole 2 x 500 mg selama 7 hari
- 2) Usia kehamilan (<32-34 minggu) maka dirawat selama masih ada pelepasan cairan ketuban

- 3) Jika (usia kehamilan 32-37 minggu, belum inpartu, tidak ada infeksi dan tes busa negatif), maka diberikan deksametason diobservasi tanda infeksi dan juga kondisi janin. Jika usia kehamilan 37 minggu maka dilakukan terminasi.
 - 4) Jika (usia kehamilan 32-37 minggu, sudah inpartu dan tidak didapatkan infeksi) maka diberikan tokolitik (salbutamol), deksametason kemudian setelah 24 jam dilakukan induksi.
 - 5) Jika usia kehamilan 32-37 minggu dan setelah dilakukan penilaian berupa (suhu, leukosit, tanda-tanda infeksi intra uterin) dan didapatkan terjadi infeksi maka berikan antibiotik dan induksi.
 - 6) Pada usia kehamilan 32-34 minggu berikan steroid berupa deksametason dengan dosis IM 5 mg per 6 jam sebanyak 4 kali, hal ini untuk mempersiapkan kematangan paru dan jika memungkinkan maka dapat dilakukan pemeriksaan kadar lesitin tiap minggu.
- b. Aktif
- 1) Saat usia kehamilan >37 minggu maka lakukan induksi dengan oksitosin dan jika gagal maka dapat dilakukan seksio sesarea. Selain itu juga dapat diberikan misoprosol 50 mg tiap 6 jam maksimal 4 kali pemberian.
 - 2) Bila didapatkan infeksi maka diberikan antibiotik dan persalian :

- a) Bila skor pelvik <5 , maka dilakukan pematangan serviks, kemudian induksi. Jika tidak berhasil, maka dilakukan tindakan seksio sesarea.
- b) Bila skor pelvik >5 , maka dilakukan induksi persalinan dan partus pervaginam.

7. *Komplikasi Ketuban Pecah Dini*

Ketuban pecah dini dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi ibu dan bayi, Hal ini dinataranya ialah (Prawirohardjo, 2016 dan Norwitz,2008):

- a. Korioamnionitis
Korioamnionitis merupakan kondisi terjadinya infeksi bakteri pada korion, amnion dan cairan amnion. Hal ini merupakan hal yang harus segera ditangani karena jika tidak maka ibu dan janin bisa terkena sepsis
- b. Partus lama.
- c. Meningkatkan tindakan operatif obstetric.
- d. Morbiditas dan mortalitas maternal.
- e. Persalinan Prematur.

Masalah yang dapat terjadi pada persalinan prematur diantaranya adalah sindrom gawat napas, hipotermia, masaiah asupan makanan neonatus, prematuritas retinopati, perdarahan intraventrikular, necrotizing enterocolitis, gangguan otak (risiko untuk cerebral palsy), hiperbilirubinemia dan sepsis.

- f. Prolaps funiculii penurunan tali pusat Hal ini bisa menyebabkan gawat Janin dan kematian janin akibat hipoksia (sering terjadi pada presentasi bokong atau Ietak lintang).
- g. Hipoksia dan asfiksia sekunder Mengakibatkan kompresi tali pusat, prolaps uteri, nilai APGAR rendah, ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intrakranial. gagal ginjal, dan sndrom gawat napas.

B. APGAR Skor

1. Definisi Apgar Skor

APGAR skor adalah suatu penilaian yang digunakan untuk menilai kondisi bayi baru lahir apakah normal atau asfiksia, penilain ini mencakup beberapa point penilaian di dalamnya berupa frekuensi jantung, usaha nafas, tonus otot, warna kulit dan reaksi terhadap rangsang (prawirohardjo, 2016). Pada tahun 1952 Apgar skor ini pertama kali diperkenalkan oleh Viginia dan sampai saat ini penilain bayi baru lahir di seluruh belahan dunia masih menggunakan penilaian Apgar untuk menentukan apakah membutuhkan resusitasi dan juga untuk menilai keberhasilan resusitasi apabila sudah dilakukan sebelumnya. Apgar skor merupakan penilaian yang dilakukan setelah 1 menit kelahiran bayi lengkap dan 5 menit berikutnya dinalakukan penilaian Apgar kembali (Hassan R., 2007). Sehingga secara keseluruhan penilaian Apgar dilakukan 2 kali hal ini dilakukan karena pada penilaian pertama itu digunakan untuk menilai toleransi bayi terhadap proses kelahirannya dan penilaian ke dua untuk menilai adaptasi bayi terhadap

lingkungan barunya, Apgar skor ini bisa dilakukan lebih dari dua kali jika kondisi bayi tidak stabil dengan jarak penilaian per 5 menit dari penilaian sebelumnya (Abdoerrachman dkk, 2007).

2. *Klasifikasi Apgar Skor*

Tabel 2.1 Penilaian Apgar Skor (Hassan R., 2007).

Tanda Vital	0	1	2
Denyut jantung	Tidak terdengar	<100/ menit	>100/ menit
Pernafasan	Hilang	Lambat / tak teratur / lemah	Normal / bayi menangis
Tonus otot	Lemah / tidak ada gerakan	Lengan dan kaki dalam posisi fleksi dengan sedikit gerak	Bergerak aktif dan spontan
Respon refleks	Tidak ada respon terhadap stimulasi	Wajah meringis saat distimulasi	Meringis, batuk, menangis atau bersin saat stimulasi
Warna kulit	Biru seluruh tubuh	Badan merah muda, ekstremitas biru	Seluruh badan merah muda

Pada masing-masing poin penilaian Apgar dapat diberikan skor 0, 1, 2.

Skor ini disesuaikan dengan kondisi bayi dan lembar penilaian, kemudian setelah melakukan penilaian secara keseluruhan maka skor yang diperoleh di total dan kemudia di kelompokkan yakni (Prwairohardjo, 2016) :

- 4) Asfiksia berat : Jika nilai APGAR 0-3.
- 5) Asfiksia sedang : Jika nilai APGAR 4-6.
- 6) Bayi normal atau sedikit asfiksia : Jika nilai APGAR 7-10.

3. Faktor yang Mempengaruhi Apgar Skor

Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi Apgar skor yakni :

a. Faktor Ibu (Prawirohardjo, 2014)

- 1) Hipoksia ibu, hal ini biasanya disebabkan oleh hipoventilasi yang kemudian menyebabkan penghantaran O₂ ke janin melemah. Jika berlangsung lama maka bayi lahir akan memiliki Apgar yang buruk karena hipoksia lama.
- 2) Penyakit ibu, penyakit yang berpengaruh ialah gangguan vaskuler seperti hipertensi, hipotensi ataupun penyakit jantung. Hal ini berpengaruh terhadap penyaluran O₂ dan nutrisi ke janin.
- 3) Sosial ekonomi, ini berkaitan dengan faktor nutrisi ibu yang akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Jika mengalami hambatan pertumbuhan maka saat lahir bayi beresiko BBLR dan akan menyebabkan asfiksia.

b. Faktor Plasenta (Prawirohardjo, 2014).

- 1) Struktur, ukuran dan perlekatan plasenta
- 2) Solusio plasental, biasanya ini disebabkan oleh trauma yang akan menyebabkan plasenta terlepas secara parsiala atau total dari perlekatannya yang dapat memicu perdarahan pada ibu yang juga akan menurunkan suplai nutrisi dan O₂ ke janin.
- 3) Plasenta Previa, kondisi ini pada saat proses persalinan akan membahayakan bagi ibu dan bayi, pada bayi saat terjadi penurunan

kepala maka otomatis akan menekan plasenta sehingga akan mengganggu transport O_2 dan menyebabkan bayi hipoksia.

c. Faktor Janin (Manuaba, 2007).

- 1) Prematur, bayi yang lahir <37 minggu dikategorikan sebagai bayi premature. Pada kondisi ini, organ bayi belum berkembang secara sempurna khususnya paru yang akan menyebabkan saat lahir bayi akan kekurangan surfaktan yang menyebabkan paru kolaps dan bayi kesulitan untuk bernafas.
- 2) BBLR, saat berat bayi lahir <2500 gr tanpa memandang usia gestasi. Kondisi ini dapat menimbulkan kondisi asfiksia neonatorum
- 3) Kelainan kongenital, hal ini seperti penyakit jantung bawaan yang akan mempengaruhi kondisi bayi.

d. Faktor Persalinan (Manuaba, 2007).

- 1) Partus Lama
- 2) Partus dengan tindakan, contohnya vakum atau forcep yang akan menimbulkan asfiksia neonatorum yang disebabkan oleh tekanan langsung pada kepala, hal ini dapat menekan pusat-pusat vital pada medula oblongata, aspirasi air ketuban, mekonium, cairan lambung dan perdarahan atau edema jaringan pusat saraf pusat.

C. Hubungan Ketuban Pecah Dini dengan Apgar Skor

Secara fisiologi, ketuban akan pecah di akhir kala I dan memasuki proses persalinan, pecahnya ketuban ini secara normal dikarenakan oleh semakin

bertambahnya usia kehamilan seseorang maka uterus juga akan membesar karena dipengaruhi oleh pertumbuhan janin dan pecahnya ketuban menjelang proses persalinan karena pada akhir trimester ke III, maka komponen kolagen yang menyusun selaput ketuban akan mengalami degradasi oleh matriks metalloproteinase (MMP) (Prawirohardjo, 2016).

Selain hal di atas, ada suatu kondisi yang disebut dengan ketuban pecah dini (KPD) yang merupakan pecahnya ketuban sebelum terjadinya persalinan (Prawirohardjo, 2016). KPD ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti overdistensi uterus (gemili ataupun polyhidramnion), infeksi selama kehamilan yang dapat merusak selaput ketuban, inkompetensi servik ataupun kelainan letak. Berdasarkan penelitian Nur Rohmawati tentang faktor resiko KPD, dijelaskan bahwa belum ada satu faktor utama yang menjadi pencetus karena pada masing-masing kasus di dalam sampel penelitiannya didapatkan banyak variasi faktor penyebab per kasusnya (Nur Rohmawati, 2018).

Terkait dengan KPD, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi bagi neonatus terutama dipengaruhi oleh lamanya KPD. Salah satu komplikasi terhadap neonatus akibat KPD ialah Asfiksia neonatorum yakni bayi tidak segera bernafas secara spontan dan teratur setelah kelahirannya (Hanifa, 2017). Asfiksia neonatorum terjadi akibat kondisi hipoksia yang dialami bayi yang dapat timbul pada saat kehamilan ataupun segera setelah bayi lahir (Andini, 2014).

Asfiksia sendiri dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti kelainan kongenital bayi, aspirasi mekonium ataupun kondisi ibu. Asfiksia neonatorum dapat

dinilai dengan menggunakan Apgar skor yang mencakup beberapa komponen yakni denyut jantung, frekuensi nafas, tonus otot, respon reflex dan warna kulit bayi (Saputra, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakuakn oleh Andini Kartika, dkk. Didapatkan bahwa ada hubungan antara lamanya ketuban pecah dini dengan Apgar skor neonatus. Dimana, dijelaskan bahwa, bayi yang lahir dengan ibu yang menagalami KPD >12 jam memiliki Apgar yang rendah <7, sedangkan untuk yang lahir dengan ibu KPD <12 jam maka Apgar skor nya rata-rata >7 yang tergolong dalam asfiksia ringan atau normal (Andini, 2014). Dan untuk penelitian yang dilakukan oleh Hanifa, dkk. yang dilakukan di RSUP. Dr. M Djamil Padang yang dimana dari 164 sampel ibu dengan KPD didapatkan Apgar <7 pada 9 neonatus dan selebihnya Apgar skor nya ialah >7 (Hanifa Hafni, 2017).


Kejadian KPD ini dimulai saat selaput ketuban robek yang bisa terjadi karena struktur membrane rapuh ataupun peregangan yang terjadi selama proses kehamilan. KPD yang terjadi ini akan menyebabkan terjadinya pelepasan cairan amnion secara terus menerus yang nantinya akan menyebabkan oligohidramnion, semakin banyak cairan yang hilang maka akan memperberat tingkat oligohidramnion (Hassan, 2007). Hal ini akan menyebabkan tali pusat yang menghubungkan ibu dan bayi akan tertekan, yang kemudian menyebabkan penghantaran O₂ terhambat ke bayi. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya kondisi asfiksia atau hipoksia, sebelum bayi dilahirkan dan bayi mengalami asfiksia hal inilah yang akan menyebabkan kondisi takikardi karena merupakan usaha tubuh untuk mekompensasi kondisi

tersebut dalam memenuhi kebutuhan pasokan O₂ terutama organ vital dan jika proses ini terus berlanjut maka denyut jantung janin akan perlahan menurun atau disebut juga bradikardi yang nantinya kondisi ini dapat dinilai pada Apgar skor, pada penilaian Apgar juga dilakukan penilaian pernafasan dan tonus otot, biasanya pada bayi hipoksia tidak memiliki usaha nafas ataupun bernafas tapi lemah namun ini berdasarkan berapa lama hipoksia yang dialami, begitu pula dengan tonus otot bayi. Hal ini terkait karena adanya kondisi hipoksia maka suplai O₂ rendah dan tidak ada yang dapat digunakan untuk metabolisme sel sehingga energi kurang atau tidak ada energi yang dapat digunakan dalam usaha nafas bayi maupun tonus otot bayi. Kemudian, penilaian Apgar juga mencakup penilaian warna kulit, kondisi hipoksia bayi berat ataupun ringan dapat dinilai berdasarkan perubahan warna kulit. Hal ini karena Hemoglobin yang terdapat dalam eritrosit bertugas untuk mengangkut O₂ yang dimana ketika Hb dan O₂ ini berikatan, maka akan nampak berwarna merah (Sherwood, 2014).

Semakin lama periode laten, semakin lama pula kala satu persalinan dan semakin besar insidensi infeksi. Janin bisa terinfeksi sekalipun tidak terlihat tanda-tanda sepsis pada ibu. Tempat paling sering mengalami infeksi adalah traktus respiratorius. Kebanyakan pneumonia yang terjadi dalam 2 minggu pertama kehidupan berasal dari dalam Rahim, setelah terjadi persalinan dan ditemukan tanda infeksi biasanya bayi memiliki nilai Apgar dibawah 7 (Prawirohardjo, 2016)

D. Kerangka Teori

Bagan 2.1 Kerangka Teori



Keterangan :

————→ : Diteliti

- - - -> : Tidak diteliti

E. Kerangka Konsep

Bagan 2.2 Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini berlandaskan pada pengujian teori-teori yang telah ada dengan melakukan pengukuran variable-variabel dengan angka, kemudian melakukan analisis data dengan prosedur analitik.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, penelitian ini akan berlangsung selama satu bulan yakni tanggal 27 Desember 2019 sampai 27 Januari 2020.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Dalam pendekatan *cross sectional*, pengukuran variable dependen yakni (Apgar skor neonatus) dan variable independen yakni (durasi ketuban pecah dini) dilakukan observasi simultan pada waktu yang sama dan dilakukan hanya satu kali.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin yang mengalami ketuban pecah dini di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada 01 Januari hingga 31 Desember 2018 sebanyak 219 orang.

2. Sampel

Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling* di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada 01 Januari hingga 31 Desember 2018 sebanyak 112 orang. Dalam hal ini, sampel yang dipilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, ada dua golongan kriteria yakni kriteria inklusi dan eksklusi.

b. Kriteria Inklusi

- 1) Ibu bersalin yang mengalami ketuban pecah dini di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada 01 Januari – 31 Desember 2018.
- 2) Ibu melahirkan dengan persalinan spontan pervaginam tanpa tindakan (vakum atau forsep), kehamilan cukup bulan (aterm) dan bayi dengan berat badan normal (2500-4000 gram).

c. Kriteria Eksklusi

- 1) Ibu yang mengalami KPD dengan kehamilan ganda (gamelli).
- 2) Bayi yang dilahirkan ibu dengan KPD mengalami kelainan kongenital.
- 3) Ibu dengan penyakit vaskuler : Penyakit jantung dan Hipertensi

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui rekam medik di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tanggal 1 Januari – 31 Desember 2018.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sebagai kebutuhan utama dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengajuan surat permohonan kepada pihak RSUD Syekh Yusuf Gowa, kemudian setelah mendapatkan izin dan surat pengantar ke bagian rekam medik, ruang persalinan dan ruang perawatan bayi. Setelah itu barulah dilakukan pengamatan dan pencatatan data ke dalam tabel observasi berdasarkan data dari rekam medik.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar Anggar skor dan tabel- tabel tertentu untuk mencatat data yang dibutuhkan dari rekam medik.

G. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Tahap pengolahan data yaitu :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data dari rekam medik.

b. Pengeditan Data

Pengeditan data dilakukan dengan mempertimbangkan, memilih dan memasukkan data yang penting dan benar-benar diperlukan.

c. Pengkodean data

Setelah melalui proses editing, data yang telah terkumpul dan dikoreksi ketepatan dan kelengkapannya kemudian diberi kode tertentu oleh peneliti secara manual.

d. Pemasukan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan SPSS.

e. Pembersihan data

Merupakan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan apakah ada kesalahan atau tidak.

f. Penyajian Data


Data yang telah diolah disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

2. Analisis data

Analisis data bivariat yang dilakukan untuk menganalisis hubungan dua variable. Kemudian, untuk pengujian hipotesis digunakan metode uji *chi square* untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel dependen dan variabel independen pada tingkat kepercayaan 95%. Jika probabilitas value $(p) < 0,05$, hipotesis null ditolak maka terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Apabila value $(p) > 0,05$,

hipotesis null diterima maka tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

H. Alur Penelitian



I. Etika Penelitian

Hal-hal yang terkait dengan etika penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Menyertakan surat pengajuan untuk pengambilan data yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian.
2. Menjaga kerahasiaan identitas pasien yang digunakan sebagai sampel sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang dilakukan.
3. Menyampaikan tujuan penelitian dengan ramah kepada subjek penelitian.

4. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengumpulan data.
5. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait sesuai dengan manfaat penelitian yang telah disebutkan sebelumnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di RSUD Syekh Yusuf Gowa untuk data pada periode Januari – Desember 2018, didapatkan jumlah persalinan dengan kejadian KPD yakni sebanyak 219 kasus, namun tidak semua kasus KPD dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah yang memenuhi kriteria retriaksi yang telah ditentukan dalam penelitian ini dan yang memenuhi kriteria yakni 112 sampel.

1. Uji Univariate

Analisis univariate dilakukan untuk mengetahui sebaran apgar skor. Diperoleh hasil analisis univariate menggunakan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.1 Apgar Skor Neonatus pada Ibu yang Mengalami Ketuban Pecah Dini

Apgar Skor	Frekuensi	Persen	Persen Valid
Berat	7	6.25%	6.25%
Sedang	28	25.00%	25.00%
Normal	77	68.75%	68.75%
Total	112	100.00%	100.00%

Berdasarkan tabel di atas ditunjukkan bahwa dari 112 bayi dari ibu yang mengalami KPD, didapatkan apgar skor neonatus dalam kategori normal sebanyak 77 bayi (68,75%), sedangkan frekuensi terendah pada ibu yang mengalami ketuban pecah dini memiliki skor apgar berkategori berat

sebanyak 7 bayi (6,25%), sisanya memiliki skor apgar pada kategori sedang sebanyak 28 bayi (25,00%).

Tabel 4.2 Frekuensi Durasi Ketuban Pecah Dini pada Ibu

Durasi KPD	Frekuensi	Persen	Persen Valid
< 12 Jam	76	67.86%	67.86%
> 12 Jam	36	32.14%	32.14%
Total	112	100.00%	100.00%

Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa dari 112 ibu yang mengalami KPD, didapatkan ibu KPD dengan durasi <12 jam sebanyak 76 (67.86%) ibu dan sisanya ibu dengan durasi >12 jam sebanyak 36 orang (32.14%).

2. Uji Bivariate

Uji Bivariate ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Diperoleh hasil uji bivariate menggunakan uji chi square sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hubungan Durasi KPD dengan Apgar Skor Neonatus

Durasi KPD	Apgar Skor						Total		P-Value
	Berat		Sedang		Normal		F	%	
	F	%	F	%	F	%	F	%	
< 12 Jam	0	0.00%	12	10.71%	64	57.14%	76	67.86%	0.000
> 12 Jam	2	1.79%	24	21.43%	10	8.93%	36	32.14%	
Total	2	1.79%	36	32.14%	74	66.07%	112	100.00%	

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh hubungan antara durasi ketuban pecah

dini dengan Apgar Skor neonatus. Durasi ketuban pecah dini terbagi menjadi

2 kategori yaitu kurang dari 12 jam dan lebih dari 12 jam, sedangkan Apgar Skor terbagi menjadi 3 kategori yaitu, berat, sedang, dan normal. Pada tabel ditunjukkan ibu yang mengalami ketuban pecah dini selama kurang dari 12 jam memiliki apgar skor normal sebanyak 64 ibu (57,14%), sedangkan jika ibu mengalami ketuban pecah dini lebih dari 12 jam memiliki apgar skor kategori sedang sebanyak 24 bayi (21,43%). Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji chi square diperoleh nilai p-value sebesar 0,000. Nilai p-value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan apgar skor.

Tabel 4.4 Hubungan Durasi KPD dengan Denyut Jantung Neonatus

Durasi KPD	Denyut Jantung								P-Value	
	Hilang atau Tidak Ada		<100/menit				>100/menit			Total
	F	%	F	%	F	%	F	%		
< 12 Jam	0	0.00%	0	0.00%	76	67.86%	76	67.86%		
> 12 Jam	0	0.00%	2	1.79%	34	30.36%	36	32.14%	0.038	
Total	0	0.00%	2	1.79%	110	98.21%	112	100.00%		

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan denyut jantung. Denyut jantung terbagi menjadi 3 kategori yaitu, hilang atau tidak ada, <100/menit dan >100/menit, sedangkan durasi ketuban pecah dini terbagi menjadi 2 kategori yaitu kurang dari 12 jam dan lebih dari 12 jam. Ditunjukkan bahwa ibu yang mengalami ketuban pecah dini <12 jam mengakibatkan denyut jantung bayi >100/menit sebanyak 76 bayi (67,86%). Sedangkan ibu dengan durasi KPD >12 jam didapatkan denyut jantung bayi <100x/menit sebanyak 2 bayi (1.79%) dan denyut jantung bayi

>100x/menit sebanyak 34 bayi (30.36%). Dari hasil pengujian menggunakan uji chi square diperoleh nilai p-value sebesar 0,038. Nilai p-value tersebut lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan denyut jantung neonatus.

Tabel 4.5 Hubungan Durasi KPD dengan Pernapasan Neonatus

Durasi KPD	Pernapasan								P-Value
	Hilang atau Tidak Ada		Lambat/Tak teratur/Lemah		Normal		Total		
	F	%	F	%	F	%	F	%	
< 12 Jam	0	0.00%	44	39.29%	32	28.57%	76	67.86%	0.000
> 12 Jam	2	1.79%	34	30.36%	0	0.00%	36	32.14%	
Total	2	1.79%	78	69.64%	32	28.57%	112	100.00%	

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hubungan antara ketuban pecah dini dengan pernafasan. Pernafasan terbagi menjadi 3 kategori yaitu, hilang atau tidak ada, lambat/tak teratur, dan normal, sedangkan durasi ketuban pecah dini terbagi menjadi 2 kategori yaitu kurang dari 12 jam dan lebih dari 12 jam. Diperoleh hasil bahwa durasi ketuban pecah dini yang dialami ibu <12 jam mengakibatkan pernafasan lambat tak teratur sebanyak 44 bayi (39,29%) dan bayi dengan pernafasan normal sebanyak 32 bayi (28.57%). Selain itu jika ibu mengalami ketuban pecah dini >12 jam mengakibatkan bayi bernafas lambat tak teratur sebanyak 34 bayi (30,36%). Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji chi square diperoleh nilai p-value sebesar 0,000. Nilai p-value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan pernafasan neonatus.

Tabel 4.6 Hubungan Durasi Ketuban Pecah dini dengan Tonus Otot Neonatus

Durasi KPD	Tonus Otot						Total		P-Value
	Lemah		Sedikit Gerak		Bergerak Aktif				
	F	%	F	%	F	%	F	%	
< 12 Jam	0	0.00%	16	14.29%	60	53.57%	76	67.86%	0.000
> 12 Jam	0	0.00%	30	26.79%	6	5.36%	36	32.14%	
Total	0	0.00%	46	41.07%	66	58.93%	112	100.00%	

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hubungan antara durasi ketuban

pecah dini dengan Tonus Otot. Variabel Tonus Otot terbagi menjadi 3 kategori yaitu, lemah, sedikit gerak, dan bergerak aktif, sedangkan durasi ketuban pecah dini terbagi menjadi 2 kategori yaitu kurang dari 12 jam dan lebih dari 12 jam. Pada tabel ditunjukkan ibu yang mengalami ketuban pecah dini <12 jam mengakibatkan tonus otot bayi bergerak aktif sebanyak 60 bayi (53,57%) dan bayi dengan sedikit gerak sebanyak 16 (14.29%), sedangkan jika ibu mengalami ketuban pecah dini >12 jam mengakibatkan tonus otot bayi sedikit bergerak sebanyak 30 bayi (26,79%). Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji chi square diperoleh nilai p-value sebesar 0,000. Nilai p-value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan tonus otot Neonatus

Tabel 4.7 Hubungan Durasi Ketuban Pecah Dini dengan Respon Reflex

Durasi KPD	Respon Reflex						Total		P-Value
	Tidak ada respon		Wajah meringis		Meringis, batuk, menangis				
	F	%	F	%	F	%	F	%	
< 12 Jam	3	2.68%	10	8.93%	63	56.25%	76	67.86%	0.000
> 12 Jam	14	12.50%	15	13.39%	7	6.25%	36	32.14%	
Total	17	15.18%	25	22.32%	70	62.50%	112	100.00%	

Berdasarkan tabel 4.7 ditunjukkan hubungan antara durasi ketuban

pecah dini dengan respon reflex. Respon Reflex terbagi menjadi 3 kategori, yaitu Tidak ada respon, wajah meringis, dan meringis, batuk atau menangis, sedangkan durasi ketuban pecah dini terbagi menjadi 2 kategori yaitu kurang dari 12 jam dan lebih dari 12 jam. Diperoleh hasil bahwa apabila ibu mengalami ketuban pecah dini <12 jam mengakibatkan respon reflex meringis, batuk, dan menangis pada bayi sebanyak 63 bayi (56,25%), selain itu jika ibu mengalami ketuban pecah dini >12 jam mengakibatkan reflek wajah bayi meringis sebanyak 15 bayi (13,39%). Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji chi square diperoleh nilai p-value sebesar 0,000. Nilai p-value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara durasi ketuban pecah dini.

Tabel 4.8 Hubungan Durasi Ketuban Pecah Dini dengan Warna Kulit Neonatus

Durasi KPD	Warna Kulit Neonatus						Total		P-Value
	Biru seluruh tubuh		Badan merah muda		Seluruh badan merah muda				
	F	%	F	%	F	%	F	%	
< 12 Jam	0	0.00%	0	0.00%	76	67.86%	76	67.86%	0.000
> 12 Jam	2	1.79%	24	21.43%	10	8.93%	36	32.14%	
Total	2	1.79%	24	21.43%	86	76.79%	112	100.00%	

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan warna kulit. Variabel warna kulit terbagi menjadi 3 kategori yaitu, lemah, sedikit gerak, dan bergerak aktif, sedangkan durasi ketuban pecah dini terbagi menjadi 2 kategori yaitu kurang dari 12 jam dan lebih dari 12 jam. Ibu dengan ketuban pecah dini <12 jam mengakibatkan warna kulit bayi seluruh badan merah muda sebanyak 76 bayi (67,86%), sedangkan jika ibu dengan ketuban pecah dini >12 jam mengakibatkan badan bayi merah muda sebanyak 24 bayi (21,43%). Hasil pengujian menggunakan uji chi square diperoleh nilai p-value sebesar 0,000. Nilai p-value yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan warna kulit neonatus.

B. Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa memperoleh hasil sebesar 219 ibu yang mengalami KPD dari 3494 ibu yang melahirkan selama periode Januari – Desember 2018. Dalam penelitian yang dilakukan, sampel yang diambil haruslah memenuhi beberapa kriteria inklusi yakni Ibu yang mengalami KPD dengan persalinan spontan pervaginam tanpa tindakan (vakum atau forseps), kehamilan cukup bulan (aterm) dan bayi dengan berat badan normal (2500-4000 gram). Adapun kriteria eksklusi yakni Ibu yang mengalami KPD dengan kehamilan ganda (gamelli), bayi lahir dengan kelainan

kongenital, ibu dengan penyakit vaskuler (Penyakit jantung dan Hipertensi). Dari kriteria ini, didapatkan sampel sebesar 112 yang memenuhi kriteria retriaksi.

Pada table 4.1 dapat dilihat nilai Apgar skor neonatus dari 112 sampel ibu yang mengalami KPD, dimana terdapat 77 bayi dengan Apgar skor normal, kemudian 28 bayi dengan Apgar skor sedang dan 7 bayi dengan Apgar skor buruk. Hal ini erat kaitannya dengan durasi KPD yang akan mempengaruhi kondisi janin.

Pada table 4.2 dapat dilihat bahwa dari total 112 ibu yang mengalami KPD yang kemudian digolongkan berdasarkan durasi perlangsungannya yakni ibu dengan KPD <12 Jam lebih banyak dari ibu dengan KPD >12 jam. Ibu hamil yang mengalami KPD < 12 jam sebanyak 76 orang (67.86%) dan >12 jam terdapat 36 ibu dengan KPD (32.14%). Ketuban pecah dini merupakan salah satu permasalahan obstetrik yang dapat menjadi penyulit selama proses persalinan, KPD ini dapat menjadi penyebab terjadinya kelahiran prematur maupun infeksi khorioamnionitis yang nantinya dapat menjadi sepsis yang dapat menjadi penyebab meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas bayi. (Prawirohardjo, 2016).

Dari tabel 4.3 dapat dilihat ibu KPD dengan durasi <12 jam berjumlah 76 orang didapatkan bayi dengan nilai Apgar baik yang lebih sering daripada nilai Apgar sedang, dimana terdapat 64 bayi (57,14 %) dengan Apgar skor normal, 12 bayi (10,71%) dengan Apgar skor sedang. Kemudian ibu KPD dengan durasi >12 jam berjumlah 36 orang dimana terdapat 10 bayi (8,93%) dengan Apgar skor

normal, 24 bayi (21,43%) dengan Apgar skor sedang dan 2 bayi (1,79%) dengan Apgar skor buruk. Hal ini menunjukkan KPD dengan >12 jam kebanyakan bayi memiliki Apgar skor sedang dan adapun yang Apgar skor nya buruk, hal ini sesuai dengan teori yakni semakin lama periode laten maka akan semakin lama pula kala satu persalinan yang nantinya durasi KPD ini akan mempengaruhi banyaknya pelepasan cairan amnion yang akan menyebabkan terjadinya oligohidramnion yang nantinya akan terjadi kompresi tali pusat sehingga suplei oksigen menuju janin akan menurun yang kemudian dapat menyebabkan bayi hipoksia dan nantinya ketika lahir hal ini dapat mempengaruhi Apgar skor (Hassan, 2007, Prawirohardjo, 2008, Hanifa Hafni, dkk. 2017). Hasil penelitian ini sejalan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Endale 2016 yang melakukan penelitian tentang durasi KPD, dimana Endale membagi durasi KPD menjadi dua yakni <12 jam dan >12 jam, kemudian didapatkan hasil bahwa bayi yang lahir dari ibu yang mengalami KPD >12 jam beresiko 12 kali lebih besar untuk mengalami kondisi yang buruk bagi bayi daripada bayi yang lahir dengan durasi KPD <12 jam yakni diantaranya ialah nilai APGAR neonatus yang lebih buruk, salah satu kondisi yang kurang baik yakni tingkat asfiksia bayi yang berat (Endale et al, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Meisha (2010) di RS Bhakti Yudha Depok terdapat hubungan antara ketuban pecah dini dengan skor Apgar neonatus dengan nilai $p = 0,011$ ($p < 0,05$) yang membuktikan adanya hubungan kedua variable (Meisha, 2010).

Dari tabel 4.4 dapat dilihat ibu KPD dengan durasi <12 jam didapatkan bayi dengan denyut jantung >100x/menit sebanyak 76 bayi (67.86%), sedangkan pada ibu dengan KPD >12 jam didapatkan bayi dengan denyut jantung >100/menit sebanyak 34 bayi (30.36%). Hal ini sesuai dengan teori bahwa saat terjadi penurunan suplai oksigen ke janin yang diakibatkan oleh KPD maka akan terjadi kondisi gawat janin yakni merupakan suatu hal yang dapat dinilai dengan pengukuran denyut jantung. Hal ini merupakan suatu kompensasi tubuh oleh adanya penurunan kadar O₂ dan meningkatnya kadar CO₂, sehingga jantung akan memompa lebih kuat agar dapat menyuplai oksigen menuju ke organ-organ vital seperti otak. (Sherwood, 2014 dan Andini, 2018).


Dari tabel 4.5 dapat dilihat ibu KPD dengan durasi <12 jam didapatkan bayi dengan pernapasan normal/bayi menangis sebanyak 32 bayi (28.57%) dan bayi dengan pernapasan lambat/tak teratur/lemah sebanyak 44 bayi (39.29%). Kemudian, ibu KPD dengan durasi >12 jam didapatkan bayi dengan pernafasan lambat/ tak teratur sebanyak 34 bayi (30.36%) dan bayi dengan tidak bernapas sebanyak 2 bayi (1.79%). Hal ini sesuai dengan teori yakni ketika tubuh mengalami penurunan pasokan oksigen maka tubuh akan berkompensasi dengan meningkatkan usaha pernafasan agar memperoleh suplai O₂ yang cukup yang akan menyebabkan terjadinya retraksi dinding dada dan otot-otot bantuan pernafasan lainnya. Kemudian saat terjadi KPD, sesaat setelah bayi lahir maka suplai O₂ akan terputus dari ibu, sehingga bayi harus melakukan usaha napas dengan sendirinya. Saat terjadi hipoksi selama dalam kandungan, maka ketika

bayi lahir akan terjadi usaha nafas yang meningkat. Namun, saat kondisi hipoksia janin terjadi cukup lama, hal ini menyebabkan penurunan energy akibat kurangnya suplai O_2 yang digunakan untuk metabolisme, yang nantinya kondisi ini akan menyebabkan bayi baru lahir akan bernapas dengan lemah. (Sherwood, 2014 dan Andini, 2018).

Dari tabel 4.6 dapat dilihat ibu KPD dengan durasi <12 jam didapatkan bayi dengan tonus otot bergerak aktif sebanyak 60 bayi (53.57%) dan bayi dengan tonus otot sedikit gerak sebanyak 16 bayi (14.29%). Kemudian, untuk ibu KPD dengan durasi >12 jam didapatkan bayi dengan tonus otot bergerak aktif sebanyak 6 bayi (5.36%) dan bayi dengan tonus otot yang sedikit gerak sebanyak 30 bayi (26.79%). Hal ini sesuai dengan teori yakni, ketika tubuh kekurangan suplai oksigen maka sel tidak dapat melakukan metabolisme untuk menghasilkan energy. Inilah yang akan menyebabkan pada kondisi KPD yang menyebabkan pasokan O_2 menurun untuk janin yang akan menyebabkan tonus otot bayi memiliki sedikit gerak.

Dari tabel 4.7 dapat dilihat ibu KPD dengan durasi <12 jam didapatkan bayi dengan respon reflex menangis sebanyak 63 bayi (56.25%), bayi dengan respon reflex wajah meringis sebanyak 10 bayi (8.93%) dan bayi dengan respon reflex tidak ada sebanyak 3 bayi (2.68%). Kemudian, ibu KPD dengan durasi >12 jam didapatkan bayi dengan respon reflex menangis sebanyak 7 bayi (6.25%), bayi dengan respon reflex meringis sebanyak 15 bayi (13.39%) dan bayi dengan respon reflex tidak ada sebanyak 14 bayi (12.50%).

Dari tabel 4.8 dapat dilihat ibu KPD dengan durasi <12 jam didapatkan bayi dengan warna kulit seluruh badan merah muda sebanyak 76 bayi (67.86%). Sedangkan ibu KPD dengan durasi >12 jam didapatkan bayi dengan warna kulit seluruh badan merah muda sebanyak 10 bayi (8.93%), bayi dengan badan merah muda dan ekstremitas biru sebanyak 24 bayi (21.43%) dan bayi dengan warna kulit biru seluruh tubuh sebanyak 2 bayi (1.79%). Hal ini sesuai dengan teori, saat terjadi KPD maka pasokan O₂ menuju janin akan menurun sehingga tubuh akan berkompensasi dengan cara jantung akan memompa lebih cepat namun dengan beberapa organ target vital utama seperti otak, sehingga area-area perifer terutama yang paling jauh dari jantung seperti ujung-ujung jari akan mengalami sianosis atau kebiruan (Sherwood, 2014).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai hubungan ketuban pecah dini dengan Apgar Skor neonatur di RSUD Syekh Yusuf Gowa periode Januari – Desember 2018, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai Apgar pada bayi dengan ibu yang mengalami KPD memiliki presentasi rata-rata Apgar skor yang baik yakni sebanyak 77 bayi (68.75%).
2. Jumlah ibu yang mengalami KPD selama tahun 2018 di RSUD Syekh Yusuf Gowa sebanyak 219, kemudian yang memenuhi syarat menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 112 orang. Ibu KPD dengan durasi <12 jam sebanyak 76 orang dan ibu KPD dengan durasi >12 jam sebanyak 36 orang.
3. Ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan Apgar Skor neonatus yakni setelah dilakukan menggunakan uji chi square diperoleh nilai p-value sebesar 0,000. Nilai p-value < 0,05.
4. Ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan denyut jantung neonatus setelah dilakukan uji chi square dan memperoleh nilai p-value <0,05.
5. Ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan pernapasan neonatus setelah dilakukan uji chi square dan memperoleh nilai p-value <0,05.
6. Ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan tonus otot neonatus setelah dilakukan uji chi square dan memperoleh nilai p-value < 0,05.

7. Ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan respon reflex neonatus setelah dilakukan uji chi square dengan nilai p-value < 0.05 .
8. Ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan warna kulit neonatus setelah dilakukan uji chi square dan memperoleh nilai p-value $< 0,05$.

B. Saran

1. Bagi RSUD Syekh Yusuf Gowa
 - a. Perlu dilakukan Penanganan aktif bagi ibu dengan ketuban pecah dini < 12 jam agar dapat mengurangi komplikasi lanjutan bagi ibu maupun bayi.
 - b. Meningkatkan kinerja dalam hal resusitasi neonatus dan penanganan Asfiksia Neonatorum.
 - c. Pada bagian rekam medik sebaiknya penyusunan status pasien lebih ditata dan dilengkapi agar dapat mempermudah pengambilan data pada saat dilakukan penelitian.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan bagi peneliti agar segala ilmu yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung dapat dipahami dan diaplikasikan dalam melakukan penatalaksanaan saat mendampingi kasus.

3. Bagi Institusi

Meningkatkan layanan administrasi terkait proses penelitian agar dapat berjalan dengan cepat dan semoga hasil penelitian ini dapat menjadi pustaka yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lanjutan terkait pengaruh durasi KPD terhadap Apgar Skor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerrachman, dkk. 2007. *Ilmu Kesehatan Anak*. Jilid 3. Jakarta: Bagian Ilmu Kesehatan Anak FKUI.
- Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Andini Kartika S, dkk. 2018. *Tingkat Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Lamanya Ketuban Pecah Dini pada Persalinan Aterm*. *Jurnal Kedokteran Wijaya Kusuma* 7(1): 84-92. https://journal.uwks.ac.id/index.php/jikw/article/download/320/pdf_2 diakses pada tanggal 23 Juli 2019.
- Colti Sistiarani, dkk. 2014. *Analisis Kualitas Penggunaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak*. *KEMAS*, 10(1): 14-20. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas> diakses pada 23 Juli 2019.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2015. *Profil Kesehatan Indonesia*. <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-Indonesia-2015.pdf> diakses pada 19 Agustus 2019.
- Dinkes Kabupaten Gowa. *Profil Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2016*. Sungguminasa. Diakses pada 23 Juli 2019. http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2016/7306_Sulsel_Kab_Gowa_2016.pdf
- Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan. 2016. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016*. Makassar. Diakses pada 23 Juli 2019 http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2016/27_Sulsel_2016.pdf
- Endale T, Fentahun N, Gemada D, and Hussien MA, 2016. *Maternal and Fetal Outcomes in Term Premature Rupture of Membrane*. *World J Emerg Med*. 7(2): 147-152
- Hakimi M. 2003. *Fisiologi dan Patologi Persalinan*. Jakarta : Yayasan Essensia Medica.
- Hanifa Hafni, dkk. 2017. *Hubungan antara Lama Ketuban Pecah Dini dengan Skor Apgar Neonatus di RSUP Dr. M Djamil Padang*. *Jurnal Kesehatan Andalas*

6(1). <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/download/635/500> diakses pada 23 Juli 2019.

Hassan, R., Alatas, FE. 2007. *Buku Kuliah Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta : FKUI.

Joseph, dkk. 2010. *Catatan Kuliah Ginekologi dan Obstetri (Obgyn)*. Yogyakarta : Muha Medika.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2012. *Profil Kesehatan Indonesia*. <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2012.pdf> diakses pada tanggal 21 Agustus 2019.

Legawati, Riyanti. 2018. *Determinan Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di Ruang Cempaka RSUD DR Doris Sylvanus Palangkaraya*. Jurnal Surya Medika 3(2). <https://media.neliti.com/media/publications/258707-determinan-kejadian-ketuban-pecah-dini-k-5f2e9bf0.pdf> diakses pada 23 Juli 2019.

Leveno K, Bloom S, dkk. 2015. *Manual Komplikasi Kehamilan Williams*. Jakarta : EGC.

Manuaba I.B.G, Chandranita Manuaba LA, Fajar Manuaba I.B.G. 2012. *Pengantar Kuliah Obstetri. Bab 6: Komplikasi Umum Pada Kehamilan. Ketuban Pecah Dini*. Jakarta: EGC.

Meisha. 2010. *Hubungan antara lamanya periode laten pada ketuban pecah dini pada kehamilan aterm terhadap nilai Apgar pada persalinan pervaginam di RS Bhakti Yudha Depok periode 2008-2010*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

Nazila Maghfiratul A, dkk. 2017. *Karakteristik Luaran Kehamilan dengan Ketuban Pecah Dini di RSUP Dr. Hasan Sadikin Periode 2013-2015*. JSK 2(4). http://jurnal.unpad.ac.id/jsk_ikm/article/view/12499/5692 diakses pada 23 Juli 2019.

Norwitz, E, John. S. 2008. *At A Glance Obstetri & Ginekologi*. Terjemahan Oleh: Diba A. Jakarta : Erlangga.

Nur Rohmawati, dkk. 2018. *Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Ungaran*. HIGEIA 2(1). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/download/17937/10476/> diakses pada 19 Agustus 2019.

Prawirohardjo S, Trijatmo R. 2016. *Ilmu kebidanan: ketuban pecah dini*. 4th ed. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Hal : 677-681.

- Saputra Lyndon. 2014. *Asuhan Neonatus, Bayi, dan Balita*. Cilacap: BINARUPA AKSARA Publisher. Hal : 55.
- Sherwood Lauralee. 2014. *Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem* Edisi 8. Jakarta: EGC.
- Sudarto, T. 2016. *Risiko Terjadinya Ketuban Pecah Dini pada Ibu Hamil dengan Infeksi Menular Seksual*. *Jurnal Vokasi Kesehatan*, 2(2):330-335. <http://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/JVK/article/view/67/59> diakses pada 24 Juli 2019.
- Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). 2012. Angka Kematian Ibu. <http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/SDKI%202012-Indonesia.pdf> diakses pada 23 Juli 2019.
- Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). 2017. Angka Kematian Neonatus. <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-tahun-2017.pdf> diakses pada 23 Juli 2019.
- WHO. 2014. *Levels and Trend Maternal Mortality Rate*. <https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-05/trends-in-maternal-mortality-1990-to-2015.pdf> diakses pada tanggal 23 Juli 2019.
- You D, dkk. 2015. *Level and Trends in Child Mortality*. New York: World Health Organization. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/levels_trends_child_mortality_2015/en/ diakses pada 23 Juli 2019.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63. Telp (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

Lampiran 1: Output SPSS

1. Uji Univariate

Apgar Skor

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berat	7	6.3	6.3	6.3
	Sedang	28	25.0	25.0	31.3
	Normal	77	68.8	68.8	100.0
	Total	112	100.0	100.0	

2. Uji Bivariate

Crosstab

		Denyut Jantung		Total
		<100/menit	>100/menit	
Ketuban Pecah Dini	<12 jam	Count	0	76
		% of Total	0.0%	67.9%
	>12 jam	Count	2	36
		% of Total	1.8%	30.4%
Total		Count	2	110
		% of Total	1.8%	98.2%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	4.299 ^a	1	.038		
Continuity Correction ^b	1.715	1	.190		
Likelihood Ratio	4.617	1	.032		
Fisher's Exact Test				.101	.101
Linear-by-Linear Association	4.261	1	.039		
N of Valid Cases	112				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .64.

b. Computed only for a 2x2 table

		Pernafasan			Total	
		tidak bernafas	Lemah	Aktif		
Ketuban Pecah Dini	<12 jam	Count	0	44	32	76
		% of Total	0.0%	39.3%	28.6%	67.9%
	>12 jam	Count	2	34	0	36
		% of Total	1.8%	30.4%	0.0%	32.1%
Total		Count	2	78	32	112
		% of Total	1.8%	69.6%	28.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	24.066 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	33.814	2	.000
Linear-by-Linear Association	23.723	1	.000
N of Valid Cases	112		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .64.

Crosstab

			Tonus Otot		Total
			Sedikit Gerak	Bergerak Aktif	
Ketuban Pecah Dini	<12 jam	Count	16	60	76
		% of Total	14.3%	53.6%	67.9%
	>12 jam	Count	30	6	36
		% of Total	26.8%	5.4%	32.1%
Total		Count	46	66	112
		% of Total	41.1%	58.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	39.151 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	36.620	1	.000		
Likelihood Ratio	41.007	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	38.801	1	.000		
N of Valid Cases	112				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.79.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

			Respon Reflex			Total
			Tidak ada respon	Wajah meringis	Meringis, batuk, menangis	
Ketuban Pecah Dini	<12 jam	Count	3	10	63	76
		% of Total	2.7%	8.9%	56.3%	67.9%
	>12 jam	Count	14	15	7	36
		% of Total	12.5%	13.4%	6.3%	32.1%
Total		Count	17	25	70	112
		% of Total	15.2%	22.3%	62.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	44.280 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	45.653	2	.000
Linear-by-Linear Association	42.395	1	.000
N of Valid Cases	112		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.46.

Crosstab

			Warna Kulit			Total
			Biru seluruh tubuh	Badan merah muda	Seluruh badan merah muda	
Ketuban Pecah Dini	<12 jam	Count	0	23	53	76
		% of Total	0.0%	20.5%	47.3%	67.9%
	>12 jam	Count	4	29	3	36
		% of Total	3.6%	25.9%	2.7%	32.1%
Total		Count	4	52	56	112
		% of Total	3.6%	46.4%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	40.174 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	45.869	2	.000
Linear-by-Linear Association	39.765	1	.000
N of Valid Cases	112		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.29.

Ketuban Pecah Dini * Apgar Skor Crosstabulation

		Apgar Skor			Total	
		Berat	Sedang	Normal		
Ketuban Pecah Dini	<12 jam	Count	0	12	64	76
		% of Total	0.0%	10.7%	57.1%	67.9%
	>12 jam	Count	2	24	10	36
		% of Total	1.8%	21.4%	8.9%	32.1%
Total		Count	2	36	74	112
		% of Total	1.8%	32.1%	66.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	35.669 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	36.217	2	.000
Linear-by-Linear Association	35.065	1	.000
N of Valid Cases	112		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .64.

Lampiran 2: Etik Penelitian



LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : E.001 /KEPK/FKIK/XII/2019
 Judul Penelitian : Hubungan Antara Ketuban Pecah Dini (KPD) dengan Apgar Skor di
 Rsud Syekh Yusuf Gowa Periode Januari - Desember 2018
 Nama Peneliti : Novia Anggraeni

No. Register

U	I	N	A	M	1	9	1	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Makassar, 5 Desember 2019



Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
 NIP. 19800701 200604 2 002

Lampiran 3: Balit Banda




1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 1 7 4 9 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 26967/S.01/PTSP/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bid. Akadmi& Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3188.A/FKIK/PP.00.9/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : NOVIA ANGGREANI
Nomor Pokok : 70600116041
Program Studi : Pend. Dokter
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. SII Alauddin No. 63, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" HUBUNGAN ANTARA KETUBAN PECAH DINI (KPD) DENGAN APGAR SKOR NEONATUS DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA PERIODE JANUARI-DESEMBER 2019 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 Desember 2019 s/d 27 Januari 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 20 Desember 2019

A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ALAUDDIN
 MAKASSAR

Tembusan Yth
 1. Wakil Dekan Bid. Akadmi& Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
 2. Peninggal.

SMAP PTSP 23-12-2019

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231



Lampiran 4: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 27 Desember 2019

Nomor : 070/305 /BKB.P/2019
 Lamp : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

K e p a d a
 Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf

Di-
 T e m p a t

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 26967/S.01/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NOVIA ANGGRAENI**
 Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 29 November 1998
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Pelita Taeng

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"HUBUNGAN ANTARA KETUBAN PECAH DINI (KPD) DENGAN APGAR SKOR NEONATUS DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA PERIODE JANUARI-DESEMBER 2019"**

Selama : 27 Desember 2019 s/d 27 Januari 2020
 Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. KEPALA-BADAN,
 SEKRETARIS

DRS. ALWI ARIFIN. M.Si
 Pangkat Pembina Tk.I
 N.P. 19670808 19881 1 012

ALAUDDIN MAKASSAR

TEMBUKAN :
 1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
 2. Ka. Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
 3. Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar
 4. Yang bersangkutan;
 5. Peringatan-

CS Scanned with CamScanner

Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
 JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 04/Diklat.RSUD-SY/1 /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Novia Anggraeni

N i m : 70600116041

Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Kamar Bersalin (INC) Dan Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul " *Hubungan Antara Durasi Ketuban Pecah Dini Dengan APGAR Skor Neonatus Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Periode Januari – Desember 2018* " pada Tanggal 15 Januari 2020 S/D 23 Desember 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Sungguminasa, 23 Januari 2020

Ketua Diklat
 Koordinator Bagian Penelitian
DIKLAT
 Dr. Hj. Ramlah Kauf, Bsc. MMRS
 Nip. 196007101987032019



Scanned with
 CamScanner



