

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK PASIEN
MENINGITIS DENGAN NYERI MENGGUNAKAN
INTERVENSI TERAPI MUSIK DI RSUD
LABUANG BAJI MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Profesi Ners Jurusan Keperawatan
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR REZKI HADIYANTI Z, S.Kep.
70900120046

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rezki Hadiyanti Z, S.Kep
NIM : 70900120046
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Pandang /16 Desember 1996
Jurusan/ Prodi : Profesi Ners
Konsentrasi : Keperawatan Anak
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Komp. Skarda N No. 29
Judul : “Analisis Asuhan Keperawatan pada Anak Pasien Meningitis dengan Nyeri Menggunakan Intervensi Terapi Musik di RSUD Labuang Baji”.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN Gowa Januari 2022
Penyusun,
M A K A S S A R

Nur Rezki Hadiyanti Z, S.Kep.
NIM : 70900120046


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Nur Rezki Hadiyanti Z. NIM: 70900120046, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Anak Pasien Meningitis dengan Nyeri Menggunakan Intervensi Terapi Musik di RSUD Labuang Baji”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.



Dr. Arbianingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes
Pembimbing I



Nurhidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kep.
Pembimbing II

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Ners yang berjudul "*Analisis Asuhan Keperawatan Pada Anak Pasien Meningitis Dengan Nyeri Menggunakan Intervensi Terapi Musik Di RSUD Labuang Baji Makassar*" yang disusun oleh Nur Rezki Hadiyah Z, NIM: 70900120046, Mahasiswa jurusan Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Januari 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Profesi dalam Ilmu Kesehatan, program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan.

Gowa, 27 November 2021
23 Jumadil Awal 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep.	(.....)
Munaqisy I	: Eka Hadrayani, S.Kep.,Ns.,M.Kep.	(.....)
Munaqisy II	: H. Abdul Rahim, Lc., M. Pd.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Arbianingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIM: 70800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat beserta salam kita limpahkan untunk junjungan kita Nabi Muhammadsaw.

Tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Anak Pasien Meningitis dengan Nyeri Menggunakan Intervensi Terapi Musik di RSUD Labuang Baji”, ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karyaini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. dr. Syatirah, S.Ked.,M.Kes.,Sp.A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep dan Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Ners,Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Arbianingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes. dan Nurhidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kep. selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini
4. Eka Hadrayani, S.Kep.,Ns.,M.Kep. dan H. Abdul Rahim, Lc., M.Pd.I selaku penguji I dan II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membangun bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ners ini.
5. Seluruh Dosen Jurusan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UINAlauddin Makassar.

6. Orang Tua tercinta, Ayahanda Zainuddin, B.Ac. & Ibunda Drs. Hamsinah Hamang atas kasih sayang, doa, dukungan, motivasi mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini. Untuk segenap keluarga besar khususnya saudara kandung Nur Zainah, S.Pd. Gr., Nur Zakiyah Ulfah, S.Pd., Nur Rodhiyah Alifah, S.Pd., Nur Roidah Afifah, S.Pd. dan Nur Aliyah Khumairah Annisa yang telah memberikan nasehat dan semangat dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.
7. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners Angkatan 18 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang begitu banyak membantu dalam penyusunan tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik diwaktu yang akan datang.

Makassar, Januari 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Penulis

DAFTAR ISI


Sampul.....	i
Halaman Sampul.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Halaman Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Medis.....	6
2.2 Konsep Keperawatan	19
2.3 <i>Evidence Based Practice in Nursing</i> (EBN)	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Rancangan Studi Kasus	45
3.2 Subyek Studi Kasus.....	45
3.3 Fokus Studi Kasus	46
3.4 Instrumen Studi Kasus	46
3.5 Prosedur Studi Kasus	46
3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data.....	47
3.7 Penyajian Data.....	47
3.8 Etika Studi Kasus	47
BAB IV LAPORAN KASUS	
4.1 Pengkajian	50
4.2 Diagnosis Keperawatan	70
4.3 Intervensi Keperawatan	70
4.4 Implementasi Keperawatan	74
4.5 Evaluasi Keperawatan	83
BAB V PEMBAHASAN	
5.1 Analisis Kasus	89
5.2 Analisis Intervensi.....	94
5.3 Keterbatasan	97

BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	98
6.2 Saran.....	99
Daftar Pustaka.....	100
Lampiran	104



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengkajian	51
Tabel 1.2 Analisis data.....	68
Tabel 1.3 Diagnosis Keperawatan.....	70
Tabel 1.4 Intervensi Keperawatan.....	70
Tabel 1.5 Implementasi Keperawatan.....	74
Tabel 1.6 Evaluasi Keperawatan.....	83



ABSTRAK

Nama : Nur Rezki Hadiyanti Z
Nim : 70900120046
Judul : “Analisis Asuhan Keperawatan pada Anak Pasien Meningitis dengan Nyeri Menggunakan Intervensi Terapi Musik di RSUD Labuang Baji”

Pendahuluan: Meningitis merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang dapat menyerang semua kelompok umur, dimana dikelompok umur terawan adalah anak-anak. Sekitar 75% kasus meningitis terjadi pada anak dibawah usia <15 tahun. Keluhan utama yang biasanya dirasakan penderita meningitis adalah nyeri kepala. Nyeri yang dirasakan terjadi akibat dari infeksi dan peningkatan tekanan intrakranial dari meningitis. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan dalam menurunkan nyeri adalah dengan terapi musik.

Metode: Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi. Penatalaksanaan intervensi terapi musik diberikan selama 3 hari dengan durasi 15 menit perhari. Musik yang didengarkan merupakan musik yang disukai anak yaitu sholawat nabi.

Hasil: Hasil analisis data menunjukkan beberapa diagnosis yaitu nyeri akut, diare, hipotermia dan ansietas. Terapi musik sebagai salah satu intervensi yang dapat diberikan pada anak dengan masalah nyeri akut dalam menurunkan skala nyeri.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil evaluasi didapatkan kesimpulan bahwa penerapan terapi musik yang dilakukan selama 3 hari berpengaruh dalam menurunkan skala nyeri.

Kata Kunci : Meningitis, Nyeri, Terapi Musik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningitis merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang dapat menyerang semua kelompok umur, dimana kelompok umur paling rawan terkena adalah anak-anak, balita, dan orang tua (CDC, 2017). Setiap tahunnya sekitar 1,2 juta kasus Meningitis terjadi di dunia dengan tingkat kematian mencapai 135.000 jiwa. Sekitar 75% kasus meningitis terjadi pada anak dibawah usia <15 tahun. Dimana meningitis yang disebabkan oleh bakteri menjadi penyebab cukup tinggi angka kematian pada anak. Menurut WHO di tahun 2015 meningitis yang disebabkan oleh bakteri berada pada urutan ke-10 penyebab kematian pada anak dan menjadi salah satu infeksi yang paling berbahaya dengan perkiraan 115.000 kematian di seluruh dunia pada anak-anak (WHO, 2018).

Angka kejadian meningitis pada anak di Indonesia juga tergolong tinggi, dengan menempati urutan ke-9 dari 10 penyakit yang sering diderita anak berdasarkan data delapan Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia. Kasus suspek meningitis bakterial pada anak di Indonesia yakni sekitar 158 dari 100.000 anak per tahun. Angka kejadian meningitis pediatrik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat kematian 18-40 % (Vemila, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yan Laksono di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar diperoleh data kasus meningitis yang telah tercatat melalui data register DIKA, SIRS dan Rekam Medis pada kurun waktu 5 tahun sejak 2014 sampai dengan 2019 yaitu sebanyak 175 kasus (Laksono, 2019).

Fenomena yang penulis temukan ketika praktik klinik di RSUD Labuang Baji Makassar melalui observasi diperoleh data masalah utama pada pasien anak meningitis adalah nyeri. Saat dilakukan pengkajian didapatkan bahwa pasien An.R berusia 8 tahun merasakan nyeri pada bagian kepala dengan skala 8 atau nyeri berat, nyeri seperti ditusuk-tusuk, dengan durasi 10-15 menit dan hilang timbul. Meningitis dapat disebabkan oleh virus, jamur atau bakteri. Keluhan utama yang biasanya dirasakan penderita meningitis adalah nyeri kepala. Nyeri yang berlangsung dalam waktu yang lama dapat menyebabkan penurunan saturasi oksigen, meningkatkan pernafasan, peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan intrakranial sehingga meningkatkan risiko terjadinya perdarahan intraventrikuler pada anak (International Association for the Study of Pain, 2017).

Sakit kepala dan demam dapat dialami oleh siapa saja. Rasulullah Muhammad SAW pun pernah merasakan sakit kepala dan demam. Saat mengalami sakit ini, Rasulullah membaca doa ini. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah Saw mengajari kami doa ini dari semua sakit dan dari panas.

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ عَرِقَ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

Terjemahnya :“Dengan nama Allah yang maha besar. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung dari luka yang mengeluarkan darah dan dari keburukan panas neraka”.

Dari Hadist Riwayat diatas dinyatakan bahwa Allah swt sudah memberitahu kepada umat-Nya bahwasanya ketika merasakan sakit kepala maupun penyakit lainnya, agar selalu mengingat meminta pertolongan dan ampunan kepada Allah swt. Selain berobat secara medis ataupun obat-obatan herbal, mintalah

pertolongan dengan cara selalu berdoa dan berikhtikarena manusia hanya bisa berusaha dan yang menentukan adalah Allah swt.

Tindakan keperawatan yang dapat dilakukan untuk menangani dampak nyeri pada anak dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yaitu dengan menggunakan manajemen nyeri. Manajemen nyeri terbagi atas dua pendekatan, yaitu farmakologi dan non farmakologi (Potter & Perry,2012). Salah satu tindakan mandiri dalam penanganan nyeri yang dapat dilakukan secara non farmakologi adalah melalui terapi musik. Terapi musik merupakan salah satu pengobatan komplementer yang bisa diterapkan setiap waktu tanpa adanya efek samping yang serius dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menurunkan nyeri pada anak-anak (Lestari, 2021). Musik dan nyeri mempunyai persamaan penting yaitu bahwa keduanya bisa digolongkan sebagai input sensor dan output. Saat tubuh merespon adanya suara yang masuk melalui telinga berupa suara musik dengan resonansi tertentu menimbulkan respon pada otak, adanya efek relaksasi sehingga disaat yang bersamaan dengan adanya rasa nyeri dapat berkurang (Sesrianty & Wulandari, 2018).

Terapi musik merupakan intervensi non farmakologik yang dapat mengurangi nyeri dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Sesuai Berdasarkan penelitian (Gilar et al., 2014) tentang perbedaan efektivitas terapi musik klasik dan terapi imajinasi terbimbing terhadap penurunan intensitas nyeri pasca bedah mayor abdomen dimana hasil penelitian menunjukkan terapi musik lebih efektif dibandingkan terapi imajinasi terbimbing terhadap penurunan intensitas nyeri. Penelitian (Arif & Sari, 2019) yang menyebutkan bahwa

intensitas skala nyeri pada anak yang diberikan distraksi musik skala nyerinya lebih rendah dibandingkan anak yang tidak diberikan distraksi musik. Hal ini dikarenakan musik merangsang pelepasan hormon endorfin, hormon tubuh yang memberikan perasaan senang yang berperan dalam penurunan nyeri.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik melakukan intervensi terapi musik pada anak pasien meningitis dengan masalah nyeri di ruang RSUD Labuang Baji Makassar .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah “ Bagaimana Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Anak Meningitis dengan Menggunakan Terapi Musik di RSUD Labuang Baji Makasaar ?”

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

“Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien meningitis dengan nyeri menggunakan intervensi terapi musik di RSUD Labuang Baji Makassar?”

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien meningitis dengan nyeri

- 1.3.2.2 Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien meningitis dengan nyeri
- 1.3.2.3 Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien meningitis dengan nyeri
- 1.3.2.4 Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien meningitis dengan nyeri
- 1.3.2.5 Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien meningitis dengan nyeri
- 1.3.2.6 Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien meningitis dengan nyeri menggunakan terapi musik.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien anak meningitis dengan nyeri menggunakan terapi musik di RSUD Labuang Baji Makassar.

1.4.2 Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi EBPN dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien anak meningitis dengan nyeri menggunakan terapi musik pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Konsep Medis

2.1.1 Definisi

Meningitis adalah peradangan pada meningen yaitu membran yang melapisi otak dan medulla spinalis. Otak dan medulla spinalis dilindungi oleh lapisan atau selaput yang disebut meningen (Tarwoto, 2013). Peradangan pada meningen khususnya pada bagian araknoid dan plamater (leptomeningens) disebut meningitis. Peradangan pada bagian duramater disebut pakimeningen. Meningitis adalah radang selaput otak yang diakibatkan oleh bakteri, virus, dan jamur (Karen et al, 2011).

Meningitis atau radang selaput otak adalah infeksi pada cairan serebrospinal (CSS) kemudian juga adanya radang pada pia dan araknoid, ruang subaraknoid, jaringan superfisial otak dan medula spinalis. Bakteri, virus, dan jamur dapat masuk ke setiap bagian ruang subaraknoidal dan juga dengan cepat menyebar ke bagian ruang lain, sehingga bagian leptomening medula spinalis juga ikut terkena (Harsono, 2015).

2.1.2 Etiologi

Meningitis dapat disebabkan oleh berbagai macam organisme. Penyebab meningitis adalah virus, bakteri, ataupun jamur meskipun jamur jarang terjadi. Paling sering klien memiliki kondisi predisposisi seperti: fraktur tengkorak, infeksi, pembedahan otak atau spinal, dimana akan meningkatkan terjadinya meningitis (Widagdo et al, 2013).

Nurarif dan Kusuma (2016), mengatakan penyebab meningitis ada 2 yaitu:

1. Pada orang dewasa, bakteri penyebab tersering adalah *Diplococcus pneumoniae* dan *neisseria meningitidis*, stafilokokus, dan gram negative.
2. Pada anak-anak bakteri tersering adalah *Hemophilus influenzae*, *neisseria meningitidis* dan *diplococcus pneumoniae*.

Penyebab meningitis bakteri pada neonatus adalah *escherichia coli*, *streptokokus grup B*, dan *listeria monocytogenes*. Pada anak-anak adalah *Hemophilus influenzae*, *pneumococci*, dan *meningococci (neisseria meningitidis)*. Sedangkan penyebab meningitis bakteri pada orang dewasa adalah *pneumokokus*, *meningokokus*, *stafilokokus*, dan *entrobakteria gram negatif* (Karen et al, 2011).

Penyebab umum meningitis virus adalah *enterovirus (virus polio dan coxsackie)*, dan *arbovirus*. Penyebab lainnya adalah *virus limfositik koriomeningitis*, *cytomegalovirus*, *herpes virus tipe II*, dan *virus gondong*, *epstein Barr*, dan *influenza virus*. Virus penyebab meningitis diidentifikasi oleh pengujian serologis. Menurut (Karen et al, 2011) *virus enterovirus* dan *arbovirus* merupakan penyebab *meningoensefalitis*. *Virus mups (gondongan)* adalah salah satu penyebab meningitis yang umum terjadi pada anak yang belum divaksinasi. Penyebab lain yang jarang terjadi adalah meningitis yang disebabkan oleh jamur. Meningitis jenis ini diderita oleh orang yang mengalami kerusakan imun (*daya tahan tubuhnya berkurang*) seperti pada penderita HIV dan AIDS. *Cryptococcal meningitis* adalah infeksi serius yang menyerang otak dan *sumsum tulang belakang* yang biasanya muncul pada

seseorang yang menderita HIV. Cryptococcal meningitis disebabkan oleh jamur *Cryptococcus Neoformans*. Penyebab lainnya yaitu blastomyces, histoplasma, dan coccidioides (Andareto, 2015).

2.1.3 Klasifikasi

Meningitis dibagi menjadi 2 golongan berdasarkan perubahan yang terjadi pada cairan otak, yaitu :

1. Meningitis serosa

Meningitis serosa adalah radang selaput otak araknoid dan piameter yang disertai cairan otak yang jernih. Penyebab terseringnya adalah *Mycobacterium Tuberculosis*. Penyebab lainnya lues, virus, toxoplasma gondhii dan ricketsia.

Menurut (Tanto, 2014) bakteri tuberculosis masuk kedalam tubuh yaitu ke bagian paru secara inhalasi, setelah di fagosit oleh makrofag alveolar, system imun seluler mengenali antigen bakteri kemudian limfosit mengaktifkan system pertahanan. Meningitis terjadi apabila bakteri berhasil mencapai meninges dalam jumlah yang banyak. Namun, apabila bakteri yang mencapai meninges dalam jumlah yang kecil, bakteri tersebut akan berkolonisasi, bereplikasi, dan akan membentuk tuberkel yang disebut *focus rich* di sekitar area subtal. Setelah bertahun-tahun *focus rich* dapat menyebabkan meningitis tuberculosis.

2. Meningitis purulenta

Meningitis purulenta adalah radang bernanah arakhnoid dan piameter yang melingkupi otak dan medulla spinalis. Penyebab dari penyakit ini

berdasarkan golongan umur adalah masa neonatus oleh E.coli, streptokokkus beta hemolitikus, dan listeria monositogenes. Kelompok umur anak dibawah 4 tahun yaitu hemofilus influenza, meningokokus, dan pneumokokus. Kelompok umur diatas 4 tahun dan orang dewasa adalah meningokokus dan pneumokokus (Harsono, 2015).

Penderita meningitis purulenta biasanya mengalami kesadaran yang menurun dan seringkali disertai dengan diare dan muntah-muntah. Meningitis purulenta umumnya terjadi akibat adanya komplikasi lain. Kuman secara hematogen sampai ke selaput otak seperti pada penyakit pneumonia, bronkopneumonia, endocarditis dan lain-lain (Fauziah, 2017).

2.1.4 Patofisiologi

Otak dan medulla spinalis dilindungi oleh tiga lapisan meningen yaitu pada bagian paling luar adalah duramater, bagian tengah araknoid dan bagian dalam piamater. Cairan serebrospinalis (CSF) merupakan bagian dari otak yang berada dalam ruang subaraknoid yang dihasilkan dalam fleksus choroid yang kemudian dialirkan melalui system ventrikel. CSF diabsorpsi melalui araknoid pada lapisan araknoid dari meningen. Mikroorganisme dapat masuk ke dalam sistem saraf pusat melalui beberapa cara misalnya meningitis bakteri terjadi sebagai infeksi sekunder akibat infeksi pernapasan atas, infeksi sinus, atau infeksi telinga, dan bisa juga terjadi karena masuknya kuman secara langsung melalui pungsi lumbal; fraktur tengkorak atau cedera kepala berat (trauma kepala), intervensi bedah neuro, abnormalitas struktur kongenital, seperti spina

bifida; atau adanya badan asing, seperti pirau ventrikel atau implant koklea (Kyle dan Carman, 2014).

Organisme penyebab meningitis masuk melalui sel darah merah pada blood brain barrier. Meningitis juga dapat terjadi bila adanya hubungan antara cairan serebrospinal dan dunia luar. Invasi bakteri pada meningen mengakibatkan respon peradangan pada pia, araknoid, cairan serebrospinal dan ventrikel. Netropil bergerak ke ruang subaraknoid untuk memfagosit bakteri menghasilkan eksudat dalam ruang subaraknoid. Eksudat yang dihasilkan dapat menyebar melalui saraf kranial dan spinal sehingga menimbulkan masalah neurologi. Eksudat ini yang dapat menimbulkan bendungan pada ruang subaraknoid yang pada akhirnya dapat menyumbat aliran normal cairan serebrospinal dan menimbulkan hidrosepalus. Eksudat yang terkumpul juga akan berpengaruh terhadap saraf-saraf kranial dan perifer. Makin bertambahnya eksudat dapat meningkatkan tekanan intracranial (Tarwoto, 2013).

2.1.5 Manifestasi Klinis

Manifestasi klinik pada meningitis bakteri menurut Tarwoto (2013) mengatakan diantaranya:

1. Demam, merupakan gejala awal
2. Nyeri kepala
3. Mual dan muntah
4. Kejang umum

5. Pada keadaan lebih lanjut dapat mengakibatkan penurunan kesadaran sampai dengan koma.

Sedangkan menurut (Widagdo et al, 2013) manifestasi klinis klien meningitis meliputi:

1. Sakit kepala
2. Mual muntah
3. Demam
4. Sakit dan nyeri secara umum
5. Perubahan tingkat kesadaran
6. Bingung
7. Perubahan pola nafas
8. Ataksia
9. Kaku kuduk
10. Ptechialrash
11. Kejang (fokal, umum)
12. Opistotonus
13. Nistagmus
14. Ptosis
15. Gangguan pendengaran
16. Tanda brundzinki's dan kerniq's positif
17. Fotophobia

Manifestasi klinik meningitis bakteri pada anak biasanya timbul diawali dengan demam serta adanya gejala infeksi saluran pernafasan atau system

gastrointestinal yang berlangsung selama beberapa hari. Keluhan pada anamnesis biasanya akan terjadi berupa demam, iritabel, tangis melengking (shrill cry), kejang, dan penurunan kesadaran. Gejala fisiknya seperti apatis sampai koma, suhu tinggi, ubun-ubun besar menonjol dan tegang, tanda rangsang meningeal positif, gejala tekanan intracranial meningkat, dan tanda-tanda defisiti neurologis (Widagdo et al, 2013). Meningitis virus terjadi pada sebagian besar anak yang berumur kurang dari 5 tahun. Gejala utamanya adalah sakit kepala, demam, meningisme, dan gejala umum lainnya seperti kelelahan dan mialgia (Kyle dan Carman, 2014).

2.1.6 Penatalaksanaan Medis

Penatalaksanaan Meningitis dibagi menjadi 2 menurut (Tarwoto, 2013) yaitu:

1. Penatalaksanaan umum
 - a. Pasien diisolasi
 - b. Pasien diistirahatkan/ bedrest
 - c. Kontrol hipertermi dengan kompres
 - d. Kontrol kejang
 - e. Pemenuhan kebutuhan cairan, nutrisi
2. Pemberian antibiotik
 - a. Diberikan 10-14 hari atau setidaknya 7 hari bebas panas
 - b. Antibiotik yang umum diberikan: Ampisilin, Gentamisin, Kloromfenikol, Sefalosporin.

- c. Jika pasien terindikasi meningitis tuberkolusis diberikan obat-obatan TBC.

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang

Diagnosis meningitis menurut (Harsono, 2015) dapat ditegakkan melalui, diantaranya adalah :

1. Laboratorium
 - a. Pemeriksaan Darah : Pemeriksaan darah lengkap, peningkatan sel darah putih (10.000-40.000/mm³), pemeriksaan koagulasi, kultur adanya mikroorganisme pathogen.
 - b. Urine : Albumin, sel darah merah, sel darah putih ada dalam urine.
2. Radiografi

Untuk menentukan adanya sumberinfeksi misalnya Rongen dada untuk menentukan adanya penyakit paru seperti TBC paru, pneumonia, abses paru. Scan otak untuk menentukan kelainan otak.
3. Pemeriksaan lumbal pungsi

untuk membandingkan keadaan CSF normal dengan meningitis.
4. CT Scan.

2.1.8 Komplikasi

1. Peningkatan tekanan intracranial
2. Hydrosephalus: Penumpukan cairan pada rongga otak, sehingga meningkatkan tekanan pada otak.
3. Infark serebral: Kerusakan jaringan otak akibat tidak cukup suplai oksigen, karena terhambatnya aliran darah ke daerah tersebut.

4. Ensefalitis: peradangan pada jaringan otak dan meningen akibat virus, bakteri, dan jamur.
5. Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone
6. Abses otak: Infeksi bakteri yang mengakibatkan penimbunan nanah didalam otak serta pembengkakan.
7. Kejang: Gangguan aktivitas listrik di otak. Ditandai dengan gerakan tubuh yang tidak terkendali dan hilangnya kesadaran.
8. Endokarditis: Infeksi pada endokardium yaitu lapisan bagian dalam jantung.
9. Pneumonia: Infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara disalah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan.
10. Syok sepsis: Infeksi luas yang menyebabkan kegagalan organ dan tekanan darah yang sangat rendah (Widagdo et al, 2013)

2.1.9 Pencegahan

Pencegahan meningitis dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan penyebaran infeksi dan mengubah gaya hidup agar jauh lebih sehat. Seperti lebih rajin berolahraga dan menjauhi asap rokok. Meningitis bakteri ditularkan melalui kontak langsung dengan droplet pernapasan dari hidung atau tenggorok. Individu yang paling berisiko adalah mereka yang tinggal bersama anak ataupun yang bermain bersama anak atau kontak dekat dengan anak tersebut. Pengendalian dapat dilakukan pada lingkungan yang berisiko. Seperti disinfeksi mainan dan benda yang digunakan bersama untuk mengurangi penularan mikroorganisme kepada individu lain (Kyle dan Carman, 2014).

Pencegahan meningitis juga dapat dilakukan dengan memberikan imunisasi atau vaksinasi kepada anak. Pemberian vaksin bertujuan untuk agar pasien dapat terlindungi dari bakteri dan virus penyebab meningitis. Menurut (Kemenkes RI, 2019) vaksin DPT-HB-HIB diberikan untuk mencegah enam penyakit yaitu meningitis, difteri, pertussis, tetanus, hepatitis B, dan pneumonia. Vaksin Hib rutin diberikan sejak usia 2 bulan dan semua anak harus mendapatkan imunisasi tersebut untuk mengurangi meningitis bakteri yang disebabkan oleh bakteri *H. Influenzae* tipe B. Vaksin Pneumokokus juga harus rutin diberikan kepada anak sejak berusia 2 bulan dan harus dipertimbangkan untuk anak prasekolah yang berisiko. Pencegahan yang dilakukan dengan memberikan vaksin dan imunisasi terhadap penyakit meningitis sesuai dengan Quran surat Al Anbiya' ayat 8, Allah SWT berfirman mengenai ayat Alquran tentang wabah penyakit yang menimpa Nabi Ayub.

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾


Artinya: Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

Berdasarkan firman Allah swt bahwa Allah menimpakan sebuah penyakit kepada manusia baik sebagai ujian ataupun cobaan. Sebagai manusia yang beriman tidak diizinkan untuk berputus asa karena hal yang dapat dilakukan adalah dengan mencegah penyakit tersebut dengan pemberian imunisasi atau vaksin, sebagaimana diketahui telah ditemukan vaksin meningitis.

Pencegahan dapat dilakukan dengan imunoprofilaksis (meningkatkan kekebalan tubuh) seperti vaksin *heptavalent conjugate* untuk *S. pneumonia*, vaksin *quadrivalent* terhadap *N. meningitides*, dan vaksin *conjugate* untuk *H. influenza* tipe B. Untuk mengurangi infeksi streptokokus B pada neonatus, dilakukan skrining pada ibu hamil. Jika hasil skrining positif, maka diberikan antibiotik intrapartum. Anak yang berisiko yaitu yang mengalami defisiensi imun (Widagdo et al, 2013).



2.1.10 Penyimpangan KDM



(Nurarif & Hardhi, 2016)

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan

2.2.1 Konsep Teori Keperawatan Terkait

Penulis memilih teori keperawatan yang terkait yaitu teori Kolcaba. Hal ini dikarenakan teori tersebut sejalan dengan intervensi yang diberikan kepada pasien, dimana intervensi tersebut bertujuan untuk memberikan perasaan nyaman, rileks sebagai salah satu upaya dalam menurunkan skala nyeri. Nyeri dapat diartikan sebagai suatu gangguan rasa nyaman yang dirasakan oleh penderita. Sedangkan teori Kolcaba merupakan teori yang mengedepankan kenyamanan sebagai kebutuhan semua manusia (Wirastri, 2014), itulah sebabnya penulis memilih teori ini sebagai konsep teori keperawatan yang terkait dengan rasa nyeri pada pasien anak yang mengalami meningitis.

Teori Kolcaba dikembangkan oleh Katharine Kolcaba sejak tahun 1990. Katharine Kolcaba merupakan tokoh keperawatan yang membawa kembali konsep kenyamanan sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kolcaba dalam teori *comfort* menyebutkan bentuk kenyamanan meliputi tiga tipe kenyamanan yaitu *relief*, *ease*, dan *transcendence*. *Relief* diartikan sebagai kondisi resipien yang membutuhkan penanganan spesifik dan segera, *ease* diartikan sebagai kondisi tenteram atau kepuasan hati dari klien yang terjadi karena hilangnya ketidaknyamanan fisik yang dirasakan pada semua kebutuhan, sedangkan *transcendence* diartikan sebagai keadaan dimana seseorang individu mampu mengatasi masalah dari ketidaknyamanan yang terjadi. Kolcaba sendiri, memandang bahwa kenyamanan merupakan

kebutuhan dasar seseorang yang bersifat holistik yang meliputi kenyamanan fisik, psikospiritual, sosiokultural, dan lingkungan (Utami, 2016).

Kenyamanan adalah kebutuhan yang diperlukan pada rentang sakit sampai sehat dan kenyamanan merupakan label tahap akhir dari tindakan terapeutik perawat terhadap pasien. Kenyamanan adalah pengalaman yang diterima oleh seseorang dari suatu intervensi. Hal ini merupakan pengalaman langsung dan menyeluruh ketika kebutuhan fisik, psikospiritual, sosial, dan lingkungan terpenuhi. Konsep teori kenyamanan meliputi kebutuhan kenyamanan, intervensi kenyamanan, variable intervensi, peningkatan kenyamanan, perilaku pencari kesehatan, dan integritas institusional (Wirastri, 2014).

Kenyamanan adalah sebuah konsep yang mempunyai hubungan yang kuat dengan ilmu keperawatan. Seorang perawat harus mampu menyediakan kenyamanan kepada pasien dan keluarga melalui intervensi dengan persentasi penilaian kenyamanan (Utami, 2016). Hubungan antara intervensi dengan teori yang dikemukakan yaitu memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien dengan memberikan tindakan keperawatan terapi musik yang berguna menurunkan nyeri akut pada pasien.

2.2.2 Pengkajian Keperawatan

Pengkajian merupakan tahap awal dan landasan proses keperawatan. Diperlukan pengkajian cermat untuk mengenal masalah pasien, agar dapat memberikan tindakan keperawatan. Keberhasilan proses keperawatan sangat tergantung pada kecermatan dan ketelitian dalam tahap pengkajian (Nurarif & Hardhi, 2016).

1. Identitas

- a. Identitas pasien terdiri dari: nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, suku/ bangsa, pendidikan, pekerjaan dan alamat.
- b. Identitas penanggung jawab terdiri dari: nama, hubungan dengan klien, pendidikan, pekerjaan dan alamat.

2. Riwayat kesehatan

- a. Keluhan Utama Biasanya pasien datang dengan keluhan utamanya demam, sakit kepala, mual dan muntah, kejang, sesak nafas, penurunan tingkat kesadaran.
- b. Riwayat Kesehatan Sekarang Pengkajian RKS yang mendukung keluhan utama dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan mengenai kelemahan fisik pasien secara PQRSST.
- c. Riwayat Kesehatan Dahulu Pengkajian penyakit yang pernah dialami pasien yang memungkinkan adanya hubungan atau menjadi predisposisi keluhan sekarang meliputi pernah kah pasien mengalami infeksi jalan nafas bagian atas, otitis media, anemia sel sabit dan hemoglobinopatis lain, tindakan bedah saraf, riwayat trauma kepala. Riwayat sakit TB paru perlu ditanyakan kepada pasien terutama jika ada keluhan batuk produktif dan pernah mengalami pengobatan obat anti tuberkulosa yang sangat berguna untuk mengidentifikasi meningitis tuberkulosa.
- d. Riwayat Kesehatan Keluarga Pada riwayat kesehatan keluarga, biasanya apakah ada di dalam keluarga yang pernah mengalami penyakit keturunan yang dapat memacu terjadinya meningitis.

3. Pemeriksaan Fisik

- a. Keadaan umum. Pada pemeriksaan keadaan umum, kesadaran klien meningitis biasanya bersekitar pada tingkat letargi, stupor, dan semikomatosa.
- b. Tanda- Tanda Vital
 - 1) TD : Biasanya tekanan darah orang penyakit meningitis normal atau meningkat dan berhubungan dengan tanda-tanda peningkatan TIK (N = 90- 140 mmHg).
 - 2) Nadi : Biasanya nadi menurun dari biasanya (N = 60-100x/i).
 - 3) Respirasi : Biasanya pernafasan orang dengan meningitis ini akan lebih meningkat dari pernafasan normal (N = 16-20x/i).
 - 4) Suhu : Biasanya pasien meningitis didapatkan peningkatan suhu tubuh lebih dari normal antara 38-41°c (N = 36,5°c – 37,4°c).
- c. Pemeriksaan Head To Toe
 - 1) Kepala : Biasanya pasien dengan meningitis mengalami nyeri kepala.
 - 2) Mata : Nerve II, III, IV, VI : Kadang reaksi pupil pada pasien meningitis yang tidak disertai penurunan kesadaran biasanya tanpa kelainan. Nerve V : Refleks kornea biasanya tidak ada kelainan.
 - 3) Hidung : Nerve I : Biasanya pada klien meningitis tidak ada kelainan pada fungsi penciuman
 - 4) Telinga : Nerve VIII : Kadang ditemukan pada pasien meningitis adanya tuli konduktif dan tuli persepsi.

- 5) Mulut : Nerve VII : Persepsi pengecapan dalam batas normal, wajah simetris Nerve XII : Lidah simetris, tidak ada deviasi pada satu sisi dan tidak ada fasikulasi. Indra pengecapan normal.
- 6) Leher Inspeksi : Biasanya terlihat distensi vena jugularis. Palpasi : Biasanya teraba distensi vena jugularis. Nerve IX dan X : Biasanya pada pasien meningitis kemampuan menelan kurang baik Nerve XI : Biasanya pada pasien meningitis terjadinya kaku kuduk
- 7) Dada
- Paru
- I : Pada pasien dengan meningitis terdapat perubahan pola nafas
- Pa : Pada pasien meningitis premitus kiri dan kanan sama
- P : Biasanya pada pasien meningitis tidak teraba
- A : Pada pasien meningitisterdapat bunyi tambahan seperti ronkhi pada klien dengan meningitis tuberkulosa.
- Jantung
- I : Pada pasien meningitis ictus tidak teraba
- Pa : Pada pasien meningitis ictus teraba 1 jari medial midklavikula sinistra RIC IV.
- P : Bunyi jantung I RIC III kanan, kiri, bunyi jantung II RIC 4-5 midklavikula.
- A : Jantung murni, tidak ada mur-mur.

8) Ekstremitas

Pada pasien meningitis adanya bengkak dan nyeri pada sendi-sendi (khususnya lutut dan pergelangan kaki). Klien sering mengalami penurunan kekuatan otot dan kelemahan fisik secara umum sehingga mengganggu ADL.

9) Rasangan Meningeal

Kaku kuduk: Adanya upaya untuk fleksi kepala mengalami kesulitan karena adanya spasme otot-otot. Fleksi menyebabkan nyeri berat.

Tanda Kernig positif: Ketika pasien dibaringkan dengan paha dalam keadaan fleksi ke arah abdomen, kaki tidak dapat diekstensikan sempurna.

Tanda Brudzinski: Tanda ini didapatkan jika leher pasien difleksikan, terjadi fleksi lutut dan pingul: jika dilakukan fleksi pasif pada ekstremitas bawah pada salah satu sisi, gerakan yang sama terlihat pada sisi ekstermitas yang berlawanan.

4. Pola Kehidupan Sehari-hari

a. Aktivitas / istirahat

Pasien mengeluh mengalami peningkatan suhu tubuh

b. Eliminasi

Pasien didapatkan berkurangnya volume pengeluaran urine, hal ini berhubungan dengan penurunan perfusi dan penurunan curah jantung ke ginjal.

c. Makanan / cairan

Pasien menyatakan tidak mempunyai nafsu makan, selalu mual dan muntah disebabkan peningkatan asam lambung. Pemenuhan nutrisi pada pasien meningitis menurun karena anoreksia dan adanya kejang.

d. Hygiene

Pasien menyatakan tidak mampu melakukan aktivitas perawatan diri karena penurunan kekuatan otot.

2.2.3 Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang alaminya baik yang berlangsung actual maupun potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan (SDKI, 2017).

Diagnosa 1 : Nyeri Akut

a. Definisi : pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.

b. Penyebab :

- 1) Agen pencedera fisiologis (mis.inflamasi, iskemis,neoplasma).
- 2) Agen pencedera kimiawi (mis.terbakar,bahan kimia iritan).
- 3) Agen pencedera fisik (mis.abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berl

c. Gejala dan Tanda Mayor

- 1) Subjektif - Mengeluh nyeri
- 2) Objektif
 - a) Tampak meringis
 - b) Bersikap protektif
 - c) Gelisah
 - d) Frekuensi nadi meningkat
 - e) Sulit tidur

d. Kondisi Klinis Terkait

- 1) Kondisi pembedahan
- 2) Cedera traumatis
- 3) Infeksi
- 4) Sindrom koroner akut

Diagnosa 2 : Hipertermia

a. Definisi : Suhu tubuh meningkat diatas rentang normal tubuh.

b. Penyebab

- 1) Dehidrasi
- 2) Terpapar lingkungan panas
- 3) Proses penyakit (mis. Infeksi, kanker)
- 4) Ketidakesesuaian pakaian dengan suhu lingkungan
- 5) Peningkatan laju metabolisme
- 6) Respon trauma
- 7) Aktivitas berlebihan

8) Penggunaan inkubator

c. Gejala dan tanda mayor

Objektif

1) suhu tubuh diatas nilai normal

d. Gejala dan tanda minor

Objektif

1) Kulit merah

2) Kejang

3) Takikardi

4) Takipnea

5) Kulit terasa hangat

e. Kondisi klinis terkait

1) Proses infeksi

2) Hipertiroid

3) Stroke

4) Dehidrasi

5) Trauma

6) Prematuritas

Diagnosa 3 : Gangguan Mobilitas Fisik

a. Definisi

Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri.

b. Penyebab

- 1) Kerusakan struktur tulang
- 2) Perubahan metabolisme
- 3) Ketidakbugaran fisik
- 4) Penurunan kendali otot
- 5) Penurunan massa otot
- 6) Kekakuan sendi
- 7) Kontraktur
- 8) Nyeri
- 9) Kecemasan gangguan sensoripersepsi

c. Gejala dan tanda mayor

Subjektif :Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas

Objektif :

- 1) Kekuatan otot menurun
- 2) Rentang gerak (ROM) menurun

d. Gejala dan tanda minor

Subjektif

- 1) Nyeri saat bergerak
- 2) Enggan melakukan pergerakan
- 3) Merasa cemas saat bergerak

Objektif

- 1) Sendi kaku
- 2) Gerakan tidak terkoordinasi

- 3) Gerakan terbatas
 - 4) Fisik lemah
- e. Kondisi klinis terkait
- 1) Cedera medulla spinalis
 - 2) Trauma
 - 3) Fraktur
 - 4) Osteoarthritis
 - 5) Keganasan

Diagnosa 4 : Intoleransi Aktivitas

a. Definisi

Ketidacukupan energy untuk melakukan aktivitas sehari-hari

b. Penyebab

- 1) Ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan oksigen
- 2) Tirah baring
- 3) Kelemahan
- 4) Imobilitas
- 5) Gaya hidup monoton

c. Gejala dan tanda mayor

Subyektif : Mengeluh Lelah

Objektif : Frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat.

d. Gejala dan tanda minor

Subyektif :

- 1) Dispnea saat/setelah aktivitas

2) Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas

3) Merasa lemah

Objektif :

1) Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat

2) Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/setelah aktiivitas

3) Gambaran EKG menunjukkan iskemia

4) Sianosis

e. Kondisi klinis terkait

1) Anemia

2) Penyakit jantung koroner

3) Gagal jantung kongestif

4) Penyakit katup jantung

5) Aritmia

6) Penyakit paru obstruktif kronis

7) Gangguan metabolic

8) Gangguan musculoskeletal

Diagnosa 5 : Risiko Infeksi

a. Definisi : Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik

b. Faktor risiko :

1) Penyakit kronis

2) Efek prosedur invasif

3) Malnutrisi

4) Peningkatan paparan organisme patogenik lingkungan

- 5) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer
- 6) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder

c. Kondisi klinis terkait

- 1) AIDS
- 2) Luka bakar
- 3) Penyakit paru obstruktif kronis
- 4) DM
- 5) Tindakan invasif
- 6) Kondisi penggunaan terapi steroid
- 7) Penyalahgunaan obat
- 8) Ketuban pecah sebelum waktunya
- 9) Kanker
- 10) Gagal ginjal
- 11) Imunosupresi
- 12) Lymphedema
- 13) Leukosit



2.2.4 Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan merupakan segala bentuk terapi yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai peningkatan, pencegahan, dan pemulihan kesehatan klien individu, keluarga dan komunitas (SIKI, 2018).

DIAGNOSA (SDKI,2017)	Tujuan/Kriteria Hasil (SLKI,2019)	Intervensi (SIKI,2018)	Rasional
Nyeri akut	Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan tingkat nyeri menurun dan kontrol nyeri meningkat dengan kriteria hasil: a. Tidak mengeluh nyeri b. Tidak meringis c. Tidak bersikap protektif d. Tidak gelisah e. Tidak mengalami kesulitan tidur f. Frekuensi nadi membaik	Manajemen Nyeri : Observasi 1) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2) Identifikasi skala nyeri 3) Identifikasi respon nyeri non verbal 4) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup Terapeutik 1) Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam) 2) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri 3) Fasilitasi istirahat dan tidur	Observasi 1) Mengetahui lokasi, karakteristik, kualitas nyeri, frekuensi dan faktor pencetus 2) Mengetahui tingkat nyeri 3) Mengetahui keadaan umum pasien 4) Mengetahui seberapa besar rasa nyeri mempengaruhi kualitas hidup pasien Terapeutik 1) Mengurangi tingkat nyeri pasien/mengalihkan pasien dari rasa nyerinya 2) mengurangi resiko factor yang dapat memperberat nyeri/menimbulkan nyeri dan 3) mengalihkan dan

	g. Tekanan darah membaik	<p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri. 2) Jelaskan strategi mengatasi nyeri 3) Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri 4) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kolaborasi pemberian analgetik 	<p>memenuhi kebutuhan istirahat pasien</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan pasien 2) Membantu pasien mengatasi saat rasa nyeri muncul 3) Pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, penyebab, lokasi saat nyeri muncul 4) Memudahkan pasien untuk mengotrol nyeri dengan cara sederhana tanpa menggunakan obat-obatan <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengurangi/menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien, pemberian analgetik sesuai kebutuhan pasien
Hipertermia	Setelah dilakukan intervensi selama 3 x 24 jam, diharapkan termoregulasi	<p>Manajemen Hipertermia</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi penyebab hipertermia 2) Monitor suhu tubuh 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengetahui penyebab hipertermia pada pasien. 2) Mengetahui suhu tubuh pasien.

	<p>membaik, dengan kriteria hasil:</p> <p>a. Kulit merah menurun</p> <p>b. Kejang menurun</p> <p>c. Pucat menurun</p> <p>d. Takipneu menurun</p> <p>e. Hipoksia menurun</p> <p>f. Suhu dalam batas normal</p>	<p>3) Monitor kadar elektrolit</p> <p>Terapeutk</p> <p>1) Longgarkan atau lepaskan pakaian</p> <p>2) Lakukan pendinginan eksternal (mis. Selimut hipotermia, kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila)</p> <p>Edukasi</p> <p>1) Anjurkan tirah baring</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1) Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu</p>	<p>Terapeutik</p> <p>1) Mengurangi hipertermia yang dirasakan.</p> <p>2) Mengurangi rasa hipetermia dan memberikan rasa nyaman.</p> <p>Edukasi :</p> <p>1) Memberikan rasa nyaman.</p> <p>Kolaborasi :</p> <p>1) Pemberian cairan dan elektroda sesuai kebutuhan pasien.</p>
<p>Gangguan Mobiltas Fisik</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan criteria hasil :</p> <p>a. Pergerakan ekstremitas meningkat</p> <p>b. Kekuatan otot meningkat</p> <p>c. Rentang gerak meningkat</p> <p>d. Nyeri sendi</p>	<p>Dukungan Mobilisasi</p> <p>Observasi</p> <p>1) Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya</p> <p>2) Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan</p> <p>Terapeutk</p> <p>1) Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. Pagar tempat tidur</p> <p>2) Libatkan keluarga untuk membantu pasien melakukan pergerakan</p> <p>Edukasi</p> <p>1) Jelaskan tujuan dan prosedur</p>	<p>Observasi</p> <p>1) Mengetahui keluhan lain pasien dan rencana tindakan berikutnya yang dapat dilakukan</p> <p>2) Mengetahui kemampuan dan batasan pasien terkait latihan/gerak yang akan dilakukan berikutnya</p> <p>Terapeutik</p> <p>1) memberikan bantuan kepada pasien saat akan melakukan mobilisasi dan mengurangi resiko</p>

	<p>menurun</p> <p>e. Gerakan terbatas menurun</p> <p>f. Kelemahan fisik menurun</p>	<p>mobilisasi</p> <p>2) Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis. Duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi.</p>	<p>jatuh/ sakit saat berpindah</p> <p>2) Keluarga dapat secara mandiri membantu pasien melakukan latihan pergerakan</p> <p>Edukasi</p> <p>1) Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan</p> <p>2) Melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi.</p>
Intoleransi aktifitas	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam. Respon fisiologis terhadap aktifitas yang membutuhkan tenaga dapat meningkat dengan kriteria hasil</p> <p>1. Kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-</p>	<p>Manajemen Energi</p> <p><i>Observasi</i></p> <p>1) Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan</p> <p>2) Monitor kelelahan fisik dan emosional</p> <p>3) Monitor pola dan jam tidur</p> <p>4) Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas</p>	<p><i>Observasi</i></p> <p>1) Mengidentifikasi pencetus terjadinya kelelahan dan rencana tindakan berikutnya yang dapat dilakukan</p> <p>2) Untuk mengetahui koping klien</p> <p>3) Menghindari kelelahan akibat kurang istirahat</p> <p>4) Mengetahui kemampuan dan batasan pasien terkait aktivitas yang akan dilakukan</p>

	<p>hari meningkat</p> <p>2. Kekuatan tubuh bagian atas meningkat</p> <p>3. Kekuatan tubuh bagian bawah meningkat</p> <p>4. Keluhan lelah menurun</p>	<p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis. cahaya, suara, kunjungan). 2) Lakukan latihan rentang gerak pasif/aktif (ROM) 3) Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan 4) Fasilitasi duduk disisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan. <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anjurkan tirah baring 2) Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap 3) Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang 4) Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan <p><i>Kolaborasi</i></p> <p>Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan</p>	<p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan rasa aman dan nyaman kepada klien 2) Membantu meningkatkan rentang gerak klien dalam beraktivitas 3) Memberikan rasa nyaman pada klien 4) Mengurangi resiko jatuh/sakit pada klien <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Istirahat yang lebih dan mengurangi aktivitas dapat memulihkan energi kembali 2) Melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi 3) Untuk mengidentifikasi rencana tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh perawat 4) memiliki kemampuan mengatasi masalah (<i>coping skill</i>) bermanfaat untuk mencegah
--	--	---	--

			<p>komplikasi kesehatan yang mungkin nanti akan timbul.</p> <p><i>Kolaborasi</i></p> <p>pemberian gizi yang cukup dapat meningkatkan energi klien</p>
Resiko infeksi	<p>Tujuan :</p> <p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 jam maka ekspektasi membaik dengan kriteria hasil :</p> <p>a. Kebersihan tangan meningkat</p> <p>b. Kebersihan badan meningkat</p> <p>c. Nafsu makan meningkat</p> <p>d. Demam menurun</p> <p>e. Kemerahan menurun</p> <p>f. Nyeri menurun</p> <p>g. Bengkak menurun</p> <p>h. Vesikel</p>	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi :</p> <p>1) Monitor tanda dan gejala infeksi local dan sistemik</p> <p>Terapeutik:</p> <p>1) Batasi jumlah pengunjung</p> <p>2) Berikan perawatan kulit pada area edema</p> <p>3) Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</p> <p>4) Pertahankan teknik aseptik</p> <p>5) Pada pasien beresiko tinggi</p> <p>Edukasi:</p> <p>1) Jelaskan tanda dan gejala infeksi</p> <p>2) Ajarkan cara mencuci tangan yang benar</p> <p>3) Ajarkan etikabatu</p> <p>4) Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi</p> <p>5) Ajarkan meningkatkan asupan nutrisi</p>	<p>Observasi</p> <p>1) Mengetahui tanda infeksi yang akan muncul pada pasien.</p> <p>Terapeutik</p> <p>1) Mengurangi risiko terserang organisme eksternal dari luar.</p> <p>Edukasi</p> <p>1) Agar pasien memahami tanda dan gejala infeksi.</p> <p>2) Personal hygiene yang baik menjadi sangat penting menanggulangi infeksi.</p> <p>3) Nutrisi dan cairan seimbang dan cukup sangat penting menanggulangi infeksi</p>

	<p>menurun</p> <p>i. Cairan berbau busuk menurun</p> <p>j. Sputum berwarna hijau menurun</p> <p>k. Drainase purulen menurun</p> <p>l. Gangguan kognitif menurun</p> <p>m. Kadar sel darah putih membaik</p>	<p>6) Anjurkan meningkatkan asupan cairan</p> <p>Kolaborasi:</p> <p>1) Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu</p>	<p>Kolaborasi</p> <p>1) Untuk menurunkan terjadinya penyebaran organisme</p>
--	---	---	--

2.2.5 Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan (Potter & Perry, 2012).

Komponen tahap implementasi :

- a. Tindakan keperawatan mandiri.
- b. Tindakan Keperawatan edukatif.
- c. Tindakan keperawatan kolaboratif
- d. Dokumentasi tindakan keperawatan dan respon klien terhadap asuhan keperawatan.

2.2.6 Evaluasi Keperawatan

Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan, membandingkan hasil tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menilai efektivitas proses keperawatan mulai dari tahap pengkajian, perencanaan dan pelaksanaan. Evaluasi disusun menggunakan SOAP dimana (Ridha & Hilda, 2019)

S : Ungkapan perasaan atau keluhan yang dikeluhkan secara subjektif oleh keluarga setelah diberikan implementasi keperawatan.

O : Keadaan objektif yang dapat diidentifikasi oleh perawat menggunakan pengamatan yang objektif.

A : Analisis perawat setelah mengetahui respon subjektif dan objektif.

P : Perencanaan selanjutnya setelah perawat melakukan analisis.

Ada tiga alternative dalam menafsirkan hasil evaluasi yaitu :

a. Masalah teratasi

Masalah teratasi apabila pasien menunjukkan perubahan tingkah laku dan perkembangan kesehatan sesuai dengan kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

b. Masalah sebagian teratasi

Masalah sebagian teratasi apabila pasien menunjukkan perubahan dan perkembangan kesehatan hanya sebagian dari kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Masalah belum teratasi

Masalah belum teratasi, jika pasien sama sekali tidak menunjukkan perubahan perilaku dan perkembangan kesehatan atau bahkan timbul masalah yang baru.

2.3 Evidence Based Practice In Nursing

2.3.1 Definisi

Terapi musik adalah mengalihkan perhatian klien ke hal yang lain sehingga dapat menurunkan kewaspadaan terhadap nyeri, bahkan meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Teknik terapi musik dapat mengatasi nyeri berdasarkan teori aktivasi retikuler, yaitu menghambat stimulus nyeri ketika seseorang menerima masukan sensoris yang cukup atau berlebihan, sehingga menyebabkan terhambatnya impuls nyeri ke otak (nyeri berkurang atau tidak dirasakan oleh klien) (Lestari, 2021).

2.3.2 Tujuan

Tujuan penggunaan teknik terapi musik dalam intervensi keperawatan adalah untuk pengalihan atau menjauhi perhatian terhadap sesuatu yang sedang dihadapi, misalnya rasa sakit (nyeri). Sedangkan manfaat dari penggunaan teknik ini, yaitu agar seseorang yang menerima teknik ini merasa lebih nyaman, santai, dan merasa berada pada situasi yang lebih menyenangkan (Vemila, 2021).

2.3.3 Indikasi

1. Memperbaiki kondisi fisik klien
2. Meningkatkan kesehatan dan emosional klien terhadap terapi musik
3. Mengurangi nyeri

2.3.4 Kontra Indikasi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam terapi musik :

1. Volume suara yang keras dapat mengganggu perasaan saat pemberian terapi sehingga volume yang digunakan tidak terlalu keras
2. Usahakan klien tidak menganalisa musik, dengan prinsip nikmati musik kemanapun musik membawa.
3. Hindari interupsi yang perlu diakibatkan cahaya yang remang-remang dan hindari menutup gorden atau pintu dan batasi lingkungan yang tidak efektif (Yulinda L, 2015).

2.3.4 Prosedur pemberian & Rasianol

2.3.4.1 Persiapan

Alat

Tape music/ Radio/Handphone

Bahan

- 1) Headset
- 2) CD music

2.3.4.2 Prosedur pelaksanaan

- 1) Tahap Pra Interaksi
 - a) Cek catatan keperawatan
 - b) siapkan alat-alat
 - c) cuci tangan

2) Interaksi

a) Tahap orientasi

- Menyampaikan salam
- Memperkenalkan diri dengan pasien dan keluarga
- Menanyakan nama pasien
- Definisikan perubahan spesifik perilaku dan fisiologis seperti yang diinginkan (mis : relaksasi, stimulasi, konsentrasi)
- Pertimbangkan minat klien pada music
- Identifikasi music yang disukai klien

b) Fase Kerja

- Pilih musik-musik tertentu yang mewakili music yang disukai klien
- Bantu individu untuk menentukan posisi yang nyaman
- Batasi stimulasi eksternal (misalnya, cahaya, suara, pengunjung, panggilan telepon) selama pengalaman mendengarkan musik
- Berikan headphone sesuai indikasi
- Pastikan volume atau suara musik adekuat dan tidak terlalu keras
- Hindari menghidupkan music dan dibiarkan dalam waktu yang lama

c) Terminasi

- Evaluasi hasil kegiatan
- Kontrak waktu pertemuan selanjutnya
- Rapikan alat dan cuci tangan
- Dokumentasi (Djohan, 2006)

2.3.4.3 Rasional

Musik dapat memberikan efek nyaman dan senang pada pendengarnya, musik yang didengar dapat membuat perasaan nyaman, senang dan sejahtera. Musik dapat berfungsi sebagai alat terapi kesehatan, dimana terapi musik adalah proses interpersonal yang digunakan untuk mempengaruhi keadaan fisik, emosional, mental estetik dan spiritual, untuk membantu meningkatkan atau mempertahankan kesehatannya (Novitasari et al., 2019).

Distraksi mendengarkan musik adalah penggunaan musik untuk relaksasi, mempercepat penyembuhan, meningkatkan fungsi mental dan menciptakan rasa sejahtera. Musik dapat mempengaruhi fungsi-fungsi fisiologis, seperti respirasi, denyut jantung, dan tekanan darah. Musik juga merangsang pelepasan hormon endorfin, hormon tubuh yang memberikan perasaan senang yang berperan dalam penurunan nyeri sehingga musik dapat digunakan untuk mengalihkan rasa nyeri sehingga pasien merasa nyerinya berkurang (Arif & Sari, 2019)

2.3.5 Kriteria Evaluasi

1. Respon : Klien nampak tenang dan rileks, keluhan nyeri berkurang dan tidak gelisah.
2. Berikan reinforcement positif
3. Mengakhiri kegiatan dengan baik

2.3.6 Artikel Utama & Pendukung

1. Artikel Utama (Selvia Novitasari, dkk. 2019. Pengaruh Terapi Musik dan Terapi Video Game terhadap tingkat nyeri anak usia pra sekolah yang dilakukan pemasangan infus. *Journal of Telenursing*).
2. Artikel Pendukung (Bulut Muhammet MD, et..all, 2020, The Effect of Music Therapy, Hand Massage, and Kaleidoscope usage on postoperative nausea and Vomiting, pain, fear, and Stress in Children : A Randomized Controlled Trial, *Journal of PerAnesthesia Nursing*)
3. Artikel Pendukung (Ali Rais, dkk. 2020. Penurunan Skala Nyeri Pada Anak Post Operasi Laparatomi menggunakan Terapi Musik Mozart. *Journal Ners Muda*)
4. Artikel Pendukung (Rita Lestari, 2021. *ANJANI Journal : Health Sciences Study The Effect of Music Therapy on Pain Level in Infusion in Children 6-12 Years of Age*)
5. Artikel Pendukung (Claire Howlin, 2020, The Cognitive Mechanisms in Music Listening Interventions for Pain : A Scoping Review)

ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Nursalam (2016) studi kasus adalah penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode studi kasus ini dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara sistematis.

3.2 Subyek Studi Kasus

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu atau klien yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Kriteria inklusi, pada studi kasus ini adalah :

- a. Pasien anak dengan diagnosa meningitis
- b. Perempuan atau laki-laki
- c. Pasien yang mengalami nyeri kepala dengan skala nyeri ringan, sedang maupun berat dalam kurun waktu < 3 bulan
- d. Bersedia menjadi responden

Kriteria eksklusi, pada studi kasus ini adalah :

- a. Pasien yang mengalami gangguan pendengaran
- b. Pasien yang mengalami penurunan kesadaran

3.3 Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini adalah melakukan proses asuhan keperawatan pada pasien anak Meningitis dengan nyeri menggunakan intervensi terapi musik.

3.4 Instrumen Studi Kasus

Instrumen studi kasus ini berupa format proses asuhan keperawatan anak, lembar SOP terapi musik, lembar pengukuran nyeri *Wong Baker Faces-Pain Rating Scale* dan jenis musik yang digunakan adalah jenis musik yang disukai pasien dengan menggunakan handphone untuk memutar musik dan earphone yang dipasangkan di telinga pasien. Pemberian terapi musik dilakukan selama 3 hari dengan durasi 15 menit perhari dan jenis musik yang didengarkan merupakan musik yang disukai anak yaitu sholawat nabi.

3.5 Prosedur Pengambilan Data

Prosedur penelitian berisi tentang uraian proses dalam melakukan studi kasus yang terdiri dari beberapa tahap antara lain:

1. Persiapan

Persiapan yang dilakukan meliputi pengajuan judul studi kasus.

2. Pengumpulan

Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, rekam medik pasien dan wawancara

3. Penyusunan Laporan

Disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah.

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data

Tempat dilakukannya studi kasus ini di Ruangan Baji Minasa RSUD Labuang Baji Makassar. Pada hari rabu sampai dengan jumat tanggal 07-09 Juli 2021.

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dan penyajian data pada studi kasus disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan didalam teks dan bersifat naratif.

3.8 Etika Studi Kasus

Menurut Nursalam (2016) prinsip etika dalam penelitian dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu prinsip manfaat, prinsip menghargai hak-hak subjek, dan prinsip keadilan.

1. Prinsip manfaat


- a. Bebas dari penderitaan.
- b. Penelitian harus dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada subjek, khususnya jika menggunakan tindakan khusus.
- c. Bebas dari eksploitasi.
- d. Partisipasi subjek dalam penelitian, harus dihindarkan dari keadaan yang tidak menguntungkan. Subjek harus diyakinkan bahwa partisipasinya dalam penelitian atau informasi yang telah diberikan, tidak akan dipergunakan dalam hal-hal yang dapat merugikan subjek dalam bentuk apa pun.

- e. Risiko (benefits ratio).
 - f. Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan.
2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (*respect human dignity*)
- a. Hak untuk ikut/tidak menjadi responden (*right to self determination*)
Subjek harus diperlakukan secara manusiawi. Subjek mempunyai hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi subjek atau pun tidak, tanpa adanya sang siapa pun atau akan berakibat terhadap kesembuhannya jika mereka seorang klien.
 - b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (*right to full disclosure*)
Seorang peneliti harus memberikan penjelasan secara rinci serta bertanggungjawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada subjek.
 - c. *Informed consent*
Subjek harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Pada informed consent juga perlu dicantumkan bahwa data yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu.
3. Prinsip keadilan (*right to justice*)
- a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (*right in fair treatment*)
Subjek harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama, dan

sesudah keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi apabila ternyata mereka tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian.

b. Hak dijaga kerahasiaannya (*right to privacy*)

Subjek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama (*anonymity*) dan rahasia (*confidentiality*).



BAB IV

LAPORAN KASUS

4.1 Asuhan Keperawatan

4.1.1 Pengkajian Keperawatan

I. Biodata

A. Identitas Klien

1. Nama/Nama panggilan : An. R
2. Tempat, tgl lahir/usia : Makassar, 20 Januari 2013/ 8 Tahun
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)
6. Alamat : Jl. Mappaodang 1 no 4A
7. Tanggal Masuk : 24 Juni 2021
8. Tanggal Pengkajian : 07 Juli 2021
9. Diagnosa Medik : Meningitis
10. Rencana terapi : Terpasang Infus Asering

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah

- a. Nama : Tn.R
- b. Usia : 50 tahun
- c. Pendidikan : SMK
- d. Pekerjaan : Buruh Harian
- e. Agama : Islam
- f. Alamat : Jl. Mappaodang 1 no 4A

2. Ibu

- a. Nama : Ny. S
- b. Usia : 47 tahun
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : IRT

- e. Agama : Islam
 f. Alamat : Jl. Mappaodang 1 no 4A

C. Identitas Saudara Kandung

No	Nama	Usia	Hubungan	Status Kesehatan
1.	M. Rian	17 Tahun	Saudara Kandung	Sehat
2.	Nur salwa	12 tahun	Saudara Kandung	Sehat

II. Keluhan Utama/ Alasan Masuk Rumah Sakit:

Ibu pasien mengatakan pasien masuk ke RS dengan keluhan sakit kepala disertai demam dan muntah 10x sebelum masuk ke RS.

III. Riwayat Kesehatan

A. Riwayat Kesehatan Sekarang

Ibu pasien mengatakan pasien menderita sakit kepala sekitar ± 1 tahun yang lalu dan memberat sejak 1 bulan terakhir. Ibu pasien mengatakan ketika pasien demam pasti akan disertai dengan sakit kepala. Ibu pasien mengatakan pasien mengalami demam yang naik turun, mual, muntah 2-4 x/hari, BAB 5 x/hari dengan konsistensi encer, ada ampas dan hitam. Pasien mengatakan sakit kepala, pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk, dengan skala 8. Ibu pasien mengatakan nyeri yang dirasakan anaknya berlangsung 10-15 menit dan hilang timbul. Pasien menangis apabila nyeri kepalanya timbul.

B. Riwayat kesehatan lalu

- 1) Penyakit yang pernah dialami : Ibu pasien mengatakan pasien pernah kejang dan demam.
- 2) Kecelakaan yang pernah dialami : Ibu pasien mengatakan pasien 1 tahun yang lalu pernah jatuh dari tangga (6 anak tangga) ketika bermain dan kepala pasien terbentur .
- 3) Pernah alergi : Ibu pasien mengatakan pasien tidak mempunyai riwayat alergi.
- 4) Komsumsi obat-obatan bebas : Bodrexin, PCT sirup

5) Perkembangan anak dibanding saudara-saudaranya :


Ibu pasien mengatakan pasien perkembangannya cepat dan paling aktif dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain.

C. Riwayat Kesehatan Keluarga

1. Penyakit anggota keluarga :

Ibu pasien mengatakan ibunya mempunyai riwayat penyakit Diabetes Melitus

2. Genogram



Keterangan:

- : Laki-Laki
- : Perempuan
- /// : Klien
- × : Meninggal
- : Garis Perkawinan
- - - : Garis Keturunan
- | : Tinggal Serumah
- ? : Umur tidak diketahui

G1 : Ibu pasien mengatakan kedua orang tua suaminya sudah meninggal dunia. Ayah dari ibu pasien juga telah meninggal dunia dan ibunya ibu pasien masih hidup

G2 : Ibu pasien mengatakan saat ini dirinya dan suaminya tidak memiliki keluhan kesehatan.

G3 : Ibu pasien mengatakan memiliki 3 anak dan pasien adalah anak ke 3

IV. Riwayat Imunisasi

No	Jenis Imunisasi	Usia Pemberian	Reaksi Setelah Pemberian
1	BCG	1 Bulan	Demam
2	DPT (I,II,III)	3,5,6 Bulan	Demam, DPT 3 demam dan bengkak pada paha(bekas suntikan)
3	Polio (I,II,III,IV)	0,3,5,6,9 Bulan	Tidak ada keluhan
4	Campak	9 Bulan	Tidak ada keluhan
5	Hepatitis B	0 dan sebelum 18 Bulan	Tidak ada keluhan
6	Rubella	5 tahun	Tidak ada keluhan

V. Riwayat Nutrisi

a. Pertumbuhan Fisik

1. Berat badan : 22 kg
2. Tinggi badan : 127 cm
3. Waktu tumbuh gigi : Usia 3 bulan

b. Perkembangan Tiap tahap

Usia anak saat

1. Berguling : 3 bulan
2. Duduk : 4 bulan
3. Merangkak : Ibu pasien mengatakan pasien tidak merangkak
4. Berdiri : 6 bulan
5. Berjalan : 12 bulan
6. Senyum kepada orang lain pertama kali : 6 bulan
7. Bicara pertama kali : 6 bulan
8. Berpakaian tanpa bantuan : 2 tahun

VI. Riwayat Nutrisi

A. Pemberian Asi

1. Pertama kali disusui : Sejak lahir
2. Cara pemberian : Ibu pasien mengatakan secara langsung dan terjadwal
3. Lama pemberian : 6 bulan, setelah itu diberikan susu formula (SGM) + ASI

B. Pemberian susu formula

1. Alasan pemberian : ASI sudah berkurang
2. Jumlah pemberian : Ibu pasien mengatakan 3 kali dalam sehari
3. Cara pemberian : Ibu pasien mengatakan pemberian dengan cara dot.

C. Pola perubahan nutrisi tiap tahap usia sampai nutrisi saat ini

Usia	Jenis Nutrisi	Lama Pemberian
1. 0-4 Bulan	ASI	6 bulan
2. 4-12 Bulan	ASI+ MPASI	1,5 tahun (dimulai usia 6 bulan- usia 2 tahun)
3. Saat ini	Makanan Padat	Sampai sekarang

VII. Riwayat Psikososial

1. Apakah anak dan orang tua tinggal di : Rumah sendiri.
2. Lingkungan berada di : Kota
3. Apakah rumah : Dekat dengan sekolah : TK ; Memiliki ruang bermain: Tidak; Memiliki kamar tidur sendiri : Ibu pasien mengatakan An. R tidur dengan kakaknya
4. Apakah ada tangga yang bisa membahayakan anak : Ibu pasien mengatakan memiliki tangga di rumahnya
5. Hubungan antara anggota keluarga : Harmonis.
6. Pengasuh anak : Orang tua

VIII. Riwayat Spiritual

- a. Support sistem dalam keluarga : Ibu pasien mengatakan semua keluarga membantu jika ada masalah
- b. Kegiatan keagamaan : Ibu pasien mengatakan aktif dalam kegiatan keagamaan di masjid. Ibu pasien mengatakan An.R aktif belajar mengaji di TPA dekat rumah.

IX. Reaksi Hospitalisasi

- A. Pengalaman keluarga tentang sakit dan rawat inap
 1. Mengapa ibu membawa anaknya ke RS: Ibu pasien mengatakan anaknya mengeluh sakit kepala
 2. Apakah dokter menceritakan tentang kondisi anak: Ya
 3. Bagaimana perasaan orangtua saat ini: Ibu pasien mengatakan merasa cemas khawatir dan sedih dengan kondisi anaknya sekarang
- B. Pemahaman anak tentang sakit dan rawat inap
 1. Mengapa keluarga/orangtua membawa kamu ke RS? An.R mengatakan kepalanya sakit
 2. Menurutmu apa penyebab kamu sakit? An.R mengatakan tidak tahu penyebab sakitnya
 3. Apakah dokter menceritakan keadaanmu? An.R mengatakan dokter tidak menceritakan keadaanya
 4. Bagaimanan rasanya dirawat di RS? An. R mengatakan sedih, cemas, khawatir dan takut selama di rumah sakit. An. R tampak menangis dan takut ketika akan diberikan pengobatan (disuntikkan obat).

X. Aktivitas Sehari-hari

A. Nutrisi

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
1. Selera makan	Baik	Nafsu makan berkurang, ibu pasien mengatakan anaknya hanya menghabiskan 3 sendok
2. Menu makan	Nasi, lauk, sayur bayam,	Nasi, lauk, sayur
3. Frekuensi makan	4 kali sehari	3 kali sehari
4. Makanan pantangan	Tidak ada	Gorengan, kerupuk, mie instan
5. Pembatasan pola makan	Tidak ada	Tidak ada
6. Cara makan	Mandiri	Dibantu orangtua
7. Ritual saat makan	Berdo'a	Berdo'a

B. Cairan

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
1. Jenis minuman	Air Putih, Susu Ultra	Air putih
2. Frekuensi minum	1 ½ liter/hari	< dari 1 ½ liter hari
3. Kebutuhan cairan	Terpenuhi	Terapi Cairan
4. Cara pemenuhan	Oral	Oral dan intravena (Terpasang IVFD Asering di tangan kanan)

C. Eliminasi (BAB dan BAK)

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
BAB (Buang Air Besar) 1. Tempat pembuangan 2. Frekuensi 3. Konsistensi 4. Obat pencahar	Toilet 1 x sehari Lunak Tidak menggunakan	Pispot 5x sehari Encer ada ampas dan berwarna hitam Tidak menggunakan
BAK (Buang Air Kecil) 1. Tempat pembuangan 2. Frekuensi 3. Warna dan bau 4. Volume 5. Kesulitan	Toilet 7-8 x sehari Bening - Tidak ada keluhan	Pispot 5-6 x sehari Bening - Tidak ada keluhan

D. Istirahat Tidur

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
1. Jam tidur a. Siang b. Malam 2. Pola tidur 3. Kebiasaan sebelum tidur 4. Kesulitan tidur	Jarang tidur 22.00 Teratur Nonton Tidak ada	16.00 22.00 / 24.00 Tidak menentu Tidak ada

E. Olah Raga

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
1. Program olahraga 2. Jenis dan frekuensi 3. Kondisi setelah olahraga	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	Tidak ada Tidak ada Tidak ada

F. Personal Hygiene

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
1. Mandi a. Cara b. Frekuensi c. Alat Mandi	Mandi sendiri 2 x sehari Sabun	diwashlap 2 kali sehari Sabun
2. Cuci rambut a. Frekuensi b. Cara	2x/seminggu Sendiri	Belum pernah
3. Gunting kuku a. Frekuensi b. Cara	1 x seminggu Sendiri	Belum pernah
4. Gosok gigi a. Frekuensi b. Cara	3 x sehari Sendiri	1 kali sehari Dibantu orangtua

G. Aktivitas /Mobilitas Fisik

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
1. Kegiatan sehari-hari	Sekolah Online dan bermain	Hanya berbaring di tempat tidur
2. Pengaturan jadwal harian	Diatur oleh orangtua	Diatur oleh petugas kesehatan
3. Penggunaan alat bantu aktivitas	Tidak ada	Tidak menggunakan alat bantu, tapi ibu pasien mengatakan segala aktivitas anaknya dibantu oleh ibu dan ayahnya
4. Kesulitan pergerakan tubuh	Tidak ada keluhan	Susah beraktivitas karena badan terasa lemah, Pasien tampak lemah

H. Rekreasi

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
1. Perasaan saat sekolah 2. Waktu luang 3. Perasaan setelah rekreasi 4. Waktu senggang keluarga 5. Kegiatan hari libur	Senang Setelah sekolah online Senang Setelah sekolah Online Bermain bersama teman atau sepupunya	Tidak senang Setiap hari Tidak bisa rekreasi Tidak ada Tidak ada

XI. Pemeriksaan Fisik

A. Keadaan umum klien :

Composmentis, Klien tampak lemah, meringis dan gelisah

B. Tanda-tanda vital

1. Suhu : 38,5° C
2. Nadi : 100x/ menit
3. Penapasan : 28 x/ menit/takipneu
4. Tekanan Darah : -

C. Antropometri

1. Tinggi badan : 127 cm
2. Berat badan : Sebelum Sakit : 22 Kg, Saat sakit : 19 kg
3. Lingkaran lengan atas : 18,8 cm
4. Lingkaran kepala : 52 cm
5. Lingkaran dada : 54 cm
6. Lingkaran perut : 49 cm
7. Skin Fold : -

D. Sistem Pernapasan

1. Hidung

- a. Simetris : Hidung nampak simetris
- b. Pernapasan cuping hidung : Tidak ada pernapasan cuping hidung
- c. Secret : Tidak ada sekret
- d. Polip : Tidak nampak ada polip
- e. Epistaksis : Tidak ada epistaksis

2. Leher

- a. Pembesaran kelenjar : Tidak ada pembesaran kelenjar
- b. Tumor : Tidak ada tumor

3. Dada

- a. Bentuk dada : Normal chest
- b. Perbandingan ukuran AP dengan Transversal : -
- c. Gerakan dada : Simetris kiri dan kanan; Terdapat retraksi otot bantu pernapasan : Tidak nampak retraksi otot bantu pernapasan
- d. Suara napas : Vesikuler diseluruh lapang paru
- e. Apakah ada clubbing finger : Tidak nampak clubbing finger

E. Sistem Cardio Vaskuler

- 1. Conjungtiva : Tidak pucat (normal)
 - a. Bibir : Pucat
 - b. Arteri carotis : Teraba lemah
 - c. Tekanan vena jugularis : Tidak nampak pembesaran
- 2. Ukuran jantung : Normal
- 3. Suara Jantung :
 - a. S1 : Lup
 - b. S2 : Dup
 - c. Bising Aorta : Tidak ada
 - d. Murmur : Tidak ada
 - e. Gallop : Tidak ada
- 4. *Capillary Refilling Time* : <2 detik

F. Sistem Pencernaan

- 1. Sklera : Tidak ikterik
 - a. Bibir : Kering
 - b. Labio Skizis : Tidak ada
- 2. Mulut : kebersihan mulut bersih
 - a. Stomatitis : Tidak ada
 - b. Palate skizis : Tidak ada

- c. Jumlah gigi : buah
- d. Kemampuan menelan : Baik
- 3. Gaster : Ada nyeri tekan
- 4. Abdomen : Ada nyeri tekan
 - a. Hati : Tidak terjadi pembesaran
 - b. Lien : Tidak terjadi pembesaran
 - c. Ginjal : Tidak ada pembesaran
 - d. Gerakan peristaltic : 18 kali per menit
- 5. Anus: Baik; Hemorrhoid : Tidak ada hemoroid

G. Sistem Indra

1. Mata

- a. Kelopak mata : Nampak baik
- b. Bulu mata : Nampak baik
- c. Alis : Nampak baik
- d. Visus : Normal
- e. Lapang pandang : Normal seluruh lapang pandang

2. Hidung

- a. Penciuman : Normal
- b. Nyeri hidung : tidak ada
- c. Trauma : Tidak ada
- d. Mimisan : Tidak ada
- e. Secret yang menghalangi penciuman : Tidak ada

3. Telinga

- a. Keadaan daun telinga : Normal, tidak nampak adanya lesi maupun pembesaran
- b. Kanal auditoris : Normal
- c. Serumen : nampak kelebihan serumen
- d. Fungsi pendengaran : Normal

H. Sistem saraf

1. Fungsi cerebral :

- a. Status mental : Oreintasi: Baik ; Daya Ingat: Baik; Perhatian & perhitungan : Baik; Bahasa: Normal dengan menggunakan bahasa Indonesia.
 - b. Kesadaran : Eyes : 4 ; Motorik :6 ; Verbal : 5 ; dengan GCS 15.
 - c. Bicara : Normal.
2. Fungsi cranial
- a. N.I : Anak mampu membedakan berbagai macam bau
 - b. N.II : Visus Normal ; Lapang pandang Normal seluruh lapang pandang
 - c. N.III, IV, VI : Gerakan bola mata Normal ; Pupil Ishokor
 - d. N.V : Sensorik Normal ; Motorik Normal
 - e. N.VII : Sensorik Normal ; Otonom Normal; Motorik Normal
 - f. N.VIII : Pendengaran Normal ; Keseimbangan Normal
 - g. N.IX : Anak mampu membedakan rasa asin/manis/ pahit
 - h. N.X :Gerakan Uvula Normal ;Rangsangan muntah/ menelan Normal
 - i. N.XI : Sternocledomastoideus Normal ; Trapesius Normal
 - j. N.XII : Gerakan lidah Normal
3. Fungsi motorik : Massa otot Normal ; Tonus otot: Normal ; Kekuatan otot: Normal
4. Fungsii sensorik : Suhu: 38,5° C; Nyeri: Ada Nyeri ; Getaran: Tidak
5. Fungsi cerebellum : Kordinasi: Normal; Keseimbangan: Tidak Seimbang
6. Refleks :
- | | |
|----------|----------|
| Bisep | : Normal |
| Trisep | : Normal |
| Patella | : Normal |
| Babinski | : Normal |
7. Iritasi meningen : Kaku kuduk : Positif
- | | |
|----------------|-----------|
| Laseque sign | : Negatif |
| Brudzinki I/II | : Positif |

I. Sistem Muskuloskeletal

1. Kepala : Bentuk Kepala: Normal ; Lingkaran kepala : 52 cm
2. Vertebrae : Gerakan : Normal ; ROM : Normal; Fungsi gerakan: Normal
3. Pelvis : Gaya jalan: lemah ; Gerakan : lemah;ROM : Normal
Trendelenberg Test : -; Ortolani/ Barlow : Tidak ada
4. Lutut : Normal, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
Gerakan :Normal
5. Kaki : Normal tidak bengkak
Gerakan : Lemah
Kemampuan jalan : Lemah
6. Tangan : Tidak bengkak
Gerakan : Bisa menggerakkan
ROM : Bisa melakukan ROM.

J. Sistem Integumen

1. Rambut : Warna : Hitam
Mudah dicabut : Tidak rapuh
2. Kulit : Warna : Kuning langsung
Temperature : Teraba hangat (38,5⁰C)
Kelembaban : Kering
Bulu kulit : Normal
Tahi lalat : Tangan
Ruam : Tidak ada
Teksture : Pecah-pecah
3. Kuku : Warna : Merah muda
Permukaan kuku : Baik
Bentuk kuku : Normal
Mudah patah : Tidak mudah patah
Kebersihan : Kuku tampak bersih

K. Sistem Endokrin

1. Kelenjar Thyroid : Tidak nampak pembesaran kelenjar tiroid

2. Ekskresi urine berlebihan: Tidak ada keluhan
3. Suhu tubuh yang tidak seimbang : 38,5°C; Keringat berlebihan: Tidak
4. Riwayat bekas air seni dikelilingi semut : Tidak ada

L. Sistem Perkemihan

1. Odema Palpebra : Tidak ada ; Moon face: Tidak ada;
Oedema Anasarka: tidak ada
2. Keadaan kandung kemih : Normal
3. Nocturia : Tidak ; Dysuria: Tidak; Kencing Batu :Tidak ada

M. Sistem Reproduksi

1. Wanita
 - a. Payudara :Normal ;Puting : Normal ; Areola mammae: Normal
 - b. Labia mayora dan minora : Genetalia eksterna sesuai dengan jenis kelamin perempuan; Secret: - ; Bau : -

N. System Imun

1. Alergi : Tidak ada
2. Penyakit yang berhubungan dengan perubahan cuaca : Tidak ada

b.Pemeriksaan Tingkat Perkembangan

- a. Perkembangan Kognitif : Pasien mengatakan sekarang sudah kelas 3 SD, ibu pasien mengatakan anaknya sudah bisa membaca dan menulis umur 6 tahun
- b. Perkembangan Psikoseksual: Ibu pasien mengatakan pasien sangat aktif dan senang mendengarkan sholawatan
- c. Perkembangan Psikososial : Pasien nampak cemas dan khawatir dengan penyakitnya

c. Tes Diagnostik

a. Radiologi

Foto Thorax(tgl: 25 Juni 2021)

- Pulmo : tampak bercak bercak dilapangan paru kanan kiri
- Cor : Bentuk dan dan ukuran dalam batas normal
- Sinus costrophenicus dan diaphragma normal
- Tulang-tulang kerangka thorax normal

b. Laboratorium (26 Juni 2021)

Parameler	Resull	Rujukan	Unit
WBC	5.76	4.11-11.30	10 ³ /uL
RBC	4.26	4.10-5.10	10 ³ /uL
HGB	12.3	12.3-15.3	g/dL
HCT	35.9	35.9-44.6	%
PLT	454	172-450	10 ³ /uL
RDW SD	34.7	37.0-54.0	fL
RDW CV	11.6	11.6-14.6	%
PDW	8.3	9.0-17.0	fL
MPV	8.7	9.0-13.0	fL
PCT	0.40	0.17-0.35	%
MONO	0.93	0.00-0.80	10 ³ /uL
EO	0.00	0.00-0.60	10 ³ /uL
BASO	0.01	0.00-0.20	10 ³ /uL
IG	0.01	0.00-7.00	10 ³ /uL
GDS	105	71-140	Mg/dl

c. Pemeriksaan cairan Tubuh (Cairan LCS)

Tgl . 29 Juni 2021

Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan
Volume cairan	3 cc	1-10 cc
Warna	Jernih	Tidak berwarna / Jernih
Glukosa	62	<200 mg/dL
Protein	200	<3000 mg/dL
Jumlah Leukosit	10	<200 sel
Hitung Jenis	MN : 90 % PMN : 10 %	60- 70 % Mononukleus

d. Terapi saat ini (ditulis dengan rinci)

Nama Obat	Dosis	Rute
Ceftriaxone	1gr/12 jam	Intravena
Paracetamol	22 cc/ 8 jam	Intravena
Dexametasone	3x 1 ^{1/2} jam	Intravena
Ranitidine	1/2 /12 jam	Intravena
Ketorolac	1/2 / 24 jam	Intravena
Infus Asering	10 tpm	Intravena

Data Fokus

No	Data Subyektif	Data Obyektif
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan pasien menderita sakit kepala dan memberat sejak 1 bulan terakhir - Pasien mengatakan sakit kepala, P : Nyeri pada Kepala Q : Nyeri seperti ditusuk-tusuk, S : skala 8 R : Oksipital, temporal, parietal dan frontal T: hilang timbul durasi 10-15 menit - Ibu pasien mengatakan pasien mengalami demam yang naik turun - Ibu pasien mengatakan ketika pasien demam pasti akan disertai dengan nyeri kepala - Ibu pasien mengatakan pasien pernah jatuh dari tangga dan kepala pasien terbentur - Ibu pasien mengatakan pasien mual, muntah 2-4 x/hari - Ibu pasien mengatakan pasien BAB 5 x/hari dengan konsistensi encer, ada ampas dan berwarna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien nampak menangis apabila nyeri kepalanya timbul. 2. Pasien tampak lemah, 3. Pasien tampak meringis, merintih 4. Pasien tampak gelisah dan cemas 5. Tubuh pasien teraba hangat 6. TTV: <ul style="list-style-type: none"> a.S: 38.5° C. b.N: 100 x/ menit. c.P: 28x/ menit. 7. Bibir tampak kering 8. Peristaltik Usus 18 x/menit

Analisis Data

No	Data	Etiologi	Masalah
1.	<p>Data Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan pasien menderita sakit kepala dan memberat sejak 1 bulan terakhir - Ibu pasien mengatakan pasien pernah jatuh dari tangga dan kepala pasien terbentur. - Pasien mengatakan sakit pada kepala P : Nyeri pada Kepala Q : Nyeriseperti ditusuk-tusuk, S : skala 8 R : Oksipital, temporal, parietal dan frontal T: hilang timbuldurasi 10-15 menit <p>Data Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien nampak menangis apabila nyeri kepalanya timbul. - Pasien tampak lemah, - Pasien tampak meringis 	<p style="text-align: center;">Trauma Kepala</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Infeksi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Peradangan meningen, lapisan korteks, sub arachnoid</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Eksudat meningkat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Peningkatan TIK</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Sakit Kepala (Nyeri)</p>	Nyeri Akut
2.	<p>Data Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan pasien mual, muntah 2-4 x/hari - Ibu pasien mengatakan pasien BAB5 x/hari dengan konsistensi encer, ada ampas dan berwarna hitam. <p>Data Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak lemah, - Bibir tampak kering - Peristaltik Usus 18 x/menit 	<p style="text-align: center;">Trauma Kepala</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Infeksi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Peradangan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Eksudat meningkat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Peningkatan TIK</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Mual, Muntah, Diare</p>	Diare

3.	<p>Data Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan demam pasien naik turun - Ibu pasien mengatakan ketika pasien demam pasti akan disertai dengan nyeri kepala <p>Data Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tubuh pasien teraba panas. - TTV: <ul style="list-style-type: none"> a. S: 38,5° C. b. N: 100 x/ menit. c. P: 28 x/ menit. 	<p>Trauma Kepala</p> <p>↓</p> <p>Infeksi</p> <p>↓</p> <p>Peradangan meningen, lapisan korteks, sub arachnoid</p> <p>↓</p> <p>Proses demam</p> <p>↓</p> <p>Hipetermia</p>	Hipetermia
4.	<p>Data Subjektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan merasa khawatir dan sedih dengan kondisi anaknya. - Pasien mengatakan sedih dan cemas terhadap penyakitnya <p>Data Objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak gelisah - Pasien tampak takut ketika akan diberikan pengobatan . 	<p>Infeksi</p> <p>↓</p> <p>Reaksi inflamasi</p> <p>↓</p> <p>Proses demam</p> <p>↓</p> <p>Hipetermia</p> <p>↓</p> <p>Pengobatan perawatan kondisi,prognosis</p> <p>↓</p> <p>Kurangnya informasi ,kondisi/prognosis dan perawatan.</p> <p>↓</p> <p>Ansietas</p>	Ansietas

4.1.2 Diagnosis Keperawatan

No	Diagnosa Keperawatan
1.	Nyeri Akut b.d. Agen pencedera fisiologis
2.	Diare b.d. Proses Infeksi
3.	Hipertermia b.d. proses penyakit
4.	Ansietas b.d. Kurang terpapar informasi

4.1.3 Intervensi Keperawatan

No	Diagnosa Keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi	Rasional
1.	Nyeri Akut	Setelah diberikan tindakan keperawatan 3x 24Jam diharapkan Nyeri menurun dengan kriteri hasil : 1. Keluhan nyeri menurun 2. Meringis menurun	Manajemen nyeri Observasi 1) Identifikasi tingkat, lokasi, karakteristik, kualitas, frekwensi dan faktor pencetus nyeri 2) Identifikasi skala nyeri 3) Observasi isyarat nonverbal ketidaknyamanan Terapeutik 1) Berikan Terapi Musik dengan jenis musik kesukaan pasien selama 15 menit 2) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri 3) Fasilitasi istirahat dan tidur	Observasi 1) Untuk mengetahui lokasi, karakteristik, kualitas nyeri, frekuensi dan faktor pencetus 2) Untuk mengetahui tingkat nyeri 3) Untuk mengetahui keadaan umum pasien Terapeutik 1) Untuk mengurangi rasa nyeri 2) Mengurangi resiko factor yang dapat memperberat nyeri/menimbulkan

			<p>Edukasi</p> <p>1) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1) Pemberian analgetik</p>	<p>n nyeri</p> <p>3) Mengalihkan dan memenuhi kebutuhan istirahat pasien</p> <p>Edukasi</p> <p>1) Memudahkan pasien untuk mengontrol nyeri dengan cara sederhana</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1) Mengurangi/menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien</p>
2.	Diare	<p>Setelah diberikan tindakan keperawatan 3x 24 jam diharapkan eliminasi fekal membaik dengan kriteri hasil :</p> <p>1. konsistensi feses membaik</p> <p>2. frekuensi defekasi membaik</p> <p>3. peristaltik usus membaik</p>	<p>Manajemen Diare</p> <p>Observasi</p> <p>1) Identifikasi penyebab diare</p> <p>2) Monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja</p> <p>Terapeutik</p> <p>1) Berikan asupan cairan oral</p> <p>2) Berikan cairan intavena</p> <p>Edukasi</p> <p>1) Anjurkan makanan porsi kecil dan sering secara</p>	<p>Observasi</p> <p>1) Mengetahui penyebab diare</p> <p>2) Mengetahui warna, frekuensi, dan konsistensi feses</p> <p>Terapeutik</p> <p>1) Menjaga keseimbangan cairan</p> <p>2) Memenuhi kebutuhan cairan</p> <p>Edukasi</p>

			<p>bertahap</p> <p>2) Anjurkan menghindari makanan pedas</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1) Pemberian obat antimotilitas</p>	<p>1) Memenuhi kebutuhan tubuh</p> <p>2) Mengurangi diare</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1) Membuat feses menjadi keras</p>
3.	Hipertermia	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan suhu tubuh berada pada rentang normal dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suhu tubuh membaik. 2. Suhu kulit membaik. 	<p>Manajemen Hipertermi:</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi penyebab hipertemi 2) Monitor suhu tubuh. <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Longgarkan atau lepaskan pakaian 2) Lakukan Kompres Hangat <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anjuran tirah baring. <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu. 2) Kolaborasi pemberian antipiretik 	<p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengetahui penyebab hipertermia pada pasien. 2) Mengetahui suhu tubuh pasien. <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengurangi hipertermia yang dirasakan. 2) Mengurangi rasa hipertermia dan memberikan rasa nyaman. <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Memberikan rasa nyaman. <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian cairan dan elektroda sesuai kebutuhan pasien.

4.	Ansietas	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 x 24 jam, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil:</p> <p>a. Gelisah menurun.</p> <p>b. Khawatir menurun.</p>	<p>Redukasi Ansietas</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi saat tingkat ansietas berubah (mis: kondisi, waktu, stresor). 2. Monitor tanda-tanda Ansietas <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengarkan dengan penuh perhatian. 2. Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan <p>Edukasi</p> <p>Latih teknik relaksasi</p> <p>Kolaborasi</p> <p>Kolaborasi pemberian terapi antiansietas, jika diperlukan.</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tingkat ansietas berubah pada kondisi, waktu, dan stress. 2. Dapat membantu pasien untuk mencegah terjadinya ansietas. <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengarkan seksama keluhan pasien dapat mengurangi ansietas. 2. Perasaan pasien akan berpikir positif jika diberikan motivasi. <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi tingkat kecemasan dan membuat rileks. <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi perasaan cemas pada pasien
----	----------	--	--	---

4.1.4 Implementasi Keperawatan

Inisial klien : An.R Ruangan: Baji Minasa (06)

No.RM : 39321 DX Medis: Meningitis

No.	DX. Keperawatan	Waktu Hari/tanggal	Implementasi Tindakan Keperawatan	Nama Jelas
1.	Nyeri Akut	Rabu, 07 Juli 2021 14.30 14.35 14.37 14.38 14.50	<p>Manajemen nyeri</p> <p>Observasi</p> <p>1) Mengidentifikasi tingkat, lokasi, karakteristik, kualitas, frekwensi dan faktor pencetus nyeri</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - P : Nyeri pada kepala Q : Nyeri seperti ditusuk-tusuk, S : skala 8 R : Oksipital, temporal, parietal dan frontal T: hilang timbul durasi 10-15 menit <p>2) Mengidentifikasi skala nyeri</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diukur dengan Wong Baker faces-Pain rating Scale - Skala nyeri 8 (lebih nyeri) - Pasien tampak merintih <p>3) Observasi isyarat nonverbal ketidaknyamanan</p> <p>Hasil :</p> <p>Pasien tampak gelisah</p> <p>Terapeutik</p> <p>1) Memberikan Terapi Musik sholawat selama 15 menit</p> <p>Hasil : Pasien nampak tenang, walaupun terkadang nampak masih meringis</p> <p>Edukasi</p> <p>1) Mengajarkan Teknik Relaksasi Nafas dalam</p> <p>Hasil : Pasien tampak rileks</p>	Nur Rezki Hadiyanti

		15.00	Kolaborasi 1) Memberikan analgetik Hasil : Pemberian ketorolac melalui IV	
2.	Diare	Rabu, 07 Juli 2021	Manajemen Diare Observasi 1) Mengidentifikasi penyebab diare Hasil : Berhubungan dengan penyebaran infeksi bakteri meningitis 2) Memonitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja Hasil : Ibu pasien mengatakan pasien BAB5 x/hari dengan konsistensi encer, ada ampas dan berwarna hitam. Terapeutik 1) Memberikan asupan cairan oral Hasil : Ibu pasien mengatakan selalu memberikan air minum kepada pasien 2) Memberikan cairan intavena Hasil : Terpasang Cairan Asering di ekstremitas kanan atas pasien. Edukasi 1) Menganjurkan makanan porsi kecil dan sering secara bertahap Hasil : Ibu pasien mengatakan pasien mual, muntah 2-4 x/hari Kolaborasi 1) Memberikan obat antimotilitasi Hasil : Pemberian injeksi Ranitidine Injeksi Ceftriaxone IV	Nur Rezki Hadiyanti
3.	Hipetermi	Rabu, 07 Juli 2021	Manajemen Hipetermi: Observasi : 1) Mengidentifikasi penyebab hipertemi Hasil : Terpapar lingkungan panas. 2) Memonitor suhu tubuh. Hasil : Suhu : 38,5°C	Nur Rezki Hadiyanti

		15.37	Terapeutik : 1) Melonggarkan atau lepaskan pakaian. Hasil :Melonggarkan pakaian pasien.	
		15.40	2) Melakukan Kompres Hangat Hasil : Klien dikompres air hangat.	
		15.50	Edukasi : 1) Menganjurkan tirah baring. Hasil: pasien tampak tirah baring	
		16.00	Kolaborasi : 1) Melakukan pemberian antipiretik Hasil : Pemberian Paracetamol	
4.	Ansietas	Rabu, 07 Juli 2021	Mengobservasi	Nur Rezki Hadiyanti
		16.05	Observasi 1. Mengidentifikasi saat tingkat ansietas berubah Hasil: Pasien khawatir dengan kondisinya.	
		16.08	2. Memberikan tanda-tanda ansietas. Hasil: Pasien tampak takut dan menangis ketika diberikan pengobatan	
		16.10	Terapeutik 1. Mendengarkan dengan penuh perhatian Hasil :Pasien mulai berbicara dan tidak menangis lagi	
		16.15	2. Membantu mengidentifikasi yang memicu kecemasan. Hasil : Pasien dapat termotivasi kembali untuk kesembuhan	
		16.20	Edukasi 1. Melatih teknik relaksasi Hasil : Pasien mampu melakukan teknik relaksasi	

No.	DX. Keperawatan	Waktu Hari/tanggal	Implementasi Tindakan Keperawatan	Nama Jelas
1.	Nyeri Akut	Kamis, 08 Juli 2021	<p>Manajemen nyeri</p> <p>Observasi</p> <p>15.00</p> <p>1) Mengidentifikasi tingkat, lokasi, karakteristik, kualitas, frekwensi dan faktor pencetus nyeri</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - P : Nyeri pada kepala Q : Nyeri seperti ditusuk-tusuk, S : skala 10 (sangat nyeri) R : Oksipital, temporal, parietal dan frontal T: hilang timbul durasi 10-15 menit <p>15.05</p> <p>2) Mengidentifikasi skala nyeri</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diukur dengan Wong Baker faces- Pain rating Scale - Skala nyeri 10 - Pasien tampak menangis dengan keras <p>15.08</p> <p>3) Mengobservasi isyarat nonverbal ketidaknyamanan</p> <p>Hasil : Pasien tampak sangat gelisah</p> <p>Terapeutik</p> <p>15.10</p> <p>1) Memberikan Terapi Musik Sholawat selama 15 menit</p> <p>Hasil : Pasien nampak masih menangis sesekali</p> <p>Edukasi</p> <p>1) Mengajarkan Teknik Relaksasi</p>	Nur Rezki Hadiyanti

		15.20	Nafas dalam Hasil : Pasien berusaha untuk tenang	
		15.30	Kolaborasi 1. Memberikan analgetik Hasil : Pemberian ketorolac melalui IV	
2.	Diare	Kamis, 08 Juli 2021	Manajemen Diare	Nur Rezki Hadiyanti
		15.15	Observasi 1) Mengidentifikasi penyebab diare Hasil : Berhubungan dengan penyebaran infeksi bakteri meningitis	
		15.18	2) Memonitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja Hasil : Ibu pasien mengatakan pasien BAB3x/hari dengan konsistensi encer dan berwarna kuning	
		15.20	Terapeutik 1) Memberikan asupan cairan oral Hasil : Ibu pasien mengatakan pasien minum 6 gelas perhari	
		15.25	2) Memberikan cairan intavena Hasil : Terpasang Cairan Asering di ekstremitas kanan atas pasien.	
		17.00	Kolaborasi - Memberikan Injeksi Ranitidine Injeksi Ceftriaxone IV	

3.	Hipetermi	<p>Kamis, 08 Juli 2021</p> <p>15.30</p> <p>15.32</p> <p>15.37</p> <p>15.40</p> <p>15.50</p> <p>16.00</p>	<p>Manajemen Hipetermi:</p> <p>Observasi :</p> <p>1) Mengidentifikasi penyebab hipertemi</p> <p>Hasil : Terpapar lingkungan panas.</p> <p>2) Memonitor suhu tubuh.</p> <p>Hasil : Suhu : 37,8⁰ C</p> <p>Terapeutik :</p> <p>3) Melonggarkan atau melepaskan pakaian.</p> <p>Hasil :Melonggarkan pakaian pasien.</p> <p>4) Melakukan Kompres Hangat</p> <p>Hasil : Klien dikompres air hangat.</p> <p>Edukasi :</p> <p>1. Menganjurkan tirah baring.</p> <p>Hasil: pasien tampak tirah baring</p> <p>Kolaborasi :</p> <p>1. Mengolaborasi pemberian antipiretik</p> <p>Hasil : Pemberian Paracetamol</p>	Nur Rezki hadiyanti
4.	Ansietas	<p>Kamis, 08 Juli2021</p> <p>17.05</p> <p>17.08</p>	<p>Mengobservasi</p> <p>Observasi</p> <p>1) Mengidentifikasi saat tingkat ansietas berubah</p> <p>Hasil: Pasien masih khawatir dengan kondisinya.</p> <p>2) Memberikan tanda-tanda</p>	Nur Rezki Hadiyanti

			<p>ansietas.</p> <p>Hasil: Pasien mulai tampak sedikit tidak takut ketika diberikan pengobatan</p> <p>17.10</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Mendengarkan dengan penuh perhatian</p> <p>Hasil :Pasien mulai berbicara</p> <p>17.15</p> <p>2. Membantu mengidentifikasi yang memicu kecemasan.</p> <p>Hasil : Pasien mulai dapat mengungkapkan kecemasannya</p> <p>Edukasi</p> <p>17.20</p> <p>1.Melatih teknik relaksasi</p> <p>Hasil : Pasien mampu melakukan teknik relaksasi</p>	
--	--	--	--	--

No.	DX. Keperawatan	Waktu Hari/tanggal	Implementasi Tindakan Keperawatan	Nama Jelas
1.	Nyeri Akut	Jumat , 09 Juli 2021	<p>Manajemen nyeri</p> <p>Observasi</p> <p>10.00</p> <p>1) Mengidentifikasi tingkat, lokasi, karakteristik, kualitas, frekwensi dan faktor pencetus nyeri</p> <p>Hasil :</p> <p>- P : Nyeri pada kepala</p> <p>Q : Nyeri seperti ditusuk-tusuk,</p> <p>S : skala 6</p> <p>R : Oksipital, temporal, parietal dan frontal</p> <p>T: hilang timbul durasi 10-15 menit</p> <p>10.05</p> <p>2) Mengidentifikasi skala nyeri</p>	Nur Rezki Hadiyanti

		10.10	<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diukur dengan Wong Baker faces- Pain rating Scale - Skala nyeri 6 (nyeri sedang) - Pasien tampak meringis <p>Terapeutik</p> <p>1) Memberikan Terapi Musik Sholawat selama 15 menit</p> <p>Hasil : Pasien nampak tenang dan terlihat memejamkan mata dan tertidur sejenak</p>	
		10.20	<p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkan Teknik Relaksasi Nafas dalam <p>Hasil : Pasien tampak rileks</p>	
2.	Diare	Jumat,09 Juli 2021	<p>Manajemen Diare</p> <p>Observasi</p> <p>10.30</p> <p>1) Mengidentifikasi penyebab diare</p> <p>Hasil : Berhubungan dengan penyebaran infeksi bakteri meningitis</p> <p>10.35</p> <p>2) Memonitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja</p> <p>Hasil : Ibu pasien mengatakan BAB pasien tidak encer lagi dan pasien 2x BAB /hari</p> <p>Terapeutik</p> <p>10.37</p> <p>1) Memberikan asupan cairan oral</p> <p>Hasil : Ibu pasien mengatakan</p>	Nur Rezki Hadiyanti

		10.40	<p>pasien minum 6 gelas perhari</p> <p>2) Memberikan cairan intavena</p> <p>Hasil : Terpasang Cairan Asering di ekstremitas kanan atas pasien.</p>	
		12.00	<p>Kolaborasi</p> <p>- Memberikan Injeksi Ranitidine</p> <p>Injeksi Ceftriaxone IV</p>	
3.	Hipetermi	Jumat,09 Juli 2021	<p>Manajemen Hipetermi:</p> <p>Observasi :</p> <p>13.00 1) Mengidentifikasi penyebab hipertemi</p> <p>Hasil : Ibu pasien mengatakan demam pasien mulai menurun</p> <p>13.05 2) Memonitor suhu tubuh.</p> <p>Hasil : Suhu : 37,0⁰ C</p> <p>Edukasi :</p> <p>13.10 1) Menganjurkan tirah baring.</p> <p>Hasil: pasien tampak tirah baring</p>	Nur Rezki Hadiyanti
4.	Ansietas	Jumat. 09 Juli2021	<p>Mengobservasi</p> <p>Observasi</p> <p>13.30 1) Mengidentifikasi saat tingkat ansietas berubah</p> <p>Hasil: Pasien mulai tampak tenang</p> <p>13.35 2) Memberikan tanda-tanda ansietas.</p> <p>Hasil: Pasien tampak tidak takut ketika diberikan pengobatan</p> <p>Terapeutik</p> <p>13.45 1. Mendengarkan dengan penuh</p>	Nur Rezki Hadiyanti

		13.50	<p>perhatian</p> <p>Hasil :Pasien mulai berbicara dan tersenyum</p> <p>2. Membantu mengidentifikasi yang memicu kecemasan.</p> <p>Hasil : Pasien mulai termotivasi untuk kesembuhannya</p>	
--	--	-------	--	--

4.1.5 Evaluasi Keperawatan

Hari /Tgl	Waktu	Evaluasi (SOAP/SOAPIER)	Nama Jelas
1.	Rabu.07 Juli 2021 15.03	<p>S ; Pasien mengatakan nyeri pada kepala</p> <p>O : Pasien nampak meringis</p> <p>Skala nyeri 6 (nyeri)</p> <p>A : Nyeri akut tidak teratasi</p> <p>P : lanjutkan Intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pantau skala nyeri - Berikan Terapi Musik - Injeksi Ketorolac 	Nur Rezki Hadiyanti
2.	Rabu,07 Juli 2021 15.25	<p>S ; - Ibu pasien mengatakan pasien mual, muntah 2-4 x/hari.</p> <p>-Ibu pasien mengatakan pasien BAB5 x/hari dengan konsistensi encer, ada ampas dan berwarna hitam</p> <p>O : - Bibir tampak kering</p> <p>- Peristaltik Usus 18 x/menit</p> <p>A : Diare tidak teratasi</p> <p>P : lanjutkan Intervensi</p>	Nur Rezki Hadiyanti

		<ul style="list-style-type: none"> - Monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja - Berikan asupan cairan oral - Berikan cairan intavena - Injeksi Ranitidine - Injeksi Ceftriaxone 	
3.	Rabu, 07 Juli 2021 16.03	<p>S:Ibu Pasien mengatakan demam pasien naik turun</p> <p>O: Suhu tubuh 38,0 °C</p> <p>Tubuh pasien teraba hangat</p> <p>A: Hipertermi belum teratasi.</p> <p>P: Lanjutkan Intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor suhu tubuh. - Kompres Hangat - Anjuran tirah baring. - Kolaborasi pemberian antipiretik 	Nur Rezki Hadiyanti
4.	Rabu, 07 Juli 2021 17.15	<p>S: Pasien mengatakan sedih dan cemas terhadap penyakitnya</p> <p>O: Pasien tampak menangis dan takut ketika diberi pengobatan</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi saat tingkat ansietas - Memberikan tanda-tanda ansietas - Membantu mengedndifikasiyang memicu kecemasan - Melatih teknik relaksasi 	Nur Rezki Hadiyanti

Hari /Tgl	Waktu	Evaluasi (SOAP/SOAPIER)	Nama Jelas
1.	Kamis , 08 Juli 2021 15.12	S ; Pasien mengatakan nyeri pada kepala O : Pasien nampak masih sesekali menangis dan masih nampak meringis Skala nyeri 8 (lebih nyeri) A : Nyeri akut belum teratasi P : lanjutkan Intervensi - Pantau skala nyeri - Berikan Terapi Musik - Injeksi Ketorolac	Nur Rezki Hadiyanti
2.	Kamis, 08 Juli 2021 17.03	S ; - Ibu pasien mengatakan pasien BAB3x/hari dengan konsistensi encer dan berwarna kuning O : - Bibir tampak kering - Peristaltik usus 15 x/menit A : Masalah teratasi sebagian P : lanjutkan Intervensi - Monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja - Berikan asupan cairan oral - Berikan cairan intravena - Injeksi Ranitidine - Injeksi Ceftriaxone	Nur Rezki Hadiyanti
3.	Kamis, 08 Juli 2021 16.05	S:Ibu Pasien mengatakan demam pasien naik turun O: Suhu tubuh 37,5°C	Nur Rezki Hadiyanti

		<p>Tubuh pasien teraba hangat</p> <p>A: Hipertermi teratasi sebagian</p> <p>P: Lanjutkan Intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor suhu tubuh. - Kompres Hangat - Anjuran tirah baring. - Kolaborasi pemberian antipiretik 	
4.	<p>Kamis,08 Juli</p> <p>2021</p> <p>17.30</p>	<p>S: Pasien mengatakan kecemasannya berkurang</p> <p>O: Pasien mulai tampak tidak menangis dan takut ketika diberi pengobatan</p> <p>A: Masalah belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi saat tingkat ansietas - Memberikan tanda-tanda ansietas - Membantu mengidentifikasi yang memicu kecemasan - Melatih teknik relaksasi 	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


Hari /Tgl	Waktu	Evaluasi (SOAP/SOAPIER)	Nama Jelas
1.	<p>Jumat, 09 Juli</p> <p>2021</p> <p>12.00</p>	<p>S ; Pasien mengatakan nyeri pada kepala berkurang</p> <p>O : pasien tampak tenang</p> <p>Skala nyeri 4 (sedikit lebih nyeri)</p> <p>A : Nyeri akut belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan Intervensi</p>	<p>Nur Rezki</p> <p>Hadiyanti</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Pantau skala nyeri - Berikan Terapi musik - Ajarkan teknik relaksasi nafas dalam 	
2.	Jumat,09 Juli 2021 13.00	<p>S ; Ibu pasien mengatakan pasien tidak diare lagi</p> <p>O : - Bibir tampak lembab</p> <p>- Peristaltik usus 12x/menit</p> <p>A : Masalah teratasi</p> <p>P : Pertahankan Intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan asupan cairan oral - Berikan cairan intavena - Injeksi Ranitidine - Injeksi Ceftriaxone 	Nur Rezki Hadiyanti
3.	Jumat, 09 Juli 2021 14.00	<p>S:Ibu Pasien mengatakan pasien tidak demam lagi</p> <p>O: Suhu tubuh 37,0 °C</p> <p>A: Hipertermi teratasi</p> <p>P: Pertahankan Intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor suhu tubuh. - Anjurkan tirah baring. 	Nur Rezki Hadiyanti
4.	Jumat,09 Juli 2021 14.15	<p>S: Pasien mengatakan kecemasannya berkurang</p> <p>O: Pasien mulai tampak tenang dan tersenyum ketika diajak berbicara</p> <p>A: Masalah Teratasi sebagian</p> <p>P: Lanjutkan intervensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi saat tingkat ansietas - Membantu mengidentifikasi yang memicu kecemasan 	Nur Rezki Hadiyanti Z.

4.2 Hasil Intervensi dan Evaluasi Terapi Musik terhadap Penurunan Nyeri

No.	Hari, Tanggal	Sebelum Terapi Musik	Setelah Terapi Musik	Nilai Selisih Pre-Post Terapi Musik
1	Sabtu, 07 Juli 2021	Skala 8 (lebih nyeri)	Skala 6 (Nyeri)	02
2	Kamis, 08 Juli 2021	Skala 10 (Sangat Nyeri)	Skala 8 (lebih Nyeri)	02
3	Jumat, 09 Juli 2021	Skala 6 (nyeri)	Skala 4 (sedikit lebih nyeri)	02

Grafik Setelah & Sebelum Terapi Musik



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Kasus

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan

Pada studi kasus didapatkan hasil pengkajian An. R mengalami keluhan nyeri kepala, demam, muntah dan diare serta diperoleh tanda kaku kuduk positif dan brudzinsky I/II positif. Hal ini sejalan dengan teori (Widogdo, 2013) yang mengemukakan bahwa tanda dan gejala pada penderita meningitis adalah sakit kepala, demam, gejala ransangan meningeal mulai nyata, kaku kuduk serta adanya gejala infeksi saluran pernafasan atau system gastrointestnital yang berlangsung selama beberapa hari.

Menurut analisa penulis penyebab An. R mengalami meningitis dapat dikarenakan trauma kepala. Diperoleh data riwayat kesehatan dahulu pada An. R mengalami trauma kepala akibat jatuh dari tangga sekitar setahun yang lalu, setelah kejadian tersebut klien sering mengalami demam, kejang serta sakit kepala. Hal ini sesuai dengan teori (Suriadi & Yuliani, 2010) penyakit meningitis dapat terjadi pada anak dengan kelainan sistem saraf pusat, pembedahan atau injury yang berhubungan dengan sistem persarafan dan diperkuat oleh teori (Muttaqin, 2008) bahwa pasien meningitis biasanya pernah memiliki riwayat penyakit yang meliputi: infeksi jalan nafas bagian atas, otitis media, mastoiditis, anemia sel sabit, tindakan bedah saraf, riwayat trauma kepala dan adanya pengaruh imunologis pada masa sebelumnya.

5.1.2 Analisis Diagnosa Keperawatan

Keluhan utama yang disampaikan pasien adalah Nyeri Kepala, ditandai dengan ekspresi meringis dan menangis pasien, dengan durasi nyeri kepala selama 10-15 menit yang hilang timbul yang dirasakan pasien. Hal ini sejalan dengan tulisan yang dikemukakan oleh (Aninditha et al, 2017) yang mengatakan nyeri kepala merupakan sensasi tidak nyaman pada daerah kepala yang disebabkan oleh kerusakan atau potensi kerusakan. Area yang dimaksud meliputi intrakranial dan ekstrakranial, termasuk wajah.

Diagnosis keperawatan utama pada kasus ini adalah nyeri akut ditandai dengan keluhan nyeri pada kepala pasien. Menurut asumsi penulis pengangkatan diagnosa utama nyeri akut dikarenakan keluhan pasien tentang sakit kepala yang dideritanya sejak \pm 1 bulan yang lalu. Nyeri akut adalah suatu sensasi yang terjadi secara tiba-tiba/mendadak atau sebagai respon terhadap beberapa jenis trauma. Sesuai dengan teori mengenai Nyeri menurut Association for the Study of Pain, Nyeri yang dirasakan pada anak merupakan gejala awal yang timbul akibat dari infeksi dan peningkatan tekanan intrakranial dari meningitis. Nyeri yang dirasakan akan mengganggu kenyamanan pasien. Nyeri yang terlalu lama dibiarkan dapat menyebabkan penurunan saturasi oksigen, peningkatan pernafasan, peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan intracranial (International Association for the Study of Pain, 2017).

5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan

Tindakan keperawatan utama yang diberikan pada diagnosis keperawatan nyeri akut adalah dengan memberikan terapi musik. Sesuai dengan penelitian (Arif M, 2019) yang menyebutkan bahwa intensitas skala nyeri pada anak yang diberikan distraksi musik skala nyerinya lebih rendah dibandingkan anak yang tidak diberikan distraksi musik. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa terapi musik efektif dalam menurunkan skala nyeri pada anak. Intervensi terapi musik ini tidak berjalan sendiri, kolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya juga dilakukan seperti pemberian obat untuk mengatasi nyeri yang dialami pasien.

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan

Implementasi yang diberikan pada diagnosis keperawatan nyeri akut pada pasien An. R adalah dengan memberikan terapi musik. Terapi musik diberikan selama 15 menit perhari selama 3x24 jam. Jenis musik yang digunakan adalah jenis musik kesukaan pasien. Dimana sebelum dilakukan pemberian terapi musik diperoleh hasil pengkajian bahwa pasien menyukai jenis musik sholawat. Setelah dilakukan pemberian terapi musik terjadi penurunan skala dengan mengukur skala nyeri menggunakan *Wong Baker Faces Pain*. Selain itu pasien tetap diberikan obat farmakologi yaitu obat penurun rasa nyeri berupa keterolac melalui intravena.

Satu hal yang dapat memotivasi kita untuk terus berusaha mencari kesembuhan dari sebuah penyakit adalah adanya jaminan dari Allah Ta'ala bahwa setiap penyakit yang menimpa hambanya pasti ada obatnya.

Rasulullah Saw bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Terjemahnya: “ Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut ” (H.R. Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bahwa seluruh jenis penyakit, memiliki obat yang dapat digunakan untuk mencegah, menyembuhkan, ataupun untuk meringankan penyakit tersebut. Hadits ini juga mengandung dorongan untuk mempelajari pengobatan penyakit-penyakit badan sebagaimana kita mempelajari obat untuk penyakit-penyakit hati. Karena Allah Ta’ala telah menjelaskan kepada kita bahwa seluruh jenis penyakit memiliki obat, sehingga kita hendaknya berusaha mempelajari dan kemudian mempraktikkannya.

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan

Hasil dari evaluasi keperawatan yang diberikan kepada An. R yang mengalami nyeri diperoleh hasil skala nyeri pada pasien berkurang setelah diberikan terapi musik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Bulut et al., 2020) menyatakan bahwa terdapat perbedaan skor nyeri pasca operasi anak-anak pada kelompok yang diberikan terapi musik dan metode kaleidoskop. Distraksi dengan terapi musik dan kaleidoskop direkomendasikan untuk digunakan pada periode pasca operasi untuk mengurangi keparahan rasa nyeri, ketakutan dan kecemasan.

Namun pengobatan yang paling agung dan paling bermanfaat adalah Alquran al-Karim. Telah ditegaskan dalam banyak nas-nas syar'i bahwa Alquran merupakan media penyembuhan yang bermanfaat dan efektif untuk mengobati berbagai penyakit ruhani dan jasmani. Hingga hari ini, banyak umat manusia yang dapat mengambil manfaat melalui pengobatan dengan Alquran ini.

Dalam Alquran kata penyembuhan (syafa dan segala turunannya) berulang sebanyak 8 kali. Namun yang mengandung pengertian penyembuhan dan yang berkaitan dengannya disebutkan sebanyak 6 kali. Firman Allah dalam QS Al-Isra (17) ayat 82, berbunyi :

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

“82. Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi **penawar** dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian.”

Pada surat al-Isrâ' [17]: 82, syifâ' dimaknakan sebagai penawar. Menurut al-Razi lafadz min di sini bukan mengandung pengertian li tab'îdh (untuk sebagian) akan tetapi mengandung makna untuk menyeluruh. Maka makna dari ayat tersebut adalah “wa nunazzilu min haza al-jins allazi huwa Alquran ma huwa syifâ”. Maka seluruh ayat-ayat Alquran merupakan penyembuh dan penawar bagi seluruh orang-orang yang beriman dan Alquran menurutnya

merupakan penawar bagi seluruh penyakit ruhani maupun jasmani (Ali, 2015).

5.2 Analisis Intervensi EBPB

Tindakan keperawatan utama yang penulis berikan pada diagnosis nyeri akut berbasis EBPB adalah dengan memberikan terapi musik. Pemberian terapi musik dilakukan selama 3 hari yang diberikan kepada anak selama 15 menit perhari dengan jenis musik kesukaan anak.

Pada hari pertama sebelum diberikan terapi musik dilakukan pengukuran skala nyeri terlebih dahulu dengan menggunakan *Wong Baker Faces-Pain Rating Scale* dengan hasil skala nyeri 8 dengan kriteria ekspresi klien lebih nyeri dengan ekspresi merintih sedangkan setelah diberikan terapi musik hasil skala nyeri 6 dengan kriteria ekspresi klien nyeri dengan pasien nampak mulai tenang namun ekspresi masih sedikit meringis.

Hari kedua dilakukan penilaian skala nyeri sebelum diberikan terapi musik dengan penilaian skala nyeri 10 dengan kriteria ekspresi menangis setelah dilakukan terapi musik klien nampak menunjukkan ekspresi dengan skala 8 dimana klien nampak berhenti menangis namun ekspresi masih sesekali menangis dan nampak masih meringis. Pada hari kedua ini pula dikarenakan pasien menangis dengan keras terdapat beberapa hambatan dimana perlu waktu yang lebih lama dalam membujuk pasien agar dapat melakukan terapi. Menurut asumsi penulis hal ini terjadi karena nyeri yang dirasakan anak teramat berat terlihat dengan ekspresi klien yang menangis dengan keras mengakibatkan klien nampak tidak bisa fokus mendengarkan musik. Walaupun terjadi penurunan

skala nyeri namun dikarenakan nyeri yang masih berat tetap dilakukan kolaborasi pemberian Keterolac.

Pada hari terakhir sebelum diberikan terapi musik dilakukan penilaian skala nyeri dimana klien menunjukkan skala nyeri 6 dengan kriteria ekspresi nyeri dan setelah klien diberikan terapi musik klien menunjukkan ekspresi rileks dengan menutup mata dan tertidur sejenak dengan nilai skala 4 (sedikit lebih nyeri). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian terapi musik cukup efektif dalam mengurangi rasa nyeri ditunjukkan dengan penurunan skala nyeri klien namun tidak dalam menghilangkan rasa nyeri.

Terapi musik dapat menurunkan skala nyeri dikarenakan musik dipercaya dapat meningkatkan pengeluaran hormon endorfin . Menurut Dwita, 2016 proses yang terjadi pada saat musik diperdengarkan kepada pasien yang merasakan nyeri dilakukan dengan adanya blok pada saraf yang menimbulkan rasa nyeri melalui hormone endorphin. Hormone endorphin yang muncul membuat saraf menjadi tidak tegang, menimbulkan efek penghilang rasa nyeri, rasa nyeri yang hilang mulai dari pikiran yang muncul di otak, hingga kepada efek secara fisik. Melalui musik hipotalamus dimanipulasi agar tidak bereaksi terlalu kuat terhadap stressor yang diterimanya. Proses secara fisiologis terjadi akibat adanya rangsangan suara yang melepaskan hormone endorphine membuat tubuh menjadi relaks dan pikiran menjadi tenang (Sesrianty et al., 2018).

Keefektifitasan terapi musik dalam penurunan skala nyeri dipengaruhi beberapa hal yaitu jenis musik, durasi pemberian dan kemampuan dalam berkonsentrasi. Jenis musik yang dipilih dalam study kasus ini adalah jenis

musik yang disukai anak-anak, karena jenis musik yang disukai dapat memberikan rasa nyaman dan senang, sesuai dengan riset Dr. John David Nobol, mengenai efek dari musik terhadap tubuh manusia dimana saat jenis musik yang didengar sesuai dan dapat diterima oleh tubuh manusia, maka tubuh akan bereaksi dengan mengeluarkan sejenis hormone serotonin yang dapat menimbulkan rasa nikmat dan senang sehingga tubuh akan menjadi lebih kuat (Yuliandary, 2019).

Durasi pemberian terapi musik juga mempengaruhi efektifitas penurunan tingkat nyeri. Menurut (Howlin & Rooney, 2020) dalam *The Cognitive Mechanisms in Music Listening Interventions for Pain* mengutip durasi setiap sesi mendengarkan musik diklasifikasikan menggunakan tujuh kategori berbeda, termasuk seluruh prosedur dan kebijaksanaan pasien di mana pasien dapat mendengarkan musik sebanyak atau sesedikit yang mereka inginkan. Durasi paling populer yang diidentifikasi dalam studi secara keseluruhan adalah 15-30 menit yang digunakan dalam 28 % dari semua studi. Pengaruh distraksi pendengaran yang dapat mengalihkan fokus perhatian pasien yang mengalami nyeri karena dapat menjadi strategi yang sangat berhasil dan mungkin merupakan mekanisme yang bertanggung jawab terhadap teknik kognitif efektif lainnya namun keefektifan distraksi tergantung pada kemampuan pasien untuk menerima dan membangkitkan input sensori (Fadli, 2017).

Hal ini juga sesuai dengan teori Kolcaba yang mengatakan kenyamanan adalah pengalaman yang diterima oleh seseorang dari suatu intervensi. Hal ini merupakan pengalaman langsung dan menyeluruh ketika kebutuhan fisik,

psikospiritual, sosial, dan lingkungan terpenuhi dan terapi musik merupakan salah satu intervensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan rasa nyaman pasien dengan mendistraksi sehingga mengalihkan fokus perhatian pasien (Wirastrarti, 2014).

Asumsi peneliti sendiri melalui terapi musik pasien akan merasakan kenyamanan, menjadi lebih santai dan pikiran menjadi tenang dikarenakan rangsangan dari musik yang didengarkan sehingga hormon endorphine membuat saraf tidak lebih tegang. Namun walaupun telah terjadi penurunan skala nyeri selama 3 kali implementasi penulis menyimpulkan masalah keperawatan belum teratasi karena pasien masih merasakan nyeri. Intervensi pemberian terapi musik ini dapat dilakukan oleh keluarga dalam menurunkan nyeri pada anak .

5.3 Keterbatasan

Dalam studi kasus ini keterbatasan yang dimiliki oleh penulis yaitu situasi atau tempat dirawatnya An. R dikarenakan pasien berada di ruang bangsal anak sehingga ruangan ramai dan kadang tidak tenang. Padahal salah satu penunjang keberhasilan dalam terapi ini adalah lingkungan yang tenang. Selain itu penulis tidak mengkombinasikan terapi musik dengan intervensi nonfarmakologi yang lain seperti halnya terapi musik yang dapat dikombinasikan dengan teknik relaksasi dikarenakan waktu dan kegiatan dinas penulis yang tidak mencukupi. Diharapkan keterbatasan ini dapat menjadi hal yang dapat ditanggulangi pada penelitian berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan asuhan keperawatan yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil pengkajian yang dilakukan terhadap An. R diperoleh keluhan berupa nyeri kepala, diare, muntah yang terjadi 3-4 x/hari, demam yang naik turun, tanda kaku kuduk dan tanda Brudzinsky I/II positif.
2. Diagnosis keperawatan An. R yaitu :
 - a. Nyeri Akut b/d agen pencedera fisiologis
 - b. Diare b/d proses Infeksi
 - c. Hipetermia b/d proses penyakit
 - d. Ansietas b/d kurang terpapar informasi
3. Intervensi yang diberikan terhadap An. R adalah pemberian terapi musik dengan jenis musik kesukaan An. R selama 15 menit perhari dalam kurun waktu 3x24 jam .
4. Hasil implementasi dan evaluasi pemberian terapi musik terhadap An. R dengan masalah nyeri pada meningitis yaitu sebelum diberikan terapi musik skala nyeri 6 dan menurun menjadi skala nyeri 4. Maka dapat disimpulkan terjadi penurunan skala nyeri namun nyeri belum teratasi sepenuhnya.
5. Hasil analisis intervensi didapatkan bahwa ada pengaruh terapi musik pada anak yang mengalami Meningitis dengan masalah nyeri.

6.2 Saran

6.2.1 Profesi Keperawatan

Bagi Profesi Keperawatan, karya akhir ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologi.

6.2.2 Pelayanan Rumah Sakit

Bagi pelayanan rumah sakit, karya akhir ini dapat dijadikan masukan bagi bidang keperawatan dan para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien meningitis dengan masalah nyeri dan melihat keefektifan pemberian terapi musik dalam mengurangi nyeri.

6.2.3 Institusi Pendidikan

Bagi institusi pendidikan penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien.



DAFTAR PUSTAKA

- Andareto, Obi (2015). *Penyakit Menular di Sekitar Anda*. Jakarta. Pustaka Ilmu Semesta.
- Aninditha T, Rasyid A. Nyeri kepala. In: Aninditha T, Wiratman W (eds). (2017). *Buku Ajar Neurologi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Arif, M., & Sari, yuli permata. (2019). Efektifitas Terapi Musik Mozart Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pasien post operasi Fraktur. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 10.
- Bulut, M., Alemdar, D. K., & MD, A. B. (2020). The Effect of Music Therapy, Hand massage and Kaleidoscope Usage on apostoperative Nause and Vomiting, Pain, fear, and stress in children. *Journal of PeriAnesthesia Nursing*, 35(6), 649–657.
- CDC. (2017). *Meningococcal disease*. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/meningococcal/index.html>.
- Djohan. (2006). *Terapi Musik Teori % Aplikasi*. Yogyakarta. Agromedia Pustaka.
- Fadli, F. (2017). *Pengaruh distraksi pendengaran terhadap intensitas nyeri pada klien fraktur di RS Nene Mallma Kabupaten Sidenreng Rappang*. *Jurnal Ilmiag Kesehatan Diagnosis*, 11, 135-138 .
- Fauziah, Fitrah. (2017). *Karakteristik Penderita Meningitis pada Anak di Ruang Rawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2014-2016*. Skripsi Mahasiswa FKM USU
- Fudhuri, A., Anik, I., & Immawati. (2021). Penerapan Relaksasi Otot Progresif untuk mengatasi masalah keperawatan nyeri akut pada pasien cephalgia di kota metro. *Jurnal Cendikia Muda*, 1. <https://doi.org/2807-364>
- Gilar, M. fajar, Armiyati, Y., & Arief, S. (2014). perbedaan efektivitas terapi musik klasik dan terapi imajinasi terbimbing terhadap penurunan intensitas nyeri pasca bedah mayor abdomen di RSUD Tugurejo Semarang. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*.
- Harsono. (2015). *Buku Ajar Neurologi Klinis*. Yogyakarta: Gajah Mada

University Press.

- Howlin, C., & Rooney, B. (2020). *The Cognitive Mechanisms in Music Listening Interventions for Pain: A Scoping Review*. 57(2), 127–167. <https://doi.org/10.1093/jmt/thaa003>
- International Association for the Study of Pain (2017). Education: IASPTaxonomy
- Karen, M. J., Kliegman, R. M., Jenson, H. B., & Behrman, R. e. (2011). *Nelson Ilmu Kesehatan Anak Esensial* (Elsevier (ed.); 6th ed.).
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Panduan Deteksi dan Respon Penyakit Meningitis Meningokokus*. Jakarta
- Kyle, Terri., & Carman, Susan. (2014). *Buku Ajar Keperawatan Pediatri (2th ed.)*. Jakarta: EGC.
- Laksono, Y. (2019). *Analisis Luaran Meningitis Pada Anak*.
- Lestari, N. Y., Suryapraba, A., Tini, K., & Budiarsa, I. G. N. K. (2021). *Karakteristik pasien meningitis dewasa di rumah sakit umum pusat sanglah denpasar januari 2018- september 2019*. 10(4), 3–5
- Lestari, R. (2021). *ANJANI Journal : Health Sciences Study The Effect of Music Therapy on Pain Level in Infusion in Children 6-12 Years of Age*. 1(1), 17– 24.
- Nurarif & Hardhi. 2016. *Asuhan Keperawatan Praktis Berdasarkan Penerapan Diagnosa Nanda, NIC,NOC Dalam Berbagai Kasus*. Jogjakarta: Mediacion Publishing.
- Novitasari, S., Sulaeman, S., & Purwati, H. N. (2019). *Pengaruh Terapi Musik dan Terapi Video Game terhadap tingkat nyeri anak usia pra sekolah yang dilakukan pemasangan infus*. 1, 168–177.
- Potter, P., & Perry, A. G. (2012). *Buku Ajar Fundamental Keperawatn* (4th ed.). ECG.
- Rahayu, H. S., & Darmawan, D. (2020). *Pemberian Teknik Distraksi Pemutaran Video Kartun Untuk Menurunkan Nyeri Pada Anak Post Operasi*. 4(1), 1–9.

- Rais, A., & Alfiyanti, D. (2020). *Penurunan Skala Nyeri Pada Anak Post Operasi Laparotomi Menggunakan Terapi Musik Mozart*.
<https://doi.org/10.26714/nm.v1i2.5653>
- Ridha & Hilda. (2019). *Pengaruh Pelaksanaan SOP Perawat terhadap Tingkat Kecemasan Pasien*. 3(23), 84-96.
- Sulistiyawati, E. (2017). *Pengaruh relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur dan efek samping kemoterapi pada anak dengan kanker*. Universitas Indonesia.
- Sesrianty, V., & Wulandari, S. (2018). *Terapi Musik Klasik (Alunan Piano) Menurunkan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi*. *Prosiding Seminar Kesehatan Perintis*, 1(1), 1–10.
<https://jurnal.stikesperintis.ac.id/index.php/PSKP/article/view/59>
- Suriadi, & Yuliani, Rita. (2010). *Asuhan Keperawatan pada Anak Edisi 2*. Jakarta : CV Sagung Seto
- Tarwoto. (2013). *Keperawatan Medikal Bedah*. CV Sagung Seto.
- Tim Pokja PPNI. 2017. *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (1st ed.)*. DPP PPNI.
- Tim Pokja PPNI. 2019. *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (2nd ed.)*. DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. 2018. *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (1st ed.)*. DPP PPNI
- Vemila, A. Y. (2021). *Gambaran Kualitas Hidup Anak Meningitis Pasca Rawatan di RSUP dr. M. Djamil Padang*. Universitas Andalas.
- WHO. (2018). *Meningococcal Meningitis*. World Health Organization 2018.
- Widagdo, W., Suharyanto, T., & Aryani, R. (2013). *Asuhan Keperawatan Pada Klien Dengan Gangguan Sistem Persarafan*. Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Wirastri, U. (2014). *Aplikasi Teori Comfort Kolcaba Dalam Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Demam Di Ruang Infeksi Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta*. Universitas Indonesia

- Yuliandari, Ismalisa. (2019). *Efektivitas Terapi Musik terhadap Penurunan Nyeri Luka pada Anak di RSU Mitra Medika Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Yulinda, Lintiya Devi. (2015). *Perbedaan Efektivitas Terapi Musik Klasik dan Relaksasi Nafas Dalam terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pasien di Ruang High Care Unit (HCU) RSUD Prof. Dr. Margno Soekarjo Purwokerto*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.



L

A

M

P

I

R

A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

REFERENSI JURNAL

Journal of Telenursing (JOTING)
Volume 1, Nomor 1, Juni 2019
e-ISSN : 2684-8988
p-ISSN : 2684-8996
DOI: <https://doi.org/10.31539/joting.v1i1.510>



PENGARUH TERAPI MUSIK DAN TERAPI VIDEO GAME TERHADAP TINGKAT NYERI ANAK USIA PRASEKOLAH YANG DILAKUKAN PEMASANGAN INFUS

Selvia Novitasari¹, Suhendar Sulaeman², Nyimas Heny Purwati³
Universitas Muhammadiyah Bengkulu¹
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{2,3}
selvianovitasari0@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata tingkat nyeri pada anak usia prasekolah yang dilakukan pemasangan infus setelah diberikan terapi musik dan terapi video game di Rumah sakit Bhayangkara TK III kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan Jenis penelitian yaitu penelitian quasy eksperimental dengan pendekatan post tes only control group. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat nyeri setelah diberikan terapi musik dan terapi video game yaitu dengan nilai p value 0,000. Simpulan, ada perbedaan rata-rata tingkat nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan pemasangan infus setelah diberikan terapi music dan terapi video game pada kelompok anak laki-laki dan kelompok perempuan di RS Bhayangkara TK III Kota Bengkulu

Kata Kunci: Musik, Prasekolah, Tingkat Nyeri, *Video Game*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the difference in the average level of pain in preschool children who were infused after being given music therapy and video game therapy at Bhayangkara Hospital TK III, Bengkulu City. This research is a quantitative research. This type of research is a quasy experimental research with a post-test only control group approach. The results showed that the level of pain after being given music therapy and video game therapy with a p value of 0.000. In conclusion, there is a difference in the average pain level of preschool children who have an IV after being given music therapy and video game therapy in the boys and girls group at Bhayangkara Hospital TK III, Bengkulu City.

Keywords: Music, Preschool, Pain Level, Video Game



Pengaruh Terapi Musik terhadap Tingkat Nyeri Tindakan Pemasangan Infus pada Anak Usia 6-12 Tahun di RSUD Arga Makmur

The Effect of Music Therapy on Pain Level in Infusion in Children 6-12 Years of Age at Arga Makmur Hospital

Rita Lestari¹

¹ Program Studi Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
GITIKad) Dhoho Huzada Bengkulu

Corresponding Author: Arjani@anjani.com

How to Cite :

Lestari, R. (2021). The Effect of Music Therapy on Pain Level in Infusion in Children 6-12 Years of Age at Arga Makmur Hospital. ANJANI Journal: Health Sciences Study, Vol. 1 No. 1 2021 page: 17-24 | DOI: <https://doi.org/10.32698/anjani.v1i1.17-24>

ARTICLE HISTORY

Received: 07 June 2021
Revised: 07 July 2021
Accepted: 06 July 2021

Keywords :

Terapi Musik, Nyeri

Music Therapy, Pain

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pendahuluan: Pemasangan infus merupakan salah satu prosedur medis invasif yang sering dilakukan dan menyebabkan nyeri akut serta ketakutan pada anak-anak (Gibson & Ibrahim, 2011). Pemasangan nyeri secara non farmakologis dapat melalui distorsi salah satunya yaitu terapi musik (Dauloh, 2010), masih banyaknya keluhan nyeri pada tindakan pemasangan infus di RSUD Arga Makmur. **Metode:** Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Quasi Eksperimental dengan desain penelitian two group desain yaitu dalam penelitian terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak. **Hasil:** Sampel pertama di lakukan penelitian dan kelompok lain tidak diberi perlakuan. **Kesimpulan :** Diperlukan pengetahuan dan wawasan bagi perawat dalam teknik distorsi terhadap intervensi nyeri.

ABSTRACT

Introduction: infusion is an invasive medical procedure that is often performed and causes acute pain and fear in children (Gibson & Ibrahim, 2011). Non-pharmacological pain management can be done through distraction, one of which is music therapy (Dauloh, 2010). There are still many complaints of pain during the infusion procedure of Arga Makmur Hospital. **Method:** This type of research is a quasi-experimental research design with a two-group research design, namely in the study there were two groups randomly selected. **Results:** The first group was treated and the other group was not treated. **Conclusion :** It is hoped that it can add knowledge and insight for nurses in distraction techniques in pain intensity.

PENDAHULUAN

Hospitalisasi sering kali menjadi masalah utama yang harus di hadapi oleh seorang anak. Penyakit yang dialaminya ketika menjalani hospitalisasi dapat menyebabkan anak menjadi trauma akibat adanya perubahan dari kondisi sehat. Perpisahan dengan keluarga, kehilangan kendali, cedera tubuh dan nyeri merupakan stressor utama hospitalisasi pada anak (Maryam, 2013).

Magnitas anak yang menjalani hospitalisasi dilakukan tindakan pemasangan infus. Selain penyakit yang diderita, biasanya pemasangan infus menjadi sumber kedua dan nyeri yang paling dirasakan. Perbedaan usia, tingkat perkembangan anak dan kemampuan dalam berkomunikasi dapat mempengaruhi anak ketika menyampaikan rasa sakit. Setiap anak memiliki tipe kepribadian

The Cognitive Mechanisms in Music Listening Interventions for Pain: A Scoping Review

Claire Howlin, MSc^o

School of Psychology, University College Dublin, Dublin, Ireland

Brendan Rooney, PhD^o

School of Psychology, University College Dublin, Dublin, Ireland

Music interventions have been introduced in a range of pain management contexts, yet considerable inconsistencies have been identified across evaluation studies. These inconsistencies have been attributed to a lack of clarity around the prospective cognitive mechanisms of action underlying such interventions. The current systematic scoping review was conducted to examine the theoretical rationales provided in the literature for introducing music listening interventions (MLIs) in pain contexts. 3 search terms (music, listening, and pain) were used in four electronic databases, and 75 articles were included for analysis. Content analysis was used to identify that more intensive listening schedules were associated with chronic and cancer pain compared with procedural pain. The degree to which patients had a choice over the music selection could be categorized into 1 of 5 levels. Thematic synthesis was then applied to develop 5 themes that describe the cognitive mechanisms involved in MLIs for pain. These mechanisms were brought together to build the Cognitive Vitality Model, which emphasizes the role of individual agency in mediating the beneficial effects of music listening through the processes of Meaning-Making, Enjoyment, and Musical Integration. Finally, content analysis was used to demonstrate that only a small proportion of studies were explicitly designed to examine the cognitive mechanisms underlying MLIs and we have suggested ways to improve future practice and empirical research. We call on researchers to design and evaluate

The authors would like to acknowledge Suzanne Guerin for her invaluable advice in developing the scoping review protocol, Darragh Lynch for his assistance with abstract screening, and Deanna Stokes for the research support library. This study was completed in partial fulfillment of the degree of Doctor of Philosophy at University College Dublin, Ireland.

Address correspondence concerning this article to Claire Howlin, MSc, School of Psychology, University College Dublin, Newman Building, Belfield, Dublin 4, Ireland. Phone: +353-86-410-6081. E-mail: claire.howlin@ucdconnect.ie

Lembar Pengukuran Skala Nyeri

Wong-Baker FACES® Pain Rating Scale



0

Tidak Nyeri



2

Sedikit Nyeri



4

Sedikit Lebih
Nyeri



6

Nyeri



8

Lebih Nyeri



10

Sangat Nyeri

Hasil Uji Turnitin

KTA 1

ORIGINALITY REPORT

18%	19%	1%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	3%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
4	es.scribd.com Internet Source	1%
5	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet Source	1%
6	repository.poltekkes-kaltim.ac.id Internet Source	1%
7	journal.ipm2kpe.or.id Internet Source	1%
8	repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	1%
9	media.neliti.com Internet Source	1%

10	ejournal.unib.ac.id Internet Source	1%
11	repository.unimus.ac.id Internet Source	1%
12	trisau-upidta.blogspot.com Internet Source	1%
13	repository.bku.ac.id Internet Source	1%
14	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
15	www.askep.web.id Internet Source	1%
16	kuliahkerjaanarifsetiawan.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Rezki Hadiyanti, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 16 Desember 1996. Penulis merupakan anak ke 5 dari 6 bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak **Zainuddin** dan Ibu **Hamsinah Hamang**.

Penulis yang akrabnya di panggil **Kiki** ini mengawali pendidikan di SD Inpres BTN Ikip 1 dan lulus pada tahun 2008, lalu melanjutkan pendidikan di MTsN Model Makassar pada tahun yang sama dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Makassar dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu di tahun yang sama penulis memasuki bangku perkuliahan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, tepatnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan melalui jalur SBMPTN dan lulus pada awal Tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Ners pada tahun 2021.

Pengalaman organisasi penulis diawali pada masa pendidikan Sekolah Dasar yaitu penulis terlibat dalam organisasi Kepramukaan, pada masa SMP terlibat dalam organisasi olahraga voli, dan pada masa SMA terlibat dalam organisasi Palang Merah Remaja (PMR). Di tahun 2021, penulis fokus mengerjakan Tugas Akhir Ners sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ners.

Syukur Alhamdulillah berkat pertolongan Allah swt, perjuangan keras dan disertai iringan doa dari kedua orang tua, keluarga serta rekan-rekan yang membantu penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun Tugas Akhir Ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Anak Pasien Meningitis Dengan Nyeri Menggunakan Intervensi Terapi Musik Di RSUD Labuang Baji Makassar”.