

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN  
*TRAUMATIC BRAIN INJURY POST CRANIOTOMY*  
DENGAN HIPERTERMIA MENGGUNAKAN  
INTERVENSI KOMPRES HANGAT DI  
RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR**



**Tugas Akhir Ners**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Ners Jurusan Ilmu Keperawatan Pada  
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

PUTRI YUNIAR, S. Kep  
NIM: 70900120023

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Yuniar, S. Kep  
NIM : 70900120023  
Tempat/Tgl, Lahir : Bajoe, 25 Agustus 1998  
Jurusan : Profesi Ners  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : BTP Jl. Kerukunan Timur No 32 Kelurahan Buntusu Blok  
H Baru No 280  
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada *Pasien Traumatic Brain Injury Post Craniotomy* Dengan Hipertermia Menggunakan Intervensi Kompres Hangat Di RSUD Labuang Baji Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 25 Januari 2022

Penyusun,

**Putri Yuniar, S.Kep**

**NIM : 70900120023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Putri Yuniar NIM: 70900120023, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Traumatic Brain Injury Post Craniotomy* Dengan Hipertermia Menggunakan Intervensi Kompres Hangat Di RSUD Labuang Baji Makassar”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 25 Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep

Andi Budiyanto A P, S.Kep., Ns., M.Kep

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Traumatic Brain Injury Post Craniotomy* Dengan Hipertermia Menggunakan Intervensi Kompres Hangat Di RSUD Labuang Baji Makassar”, yang disusun oleh Putri Yuniar, NIM : 70900120023, mahasiswa program study Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 28 Januari 2022 M, bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan

Gowa, 25 Januari 2022 M  
28 Jumadil Akhir 1443 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patimah. S.Kep.,Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Ardian Adhiwijaya S.Kep.,Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Andi Budiyanto A P, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu  
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP:198007012006042002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadiran Allah swt, berkat rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Traumatic Brain Injury Post Craniotomy* Dengan Hipertermia Menggunakan Intervensi Kompres Hangat Di RSUD Labuang Baji Makassar”, ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di Program Study Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dengan penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penulisan banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta. Bapak tercinta Muhammad Yunus dan Mammi tercinta Nurlaela atas kasih sayang, do'a, dukungan dan semangat serta moril dan materinya, sehingga penulis dapat berada ditahap ini, merai gelar Ns (Ners). Ucapan terima kasih yang tulus kepada pembimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta Staf

Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.

3. Dr. Patima, S.Kep.,Ns., M.Kep selaku ketua Prodi Ners Jurusan Keperawatan dan Syisnawati, S.Kep.,Ns., M.Kep. Sp.Kep.Jiwa selaku sekretaris Prodi Ners jurusan keperawatan beserta Staf dan Dosen pengajar yang tidak bosan-bosannya memberikan ilmu, dan membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan karya akhir ners
4. Ihamsyah S.Kep., Ns., M.Kep selaku Pembimbing I dan Andi Budianto S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing II yang selama ini telah sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penulisan karya akhir ners, serta motivasi yang membangun.
5. Ardian Adhiwijaya, S.Kep., Ns., M.Kep selaku Penguji I dan Dr. Hj. Rahmi Damis M.Ag selaku Penguji II yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran yang membangun sehingga saya dapat menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesiapa yang akan membacanya.
6. Kepada kakak kandung saya Reski Yunita dan Dwi Yuliah Yunus yang selalu memberikan saya dorongan untuk belajar dan memberi arahan dan semangat untuk terus menajutkan pendidikan hingga tahap ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan love you more
7. Kepada sahabat- sahabat saya “Bergerak” yang bersama saling menguatkan untuk menyelesaikan study profesi ners ini, bersama saling merangkul dan saling mengingatkan.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pembaca menemukan kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh pendidikan di kampus peradaban yang saya cintai dan banggakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis

sangat mengharapkan saran- saran yang membangun, untuk meningkatkan ilmu penelitian saya kedepannya.

Gowa, 25 Januari 2022

Penulis



## ABSTRAK

Nama : Putri Yuniar

NIM : 70900120023

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Traumatic Brain Injury Post Craniotomy* Dengan Hipertermia Menggunakan Intervensi Kompres Hangat Di RSUD Labuang Baji Makassar

---

**Latar Belakang:** (WHO, 2016) menunjukkan bahwa 16.500 orang di seluruh dunia meninggal setiap hari karena semua jenis cedera. Salah satunya adalah cedera kepala yang kasusnya sering ditemukan di ruang perawatan atau di unit perawatan intensif di rumah sakit. Faktor-faktor yang memperberat kondisi pasien trauma kepala pasca kraniotomi selama rawat inap di ICU, seperti penurunan kesadaran, edema serebral, dilatasi pupil, peningkatan tekanan intrakranial, kejang, demam/peningkatan suhu tubuh. Demam pada pasien trauma kepala dapat disebabkan oleh peradangan, infeksi atau kerusakan pada hipotalamus sehingga menyebabkan peningkatan laju metabolisme dan peningkatan tekanan intrakranial, sehingga dapat menimbulkan trauma tambahan seperti kejang, dehidrasi bahkan syok. **Tujuan:** Analisis asuhan keperawatan pada pasien trauma otak pasca kraniotomi dengan hipertermia menggunakan intervensi kompres hangat di ICU **Metode:** Studi kasus dengan teknik penerapan intervensi kompres hangat diterapkan saat pasien hipertermia dan berhenti saat suhu tubuh turun. **Hasil:** Analisis data menunjukkan bahwa intervensi kompres hangat efektif dalam menurunkan suhu tubuh pada pasien cedera otak traumatik pasca kraniotomi dengan hipertermia.

**Kata Kunci :** *Traumatic brain injury* , Hipertermia, Kompres air hangat



## ABSTRAC

Nama : Putri Yuniar

NIM : 70900120023

Judul : *Analysis Of Nursing Care In Post Craniotomy Traumatic Brain Injury Patients With Hypertermia Using Warm Compress Intervention In RSUD Labuang Baji Makassar*

---

---

**Background** : (WHO, 2016 suggest that there are 16.500 people die worldwide every day due to all types injuries. One of them is a head injury, the case is often found in the treatment room or ICU room at the hospital. Factors that affect the condition of post craniotomy heat trauma patients while being treated in the ICU such as decreased consciousness, cerebral edema, pupillary dilatation, increased intracranial pressure, seizures, fever/ increased body temperature, fever in head trauma patients can be caused by inflammation, infection, or damage to the hypothalamus, increasing metabolic rate and increasing intracranial pressure so that it can increase additional trauma such as seizure, even shock, so that one of the intervention that can be done in lowering body temperature is warm compresses on the scalp. The patients using a cloth and warm water.


**Purpose** : To analyze nursing care in patients with traumatic brain injury after craniotomy with hypertermia using a warm compress intervention in the ICU using a warm compress. **Method** : Case study with data collection through interviews, observation, physical examination and documentation. The implementation of warm compresses is carried out while the patient is hypertermic and stopped when body temperature decreases. **Results** : Data analysis shows that the warm compresses intervention was effective in reducing body temperature in post craniotomy traumatic brain injury patients with hypertermia. **Conclusion** : Based on the results of the case evaluation, it was concluded that warm compresses were effective in overcoming the problem of hypertermia.

**Keywords** : Traumatic Brain Injury, Hypertermia, Warm Compresses

## DAFTAR ISI

<b>Sampul</b>	
<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Abstrak (Indonesia)</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Abstrac (Inggris)</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-6</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan .....	4
1.4 Manfaat .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7-40</b>
2.1 Konsep Medis .....	7
2.2 Konsep Asuhan Keperawatan .....	16
2.3 Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan .....	31
2.4 <i>Evidance Based Practice in Nursing</i> (EBPN) .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>42-46</b>
3.1 Rancangan Studi Kasus .....	42
3.2 Subjek Studi Kasus .....	42
3.3 Fokus Studi Kasus .....	43
3.4 Instrumen Studi Kasus .....	43
3.5 Prosedur Studi Kasus .....	43
3.6 Tempat Dan Waktu Pengambilan Data Kasus .....	44
3.7 Analisis Data Dan Penyajian Data .....	44

3.8 Etika Studi Kasus .....	45
<b>BAB IV LAPORAN KASUS .....</b>	<b>47-70</b>
4.1 Pengkajian .....	47
4.2 Diagnosis Keperawatan .....	55
4.3 Intervensi Keperawatan .....	56
4.4 Implementasi Keperawatan .....	60
4.5 Evaluasi .....	66
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>71-78</b>
5.1 Analisis asuhan keperawatan .....	71
5.2 Analisis intervensi EBPN .....	78
5.3 Keterbatasan .....	78
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>79-81</b>
6.1 Kesimpulan .....	79
6.2 Saran .....	80
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>82</b>
Lampiran .....	84



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Intervensi Keperawatan .....	24
Tabel 2.1 Tabel Pemeriksaan penunjang .....	53
Tabel 3.1 Tabel Inervensi Keperawatan .....	56
Tabel 4.1 Tabel Implementasi Keperawatan .....	60
Tabel 5.1 Tabel Evaluasi Keperawatan .....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cedera Otak Traumattik .....	8
Gambar 2.1 T- scan Trauma Tajam .....	8



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara global, angka kejadian cedera masih relatif tinggi. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia, 16.500 orang meninggal setiap hari di seluruh dunia karena semua jenis cedera. Cedera menyumbang 12% dari beban holistik penyakit. Akibatnya, cedera merupakan penyebab kematian ketiga secara umum (WHO, 2016). Kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia pada tahun 2018 telah menyebabkan meninggalnya satu juta orang setiap tahun, sejauh ini dan ada 50 juta orang yang terluka, kebanyakan dari mereka adalah korban pengguna jalan, dari pejalan kaki, pengendara sepeda motor, anak-anak dan penumpang (Risksdas, 2018)

Jumlah pasien rawat inap dengan cedera kepala sekitar satu juta orang. Di eropa setiap tahun. sekitar 50% disebabkan oleh kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Cedera kepala akibat kecelakaan kerja diperkirakan sekitar 300.000 orang per tahun. Jumlah pasien dengan cedera kepala yang dirawat dan dipulangkan dari unit gawat darurat adalah sekitar 1 juta orang setiap tahun di Amerika. Sekitar 230.000 orang dirawat di rumah sakit dan hidup, sekitar 80.000 orang dipulangkan dengan cacat akibat cedera kepala dan 50.000 orang meninggal karena cedera kepala. Diperkirakan saat ini ada 5,3 juta orang Amerika yang hidup dengan disabilitas yang disebabkan oleh cedera kepala. Usia rata-rata untuk cedera kepala umum adalah 15-24 tahun. Sekitar 500.000 anak

dengan cedera kepala datang ke rumah sakit setiap tahun di Inggris dan sekitar 10% dari masalah di setiap rumah sakit anak adalah cedera kepala (Trevana L, 2011).

Angka kejadian cedera di Indonesia tahun 2017 ialah 8,2%. Provinsi yang memiliki prevalensi cedera kepala lebih tinggi dari angka nasional sebanyak 15 provinsi. Di provinsi Jawa Tengah menunjukkan masalah cedera sebanyak 7,7% . Cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan sepeda motor sebanyak 40,1%. Cedera lebih banyak didominasi dialami oleh kelompok umur dewasa yaitu sebanyak 38,8% dan lanjut usia (lansia) yaitu 13,3% serta anak-anak  $\pm$  11,3%) Kecelakaan lalu lintas serta kecelakaan kerja sebagai penyebab utama masalah cedera kepala. Jambi berada pada kasus cedera kepala terendah yaitu sebanyak (4,5%) dan prevalensi tertinggi ditemukan pada Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak (12,8%) (Risksedas, 2018)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan selama pelayanan di Intensive Care Unit (ICU) RS Labuang Baji Makassar per bulan, 120 pasien dirawat di ICU dan mendapatkan perawatan, dimana 100 diantaranya merupakan kasus trauma kepala dengan penyebab rata-rata kecelakaan. . Trauma/trauma kranial merupakan kasus yang sering dijumpai di ICU. Dari hasil observasi yang diperoleh selama pelayanan di RSUD Labuang Baji Kota Makassar, dari 11 tempat tidur yang tersedia terdapat 8 pasien dan 2 diantaranya mengalami masalah trauma kepala dengan jenis cedera kepala ringan dan cedera kepala berat. Hal ini

menunjukkan bahwa kasus cedera kepala di ICU masih sering terjadi.

Terdapat faktor-faktor yang dapat memperburuk kondisi pasien yang menjalani perawatan dengan masalah trauma kepala setelah dilakukan operasi kraniotomi di Intensive Care Unit (ICU) seperti penurunan kesadaran, edema serebral, dilatasi pupil, peningkatan tekanan intak dan lesi lainnya. karena penggunaan perangkat sensorik. life support (kipas angin, monitor, CVP dan lain-lain) serta gangguan pernafasan akibat penggunaan obat penenang selama proses operasi. Demam/kenaikan suhu tubuh merupakan masalah yang sering terjadi pada kasus cedera otak traumatis.

Dari hasil observasi selama pelayanan di ruang rawat intensif RSUD Labuang Baji kota Makassar terdapat 2 pasien trauma kepala yang kesemuanya mengalami masalah hipertermia. Mengingat masalah hipetermia dan tingginya angka kecacatan dan kematian pada pasien cedera kepala, maka diperlukan penanganan yang tepat. Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan penanganan yang tepat untuk mengatasi masalah hipetermia pada kasus ini. Penatalaksanaan intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi demam/peningkatan suhu tubuh atau yang sering disebut dengan hipertermia adalah dengan penerapan kompres hangat (Ika Rahmawati, 2018).

Kompres hangat dalam penelitiannya (Sarah Fadillah, 2019) menyatakan bahwa penelitian dalam pengelolaan pasien rawat inap hipertermia menggunakan kompres hangat yang terbukti mampu

mengatasi beberapa masalah yang dapat memicu terjadinya hipertermia, seperti kejang, nyeri dan demam. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa kompres hangat yang dilakukan pada pasien selama pasien mengalami kenaikan suhu tubuh dapat menurunkan suhu tubuh pasien dari 38 cecius menjadi 36,5 cecius dengan pemberian kompres hangat selama 3 jam (Kahinedan, 2017). Menurut (Prastiwi, 2020) pengaruh pemberian kompres hangat pada pasien dengan masalah hipertermia menurunkan jumlah pasien yang mengalami hipertermia dengan 30 pasien dari 30 responden. Kompres hangat adalah tindakan yang dilakukan dengan memberikan cairan atau air hangat dan menggunakan handuk atau spons untuk memenuhi kebutuhan akan rasa nyaman, menurunkan suhu tubuh, mengurangi rasa sakit, memperbaiki aliran darah ke bagian tubuh yang cedera dan mencegah spasme otot. Selain itu, kompres air panas juga merupakan terapi nonfarmakologis (Fuad Toyib, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan intervensi kompres hangat pada pasien *traumatic brain injury post op craniotomy* dengan masalah hipertermi di Ruang perawatan *Intensif care (ICU) RSUD Labuang Baji Kota Makassar*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah pada penulisan Karya Akhir Ners ini adalah Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada pasien *traumatic brain injury post craniotomy* dengan hipertermia menggunakan intervensi kompres air

hangat ?

### 1.3 Tujuan

#### 1.3.1 Tujuan Umum

“Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien *traumatic brain injury post craniotomy* dengan hipertermia menggunakan intervensi kompres air hangat di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUD Labuang Baji Makassar”

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk Menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien *traumatic brain injury post craniotomy* dengan hipertermia
- b. Untuk Menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien *traumatic brain injury post craniotomy* dengan hipertermia
- c. Untuk Menganalisis intervensi keperawatan pada pasien *traumatic brain injury post craniotomy* dengan hipertermia
- d. Untuk Menganalisis implementasi keperawatan pada pasien *traumatic brain injury post craniotomy* dengan hipertermia
- e. Untuk Menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien *traumatic brain injury post craniotomy* dengan hipertermia
- f. Untuk Menganalisis asuhan keperawatan pada pasien *traumatic brain injury post craniotomy* dengan hipertermia menggunakan intervensi kompres air hangat.

## 1.4 Manfaat

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Tugas akhir ini diharapkan berbasis pada praktik perawat sebagai proses pembelajaran dalam pengembangan praktik pelayanan kesehatan pada pasien cedera otak traumatik pasca kraniotomi, dengan hipertermia, menggunakan intervensi dengan kompres air hangat di ruang Intensive Care Unit (ICU) RS Labuang Baji Kota Makassar.

### 1.4.2 Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan intervensi keperawatan berbasis bukti dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien cedera otak traumatik pasca kraniotomi, dengan masalah hipertermia, menggunakan intervensi kompres air hangat di pelayanan kesehatan.

## **BAB II**


### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Medis**

##### **2.1.1 Defenisi**

Cedera otak traumatis adalah gangguan fungsi otak atau patologi otak yang disebabkan oleh kekuatan eksternal yang dapat terjadi di mana saja, termasuk di lalu lintas, di rumah, di tempat kerja, saat berolahraga atau di medan perang (Manley dan Mass, 2013).

Cedera otak traumatis (TBI) adalah cedera otak akut yang disebabkan oleh energi mekanik kepala dari kekuatan eksternal, seperti benturan, pukulan, atau tusukan. Identifikasi klinis cedera otak mencakup salah satu kriteria berikut: kebingungan atau disorientasi, kehilangan kesadaran, amnesia pasca-trauma atau kelainan neurologis lainnya (tanda neurologis focal, kejang, lesi intrakranial). (Manley dan Massa, 2013). Menurut Brain Injury Association Of America (2009), trauma kepala adalah cedera kepala, bukan bawaan atau degeneratif, tetapi disebabkan oleh dampak fisik eksternal yang dapat menyebabkan gangguan kemampuan kognitif dan fisik serta defisit neurologis yang terjadi karena iskemia dan efek massa karena hemoragik dan edema serebral di sekitar jaringan otak.



**Gambar 2.1 Cedera Otak Traumatik**

### 2.1.2 Etiologi

- a. Trauma tajam adalah luka yang disebabkan oleh benda tajam, yang kemudian menimbulkan luka lokal. Lesi lokal termasuk stroke, hematoma serebral, kerusakan otak sekunder yang disebabkan oleh perluasan massa lesi.



**Gambar 2.2 CT-Scan Trauma Tajam**

- b. Trauma tumpul, cedera yang disebabkan oleh benda tumpul menyebabkan cedera umum (difusi): Kerusakan meluas dan kemudian terjadi dalam 4 bentuk: kerusakan aksonal, kerusakan otak hipoksia, pembengkakan otak, perdarahan otak minor, kerusakan multipel, koma, akibat penyebaran cedera kepala ke hemisfer serebral, batang otak atau keduanya.

### 2.1.3 Klasifikasi

Luka terbuka di kepala akibat cedera kepala kemudian menyebabkan patah tulang tengkorak atau luka tembus, hal ini menjadi pertimbangan bahwa sejauh mana cedera kepala jenis ini ditentukan oleh massa dan bentuk benturan, kerusakan otak dapat terjadi dan jika terjadi cedera kepala. benda tajam masuk dan melubangi jaringan otak nantinya. merusak dura mater, saraf otak. jaringan otak yang disebabkan oleh benda tajam/tembakan, cedera kepala terbuka akan memungkinkan bakteri patogen sesekali masuk ke otak. Cedera kepala tertutup dengan benturan kranial pada jaringan otak tengkorak dapat muncul secara tiba-tiba, ini adalah dampak bahwa sesuatu mirip dengan sesuatu yang bergerak cepat, kemudian berhenti secara bersamaan dan jika ada kelebihan cairan akan tumpah. Cedera kepala tertutup meliputi: gegar otak, memar demi memar dan laserasi.

Berdasarkan tingkat parahnya cedera kepala.

#### 1) Cedera Kepala Ringan

- a) Tidak ada patah tulang tengkorak
- b) Tidak ada gegar otak, hematom
- c) GCS 13 -15
- d) Mungkin ada penurunan kesadaran, tetapi <30 menit

#### 2) Cedera Kepala Sedang

- a) Kehilangan kesadaran (amnesia) > 30 menit tetapi <24 jam

- b) Muntah
- c) GCS 9 - 12
- d) Mungkin mengalami patah tulang tengkorak, sedikit disorientasi (membingungkan)

### 3) Cedera Kepala Berat

- a) GCS 3 - 8
- b) Kehilangan kesadaran > 24 jam
- c) Adanya gegar otak, laserasi intrakranial / hematoma

Berdasarkan jenis cedera

- 1) Cedera kepala terbuka dapat menyebabkan krepitasi atau patah tulang tengkorak dan kemudian merusak jaringan otak.
- 2) Cedera kepala tertutup biasanya mirip dengan keluhan gegar otak ringan dan edema serebral yang luas

#### 2.1.4 Patofisiologi

Kerusakan otak dibagi menjadi dua, yaitu kerusakan otak primer dan kerusakan otak sekunder. Cedera otak primer biasanya terjadi ketika peristiwa yang tidak dapat dihindari terjadi dan disertai dengan kerusakan parenkim yang terjadi segera setelah trauma. Cedera akibat adanya gaya seperti akselerasi, rotasi, kompresi dan distensi akibat proses akselerasi dan deselerasi. Kekuatan ini menyebabkan tekanan pada tengkorak, yang dapat mempengaruhi neuron, glia, dan pembuluh darah, dan selanjutnya menyebabkan kerusakan otak fokal, multifokal, atau difus.

Kerusakan otak dapat melibatkan parenkim otak dan/atau pembuluh darah otak. Lesi pada parenkim dapat berupa memar, laserasi, atau lesi aksonal difus, sedangkan lesi pada pembuluh darah otak dapat berupa perdarahan epidural, subdural, subarachnoid, dan intraserebral yang dapat dilihat pada CT scan. (Indharty, 2012).

Cedera otak sekunder adalah suatu kondisi di mana kerusakan otak dapat dicegah setelah proses cedera. Contoh gangguan sekunder tersebut antara lain hipoksia, hipertensi, hiperkarbia, hiponatremia, dan kejang (Saatman et al, 2008). Menurut Indharty (2012), cedera otak sekunder ini merupakan lanjutan dari cedera primer. Hal ini disebabkan adanya reaksi inflamasi, biokimia, pengaruh neurotransmitter, gangguan regulasi diri, neuro-apoptosis dan inokulasi bakteri. Faktor intrakranial (lokal) yang mempengaruhi cedera otak sekunder adalah adanya hematoma intrakranial, iskemia serebral akibat penurunan perfusi jaringan otak, hernia, penurunan tekanan darah serebral, peningkatan tekanan intrakranial, demam, vasospasme, infeksi. Sebaliknya, faktor ekstrakranial (sistemik) yang mempengaruhi kerusakan otak sekunder dikenal sebagai "9 Hs mematikan," termasuk hipotensi, hipoksia, hipertermia, hipokapnia, hiperkapnia, hiperglikemia dan hipoglikemia, hiponatremia, hipoproteinemia, dan hemostasis (Idharty, 2012)

### 2.1.5 Manifestasi Klinis

Gejala cedera otak traumatis yang lebih parah bervariasi, tetapi pada umumnya cedera serius akan disertai dengan hilangnya kesadaran hingga koma. Menurut American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM), cedera otak traumatis ringan adalah pasien dengan gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh trauma dengan setidaknya satu dari manifestasi berikut:

- a. Kehilangan kesadaran <30 menit
- b. Kehilangan memori untuk kejadian sesaat sebelum atau sesudah kejadian (amnesia pascatrauma) kurang dari 24 jam
- c. Perubahan keadaan mental pada saat kejadian (disorientasi atau kebingungan)
- d. Defisit neurologis fokal sementara atau non-sementara
- e. Skor GCS 13-15 setelah 30 menit (Roozenbeek.2013)

Setelah menderita cedera otak traumatis, 30-80% pasien mengalami gejala lanjutan setelah gegar otak (post contusion). Secara umum, kasus cedera membaik dari waktu ke waktu, tetapi mereka juga ada dalam jangka waktu yang lama, seperti berminggu-minggu. Manifestasi klinis cedera otak traumatis ringan (mild TBI) meliputi kombinasi gejala fisik dan neuropsikiatri, termasuk:

- a. Gejala fisik antara lain sakit kepala, pusing, mual, kelelahan, gangguan tidur, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau kejang jika terdapat kerusakan pada lobus temporal atau frontal, yang harus

dibedakan dengan epilepsi.

- b. Gejala neuropsikiatri meliputi gangguan kognitif, perilaku, dan gangguan lainnya.
- c. Gangguan kognitif dapat berupa gangguan pemusatan perhatian, gangguan memori dan gangguan fungsi eksekutif. Gangguan rentang perhatian dapat menyulitkan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tingkat gangguan kognitif berkorelasi dengan tingkat keparahan cedera.
- d. Gejala perilaku berhubungan dengan kepribadian pasien, antara lain iritabilitas, perubahan suasana hati, agresi, impulsif, perilaku egois.
- e. .Gejala lain yang terkait termasuk depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma. (Lozano.2015)

#### **2.1.6 Penatalaksanaan**

- a. Deksametason / Caletazone sebagai obat anti edema serebral, dosisnya disesuaikan dengan tingkat keparahan cedera.
- b. Terapi hiperventilasi pada kasus trauma kepala berat untuk mengurangi vasodilatasi.
- c. Pemberian analgetik.
- d. Pengobatan anti bengkak adalah larutan hipertonik manitol 20%, glukosa 40% atau gliserol.
- e. Antibiotik sawar darah-otak (pinisilin) atau infeksi anaerob dapat diberikan bersama metronidazol.
- f. Makanan atau cairan infus 5% dekstrosa, aminousin, aminophel (18 jam

setelah kecelakaan) 2-3 hari kemudian diberikan makanan lunak.

- g. Tidur ditopang oleh bantal setinggi 30 kaki atau yang sering disebut bantal terbalik.
- h. Pembedahan, pada kasus cedera kepala, prosedur pembedahan yang biasa dilakukan disebut dengan kraniotomi (perforasi tulang tengkorak untuk menangani kasus kerusakan otak, seperti pendarahan pada tengkorak, pembengkakan otak dan tumor otak)

### **2.1.7 Pemeriksaan Penunjang**

- a. CT scan, CT scan berfungsi untuk mengidentifikasi terjadinya hemoragig, ukuran ventrikuler dan infark pada jaringan mati.
- b. Foto tengkorak atau cranium foto berfungsi untuk mengetahui adanya patah pada tulang tengkorak.
- a. MRI, berfungsi sebagai penginderaan yang menggunakan gelombang elektomagnetik
- b. Laboratorium
  - 1) Kimia darah : Untuk mengetahui kadar elektrolit dalam tubh apakah seimbang atau tidak
  - 2) Kadar elektrolit : Untuk mengetahui adanya ketidakseimbangan cairan yang berakibat terjadinya peningkatan tekanan intrakranial.
  - 3) Screen toksikologi : Untuk mengetahui apakah ada pengaruh obat sehingga menyebabkan penurunan kesadaran.
- c. Serebral angiographi Menunjukkan anomaly sirkulasi serebral ,seperti perubahan jaringan otak sekunder menjadi edema maupun perdarahan.

- d. Serial EEG Serial EEG digunakan untuk melihat perkembangan apakah apa gelombang yang patologis.
- e. X-ray, digunakan untuk mendeteksi perubahan struktur tulang , perubahan truktur garis (perdarahan atau edema) pada frakmen tulang.
- f. BAER, digunakan untuk mengoreksi batas fungsi kortek dan otak kecil.
- g. PET, digunakan untuk mendeteksi perubahan aktivitas metabolisme otak.
- h. CSF & lumbalpunksi, dapat dilakukan jika diduga terjadi perdarahan subaracnoid.
- i. ABGs, digunakan untuk mendeteksi keberadaan ventilasi atau masalah pernafasan (oksigenasi) jika terjadi peningkatan intracranial.

### **2.1.8 Komplikasi**

Adapun komplikasi yang muncul pada cedera kepala menurut Ahmadsyah, (2010) adalah:

- a. Epilepsi pasca trauma adalah gangguan kejang beberapa saat setelah otak mengalami trauma akibat pukulan di kepala. Hal ini dapat menyebabkan kejang dan terjadi pada sekitar 10 pasien dengan trauma kepala berat, meskipun tidak ada luka tembus, dan pada 40% pasien dengan cedera kepala tembus.
- b. Edema paru, komplikasi paru yang paling serius pada pasien cedera kepala adalah edema paru. Ini mungkin terutama gangguan neurologis atau akibat sindrom gangguan pernapasan dewasa. Edema paru dapat terjadi akibat kerusakan otak yang menyebabkan refleksi Cushing. Peningkatan tekanan darah sistemik terjadi sebagai respons sistem saraf simpatis terhadap

peningkatan PCI. Peningkatan vasokonstriksi umum tubuh ini menyebabkan lebih banyak darah dikirim ke paru-paru. Perubahan permeabilitas pembuluh darah paru berperan dalam proses ini, memungkinkan cairan bergerak ke dalam alveoli. Gangguan difusi oksigen dan karbon dioksida dalam darah dapat menyebabkan peningkatan PCI lebih lanjut (Mary Fran Hazinski, 2011)

- c. Afasia adalah penurunan atau bahkan kurangnya kemampuan menggunakan bahasa karena cedera pada area bahasa dan otak. Pasien tidak dapat memahami atau mengungkapkan kata-kata.



## 2.2 Konsep Asuhan Keperawatan

### 2.2.1 Pengkajian Keperawatan

- a. Identitas Pasien Meliputi nama, umur (kebanyakan terjadi pada usia tua), jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal dan jam MRS, nomor register, dan diagnosis medis .
- b. Keluhan utama dalam kegawatdaruratan yang sering menjadi alasan pasien untuk meminta pertolongan kesehatan adalah kelemahan anggota gerak badan, gelisah, tidak dapat berkomunikasi, dan penurunan tingkat kesadaran. Pada kasus cedera kepala keluhan utama yang sering dirasakan pasien adalah, nyeri kepala ringan atau berat, sulit berbicara, sulit bernapas, kerusakan pada tulang tengkorak atau wajah, keluar darah pada hidung atau telinga, muntah, disorientasi waktu, tempat ataupun orang, perubahan ukuran pupil mata, memar atau bengkak disekitar kedua mata, penurunan kesadaran, bahkan amnesia.
- c. Riwayat penyakit sekarang adanya penurunan kesadaran, gelisah.
- d. Riwayat penyakit dahulu, adanya riwayat hipertensi, riwayat stroke, diabetes melitus, penyakit jantung, anemia, riwayat trauma kepala. Pengkajian pemakaian obat-obat yang sering digunakan pasien, seperti pemakaian obat antihipertensi, antilipidemia, penghambat beta, dan lainnya. Adanya riwayat merokok, penggunaan alkohol. Pengkajian riwayat ini dapat mendukung pengkajian dari riwayat penyakit sekarang dan merupakan data dasar untuk mengkaji lebih jauh dan untuk

memberikan tindakan selanjutnya.

- e. Riwayat penyakit keluarga Biasanya ada riwayat keluarga yang menderita hipertensi, diabetes melitus, atau penyakit menurun lainnya.

- f. Primary Survey (ABCDE)

- 1) Airway. Tanda-tanda objektif-sumbatan Airway

- a. Lihat (lihat) apakah pasien mengalami agitasi atau penurunan kesadaran.

Agitasi menunjukkan hipoksia, dan penurunan kesadaran menunjukkan hiperkarbia. Sianosis menunjukkan hipoksemia yang disebabkan oleh kekurangan oksigenasi dan dapat dilihat dengan melihat kuku dan kulit di sekitar mulut. Cari retraksi dan penggunaan otot bantu pernapasan yang, jika ada, merupakan bukti lebih lanjut dari gangguan jalan napas. Jalan napas membersihkan jalan napas memperhatikan kontrol serviks, memasang kerah serviks untuk imobilisasi serviks sampai tidak ada bukti cedera serviks, membersihkan jalan napas dari semua hambatan, benda asing, darah dari fraktur maksilofasial, gigi patah dan banyak lagi. Lakukan intubasi (tabung orotrakeal) jika apnea, GCS (Glasgow Coma Scale) <8, pertimbangkan juga GCS 9 dan 10 jika saturasi oksigen tidak mencapai 90%.

- b. Mendengarkan (mendengar) suara-suara yang tidak normal. Suara pernapasan (suara pernapasan tambahan) menghalangi pernapasan.

- c. Rasakan (sentuhan)

- 2) Breathing. Tanda-tanda objektif-ventilasi yang tidak adekuat

- a. Carilah simetris menaikkan dan menurunkan dada dan gerakan yang tepat dari dinding dada. Asimetri yang menunjukkan bidai atau dada berdebar dan setiap pernapasan berat harus dianggap sebagai ancaman bagi oksigenasi pasien dan harus segera dievaluasi. Pengkajian meliputi inspeksi bentuk dan pergerakan dada, palpasi adanya kelainan pada dinding dada yang dapat mengganggu ventilasi dan perkusi untuk mengetahui adanya darah atau udara di paru-paru.
  - b. Mendengarkan (mendengar) gerakan udara pada kedua sisi dada. Penurunan atau tidak adanya suara pernapasan pada satu atau hemitoraks adalah tanda-tanda cedera dada. Waspadalah terhadap pernapasan cepat - takipnea dapat mengindikasikan kekurangan oksigen.
  - c. Gunakan pulse oxymeter. Perangkat ini mampu memberikan informasi tentang saturasi oksigen pasien dan infus perifer, tetapi tidak memberikan ventilasi yang memadai.
- 3) Circulation dengan kontrol perdarahan
- a. Respon awal tubuh terhadap perdarahan adalah takikardia untuk mempertahankan denyut jantung meskipun terjadi penurunan volume sekuncup.
  - b. Hal ini kemudian akan diikuti dengan penurunan tekanan nadi (tekanan sistolik-tekanan diastolik).
  - c. Jika aliran darah ke organ vital dapat dipertahankan kembali, maka terjadilah hipotensi

- d. Pendarahan dari luar harus segera dihentikan dengan perban penekan pada area tersebut
- e. Ingat, terutama untuk koagulasi tanpa koagulasi, jangan menarik MAE (Meatus Acoustic Eksternus) dengan kapas atau kain kasa, biarkan cairan atau darah mengalir, karena ini membantu mengurangi TIK (High Intracranial Pressure)
- f. Semua cairan yang diberikan harus dipanaskan untuk mencegah koagulopati dan gangguan irama jantung.

#### 4) Disability

- a. GCS setelah resusitasi
- b. Ukuran dan bentuk refleks cahaya pupil
- c. Evaluasi motorik kiri dan kanan ada tidaknya paresis

#### 5) Exposure

Hindari hipotermia, semua pakaian yang menutupi tubuh pasien harus dilepas agar tidak ada luka yang terlewatkan selama pemeriksaan. Pemeriksaan punggung harus dilakukan secara berguling untuk menghindari hipotermia (America College of Surgeons; ATLS)

### 2.2.2 Secondary Survey

#### 1) Kepala dan leher

Kepala. Inspeksi (kesimetrisan muka dan tengkorak, warna dan distribusi rambut kulit kepala), palpasi (keadaan rambut, tengkorak, kulit kepala, massa, pembengkakan, nyeri tekan,

fontanela (pada bayi)).

Leher. Inspeksi (bentuk kulit (warna, pembengkakan, jaringan parut, massa), tiroid), palpasi (kelenjar limfe, kelenjar tiroid, trakea), mobilitas leher

## 2) Dada dan paru

Inspeksi. Dada diinspeksi terutama mengenai postur, bentuk dan kesimetrisan ekspansi serta keadaan kulit. Inspeksi dada dikerjakan baik pada saat dada bergerak atau pada saat diem, terutama sewaktu dilakukan pengamatan pergerakan pernapasan. Pengamatan dada saat bergerak dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui frekuensi, sifat dan ritme/irama pernapasan.

Palpasi. Dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji keadaan kulit pada dinding dada, nyeri tekan, massa, peradangan, kesimetrisan ekspansi, dan tactil vremitus (vibrasi yang dapat teraba yang dihantarkan melalui sistem bronkopulmonal selama seseorang berbicara)

Perkusi. Perhatikan adanya hipersonor atau "dull" yang menunjukkan udara (pneumotorak) atau cairan (hemotorak) yang terdapat pada rongga pleura.

Auskultasi. Berguna untuk mengkaji aliran udara melalui batang trakeobronkeal dan untuk mengetahui adanya sumbatan aliran udara. Auskultasi juga berguna untuk mengkaji kondisi paru-paru dan rongga pleura.

### 3) Kardiovaskuler

Inspeksi dan palpasi. Area jantung diinspeksi dan palpasi secara simultan untuk mengetahui adanya ketidaknormalan denyutan atau dorongan (heaves).

Palpasi dilakukan secara sistematis mengikuti struktur anatomi jantung mulai area aorta, area pulmonal, area trikuspidalis, area apikal dan area epigastrik

Perkusi. Dilakukan untuk mengetahui ukuran dan bentuk jantung. Akan tetapi dengan adanya foto rontgen, maka perkusi pada area jantung jarang dilakukan karena gambaran jantung dapat dilihat pada hasil foto torak anteroposterior.

### 4) Ekstermitas

Beberapa keadaan dapat menimbulkan iskemik pada ekstremitas bersangkutan, antara lain :

- a. Cedera pembuluh darah.
- b. Fraktur di sekitar sendi lutut dan sendi siku.
- c. Crush injury.
- d. Sindroma kompartemen.
- e. Dislokasi sendi panggul.
- f. Keadaan iskemik ini akan ditandai dengan :
- g. Pusasi arteri tidak teraba.
- h. Pucat (pallor).
- i. Dingin (coolness).

- j. Hilangnya fungsi sensorik dan motorik.
- k. Kadang-kadang disertai hematoma, "bruit dan thrill".

Fiksasi fraktur khususnya pada penderita dengan cedera kepala sedapat mungkin dilaksanakan secepatnya. Sebab fiksasi yang tertunda dapat meningkatkan resiko ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrom) sampai 5 kali lipat. Fiksasi dini pada fraktur tulang panjang yang menyertai cedera kepala dapat menurunkan insidensi ARDS.

### 2.2.3 Diagnosis Keperawatan

Menurut Priyono, 2019, diagnosis keperawatan yang sering muncul pada kasus cedera kepala adalah :

- a) Risiko perfusijaringan serebral tidak efektif
- b) Pola napas tidak efektif
- c) Bersihan jalan napas tidak efektif
- d) Gangguan mobilitas fisik
- e) Hipertermia
- f) Kecemasan
- g) Defisit perawatan diri

Menurut Yusuf, 2019 diagnosis keperawatan yang muncul pada kasus cedera kepala adalah :

- a) Nyeri akut
- b) Pola napas tidak efektif
- c) Gangguan mobilitas fisik
- d) Kekurangan volume cairan

Berdasarkan beberapa referensi diatas diagnosis keperawatan yang dapat diangkat pada kasus cedera kepala yang terdapat pada (SDKI PPNI , 2016) adalah sebagai berikut:

- a) Pola Napas Tidak Efektif
- b) Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif
- c) Penurunan Kapasitas Adaptif Intra Kranial
- d) Hipertermia
- e) Defisit nutrisi
- f) Gangguan mobilitas fisik
- g) Defisit perawatan diri
- h) Risiko infeksi



## 2.2.4 Intervensi Keperawatan

Tabel 2.1 Intervensi Keperawatan

NO	DIAGNOSIS KEPERAWATAN	LUARAN KEPERAWATAN	INTERVENSI KEPERAWATAN
1	Pola Napas Tidak Efektif	<p><b>Pertukaran Gas</b>  <b>Tujuan:</b> Setelah dilakukan tindakan keperawatan ..... jam oksigenasi dan/atau eliminasi karbondioksida pada membran alveolus-kapiler Normal.  <b>Kriteria Hasil:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memburuk: 1</li> <li>2. Cukup memburuk: 2</li> <li>3. Sedang: 3</li> <li>4. Cukup membaik: 4</li> <li>5. Membaik: 5</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Batuk efektif</li> <li>b) Produksi sputum</li> <li>c) Mengi</li> <li>d) Sianosis</li> <li>e) Gelisah</li> <li>f) Pola napas</li> </ol>	<p><b>Manajemen Jalan Napas</b>  <b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor pola napas</li> <li>2. Monitor bunyi napas tambahan</li> <li>3. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma)</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertahankan kepatenan jalan napas</li> <li>2. Posisikan semi fowler atau fowler</li> <li>3. Lakukan fisioterapi dada, <i>jika perlu</i></li> <li>4. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik</li> <li>5. Berikan oksigen, <i>jika perlu</i></li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, <i>jika tidak kontraindikasi</i></li> </ol> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, <i>jika perlu</i></li> <li>2. Pemantauan Respirasi</li> </ol> <p><b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor pola nafas</li> <li>2. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas</li> <li>3. Monitor saturasi oksigen, monitor nilai AGD</li> <li>4. Monitor adanya sumbatan jalan nafas</li> <li>5. Monitor produksi sputum</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atur Interval pemantauan respirasi sesuai kondisi ps</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan</li> <li>2. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu</li> </ol>
2	Bersihkan Jalan Napas Tidak Efektif	<p><b>Pertukaran Gas</b>  <b>Tujuan:</b> Setelah dilakukan tindakan keperawatan ..... jam oksigenasi dan/atau eliminasi karbondioksida pada membran alveolus-kapiler Normal.</p> <p><b>Kriteria Hasil:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Memburuk: 1</li> <li>7. Cukup memburuk: 2</li> <li>8. Sedang: 3</li> <li>9. Cukup membaik: 4</li> <li>10. Membaik: 5</li> </ol> <p>g) Batuk efektif  h) Produksi sputum  i) Mengi  j) Sianosis  k) Gelisah  l) Pola napas</p>	<p><b>Manajemen Jalan Napas</b>  Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Monitor pola napas</li> <li>5. Monitor bunyi napas tambahan</li> <li>6. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma)</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pertahankan kepatenan jalan napas</li> <li>7. Posisikan semi fowler atau fowler</li> <li>8. Lakukan fisioterapi dada, <i>jika perlu</i></li> <li>9. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik</li> <li>10. Berikan oksigen, <i>jika perlu</i></li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, <i>jika tidak kontraindikasi</i></li> </ol> <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, <i>jika perlu</i></li> <li>4. Pemantauan Respirasi</li> </ol> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Monitor pola nafas</li> <li>7. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas</li> <li>8. Monitor saturasi oksigen, monitor nilai AGD</li> <li>9. Monitor adanya sumbatan jalan nafas</li> <li>10. Monitor produksi sputum</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Atur Interval pemantauan respirasi sesuai kondisi ps</li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan</li> <li>4. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu</li> </ol>
3	Penurunan Kapasitas Adaptif Intra Kranial	<p><b>Kapasitas Adaptif Intrakranial</b>  <b>Tujuan :</b> Setelah dilakukan tindakan keperawatan ..... jam kapasitas adaptif intracranial meningkat, dan</p>	<p><b>Manajemen Peningkatan Tekanan Intrakranial</b>  Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi penyebab meningkatkan TIK (mis, lesi, gangguan metabolisme, edema serebral)</li> </ol>

		<p>kesadaran meningkat</p> <p><b>Kriteria Hasil :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurun :1</li> <li>2. Cukup menurun : 2</li> <li>3. Sedang :3</li> <li>4. Cukup meningkat : 4</li> <li>5. Meningkat :5</li> </ol> <p>Tingkat Kedarasan Fungsi kognitif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkat :1</li> <li>2. Cukup meningkat:2</li> <li>3. Sedang:3</li> <li>4. Cukup menurun :4</li> <li>5. Menurun :5</li> </ol> <p>Sakit kepala Gelisah Agitasi Muntah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memburuk :1</li> <li>2. Cukup memburuk :2</li> <li>3. Sedang:3</li> <li>4. Cukup membaik : 4</li> <li>5. Membaik :5</li> </ol> <p>Tekanan darah Tekanan nadi Bradikardi Pola napas Respon pupil Reflex neurologis Tekanan intrakranial</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Monitor tanda dan gejala peningkatan TIK (mis, tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola napas irreguler, kesadaran menurun)</li> <li>3. Monitor MAP (<i>Mean arteri pressure</i>)</li> <li>4. Monitor CVP (<i>Central venous pressure</i>)</li> <li>5. Monitor ICP (<i>Intracranial pressure</i>)</li> <li>6. Menitor CPP (<i>Cerebral cranial pressure</i>)</li> <li>7. Monitor status pernapasan</li> <li>8. Monitor intake dan output cairan</li> <li>9. Monitor cairan serebro-spinal (mis, warna, konsistensi)</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang</li> <li>2. Berikan posisi semi- fowler</li> <li>3. Hindari manuver valsava</li> <li>4. Cegah terjadinya kejang</li> <li>5. Atur ventilator agar PaCO<sub>2</sub> optimal</li> <li>6. Pertahankan suhu tubuh normal</li> </ol> <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi pemberian sedasi dan anti konvulsan, jika perlu</li> <li>2. Kolaborasi pemberian deuretik osmosis, jika perlu</li> <li>3. Kolaborasi pemberian pelunak tinja, jika perlu</li> </ol>
--	--	--	--

4	Hipertermia	<p><b>Termoregulasi</b></p> <p><b>Tujuan:</b> Setelah dilakukan tindakan keperawatan ..... jam diharapkan suhu tubuh tetap berada pada rentang normal</p> <p><b>Kriteria Hasil:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan: 1</li> <li>2. Cukup meningkat: 2</li> <li>3. Sedang: 3</li> <li>4. Cukup menurun: 4</li> <li>5. Menurun: 5</li> </ol> <p>a) Mengigil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memburuk: 1</li> <li>2. Cukup memburuk: 2</li> <li>3. Sedang: 3</li> <li>4. Cukup membaik: 4</li> <li>5. Membaik: 5</li> </ol> <p>a) Suhu tubuh b) Suhu kulit</p>	<p><b>Manajemen Hipertermia</b></p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi penyebab hipertermia (mis. dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator)</li> <li>2. Monitor suhu tubuh</li> <li>3. Monitor kadar elektrolit</li> <li>4. Monitor haluaran urine</li> <li>5. Monitor komplikasi akibat hipertermia</li> </ol> <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sediakan lingkungan yang dingin</li> <li>2. Longgarkan atau lepaskan pakaian</li> <li>3. Basahi dan kipasi permukaan tubuh</li> <li>4. Berikan cairan oral</li> <li>5. Lakukan kompres pada dahi, dada, leher, abdomen atau aksila.</li> <li>6. Hindari pemberian antipiretik atau aspirin</li> <li>7. Berikan oksigen, jika perlu</li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan tirah baring</li> </ol> <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu</li> </ol>
5	Defisit nutrisi	<p><b>Status Nutrisi</b></p> <p>Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan ..... jam status nutrisi terpenuhi.</p> <p><b>Kriteria Hasil:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurun</li> <li>2. Cukup menurun</li> <li>3. Sedang</li> <li>4. Cukup meningkat</li> <li>5. Meningkatkan</li> </ol> <p>a) Porsi makanan yang dihabiskan</p> <p>b) Berat badan atau IMT</p>	<p><b>Manajemen Nutrisi</b></p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi status nutrisi</li> <li>2. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan</li> <li>3. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric</li> <li>4. Monitor asupan makanan</li> <li>5. Monitor berat badan</li> </ol> <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan oral hygiene sebelum makan, <i>Jika perlu</i></li> <li>2. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai</li> <li>3. Hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastric jika asupan oral dapat ditoleransi</li> </ol> <p>Edukasi</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Frekuensi makan</li> <li>d) Nafsu makan</li> <li>e) Cepat kenyang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan posisi duduk, jika mampu</li> <li>2. Ajarkan diet yang diprogramkan</li> </ul> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan</li> </ul>
6	Defisit perawatan diri	<p><b>Perawatan Diri</b>  Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan ..... jam diharapkan perawatan diri meningkat</p> <p><b>Kriteria Hasil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menurun: 1</li> <li>2. Cukup menurun: 2</li> <li>3. Sedang: 3</li> <li>4. Cukup meningkat: 4</li> <li>5. Meningkat: 5</li> <li>a) Kemampuan mandi</li> <li>b) Kemampuan mengenakan pakaian</li> <li>c) Kemampuan makan</li> <li>d) Kemampuan ke toilet (BAK dan BAB)</li> <li>e) Verbalisasi diri keinginan untuk melakukan perawatan diri</li> <li>f) Mempertahankan kebersihan mulut</li> </ul>	<p><b>Dukungan Perawatan Diri</b></p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia</li> <li>2. Monitor tingkat kemandirian</li> <li>3. Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan</li> </ul> <p>Terapeutik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sediakan lingkungan yang terapeutik</li> <li>2. Siapkan keperluan pribadi</li> <li>3. Dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri</li> <li>4. Fasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan</li> <li>5. Jadwalkan rutinitas perawatan diri</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan</li> </ul>
7	Risiko infeksi	<p><b>Tingkat Infeksi</b>  Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan ..... jam glukosa derajat infeksi menurun.</p> <p>Kriteria Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkat: 1</li> <li>2. Cukup meningkat: 2</li> <li>3. Sedang: 3</li> <li>4. Cukup menurun: 4</li> </ul>	<p><b>Pencegahan infeksi</b></p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor tanda gejala infeksi lokal dan sistemik</li> </ul> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Batasi jumlah pengunjung</li> <li>2. Berikan perawatan kulit pada daerah edema</li> <li>3. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</li> <li>4. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi</li> </ul>

	<p>5. Menurun: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Demam</li> <li>b) Kemerahan</li> <li>c) Nyeri</li> <li>d) Bengkak</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memburuk: 1</li> <li>2. Cukup memburuk: 2</li> <li>3. Sedang: 3</li> <li>4. Cukup membaik: 4</li> <li>5. Membaik: 5</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kadar sel darah Putih</li> </ul>	<p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan tanda dan gejala infeksi</li> <li>2. Ajarkan cara memeriksa luka</li> <li>3. Anjurkan meningkatkan asupan cairan</li> </ul> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi pemberian imunisasi, <i>Jika perlu</i></li> </ul>
--	---	--

### 2.3 Konsep Teori Keperawatan

Teori keperawatan yang digunakan dalam analisis kasus ini adalah teori Virginia Henderson yaitu 14 kebutuhan dasar manusia dalam memberikan asuhan keperawatan yang telah di tuangkan dalam buku Falsafah Dan Teori Keperawatan Dalam Integrasi Keilmuan (Risnah & Muhammad Irwan, 2021) Henderson menegaskan pentingnya seni dalam keperawatan dan mengenalkan 14 kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar asuhan keperawatan. Sebagaimana dalam buku Virginia Henderson berjudul *The Nature of Nursing: A Definition and Its Implications for Practice, Research, and Education*, yang memperkenalkan 14 kebutuhan dasar manusia yang merupakan dasar untuk dikatakan sehat dan harus diaplikasikan dalam pemberian asuhan keperawatan:

1. Kebutuhan oksigen yang terpenuhi secara alami tanpa bantuan alat pernapasan (bernafas secara alami)
2. Terpenuhinya kebutuhan nutrisi dan cairan yang dibutuhkan tubuh.
3. Proses pengeluaran hasil absorpsi tubuh atau yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh secara alami tanpa keluhan dan tanpa bantuan.
4. Melakukan aktivitas tubuh secara alami tanpa bantuan dan mempunyai bentuk tubuh yang ideal
5. Terpenuhinya kebutuhan istirahat dan tidur secara alami

6. Mampu menyesuaikan diri dalam menggunakan pakaian dan mampu mengganti dan berhias diri secara mandiri.
7. Mampu menjaga kestabilan suhu tubuh dan mengatasi dengan menggunakan terapi nonfarmakologi.
8. Mampu melakukan personal heigiene secara mandiri tanpa bantuan orang lain atau orang terdekat.
9. Menjahui lingkungan atau aktivitas yang bisa merugikan atau membahayakan dirinya orang lain dan masyarakat.
10. Mampu bekromunikasi dengan baik pada diri sendiri, orang lain dan masyarakat serta dapat mengeluarkan pendapat dan memberi balasan orang lain
11. Mampu melakukan kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya dan mempunyai jiwa spiritual yang tinggi
12. Mampu bekerja sama dengan orang lain, berkarir dan mendapatkan prestasi atau penghargaan atas jasanya
13. Mampu berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan memanfaatkan waktu luang untuk liburan
14. Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi seperti melakukan proses belajar apa yang terjadi pada dirinya dan mampu memenfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia

Dalam keempat belas kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi menurut Virginia henderson terbagi menjadi empat kategori, yaitu kebutuhan biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual

kebutuhan dasar pada nomor 1-9 adalah komponen kebutuhan biologis, nomor 10 dan 14 adalah komponen kebutuhan psikologis, nomor 11 adalah kebutuhan spiritual, nomor 12 dan 13 adalah komponen kebutuhan sosiologis. Selain itu, Henderson juga menyatakan bahwa pikiran dan tubuh manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain (inseparable). Sama halnya dengan pasien dan keluarga, mereka merupakan satu kesatuan (unit) yang harus satu karena keluarga klien dapat membantu seorang perawat atau tenaga medis untuk menggali lebih dalam masalah yang ada pada pasien dan membantu proses penyembuhan melalui semangat dan keikutsertaannya dalam melakukan perawatan kepada keluarga klien sehingga penyembuhan klien lebih cepat.

Menurut Virginia Henderson ada tiga tahap hubungan perawat dengan pasien, yaitu saat perawat berperan sebagai pengganti keluarga, penyelamat, dan mitra bagi pasien. Melalui proses interpersonal, perawat harus mempunyai instin, komunikasi yang baik dan hubungan yang baik kepada pasiennya untuk menggali lebih dalam bantuan apa yang dibutuhkan klien. Walaupun fungsi perawat dan dokter saling berkaitan dan Henderson mempercayai itu, tetapi ia kembali menegaskan bahwa perawat bekerja saling ketergantungan dengan tenaga kesehatan profesional lainnya juga pasien dan keluarga (Yani Achir, 2018: dalam Risnah, 2021)

Perawat berperan sebagai pengganti dalam upaya memenuhi

kebutuhan pasien karena berkurangnya kekuatan dan kemampuan fisik pasien dalam situasi darurat. Dalam hal ini, perawat berperan sebagai “pelengkap”. Pasien berada dalam fase pemulihan setelah keadaan darurat berlalu. Perawat memiliki peran membantu yang membantu pasien mendapatkan kemandirian. Kemandirian itu relatif, karena tidak ada manusia yang tidak bergantung pada orang lain. Meskipun demi meningkatkan kesehatan pasien, perawat berusaha keras untuk saling bergantung, yang pada kenyataannya manusia adalah makhluk simbiosis mutualisme. Meskipun klien memiliki diagnosis yang berbeda, keduanya memiliki kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi dan kebutuhan dasar berubah berdasarkan kondisi patologis dan faktor lain seperti usia, karakter, keadaan emosi, status sosial atau budaya, dan kekuatan fisik dan intelektual.

Teori henderson berkaitan dengan ilmu keperawatan dalam memberi asuhan keperawatan yang merupakan tugas utama perawat. Manfaat dari asuhan keperawatan ini dapat dilihat dari perubahan kesehatan klien dari sakit menjadi sehat, yang awalnya mengalami ketergantungan pada orang lain hingga pada akhirnya menjadi mandiri dalam merawat diri. Perawat melakukan tugasnya membantu pasien dengan melakukan pengkajian, merencanakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi hal yang terjadi pada pasien setelah diberikan asuhan keperawatan berdasar pada 14 komponen kebutuhan dasar manusia (Asmadi, 2008 dalam: Risnah, 2021)

Pada tahapan pengkajian, perawat menilai 14 kebutuhan dasar manusia yang ada pada pasien, setelah selesai dikumpulkan data yang perawat peroleh melalui metode observasi, indera penciuman, peraba, dan pendengaran, jika telah selesai, selanjutnya perawat mengkategorisasikan data, mengklasifikasikan data dan menganalisis data serta melakukan penegakan diagnosis keperawatan berdasarkan masalah yang didapatkan pada proses pengkajian.

Pada tahap perencanaan, perawat melakukan penyusunan rencana kebutuhan yang disesuaikan pada kebutuhan atau masalah yang akan diatasi, termasuk rencana perbaikan apabila didapatkan adanya masalah kesehatan, dan dokumentasi bagaimana perawat melakukan upaya dalam membantu individu kelompok dan lingkungan di saat kondisi sehat atau sakit.

Pada tahap implementasi, dilaksanakan berdasarkan apa yang telah direncanakan ditahap intervensi dalam membantu individu memenuhi kebutuhan yang bermasalah dan setelah selesai melakukan proses implementasi maka dilakukan evaluasi untuk melihat apakah masalah sudah teratasi atau masih memerlukan tindakan lanjutan atau intervensi lanjutan serta mendokumentasikan apa yang telah dilakukan untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah kita lakukan agar dikemudian hari akan melindungi kita dari jeratan hukum apa bila ada keluarga pasien yang komplain terhadap tindakan yang kita lakukan.

## 2.4 Evidence Based Practice Nursing (EBPN)

Evidence Based Nursing dalam analisis kasus *pasien traumatic brain injury post op craniotomy* dengan masalah hipertermia adalah kompres hangat yang efektif menurunkan suhu tubuh klien berdasarkan apa yang telah dilakukan pada klien yang mengalami hipertermi. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian kompres hangat untuk mengatasi hipertermi pada pasien trauma kepala dengan masalah hipertermi dengan beberapa kelompok usia mulai dari umur 5 tahun sampai dengan umur > 50 tahun (Ika Rahmawati & Yosep 2018) selain itu banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengatasi hipertermi seperti penelitian yang telah dilakukan (Kurnia Dewi Annisa, 2019) yang melakukan penelitian kompres hangat pada anak untuk mengatasi hipertermi dan terbukti kompres hangat dapat menurunkan hipertermi dan masih banyak lagi penelitian-penelitian yang memberikan kompres hangat pada pasien yang mengalami masalah hipertermi. Berikut SOP terkait dengan kompres hangat:

### 2.4.1 Pengertian

Kompres hangat adalah tindakan yang dilakukan dengan menempelkan handuk atau spons yang di peras dengan dengan air hangat pada bagian tubuh tertentu pasien seperti, frontalis dan aksila, untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman, menurunkan suhu tubuh, mengurangi nyeri, melancarkan aliran darah kebagian tubuh yang mengalami cedera dan mencegah terjadinya spasme otot. Dan

kompres air hangat merupakan salah satu terapi non farmakologi.

#### 2.4.2 Tujuan

- a. Memperlancar sirkulasi darah
- b. Mengurangi nyeri
- c. Merangsang peristaltik usus
- d. Memperlancar pengeluaran getah radang (eksudat)
- e. Menurunkan suhu tubuh

#### 2.4.3 Indikasi

Kompres hangat diberikan pada pasien:

- a. Pasien yang mengalami peningkatan suhu tubuh
- b. Cedera lama atau kondisi kronis
- c. Pengobatan nyeri dan merelaksasikan otot-otot yang tegang
- d. Perut kembung dan radang sendi

#### 2.4.4 Kontraindikasi

Kondisi yang tidak bisa di berikan kompres hangat:

- a. Radang kulit
- b. Dermatitis atau luka terbuka
- c. Mati rasa
- d. Neuropati perifer yang menyebabkan individu tidak peka terhadap rasa panas

#### 2.4.5 Prosedur Pemberian Dan Rasional

Cara pemberian kompres hangat:

- 1) Persiapkan bahan kompres hangat:

- a. Baskom berisi air hangat
- b. Handuk/botol atau spons
- c. Termometer/ pengukur suhu
- d. Jam tangan

2) Prosedur kerja

- a. Tempelkan pada bagian tubuh yaitu aksila, atau dahi dengan kain atau handuk yang telah di rendam kedalam air hangat dengan temperatur 40-50 derajat celsius yaitu terasa hangat, untuk mengukurnya dapat dicoba pada siku terlebih dahulu. Jangan sampai terlalu panas atau sesuaikan panasnya dengan kenyamanan yang akan dikompres
- b. Peras kain yang akan digunakan untuk mengompres. Jangan terlalu basah
- c. Lama kompres sekitar 10-20 menit dan dapat di perpanjang . Dampak fisiologi dari kompres hangat adalah pelunakan jaringan fibrosa membuat otot tubuh lebih rileks, menurunkan suhu tubuh, menghilangkan rasa nyeri serta memperlancar aliran darah.

## 2.4.6 Artikel Utama dan Pendukung

No	Penulis	Judul Penelitian	Referensi	Metode	Sampel	Hasil Penelitian
1	Ika Rahmawati, Yoseph Agung	Kompres Hangat Sebagai Penurun Suhu Tubuh Pasien Trauma Kepala	Adi Husada Nursing Journal, Vol.4, No.2, Desember 2018 Program studi profesi ners fakultas ilmu kesehatan institut ilmu kesehatan bhakti wiyata kediriika_rahma23@yahoo.com	Desain penelitian yang digunakan adalah quasy eksperimental. Alat ukur yang digunakan adalah lembar observasi.	Tehnik sampling yang digunakan adalah accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 20 responden	Hasil analisis menggunakan uji mann whitney menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang artinya kompres hangat efektif untuk menurunkan suhu tubuh pasien trauma kepala. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kompres hangat dapat digunakan sebagai penurun suhu tubuh pasien trauma kepala.
2	Fadli Akmal Hasan	Pengaruh Kompres Hangat Terhadap Perubahan Suhu Tubuh Pada Pasien Febris	Jurnal ilmiah kesehatan pencerah volume 7 nomor 2 bulan desember tahun 2018 . issn:2089-9394	Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain quasi eksperimen dengan rancangan pre and post test design	Sampel pada penelitian ini adalah pasien anak yang mengalami febris di ruang instalasi gawat darurat dengan jumlah sampel	Hasil penelitian dengan uji kolmogorov-smirnov z didapat nilai pre p=0,62 dan untuk post p=0,54. Dengan tingkat kemaknaan $p > \alpha$ (0,05) yang dimana $p > \alpha$ (0,05) berarti uji normalitas data berdistribusi normal maka dari itu dilakukan

					sebanyak 17 orang. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling	uji paired t test, dengan hasil $p=0,0001$ dengan tingkat kemaknaan $p$
3	Kurnia Dewi Anisa	Efektifitas Kompres Hangat Untuk Menurunkan Suhu Tubuh Pada An.D Dengan Hipertermia The Effectiveness Of Warm Compress To Reduce Body Temperature In An.D With Hipertermia	Jurnal ilmiah ilmu kesehatan: wawasan kesehatan, p-issn 2087-4995, e-issn 2598-4004 Volume 5, nomor 2 januari 2019 doi: 10.33485/jiik-wk.v5i2.112	Penelitian ini menggunakan metode studi kasus deskriptif yaitu dengan cara perawatan selama bertahap dan teratur kepada klien.	Penelitian ini merupakan perawatan terhadap klien berumur 11 tahun dan berjenis kelamin perempuan yang mengalami demam tinggi.	Hasil perawatan menunjukkan bahwa terjadi penurunan setelah dilakukan kompres air hangat sesuai target yang ingin dicapai. Dapat disimpulkan bahwa kompres air hangat efektif menurunkan demam pada klien di rsud temanggung.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Studi Kasus**

Menurut (Hidayat, 2019) studi kasus (*Case Studies*) ialah bagian dari metodologi penelitian, atau sering dibahasakan bahwa peneliti dituntut agar lebih cermat, teliti untuk mengungkapkan suatu kasus atau peristiwa, baik kasus perseorangan maupun berkelompok. Pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini jenis penelitian yang penulis digunakan ialah “Studi Kasus” dimana dalam pelaksanaannya yaitu dengan melakukan asuhan keperawatan pada pasien yang sedang menjalankan proses perawatan di rumah sakit.

#### **3.2 Subjek Studi Kasus**

Dalam studi kasus ini subjek yang digunakan adalah bersifat individu atau pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

1. Kriteria inklusi ialah suatu karakteristik umum dalam subjek penelitian dari suatu populasi target yang bisa dijangkau dan diteliti (Nursalam, 2017)
  - a. Pasien mengalami masalah hipertermia
  - b. Pasien yang sedang menjalankan proses rawat inap di rumah sakit
2. Kriteria eksklusi ialah menghapus atau mengeluarkan subjek tidak memenuhi kriteria inklusi.
  - a. Pasien yang tidak mengalami gejala hipertermia

### 3.3 Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus pada penelitian ini ialah melakukan asuhan keperawatan pada pasien *traumatic brain injury*/ cedera otak traumatik dengan hipertermia menggunakan kompres hangat

### 3.4 Instrumen Studi Kasus

Menurut (Sugiyono, 2014), instrumen peneliti diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang akan diamati. Dalam studi kasus ini instrumen yang digunakan berupa alat yaitu termometer manual, dimana alat ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh pasien atau responden baik sebelum dan setelah intervensi diberikan.

### 3.5 Prosedur Pengambilan Data

1. Tahap persiapan
  - a. Peneliti mengajukan judul terkait studi kasus yang akan diteliti, kemudian mengajukan intervensi berbasis *Evidence based practice nursing* (EBPN) kepada pasien yang telah dipilih, berdasarkan hasil diskusi dengan pembimbing insitisi.
  - b. Peneliti melakukan koordinasi kepada kepala ruangan tempat pasien dirawat inap yaitu ruang *Intensive care unit* (ICU) RSUD Labuang Baji Kota Makassar, serta menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan.
  - c. Peneliti menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam melakukan kompres hangat

## 2. Pengumpulan data

Pengumpulan data diperoleh melalui metode observasi dan wawancara

## 3. Penyusunan laporan

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah yang telah dianjurkan oleh institusi dalam hal ini Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prodi Ners.

### **3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus**

Penelitian ini dilakukan di RSUD Labuang Baji Makassar, tepatnya di ruang *Intensive Care Unit* (ICU), dan dilakukan pada tanggal 13-15 September 2021

### **3.7 Analisis Data dan Penyajian Data**

Analisis data dilakukan saat peneliti berada dilapangan atau ruang perawatan, pada saat pengumpulan sampai keseluruhan data terkumpul. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta, membandingkan dengan teori yang kemudian akan dituangkan melalui opini pada bagian pembahasan. Teknik yang digunakan yaitu dengan menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf berdasarkan jawaban yang telah diperoleh dari hasil observasi ataupun wawancara, serta dokumentasi yang kemudian akan dipresentasikan oleh peneliti untuk memberikan intervensi terkait masalah yang ditemukan. Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data dimana data yang disajikan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan hasil intervensi yang telah dilakukan peneliti kepada pasien.

### 3.8 Etika Studi Kasus

Dalam penelitian studi kasus ini peneliti menekankan beberapa prinsi etik dalam keperawatn yaitu menurut (Notoatmojo, 2012) :

#### 1. *Autonomy* (Otonomi/ keyakinan)

Peneliti menerapkan prinsip otonomi bahwa seseorang/ pasien memiliki keyakinan, keputusan, ataupun pilihan sendiri untuk memberi persetujuan kepada peneliti dalam memberikan tindakan. Dalam hal ini persetujuan tindakan yang akan diberikan kepada pasien telah melalui *Informed consent* (izin) kepada pasien ataupun keluarga pasien untuk dilakukan kompres hangat.

#### 2. *Non malaficence* (Tidak merugikan)

Peneliti menerapkan prinsip tidak merugikan, dimana selama proses perawatan atau pemberian intervensi kompres hangat peneliti tidak akan memberikan kerugian kepada pasien dalam hal ini, dapat memperburuk keadaan pasien baik secara fisik maupun psikologi.

Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Al-Qashash/28 : 77

(وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ انْتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنْ

الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

Terjemahnya :

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.

Dalam tafsir Ibn Katsir dalam Tafsir Al- Qur'an Al-‘Adzim menafsirkan ayat diatas agar kita selalu menggunakan harta dan nikmat sebagai bekal bentuk ketaatan dan untuk mendekati diri kepada Allah dengan mengerjakan berbagai macam kebaikan diakhirat. Diperbolehkan kepadamu oleh Allah untuk makan, minum, pakain, rumah dan nikah. Sebab engkau punya kewajiban terhadap Tuhanmu, dirimu, dan keluargamu. Maka penuhlah kewajiban tersebut. Serta berbuat baiklah kepada sesama makhluk sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Janganlah engkau berkeinginan untuk berbuat kerusakan dimuka bumi dan jangan pula berbuat jahat kepada ciptaan-Nya.

### 3. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Peneliti menerapkan prinsip kerahasiaan dimana informasi pasien dijaga kerahasiaanya dalam hal ini penggunaan nama diubah menjadi inisial pasien, sehingga tidak akan ada dari pihak manapun yang akan mengetahui identitas pasien.

**BAB IV**  
**LAPORAN KASUS**

**4.1 Pengkajian**

1. Primary Survey

Inisial pasien : Tn. A

Umur : 20 Tahun

Jenis kelamin : Laki- laki

No RM : 39 59 81

Inisial Keluarga : Nn. A (kakak pasien)

Agama : Islam

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl Urip Sumoharjo LR 4

No Telpon : 083 131 \*\*\* \*\*

Tanggal pengkajian : Senin, 13 September 2021

Jam masuk ruangan : 21.00

Kendaraan : Ambulans

Diagnosa Medis : Post Op Craniactomy (Traumatik Brain Injury)

Keluhan utama : Penurunan kesadaran , masuk ICU GCS 3

Riwayat penyakit : Keluarga pasien mengatakan Tn. A dibawa ke Rumah sakit karena terkena busur dikepala, sebelumnya pasien dibawa di Rumah sakit Ibnu Sina, untuk mendapat

tindakan medis, namun karena ketidaksiapan dari pihak RS, pasien selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Labuang Baji. Sebelumnya pasien masuk di ruang ICU lalu kemudian masuk ke ruang operasi untuk tindakan *craniotomy* (pelepasan busur dikepala), dan kemudian kembali masuk ICU setelah operasi. Pasien masuk dalam keadaan tidak sadar, tidak ada respon, terintubasi, dan berdasarkan laporan operasi pasien mengalami demam post operasi yaitu 38,3°c, kemudian di ICU dipasang ventilator, terpasang kateter urine, infus Sanbe RL 500 ml IV di tangan kanan, terpasang Syringpump Fentanyl 5,00 ml/h dan Milos 3,00 ml/h IV di kaki kanan.

Orientasi : Tidak ada

#### 1. Airway

Pasien terintubasi ETT bernapas dengan bantuan ventilator di mode VCV (Volume Control Ventilator)

Suaran napas : Vesikuler

Suara napas tambahan : Tidak ada

#### 2. Breathing

- a. Pola napas : Normal dengan ventilator
- b. Frekuensi napas : 19x/ i
- c. Bunyi napas : Vesikuler
- d. Irama napas : Reguler
- e. Distress pernapasan : Tidak ada
- f. Jenis pernapasan : Pernpasan dada dengan ventilator

### 3. Circulation

- a. Akral : Hangat
- b. Suhu : 38,3° C
- c. Pucat : Ya
- d. Sianosis : Tidak
- e. Pengisian kapiler : < 2 dtk
- f. Frekuensi nadi : 114 x/i
- g. Irama nadi : Irreguler
- h. Kekuatan nadi : Teraba kuat
- i. TD : 152/ 95 mmHg
- j. Kelembaban kulit : Kering
- k. Turgor kulit : Kurang

### 4. Disability

- a. Tingkat kesadaran : Menurun
- b. GCS : E1 M1 V1 (3 koma )
- c. Pupil : Isokor

## d. Ekstremitas

- a. Motorik : Tidak ada
- b. Sensorik : Tidak ada

## 5. Exposure

- a. Adanya luka bekas operasi pada bagian kepala, pada os temporal sinistra, nampak dibalut verban putih.
- b. Ukuran kedalaman luka sepanjang 12,48 cm busur menembus kepala os temporal sampai melewati batang otak.

## 2. Secondary Survey

Alergies : Keluarga pasien mengatakan bahwa, Tn.A tidak memiliki riwayat alergi

Medication : Terpasang infus IV RL 18 tmp ditangan kanan,  
: Terpasang syringpump Fentanyl 5,00 ml/h dan

Milos 3,00 ml/h dikaki kanan, Metrodinazole

Otsu Manytol 20% 20 tpm

Amlodipine 10 mg via NGT

IV bolus : Seftriaxone Sodium 1 g

: Tranexamic Acid 500 mg/ 5 ml

: Atracurium besylate 10 mg/ ml

## Laporan Operasi

Jenis Anastesi : General Anastesi

Diagnose pre operasi : *Intrcranial penetrating injury*

Diagnose post operasi : *Intrcranial penetrating injury* (Besar)

Nama Operasi : *Craniotomy removal corpus alienum*

Tanggal operasi : 13-09-2021

### 3. Pemeriksaan Fisik

#### a. Kepala dan leher

Hematoma/ Post trauma : ada

Kepala gundul dan bulat, nampak luka bekas operasi dibalut perban putih

#### b. Mata

Pupil Isokor

Diameter 3,0 mm

Sklera putih

Konjungtiva tampak anemis, kelopak mata bengkak

#### c. Telinga

Tidak nampak serumen

Tidak terpasang alat bantu dengar

#### d. Pipi

Nampak bengkak, dan terdapat bekas- bekas jerawat

#### e. Hidung

Tidak tampak penapasan cuping hidung

Nampak terpasang kateter NGT (Naso Gastric Tube)

#### f. Bibir dan mulut

Bibir nampak pucat namun tidak sianosis

Mukosa bibir kering

Tampak terpasang Endotracheal tube (ETT) yang terhubung dengan Ventilator

g. Leher

Tidak nampak adanya pembesaran kelenjar tyroid, nadi karotis teraba sedang

h. Pre Kardium

Inspeksi : Ictus cordis terlihat diinterkosta 4-5, tidak ada luka atau jejas

Palpasi : Ictus cordis teraba di ICS 4-5

Perkusi : Redup

Auskultasi : Tidak ada bising jantung, bunyi s1 lup dan s2 dub

i. Pulmonal

Inspeksi : Tidak nampak adanya retraksi dada, dada simetris kiri dan kanan

Palpasi : Tidak teraba adanya krepitasi, tidak ada jejas atau luka

Perkusi : Sonor

Auskultasi : Vesikuler dengan ventilator, tidak ada suara napas tambahan

j. Abdomen

Inspeksi : Abdomen tampak buncit, tidak ada jejas atau luka

Auskultasi : Peristaltik usus redup

Perkusi : Timpani

Palpasi : Tidak ada massa

k. Ekstremitas

Superior : Tidak ada edema, akral hangat, tampak terpasang infus pada tangan kanan dan kiri

Kekuatan otot :  $\frac{1}{1} \quad \frac{1}{1}$

Inferior : Tidak ada edema, akral hangat, terpasang infus pada kaki kanan

Kekuatan otot :  $\frac{1}{1} \quad \frac{1}{1}$

l. Nutrisi

Antropometri

BB : 75 kg (sebelum dirawat)

TB : 167 cm

IMT : 27,2 (Overweight)

m. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan radiologi

- 1) Corpus alienum densitas metal sepanjang  $\pm 12,48$  cm menembus regio temporalis sinistra kearah posteriolateral.
- 2) Carvaria crani dan tulang- tulang wajah tidak tampak fraktur
- 3) Sinur paranasal bersih

## Pemeriksaan Laboratorium

Tabel 4. 1 Pemeriksaan Laboratorium

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
<b>Kimia Darah</b>			
Ureum	32,8	<50	mg/ dl
Kreatinin	1,08	L 0,7-1	mg/ dl
Glukosa D. Sewaktu	162	<200	mg/ dl
<b>Kimia Klinik</b>			
Natrium	140	133-145	mea/l
Kalium	4,2	3,5-50	mea/l
Klorida	106	96-10,6	
<b>Darah Rutin</b>			
HGB	13,1	8.0-17.0	g/dl
LVMPH	0,92-6,7%	20,0-50,0	%
NEUT	12,16	1,50-7,00	%
WBC	13,74	5.00-10.00	l <sup>o</sup> 3/dl
MOND	0,64	0,00-0,40	%

Tabel 3.2 Analisa Data

NO	DATA	ETIOLOGI	MASALAH
1	<p>DS:</p> <p>1. Keluarga pasien mengatakan Tn. dibawa ke Rumah sakit karena terkena busur dikepala</p> <p>DO :</p> <p>2. Berdasarkan catatan operasi bahwa dikepala pasien terjadi robekan pada otak menyebabkan pecahnya pembuluh darah akibat benturan benda tajam yaitu busur sepanjang 12, 48 cm, mengakibatkan perdarahan atau intraserebral hematoma.</p> <p>3. Pasien masuk ICU dalam keadaan tidak sadar</p> <p>4. Tidak ada respon,</p> <p>5. Terintubasi, dan di ICU dipasang ventilator</p> <p>6. TTV            TD : 152/ 95 mmHg            N : 114x/i            S : 38,3°C            P : 19x/I dengan ventilator mode Volume Control Ventilator (VCV)            SPO2 : 100% dengan ventilator</p> <p>7. Kesadaran : Koma</p> <p>8. GCS : E1 M1 V1 (3)</p>	<p>Trauma kepala / cedera kepala</p> <p>↓</p> <p>Benda tajam menembus dan merobek pembuluh darah otak</p> <p>↓</p> <p>Perdarahan</p> <p>↓</p> <p>Pembengkakan/ edema</p> <p>↓</p> <p>Peningkatan TIK</p> <p>↓</p> <p>Kranial tidak mampu mengkompensasi peningkatan TIK</p> <p>↓</p> <p>Penurunan kapasitas adaptif intracranial</p>	<p>Penurunan kapasitas adaptif intrakranial</p>
2	<p>DS :-</p> <p>DO :</p> <p>1. Nampak retraksi otot pernapasan</p> <p>2. Nampak</p>	<p>Truma kepala/ cedera kepala</p> <p>↓</p> <p>Trauma tajam menembus otak</p>	<p>Pola napas tidak efektif</p>

	<p>penurunan kesadaran</p> <p>3. Nampak terintubasi, terpasang ventilator mode vcv</p>	<p>↓</p> <p>Terjadi kerusakan saraf pusat</p> <p>↓</p> <p>Gangguan neurologis</p> <p>↓</p> <p>Penurunan kesadaran</p> <p>Ketidakmampuan inspirasi dan ekspirasi memberikan ventilasi adekuat</p> <p>↓</p> <p>Pola napas tidak efektif</p>	
3	<p>DS : -</p> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan teraba hangat</li> <li>2. Suhu tubuh 38,3°c</li> <li>3. TTV</li> </ol> <p>TD : 152/95 mmHg</p> <p>Nadi : 114 x/i</p> <p>RR : 21 x/i</p>	<p>Trauma kepala/ cedera kepala</p> <p>↓</p> <p>Trauma tajam menembus otak</p> <p>↓</p> <p>Menembus hipotalamus</p> <p>↓</p> <p>Terjadi robekan dan edema serebral</p> <p>↓</p> <p>Gangguan termoregulasi, proses infeksi</p> <p>↓</p> <p>Suhu tubuh meningkat diatas normal</p> <p>↓</p> <p>Hipertermia</p>	Hipertermi

#### 4.2 Diagnosis Keperawatan

1. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema serebral ditandai dengan tingkat kesadaran menurun
2. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis ditandai dengan dipsnea
3. Hipertermia berhubungan dengan kerusakan termoregulasi, respon trauma, proses infeksi, ditandai dengan suhu tubuh meningkat diatas nilai normal



### 4.3 Intervensi Keperawatan

**Tabel 4.3 Intervensi Keperawatan**

NO	DIAGNOSIS KEPERAWATAN	LUARAN KEPERAWATAN	INTERVENSI KEPERAWATAN
1	Penurunan Kapasitas Adaptif Intra Kranial	<p><b>Kapasitas Adaptif Intrakranial</b></p> <p><b>Tujuan :</b> Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam kapasitas adaptif intracranial meningkat, dan kesadaran meningkat</p> <p><b>Kriteria Hasil :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurun : 1</li> <li>2. Cukup menurun : 2</li> <li>3. Sedang : 3</li> <li>4. Cukup meningkat : 4</li> <li>5. Meningkatkan :5</li> </ol> <p>Tingkat Keadasaran Fungsi kognitif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan :1</li> <li>2. Cukup meningkat:2</li> <li>3. Sedang:3</li> <li>4. Cukup menurun :4</li> <li>5. Menurun :5</li> </ol> <p>Sakit kepala Gelisah Agitasi Muntah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memburuk :1</li> </ol>	<p><b>Manajemen Peningkatan Tekanan Intrakranial</b></p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi penyebab peningkatan TIK (mis, lesi, gangguan metabolisme, edema serebral)</li> <li>2. Monitor tanda dan gejala peningkatan TIK (mis, tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola napas irreguler,kesadaran menurun)</li> <li>3. Monitor MAP (<i>Mean arteri presure</i>)</li> <li>4. Monitor CVP (<i>Central venous presure</i>)</li> <li>5. Monitor ICP (<i>Intracranial presure</i>)</li> <li>6. Menitor CPP (<i>Cerebral cranial presure</i>)</li> <li>7. Monitor status pernapasan</li> <li>8. Monitor intake dan output cairan</li> <li>9. Monitor cairan serebro-spinal (mis,warna, konsistensi)</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang</li> <li>2. Berikan posisi semi- fowler</li> <li>3. Hindari manuver valsava</li> <li>4. Cegah terjadinya kejang</li> <li>5. Atur ventilator agar PaCO<sub>2</sub> optimal</li> <li>6. Pertahankan suhu tubuh normal</li> </ol> <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi pemberian sedasi dan anti konvulsan, jika perlu</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Cukup memburuk :2</li> <li>3. Sedang:3</li> <li>4. Cukup membaik : 4</li> <li>5. Membaik :5</li> </ol> <p>Tekanan darah Tekanan nadi Bradikardi Pola napas Respon pupil Reflex neurologis Tekanan intrakranial</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kolaborasi pemberian deuretik osmosis, jika perlu</li> <li>3. Kolaborasi pemberian pelunak tinja, jika perlu</li> </ol>
2	Pola Napas Tidak Efektif	<p><b>Pertukaran Gas</b> <b>Tujuan:</b> Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam oksigenasi dan/atau eliminasi karbondioksida pada membran alveolus-kapiler Normal. <b>Kriteria Hasil:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memburuk: 1</li> <li>2. Cukup memburuk: 2</li> <li>3. Sedang: 3</li> <li>4. Cukup membaik: 4</li> <li>5. Membaik: 5</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Batuk efektif</li> <li>b. Produksi sputum</li> <li>c. Mengi</li> <li>d. Sianosis</li> <li>e. Gelisah</li> <li>f. Pola napas</li> </ol>	<p><b>Manajemen Jalan Napas</b> Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor pola napas</li> <li>2. Monitor bunyi napas tambahan</li> <li>3. Monitor sputum (jumlah,warna,aroma)</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertahankan kepatenan jalan napas</li> <li>2. Posisikan semi fowler atau fowler</li> <li>3. Lakukan fisioterapi dada, <i>jika perlu</i></li> <li>4. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik</li> <li>5. Berikan oksigen, <i>jika perlu</i></li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, <i>jika tidak kontraindikasi</i></li> </ol> <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, <i>jika perlu</i></li> </ol>

3	Hipertermia	<p><b>Termoregulasi</b>  <b>Tujuan:</b> Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x8 jam diharapkan suhu tubuh tetap berada pada rentang normal  <b>Kriteria Hasil:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkat: 1</li> <li>2. Cukup meningkat: 2</li> <li>3. Sedang: 3</li> <li>4. Cukup menurun: 4</li> <li>5. Menurun: 5</li> <li>6. Memburuk: 1</li> <li>7. Cukup memburuk: 2</li> <li>8. Sedang: 3</li> <li>9. Cukup membaik: 4</li> <li>10. Membaik: 5</li> </ol> <p>Suhu tubuh Suhu kulit</p>	<p><b>Manajemen Hipertermia</b>  <b>Observasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi penyebab hipertermia (mis. dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator)</li> <li>2. Monitor suhu tubuh</li> <li>3. Monitor kadar elektrolit</li> <li>4. Monitor haluaran urine</li> <li>5. Monitor komplikasi akibat hipertermia</li> </ol> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sediakan lingkungan yang dingin</li> <li>2. Longgarkan atau lepaskan pakaian</li> <li>3. Basahi dan kipasi permukaan tubuh</li> <li>4. Berikan cairan oral</li> <li>5. Hindari pemberian antipiretik atau aspirin</li> <li>6. Berikan oksigen, jika perlu</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan tirah baring</li> </ol> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu</li> </ol>
---	-------------	--	---

#### 4.4 Implementasi Keperawatan

**Tabel 4.4 Implementasi Keperawatan**

NO	DIAGNOSIS KEPERAWATAN	HARI/ TANGGAL/ JAM	IMPLEMENTASI	NAMA JELAS
1	Penurunana kapasitas adaptif intrakranial	Senin, 13 September 2021 21.30  21.35  21. 40  21.50	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK Hasil : Nampak kepala pasien dibalut verban, post op cariactomy dan berdasarkan catatan hasil operasi bahwa pasien mengalami edema serebral karena intraserebral hematoma</li> <li>2. Memonitor tanda dan gejala TIK Hasil : TD : 152/95 mmHg Nadi : 114x/i RR : 21x/i Terjadi penurunan kesadaran</li> <li>3. Memonitor status pernapasan Hasil : Penapasan 21 x/i dengan ventilator</li> <li>4. Memonitor intake dan output cairan Hasil :Terpasang infus RL 18 tpm pada tangan kanan Terpasang monitol 20% 20 tpm Terpasang Fentanil 5.00 w/h via Syiringpump pada tangan kanan Terpasang mylos 3.00 w/h via syiringpump Terpasang cateter urine setiap 1 jam urine bag terisi 1800 cc/jam</li> <li>5. Mengatur ventilator optimal Hasil : Terpasang ventilator mode VCV</li> <li>6. Mempertahankan suhu tubuh Hasil : Melepas pakaian pasien dan melakukan kompres hangat</li> <li>7. Mengkolaborasi pemberian sedasi</li> </ol>	Putri Yuniar

			<p>Hasil : Memasang Mylos 3.00 w/h via syringpump          Memasang fentanyl 5.00 w/h via syringpump</p>	
2	Pola napas tidak efektif	<p>Senin, 13          September 2021          21.45</p> <p>21.55</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memonitor posisi selang ETT              Hasil : Selang ETT terpasang dan terfiksasi pada sudut bibir kanan pasien, terhubung ventilator</li> <li>2. Memonitor kulit area ETT              Hasil : Tidak nampak adanya kemerahan dan perdarahan</li> <li>3. Memasang OPA untuk mencegah ETT tergitit              Hasil : OPA dipasang</li> <li>4. Menjelaskan kepada keluarga mengenai tujuan pemasangan ETT              Hasil : Untuk mempertahankan pernapasan pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Keluarga pasien mengerti</li> </ol>	Putri Yuniar
3	Hipertermia	<p>Senin, 13          September 2021          21.58</p> <p>21.60</p> <p>22.10</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi penyebab hipertermia              Hasil : Penyebab hipertermia merupakan respon dari trauma tajam yang menyebabkan kerusakan pada hipotalamus sehingga termoregulasi terganggu</li> <li>2. Memonitor suhu tubuh              Hasil : terjadi peningkatan suhu tubuh 38,3 °C</li> <li>3. Memonitor pengeluaran urine              Hasil : Urine bag setiap 1 jam penuh 1800 cc</li> <li>4. Melonggarkan atau melepaskan pakaian              Hasil : melepaskan pakaian pasien dan menggantinya dengan selimut</li> <li>5. Melakukan kompres hangat              Hasil : melakukan kompres hangat pada bagian aksila dan bagian dahi 10-15 menit , dan terjadi penurunan suhu tubuh 38° c</li> <li>6. Mengkolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena              Hasil : Terpasang infus RL 18 tpm dan metrodinazole</li> </ol>	Putri Yuniar

			7. Mengkolaborasikan pemberian obat penurun panas Hasil : Memasang paracetamol drips via IV 20 tpm	
4	Penurunana kapasitas adaptif intrakranial	Selasa, 14 September 2021  14.05  14.10  14.30	<p>1. Memonitor tanda dan gejala TIK Hasil : TD : 160/98 mmHg Nadi : 118x/i RR : 24x/i Terjadi penurunan kesadaran</p> <p>2. Memonitor status pernapasan Hasil : Penapasan 24 x/i dengan ventilator</p> <p>3. Memonitor intake dan output cairan Hasil :Terpasang infus RL 18 tpm pada tangan kanan Terpasang monitol 20% 20 tpm Terpasang Fentanil 5.00 w/h via Syringpump pada tangan kanan Terpasang mylos 3.00 w/h via syringpump Terpasang cateter urine bag terisi 1500 cc</p> <p>4. Mengatur ventilator optimal Hasil : Terpasang ventilator mode VCV</p> <p>5. Mempertahankan suhu tubuh Hasil : Melakukan kompres hangat</p> <p>6. Mengkolaborasi pemberian sedasi Hasil : Memasang Mylos 3.00 w/h via syringpump Memasang fentanyl 5.00 w/h via syringpump</p>	Putri Yuniar
5	Pola napas tidak efektif	Selasa, 14 September 2021  14.30	<p>1. Memonitor posisi selang ETT Hasil : Selang ETT terpasang dan terfiksasi pada sudut bibir kanan pasien, terhubung ventilator</p> <p>2. Memonitor kulit area ETT Hasil : Tidak nampak adanya kemerahan dan perdarahan</p> <p>3. Mempertahankan Ventilator tetap optimal</p>	Putri Yuniar

			Hasil : Ventilator masih terpasang dengan mode VCV	
6	Hipertermia	Selasa, 14 September 2021  14.35  14.36  16.45  18.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi penyebab hipertermia Hasil : Penyebab hipertermia merupakan respon dari trauma tajam yang menyebabkan kerusakan pada hipotalamus sehingga termoregulasi terganggu</li> <li>Memonitor suhu tubuh Hasil : terjadi peningkatan suhu tubuh di jam pertama 38,00 °C, kedua 38,3°C, ketiga 37,9°C keempat 38,0°C, kelima 38,5°C</li> <li>Memonitor pengeluaran urine Hasil : Urine bag terisi 1500 cc</li> <li>Melonggarkan atau melepaskan pakaian Hasil : melepaskan pakaian pasien dan menggantinya dengan selimut</li> <li>Melakukan kompres hangat Hasil : melakukan kompres hangat pada bagian aksila dan bagian dahi 10-15 menit , terjadi penurunan suhu tubuh 37,8°C</li> <li>Mengkolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena Hasil : Terpasang infus RL 18 tpm dan metrodinazole</li> <li>Mengkolaborasi pemberian obat penurun panas Hasil : Memasang paracetamol drips via IV 20 tpm</li> </ol>	Putri Yuniar
7	Penurunan kapasitas adaptif intrakranial	Rabu, 15 September 2021  08.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memonitor tanda dan gejala TIK Hasil : TD : 160/98 mmHg Nadi : 118x/i RR : 24x/i Terjadi penurunan kesadaran</li> <li>Memonitor status pernapasan</li> </ol>	Putri Yuniar

		08.20	<p>Hasil : Penapasan 24 x/i dengan ventilator</p> <p>3. Memonitor intake dan output cairan        Hasil :Terpasang infus RL 18 tpm pada tangan kanan        Terpasang monitol 20% 20 tpm        Terpasang Fentanil 5.00 w/h via Syringpump pada tangan kanan        Terpasang mylos 3.00 w/h via syringpump        Terpasang cateter urine bag terisi 1500 cc</p> <p>4. Mengatur ventilator optimal        Hasil : Terpasang ventilator mode VCV</p> <p>5. Mempertahankan suhu tubuh        Hasil : Melakukan kompres hangat</p> <p>6. Mengkolaborasi pemberian sedasi        Hasil : Memasang Mylos 3.00 w/h via syringpump        Memasang fentanyl 5.00 w/h via syringpump</p>	
8	Pola napas tidak efektif	Rabu, 15 September 2021  08.40	<p>1. Memonitor posisi selang ETT        Hasil : Selang ETT terpasang dan terfiksasi pada sudut bibir kanan pasien, terhubung ventilator</p> <p>2. Memonitor kulit area ETT        Hasil : Tidak nampak adanya kemerahan dan perdarahan</p> <p>3. Mempertahankan Ventilator tetap optimal        Hasil : Ventilator masih terpasang dengan mode VCV</p>	Putri Yuniar
9	Hipertermia	Rabu, 15 September 2021  10.00	<p>1. Mengidentifikasi penyebab hipertermia        Hasil : Penyebab hipertermia merupakan respon dari trauma tajam yang menyebabkan kerusakan pada hipotalamus sehingga termoregulasi terganggu</p> <p>2. Memonitor suhu tubuh        Hasil : terjadi peningkatan suhu tubuh 38,0 °C</p> <p>3. Memonitor pengeluaran urine        Hasil : Urine bag terisi 1500 cc</p>	Putri Yuniar

		10.05	4. Melonggarkan atau melepaskan pakaian Hasil : melepaskan pakaian pasien dan menggantinya dengan selimut	
		10.25	5. Melakukan kompres hangat Hasil : melakukan kompres hangat pada bagian aksila dan bagian dahi 10-15 menit , terjadi penurunan suhu tubuh 37,3'c	
		10.55	6. Mengkolaborasikan pemberian cairan dan elektrolit intravena Hasil : Terpasang infus RL 18 tpm dan metrodinazole 7. Mengkolaborasikan pemberian obat penurun panas Hasil : Memasang paracetamol drips via IV 20 tpm	

#### 4.5 Evaluasi Keperawatan

**Tabel 4.5 Evaluasi Keperawatan**

NO	DIAGNOSIS KEPERAWATAN	HARI/ TANGGAL/ JAM	EVALUASI	NAMA JELAS
1	Penurunan kapasitas adaptif intrakranial	Senin, 13 September 2021 06.30	S : - O : 1. Nampak pasien terpasang ETT yang terhubung pada ventilator 2. Nampak pasien mengalami penurunan kesadaran (GCS 3/ koma) 3. TD meningkat 152/95 mmHG 4. Nadi meningkat 114x/i A : 1. Penurunan kapasitas adaptif intracranial belum teratasi P : 1. Lanjutkan intervensi a. Monitor TTV b. Pertahankan ventilator	Putri Yuniar
2	Pola napas tidak efektif	Senin, 13 September 2021 06.30	S : - O : 1. Frekuensi napas reguler dengan bantuan ventilator 2. Pasien nampak belum mampu bernapas dengan spontan A : 1. Pola napas tidak efektif belum teratasi P :	Putri Yuniar

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutkan intervensi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertahankan ventilator mode vcv untuk membatu pernapasan</li> <li>b. Monitor tingkat kesadaran</li> </ol> </li> </ol>	
3	Hipertermia	Senin, 13 September 2021 06.30	<p>S : -</p> <p>O :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suhu tubuh masih mengalami peningkatan diatas normal</li> <li>2. Hasil pengukuran moniitor 38,0' c</li> <li>3. Tekanan darah 130/90 mmHg</li> </ol> <p>A :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hipertermia belum teratasi</li> </ol> <p>P :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutkan intervensi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Monitor suhu tubuh setiap 1 jam</li> <li>b. Lakukan kompres air hangat</li> <li>c. Kolaborasi pemberian obat penurun panas</li> </ol> </li> </ol>	Putri Yuniar
4	Penurunana kapasitas adaptif intrakranial	Selasa, 14 September 2021 20.30	<p>S : -</p> <p>O :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nampak pasien terpasang ETT yang terhubung pada ventilator</li> <li>2. Nampak pasien mengalami penurunana kesadaran (GCS 3/ koma)</li> <li>3. TD meningkat 152/95 mmHG</li> <li>4. Nadi meningkat 114x/i</li> </ol> <p>A :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan kapasitas adaptif intracranial belum teratasi</li> </ol>	Putri Yuniar

			<p>P :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutkan intervensi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Monitor TTV</li> <li>b. Pertahankan ventilator</li> </ol> </li> </ol>	
5	Pola napas tidak efektif	Selasa, 14 September 2021 20.30	<p>S : -</p> <p>O :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frekuensi napas reguler dengan bantuan ventilator</li> <li>2. Pasien nampak belum mampu bernapas dengan spontan</li> </ol> <p>A :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola napas tidak efektif belum teratasi</li> </ol> <p>P :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutkan intervensi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertahankan ventilator mode vcv untuk membatu pernapasan</li> <li>b. Monitor tingkat kesadaran</li> </ol> </li> </ol>	Putri Yuniar
6	Hipertermia	Selasa, 14 September 2021 20.30	<p>S : -</p> <p>O :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suhu tubuh masih mengalami peningkatan diatas normal</li> <li>2. Hasil pengukuran suhu tubuh dijam 20.00 37,8°c</li> <li>3. Tekanan darah 130/90 mmHg</li> </ol> <p>A :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hipertermia teratasi</li> </ol> <p>P :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertahankan intervensi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Monitor suhu tubuh setiap 1 jam</li> <li>b. Lakukan kompres air hangat</li> <li>c. Kolaborasi pemberian obat penurun panas</li> </ol> </li> </ol>	Putri Yuniar

7	Penurunan kapasitas adaptif intrakranial	Rabu, 15 September 2021  12.00	<p>S : -</p> <p>O :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nampak pasien terpasang ETT yang terhubung pada ventilator</li> <li>2. Nampak pasien mengalami penurunan kesadaran (GCS 3/ koma)</li> <li>3. TD meningkat 152/95 mmHG</li> <li>4. Nadi meningkat 114x/i</li> </ol> <p>A :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan kapasitas adaptif intracranial belum teratasi</li> </ol> <p>P :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutkan intervensi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Monitor TTV</li> <li>b. Pertahankan ventilator</li> </ol> </li> </ol>	Putri Yuniar
8	Pola napas tidak efektif	Rabu, 15 September 2021  12.00	<p>S : -</p> <p>O :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frekuensi napas reguler dengan bantuan ventilator</li> <li>2. Pasien nampak belum mampu bernapas dengan spontan</li> </ol> <p>A :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola napas tidak efektif belum teratasi</li> </ol> <p>P :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutkan intervensi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertahankan ventilator mode vcv untuk membatu pernapasan</li> <li>b. Monitor tingkat kesadaran</li> </ol> </li> </ol>	Putri Yuniar

9	Hipertermia	Rabu, 15 September 2021  12.00	<p>S : -</p> <p>O :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suhu tubuh masih mengalami peningkatan diatas normal</li> <li>2. Hasil pengukuran suhu tubuh dijam 20.00 36,8'c</li> <li>3. Tekanan darah 130/90 mmHg</li> </ol> <p>A :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hipertermia teratasi</li> </ol> <p>P :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertahankan Intervensi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Monitor suhu tubuh setiap 1 jam</li> <li>b. Lakukan kompres air hangat</li> <li>c. Kolaborasi pemberian obat penurun panas</li> </ol> </li> </ol>	Putri Yuniar
---	-------------	---	---	--------------

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### 5.1 Analisis Asuhan Keperawatan

##### 5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan

Pada kasus laporan akhir ners ini didapatkan hasil pengkajian, pasien laki-laki berinisial Tn .A berumur 20 tahun beragama islam dirujuk dari rumah sakit Ibnu sina kerumah sakit Labuang baji untuk melakukan operasi *craniotomy*, pasien mengalami trauma brain injury yaitu terkena busur pada kepala bagian temporalis sinistra yang menembus batang otak dan menyebabkan robekan serta perdarahan otak yang disebut dengan intraserebral hematoma, busur sepanjang 12,48 cm tertancap dikepala. Setelah operasi pasien masuk di ICU dengan keadaan kesadaran menurun, pasien masuk pukul 22.00 wita. Pasien dengan GCS 5 yaitu koma dan mengalami peningkatan suhu tubuh yaitu 38,3' c, terpasang cateter urine, dan terpasang infus RL , tanda dan gejala lain yang ditemukan adalah terjadi peningkatan tekanan darah yaitu 152/95 mmHg, frekuensi nadi 114x/i, dan frekuensi napas 21x/i.

Pada kasus seperti diatas disimpulkan bahwa pasien mengalami trauma/ cedera kepala berat dengan tingkat kesadaran rentan 3-8. Berdasarkan beberapa kasus ditemukan bahwa pasien dengan trauma kepala berat biasanya memang akan menimbulkan gejala seperti penurunan kesadaran, peningkatan suhu tubuh,tekanan darah dan frekuensi nadi meningkat. Cedera kepala

dalam hal kasus ini adalah trauma otak merupakan kondisi akut pada otak yang dapat bersifat sementara ataupun permanen. Dalam menghadapi masalah ataupun penyakit yang mengganggu kesehatan, dalam perawatan secara islami juga dapat dilakukan dengan berdoa kepada Allah swt, salah satu doa ketika sakit dalam QS Al-Anbiya/21: 83

﴿وَإِيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ  
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ (٨٣)

Terjemahnya :

“ Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang diantara semua penyayang.”

Dan ingatlah kisah Ayub, seorang nabi dan rasul yang mendapat cobaan berat dalam hidupnya, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan berserah dan bertawakal kepada-Nya. “Ya Tuhanku, sungguh, aku telah ditimpa penyakit yang terasa sangat berat; tetapi aku yakin bahwa Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang, sehingga cobaan ini merupakan bentuk kasih sayang-Mu kepadaku. Karena sikap Nabi Ayub yang sabar, berserah dan bertawakal kepada Allah dalam menyikapi penyakit yang menimpa dirinya, maka Kami mengabulkan doa-nya, lalu Kami melenyapkan berbagai penyakit yang ada padanya sehingga penyakitnya sembuh lahir batin; dan Kami pun mengembalikan keluarganya kepadanya untuk lebih menyempurnakan

kebahagiaannya. Dan Kami pun melipatgandakan jumlah keturunan Nabi Ayub sebagai suatu rahmat dari Kami kepada hamba-Nya yang sabar, dan sekaligus kisah Nabi Ayub ini untuk menjadi peringatan bagi semua orang beriman yang menyembah Kami agar bersabar, bertawakal dan berserah kepada Allah dalam menghadapi berbagai cobaan yang menimpa dirinya.

Adapun ayat lain yang membahas tentang sakit adalah,

Sebagaiman Firmal Allah swt dalam QS. Asy-syu'ara'/26:80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ٨٠

Terjemahnya :

*“Dan apabila aku sakit, Dialah pada hakikatnya yang menyembuhkan aku, baik melalui sebab atau tidak”.*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang menyembuhkan manusia apabila ia sakit. Allah berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja yang diderita oleh seseorang. Meskipun begitu, manusia juga harus mencari tahu untuk memperoleh kesembuhan itu. Imam Jamaluddin A-Qasimi dalam tafsirnya menguraikan bahwa ayat ini menggambarkan tata susila hamba Allah kepada Khaliknya. Sebab penyakit itu kadang-kadang akibat dari perbuatan manusia sendiri, umpamannya disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma- norma kesehatan, atau pola hidup sehari –hari, maka serangan penyakit terhadap tubuh tidak dapat dielakkan. Sebaliknya yang berhak menyembuhkan penyakit adalah Allah semata. (Kementrian agama RI)

### 5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan teori keperawatan yang dikembangkan oleh Virginia Handerson yang mengatakan bahwa terdapat 14 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi di antaranya kebutuhan biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Virginia memandang manusia sebagai makhluk yang membutuhkan bantuan. Dalam 14 kebutuhan dasar salah satu membahas tentang kebutuhan yaitu mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal dengan cara menyesuaikan pakaian dan modifikasi lingkungan. Pada kasus yang diteliti, terjadi peningkatan peningkatan suhu tubuh diatas normal yaitu 38,3°c. atau disebut dengan hipertermia.

Hipertermia dapat disebabkan dengan adanya respon trauma, inflamasi ataupun karena kerusakan pusat termoregulasi yang ditandai dengan suhu tubuh diatas nilai normal. Pada kasus cedera kepala benturan langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada otak, pada kasus ini dimana busur menembus sampai kebatang otak sehingga menyebabkan kerusakan pada hipotalamus yang berakibat terganggunya pusat termoregulasi yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Sehingga demikian pasien cedera kepala akan mengalami peningkatan suhu tubuh. Hal tersebut dapat ditandai dengan adanya luka bekas operasi, peningkatan tekanan darah dan peningkatan denyut nadi, dan dari hasil pemeriksaan kimia darah didapatkan bahwa nilai sel darah putih meningkat, hal ini menandakan tubuh dalam proses

mempertahankan diri untuk melawan infeksi. Pada kasus cedera kepala jika tanda dan gejala tersebut tidak cepat ditangani dapat berakibat menjadi kerusakan otak permanent ataupun bahkan kematian.

### 5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan

Analisis intervensi hipertermia pada pasien cedera otak traumatik berdasarkan (SIKI PPNI, 2018) adalah Manajemen Hipertermia dengan Observasi: penyebab, Monitor suhu tubuh, Monitor kadar elektrolit, Monitor haluaran urine, Monitor komplikasi akibat hipertermia. Terapeutik: Sediakan lingkungan yang dingin, Longgarkan atau lepaskan pakaian, Basahi atau kompres hangat, Berikan cairan oral. Edukasi: Anjurkan tirah baring, Kolaborasi: Kolaborasi pemberian cairan elektrolit intravena dan anti piretik jika perlu. Tindakan utama yang diberikan pada diagnosis hipertermia adalah kompres hangat.

Sejalan dengan penelitian Sarah Fadillah, (2019) bahwa penanganan pada pasien dewasa yang mengalami masalah hipertermi adalah kompres hangat yang dilakukan selalama tiga hari dengan terbukti dapat menu runkan suhu tubuh. Kemudian studi yang dilakukan oleh Kahinedan, (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa selama perawatan didapatkan terjadinya penurunan setelah dilakukan kompres air hangat setiap jamnya dimana jam pertama 38,3' c, jam kedua 38.0' celcius, jam ketiga 37,3'c . Berdasarkan hasil penurunan suhu tubuh pada pasien yang

diberikan kompres hangat. Sejalan dengan penitian sebelumnya yang mengatakan bahwa penurunan suhu tubuh pada kompres hangat menurun 0,4 setiap jamnya (Windawati, 2020).

Sedangkan penelitian yang dilakukan (Ika Rahmawati, 2018) mengatakan terjadi penurunan suhu tubuh pada pasien trauma kepala yang di berikan kompres hangat dengan hasil uji *Mann whitney* menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang artinya kompres hangat efektif untuk menurunkan suhu tubuh pasien trauma kepala. Intervensi Kompres hangat ini tidak berjalan sendiri, kolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya juga dilakukan seperti pemberian obat untuk mengatasi hipertermi yang dialami pasien. Penelitian lainnya yang mengatakan bahwa kompres hangat dapat menurunkan suhu tubuh denga satu kali pemberian yang dilakukan oleh 20 responden dan dari 20 responden semuanya mengalami penurunan suhu tubuh yang signifikan dengan hasil p-value = 0.000 yang artinya kompres hangat terbukti menurunkan suhu tubh pada pasien yang mengalami hipertermi, sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadli dan Akmal Hasan, 2018 dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa adanya pengaruh kompres hangat terhadap perubahan suhu tubuh pasien yang mengalami demam.

#### 5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan

Implementasi yang telah dilakukan pada pasien dengan masalah hipertermia adalah manajemen hipertermia yang terdiri dari observasi, dimana pada bagian observasi peneliti menilai dan atau mengidentifikasi penyebab hipertermia dan didapatkan hasil bahwa penyebab hipertermia pada kasus ini adalah karena terjadinya proses infeksi dan disertai kerusakan pusat termoregulasi yaitu hipotalamus. Kedua dilakukan monitor suhu tubuh dan hasil yang didapatkan adalah terjadi peningkatan suhu tubuh yaitu 38,3°C. Setelah mengobservasi, selanjutnya peneliti melakukan tindakan terapeutik yaitu melonggarkan pakaian pasien dan memberi kompres hangat pada bagian aksila dan dahi selama 10-20 menit dan melakukan pengukuran dengan menggunakan termometer air raksa. Adapun tindakan kolaborasi yang dilakukan selama proses rawat adalah pemberian antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh jika suhu tubuh tidak kunjung turun dimana pemberian atipiretik yang dikombinasikan dengan pemberian kompres hangat dapat menjadi intervensi yang kuat untuk menurunkan suhu tubuh pasien yang mengalami hipertermia.

#### 5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan

Pada bagian evaluasi didapatkan masalah hipertermia yang terjadi selama tiga hari yang mengalami penurunan dan peningkatan sewaktu-waktu, dilakukan kompres air hangat selama tiga hari rawat dan terjadi penurunan suhu tubuh dari 38,3°C turun menjadi 36,8°C. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan

oleh . Fadli, 2018 bahwa intervensi pemberian kompres hangat pada pasien demam dianggap efektif.

## 5.2 Analisis Intervensi EBP

Evidence Based Nursing dalam analisis kasus *pasien traumatic brain injury post op craniotomy* dengan masalah hipertermia adalah kompres hangat yang efektif menurunkan suhu tubuh klien berdasarkan apa yang telah dilakukan pada klien yang mengalami hipertermi. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian kompres hangat untuk mengatasi hipertermi pada pasien trauma kepala dengan masalah hipertermi dengan beberapa kelompok usia mulai dari umur 5 tahun sampai dengan umur > 50 tahun (Ika Rahmawati & Yosep 2018) selain itu banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengatasi hipertermi seperti penelitian yang telah dilakukan (Kurnia Dewi Annisa, 2019) yang melakukan penelitian kompres hangat pada anak untuk mengatasi hipertermi dan terbukti kompres hangat dapat menurunkan hipertermi dan masih banyak lagi penelitian-penelitian yang memberikan kompres hangat pada pasien yang mengalami masalah hipertermi. Berikut SOP terkait dengan kompres hangat.

## 5.3 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak dapat melakukan pengukuran secara murni terkait keberhasilan pemberian kompres air hangat pada pasien, karena pasien yang dirawat di rumah

sakit harus mematuhi aturan yang ada, dimana selama hari rawat pasien akan mendapat terapi farmakologis dimana terapi tersebut juga mampu menurunkan hipertermia pada pasien. Adapun keterbatasan lain peneliti tidak memberikan intervensi non farmakologis pembanding untuk menilai apakah dalam penanganan hipertermia hanya pemberian kompres hangat saja ataukah terdapat tindakan yang lain yang lebih efektif.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakan proses asuhan keperawatan dengan pemberian kompres hangat pada pasien *traumatic brain injury post op craniotomy* dengan masalah-masalah yang ada pada pasien teratasi dan didapatkan hasil pengkajian sampai dengan evaluasi. Didapatkannya pengkajian pada Tn. A umur 20 tahun masuk ICU dengan keluhan penurunan kesadaran, TD 152/95 mmHg, Nadi 114x/m, suhu 38,3° C, pernapasan 21x/m saturasi oksigen 100% dengan ventilator, GCS: 3 kesadaran coma, pasien memiliki riwayat pekerjaan sebagai buruh bangunan dan terkena tembakan busur dibagian temporalis sinistra yang mengakibatkan busur tertancap di kepala bagian kiri menembus otak dan merobek pembuluh darah kemudian dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala yang menemukan hasil adanya cedera kepala traumatik brain injury dan intrasereberal hematoma kemudian dilakukan operasi craniotomy setelah dilakukan operasi klien masih mengalami coma, klien dibantu pernapasannya dengan menggunakan ventilator, terpasang selang ETT, OPA, pasien mengalami peningkatan tekanan darah sewaktu-waktu, dan mengalami peningkatan suhu tubuh.

Didapatkan diagnosis keperawatan penurunan kapasitas adaptif intrakranial, pola napas tidak efektif dan hipertermia. Intervensi yang digunakan adalah manajemen jalan napas, manajemen peningkatan

tekanan intrakranial, dan manajemen hipertermia. Dalam melakukan implementasi didapatkan pola napas tidak efektif yang dilakukan adalah pemberian oksigen melalui ventilator, dan tindakan kolaborasi dengan tenaga medis lainnya, namun masalah yang terjadi belum dapat teratasi dengan hasil: masih terjadi penurunan kesadaran, support pernapasan masih penuh dilakukan oleh ventilator, kecuali dengan diagnosis keperawatan hipertermia yang sudah berhasil menurunkan suhu tubuh pasien yang awalnya demam menjadi tidak demam. Berdasarkan dari hasil implementasi yang sudah dilakukan pada pasien dengan tiga diagnosis keperawatan masalah hipertermi teratasi dengan 3 kali pemberian intervensi dan dilakukan implementasi sedangkan kedua diagnosis lainnya belum membaik karena pada kasus ini pasien mengalami cedera berat yang perlu penanganan lebih lanjut, serta perawatan yang lebih intensif. Hipertermi yang dilakukan adalah pemberian kompres hangat dan melonggarkan pakaian maka masalah hipertermi yang ada teratasi dengan hasil: suhu tubuh sebelum di kompres adalah 38,3°C dan menurun 36,8°C saat dilakukan kompres hangat, maka dapat disimpulkan tindakan implementasi yang dilakukan berhasil memperbaiki keadaan pasien dan mengatasi masalah hipertemia pada pasien.

## 6.2 Saran

1. Bagi Profesi Keperawatan karya akhir ini bisa dijadikan bahan referensi untuk dilanjutkan untuk diteliti.
2. Bagi Institusi Pendidikan Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien

epidural hematoma post operasi craniactomy. Perlu dilakukannya penelitian yang lebih lanjut dengan kasus yang lain.

3. Untuk pelayanan di rumah sakit dapat menjadi referensi asuhan keperawatan kepada para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien traumatik brain injury post op dengan masalah hipertermia dan melihat keefektifan pemberian kompres hangat dalam mengatasi hipertermia atau peningkatan suhu tubuh




## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an*. (n.d.).
- Agung, I. R. & Y. (2018). KOMPRES HANGAT SEBAGAI PENURUN SUHU TUBUH PASIEN TRAUMA KEPALA. *Journal Nursing ADI HUSADA*, 4.
- Alfiyanti, W. dan D. (2020). Penurunan Hipertermia Pada Pasien Kejang Demam Menggunakan Kompres Hangat. *Jurnal Unimus (Ners Muda)*, Vol 1 No 1, 59–67.
- Anisa., K. D. (2019). Efektifitas kompres hangat untuk menurunkan suhu tubuh pada An.D dengan hipertermia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 5, 122–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.33485/jiik-wk.v5i2.112>
- BIA. (2010). Brain injury asossiation. *Amerika*.
- Fadillah, S. (2019). ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DEWASA PENDERITA THYPOID FEVER DENGAN MASALAH KEPERAWATAN HIPERTERMI. *FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO*.
- Fadli, 2018. Pengaruh Pemberina Kompres Hangat Pada Anak Dengan Masalah Febris. . ISSN. 20899394
- Hoffman, J.M., Lucas, S., Dikmen, S., et al. (2011). Natural History of Headache after Traumatic Brain Injury. *Journal of Neurotrauma*, XXVIII, 1719–1725.
- Ibrahim, A. (2010). *Trauma dan Bencana. Dalam: Buku Ajar Ilmu Bedah: Vol. (Edisi 6; penerbit buku kedokteran EGC.*
- Indharty, R. . (2012). Peran ACTH4- 10PRO8-GLY9-PRO10 dan Inhibitor HMG-CoA Reductase dalam Peningkatan BCL-2 dan BDNF terhadap Hasil Akhir Klinis Penderita Kontusio Serebri. *Universitas Sumatera Utara*.
- Irmachatshalihah, R., & Alfiyanti, D. (2020). Kombinasi Kompres Hangat Dengan Teknik Blok Dan Teknik Seka ( Tepid Sponge Bath ) Menurunkan Suhu Tubuh Pada Anak Penderita Gastroenteritis. *Jurnal Unimus*, vol 1 no 3. <https://doi.org/https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.26714/nm.v1i3.6215>
- Irwan, R. dan M. (2021). *Falsafah dan teori keperawatan dalam integrasi keilmuan*.
- Kahinedan, V. A., & Gobel, I. (2013). Studi penatalaksanaan tindakan keperawatan pada pasien hipertermi di ruang rawat inap blud rsd liun kendage tahuna. *P3M POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA*, 1 November, 64–68.
- Kahinedan, V. A., & Gobel, I. (2017). Studi penatalaksanaan tindakan keperawatan pada pasien hipertermi di ruang rawat inap blud rsd liun kendage tahuna. *P3M POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA*, 1(November), 64–68.
- Kemenag, T. (2019). *Tafsir Ringkas Kemenag*.

- Lozano, et al. (2015). *Neuroinflammatory responses to traumatic brain injury: etiology, clinical consequences, and therapeutic opportunities. Neuropsychiatr Dis Treat.*  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4295534>
- Luci Riani Br. Ginting, D. (2020). Pengaruh Pemberian Oksigen Dan Elevasi Kepala 30' Terhadap Tingkat Kesadaran Pada Pasien Cedera Kepala. *Jurnal Keperawatan Dan Fisioterapi . (JKF)*, 2, 2.
- M, S. (2015). Craniocerebral Trauma. In: Darrof RB, Jancovic J, Mazziota JC, Pomeroy SL, editors. *Bradley's Neurology in Clinical Practices. London: Elsevier.*
- Majid, A. (2017). *Asuhan Keperawatan Dengan Gangguan Sistem Kardiovaskuler.* Pustaka Baru Press, 2018.
- Mass, M. and. (2013). Head injury with craniactomy. *America.*
- Nugroho, D. (2016). *Teori Asuhan Keperawatan Gawat Darurat.* Nuha Medika 2016.
- Nurhidayat. (2015). *Asuhan Keperawatan Dengan Gangguan Sistem Kardiovaskuler.* Umpo Press , 2011.
- Organization, W. H. (2016). Global Status Report on Road Safety. *WHO Librar Ed.* [https://doi.org/https://doi.org/Doi:978\\_92\\_4\\_156506\\_6](https://doi.org/https://doi.org/Doi:978_92_4_156506_6). WHO/NMH/NVI/15.6.
- PPNI. (2016). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Indikator Diagnostik.*
- PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan indonesia: Defenisi dan tindakan keperawatan.* (2018 DPP PPNI (Ed.); 1st ed.).
- PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia : Defenisi dan Kriteria hasil keperawatan* (1st ed.). DPP PPNI, 2018.
- Prastiwi, A. K. (2020). ENGELOLAAN HIPERTERMI PADA TN . N DENGAN TYPOID FEVER DIRUANG DAHLIA DI RSUD UNGARAN. *Universitas Ngudi Waluyo, vol, 1.*
- Riskesdas. (2018). *Laporan Nasional Riskesdas: kasus cedera kepala. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan.*  
[http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/La%0Aporan\\_Nasional\\_RKD2018\\_FINAL.pdf.%0A](http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/La%0Aporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf.%0A)
- Roozenbeek B, Maas AIR, M. D. (2013). *Changing patterns in the epidemiology of traumatic brain injury.* <http://dx.doi.org/10.1038/nrneurol.2013.22>
- Suddarth, B. &. (2016). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah.* EGC 2013.
- Trevana, L & Cameron, I. (2011). Traumatic Brain Injury Long Term Care of Patients in General Practice. *Focus Neurology, XL (12th ed.). America.*
- WHO. (2016). *World Health Organisation.*

## LAMPIRAN

### 1. Penyimpangan KDM



## 2. Jurnal Rujukan

### PENGARUH KOMPRES HANGAT TERHADAP PERUBAHAN SUHU TUBUH PADA PASIEN FEBRIS

Fadli<sup>1</sup>, Akmal Hasan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Profesi Ners STIKES Muhammadiyah Sidrap  
<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Keperawatan STIKES Muhammadiyah Sidrap

Alamat Korespondensi: [fadli.hurufi88@yahoo.com](mailto:fadli.hurufi88@yahoo.com) 085342707077

#### ABSTRAK

Demam adalah peroses alami tubuh untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh ketika suhu tubuh meningkat melebihi suhu tubuh normal ( $>37,2^{\circ}\text{C}$ ). Peningkatan suhu tubuh mengakibatkan demam dan menjadi salah satu manifestasi paling umum penyakit pada anak. Kompres adalah salah satu terapi non farmakologi yang mampu mengurangi suhu tubuh anak yang mengalami febris. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 05 Juni sampai dengan 05 Juli Tahun 2017 di puskesmas Tanru Tedong Kabupaten Sidrap. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain *quasi* eksperimen dengan rancangan *pre and post test design*, sampel pada penelitian ini adalah pasien anak yang mengalami febris di ruang instalasi gawat darurat dengan jumlah sampel sebanyak 17 orang. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Dari hasil penelitian dengan uji Kolmogorov-Smirnov Z didapat nilai *pre*  $p=0,62$  dan untuk *post*  $p=0,54$ . Dengan tingkat kemaknaan  $p > \alpha$  (0,05) Yang dimana  $p > \alpha$  (0,05) berarti uji normalitas data berdistribusi normal maka dari itu dilakukan uji *Paired T test*, dengan hasil  $p=0,0001$  dengan tingkat kemaknaan  $p < \alpha$  (0,05) yang dimana  $0,0001 < 0,05$  maka dari itu dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh kompres hangat terhadap perubahan suhu tubuh pasien febris di ruangan instalasi gawat darurat puskesmas Tanru Tedong Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan masukan bagi institusi kesehatan dan penanganan peningkatan suhu tubuh pada pasien febris. Semoga penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi peneliti dalam hal melakukan penelitian.

*Kata Kunci* : Kompres hangat, Febris, Suhu tubuh

#### PENDAHULUAN

Demam adalah suatu keadaan suhu tubuh diatas normal akibat peningkatan pusat pengatur suhu di hipotalamus. Sebagian besar demam pada anak akibat dari perubahan pada pusat panas (*termoregulasi*) di hipotalamus. Penyakit-peryakit yang ditandai adanya demam dapat menyerang sistem tubuh. Selain itu demam juga berperan dalam meningkatkan perkembangan imunitas spesifik dan nonspesifik dalam membantu pemulihan atau pertahanan terhadap infeksi (Sodikin, 2012).

Berdasarkan World Health Organization (WHO) memperkirakan jumlah kasus demam di seluruh dunia mencapai 16 - 33 juta 500 - 600 ribu kematian tiap tahunnya (Setyowati, 2013). Data kurjungan ke fasilitas kesehatan

pediatrik di Brazil terdapat sekitar 19% sampai 30% anak diperiksa karena menderita demam. Penelitian deh Jalil, Jumah, & Al-Baghli, (2007) di Kuwait menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia tiga bulan sampai 36 bulan mengalami serangan

## KOMPRES HANGAT SEBAGAI PENURUN SUHU TUBUH PASIEN TRAUMA KEPALA

**Ika Rahmawati, Yoseph Agung**  
Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan  
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri  
[ika\\_rahma23@yahoo.com](mailto:ika_rahma23@yahoo.com)

### ABSTRAK

Trauma kepala merupakan salah satu penyebab utama kematian. Selain itu trauma kepala juga dapat menyebabkan kecacatan. Pasien trauma kepala seringkali mengalami peningkatan suhu tubuh. Kompres hangat dapat menurunkan suhu tubuh pasien sehingga peningkatan metabolisme dapat teratasi dan mencegah kondisi lebih buruk pada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kompres hangat dapat menurunkan suhu tubuh pada pasien yang mengalami trauma kepala. Desain penelitian yang digunakan adalah *quasy eksperimental*. Teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 20 responden. Alat ukur yang digunakan adalah lembar observasi. Hasil analisis menggunakan uji *Mann whitney* menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang artinya kompres hangat efektif untuk menurunkan suhu tubuh pasien trauma kepala. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kompres hangat dapat digunakan sebagai penurun suhu tubuh pasien trauma kepala.

**Kata Kunci :** Trauma Kepala, Suhu Tubuh, Kompres Hangat

### ABSTRACT

*Head injury wis the main cause death. Besides, head injury also cause disability. Head injury patients often cause the body temperature increasing. Warm compress were able to lower the body temperature, so that metabolism increasing can be overcome and prevent the condition of patient from getting worse. This study aims to know whether warm compress are able to lower the body temperature of head injury patients. Design of study used was quasy experiment. Sampling technique used was accidental sampling, and the sample size was 20 respondents. The instrument used was observational sheet. The result of analysis using Mann whitney statistic test demonstrated the significant value was 0,000, which means warm compress are effective to lower the body temperature of head injury patients. Based on explanation, it can be conclude that warm compresses are able to used as the body temperature lowering on head injury patients.*

**Keywords :** Head Injury, Body Temperature, Warm Compress

EFEKTIFITAS KOMPRES HANGAT UNTUK MENURUNKAN SUHU TUBUH  
 PADA AN.D DENGAN HIPERTERMIA  
*The Effectiveness of Warm Compress to Reduce Body Temperature in AN.D with Hipertermia*

Kurnia Dewi Arisa\*

\*Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang  
 e-mail: kumiadedev@gmail.com

ABSTRAK

Hipertermia adalah peningkatan suhu inti tubuh manusia yang biasanya terjadi karena infeksi. Hipertermia juga dapat didefinisikan sebagai suhu tubuh yang terlalu panas atau tinggi ( $>37,5^{\circ}\text{C}$ ). Peningkatan suhu mengakibatkan demam dan merupakan salah satu manifestasi paling umum penyakit pada anak. Kompres adalah salah satu metode fisik untuk menurunkan suhu tubuh anak yang mengalami demam. Tujuan dari perawatan ini untuk mengetahui efektifitas kompres hangat untuk menurunkan suhu tubuh pada demam anak. Tinjauan kasus ini dilakukan dengan metode studi kasus perawatan secara bertahap dan teratur. Berdasarkan perawatan yang telah dilakukan terhadap anak demam dengan cara dikompres air hangat didapatkan rata-rata penurunan suhu sebesar  $0,4^{\circ}\text{C}$  per hari dan dilakukan selama 3 hari. Hasil perawatan menunjukkan bahwa terjadi penurunan setelah dilakukan kompres air hangat sesuai target yang ingin dicapai. Dapat disimpulkan bahwa kompres air hangat efektif menurunkan demam pada klien di RSUD Temanggung.

Kata Kunci : Hipertermia, Kompres Hangat

ABSTRACT

*Hyperthermia is an increase in the core temperature of the human body which usually occurs due to infection. Hyperthermia can also be defined as a body temperature that is too hot or high ( $>37,5^{\circ}\text{C}$ ). Increased temperature results in fever and is one of the most common manifestations of childhood disease. Compress is one physical method to reduce the body temperature of a child who has a fever. The purpose of this treatment is to find out the effectiveness of warm compresses to reduce body temperature in childhood fever. This case review was carried out with a gradual and regular case study treatment method. Based on the care that has been done on children with fever by compressing warm water, the average temperature drop is  $0,40\text{C}$  per day and is carried out for 3 days. Treatment results show that there is a decrease after warm water compresses are according to the target to be achieved. It can be concluded that warm water compresses effectively reduce fever in clients at Temanggung Hospital.*

**Keywords:** *Hipertermia, WarmCompress*

A. Pendahuluan

Hipertermia adalah peningkatan suhu inti tubuh manusia yang biasanya terjadi karena infeksi, kondisi dimana otak mematok suhu di atas setting normal yaitu di atas  $38^{\circ}\text{C}$ . Namun demikian, panas yang sesungguhnya adalah bila suhu  $>38,5^{\circ}\text{C}$ . Hipertermia juga dapat didefinisikan sebagai suhu tubuh yang terlalu panas atau tinggi. Umumnya, manusia akan mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Namun, pada keadaan tertentu, suhu dapat meningkat dengan cepat hingga

pengeluaran keringat tidak memberikan pengaruh yang cukup.

Demam pada anak seringkali terjadi, perawat biasanya melakukan berbagai tindakan untuk penurunan demam salah satunya yaitu dengan cara kompres air hangat. Demam merupakan salah satu sebab yang sering membuat orang tua segera membawa anaknya berobat. Sebenarnya panas bukan penyakit melainkan gejala suatu penyakit sebagai reaksi tubuh untuk melawan infeksi atau penyakit, yang bisa disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Ketika melawan penyakit atau

### 3. Daftar Riwayat Hidup



**Putri Yuniar**, lahir di Bajoe pada tanggal 25 Agustus 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak H. Muh Yunus dan Ibu Hj. Nurlelah Penulis dengan nama panggilan Putri ini mulai mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2004 di SD Inpres 6/75 Pattiro dan selesai ditahun 2010. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Dua Boccoe pada tahun 2010 dan selesai ditahun 2013, kemudian melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Dua Boccoe pada tahun 2013 dan selesai ditahun 2016. Setelah itu, ditahun yang sama juga penulis memasuki kuliah disalah satu Universitas di Kota Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur UM-PTKIN, tepatnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Ilmu Keperawatan. Syukur Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi Kesehatan sehingga bisa melewati perjuangan keras dan disertai iringan doa dari kedua orang tua penulis, keluarga serta rekan-rekan yang dapat membantu penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan S1 dan melanjutkan jenjang Pendidikan Profesi Ners dan berhasil menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Tarumatic Brain Injury Post Craniotomy* Dengan Hipertemia Menggunakan Intervensi Kompres Hangat”. Penulis aktif didalam organisasi, pada masa SMP dan SMA dan saat di perguruan tinggi penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar sebagai anggota Divisi Sanggar Seni Rufaidah periode 2016-2017, dan kemudian setelah tahun berikutnya masih

sebagai anggota Dalam BSO Sanggar Seni Rufaidah, Penulis banyak mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti mengikuti kegiatan PIONIR pada tahun 2018 yaitu menjadi perwakilan kampus UIN Alauddin Makassar untuk terbang ke Aceh mengikuti kegiatan pionir tersebut dalam bidang Tarik suara dan berhasil menjadi kebanggaan , selanjutnya penulis diberi kesempatan kembali untuk menjadi perwakilan dalam ajang POROS INTIM tahun 2019 se- Indonesia Timur dalam bidang Model Fashion Muslimah dan alhamdulillah dapat meraih juara ke 2. Selain itu, penulis juga mengikuti ajang pemilihan Duta Kampus Asri dan berhasil meraih juara 2 atau Runner Up 1 dan menjadi bagian dari keluarga besar Green kampus. Penulis memang senang mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan perlombaan, bagi penulis mencoba berbagai hal akan memberikan pengalaman dan teman baru, serta kebahagiaan tersendiri , Saat ini penulis sangat tertarik dengan departemen keperawatan gawat darurat, penulis berharap dapat bekerja dibidang tersebut nantinya entah menjadi seorang perawat di rumah sakit atau menjadi seorang pengajar di perguruan tinggi. Penulis berharap apa yang penulis susun saat ini dapat bermanfaat untuk kedepannya

#### 4. Uji Turnitin

26 01

ORIGINALITY REPORT

<b>21</b> %	<b>21</b> %	<b>1</b> %	<b>6</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>edoc.pub</b> Internet Source	<b>3</b> %
<b>2</b>	<b>eprints.umpo.ac.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>3</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<b>tulisannurse.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<b>apnilasaragih98.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<b>www.alomedika.com</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<b>Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar</b> Student Paper	<b>1</b> %
<b>8</b>	<b>www.nahimunkar.org</b> Internet Source	<b>1</b> %