

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA RESPIRATORY
DISTRESS NEWBORN DENGAN POLA NAPAS TIDAK
EFEKTIF MENGGUNAKAN INTERVENSI
POSISI SEMI PRONE**



Tugas Akhir Ners

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

RETNO IRIANA PAKAYA, S. Kep
NIM : 70900120045

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno Iriana Pakaya
NIM : 70900120045
Tempat/ Tgl. Lahir : Kaimana/ 04 November 1996
Jurusan/ Prodi/ Konsentrasi : Profesi Ners
Fakultas : Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Ir Sutami Villa Mutiara Biru Blok IV
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada *Respiratory Distress Newborn* Dengan Masalah Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Posisi *Semi Prone*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R
Gowa, 28 Januari 2022
Penyusun

Retno Iriana Pakaya

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Retno Iriana Pakaya NIM: 70900120045, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “*Analisis Asuhan Keperawatan Pada Respiratory Distress Newborn Dengan Masalah Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Posisi Semi Prone*”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Gowa, 28 Januari 2022

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Muthahharah, S.Kep, Ns, M.Kep



Nurul Fadhilah Gani, S.Kep, Ns, M.Kep

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "*Analisis Asuhan Keperawatan Pada Respiratory Distress Newborn Dengan Masalah Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Posisi Semi Prone*" yang disusun oleh Retno Iriana Pakaya, NIM: 70900120045, Mahasiswa jurusan Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 28 Januari 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Profesi dalam Ilmu Kesehatan, program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan.

Gowa, 28 November 2021
28 Jumadil Awal 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep.	(.....)
Munaqisy I	: Huriati, S.Kep.,Ns.,M.Kes.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muhaemin, S.Ag., M.Th.I., M.Ed	(.....)
Pembimbing I	: Muthahharah, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Nurul Fadhilah Gani, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada *Respiratory Distress Newborn* Dengan Masalah Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Posisi *Semi Prone*” ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :


1. Dr. Dr. Syatirah, Sp. A, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
2. Dr. Patimah, S.Kep, Ns, M.Kep selaku Kepala Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Muthahharah, S.Kep, Ns, M.Kep dan Nurul Fadhilah Gani, S.Kep, Ns, M.Kep selaku Pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini.
4. Seluruh Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Keluarga tercinta terimakasih yang tak terhingga atas doa dan dukungannya selama ini.
6. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu dalam penyusunan proposal tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat di rasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang

Gowa, 28 Januari 2022

Retno Iriana Pakaya




DAFTAR ISI

Sampul	i
Halaman Sampul	ii
Halaman Pernyataan Keaslian	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Halaman Abstrak (Indonesia).....	x
BAB I PENDAHULUAN	1-5
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Umum dan Khusus.....	4
1.4 Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6-38
2.1 Konsep Teori.....	6
2.2 Konsep Asuhan Keperawatan	17
2.3 <i>Evidence Based Practice Nursing</i> (EBPN).....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38-39
3.1 Rancangan Studi Kasus	38
3.2 Subyek Studi Kasus.....	38
3.3 Fokus Studi Kasus.....	38
3.4 Instrumen Studi Kasus	38
3.5 Prosedur Pengambilan Data	38
3.6 Tempat & Waktu Pengambilan Data	39
3.7 Analisis Data & Penyajian Data.....	39
3.8 Etika Studi Kasus	39
BAB IV LAPORAN KASUS	40-59
4.1 Pengkajian Keperawatan.....	41
4.2 Diagnosis Keperawatan.....	53
4.3 Intervensi Keperawatan.....	54
4.4 Implementasi Keperawatan	56
4.5 Evaluasi	56
BAB V PEMBAHASAN	60-69
5.1 Analisis Asuhan Keperawatan	60
5.2 Analisis Intervensi EBPN	66
5.3 Keterbatasan.....	68

BAB VI	PENUTUP	70
	6.1 Kesimpulan	70
	6.2 Saran.....	70


DAFTAR PUSTAKA

- Lampiran 1 : Dokumentasi
Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Penilaian Maturitas Neuromuskuler	40
Gambar 4.2 Penilaian Maturitas Fisik	41



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Score Down</i>	7
Tabel 4.1 Pengkajian Nyeri	39
Tabel 4.2 Reflex	42
Tabel 4.3 Pengkajian Head To Toe	43
Tabel 4.4 Penilaian Skor Down	46
Tabel 4.5 Hasil Laboratorium	48
Tabel 4.6 Data Fokus	49
Tabel 4.7 Analisis Data.....	50
Tabel 4.8 Intervensi Keperawatan.....	52
Tabel 4.9 Implementasi & Evaluasi Keperawatan.....	54
Tabel 4.10 Hail Intervensi	59



ABSTRAK

Nama : Retno Iriana Pakaya
NIM : 70900120045
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada *Respiratory Distress Newborn*
Dengan Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Posisi Semi Prone

Latar Belakang : Respiratory Distress Newborn adalah istilah yang digunakan untuk disfungsi pernapasan pada neonatus. Menurut UNICEF tahun 2018 Angka Kematian Neonatus (AKN) di dunia tercatat sebanyak 18 per 1000 kelahiran hidup. Dalam profil kesehatan Indonesia tahun 2019 penyebab kematian terbanyak bayi baru lahir salah satunya yaitu gangguan pernapasan. Intervensi yang dapat diberikan pada neonatus dengan gangguan pernapasan selain oksigen yaitu pemberian pengaturan posisi seperti posisi semi prone. **Tujuan** penulisan adalah mengetahui analisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan masalah gangguan pola napas tidak efektif dengan menggunakan intervensi posisi semi prone. **Metode** yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi. Penatalaksanaan intervensi posisi semi prone diberikan selama 3 hari pemberian. **Hasil** analisis data menunjukkan beberapa diagnosis yaitu pola napas tidak efektif, bersihan jalan napas tidak efektif dan risiko defisit nutrisi. Pemberian posisi *semi prone* sebagai salah satu intervensi yang dapat diberikan pada RDN dengan masalah pola napas tidak efektif dalam mengurangi sesak. **Kesimpulan** berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan menyatakan bahwa pemberian posisi *semi prone* selama 3 hari sesuai jadwal yang ditetapkan menunjukkan penurunan sesak dengan kriteria frekuensi napas menurun, retraksi dinding dada menurun, dan pernapasan cuping hidung menurun., hal ini mengindikasikan bahwa posisi *semi prone* efektif dilakukan dalam membantu mengurangi sesak pada pasien dengan RDN.

Kata Kunci : *Respiratory Distress Newborn*, Frekuensi Napas, Posisi *Semi Prone*

BAB I

PEMBAHASAN

1.1 Latar Belakang

Kelahiran bayi dalam keluarga adalah suatu hal yang sangat diharapkan. Bayi baru lahir (BBL) atau neonatus adalah masa kehidupan pertama diluar rahim hingga usia 28 hari (Atika, 2019). Hanya saja ada beberapa bayi yang lahir dengan masalah kesehatan, salah satu masalah kesehatan yang sering muncul pada neonatus yaitu gangguan pernapasan. Masalah ini menyumbangkan angka morbiditas dan mortalitas neonatus (Apriliawati, 2016).

Menurut *United Nations Children's Fund* 2018, Angka Kematian Neonatal (AKN) di dunia sebanyak 18 per 1.000 kelahiran hidup. Bahkan insiden kematian bayi baru lahir sebesar 75% terjadi pada minggu pertama kehidupan dan 40% meninggal dalam 24 jam pertama. Mayoritas dari semua kematian bayi baru lahir disebabkan oleh komplikasi pernapasan, kelahiran prematur, infeksi dan cacat lahir WHO 2018 dalam (Atika, 2019). Hasil study survey di USA kematian bayi terus mengalami peningkatan, pada tahun 2005 terdapat 6,86% kematian tiap 1000 kelahiran dengan penyebab utama prematuritas dengan gawat nafas atau *Respiratory Distress Newborn* (Wahyuni & Wiwin, 2020)

Data Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2018, penyebab kematian bayi baru lahir disebabkan oleh komplikasi kejadian intrapartum, akibat gangguan pernapasan dan kardiovaskuler, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan prematur, kelainan kongenital, infeksi dan akibat lainnya. Sedangkan pada tahun 2019 proporsi penyebab kematian bayi baru lahir dalam Profil Kesehatan Indonesia (KEMENKES, 2019) adalah BBLR 35,3%, asfiksia 27,0 %, kelainan bawaan 21,4%, sepsis 12,5%, dan lain-lain.

Penyebab utama kematian neonatal dini di Indonesia berdasarkan trend kematian neonatal dari tahun 2001–2007 adalah gangguan pernapasan ketika lahir (*birth asphyxia, respiratory distress syndrome, aspirasi meconium*), prematur dan berat badan lahir rendah untuk bayi neonatal dini, serta sepsis neonatorum (Wahyuni & Wiwin, 2020)

Di Provinsi Sulawesi Selatan, kasus kematian bayi baru lahir pada tahun 2016 sebanyak 838, khususnya Kota Makassar sebanyak 37 kasus dan pada tahun 2017 mengalami penurunan angka kematian bayi baru lahir yaitu 817 kasus dan khusus Kota Makassar sebanyak 33 kasus (Atika, 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat pelaksana di ruang *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) RSUD Labuang Baji Makassar di dapatkan data bahwa mayoritas yang dirawat di ruang tersebut yaitu neonatus dengan *Respiratory Distress Newborn* (RDN) dan BBLR.

RDN atau gangguan pernapasan pada bayi baru lahir biasanya menunjukkan gejala takipnea dengan laju pernapasan lebih dari 60 kali per menit disertai dengan grunting, retraksi dinding dada, cuping hidung, dan sianosis. RDN merupakan sekumpulan gejala gangguan pernapasan pada bayi yang baru lahir dengan tanda-tanda takipnea, grunting, retraksi dada, napas cuping hidung, dan sianosis yang biasanya disebabkan oleh ketidakmaturation dari sel tipe II untuk menghasilkan surfaktan yang memadai (Atika, 2019). Perkembangan intervensi keperawatan saat ini dalam mengurangi angka kematian dan kesakitan pada bayi dengan gangguan pernapasan yaitu antara lain dengan menggunakan ventilasi mekanik dan juga mobilisasi atau pengaturan posisi sebagai suatu upaya untuk mengurangi sesak napas (Apriliawati, 2016)

Pemberian pengaturan posisi tidur pada BBL merupakan peran perawat neonatus dalam memberikan asuhan keperawatan. Pengaturan posisi yang tepat pada bayi baru lahir dapat meningkatkan keluaran klinis seperti peningkatan fungsi paru dan dapat meningkatkan kualitas tidur bayi. Posisi lateral kiri dan prone juga dapat menurunkan kompresi paru oleh jantung dan memaksimalkan ekspansi paru di region dorsal sebagai akibat dari

berkurangnya tekanan paru region dorsal oleh organ abdomen (Efendi et al., 2019).

Posisi *semi prone* merupakan modifikasi dari posisi lateral dan posisi pronasi. Posisi *semi prone* juga biasa disebut *the quarter prone* dan dikenal juga dengan istilah posisi sims. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yin et al., 2016) dan (Utario et al., 2017) menunjukkan bahwa posisi *semi prone* dapat meningkatkan oksigenasi pada bayi premature dengan *Continous Positive Airway Pressure* (CPAP).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Efendi et al., 2019 menunjukkan bahwa posisi quarter atau semi prone merupakan posisi yang direkomendasikan untuk bayi prematur dengan RDS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ginting & Nurhaeni, 2021) menunjukkan bahwa posisi *semi prone* dapat memberikan efek kenyamanan pada anak. Selain itu posisi *semi prone* dapat menurunkan frekuensi pernapasan pada anak yang sesak, dan meningkatkan saturasi oksigen pada anak yang terpasang CPAP.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari senin tanggal 26 juli 2021 yaitu terdapat 2 bayi yang dirawat di ruang *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) RSUD Labuang Baji Makassar yaitu Bayi Ny. R dengan RDN dan Bayi Ny. J dengan BBLR. Pada saat observasi Bayi Ny. R nampak terpasang CPAP. Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat pelaksana di ruang NICU bahwa mayoritas bayi yang dirawat di ruang NICU yaitu bayi dengan RDN dan BBLR. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tentang posisi semi prone, peneliti tertarik melakukan intervensi pemberian posisi semi prone pada bayi Ny. R yang mengalami RDN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah “Bagaimana Analisis Asuhan Keperawatan Pada Bayi Yang Mengalami RDN Dengan Masalah Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Posisi *Semi Prone* Di Ruang NICU RSUD Labuang Baji Makassar ?”

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui analisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan masalah pola napas tidak efektif menggunakan intervensi posisi *semi prone* di ruang NICU RSUD Labuang Baji Makassar

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1.3.2.1 Untuk menganalisis pengkajian pada bayi yang mengalami RDN
- 1.3.2.2 Untuk menganalisis diagnosa keperawatan pada bayi yang mengalami RDN
- 1.3.2.3 Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada bayi yang mengalami RDN
- 1.3.2.4 Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada bayi yang mengalami RDN
- 1.3.2.5 Untuk menganalisis evaluasi tindakan keperawatan yang telah dilakukansesuai dengan rencana keperawatan pada bayi yang mengalami RDN
- 1.3.2.6 Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan masalah pola napas tidak efektif menggunakan intervensi posisi *semi prone*


1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan masalah pola napas tidak efektif menggunakan intervensi posisi *semi prone* di RSUD Labuang Baji Makassar

1.4.2 Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi dengan masalah pola napas tidak efektif pada bayi yang mengalami RDN dengan masalah pola napas tidak efektif menggunakan intervensi posisi *semi prone* pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Definisi

RDN adalah kumpulan gejala gangguan pernapasan pada bayi yang baru lahir yang ditandai dengan takipnea, grunting, retraksi dada, pernapasan cuping hidung, dan sianosis (Atika, 2019)

RDS merupakan istilah yang digunakan untuk disfungsi pernafasan pada neonatus. Gangguan ini merupakan penyakit yang berhubungan dengan keterlambatan perkembangan maturitas paru atau tidak adekuatnya jumlah surfaktan dalam paru (Marmi & Rahardjo, 2014)

RDN/ RDS atau biasa juga disebut dengan *Hyaline Membrane Disease* (HMD) merupakan gangguan pernafasan yang sering terjadi pada bayi prematur dengan tanda-tanda antara lain takipnue > 60 kali/ menit, retraksi dinding dada, sianosis pada udara kamar yang menetap atau memburuk pada 48-96 jam kehidupan dengan x-ray thorak yang spesifik, sekitar 60% bayi yang lahir sebelum gestasi 29 minggu mengalami RDS (Suriadi et al., 2010). Tanda dan gejala sesuai dengan besarnya bayi, berat penyakit, adanya infeksi dan ada tidaknya shunting darah melalui Patent Ductus Arteri (PDA) (Hidayat, 2012)

2.1.2 Etiologi

Menurut (Suriadi et al., 2010) dalam bukunya menyebutkan penyebab RDS sebagai berikut :

1. Usia kehamilan
2. Berat badan bayi lahir < 2500 gram
3. Bayi dengan Berat badan < 1000 gram
4. 20% berkembang dengan *Bronchopulmonary Dysplasia* (BPD)

Penyebab RDS dalam (Atika, 2019) yaitu sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan paru-paru untuk mengembang dan alveoli terbuka
2. Alveoli masih kecil sehingga mengalami kesulitan berkembang dan pengembangan juga kurang sempurna
3. Berat badan bayi lahir kurang dari 2500 gram
4. Adanya kelainan di dalam dan di luar paru
5. Kelainan dalam paru yang menunjukkan sindrom ini adalah pneumothoraks / pneumomediastinum dan PMH
6. Bayi prematur

2.1.3 Klasifikasi Kegawatan Pernapasan pada Bayi

Down Score dapat digunakan untuk mendiagnosis cepat dari gawat napas yang dialami oleh bayi baru lahir dalam menilai tingkat keparahannya. *Down score* dapat dijadikan sebagai pengkajian klinis awal dalam memantau derajat gawat napas pada bayi dengan RDN tanpa melalui uji yang kompleks di unit perawatan (Atika, 2019). Menurut (Hidayat, 2012) RDN atau RDS di klasifikasikan berdasarkan tingkat kegawatannya. Penilaian tingkat kegawatan napas dengan down skor ialah sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Score Down*

Pemeriksaan	Skor		
	0	1	2
Frekuensi	< 60 kali/ menit	60-80 kali/ menit	> 80 kali/ menit
Retraksi	Tidak ada retraksi	Retraksi ringan	Retraksi berat
Sianosis	Tidak ada sianosis	Sianosis hilang dengan oksigen	Sianosis menetap walaupun diberi oksigen
Air Entry	Udara masuk	Penurunan ringan udara masuk	Tidak ada udara masuk
Merintih	Tidak merintih	Dapat didengar dengan stetoskop	Dapat didengar dengan alat bantu
Evaluasi	< 4 : Gawat napas ringan → O ² Nasal / Head Box 4-7 : Gawat napas sedang → Perlu Nasal CPAP > 7 : Gawat berat → Diperlukan analisis gas darah/ Perlu Intubasi		

2.1.4 Patofisiologi

Faktor yang mempengaruhi terjadinya RDS pada bayi yaitu disebabkan oleh ukuran alveoli yang masih kecil sehingga sulit untuk berkembang. Pengembangan kurang sempurna karena dinding thorax masih lemah dan juga produksi surfaktan kurang sempurna. Kekurangan surfaktan mengakibatkan kolaps pada alveolus sehingga membuat paru-paru menjadi kaku. Hal ini menyebabkan perubahan fisiologi paru sehingga daya pengembangan paru (*compliance*) menurun 25 % dari normal, pernafasan menjadi berat, *shunting intrapulmonal* meningkat dan terjadi hipoksemia berat, hipoventilasi yang menyebabkan asidosis respiratorik.

Surfaktan mengandung 90% fosfolipid dan 10% protein, lipoprotein ini berfungsi menurunkan tegangan pada permukaan dan menjaga agar alveoli tetap mengembang. Secara makroskopik, paru-paru tampak tidak berisi udara dan berwarna kemerahan seperti hati. Oleh karena itu paru-paru memerlukan tekanan pembukaan yang tinggi untuk mengembang.

Gawat napas dapat terjadi pada bayi dengan gangguan pernafasan yang dapat menimbulkan dampak cukup berat pada bayi berupa kerusakan otak bahkan kematian. Akibat dari gangguan pada sistem pernafasan atau kurangnya oksigen (hipoksia) pada tubuh bayi yang akan beradaptasi terhadap kekurangan oksigen dengan mengaktifkan metabolisme anaerob. Apabila keadaan hipoksia semakin berat dan lama, metabolisme anaerob akan menghasilkan asam laktat.

Dengan memburuknya keadaan asidosis dan penurunan aliran darah ke otak maka terjadilah kerusakan otak dan organ yang lainnya karena hipoksia dan iskemia. Pada stadium awal terjadi hiperventilasi diikuti stadium apneu primer. Pada keadaan ini bayi tampak sianosis, tetapi sirkulasi darah relatif masih baik. Curah jantung meningkat dan adanya vasokonstriksi perifer ringan menimbulkan peningkatan tekanan darah dan refleksi bradikardi ringan.

Depresi pernafasan saat ini dapat diatasi dengan meningkatkan implus aferen seperti perangsangan pada kulit. Apneu normal berlangsung

sekitar 1-2 menit. Apnea primer dapat memanjang dan diikuti dengan memburuknya sistem sirkulasi. Hipoksia miokardium dan asidosis akan memperberat bradikardi, vesokonstriksi dan hipotensi. Keadaan ini dapat terjadi samapai 5 menit dan kemudian terjadi apneu sekeunder. Selama apneu sekunder jantung tekanan darah, dan kadar oksigen dalam darah terus menurun. Bayi tidak bereaksi terhadap rangsangan dan tidak menunjukkan upaya pernafasan secara spontan. Kematian akan terjadi kecuali pernafasan buatan akan memberikan oksigen sesegera mungkin (Marmi & Rahardjo, 2014)

Menurut (Suriadi et al., 2010) dalam bukunya dijelaskan patofisiologi RDS sebagai berikut :

1. Pada bayi dengan RDS, dimana terjadi ketidakmampuan paru untuk mengembang dan alveoli terbuka. RDS pada bayi yang belum matur dapat menjadi penyebab gagal napas karena imaturnya dinding dada, parenchyma paru dan imaturnya endotelium kapiler yang menyebabkan kolaps paru pada akhir ekspirasi
2. Pada bayi dengan RDS disebabkan oleh menurunnya jumlah surfaktan atau perubahan kualitatif surfaktan, dengan demikian menimbulkan ketidakmampuan alveoli untuk ekspansi.
3. Secara alamiah perbaikan mulai setelah 24-48 jam sel yang rusak akan diganti. Membran hyaline berisi debris dari sel yang nekrosis yang tertangkap dalam *proteinaceous filtrate serum* (saringan serum protein) di fagosit oleh makrofag. Sel cuboidal menempatkan pada alveolar yang rusak dan epitelium jalan napas, kemudian terjadi perkembangan sel kapiler baru pada alveoli. Sintesis surfaktan memulai lagi dan kemudian membantu perbaikan alveoli untuk penebangan

2.1.5 Manifestasi Klinis

Berdasarkan berat dan ringannya tanda dan gejala klinis penyakit RDS ini dipengaruhi oleh tingkat maturitas paru. Apabila semakin rendah berat badan dan usia kehamilan, maka semakin berat pula gejala klinis yang

akan ditunjukkan. Manifestasi dari RDS disebabkan adanya atelektasis alveoli, edema, dan kerusakan sel dan selanjutnya menyebabkan kebocoran serum protein ke dalam alveoli sehingga menghambat fungsi surfaktan. Gejala klinikal yang timbul yaitu : adanya sesak nafas pada bayi yang ditandai dengan takipnea > 60 x/menit, pernafasan cuping hidung, grunting, retraksi dinding dada, dan sianosis, dan gejala menetap dalam 48-96 jam pertama setelah lahir (Marmi & Rahardjo, 2014).

Menurut (Suriadi et al., 2010) manifestasi klinis dari RDS adalah sebagai berikut :

1. Pernapasan cepat
2. Pernapasan terlihat paradoks
3. Cuping hidung
4. Apnea
5. Murmur
6. Sianosis pusat

2.1.6 Pemeriksaan Penunjang

Diagnosa RDN dapat ditegakkan melalui pemeriksaan foto thoraks, AGD, hitung darah lengkap, perubahan elektrolit dan biopsy paru (Atika, 2019)

1. Foto Thoraks
 - a) Pemeriksaan radiologis, mula-mula tidak ada kelainan jelas pada foto dada, setelah 12-24 jam akan tampak infiltrate alveolar tanpa batas yang tegas diseluruh paru
 - b) Pola retikulo granular difus bersama bronkhogram udara yang saling tumpah tindih
 - c) Tanda paru sentral, batas jantung sukar dilihat, inflasi paru buruk
 - d) Kemungkinan terdapat kardoomegali bila system lain juga terkena (bayi dari ibu diabetes, hipoksia, gagal jantung terkena (bayi dari ibu diabetes, hipoksia, gagal jantung kongestif)
 - e) Bayangan timus yang besar

- f) Bergranul merata pada bronkhogram udara, yang menandakan penyakit berat jika terdapat pada beberapa jam pertama
- 2. AGD menunjukkan asidosis respiratory dan metabolik yaitu adanya penurunan pH, penurunan PaO₂, dan peningkatan paCO₂, penurunan HCO₃
- 3. Hitung darah lengkap
- 4. Perubahan elektrolit, cenderung terjadi penurunan kadar kalsium, natrium, dan glukosa serum
- 5. Biopsi paru, terdapat adanya pengumpulan granulosit secara abnormal dalam parenkim paru

Menurut (Suriadi et al., 2010) pemeriksaan diagnostik atau penunjang pada RDS meliputi :

- 1. Foto rontgen
- 2. AGD
- 3. *Imatur lecithin/ sphingomyelin*

2.1.7 Komplikasi

Menurut (Suriadi et al., 2010) dalam bukunya menyebutkan komplikasi RDS sebagai berikut :

- 1. *Pneumothorax*
- 2. *Pneumomediastinum*
- 3. *Pulmonary dysplasia*
- 4. *Bronchopulmonary dysplasia*
- 5. *Patent ductus arteriosus*
- 6. Hipotensi
- 7. Menurunnya pengeluaran urin
- 8. Asidosis
- 9. Hiponatremi
- 10. Hipernatremi
- 11. Hipokalemia
- 12. Hipoglikemi

13. *Disseminated intravascular coagulation*
14. Kejang
15. *Intraventricular hemorrhage*
16. *Retinopathy* pada prematur
17. Infeksi sekunder

2.1.8 Penatalaksanaan

1. Terapi Oksigen

Tujuan terapi oksigen adalah untuk menyediakan oksigen yang memadai bagi jaringan, mencegah akumulasi asam laktat yang dihasilkan oleh hipoksiaserta pada waktu yang sama menghindari efek negatif yang potensial dari hiperoksia dan radikal bebas. Jika bayi tidak membutuhkan ventilasi mekanik, oksigen dapat dipasok menggunakan tudung plastic yang ditempatkan di atas kepala bayi, menggunakan nasal kanul, atau CPAP untuk menyediakan konsentrasi dan kelembapan oksigen yang bervariasi. Ventilasi mekanik (bantuan pernafasan dengan memberikan sejumlah oksigen yang ditentukan melalui tabung endotrakeal) diatur untuk memberikan sejumlah oksigen yang telah ditentukan pada bayi selama nafas spontan dan menyediakan pernafasan mekanik pada saat tidak ada nafas spontan

2. Resusitasi Neonatal

Pengkajian bayi yang cepat dapat mengidentifikasi bayi yang tidak membutuhkan resusitasi : bayi lahir cukup bulan tanpa ada bukti mekonium atau infeksi pada pada cairan amnion, bernafas atau menangis, dan memiliki tonus otot yang baik. Keputusan untuk melanjutkan langkah tindakan berdasarkan pengkajian pernafasan, denyut jantung dan warna. Jika salah satu karakteristik tersebut tidak ada, maka bayi harus menerima tindakan berikut secara berurutan :

- a. Langkah awal penstabilan : berikan kehangatan dan menempatkan bayi di bawah pemancar panas, posisikan kepala pada posisi jalan nafas terbuka, bersihkan jalan nafas dengan *bulb syringe* atau kateter

pengisap (*suction*), keringkan bayi, rangsang untuk bernafas dan ubah posisi bayi

- b. Ventilasi
- c. Kompresi dada
- d. Pemberian epinefrin atau ekspansi volume atau keduanya

3. Terapi Pengganti Surfaktan

Surfaktan dapat diberikan sebagai tambahan untuk terapi oksigen dan ventilasi. Pada umumnya, bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 32 minggu belum mempunyai surfaktan paru yang cukup adekuat untuk kelangsungan hidup di luar rahim. Penggunaan surfaktan disarankan pada bayi dengan distress pernafasan sesegera mungkin, setelah kelahiran, terutama bayi BBLR, yang belum terpapar steroid antenatal pada ibu hamil. Pemberian steroid antenatal pada ibu hamil dan penggantian surfaktan dapat mengurangi insiden distress pernafasan dan penyakit penyerta

4. Terapi Tambahan

Terapi tambahan Nitrat hidup (*inhaled nitric oxide-INO*), *extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)*, dan cairan ventilasi merupakan terapi tambahan yang digunakan bagi bayi matur/cukup bulan dan prematur akhir dengan kondisi seperti hipertensi pulmonal, sindrom aspirasi mekonium, pneumonia, sepsis, dan hernia diafragmatika kongenital untuk mengurangi atau membalikkan hipertensi pulmonal, vasokonstriksi paru, asidosis, serta distress pernapasan dan gagal napas bayi baru lahir. Terapi INO digunakan bersamaan dengan terapi penggantian surfaktan, ventilasi frekuensi tinggi, atau ECMO.

ECMO digunakan pada penatalaksanaan bayi baru lahir dengan gagal napas akut hebat pada kondisi yang sama seperti yang disebutkan untuk INO. Terapi sebuah mesin jantung-paru yang dimodifikasi, meskipun begitu, pada ECMO jantung tidak berhenti dan darah tidak sepenuhnya melewati paru. Darah didorong dari kateter atrium kanan atau vena jugularis kanan dengan gaya gravitasi ke sebuah pompa pengatur,

dipompa melalui membran paru di mana darah dioksigenasi, kemudian melalui sebuah mesin penukar panas yang kecil di mana darah menghangatkan, dan kemudian dikembalikan ke sistem sirkulasi melalui sebuah arteri utama seperti arteri karotis ke lengkung menyediakan oksigen untuk sirkulasi, yang memungkinkan paru beristirahat serta menurunkan hipertensi paru maupun hipoksemia pada kondisi seperti hipertensi paru menetap bayi baru lahir, hernia diafragma kongenital, sepsis, aspirasi mekonium, dan pneumonia berat (Atika, 2019). Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam dalam sabdannya :

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram” (H.R Abu Dawud dari Abud Darda'radiallahu'anhu)

2.1.9 Prognosis

Prognosis penyakit RDN tergantung dari penyebabnya, adanya disfungsi organ lain, usia dan penyakit kronik penderita. RDN merupakan penyakit yang dapat hilang sendiri. Setelah periode deteriorasi (sekitar 48 jam) dan bila tidak ada komplikasi, bayi yang terkena mulai membaik pada 72 jam. Sering ditandai dengan awitan diuresis, perbaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan ketersediaan yang lebih besar material surfaktan-aktif. Bayi RDN yang bertahan dalam 96 jam pertama memiliki kesempatan mengalami pemulihan (Wong et al., 2009)


Akan tetapi, komplikasi RDN mencakup komplikasi seperti terkait komplikasi terapi oksigen dan masalah yang berhubungan dengan prematuritas seperti paten ductus arteriosus dan gagal jantung kongestif, perdarahan intraventrikular, dysplasia bronkopulmonal, retinopati prematuritas, pneumonia, sindrom kebocoran udara, sepsis, *necrotizing enterocolitis*, dan sekuele neurologis (Wong et al., 2009)

Prognosis dengan pengobatan yang baik akan menurunkan mortalitas hingga <10%. Dengan dukungan ventilasi yang memadai saja, produksi surfaktan akhirnya dimulai, dan begitu produksi dimulai, RDN hilang dalam 4 atau 5 hari. Namun, hipoksemia berat dapat menyebabkan kegagalan organ multipel dan kematian (Balest, 2018). Bayi yang tidak mendapatkan penanganan segera atau memiliki penyakit komplikasi lainnya yang akan memperburuk kondisi RDN dapat menyebabkan kematian

Bayi dengan RDN memiliki 2-4 kali risiko menyebabkan kematian dibandingkan bayi tanpa gangguan pernafasan (Swarnkar & Swarnkar, 2015). Bahkan, kondisi RDN sering memburuk selama 2 sampai 4 hari setelah lahir, dan sering terjadi peningkatan perlahan setelah itu. Beberapa bayi dengan sindrom gawat pernafasan berat akan meninggal antara pada hari ke-2 dan hari ke-7. Dalam penelitian lain, menemukan angka kematian yang cukup tinggi akibat RDN yaitu 60 (36,6%) dari 164 bayi (Adebami et al., 2017 Dalam (Atika, 2019))

Prognosis memburuk, jika terjadi komplikasi jangka panjang sehingga angka mortalitas RDN mencapai 40%, bila ditambah dengan *Multiple Organ Dysfunction Syndrome* dari organ lain maka angka kematian mencapai > 60 %. Pada penderita yang sembuh, gejala sisa fisik dan psikis secara bermakna akibat fibrosis dan dapat berkembang menjadi menjadi penyakit paru obstruktif . Selain itu, pasien sembuh juga dapat asimtomatik tetapi kelainan tes fungsi paru masih dapat ditemukan, sedangkan sebagian lainnya fungsi parunya kembali normal dalam 6-12 bulan (Osterbur, Mann, Kuroki, & Declue, 2014 dalam (Atika, 2019))

2.1.10 Penyimpangan KDM



2.2 Konsep Asuhan Keperawatan

2.2.1 Konsep Teori Keperawatan Terkait

Virginia Henderson lahir pada tahun 1897, ia adalah anak kelima dari 8 bersaudara dikeluarganya. Henderson berasal dari Kansas City, Ia menghabiskan masa pertumbuhannya di Virginia sebab ayahnya membuka praktik hukum di Washington

Selama masa perang dunia ke I, Henderson tertarik dengan ilmu perawatan, kemudian pada tahun 1918 Henderson masuk Sekolah Perawat Militer di Washington. Ia kemudian lulus di tahun 1921 dan menempati posisi sebagai staf perawat di Henry Street Visiting Nurse Service di New York. Pada tahun 1922 Henderson mulai mengajar ilmu perawatan di Norfolk Protestant Hospital di Virginia. Dan lima tahun kemudian ia memasuki Teacher's College di Universitas Columbia, dimana ia berturut-turut meraih gelar B.S dan M.A bidang pendidikan perawatan

Virginia Henderson melihat pasien sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk meraih kesehatan dan kebebasan atau kematian yang damai. Pikiran dan tubuh tidak terpisahkan (*inseparable*). Pasien dan keluarganya dipandang sebagai satu kesatuan.

Dalam teorinya, tidak ditemukan adanya definisi khusus tentang kebutuhan, tetapi Henderson mengidentifikasi 14 kebutuhan dasar pasien, yang terdiri dari komponen-komponen penanganan perawatan. Hal ini termasuk kebutuhan untuk : bernapas secara normal, makan dan minum dengan cukup, membuang kotoran tubuh, bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan, tidur dan istirahat, memilih pakaian yang sesuai, menjaga suhu badan tetap dalam batas normal dengan menyesuaikan pakaian dan mengubah lingkungan, menjaga tubuh tetap bersih dan terawat dengan baik dan melindungi integument, menghindar dari bahaya dalam lingkungan dan yang bisa melukai, berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi,

kebutuhan, rasa takut, atau pendapat-pendapat, beribadah sesuai keyakinan seseorang, bekerja dengan suatu cara yang mengandung unsur prestasi, bermain atau terlibat dalam beragam bentuk rekreasi, belajar, mengetahui, atau memuaskan rasa penasaran yang menuntun pada perkembangan normal dan kesehatan serta menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada

2.2.2 Pengkajian Keperawatan

1. Anamnesa

a. Data Demografi

Data demografi berisi identitas bayi, usia, jenis kelamin, agama, identitas orangtua, suku, alamat, pekerjaan

b. Keluhan Utama

Bayi dengan RDN sering ditemui keluhan seperti sesak, ada pernapasan cuping hidung, kondisi umum lemah, lesu, apneu, tidak responsif, penurunan bunyi napas

c. Riwayat Penyakit Sekarang

Pada bayi yang mengalami RDN, biasanya akan diawali dengan tanda dan gejala seperti mudah letih, dispnea, sianosis, bradikardi, hipotensi, hipotermi, tonus otot menurun, edema terutama di daerah dorsal tangan atau kaki, retraksi supersternal/ epigastrik/ intercosta, grunting expirasi. Perlu juga ditanyakan mulai kapan keluhan itu muncul. Apa tindakan yang telah dilakukan untuk menurunkan atau menghilangkan keluhan keluhan tersebut

d. Riwayat Penyakit Dahulu

Perlu ditanyakan apakah pasien mengalami prematuritas dengan paru-paru yang imatur (gestasi dibawah 32 minggu), gangguan surfaktan, lahir prematur dengan operasi caesar serta penurunan suplai oksigen saat janin saat kelahiran pada bayi matur atau prematur, atelektasis, DM, hipoksia, asidosis

e. Riwayat Maternal

Meliputi riwayat menderita penyakit seperti diabetes mellitus, kondisi seperti perdarahan placenta, placenta previa, tipe dan lama persalinan, stress fetal atau intrapartus, dan makrosomia (bayi dengan ukuran besar akibat ibu yang memiliki riwayat sebagai perokok, dan pengonsumsi minuman keras serta tidak memperhatikan gizi yang baik bagi janin)

f. Riwayat Penyakit Keluarga

Perlu dikaji apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit yang disinyalir sebagai penyebab kelahiran prematur/ caesar sehingga menimbulkan membran hyalin disease

g. Riwayat Psikososial

Meliputi perasaan keluarga terhadap penyakitnya, bagaimana cara mengatasi masalahnya serta bagaimana perilaku keluarga terhadap tindakan yang dilakukan terhadap bayinya

h. Status Infant Saat Lahir

1) Prematur, umur kehamilan

2) Apgar score, apakah terjadi aspiksia

3) Apgar score adalah : Suatu ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi keadaan umum bayi baru lahir

4) Bayi premature yang lahir melalui operasi Caesar

2. Pemeriksaan Fisik

Pada pemeriksaan fisik akan ditemukan takhipneu/ pernapasan > 60 kali / menit, pernafasan mendengkur, retraksi subkostal/interkostal, pernafasan cuping hidung, sianosis dan pucat, hipotonus, apneu, gerakan tubuh berirama, sulit bernafas dan sentakan dagu. Pada awalnya suara nafas mungkin normal kemudian dengan menurunnya pertukaran udara, nafas menjadi parau dan pernapasan dalam.

Pengkajian fisik pada bayi dan anak dengan kegawatan pernafasan dapat dilihat dari penilaian fungsi respirasi dan penilaian fungsi kardiovaskuler. Penilaian fungsi respirasi meliputi :

a. Frekuensi nafas

Takhipneu adalah manifestasi awal distress pernafasan pada bayi. Takhipneu tanpa tanda lain berupa distress pernafasan merupakan usaha kompensasi terhadap terjadinya asidosis metabolik seperti pada syok, diare, dehidrasi, ketoasidosis, diabetikum, keracunan salisilat, dan insufisiensi ginjal kronik. Frekuensi nafas yang sangat lambat dan ireguler sering terjadi pada hipotermi, kelelahan dan depresi SSP yang merupakan tanda memburuknya keadaan klinik

b. Mekanika usaha pernafasan

Meningkatnya usaha nafas ditandai dengan respirasi cuping hidung, retraksi dinding dada, yang sering dijumpai pada obtruksi jalan nafas dan penyakit alveolar. Anggukan kepala ke atas, merintih, stridor dan ekspansi memanjang menandakan terjadi gangguan mekanik usaha pernafasan. Retraksi intercostal, suprasternal, atau substernal

c. Warna kulit/membran mukosa

Pada keadaan perfusi dan hipoksemia, warna kulit tubuh terlihat berbercak (*mottled*), tangan dan kaki terlihat kelabu, pucat dan teraba dingin, sianosis (sentral kemudian diikuti sirkumoral) berhubungan dengan persentase desaturasi hemoglobin

d. Kardiovaskuler

1) Frekuensi jantung dan tekanan darah

Adanya sinus tachikardi merupakan respon umum adanya stress, ansietas, nyeri, demam, hiperkapnia, dan atau kelainan fungsi jantung

2) Kualitas nadi

Pemeriksaan kualitas nadi sangat penting untuk mengetahui volume dan aliran sirkulasi perifer nadi yang tidak adekwat dan tidak teraba pada satu sisi menandakan berkurangnya aliran darah atau tersumbatnya aliran darah pada daerah tersebut. Perfusi kulit yang memburuk dapat dilihat dengan adanya bercak, pucat dan sianosis

e. Pemeriksaan pada pengisian kapiler dapat dilakukan dengan cara :

1) *Nail Bed Pressure* (tekan pada kuku)

2) *Blancing Skin Test*

Caranya yaitu dengan meninggikan sedikit ekstremitas dibandingkan jantung kemudian tekan telapak tangan atau kaki tersebut selama 5 detik, biasanya tampak keputihan. Selanjutnya tekanan dilepaskan pucat akan menghilang 2-3 detik

3) Perfusi pada otak dan respirasi

Gangguan fungsi serebral awalnya adalah gaduh gelisah diselingi agitasi dan letargi. Pada iskemia otak mendadak selain terjadi penurunan kesadaran juga terjadi kelemahan otot, kejang dan dilatasi pupil

3. *Activity Daily Life* (ADL)

a. Nutrisi

Bayi dapat kekeurangan cairan sebagai akibat bayi belum minum atau menghisap

b. Istirahat tidur

Kebutuhan istirahat terganggu karena adanya sesak nafas ataupun kebutulan nyaman terganggu akibat tindakan medis

c. Eliminasi

Penurunan pengeluaran urin

2.2.3 **Diagnosis Keperawatan**

1. **Pola Napas Tidak Efektif**

Definisi : Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat

Penyebab :

a. Depresi pusat pernapasan

b. Hambatan upaya napas

c. Deformitas dinding dada

d. Deformitas tulang dada

- e. Gangguan neuromuskular
 - f. Gangguan neurologis
 - g. Imaturitas neurologis
 - h. Penurunan energi
 - i. Obesitas
 - j. Posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru
 - k. Sindrom hipoventilasi
 - l. Kerusakan inervasi diafragma
 - m. Cedera medula spinalis
 - n. Efek agen farmakologis
 - o. Kecemasan
- Gejala dan tanda mayor

- a. Subjek
 - Dispnea
- b. Objektif
 - Penggunaan otot bantu pernapasan
 - Fase ekspirasi memanjang
 - Pola napas abnormal

2. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

Definisi : Ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten

Penyebab :

- a. Spasme jalan napas
- b. Hipersekresi jalan napas
- c. Disfungsi neuromuskular
- d. Benda asing dalam jalan napas
- e. Adanya jalan napas buatan
- f. Sekresi yang tertahan
- g. Hiperplasia dinding jalan napas
- h. Proses infeksi

- i. Respon alergi
- j. Efek agen farmakologi

Situasional :

- a. Merokok aktif
- b. Merokok pasif
- c. Terpajan polutan

Gejala dan tanda mayor

- a. Subjektif : Tidak tersedia
- b. Objektif
 - Batuk tidak efektif
 - Tidak mampu batuk
 - Sputum berlebih
 - Mengi, *wheezing* dan/ ronchi kering
 - Mekonium di jalan napas

Gejala dan tanda minor

- a. Subjektif
 - Dispnea
 - Sulit bicara
 - Ortopnea
- b. Objektif
 - Gelisah
 - Sianosis
 - Bunyi napas menurun
 - Frekuensi napas berubah
 - Pola napas berubah

Kondisi klinis terkait

- a. *Gullian barre syndrome*
- b. Sklerosis multiple
- c. *Myasthenia gravis*
- d. Prosedur diagnostik
- e. Depresi SSP

- f. Cedera kepala
- g. Stroke
- h. Kuadri plegia
- i. Sindrom aspirasi mekonium
- j. Infeksi saluran napas

3. Defisit Nutrisi

Definisi : Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme

Penyebab

- a. Ketidakmampuan menelan makanan
- b. Ketidakmampuan mencerna makanan
- c. Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi
- d. Peningkatan kemampuan metabolisme
- e. Faktor ekonomi
- f. Faktor psikologis

Gejala dan tanda mayor

- a. Subjektif : Tidak tersedia
- b. Objektif : BB menurun minimal 10% dibawah rentang ideal

Gejala dan tanda minor

- a. Subjektif
 - Cepat kenyang setelah makan
 - Keras/nyeri abdomen
 - Napsu makan menurun
- b. Objektif
 - Bising usus hiperaktif
 - Otot pengunyah melemah
 - Otot menelan melemah
 - Membran mukosa pucat
 - Sariawan
 - Serum albumin turun
 - Rambut rontok berlebihan

Diare

Kondisi klinis terkait

- a. Stroke
- b. Parkinson
- c. *Mobius sindrom*
- d. *Cerebral palsy*
- e. *Cleftlip*
- f. *Cleftpalate*
- g. *Amvotropic lateral sclerosis*

4. Risiko Perfusi Perifer Tidak Efektif

Definisi : Berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh

Faktor risiko :

- a. Hiperglikemia
- b. Gaya hidup kurang gerak
- c. Hipertensi
- d. Merokok
- e. Prosedurendovaskuler
- f. Trauma
- g. Kurang terpapar informasi tentang faktor pemberat (mis. merokok gaya hidup kurang gerak, obesitas, imobilitas)

Kondisi klinis terkait :

- a. Arteriosklerosis
- b. Raynaud's disease
- c. Trombosis arteri
- d. Atritis reumatoid
- e. Leriche's syndrome
- f. Aneurisma
- g. Buerger's disease
- h. Varises
- i. DM

j. Hipotensi

k. kanker

5. Risiko Infeksi

Definisi : Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik

Faktor risiko :

- a. Penyakit kronis
- b. Efek prosedur invasif
- c. Malnutrisi
- d. Peningkatan paparan organisme patogenik lingkungan
- e. Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer
- f. Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder

Kondisi klinis terkait

- a. AIDS
- b. Luka bakar
- c. Penyakit paru obstruktif kronis
- d. DM
- e. Tindakan invasif
- f. Kondisi penggunaan terapi steroid
- g. Penyalahgunaan obat
- h. Ketuban pecah sebelum waktunya
- i. Kanker
- j. Gagal ginjal
- k. Imunosupresi
- l. Lymphedema
- m. Leukositopenia
- n. Gangguan fungsi hati

6. Ansietas

Definisi : Emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman

Penyebab

- a. Krisis situasional
- b. Kebutuhan tidak terpenuhi
- c. Krisis maturasional
- d. Ancaman terhadap konsep diri
- e. Ancaman terhadap kematian
- f. Kekhawatiran mengalam kegagalan
- g. Disfungsi sistem keluarga
- h. Hubungan orangtua anak tidak memuaskan
- i. Faktor keturunan
- j. Penyalahgunaan zat
- k. Terpapar bahaya lingkungan
- l. Kurang terpapar informasi

Gejala dan tanda mayor

- a. Subjektif

Merasa bingung

Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi

Sulit berkonsentrasi

- b. Objektif

Tampak gelisah

Tampak tegang

Sulit tidur

Gejala dan tanda minor

- a. subjektif

Mengeluh pusing

Anoreksia

Palpitasi

Merasa tidak berdaya

b. Objektif

Frekuensi napas meningkat

Frekuensi nadi meningkat

Tekanan darah meningkat

Diaforesis

Tremor

Muka tampak pucat

Suara bergetar

Kontak mata buruk

Sering berkemih

Berorientasi pada masa lalu

Kondisi klinis terkait

- a. Penyakit kronis progresif
- b. Penyakit akut
- c. Hospitalisasi
- d. Rencana operasi
- e. Kondisi diagnosis penyakit belum jelas
- f. Penyakit neurologis
- g. Tahap tumbuh kembang

2.2.4 Intervensi Keperawatan

1. Diagnosa II : Pola Napas Tidak Efektif

Luaran Keperawatan : (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019)

a. Tujuan dan kriteria hasil

Sesak yang dirasakan klien menurun dengan kriteria hasil :

- 1) Dispnea menurun
- 2) Frekuensi napas membaik
- 3) Tidak ada penggunaan otot bantu napas
- 4) Tidak ada pernapasan cuping hidung

b. Intervensi keperawatan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2019)

Pemantauan Respirasi

Observasi

- a. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas
- b. Monitor pola napas
- c. Monitor kemampuan batuk efektif
- d. Monitor adanya produksi sputum
- e. Monitor adanya sumbatan jalan napas
- f. Palpasi kesimetrisan ekspansi paru
- g. Auskultasi bunyi napas Monitor saturasi oksigen
- h. Monitor hasil x-ray thorax

Terapeutik

- a. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien
- b. Dokumentasikan hasil pemantauan

Edukasi

- a. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan
- b. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu

2. Diagnosa III : Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

Luaran Keperawatan :

- a. Tujuan dan kriteria hasil

Jalan napas tetap paten dengan kriteria hasil :

- 1) Produksi sputum menurun
- 2) Tidak ada sianosis
- 3) Pola napas membaik
- 4) Frekuensi napas membaik

- b. Intervensi keperawatan

Manajemen Jalan Napas

Observasi

- a. Monitor pola napas
- b. Monitor bunyi napas
- c. Monitor sputum

Terapeutik

- a. Pertahankan kepatenan jalan napas
- b. Posisikan semi fowler atau fowler
- c. Berikan minum hangat
- d. Lakukan fisioterapi dada
- e. Lakukan pengisapan lendir <15 detik
- f. Keluarkan sumbatan benda padat dengan forsep McGill
- g. Berikan oksigen

Edukasi

- a. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari
- b. Ajarkan teknik batuk efektif

Kolaborasi : Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu

3. Diagnosa IV : Defisit Nutrisi

Luaran Keperawatan :

- a. Tujuan dan kriteria hasil

Kebutuhan nutrisi klien tercukupi dengan kriteria hasil :

- 1) Berat badan dalam batas normal
- 2) Indeks Masa Tubuh (IMT) dalam batas normal
- 3) Membran mukosa membaik
- 4) Nafsu makan membaik

- b. Intervensi keperawatan

Manajemen Nutrisi

Observasi

- a. Identifikasi status nutrisi
- b. Identifikasi alergi dan intoleran makanan
- c. Identifikasi makanan yang disukai
- d. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien
- e. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik
- f. Monitor asupan makanan
- g. Monitor BB

h. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium

Terapeutik

- a. Lakukan *oral hygiene* sebelum makan, jika perlu
- b. Fasilitasi menentukan program diet
- c. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai
- d. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi
- e. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein
- f. Berikan suplemen makanan
- g. Hentikan pemberian makan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi

Edukasi

- a. Anjurkan posisi susuk, jika mampu
- b. Ajarkan diet yang diprogramkan

Kolaborasi

- a. Pemberian medikasi sebelum makan
- b. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan, jika perlu

4. Diagnosa IV : Risiko Perfusi Perifer Tidak Efektif

Luaran Keperawatan :

- a. Tujuan dan kriteria hasil

Tidak terjadi tanda-tanda perfusi perifer tidak efektif dengan kriteria hasil :

- 1) Warna kulit pucat menurun
- 2) Pengisian kapuler membaik

- b. Intervensi keperawatan

Perawatan Sirkulasi

Observasi

- a. Periksa sirkulasi perifer
- b. Identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi
- c. Monitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstermitas

Terapeutik

- a. Hindari pemasangan infus dan pengambilan darah di area keterbatasan perifer
- b. Hindari pengukuran tekanan darah pada ekstermitas dengan keterbatasan perfusi
- c. Lakukan pencegahan infeksi

Edukasi

- a. Anjurkan berhenti merokok
- b. Anjurkan berolahraga dengan rutin
- c. Anjurkan menggunakan obat penurun tekanan darah, antikoagulan dan penurun kolesterol, jika perlu
- d. Anjurkan melakukan perawatan kulit
- e. Anjurkan program rehabilitasi vaskular

5. Diagnosa V : Risiko Infeksi

Luaran Keperawatan :

- a. Tujuan dan kriteria hasil

Tidak terjadi infeksi dengan kriteria hasil :

- 1) Tidak ada tanda-tanda infeksi
- 2) Kebersihan badan baik
- 3) Kebersihan tangan baik
- 4) Kadar sel darah putih dalam batas normal

- b. Intervensi keperawatan

Pencegahan Infeksi

Observasi

- a. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik

Terapeutik

- a. Batasi jumlah pengunjung
- b. Berikan perawatan kulit pada area edema
- c. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien
- d. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi

Edukasi

- a. Jelaskan tanda dan gejala infeksi
- b. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar
- c. Ajarkan etika batuk
- d. Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi
- e. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi
- f. Anjurkan meningkatkan asupan cairan

Kolaborasi : kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu

6. Diagnosa VI : Ansietas

Luaran Keperawatan :

- a. Tujuan dan kriteria hasil

Ansietas klien menurun dengan kriteria hasil :

- 1) Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun
- 2) Perilaku gelisah menurun
- 3) Verbalisasi kebingungan menurun
- 4) Perilaku tegang menurun

- b. Intervensi keperawatan

Reduksi Ansietas

Observasi

- a. Identifikasi tingkat ansietas berubah
- b. Identifikasi kemampuan mengambil keputusan
- c. Monitor tanda-tanda ansietas

Terapeutik

- a. Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan
- b. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan
- c. Pahami situasi yang membuat ansietas
- d. Dengarkan dengan penuh perhatian
- e. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan
- f. Tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan
- g. Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan
- h. Diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang

Edukasi

- a. Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami
- b. Informasikan secara faktual mengenai diagnosis pengobatan dan prognosis
- c. Anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien
- d. Anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif sesuai kebutuhan
- e. Anjurkan menggunakan perasaan dan persepsi
- f. Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan
- g. Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat
- h. Latih teknik relaksasi

Kolaborasi : Kolaborasi pemberian obat antiansietas, jika perlu

2.2.5 Implementasi Keperawatan

Implementasi Keperawatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Adapun tahap komponen implementasi ialah sebagai berikut :

1. Tindakan keperawatan mandiri
2. Tindakan keperawatan edukatif
3. Tindakan keperawatan kolaboratif
4. Dokumentasi tindakan keperawatan dan respon klien terhadap asuhan keperawatan

2.2.6 Evaluasi Keperawatan

Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan, membandingkan hasil tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menilai efektivitas proses keperawatan mulai dari tahap pengkajian, perencanaan dan pelaksanaan. Evaluasi disusun menggunakan SOAP.

S : Ungkapan perasaan atau keluhan yang dikeluhkan secara subjektif oleh keluarga setelah diberikan implementasi keperawatan

O : Keadaan objektif yang dapat diidentifikasi oleh perawat menggunakan pengamatan yang objektif

A : Analisis perawat setelah mengetahui respon subjektif dan objektif

P : Perencanaan selanjutnya setelah perawat melakukan analisis.

Ada tiga alternatif dalam menafsirkan hasil evaluasi yaitu :

1. Masalah teratasi : masalah teratasi apabila pasien menunjukkan perubahan tingkah laku dan perkembangan kesehatan sesuai dengan kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
2. Masalah sebagian teratasi : masalah sebagian teratasi apabila pasien menunjukkan perubahan dan perkembangan kesehatan hanya sebagian dari kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
3. Masalah belum teratasi : masalah belum teratasi jika pasien sama sekali tidak menunjukkan perubahan perilaku dan perkembangan kesehatan atau bahkan timbul masalah yang baru

2.3 Evidence Based Practice in Nursing

2.3.1 Pengertian

Posisi semi prone merupakan modifikasi dari posisi lateral dan posisi pronasi. Posisi semi prone adalah posisi klien berbaring pada pertengahan antara posisi lateral dan posisi pronasi. Pada posisi ini lengan bawah ada di belakang klien, sedangkan lengan atas ada di depan tubuh klien

2.3.2 Tujuan

Tujuan posisi semi prone dalam (Health, 2020)

1. Menurunkan / menstabilkan laju pernapasan pada bayi yang sesak
2. Meningkatkan saturasi oksigen pada bayi dengan RDS
3. Memberikan efek kenyamanan pada bayi

2.3.3 Indikasi

1. Bayi dengan RDN/RDS
2. Bayi sesak dengan pneumonia
3. Bayi prematur

2.3.4 Kontraindikasi

Beberapa penelitian menyatakan pemberian posisi semi prone tidak dianjurkan untuk bayi dengan penyakit jantung bawaan karena dapat menekan bagian dada (Ginting & Nurhaeni, 2021)

2.3.5 Prosedur Pemberian

Cara pemberian posisi semi prone :

1. Persiapan alat dan bahan
 - a. Handscone
 - b. Alat ukur waktu/ jam/ stopwatch
2. Fase orientasi
 - a. Mengucap salam
 - b. *Informed concent* dengan orangtua bayi
 - c. Mengobservasi keadaan bayi
3. Fase kerja
 - a. Mencuci tangan
 - b. Memastikan keadaan lingkungan dan menjaga privasi
 - c. Membaca Basmalah sebelum melakukan tindakan
 - d. Memakai handscone
 - e. Membuka sarung/ selimut bayi
 - f. Mengatur posisi *semi prone*
 - g. Memastikan bayi nyaman dengan posisi yang diberikan
 - h. Memasang kembali sarung/selimut
 - i. Mengucapkan hamdalah

4. Fase terminasi

Melakukan evaluasi tindakan pada menit ke 10, menit ke 20, menit 30, dan 1 jam setelah pemberian dan mendokumentasikan tindakan

2.3.6 Kriteria Evaluasi

1. Respon : Sesak berkurang, saturasi dalam batas normal, bayi tidak gelisah, tidak rewel, retraksi dada berkurang, bayi merasa nyaman
2. Berikan reinforcement positif
3. Mengakhiri kegiatan dengan baik

2.3.7 Artikel Utama & Artikel Pendukung

1. Artikel utama :
(Ginting & Nurhaeni, 2021, *Posisi Semi Prone Dapat Memberikan Kenyamanan Pada Anak Dengan Pneumonia*, Google Scholer)
2. Artikel Pendukung :
(Efendi, Sari, dkk, 2019, *Pemberian Posisi (Positioning) Dan Nesting Pada Bayi Prematur : Evaluasi Implementasi Perawatan Di Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*, Google Scholer)
3. Artikel Pendukung :
(Apriliawati & Rosalina, 2016, *The Effect Of Prone Position To Oxygen Aturation 'Level and Respiratory Rate Among Infants Who Being Installed Mechanical Ventilation In NICU Koja Hospital*, Google Scholer)
4. Artikel Pendukung :
(Atika, 2019, *Faktor Risiko Kejadian Respiratory Distress Newborn Di Neonatal Intensive Care Unit RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo*, Google Scholer)
5. Artikel Pendukung :
(Lestari, Susmarini & Awaludin, 2018, *Quarter Turn From Prone Position Increases Position Oxygen Saturation In Premature Babies With Respiratory Distress Syndrom*, Google Scholer)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode kualitatif. Dimana peneliti melakukan proses asuhan keperawatan mulai dari pengkajian hingga evaluasi dan kemudian menganalisis terkait masalah-masalah yang ditemukan dengan konsep teori yang ada

3.2 Subyek Studi Kasus

Subjek dalam studi kasus ini adalah Bayi “R” usia 13 hari yang mengalami RDN. Subjek dalam studi kasus ini telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi diagnosa medis, dan kesediaan orangtua pasien menjadi responden. Sedangkan kriteria eksklusi meliputi neonatus dengan keadaan umum buruk, neonatus dengan penyakit jantung bawaan, hidrosefalus, dan *hiperbilirubinemia* yang harus di fototerapi karena intervensi pemberian posisi *semi prone* ini dilakukan reposisi setiap 30 menit

3.3 Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini adalah melakukan proses asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan masalah pola napas tidak efektif dengan intervensi pemberian posisi semi prone

3.4 Instrumen Studi Kasus

Instrumen yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu format asuhan keperawatan neonatus, lembar observasi penilaian *respiratory rate* dan alat ukur waktu/ jam tangan

3.5 Prosedur Pengambilan Data

3.5.1 Persiapan/ pengajuan judul studi kasus

3.5.2 Pengumpulan data dengan cara observasi & wawancara

3.5.3 Penyusunan laporan berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah

3.6 Tempat & Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

3.6.1 Tempat : Ruang NICU RSUD Labuang Baji Makassar

3.6.2 Waktu : Waktu pengambilan data Senin, 26 Juli 2021 dan waktu pemberian intervensi tanggal 27-29 Juli 2021

3.7 Analisis Data & Penyajian Data

Analisis data dan penyajian data pada studi kasus disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan didalam teks dan bersifat naratif

3.8 Etika Studi Kasus

Saat melakukan studi kasus asuhan keperawatan maka yang perlu diperhatikan beberapa etika kepada pasien sebagai berikut :

1. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Peneliti tidak menampilkan identitas pasien, peneliti hanya menggunakan inisial sebagai pengganti identitas pasien. Informasi yang telah didapat oleh peneliti tidak disebarluaskan ke orang lain dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja

2. *Justice* (Keadilan)

Prinsip keterbukaan dan adil yang perlu dijaga oleh peneliti dengan kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, peneliti menjelaskan prosedur penelitian pada orangtua pasien via aplikasi whatsapp. Sedangkan prinsip keadilan, peneliti menjamin bahwa subjek peneliti memperoleh perlakuan yang sama

3. *Non Malefeciencia*

Prinsip ini adalah kewajiban untuk tidak membahayakan pasien. Pasien dan keluarga berhak memutuskan dengan sukarela untuk ikut dalam menjalankan intervensi pemberian posisi semi prone yang diberikan tanpa risiko yang merugikan

BAB IV
LAPORAN KASUS

4.1 Pengkajian Keperawatan

4.1.1 Biodata

DATA BAYI

Nama Bayi : By. "R"
BB/PB : 2080 gram / 43cm
Jenis Kelamin : Laki-laki
Apgar Score : 8
Tanggal Lahir : 13 Juli 2021

DATA ORANGTUA

Nama Ibu : Ny. R
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Barua

Nama Suami : Tn. R
Umur : 35 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Barua

4.1.2 Pemeriksaan Fisik

1. Pengkajian Nyeri

4.1 Tabel Pengkajian Nyeri

No	KATEGORI	SKOR
1.	Ekspresi Wajah	
	Otot wajah rileks, ekspresi netral (0)	0

	Otot wajah tegang, alis berkerut, rahang dan dagu mengunci (1)	1
2.	Tangisan	
	Tenang, tidak menangis (0)	0
	Mengerang, sebentar-sebentar menangis (1)	0
	Terus menerus menangis, menangis kencang melengking (2)	0
3.	Pola napas	
	Rileks, napas reguler (0)	0
	Pola napas berubah : tidak teratur, lebih cepat dari biasanya, tersedak, menahan napas (1)	1
4.	Tangan	
	Rileks, otot tangan tidak kaku, kadang bergerak tidak beraturan (0)	0
	Rileks, otot tangan tidak kaku, kadang fleksi/ekstensi yang kaku, meluruskan tangan tapi dengan cepat melakukan fleksi/ekstensi yang kaku (1)	0
5.	Kaki	
	Rileks, otot kaki tidak kaku, kadang bergerak tidak beraturan (0)	0
	Fleksi/ekstensi yang kaku, meluruskan tangan tapi dengan cepat melakukan fleksi/ekstensi yang kaku (1)	0
6.	Kesadaran	
	Tidur pulas atau cepat bangun, tenang (0)	0
	Rewel, gelisah dan meronta-ronta (1)	1
Nilai Total Skor		3
Catatan : 0-2 : Nyeri ringan 3-4 : Nyeri sedang > 4 : Nyeri berat		Nyeri Sedang

Interpretasi hasil : Berdasarkan hasil pengkajian nyeri menggunakan skala NIPS skor yang diperoleh yaitu 3 yang artinya bayi mengalami nyeri sedang

2. Penilaian *Ballard's Score*

a. Penilaian Maturitas Neuromuskuler

Gambar 4.1 Penilaian Maturitas Neuromuskular

Score	-1	0	1	2	3	4	5
Posture							
Square window (wrist)	 >90°	 90°	 60°	 45°	 30°	 0°	
Arm recoil		 180°	 140-180°	 110-140°	 90-110°	 <90°	
Popliteal angle	 180°	 160°	 140°	 120°	 100°	 90°	 <90°
Scarf sign							
Heel to ear							

Postur : 4
 Square window : 3
 Arm recoil : 2
 Poplitea angle : 4
 Scarf sign : 2
 Heel to ear : 3

b. Penilaian Maturitas Fisik

Gambar 4.2 Penilaian Maturitas Fisik

Skin	Sticky, friable, transparent	Gelatinous, red, translucent	Smooth, pink; visible veins	Superficial peeling and/or rash; few veins	Cracking, pale areas; rare veins	Parchment, deep cracking; no vessels	Leathery, cracked, wrinkled	Maturity Rating	
								Score	Weeks
Lanugo	None	Sparse	Abundant	Thinning	Bald areas	Mostly bald			
Plantar surface	Heel-toe 40–50 mm: -1 <40 mm: -2	> 50 mm, no crease	Faint red marks	Anterior transverse crease only	Creases anterior 2/3	Creases over entire sole	-10	20	
							-5	22	
Breast	Imperceptible	Barely perceptible	Flat areola, no bud	Stippled areola, 1–2 mm bud	Raised areola, 3–4 mm bud	Full areola, 5–10 mm bud	0	24	
							5	26	
							10	28	
							15	30	
Eye/Ear	Lids fused loosely: -1 tightly: -2	Lids open; pinna flat; stays folded	Slightly curved pinna; soft; slow recoil	Well curved pinna; soft but ready recoil	Formed and firm, instant recoil	Thick cartilage, ear stiff	20	32	
							25	34	
							30	36	
Genitals (male)	Scrotum flat, smooth	Scrotum empty, faint rugae	Testes in upper canal, rare rugae	Testes descending, few rugae	Testes down, good rugae	Testes pendulous, deep rugae	35	38	
							40	40	
Genitals (female)	Clitoris prominent, labia flat	Clitoris prominent, small labia minora	Clitoris prominent, enlarging minora	Majora and minora equally prominent	Majora large, minora small	Majora cover clitoris and minora	45	42	
							50	44	

Kulit : 1
 Lanugo : 2
 Garis Plantar : 4
 Payudara : 2
 Mata / Telinga : 4
 Genitalia Laki-laki : 4

Interpretasi hasil :

Skor Maturitas Neuromaskuler : 18

Skor Maturitas Fisik : 17

Total Ballard's skor : 35 yang artinya usia gestasi 38 minggu

3. Refleks

4.2 Tabel Refleks

No.	Refleks	Hasil
1.	Sucking reflex	Normal
2.	Grasping reflex	Normal
3.	Rooting reflex	Normal
4.	Moro reflex	Normal
5.	Babinski reflex	Normal
6.	Swallowing reflex	Normal
7.	Breathing reflex	Normal
8.	Eyeblink reflex	Normal
9.	Pupillary reflex	Tidak dilakukan
10.	Tonic neck reflex	Tidak dilakukan
11.	Labirin reflex	Tidak dilakukan
12.	Crawling reflex	Tidak dilakukan

Interpretasi hasil : Berdasarkan pemeriksaan refleks pada bayi di dapatkan hasil pemeriksaan normal

4. Tonus Aktivitas

- Aktif (√), Tenang (), Letargie (), Kejang ()
- Menangis keras (), Lemah (√), Melengking (), Sulit menangis ()

Interpretasi hasil : Saat dilakukan pengkajian gerakan bayi aktif namun lemah

5. Pengkajian Head to Toe

4.3 Tabel Pengkajian Head to Toe

No.	Pemeriksaan	Hasil
Kepala/ leher		
1.	Fontanel Anterior	Teraba lunak
2.	Sutura Sagitalis	Normal/tepat
3.	Gambaran Wajah	Wajah nampak simetris
4.	Molding Caput Succedanum	Kepala tidak nampak molding
5.	Mata	Bersih, tidak ada sekret
7.	Mulut	Bersih, bibir nampak sianosis, mukosa bibir kering, terpasang OGT
THT		
1.	Hidung	Bersih, ada penggunaan cuping hidung sat bernapas, terpasang CPAP FiO ₂ 25% flow 8L/menit
2.	Leher	Normal, tidak ada pembesaran tiroid
3.	Telinga	Normal, bersih
Thoraks		
1.	Bentuk dada	Simetris
2.	Klavikula	Normal
3.	Retraksi	Ada retraksi dinding dada

4.	Suara napas	Saat bernapas gerak dada kiri dan kanan sama
5.	Bunyi napas	Ada bunyi napas tambahan yaitu ronchi
6.	Penggunaan alat bantu napas	Terpasang CPAP FiO ² 25% flow 8L/menit
Jantung		
1.	Bunyi & frekuensi	Normal, nadi 140 kali/menit
2.	Murmur & gallop	Normal
3.	CRT	<3 detik
Abdomen		
1.	Abdomen	Nampak supel teraba lemas
2.	Lingkar perut	30 cm
3.	Umbilikus	Tali pusar telah kering dan terlepas, tidak ada tanda infeksi
Ekstermitas		
1.	Ekstermitas atas	Kedua tangan lengkap, jari-jari lengkap, ada sianosis perifer
2.	Gerakan ekstermitas atas	Gerakan pasif
3.	Ekstermitas bawah	Kedua kaki lengkap, jari-jari lengkap, ada sianosis perifer
4.	Gerakan ekstermitas bawah	Gerakan pasif
Nadi		
1.	Perifer	Teraba keras
2.	Brakial kanan & kiri	Teraba keras
3.	Femoral	Teraba lemah
Genitalia		
1.	Geneitalia	Jenis kelamin laki-laki, nampak testis & skrotum
Anus		
1.	Anus	Paten, tidak ada kelainan
Spina		
1.	Spina	Normal
Kulit		
1.	Warna kulit	Warna kulit merah muda/pink
2.	Tanda lahir	Tidak ada tanda lahir
Suhu		
1.	Lingkungan bayi di rawat	Penghangat radian
2.	Suhu	36,5°C

Interpretasi hasil :

Saat dilakukan pengkajian pada bagian kepala nampak normal, tidak ada pembesaran kepala, distribusi rambut merata, tidak ada kelainan, tidak ada massa, wajah nampak simetris, mata bersih, hidung nampak simetris, ada pernapasan cuping hidung, terpasang nasal CPAP FiO² 25% 8L/menit, mulut nampak bersih, mukosa bibir kering, bibir nampak sianosis, terpasang OGT, perawat mengatakan bayi di stop oral sementara waktu, leher nampak normal, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, telinga bersih tidak ada serumen.

Bentuk dada simetris kiri dan kanan, nampak retraksi dada ringan saat bernapas, ada bunyi napas tambahan (ronchi), terpasang alat bantu napas CPAP, pernapasan 68 kali/menit, SpO² 96%, tidak ada bunyi murmur dan gallop, frekuensi nadi 140 kali/menit, CRT <3 detik, abdomen nampak supel, lingkaran perut 30 cm, tali pusar telah kering dan terlepas, tidak ada tanda-tanda infeksi, kedua tangan dan kaki serta jari-jari lengkap, nampak sianosis perifer, gerakan ekstermitas pasif, nadi teraba keras, terpasang IVFD Dextrose 10%/13ml/jam/SP pada ekstermitas kiri atas, jenis kelamin laki-laki, nampak testis dan skrotum, anus normal tidak ada kelainan, warna kulit merah muda/pink, bayi dirawat di penghangat radian dengan suhu 36,5 °C

4.1.3 Riwayat Ante Natal Care (ANC)

1. Jumlah kunjungan : Ny. R mengatakan selama hamil 4 kali memeriksakan kehamilan. Yaitu pemeriksaan pertama dan kedua dilakukan di puskesmas dekat tempat tinggal, ketiga pada trimester ketiga, pemeriksaan dilakukan di dokter praktik dan melakukan USG dan yang keempat dilakukan seminggu sebelum persalinan di Rumah sakit
2. Bidan/ Dokter : Ny. R mengatakan memeriksakan kehamilannya di puskesmas, dokter praktik dan RS
3. Pend.kes yang didapat : Ny. R mrngatakan tidak ada pendidikan kesehatan yang di dapat saat melakukan pemeriksaan kehamilan
4. HPHT : 09 Juli 2021
5. Kenaikan BB selama hamil : Ny. R mengatakan Bbnya naik 15 kg selama hamil
6. Komplikasi obat : Ny. R mengatakan tidak memiliki komplikasi dengan obat-obatan tertentu
7. Obat-obatan yang didapat : Ny. R mengatakan diberi obat penambah

darah dan obat anti mual saat pemeriksaan kehamilan di puskesmas

8. Pengobatan yang didapat : Tablet tambah darah dan obat anti mual
9. Riwayat hospitalisasi : Ny. R mengatakan bersalin di RSIA Amanat pada tanggal 13 juli 2021 dan Ny. R membawa bayinya ke IGD RSUD Labuang Baji pada tanggal 24 Juli 2021 karena sesak napas. Ny. R mengatakan sebelumnya bayinya sehat, namun 2 hari sebelum MRS bayinya tidak mau minum susu, dan pada tanggal 24 bayinya mengalami sesak napas dan kebiruan pada bibir, tangan dan kaki. Ny. R juga mengatakan suaminya sering merokok di dalam rumah
10. Golongan darah ibu : Ny. R mengatakan golongan darahnya A

4.1.4 Riwayat Intra Natal Care (INC)

1. Awal persalinan : Ny. R mengatakan persalinannya pada 13 juli 2021 pukul 23.00
2. Lama persalinan : Ny. R mengatakan lama persalinannya \pm 1 2 jam
3. Cara melahirkan : Ny. R mengatakan melahirkan dengan sectio caesarea
4. Komplikasi persalinan : Ny. R mengatakan tidak ada komplikasi selama persalinan
5. Terapi yang diberikan : Ny. R mengatakan tidak mengetahui terapi apa saja yang diberikan
6. Jumlah cairan ketuban : Ny. R mengatakan tidak mengetahui jumlah air ketubannya
7. Anastesi yang diberikan : Ny. R mengatakan tidak mengetahui jenis anastesi yang diberikan
8. Ada/tidak mekonium : Ny. R mengatakan ada mekonium

4.1.5 Riwayat Post Natal Care (PNC)

1. Penilaian *score down* pada bayi

4.4 Penilaian *score down*

Pemeriksaan	0	1	2
Frekuensi nafas	<60x/menit	60-80x/menit	>80x/menit
Retraksi	Tidak ada Retraksi	Retraksi ringan	Retraksi berat
Sianosis	Tidak sianosis	Sianosis hilang dengan O ²	Sianosis menetap walaupun diberi O²
Air entry	Udara masuk Bilateral	Penurunan ringan udara masuk	Tidak ada udara Masuk
Merintih	Tidak merintih	Dapat didengar dengan stetoskop	Dapat didengar dengan alat bantu

Hasil :

0-4 = Gangguan napas ringan : Membutuhkan O² nasal atau headbox

4-7 = Gangguan napas sedang : Membutuhkan Nasal CPAP


>7 = Gangguan napas berat : Membutuhkan intubasi (perlu diperiksa AGD)

Interpretasi Hasil : Saat dilakukan penilaian diperoleh hasil skor down yaitu **5**

2. Usaha napas : Bayi di bantu dengan alat ventilator
3. Apgar score menit pertama: Ny. R mengatakan tidak mengetahui nilai apgar skor bayinya saat lahir
4. Kebutuhan resusitasi : Tidak dilakukan resusitasi
5. Kebutuhan nutrisi : Perawat mengatakan bayi dianjurkan untuk stop oral sementara waktu
6. Adanya trauma lahir : Ny. R mengatakan anaknya tidak memiliki trauma lahir
7. Keluarnya urin : Nampak ada pengeluaran urin
8. BAB : Nampak ada pengeluaran urin

4.1.6 Riwayat Sosial

1. Struktur keluarga (Genogram)



Keterangan :

	: Laki-laki		: Garis Pernikahan
	: Perempuan		: Garis Keturunan
	: Pasien		: Meninggal
	: Umur tidak diketahui		: Tinggal serumah

G1 : Ny. R mengatakan kakek dari ayah pasien sudah lama meninggal, nenek dari ayah pasien dalam keadaan sehat. Kakek dan nenek dari ibu pasien dalam keadaan sehat

G2 : Ayah pasien berusia 35 tahun, ayah pasien memiliki 2 saudara perempuan dan seorang adik laki-laki. Ibu pasien berusia 25 tahun, ibu pasien memiliki 5 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Tidak ada anggota keluarga yang memiliki penyakit menular

G3 : Pasien memiliki 2 saudara perempuan berusia 8 tahun dan 7 tahun. Kedua kakak pasien dalam keadaan sehat. Pasien adalah anak ketiga berusia 13 hari, saat ini sedang dirawat di ruang NICU RSUD Labuang Baji Makassar karena mengalami RDN

2. Budaya

a. Suku : Makassar

- b. Agama : Islam
- c. Bahasa utama : Indonesia
3. Perencanaan makanan bayi : Ny. R mengatakan belum merencanakan makanan untuk bayinya nanti
4. Problem sosial yang penting : Ny. R mengatakan bahwa tidak ada masalah sosial yang dialami
5. Hubungan orangtua dan bayi : Ny. R mengatakan hubungannya dengan bayi baik, begitupun dengan ayah sang bayi
6. Orang terdekat yang dapat dihubungi : Ny. R mengatakan orang terdekat yang dapat dihubungi yaitu keluarga, seperti kedua orangtuanya, dan kakak serta adiknya
7. Respon
- a. Orangtua berespon terhadap penyakit bayi : Ny. R dan suaminya sedih saat anaknya sakit
- b. Orangtua berespon terhadap hospitalisasi : Ny. R dan suaminya sedih karena saat ini bayinya dirawat di ruang NICU dan hanya bisa dijenguk 2 kali seminggu

4.1.7 Pemeriksaan Diagnostik

1. Laboratorium

Tanggal pemeriksaan : 24 Juli 2021

4.5 Tabel Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Jenis pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
Hematologi Rutin			
WBC	21.12	4.11-11.30	$10^3/\text{ul}$
RBC	3.48	4.10-5.10	$10^6/\text{ul}$
HGB	12.1	12.3-15.3	Mg/dl
HCT	37.2	35.9-44.6	%
MCV	106.9	98-122	Fl
MCH	34.8	33-41	Pg
MCHC	32.5	31-35	%

PLT	426	172-450	$10^3/\mu\text{l}$
-----	-----	---------	--------------------

Kesan : Nilai WBC diatas batas normal menandakan adanya infeksi dan nilai HGB dibawah batas normal yang menandakan anemia

2. Foto Rontgen : Dilakukan foto thoraks (menunggu hasil)
3. CT Scan : Tidak dilakukan pemeriksaan CT Scan
4. MRI/USG/EEG : Tidak dilakukan pemeriksaan MRI/USG/EEG
5. Dan lain-lain : Tidak ada

4.1.8 Terapi Saat Ini

1. Terapi IVFD Dextrose 10%/13ml/jam
2. Cefotaxime 80mg/12 jam/IV (07.00 & 19.00)
3. Gentacimine 8mg/12 jam/IV (07.00 & 19.00)
4. Terpasang O² CPAP FiO² 30% flow 8L/menit
5. Terpasang OGT
6. Farbivent/12 jam/Nebulizer

DATA FOKUS

DATA SUBJEKTIF	DATA OBJEKTIF
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ny. R mengatakan bayinya di bawa ke RS karena sesak napas, tidak mau minum susu, serta kebiruan pada bibir, kaki dan tangan bayi 2. Ny. R mengatakan suaminya sering merokok di dalam rumah 3. Bayi Ny. R sementara waktu stop oral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum pasif 2. BB lahir : 2100 gr & BB saat ini : 2080 gr 3. Bibir bayi nampak sianosis & nampak sianosis perifer 4. Nampak retraksi dinding dada 5. Nilai <i>Score Down</i> 5 6. Terdapat bunyi napas tambahan/ ronchi 7. Bayi nampak sesekali batuk 8. Terpasang IVFD Dextrose 10%/13ml/jam 9. Terpasang terapi O² dengan menggunakan CPAP FiO² 30% flow 8L/menit 10. Terpasang OGT 11. TTV : HR : 140x/m Crt : < 3detik RR : 68 x/m SpO² : 96% 12. Pemeriksaan Penunjang WBC : 21.12 & HGB : 12.1

ANALISA DATA

No.	DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN
1.	<p>DS :</p> <p>1. Ny. R mengatakan bayinya di bawa ke RS karena sesak napas, kebiruan pada bibir, kaki dan tangan bayi</p> <p>DO :</p> <p>1. Keadaan umum bayi Ny. R pasif</p> <p>2. Bayi nampak sianosis</p> <p>3. Nampak retraksi dinding dada</p> <p>4. Nampak pernapasan cuping hidung</p> <p>5. Nilai <i>Score Down</i> 5</p> <p>6. Terpasang terapi O^2 dengan menggunakan CPAP FiO^2 30% flow 8L/menit</p> <p>7. TTV : HR : 140x/m RR : 68 x/m CRT : < 3detik SpO^2 : 96%</p>	<p>Ketidakmampuan paru-paru mengembang, alveolus imatur, kelainan di dalam dan diluar paru-paru, lahir prematur</p> <p>↓</p> <p>Gang. endothelium alveolac</p> <p>↓</p> <p>PO^2 menurun</p> <p>↓</p> <p>Usaha nafas meningkat</p> <p>↓</p> <p>Menurunnya ventilasi dan CO^2 meningkat</p> <p>↓</p> <p>Tekanan darah arteri menurun</p> <p>↓</p> <p>Atektasis alveoli, edema dan kerusakan sel</p> <p>↓</p> <p>Kebocoran serum protein kedalam alveoli</p> <p>↓</p> <p>Kekurangan surfaktan</p> <p>↓</p> <p>Kolaps pada paru-paru Paru-paru menjadi kaku</p> <p>↓</p> <p>Sesak nafas</p> <p>↓</p> <p>Pola nafas tidak efektif</p>	<p>Pola Napas Tidak Efektif</p>
2.	<p>DS :</p> <p>1. Ny. R mengatakan suaminya sering merokok di dalam rumah</p> <p>DO :</p> <p>1. Keadaan umum pasif</p> <p>2. Terdapat bunyi napas ronchi</p> <p>3. Bayi nampak sesekali batuk</p>	<p>Masuknya mikrobakterium/ virus ke saluran pernapasan</p> <p>↓</p> <p>Mengiritasi bronkus</p> <p>↓</p> <p>Terjadi peradangan</p> <p>↓</p>	<p>Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif</p>

		<p>Akumulasi sekret pada saluran napas</p> <p>↓</p> <p>Menghambat masuknya oksigen ke paru-paru</p> <p>↓</p> <p>Batuk</p> <p>↓</p> <p>Bersihkan jalan napas tidak efektif</p>	
3.	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny. R mengatakan bayinya tidak mau minum susu 2. Bayi Ny. R sementara waktu stop oral <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BB lahir : 2100 gr 2. BB saat ini : 2080 gr 3. Mukosa bibir nampak kering 	<p>Peristaltik belum sempurna</p> <p>↓</p> <p>Kurangnya kemampuan untuk mencerna makanan</p> <p>↓</p> <p>Refleks menghisap dan menelan belum berkembang dengan baik</p> <p>↓</p> <p>Risiko Defisit Nutrisi</p>	Risiko Defisit Nutrisi

4.2 Diagnosis Keperawatan

4.2.1 Pola Napas Tidak Efektif

4.2.2 Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

4.2.3 Risiko Defisit Nutrisi

INTERVENSI KEPERAWATAN

Nama : Bayi Ny. R

No. RM : 39 46 27

Umur : 13 Hari

Dx. Medik : RDN

No.	DIAGNOSA KEPERAWATAN	LUARAN KEPERAWATAN	INTERVENSI	RASIONAL
1.	Pola Napas Tidak Efektif	Setelah dilakukan tindakan keperawatan pemantauan respirasi selama 3x24 jam maka sesak yang dirasakan menurun dengan kriteria hasil : 1. Frekuensi napas membaik dari kriteria 1 (memburuk) ke kriteria 5 (membaik) 2. Tidak ada penggunaan otot bantu napas dari kriteria 1 (meningkat) ke kriteria 5 (menurun) 3. Tidak ada pernapasan cuping hidung dari kriteria 1 (meningkat) ke kriteria 5 (menurun) (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019)	<u>Pemantauan Respirasi</u> Observasi 1. Monitor saturasi oksigen 2. Monitor adanya sumbatan jalan napas Terapeutik 1. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien 2. Berikan terapi murossal 3. Posisikan semi prone (EBN) 4. Dokumentasikan hasil pemantauan Edukasi 1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemberian posisi semi prone 2. Informasikan hasil pemantauan, <i>jika perlu</i> (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2019)	Observasi 1. Menilai persentase oksigen di perifer 2. Menilai adanya zat padat, cair yang menutupi jalan napas Teraupetik 1. Menilai kondisi pasien yang membutuhkan pemantauan lebih sering 2. Mengurangi sesak dan memberi kenyamanan 3. Sebagai laporan atas tindakan yang telah dilakukan perawat Edukasi 1. Edukasi bagi keluarga mengenai tindakan yang dilakukan 2. Sebagai informasi bagi keluarga mengenai kondisinya
2.	Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif	Setelah dilakukan tindakan keperawatan manajemen jalan selama 3x24 jam maka diharapkan jalan napas tetap paten dengan	<u>Manajemen Jalan Napas</u> Observasi 1. Monitor pola napas 2. Monitor bunyi napas tambahan	Observasi 1. Mengkaji jenis pernapasan pasien 2. Mengkaji abnormalitas pernapasan

		<p>kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi sputum menurun dari kriteria 1 (meningkat) ke kriteria 4 (cukup menurun) 2. Tidak ada sianosis dari kriteria 1 (meningkat) ke kriteria 5 (menurun) 3. Pola napas membaik dari kriteria 1 (memburuk) ke kriteria 5 (membaik) 	<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan oksigen, jika perlu 2. Lakukan penghisapan lendir, jika perlu <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajarkan keluarga terkait bahaya asap rokok bagi kesehatan bayi <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, (jika perlu) 	<p>Teraupetik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memudahkan proses pernapasan 2. Membantu pengeluaran sputum/ lendir <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pengetahuan kepada orangtua terkait bahaya asap rokok bagi kesehatan bayi <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pengeluaran dahak
3.	Risiko Defisit Nutrisi	<p>Setelah dilakukan tindakan intervensi keperawatan manajemen nutrisi selama 3x24 jam maka diharapkan kebutuhan nutrisi tercukupi dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berat badan membaik dari kriteria 1 (menurun) ke kriteria 4 (cukup meningkat) 2. Membran mukosa membaik dari kriteria 1 (menurun) ke kriteria 4 (cukup menurun) 	<p><u>Manajemen nutrisi</u></p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor asupan nutrisi 2. Monitor BB 3. Monitor kepatenan akses intravena <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atur kecepatan pemberian infus 2. Gunakan infus pump <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi keluarga terkait anjuran stop oral <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian nutrisi parenteral sesuai instruksi 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui status nutrisi 2. Mengetahui adanya peningkatan atau penurunan BB 3. Menjaga akses intravena tetap paten untuk memenuhi kebutuhan nutrisi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan 2. Mengatur jumlah cairan yang masuk secara kontinu <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi sesak <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan

IMPLEMENTASI & EVALUASI KEPERAWATAN

Nama : Bayi Ny. R

No. RM : 39 46 27

Umur : 13 Hari

Dx. Medik : RDN

No.	HARI/TGL/JAM	IMPLEMENTASI	EVALUASI
1.	<p>Senin/ 26 Juli 2021/ 21.01</p> <p>21.03</p> <p>21.04</p> <p>21.05</p> <p>21.06</p> <p>21.10</p> <p>21.40</p>	<p><u>Pemantauan Respirasi</u></p> <p>1. Memonitor pola napas Hasil : Pernapasan bayi nampak cepat, nampak retraksi dinding dada ringan</p> <p>2. Memonitor frekuensi napas Hasil : Pernapasan 68x/menit dan terpasang CPAP FiO² 30% flow 8L/menit</p> <p>3. Memonitor saturasi oksigen Hasil : SpO² 97%</p> <p>4. Memonitor adanya produksi sputum Hasil : Ada produksi sputum</p> <p>5. Memberikan oksigen sesuai instruksi Hasil : Terpasang CPAP FiO² 30% flow 8L/menit</p> <p>6. Memb memberikan terapi murottal Hasil : Bayi nampak tidur dengan nyenyak, sesekali terbangun</p> <p>7. Memonitor frekuensi napas setelah memberikan terapi murottal Hasil : 1 menit setelah pemberian terapi murottal RR : 67x/menit, 30 menit setelah pemberian terapi murottal RR : 64x/menit</p>	<p>S : Perawat mengatakan bayi masuk dengan sesak</p> <p>O : Pernapasan bayi nampak cepat, nampak retraksi dinding dada ringan, pernapasan 64x/menit, masih ada penggunaan otot bantu napas, masih ada pernapasan cuping hidung terpasang CPAP FiO² 30% flow 8L/menit, SpO² 97%</p> <p>A : Masalah belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor pola napas 2. Monitor frekuensi napas 3. Monitor adanya produksi sputum 4. Berikan O² sesuai instruksi 5. Atur posisi semi prone 6. Monitor frekuensi napas setelah mengatur posisi
2.	<p>Senin/ 26 Juli 2021/ 21.01</p> <p>21.01</p> <p>21.02</p>	<p><u>Manajemen Jalan Napas</u></p> <p>1. Memonitor pola napas Hasil : Pernapasan bayi nampak cepat dan nampak retraksi dinding dada ringan</p> <p>2. Memonitor bunyi napas tambahan Hasil : Terdengar bunyi ronchi</p>	<p>S : Perawat mengatakan bayi masuk dengan sesak</p> <p>O : Bayi nampak nyaman setelah disuction, masih terdengar bunyi ronchi, masih ada sianosis perifer, pola napas nampak cepat</p> <p>A : Masalah belum teratasi</p>

	07.10 06.50	3. Memonitor sputum Hasil : Belum ada pengeluaran sputum 4. Melakukan penghisapan lendir Hasil : Melakukan suction setelah nebulizer lendir ± 5cc 5. Kolaborasi pemberian bronkodilator Hasil : Nebulizer dengan farbivent	P : Lanjutkan intervensi 1. Monitor pola napas 2. Monitor bunyi napas tambahan 3. Monitor sputum 4. Lakukan suction 5. Nebulizer dengan farbivent
3.	Senin/ 26 Juli 2021/ 21.10 21.12 21.13 21.14 21.15	<u>Manajemen Nutrisi</u> 1. Memonitor asupan nutrisi Hasil : Bayi sedang stop oral 2. Memonitor kepatenan akses intravena Hasil : Akses intravena paten 3. Memberikan nutrisi parenteral sesuai instruksi Hasil : Terpasang IVFD Dextrose 10%/13ml/jam/SP di ekstermitas kiri atas 4. Mengatur kecepatan pemberian infus Hasil : 13ml/jam/SP 5. Menggunakan infus pump Hasil : Terpasang infus pump	S : Perawat mengatakan bayi sedang stop oral O : Bayi nampak lemah, BB 1080 gram, mukosa bibir masih kering, terpasang IFVD dextrose 10% 13ml/jam A : Masalah belum teratasi P : Lanjutkan intervensi 1. Monitor asupan nutrisi 2. Monitor kepatenan akses intravena 3. Berikan nutrisi parenteral sesuai instruksi 4. Atur kecepatan pemberian infus
1.	Selasa/ 27 Juli 2021/ 20.40 20.43 20.44 20.45 20.46 20.50	<u>Pemantauan Respirasi</u> 1. Memonitor pola napas Hasil : Pernapasan bayi nampak cepat, nampak retraksi dinding dada ringan, masih ada penggunaan otot bantu napas 2. Memonitor frekuensi napas Hasil : Pernapasan 64x/menit dan terpasang CPAP FiO ² 30% flow 8L/menit 3. Memonitor saturasi oksigen Hasil : SpO ² 98% 4. Memonitor adanya produksi sputum Hasil : Ada produksi sputum 5. Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai instruksi Hasil : Terpasang CPAP FiO ² 25% flow 8L/menit 6. Mengatur posisi semi prone	S : - O : Pernapasan bayi nampak teratur, nampak retraksi dinding dada ringan, masih ada penggunaan otot bantu napas, masih ada pernapasan cuping hidung, pernapasan 53x/menit, bayi nampak tidur nyenyak, masih terpasang CPAP FiO ² 25% flow 8L/menit, SpO ² 98% A : Masalah belum teratasi P : Lanjutkan intervensi 1. Monitor pola napas 2. Monitor frekuensi napas 3. Monitor adanya produksi sputum 4. Berikan O ² sesuai instruksi

	<p>21.00</p> <p>21.10</p> <p>21.20</p> <p>21.50</p>	<p>Hasil : Bayi nampak nyaman, tidur dengan nyenyak dan pernapasan bayi nampak teratur</p> <p>7. Memonitor frekuensi napas setelah mengatur posisi</p> <p>Hasil : 10 menit pertama RR : 60x/menit, 10 menit kedua RR : 59x/menit, 10 menit ketiga RR : 54x/menit, 1 jam setelah mengatur posisi RR : 53x/menit</p> <p>8. Mengatur posisi setiap 30 menit</p> <p>Hasil : Bayi nampak nyaman</p>	<p>5. Atur posisi semi prone</p> <p>6. Monitor frekuensi napas setelah mengatur posisi</p>
2.	<p>Selasa/ 27 Juli 2021/</p> <p>20.40</p> <p>20.41</p> <p>20.41</p> <p>07.04</p> <p>06.48</p>	<p><u>Manajemen Jalan Napas</u></p> <p>1. Memonitor pola napas</p> <p>Hasil : Pernapasan bayi nampak cepat, nampak retraksi dinding dada ringan</p> <p>2. Memonitor bunyi napas tambahan</p> <p>Hasil : Terdapat bunyi ronchi</p> <p>3. Memonitor sputum</p> <p>Hasil : Belum ada pengeluaran sputum</p> <p>4. Melakukan penghisapan lendir</p> <p>Hasil : Melakukan suction setelah nebulizer, produksi sputum ± 3 cc</p> <p>5. Kolaborasi pemberian bronkodilator</p> <p>Hasil : Nebulizer dengan farbivent</p>	<p>S : -</p> <p>O : Masih terdengar bunyi ronchi, bayi nampak tidur setelah dilakukan suction, masih ada sianosis perifer, pola napas nampak cepat</p> <p>A : Masalah belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor pola napas 2. Monitor bunyi napas tambahan 3. Monitor sputum 4. Lakukan suction 5. Nebulizer dengan farbivent
3.	<p>Selasa/ 27 Juli 2021/</p> <p>21.04</p> <p>21.05</p> <p>21.06</p> <p>21.07</p> <p>21.09</p>	<p><u>Manajemen Nutrisi</u></p> <p>1. Memonitor asupan nutrisi</p> <p>Hasil : Bayi sedang stop oral, terpasang IVFD dextrose 10%</p> <p>2. Memonitor kepatenan akses intravena</p> <p>Hasil : Akses intravena paten</p> <p>3. Memberikan nutrisi parenteral sesuai instruksi</p> <p>Hasil : Terpasang IVFD Dextrose 10%/13ml/jam</p> <p>4. Mengatur kecepatan pemberian infus</p> <p>Hasil : 13ml/jam</p> <p>5. Menggunakan infus pump</p> <p>Hasil : Terpasang infus pump</p>	<p>S : -</p> <p>O : Bayi nampak lemah, BB masih tetap 1080gram, mukosa bibir kering, terpasang IFVD dextrose 10% 13ml/jam</p> <p>A : Masalah belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor asupan nutrisi 2. Monitor kepatenan akses intravena 3. Berikan nutrisi parenteral sesuai instruksi 4. Atur kecepatan pemberian infus

1.	Rabu/ 28 Juli 2021/ 05.55 05.56 05.57 05.58 05.59 06.00 06.10 06.20 06.30 07.00	<p><u>Pemantauan Respirasi</u></p> <p>1. Memonitor pola napas Hasil : Pernapasan bayi nampak cepat, nampak retraksi dinding dada ringan</p> <p>2. Memonitor frekuensi napas Hasil : Pernapasan 56x/menit</p> <p>3. Memonitor saturasi oksigen Hasil : SpO² 98%</p> <p>4. Memonitor adanya produksi sputum Hasil : Ada produksi sputum</p> <p>5. Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai instruksi Hasil : Terpasang CPAP FiO² 25% flow 8 ipm</p> <p>6. Mengatur posisi semi prone Hasil : Bayi nampak nyaman, tidur dengan nyenyak dan pernapasan bayi nampak teratur</p> <p>7. Memonitor frekuensi napas setelah mengatur posisi Hasil : 10 menit pertama RR : 54x/menit, 10 menit kedua RR : 54x/menit, 10 menit ketiga RR : 51x/menit, 1 jam setelah mengatur posisi RR : 50x/menit</p> <p>8. Mengganti posisi setiap 30 menit Hasil : Bayi nampak nyaman</p>	<p>S : -</p> <p>O : Pernapasan bayi nampak teratur, nampak retraksi dinding dada ringan, penggunaan otot bantu napas dan pernapasan cuping hidung cukup menurun, pernapasan 50x/menit, terpasang CPAP FiO² 25% flow 8L/menit, SpO² 98%, bayi nampak tidur nyenyak</p> <p>A : Masalah belum sepenuhnya teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor pola napas 2. Monitor frekuensi napas 3. Monitor adanya produksi sputum 4. Berikan O² sesuai instruksi 5. Atur posisi semi prone 6. Monitor frekuensi napas setelah mengatur posisi
1.	Kamis/ 29 Juli 2021/ 11.32 11.33 11.34 11.35 11.36	<p><u>Pemantauan Respirasi</u></p> <p>1. Memonitor pola napas Hasil : Pernapasan bayi nampak teratur, CPAP nampak dilepas</p> <p>2. Memonitor frekuensi napas Hasil : Pernapasan 49x/menit</p> <p>3. Memonitor saturasi oksigen Hasil : SpO² 97%</p> <p>4. Memonitor adanya produksi sputum Hasil : Ada produksi sputum</p> <p>5. Mengatur posisi semi prone Hasil : Bayi nampak berbaring dengan nyaman dan pernapasan bayi nampak teratur</p>	<p>S : -</p> <p>O : Pernapasan bayi nampak teratur, nampak retraksi dinding dada ringan, penggunaan otot bantu napas menurun, pernapasan cuping hidung menurun, pernapasan 42x/menit, CPAP nampak dilepas, SpO² 98%, bayi nampak tidur nyenyak</p> <p>A : Masalah teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor pola napas 2. Monitor frekuensi napas 3. Monitor adanya produksi sputum 4. Atur posisi semi prone

	11.46 11.56 12.06 12.36	6. Memonitor frekuensi napas setelah mengatur posisi Hasil : 10 menit pertama RR : 48x/menit, 10 menit kedua RR : 47x/menit, 10 menit ketiga RR : 42x/menit, 1 jam setelah mengatur posisi RR : 45x/menit 7. Mengganti posisi setiap 30 menit Hasil : Bayi nampak nyaman	5. Monitor frekuensi napas setelah mengatur posisi
2.	Kamis/ 29 Juli 2021/ 11.37 11.37 11.38 07.00 06.40	<u>Manajemen Jalan Napas</u> 1. Memonitor pola napas Hasil : Pernapasan bayi nampak teratur, CPAP nampak dilepas 2. Memonitor bunyi napas tambahan Hasil : Masih terdengar bunyi ronchi 3. Memonitor sputum Hasil : Ada pengeluaran sputum \pm 20 menit setelah di nebulizer berwarna bening bercampur kuning 4. Melakukan penghisapan lendir Hasil : Melakukan suction setelah nebulizer ada pengeluaran sekret saat di suction \pm 2cc 5. Kolaborasi pemberian bronkodilator Hasil : Nebulizer dengan farbivent	S : - O : Pernapasan nampak teratur, masih terdengar bunyi ronchi, ada pengeluaran sputum saat di suction, tidak nampak sianosis perifer A : Masalah belum teratasi sepenuhnya P : Lanjutkan intervensi 1. Monitor pola napas 2. Monitor bunyi napas tambahan 3. Monitor sputum 4. Lakukan suction 5. Nebulizer dengan farbivent
3.	Kamis/ 29 Juli 2021/ 11.57 11.58 11.59 12.00 12.02	<u>Manajemen Nutrisi</u> 1. Memonitor asupan nutrisi Hasil : Bayi sudah bisa minum susu dan reflek mengisap sangat baik, bayi minum sebanyak 20ml 2. Memonitor kepatenan akses intravena Hasil : Akses intravena paten 3. Memberikan nutrisi parenteral sesuai instruksi Hasil : Terpasang IVFD Dextrose 10%/6ml/jam 4. Mengatur kecepatan pemberian infus Hasil : 6ml/jam 5. Menggunakan infus pump Hasil : Terepasang infus pump	S : Dokter mengatakan bayi sudah bisa minum O : BB bayi 1081 gram, bayi nampak senang mengisap dot susu, bayi minum susu sebanyak 20ml, mukosa bibir lembab, terpasang IFVD dextrose 10% 6ml/jam A : Masalah teratasi P : Hentikan intervensi

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan

Pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 15.15 Ny. R membawa anaknya yang berusia 11 hari ke IGD RSUD Labuang Baji Makassar karena sesak napas. Ny. R mengatakan bayinya lahir di RSIA Amanat pada tanggal 13 Juli 2021 dengan berat badan lahir 2.100 gram. Ny. R mengatakan sebelumnya bayinya sehat tidak ada masalah, namun 2 hari sebelum masuk rumah sakit bayinya tidak mau minum susu/ ASI, kemudian tiba-tiba sesak napas dan bibir serta kaki tangan bayinya membiru. Ny. R juga mengatakan suaminya sering merokok didalam rumah

Saat dilakukan pengkajian pada tanggal 26 Juli 2021, bayi nampak lemah, nampak pernapasan cuping hidung, mukosa bibir nampak kering, bibir nampak sianosis, terpasang OGT, terpasang CPAP, ada retraksi dinding dada, ada bunyi ronchi, pergerakan pasif, nampak terpasang IVFD Dextrose 10% diekstermitas kiri atas, nampak sianosis perifer, CRT <3 detik. Hasil TTV saat pengkajian yaitu nadi 140x/ menit, pernapasan 68x/ menit, SpO2 96% dan Berat badan saat ini 1080 gram

Dari data wawancara dengan perawat pelaksana, di dapatkan data bahwa Bayi R masuk di Ruang NICU pada tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 dengan sesak. Hasil down score yaitu 5 (Gawat Napas Sedang). Bayi juga dianjurkan stop oral sementara waktu

Setelah melakukan wawancara dengan perawat pelaksana dan melakukan pengkajian, peneliti juga menghubungi ibu Bayi "R" untuk menanyakan beberapa pertanyaan dan setelah itu peneliti melakukan *informed consent* pada ibu Bayi "R" melalui telepon via aplikasi whatsapp

Berdasarkan analisis peneliti saat melakukan pengkajian yaitu tanda dan gejala yang muncul pada Bayi "R" yang mengalami RDN sejalan dengan

teori dalam (Suriadi et al., 2010) yang menyebutkan manifestasi klinis dari RDN adalah pernapasan cepat/ takipnea, retraksi dada, pernapasan cuping hidung dan sianosis. Menurut analisis peneliti kemungkinan pasien mengalami RDN disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya yaitu pasien lahir dengan berat badan rendah yaitu 2100 gram sejalan dengan teori yang jelaskan oleh (Suriadi et al., 2010) dalam bukunya yaitu seringkali bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram mengalami RDN. Kemudian lingkungan pasien juga menjadi salah satu faktor terjadinya RDN yaitu ayah pasien sering merokok didalam rumah. Sehingga pasien sering terpapar asap rokok yang sangat tidak baik untuk kesehatan paru-paru. Sehingga pasien mengalami RDN dengan tanda utamanya yaitu pernapasan cepat/ sesak

ضِرَارَ لَا وَ ضِرَارَ لَا

Artinya :

“Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain)” (HR. Ibnu Majah, kitab al-Ahkam, no. 2340)

Berdasarkan hadist diatas telah dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh membahayakan diri kita dan orang lain. Sebagaimana kita tahu bahwa rokok tidak hanya membayakan kesehatan orang yang menghisapnya melainkan juga membahayakan kesehatan orang disekitarnya.

Setelah semua data pengkajian diperoleh, selanjutnya peneliti menganalisis masalah keperawatan yang muncul.

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan hasil analisis dari data pengkajian maka diagnosis yang pertama muncul yaitu Pola Napas Tidak Efektif yang di buktikan dengan frekuensi napas 68x/ menit, ada retraksi dinding dada ringan, ada pernapasan cuping hidung dan hasil penilaian down score yaitu 5 (Gawat Napas Sedang). Diagnosis kedua yaitu Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif yang dibuktikan oleh adanya bunyi napas tambahan yaitu ronchi, ada sianosis perifer, dan pola napas berubah. Diagnosis yang ketiga yaitu Risiko Defisit Nutrisi yang

dibuktikan dengan Berat badan saat ini 1080 gram, bayi dianjurkan stop oral sementara waktu, mukosa bibir kering. RDN merupakan sekumpulan gejala gangguan pernapasan pada bayi yang baru lahir yang ditandai dengan retraksi dinding dada, pernapasan cuping hidung, sianosis, dan takipnea/ pernapasan > 60x/menit (Atika, 2019). Maka diagnosa utama yang diangkat yaitu Pola Napas Tidak Efektif.

5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan

Berdasarkan diagnosa diatas, adapun rencana intervensi yang akan diberikan untuk Bayi R yaitu diagnosa pertama rencana tindakan yang akan diberikan yaitu Pemantauan Respirasi dan pemberian posisi *semi prone*. Intervensi dilakukan selama 3x24 jam. Setelah diberikan tindakan keperawatan diharapkan sesak menurun dengan kriteria hasil frekuensi napas membaik dari kriteria 1 (memburuk) ke kriteria 5 (membaik), tidak ada penggunaan otot bantu napas dari kriteria 1 (meningkat) ke kriteria 5 (menurun), dan tidak ada pernapasan cuping hidung dari kriteria 1 (meningkat) ke kriteria 5 (menurun)

Untuk diagnosa kedua rencana tindakan yang akan diberikan yaitu Manajemen Jalan Napas, intervensi dilakukan selama 3x24 jam. Setelah diberikan tindakan keperawatan diharapkan jalan napas tetap paten dengan kriteria hasil produksi sputum menurun dari kriteria 1 (meningkat) ke kriteria 4 (cukup menurun), tidak ada sianosis dari kriteria 1 (meningkat) ke kriteria 5 (menurun), dan pola napas membaik dari kriteria 1 (memburuk) ke kriteria 5 (membaik)

Serta diagnosa ketiga rencana tindakan yang akan diberikan yaitu Manajemen Nutrisi, intervensi dilakukan selama 3x24 jam. Setelah diberikan tindakan keperawatan diharapkan nutrisi tercukupi dengan kriteria hasil berat badan membaik dari kriteria 1 (menurun) ke kriteria 4 (cukup meningkat) dan membran mukosa membaik dari kriteria 1 (memburuk) ke kriteria 4 (cukup membaik)

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang rencana tindakan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan pedoman buku yang ada yaitu Standar

Intervensi Keperawatan Indonesia dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Intervensi yang diberikan sesuai dengan masalah keperawatan yang ditemui, intervensi yang diberikan yaitu mulai dari observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Adapun intervensi tambahan yang diberikan dalam penelitian ini yaitu pemberian posisi *semi prone* berdasarkan jurnal EBN dan penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh posisi ini pada bayi yang mengalami sesak.

Berdasarkan teori Virginia Henderson dimana ada 14 kebutuhan dasar manusia dimana salah satunya yaitu manusia harus bernapas secara normal, sedangkan pada kasus ini Bayi “R” tidak dapat bernapas secara normal. Sehingga diperlukan rencana tindakan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan dasar bayi “R” dalam hal ini yaitu kebutuhan bernapas secara normal.

Penulis memilih teori Henderson karena sejalan dengan intervensi yang akan diberikan kepada pasien, dimana intervensi tersebut bertujuan untuk memberikan efek menurunkan frekuensi napas sehingga pasien dapat bernapas secara normal. Oleh karena itu teori Henderson ini sangat sejalan dengan karya tulis yang akan menerapkan intervensi yang bertujuan menurunkan atau menghilangkan sesak yang dirasakan oleh pasien dengan RDN .

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan

Implementasi dilakukan selama tiga hari yaitu dari tanggal 27-29 Juli 2021. Sebelum diberikan intervensi posisi *semi prone* pada Bayi “R”, peneliti menerapkan etik keperawatan *justice* dimana peneliti melakukan *informed consent* dengan orangtua Bayi “R”, kemudian sebelum masuk ke ruangan tidak lupa mengucapkan salam, mengobservasi keadaan umum bayi, mencuci tangan, membaca basmalash, kemudian melakukan pengukuran frekuensi napas, mengobservasi penggunaan otot bantu pernapasan dan pernapasan cuping hidung. Serta pemberian posisi semi prone dilakukan reposisi tiap 30 menit. Saat pemberian intervensi peneliti menerapkan etik keperawatan *non*

maleficiencia dimana peneliti wajib untuk tidak melakukan hal yang dapat membahayakan pasien.

Pada hari pertama saat diobservasi nampak penggunaan otot bantu napas dan ada pernapasan cuping hidung, serta frekuensi napas sebelum pemberian posisi *semi prone* yaitu 64x/ menit. Setelah diberikan intervensi posisi *semi prone* dilakukan pengukuran frekuensi napas, pada 10 menit pertama frekuensi napas 60x/ menit, 20 menit setelah intervensi frekuensi napas 59x/ menit, 30 menit setelah intervensi frekuensi napas 54x/ menit dan 1 jam setelah pemberian posisi *semi prone* frekuensi napas 53x/ menit.

Pada hari kedua frekuensi napas sebelum diberikan intervensi yaitu 56x/ menit. 10 menit setelah diberikan intervensi frekuensi napas 54x/ menit, 20 menit setelah intervensi frekuensi napas 54x/ menit, 30 menit setelah intervensi frekuensi napas 51x/ menit, dan 1 jam setelah pemberian intervensi pemberian posisi *semi prone* frekuensi napas 50x/ menit.

Pada hari ketiga frekuensi napas sebelum diberikan intervensi yaitu 49x/ menit. 10 menit setelah diberikan intervensi frekuensi napas 48x/ menit, 20 menit setelah intervensi frekuensi napas 47x/ menit, 30 menit setelah intervensi frekuensi napas 45x/ menit dan 1 jam setelah pemberian intervensi posisi *semi prone* yaitu 42x/ menit. Pada implementasi hari ketiga alat bantu pernapasan/ ventilator telah dilepas, pola napas bayi R nampak teratur, tidak ada penggunaan otot bantu napas dan pernapasan cuping hidung, frekuensi napas dalam batas normal

Untuk diagnosa kedua dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif peneliti memberikan intervensi manajemen bersihan jalan napas sesuai dengan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, mulai dari memonitor pola napas, melakukan nebulizer dan suction. Pada hari pertama dilakukan suction terdapat sputum atau lendir sebanyak ± 5 cc.

Pada hari kedua masih tetap mempertahankan intervensi manajemen bersihan jalan napas. Tindakan keperawatan yang dilakukan yaitu nebulizer dan suction. Saat di suction jumlah sputum sebanyak ± 3 cc. Dan pada hari ketiga saat dimonitor, pola napas baik nampak membaik dan CPAP telah

dilepas. Tindakan yang dilakukan di hari ketiga yaitu melakukan nebulizer dan suction. Saat di suction jumlah sputum ± 2 cc.

Untuk diagnosa ketiga dengan masalah risiko defisit nutrisi peneliti memberikan intervensi manajemen nutrisi sesuai dengan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, mulai dari memonitor asupan nutrisi, dimana hari pertama bayi “R” sedang menjalani stop oral , kemudian memonitor kepatenan akses intravena, dan mengatur kecepatan pemberian Dextrose 10%/13 ml/jam/SP.

Di hari kedua masih tetap memberikan manajemen nutrisi, pada hari kedua tidak ada kenaikan ataupun penurunan berat badan bayi dimana BB bayi tetap 1080 gram. Pada hari ketiga bayi sudah bisa minum susu, refleks menghisap bayi “R” sangat baik. Bayi “R” menghabiskan susu ± 20 ml dan pemberian cairan infus dikurangi menjadi 6ml/ jam.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait implementasi yang dilakukan yaitu pada diagnosis pertama ada penurunan frekuensi napas, retraksi dinding dada dan pernapasan cuping hidung. Pada diagnosis kedua ada pengeluaran sputum pada hari pertama, kedua dan ketiga serta sianosis menurun. Dan pada diagnosis ketiga tidak terjadi penurunan berat badan selama dilakukan implementasi

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan

Evaluasi pemberian posisi *semi prone* pada bayi R selama 3x24 jam yaitu dapat menurunkan frekuensi napas, mengurangi sesak, memberi efek nyaman pada bayi, pola napas juga nampak teratur, bayi juga tidur dengan nyenyak. Allah SWT berfirman :

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ

Terjemahnya :

“Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat”. (QS. An-Naba’ : 9)

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa tidur merupakan salah satu nikmat dan rahmat yang Allah Swt berikan kepada hamba-Nya. Tidur pada bayi selain untuk istirahat juga dapat memberikan manfaat seperti tidur dalam

posisi semi prone dapat menurunkan masalah gangguan pernapasan pada bayi yang mengalami sesak

Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait evaluasi pemberian intervensi selama 3x24 jam yaitu terjadi penurunan frekuensi napas pada bayi RDN yang mengalami sesak saat diberikan posisi *semi prone*. Evaluasi hasil intervensi dapat dilihat pada tabel berikut :

HASIL INTERVENSI DAN EVALUASI PEMBERIAN POSISI SEMI PRONE TERHADAP FREKUENSI NAPAS

Tabel 4.10 Evaluasi

N o.	Hari / Tanggal	Sebelum Pemberian Posisi Semi Prone	10 Menit Setelah Pemberian Posisi Semi Prone	20 Menit Setelah Pemberian Posisi Semi Prone	30 Menit Setelah Pemberian Posisi Semi Prone	1 Jam Setelah Pemberian Posisi Semi Prone
1.	Selasa/ 27 Juli 2021	64x/menit	60x/menit	59x/menit	54x/menit	53x/menit
2.	Rabu/ 28 Juli 2021	56x/menit	54x/menit	54x/menit	51x/menit	50x/menit
3.	Kamis/ 29 Juli 2021	49x/menit	48x/menit	47x/menit	45x/menit	42x/menit

5.2 Analisis Intervensi EBP

Tindakan keperawatan utama yang diberikan pada diagnosa pola napas tidak efektif adalah terapi oksigen. Selain itu pemberian posisi juga dapat diberikan, salah satunya yaitu posisi semi prone. Posisi semi prone merupakan modifikasi dari posisi lateral dan posisi pronasi. Posisi *semi prone* juga biasa disebut *the quarter prone* atau dikenal juga dengan istilah posisi sims. Sejauh ini sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa posisi ini dapat menurunkan sesak pada bayi.

Pemberian intervensi posisi semi prone pada bayi R yang mengalami RDN dengan masalah pola napas tidak efektif selama 3x24 jam terdapat pengaruh penurunan sesak dengan kriteria frekuensi napas membaik, penggunaan otot bantu menurun, dan pernapasan cuping hidung menurun. Hal ini dikarenakan pada saat bayi diberikan posisi semi prone maka pergerakan dinding dada akan terstabilisasi dan tersinkronisasi sehingga menghasilkan pola napas yang efektif yang berdampak pada efisiensi ventilasi paru dan juga saat diberikan posisi semi prone maka dapat menurunkan kompresi paru oleh

jantung dan memaksimalkan ekspansi paru di region dorsal akibat kurangnya tekanan paru di region dorsal oleh organ abdomen.

Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ginting & Nurhaeni, 2021) yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian posisi semi prone terhadap kenyamanan pada anak pneumonia yang menunjukkan bahwa terapi pemberian posisi semi prone memberikan efek kenyamanan pada anak dan juga dapat menurunkan frekuensi pernapasan pada anak yang terpasang CPAP, selain itu anak tidak rewel dan tertidur pulas saat diberikan posisi semi prone.

Adapun hasil penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2018) yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas posisi semi prone dalam meningkatkan saturasi oksigen pada bayi prematur dengan RDS yang menunjukkan bahwa posisi quarter/semi prone ini dapat meningkatkan saturasi oksigen pada bayi prematur dengan RDS, dimana saat diberikan posisi quarter/semi prone dapat memberi lebih banyak ruang bagi bagian belakang sehingga meningkatkan ventilasi paru. Allah SWT berfirman dalam

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ ٢٣

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan”. (QS. Ar-Rum : 23)

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Manusia tidur agar badannya mendapatkan ketenangan. Posisi semi prone merupakan salah satu posisi yang bisa diberikan pada bayi saat tidur. Selain mendapatkan ketenangan dan kenyamanan saat tidur, posisi semi prone ini juga bermanfaat bagi bayi kesehatan bayi yang mengalami gangguan pernapasan.

Selanjutnya di dukung oleh studi literatur yang dilakukan (Efendi et al., 2019) dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai jenis posisi yang dapat diberikan pada bayi prematur melalui pendekatan studi literatur dan praktik klinis. Hasil yang diperoleh yaitu posisi quarter/semi prone di rekomendasikan untuk bayi prematur dengan *Respiratory Distress Sindrom* (RDS). Karena pemberian posisi semi prone dapat meningkatkan fungsi paru dan penurunan distres pernapasan pada bayi prematur, selain itu posisi semi prone dapat meningkatkan outcome fungsi pernapasan yang ditandai dengan peningkatan volume tidal (V_t), saturasi oksigen (SPO_2), dan penurunan tekanan karbondioksida ($PaCO_2$).

Intervensi terapi pemberian posisi semi prone ini tidak berjalan sendiri, namun ada kolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya seperti pemberian obat farmakologi dan juga penggunaan alat bantu napas ventilator untuk mengurangi sesak yang dialami oleh bayi.


5.3 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu intervensi pemberian posisi semi prone ini tidak dapat diberikan pada bayi dengan komplikasi penyakit jantung bawaan, hidrosepalus karena dianjurkan untuk melakukan reposisi. Kemudian pemberian intervensi posisi semi prone ini hanya pada saat jadwal praktik peneliti sesuai shift sehingga tidak ada monitoring lanjutan setelah shift peneliti selesai.

Selain itu keterbatasan dalam penelitian ini yaitu intervensi pemberian posisi *semi prone* bukan satu-satunya intervensi yang diberikan pada kasus ini, melainkan ada intervensi lain yang diberikan seperti bantuan pernapasan menggunakan ventilator, dibantu juga oleh pemberian obat-obatan farmakologi sehingga pemberian posisi *semi prone* bukan satu-satunya intervensi yang diberikan.

Adapun rekomendasi penelitian selanjutnya yaitu memberikan intervensi pembandingan atau kelompok kontrol agar dapat melihat efektivitas dari intervensi pemberian posisi semi prone ini pada bayi dengan gangguan pola

napas dan juga melihat pengaruh dari intervensi posisi semi prone terhadap saturasi oksigen bayi dengan gangguan pernapasan.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian dilakukan pada Bayi R yang mengalami RDN dengan masalah utama pola napas tidak yang efektif diberikan intervensi 3 hari berturut-turut yaitu dengan pemberian posisi semi prone terbukti dapat mengurangi sesak dengan kriteria frekuensi napas membaik, penggunaan otot bantu menurun, dan pernapasan cuping hidung menurun.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Profesi Keperawatan

Karya akhir ini bisa dijadikan sebagai salah satu intervensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi nonfarmakologi pada bayi yang mengalami *Respiratory Distress Newborn* (RDN) dengan masalah pola napas tidak efektif

6.2.2 Bagi Pelayanan Rumah Sakit

Karya akhir ini menjadi masukan bagi bidang keperawatan dan para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan masalah pola napas tidak efektif

6.2.3 Bagi Institusi Pendidikan

Karya akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami RDN. Perlu juga dilakukan penelitian lebih lanjut terkait perbedaan efektivitas pemberian posisi untuk masalah pola napas tidak efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliawati, A. (2016). *The Effect Of Prone Position To Oxygen Aturations'Level And Respiratory Rate Among Infants Who Being Installed Mechanical Ventilation In NICU Koja Hospital*. 541–546.
- Atika, A. (2019). *Faktor Risiko Kejadian Respiratory Distress Newborn Di Neonatal Intensive Care Unit RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Efendi, D., Sari, D., Riyantini, Y., Anggur, D., & Lestari, P. (2019). *Pemberian Posis (Posiotoning) Dan Nesting Pada Bayi Prematur : Evaluasi Implementasi Perawatan Di Neonatal Iintensive Care Unit (NICU)*. 22(July), 169–181. <https://doi.org/10.7454/jki.v22i3.619>
- Ginting, N., & Nurhaeni, N. (2021). *Posisi Semi Prone Dapat Mmeberikan Kenyamanan Pada Anak Dengan Pneumonia*. 3, 347–353.
- Health, Q. (2020). *Maternity and Neonatal Clinical Guideline Respiratory distress and CPAP*. <https://doi.org/MN20.3V9-R25>
- Hidayat, A. A. A. (2012). *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak 2* (2 ed.). Salemba Medika.
- KEMENKES. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lestari, P., Susmarini, D., & Awaludin, S. (2018). *Quarter Turn From Prone Position Increases Oxygen Saturation In Premature Babies With Respiratory Distress Syndrome*. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 13(1), 38–44.
- Marmi, & Rahardjo, K. (2014). *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah* (Cetakan 2). Pustaka Pelajar.
- Suriadi, Yuliani, R., & Haryanto. (2010). *Buku Pegangan Praktik Klinik : Asuhan Keperawatan Pada Anak* (A. Astrada (ed.); Edisi 2). Sagung Seto.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2019). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia* (Edisi I). PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia* (Edisi I). PPNI.
- Utario, Y., Rustina, Y., & Waluyanti, F. T. (2017). *The Quarter Prone Position Increases Oxygen Saturation In Premature Infants Using Continuous Positive Airway Preasure*. <https://doi.org/10.1080/24694193.20171386976>
- Wahyuni, S., & Wiwin, N. W. (2020). *Hubungan Usia Ibu dan Asfiksia Neonatorum dengan Kejadian Respiratory Distress Syndrome (RDS) npada Neonatus di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda*. 1(3), 1824–1833.
- Wong, D., Wilson, D., Hockenberry, M., Winkelstein, M., & Schwartz, P. (2009). *Buku Ajar Keperawatan Pediatrik* (Edisi 6 Vo). EGC.
- Yin, T., Liaw, J.-J., Yuh, Y.-S., Chen, Y.-Y., & Wang, K.-W. (2016). *Semi-prone Position Can Influence Variability In Respiratory Rate Of Premature Infants Using Nasal CPAP*. 31(2), e167–e174.