

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN
PNEUMOTHORAKS DENGAN POLA NAPAS TIDAK
EFEKTIF MENGGUNAKAN INTERVENSI KOMBINASI
BREATHING EXERCISE DAN *RESPIRATORY
MUSCLE STRETCHING* DI RSUD
LABUANG BAJI MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Oleh :

RISDAWATI
NIM: 70900120039

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risdawati, S.Kep
NIM : 70900120039
Tempat/Tgl Lahir : Tanete, 03 April 1998
Jurusan/Prodi : Program Studi Profesi Ners
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien
Pneumothoraks Dengan Pola Napas Tidak efektif Menggunakan Intervensi Kombinasi
Breathing Exercise dan *Respiratory Muscle Stretching* Di Rsud labuang baji Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 25 Januari 2022

Penyusun

Risdawati, S.Kep
70900120039

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Tugas Akhir Ners/Seminar Keperawatan Saudara(i) Risdawati, S.Kep Nim :70900120039, mahasiswa Program Studi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pneumothoraks Dengan Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Kombinasi *Breathing Exercise* Dan *respiratory Muscle Stretching* Di RSUD Labuang Baji Makassar" memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 25 Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

 Andi Budiyanto A P, S.Kep., Ns., M.Kep

 Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep., Ns., M.Kep

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "*Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pneumothoraks Dengan Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Kombinasi Breathing Exercise Dan Respiratory Muscle Stretching Di RSUD Labuang Baji Makassar*" yang disusun oleh Risdawati, S.Kep, NIM: 70900120039, Mahasiswa Program Studi profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 28 Januari 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Program Studi Profesi Ners.

Gowa, 28 Januari 2022
26 Jumadil Akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patimah, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Ahmad J, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep MB	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muhammad Irham S.Th.I., M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: Andi Budiyanto A P, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:

.....
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIM: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah swt., atas rahmat dan hidayah-Nya yang masih tercurahkan kepada penulis, sehingga karya tulis ini yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pneumothoraks Dengan Pola Napas Tidak efektif Menggunakan Intervensi Kombinasi *Breathing Exercise* dan *Respiratory Muscle Stretching* Di RSUD Labuang Baji Makassar” dapat terselesaikan, dan tak lupa pula saya kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang dirasakan saat ini.

Proses penyusunan karya tulis ini, penyusun telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtuaku yang tercinta, terkasih, dan tersayang sebagai motivator dan inspirasi terbesar dalam menggapai cita. Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D. selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta para wakil rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes. beserta para wakil dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Dr.Patimah,S.Kep.,Ns.,M.Kep. selaku Ketua Prodi Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta dosen-dosen pengajar Program Studi Ners.
4. Andi Budiyanto A P, S.Kep., Ns., M.Kep. selaku pembimbing I dan Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep., Ns., M.Kep. selaku pembimbing II yang sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun karya tulis ini.
5. Ahmad J, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep. MB. selaku penguji I dan Dr. H. Muhammad Irham S.Th.I., M.Th.I. selaku penguji II yang telah memberi masukan berupa saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya tulis ini.

Penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan. Semoga semua ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan Terima Kasih.

Gowa, 25 Januari 2022

Risdawati, S.Kep

70900120039

ABSTRAK

Nama : Risdawati, S.Kep
NIM : 70900120039
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pneumothoraks Dengan Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Kombinasi *Breathing Exercise* Dan *respiratory Muscle Stretching* Di RSUD Labuang Baji Makassar

Latar Belakang : Pneumothoraks merupakan salah satu trauma dada yang sering terjadi di luar rumah sakit yang saat ini masih menjadi salah satu masalah global. Pneumothoraks ialah kondisi terjebaknya udara di dalam rongga pleura, yang menyebabkan paru-paru terjadi kolaps dan gagal napas. Pada penderita pneumothoraks, umumnya penderitanya akan mengeluh sesak napas, nyeri dada, dan batuk. Berdasarkan penelitian latihan pernapasan (*Breathing Exercise*) mampu meningkatkan efisiensi pernapasan dengan mengurangi udara yang terperangkap. **Tujuan :** untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif menggunakan intervensi kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching* di RSUD Labuang Baji Makassar. **Metode :** Penelitian ini merupakan studi kasus. **Hasil :** Terdapat perubahan status dyspnea dengan pemberian *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching*. **Kesimpulan :** Kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching* efektif digunakan dalam mengatasi sesak pada pasien pneumothoraks. **Implikasi :** Hasil dari penelitian ini menjadi tambahan informasi perawat dalam memberikan intervensi yang bersifat non farmakologis kepada pasien pneumothoraks yang mengalami pola napas tidak efektif.

Keywords : Pneumothoraks, dyspnea, *breathing exercise*, *respiratory muscle stretching*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Name : Risdawati, S.Kep
NIM : 70900120039
Title : Analysis of Nursing Care in Pneumothorax Patients with Ineffective Breathing Patterns Using a Combination Intervention *Breathing Exercise* and *Respiratory Muscle Stretching* in RSUD Labuang Wedge Makassar

Background: Pneumothorax is a chest trauma that often occurs outside the hospital which is currently still a global problem. Pneumothorax is a condition of trapped air in the pleural cavity, which causes the lungs to collapse and respiratory failure. In patients with pneumothorax, generally sufferers will complain of shortness of breath, chest pain, and cough. Based on research, breathing exercises can increase breathing efficiency by reducing trapped air. **Objective:** to analyze nursing care in pneumothorax patients with ineffective breathing patterns using a combination of *breathing exercise* and *respiratory muscle stretching* at Labuang Baji Hospital Makassar. **Methods:** This research is a case study. **Result :** There is a change in dyspnea status by giving *breathing exercise* and *respiratory muscle stretching*. **Conclusion:** Combination *breathing exercise* and *respiratory muscle stretching* is effective in overcoming shortness of breath in patients with pneumothorax. **Implications:** The results of this study provide additional information for nurses in providing non-pharmacological interventions to pneumothorax patients who experience ineffective breathing patterns.

Keywords: Pneumothorax, dyspnea, *breathing exercise*, *respiratory muscle stretching*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-7
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8-37
A. Konsep Medis Pneumothoraks.....	8
1. Definisi	8
2. Etiologi.....	9
3. Patofisiologi.....	11
4. Manifestasi Klinis.....	12
5. Penatalaksanaan Medis.....	13
6. Pemeriksaan Penunjang.....	15
7. Komplikasi	17
8. Penyimpangan KDM	18
B. Konsep Dyspnea.....	19
C. Konsep <i>Breathing Exercise</i>	22
D. Konsep Respiratory Muscle Stretching (RMS).....	23
E. Konsep Asuhan Keperawatan	25
F. Evidence Based Practice in Nursing (EBPN)	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44-46
A. Rancangan Studi Kasus.....	44

B. Subyek Studi Kasus.....	44
C. Fokus Studi kasus.....	45
D. Instrumen studi kasus.....	45
E. Prosedur Pengambilan Data.....	45
F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus	46
G. Analisis Data dan Penyajian Data.....	46
H. Etika Studi Kasus.....	46
BAB IV LAPORAN KASUS	48-96
A. Pengkajian Keperawatan.....	48
B. Diagnosis Keperawatan.....	72
C. Intervensi Keperawatan.....	73
D. Implementasi Keperawatan.....	77
E. Evaluasi Keperawatan.....	96
BAB V PEMBAHASAN	100-112
A. Analisis Asuhan Keperawatan	100
B. Analisis Evidence Based Practice in Nursing	111
C. Keterbatasan.....	112
BAB VI PENUTUP	113-114
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Trauma merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Secara global angka kejadian kasus cedera atau trauma masih cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari WHO (*World Health Organization*) setiap harinya, sekitar 16.500 orang meninggal di seluruh dunia disebabkan oleh semua jenis cedera. Cedera atau trauma mewakili 12% dari beban keseluruhan penyakit, sehingga cedera juga merupakan bagian dari penyebab penting ketiga dari kematian secara keseluruhan (*World Health Organization*, 2016).

Trauma dada merupakan salah satu jenis trauma yang sering terjadi. Trauma dada yang tidak ditangani dengan benar maka akan menyebabkan kematian. Pada kasus trauma dada, sebanyak 90% merupakan trauma dada tumpul dan 10% merupakan trauma yang memerlukan tindakan pembedahan. Kejadian trauma dada mencapai sekitar $\frac{1}{4}$ dari jumlah kematian akibat trauma dan merupakan $\frac{1}{3}$ penyebab dari kematian yang terjadi di berbagai rumah sakit (*World Health Organization*, 2016).

Hampir seluruh kejadian trauma dada disebabkan oleh kecelakaan bermotor. Berdasarkan data Riskesdas, kejadian trauma dada di Sulawesi Selatan mencapai 2,8% dimana 71,6% disebabkan karena kecelakaan lalu lintas pada saat mengendarai motor (*Tim Riskesdas*, 2018). Dari observasi secara langsung selama praktik departemen keperawatan gawat darurat yang dilaksanakan di ruang *Intensive Care Unit* (ICU)

Rumah Sakit Labuang Baji, tiap bulannya terdapat 120 pasien yang masuk menjalani perawatan di ruang ICU, 17 diantaranya merupakan kasus dengan trauma dada akibat kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja. Dari data primer, diperoleh dari 13 pasien terdapat 2 pasien yang mengalami kasus trauma dada selama praktik di lapangan.

Pneumothoraks merupakan salah satu jenis trauma dada yang umum ditemukan pada kejadian trauma di luar rumah sakit. Dimana, pneumothoraks merupakan kegawatdaruratan yang harus diberikan penanganan secepat mungkin untuk menghindari kemungkinan kematian. Insiden pneumothoraks sendiri tidak diketahui secara pasti di populasi, hal disebabkan di beberapa literatur menyebutkan bahwa insiden pneumothoraks dimasukkan ke dalam insiden trauma dada. Sebuah literatur menyebutkan bahwa 5,4% dari seluruh pasien yang menderita trauma merupakan pasien yang mengalami pneumothoraks (Punarbawa & Suarjaya, 2019).

Pneumothoraks menjadi masalah kesehatan global terutama pneumothoraks spontan. Riset dari Olmsted Country, USA melaporkan bahwa insiden pneumothoraks primer pertahunnya mencapai 7,4/100.000 pada laki-laki dan 1,2/100.000 pada perempuan. Pada insiden pneumothoraks sekunder insiden pertahunnya tercatat 6,3/100.000 baik pada laki-laki maupun pada perempuan. (Papagiannis et al., 2015).

Insiden pneumothoraks selalu bervariasi di tiap rumah sakit. Di salah satu rumah sakit di Iran, yaitu Hospital of Rasht melaporkan kejadian pneumothoraks pada tahun 2015 ialah mencapai 253 kasus, dimana 116 pasien menderita pneumothoraks spontan sekunder, 80 pasien menderita pneumothoraks spontan primer, dan 57 pasien lainnya menderita pneumothoraks jenis lainnya (Aghajanzadeh et al., 2018).

Pada penderita pneumothoraks, umumnya penderitanya akan mengeluh sesak napas, nyeri dada, batuk dan ada beberapa penderita yang mengalami emfisema subkutis. Pada saat pemeriksaan ditemukan takipnea, hiperresonansi saat dilakukan perkusi, dan suara napas terdengar menurun atau tidak ada sama sekali pada saat dilakukan auskultasi pada pasien pneumothoraks (White & Eaton, 2017). Kelemahan yang terjadi pada otot-otot bantu pernapasan mengakibatkan pasien pneumothoraks mengalami sesak napas parah dan mempengaruhi diafragma. Terjadinya retraksi jaringan lunak dan otot-otot di sekitar dinding dada akan menyebabkan keterbatasan ekspansi dada yang menyebabkan pasien akan mengeluh sesak (Rekha et al., 2016).

Dalam penanganannya, terapi farmakologis saja tidak cukup untuk meredakan sesak pada beberapa pasien. Pendekatan nonfarmakologis terbukti dapat digunakan untuk meningkatkan terapi farmakologis. Yang paling utama di antara pendekatan ini adalah rehabilitasi paru, dimana sudah menunjukkan peran dalam mengurangi sesak (termasuk persepsi sesak) dengan meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan mengurangi sensitivitas pasien dengan mengurangi rasa takut atau kecemasan (GOLD, 2017).

Saat ini begitu banyak teknik non farmakologis yang telah dikembangkan sebagai upaya untuk mengatasi sesak yang dialami pasien. Salah satunya yaitu teknik *Breathing Exercise*. Berdasarkan penelitian, latihan pernapasan (*Breathing Exercise*) mampu meningkatkan efisiensi pernapasan dengan mengurangi udara yang terperangkap dan mengurangi kerja pernapasan (Mertha et al., 2018). Latihan pernapasan ini dapat diberikan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan paru-

paru seperti COPD, Pneumonia, Atelektasis, dan *acute respiratory disease*, penumpukan secret pada saluran pernapasan yang sulit dikeluarkan, dan juga nyeri (Rusli et al., 2015).

Respiratory Muscle Stretching (RMS) juga menjadi pilihan teknik non farmakologis yang bisa diberikan kepada pasien yang mengalami sesak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawi dan Farhani, 2021 pemberian RMS terbukti mampu memperbaiki pola napas yang ditunjukkan dengan penurunan nilai *respiratory rate* dan *heart rate* pada pasien pneumothoraks (Pahlawi & Farhani, 2021).

Pemberian kombinasi *breathing exercise* dan *Respiratory Muscle Stretching* (RMS) pada akhirnya diharapkan mampu memperbaiki status respirasi pasien sehingga pasien bisa segera pulih dan sembuh atas izin Allah swt. sebagaimana firman-Nya dalam QS Asy-Syu'ara'/26:80 yang berbunyi :

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠)

Terjemahnya :

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”.

Tafsir Al-Misbah menyatakan sakit merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Namun demikian, dalam hal penyembuhan bahwa Yang melakukannya adalah Allah Ta'ala. Perlu dicatat bahwa penyembuhan, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Ibrahim, bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan

lagi. Sekian banyak hadits Rasulullah yang memerintahkan untuk berobat. Ucapan Nabi Ibrahim bermaksud menyatakan bahwa sebab dari segala sebab adalah datangnya dari Allah (Shihab, 2009). Keterkaitan dalil ini adalah apapun penyakit yang menyerang seorang individu, maka yang hanya bisa mengangkat penyakit tersebut adalah Allah. Oleh karena itu, pasien, tenaga kesehatan, dan keluarga harus selalu meyakini dan mencari sebab bahwasannya untuk kesembuhan dari penyakit, semuanya adalah berasal dari Allah.

Berdasarkan dari berbagai data yang telah dipaparkan, permasalahan yang terkait, hasil penelitian sebelumnya, dan berdasarkan fenomena yang penulis temukan selama praktik di lapangan, yaitu selain nyeri dada, sesak napas juga merupakan hal yang paling sering dikeluhkan oleh pasien pneumothorax. Oleh karenanya, berdasarkan *Evidence Based Practice In Nursing* (EBPN) yang telah ditemukan, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus pengaruh kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching* terhadap sesak pasien pneumothoraks.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif menggunakan intervensi kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching* di RSUD Labuang Baji Makassar?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif menggunakan intervensi kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching* di RSUD Labuang baji Makassar.

2. Tujuan Khusus :

- a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif.
- b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif.
- c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif.
- d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif.
- e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif.
- f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif menggunakan intervensi kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif menggunakan intervensi kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching* di RSUD Labuang baji Makassar.

2. Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi *Evidence Based Practice in Nursing* (EBPN) dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif menggunakan intervensi kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching* pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Medis Pneumothoraks

1. Definisi

Pneumothoraks adalah keadaan dimana udara mengisi ruang antara bagian luar paru dan bagian dalam dinding dada. Pneumothoraks ialah kondisi dimana terdapatnya udara atau terjebaknya udara di dalam rongga pleura, yang menyebabkan paru-paru terjadi kolaps dan gagal napas. Pneumothoraks merupakan suatu kondisi gawat darurat yang disebabkan terdapatnya akumulasi udara di dalam rongga pleura yang biasanya disebabkan oleh proses suatu penyakit ataupun cedera (British Lung Foundation, 2019).

Pada kondisi yang normal, rongga pleura dipenuhi dengan paru-paru yang mengembang saat inspirasi yang disebabkan karena tegangan permukaan (bertekanan negative) antara kedua permukaan pleura. Terdapatnya udara pada rongga potensial antara pleura visceral dan pleura parietal akan mengakibatkan paru-paru terdesak sesuai dengan jumlah udara yang masuk ke dalam rongga pleura. Semakin banyak udara yang terperangkap dalam rongga pleura maka akan mengakibatkan paru-paru kolaps karena terjadi peningkatan tekanan pada intrapleura (Utama, 2018).

2. Etiologi

Terdapat beberapa jenis pneumothorax yang diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya dan mekanisme terjadinya, antara lain :

a. Pneumothoraks berdasarkan penyebabnya :

1) Pneumothoraks spontan

Pneumothorax ini terjadi secara spontan tanpa adanya kecelakaan atau trauma.

Pneumothorax spontan dibagi menjadi dua, yaitu :

a) *Primary Spontaneous Pneumothorax* (Pneumothoraks Spontan Primer).

Pneumothorax jenis ini biasanya disebabkan oleh pecahnya bleb pada paru-paru yang biasanya terjadi pada orang sehat tanpa didahului oleh suatu penyakit paru.

b) *Secondary Spontaneous Pneumothorax* (Pneumothoraks Spontan Sekunder).

Pneumothorax jenis ini seringkali sebagai akibat dari komplikasi beberapa penyakit paru-paru seperti *Chronic Obstructive Pulmonary Disease* (COPD), infeksi yang disebabkan oleh bakteri *pneumocity carinii*, *cystic fibrosis*, *interstitial lung disease*, dan lain sebagainya (Papagiannis et al., 2015).

2) Pneumothoraks trauma

Pneumothoraks ini merupakan jenis pneumothorax yang disebabkan karena adanya trauma yang secara langsung mengenai dinding dada baik benda tajam maupun benda tumpul. Mekanisme terjadinya pneumothorax karena trauma tajam disebabkan oleh terjadinya penetrasi benda tajam pada dinding dada sehingga merobek pleura parietal kemudian udara masuk melalui luka tersebut ke dalam rongga pleura sehingga terjadilah pneumothorax. Sedangkan mekanisme

terjadinya pneumothorax trauma tumpul disebabkan karena terjadinya peningkatan tekanan pada alveolar secara mendadak yang kemudian menyebabkan alveolar menjadi rupture sebagai akibat dari kompresi yang timbul akibat trauma tumpul tersebut. Pecahnya alveolar ini kemudian akan menyebabkan udara menumpuk di pleura visceral dan terperangkap, terperangkapnya udara akan menyebabkan pleura visceral rupture atau robek sehingga menyebabkan terjadinya pneumothorax (Utama, 2018).

3) Iatrogenik pneumothoraks

Pneumothoraks jenis ini biasanya disebabkan karena komplikasi tindakan atau tertusuknya paru-paru karena prosedur tindakan medis yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Tindakan medis yang dapat menyebabkan pneumothorax antara lain pemangan *subclavian vein cannulation*, aspirasi dan biopsy pleura, *transthoracic or transbronchial lung biopsy*, *lung injury* yang disebabkan karena penggunaan dari *positive airway pressure* selama tindakan *mechanical ventilation* (Papagiannis et al., 2015).

b. Pneumothoraks berdasarkan mekanisme terjadinya :

1) *Tension Pneumothorax* (Pneumothoraks Terdesak)

Tension Pneumothorax terjadi akibat adanya kerusakan yang menyebabkan udara masuk ke dalam rongga pleura dan terperangkap di dalam pleura, dimana keadaan ini disebut dengan fenomena ventil. Udara yang terperangkap di dalam rongga pleura ini akan menyebabkan tekanan intrapleura meningkat sehingga menyebabkan kolaps pada paru-paru kemudian menggeser mediastinum ke bagian

paru-paru kontralateral sehingga terjadi penekanan pada aliran vena balik yang menimbulkan hipoksia. Jika gejala hipoksia tidak segera ditangani maka akan mengarah ke asidosis kemudian terjadi penurunan *cardiac output* hingga terjadi henti jantung.

2) *Open Pneumothorax* (Pneumothoraks Terbuka)

Open Pneumothorax sering kali disebabkan karena adanya penetrasi langsung dari benda tajam mengenai dinding dada sehingga menimbulkan defek pada dinding dada. Defek tersebut kemudian merobek pleura parietal yang mengakibatkan udara masuk ke rongga pleura. Kondisi ini menyebabkan terjadinya hubungan antara udara di lingkungan luar dengan udara yang ada pada rongga pleura yang kemudian menyebabkan samanya tekanan pada rongga pleura dan udara yang ada di atmosfer. Jika keadaan ini dibiarkan maka akan menyebabkan sianosis sampai distress respirasi (Utama, 2018).

3. Patofisiologi

Paru-paru dibungkus oleh pleura parietalis dan pleura visceralis dimana di antaranya terdapat *cavum pleura*. Pada kondisi normal, *cavum pleura* berisi sedikit cairan serous jaringan. Tekanan negatif merupakan tekanan dari intrapleura, dimana tekanan ini membantu dalam proses respirasi. Proses respirasi terbagi menjadi dua fase yaitu fase inspirasi dengan tekanan intrapleura : -9 s/d -12 cmH₂ O dan fase ekspirasi dengan tekanan intrapleura : -3 s/d -6 cmH₂O.

Pneumothoraks merupakan kondisi dimana adanya udara dalam cavum pleura yang menyebabkan tekanan negative pada intrapleura tidak terbentuk sehingga menyebabkan paru-paru menjadi colabs dan menyebabkan gangguan pada saat respirasi. Secara garis besar, semua jenis pneumothoraks mempunyai dasar patofisiologis yang sama, yaitu terdapat udara dalam cavum pleura yang mengakibatkan tidak terbentuknya tekanan negative dalam cavum pleura.

Pada kasus tension pneumothorax, saat ekspirasi udara tidak dipompakan balik secara maksimal karena elastic recoil dari kerja alveoli tidak bekerja dengan baik. Akibatnya, terjadi hiperekspansi cavum pleura pada saat inspirasi dan menekan mediastinal ke sisi yang sehat dan pada saat fase ekspirasi udara terperangkap pada paru dan cavum pleura karena luka yang bersifat katup tertutup kemudian terjadilah penekanan vena cava, peregeseran udara ke paru yang sehat, dan obstruksi jalan napas, kemudian timbulah gejala pre-shock atau shock oleh karena penekanan vena cava. Akibatnya, maka akan terjadi hiperekspansi cavum pleura yang menekan ke arah yang sehat begitupun saat ekspirasi sehingga terjadilah mediastinum flutter (Utama, 2018).

4. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis dari pneumothoraks sangatlah bervariasi, tergantung pada jumlah udara yang masuk ke dalam rongga pleura dan luasnya paru-paru yang mengalami kolaps. Manifestasi klinis dari pneumothoraks adalah :

- a. Nyeri dada berat yang timbul secara tiba-tiba dan semakin nyeri jika penderita menarik napas dalam atau jika pasien terbatuk.
- b. Sesak napas
- c. Dada terasa sempit
- d. Mudah lelah
- e. Denyut jantung cepat
- f. Warna kulit menjadi kebiruan akibat kekurangan oksigen
- g. Hidung tampak kemerahan
- h. Cemas, tegang, stress
- i. Tekanan darah rendah (hipotensi)
- j. Deviasi trakea ke arah yang normal
- k. Hasil perkusi hipersonor (Utama, 2018).

5. Penatalaksanaan Medis

Penatalaksanaan untuk pasien-pasien pneumothorax adalah sebagai berikut :

- a. *Chest wound/sucking chest wound*

Luka tembus perlu segera ditutup dengan pembalut darurat atau balutan tekan dibuat kedap udara dengan petroleum jelly atau plastic bersih. Pembalut plastic yang steril merupakan alat yang baik, aluminium foil juga dapat digunakan. Plastik dibentuk segitiga dengan salah satu ujungnya dibiarkan terbuka untuk memungkinkan udara yang terhisap dapat dikeluarkan. Hal ini untuk mencegah

terjadinya tension pneumothoraks. Celah kecil dibiarkan terbuka sebagai katup agar udara dapat keluar dan paru-paru akan mengembang.

b. *Blast injury or tension*

Jika udara masuk ke rongga pleura disebabkan oleh robekan jaringan paru, perlu penanganan segera. Sebuah tusukan jarum halus dapat dilakukan untuk mengurangi tekanan agar paru dapat mengembang kembali.

c. *Bullow Drainage/WSD*

WSD (*Water Sealed Drainage*) merupakan tindakan invasive yang dilakukan untuk mengeluarkan udara, cairan (dara,pus) dari rongga pleura, rongga thorax, dan mediastinum dengan menggunakan pipa penghubung untuk mempertahankan tekanan negative rongga tersebut.

Indikasi pemasangan WSD :

- 1) Pneumothoraks
- 2) Hemathoraks
- 3) Hemopneumothorax
- 4) Efusi pleura
- 5) Cylothorax
- 6) *Penetrating chest* trauma
- 7) Pleural empyema

Indikasi lain dari pemasangan WSD adalah :

- a) Diagnostik : Menentukan perdarahan dari pembuluh darah besar atau kecil, sehingga dapat ditentukan apakah perlu operasi torakotomi atau tidak, sebelum penderita jatuh dalam syok.
- b) Terapi : Mengeluarkan darah atau udara yang terperangkap di rongga pleura. Mengembalikan tekanan rongga pleura sehingga mekanisme pernapasan dapat kembali seperti yang seharusnya.
- c) Preventif : Mengeluarkan udara atau darah yang masuk ke dalam rongga pleura sehingga mekanisme pernapasan dapat kembali berfungsi dengan baik.
- d. Perawatan Pre-hospital

Beberapa paramedik mampu melakukan needle thoracosentesis untuk mengurangi tekanan intrapleura. Jika dikehendaki intubasi dapat segera dilakukan jika keadaan pasien makin memburuk. Perawatan medis lebih lanjut dan evaluasi sangat dianjurkan segera dilakukan. Termasuk dukungan ventilasi mekanik.

6. Pemeriksaan Penunjang

- a. Pemeriksaan fisik dengan bantuan stetoskop menunjukkan adanya penurunan suara.
- b. Laboratorium

Pemeriksaan Laboratorium yang biasanya dilakukan adalah pemeriksaan hematocrit dari cairan pleura :

- 1) Pengukuran hematocrit
- 2) Gas darah arteri untuk mengkaji P_aO_2 dan P_aCO_2

c. *Imaging Study*

1) *Chest Radiotherapy*

Rontgen dada biasanya merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mendiagnosis pneumothoraks, yang hasilnya menunjukkan adanya udara. Merupakan studi ideal sebagai evaluasi diagnostic hematothoraks. Dalam *unscarred* normal, rongga pleura yang hematothorax dicatat sebagai meniscus cairan menimbulkan costophrenic diafragmatik sudut atau permukaan dan penentuan atas margin pleura dinding dada saat dilihat pada hasil thoraks foto AP. Pada dasarnya tampakan yang sama ditemukan pada radiografi dada pasien efusi pleura.

2) *Ultrasonography (USG)*

USG dapat membantu dalam menentukan lokasi dari pengumpulan cairan yang jumlahnya sedikit, sehingga bisa dilakukan pengeluaran udara. USG sendiri digunakan pada beberapa pusat trauma untuk melakukan evaluasi awal pasien hematothorax. Salah satu kekurangan USG dalam mengidentifikasi trauma terkait hematothorax ialah luka-luka yang terlihat pada radiography dada pasien yang mengalami trauma. Cedera tulang, mediastinum yang melebar dan pneumothorax, tidak mudah untuk diidentifikasi di dada melalui USG. USG lebih mungkin berperan dalam kasus-kasus tertentu dimana x-ray dada pada hematothorax yang samar-samar.

3) *CT Scan*

CT scan dengan jelas menggambarkan paru-paru dan udara dan bisa menunjukkan adanya pneumosia, abses paru atau tumor. CT scan sangat akurat untuk mendiagnostik adanya cairan pleura atau darah. CT scan tidak memegang peran utama dalam menegakkan diagnostic hematothorax, namun melengkapi data radiography. Saat ini, CT scan memegang peranan penting yakni untuk menentukan lokalisasi dan klasifikasi dari setiap temua dalam rongga pleura.


7. Komplikasi

Pneumothoraks dapat menyebabkan hipoksia dan dyspnea berat dimana kematian menjadi akhir dari pneumothorax jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Gambaran ancaman terhadap kehidupan pada pasien ekstrim ialah pertimbangan tension pneumothorax, nafas pendek, hypotensi, takikardi, trakea berubah.

Tension pneumothoraks dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kolaps, akibatnya pengisian jantung menurun sehingga tekanan darah juga menurun. Selain itu, paru yang sehat juga dapat terkena dampaknya.

ALAUDDIN
MAKASSAR

8. Penyimpangan KDM



Gambar 2.1 (Penyimpangan KDM)

(Utama, 2018)

B. Konsep Dyspnea

1. Definisi

Dyspnea merupakan kondisi yang menggambarkan sensasi sesak napas, ditandai dengan terhambatnya aliran udara atau keadaan sulit bernapas dan sesak di dada yang sering dikaitkan dengan penyakit jantung atau pernafasan. Dyspnea merupakan gejala umum yang sering melemahkan dan mempengaruhi hingga 50% pasien yang dirawat di rumah sakit akut dan tersier, dan seperempat pasien yang mencari perawatan di rangkaian rawat jalan.

Sesak napas sendiri merupakan gejala nyata adanya gangguan trakeobronkial, parenkim paru, dan rongga pleura. Saat terjadi sesak napas, ada peningkatan kerja pernapasan akibat bertambahnya resistensi elastis paru (seperti pada penyakit pneumonia, atelectasis, dan penyakit pleura), dinding dada (obesitas, kifoskoliosis), atau meningkatnya resistensi nonelastisitas (emfisema, asma, dan bronchitis). Selain itu, sesak napas ialah suatu keluhan yang menunjukkan adanya gangguan atau penyakit kardiorespirasi (Muttaqin & Novianty, 2012).

2. Faktor Penyebab Dyspnea

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya keluhan sesak napas, ialah sebagai berikut :

a. Faktor Psikis

Keaadan emosi tertentu seperti menangis terisak-isak, tertawa terbahak-bahak, mengeluh dengan menarik napas panjang, dan merintih atau mengerang karena suatu penyakit dapat mempengaruhi irama pernapasan. Sesak napas yang

berhubungan dengan adanya periode emosi, terjadi melalui mekanisme ventilasi. Klien yang berada dibawah pengaruh emosi, depresi, dan kecemasan dapat mengalami sensasi sesak napas melalui mekanisme hipoventilasi.

b. Faktor peningkatan kerja pernapasan

Jika kemampuan dinding thoraks atau paru untuk mengembang mengalami penurunan sedangkan tahanan saluran pernapasan meningkat, maka otot pernapasan akan membutuhkan tenaga guna memberikan perubahan volume serta tambahan tenaga yang diperlukan untuk kerja pernapasan. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan oksigen, jika paru tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen maka keluhan sesak napas akan muncul (Muttaqin & Novianty, 2012).

3. Penilaian Fungsi Dyspnea

Cara yang paling mudah untuk menentukan pasien dyspnea atau tidak ialah dengan langsung melakukan wawancara kepada pasien untuk menilai perasaan dan persepsi mereka tentang dispnea, sebab faktor penentu fungsional dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti nyeri sendi atau kelelahan kaki. mMRC merupakan pengukuran skala sesak yang biasa digunakan. mMRC adalah skala lima poin (0 : ringan sampai 4 : *Dyspnea* berat) yang mengukur kesulitan bernafas selama aktivitas sehari-hari.

mMRC Dyspnoe scale (modified Medical Research Council)

Skala Dyspnea	Keterangan
Tingkat 0	Tidak terganggu oleh sesak napas kecuali pada keadaan olah-raga yang berat
Tingkat 1	Terganggu dengan sesak napas ketika terburu-buru berjalan di tanah yang datar atau mendaki tanjakan
Tingkat 2	Berjalan lebih lambat pada permukaan yang datar dibandingkan orang lain yang seusia karena sesak napas atau harus berhenti untuk bernapas ketika berjalan pada kecepatan sendiri di permukaan yang datar
Tingkat 3	Berhenti untuk bernapas setelah berjalan 90 meter atau setelah beberapa menit di permukaan yang datar.
Tingkat 4	Terlalu sesak untuk meninggalkan rumah atau sesak saat berpakaian atau berganti pakaian.

Tabel 1.1 mMRC Dyspnoe Scale

4. Pendekatan Non Farmakologis dalam mengatasi dyspnea

Pendekatan nonfarmakologis terbukti dapat digunakan untuk meningkatkan terapi obat, karena pendekatan farmakologis saja mungkin tidak cukup untuk meredakan *Dyspnea* pada beberapa pasien. Yang paling utama di antara pendekatan ini adalah rehabilitasi paru, dimana sudah menunjukkan peran dalam mengurangi *Dyspnea* (termasuk persepsi *Dyspnea*) dengan meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan mengurangi sensitivitas pasien dengan mengurangi rasa takut atau kecemasan. Meningkatkan durasi olah raga juga merupakan bagian dari program rehabilitasi paru yang telah terbukti efektif dalam menurunkan *Dyspnea*. Latihan otot eksposur juga telah terbukti menjadi tambahan yang berguna

untuk seluruh latihan tubuh bagi mereka yang memiliki kelemahan dalam otot inspirasi mereka (GOLD, 2017).

C. Konsep *Breathing Exercise*

1. Definisi

Breathing Exercise (BE) ialah latihan pernapasan dengan teknik bernapas secara perlahan dan rileks, menggunakan otot diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh.

2. Tujuan dan Manfaat *Breathing Exercise*

Tujuan dan manfaat *Breathing Exercise* yaitu :

- a. Untuk mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien serta mengurangi kerja pernapasan
- b. Meningkatkan inflasi alveolar maksimal, relaksasi otot dan menghilangkan ansietas
- c. Mencegah pola aktifitas otot pernapasan yang tidak berguna, melambatkan frekuensi pernapasan, mengurangi udara yang terperangkap serta mengurangi kerja bernafas

Latihan pernapasan dengan teknik *Breathing Exercise* dapat membantu meningkatkan compliance paru untuk melatih kembali otot pernapasan berfungsi dengan baik serta mencegah distress pernapasan. *Breathing Exercise* dapat mencegah atelektasis dan meningkatkan fungsi ventilasi paru pada klien post ekstubasi. Pemulihan kemampuan otot pernapasan akan meningkatkan

pengembangan paru sehingga membantu ventilasi lebih adekuat yang menunjang oksigenasi jaringan.

3. Teknik *Breathing Exercise*

Teknik BE meliputi :

- 1) Mengatur posisi klien dengan semi fowler/fowler di tempat tidur/kursi
- 2) Meletakkan satu tangan klien di atas abdomen (tepat di bawah iga) dan tangan lainnya pada tengah dada untuk merasakan gerakan dada dan abdomen saat bernafas
- 3) Menarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik sampai dada dan abdomen terasa terangkat maksimal, jaga mulut tetap tertutup selama inspirasi.
- 4) Menghembuskan nafas melalui bibir yang dirapatkan dan sedikit terbuka sambil mengencangkan otot-otot abdomen dalam 4 detik
- 5) Melakukan pengulangan selama 1 menit dengan jeda 2 detik setiap pengulangan, mengikuti dengan periode istirahat 2 menit
- 6) Melakukan latihan dalam lima siklus selama 15 menit (Smelter & Bare, 2013).

D. Konsep Respiratory Muscle Stretching (RMS)

1. Definisi

Respiratory Muscle Stretching (RMS) atau peregangan otot pernafasan merupakan suatu latihan yang memiliki tujuan untuk meregangkan otot pernafasan dinding dada ketika inspirasi dan ekspirasi. Latihan ini bertujuan untuk mengurangi kekakuan dinding dada sehingga dapat meningkatkan kemampuan mobilitas

dinding dada. Selain itu, latihan ini juga bertujuan untuk mengurangi sesak napas, menurunkan FRC (*Functional Residual Capacity*), hiperinflasi, dan meningkatkan VC (*Vital Capacity*).

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Respiratory Muscle Stretching* (RMS) merupakan latihan peregangan yang bertujuan untuk mengurangi kekakuan pada dinding dada pasien yang mengalami sesak dimana manfaat dari peregangan ini ialah meningkatkan kapasitas paru sehingga sesak napas dapat berkurang (Fajriah, 2014).

2. Manfaat Latihan *Respiratory Muscle Stretching*

Latihan ini memiliki manfaat berupa memperkuat daya tahan tubuh otot pernapasan yang dapat meningkatkan toleransi aktivitas, mengurangi *dyspnea* dengan meningkatkan pola pernapasan, serta dapat meningkatkan ventilasi dan oksigenasi. Peregangan otot ini dapat memperluas dan mempertahankan fleksibilitas, juga dapat mengurangi stress dan ketegangan otot serta meningkatkan oksigenasi yang akan memberikan stimulus untuk sirkulasi limfatik (Yunani et al., 2018).

3. Pengaruh *Respiratory Muscle Stretching* terhadap sesak pasien pneumothoraks

Stretching atau yang biasa disebut peregangan ialah istilah umum untuk menggambarkan suatu gerakan terapeutik yang bertujuan untuk memanjangkan struktur jaringan lunak yang memendek baik secara patologis maupun nonpatologis sehingga dapat meningkatkan lingkup gerak sendi. Manfaat *stretching* pada

serabut otot ialah mempengaruhi sarcomere yang merupakan unit kontraksi dasar pada serabut otot. Pada saat terjadi suatu penguluran maka serabut otot akan terulur penuh melebihi panjang serabut otot itu pada keadaan normalnya. Ketika penguluran terjadi maka akan menyebabkan serabut yang berada pada posisi tidak teratur akan berubah posisi menjadi lurus sesuai dengan arah ketegangan yang diterima. Terjadinya perubahan dan pelurusan serabut ini maka akan memulihkan jaringan perut sehingga kembali normal. Ketika jaringan perut kembali normal, maka kekakuan yang dialami pasien pada otot-otot pernapasan akan berkurang sehingga sesak menurun (Karim et al., 2020).

E. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Konsep Teori Keperawatan Terkait

Teori keperawatan terkait yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Virginia Henderson, dimana Henderson memandang bahwa tugas unik perawat ialah membantu individu, baik dalam keadaan sakit maupun sehat melalui upayanya melaksanakan berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan dan penyembuhan individu maupun proses meninggal dengan damai. Henderson mengemukakan teori tersebut disebabkan keyakinan dan nilai yang dia percayai yaitu manusia, keperawatan, kesehatan dan juga lingkungan. Selain daripada itu, Henderson juga mengemukakan bahwa dalam mendefinisikan keperawatan haruslah memikirkan keseimbangan fisiologisnya.

Henderson memandang bahwa manusia merupakan individu yang mengalami perkembangan rentang kehidupan yang dimana dalam meraih kesehatan, kebebasan, dan kematian yang damai membutuhkan orang lain. Henderson memandang bahwa pikiran dan tubuh manusia adalah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, Henderson membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 14 komponen penanganan perawatan dimana 14 komponen kebutuhan dasar manusia di klasaifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu :

a. Biologis

- 1) Bernapas secara normal
- 2) Makan dan minum dengan cukup
- 3) Membuang kotoran tubuh
- 4) Bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan
- 5) Tidur dan istirahat
- 6) Memilih pakaian yang sesuai
- 7) Menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal dengan menyesuaikan pakaian dan mengubah lingkungan
- 8) menjaga tubuh tetap bersih dan terawatt serta melindungi integument
- 9) Menghindari bahaya lingkungan yang bisa melukasi

b. Psikologis

- 1) Berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi, kebutuhan, rasa takut, atau pendapat

- 2) belajar mengetahui atau memuaskan rasa penasaran yang menuntun pada perkembangan normal dan kesehatan serta menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia
- c. Sosiologis
- 1) Bekerja dengan tata cara yang mengandung unsur prestasi
 - 2) Bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan rekreasi
- d. Spiritual
- 1) Beribadah sesuai dengan keyakinan (Kusuma, 2014).

2. Pengkajian Keperawatan

a. Identitas pasien

Pada tahap ini perawat perlu mengetahui tentang nama, umur, jenis kelamin, alamat rumah, agama atau kepercayaan, suku bangsa, bahasa yang dipakai, status pendidikan dan pekerjaan pasien.

b. Keluhan utama

Keluhan utama merupakan faktor utama yang mendorong pasien mencari pertolongan atau berobat ke rumah sakit. Biasanya pada pasien dengan pneumothoraks didapatkan keluhan berupa sesak nafas, nyeri dada, Napas pendek dan cepat, Denyut jantung cepat, dan Batuk.

c. Riwayat penyakit sekarang

Pasien dengan pneumothoraks biasanya akan diawali dengan adanya tanda-tanda seperti sesak nafas, nyeri dada, Napas pendek dan cepat, Denyut jantung cepat, Batuk, Kelelahan, dan Sianosis. Perlu juga ditanyakan mulai kapan keluhan

itu muncul. Apa tindakan yang telah dilakukan untuk menurunkan atau menghilangkan keluhan-keluhannya tersebut.

d. Riwayat penyakit dahulu

Tanyakan kepada pasien apakah pasien pernah menderita penyakit seperti TBC paru, pneumoni, gagal jantung, trauma, asites dan sebagainya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya faktor predisposisi.

e. Riwayat penyakit keluarga

Perlu ditanyakan apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit-penyakit yang disinyalir sebagai penyebab pneumothoraks.

f. Pemeriksaan Fisik

1) Breathing (B1)

Pada pemeriksaan ini, hal yang sering ditemukan ialah : Adanya sesak napas, batuk, nyeri dada, terdapat retraksi dada, pengembangan paru yang tidak simetris, fremitus menurun dibandingkan dengan sisi yang lain, pada perkusi ditemukannya suara sonor/hipersonor/timpani, hemathoraks redup. Pemeriksaan auskultasi ditemukan suara napas menurun, bising napas menghilang/berkurang, pekak dengan batas miring/tidak jelas, dyspnea pada saat aktivitas maupun istirahat, gerakan dada pada saat pernapasan tidak sama, takipnea, pergeseran edia sternum ke arah normal, terdapat ronkhi atau rales, suara napas menurun.

2) Blood (B2)

Pada pemeriksaan ini, ditemukan data berupa nyeri dada yang meningkat akibat pernapasan ataupun batuk, takikardi, lemah, pucat, Hb menurun/normal, hipotensi.

3) Brain (B3)

Pada pemeriksaan ini ditemukan, nyeri dada meningkat.

4) Bladder (B4)

Pada pemeriksaan ini, hal yang perlu diperhatikan ialah pengukuran volume output urine yang berhubungan dengan intake cairan, perawat harus memonitor tanda oliguria yang merupakan tanda awal dari syok.

5) Bowel (B5)

Pada pemeriksaan ini ditemukan data, pasien biasanya mengalami mual muntah, nafsu makan menurun, berat badan menurun.

6) Bone (B6)

Pada pemeriksaan ini, ditemuka data berupa terdapat trauma pada rusuk dada, terdapat kerusakan otot dan jaringan lunak pada dada sehingga meningkatkan risiko infeksi, pasien sering mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan sehari-ahri akibat adanya sesak napas, kelemahan, maupun kelelahan fisik secara umum.

g. Pemeriksaan fisik head to toe

- 1) Kulit, perhatikan apakah warna kulit normal, adanya sianosis atau pucat, terdapat lesi, kelembaban dan turgor kulit.
- 2) Kepala, perhatikan apakah terdapat benjolan, luka perdarahan, ataupun nyeri tekan
- 3) Wajah, perhatikan kesimetrisan wajah
- 4) Mata, perhatikan kondidi pupil apakah isokor atau tidak, diameter pupil, reflex cahaya

- 5) Telinga, telinga perhatikan bentuk, ukuran, kesimetrisan, warna, adanya serumen, tanda-tanda infeksi, palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak
- 6) Hidung, perhatikan bentuk, posisi, terdapat lendir, adanya sumbatan, lesi, perdarahan, pernapasan cuping hidung, dan nyeri tekan
- 7) Mulut, perhatikan warna bibir, mukosa, apakah ada stomatitis, kondisi palatum durum, tenggorokan, adanya secret, kesimetrisan bibir, serta tanda-tanda sianosis.
- 8) Dada, perhatikan kesimetrisan dada, apakah ada retraksi dada, bunyi napas tambahan, bunyi jantung tambahan seperti mur-mur, takipnea, dyspnea, peningkatan frekuensi pernapasan, kedalaman pernapasan., pada saat palpasi biasanya ditemukan fremitus menurun disbanding sisi yang lain, pada perkusi ditemukan suara redup atau pekak.
- 9) Abdomen, pada inspeksi ditemukan perut apakah tampak membesar atau tidak, pada palpasi apakah ada nyeri tekan, distensi, massa, auskultasi bising usus, perkusi seluruh kuadran abdomen apakah timpani.
- 10) Genetalia dan rectum, perhatikan apakah lubang anus ada atau tidak. pada laki-laki, inspeksi apakah ada edema skrotum atau hernia, serta perhatikan kebersihan preputium. Pada wanita, inspeksi kondisi labia dan klitoris apakah ada massa atau edema.
- 11) Ekstremitas, perhatikan kekuatan otot dan massa otot (Wilkinson, 2012).

3. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan yang muncul antara lain:

- a. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan deformitas dinding dada, posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru, sindrom hipoventilasi (D.0005).
- b. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik (prosedur operasi, trauma) (D.0077).
- c. Defisit Nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan, mencerna dan mengabsorpsi makanan (D.0019).
- d. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dengan kebutuhan oksigen, tirah baring, kelemahan (D.0056).
- e. Resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur infasif (D.0142) (PPNI, 2016).

4. Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
1.	Pola napas tidak efektif berhubungan dengan deformitas dinding dada, posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru, sindrom hipoventilasi.	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam pasien menunjukkan Pola Nafas Adekuat (L.01004) dibuktikan dengan kriteria hasil : a. Dispnea menurun b. Penggunaan otot bantu napas menurun c. Frekuensi napas membaik	Manajemen jalan nafas (I. 01011) <i>Observasi:</i> a. Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas) b. Monitor bunyi nafas tambahan c. Monitor sputum <i>Terapeutik:</i> d. Pertahankan kepatenan jalan nafas e. Posisikan semi-fowler atau fowler f. Berikan minum hangat g. Lakukan fisioterapi dada jika perlu h. Lakukan penghisapan lendir i. Berikan oksigen <i>Edukasi:</i> j. Ajarkan teknik batuk efektif <i>Kolaborasi:</i> k. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu	<i>Observasi :</i> 1. Mengetahui perubahan pola napas pasien 2. Mengidentifikasi adanya hambatan pada saluran pernapasan 3. Mengetahui adanya produksi sputum <i>Terapeutik :</i> 1. Mempertahankan jalan napas agar tetap paten 2. Memberikan posisi yang nyaman dan agar pemasukan O ₂ lebih baik 3. Mengencerkan dahak 4. Untuk meningkatkan ekspansi dada 5. Untuk membersihkan jalan napas <i>Edukasi :</i> 1. Menjaga agar cairan tetap seimbang 2. Membersihkan jalan napas <i>Kolaborasi :</i> 1. Kolaborasi untuk mengencerkan dahak, <i>jika perlu</i> 2. Memantau perubahan status respirasi
2.	Nyeri akut berhubungan dengan agen injury fisik (prosedur operasi, trauma)	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, tingkat nyeri (L.08066) dengan kriteria hasil: a. Keluhan nyeri menurun	Manajemen nyeri (I.08238) <i>Observasi:</i> a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri.	<i>Observasi :</i> 1. Untuk mengidentifikasi karakteristik nyeri yang dirasakan pasien

		<p>b. Meringis menurun c. Gelisah menurun d. Kesulitan Tidur menurun e. Frekuensi nadi membaik f. Pola nafas membaik</p>	<p>b. Identifikasi skala nyeri c. Identifikasi respon nyeri non-verbal d. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri e. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri f. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan g. Monitor efek samping penggunaan analgesik <i>Terapeutik:</i> h. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain) i. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri j. Fasilitasi istirahat dan tidur k. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri <i>Edukasi:</i> l. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri m. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri <i>Kolaborasi:</i> n. Kolaborasi Pemberian analgetik</p>	<p>2. Untuk mengidentifikasi tingkat keparahan nyeri yang dirasakan pasien 3. Untuk mengetahui apakah ada respons terhadap nyeri atau tidak 4. Untuk mengetahui faktor pencetus nyeri 5. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pasien terkait nyeri 6. Mengetahui keefektifan terapi komplementer yang telah diberikan 7. Mengetahui apakah ada efek samping yang dirasakan pasien dari penggunaan analgetik <i>Terapeutik :</i> 1. Untuk mengurangi penggunaan analgetik dalam penanganan nyeri 2. Memberi rasa nyaman kepada pasien 3. Mengatur pola istirahat pasien 4. Untuk mengetahui kontraindikasi dari strategi menurunkan nyeri yang diberikan <i>Edukasi :</i> 1. Agar pasien mampu mengenali nyeri yang dirasakan 2. Agar pasien mampu mengontrol nyeri secara mandiri 3. Agar pasien mampu mengenali perkembangan nyeri yang dirasakan secara mandiri 4. Mengurangi tingkat ketergantungan analgetik</p>
--	--	--	---	---

				Kolaborasi : 1. Untuk mengurangi nyeri
3.	Defisit Nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan, mencerna dan mengabsorpsi makanan	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan klien dapat terpenuhi Status Nutrisi (L. 03030), dengan kriteria hasil: a. Porsi makanan yang dihabiskan meningkat b. Nafsu makan membaik c. Indeks massa tubuh membaik d. Bising usus menurun	Manajemen Nutrisi (I. 03119) <i>Observasi:</i> a. Identifikasi status nutrisi b. Monitor asupan makanan c. Monitor berat badan d. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium <i>Terapeutik:</i> e. Lakukan oral hygiene sebelum makan <i>Edukasi:</i> f. Ajarkan diet yang diprogramkan <i>Kolaborasi:</i> g. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi jika perlu	Observasi : 1. untuk mengetahui status nutrisi pasien 2. Untuk memantau asupan makanan pasien 3. Untuk mengetahui perubahan berat badan pasien selama sakit 4. Untuk mengetahui status kesehatan pasien <i>Terapeutik :</i> 1. Untuk meningkatkan nafsu makan pasien <i>Edukasi :</i> 1. Untuk mengatur pola makan pasien <i>Kolaborasi :</i> 1. Menjaga asupan nutrisi pasien
4.	Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dengan kebutuhan oksigen, tirah baring, kelemahan.	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, toleransi aktivitas adekuat (L. 05047) dengan kriteria hasil: a. Frekuensi Nadi membaik b. Saturasi oksigen membaik c. Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat d. Keluhan lelah menurun e. Dispnea saat aktivitas menurun	Manajemen energi (I. 05178) <i>Observasi :</i> a. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan b. Monitor kelelahan fisik dan emosional c. Monitor pola dan jam tidur d. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas <i>Terapeutik :</i> a. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus b. Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif c. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan	<i>Kolaborasi :</i> 1. Untuk mengetahui faktor penyebab kelelahan 2. Untuk tingkat kelelahan yang dirasakan pasien 3. Mengatur waktu istirahat pasien 4. Mengetahui lokasi ketidaknyamanan selama beraktivitas terjadi <i>Terapeutik :</i> 1. Meningkatkan kenyamanan pasien 2. Melatih otot-otot pasien agar tidak kaku 3. Meningkatkan kenyamanan pasien

		f. Dispnea setelah aktivitas menurun	d. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak adapt berpindah atau berjalan Edukasi : a. Anjurkan tirah baring b. Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap c. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang d. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan Kolaborasi : a. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan	4. Mengajarkan mobilisasi sederhana Edukasi : 1. Untuk mengurangi kelelahan pasien saat beraktivitas 2. Untuk melatih kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas 3. Agar kelelahan segera ditangani 4. Untuk mengurangi kelelahan yang dirasakan pasien Kolaborasi : 1. Untuk memenuhi kebutuhan energi pasien
5.	Resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif.	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, tingkat infeksi adekuat (L. 14137) dengan kriteria hasil: a. Kebersihan tangan b. Kebersihan badan c. Nafsu makan membaik d. Suhu tubuh menurun e. Nyeri menurun	Pencegahan Infeksi (I. 14539) <i>Observasi:</i> a. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <i>Terapeutik:</i> b. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien c. Pertahankan teknik aseptik <i>Edukasi:</i> d. Jelaskan tanda dan gejala infeksi e. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar	Observasi 1. Untuk melihat dan membantu menurunkan risiko terserang organisme patogenik 2. Untuk mengetahui jika terjadi tanda dan gejala infeksi Terapeutik 1. Memberikan ketenangan agar pasien beristirahat dan mengurangi kebisingan Edukasi 1. Memberikan informasi kepada pasien dan terhadap tanda dan gejala infeksi 2. Untuk mengurangi terjadinya infeksi silang atau penyebaran mikroorganisme

(Tim Pokja SLKI & SIKI DPP PPNI, 2018).

5. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan ialah proses pelaksanaan dari rencana atau intervensi keperawatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan ini dimulai setelah rencana intervensi disusun dan menjadi tujuan pada *nursing order* untuk membantu pasien dalam mencapai tujuan proses keperawatan yang diharapkan. Oleh sebab itu, implementasi sebagai manifestasi pelaksanaan intervensi yang spesifik, dilakukan untuk memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan (Nursalam, 2017).

6. Evaluasi keperawatan

Evaluasi adalah fase kelima dan fase terakhir proses keperawatan. Dalam konteks ini, evaluasi adalah aktivitas yang direncanakan, berkelanjutan, dan terarah ketika pasien dan profesional kesehatan menentukan kemajuan pasien menuju pencapaian tujuan/hasil, dan keefektifan rencana asuhan keperawatan. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pencapaian tujuan pada rencana keperawatan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi variabel-variabel yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan, dan mengambil keputusan apakah rencana keperawatan diteruskan, modifikasi atau dihentikan.

Dokumentasi pada tahap evaluasi adalah membandingkan secara sistematis dan terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada pada pasien, dilakukan dengan cara bersinambungan dengan melibatkan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan merupakan

tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan yang berguna apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain (Nursalam, 2017).

Dalam mengevaluasi, perawat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami respon terhadap intervensi keperawatan, kemampuan menggambarkan kesimpulan tentang tujuan yang dicapai, serta kemampuan dalam menghubungkan tindakan keperawatan pada kriteria hasil. Evaluasi keperawatan pada asuhan keperawatan pneumothoraks yaitu :

- a. Pola nafas kembali efektif
- b. Kebutuhan nutrisi klien terpenuhi
- c. Nyeri akut teratasi
- d. Tidak terjadi resiko tinggi infeksi
- e. Aktivitas sehari-hari kembali baik

F. Evidence Based Practice in Nursing (EBPN)

1. Definisi

Respiratory Muscle Stretching (RMS) atau biasa disebut latihan otot pernapasan merupakan suatu latihan yang memang dirancang khusus untuk mengurangi kekakuan yang terjadi pada dinding dada, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi derajat sesak serta meningkatkan kualitas hidup seseorang. RMS dipergunakan untuk meregangkan otot-otot intercostal pada bagian atas dinding dada serta otot-otot punggung selama fase inspirasi atau inhale dan

meregangkan otot-otot bagian bawah pada dinding dada selama fase ekspirasi atau exhale (Multazam et al., 2021). Sedangkan, Breathing Exercise merupakan latihan pernapasan dengan teknik bernapas secara perlahan dan dalam, menggunakan otot diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan toleransi aktivitas
- a. Mengurangi *dyspnea* dengan meningkatkan pola pernapasan
- b. Meningkatkan ventilasi dan oksigenasi (Graselia, 2019).

3. Indikasi

- a. Pasien dengan diagnosa asma bronkial, pasien yang mengalami sesak
- b. Usia 20-60 tahun
- c. Hemodinamik stabil (tekanan sistolik 90-130 MmHg)
- d. Denyut nadi 60-100x/menit, RR >24x/menit.

4. Kontra Indikasi

Dalam pemberian latihan RMS ialah pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung (Yunani et al., 2018).

5. Prosedur Penatalaksanaan dan Rasional

- a. Pre interaksi :
 - 1) Siapkan alat-alat
 - 2) Identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi

3) Cuci tangan

b. Tahap Orientasi :

- 1) Beri salam dan panggil pasien dengan namanya (validasi pasien)
- 2) Jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada pasien/keluarga

c. Tahap Kerja :


- 1) Pasien dalam keadaan duduk 90° dengan keadaan rileks
- 2) Gerakan dibarengi dengan menarik nafas melalui hidung kemudian dihembuskan melalui mulut
- 3) Mengangkat kedua tangan dari samping ke atas sambil menarik nafas melalui hidung, kemudian menurunkan kedua tangan sambil membuang udara melalui mulut. gerakan ini dilakukan sebanyak 2-10 kali
- 4) Posisi kedua tangan diregangkan ke belakang sambil menarik nafas melalui hidung kemudian menggerakkan kedua tangan ke depan sambil membuang udara melalui mulut. Gerakan ini dilakukan 2-10 kali
- 5) Pasien diminta menghirup udara melalui hidung dengan gerakan agak cepat (seperti saat sesak nafas). Gerakan ini dilakukan 2-10 kali
- 6) Pasien membuat kedua tangan diletakkan di pundak kemudian menggerakkan tangan kedepan membuat lingkaran siku sambil menarik nafas melalui hidung dan membuang udara melalui mulut
- 7) Pasien mengangkat bahu sambil menarik nafas melalui hidung kemudian menurunkan bahu sambil membuang udara melalui mulut

- 8) Kedua tangan diangkat ke belakang kepala seperti membentuk sayap ayam kemudian menggerakkan tangan tersebut ke depan sambil menarik nafas melalui hidung dan menggerakkan tangan tersebut ke belakang sambil membuang udara melalui mulut
 - 9) Kedua tangan disatukan seperti melakukan gerakan seperti sedang mengaduk panci sambil menarik nafas melalui hidung dan membuang udara melalui mulut.
- d. Terminasi :
- 1) Evaluasi hasil kegiatan (kenyamanan pasien)
 - 2) Simpulkan hasil kegiatan
 - 3) Berikan umpan balik positif
 - 4) Kontrak pertemuan selanjutnya
 - 5) Akhiri kegiatan dengan cara yang baik
 - 6) Bereskan alat-alat
 - 7) Cuci tangan
- e. Evaluasi :
- 1) Nama Px, Umur, Jenis Kelamin, dll
 - 2) Keluhan Utama
 - 3) Tindakan yang dilakukan (Breathing exercise dan Respiratory Muscle Stretching)
 - 4) Lama tindakan

- 5) Jenis terapi murottal yang diberikan
- 6) Reaksi selama, setelah terapi pemberian terapi murottal
- 7) Respon pasien
- 8) Nama perawat
- 9) Tanggal pemeriksaan (Ismoyowati, 2021).

6. Kriteria Evaluasi

- a. Respirasi dalam batas normal 16-24 x/menit
- b. Nadi dalam batas normal 60-100 x.menit
- c. Penggunaan O2 berkurang
- d. Mengeluh sesak berkurang.



No.	Author	Negara	Judul Penelitian	Metode (Desain, Instrumen, Responden)	Hasil Penelitian	Database
1	(Pahlawi & Farhani, 2021)	Indonesia	Pengaruh Breathing Exercise dan Stretching Terhadap Penurunan Sesak Pada Kasus Pneumothorax Bilateral	D : <i>Case Report Study</i> I : <i>Dyspnea Severity Scale</i> R : 1 Responden	Pemberian intervensi fisioterapi berupa deep breathing exercise dan <i>Respiratory stretching</i> terbukti dapat memperbaiki pola napas yang ditunjukkan dengan penurunan nilai respiration rate dan heart rate namu Latihan ini masih belum berdampak pada nilai SpO2 karena pasien masih menggunakan terapi oksigen berupa nasal cannula.	<i>Google Scholar</i>
2	(Yokogawa et al., 2018)	Japan	Comparison of two instructions for deep breathing exercise : non-specific and diaphragmatic breathing	D : <i>Study compared</i> I : <i>Ventilatory parameters, heart rate, and autonomic nervous system activity</i> R : 30 responden	Terdapat peningkatan yang signifikan sesudah diberikan intervensi <i>deep breathing exercise</i> dimana terjadi peningkatan ventilasi paru secara keseluruhan, peningkatan volume tidal, dan terjadi penurunan RR baik pada laki-laki maupun perempuan.	
3	(Rattes et al., 2018)	Brazil	Respiratory Muscle Stretching Acutely Increases Expansion in Hemiparetic Chest Wall	D : <i>A randomized crossover clinical trial</i> I : Instrumen berisi skalas dyspnea, perubahan ventilasi, dll. R : 11 Responden	Pemberian intervensi <i>respiratory muscle stretching</i> mampu mendorong terjadinya perubahan ventilasi, mobilitas dinding dada meningkat, hiperflasi paru berkurang, spasme otot berkurang, penurunan sensasi dyspnea dan juga peningkatan fungsi paru secara keseluruhan.	<i>Science Direct</i>
4	(Rohmah et al., 2020)	Indonesia	The Combination Of Upper Limb Exercise And Respiratory Muscle Stretch Gymnastics On	D : <i>a quantitative research design with a quasi-experimental design (pre-post test with control group design)</i>	Terdapat perbedaan yang signifikan untuk tingkat dyspnea pada kelompok intervensi sebelum dan setelah diberikan latihan.	<i>Google Scholar</i>

			Dyspnea Among COPD Patients	I : <i>Dyspnea Severity Scale</i> R : 56 responden		
5	(Sodikin et al., 2022)	Indonesia	Penerapan Teknik Deep Breathing Untuk Mengatasi Sesak Nafas Pada Pasien PPOK	D : <i>Case Study</i> I : Instrumen yang berisi karakteristik skala frekuensi sesak napas R : 2 orang	Hasil pengkajian frekuensi nafas dan saturasi oksigen setelah dilakukan teknik Deep Breathing Exercise di hari ketiga pada kedua subjek yaitu pada Tn. K RR : 23 x/menit dengan SPO2 91 %, sedangkan pada Tn. J RR : 24 x/menit dengan saturasi oksigen 98 %. Ada perbedaan hasil di hari terakhir penerapan yaitu dimana frekuensi nafas kedua subjek mengalami penurunan sesak nafas serta peningkatan saturasi oksigen.	<i>Researchgate</i>

Tabel 2.3 EBPB yang digunakan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang mencakup pengkajian yang bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dalam suatu kasus, atau dengan kata lain, studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci. Penelitian pada metode ini, dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara sistematis (Nursalam, 2016).

B. Subyek Studi Kasus

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini ialah individu atau klien yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah pasien dengan diagnose medis pneumothoraks; usia 20-60 tahun, hemodinamik stabil (sistolik 90-130 MmHg), pasien mengeluh sesak, RR>24x/menit, kesadaran komposmentis, bersedia menjadi responden. Adapun kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung, pasien yang mengalami kondisi penurunan kesadaran.

C. Fokus Studi kasus

Fokus studi kasus ini ialah melakukan proses asuhan keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif menggunakan intervensi kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching*.

D. Instrumen studi kasus

Instrumen yang digunakan pada studi kasus ini ialah format proses asuhan keperawatan, SOP intervensi.

E. Prosedur Pengambilan Data

Prosedur pengambilan data pada penelitian ini meliputi :

1. Persiapan

Persiapan yang dilakukan meliputi pengajuan judul studi kasus.

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui metode observasi dan wawancara langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana, data primer meliputi data yang diperoleh sendiri oleh peneliti melalui hasil pengukuran, pengamatan, survey dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini ialah data yang diperoleh melalui pihak lain yang secara rutin mengumpulkan data, seperti hasil lab, dan lain-lain.

3. Penyusunan laporan

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tuls ilmiah sesuai dengan buku panduan tugas akhir ners UIN Alauddin Makassar 2022.

F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Tempat dilakukannya penelitian ini ialah ruang perawatan dewasa Mamminasa Baji RSUD Labung Baji Makassar pada tanggal 17 September 2021 pukul 10.00 hingga 21 September 2021. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 hari.

G. Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dan penyajian data pada studi kasus ini disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta yang dituangkan dalam teks dan bersifat naratif.

H. Etika Studi Kasus

Prinsip umum etika yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah :

1. Informed Conccent

Informed conccent ialah suatu bentuk persetujuan antara peneliti dengan pasien. Informed conccent yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan pemberian tindakan, menjelaskan standar prosedur pelaksanaan tindakan, serta meminta persetujuan pasien untuk dijadikan responden pada penelitian.

2. Kerahasiaan (*confidentiality*)


Pada penelitian ini, peneliti memberikan jaminan kepada pasien untuk tetap menjaga privasi pasien dengan tidak mencantumkan nama melainkan hanya mencantumkan inisial dan rekam medik pasien.

3. Keadilan (*Justice*)

Pada penelitian ini, peneliti bersikap adil dalam memperlakukan pasien dan menjamin bahwa subjek yang dilakukan oleh peneliti juga memberikan keuntungan yang sama terhadap pasien.

4. Tidak merugikan (*Non malaficiencia*)

Pada penelitian ini, peneliti menjamin tidak melakukan intervensi yang justru akan memperburuk kondisi pasien.



BAB IV
LAPORAN KASUS

A. Pengkajian Keperawatan

HARI/TANGGAL : 17 September 2021
JAM PENGKAJIAN : 10.00
PENGKAJI : Risdawati, S.Kep
RUANG : Mamminasa Baji

A. IDENTITAS

A. PASIEN

Nama : Tn. T
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 39 Tahun
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum menikah
Pekerjaan : Tidak bekerja (IOM)
Pendidikan terakhir : Pendidikan Dasar
Alamat : Jl. Mappaoddang wisma baji rupa

No. CM : 389928
Diagnostik Medis : Pneumothorax dextra
Tgl masuk RS : 13 September 2021

B. PENANGGUNG JAWAB

Nama : Tn. T
Umur : 39 Tahun
Pendidikan : Pendidikan Dasar
Pekerjaan : Tidak bekerja (IOM)
Alamat : Jl. Mappaoddang wisma baji rupa

II. RIWAYAT KEPERAWATAN

A. RIWAYAT KESEHATAN PASIEN

1. Riwayat Penyakit Sekarang

- a. Keluhan Utama : Sesak
- b. Kronologi penyakit saat ini :

Tn. T mengatakan masuk IGD dengan keluhan sesak akibat trauma dada karena kecelakaan lalu lintas yang dialaminya. Tindakan yang telah dilakukan kepada Tn.

T adalah pemasangan *Chest Tube* akibat pneumothorax yang dialaminya. Keluhan yang dialami saat ini adalah nyeri dada yang disertai dengan sesak.

- c. Pengaruh penyakit terhadap pasien :

Tn. T mengatakan akibat penyakit yang dialaminya, pasien tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya.

- d. Harapan pasien terhadap pelayanan kesehatan :

Tn. T mengatakan banyak berharap dari pelayanan yang diberikan, pasien berharap bisa segera sembuh dan beraktivitas seperti biasanya.

2. Riwayat Penyakit Masa Lalu

- a. Penyakit masa anak-anak :

Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit masa anak-anak selain demam dan flu biasa

- b. Imunisasi :

Pasien mengatakan imunisasinya lengkap

- c. Alergi :

Pasien mengatakan tidak memiliki alergi apapun baik itu makanan, obat-obatan maupun alergi akibat lingkungan seperti debu, dan lain-lain.

- d. Pengalaman saki/dirawat sebelumnya :


Pasien mengatakan pernah dirawat di Rumah Sakit yang sama pada tahun 2020 akibat Covid-19.

- e. Pengobatan terakhir :

- f. Pasien mengatakan pengobatan terakhir yang pernah dijalaniya adalah perawatan akibat Covid-19.

B. RIWAYAT KESEHATAN KELUARGA

1. Genogram



Keterangan :

□ : Laki-Laki

○ : Perempuan

— : Garis perkawinan

| : Garis keturunan



→ : Pasien



✕ : Meninggal

?

: Tidak diketahui



- - - : Garis serumah

G1 : Kakek dan Nenek pasien telah meninggal dunia akibat peperangan. Kakek dan nenek pasien tidak memiliki riwayat penyakit yang sama dengan yang dialami pasien.

GII : Ayah pasien merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara dan telah meninggal dunia. Ayah pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi. Ibu pasien merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara dan telah meninggal dunia. Ibu pasien tidak memiliki riwayat penyakit apapun.

GIII : Pasien merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Labuang Baji akibat pneumothorax yang dialami. Pasien memiliki riwayat penyakit Covid-19. Pasien saat ini tinggal bersama kedua temannya.

C. PENGKAJIAN BIOLOGIS

1. Rasa Aman dan Nyaman

a. Pasien mengatakan nyeri dengan PQRST:

P : Nyeri yang dirasakan pada bagian dada sebelah kanan

Q : Nyeri yang dirasakan seperti tertusuk-tusuk

R : Nyeri yang dirasakan tidak menjalar, hanya di bagian dada sebelah kanan saja atau area sekitar WSD

S : Skala nyeri 7 (Sedang), pasien tampak meringis apabila nyeri timbul diukur dengan *Numeric Rating Scale* (NRS).

T : Nyeri yang dirasakan hilang timbul terutama pada saat banyak bergerak dengan durasi ± 30 menit, nyeri hilang apabila diberi obat

b. Apakah mengganggu aktifitas :

Pasien mengatakan nyeri yang dialaminya sangat mengganggu aktifitasnya terutama waktu istirahatnya.

- c. Apakah yang dilakukan untuk mengurangi/menghilangkan nyeri :

Pasien mengatakan apabila nyeri timbul pasien hanya bisa menahan dan menunggu obat pereda nyeri diberikan.

- d. Apakah cara yang digunakan efektif : Tidak

- e. Apakah ada riwayat pembedahan : Pasien terpasang WSD sudah 3 hari

2. Aktifitas Istirahat dan Tidur

a. Aktifitas

1. Apakah klien selalu berolahraga :

Pasien mengatakan jarang berolahraga disaat sehat apalagi saat sakit.

2. Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktifitas :

Pasien tidak menggunakan alat bantu pada saat beraktifitas, hanya dibantu oleh keluarga

3. Apakah ada gangguan aktifitas:

Pasien mengatakan penyakitnya mengakibatkan pasien tidak bisa melakukan aktifitasnya secara mandiri dan harus dibantu oleh keluarga atau perawat seperti *personal hygiene*, berpakaian, mobilisasi, makan/minum. Pasien mengatakan akan merasa sesak apabila melakukan aktifitas-aktifitas tertentu misalnya saat berganti pakaian.

4. Berapa lama melakukan kegiatan sehari :

Pasien mengatakan sebelum sakit jarang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu kebanyakan hanya berdiam diri di rumah atau berkumpul dengan teman-

temannya. Saat sakit, pasien mengatakan tidak banyak melakukan kegiatan dan hanya berbaring di tempat tidur saja.

5. Apakah klien memiliki keterampilan khusus : Tidak ada

b. Istirahat

1. Kapan dan berapa lama klien beristirahat :

Pasien mengatakan selama sakit pasien hanya berbaring dan sesekali duduk.

2. Apakah kegiatan untuk mengisi waktu luang :

Pasien mengatakan sebelum sakit untuk mengisi waktu luangnya, pasien hanya berkumpul dengan teman-temannya. Semenjak sakit, kegiatan untuk mengisi waktu luang yang biasa dilakukan pasien adalah berbincang dengan keluarganya dan kebanyakan hanya berbaring tanpa melakukan apa-apa.

c. Tidur

1. Bagaimana pola tidur klien :

Pasien mengatakan sulit tidur disiang hari maupun dimalam hari akibat nyeri dada dan sesak yang dialaminya. Pada malam hari, pasien mengatakan biasanya tidur dipukul 21.00 namun sering terjaga dimalam hari akibat nyeri dan sesak yang dialaminya.

2. Apakah kondisi saat ini mengganggu klien :

Pasien mengatakan kondisinya saat ini sangatlah mengganggu tidur pasien.

3. Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur :

Pasien mengatakan tidak pernah mengkonsumsi obat tidur jenis apapun apabila ingin tidur.

4. Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur :

Pasien mengatakan tidak melakukan kegiatan apapun menjelang tidur.

3. Cairan

a. Berapa banyak klien minum perhari :

Pasien mengatakan semenjak dirawat pasien tidak begitu banyak minum hanya sekitar 1 botol ukuran 650 ml/hari.

b. Minuman apa yang disukai klien dan yang biasa diminum klien :

c. Pasien mengatakan sebelum sakit sangat suka minum kopi dan sudah dijadikan kebiasaan untuk minum kopi tiap hari namun sejak sakit, pasien tidak pernah mengkonsumsi kopi lagi.

d. Apakah ada minuman yang disukai/dipantang :

Pasien mengatakan suka minum kopi dan tidak memiliki pantangan minuman apapun.

e. Apakah klien terbiasa minum alkohol :

Pasien mengatakan apabila berkumpul dengan teman-temannya sering mengkonsumsi alkohol.

f. Bagaimana pola pemenuhan cairan perhari :

Pasien mengatakan semenjak sakit tiap hari minum air mineral 650 ml, saat ini pemenuhan cairan pasien juga dibantu dengan cairan infus KN3B 1500ml/24jam dan infus RL 500ml.

g. Ada program pembatasan cairan :

Pasien mengatakan tidak ada instruksi sama sekali baik dari dokter maupun perawat mengenai pembatasan cairan.

h. Bagaimana balance cairan klien :

Intake :

- 1) Minum&makan : 800ml
- 2) Infus : 1500 ml (KN3B), 500 ml(RL)
- 3) Dextopen : $100 \text{ mg}/8 \text{ jam} = 20 \times 3 = 60 \text{ cc}$
- 4) As traneksamat : $500 \text{ mg}/8 \text{ jam} = 100 \times 3 = 300 \text{ cc}$
- 5) Omeprazole : $40 \text{ mg}/12 \text{ jam} = 8 \times 2 = 16 \text{ cc}$
- 6) Ceftriaxone : $1 \text{ g}/12 \text{ jam} = 2 \text{ cc}$
- 7) AM : $5 \text{ cc} \times \text{BB} = 5 \times 65 = 325 \text{ cc}$
- 8) Total : 3.503 cc

Output :

- 1) Urine : 1500 cc
- 2) Feses : 1 x BAB = 100 cc
- 3) Drain : 300 cc
- 4) Total : 1900 cc

IWL : $(15 \times \text{BB})/24 \text{ jam} : 15 \times 65 = 975 \text{ cc}$

Balance cairan : Intake - (output + IWL)

: $3.503 - (1900 + 975)$

: $3.503 - 2.875$

: 628 cc

(Jumlah cairan yang masuk lebih banyak dibanding cairan yang keluar menunjukkan bahwa balance cairan seimbang).

4. Nutrisi

- a. Apa yang biasa dimakan klien tiap hari :

Keluarga pasien mengatakan sebelum sakit, pasien makan nasi, lauk, dan sayur namun sejak sakit pasien dianjurkan untuk makan bubur. Pasien mengatakan sejak sakit, pasien juga rutin mengkonsumsi buah-buahan.

- b. Bagaimana pola pemenuhan nutrisi klien :

Pasien mengatakan sebelum sakit, pasien makan 3 kali sehari. Sejak sakit, pasien makan 2 kali sehari dengan porsi yang tidak dihabiskan (setengah dari porsi makan yang diberikan).

- c. Apakah ada makanan kesukaan, makanan yang dipantang :

Pasien mengatakan sangat menyukai daging, buah dan tidak memiliki makanan pantangan apapun

- d. Apakah ada riwayat alergi terhadap makanan :

Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat alergi makanan jenis apapun.

e. Apakah ada kesulitan menelan atau mengunyah :

Pasien mengatakan saat ini nafsu makannya tidak begitu baik, pasien juga mengatakan enggan untuk makan banyak karena takut jika BAB dan harus ke toilet sedangkan WSD masih terpasang.

f. Apakah ada alat bantu dalam makan :

Pasien tidak menggunakan alat bantu dalam makan jenis apapun.

g. Apakah ada yang menyebabkan gangguan pencernaan :

Pasien mengatakan saat ini tidak mengalami gangguan pencernaan.

h. Bagaimana kondisi gigi geligi klien :

Pasien mengatakan giginya masih lengkap dan tidak pernah mengalami sakit gigi.

i. Adakah riwayat pengobatan atau pembedahan yang berkaitan dengan sistem pencernaan :

Pasien mengatakan tidak pernah menjalani pembedahan ataupun riwayat pengobatan terkait sistem pencernaan.

j. Adakah program diet klien :

Pasien mengatakan saat ini sedang dianjurkan untuk diet makanan lunak.

5. Eliminasi Urine dan Feses

a. Eliminasi feses :

1. Bagaimana pola pasien dalam defekasi :

Pasien mengatakan semenjak dirawat di rumah sakit baru 1 kali BAB dengan karakteristik lunak.

2. Apakah terbiasa menggunakan obat pencahar :

Pasien mengatakan tidak pernah menggunakan obat pencahar jenis apapun.

3. Apakah ada kesulitan :

Pasien mengatakan tidak mengalami kesulitan dalam BAB.

4. Apakah klien menggunakan alat bantu untuk defekasi :

Pada saat BAB pasien harus dibantu oleh keluarga dan melalui pisfot.

b. Eliminasi urine :

1. Apakah BAK klien teratur :

Pasien mengatakan semenjak sakit tidak pernah merasakan sudah berapa kali BAK sebab terpasang kateter urine.

2. Bagaimana pola, frekuensi, waktu, karakteristik serta perubahan yang terjadi dalam miksi :

Urine bag dikosongkan tiap dua kali sehari (per 12 jam) dengan volume 1500 ml dengan karakteristik berwarna kuning dan berbau khas urine.

3. Apakah ada riwayat pembedahan, apakah menggunakan alat bantu dalam miksi:

Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat pembedahan terkait sistem perkemihan. Saat ini pasien terpasang alat bantu berkemih yaitu kateter urine.

4. Bila menggunakan alat bantu sudah berapa lama :

Kateter urine terpasang sudah sejak 4 hari yang lalu dari hari pengkajian dilakukan.

6. Kebutuhan Oksigenasi dan Karbondioksida

a. Pernafasan

1. Apakah ada kesulitan dalam bernafas, bunyi nafas, dyspnea :

Pasien mengatakan sulit untuk bernafas, dada terasa berat, pasien tampak mengalami dyspnea, pasien mengatakan ingin batuk tapi tidak bisa.

2. Apakah yang dilakukan klien untuk mengatasi masalah :

Pasien mengatakan apabila sesak dada terasa berat maka pasien akan panik dan segera memanggil perawat.

3. Apakah klien menggunakan alat bantu pernafasan :

Saat ini pasien tampak menggunakan alat bantu pernafasan jenis nasal kanul dengan volume O₂ 6 ltr/menit.

4. Posisi yang nyaman bagi pasien :

Pasien mengatakan posisi yang dirasa nyaman adalah posisi kepala lebih tinggi dibanding kaki (semi fowler).

5. Apakah klien terbiasa merokok, obat-obatan untuk melancarkan pernafasan :

Pasien mengatakan dirinya adalah perokok aktif, pasien mengatakan tidak pernah menggunakan obat-obatan untuk melancarkan pernafasan.

6. Apakah ada alergi terhadap debu, obat-obatan, dll :

Pasien mengatakan tidak memiliki alergi terhadap debu maupun obat-obatan.

7. Apakah klien pernah dirawat dengan gangguan pernafasan :

Pasien mengatakan pernah dirawat dengan gangguan pernafasan yaitu akibat Covid-19 dan dirawat di rumah sakit yang sama.

b. Kardiovaskuler

1. Apakah klien cepat lelah :

Pasien mengatakan sebelum sakit tidak pernah mengalami keluhan cepat lelah setelah beraktifitas, namun sejak dirawat di rumah sakit pasien sering mengeluh lemas.

2. Apakah ada keluhan berdebar-debar, nyeri dada yang menyebar, pusing, rasa berat di dada :

Pasien mengatakan nyeri di area dada tempat terjadinya trauma dan tempat terpasangnya WSD, pasien mengeluh pusing dan rasa berat di dada terutama pada saat sesak.

3. Apakah klien menggunakan alat pacu jantung :

Pasien tidak menggunakan alat pacu jantung.

4. Apakah klien mendapat obat untuk mengatasi gangguan kardiovaskuler :

Pasien tidak mendapatkan obat apapun untuk mengatasi gangguan kardiovaskuler.

7. Personal Hygiene :

1. Bagaimana pola personal hygiene, berapa kali mandi, gosok gigi, dll :

Pasien mengatakan sebelum sakit, pasien biasanya mandi 2 kali sehari, dan gosok gigi 2 kali sehari dan dilakukan secara mandiri. Namun, sejak sakit pasien

belum pernah mandi hanya diwashlap saja dengan menggunakan handuk kecil atau tissue basah, sejak sakit pasien rutin gosok gigi 1 kali sehari.

2. Berapa hari klien terbiasa cuci rambut :

Pasien mengatakan sebelum dirawat pasien terbiasa cuci rambut setiap hari.

Namun, sejak sakit pasien tidak pernah cuci rambut.

3. Apakah klien memerlukan bantuan dalam melakukan personal hygiene :

Pasien mengatakan untuk personal hygiene harus dibantu oleh keluarga.

8. Sex

1. Pasien mengatakan belum pernah menikah.

D. Pengkajian Psikososial dan Spiritual

1. Psikologi

a. Status emosi :

1. Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya :

Pasien tampak mampu mengekspresikan apa yang dirasakan saat ini.

2. Bagaimana suasana hati klien :

Pasien mengatakan saat pasien merasa sedikit stress dengan kondisi yang dialaminya.

3. Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, gembira :

Pasien mengatakan apabila pasien merasa stress dengan kondisinya pasien akan mengajak keluarganya bercerita terkait kondisinya.

b. Konsep diri :

1. Bagaimana klien memandang dirinya :

Pasien mengatakan dirinya berharga dan masih dibutuhkan didalam keluarganya.

2. Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya :

Pasien percaya bahwa segala penyakit dapat disembuhkan termasuk penyakitnya.

2. Hubungan Sosial

a. Apakah klien mempunyai teman dekat :

Pasien mengatakan sangat dekat dengan teman-temannya yang berasal dari Afganistan dan menganggap mereka seperti keluarga sendiri.

b. Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat :

Pasien mengatakan tidak pernah mengikuti kegiatan masyarakat sekitar rumahnya sebab terkendala di bahasa.

c. Apakah pekerjaan klien sekarang sesuai dengan kemampuan :

Pasien mengatakan saat ini pasien tidak bekerja.

3. Spiritual

a. Apakah klien menganut satu agama :

Pasien mengatakan menganut agama islam.

b. Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah :

Pasien mengatakan saat ini tidak melaksanakan shalat sebab kondisi yang dialaminya.

III. PEMERIKSAAN FISIK

A. Keadaan Umum

1. Kesadaran : Composmentis GCS : E₄V₅M₆
2. Kondisi klien secara umum : Keadaan umum pasien tampak lemah
3. Tanda-tanda vital : TD : 100/60 MmHg
N : 76 x/ menit, P : 30x/menit, S : 36,8°C
4. Pertumbuhan fisik : TB : 178 cm, BB : 65 Kg, IMT : 20,56 (Normal)
5. Keadaan kulit :

Tampak luka lecet di bagian lutut kanan dan betis, tampak luka lecet di bagian siku dan punggung, dada sebelah kanan tampak memar dan terdapat luka lecet.

Warna kulit putih dan bersih.

B. Pemeriksaan Cepalo Kaudal

1. Kepala

- a. Kepala tampak simetris, kulit kepala tampak sedikit kotor, rambut pendek dan berwarna hitam, tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan, tidak ada luka di sekitar kepala, pertumbuhan rambut baik.
- b. Mata tampak bersih, pupil isokor, refleksi cahaya positif, sclera berwarna putih, konjungtiva anemis, tidak ada gangguan fungsi penglihatan.

- c. Telinga tampak simetris, tidak ada kelainan bentuk telinga, tidak ada secret, tidak ada nyeri telinga, tidak ada luka, fungsi pendengaran baik.
- d. Hidung tampak simetris, tidak ada polip, tidak ada secret, tidak ada nyeri, fungsi penciuman baik.
- e. Mukosa bibir sedikit kering, warna lidah pucat, lidah tampak sedikit kotor, tampak dahak pada saat batuk, fungsi pengecapan kurang.

2. Leher

Tidak ada pembesaran thyroïd, tidak ada distensi vena jugularis, tidak ada nyeri menelan, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, tidak ada luka.

3. Dada

a. Inspeksi:

Pengembangan dada tampak tidak simetris, terdapat retraksi otot dada, terpasang WSD pada dada sebelah kanan, tampak memar pada bagian dada sebelah kanan, terdapat luka lecet di bagian dada sebelah kanan.

b. Auskultasi :

Terdapat bunyi napas tambahan (ronchi), bunyi jantung dalam batas normal (lup-dup), vesikuler melemah pada dada sebelah kanan.

c. Perkusi :

Suara perkusi pada dada sebelah kanan hipersonor.

d. Palpasi:

Dada tidak simetris dimana dada kanan tertinggal dari dada kiri, terdapat nyeri tekan pada dada sebelah kanan, fremitus berkurang terutama pada dada sebelah kanan.

4. Abdomen

a. Inspeksi :

Perut tampak datar, tidak ada striae, terdapat luka lecet pada bagian perut sebelah kanan, dinding abdomen tampak simetris, warna kulit abdomen sama dengan warna kulit sekitar.

b. Auskultasi :

Peristaltik usus terdengar sebanyak 11 x/menit.

c. Perkusi :

Suara perkusi timpani.

d. Palpasi:

Abdomen teraba lunak, tidak ada massa atau tumor, tidak ada nyeri tekan.

5. Genetalia

a. Inspeksi :

Terpasang selang kateter.

b. Palpasi:

Tidak teraba penumpukan urine.

6. Ekstremitas

a. Atas :

Kedua tangan simetris, jari-jari lengkap, tonus otot menurun, terpasang infus di sebelah kanan, kekuatan otot kanan 4 kiri 5, kuku tampak pendek dan bersih, terdapat luka lecet pada bagian siku kanan dan kiri, CRT < 2 detik

b. Bawah :

Kedua kaki simetris, jari-jari kaki lengkap, tonus otot menurun, tidak ada varices, kekuatan otot kanan 4 kiri 4, terdapat luka lecet pada bagian lutut kanan dan betis.

IV. Pemeriksaan Penunjang

a. Foto Thorax :

Tanggal pemeriksaan : 14 September 2021

Hasil pemeriksaan radiografi thorax AP :

1. Konsolidasi homogeny pada lapangan paru kanan
2. Cor : CTR normal. Aorta normal
3. Sinus dan diafragma normal
4. Bayangan lusen pada jaringan lunak hemitoraks kanan

Kesan: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Konstusio paru dextra
2. Emfisema subkutis hemitoraks dextra

ALAUDDIN
M A K A S S A R

b. Pemeriksaan Laboratorium :

1. Analisa Gas darah :

Tanggal pemeriksaan : 17 September 2021

Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
Kimia Darah			
Analisa Gas Darah			
PH	7.468	7.35-7.45	
SO ₂	100	95-98	%
PO ₂	220	80.0-100.0	mmHg
ctO ₂	-	15.8-22.3	ml/dl
PCO ₂	31,4	35.0-45.0	mmHg
ctCO ₂	24	23-27	mmol/l
HCO ₃	22,7	22-26	mmol/l
BE	-1	-2 s/d +2	mmol/l
LAC	-	0.5-1.6	mmol/l
Kesan/Saran	Alkalosis Respiratorik		

2. Hematologi

Tanggal pemeriksaan : 17 September 2021

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
Hematologi			
PT	9.3	10-15	Detik
INR	0.89		
APTT	24.8	20-30	Detik

3. Kimia Darah

Tanggal pemeriksaan : 16 september 2021

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
Kimia Darah			
SGOT	109	6-30	IU/dL
SGPT	56	7-32	IU/dL
Ureum	62	<50	Mg/dL
Kreatinin	1.00	L : 0.7-1.1, P : 0.6-0.9	Mg/dL
Glukosa Darah Sewaktu	85	<200	Mg/dL

Kesan : Peningkatan enzim-enzim transaminase

4. Darah rutin

Tanggal pemeriksaan : 16 September 2021

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan
WBC	3,9 [$10^3/uL$]	4,11-11,30
RBC	2.21 – [$10^3/uL$]	4.50-5.90
HGB	6.8 – [g/dL]	14.0-17.5
HCT	18.9 – [%]	41.5-50.4
MCHC	36.0 + [g/dL]	33.4-35.5
PLT	77 – [$10^3/uL$]	172-450
PCT	0.08 – [%]	0.17-0.35
LYMPH	0.77 – [$10^3/uL$] 8.7 – [%]	1.00-4.80 20.0-50.0

Kesan : 1. Anemia normositik normokrom

2. Trombositopenia sedang

V. Terapi Yang Diberikan

a. Jenis terapi yang diberikan :

1. Ceftriaxone : 1 gr/12 jam/IV
2. Ketorolac : 30 mg/8 jam/IV
3. Omeprazole : 40 mg/12 jam/IV
4. Dextopen : 1 amp/8 jam/IV
5. As.traneksamat : 500 mg/12 j/IV
6. Infus RL 500 ml
7. Cairan KN3B 1500 cc/24 jam

b. Estimasi tanggal pemulangan : 23 September 2021

c. Edukasi pasien pulang :

1. Rutin minum obat
2. Kontrol di poliklinik

VI. Analisa Data

DATA	ETIOLOGI	MASALAH
<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengeluh sesak 2. Pasien mengatakan sulit untuk bernafas, dada terasa berat <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien tampak mengalami dyspnea 2. Tanda-tanda vital : TD : 100/60 N : 76x/menit, P : 30x/Menit, S : 36,8°C 3. Pengembangan dada tampak tidak simetris 4. Terdapat retraksi otot dada 5. Vesikuler melemah pada dada sebelah kanan 6. Suara perkusi pada dada sebelah kanan hipersonor 	<p>Pneumothoraks spontan, traumatic, autogenic</p> <p>↓</p> <p>Udara masuk ke dalam kavum pleura</p> <p>↓</p> <p>Meningkatkan tekanan intra pleura</p> <p>↓</p> <p>Kemampuan dilatasi alveoli menurun</p> <p>↓</p> <p>Atelektasis</p> <p>↓</p> <p>Sesak</p> <p>↓</p> <p>Pola napas tidak efektif</p>	<p>Pola napas tidak efektif</p>
<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengeluh sesak 2. Pasien mengatakan tidak mampu batuk <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpasang Chest Tube (WSD) sejak 3 hari yang lalu 2. Terdapat bunyi napas tambahan (ronchi) 3. Vesikuler melemah pada dada sebelah kanan 4. Suara perkusi pada dada sebelah kanan hipersonor 5. Dada tidak simetris dimana dada kanan tertinggal dari dada kiri 6. Fremitus berkurang 	<p>Penumpukan cairan dalam rongga pleura</p> <p>↓</p> <p>Ekspansi paru menurun</p> <p>↓</p> <p>Sesak napas</p> <p>↓</p> <p>Kelemahan dan upaya batuk buruk</p> <p>↓</p> <p>Bersihkan jalan napas tidak efektif</p>	<p>Bersihkan jalan napas tidak efektif</p>

<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tn. T mengeluh nyeri pada dada sebelah kanan 2. Nyeri yang dirasakan seperti tertusuk-tusuk 3. Nyeri yang dirasakan tidak menjalar, hanya di bagian dada sebelah kanan saja atau area sekitar WSD 4. Skala nyeri 7 (Sedang) diukur dengan menggunakan <i>Numeric Rating scale</i> (NRS) 5. Nyeri yang dirasakan hilang timbul terutama pada saat banyak bergerak dengan durasi ± 30 menit, nyeri hilang apabila diberi obat 6. Pasien mengatakan nyeri yang dialaminya sangat mengganggu aktifitasnya terutama waktu istirahatnya <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpasang Chest Tube (WSD) sejak 3 hari yang lalu 2. Pasien tampak meringis apabila nyeri timbul 3. Terdapat nyeri tekan pada dada sebelah kanan 	<pre> graph TD A[Terputusnya kontinuitas tulang dan jaringan] --> B[Nositseptor menghantarkan zat kimia bradikinin] B --> C[Menurunnya ambang nyeri] C --> D[Nyeri] </pre>	<p>Nyeri</p>
<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tn. T mengatakan akibat penyakit yang dialaminya, pasien tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya 2. Pasien mengatakan penyakitnya mengakibatkan pasien tidak bisa melakukan aktifitasnya secara mandiri dan harus dibantu oleh keluarga atau perawat seperti <i>personal hygiene</i>, berpakaian, mobilisasi, makan/minum 3. Pasien mengatakan akan merasa sesak apabila melakukan aktifitas-aktifitas tertentu misalnya saat berganti pakaian 4. Selama sakit pasien sering mengeluh lemas 5. Pasien mengeluh pusing dan rasa berat di dada terutama pada saat sesak <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi umum pasien tampak lemah 	<pre> graph TD A[Pneumothoraks spontan, traumatic, autogenic] --> B[Udara masuk ke dalam kavum pleura] B --> C[Meningkatkan tekanan intra pleura] C --> D[Kemampuan dilatasi alveoli menurun] D --> E[Atelektasis] E --> F[Sesak] F --> G[Pola napas tidak efektif] </pre>	<p>Intoleransi Aktifitas</p>

<ul style="list-style-type: none"> 2. Aktifitas klien tampak dibantu seperti makan, toileting, personal hygiene, dan mengganti pakaian 3. Kekuatan otot ekstremitas atas 4 5 4. Kekuatan otot ekstremitas bawah 4 4 	<p>↓</p> <p>Intoleransi aktifitas</p>	
<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan masuk Rumah sakit karena kecelakaan lalulintas <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terdapat luka lecet pada bagian siku kanan dan kiri 2. Terdapat luka lecet pada bagian lutut kanan dan betis 3. Terpasang drain (chest tube) 4. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan 	<p>Tension pneumothoraks</p> <p>↓</p> <p>Trauma dada penetrasi</p> <p>↓</p> <p>Udara memasuki ruang pleura pada saat inspirasi dan tidak dapat keluar pada saat ekspirasi</p> <p>↓</p> <p>Inseri WSD</p> <p>↓</p> <p>Risiko Infeksi</p>	<p>Risiko Infeksi</p>

B. Diagnosis Keperawatan

1. Pola napas tidak efektif b.d hambatan upaya napas d.d dyspnea, penggunaan otot bantu pernapasan, pola napas abnormal (D. 0005)
2. Bersihan jalan napas tidak efektif b.d benda asing dalam jalan napas d.d dyspnea, tidak mampu batuk, ronkhi, gelisah, frekuensi napas berubah (D. 0001)
3. Nyeri akut b.d agen pencedera fisik d.d mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, sulit tidur, pola napas berubah (D. 0077)
4. Intoleransi aktivitas b.d ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen d.d mngeluh lelah, dyspnea saat/setelah aktivitas, merasa lemah (D. 0056)
5. Risiko infeksi b.d efek prosedur invasif (D. 0142) (PPNI, 2016).

C. Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Tujuan & Kriteria hasil (PPNI, 2018)	Intervensi (Tim Pokja SLKI & SIKI DPP PPNI, 2018)	Rasional
1.	Pola napas tidak efektif b.d hambatan upaya napas d.d dyspnea, penggunaan otot bantu pernapasan, pola napas abnormal	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam diharapkan pola napas membaik (L. 01004) dengan kriteria hasil : a. Dyspnea menurun b. Penggunaan otot bantu pernapasan menurun c. Frekuensi napas membaik	Manajemen jalan napas (I. 01011) : Observasi : 1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) 2. Monitor bunyi napas tambahan 3. Monitor sputum Terapeutik : 1. Pertahankan kepatenan jalan napas 2. Posisikan fowler atau semi fowler 3. Berikan minuman hangat 4. Lakukan kombinasi <i>breathing exercise</i> dan <i>respiratory muscle stretching</i> Edukasi : 1. Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, <i>jika tidak kontra indikasi</i> 2. Ajarkan batuk efektif Kolaborasi : 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, <i>jika perlu</i> 2. Pemantauan respirasi	Observasi : 1. Mengetahui perubahan pola napas pasien 2. Mengidentifikasi adanya hambatan pada saluran pernapasan 3. Mengetahui adanya produksi sputum Terapeutik : 1. Mempertahankan jalan napas agar tetap paten 2. Memberikan posisi yang nyaman dan agar pemasukan O2 lebih baik 3. Mengencerkan dahak 4. Untuk meningkatkan ekspansi dada 5. Untuk membersihkan jalan napas Edukasi : 1. Menjaga agar cairan tetap seimbang 2. Membersihkan jalan napas Kolaborasi : 1. Kolaborasi untuk mengencerkan dahak, <i>jika perlu</i> 2. Memantau perubahan status respirasi
2.	Bersihan jalan napas tidak efektif b.d benda asing dalam jalan napas d.d dyspnea, tidak mampu batuk, ronkhi, gelisah, frekuensi napas berubah	Setelah diberikan intervensi keperawatan selama 3x24 jam maka diharapkan bersihan jalan napas (L. 01001) meningkat dengan kriteria hasil : a. Batuk efektif meningkat	Latihan batuk efektif (I. 01006) : Observasi : 1. Identifikasi kemampuan batuk 2. Monitor adanya retensi sputum 3. Monitor tanda dan gejala infeksi saluran pernapasan 4. Monitor input dan output cairan Terapeutik : 1. Atur posisi semi fowler atau fowler	Observasi ; 1. Mengetahui sejauh mana kemampuan batuk pasien 2. Mengetahui apakah ada produksi sputum 3. Mengetahui apakah terjadi infeksi saluran pernapasan 4. Mengetahui keseimbangan cairan Terapeutik :

		<p>b. Produksi sputum menurun</p> <p>c. Dispnea menurun</p>	<p>2. Pasang pernak dan bengkok di pangkuan pasien</p> <p>3. Buang secret pada tempat sputum</p> <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif 2. Anjurkan Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 detik 3. Anjurkan mengulangi Tarik napas dalam hingga 3 kali 4. Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah Tarik napas dalam yang ke 3 <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran, <i>jika perlu</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan posisi yang nyaman dengan kepala lebih tinggi 2. Agar sputum tidak merembes 3. Mencegah infeksi nasokomial <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar pasien paham akan prosedur yang akan diberikan 2. Salah satu prosedur batuk efektif 3. Agar pengeluaran sputum lebih efektif <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pengencer dahak
3.	<p>Nyeri akut b.d agen pencedera fisik d.d mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, sulit tidur, pola napas berubah</p>	<p>Setelah diberi tindakan keperawatan 3x24 jam maka diharapkan tingkat (L. 08066) nyeri menurun dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keluhan nyeri menurun b. Meringis menurun c. Pola napas membaik 	<p>Manajemen nyeri (I. 08238) :</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi respons nyeri non verbal 4. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 5. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri 6. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan 7. Monitor efek samping penggunaan analgetik <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 2. Kontrol ruangan yang dapat memperberat rasa nyeri 3. Fasilitasi istirahat dan tidur 	<p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengidentifikasi karakteristik nyeri yang dirasakan pasien 2. Untuk mengidentifikasi tingkat keparahan nyeri yang dirasakan pasien 3. Untuk mengetahui apakah ada respons terhadap nyeri atau tidak 4. Untuk mengetahui faktor pencetus nyeri 5. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pasien terkait nyeri 6. Mengetahui keefektifan terapi komplementer yang telah diberikan 7. Mengetahui apakah ada efek samping yang dirasakan pasien dari penggunaan analgetik <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengurangi penggunaan analgetik dalam penanganan nyeri

			<p>4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri</p> <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi meredakan nyeri 3. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 4. Anjurkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian analgetik, <i>jika perlu</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memberi rasa nyaman kepada pasien 3. Mengatur pola istirahat pasien 4. Untuk mengetahui kontraindikasi dari strategi menurunkan nyeri yang diberikan <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar pasien mampu mengenali nyeri yang dirasakan 2. Agar pasien mampu mengontrol nyeri secara mandiri 3. Agar pasien mampu mengenali perkembangan nyeri yang dirasakan secara mandiri 4. Mengurangi tingkat ketergantungan analgetik <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengurangi nyeri
4.	Intoleransi aktivitas b.d ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen d.d mengeluh lelah, dyspnea saat/setelah aktivitas, merasa lemah	Setelah diberikan tindakan keperawatan selama 3x24 jam maka diharapkan toleransi aktivitas (L. 05047) meningkat, dengan kriteria hasil : <ol style="list-style-type: none"> a. Keluhan lelah menurun b. Dispnea saat dan setelah aktivitas menurun c. Perasaan lemah membaik 	<p>Manajemen energi (I. 05178) :</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan 2. Monitor kelelahan fisik dan emosional 3. Monitor pola dan jam tidur 4. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus 2. Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif 3. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan 4. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak adapt berpindah atau berjalan 	<p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui faktor penyebab kelelahan 2. Untuk tingkat kelelahan yang dirasakan pasien 3. Mengatur waktu istirahat pasien 4. Mengetahui lokasi ketidaknyamanan selama beraktivitas terjadi <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kenyamanan pasien 2. Melatih otot-otot pasien agar tidak kaku 3. Meningkatkan kenyamanan pasien 4. Mengajarkan mobilisasi sederhana <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengurangi kelelahan pasien saat beraktivitas

			<p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan tirah baring 2. Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap 3. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang 4. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk melatih kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas 3. Agar kelelahan segera ditangani 4. Untuk mengurangi kelelahan yang dirasakan pasien <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memenuhi kebutuhan energi pasien
5.	Risiko infeksi b.d efek prosedur invasif	<p>Setelah diberikan tindakan keperawatan selama 3x24 jam maka diharapkan status imun (L. 14133) membaik, dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Integritas kulit meningkat b. Integritas mukosa meningkat c. Suhu tubuh membaik 	<p>Pencegahan infeksi (I. 14539) :</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batasi jumlah pengunjung 2. Berikan perawatan kulit pada area edema 3. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 4. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tanda dan gejala infeksi 2. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar 3. Ajarkan etika batuk 4. Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi 5. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi 6. Anjurkan meningkatkan asupan cairan <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian imunisasi, <i>jika perlu</i> 	<p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antisipasi terjadinya infeksi <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga privasi dan meningkatkan kenyamanan pasien 2. Mencegah terjadinya infeksi 3. Mencegah terjadinya infeksi nasokomial 4. Mencegah terjadinya penularan virus <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar pasien mampu mengenali tanda dan gejala infeksi 2. Mencegah terjadinya infeksi nasokomial 3. Mencegah penularan droplet 4. Agar pasien mampu mengenali perkembangan lukanya 5. Agar mempercepat pemulihan 6. Agar menjaga cairan tetap seimbang dan mencegah terjadinya syok <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan imunitas tubuh

D. Implementasi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Waktu	Implementasi	Nama Jelas
1.	Pola napas tidak efektif b.d hambatan upaya napas d.d dyspnea, penggunaan otot bantu pernapasan, pola napas abnormal	Sabtu, 18 September 2021 Pukul 08.00	<p>Manajemen jalan napas :</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor pola napas Hasil : RR : 30 x/menit, terdapat penggunaan otot bantu pernapasan, pola napas abnormal 2. Memonitor bunyi napas tambahan Hasil : Terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronkhi 3. Memonitor sputum Hasil : Terdapat sputum yang sulit dikeluarkan dengan karakteristik berwarna putih <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kepatenan jalan napas Hasil : Mempertahankan kepatenan jalan napas dengan memberikan posisi semi fowler dan bantuan O2, pasien mengatakan nyaman dengan posisi yang diberikan 2. Memosisikan fowler atau semi fowler Hasil : Memberikan posisi semifowler dimana pasien mengatakan merasa lebih nyaman 3. Memberikan minuman hangat Hasil : Keluarga mengatakan pasien rutin diberi air hangat di pagi hari 4. Melakukan kombinasi <i>breathing exercise</i> dan <i>respiratory muscle stretching</i> Hasil : Memberikan kombinasi teknik <i>breathing exercise</i> dan <i>respiratory muscle stretching</i> untuk membantu pengembangan ekspansi paru dan menurunkan sesak dengan hasil RR : 29x/menit, HR : 89x/menit, pasien masih mengeluh sesak <p>Edukasi :</p>	Risdawati

		<p>Senin, 20 September 2021 Pukul 08.30</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, <i>jika tidak kontra indikasi</i> Hasil : Pasien minum 650 ml hari ditambah dengan terapi cairan berupa infus RL500ml dan KN3B 1500 ml/24 jam 2. Mengajarkan batuk efektif Hasil : Pasien belum bisa batuk dengan efektif <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian O₂ Hasil : Kolaborasi pemberian O₂ nasal kanul 6 ltr/menit, pasien mengatakan merasa nyaman dengan diberikan bantuan oksigen 2. Memantau respirasi Hasil : RR : 29x/menit, pasien mengatakan masih merasa sesak <p>Manajemen jalan napas : Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor pola napas Hasil : RR : 27 x/menit, terdapat penggunaan otot bantu pernapasan, pola napas abnormal 2. Memonitor bunyi napas tambahan Hasil : Bunyi napas tambahan ronkhi menurun 3. Memonitor sputum Hasil : Terdapat sputum yang sulit dikeluarkan dengan karakteristik berwarna putih <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kepatenan jalan napas Hasil : Mempertahankan kepatenan jalan napas dengan memberikan posisi semi fowler dan bantuan O₂ nasal kanul 5 liter/menit 2. Memposisikan fowler atau semi fowler Hasil : Memberikan posisi semifowler, pasien mengatakan lebih nyaman diberi posisi semi fowler 3. Memberikan minuman hangat Hasil : Pasien mengatakan rutin minum air hangat di pagi hari 	<p>Risdawati</p>
--	--	--	---	-------------------------

		<p>4. Melakukan kombinasi <i>breathing exercise</i> dan <i>respiratory muscle stretching</i> Hasil : Memberikan kombinasi teknik <i>breathing exercise</i> dan <i>respiratory muscle stretching</i> untuk membantu pengembangan ekspansi paru dan menurunkan sesak dengan hasil RR : 27x/menit, HR : 91x/menit, Pasien mengatakan sesak mulai menurun</p> <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, <i>jika tidak kontra indikasi</i> Hasil : Pasien minum 650 ml/hari ditambah dengan terapi cairan berupa infus RL500ml dan KN3B 1500 ml/24 jam 2. Mengajarkan batuk efektif Hasil : Pasien bisa batuk namun belum bisa batuk dengan kuat <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian O₂ Hasil : Kolaborasi pemberian O₂ nasal kanul 5 ltr/menit 2. Memantau respirasi Hasil : Memantau status respirasi pasien <p>Manajemen jalan napas :</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor pola napas Hasil : RR : 25 x/menit, penggunaan otot bantu pernapasan menurun, pola napas masih berada pada ambat batas abnormal 2. Memonitor bunyi napas tambahan Hasil : Bunyi napas tambahan ronkhi menurun 3. Memonitor sputum Hasil : Terdapat sputum pada saat pasien batuk dengan karakteristik berwarna putih <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kepatenan jalan napas 	<p>Risdawati</p>
--	--	--	-------------------------

			<p>Hasil : Mempertahankan kepatenan jalan napas dengan memberikan posisi semi fowler dan bantuan O₂ nasal kanul 5 liter/menit</p> <p>2. Memposisikan fowler atau semi fowler Hasil : Memberikan posisi semi fowler, pasien merasa nyaman dengan posisi yang diberikan</p> <p>3. Memberikan minuman hangat Hasil : Pasien mengatakan rutin minum air hangat</p> <p>4. Melakukan kombinasi <i>breathing exercise</i> dan <i>respiratory muscle stretching</i> Hasil : Memberikan kombinasi teknik <i>breathing exercise</i> dan <i>respiratory muscle stretching</i> untuk membantu pengembangan ekspansi paru dan menurunkan sesak dengan hasil RR : 24x/menit, HR : 84x/menit, pasien mengatakan sesak yang dirasakan sudah menurun</p> <p>Edukasi :</p> <p>1. Menganjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, <i>jika tidak kontra indikasi</i> Hasil : Pasien minum 650 ml/hari ditambah dengan terapi cairan berupa infus RL500ml dan KN3B 1500 ml/24 jam</p> <p>2. Mengajarkan batuk efektif Hasil : Pasien bisa batuk</p> <p>Kolaborasi :</p> <p>1. Kolaborasi pemberian O₂ Hasil : Kolaborasi pemberian O₂ nasal kanul 5 ltr/menit</p> <p>2. Memantau respirasi Hasil : Memantau status respirasi pasien</p>	
2.	Bersihkan jalan napas tidak efektif b.d benda asing dalam jalan napas d.d dyspnea, tidak mampu batuk, ronkhi, gelisah, frekuensi napas berubah	Sabtu, 18 September 2021 Pukul 08.30	<p>Latihan batuk efektif :</p> <p>Observasi :</p> <p>1. Mengidentifikasi kemampuan batuk Hasil : Pasien mengatakan ada lendir yang tertahan namun tidak mampu mengeluarkan karena tidak mampu batuk</p> <p>2. Memonitor adanya retensi sputum Hasil : Pasien mengatakan ada lendir yang tertahan</p> <p>3. Memonitor tanda dan gejala infeksi saluran pernapasan</p>	Risdawati

			<p>Hasil : Pasien mengatakan gatal pada tenggorokan, terdapat lendir, dan selalu ingin batuk tapi tidak bisa</p> <p>4. Memonitor input dan output cairan Hasil : Pasien minum 650ml/hari, terapi intravena berupa RL500ml dan KN3B1500ml/24 jam dan pengosongan urine bag 1500cc</p> <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur posisi semi fowler atau fowler Hasil : Pasien mengatakan lebih nyaman dengan posisi yang diberikan 2. Memasang perlak dan bengkak di pangkuan pasien Hasil : Menyediakan pasien tempat sputum 3. Membuang secret pada tempat sputum Hasil : Membuang secret di tempat sputum yang sudah disediakan <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif Hasil : Pasien mengatakan paham terkait tujuan dan prosedur batuk efektif yang dijelaskan 2. Menganjurkan Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 detik Hasil : Pasien mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan 3. Menganjurkan mengulangi Tarik napas dalam hingga 3 kali Hasil : Pasien mengikuti instruksi 4. Menganjurkan batuk dengan kuat langsung setelah Tarik napas dalam yang ke 3 Hasil : Pasien tidak mampu batuk dengan kuat karena akan terasa nyeri pada area dada <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran Hasil : Tidak dilakukan kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran 	
--	--	--	---	--

		<p>Senin, 20 September 2021 Pukul 09.00</p>	<p>Latihan batuk efektif :</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kemampuan batuk Hasil : Pasien mengatakan sudah mulai bisa batuk sedikit-sedikit untuk mengeluarkan lendir yang tertahan 2. Memonitor adanya retensi sputum Hasil : Pasien mengatakan merasakan masih ada lendir yang tertahan 3. Memonitor tanda dan gejala infeksi saluran pernapasan Hasil : Pasien mengatakan gatal pada tenggorokan, terdapat lendir, dan selalu ingin batuk tapi tidak bisa terlalu kuat 4. Memonitor input dan output cairan Hasil : Pasien minum 650ml/hari, terapi intravena berupa RL500ml dan KN3B1500ml/24 jam dan pengosongan urine bag 1500cc <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur posisi semi fowler atau fowler Hasil : Mengatur posisi fowler, pasien mengatakan lebih nyaman 2. Memasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien Hasil : Menyediakan pasien tempat sputum 3. Membuang secret pada tempat sputum Hasil : Membuang secret di tempat sputum yang sudah disediakan <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif Hasil : Pasien mengatakan paham terkait tujuan dan prosedur batuk efektif yang dijelaskan 2. Menganjurkan Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 detik Hasil : Pasien mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan 3. Menganjurkan mengulangi Tarik napas dalam hingga 3 kali Hasil : Pasien mengikuti instruksi 4. Menganjurkan batuk dengan kuat langsung setelah Tarik napas dalam yang ke 3 Hasil : Pasien mampu batuk namun tidak begitu kuat 	<p>Risdawati</p>
--	--	--	--	-------------------------

		<p>Selasa, 21 September 2021 Pukul 09.05</p> <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran Hasil : Tidak dilakukan kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran <p>Latihan batuk efektif :</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kemampuan batuk Hasil : Pasien mengatakan sudah bisa batuk dan mengeluarkan lender yang tertahan dengan baik 2. Memonitor adanya retensi sputum Hasil : Pasien mengatakan sudah bisa mengeluarkan lender yang tertahan 3. Memonitor tanda dan gejala infeksi saluran pernapasan Hasil : Pasien mengatakan masih merasakan gatal di bagian tenggorokan, terdapat lendir 4. Memonitor input dan output cairan Hasil : Pasien minum 650ml/hari, terapi intravena berupa RL500ml dan KN3B1500ml/24 jam dan pengosongan urine bag 1500cc <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengatur posisi semi fowler atau fowler Hasil : Mengatur posisi fowler 5. Memasang pernak dan bengkok di pangkuan pasien Hasil : Menyediakan pasien tempat sputum 6. Membuang secret pada tempat sputum Hasil : Membuang secret di tempat sputum yang sudah disediakan <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif Hasil : Pasien mengatakan paham terkait tujuan dan prosedur batuk efektif yang dijelaskan 6. Mengajarkan Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 detik Hasil : Pasien mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan 	Risdawati
--	--	--	------------------

			<p>7. Menganjurkan mengulangi Tarik napas dalam hingga 3 kali Hasil : Pasien mengikuti instruksi</p> <p>8. Menganjurkan batuk dengan kuat langsung setelah Tarik napas dalam yang ke 3 Hasil : Pasien mampu batuk dengan kuat dan mengeluarkan lender yang tertahan</p> <p>Kolaborasi :</p> <p>1. Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran, <i>jika perlu</i> Hasil : Tidak dilakukan kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran</p>	
3.	Nyeri akut b.d agen pencedera fisik d.d mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, sulit tidur, pola napas berubah	Sabtu, 18 September 2021 Pukul 09.00	<p>Manajemen nyeri :</p> <p>Observasi :</p> <p>1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Hasil : Pasien mengatakan nyeri pada bagian dada sebelah kanan terutama yang terpasang chest tube, dengan karakteristik seperti tertusuk-tusuk, durasi nyeri ± 30 menit hilang timbul, nyeri yang dirasakan tidak menjalar.</p> <p>2. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil : Skala nyeri 7 (sedang) dengan menggunakan <i>Numeric Rating Scale</i></p> <p>3. Mengidentifikasi respons nyeri non verbal Hasil : Pasien tampak meringis dan menunjuk area yang sakit, Pasien bersikap hati-hati pada saat bergerak</p> <p>4. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil : Pasien mengatakan nyeri diperberat apabila terlalu banyak bergerak dan diperingan apabila diberi obat anti nyeri</p> <p>5. Mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri Hasil : Pasien mengatakan nyerinya disebabkan karena benturan pada saat kecelakaan lalu lintas dan dipengaruhi oleh terpasangnya selang pada dada sebelah kanan dan meyakini bahwa akan hilang jika diberi obat anti nyeri</p> <p>6. Memonitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan</p>	Risdawati

			<p>Hasil : Pasien mengatakan tidak pernah diberi terapi anti nyeri selain obat yang disuntikkan</p> <p>7. Memonitor efek samping penggunaan analgetik Hasil : Pasien mengatakan sejauh ini tidak pernah merasakan efek samping dari obat anti nyeri yang diberikan</p> <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil : Memberikan pasien teknik nonfarmakologis berupa terapi murottal dikombinasikan dengan teknik relaksasi napas dalam, pasien mengatakan merasa nyaman diberi intervensi tersebut 2. Mengontrol ruangan yang dapat memperberat rasa nyeri Hasil : Menginstruksikan keluarga pasien untuk tidak menerima banyak tamu yang dapat mengganggu jadwal istirahat dan kenyamanan pasien 3. Memfasilitasi istirahat dan tidur Hasil : Memberikan pasien waktu istirahat yang cukup, Mengontrol suhu ruangan dan kebisingan 4. Mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Hasil : Pasien tidak diberikan strategi meredakan nyeri yang sifatnya kontraindikasi dengan kondisi pasien <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri Hasil : Menjelaskan kepada pasien bahwa penyebab dari nyerinya adalah berasal dari efek benturan dari kecelakaan yang dialaminya dan salah satu yang dapat memperberat nyerinya adalah ketika pasien merasa panic dengan kondisinya 2. Menjelaskan strategi meredakan nyeri Hasil : Menjelaskan kepada pasien bahwa banyak strategi meredakan nyeri yang bisa dilakukan selain teknik yang telah diajarkan 3. Menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri Hasil : Pasien mengatakan akan memonitor nyerinya secara mandiri 	
--	--	--	--	--

		<p>4. Mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil : Mengajarkan kepada pasien dan keluarga untuk mengimplementasikan teknik nonfarmakologis yang telah diajarkan</p> <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian analgetik Hasil : Kolaborasi pemberian ketorolak 30mg/8 jam/IV dan Dextopen 1 amp/8 jam/IV <p>Manajemen nyeri :</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Hasil : Pasien mengatakan nyeri pada bagian dada sebelah kanan terutama yang terpasang chest tube, dengan karakteristik seperti tertusuk-tusuk, durasi nyeri ±30 menit hilang timbul, nyeri yang dirasakan tidak menjalar. 2. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil : Skala nyeri 6 (sedang) dengan menggunakan <i>Numeric Rating Scale</i> 3. Mengidentifikasi respons nyeri non verbal Hasil : Pasien tampak meringis dan menunjuk area yang sakit, Pasien bersikap hati-hati pada saat bergerak 4. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil : Pasien mengatakan nyeri diperberat apabila terlalu banyak bergerak dan diperingan apabila diberi obat anti nyeri 5. Mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri Hasil : Pasien mengatakan nyerinya disebabkan karena benturan pada saat kecelakaan lalu lintas dan dipengaruhi oleh terpasangnya selang pada dada sebelah kanan dan meyakini bahwa akan hilang jika diberi obat anti nyeri 6. Memonitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan 	<p>Risdawati</p>
--	--	--	-------------------------

			<p>Hasil : Pasien mengatakan merasa nyaman dengan terapi yang terakhir kali diberikan</p> <p>7. Memonitor efek samping penggunaan analgetik Hasil : Pasien mengatakan sejauh ini tidak pernah merasakan efek samping dari obat anti nyeri yang diberikan</p> <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil : Memberikan pasien teknik nonfarmakologis berupa terapi murtal dikombinasikan dengan teknik relaksasi napas dalam 2. Mengontrol ruangan yang dapat memperberat rasa nyeri Hasil : Menginstruksikan keluarga pasien untuk tidak menerima banyak tamu yang dapat mengganggu jadwal istirahat dan kenyamanan pasien 3. Memfasilitasi istirahat dan tidur Hasil : Memberikan pasien waktu istirahat yang cukup, Mengontrol suhu ruangan dan kebisingan 4. Mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Hasil : Pasien tidak diberikan strategi meredakan nyeri yang sifatnya kontraindikasi dengan kondisi pasien <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri Hasil : Menjelaskan kepada pasien bahwa penyebab dari nyerinya adalah berasal dari efek benturan dari kecelakaan yang dialaminya dan salah satu yang dapat memperberat nyerinya adalah ketika pasien merasa panic dengan kondisinya 2. Menjelaskan strategi meredakan nyeri Hasil : Menjelaskan kepada pasien bahwa banyak strategi meredakan nyeri yang bisa dilakukan selain teknik yang telah diajarkan 3. Menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri Hasil : Pasien mengatakan akan memonitor nyerinya secara mandiri 4. Menganjurkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 	
--	--	--	--	--

		<p>Selasa, 21 September 2021 Pukul 10.00</p>	<p>Hasil : Menganjurkan kepada pasien dan keluarga untuk mengimplementasikan teknik nonfarmakologis yang telah diajarkan</p> <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian analgetik, <i>jika perlu</i> Hasil : Kolaborasi pemberian ketorolak 30mg/8 jam/IV <p>Manajemen nyeri :</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Hasil : Pasien mengatakan nyeri pada bagian dada sebelah kanan terutama yang terpasang chest tube, dengan karakteristik seperti tertusuk-tusuk, durasi nyeri ±15 menit hilang timbul, nyeri yang dirasakan tidak menjalar. 2. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil : Skala nyeri 5 (sedang) dengan menggunakan <i>Numeric Rating Scale</i> 3. Mengidentifikasi respons nyeri non verbal Hasil : Meringis menurun, Pasien bersikap hati-hati pada saat bergerak 4. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil : Pasien mengatakan nyeri diperberat apabila terlalu banyak bergerak dan diperingan apabila diberi obat anti nyeri dan diberi terapi komplementer 5. Mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri Hasil : Pasien mengatakan nyerinya disebabkan karena benturan pada saat kecelakaan lalu lintas dan dipengaruhi oleh terpasangnya selang pada dada sebelah kanan dan meyakini bahwa akan hilang jika diberi obat anti nyeri 6. Memonitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan Hasil : Pasien mengatakan merasa nyaman dengan terapi yang terakhir kali diberikan 	<p>Risdawati</p>
--	--	---	--	-------------------------

		<p>7. Memonitor efek samping penggunaan analgetik Hasil : Pasien mengatakan sejauh ini tidak pernah merasakan efek samping dari obat anti nyeri yang diberikan</p> <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil : Memberikan pasien teknik nonfarmakologis berupa terapi murottal dikombinasikan dengan teknik relaksasi napas dalam 2. Mengontrol ruangan yang dapat memperberat rasa nyeri Hasil : Menginstruksikan keluarga pasien untuk tidak menerima banyak tamu yang dapat mengganggu jadwal istirahat dan kenyamanan pasien 3. Memfasilitasi istirahat dan tidur Hasil : Memberikan pasien waktu istirahat yang cukup, Mengontrol suhu ruangan dan kebisingan 4. Mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Hasil : Pasien tidak diberikan strategi meredakan nyeri yang sifatnya kontraindikasi dengan kondisi pasien <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri Hasil : Menjelaskan kepada pasien bahwa penyebab dari nyerinya adalah berasal dari efek benturan dari kecelakaan yang dialaminya dan salah satu yang dapat memperberat nyerinya adalah ketika pasien merasa panic dengan kondisinya 2. Menjelaskan strategi meredakan nyeri Hasil : Menjelaskan kepada pasien bahwa banyak strategi meredakan nyeri yang bisa dilakukan selain teknik yang telah diajarkan 3. Menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri Hasil : Pasien mengatakan akan memonitor nyerinya secara mandiri 4. Menganjurkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 	
--	--	--	--

			<p>Hasil : Menganjurkan kepada pasien dan keluarga untuk mengimplementasikan teknik nonfarmakologis yang telah diajarkan</p> <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian analgetik, <i>jika perlu</i> <p>Hasil : Kolaborasi pemberian ketorolak 30mg/8 jam/IV</p>	
4.	Intoleransi aktivitas b.d ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen d.d mengeluh lelah, dyspnea saat/setelah aktivitas, merasa lemah	<p>Sabtu, 19 september 2021 Pukul 13.30</p>	<p>Manajemen energi :</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan Hasil : Pasien mengalami kecelakaan lalulintas yang menyebabkan terjadinya trauma dada berupa pneumothorax akibatnya pasien selalu merasa sesak dan merasa lemah 2. Memonitor kelelahan fisik dan emosional Hasil : Pasien mengatakan mudah lelah apabila melakukan aktivitas-aktivitas tertentu seperti berganti pakaian dan juga dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya yang selalu merasa panik apabila sesak dirasakan 3. Memonitor pola dan jam tidur Hasil : pasien mengatakan biasanya tidur pukul 21.00 di malam hari dan kerap kali terjaga akibat nyeri dan sesak yang dirasakan 4. Memonitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas Hasil : Pasien mengatakan merasa tidak nyaman pada area dada sebelah kanan yang terpasang chest tube <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus Hasil : Memasang pengaman tempat tidur, mengontrol kebisingan 2. Melakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif Hasil : Melatih pasien dengan memberikan ROM aktif 3. Memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan Hasil : Memberikan pasien aktivitas distraksi berupa terapi music relaksasi 4. Memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan 	Risdawati

		<p>Senin, 20 September 2021 Pukul 13.00</p>	<p>Hasil : Pasien mampu duduk</p> <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan tirah baring Hasil : Menganjurkan pasien untuk melakukan tirah baring apabila pasien merasa sangat lelah 2. Menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap Hasil : Menganjurkan pasien untuk melakukan aktivitas-aktivitas mandiri yang masih bisa dilakukan sendiri secara bertahap 3. Menganjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang Hasil : Menganjurkan pasien untuk melaporkan kondisinya apabila tidak ada perubahan setelah diberikan intervensi, pasien melaporkan masih merasa lemas 4. Mengajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan Hasil : Mengajarkan pasien untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang memang tidak bisa dilakukan sendiri <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan Hasil : Memberikan cairan KN3B 1500ml/24 jam Diet makanan lunak <p>Manajemen energi :</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan Hasil : Pasien mengalami kecelakaan lalulintas yang menyebabkan terjadinya trauma dada berupa pneumothorax akibatnya pasien selalu merasa sesak dan merasa lemah 2. Memonitor kelelahan fisik dan emosional Hasil : Pasien mengatakan mudah lelah apabila melakukan aktivitas-aktivitas tertentu seperti berganti pakaian dan juga dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya yang selalu merasa panik apabila sesak dirasakan 	<p>Risdawati</p>
--	--	--	--	-------------------------

		<p>3. Memonitor pola dan jam tidur Hasil : Pasien mengatakan biasanya tidur pukul 21.00 dimalam hari dan kerap kali terjaga akibat nyeri dan sesak yang dirasakan</p> <p>4. Memonitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas Hasil : Pasien mengatakan merasa tidak nyaman pada area dada sebelah kanan yang terpasang chest tube</p> <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus Hasil : Memasang pengaman tempat tidur, mengontrol kebisingan 2. Melakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif Hasil : Melatih pasien dengan memberikan ROM aktif 3. Memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan Hasil : Memberikan pasien aktivitas distraksi berupa terapi music relaksasi 4. Memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan Hasil : Pasien mampu duduk <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajarkan tirah baring Hasil : Mengajarkan pasien untuk melakukan tirah baring apabila pasien merasa sangat lelah 2. Mengajarkan melakukan aktivitas secara bertahap Hasil : Mengajarkan pasien untuk melakukan aktivitas-aktivitas mandiri yang masih bisa dilakukan sendiri secara bertahap 3. Mengajarkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang Hasil : Mengajarkan pasien untuk melaporkan kondisinya apabila tidak ada perubahan setelah diberikan intervensi, pasien mengatakan keluhan lemas menurun 4. Mengajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan Hasil : Mengajarkan pasien untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang memang tidak bisa dilakukan sendiri <p>Kolaborasi :</p>	
--	--	--	--

			<ol style="list-style-type: none"> Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan Hasil : Memberikan cairan KN3B 1500ml/24 jam Diet makanan lunak 	
5.	Risiko infeksi b.d efek prosedur invasif	<p>Sabtu, 19 September 2021 Pukul 10.00</p>	<p>Pencegahan infeksi: Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil : Sejauh pemantauan, belum ada tanda dan gejala infeksi yang berarti. Pasien mengeluh nyeri pada area terpasang chest tube, drainase 300cc, WBC : 3,9 <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> Membatasi jumlah pengunjung Hasil : menginstruksikan keluarga pasien agar mebatasi jumlah pengunjung Memberikan perawatan kulit pada area edema Hasil : Sejauh pemantauan, tidak ada area luka yang tampak edema Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil : Menganjurkan pasien untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan 6 langkah sesuai dengan WHO Mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi Hasil : Selalu memakai APD saat kontak dengan pasien, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan tanda dan gejala infeksi Hasil : Menjelaskan kepada pasien dan keluarga terkait tanda dan gejala infeksi dan pasien mengatakan paham Mengajarkan cara mencuci tangan dengan benar Hasil : Mengajarkan kepada pasien cara mencuci tangan 6 langkah sesuai anjuran WHO, pasien mampu mengikuti langkah-langkah yang diajarkan Mengajarkan etika batuk Hasil : Mengajarkan etika batuk kepada pasien yaitu dengan menutup mulut dan hidung, pasien mengatakan paham terkait apa yang disampaikan 	Risdawati

		<p>4. Mengajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi Hasil : Pasien mengatakan paham akan apa yang disampaikan</p> <p>5. Mengajarkan meningkatkan asupan nutrisi Hasil : Mengajarkan pasien mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein, keluarga pasien mengatakan akan rutin memberikan pasien makanan yang tinggi kalori dan protein</p> <p>6. Mengajarkan meningkatkan asupan cairan Hasil : Pasien minum 650 ml/hari</p> <p>Kolaborasi :</p> <p>1. Kolaborasi pemberian imunisasi Hasil : Tidak dilakukan kolaborasi pemberian imunisasi</p> <p>Pencegahan infeksi: Observasi :</p> <p>1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil : Sejang pemantauan, belum ada tanda dan gejala infeksi yang berarti. Pasien mengatakan nyeri berkurang, drainase 100cc, WBC : 4,5</p> <p>Terapeutik :</p> <p>1. Membatasi jumlah pengunjung Hasil : Menginstruksikan keluarga pasien agar mebatasi jumlah pengunjung</p> <p>2. Memberikan perawatan kulit pada area edema Hasil : Sejang pemantauan, tidak ada area luka yang tampak edema. Luka lecet tampak bersih dan membaik</p> <p>3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil : Mengajarkan pasien untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan 6 langkah sesuai dengan WHO</p> <p>4. Mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi Hasil : Selalu memakai APD saat kontak dengan pasien, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien</p> <p>Edukasi :</p> <p>1. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi</p>	<p>Risdawati</p>
--	--	---	-------------------------

		<p>Hasil : Pasien mengatakan paham akan apa yang disampaikan</p> <p>2. Mengajarkan cara mencuci tangan dengan benar Hasil : Mengajarkan kepada pasien cara mencuci tangan 6 langkah sesuai anjuran WHO</p> <p>3. Mengajarkan etika batuk Hasil : Mengajarkan etika batuk kepada pasien yaitu dengan menutup mulut dan hidung</p> <p>4. Mengajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi Hasil : Mengajarkan pasien dan keluarga terkait cara memeriksa luka, pasien mengatakan paham akan apa yang disampaikan</p> <p>5. Menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi Hasil : Menganjurkan pasien mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein</p> <p>6. Menganjurkan meningkatkan asupan cairan Hasil : Pasien minum 650 ml/hari</p> <p>Kolaborasi :</p> <p>1. Kolaborasi pemberian imunisasi Hasil : Tidak dilakukan kolaborasi pemberian imunisasi</p>	
--	--	--	--

E. Evaluasi Keperawatan

No	Diagnosa Keperawatan	Waktu	Evaluasi	Nama Jelas
1.	Pola napas tidak efektif b.d hambatan upaya napas d.d dyspnea, penggunaan otot bantu pernapasan, pola napas abnormal	Sabtu, 18 September 2021 Pukul 08.45	<p>S : - Pasien masih mengeluh sesak</p> <p>O : - Masih tampak penggunaan otot bantu pernapasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - RR : 29x/menit, terjadi penurunan namun tidak begitu signifikan dari RR 30x/menit - HR : 89x/menit <p>A : Masalah pola napas tidak efektif belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi Manajemen jalan napas</p>	Risdawati
		Senin, 20 September 2021 Pukul 08.50	<p>S : - Pasien mengatakan sesak sudah mulai menurun</p> <p>O : - Pasien masih tampak menggunakan otot bantu pernapasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - RR : 27x/menit, RR menurun dari 29x/menit - HR : 91x/menit <p>A: Masalah pola napas tidak efektif belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi Manajemen jalan napas</p>	Risdawati
		Selasa, 21 September 2021 Pukul 09.00	<p>S : - Pasien mengatakan sesak sudah menurun dan tidak separah awal pengkajian</p> <p>O : - Penggunaan otot bantu pernapasan menurun</p> <ul style="list-style-type: none"> - RR : 24x/menit, RR menurun dari 27x/menit - HR : 84 x/menit <p>A : Masalah pola napas tidak efektif teratasi sebagian</p> <p>P : Pertahankan intervensi manajemen jalan napas</p>	Risdawati
2.	Bersihkan jalan napas tidak efektif b.d benda asing dalam jalan napas d.d dyspnea, tidak mampu batuk, ronkhi, gelisah, frekuensi napas berubah	Sabtu, 18 September 2021 Pukul 08.45	<p>S : - Pasien masih mengeluh tidak mampu batuk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien masih mengatakan masih ada lendir yang tertahan <p>O : - Pasien tampak sesak</p> <ul style="list-style-type: none"> - RR : 29x/menit, terjadi penurunan RR dari 30 namun tidak begitu signifikan - Terdapat lendir berwarna putih - Pasien masih tampak gelisah 	Risdawati

		<p>Senin, 20 September 2021 Pukul 09.15</p> <p>Selasa, 21 September 2021 Pukul 09.15</p>	<p>A : Masalah bersihan jalan napas tidak efektif belum teratasi P : Lanjutkan intervensi Latihan batuk efektif</p> <p>S : - Pasien mengatakan sudah bisa batuk sedikit demi sedikit - Pasien mengatakan sudah bisa mengeluarkan lendir yang tertahan sedikit demi sedikit</p> <p>O : - Sesak menurun - RR : 27x/menit dari RR semula 29x/menit - Terdapat lendir berwarna putih - Pasien tampak lebih tenang</p> <p>A : Masalah bersihan jalan napas tidak efektif belum teratasi P : Lanjutkan intervensi latihan batuk efektif</p> <p>S : - Pasien mengatakan sudah bisa batuk dan mengeluarkan lender yang tertahan O : - Sesak menurun - RR : 24x/menit dari RR 27x/menit - Pasien tampak lebih tenang</p> <p>A : Masalah bersihan jalan napas tidak efektif teratasi P : Pertahankan intervensi latihan batuk efektif</p>	<p>Risdawati</p> <p>Risdawati</p>
3.	Nyeri akut b.d agen pencedera fisik d.d mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, sulit tidur, pola napas berubah	<p>Sabtu, 18 September 2021 Pukul 09.45</p> <p>Senin, 20 September</p>	<p>S : - Pasien masih mengeluh nyeri O : - Skala nyeri menurun menjadi 6 dari skala 7 yang diukur dengan menggunakan <i>Numeric Rating Scale</i> - Pasien masih tampak meringis - Pasien masih bersikap protektif - Pasien masih tampak gelisah - Pola napas masih takipnea</p> <p>A : Masalah nyeri akut belum teratasi P : Lanjutkan intervensi manajemen nyeri</p> <p>S : - Pasien masih mengeluh nyeri</p>	<p>Risdawati</p> <p>Risdawati</p>

		<p>2021 Pukul 12.00</p> <p>Selasa, 21 September 2021 Pukul 10.15</p>	<p>O : - Skala nyeri 6 (sedang) diukur dengan <i>Numeric Rating Scale</i>, tidak ada perubahan skala nyeri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien masih tampak meringis - Pasien masih tampak bersikap protektif - Sesak napas menurun <p>A : Masalah nyeri aku belum teratasi P : Lanjutkan intervensi manajemen nyeri</p> <p>S : - Pasien mengatakan masih merasa nyeri namun tidak seberat awal pengkajian</p> <p>O : - Skala nyeri 5 (sedang), skala nyeri menurun dari 6 yang diukur dengan menggunakan <i>Numeric Rating Scale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meringis menurun - Pasien masih tampak bersikap protektif - Sesak napas menurun - Pasien tampak lebih tenang <p>A : Masalah nyeri teratasi sebagian P : Pertahankan intervensi</p>	<p>Risdawati</p>
4.	Intoleransi aktivitas b.d ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen d.d mengeluh lelah, dyspnea saat/setelah aktivitas, merasa lemah	<p>Senin, 20 September 2021 Pukul 08.00</p> <p>Selasa, 21 September 2021 Pukul 08.00</p>	<p>S : - Pasien masih mengeluh lemah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien masih mengeluh sesak bila melakukan suatu aktivitas <p>O : - Pasien masih tampak lemah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien masih tampak sesak <p>A : Masalah intoleransi aktivitas belum teratasi P : Lanjutkan intervensi manajemen energi</p> <p>S : - Pasien mengatakan sudah tidak merasa terlalu lemas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan sudah tidak terlalu sesak pada saat melakukan aktivitas <p>O : - Pasien tampak lebih membaik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien masih tampak sesak namun tidak separah awal pengkajian <p>A : Masalah intoleransi aktivitas teratasi sebagian P : Pertahankan intervensi manajemen energi</p>	<p>Risdawati</p> <p>Risdawati</p>

5.	Risiko infeksi b.d efek prosedur invasif	<p>Senin, 20 September 2021 Pukul 08.05</p> <p>Selasa, 21 September 2021 Pukul 08.30</p>	<p>S : - Pasien mengatakan masih merasa nyeri pada area yang terpasang drain menurun O : - Lapisan kulit tampak membaik - Mulai tampak jaringan granulasi pada area yang luka lecet - Mukosa tampak lembab - drain 100cc - Suhu tubuh 37,1 - WBC : 4,5 A : Masalah risiko infeksi teratasi sebagian P : Lanjutkan intervensi pencegahan infeksi</p> <p>S : - Pasien mengatakan nyeri pada area dada yang terpasang chest tube membaik O : - Lapisan kulit tampak membaik - Tampak jaringan granulasi pada area yang luka lecet - Mukosa tampak lembab - Suhu tubuh 36,7 - WBC : 4,5 A : Masalah risiko infeksi teratasi P : Pertahankan intervensi pencegahan infeksi</p>	<p>Risdawati</p> <p>Risdawati</p>
----	--	--	---	---

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Asuhan Keperawatan

1. Analisis Pengkajian Keperawatan

Pengkajian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada pasien dan keluarga klien. Pasien atas nama Tn. T usia 39 tahun asal Afganistan merupakan pasien dengan kasus pneumothoraks akibat kecelakaan lalu lintas. Pneumothoraks yang dialami Tn. T merupakan jenis pneumothoraks akibat trauma tumpul yang mengenai dada pasien pada saat kecelakaan terjadi. Tn. T dirawat di ruang perawatan dewasa Mamminasa Baji rumah sakit Labuang Baji Makassar. Sebelum dirawat di ruang Mamminasa Baji, Tn.T sempat dirawat di ICU selama 3 hari karena mengalami sesak yang mengakibatkan terjadinya penurunan kesadaran pada Tn. T. Pengkajian dilakukan di ruang perawatan dewasa mamminasa baji sehari setelah pasien dipindahkan dari ICU. Saat ini terpasang WSD yang bertujuan untuk mengeluarkan cairan dan udara yang terperangkap di rongga pleura akibat pneumothoraks yang dialami pasien. Pasien memiliki riwayat pernah opname di rumah sakit yang sama pada tahun 2020 akibat Covid-19. Pasien memiliki riwayat sebagai perokok aktif.

Pada kasus ini jenis pneumothoraks yang dialami oleh Tn. T adalah pneumothoraks yang disebabkan oleh trauma dada yaitu berupa kecelakaan lalu

lintas dimana berdasarkan teori, pneumothoraks akibat trauma juga menjadi penyumbang terbesar terjadinya pneumothoraks. Hampir seluruh kejadian trauma thoraks disebabkan oleh kecelakaan bermotor (Punarbawa & Suarjaya, 2019). Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Riskesdas, kejadian trauma dada di Sulawesi Selatan sendiri mencapai 2,8% dimana 71,6% disebabkan karena kecelakaan lalu lintas pada saat mengendarai motor (Tim Riskesdas, 2018). Tingginya persentasi penyebab trauma thoraks akibat kecelakaan bermotor disebabkan karena pengendara yang kadang lalai dan sering ugal-ugalan tanpa memperhatikan keselamatan diri dan orang sekitar. Hal tersebut merupakan murni kesalahan pengendara.

Kondisi ini telah disampaikan dalam Al-Qur'an Asy-Syura/42:30 yang berbunyi:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (٣٠)

Terjemahnya :

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)”.

Makna ayat di atas ialah, bahwasanya musibah yang menimpa umat manusia di muka bumi kapan dan dimanapun terjadinya, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri yakni dosa dan kemaksiatan yang kamu lakukan, paling tidak disebabkan oleh kecerobohan atau ketidak hati-hatianmu. Musibah

yang dialami itu hanyalah akibat sebagian dari kesalahanmu karena Allah tetap melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kamu sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak mengakibatkan musibah atas diri kamu. seandainya pemaafan itu tidak dilakukan-Nya, pastilah kamu semua binasa bahkan tidak ada satu binatang melata pun di pentas bumi ini (Shihab, 2012). Keterkaitan antara ayat di atas dengan kasus yang diangkat ialah menunjukkan bahwa setiap kejadian di muka bumi ini pasti ada penyebabnya yang bisa jadi merupakan akibat dari perbuatan tangan sendiri. Sebagaimana pada kasus yang dibahas ialah pneumothoraks yang dialami pasien merupakan pneumothoraks akibat trauma berupa kecelakaan lalu lintas pada saat berkendara motor yang bisa jadi diakibatkan oleh kelalaian atau ketidak hati-hatian pengendara pada saat berkendara.

Pada saat dilakukan pengkajian hari pertama Jum'at, 17 September 2021 ditemukan keluhan utama pasien berupa sesak. Pasien mengatakan sulit untuk bernapas, dada terasa berat, RR : 30x/menit, HR : 76x/menit, pengembangan dada tampak tidak simetris, terdapat retraksi otot dada, vesikuler melemah pada dada sebelah kanan, suara perkusi pada dada sebelah kanan hipersonor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (White & Eaton, 2017) dimana, dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada penderita pneumothoraks, umumnya penderitanya akan mengeluh sesak napas, nyeri dada, batuk dan ada beberapa penderita yang mengalami emfisema subkutis. Pada saat pemeriksaan, umumnya

ditemukan takipnea, hiperresonansi saat dilakukan perkusi, dan suara napas terdengar menurun atau tidak ada sama sekali pada saat dilakukan auskultasi pada pasien pneumothoraks. Sejalan dengan penelitian tersebut, (Pwidjaya et al., 2014) dalam penelitiannya terkait karakteristik pasien pneumothoraks di RSCM menyatakan bahwa gejala respirasi yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien pneumothoraks adalah sesak napas, batuk, nyeri dada, hipersonor, ronkhi, dan mengi.

Pneumothoraks merupakan kondisi dimana adanya udara dalam cavum pleura yang menyebabkan gangguan pada saat respirasi. Tekanan rongga pleura pada orang yang sehat selalu negative agar mampu mempertahankan paru-paru dalam keadaan berkembang (inflasi). Pada kasus pneumothoraks tekanan pada rongga pleura tidak negative sehingga menyebabkan paru-paru menjadi kolaps, baik sebagian maupun keseluruhan yang menyebabkan paru bergeser ke arah yang sehat, akibatnya gejala sesakpun dialami oleh penderita pneumothoraks. Sesak yang dialami oleh pasien pneumothoraks akan menyebabkan kelemahan atau terjadinya penurunan kemampuan batuk. Akibatnya, sekret akan menumpuk di jalan napas sehingga pada saat pemeriksaan akan ditemukan hasil berupa suara perkusi hipersonor dan adanya bunyi napas tambahan yaitu ronkhi (British Lung Foundation, 2019).

2. Analisis Diagnosis Keperawatan

Keluhan utama yang disampaikan pasien saat pengkajian dilakukan ialah sesak (dyspnea). Dyspnea merupakan kondisi yang menggambarkan sensasi sesak napas, ditandai dengan terhambatnya aliran udara atau keadaan sulit bernapas dan sesak di dada yang sering dikaitkan dengan penyakit jantung atau pernafasan (Muttaqin & Novianty, 2012). Terjadinya sesak pada pasien pneumothoraks diakibatkan oleh adanya hambatan upaya napas dalam hal ini terjadinya kelemahan pada otot-otot bantu pernafasan sehingga menghambat ekspansi dada. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan bahwa pada pasien pneumothoraks terjadi kondisi dimana terdapatnya udara atau terjebaknya udara di dalam rongga pleura, yang menyebabkan paru-paru terjadi kolaps dan gagal napas (British Lung Foundation, 2019).

Diagnosis utama yang muncul berdasarkan dari data pengkajian secara langsung kepada pasien Tn. T adalah pola napas tidak efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengkajian pasien mengeluh sesak napas (dyspnea), pola napas cepat (takipnea), frekuensi pernafasan di atas normal yaitu 30x/menit, terdapat penggunaan otot bantu pernafasan, pada saat auskultasi vesikuler melemah pada dada sebelah kanan, bunyi perkusi hipersonor pada dada sebelah kanan. Masalah ini ditemukan pada hari pertama pengkajian, di ruangan perawatan dewasa Mamminasa Baji.

Pola napas tidak efektif merupakan inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Biasanya, disebabkan karena adanya depresi pusat pernapasan, hambatan upaya napas (misalnya nyeri saat bernapas, kelemahan otot pernapasan). Kondisi klinis terkait yang bisa menyebabkan pola napas tidak efektif adalah trauma thoraks (PPNI, 2016).

Sesak napas yang terjadi pada pasien pneumothoraks diakibatkan oleh udara yang masuk mengisi rongga pleura. Jika terus berlanjut, penderita akan merasa gelisah akibat kesulitan bernapas. Usaha dari tubuh untuk mengkompensasi akibat dari sesak napas yang terjadi ialah bernapas cepat (takipnea), dan denyut nadi meningkat (takikardia). Keadaan ini akan bertambah parah jika tidak ditangani secara tepat dan tepat. Penurunan kesadaran akan terjadi akibat perfusi oksigen ke otak yang menurun (hipoksia). Semakin lama kondisi ini berlangsung, maka pasien akan jatuh ke fase sianosis (Punarbawa & Suarjaya, 2020).

3. Analisis Intervensi Keperawatan

Analisis intervensi pola napas tidak efektif pada pasien pneumothoraks berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) adalah manajemen jalan napas (Tim Pokja SLKI & SIKI DPP PPNI, 2018). Dimana, intervensi utama dari diagnosis pola napas tidak efektif ialah pemberian kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching*.

Breathing Exercise dan *Respiratory Muscle Stretching* merupakan intervensi yang dapat diberikan pada kasus pola napas tidak efektif. *Breathing Exercise* ialah latihan pernapasan dengan teknik bernapas secara perlahan dan rileks, menggunakan otot diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Sedangkan, *Respiratory Muscle Stretching* (RMS) merupakan latihan peregangan yang bertujuan untuk mengurangi kekakuan pada dinding dada pasien yang mengalami sesak dimana manfaat dari peregangan ini ialah meningkatkan kapasitas paru sehingga sesak napas dapat berkurang (Fajriah, 2014).

Tujuan kombinasi kedua intervensi ini, diharapkan mampu menurunkan sesak napas atau memperbaiki pola napas pada pasien pneumothoraks. Seperti hasil dari penelitian (Pahlawi & Farhani, 2021) menunjukkan bahwa pemberian intervensi fisioterapi berupa *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching* terbukti mampu memperbaiki pola napas pasien yang dibuktikan dengan adanya penurunan nilai *respiratory rate* dan *heart rate* pada pasien pneumothoraks. Selain pemberian intervensi utama dalam menangani pola napas tidak efektif, pasien juga diberikan beberapa intervensi pendukung meliputi pemberian terapi O₂ 100% dan pemberian posisi semi fowler.

Adanya terapi yang bersifat nonfarmakologis menjadi bukti bahwa apa yang disampaikan Rasulullah saw. adalah benar bahwa setiap penyakit ada obatnya kecuali tua. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, berikut :

عن جابر بن عبد الله لكلِّ داءٍ دواءٌ، فإذا أصابَ الدَّواءُ الدَّاءَ، برأ بإذنِ الله عزَّ وجلَّ

Artinya:

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (HR. Muslim).

Hadits di atas mengisyaratkan diizinkan seseorang Muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah SWT penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Meski demikian, kesembuhan kadang terjadi dalam waktu yang agak lama, jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Yunus 10:57 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (Q.S. Yunus 10:57)

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengatakan bahwa ayat di atas mengandung empat fungsi, pengajaran, obat, petunjuk serta rahmat. Dari keterangan di atas, sangat jelas bahwa selain petunjuk, al-Qur’an juga sebagai obat

bagi penyakit-penyakit jiwa, yang menghinggapi orang-orang yang beriman. Sakit berat atau ringan, fisik atau mental, merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia dan sesuatu yang tidak boleh dinyatakan bersumber dari Allah swt. Sedangkan penyakit adalah sesuatu yang dapat dikatakan buruk sehingga wajar dinyatakan bersumber dari Allah. Demikian bahwa segala sesuatu yang terpuji dan indah bersumber dari Allah swt. dan apapun yang tercela atau negative maka hendaknya terlebih dahulu dicari penyebabnya pada diri sendiri (Shihab, 2012).

4. Analisis Implementasi Keperawatan

Pada diagnosis utama yaitu pola napas tidak efektif, implementasi keperawatan dilakukan sebanyak 3 kali. Implementasi hari pertama dilakukan pada hari sabtu, 18 september 2021 pukul 08.00, implemetasi hari kedua dilakukan pada hari senin, 20 september 2021 pukul 08.30, dan implementasi hari ketiga dilakukan pada hari selasa, 21 september 2021 pukul 08.45.

Implementasi kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching* selama 3 hari terbukti mampu menurunkan sesak napas dan memperbaiki pola napas pasien. Berdasarkan teori, implementasi *breathing exercise* dapat membantu meningkatkan pemenuhan paru untuk melatih kembali otot pernapasan berfungsi dengan baik serta mencegah distress pernapasan. *Breathing exercise* dapat mencegah atelektesis dan meningkatkan fungsi ventilasi paru menjadi lebih adekuat sehingga menunjang oksigenasi jaringan (Smelter & Bare, 2013).

Respiratory Muscle Stretching memiliki manfaat pada serabut otot yaitu mempengaruhi sarcomere yang merupakan unik kontraksi dasar pada serabut otot. Pada saat terjadi suatu penguluran maka serabut otot akan terulur penuh melebihi panjang serabut otot itu pada keadaan normalnya. Ketika penguluran terjadi maka akan menyebabkan serabut yang berada pada posisi tidak teratur akan berubah posisi menjadi lurus sesuai dengan arah ketegangan yang diterima. Terjadinya perubahan dan pelurusan serabut ini maka akan memulihkan jaringan perut sehingga kembali normal. Ketika jaringan perut kembali normal, maka kekakuan yang dialami pasien pada otot-otot pernapasan akan berkurang sehingga sesak menurun (Karim et al., 2020).

Selain implementasi dari intervensi utama, implementasi pemberian terapi O₂ 100% dan posisi semi fowler juga diberikan seiring dengan diberikannya intervensi utama. Pemberian O₂ pada hari pertama diberikan kepada pasien melalui nasal kanul dengan volume 6 ltr/menit, pada hari kedua diberikan O₂ sebanyak 5 ltr/menit, dan pada implementasi hari ketiga O₂ juga diberikan sebanyak 5 ltr/menit melalui nasal kanul. Berdasarkan teori, pemberian O₂ tambahan pada pasien berupa nasal kanul 4-6 ltr/menit setara dengan konsentrasi FiO₂ sekitar 0,37 hingga 0,45 sehingga SPO₂ dapat terpenuhi (Panjwani et al., 2017).

Disamping pemberian O₂, pemberian posisi semi fowler juga menjadi implementasi yang melengkapi implementasi utama. Tujuan dari tindakan

pemberian posisi semi fowler adalah untuk menurunkan konsumsi oksigen dan meningkatkan ekspansi paru yang maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad muzaki, 2020 menunjukkan bahwa penerapan posisi semi fowler selama 3x24 jam yang sesuai dengan SOP dapat membantu mengoptimalkan RR pada klien sehingga masalah ketidakefektifan pola napas dapat teratasi dengan baik (Muzaki & Ani, 2020).

5. Analisis Evaluasi Keperawatan

Pada evaluasi hari pertama Sabtu, 18 September 2021 pukul 08.45 setelah melakukan implementasi ditemukan hasil berupa pasien mengeluh sesak, tampak penggunaan otot bantu pernapasan, RR : 29x/menit, HR : 89x/menit. Pada hari kedua dilanjutkan pemberian intervensi kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching* dengan hasil evaluasi pada Senin, 20 September 2021 Pukul 08.50 yaitu pasien mengatakan sesak sudah mulai menurun, masih terdapat penggunaan otot bantu pernapasan, RR : 27x/menit, HR : 91x/menit. Kemudian, pada hari ketiga intervensi dilanjutkan dengan evaluasi hasil Selasa, 21 September 2021 Pukul 09.00 yaitu pasien mengatakan sesak mulai menurun, penggunaan otot bantu pernapasan menurun, RR : 24x/menit, HR : 84x/menit. Hal ini menandakan bahwa pemberian terapi kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching* efektif untuk mengatasi masalah pola napas tidak efektif pada pasien pneumothoraks. Disamping intervensi utama, intervensi pendukung juga memberikan kontribusi terkait hasil evaluasi.

Hasil dari evaluasi di atas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2019) yang menyatakan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada

SPO2 dan RR sebelum dan sesudah pemberian intervensi *Deep Breathing Exercise* pada pasien post ventilasi mekanik. Sementara itu, hasil dari penelitian (Jamaluddin et al., 2018) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan status respirasi, sebelum dan sesudah diberikan RMS pada pasien asma yang ditunjukkan dengan penurunan frekuensi pernapasan pasien asma dari 23 x/menit menjadi 20x/menit.

Evaluasi dari implementasi unggulan yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa pasien mengalami perbaikan frekuensi napas, keluhan sesak menurun, perbaikan pola napas, penggunaan otot bantu pernapasan menurun, dan nadi dalam batas normal. Rencana tindak lanjut pada keluarga pasien adalah mengatur perawatan saat perawat tidak sedang berada di tempat yaitu dengan keluarga tetap memberikan intervensi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching*, dan pengaturan posisi semi fowler.

B. Analisis Evidence Based Practice in Nursing

Pemberian *Breathing Exercise* dan *Respiratory Muscle Stretching* mampu menurunkan sesak yang dialami pasien. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Pahlawi & Farhani, 2021) yang juga merupakan EBPN dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pemberian intervensi fisioterapi berupa *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching* terbukti mampu memperbaiki pola napas pasien yang dibuktikan dengan adanya penurunan nilai *respiratory rate* dan *heart rate* pada pasien pneumothoraks.

Terdapat peningkatan yang signifikan sesudah diberikan intervensi *breathing exercise*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yokogawa terjadi

peningkatan ventilasi paru secara keseluruhan, peningkatan volume tidal, dan terjadi penurunan *Respiratory Rate* pada pasien sesak (Yokogawa et al., 2018). Selain daripada itu, penelitian lain juga menunjukkan hasil pengkajian frekuensi nafas dan saturasi oksigen setelah dilakukan teknik *Breathing Exercise* di hari ketiga pada kedua subjek yaitu pada Tn. K RR : 23 x/menit dengan SPO2 91 %, sedangkan pada Tn. J RR : 24 x/menit dengan saturasi oksigen 98 %. Ada perbedaan hasil di hari terakhir penerapan yaitu dimana frekuensi nafas kedua subjek mengalami penurunan sesak nafas serta peningkatan saturasi oksigen (Sodikin et al., 2022).

Disamping itu, *respiratory muscle stretching* juga terbukti efektif dalam mengatasi masalah sesak pada pasien. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Rattes, dkk (2018) yang menyatakan bahwa pemberian RMS mampu mendorong terjadinya perubahan ventilasi, mobilitas dinding dada meningkat, hiperinflasi paru berkurang, spasme otot berkurang, penurunan sensasi dyspnea dan juga peningkatan fungsi paru secara keseluruhan (Rattes et al., 2018). Penelitian lain juga menyatakan berdasar perbedaan yang signifikan untuk tingkat dyspnea pada kelompok intervensi sebelum dan setelah diberikan latihan (Rohmah et al., 2020)

C. Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini ialah karena keterbatasan waktu, implementasi hanya dilakukan selama 3x24 jam, sehingga hanya bisa diberikan

dipagi hari dan tidak ada yang melanjutkan implementasi di siang dan malam hari sehingga proses evaluasi dianggap kurang maksimal.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan study kasus yang telah dilakukan mengenai intervensi terapi kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching* pada pasien pneumothoraks, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Gambaran hasil pengkajian pada pasien yang mengalami pneumothoraks adalah pasien mengalami dyspnea, nyeri dada, penggunaan otot bantu pernapasan, mengalami kelemahan, keterbatasan ekspansi dada, pasien juga masih terpasang WSD, dan memiliki luka lecet di beberapa bagian tubuh.
2. Diagnosis keperawatan pada pasien yang mengalami pneumothoraks adalah pola napas tidak efektif, bersihan jalan napas tidak efektif, nyeri akut, intoleransi aktivitas, dan risiko infeksi.
3. Gambaran setelah pemberian intervensi kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching* terhadap sesak pasien pneumothoraks ditemukan hasil bahwa pasien mengalami penurunan *respiratory rate*, penurunan penggunaan penggunaan otot bantu pernapasan, dan *heart rate* normal.
4. Implementasi keperawatan pada pasien yang mengalami pneumothoraks adalah terapi kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching*, pengaturan posisi semi fowler, terapi oksigen, latihan batuk efektif, manajemen energy, dan pencegahan infeksi.
5. Evaluasi keperawatan pada pasien yang mengalami pneumothoraks adalah pola napas tidak efektif teratasi sebagian, bersihan jalan napas teratasi, nyeri akut teratasi sebagian, intoleransi aktivitas teratasi sebagian, dan risiko infeksi teratasi.

B. Saran

Dari intervensi kombinasi *breathing exercise* dan *respiratory muscle stretching*, adapun saran peneliti ialah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi peneliti di kemudian hari dapat lebih mengkaji mengenai frekuensi dan durasi yang paling tepat dalam pemberian terapi ini. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan untuk menambah informasi dan mendukung teori dan fakta berdasarkan *evidence based nursing* yang telah tertera di dalamnya.

2. Bagi pelayanan keperawatan

Penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan dan dijadikan bahan masukan atau referensi dalam pemberian asuhan keperawatan dalam hal mengatasi dyspnea pada pasien pneumothoraks.

3. Bagi masyarakat

Bagi pasien atau keluarga pasien diharapkan mampu menerapkan hasil dari penelitian ini, sebab sesak atau dyspnea merupakan salah satu gejala yang dapat mengancam nyawa bagi pasien pneumothoraks.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghajanzadeh, M., Asgary, M. R., Delshad, M. S. E., & Khotbehsora, M. H. (2018). Data on The Epidemiology, Diagnosis, and Treatment of Patients with Pneumothorax. *Data in Brief*, 20, 1053–1056.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.08.063>
- British Lung Foundation. (2019). *Pneumothorax*. www.blf.org.uk/support-for-you/pneumothorax
- Fajriah. (2014). *Pengaruh Respiratory Muscle Stretching Gymnastics (RMSG) Terhadap Peningkatan Mobilitas Dinding Dada Pada Penderita Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK)*.
- GOLD. (2017). Global Initiative for Chronic Obstructive Lung A Guide for Health Care Professionals Global Initiative for Chronic Obstructive Disease. *Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease*.
- Graselia, M. N. (2019). *Analisis Praktik Klinik Keperawatan dengan Intervensi Inovasi Respiratory Muscle Stretching Terhadap Perubahan Saturasi Oksigenasi pada Pasien Asma Bronkial di Ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahid Sjahteranie Samarinda*. 2(10), 1–15.
- Jamaluddin, M., Yunani, & Widiyaningsih. (2018). Latihan Peregangan Otot Pernapasan Untuk Meningkatkan Status Respirasi Pasien Asma. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 1.
- Karim, B. A. M. T. K., Suwondo, D. dr. A. M., & Sudirman, Dr. BN, M. (2020). *Buku Panduan : Respiratory Muscle Stretch Gymnastic (RMSG) (dan Pursed Lip Breathing Exercise (PLB) Meningkatkan Volume Ekspirasi Paksa 1 (VEP 1)*. Program Pascasarjana Magister Terapan Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang.
- Kusuma, N. (2014). *Teori Model keperawatan Virginia Henderson*.
- Lestari, N. S., Agustin, W. R., & Rakhmawati, N. (2019). *The Effect Of Breathing Exercise (DBE) To The Oxygen Saturation And Respiratory Frequency On Patients With Post Ventilation Mechanics At Dr. Oen Surakarta*.
- Mertha, M., Putir, P. J. Y., & Suardana, I. ketut. (2018). Pengaruh Pemberian Deep Breathing Exercise Terhadap Saturasi Oksigen Pada Pasien PPOK. *Jurnal Gema Keperawatan*.
- Multazam, A., Rakhmawati, H. S. N., & Hidayat, M. (2021). Pemberian Kombinasi Respiratory Muscle Stretch Gymnastic (RMSG) dengan Latihan Pernapasan Buteyko dala Meningkatkan Ekspansi Dada dan Arus Puncak Ekspirasi pada

- Lansia. *Physiotherapy Health Science*, 3(2), 101–107.
- Muttaqin, A., & Novianty, A. (2012). *Asuhan Keperawatan Klien Dengan Gangguan Sistem Pernapasan : Buku Ajar*. Salemba Empat.
- Muzaki, A., & Ani, Y. (2020). Penerapan Posisi Semi Fowler Terhadap Ketidakefektifan Pola Napas Pada Pasien Congestive Heart Failure (CHF). *Nursing Science Journal (NSJ)*, 1(1), 19–24.
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis* (4th ed.). Salemba Medika.
- Nursalam. (2017). *Konsep dan Penerapan Penelitian Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika.
- Pahlawi, R., & Farhani, N. (2021). Pengaruh Breathing Exercise Dan Stertching Terhadap Penurunan Sesak Pada Kasus Pneumothoraks Bilateral. *Jurnal Fisioterapi Terapan Indonesia*, 1(1).
- Panjwani, A., Salmaniyah Medical Complex, Manama, & Bahrain. (2017). *Management of Pneumothorax with Oxygen Therapy : A Case Series*. 5(6276), 6–9. <https://doi.org/doi: 10.4081/cdr.2017.6276>
- Papagiannis, A., Lazaridis, G., Zarogoulidis, K., Papaiwannou, A., & Karavergou, A. (2015). Pneumothorax : An Up To Date “Introduction.” *Annals of Translational Medicine*, 3(4), 53. <https://doi.org/doi : 10.3978/j.issn.2305-5839.2015.03.23>
- PPNI. (2016). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (Definisi dan Indikator Diagnostik* (1st ed.). PPNI.
- PPNI. (2018). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (Definisi dan Kriteria Hasil keperawatan)* (1st ed.). PPNI.
- Punarbawa, I. W. A., & Suarjaya, P. P. (2019). *Early Identification and Basic Life Support for Pneumothoraks*.
- Punarbawa, I. W. A., & Suarjaya, P. P. (2020). Early Identification And Basic Life Support For Pneumothorax. *Ilmu Anestesiologi Dan Terapi Intensif*.
- Pwidjaya, D., Amin, Z., Suprayitno, Afifi, R., & Shatri, H. (2014). Karakteristik dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesintasan Pasien Pneumothoraks di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. *Indonesian Journal of Chest Critical and Emergency Medicine*, 1(3), 113–119.
- Rattes, C., Campos, S. L., Morais, C., Gincalves, T., Sayao, L. B., & Filho, V. C. G. (2018). Respiratory Muscle stretching Acutely Increases Expansion in Hemiparetic Chest Wall. *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 254, 16–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resp.2018.03.015>

- Rekha, K., Rai, S., Anandh, V., & D, S. S. D. (2016). Effect Of Stretching Respiratory Accessory Muscles In Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *Asian Journal of Pharmaceutical And Clinical Research*, 9(1), 105–108.
- Rohmah, U. N., Amin, M., & Makhfudli. (2020). THE COMBINATION OF UPPER LIMB EXERCISE AND RESPIRATORY MUSCLE STRETCH GYMNASTICS ON DYSPNEA AMONG COPD PATIENTS. *Jurnal INJEC*, 5(1), 87–94.
- Rusli, Muthiah, & Hasbiah. (2015). *Fisoterapi Respirasi*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. V). Lentera Hati.
- Smelter, S. C., & Bare, B. G. (2013). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth* (8th ed.). EGC.
- Sodikin, M., Purwono, J., & Utami, I. T. (2022). Penerapan Teknik Deep Breathing Exercise Untuk Mengatasi Sesak Napas Pada Pasien PPOK. *Jurnal Cendikia Muda*, 2(1), 110–117.
- Tim Pokja SLKI & SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia : Definisi dan Tindakan Keperawatan* (1st ed.). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Riskesdas. (2018). *laporan Nasional RISKESDAS 2018*. Lembaga Penerbit Balitbangkes.
- Utama, S. Y. A. (2018). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Sistem Respirasi* (1st ed.). Deeppublis.
- White, D., & Eaton, D. A. (2017). Pneumothorax and Chest Drain Insertion. *Surgery (Oxford)*, 35(5), 281–284. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mpsur.2017.02.010>
- Wilkinson, J. M. (2012). *Buku Saku Diagnosa Keperawatan* (E. Wahyuningsih (ed.); 9th ed.). EGC.
- World Health Organization. (2016). Global Status Report on Road Safety. *WHO Librar. Ed.* <https://doi.org/Doi:978 92 4 156506 6>. WHO/NMH/NVI/15.6.
- Yokogawa, M., Kurebayashi, T., Ichimura, T., Nishino, M., Miaki, H., & Nakagawa, T. (2018). Comparison Of Two Instructions For Deep Breathing Exercise : Non-specific And Diaphragmatic Breathing. *The Journal of Physical Therapy Science*, 30(4), 614–618.
- Yunani, A, W., & Jamaluddin. (2018). Terapi Peregangan Otot Pernafasan Untuk

Kapasitas Vital Paru Pasien Asma. *URECOL*, 62–67.



LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Risdawati, lahir di Tenete pada tanggal 03 April 1998. Penulis merupakan anak terakhir dari 7 bersaudara dari pasangan bapak Muh. Ramli dan ibu Radiana. Penulis dengan nama panggilan Risda ini mulai mengikuti pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2004 di SDN 60 Tanete dan selesai pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN 410 Tanete pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di MAN Tanete Bulukumba pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis kemudian melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi yaitu UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2020 dengan jurusan S1 Keperawatan, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas yang sama dengan jurusan Profesi ners pada tahun 2021 dan selesai pada tahun 2022. Dengan ucapan Syukur Alhamdulillah penulis saat ini telah selesai mengerjakan studi dengan judul Tugas akhir “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pneumothoraks Dengan Pola Napas Tidak efektif Menggunakan Intervensi Kombinasi *Breathing Exercise* Dan *Respiratory Muscle Stretching* Di RSUD Labuang Baji Makassar”.



**PENGARUH BREATHING EXERCISE DAN STRETCHING TERHADAP
PENURUNAN SESAK PADA KASUS PNEUMOTHORAX BILATERAL**
**THE EFFECT OF BREATHING EXERCISE AND STRETCHING FOR
DECREASE BREATHING DIFFICULTIES IN BILATERAL
PNEUMOTHORAX**

Riza Pahlawi¹, Nida Farhani¹

¹Program Studi Fisioterapi Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia
(Corresponding author: rizapahlawi09@gmail.com)

ABSTRACT: The purpose of this case study is to determine the effectiveness of two exercises, namely, breathing exercise and stretching which are the modalities of physiotherapy in dealing with cardiorespiratory cases. Pneumothorax is caused by the presence of air or gas in the pleural space. This causes the lungs to collapse partially or totally, and decrease the degree of oxygenation and ventilation in the lungs. Pneumothorax is classified into primary spontaneous pneumothorax (PSP) and secondary spontaneous pneumothorax (CNS). PSP occurs in healthy people without underlying lung disease. CNS is caused by rupture of damaged lung tissue and occurs in patients who have been diagnosed with a previous lung disease, mycobacterial tuberculosis being the most common cause of CNS. Besides the two types of pneumothorax there are also traumatic pneumothorax and tension pneumothorax. Chest tube drainage or also called thoracostomy tube is usually used for people with pneumothorax to drain fluid, blood, or air from the pleural cavity. The combination of exercises in the form of deep breathing exercise and active assisted stretching is expected to reduce tightness so that the patient is able to move optimally. The reduction in patient tightness can be measured using the dyspnea severity scale parameter. Clinical questions arise, "Can breathing exercise and stretching have a better effect on reducing congestion in bilateral pneumothorax patients?" To answer this question, evidence was traced to 2 data bases, Pubmed and Science Direct. Keywords used are Deep breathing AND dyspnea, Respiratory muscle stretching AND dyspnea, and Deep breathing OR Breathing exercise AND oxygen saturation AND Heart rate with full text article inclusion criteria and publications from 2015 - 2020.

In the search found 5 articles that meet the inclusion criteria. Then the search phase continued with reading the entire article and found articles that corresponded to 2 articles in Pubmed and 2 articles in Science Direct.

Keywords: pneumothorax, chest tube drainage, deep breathing exercise, respiratory muscle stretching,

ABSTRAK: Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui efektifitas dua latihan yaitu, breathing exercise dan stretching yang menjadi modalitas fisioterapi dalam menangani kasus-kasus kardiorespirasi. Pneumothorax disebabkan oleh adanya udara atau gas di ruang pleura. Hal tersebut menyebabkan paru-paru kolaps secara parsial atau total, serta penurunan derajat oksigenasi dan ventilasi dalam paru-paru. Pneumothorax diklasifikasikan menjadi primer spontan pneumothorax (PSP) dan sekunder spontan pneumothorax (SSP). PSP terjadi pada orang sehat tanpa penyakit paru yang mendasarinya. SSP disebabkan oleh pecahnya jaringan paru yang rusak dan terjadi pada penderita yang telah didiagnosis dengan penyakit paru sebelumnya, mycobacterial tuberculosis menjadi penyebab paling umum dari SSP. Selain dua jenis pneumothorax juga terdapat traumatic pneumothorax dan tension pneumothorax. Chest tube drainage atau disebut juga tube thoracostomy biasanya digunakan bagi penderita pneumothorax untuk mengalirkan cairan, darah, atau udara dari rongga pleura. Kombinasi latihan berupa pemberian deep breathing exercise dan active assisted stretching diperkirakan mampu mengurangi sesak sehingga pasien mampu beraktivitas secara optimal. Penurunan sesak pasien dapat diukur menggunakan parameter dyspnea severity scale. Muncul pertanyaan-pertanyaan klinis, "Apakah pemberian breathing exercise dan stretching dapat memberikan efek yang lebih baik untuk menurunkan sesak pada pasien pneumothorax bilateral?" untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelusuran bukti pada 2 data base yaitu Pubmed dan Science Direct. Kata Kunci yang digunakan adalah Deep breathing AND dyspnea, Respiratory muscle stretching AND dyspnea, dan Deep breathing OR Breathing exercise AND oxygen saturation AND Heart rate dengan kriteria inklusi artikel full teks dan publikasi sejak tahun 2015 - 2020.

Pada penelusuran didapatkan 5 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Kemudian tahap pencarian dilanjutkan dengan membaca keseluruhan artikel dan ditemukan artikel yang sesuai sebanyak 2 artikel pada Pubmed dan 2 artikel pada Science Direct.

Kata Kunci : pneumothorax, chest tube drainage, deep breathing exercise, respiratory muscle stretching,

Risdawati

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	19% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	9% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	4%
2	repository.unair.ac.id Internet Source	2%
3	idoc.pub Internet Source	2%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
5	repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	1%
6	es.scribd.com Internet Source	1%
7	askeporg.blogspot.com Internet Source	1%
8	www.stikesmukla.ac.id Internet Source	1%
9	www.scribd.com Internet Source	1%
10	jurnal.akperdharmawacana.ac.id Internet Source	1%
11	wadung.wordpress.com Internet Source	1%
12	www.repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	1%
13	repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	1%
14	core.ac.uk	1%