

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN POST HEMOROIDEKTOMI  
DENGAN MASALAH NYERI MENGGUNAKAN INTERVENSI KOMBINASI  
KOMPRES DINGIN DAN TERAPI MUROTTAL AI-QUR'AN  
DI RUANG ICURSUD LABUANG BAJI MAKASSAR**



**Tugas Akhir Ners**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Ners Jurusan Keperawatan  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

SRI MULIANA, S.KEP  
NIM: 70900120047

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Muliana, S.Kep  
NIM : 70900120047  
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 24 Agustus 1998  
Jurusan/Prodi : Program Studi Profesi Ners  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Kajenjeng dlm 6 no. 3 Perumnas Antang  
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pasien Post Hemoroidektomi Dengan Masalah Nyeri Menggunakan Intervensi Kombinasi Kompres Dingin Dan Terapi Murottal Al-Qur'an Di Ruang ICU RSUD Labuang Baji Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Januari 2022

Penyusun

Sri Muliana, S.Kep  
70900120047

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Sri Muliana, S.Kep NIM: 70900120047, mahasiswa Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pasien Post Hemoroidektomi Dengan Masalah Nyeri Menggunakan Intervensi Kombinasi Kompres Dingin Dan Terapi Murottal Al-Qur'an Di Ruang ICU RSUD Labuang Baji Kota Makassar", memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 24 Januari 2022



Ardian Adhiwijaya, S.Kep.,Ns.,M.Kep  
Pembimbing I



Musdalifah, S.Kep.,Ns.,M.Kep  
Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pasien Post Hemoroidektomi Dengan Masalah Nyeri Menggunakan Intervensi Kombinasi Kompres Dingin Dan Terapi Murottal Al-Qur'an Di Ruang ICU RSUD Labuang Baji Kota Makassar", yang disusun oleh Sri Muliana, S.Kep, NIM: 70900120047, mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 28 Januari 2022 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam Program Studi Profesi Ners.

**Makassar, 28 Januari 2022 M**  
**26 Jumadil Akhir 1443 H**

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep.,Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Ilhamsyah, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Ardian Adhiwijaya, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Musdalifah, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,




**Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes**  
NIP:198007012006042002

## DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	
A. Konsep Medis .....	8
B. Konsep Keperawatan .....	18
C. Evidence Based Practice Nursing (EBPN) .....	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	
A. Rancangan Studi Kasus.....	60
B. Subyek Studi Kasus .....	60
C. Fokus Studi Kasus.....	60
D. Instrumen Studi Kasus .....	61
E. Prosedur Studi Kasus .....	61
F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus .....	62
G. Analisis Data dan Penyejiaan Data.....	62
H. Etika Studi Kasus.....	63
BAB IV LAPORAN KASUS .....	
A. Pengkajian.....	65

C. Diagnosis Keperawatan.....	78
D. Intervensi Keperawatan.....	79
E. Implementasi Keperawatan.....	81
F. Evaluasi Keperawatan.....	85
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	
A. Analisis Asuhan Keperawatan .....	88
B. Analisis Intervensi EPBN .....	96
C. Keterbatasan.....	100
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran-Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	104
<b>LAMPIRAN.....</b>	107



## ABSTRAK

Nama : Sri Muliana  
NIM : 70900120047  
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pasien Post Hemoroidektomi dengan Masalah Nyeri Menggunakan Intervensi Kombinasi Kompres Dingin dan Terapi Murottal Al-Qur'an di Ruang ICU RSUD Labuang Baji Kota Makassar

---

**Latar Belakang:** Nyeri merupakan masalah yang sering muncul pada pasien pasca operasi namun tidak menutup kemungkinan masalah lain pun dapat muncul. Pembedahan hemoroidektomi merupakan pengobatan yang paling efektif dan sangat dianjurkan untuk pasien dengan wasir internal derajat tinggi (kelas III dan IV), wasir eksternal dan campuran, dan wasir berulang. Post hemoroidektomi penggunaan tampon di kanalis analis menjadi penyebab utama nyeri 24 jam karena tampon menyebabkan spasme internal sehingga timbul regangan dan tekanan saraf perifer di kanalis analis. Sebagai seorang perawat tugas kita adalah membantu pasien dalam mengatasi masalah nyeri yang dirasakan dengan pendekatan non-farmakologi yaitu dengan pemberian kompres dingin dan terapi Murottal Al-Qur'an. **Tujuan:** Menganalisis asuhan keperawatan pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri akut menggunakan intervensi kombinasi kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an. **Metode:** Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan pendokumentasian. Pelaksanaan intervensi kombinasi kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an dilakukan 1 kali sehari dalam 2 hari pemberian. **Hasil:** Analisis studi kasus pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri dengan intervensi kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an didapatkan hasil tingkat nyeri yang di rasakan pasien berkurang setelah dari skala nyeri 7 (nyeri berat) menjadi skala nyeri 3 (nyeri ringan) **Kesimpulan:** berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa pemberian intervensi kompres dingin selama  $\pm 20$  menit dan terapi murottal dengan durasi  $\pm 25$  menit selama 2 hari menunjukkan bahwa terjadi penurunan intensitas nyeri. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an efektif dilakukan dalam membantu menurunkan intensitas nyeri pada pasien post hemoroidektomi.

**Kata Kunci :** *Post Hemoroidektomi, nyeri, kompres dingin, terapi murottal*



## ABSTRACT

**Name** : Sri Muliana  
**NIM** : 70900120047  
**Title** : *Analysis of Nursing Care for Post Hemorrhoidectomy Patients with Pain Problems Using Combination Intervention of Cold Compress and Murottal Therapy Al-Qur'an in the ICU Room at Labuang Baji Hospital, Makassar City*

---

**Background:** Pain is a problem that often arises in postoperative patients, but it is possible that other problems can arise. Surgical hemorrhoidectomy is the most effective treatment and is highly recommended for patients with high grade internal hemorrhoids (class III and IV), external and mixed hemorrhoids, and recurrent hemorrhoids. Post hemorrhoidectomy the use of tampons in the anal canal is the main cause of 24-hour pain because tampons cause internal spasms, causing strain and pressure on the peripheral nerves in the anal canal. As nurses, our task is to assist patients in overcoming their pain problems with a non-pharmacological approach, namely by giving cold compresses and Murottal Al-Qur'an therapy. **Purpose:** Analyzing nursing care in post hemorrhoidectomy patients with acute pain problems using a combination intervention of cold compresses and murottal Al-Qur'an therapy. **Method:** The type of research used in this study is a case study with data collection techniques through interviews, observation, physical examination, and documentation. The implementation of the intervention of a combination of cold compresses and murottal Al-Qur'an therapy was carried out once a day for 2 days of administration. **Results:** Analysis of case studies in post hemorrhoidectomy patients with pain problems with the intervention of cold compresses and murottal Al-Qur'an therapy, the results showed that the level of pain felt by the patient was reduced from a pain scale of 7 (severe pain) to a pain scale of 3 (mild pain). **Conclusion:** Based on the results of the evaluation of the cases carried out, it was concluded that giving cold compresses for  $\pm 20$  minutes and murottal therapy with a duration of  $\pm 25$  minutes for 2 days showed that there was a decrease in pain intensity. This shows that giving cold compresses and murottal Al-Qur'an therapy are effective in helping reduce pain intensity in post hemorrhoidectomy patients.

**Keywords:** Post Hemorrhoidectomy, pain, cold compress, murottal Al-Qur'an therapy

ALAUDDIN  
MAKASSAR



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil' alamin segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan semesta alam yang telah memberi banyak berkah kepada penyusun, diantaranya keimanan dan kesehatan serta kesabaran sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Salam dan shalawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai karena penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners yang berjudul "Kombinasi Intervensi Kompres Dingindan Terapi Murottal Al-Qur'an pada Pasien Nyeri Post Hemoroidektomi" ini dibuat memenuhi syarat ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN alauddin Makassar.

Dalam penyusunan tugas akhir ners ini, penulis dihadapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan, namun atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, doa restu orang tua serta izin Allah swt., akhirnya hambatan dan tantangan tersebut dapat diatasi serta mencapai tahap penyelesaian.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, beserta seluruh jajarannya yang telah memberi penulis kesempatan dalam menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A., M.Kes, para wakil dekan, dan seluruh staf akademik yang memberikan bantuan kepada penyusun selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr.Patimah,S.Kep.,Ns.,M.Kep, selaku Ketua Program Studi Profesi Ners Keperawatan UIN Alauddin Makassar

4. Ns. Ardian Adhiwijaya, S.Kep.,M.Kep dan Ns. Musdalifah, S.Kep., M.Kep selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini
5. Ns. Ilhamsyah, S.Kep.,M.Kep selaku Penguji utama dan Bapak Dr. H. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag selaku Penguji agama atas saran, kritik, arahan dan bimbingannya yang diberikan sehingga penulis dapat menghasilkan karya terbaik yang dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain.
6. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang begitu banyak membantu dalam penyusunan tugas akhir ners ini.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ners ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karta tulis ini. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon do'a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian dimasyarakat nantinya. Jazakumullahu khairon. Wassalamu'Alaikum Wr. Wb..

**Makassar, 1 Desember 2021**

Sri Muliana, S.Kep

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hemoroid atau wasir yaitu keadaan anorektal yang didefinisikan sebagai pembesaran pada vena hemoroidialis yang melalui kanal anus atau rectum yang disebabkan karena adanya dilatasi abnormal dan distorsi saluran vaskular, bersama dengan perubahan destruktif pada jaringan ikat pendukung di dalam bantalan anus, sehingga menyebabkan nyeri, rasa tidak nyaman dan menyebabkan perdarahan setelah defekasi (Tri Utami & Ganik Sakitri, 2020). Kejadian hemoroid biasanya terjadi pada usia 50 tahun namun tidak menutup kemungkinan hemoroid juga bisa terjadi pada usia remaja. Malahayati, (2016) rentan usia diatas 50 tahun ditemukan 50% populasi mengalami hemoroid, menurut data WHO (World Health Organization) menunjukkan jumlah hemoroid di asia tenggara pada tahun 2019 mencapai 285 jiwa dan diperkirakan meningkat menjadi 350 jiwa, pada tahun 2030 prevalensi hemoroid sekitar 5,9% (Tri Utami & Ganik Sakitri, 2020; Sari, 2021).

Di Indonesia sendiri penderita hemoroid terus bertambah. Menurut data Depkes tahun 2008, prevalensi hemoroid di indonesia adalah sekitar 5,7%, namun hanya 1,5% saja yang terdiagnosa. Data Riskesdas tahun 2007 menyebutkan ada 12,5 juta jiwa penduduk indonesia mengalami hemoroid, maka secara epidemiologi diperkirakan pada tahun 2030 prevalensi hemoroid di Indonesia mencapai 21,3 juta orang (Rezkita, 2020).

Pembedahan merupakan tindakan membersihkan atau membuang jaringan yang terkontaminasi atau jaringan yang mati dengan cara membuat kulit terbuka

dan melukai kulit sehingga merangsang impuls nyeri menuju saraf sensorik (serabut A-delta dan serabut C) diaktifkan kemudian di transmisikan ke kornus posterior di korda spinalis lalu saraf aferen akan mempersepsikan nyeri ke otak (Tri Utami & Ganik Sakitri, 2020). Pembedahan adalah pengobatan yang paling efektif dan sangat dianjurkan untuk pasien dengan wasir internal derajat tinggi (kelas III dan IV), wasir eksternal dan campuran, dan wasir berulang. Pilihan bedah yang paling populer adalah hemoroidektomi terbuka atau tertutup, hemoroidopeksi dengan stapler, dan ligasi arteri hemoroid yang dipandu Doppler. Masing-masing memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda dan profil komplikasi yang berbeda-beda, dan tindakan tersebut perlu didiskusikan dengan pasien (Cengiz & Gorgun, 2019).

Dalam buku “Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia” oleh (PPNI, 2017) disebutkan kemungkinan masalah bisa timbul pada pasien post hemoroidektomi yaitu masalah nyeri yang ditandai karena adanya iritasi, tekanan, dan sensitifitas pada area rectum akibat penyakit anorectal dan spasme sfingter pasca operatif, dapat menimbulkan resiko infeksi yang berhubungan dengan adanya port d’entr ee kuman karena kerusakan jaringan, masalah nyeri juga timbul akibat terlalu mengejan saat defekasi. Beberapa ahli bedah masih menggunakan tampon pada pasien hemoroid gunanya untuk mengurangi perdarahan. Penggunaan tampon di kanalis analis menjadi penyebab utama nyeri 24 jam pertama post hemoroidektomi karena tampon menyebabkan spasme internal sehingga timbul regangan dan tekanan saraf perifer di kanalis analis (Rohmani, 2018)

Nyeri merupakan masalah yang sering muncul pada pasien post hemoroidektomi tetapi tidak menutup kemungkinan permasalahan lain pun dapat muncul. Lebih dari 80% pasien yang menjalani prosedur pembedahan mengalami nyeri pasca operasi akut dan sekitar 75% dari mereka yang mengalami nyeri pasca operasi melaporkan tingkat keparahannya sebagai sedang, berat, hingga nyeri yang tidak tertahankan. Nyeri yang tidak terkontrol secara negatif mempengaruhi kualitas hidup, fungsi, dan pemulihan fungsional, risiko komplikasi pascao perasi, dan risiko nyeri pascaooperasi yang persisten (Chou, 2016). Sebagai seorang perawat peran kita adalah membantu pasien dalam mengatasi masalah nyeri yang dirasakan (menggunakan pendekatan/manajemen farmakologis maupun non-farmakologis) (Sagitha, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rohmani, 2018 menunjukkan adanya perbedaan penurunan nyeri setelah diberi kompres dingin di leher belakang (tengkuk) pada pasien post hemoroidektomi yang terpasang tampon. Kompres dingin dapat mengurangi prostaglandin yang memperkuat reseptor nyeri, menghambat proses inflamasi dan merangsang pelepasan endorphin. Kompres dingin mengurangi transmisi nyeri melalui serabut A-delta dan serabut C yang berdiameter kecil serta mengaktivasi serabut A-beta yang berdiameter lebih cepat dan besar. Pengaruh kompres dingin di leher belakang yaitu untuk menghambat sensasi nyeri yang akan dihantarkan oleh impuls saraf ke sistem saraf pusat (otak) (Tri Utami & Ganik Sakitri, 2020).

Selain pemberian kompres dingin, salah satu manajemen nyeri yaitu terapi murottal yang merupakan kumpulan audio yang berisi ayat dan surah dalam Al-

Qur'an yang dilantunkan oleh seorang qori'/qori'ah yang fokus pada kebenaran bacaannya. Terapi murottal dapat mengeluarkan neurotransmitter (Benzodiazepine) yang fungsinya memberikakn perasaan rileks/tenang.Terapi ini juga berfungsi menurunkan ketegangan saraf dan menurunkan frekuensi jantung. Risnah (2021) mengatakan bahwa terapi murottal merupakan terapi yang dapat dilakukan oleh siapapun dan dapat pasien gunakan jika ingin melakukan terapi murottal secara mandiri, juga dapat menerapkannya sendiri ketika pulang di rumah.

Terdapat firman Allah yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman juga sebagai penawar atau penyembuh berbagai penyakit seperti yang telah dijelaskandalam QS.Yunus 10): 57

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya :

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (QS.Yunus 10 :57).

#### **Tafsir QS. Yunus (10) : 57 Oleh Muhammad Quraish Shihab:**

Wahai umat manusia, telah datang kepada kalian kitab Allah yang disampaikan melalui rasul-Nya, Muhammad. Di dalamnya terdapat peringatan untuk taat dan beriman serta nasihat untuk melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan. Di dalamnya juga terdapat kisah-kisah orang sebelum kalian agar dapat dijadikan bahan renungan dan juga terdapat anjuran untuk melakukan pengamatan

terhadap rahasia-rahasia alam raya, sehingga kalian dapat menyadari keagungan ciptaan-Nya. Selain itu, kitab ini pun mengandung terapi penyakit hati, semisal kemusyrikan dan kemunafikan. Kitab yang diturunkan ini (Al-quran) merupakan pedoman untuk mendapatkan jalan kebenaran. Semua itu adalah rahmat bagi orang-orang mukmin yang menerimanya dengan baik (Kementerian Agama RI, 2019).

## B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dengan pertanyaan berikut : “Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri menggunakan intervensi kombinasi kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur’an di ruang ICU RSUD Labuang Baji Makassar?”

## C. Tujuan penelitian

### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri menggunakan intervensi kombinasi kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur’an di ruang ICU RSUD Labuang Baji Makassar.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran hasil pengkajian pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri akut di Ruang *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Labuang Baji Makassar.

- b. Untuk mengetahui diagnosis keperawatan pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri akut di Ruang *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Labuang Baji Makassar.
- c. Untuk mengetahui gambaran analisis intervensi terapi kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri akut di Ruang *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Labuang Baji Makassar.
- d. Untuk mengetahui implementasi keperawatan pada pasien post Hemoroidektomi dengan masalah nyeri akut di Ruang *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Labuang Baji Makassar.
- e. Untuk mengetahui evaluasi keperawatan pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri akut di *Ruang Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Labuang Baji Makassar.

#### D. Manfaat

##### 1. Manfaat Teoritis


Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar praktik dalam memberikan intervensi pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri menggunakan intervensi terapi kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an di RSUD Labuang Baji Makassar

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien nyeri post hemoroidektomi dalam



pemberian asuhan keperawatan pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri menggunakan intervensi kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Medis

##### 1. Definisi Hemorhoid

Hemoroid atau wasir yaitu gangguan sirkulasi darah berupa pelebaran vena yang pada daerah anus dan perianus yang disebabkan oleh bendungan dalam pembuluh vena. Hemoroid disebabkan karena konstipasi kronik dan uterus gravidus, selain itu adanya bendungan sentral seperti bendungan susunan portal pada sirosis hati, pembesaran prostat, atau tumor pada rectum dan penyakit jantung kongestif (Bagian Patologi F.K.UI, 1999 dalam Natasa, 2019). Hemoroid akibat pelebaran pleksus vena hemoroidalis interna masih belum diketahui secara jelas. Letak pleksus vena hemoroidalis interna yaitu di rongga submukosa di atas valvula morgagni. Kanalis anal memisahkannya dari pleksus vena hemoroidalis eksterna, tetapi kedua rongga berhubungan di bawah kanalis anal, yang submukosanya melekat pada jaringan yang mendasarinya untuk membentuk depresi inter hemoroidalis. Hemorhoid sangat umum dan berhubungan dengan peningkatan tekanan hidrostatis pada sistem porta, seperti selama kehamilan, mengejan saat defekasi, atau dengan sirosis hepatis. (Isselbacher, 2000 dalam Natasa, 2019).

##### 2. Etiologi

Hemoroid timbul karena adanya pembengkakan, dilatasi atau inflamasi vena hemoroidalis yang disebabkan oleh beberapa risiko/pencetus, seperti :

- a. Mengedan pada saat defekasi

- b. Saat defekasi lebih banyak menggunakan jamban duduk, terlalu lama duduk di jamban sambil membaca dan merokok
- c. Peningkatan tekanan intra abdomen karena tumor
- d. Kehamilan (disebabkan tekanan pada abdomen dan perubahan hormonal)
- e. Faktor usia
- f. Konstipasi yg sudah kronik
- g. Diare akut yang berlebihan
- h. Hubungan seks perianal
- i. Kurang minum air dan kurang makan-makanan yang berserat seperti sayur dan buah
- j. Kurang melakukan olahraga (Nurarif. A.H dan Kusuma. H, 2015 dalam Natasa, 2019).

### 3. Klasifikasi

Menurut asalnya penyakit hemoroid dibagi menjadi 2 macam yang pertama penyakit hemoroid interna dan hemoroid eksterna (Sukurokhman, 2018). Wasir umumnya diklasifikasikan berdasarkan lokasi dan tingkat prolapsnya

#### a. Hemoroid Internal

Hemoroid internal merupakan bantalan vaskuler yang di dalamnya terdapat jaringan submukosa pada rektum sebelah bawah hemoroid internal berasal dari pleksus vena hemoroidalis inferior di atas garis dentate (dinding kanal anus) dan ditutupi oleh mukosa, hemoroid interna sering terdapat pada tiga posisi primer, yaitu kanan depan, kanan belakang, dan kiri lateral

(Sjamsuhidajat, 1998 dalam Natasa, 2019). Trombosis hemoroid juga terjadi di pleksus hemoroidalis interna. Trombosis pleksus hemoroidalis atau terdapatnya benjolan pada trombosis dapat menyebabkan nyeri mendadak, kadang terjadi perdarahan (David, C, 1994 dalam Natasa, 2019).

b. Hemoroid Eksternal

Hemoroid eksternal adalah pelebaran vena hemoroidalis dari pleksus yang terletak di bawah garis dentate (dinding kanal anus) dan ditutupi oleh epitel skuamosa. Terdapat 3 jenis hemoroid eksternal yaitu hemoroid biasa yang terletak pada distal linea pectinea, trombosis atau benjolan hemoroid yang terjepit dan skin tags (Lohsiriwat, 2012).

c. Hemoroid Campuran (Internal-Eksternal)

Hemoroid campuran ini muncul di atas dan di bawah garis dentate (dinding kanal anus). Hemoroid internal dinilai penampilannya dan tingkat prolapsnya, yang dikenal sebagai klasifikasi Goligher:

- 1) Hemoroid derajat I : Bantalan anus berdarah tetapi tidak prolaps,
- 2) Hemoroid derajat II : Bantalan anus prolaps melalui anus saat mengejan tetapi berkurang secara spontan;
- 3) Hemoroid derajat III : Bantalan anus prolaps melalui anus saat mengejan atau beraktivitas dan memerlukan penggantian manual ke dalam lubang anus;
- 4) Hemoroid derajat IV : Prolaps tetap keluar setiap saat dan tidak dapat direduksi. Hemoroid internal yang mengalami trombosis akut dan terkurung dan hemoroid

tertrombosis terkurung yang melibatkan prolaps mukosa rectalmelingkar juga merupakan hemoroid derajat empat (Lohsiriwat, 2012).

#### 4. Patofisiologi

Hemoroid adalah kumpulan jaringan pembuluh darah, otot polos, dan jaringan ikat yang terletak di sepanjang saluran anus dalam tiga kolom posisi lateral kiri, anterior kanan, dan posterior kanan. Karena beberapa tidak mengandung dinding otot, kelompok ini dapat dianggap sinusoid daripada arteri atau vena. Hemoroid disebabkan karena obstruksi vena sekunder akibat kongesti dan hipertrofi bantalan anus, prolaps atau perpindahan bantalan anus ke bawah, penghancuran jaringan ikat penahan, dan dilatasi abnormal vena pleksus hemoroid interna. Faktor lain, seperti keturunan, usia, tonus sfingter ani, diet, pekerjaan, konstipasi, dan kehamilan, juga telah terlibat dalam penyebab terjadinya hemoroid. Penyakit hati kronis yang disertai hipertensi portal juga dapat mengakibatkan hemoroid, karena vena hemoroidalis superior mengalirkan darah ke sistem portal. Selain itu sistem portal tidak mempunyai katup, sehingga mudah terjadi aliran balik (Sardinha & Corman, 2002; Sun & Migaly, 2016).

#### 5. Manifestasi Klinis

- a. Perdarahan
- b. Nyeri
- c. Anemia biasa terjadi karena perdarahan hemoroid yang berulang
- d. Benjolan/pembengkakan di daerah anus

- e. Ketidaknyamanan/nyeri
  - f. Keluar lendir
  - g. Rasa gatal karena iritasi di daerah anus (Ramani, 2021)
6. Penatalaksanaan
- a. Manajemen keperawatan pada pasien yaitu dengan
    - 1) Krim dan salep topikal: Krim atau supositoria bebas (OTC), yang mengandung hidrokortison. Ada juga pembalut yang mengandung witch hazel yang bisa dioleskan ke kulit.
    - 2) Kompres dingin: dengan menerapkan ini ke daerah yang terkena dapat menurunkan pembengkakan dan jika dilakukan post operasi pada tengkuk dapat membantu menurunkan nyeri.
    - 3) Mandi sitz menggunakan air hangat: Mandi sitz dapat meredakan gejala terbakar atau gatal.
    - 4) Analgesik: Beberapa obat penghilang rasa sakit, seperti aspirin, ibuprofen, dan asetaminofen dapat mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan.
    - 5) Anastesi topical atau preparat steroid, seperti lidokain (xyiocaine) atau krim steroid dapat mengurangi nyeri dan gatal (Ramani, 2021)
  - b. Manajemen bedah beberapa prosedur bedah yang digunakan untuk menangani hemoroid :
    - 1) Skleroterapi, dilakukan dengan injeksi sgen sklerosing (zat yang dapat menyebabkan pembentukan jaringan parut) diantara vena vena anus dan sekitarnya. Prosedur ini akan menciptakan reaksi inflamasi yang menyebabkan trombosis dan fibrosis. Prosedur ini dapat dilakukan

sebagai pasien rawat jalan tetapi membutuhkan 1 hingga 4 injeksi tipe 5 atau 7 hari. Agen sklerosing juga dapat melukai kanal anus.

- 2) Ligasi, Sebuah prosedur yang umum dilakukan untuk hemoroid internal. Pasien biasanya bisa melanjutkan aktivitas normal sesuai prosedur. Ligasi tidak dapat di gunakan untuk hemoroid eksternal dan mungkin hanya efektif sementara waktu. Dokter bedah memasukan ligator, suatu tabung kecil dengan dua lumen yang memiliki pita karet kecil pada lapisan dalam, melalui anoskop. Hemoroid kemudian ditangkap dengan forshep dan ditarik melalui ligator, pita karet kemudian diletakan disekitar leher dari hemoroid tersebut. Walaupun dapat terjadi perdarahan, permasalahan yang sering timbul adalah rasa nyeri saat menjalani prosedur ini. Pasien mengkonsumsi laksatif setelah prosedur ini untuk menghindari trauma lokal dari masa feses yang keras. Dalam 8 sampai 10 hari pita karet akan memotong leher jaringan hemoroid dan jaringan sisa akan lepas
- 3) Cryosurgery (pembekuan), dari hemoroid merupakan suatu prosedur rawat jalan yang jarang dilakukan sekarang. Masalah yang timbul dengan prosedur ini adalah periode drainase yang lama. Jumlah drainase busuk yang banyak, adanya polip kulit sisa yang keras, dan kemungkinan penghancuran hemoroid yang inkomplet.
- 4) Laser, penghancuran hemoroid dengan dengan cara dibakar dengan laser, sedikit perdarahan dan prosedur ini dapat menimbulkan nyeri.
- 5) Hemoroidektomi, vena hemoroid akan dieksisi, dan area potongan bisa dibiarkan terbuka untuk sembuh melalui granulasi, akan ditutup oleh jaitan.

Metode terbuka sangat nyeri tetapi memiliki angka keberhasilan yang tinggi. Komplikasi yang terjadi dapat berupa infeksi, pembentukan striktur saat penyembuhan luka, dan perdarahan. Perdarahan dapat terjadi segera setelah operasi atau sekita 10 hari kemudian sebagai akibat lepasnya jaringan hemoroid (Sukurokhman, 2018).

Menurut Weni, 2012 dalam Sukurokhman (2018) tindakan operatif ditunjukkan untuk hemoroid interna drajat IV dan eksterna atau semua drajat hemoroid yang tidak berespon terhadap pengobatan medis yaitu prosedur ligasi pita karet, hemoroidektomi kriosirugi, laser, hemoroidektomi. Penatalaksanaan tindakan non operatif pada pasien dengan hemoroid sebagai berikut :

- a) Fotokoagulasi inframerah, diatermi bipolar, terapi laser adalah teknik terbaru yang digunakan untuk melekatkan mukosa ke otot yang mendasarinya.
- b) Injeksi larutan sklerosan juga efektif untuk hemoroid berukuran kecil dan berdarah. Membantu mencegah prolaps.

#### 7. Pemeriksaan Penunjang

- a. Pemeriksaan Colok Dubur
- b. Felksibel sigmoidoskopi
- c. Kolonoskopi
- d. Endosonografi anorektal
- e. Anoskop
- f. Proktosigmoidoskopi (Pradiantini & Dinata, 2021)



## 8. Pencegahan

- a. Makan makanan berserat tinggi, makan lebih banyak buah-buahan, sayuran dan biji-bijian. Makanan yang tinggi serat dapat melunakkan tinja dan meningkatkan volumenya, yang akan membantu Anda menghindari ketegangan yang dapat menyebabkan wasir. Tambahkan serat ke dalam diet Anda secara perlahan untuk menghindari masalah dengan gas.
- b. Minum air, minum 6-8 gelas air dan cairan lain (bukan alkohol) setiap hari untuk membantu menjaga feses tetap lunak.
- c. Pertimbangkan suplemen serat, kebanyakan orang tidak mendapatkan cukup jumlah serat yang disarankan 20 hingga 30 gram sehari dalam makanan mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa suplemen serat yang dijual bebas, seperti psyllium (Metamucil) atau methylcellulose (Citrucel), memperbaiki gejala keseluruhan dan pendarahan dari wasir. Jika Anda menggunakan suplemen serat, pastikan untuk minum setidaknya delapan gelas air atau cairan lain setiap hari. Jika tidak, suplemen dapat menyebabkan atau memperburuk sembelit.
- d. Jangan tegang, mengejan dan menahan napas saat mencoba buang air besar menciptakan tekanan yang lebih besar pada pembuluh darah di rektum bagian bawah.
- e. Olahraga, dengan olahraga yang aktif dapat membantu mencegah sembelit dan mengurangi tekanan pada pembuluh darah, yang dapat terjadi dengan berdiri atau duduk dalam waktu lama. Olahraga juga dapat membantu Anda

menurunkan berat badan berlebih yang mungkin berkontribusi terhadap hemoroid.


- f. Hindari duduk dalam waktu lama, duduk terlalu lama terutama di toilet, dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah di anus (Ramani, 2021).

## 9. Komplikasi

Komplikasi hemoroid antara lain :

- a. Luka dengan nyeri hebat sehingga pasien takut mengejan dan takut untuk BAB. Menyebabkan feses makin keras dan semakin memperberat luka di anus.
- b. Infeksi pada daerah yang terluka sampai terjadi nanah dan fistula (saluran tak normal) dari selaput lendir usus/anus.
- c. Perdarahan akibat luka, dapat menyebabkan terjadinya anemia (Dermawan, 2010 dalam Natasa, 2019).

## 10. Penyimpangan KDM



## B. Konsep Asuhan Keperawatan

### 1. Konsep keperawatan yang digunakan

#### a. Konsep Teori Comfort Kolcaba

Nyeri merupakan pengalaman yang kurang menyenangkan yang seseorang alami nyeri biasanya didapatkan dari penyakit, trauma maupun persalinan, *Theory of Comfort* yang dikemukakan oleh Katherine Kolcaba merupakan salah satu teori *middle-range* dimana teori ini membahas pemberian intervensi yang efektif dan holistic untuk mengurangi nyeri, penderitaan dan mencegah efek jangka panjang yang dapat merugikan. Teori ini kuat karena sifatnya yang konkret, cakupan lebih sempit, fenomenanya lebih spesifik, mewakili realitas pandangan keperawatan, teruji secara empiris dan lebih mudah diaplikasikan langsung dalam praktik terutama yang bersangkutan dengan manajemen nyeri (Rachmawati, 2008).

Kolcaba Mengemukakan bahwa kenyamanan adalah suatu konsep yang mempunyai suatu hubungan yang kuat dengan ilmu perawatan. Perawat menyediakan kenyamanan ke pasien dan keluarga-keluarga mereka melalui intervensi dengan prientasi pengukuran kenyamanan. Hubungan antara intervensi dengan teori yang dikemukakan yaitu memberikan rasa aman nyaman nyeri terhadap keluhan yang dirasakan pasien dengan memberikan tindakan keperawatan terapi Murottal guna menurunkan nyeri akut pada pasien dengan menekan nilai-nilai keislaman (Risnah & Irwan, 2021). Dalam teori *Theory of Comfort* kolcaba terdapat 4 konsep yang dibahas yaitu

kebutuhan kenyamanan fisik, kebutuhan kenyamanan psikospiritual, kebutuhan kenyamanan sosiokultural, dan dan kebutuhan kenyamanan lingkungan.

b. Konsep Nyeri

1) Definsi Nyeri

Nyeri telah didefinisikan sebagai "pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial atau dijelaskan dalam hal kerusakan tersebut".Nyeri dapat diklasifikasikan dalam istilah temporal sebagai akutatau kronis, tergantung pada luas dan durasi nyeri. Nyeri akut biasanya muncul secara tiba-tiba setelah rangsangan eksternal yang kuat, trauma, atau pembedahan dan biasanya diakibatkan oleh kerusakan atau cedera pada jaringan atau peradangan sebagai mekanisme perlindungan tubuh kita. Di sisi lain, nyeri kronis bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama dan dalam banyak kasus, penyebab nyeri kronis sulit untuk ditentukan karena nyeri kronis diperkirakan tidak hanya diakibatkan oleh cedera fisik, tetapi juga dari kombinasi psikologis, kelainan sosial, dan fisik (Kwon et al., 2014).

2) Fisiologi Nyeri

Mekanisme timbulnya nyeri dalam jurnal Dewangan & Tiwari, 2019 "Physiology of Pain and its Management in Veterinary Patients" mengatakan bahwa terjadinya nyeri didasari oleh proses multipel yaitu nosisepsi, sensitisasi perifer, perubahan fenotip, sensitisasi sentral, eksitabilitas ektopik, reorganisasi struktural, dan penurunan inhibisi.

Antara stimulus cedera jaringan dan pengalaman subjektif nyeri terdapat empat proses trauma jaringan awal hingga terjadi respon nyeri yang dirasakan : transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi.

a) Transduksi

Konversi rangsangan nyeri dari rangsangan termal, mekanik, atau kimia berbahaya menjadi energi listrik. Energi listrik ini dikenal sebagai transduksi. Stimulus ini mengirimkan impuls melintasi serat saraf perifer oleh reseptor sensorik yang disebut nosiseptor. Kebanyakan nosiseptor adalah ujung saraf bebas yang merasakan panas, kerusakan jaringan mekanis dan kimiawi. Beberapa jenis adalah dijelaskan:

- 1) mekanoreseptor, yang merespon cubitan dan tusukan jarum
- 2) nosiseptor diam, yang merespon hanya dengan adanya peradangan
- 3) nosiseptor mekanopanas polimodal.

b) Transmisi

Transmisi sinyal saraf ini dari tempat transduksi (pinggiran) ke sumsum tulang belakang dan otak terjadi dalam dua fase (pinggiran ke sumsum tulang belakang dan sumsum tulang belakang ke otak). Impuls nyeri ditransmisikan oleh dua sistem serat. Serabut A $\delta$  (bermielin) mentransmisikan sensasi yang cepat, tajam dan terlokalisasi dengan baik (nyeri pertama) dan awitan yang lebih lambat dan seringkali sensasi yang tidak terlokalisasi dengan baik (nyeri kedua) yang dihantarkan oleh serabut C (tidak bermielin). Kedua kelompok serat

berakhir di tanduk dorsal sumsum tulang belakang. Serabut A $\delta$  berakhir terutama pada neuron di lamina I dan V, sedangkan serabut C akar dorsal berakhir di lamina I dan II. Neuron orde pertama (serabut A $\delta$  dan C) bersinaps dengan neuron di kornu dorsalis atau yang biasa disebut gerbang, di mana impuls nyeri dapat "berpintu" yaitu, dimodifikasi. Transmisi neuron berakhir di talamus. Neuron hanya melayani rangsangan berbahaya dan diatur secara somatotopik dalam lamina I dan memiliki bidang reseptif somatik yang terpisah; mereka biasanya diam dan hanya menanggapi rangsangan berbahaya ambang tinggi. Neuron WDR menerima input aferen berbahaya dan tidak berbahaya dari serat A $\beta$ , A $\delta$  dan C.

c) Modulasi

Proses mengubah transmisi nyeri. Ini terjadi pada beberapa tingkat (Perifer, tulang belakang, supraspinal). Modulasi ini dapat berupa mekanisme penghambatan atau fasilitasi yang memodulasi transmisi impuls nyeri di system saraf pusat dan system saraf perifer. Neurotransmitter yang terlibat termasuk (tetapi tidak terbatas pada) serotonin, GABA, glisin, somatostatin, norepinefrin, dan endorfin. Substansi ini berikatan dengan reseptor pada aferen primer dan/atau neuron kornu dorsalis dan menghambat transmisi nosiseptif. Penghambatan impuls nyeri ini dikenal sebagai modulasi.

#### d) Persepsi nyeri

Ini terjadi setelah sinyal yang ditransmisikan mencapai pusat yang lebih tinggi di system saraf pusat. Dari traktus spinothalamikus, neuron berjalan melalui pons dan medula, dan berakhir di talamus. Talamus menyampaikan input nosiseptif lainnya ke sistem limbik. Baik struktur sistem kortikal dan limbik terlibat untuk persepsi. Pusat-pusat ini bertanggung jawab untuk pemrosesan sensorik dan emosional dari informasi nosiseptif.

### 3) Etiologi

Penyebab nyeri dapat di ketahui berdasarkan penyebab, asal/lokasi nyeri itu sendiri, durasi, intensitas dan tingkat keparahannya.

#### a) Nyeri Berdasarkan Asal/lokasinya

##### (1) Nyeri somatik

Nyeri yang timbul dari dinding tubuh. Rasa sakit berasal dari otot, tulang, sendi, ligamen atau jaringan ikat, itu disebut nyeri dalam.

Dengan kata lain nyeri somatik mengacu pada nyeri yang berasal dari perifer. Biasanya digambarkan sebagai tajam, menusuk, dan terlokalisasi dengan baik.

##### (2) Nyeri superfisial

Nyeri superfisial/nyeri kulit. Nosiseptor kulit berakhir tepat di bawah kulit dan karena konsentrasi ujung saraf yang tinggi, menghasilkan nyeri lokal yang terdefinisi dengan baik dengan durasi singkat.



(3) Nyeri visceral

Nyeri yang berasal dari jeroan tubuh. Nyeri visceral biasanya lebih menyebar dan tidak menyenangkan daripada nyeri somatik. Ini terjadi sebagai akibat dari distensi viseral, iskemia, peregangan ligamen yang melekatkan visera, atau spasme otot polos. Rasa sakitnya tidak terlokalisir dengan baik, tumpul, sakit, dan sering menyebar ke area lain di tubuh.

(4) Nyeri alih/referensi

Nyeri yang terjadi jauh dari sumber penyakit atau cedera biasanya merupakan sumber visceral.

(5) Nyeri phantom

Terjadi ketika seseorang merasakan sakit dari bagian tubuh yang telah diangkat atau diamputasi. Nyeri yang berhubungan dengan kehilangan anggota tubuh, ginjal dan gigi.

(6) Gangguan psikologis

Rasa sakit yang dialami oleh pasien ketika tidak ada patologi yang jelas, meskipun biasanya mengikuti kejadian menyakitkan sebelumnya.

b) Nyeri Berdasarkan Etiologi

(1) Nyeri nosiseptif

Terjadi setelah pasien yang telah melakukan operasi dan pada pasien yang mengalami luka bakar

(2) Nyeri neuropatik

Terjadi sebagai akibat dari cedera atau penyakit pada sistem saraf itu sendiri dan muncul sebagai gangguan pemrosesan aktivitas nosiseptif atau sebagai akibat dari aktivitas abnormal pada jalur nosiseptif. Ini mengganggu kemampuan saraf sensorik untuk mengirimkan informasi yang benar ke thalamus. Nyeri neuropatik sulit dikendalikan.

c) Nyeri Berdasarkan Durasi dan Intensitasnya

(1) Nyeri akut

Terjadi segera setelah stimulus diterima dan mereda setelah stimulus dihilangkan. Jenis rasa sakit ini merespon dengan baik terhadap pengobatan.

(2) Nyeri kronis

Ini bertahan lebih lama dari waktu normal (3-6 bulan) untuk menyembuhkan jaringan yang terluka dan bisa lebih sulit untuk dikenali. Ini mungkin atau mungkin tidak merespon dengan baik terhadap pengobatan tetapi memerlukan pendekatan multimodal (Dewangan & Tiwari, 2019).


4) Mengkaji Intensitas Nyeri

a) Numerical Rating Scale (NRS)

Ini dapat dinilai dengan menetapkan nilai numerik untuk berbagai tingkat perubahan perilaku dan fisiologis karena nyeri. Dalam skor ini


ditugaskan untuk kategori deskriptif diberikan bilangan bulat. Kategori diberi bobot (Dewangan & Tiwari, 2019).

(1) Anak-anak




(2) Dewasa

Skala intensitas nyeri deskriptif




Skala identitas nyeri numeric



b) Visual Analog Scale (VAS)

Skala sederhana yang terdiri dari garis lurus 100 mm horizontal dengan deskripsi intensitas nyeri di kedua ujungnya. Orang yang melakukan penilaian nyeri menggambar garis vertikal melintasi skala yang paling mewakili tingkat nyeri. Pendeskripsian dimulai dari

“tidak nyeri” hingga ke “nyeri yang tidak tertahankan”. Meskipun mudah digunakan, kegunaannya sangat tergantung pada pengalaman pengamat karena tidak menggunakan kategori yang ditentukan (Dewangan & Tiwari, 2019).



## 5) Penatalaksanaan Nyeri

### a) Penatalaksanaan Nyeri Nonfarmakologis

Dalam pemberian intervensi keperawatan, manajemen nyeri nonfarmakologi merupakan suatu tindakan mandiri seorang perawat dalam mengatasi keluhan pasien khususnya nyeri. Manajemen nyeri nonfarmakologi sangatlah beragam. Andarmoyo (2017) dalam buku “Konsep dan Proses Keperawatan Nyeri” membahas beberapa mengenai tindakan-tindakan peredaan nyeri yaitu : Terapi murottal, kompres panas dan kompres dingin, bimbingan antisipasi, stimulasi saraf elektrik transkutan/TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), distraksi, relaksasi, imajinasi terbimbing, hipnosis, akupunktur, masase.

Berdasarkan jurnal internasional yang berjudul “Physiology of Pain and its Management in Veterinary Patients” tahun 2019, juga membahas tentang manajemen nyeri non-farmakologi diantaranya:

- (1) Cryotherapy: Menggunakan es memperlambat konduksi saraf dari serat mielin berdiameter kecil (A $\delta$  dan C). Juga menyebabkan vasokonstriksi perifer (dan selanjutnya mengurangi aliran darah) dan memperlambat aliran darah local peradangan. Cara termudah untuk menerapkan cryotherapy adalah dengan memijat dengan es (5 hingga 10 menit) selama 3 hingga 6 kali sehari
- (2) Termoterapi: Panas menyebabkan vasodilatasi perifer dan merangsang banyak reseptor termosensitif yang meningkatkan mekanisme kontrol gerbang yang menyebabkan analgesia lokal. Panas superfisial harus diterapkan selama 15 hingga 20 menit, satu hingga tiga kali sehari.
- (3) Actinotherapy: Actinotherapy melibatkan pengobatan penyakit menggunakan sinar cahaya terutama sinar ultra-violet atau actinic. Sinar ini dapat memanaskan jaringan dalam yang menghasilkan kehangatan dan analgesia. Durasi paparan harus 15 menit hingga satu jam.
- (4) Terapi Ultrasound: Terapi ultrasonik adalah pengobatan penyakit dengan menggunakan gelombang suara yang memiliki frekuensi lebih tinggi dari yang dapat didengar oleh telinga manusia. Secara

umum, itu harus diterapkan selama 5 hingga 10 menit selama dua hingga tiga kali seminggu.

- (5) Stimulasi Saraf Listrik Transkutan (TENS): TENS (Stimulasi Saraf Listrik Transkutan) biasanya digunakan oleh fisioterapis dan dokter di dekat tempat nyeri (yaitu secara segmental). Agar efektif, arus TENS harus diterapkan selama minimal 20 hingga 30 menit. Ini sebagian besar digunakan untuk mengobati sakit punggung kronis, sehingga penerapannya mungkin terbatas pada hewan karena kondisi seperti itu mungkin sulit untuk didiagnosis.
- (6) Akupunktur: Akupunktur dapat digunakan untuk mengobati serangan arthritis akut serta subakut dan kronis.
- (7) Terapi Laser Tingkat Rendah: Peningkatan lokal dan sistemik endorfin setelah terapi tersebut telah dilaporkan secara klinis dalam beberapa penelitian dengan pengurangan nyeri (Dewangan & Tiwari, 2019).

b) Penatalaksanaan Nyeri Farmakologis

Menurut The Pharma Innovation Journal yang berjudul "Physiology of Pain and its Management in Veterinary Patients" tahun 2019, menjelaskan tentang penatalaksanaan nyeri secara farmakologis yaitu menggunakan obat analgetik. Dimana analgetik merupakan obat yang efek utamanya adalah menekan rasa sakit atau menginduksi analgesia. Obat analgetik yang digunakan untuk manajemen nyeri farmakologi yaitu

### (1) Opioid

Opioid adalah analgesik yang paling efektif untuk pengobatan nyeri tetapi juga obat penenang yang sangat efektif. Efek samping yang terkait dengan opioid termasuk depresi pernapasan, bradikardia, penurunan motilitas gastrointestinal, mual, muntah dan sembelit.

Opioid dapat digunakan untuk mengobati keadaan nyeri ringan, sedang dan berat. Durasi aksi berkisar dari beberapa menit hingga beberapa jam, tergantung pada obat yang dipilih. Selain rute pemberian tradisional (SC, IM dan IV), Opioid dapat diberikan secara efektif melalui transdermal (fentanil), transmukosa (buprenorfin), oral (morfin dan butorfanol), intra-artikular (morfin), epidural (morfin, petidin) dan rute intratekal.

### (2) Obat Anti-Inflamasi Nonsteroid (NSAID)

Obat anti inflamasi nonsteroid (NSAID) adalah obat yang memiliki sifat antiinflamasi, antipiretik, dan analgesik. NSAID termasuk obat apa pun dengan sifat anti-inflamasi yang bukan steroid. NSAID secara spesifik adalah obat yang menghambat pembentukan prostaglandin dan tromboksan dari asam arakidonat. Obat anti inflamasi nonsteroid (NSAID) biasanya digunakan untuk meredakan nyeri dari nyeri ringan hingga sedang.

### (3) Kortikosteroid

Kortikosteroid digunakan untuk mengatasi nyeri kronis. Mekanisme kerjanya adalah memasuki inti sel, mengikat kromatin, dan mengubah sintesis RNA. Kortikosteroid memiliki banyak efek samping yang serius, yaitu penghambatan penyembuhan luka, hiperadrenokortisisme iatrogenik, pengecilan otot, poliuria, polidipsia, peningkatan nafsu makan, alopecia, ulserasi lambung, immunosupresi, hepatopati, dan abdominomegali dan sering membatasi kegunaannya dalam manajemen nyeri.

### (4) Agonis Adrogenik Alfa-2

Alfa-2 obat agonis seperti medetomidine, detomidine dan romifidine adalah agen analgesik kuat yang digunakan terutama untuk pengobatan nyeri organ perut.

### (5) Anestesi Lokal

Anestesi lokal mengerahkan aksinya dengan mengikat situs hidrofilik dalam saluran  $\text{Na}^+$ , sehingga memblokirnya dan menghalangi masuknya  $\text{Na}^+$ . Lidokain dan bupivakain adalah anestesi lokal injeksi yang paling umum digunakan. Efek bupivakain (4-8 jam) memiliki durasi yang lebih lama dibandingkan dengan lidokain (1,5-3 jam) sehingga lebih disukai untuk analgesia pascaoperasi.



#### (6) Gabapentin

Gabapentin adalah obat anti epilepsi yang telah digunakan pada manusia untuk pengobatan nyeri neuropatik. Gabapentin mengaktifkan jalur penghambatan menurun dengan menginduksi pelepasan norepinefrin yang kemudian menginduksi analgesia karena alpha spinal. stimulasi adrenoseptor. Ini ditemukan sangat efektif dalam kasus cedera tulang belakang.

#### (7) Nutrisi

Nutriceuticals adalah non-obat yang memainkan peran utama dalam memperkuat jaringan tubuh normal, membantu dalam memperbaiki jaringan yang rusak dan membantu dalam meningkatkan metabolisme tubuh yang efisien.

### 2. Pengkajian Keperawatan

Format pengkajian keperawatan pada karya ilmiah ini sesuai dengan format buku panduan praktek profesi ners departemen keperawatan gawat darurat sebagai berikut:

#### a. Identitas

- 1) Identitas pasien: Nama, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, suku/bangsa, agama, status perkawinan, tanggal masuk rumah sakit (MRS), nomor rekam medik dan diagnosa medis
- 2) Identitas penanggung jawab: Nama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, serta status hubungan dengan pasien

b. Pengkajian Umum

1) Keluhan utama

Keluhan yang pasien rasakan saat pengkajian dan alasan utama masuk rumah sakit

2) Pengkajian riwayat penyakit sekarang

3) Riwayat penyakit terdahulu

4) Pada pengkajian psikososial

Mengkaji dampak penyakit terhadap keadaan psikologis dan kehidupan sosialnya, aktivitas/istirahat, sirkulasi, makanan/cairan, integritas ego, nyeri/kenyamanan, pernapasan, penyuluhan/pembelajaran

5) Pemeriksaan umum/tanda-tanda vital

c. Pengkajian Primer (Primary Survey)

1) Airway (Jalan napas) dengan control cervical

a) Kaji ada tidaknya sumbatan jalan napas

b) Distress pernapasan

c) Kemungkinan fraktur cervical

2) Breathing ( Pernapasan)

a) Kaji frekuensi napas

b) Suara napas

c) Kaji udara yang keluar dari jalan napas

3) Circulation (Sirkulasi)

a) Apakah denyut nadi karotis

b) Ada atau tidaknya tanda-tanda syok

c) Ada atau tidaknya perdarahan

#### 4) Disability (Tingkat Kesadaran)

Tingkat kesadaran merupakan respon seseorang terhadap rangsangan dari lingkungan, tingkat kesadaran dibedakan menjadi :

- a) Compos Mentis (sadar sepenuhnya)
- b) Apatitis (acuh tak acuh)
- c) Delirium (gelisah, berteriak-teriak, disorientasi orang, tempat, waktu, berhalusinasi, memberontak)
- d) Somnolen (kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang tetapi jatuh tertidur lagi, mampu memberi jawaban verbal)
- e) Stupor (koma) keadaan tertidur lelap namun masih ada respon nyeri.
- f) Coma (comatose/keadaan tidak sadar) (Ardian, 2021).

Tingkat kesadaran ini bisa dijadikan bagian dari vital sign. GCS (Glasgow Coma Scale) yaitu skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien, (apakah pasien dalam kondisi koma atau tidak) dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan.

Tabel 2.1 Tingkat Kesadaran Glasgow Coma Scale

Jenis Pemeriksaan	Nilai
Respon buka mata (Eye opening E)	
1. Spontan	4
2. Terhadap suara	3
3. Terhadap nyeri	2
4. Tidak ada respon	1
Respon motorik terbaik (M)	
1. Ikut perintah	6
2. Melokalisir nyeri	5
3. Fleksi normal (Menarik anggota yang dirangsang)	4
4. Fleksi abnormal (Dekortikasi)	3
5. Ekstensi abnormal (Deserebsasi)	2
6. Tidak ada respon (Flasib)	1
Respon verbal	
1. Berorientasi baik	5
2. Berbicara mengacau (Bingung)	4
3. Kata-kata tidak teratur	3
4. Suara tidak jelas	2
5. Tidak ada respon	1

- 5) Exposure (control untuk kasus trauma, dengan membuka pakaian pasien tetapi cegah hipotermi)

d. Pemeriksaan Head to Toe

1) Kepala

a) Rambut

Kebersihan rambut, bentuk kepala, kelainan di kepala

b) Mata

Bentuk kedua bola mata, konjungtiva, reflek pupil, kelainan pada mata.

c) Telinga

Bentuk kedua telinga, kebersihan telinga, kelainan pada telinga.

d) Hidung

Bentuk tulang hidung, kebersihan hidung, pembengkakan, lesi ataupun kelainan yang lainnya

- e) Mulut, lidah, gigi bibir simetris, warna bibir, bibir lembab, apakah ada lesi (keadaan mulut).

## 2) Leher

Bentuk leher, apakah ada pembengkakan/massa, reflek menelan.

## 3) Dada, Payudara, dan Ketiak

- a) Kesimetrisan dada, ekspansi dada, suara tambahan, irama nafas klien.
- b) Apakah tambahan pada jantung.
- c) Apakah ada edema di daerah payudara, bentuk payudara simetris, tidak ada massa dan lesi, tidak ada keluaran di daerah puting.

## 4) Abdomen

- a) Bentuk perut, tidak ada kelainan lain, tidak ada nyeri tekan di daerah perut, bising usus klien normal yaitu 9x/menit, tidak ada keluhan saat diperkusi, perut tidak kembung.
- b) Posisi umbilikal, tidak ada peradangan ataupun keluaran, keadaan umbilikal bersih, tidak ada kelainan lain pada umbilikal.

## 5) Genitalia

- a) Apakah ada kelainan pada genitalia, bentuk simeris tidak ada varises, edema, tumor/ benjolan, infeksi, luka atau iritasi, pengeluaran cairan atau uaran cairan atau darah
- b) Pada pemeriksaan rektum normalnya tidak ada nyeri, tidak terdapat edema/hemoroid/poliptanda-tanda infeksi dan perdarahan.

6) Kulit dan Kuku

Warna kulit pucat, tidak ada lesi maupun edema, warna kuku pucat hampir berwarna putih, bentuk kuku normal, kuku tebal, tekstur kuku lembut, kelembapan kulit kurang, turgor kulit normal, pengisian kapiler / capillary refill lambat yaitu lebih dari 3 detik.

7) Ekstermitas

a) Atas

Bentuk simetris, tidak ada kelainan lain, reflek bisep dan trisep klien normal, terbukti saat dilakukan ketukan di lekukan sikut dan di sikut menggunakan reflek hammer adanya gerakan spontan di ujung ekstermitas.

b) Bawah

Bentuk kedua kaki simetris, tidak ada kelainan lain, reflek patella normal terbukti saat dilakukan ketukan pada lutut menggunakan reflek hammer untuk mengetahui adanya gerakan spontan di ujung ekstermitas.

e. Pengkajian Sekunder (Secondary Survey)

Survey sekunder merupakan pemeriksaan secara lengkap yang dilakukan secara head to toe, dari depan hingga belakang. Secondary survey hanya dilakukan setelah kondisi pasien mulai stabil, dalam artian tidak mengalami syok atau tanda-tanda syok telah mulai membaik.

Anamnesis juga harus meliputi riwayat AMPLE yang didapatkan dari pasien dan keluarga (Emergency Nursing Association, 2007):

A : Alergi (apakah adakah alergi pada pasien, seperti obat-obatan, makanan)

M : Medikasi/obat-obatan (apakah obat-obatan yang yang digunakan seperti sedang menjalani pengobatan hipertensi, kencing manis, jantung, dosis, atau penyalahgunaan obat.

P : Pertinent medical history (bagaimana riwayat medis pasien seperti penyakit yang pernahdiderita, obatnya apa, berapa dosisnya, penggunaan obat-obatan herbal)

L : Last meal (apaobat atau makanan yang baru saja dikonsumsi, dikonsumsi berapajam sebelum kejadian, selain itu juga periode menstruasi termasuk dalam komponen ini)

E : Events, hal-hal yang bersangkutan dengan sebab cedera (kronologi kejadian yangmenyebabkan adanya keluhan utama)(Ardian, 2021).

## 2. DiagnosaKeperawatan

Adapun diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien dengan hemoroid yaitu (PPNI, 2017):


### Pre Operasi

- a. Ansietas
- b. Defisit pengetahuan
- c. Perfusi perifer tidak efektif
- d. RisikoPerdarahan

- e. Risiko Konstipasi
- f. Risiko Ketidakseimbangan Cairan
- g. Risiko Hipovolemia

Post Operasi

- a. Nyeri Akut
- b. Intoleransi Aktivitas
- c. Gangguan pola tidur
- d. Risiko Infeksi





3. Intervensi Keperawatan  
 a. Pre Operasi  
 1) Ansietas

Diagnosa Keperawatan	Perencanaan Keperawatan						
	Tujuan & Kriteria Hasil			Intervensi			
<b>Ansietas</b>	Tingkat Ansietas						
<b>D.0080</b>	Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan tingkat ansietas menurun						
<b>Pengertian :</b>	Kriteria Hasil:						
<b>Kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman</b>		Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Menurun	<b>Reduksi Ansietas</b>  Observasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi saat tingkat ansietas berubah</li> <li>Identifikasi kemampuan mengambil keputusan</li> <li>Monitor tanda-tanda ansietas</li> </ul> Terapeutik: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ciptakan suasana teraupetik untuk menumbuhkan kepercayaan</li> <li>Temani pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan</li> <li>Pahami situasi yang membuat ansietas</li> <li>Dengarkan dengan penuh perhatian</li> <li>Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan</li> <li>Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan</li> </ul> Edukasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami</li> <li>Informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis</li> <li>Anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien</li> <li>Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan</li> </ul>	
	1	Konsentrasi					
		1	2	3	4		5
	2	Pola tidur					
		1	2	3	4		5
		Meningkat	Cukup Meningkatkan	Sedang	Cukup Menurun		Menurun
	3	Perilaku gelisah					
		1	2	3	4		5
	4	Verbalisasi kebingungan					
		1	2	3	4		5

5	Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi									<ul style="list-style-type: none"> <li>Latih teknik relaksasi</li> </ul>
		1	2	3	4	5				
6	Perilaku tegang									
		1	2	3	4	5				

## 2) Defisit pengetahuan

Diagnosa Keperawatan	Perencanaan Keperawatan					
	Tujuan & Kriteria Hasil					Intervensi
<b>Defisit pengetahuan</b>	Tingkat Pengetahuan					<b>Edukasi Kesehatan</b>  Observasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi</li> <li>Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat</li> </ul> Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> <li>Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan</li> <li>Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan</li> <li>Berikan kesempatan untuk bertanya</li> </ul> Edukasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan faktor risiko yang dapat memengaruhi kesehatan</li> <li>Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat</li> <li>Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk</li> </ul>
<b>D.0111</b>	Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 diharapkan pengetahuan meningkat					
<b>Pengertian :</b>	Kriteria Hasil:					
<b>Ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan dengan topic tertentu</b>	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik	
	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5	

	1	2	3	4	5	meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
4	Perilaku sesuai dengan pengetahuan					
	1	2	3	4	5	
	Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	Menurun	
1	Perilaku					
	1	2	3	4	5	

3) Perfusi perifer tidak efektif

Diagnosa Keperawatan	Perencanaan Keperawatan				
	Tujuan & Kriteria Hasil			Intervensi	
<b>Perfusi perifer tidak efektif</b>	Perfusi perifer				
<b>D.0009</b>	Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 perfusi perifer meningkat				
<b>Pengertian :</b>	Kriteria Hasil:				
<b>Penurunan sirkulasi darah pada level kapiler dapat</b>	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
	1	Denyut nadi perifer			
	<p><b>Perawatan Sirkulasi</b></p> <p>Observasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Periksa sirkulasi perifer (mis. Nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu, anklebrachial index)</li> <li>Identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis. Diabetes, perokok, orangtua, hipertensi dan kadar kolesterol tinggi)</li> <li>Monitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstremitas</li> </ul>				

<b>mengganggu metabolisme tubuh</b>	1	2	3	4	5	<b>Terapeutik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lakukan pencegahan infeksi</li> <li>Lakukan hidrasi</li> </ul> <b>Edukasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anjurkan berhenti merokok</li> <li>Anjurkan berolahraga rutin</li> <li>Anjurkan menghindari penggunaan obat peneka beta</li> <li>Anjurkan melakukan perawatan kulit yang benar</li> <li>Anjurkan program rehabilitasi vascular</li> <li>Ajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi (mis. Rendah lemak jenuh, minyak ikan omega 3)</li> <li>Informasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan (mis. Rasa sakit yang tidak hilang saat istirahat, luka tidak sembuh, hilang rasa)</li> </ul>	
	2	Penyembuhan luka					
	1	2	3	4	5		
	3	Turgor kulit					
	1	2	3	4	5		
	4	Pengisian kapiler					
	1	2	3	4	5		
		Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun		Menurun
	1	Ttv					
		1	2	3	4		5

4) Risiko perdarahan

Diagnosa Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
	Tujuan & Kriteria Hasil	Intervensi
<b>Risiko Perdarahan</b>	Tingkat Perdarahan	<b>Pencegahan Perdarahan</b>
<b>D.0012</b>	Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 kehilangan darah baik internal maupun eksternal menurun	Observasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor tanda dan gejala perdarahan</li> </ul>

Pengertian :	Kriteria Hasil:					
	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik	
<b>Berisiko mengalami kehilangan darah baik internal (tejadi di dalam tubuh) maupun eksternal (terjadi hingga keluar tubuh)</b>	1	Hemoglobin				
	1		2	3	4	5
	2	Hematokrit				
	1		2	3	4	5
	3	Tekanan Darah				
	1		2	3	4	5
	4	Suhu Tubuh				
	1		2	3	4	5
		Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	Menurun
	1	Perdarahan Vagima				
	1	2	3	4	5	

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitor nilai hemoglobin/hematokrit</li> <li>▪ Monitor tanda-tanda vita ortostatik</li> <li>▪ Monitor koagulasi</li> </ul>	<p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Batasi tindakan invasif, jika perlu</li> <li>▪ Pertahankan bedrest selama perdarahan</li> <li>▪ Gunakan kasur pencegah dekubitus</li> <li>▪ Hindari pengukuran suhu rektal</li> </ul> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jelaskan tanda dan gejala perdarahan</li> <li>▪ Anjurkan untuk meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi</li> <li>▪ Anjurkan menghindari aspirin atau antikoagulan</li> <li>▪ Anjurkan meningkatkan asupan makan dan vitamin K</li> <li>▪ Anjurkan segera melapor jika terjadi perdarahan</li> </ul> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kolaborasi pemberian obat untuk pengontrol perdarahan, jika perlu</li> <li>▪ Anjurkan transfusi, jika perlu</li> <li>▪ Anjurkan pemberian obat supositoria, jika perlu</li> </ul>
---	--

## 5) Risiko konstipasi

Diagnosa Keperawatan	Perencanaan Keperawatan				
	Tujuan & Kriteria Hasil			Intervensi	
<b>Risiko Konstipasi</b>	Eliminasi Fekal				
<b>D.0052</b>	Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 pengeluaran feses mudah				
<b>Pengertian :</b>	Kriteria Hasil:				
<b>Berisiko mengalami penurunan frekuensi defekasi normal disertai kesulitan dan pengeluaran feses tidak lengkap</b>	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
	1	Kontrol pengeluaran feses			
	1	2	3	4	5
	2	Keluhan defekasi lama dan sulit			
	1	2	3	4	5
	3	Mengejan saat defekasi			
	1	2	3	4	5
	4	Distensi abdomen			
	1	2	3	4	5
		Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun
<b>Pencegahan Konstipasi</b>					
Observasi:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi faktor risiko konstipasi (mis. Asupan serat tidak adekuat, asupan cairan tidak adekuat, aganglionik, kelemahan otot abdomen, aktivitas fisik kurang)</li> <li>Monitor tanda dan gejala konstipasi</li> <li>Identifikasi penggunaan obat-obatan yang menyebabkan konstipasi</li> </ul>					
Terapeutik					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Batasi minuman yang mengandung kafein dan alcohol</li> <li>Jadwalkan rutinitas BAK</li> <li>Lakukan masase abdomen</li> <li>Berikan terapi akupresur</li> </ul>					
Edukasi					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan penyebab dan faktor risiko konstipasi</li> <li>Anjurkan minum air putih sesuai dengan kebutuhan</li> <li>Anjurkan meningkatkan aktivitas fisik sesuai dengan kebutuhan</li> <li>Anjurkan berjongkok untuk memfasilitasi proses BAB</li> </ul>					
Kolaborasi					

	1	Konsistensi feses				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kolaborasi dengan ahli gizi, <i>jika perlu</i></li> </ul>
		1	2	3	4	

6) Risiko ketidakseimbangan cairan

Diagnosa Keperawatan	Perencanaan Keperawatan						
	Tujuan & Kriteria Hasil			Intervensi			
<b>Risiko Ketidakseimbangan Cairan</b>	Kebutuhan Cairan			<b>Manajemen cairan</b>			
<b>D.0036</b>	Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 kebutuhan cairan terpenuhi			Observasi:			
<b>Pengertian :</b>	Kriteria Hasil:			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitor status hidrasi (mis. Frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian kapiler, kelembapan mukosa, turgor kulit dan tekanan darah)</li> <li>▪ Monitor berat badan harian</li> <li>▪ Monitor hasil pemeriksaan laboratorium</li> <li>▪ Monitor status hemodinamik</li> </ul>			
<b>Berisiko mengalami penurunan, peningkatan atau percepatan perpindahan cairan dari intravaskuler, interstisial atau intraseluler</b>		Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Catat intake-output dan hitung balance cairan 24 jam</li> <li>▪ Berikan asupan cairan</li> <li>▪ Berikan cairan intravena</li> </ul> Kolaborasi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kolaborasi pemberian deuretik, <i>jika perlu</i></li> </ul>	
	1	Asupan cairan					
		1	2	3	4		5
	2	Keluaran urine					
	1	2	3	4	5		
3	Kelembapan membrane mukosa						
	1	2	3	4	5		
4	dehidrasi						

	1	2	3	4	5
	Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	Menurun
1	Tanda-tanda vital				
	1	2	3	4	5

7) Risiko hipovolemia

Diagnosa Keperawatan		Perencanaan Keperawatan				
		Tujuan & Kriteria Hasil			Intervensi	
<b>Risiko hipovolemia</b>	Status cairan	<b>Manajemen Hipovolemia</b>				
<b>D.0034</b>	Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 kebutuhan cairan terpenuhi	Observasi:				
<b>Pengertian :</b>	Kriteria Hasil:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Periksa tanda dan gejala hipovolemia (mis. Ortopnea, dispnea, edema, JVP/CVP meningkat, refleks hepatojugular meningkat, suara napas tambahan)</li> <li>Identifikasi penyebab hipovolemia</li> <li>Monitor status hemodinamik (mis. Frekuensi jantung, tekanan darah, MAP, CVP, PAP, PCWP, CO,CI), <i>jika tersedia</i></li> <li>Monitor intake dan output cairan</li> <li>Monitor tanda hemokonsentrasi</li> <li>Monitor tanda peningkatan tekanan onkotik plasma</li> </ul>				
<b>Berisiko mengalami penurunan volume cairan intravascular, interstisial, dan/atau intraseluler</b>	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik	
	1	Tekanan darah				
	1	2	3	4	5	
	2	Frekuensi nadi				
	1	2	3	4	5	



	3	Tekanan nadi					Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> <li>Batasi asupan cairan dan garam</li> <li>Tinggikan kepala tempat tidur 30-40°</li> </ul> Edukasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajarkan cara mengukur dan mencatat asupan dan haluaran cairan</li> <li>Ajarkan cara membatasi cairan</li> </ul> Kolaborasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolaborasi pemberian deuretik, <i>jika perlu</i></li> <li>kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretic</li> <li>kolaborasi pemberian <i>continous renal replacement therapy (CRRT)</i> , <i>jika perlu</i></li> </ul>
		1	2	3	4	5	
	4	Membrane mukosa					
		1	2	3	4	5	
			Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	
	1	Jugular venous pressure (JVP)					
		1	2	3	4	5	

b. Post Operasi  
1) Nyeri akut

Diagnosa Keperawatan		Perencanaan Keperawatan				
	Tujuan & Kriteria Hasil	Intervensi				
<b>Nyeri Akut</b>	Tingkat Nyeri	<b>Manajemen Nyeri</b>				
<b>D.0077</b>	Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun	Observasi:				
<b>Pengertian :</b>	Kriteria Hasil:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>Identifikasi skala nyeri</li> <li>Identifikasi respons nyeri non verbal</li> <li>Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan</li> </ul>				
<b>Pengalaman sensorik atau emosional yang</b>	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik	

berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.	1	Frekuensi nadi					nyeri <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri</li> <li>Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup</li> <li>Monitor efek samping penggunaan analgetik</li> </ul> Terapeutik: <ul style="list-style-type: none"> <li>Berikan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi rasa nyeri</li> <li>Kontrol lingkungan yang memperberat dan memperingan rasa nyeri</li> <li>Fasilitasi untuk istirahat dan tidur</li> <li>Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri</li> </ul> Edukasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri</li> <li>Jelaskan strategi meredakan nyeri</li> <li>Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</li> </ul> Kolaborasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu</li> </ul>
		1	2	3	4	5	
	2	Pola nafas					
		1	2	3	4	5	
		Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun	
	3	Keluhan nyeri					
		1	2	3	4	5	
	4	Meringis					
		1	2	3	4	5	
	5	Gelisah					
		1	2	3	4	5	
	6	Kesulitan tidur					
	1	2	3	4	5		

2) Intoleransi aktivitas

Diagnosa Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
	Tujuan & Kriteria Hasil	Intervensi
Intoleransi aktivitas	Toleransi Aktivitas	Manajemen Energi



## 3) Gangguan pola tidur

Diagnosa Keperawatan		Perencanaan Keperawatan						
Tujuan & Kriteria Hasil		Intervensi						
<b>Gangguan pola tidur</b>	Pola tidur	<b>Dukungan Tidur</b>						
<b>D.0055</b>	Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam pola tidur membaik	Observasi:						
<b>Pengertian :</b>	Kriteria Hasil:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikasi pola aktivitas dan tidur</li> <li>▪ Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/atau psikologis)</li> <li>▪ Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur (mis. Kopi, teh, alcohol, makan mendekati tidur dan minum terlalu banyak)</li> <li>▪ Identifikasi obat tidur yang dikonsumsi</li> </ul>						
<b>Gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal</b>	Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun	Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modifikasi lingkungan (mis. Pencahayaan, kebisingan, suhu, matras dan tempat tidur)</li> <li>▪ Batasi waktu tidur siang</li> <li>▪ Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur</li> <li>▪ Terapkan jadwal tidur rutin</li> <li>▪ Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan</li> </ul> Edukasi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit</li> <li>▪ Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur</li> <li>▪ Anjurkan menghindari makanan/minuman yang mengganggu tidur</li> <li>▪ Anjurkan penggunaan obat tidur yang tidak mengandung supresor terhadap tidur REM</li> <li>▪ Ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap</li> </ul>		
	1	Keluhan sulit tidur	1	2	3		4	5
	2	Keluhan sering terjaga	1	2	3		4	5
	3	Keluhan tidak puas tidur	1	2	3		4	5
	4	Keluhan istirahat tidak cukup	1	2	3		4	5
	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik			
	5	Kemampuan beraktivitas						

	1	2	3	4	5	gangguan pola tidur (mis. Psikologis, gaya hidup, sering berubah shift bekerja) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajarkan relaksasi otot autogenic atau secara nonfarmakologi lainnya</li> </ul>
--	---	---	---	---	---	---

4) Risiko infeksi

Diagnosa Keperawatan	Perencanaan Keperawatan					
	Tujuan & Kriteria Hasil					Intervensi
<b>Risiko Infeksi</b>	Tingkat Infeksi					<b>Pencegahan infeksi</b>
<b>D.0142</b>	Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam glukosa derajat infeksi menurun.					Observasi:
<b>Pengertian :</b>	Kriteria Hasil:					<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor tanda gejala infeksi lokal dan sistemik</li> </ul>
<b>Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik</b>	Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batasi jumlah pengunjung</li> <li>Berikan perawatan kulit pada daerah edema</li> <li>Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</li> <li>Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi</li> </ul>
1 Demam	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terapeutik</li> </ul>
2 Kemerahan	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edukasi</li> </ul>
3 Nyeri	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan tanda dan gejala infeksi</li> <li>Ajarkan cara memeriksa luka</li> <li>Anjurkan meningkatkan asupan cairan</li> </ul>
4 Bengkak	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolaborasi</li> <li>Kolaborasi pemberian imunisasi, Jika perlu</li> </ul>

	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
5	Kadar sel darah putih				
	1	2	3	4	5

(PPNI, 2018a, 2018b)



### 3. Implementasi

Implementasi keperawatan merupakan tindakan keperawatan yang telah direncanakan dan akan di berikan/diimplementasikan pada klien dengan tujuan kebutuhan pasien dapat terpenuhi secara optimal. Implementasi Tahapan ini dimulai setelah rencana intervensi disusun dan menjadi tujuan pada nursing order untuk membantu pasien dalam mencapai tujuan proses keperawatan yang diharapkan. Oleh sebab itu, implementasi sebagai manifestasi pelaksanaan intervensi yang spesifik, dilakukan untuk memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan (Nursalam, 2015).

### 4. Evaluasi

Tahap evaluasi yaitu proses penilain pencapaian tujuan secara sistematis dan terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan sesuai kenyataan yang ada pada pasien. Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan yang berguna apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain. Pada tahap ini penilaian evaluasi menilai respon pasien yang meliputi subyek, obyek, pengkajian kembali (*assessment*) dari semua rencana tindakan (*planning*) untuk menentukan apakah hasil yang diharapkan telah tercapai melalui penentuan apakah pengkajian yang dilakukan sudah akurat dan lengkap, apakah diagnosis yang dirumuskan sudah tepat, dan apakah tindakan yang ditentukan sudah tepat (Nursalam, 2015; Basri, 2020; Rukmi, 2022).

## C. Evidence Based Learning

### 1. Definisi

Kompres dingin adalah sebuah terapi dingin yang sederhana dan murah dan penting dalam penatalaksanaan manajemen nyeri non farmakologi. Gel pack atau ice pack biasanya digunakan dengan menggunakan handuk atau kassa antara kulit dan selama mampu menahan rasa dingin yang ekstrem saat kontak pertama kali dari icepack, pendingin homogen dan menyediakan area yang bersih (Rohmani, 2021). Terapi murottal adalah rekaman suara Al-Qur'an yang dilantunkan oleh seorang qori (pembaca Al-Qur'an) (Siswantinah, 2011; Mulyani et al., 2019).

### 2. Tujuan

Menurut Potter & Perry (2009) kompres dingin bertujuan menurunkan aliran darah ke lokasi cedera menghambat adanya edema dan mengurangi peradangan. Kompres dingin juga bertujuan untuk menghilangkan nyeri, mengurangi nyeri lokal. Selain itu kompres dingin dapat mengurangi kebutuhan oksigen pada jaringan, meningkatkan koagulasi darah pada tempat cedera (Rohmani, 2021).

Suara pada murottal Al-Qur'an dapat menurunkan kadar hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks/tenangan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga dapat menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernapasan, detak jantung dan aktivitas gelombang otak.



Keadaan rileks tersebut dapat mendistraksi nyeri sehingga nyeri yang dirasakan menjadi berkurang (Siswantinah, 2011; Mulyani et al., 2019).

### 3. Indikasi

- a. Pasien post hemoroidektomi
- b. Pasien yang mengalami masalah nyeri
- c. Pasien yang gelisah
- d. manajemen nyeri, anti inflamasi, mengendalikan edema, menurunkan spasme otot/otot tegang (William, 2012 dalam Rohmani, 2021).

### 4. Kontraindikasi

- a. Kontraindikasi pemberian kompres dingin yaitu pasien alergi dingin
- b. Luka terbuka tidak diperbolehkan dengan kompres dingin, karena dapat merusak jaringan sehingga aliran darah berkurang ke daerah luka tersebut.
- c. Hipersensitivitas dingin jugadapat mengganggu nutrisi jaringan lebih lanjut
- d. Kontraindikasi terapi murottal yaitu pasien non muslim

## 5. Prosedur Pemberian

Prosedur kerja pemberian kompres dingin dan terapi murottal adalah sebagai berikut:

<b>Standar Perosedur Operisional (SPO)</b>	
<b>Kompres Dingin dan Terapi Murottal Al-Qur'an</b>	
Pengertian	Kompres dingin dan terapi murottal merupakan tindakan mandiri seorang perawat dan dapat dijadikan salah satu opsi intervensi nonfarmakologi di dunia keperawatan. Dimana kompres dingin dapat meredakan nyeri, menghambat proses inflamasi dan merangsang pelepasan endorphen (Rohmani, 2018). Sedangkan terapi murottal merupakan lantunan ayat suci Al-Quran yang dapat mengaktifkan energy ilahiyah dan memberikan perasaan rileks dan tenang saat mendengarnya (Siswantinah, 2011; Mulyani et al., 2019).
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan tekanan darah</li> <li>2. Menghambat adanya edema</li> <li>3. Mengurangi peradangan</li> <li>4. Mengurangi nyeri</li> <li>5. Mengurangi kebutuhan oksigen</li> <li>6. Meningkatkan koagulasi darah</li> <li>7. Menurunkan kadar hormone stress</li> <li>8. Mengaktifkan hormone endorphen alami</li> <li>9. Meningkatkan perasaan rileks dan tenang</li> <li>10. Mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang</li> <li>11. Memperbaiki sistem kimia tubuh seperti TD↓, memperlambat pernapasan, detak jantung dan aktivitas gelombang otak (Rohmani, 2021); (Siswantinah, 2011; Mulyani et al., 2019).</li> </ol>
Setting	Pasien diposisikan dengan posisi menyamping (Posisi Sim's) dan perawat berada di samping bad pasien
Alat dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air dingin dengan suhu 10-18°C</li> <li>2. Handuk/washlap 2 buah (1 untuk mengompres dan 1 washlap kering/cold pack</li> <li>3. Handphone yang berisi murottal Al-Qur'an</li> </ol>
Prosedur Tindakan	<p><b><u>Tahap orientasi</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beri salam dan panggil nama pasien</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perkenalan</li> <li>3. Jelaskan tujuan, prosedur, durasi dilakukan tindakan pada pasien dan keluarga</li> </ol> <p><b><u>Tahap Kerja</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berikan kesempatan pada klien dan keluarga bertanya sebelum tindakan dilakukan</li> <li>2. Menanyakan kondisi klien</li> <li>3. Jaga privasi dan memulai kegiatan dengan cara yang baik</li> <li>4. Mendekatkan alat dan bahan</li> <li>5. Mencuci tangan</li> <li>6. Dekatkan handpone ke telinga pasien</li> <li>7. Pilih surah yang akan di perdengarkan ke klien</li> <li>8. Pastikan volume sesuai dengan keinginan klien dan tidak terlalu keras</li> <li>9. Durasi terapi murottal <math>\pm 25</math> menit</li> <li>10. Sembari mendengarkan murottal, atur posisi klien untuk pemberian kompres dingin dengan posisi miring ke samping (posisi Sim's)</li> <li>11. Tempelkan cold pack atau kain yang direndam air dingin di leher belakang (tengkuk) pasien</li> <li>12. Lakukan kompres dingin pada selama <math>\pm 20</math> menit</li> <li>13. Terapi kompres dingin di berikan 1x sehari dikombinasikan dengan terapi murottal</li> </ol> <p><b><u>Terminasi</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi hasil kegiatan (kenyamanan pasien)</li> <li>2. Simpulkan hasil kegiatan</li> <li>3. Berikan umpan balik positif</li> <li>4. Kontrak pertemuan selanjutnya</li> <li>5. Akhiri kegiatan dengan cara yang baik</li> <li>6. Bereskan alat</li> <li>7. Cuci tangan</li> </ol> <p><b><u>Dokumentasi</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catat hasil kegiatan di dalam catatan keperawatan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama , Umur, Jenis Kelamin, dll</li> <li>b. Keluhan Utama</li> <li>c. Tindakan yang dilakukan kompres dingin dan terapi murottal</li> <li>d. Lama tindakan</li> <li>e. Jenis terapi murottal yang diberikan</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Reaksi selama, setelah terapi pemberian kompres dingin dan terapi murottal</li> <li>g. Respon pasien</li> <li>h. Nama perawat</li> <li>i. Tanggal pemeriksaan</li> </ul>
--	--

## 6. Kriteria Evaluasi

- a. Intensitas nyeri berkurang
- b. Meringis menurun
- c. Gelisah berkurang

## 7. Artikel Utama dan Pendukung


### b. Artikel Utama

- 1) Rohmani, R. dkk. (2018). Penurunan Nyeri Dengan Kompres Dingin di Belakang Leher Pada Pasien Post Hemoroidektomi Terpasang Tampon. *Jurnal Keperawatan Tropis Papua*
- 2) Sulistiyawati, & Widodo, S. (2020). Penerapan Terapi Murottal dan Aromaterapi Lavender terhadap Penurunan Intensitas Nyeri dalam Asuhan Keperawatan pada Pasien Post Operasi Open Reduction Internal Fixation (ORIF) di RS Roemani Semarang.

### c. Artikel Pendukung

- 1) Utami, & Ganik Sakitri. (2020). Pemberian Kompres Dingin Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Hemoroidektomi Di Rsud Simo Boyolali: Studi Kasus. *Intan Husada Jurnal Ilmu Keperawatan*.
- 2) Rohmani. (2021). *Kompres Dingin Di Leher Belakang Pada Pasien Post Hemoroidektomi*.

- 3) Mulyani & Upoyo, A. S. (2019). *Perbedaan Pengaruh Terapi Murottal selama 15 Menit dan 25 Menit terhadap Penurunan Skala Nyeri pada Pasien Kanker Pasca Bedah.*
- 4) Suwardi & Rahayu. (2019). Efektifitas Terapi Murottal terhadap Penurunan Tingkat Nyeri pada Pasien Kanker. *Jurnal Keperawatan Jiwa*



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Rancangan Studi Kasus**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode studi kasus ini dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara sistematis (Nursalam, 2016).

Penelitian ini adalah penelitian untuk menganalisis masalah asuhan keperawatan pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri di Ruang ICU RSUD Labuang Baji Makassar.

##### **B. Subyek Studi Kasus**

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini pasien post Hemoroidektomi dan bersedia menjadi responden.

##### **C. Fokus Studi Kasus**

Asuhan Keperawatan Pasien Post Hemoroidektomi dengan Masalah Nyeri Menggunakan Intervensi Kombinasi Kompres Dingin dan Terapi Murottal Al-Qur'an

#### D. Instrumen Studi Kasus

Instrumen studi kasus ini berupa format proses asuhan keperawatan, instrumen yang digunakan untuk menilai hasil dari intervensi yaitu Numerical Rating Scale (NRS) yaitu alat untuk menilai nyeri dengan menggunakan skala 0-10.

#### E. Prosedur Pengambilan Data

Prosedur penelitian berisi tentang uraian proses dalam melakukan studi kasus yang terdiri dari beberapa tahap antara lain:

##### 1. Persiapan

- a. Mencari literatur-literatur terkait masalah apa yang sering di dapatkan di ruangan ICU
- b. Mencari solusi yang mampu meminimalisir komplikasi yang terjadi sesuai dengan masalah yang ditemukan
- c. Melakukan pengajuan judul studi kasus dan intervensi yang akan diberikan sesuai dengan masalah yang ditemukan.
- d. Mendapatkan persetujuan dari pembimbing untuk melakukan intervensi sesuai dengan masalah yang ditemukan

##### 2. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data studi kasus ini yaitu melakukan screening pasien yang memiliki masalah kesehatan yang perlu ditangani di ruangan tempat pengambilan data terdapat tiga tahapan saat mengumpulkan data yaitu: data dikumpulkan dari hasil WOD (wawancara, observasi, dokumen),

datayang dikumpulkan terkait dengan data pengkajian, diagnosis, perencanaan,tindakan implementasi dan evaluasi.

### 3. Penyusunan Laporan

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah yang telah ditetapkan sebagai pedoman.

## F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ruang ICU RSUD Labuang Baji Makassar

### 2. Waktu Pengambilan Data Kasus

Pembuatan karya tulis ini dimulai pada bulan Oktober 2021 sampai bulan Januari 2022, penelitian dimulai tanggal 7-10 September 2021 pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri

## G. Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dilakukan sejak peneliti sedang malkukan praktik klinik di RSUD Labuang Baji Makassar, proses analisa data dilakukan dengan mengemukakan fakta yang telah ditemukan selanjutnya akan menjadi perbandingan dengan teori yang sudah ada lalu disimpulkan dan dinarasikan dalam bentuk pendapat serta pembahasan. Teknik analisa data dinarasikan berdasarkan jawaban-jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian. Data kemudiandi uraikan dalam data pengkajian, diagnosis, perencanaan, tindakan/implementasi dan evaluasi.

Penyajian data dilakukan menggunakan tabel, gambar, bagan maupun teks yang bersifat naratif. Selanjutnya data dibahas dan dibandingkan dengan hasil



penelitian sebelumnya dan secara teoritis dengan perilaku kesehatan. Kerahasiaan responden akan dijamin dengan menggunakan inisial identitas dari responden tersebut.

#### H. Etika Studi Kasus

Etika menggambarkan aspek-aspek etik yang dijadikan pertimbangan dalam memberikan asuhan keperawatan bagi pasien sampai dengan proses dokumentasi yang dilakukan. Etika penelitian adalah suatu bentuk sopan santun, tata susila dan budi pekerti dalam melakukan penelitian. Etika penelitian merupakan hal yang penting karena menggunakan subjek manusia. Pada penelitian keperawatan hampir 90% subjek yang dipergunakan yaitu manusia (Nursalam, 2016). Beberapa prinsip etika yang digunakan ketika memberikan asuhan keperawatan adalah *voluntary* (keiklasan), dan *confidentially* (kerahasiaan), *anonymity*, *informed consent*.

##### 1. Keiklasan (*voluntary*)

Klien berhak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi subjek atau tidak, peneliti tidak berhak memaksa klien menjadi subjek penelitian yang bertentangan dengan keinginannya (Nursalam, 2016).

##### 2. Kerahasiaan (*confidentially*)

Peneliti harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diberikan oleh klien dan menggunakan informasi tersebut hanya untuk kegiatan penelitian. Peneliti harus meyakinkan subjek penelitian bahwa semua hasil tidak akan dihubungkan dengan mereka serta informasi yang telah diberikan, tidak akan digunakan dalam hal-hal yang dapat merugikan mereka (Nursalam, 2016).

### 3. Anonymity

Klien berhak meminta data yang telah diberikan harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama, data cukup dengan menggunakan inisial atau kode sehingga subjek tidak dapat dikenali (Nursalam, 2016).

### 4. Informed consent

Klien berhak mendapatkan informasi lengkap tentang tujuan yang peneliti lakukan, mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Pada *informed consent* juga dicantumkan bahwa data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk pengembangan ilmu (Nursalam, 2016).



**BAB IV**  
**LAPORAN KASUS**

A. Pengkajian

**Identitas Klien**

Nama inisial klien : Tn. U  
Umur : 65 Tahun  
Alamat : Pakkabba  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Tanggal masuk RS : 07 September 2021  
Nomor Rekam Medis : 35 58 15  
Diagnosa Medis : Hemoroid Grade IV

**Identitas Penanggungjawab**

Nama : Tn. A  
Umur : 35 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Polisi  
Hubungan dengan pasien : Anak pasien

**Laporan Operasi**

No. RM : 35 58 15  
Nama : Tn. U  
Umur : 65 Tahun  
Ruangan : Instalasi Bedah Sentral (IBS)

Ahli bedah : dr. I

Ahli anastesi :dr. F

Perawat : Ns. R

Jenis anastesi : Subarachnoid Block (SAB)

Posisi operasi : Posisi itotomi

Tindakan operasi : Hemoroidektomi

Tanggal operasi : 7 September 2021

Jam operasi dimulai : 10.35 Wita

Jam operasi selesai : 11.20 Wita

Resume operasi : Pasien diberikan anastesi lokal subarachnoid block (SAB) pada jam 10.00, setelah diberikan anastesi spinal pasien berbaring dengan posisi litotomi, dilakukan prosedur aseptik pada bagian yang akan di operasi, eksisi jaringan hemoroid dengan pisau atau gunting, predikel hemoroid dilagasi dengan chromic catgut 3/0, proses penjahitan setelah eksisi jaringan hemoroid, tindakan di ulang pada bagian jaringan hemoroid yang lain, area bekas operasi dibersihkan dan di tutup menggunakan kasa/di tampon, dan operasi selesai pada jam 11.20 Wita.


### **Pengkajian Umum**

1. Keluhan utama masuk ICU : Post Hemoroidektomi
2. Riwayat Penyakit Sekarang : Pasien mengeluh nyeri pada area luka operasi, nyeri dirasakan seperti tertusuk-tusuk dengan skala nyeri 7, nyeri timbul terus.


### **Pengkajian Nyeri:**

- P (Problem) : Pasien mengatakan nyeri pada bagian anus bekas operasi
- Q (Quality) : Pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk
- R (Region) : Nyeri pada bagian anus
- S (Skala) : Skala nyeri 7
- T (Time) : Nyeri timbul terus
3. Riwayat Penyakit Dahulu : Tidak ada
  4. Riwayat masuk RS : Keluarga pasien mengatakan bahwa sebelumnya pasien pernah dirawat di rumah sakit 20 tahun
  5. Riwayat Sosial :
    - a. Apakah klien merokok : Ya
    - b. Apakah klien mengkonsumsi analgetik : Tidak
  6. Riwayat Penyakit Keluarga : Tidak ada

## Genogram



## Keterangan :



GI : Generasi pertama adalah kakek dan nenek pasien sudah meninggal dengan penyakit yang tidak di ketahui

GII : Generasi kedua adalah bapak dan ibu pasien sudah meninggal dikarenakan faktor usia

GIII : Generasi ketiga adalah pasien yang merupakan anak ke-2 dari 7 bersaudara dan tidak ada keluarga yang memiliki penyakit yang sama dengan pasien

## 7. Tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 155/80 mmHg
- b. Suhu : 36°C
- c. Nadi : 82x/i
- d. Pernapasan : 18x/i
- e. SpO2 : 98%

**Pemeriksaan Fisik Khusus**

## 1. Airway

- a. Bebas : Ya
- b. Sumbatan jalan napas : Tidak ada
- c. Suara nafas : Tidak ada
- d. Kejang : Tidak
- Masalah Keperawatan : Tidak terdapat masalah keperawatan

## 2. Breathing

- a. Spontan : Ya
- b. Takipnea : Tidak Ada
- c. Wheezing : Tidak Ada
- d. Apnea : Tidak Ada
- e. Dispnea : Tidak ada
- f. Lain-lain : Tidak ada
- Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

## 3. Circulation

- a. Nadi : Teraba kuat

- b. Irama : Reguler
- c. Frekuensi : 82x/i
- d. Kulit : Tidak pucat
- e. Sianosis : Tidak
- f. Turgor : Elastis
- g. CRT : 2x/detik
- Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan

#### 4. Disability

- a. GCS : 15 (E4V5M6)
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. Pupil : isokor 2,5 mm/ 2,5 mm (normal)
- d. Reflek cahaya : (+/+)
- e. Kekuatan otot : Lemah 4,4,4,4
- Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan

#### 5. Exposure

- a. Deformitas : Tidak ada
- b. Contusio : Tidak ada
- c. Abrasi : Tidak ada
- d. Penetrasi : tidak ada
- e. Laserasi : Tidak ada
- f. Edema : Tidak ada
- Masalah keprawatan : Tidak ada masalah keperawatan



## Pemeriksaan Fisik Umum (Kepala dan Leher)

### 1. Bagian kepala atas

- a. Hematom/post trauma : Tidak ada
- b. Tipe rambut : Gelombang
- c. Warna rambut : Hitam
- d. Distribusi rambut : Normal
- e. Alopesia/Kebotakan : Tidak ada

### 2. Mata

- a. Pupil isokor (diameter kedua pupil sama) : 2,5/2,5 mm
- b. Sklera ikterik (kekuningan) : Tidak
- c. Conjunctiva anemis (pucat) : Ya (+/+)

### 3. Telinga

- a. Cerumen : Tidak ada
- b. Alat bantu dengar : Tidak ada

### 4. Hidung

- a. Nafas cuping hidung : Tidak
- b. Pilek : Tidak
- c. Terpasang alat bantu nafas : Tidak

### 5. Bibir dan Mulut

- a. Sianosis : Tidak
- b. Sariawan : Tidak
- c. Gigi palsu : Tidak
- d. Mukosa bibir : Lembab

e. Gangguan gigi dan gusi : Tidak

6. Leher

a. Pembesaran kelenjar tiroid : Tidak

b. Limfonodi (kelenjar limfe) : Teraba

c. Nadi karotis : Teraba

**Pemeriksaan Fisik Umum (Thoraks)**

1. Inspeksi : Bentuk dada simetris antara kiri dan kanan, tidak ada kelainan bentuk, pergerakan pernapasan normal
2. Auskultasi : Vesikuler
3. Perkusi : Sonor
4. Palpasi : Ekspansi dada simetris, tidak ada nyeri tekan

**Pemeriksaan Fisik Umum (Abdomen)**

1. Inspeksi : Simetris antara kiri dan kanan, warna kulit coklat tidak ada bekas luka
2. Auskultasi : Peristaltik usus 16x/i
3. Perkusi : Tidak ada penumpukan cairan, tidak ada massa/tumor
4. Palpasi : Tidak ada massa, tidak ada pembesaran hepar/hernia

### Pemeriksaan Fisik Umum (Genetalia)

1. Inspeksi : Terpasang kateter urine, nampak luka bekas operasi pada anus, nampak warna kemerahan, nampak terpasang verban, pasien nampak meringis kesakitan dan gelisah

### Pemeriksaan Fisik Umum (Ekstremitas)

1. Superior (atas):
- a. Edema : Tidak
  - b. Infus
    - a) Terpasang : Di lengan dextra dan sinistra
    - b) Jenis infus : Ringer laktat dan Dextrosa 5%
    - c) Faktor tetesan : 20 tetes/menit
    - d) Nyeri tusukan infus : Tidak
  - c. Nadi radialis : 86x/menit
  - d. CRT < 3 detik : Ya
  - e. Deformitas : Tidak
  - f. Fraktur : Tidak
2. Inferior (bawah)
- a. Edema : Tidak
  - b. Deformitas : Tidak
  - c. Fraktur : Tidak

## Pengkajian Nutrisi

Hari/Tanggal : Selasa, 7 September 2021

### 1. A (Antropometri)

BB : 60 Kg

TB : 165 cm

IMT : 22

### 2. B (Biochemical)

HGB : 15,6 g/dl dengan nilai rujukan : 14,0-17,5 g/dl

### 3. C (Clinical)

Rambut : Hitam

Turgor kulit : Elastis

Mukosa bibir : Kering terdapat lendir yang menempel dibibir

Conjungtiva : Anemis

### 4. D (Diet)

Tidak ada program diet

### 5. E (Energy)

Keluarga pasien mengatakan aktivitas pasien terbatas, selama di rawat aktivitas pasien dibantu oleh anaknya, pasien nampak lemah

### 6. F (Factor)

Pasien dirawat di rumah sakit karena telah dilakukan operasi hemorid dan membutuhkan pemantauan dan perawat

**Obat-obatan**

Nama obat	Dosis	Rute
Ringer Laktat	500ml/20tpm	Intravena
Dextrose 5%	500ml/20tpm	Intravena
Ceftriaxone	1 gr/12 jam	Intravena
Metronidazole	500mg/8 jam	Intravena
Dextofen	1 amp/8 jam	Intravena
Ranitidin	1 amp/12 jam	Intravena
Fentanyl	3cc/SP	Intravena

**Pemeriksaan Penunjang (Selasa, 7/9/2021)**

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
<b>Darah Rutin</b>			
WBC	7,84	(4,11-11,30)	10 <sup>3</sup> /uL
RBC	5,17	(4,50-5,90)	10 <sup>6</sup> /uL
HGB	15,6	(14,0-17,5)	g/dL
HCT	45,8	(80,0-96,4)	%
MCV	88,6	(27,5-33,2)	fL
MCH	30,2	(33,4-33,5)	Pg
MCHC	34,1	(4,50-5,90)	g/dL
PLT	256	(172-450)	10 <sup>3</sup> /uL
RDW-SD	40,1	(37,0-54,0)	fL
RDW-CV	12,2	(11,6-14,6)	%
PDW	9,1	(9,0-17,0)	fL
MPV	8,9	(9,0-13,0)	fL
P-CLR	15,7	(13,0-43,0)	%
PCT	0,23	(0,17-0,35)	%

NEUT	4,56	(1,80-7,70)	10 <sup>3</sup> /uL
LYMPH	2,15	(1,00-4,80)	10 <sup>3</sup> /uL
MONO	1,08	(0,00-0,80)	10 <sup>3</sup> /uL
EO	0,03	(0,00-0,60)	10 <sup>3</sup> /uL
BASO	0,02	(0,00-0,20)	10 <sup>3</sup> /uL
IG	0,02	(0,00-7,00)	10 <sup>3</sup> /uL
<b>Kimia Darah</b>			
SGPT	23	7-23	Iu/dL
Kreatinin	0,93	L: 0,7-1,1, P : 0,6-0,9	mg/dL
GDS	121	<200	mg/dL
<b>Immunologi</b>			
HbsAg	Reaktif	Non reaktif	

### Klasifikasi Data

Data Subjektif	Data Objektif
<p>1. Pasien mengeluh nyeri bekas operasi</p> <p>2. Pasien mengatakan nyeri pada bagian anus bekas operasi</p> <p>3. Pengkajian PQRST  P : pasien megatakan neri pada bagian anus bekas operasi  Q : pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk  R : nyeri pada bagian anus  S : skala nyeri 7  T : nyeri timbul terus</p> <p>4. Pasien mengatakan aktivitasnya terbatas</p> <p>5. Keluarga pasien mengatakan aktivitas pasien selama di RS dibantu oleh anaknya, misalnya apabila pasien ingin mengganti pakaian dan perawatan diri pasien</p>	<p>1. Pasien nampak meringis kesakitan</p> <p>2. Pasien nampak gelisah</p> <p>3. Nampak luka bekas operasi pada anus</p> <p>4. Nampak berwarna kemerahan</p> <p>5. Nampak terpasang verban</p> <p>6. Aktivitas sehari-hari nampak dibantu keluarga</p> <p>7. Pasiennampak lemah</p> <p>8. Kekuatan otot : 4,4,4,4</p> <p>9. TTV  TD : 155/90 mmHg  S: 36°C  N: 90x/i  P: 18x/i  SpO2 : 98%</p>

## Analisa data

No	Data	Etiologi	Masalah keperawatan
1.	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengeluh nyeri bekas operasi</li> <li>- Pasien mengatakan nyeri pada bagian anus bekas operasi, pengkajian PQRST</li> </ul> <p>P : pasien megatakan nyeri pada bagian anus bekas operasi</p> <p>Q : pasien mengatakan nyeri seperti tertusuktusuk</p> <p>R : nyeri pada bagian anus</p> <p>S : skala nyeri 7</p> <p>T : nyeri timbul terus</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien nampak meringis kesakitan</li> <li>- Pasien nampak gelisah</li> </ul>	<p>Konstipasi, mendedan yang kuat, diare tekanan intra kranial</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tekanan periver meningkat dan pelebaran vena hemoroidalis</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Hemoroid</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pembedahan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Post OP</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Diskontinuitas jaringan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pelepasan mediator kimia (bradikinin, histamin, serotonin dan prostaglandin)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Merangsang ujung saraf perifer</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Menghantarkan rangsangan ke substansi glatinosa</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Cortex cerebri (nyeri dipersepsikan)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nyeri akut</p>	Nyeri akut

## B. Diagnosis Keperawatan

1. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik



## C. Intervensi Keperawatan

No.	Diagnosa Keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi	Rasional
1.	Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik	Setelah dilakukan tindakan keperawatan nyeri pasien berkurang dengan kriteria hasil : 1. Keluhan nyeri menurun 2. Meringis menurun	<p><b>Manajemen Nyeri (I.08238)</b></p> <p><u>Observasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri</li> <li>- Identifikasi skala nyeri</li> <li>- Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri</li> </ul> <p><u>Terapeutik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an)</li> <li>- Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri</li> <li>- Fasilitasi istirahat dan tidur</li> </ul> <p><u>Edukasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jelaskan penyebab dan periode dan pemicu nyeri</li> <li>- Anjurkan monitor nyeri secara mandiri</li> <li>- Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</li> </ul>	<p><b>Manajemen Nyeri</b></p> <p><u>Observasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri yang pasien rasakan</li> <li>- Mengetahui tingkat nyeri yang pasien rasakan</li> <li>- Mengetahui hal-hal yang dapat memperberat ataupun memperingan nyeri yang pasien rasakan</li> </ul> <p><u>Terapeutik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi tingkat nyeri pasien/ mengalihkan pasien dari rasa nyerinya</li> <li>- Mengurangi resiko faktor yang dapat memperberat nyeri/menimbulkan nyeri</li> <li>- Mengalihkan dan memenuhi kebutuhan istirahat pasien</li> </ul> <p><u>Edukasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan pasien</li> </ul>

			<p><u>Kolaborasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, penyebab, lokasi saat nyeri muncul</li><li>- Memudahkan pasien untuk mengotrol nyeri dengan cara sederhana</li></ul> <p><u>Kolaborasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengurangi/menghilangkan rasa nyeri</li></ul>
--	--	--	---	--

## D. Implementasi Keperawatan

No .	Diagnosis Keperawatan	Hari, Tgl/jam	Implementasi	Nama Jelas
1.	<p>Nyeri Akut berhubungan dengan agen pencedera fisik</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengeluh nyeri bekas operasi</li> <li>- Pasien mengatakan nyeri pada bagian anus bekas operasi</li> <li>- Pengkajian PQRST</li> </ul> <p>P : pasien megatakan nyeri pada bagian anus bekas operasi</p> <p>Q : pasien mengatakan nyeri seperti tertusuktusuk</p> <p>R : nyeri pada bagian anus</p> <p>S : skala nyeri 7</p> <p>T : nyeri timbul terus</p> <p>DO:</p>	<p>Rabu, 08September2021</p> <p>10: 30 WITA</p>	<p><b>Manajemen Nyeri</b></p> <p><u>Observasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri</li> </ul> <p>Hasil:</p> <p>P : Pasien mengatakan nyeri pada luka post operasi bagian anus</p> <p>Q : nyeri seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R : nyeri pada bagian anus</p> <p>S :7 (Berat)</p> <p>T : nyeri timbul terus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi skala nyeri</li> </ul> <p>Hasil: Skala nyeri : 7 (Berat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri</li> </ul> <p>Hasil: Pasien mengatakan mendengarkan murottal Al-Qur'an ketika nyerinya datang</p>	Sri Muliana



2.	<p>Nyeri Akut berhubungan dengan agen pencedera fisik</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pasien mengeluh nyeri bekas operasi</li><li>- Pasien mengatakan nyeri pada bagian anus bekas operasi</li><li>- Pengkajian PQRST</li></ul> <p>P : pasien megatakan nyeri pada bagian anus bekas operasi</p> <p>Q : pasien mengatakan nyeri seperti tertusuktusuk</p> <p>R : nyeri pada bagian anus</p> <p>S : skala nyeri 7</p> <p>T : nyeri timbul terus</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Klien nampak meringis kesakitan</li><li>- Pasien nampak gelisah</li></ul>	<p>Kamis, 09 September 2021</p> <p>14:45 WITA</p> <p>15:30W</p>	<p><b>Manajemen Nyeri</b></p> <p><u>Observasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri</li></ul> <p>Hasil:</p> <p>P : Pasien mengatakan nyeri pada luka post operasi bagian anus</p> <p>Q : nyeri seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R : nyeri pada bagian anus</p> <p>S : 4 (sedang)</p> <p>T : nyeri timbul terus</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi skala nyeri</li></ul> <p>Hasil: Pasien mengatakan skala nyeri : 4 (nyeri sedang)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi faktor yang dapat memperberat dan memperingan nyeri</li></ul> <p>Hasil: Pasien mengatakanmendengarkan murottal ketika nyeri muncul</p> <p><u>Terapeutik</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an)</li></ul>	<p>Sri Muliana</p> <p>Sri Muliana</p>
----	--	---	--	---------------------------------------

		16:45 WITA	<p>Hasil: Pasien diberikan kompres dingin, evaluasi: pasien mengatakan merasa lebih nyaman dan rileks, nyeri sedikit berkurang setelah di kompres, skala nyeri: 3 (nyeri ringan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi istirahat dan tidur</li> </ul> <p>Hasil: Pasien sambil beristirahat dan mendengarkan murottal</p> <p><u>Edukasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan penyebab dan pemicu nyeri</li> </ul> <p>Hasil: Pasien paham tentang nyeri yang dirasakan dan apa yang telah di jelaskan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</li> </ul> <p>Hasil: Telah di adukasi keluarga terkait kompres dingin dan edukasi terkait aplikasi SINC untuk terapi murottal dan terapi dzikir</p> <p><u>Kolaborasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolaborasi pemberian analgesik</li> </ul> <p>Hasil: Di berikan Obat Dextofen 1 amp/IV/8 jam</p>	Sri Muliana
		23 :10 WITA		Sri Muliana

## E. Evaluasi Keperawatan

No	Diagnosis	Hari, Tgl./ Jam	Evaluasi	Nama Jelas
1	Nyeri Akut berhubungan dengan agen pencedera fisik	Rabu 08 September 2021 13.00 WITA	<p><u>Subjektif:</u></p> <p>P : Pasien mengatakan nyeri pada luka post operasi bagian anus</p> <p>Q : nyeri seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R : nyeri pada bagian anus</p> <p>S : 4 (sedang)</p> <p>T : nyeri timbul terus</p> <p><u>Objektif:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tampak masih meringis</li> <li>2. Kesadaran: Composmentis</li> <li>3. TTV <ul style="list-style-type: none"> <li>TD : 130/90 mmHg</li> <li>S: 36°C</li> <li>N: 86x/i</li> <li>P: 18x/i</li> <li>SpO2 : 98%</li> </ul> </li> <li>4. Skala nyeri : 4</li> </ol>	Sri Muliana

			<p><u>Assesment:</u> Masalah nyeri akut belum teratasi</p> <p><u>Planning:</u> Lanjutkan Intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor skala nyeri</li> <li>2. Berikan kompres dingin dan terapi murottal</li> <li>3. Obsevasi KU TTV pasien/ jam</li> <li>4. Tindakan kolaborasi analgesic dextofen 1amp/IV/8 jam</li> </ol>	
2	Nyeri Akut berhubungan dengan agen pencedera fisik	Kamis, 09 September 2021 Jam 18.20 WITA	<p><u>Subjektif:</u></p> <p>P : Pasien mengatakan nyeri pada luka post operasi bagian anus</p> <p>Q : nyeri seperti tertusuk-tusuk</p> <p>R : nyeri pada bagian anus</p> <p>S : 3 (ringan)</p> <p>T : nyeri hilang timbul</p> <p><u>Objektif:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran: Composmentis</li> <li>2. TTV</li> </ol> <p>TD : 120/80 mmHg</p> <p>S: 36,2°C</p>	Sri Muliana



			<p>N: 80x/i P: 20x/i SpO2 : 98%</p> <p>3. Skala nyeri : 3 (ringan)</p> <p><u>Assesment:</u> Masalah nyeri belum teratasi</p> <p><u>Planning:</u> Lanjutkan Intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitor skala nyeri</li><li>2. Berikan kompres dingin dan terapi murottal</li><li>3. Obsevasi KU TTV pasien/ jam</li><li>4. Tindakan kolaborasi analgesik dextofen 1 amp/IV/8 jam</li></ol>	
--	--	--	--	--

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Asuhan Keperawatan**

##### **1. Analisis Pengkajian Keperawatan**

Pasien laki-laki dengan inisial Tn. U berusia 65 tahun, masuk Rumah Sakit pada tanggal 07/09/2021 dengan diagnosa medis hemoroid grade IV dan tindakan medis yang telah dilakukan yaitu Hemoroidektomi yang dilakukan juga pada tanggal 07/09/2021 di ruang Instalasi Bedah Sentral. Post Hemoroidektomi pasien masuk ICU dengan keluhan nyeri pada daerah bekas operasi, nyeri dirasakan seperti tertusuk-tusuk dengan skala nyeri 7, nyeri dirasakan hilang timbul. Hasil pemeriksaan fisik di dapatkan TD : 155/90mmHg, Suhu : 36°C, Nadi : 82x/i, Pernapasan : 18x/I, dan SpO<sub>2</sub> : 98%.

Indikasi pasien masuk ICU menggunakan kriteria yang disesuaikan dengan prioritas kondisi pasien sesuai dengan Permenkes (2011) menyebutkan bahwa pasien yang masuk ICU didasarkan dengan skala prioritas 1, 2 dan 3. Pasien Prioritas 1 (satu) : pasien yang sakit kritis, tidak stabil memerlukan terapi intensif dan tertitrasi, seperti memerlukan dukungan ventilasi, alat bantu suportif organ tubuh, infus obat-obatan vasoaktif kontinyu, obat anti aritmia kontinyu dan obat tertitrasi. contoh : pasien pasca bedah kardiorasik, pasien sepsis berat, gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit yang mengancam nyawa. Pasien Prioritas 2 (dua) : pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU, sebab sangat beresiko jika tidak mendapatkan pelayanan intensif segera, misal pemantauan intensive dengan menggunakan

peralatan pulmonary arterial cateter. Contoh : pasien dengan penyakit jantung paru, CKD dengan komplikasi. Pasien Prioritas 3 (tiga) :pasien kritis yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya, atau penyakit akutnya, secara sendirian atau kombinasi. Kemungkinan sembuh dan/atau manfaat terapi di ICU pada golongan ini sangat kecil. Contoh pasien dengan keganasan metastatik disertai penyulit infeksi (Kementerian Kesehatan RI, 2011; Yulianti, 2021).

Keluhan utama yang disampaikan pasien adalah nyeri pada daerah luka post operasi. Masalah ini didapatkan pada saat melakukan pengkajian di Ruang ICU pada tanggal 07/09/2021. Dihari pertama post hemoroidektomi pasien mengeluh nyeri pada bekas operasi dengan skala nyeri 7 nyeri berat, nyeri tertusu-tusuk, nyeri timbul terus dan nyeri akan hilang ketika pasien diberi obat anti nyeri. nyeri akut sendiri merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga keberat yang berlangsung kurang dari 3 bulan (SDKI, 2017).

Nyeri pasca bedah merupakan akibat dari adanya trauma jaringan dan terputusnya kontinuitas jaringan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Utami & Ganik Sakitri (2020), menyatakan bahwa nyeri pasca bedah disebabkan karena adanya stimulus mekanik akibat kerusakan jaringan dari prosedur pembedahan yaitu luka (insisi), sehingga merangsang mediator-mediator zat kimia nyeri. Post operasi membuat kulit terbuka dan terluka sehingga impuls nyeri di timulus ke saraf sensori dan teraktivasi lalu di

transmisikan ke kornus posterior di korda spinalis, kemudian saraf aferen akan menyampaikan persepsi nyeri ke otak. Rohmani (2018) juga mengatakan salah satu penyebab nyeri post hemoroidektomi yaitu pemasangan tampon dalam kanalis analis di 24 jam pertama setelah dilakukan tindakan operasi. Tampon yang terpasang menyebabkan spasme internal karena adanya tekanan dan regangan di saraf perifer di kanalis analis.

## 2. Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan utama pada kasus diatas yaitu nyeri akut post hemoroidektomi. Masalah didapatkan pada saat melakukan pengkajian pada tanggal 07/09/2021 di ruang *Intensif Care Unit* (ICU) dengan skala nyeri 7 kualitas nyeri seperti tertusuk-tusuk, intensitas nyeri timbul terus, pasien tampak meringis kesakitan dan gelisah, TD: 155/90 mmHg, nadi: 82x/i. Menurut International Association for the Study of Pain (IASP) dalam buku “Classification of Chronic Pain, Second Edition (Revised)” tahun 2011, nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang sangat tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan aktual atau potensial, atau dijelaskan dalam hal kerusakan tersebut (Bahrudin, 2017). Berdasarkan dari beberapa masalah yang didapatkan, akar permasalahan pada pasien post hemoroidektomi adalah nyeri akut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Utami & Ganik Sakitri (2020) mengatakan bahwa nyeri post operasi disebabkan oleh adanya stimulus mekanik akibat kerusakan jaringan dari prosedur pembedahan yaitu luka (insisi), sehingga akan merangsang mediator-mediator zat kimia dari nyeri.

Nyeri akut merupakan masalah utama dalam penelitian ini dan tidak menutup kemungkinan permasalahan lainpun juga dapat muncul. Peran seorang perawat disini sangat dibutuhkan dalam membantu mengurangi intensitas nyeri yang dirasakan pasien dengan memberikan intervensi (menggunakan pendekatan/manajemen farmakologis maupun non-farmakologis).

### 3. Analisis Intervensi Keperawatan

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada Tn. U didapatkan diagnosis keperawatan utama yaitu nyeri akut. Tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien dengan diagnosis keperawatan nyeri akut adalah manajemen nyeri dengan memberikan kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an (PPNI, 2018). Kompres dingin merupakan salah satu intervensi nonfarmakologi dengan fungsi mengurangi prostaglandin yang memperkuat reseptor nyeri, menghambat proses inflamasi dan merangsang pelepasan endorfin (Andarmoyo, 2013; Rohmani, 2018). Tindakan pemberian yang dilakukan yaitu kompres dingin di tengkuk leher belakang yang dikombinasikan dengan terapi murottal. Terapi murottal adalah rekaman suara Al-Qur'an yang dilantunkan oleh seorang qori (pembaca Al-Qur'an) (Siswantinah, 2011; Mulyani et al., 2019).

Pengaruh kompres dingin di leher belakang atau tengkuk bertujuan untuk menghambat sensasi nyeri yang akan dihantarkan oleh impuls syaraf ke sistem syaraf pusat (otak). William & Ramakhrisan (2014) menyatakan bahwa kompres dingin di leher belakang pada pasien nyeri dapat menyebabkan pembuluh darah vasokonstriksi, aliran darah berkurang, sensasi nyeri berkurang

dan proses inflamasi melambat. Pemberian intervensi kompres dingin diletakkan pada leher bagian belakang karena dipersyarafi oleh saraf cervikalis. Saraf cervikalis sendiri dibentuk oleh pleksus servikobrakialis dan saraf ke kepala yang berperan pada fungsi ekstremitas atas dan terlibat dalam produksi nyeri (Tulaar, 2008). Tengku (leher belakang) merupakan daerah yang kaya akan pembuluh darah dan lokasinya dekat dengan daerah otak. Kompres dingin mempunyai beberapa tahapan mekanisme kerja yang pertama memberikan sensasi dingin, kedua serasa dingin dan menusuk, ketiga timbul rasa sakit yang sementara dan terakhir memberikan sensasi kesemutan dan mati rasa (*paresthesia*). Daily Nutrition News (2016) menyatakan bahwa menempatkan es batu ditengku pada titik Feng Fu selama 10-20 menit akan memberikan sensasi yang luar biasa. Pada 30-40 detik pertama merasa dingin, selanjutnya akan memberikan rasa kehangatan. Hal ini karena dingin merangsang endorpin dilepaskan oleh otak dan spinal sehingga mengalir ke pembuluh darah yang dapat membuat dan rileks tubuh (Rohmani, 2021)

Berdasarkan hasil analisis jurnal yang telah didapatkan, peneliti menyimpulkan bahwa intervensi yang diberikan pada pasien post hemoroidektomi yaitu terapi kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an dan diberikan 2 kali dalam sehari, intervensi dilakukan secara bersamaan antara terapi kompres dingin yang dikombinasikan dengan terapi murottal Al-Qur'an. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu air dingin dengan suhu 10-18°C, cold pack/ice pack/ washlap, handphone/audio yang berisi murottal Al-Qur'an. Terapi kompres dingin diberikan selama  $\pm 20$  menit dan terapi murottal

dilakukan selama  $\pm 25$  menit. Intervensi yang diberikan bertujuan untuk meringankan rasa nyeri, meningkatkan perasaan rileks, mengalihkan perhatian dari rasa takut, menghilangkan rasa cemas dan tegang.

#### 4. Analisis Implementasi Keperawatan

Pemberian kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an diberikan selama 2 hari pada tanggal 08-09 September 2021 di Ruang ICU RSUD Labuang Baji Makassar dan didapatkan hasil :

- a. Implementasi hari Pertama : pada tanggal 08 September 2021 jam 10.30 WITA sebelum diberikan intervensi pada pasien dahulukan observasi terkait karakteristik nyeri, identifikasi faktor yang memperberat nyeri dan menanyakan kondisi pasien, kemudian memberikan kompres dingin  $\pm 20$  menit di belakang leher (tengkuk belakang) dan terapi murottal selama  $\pm 25$  menit menggunakan handphone yang berisi murottal (surah Ar-Rahman), terapi di berikan 2-5 jam setelah pemberian analgetik. Sebelum dilakukan intervensi didapatkan hasil pasien mengatakan nyeri tidak tertahankan dengan skala nyeri 7 (nyeri berat) pada bekas operasi, nyeri dirasakan terus-menerus dibuktikan dengan wajah nampak meringis, menutup mata dan pasien nampak memegang bagian yang sakit. Setelah diberikan kompres dingin dan terapi murottal pasien merasa lebih tenang dan nyaman, skala nyeri berkurang dari skala 7 nyeri berat menjadi skala 4 nyeri sedang, tampak meringis menurun dibuktikan dengan pasien nampak tenang, tidak memegang area yang sakit. Tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 86x/i.

b. Implementasi hari kedua : tanggal 09 September 2021 jam 14.45 WITA, sebelum diberikan intervensi pasien diobservasi terkait karakteristik nyeri, identifikasi faktor yang memperberat nyeri dan menanyakan kondisi pasien sebelum dilakukan intervensi didapatkan hasil pasien mengatakan nyeri tidak sudah mulai berkurang dengan skala 4 (nyeri sedang), nyeri dirasakan pada area bekas operasi, nyeri dirasakan hilang timbul, dibuktikan dengan wajah pasien nampak meringis. Kemudian diberikan intervensi kompres dingin dan terapi murottal, setelah diberikan intervensi didapatkan hasil: pasien mengatakan nyeri sudah berkurang setelah diberikan kompres dingin selama  $\pm 20$  menit di bagian belakang leher (tengkuk belakang) dan terapi murottal dengan waktu  $\pm 25$  menit menggunakan handphone yang berisi ayat-ayat murottal (surah Ar-Rahman). Setelah diberikan terapi pasien mengatakan merasa lebih nyaman dan tenang, nyeri berkurang dari skala nyeri 4 nyeri sedang berkurang menjadi nyeri skala 3 yaitu nyeri ringan, tampak meringis menurun dibuktikan dengan pasien tampak beristirahat, dan terjadi perubahan status hemodinamik setiap setelah diberikan intervensi yaitu tekanan darah 120/80mmHg dan nadi 80x/i.

##### 5. Analisis Evaluasi Keperawatan

Setelah pemberian intervensi kompres dingin dan terapi murottal selama 2 hari di dapatkan hasil yaitu terjadi penurunan tingkat nyeri yang dirasakan oleh pasien nyeri skala 7 nyeri berat menjadi nyeri skala 3 nyeri ringan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian intervensi kompres dingin dan terapi murottal efektif dalam menurunkan nyeri pada pasien post hemoroidektomi.



Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva, 2013 yang mengatakan bahwa kompres dingin merupakan suatu tindakan yang menempatkan suatu benda dingin pada tubuh bagian luar. Dampak fisiologisnya yaitu terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah, mengurangi rasa nyeri, dan menurunkan aktifitas ujung saraf pada otot. Penggunaan kompres dingin terbukti dapat mengurangi nyeri, terapi dingin menimbulkan efek analgetik dan memperlambat kecepatan hantaran saraf sehingga impuls nyeri yang mencapai otak lebih sedikit (Tri Utami & Ganik Sakitri, 2020). Penelitian lain yang sejalan dilakukan oleh Rohmani (2018) mengatakan bahwa kompres dingin dapat menurunkan transmisi nyeri melalui serabut A-delta dan serabut C yang berdiameter kecil serta mengaktifasi transmisi serabut saraf A-beta yang lebih cepat dan besar.

Terapi murottal adalah terapi yang memperdengarkan rekaman suara Al-Qur'an yang dilagukan oleh seorang qori' (pembaca Al-Qur'an). Lantunan Al-Qur'an secara fisik mengandung unsur suara manusia, sedangkan suara manusia merupakan instrument penyembuh yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau yang biasanya dilantunkan 15-25 menit saja. Suara dapat menurunkan hormon-hormon stress, mengaktifkan hormon endorphine alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernapasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak (Kuncoro, 2015 dalam Risnah et al., 2021). Terapi murottal ini menggunakan beberapa surah dalam Al-Qur'an diantaranya surat Al-Fatihah,

surat Al-Ikhlâs, surat An-Nas, Ayat Kursi, surat Yasin ayat 58 dan surat Al-Anam ayat 1-3 dan 13 dimana dalam surat ini dapat mengaktifkan energi ilaiyah dan dapat pula merangsang sistem endokrin serta dipercaya sebagai ayat yang dapat mengusir segala penyakit dan rasa sakit yang diderita (Sulistiyawati & Widodo, 2020).

Murottal Al-Qur'an yang diperdengarkan dalam bentuk suara masuk menjadi rangsang auditori yang dapat diterima oleh telinga yang sehingga mengakibatkan getaran yang akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran kemudian dipancarkan ke saraf melalui nervus VIII (Vestibule choclearis) ke otak dilanjutkan ke lobus temporal untuk diteruskan ke amigdala sebagai pusat emosi yang berperan penting dari salahs atu sistem limbik kemudian mengeluarkan neurontrasmitter (Bensodiashepam) dalam hal ini yang dapat membuat perasaan menjani tenang dan rileks (Sherwood, 2011 dalam Risnah et al., 2021).

#### B. Analisis Intervensi EBPN

Intervensi utama yang telah peneliti berikan untuk mengatasi nyeri pada pasien psot hemoroidektomi untuk mengatasi masalah nyerinya yaitu terapi kompres dingin dan terapi murottal (PPNI, 2018a). Kompres dingin merupakan suatu tindakan menempatkan benda dingin pada tubuh bagian luar. Dampak fisiologisnya yaitu terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah, mengurangi rasa nyeri, dan menurunkan aktifitas ujung saraf pada otot. Penggunaan kompres dingin terbukti dapat mengurangi nyeri, terapi dingin menimbulkan efek analgetik dengan memperlambat kecepatan hantaran saraf sehingga impuls nyeri yang menuju otak

lebih sedikit (Tri Utami & Ganik Sakitri, 2020). Penelitian lain yang sejalan dilakukan oleh Rohmani (2018) mengatakan bahwa kompres dingin dapat menurunkan transmisi nyeri melalui serabut A-delta dan serabut C yang berdiameter kecil serta mengaktivasi transmisi serabut saraf A-beta yang lebih cepat dan besar.

Pada penelitian (Suwardi & Rahayu, 2019) mengatakan salah satu teknik relaksasi yang dapat menurunkan ketegangan fisiologis yaitu terapi murottal, berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan terapi murottal dapat menurunkan nyeri, dari nyeri berat ke nyeri ringan. Hal tersebut dikarenakan terapi murottal berisi nilai spiritual yang membuat jiwa menjadi tenang, damai dan juga jika makna yang terkandung dalam Al-Qur'an di hayati maka akan mengeluarkan tetesan air mata seakan merasakan ada energi baru pada tubuhnya. Hal tersebut didukung oleh pendapat Rahayu, Hidayati & Imam (2018) yang menyatakan bahwa setelah diberikan terapi murottal tingkat depresi menurun dari tingkat depresi sedang turun menjadi tingkat depresi ringan. Selain itu hasil penelitian Faradisi & Aktifah (2018) tentang pengaruh intervensi terapi murottal pada penurunan kecemasan post operasi didapatkan hasil secara statistic dengan  $p = 0,004$  artinya terdapat pengaruh intervensi terapi murottal terhadap penurunan kecemasan post operasi (Suwardi & Rahayu, 2019).

Suara pada murottal dapat menurunkan kadar hormon stres, mengaktifkan hormon endorphin alami, meningkatkan perasaan rileks dan damai serta mengalihkan perhatian dari rasatakut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga dapat menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernapasan,

detak jantung dan aktivitas gelombang otak. Keadaan rileks, nyaman dan tenang tersebut mampu mendistraksi nyeri sehingga nyeri yang dirasakan berkurang (Siswantinah, 2011; Mulyani et al., 2019).

Keterikatan dan keterkaitan intervensi *evidence based practice nursing* dengan Murottal Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an dengan mendengarkan murottal akan membuat perasaan lebih rileks, memberikan perubahan fisiologis, terapi murottal secara teratur dapat menjadi obat dalam menyembuhkan berbagai penyakit, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-isra:82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

*Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi obat (penawar) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian (QS. Al-Isra 17 : 82).*


#### **Tafsir QS. Surat Al-Isra (17): 82 Oleh Muhammad Quraish Shihab:**

Dan kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai nabi Muhammad, sebagai obat penawar berbagai macam penyakit hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman yang mengamalkannya, sedangkan bagi orang-orang yang zalim Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian yang disebabkan oleh kekufuran mereka. Setiap kali mendengar bacaan alqur'an semakin bertambah kekufurannya dan apabila kami berikan kenikmatan kepada manusia, seperti kesehatan atau kekayaan niscaya dia berpaling dan tidak bersyukur kepada Allah, menjauhkan diri dari mengingat Allah dengan sombong dan apabila dia ditimpa kesusahan, seperti sakit

atau kemiskinan niscaya dia berputus asa kehilangan harapan dari rahmat Allah(Kementerian Agama RI, 2019).

Terapi murottal yang biasa digunakan yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlâs, surah An-Nas, Ayatul Qursi, surah Ar-Rahman, surah Yasin ayat 58 dan surah Al-An'am ayat 1-3 dan 13 dimana dalam surah ini dapat mengaktifkan energi ilaiyah dan dapat merangsang sistem endokrin serta dipercaya sebagai ayat yang dapat mengusir segala penyakit dan rasa sakit yang diderita (Sulistiyawati & Widodo, 2020).

Terdapat hadits dari 'Aisyah RA yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah menderita suatu penyakit beliau biasanya meruqyah dirinya dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur-an seperti hadis berikut:



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ. فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِي رَجَاءَ بَرَكَاتِهَا

Atrinya :

*“Rasulullah saw jika menderita suatu penyakit, biasanya beliau meruqyah dirinya dengan membaca kedua surah tersebut (al-Falaq dan an-Nas), kemudian meniupkannya. Ketika beliau sakit keras, akulah yang membacakan kedua surat tersebut untuk beliau. Selanjutnya akulah yang mengusapkan tangan beliau (pada badan beliau), demi mengharap barokah dari tangan beliau.”*

Salah satu surah dalam Al Qur'an yang berfungsi sebagai obat dan dapat digunakan sebagai terapi murottal adalah surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman terdiri atas 78 ayat, semua ayatnya mempunyai karakter ayat pendek sehingga nyaman didengarkan dan dapat menimbulkan efek relaksasi bagi pendengar yang

masih awam sekalipun, bentuk gaya bahasanya yaitu terdapat 31 ayat yang diulang-ulang (Salim, 2014). Terapi murottal surah Ar-Rahman akan merdu jika pembacanya tartil (sesuai dengan pembacaan Al-Qur'an yang benar), surah Ar Rahman juga memiliki banyak ayat yang dibaca berulang-ulang sehingga mampu memberikan penekanan/penegasan alunan suara bagi pendengarnya (Gunawan, 2017). Terapi lantunan Murottal Al-Qur'an yang dibacakan kepada orang yang sakit selain bacaan yang diulang-ulang beberapa kali hingga datangnya kesembuhan atas izin Allah Swt. Ketahuilah bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh untuk setiap penyakit dan Allah SWT membuat ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang menakjubkan yang bisa dipahami (Ridaryani, 2020).

#### C. Keterbatasan

- 1) Keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu saat melakukan implementasi hanya dilakukan 2 hari sehingga peneliti mengalami keterbatasan dalam pengambilan data.
- 2) Saat melakukan implementasi keperawatan 1x24 jam peneliti tidak sempat melakukan evaluasi pada pasien karena waktu melakukan implementasi hanya 1 waktu dalam sehari, implementasi hari pertama di pagi hari dan implementasi hari ke 2 di sore hari.
- 3) Saat melakukan implementasi terapi murottal pada pasien peneliti tidak menggunakan headset/earphone sehingga saat implementasi kemungkinan pasien lebih khidmat mendengarkan murottal menggunakan headset/earphone dibandingkan yang tidak menggunakan headset/earphone.
- 4) Jumlah sampel yang digunakan hanya 1 sampe

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan peneliti mengenai pemberian intervensi terapi kompres dingin dan murottal Al-Qur'an pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri akut, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Gambaran hasil pengkajian pada pasien post hemoroidektomi yaitu dengan masalah nyeri akut, nyeri dirasakan tertusuk-tusuk dengan skala nyeri 7 dan nyeri timbul terus, tekanan darah: 155/90 mmHg, nadi: 90x/i.
2. Diagnosis keperawatan pada pasien post hemoroidektomi ialah nyeri akut
3. Gambaran setelah diberikan intervensi kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an selama 2 hari pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri akut, didapatkan hasil:
  - a. Hari Pertama : pada tanggal 08 September 2021 jam 10.30 WITA didapatkan hasil pasien mengatakan nyeri agak berkurang setelah diberikan kompres dingin dan merasa lebih rileks dan nyaman setelah mendengarkan murottal, skala nyeri berkurang dari skala 7 nyeri berat menjadi skala 4 nyeri sedang, tampak meringis menurun.
  - b. Hari kedua : tanggal 09 September 2021 jam 14.45 WITA, dapatkan hasil: pasien mengatakan nyeri sudah berkurang setelah diberikan kompres dingin dan pasien merasa lebih nyaman dan tenang setelah mendengarkan terapi murottal, nyeri berkurang dari skala nyeri 4

berkurang menjadi nyeri skala 3 yaitu nyeri ringan, tampak meringis menurun

4. Implementasi keperawatan pada pasien post hemoroidektomi yaitu kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an. Hasil analisis intervensi kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri akut yaitu terdapat perubahan tingkat nyeri yang dirasakan pasien setelah diberikan intervensi kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an selama 2 hari dari skala nyeri 7 menjadi skala nyeri 3 yaitu skala nyeri ringan. Selain itu juga terjadi perubahan status hemodinamik setiap setelah diberikan intervensi yaitu tekanan darah sebelum dilakukan intervensi kompres dingin dan terapi murottal yaitu TD 155/90 mmHg, nadi: 90x/i, hari pertama dilakukan implementasi didapatkan hasil tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 86x/i, dan hari ke 2 implementasi di dapatkan hasil tekanan darah 120/80mmHg dan nadi 90x/i.
5. Evaluasi keperawatan pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri akut diberikan intervensi kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an efektif dapat mengatasi beberapa masalah keperawatan yang muncul yaitu nyeri akut, gangguan pola tidur, dan ansietas yang disebabkan oleh nyeri yang dirasakan pasien. Dapat disimpulkan bahwa intervensi ini efektif dalam mengatasi nyeri yang dirasakan pasien post hemoroidektomi.



## B. Saran

### 1. Bagi Profesi Keperawatan

Penulisan karya akhir ini bisa dijadikan bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dalam pemberian terapi non farmakologi khususnya pada pasien nyeri post hemoroidektomi

### 2. Bagi Pelayanan Rumah Sakit

Penulisan karya akhir dapat menjadi bahan masukan dibidang keperawatan serta memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien post hemoroidektomi dengan masalah nyeri dan melihat keefektifan pemberian kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an dalam mengatasi nyeri.

### 3. Bagi Institusi Pendidikan

Penulisan karya akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan serta dapat memberikan informasi sehingga menambah pengetahuan bagi pembaca tentang pemberian terapi nonfarmakologis kompres dingin dan terapi murottal Al-Qur'an terhadap penurunan tingkat nyeri pasien post hemoroidektomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andarmoyo, S. (2017). *Konsep & Proses Keperawatan Nyeri*. Ar-Ruzz Media.
- Ardian, A. dkk. (2021). *Buku Panduan Praktek Profesi Ners Angkatan XVIII Departemen Keperawatan Gawat Darurat*. Prodi Ners UIN Alauddin Makassar.
- Bahrudin, M. (2017). Patofisiologi Nyeri (Pain). *Saintika Medika*, 13(1), 7. <https://doi.org/10.22219/sm.v13i1.5449>
- Basri, B. dkk. (2020). *Konsep Dasar Dokumentasi Keperawatan*. CV. Media Sains Indonesia.
- Cengiz, T. B., & Gorgun, E. (2019). Hemorrhoids: A range of treatment. *Cleveland Clinic Journal Of Medicine*, 86.
- Chou, R. et al. (2016). Guidelines on the Management of Postoperative Pain. *Journal of Pain*, 17(2), 131–157.
- Dewangan, R., & Tiwari, S. K. (2019). Physiology of Pain and its Management in Veterinary Patients. *The Pharma Innovation Journal*, 8(11), 68–78.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an kemenag*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kwon, M., Altin, M., Duenas, H., & Alev, L. (2014). The Role of Descending Inhibitory Pathways on Chronic Pain Modulation and Clinical Implications. *Pain Practice*, 14(7), 656–667. <https://doi.org/10.1111/papr.12145>
- Lohsiriwat, V. (2012). Hemorrhoids: From Basic Pathophysiology to Clinical Management. *World Journal of Gastroenterology*, 18(17), 2009–2017. <https://doi.org/10.3748/wjg.v18.i17.2009>
- Mulyani, N. S., Purnawan, I., & Upoyo, A. S. (2019). *Perbedaan Pengaruh Terapi Murottal selama 15 Menit dan 25 Menit terhadap Penurunan Skala Nyeri pada Pasien Kanker Pasca Bedah*. 1(April), 33–35.
- Natasa, A. (2019). *Asuhan Keperawatan pada Pasien Tn. B dengan Hemoroid di Ruang Ambun Suri Lantai 1 RSUD dr. Drachmad Mochtar Bukittinggi*.
- Nurarif, A.H dan Kusuma. H. (2015). *APLIKASI Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis & NANDA NIC-NOC*. MediAction.
- Nursalam. (2015). *Manajemen Keperawatan Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Konsep, Proses dan Praktik* (5th ed.). Salemba Medika.
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika.

- PPNI, T. P. S. D. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia* (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI, T. P. S. D. (2018a). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia* (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI, T. P. S. D. (2018b). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia* (1st ed.). DPP PPNI.
- Pradiantini, K. H. Y., & Dinata, I. G. S. (2021). Diagnosis Dan Penatalaksanaan Hemoroid. *Ganesha Medicina Journal*, 1(1).
- Rachmawati, I. N. (2008). Analisis Teori Nyeri: Keseimbangan Antara Analgesik dan Efek Samping. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2), 129–136. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i2.211>
- Ramani, R. (2021). Review Article On Treatments & Preventions Of Hemorrhoids. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(7), 6096–6099.
- Rezkita, W. (2020). *Karakteristik Penderita Hemoroid Rawat Inap di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Ridaryani, W. (2020). *Efektifitas Terapi Murottal Al-Qur'an terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Ibu Post Sectio Caesaria si RSUD Puri Husada Tembilihan*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah.
- Risnah, & Irwan, M. (2021). *Falsafah dan Teori Keperawatan dalam Integrasi Keilmuan* (Musdalifah (ed.)). Alauddin University Press.
- Risnah, Yulistiawati, E., & Agrevita, A. (2021). Evidance Based Nursing Terapi Murottal pada Klien Preeklampsia Post Sectio Caesarea. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan Nasional*.
- Rohmani. (2021). *KOMPRES DINGIN DI LEHER BELAKANG (TENGGUK) PADA PASIEN POST HEMOROIDEKTOMI* - Google Books.
- Rohmani, R. dkk. (2018). Penurunan Nyeri Dengan Kompres Dingin Di Leher Belakang (Tengkuk) Pada Pasien Post Hemoroidektomi Terpasang Tampon. *Jurnal Keperawatan Tropis Papua*, 1(1), 8–12. <https://doi.org/10.47539/jktp.v1i1.14>
- Rukmi, D. K. dkk. (2022). *Metodologi Proses Asuhan Keperawatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sagitha, M. (2020). *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Hemoroidektomi Dengan Gangguan Nyeri Akut Di Ruang Wijaya Kusuma I RSUD Ciamis*. 1–83. <http://repository.bku.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/632/MetaSagitha-1-83.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Sardinha, T. C., & Corman, M. L. (2002). Hemorrhoids. *Surgical Clinics of North America*, 82, 1153–1167.
- Sari, R. C. E. (2021). *Aplikasi Hidroterapi SITZ BATH terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Post Hemoroidektomi*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Sukurokhman, D. dkk. (2018). Asuhan Keperawatan pada Ny. M dengan Post Operasi Hemoroidektomi di Ruang Menur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. *Journal of Nursing & Health*, Vol. 3, No.
- Sulistiyawati, & Widodo, S. (2020). *Penerapan Terapi Murottal dan Aromaterapi Lavender terhadap Penurunan Nyeri dalam Asuhan Keperawatan pada Pasien Post Operasi Open Reduction Internal Fixation (ORIF) di RS Roemani Semarang. Vol 3*.
- Sun, Z., & Migaly, J. (2016). Review of Hemorrhoid Disease: Presentation and Management. *Clinics in Colon and Rectal Surgery*, 29(1), 22–29. <https://doi.org/10.1055/s-0035-1568144>
- Suwardi, A. R., & Rahayu, D. A. (2019). Efektifitas Terapi Murottal terhadap Penurunan Tingkat Nyeri pada Pasien Kanker. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 7(1).
- Tri Utami, & Ganik Sakitri. (2020). Pemberian Kompres Dingin Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Post Hemoroidektomi Di Rsud Simo Boyolali: Studi Kasus. *Intan Husada Jurnal Ilmu Keperawatan*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.52236/ih.v8i1.169>
- Yulianti, T. (2021). *Gambaran Tingkat Kejadian Systemik Inflammatory Response Syndrom (SIRS) di Ruang ICU RSUD Lahad Sumatera Selatan Tahun 2021*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang.

**LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**



**SRI MULIANA**

Penulis lahir di Ujung Pandang, 24 Agustus 1998, penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Ismail dan Hawatiah. Saat ini penulis bertempat tinggal Perumnas Antang Jalan kajenjeng dalam 6 no.3. Penulis akrab di panggil **Srimul**, penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD INP Brorong Jambu III Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 20 Makassar dan sekolah menengah akhir di SMA Negeri 13 Makassar. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Keperawatan dan melanjutkan Program Profesi Ners di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun karya tulis akhir (KTA) yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pasien Post Hemoroidektomi Dengan Masalah Nyeri Menggunakan Intervensi Kombinasi Kompres Dingin Dan Terapi Murottal Al-Qur’an Di Ruang ICU RSUD Labuang Baji Kota Makassar”.



## Kompres Dingin Pada Vertebra (Lumbal) Terhadap Skala Nyeri Pasien Post Operasi

### *A Cold Compress in Lumbar Vertebrae on The Pain of Post Operative Patients*

Dewi Setyawati<sup>1</sup>, Nury Sukraeny<sup>2</sup>, Khoiriyah<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Semarang

Korespondensi Email: [dewisetyawati@unimus.ac.id](mailto:dewisetyawati@unimus.ac.id)

#### Abstrak

**Pendahuluan:** Nyeri merupakan salah satu masalah yang dialami pasien setelah tindakan pembedahan. Untuk mengatasi nyeri tersebut dapat dilakukan tindakan non farmakologis, seperti teknik relaksasi, distraksi, aromaterapi, terapi musik. Kompres dingin merupakan salah satu teknik distraksi yang sering digunakan pada pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah nyeri post operasi. Kompres dingin pada vertebra (lumbal) memberikan efek mati rasa pada daerah sekitar sehingga ini berfungsi sebagai anestesi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan kompres dingin pada pasien post operasi.

**Metodologi:** Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode quasi eksperimen untuk mengetahui skala nyeri pasien post operasi sebelum dan setelah dilakukan kompres dingin pada vertebra (lumbal). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 16 orang pasien post operasi di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang.

**Hasil dan Pembahasan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rerata skala nyeri pasien post operasi sebelum dilakukan kompres dingin pada vertebra (lumbal) sebesar 5,31. Sedangkan skala nyeri pasien post operasi sesudah dilakukan kompres dingin pada vertebra (lumbal) sebesar 3,44. Ada perbedaan rerata skala nyeri pasien post operasi sebelum dan sesudah dilakukan kompres dingin pada vertebra (lumbal) dengan  $p$  value = 0,000. Kompres dingin efektif menurunkan nyeri post operasi karena dengan kompres dingin ini menyebabkan transmisi nyeri tertutup sehingga cortex cerebri tidak dapat menerima sinyal karena nyeri sudah diblok dengan stimulasi dingin yang mencapai otak lebih dulu. Hal ini berkaitan dengan *gate control theory* dimana stimulasi kulit berupa kompres dingin dapat mengaktifasi transmisi serabut saraf sensorik A-beta yang lebih besar dan lebih cepat, sehingga menutup "gerbang" dan menurunkan transmisi nyeri melalui serabut C dengan diameter yang kecil.

**Kesimpulan:** Rerata skala nyeri pasien post operasi di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang sebelum dilakukan kompres dingin pada vertebra (lumbal) yaitu 5,31. Sedangkan skala nyeri pasien post operasi setelah dilakukan kompres dingin pada vertebra (lumbal) mengalami penurunan sebesar 3,44. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan skala nyeri pasien post operasi sebelum dan sesudah dilakukan kompres dingin pada vertebra (lumbal) dengan  $p$  value = 0,000.

**Kata Kunci:** Kompres dingin, nyeri post operasi

#### Abstract

**Introduction:** Pain is one of the problems experienced by patients after surgery. To overcome these pain can be done non-pharmacological actions, such as relaxation techniques, distraction, aromatherapy, music therapy. A cold compress is one of the distraction techniques that is often used in health services to overcome postoperative pain problems. Cold compresses on the lumbar vertebrae give a numb effect to the surrounding area so that it functions as a local anesthetic. This study aims to determine the scale of pain before and after cold compresses in postoperative patients.

**Methodology:** This study was a quantitative study with a quasi-experimental method to determine the pain scale of patients postoperatively before and after a cold compress on the lumbar vertebrae. The number of samples in this study was 16 post-operative patients at KRMT Wongsonegoro Hospital, Semarang City.

**Results and Discussion:** The results of this study indicate that the mean pain scale of patients postoperatively before cold compresses on the lumbar vertebrae is 5.31. While the pain scale of postoperative patients after a cold compress on the lumbar vertebrae is 3.44. There is a difference in the mean pain scale of patients postoperatively before and after a cold compress on the lumbar vertebrae with  $p$ -value = 0.000. Cold compresses

## PEMBERIAN KOMPRES DINGIN TERHADAP PENURUNAN NYERI PADA PASIEN POST HEMOROIDEKTOMI DI RSUD SIMO BOYOLALI: STUDI KASUS

Tri Utami<sup>1</sup>, Ganik Sakitri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akper Insan Husada Surakarta

\*Email: ganiksakitri2312@gmail.com

### Abstrak

**Latar belakang.** Hemoroid merupakan pembesaran atau pelebaran vena hemoroidialis yang melalui kanal anus atau rectum yang disebabkan oleh peradangan pada usus yang ditandai dengan nyeri dan rasa tidak nyaman yang bermanifestasi perdarahan setelah buang air besar. Tahun 2014 jumlah penderita hemoroid di dunia diperkirakan 230 juta orang. Tahun 2013 jumlah penderita hemoroid di Indonesia berkisar 5,7 % dari total 10 juta orang. Data kejadian hemoroid di RSUD Simo Boyolali menyatakan pada bulan Januari terdapat 3 jiwa dilakukan hemoroidektomi setiap minggunya. Salah satu masalah keperawatan utama pasien post operasi hemoroid adalah nyeri akut.

**Tujuan Penelitian.** Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian kompres dingin terhadap penurunan nyeri pada pasien post operasi hemoroid.

**Metode penelitian.** Penelitian ini menggunakan metode *case study design*. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2019. Subyek penelitian adalah 2 orang pasien post operasi hemoroid di ruang bedah bougainvillea RSUD Simo Boyolali. Intervensi yang dilakukan adalah melakukan kompres dingin suhu 5-10°C selama 10-15 menit. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi.

**Hasil penelitian.** Studi kasus menunjukkan bahwa tingkat nyeri pasien setelah dilakukan kompres dingin mengalami penurunan.

**Kesimpulan.** Studi kasus pemberian kompres dingin berpengaruh terhadap penurunan nyeri pada pasien post hemoroidektomi.

**Kata kunci:** hemoroidektomi, kompres dingin, nyeri.

### Abstract

**Background.** Hemorrhoids are enlargements or widening of the hemoroidial vein through the anus or rectum canal caused by inflammation of the intestine characterized by pain and discomfort that manifests bleeding after defecation. In 2014 the number of hemorrhoid sufferers in the world is estimated at 230 million people, in 2013 the number of hemorrhoid sufferers in Indonesia ranged from 5.7 % of the total 10 million people. Data on hemorrhoidal event at simo boyolali General Hospital stated that in January there were 3 people having hemorrhoidectomy every week. One of the main problem of patients with postoperative hemorrhoid is acute pain.

**Research purpose.** The aim of the study was to determine the effect of giving cold compresses on the reduction of pain scale in postoperative hemorrhoid patients.

**Research methods.** This study uses a case study design method. This research was conducted on January 2019. Research subjects were 2 post hemorrhoidal surgery patients in the bougainvillea operating room of simo Boyolali General Hospital. The intervention was cold compresses temperature of 5- 10°C for 10-15 minutes. Data collection techniques are interviews, observation, documentation.

**Research results.** Case studies show that the patient's pain level after a cold compresses has decreased.