

**HUBUNGAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DENGAN ANTROPOMETRI
DAN *APGAR SCORE* BAYI BARU LAHIR DI RUMAH SAKIT DR.
TADJUDDIN CHALID KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada Program
Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

SRI RAHAYU

NIM: 70600116040

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu
NIM : 70600116040
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkep, 27 Juni 1998
Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Mannuruki II Ir. 5A
Judul : Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Antropometri dan *Apgar Score* Bayi Baru Lahir di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Februari 2020

Penyusun,



Sri Rahayu
NIM: 70600116040

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Antropometri dan *Apgar Score* Bayi Baru Lahir di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar**", yang disusun oleh **Sri Rahayu**, NIM: 70600116040, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 24 Februari 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 20 Februari 2020 M

26 Jumadil Akhir 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes (.....)	
Sekretaris	: dr. Rini Fitriani, M.Kes (.....)	
Pembimbing I	: dr. Azizah Nurdin, Sp. OG, M.Kes (.....)	
Pembimbing II	: Dr. dr. Rosdianah, M.Kes (.....)	
Penguji I	: dr. Arlina Wiyata Gama (.....)	
Penguji II	: Prof. Dr. Rahim Yunus, M.A (.....)	

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701200604 2 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan dan kemudahan dalam penyelesaian Proposal Penelitian ini yang berjudul **“Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Antropometri dan Apgar Score Bayi Baru Lahir di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar”**. Penulis juga tak lupa untuk senantiasa mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Uswatun Hasanah.

Dalam penyelesaian proposal ini, tidak hanya semata – mata dari usaha penulis sendiri. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Orangtua peneliti yang tercinta, sebagai penyemangat dan sumber inspirasi terbesar **Ayahanda H. Jamaluddin** dan **Ibunda Hj. Haeriah** atas cinta kasih, doa restu, bimbingan, dukungan serta motivasi.

Demikian juga penulis ucapkan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan tak terhingga, kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof.. Hamdan Junannis M.A, Ph.D beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr. dr. Syatirah Jalaluddin Sp.A, M.Kes serta seluruh Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. dr. Darmawansyih, M. Kes selaku Ketua Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku Pembimbing Akademik, yang tak hentinya memberikan masukan kritik dan saran selama pendidikan.
5. dr. Azizah Nurdin, Sp. OG., M. Kes selaku pembimbing I dan Dr. dr. Rosdianah Rahim, M.Kes selaku pembimbing II, yang telah memberikan masukan dan arahan serta motivasi untuk penyelesaian proposal ini.
6. dr. Arlina Wiyata Gama selaku Penguji kompetensi dan Prof. Dr. Rahim Yunus, M.A selaku penguji integrasi keislaman atas saran, kritikan, arahan dan bimbingan yang diberikan sehingga penulisan dapat menghasilkan karya yang terbaik.
7. Kepada Direktur Utama RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar yang telah berkenan menerima peneliti untuk melakukan penelitian serta
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membimbing dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
9. Kepada saudara saya Irma Yunita, Niafitri Ramadhani, Seseang, Kanuma dan Hatijah yang selalu menjaga dan membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan proposal ini. Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.
10. Kepada sahabat – sahabat saya Siti Nurbina, Nurul Fatwa S, Mufidah, Indra Sari, yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis selama mengenyam pendidikan hingga saat ini dalam keadaan apapun, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Kepada Nursyam Musfirah R, Zulfadliani, Magfiratul Jannah, Annisa Syahrawani, Raodatul Jannah yang tidak pernah bosan untuk memberikan semangat

dan motivasinya agar penulis senantiasa dalam keadaan sehat fisik dan sehat rohani. Semoga kita semua tetap bersama hingga Jannah-Nya.

11. Kepada teman-teman KKN Posko 6 Desa Bulo-Bulo, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Rama, Herianto, Nurwahyuni Cole, St. Aisyah, Yuliana dan Nuraeni yang selalu memberikan semangat kepada peneliti sejak ber-KKN hingga peneliti sampai ditahap penyelesaian skripsi. Semoga persahabatan ini terus berlanjut.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Pendidikan dokter Angkatan 2016 “NUCLEI” yang telah memberikan semangat serta membantu penulis dalam pengembangan ilmu, bakat dan kepribadian penulis selama melaksanakan pendidikan. Semoga kita bisa menuju kesuksesan dan selalu dalam lindungan-Nya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 10 Februari 2020

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis.....	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Anemia pada Ibu Hamil.....	11
B. Tinjauan Umum Antropometri.....	17
C. Tinjauan Umum <i>Apgar Score</i>	21
D. Hubungan Anemia dengan Antropometri dan <i>Apgar Score</i>	25
E. Integrasi Keislaman.....	27

F. Kerangka Teori.....	33
G. Kerangka Konsep.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	35
B. Waktu Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel	35
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Metode Analisis Data.....	37
H. Alur Penelitian	38
I. Etika Penelitian	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	35
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penyebab Anemia.....	11
Tabel 2.2 Kriteria <i>Apgar score</i>	20
Tabel 2.3 Klasifikasi <i>Apgar Score</i>	23
Tabel 4.1 Distribusi Data Berdasarkan Data Rekam Medik RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018	39
Tabel 4.2 Analisis Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Berat Badan Lahir Bayi di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018	40
Tabel 4.3 Analisis Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Panjang Badan Lahir Bayi di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018 ..	41
Tabel 4.4 Analisis Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Lingkar Kepala Lahir Bayi di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018 ..	42
Tabel 4.5 Analisis Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan <i>Apgar Score</i> Lahir Bayi di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018	43

DAFTAR BAGAN


Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	33
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	34
Bagan 3.1 Alur Penelitian.....	38



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Sampel Ibu Hamil yang Melahirkan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018
- Lampiran 2** Hasil Pengolahan Data Menggunakan Aplikasi SPSS 23
- Lampiran 3** Dokumentasi
- Lampiran 4** Persuratan
- Lampiran 5** Riwayat Hidup Penulis



ABSTRAK

Nama : Sri Rahayu
NIM : 70600116040
Judul : Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Dengan Antropometri Dan
Apgar Score Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin
Chalid Kota Makassar

Anemia merupakan salah satu masalah pada ibu hamil dimana dapat mempengaruhi antropometri bayi baru lahir yang meliputi berat badan, panjang badan dan lingkaran kepala serta *apgar score* bayi baru lahir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara anemia ibu hamil terhadap antropometri dan *apgar score* bayi baru lahir di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan rancangan *cross sectional*. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Jumlah sampel sebanyak 269 yang melakukan persalinan di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar. Data penelitian bersumber dari data sekunder yaitu identitas pasien, anemia ibu hamil, antropometri bayi yang meliputi berat badan, panjang badan, lingkaran kepala, dan *apgar score* diukur segera setelah lahir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anemia ibu hamil berhubungan bermakna dengan berat badan bayi baru lahir ($p=0,004$), panjang badan bayi baru lahir ($p = 0,015$), lingkaran kepala bayi baru lahir ($p = 0,023$), dan *apgar score* bayi baru lahir ($p = 0,047$). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa status anemia ibu hamil memiliki hubungan dengan antropometri bayi baru lahir pada parameter panjang badan, lingkaran kepala, dan lingkaran dada serta *apgar score* bayi baru lahir.

Kata kunci: Anemia ibu hamil, antropometri, *apgar score*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anemia didefinisikan sebagai menurunnya jumlah massa eritrosit (*red cell mass*) yang mengakibatkan gagalnya fungsi eritrosit untuk membawa oksigen yang cukup ke jaringan perifer (penurunan *oxygen carrying capacity*) (Setiati, 2014). Pada akhir trimester kedua hingga awal trimester ketiga kehamilan, mengalami peningkatan volume darah hingga 50%, sedangkan peningkatan dari massa eritrosit mencapai 33%. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya hemodilusi fisiologis yang berakibat pada penurunan kadar hemoglobin serta hematokrit. (DeCherney, 2007). Menurut *World Health Organization (WHO)*, anemia pada ibu hamil adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin (Hb) dalam darahnya <11gr/dl, sedangkan berdasarkan sumber dari Departemen Kesehatan RI, anemia pada ibu hamil ialah kondisi ibu dengan kadar Hb <11gr/dl pada trimester I dan III serta <10.5gr/dl pada trimester II kehamilannya (Depkes RI, 2003).

Menurut *World Health Organization (WHO)* memperkirakan sekitar 1,62 milyar penduduk di dunia menderita anemia dimana 56,4 juta dari penduduk tersebut adalah perempuan hamil. WHO menaksirkan sekitar 18,1 juta perempuan hamil di Asia Tenggara mengalami anemia. Dimana Asia Tenggara mempunyai prevalensi yang tertinggi dibanding negara lain (WHO, 2008).

Anemia yang terjadi saat kehamilan merupakan salah satu masalah besar yang banyak terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dimana angka kejadian diperkirakan sebanyak 40% dari jumlah populasi. Menurut WHO pada tahun 2012 sekitar 500 juta perempuan usia reproduksi mengalami anemia. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 di Indonesia,

prevalensi ibu hamil yang mengalami anemia sebesar 37,1% yang mempunyai kadar hemoglobin dibawah 11,0 g/dL, serta perbandingan prevalensi antara daerah perkotaan sebanyak 36,4% dan pedesaan sebanyak 37,8%. Sementara prevalensi anemia pada kehamilan di Solok dilaporkan sebesar 49,35 % (Riskesdas, 2013).

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dari 23.839 ibu hamil yang di periksa kadar hemoglobinnya, terdapat ibu hamil dengan kadar hemoglobin 8-11 mg/dl terdapat 23.478 orang (98,49 %) dan ibu hamil dengan kadar hemoglobin < 8 mg/dl terdapat 361 orang (1,15%) (Data Binkesmas, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015). Dan dari data RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar tahun 2017 sebanyak 731 persalinan secara pervaginam masih didominasi dengan kejadian anemia pada kehamilan sekitar 19 pasien setiap bulannya yang diketahui pada saat melakukan ANC dan saat persalinan dimana biasanya RS Dr. Tadjuddin Chalid ini menerima pasien rujukan dari puskesmas sekitar.

Ada tiga penyebab kematian maternal secara langsung yaitu perdarahan sebanyak 32%, hipertensi sebanyak 25%, serta infeksi sebanyak 5%. Adapun salah satu penyebab tidak langsung kematian pada ibu hamil adalah anemia. Anemia menyumbang resiko kematian pada ibu hamil selama masa kehamilannya maupun setelah persalinan dengan melihat faktor resiko yang lain (BKKBN, 2014).

Untuk melihat upaya keberhasilan akan kesehatan ibu, dapat ditinjau dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). Dimana, AKI merupakan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan serta nifas dalam atau dalam hal pengelolaannya namun bukan karena penyebab lain contohnya kecelakaan, dan lain sebagainya pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Menurut Kemenkes RI tahun 2014 memperkirakan AKI di Indonesia sendiri berjumlah 359 per 100.000

kelahiran hidup. Dimana, jika dilihat dari target Milenium Development Goals (MDG's) pada tahun 2015 sebanyak 102 per 100.000 kelahiran hidup, angka tersebut masih terbilang jauh dari target yang diperkirakan (Kemenkes RI, 2015).

Di Makassar, tercatat AKI selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2015 (5 dari 25.181), tahun 2014 (5 dari 24.590) dan tahun 2013 (4 dari 24.576). Penyebab AKI di Makassar dikarenakan perdarahan selain hipertensi dan infeksi. Dimana anemia pada masa kehamilan menyumbang angka kematian yang cukup besar akibat perdarahan (Dinkes Makassar, 2016).

Perempuan hamil yang mengalami anemia akan memiliki risiko morbiditas serta mortalitas, terutama pada meningkatnya anemia pada kehamilan yang menyebabkan tingginya AKI jika terjadi pada hemoragi post partum, dan akan berdampak pada janin seperti risiko kelahiran prematur, berat badan lahir, serta nilai apgar juga akan rendah rendah (Sarwono, 2010).

Dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma'idah/5: 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahannya :*“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”*.

Berdasarkan Surah Al-Ma'idah ayat 88 menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang telah Allah rezeasikan kepada kita. Dan kata halal disini menurut tafsir al-misbah dijelaskan bahwa terdiri dari empat, yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain.

Ada makanan halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan adalah halal lagi baik. (Shihab, 2016)

Khususnya untuk ibu hamil, asupan makanan sangatlah penting diperhatikan guna untuk mensuplai asupan ke janin nya agar janin dapat berkembang dengan baik karena dalam keadaan hamil, ibu mengalami banyak perubahan dalam tubuhnya, sehingga harus selalu menjaga kondisi tubuhnya dengan cara mengonsumsi makanan yang memiliki kadar gizi yang cukup dan seimbang. Kekurangan asupan nutrisi pada masa kehamilan akan mempengaruhi proses perkembangan janin. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Mu'minun/23: 14 :

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَاقَةً فَخَلَقْنَا الْعَاقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا
الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Terjemahannya : “ Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami meniadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik”.

Berdasarkan penjelasan Surah Al-Mu'minun ayat 14 bahwa Allah SWT menciptakan manusia melalui proses yang sempurna. Oleh karena itu ibu hamil harus menjaga kehamilannya karena anak merupakan suatu nikmat dan anugerah yang harus kita syukuri dan kita jaga. Dengan ibu melakukan ANC secara rutin, ibu hamil dapat mengetahui perkembangan janinnya dan komplikasi yang bisa terjadi pada kehamilannya, ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kehamilan. Namun, jika ibu hamil tidak menjaga perkembangan janinnya dan disertai kurang mengonsumsi asupan gizi atau nutrisi dapat menimbulkan gejala-gejala anemia yang akan berdampak pada kesehatan ibu dan juga pada janin yang dikandung.

Anemia akan menimbulkan dampak pada ibu hamil serta janin yang dikandung dimana dapat mengalami abortus, terhambatnya janin selama

kehamilan, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Ketuban Pecah Dini (KPD), cepat terjadi infeksi dekompensasi kordis ($Hb < 6 \text{ gr\%}$), hiperemesis gravidarum, prematur, mola hidatidosa, perdarahan antepartum, terjadi kematian intrauteri, terjadi cacat bawaan sampai terjadi kematian perinatal (Mandang, 2016).

Berdasarkan tingginya mortalitas dan morbiditas yang disebabkan oleh anemia mendorong peneliti untuk mengetahui dan melakukan penelitian lebih jauh mengenai hubungan anemia pada kehamilan terhadap antropometri dan *apgar score* bayi baru lahir.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara anemia dalam kehamilan terhadap antropometri dan *apgar score* bayi baru lahir di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018 ?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Alternatif (H_a)

Ada hubungan antara anemia pada ibu hamil dengan antropometri dan *apgar score* bayi baru lahir.

2. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada hubungan antara anemia pada ibu hamil dengan antropometri dan *apgar score* bayi baru lahir.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Anemia dalam kehamilan

Definisi : Kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester III kehamilannya yaitu <11 gr/dL, sesuai yang tercatat pada rekam medis pasien.

Hasil ukur : Anemia : < 11 gr/dL

Tidak anemia: ≥ 11 gr/dL (WHO, 2008)

b. Antropometri Bayi Baru Lahir

1) Berat Badan

Definisi : Berat badan bayi yang baru lahir diukur segera setelah persalinan menggunakan timbangan bayi dalam satuan gram sesuai yang tercatat pada rekam medis pasien.

Hasil ukur : BBLR : < 2500 gram

Normal : $2500 - 4000$ gram

Makrosomia : >4000 gram (Gomella, 2013)

2) Panjang Badan

Definisi : Panjang badan bayi yang baru lahir diukur segera setelah persalinan menggunakan infantometer dalam satuan sentimeter (cm) sesuai yang tercatat pada rekam medis pasien.

Hasil ukur : Normal : $48-52$ cm

Tidak normal: < 48 cm (Gomella, 2013)

3) Lingkar Kepala

Definisi : Ukuran kepala bayi yang baru lahir diukur segera setelah persalinan menggunakan pita ukur dalam satuan sentimeter (cm) sesuai yang tercatat pada rekam medis pasien.

Hasil ukur : Normal : 32-37 cm

Tidak normal : < 32 cm (Gomella, 2013)

c. Apgar Score

Definisi : Pengukuran keadaan klinis bayi yang baru lahir setelah persalinan meliputi penilaian frekuensi jantung, usaha nafas, tonus otot, refleks terhadap rangsangan dan warna kulit bayi yang diukur pada menit pertama setelah kelahiran sesuai yang tercatat pada rekam medis pasien.

Hasil ukur : Skor 7-10 : Normal

Skor 4-6 : Asfiksia sedang

Skor 0-3 : Asfiksia berat (IDAI, 2009)

2. Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pengujian hipotesis (*hypothesis testing study*). Pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan sifat dan hubungan antar variabel yang akan diuji yang didasarkan dengan teori yang ada. Pada penelitian ini akan menganalisa hubungan antara anemia dalam kehamilan pada ibu hamil terhadap antropometri dan *apgar score* bayi baru lahir di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar tahun 2018.

E. Kajian Pustaka

- a. Anggi Setiawan, dkk. 2013. “Hubungan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Trimester III Dengan Berat Bayi Lahir di Kota Pariaman. Hasil penelitian: ditemukan rata-rata kadar hemoglobin ibu hamil trimester III adalah 11,16 (SD 0,82) gr/dl dan ditemukan ibu hamil yang mengalami anemia sebesar 31,25%. Rata-rata berat bayi lahir pada penelitian adalah 3.103 (SD 405) gram dan ditemukan bayi yang mempunyai berat lahir rendah sebesar 3,1%. Pada penelitian sekarang selain berfokus pada berat badan bayi juga berfokus pada *apgar score* bayi baru lahir terhadap anemia dalam kehamilan”.
- b. Neila Fawza Putri Sibarani, 2014. “Hubungan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil dengan Nilai Apgar Bayi Baru Lahir di RSUD Artha Medica Binjai Tahun 2013. Hasil penelitian ini didapat rata-rata kadar Hb ibu hamil 10,2 g/dL. Ibu dengan kadar Hb normal 28,7%, anemia ringan 36%, anemia sedang 34,8%, dan anemia berat 0,4%. Sebanyak 77,3% bayi lahir dengan nilai apgar normal dan 22,7% bayi lahir dengan asfiksia sedang. Hasil uji korelasi pearson terhadap hubungan kadar hemoglobin ibu dengan nilai apgar bayi baru lahir menunjukkan $r = +0,102$ dan nilai $p > 0,05$ ($p = 0,112$). Pada penelitian sekarang juga meneliti mengenai antropometri bayi baru lahir yaitu berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala.”
- c. Denna Rahinda Yulia Fanni. 2017. “Hubungan Usia Gestasi dan Kadar Hemoglobin Trimester 3 Kehamilan dengan Berat Lahir Bayi. Variabel usia gestasi dan kadar hemoglobin trimester 3 kehamilan memiliki hubungan dengan berat lahir bayi di wilayah kerja Puskesmas Tambak Wedi Surabaya. Usia gestasi yang tergolong tidak berisiko untuk melahirkan bayi BBLR adalah usia gestasi >38 minggu sedangkan kadar hemoglobin trimester 3

kehamilan yang tergolong tidak berisiko untuk melahirkan bayi BBLR adalah $< 11\text{g/dl}$. Pada penelitian sekarang meneliti tentang panjang badan, lingkaran kepala dan *apgar score* bayi baru lahir.”

F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara anemia dalam kehamilan pada ibu hamil terhadap antropometri dan *apgar score* bayi baru lahir di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar selama tahun 2018.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui karakteristik anemia pada ibu hamil ditinjau dari kadar hemoglobin.
- 2) Mengetahui karakteristik antropometri bayi baru lahir ditinjau dari berat badan, panjang badan, dan lingkaran kepala.
- 3) Mengetahui karakteristik *apgar score* bayi baru lahir ditinjau dari penilaian pada saat bayi baru lahir (pada 1 menit setelah bayi lahir).
- 4) Membuktikan adanya hubungan antara anemia pada ibu hamil terhadap antropometri bayi baru lahir.
- 5) Membuktikan hubungan antara anemia pada ibu hamil terhadap *apgar score* bayi baru lahir.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian serta menerapkan ilmu yang telah didapat selama studi khususnya mengenai hubungan anemia dalam kehamilan pada ibu hamil terhadap antropometri dan *apgar score* bayi baru lahir.

b. Bagi pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi ataupun bahan untuk pengetahuan serta acuan untuk penelitian-penelitian di bidang kesehatan ibu dan anak.

c. Bagi instansi

Sebagai bahan informasi bagi Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar dan instansi terkait lainnya dalam pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anemia pada Ibu Hamil

1. Pengertian Anemia

Menurut *World Health Organization (WHO)*, anemia pada ibu hamil adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin (Hb) dalam darahnya <11gr/dl, sedangkan berdasarkan sumber dari Departemen Kesehatan RI, anemia pada ibu hamil ialah kondisi ibu dengan kadar Hb <11gr/dl pada trimester I dan III serta <10.5gr/dl pada trimester II kehamilannya (Depkes RI, 2003).

Anemia secara fungsional didefinisikan sebagai penurunan jumlah massa eritrosit (*red cell mass*) sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk membawa oksigen dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer (penurunan *oxygen carrying capacity*) (Setiati, 2014). Turunnya kadar Hb pada masa kehamilan disebabkan karena ekspansi volume plasma yang relatif lebih besar dibandingkan dengan peningkatan volume sel darah merah. Disproporsi antara kecepatan penambahan plasma dan eritrosit ke dalam sirkulasi ibu paling besar selama trimester kedua. Menjelang akhir kehamilan, ekspansi plasma pada hakikatnya berhenti, sementara massa hemoglobin terus bertambah (Cunningham, 2017).

2. Etiologi Anemia

Adapun penyebab anemia antara lain:

- a. Eritrosit yang dibentuk oleh sumsum tulang terganggu
 - b. Terjadinya perdarahan
 - c. Eritrosit dihancurkan sebelum waktunya didalam tubuh (hemolisis)
- (Setiati, 2014).

Adapun etiologi anemia yang sering dijumpai dalam kehamilan yaitu pada tabel berikut : (Cunningham, 2017)

Tabel 2.1 Penyebab Anemia

Penyebab anemia selama kehamilan
Didapat Anemia defisiensi besi Anemia akibat kehilangan darah akut Anemia pada peradangan atau keganasan Anemia megaloblastik Anemia hemolitik didapat Anemia aplastic atau hipoplastik
Hereditas Talasemia Hemoglobinopati sel sabit Hemoglobinopati lain Anemia hemolitik hereditas

Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat penyebab terjadinya anemia pada ibu hamil ialah kekurangan gizi, yaitu defisiensi zat besi. Adapun beberapa faktor penyebab anemia pada ibu hamil ialah :

- a. Banyaknya kehilangan darah akibat perdarahan, haid yang berlebihan serta gangguan pencernaan
- b. Rusaknya sel darah merah akibat penyakit kronis
- c. Turunnya produksi dari eritrosit akibat konsumsi zat gizi yang kurang utamanya vitamin B12, vitamin C, zat besi, protein, asam folat serta zat gizi lainnya yang penting untuk pembentukan eritrosit (Saifuddin, 2010).

3. Gejala Anemia

Sindrom anemia (*anemic syndrome*) merupakan nama lain dari gejala umum anemia. Turunnya kadar hemoglobin dan iskemia organ target mengakibatkan tubuh berkompensasi sehingga menimbulkan anemia. Terjadinya penurunan kadar Hemoglobin ($Hb < 7 \text{ gr/dL}$) akan memunculkan manifestasi klinis ini berupa sindrom anemia yang terdiri dari kaki dingin, lesu, pucat, lemah, dispepsia, tinnitus, sesak napas, mata terasa berkunang-kunang serta lelah. Pucat pada mukosa, jaringan dibawah kuku, konjungtiva, dan telapak tangan dapat ditemukan pada pemeriksaan. Penyakit diluar anemia bisa menyebabkan sindrom anemia, oleh karena itu sindrom anemia tidak bersidat spesifik dan juga hanya akan timbul ketika $Hb < 7 \text{ gr/dL}$ sehingga tidak sensitif (Setiati, 2014).

Adapun jenis anemia dan gejalanya adalah sebagai berikut :

- a. Anemia akibat kekurangan zat besi (defisiensi Fe) : sulit menelan, papil lidah mengecil dan stomatittis angularis.
- b. Anemia akibat kekurangan asam folat (defisiensi B9) : *buffy tongue* (lidah berwarna merah).
- c. Anemia hemolitik : pembesaran hepar dan limpa serta icterus.
- d. Anemia aplastik : tanda infeksi serta perdarahan dibawah mukosa atau kulit (Bakta, 2016).

Gejala klinis yang muncul biasanya perlahan-lahan. Gejala seperti kebas atau dingin pada tangan serta kaki, bibir pucat, lelah, takikardi, pusing atau sakit kepala, lemas, gangguan sistem neuromuskuler, nafsu makan menurun atau hilang (anoreksia), pembesaran kelenjar limpa, dan daya konsentrasi menurun akan muncul ketika anemia bertambah berat (Bakta, 2016).

4. Klasifikasi Anemia

Klasifikasi anemia menurut morfologi, dibagi menjadi tiga kelompok besar. Klasifikasi berdasarkan morfologi ini dilihat berdasarkan ukuran dan warna sel darah merah. Klasifikasi anemia tersebut, antara lain adalah :

a. Anemia normositik normokrom.

Anemia jenis ini memiliki ukuran dan bentuk sel-sel darah merah normal serta mengandung hemoglobin dalam jumlah yang normal tetapi individu menderita anemia tetapi jumlah retikulosit bisa menurun, normal maupun meningkat. Etiologinya ialah gangguan endokrin, infeksi, hemolisis, perdarahan, kegagalan sumsum tulang, serta gangguan ginjal.

b. Anemia makrositik normokrom.

Jenis anemia ini memiliki ukuran eritrosit yang lebih besar daripada sel eritrosit yang normal. Akan tetapi, disebut normokrom dikarenakan memiliki hemoglobin yang konsentrasinya normal. Ini disebabkan oleh terganggunya atau terhentinya asam nukleat DNA yang disintesis sebagaimana yang terdapat pada kekurangan B9 (asam folat) serta B12.

c. Anemia mikrositik hipokrom

Pada anemia jenis ini, mengandung jumlah Hb yang kurang dari normal atau biasa disebut hipokrom. Keadaan insufisiensi sintesis hemoglobin biasanya terjadi pada talasemia, keadaan sideroblastik, perdarahan kronik, dan kekurangan zat besi (Sohimah. 2006).

5. Patofisiologi terjadinya Anemia

Dalam tubuh orang dewasa terdapat kandungan besi 3 hingga 5 gr, dimana 2/3 kandungan besi tersebut ada pada Hb yang akan dilepaskan ketika proses apoptosis dari sel lalu dibawa ke sumsum tulang untuk melakukan proses eritropoiesis. Ketika besi yang beredar kurang, maka besi akan diserap lebih banyak lagi. Fe yang diproses akan diubah besi keto pada lambung serta duodenum dan diserap pada duodenum serta jejunum bagian proksimal, lalu Fe akan diangkut menuju sumsum tulang untuk disintesis Hb ke jaringan. Hb dibentuk di sumsum tulang lalu mengalami pematangan, namun ketika besi mengalami penurunan maka akan dibentuk sel darah merah yang akan mengakibatkan kadar Hb turun dan menyebabkan proses transpor nutrisi serta oksigen ke jaringan akan berkurang sehingga proses metabolisme akan mengalami penurunan (Price, 2006).

Gejala dasar pada anemia dapat karena dua hal yaitu anoksia pada organ target dan adanya mekanisme kompensasi dari tubuh ketika terjadi anemia. Gabungan etiologi dapat menyebabkan timbulnya gejala sindrom anemia. Gejala anemia biasanya timbul pada keadaan adanya kelainan pada jantung, seseorang dengan umur yang sudah tua, turunnya kecepatan kadar Hb, serta penurunan berat dari Hb (Bakta, 2016).

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa penyebab utama terjadinya anemia pada ibu hamil ialah kekurangan gizi, yakni defisiensi zat besi. Selain itu, faktor lain yang dapat berperan dalam terjadinya anemia dalam ibu hamil adalah perdarahan dan juga penyakit kronis. Secara umum, faktor penyebab anemia pada ibu hamil adalah :

- a. Banyaknya kehilangan darah akibat perdarahan, haid yang berlebihan serta gangguan pencernaan.

- b. Rusaknya sel darah merah akibat penyakit-penyakit kronis.
- c. Turunnya produksi eritrosit karena kurangnya konsumsi makanan mengandung asam folat, vitamin C, vitamin B12, dan zat besi serta gizi lainnya.

Kebutuhan zat besi ibu pada hamil berkisar 800 mg, dimana 300 mg untuk janin dan 500 mg untuk regenerasi eritrosi ibu itu sendiri. Dapat dirata-ratakan bahwa kebutuhan tambahan zat besi ibu dalam sehari berkisar 2-3 mg besi/hari (Reece, 2007).

6. Diagnosis

Dianjurkan pada ibu hamil mengukur serum feritin sekali ketika awal dari kehamilannya. Tak lupa juga kadar hemoglobin diukur ketika tiap memasuki awal trimester. Selain itu, konsentrasi Hb selama persalinan juga sangat diperlukan karena dapat timbul masalah pada janin hingga kematian. Jika serum feritin rendah ($<30 \mu\text{g} / \text{L}$), tetapi Hb normal dapat di diagnosis sebagai defisiensi besi; namun, jika serum feritin rendah ($<30 \mu\text{g} / \text{L}$) dan Hb juga rendah diagnosis merupakan anemia defisiensi besi. Ketika Hb rendah, tetapi serum feritin adalah normal ($\geq 30 \mu\text{g} / \text{L}$) tambahan tes, seperti saturasi transferrin, besi serum, kapasitas pengikatan besi total, dan protein C-reaktif (CRP), diperlukan untuk diagnosis. Ketika serum feritin normal ($\geq 30 \mu\text{g} / \text{L}$), tetapi volume sel rata-rata (MCV) rendah ($<70 \text{fL}$) jika tidak ada peradangan, diagnosis mungkin talasemia dan diperlukan investigasi lebih lanjut (Olus, 2015).

7. Efek Anemia pada Kehamilan

Anemia yang terjadi pada kehamilan dapat menyebabkan resiko terjadinya perdarahan, baik sebelum partus maupun post partum, resiko berat badan lahir rendah pada bayi, dan yang paling parah dapat mengakibatkan

kematian jika anemia dalam tipe yang berat. Ini diakibatkan oleh berkurangnya suplai eritrosit yang mengangkut oksigen dan nutrisi lainnya menuju ke plasenta dan dapat berpengaruh terhadap fungsi dari plasenta janin nantinya (Labir, 2013).

B. Tinjauan Umum Antropometri

1. Pengertian Antropometri

Antropometri berasal dari kata *anthropos* dan *metros*. *Anthropos* artinya tubuh dan *metros* artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran tubuh. Pengertian ini bersifat sangat umum sekali (Supariasa, dkk, 2012).

Pada bayi baru lahir, antropometri memiliki kelebihan karena mudah dilakukan dan nyaman digunakan pengukuran samping tempat tidur. Namun, pada kelompok umur ini, antropometri terkenal karena sifatnya ketidaktepatan di tangan yang tidak terlatih dan untuk variasi antar pengamat.

Pengukuran langsung seperti berat badan, panjang, dan lingkar tubuh adalah pengukuran yang paling umum digunakan untuk penilaian gizi dalam praktik klinis dan studi lapangan. Beberapa indeks dan persamaan yang berasal dari pengukuran langsung telah diusulkan dan digunakan dalam bayi baru lahir untuk meningkatkan akurasi antropometri. (Pereira-Da-Silva, 2012).

Adapun ciri-ciri bayi normal, yaitu :

- 1) Berat badan 2500-4000 gram.
- 2) Panjang badan lahir 48-52 cm.
- 3) Lingkar dada 30-38 cm.
- 4) Lingkar kepala 33-35 cm.
- 5) Bunyi jantung dalam menit-menit pertama kira-kira 180×/menit, kemudian menurun sampai 120-140×/menit.

- 6) Pernafasan pada menit-menit pertama kira-kira 80x/menit, kemudian menurun setelah tenang kira-kira 40x/menit.
- 7) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan yang cukup terbentuk dan diliputi vernix caseosa, kuku Panjang.
- 8) Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah sempurna.
- 9) Genitalia : labia mayora sudah menutupi labia minora (pada perempuan), testis sudah turun (pada laki-laki).
- 10) Refleks isap dan menelan sudah terbentuk dengan baik.
- 11) Refleks *moro* sudah baik: bayi bila dikagetkan akan memperlihatkan gerakan seperti memeluk.
- 12) Refleks *grasping* sudah baik: apabila diletakkan suatu benda diatas telapak tangan, bayi akan menggengam / adanya gerakan refleks.
- 13) Refleks *rooting*/mencari puting susu dengan rangsangan tekstil pada pipi dan daerah mulut Sudah terbentuk dengan baik.
- 14) Eliminasi baik: urine dan mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama, mekonium berwarna hitam kecoklatan. (Gomella, 2013)

a. Berat Badan

Karena pengukuran berat badan sederhana dan dapat diandalkan, telah menjadi parameter terisolasi yang paling banyak digunakan untuk memantau pertumbuhan dan status gizi pada neonatus dalam praktik klinis. Telah dilaporkan bahwa berat badan adalah prediktor independen tubuh komposisi pada bayi prematur dan cukup bulan. Namun, itu tidak memberikan informasi apa pun pada kompartemen

tubuh dan kualitas pertumbuhan. Misalnya, pada bayi prematur, kenaikan berat badan bisa terjadi hasil dari keseimbangan positif air dan natrium daripada akumulasi lemak atau massa otot).

Berdasarkan berat badan, neonatus diklasifikasikan sebagai makrosomik jika > 4.000 gram, mikrosomik atau BBLR jika < 2.500 gram, berat lahir sangat rendah jika < 1.500 gram, dan berat lahir sangat rendah jika < 1.000 gram. Klasifikasi bayi berdasarkan usia kehamilan dan berat lahir.

Teknik melakukan pengukuran berat badan yaitu pasien ditimbang telanjang, idealnya sampai gram terdekat. Timbangan elektronik digital memiliki presisi dan reproduktifitas yang sangat baik dan berkurang dramatis bias pengamat dan pembacaan kesalahan dibandingkan dengan skala balok. Dengan tujuan meminimalkan penanganan bayi prematur yang sakit dan rapuh, baru-baru ini inkubator dilengkapi dengan timbangan timbangan, tetapi ketepatannya belum divalidasi. Beratnya prosedurnya sulit karena tetesan dan tabung yang dimasukkan tidak boleh menyentuh kasur, dan kesalahan mungkin terjadi juga disebabkan oleh gerakan bayi. (Pereira-Da-Silva, 2012).

b. Panjang badan

Panjang badan ialah antropometri dimana memperlihatkan keadaan pertumbuhan tulang. Panjang badan dianggap sebagai indikator kasar dari massa tanpa lemak, yang mencerminkan pertumbuhan kerangka. Karena pertumbuhan linier berlanjut setelah lahir meskipun berat badan turun secara akut, pengukuran linier dapat lebih mencerminkan pertumbuhan sebenarnya daripada berat badan. (Pereira-Da-Silva, 2012).

Panjang badan direkam ke terdekat 0,1 cm dengan infantometer dengan bayi telentang, lutut sepenuhnya diperpanjang dan telapak kaki dipegang dengan kuat terhadap papan kaki dan menyentuh kepala tetap naik. (Soetjiningsih 2012).

c. Lingkar Kepala

Lingkar oksipito-frontal/ lingkar kepala adalah salah satu pengukuran yang paling dapat diandalkan pada neonatus. Peningkatan lingkar kepala mencerminkan pertumbuhan otak, meskipun lingkar kepala hanya memberikan perkiraan volume tengkorak sebagai dimensi linier dan bukan volume volumetrik. Ketika menginterpretasikan pengukuran lingkar kepala, beberapa faktor harus dipertimbangkan, lingkar kepala harus diukur 48-72 jam setelah lahir, setelah pengurangan atau resolusi mereka. Lingkar kepala di atas atau di bawah batas referensi dapat mewakili varian normal, konstitusional atau keluarga. Oleh karena itu, lingkar kepala orang tua juga harus diukur.

Pada periode neonatal pengukuran lingkar kepala penting untuk deteksi patologi otak dan sebagai deteksi adanya makrosefali yang dapat mengindikasikan hidrosefali. Lingkar kepala yang kecil di saat kelahiran dikaitkan dengan hasil suboptimal kognitif dan perkembangan saraf, terutama di SGA bayi.

Untuk mengukur lingkar kepala, pita meteran melingkari bagian paling menonjol dari dahi dan oksipital, yaitu punggung supraorbital dan tonjolan oksipital. Lingkar oksipitofrontal terbesar dari tiga pengukuran berturut-turut dipertimbangkan. Direkomendasikan untuk menggunakan pita yang tidak dapat direntangkan dengan presisi

hingga 1 mm terdekat. Pita kertas yang sekali pakai mungkin lebih dapat diandalkan dan lebih disukai daripada pita plastik atau kain.

Untuk memantau pertumbuhan kepala pasca kelahiran bayi prematur, longitudinal yaitu dengan memberikan rata-rata lingkaran kepala mingguan per minggu versus usia pascanatal untuk bayi yang dikelompokkan berdasarkan Interval BW 100 g. Grafik Fenton 2003 (diperbarui pada 2008), berdasarkan data longitudinal dan meta-analisis dari beberapa set data terbaru, memberikan rata-rata lingkaran kepala mingguan per minggu versus usia pascakelahiran di Indonesia minggu hingga 50 minggu pascanatal. Sebagai aturan praktis tingkat pertumbuhan lingkaran kepala pada bayi prematur harus rata-rata 1 cm / minggu. (Pereira-Da-Silva, 2012).

C. Tinjauan Umum Apgar Score

a. Pengertian Nilai Apgar Score

Pada tahun 1952, Dr Virginia Apgar menyusun sistem penilaian yang merupakan metode cepat menilai status klinis bayi baru lahir pada usia 1 menit dan kebutuhan untuk intervensi cepat untuk membangun pernapasan. Laporan kedua mengevaluasi yang lebih besar jumlah pasien diterbitkan pada tahun 1958. Sistem penilaian ini menyediakan penilaian standar untuk bayi setelah melahirkan. Skor apgar terdiri dari 5 komponen: detak jantung, upaya pernapasan, tonus otot, lekas marah refleks, dan warna, masing-masing diberi skor 0, 1, atau 2. Skor sekarang dilaporkan 1 dan 5 menit setelah lahir. Skor Apgar terus memberikan kenyamanan singkat untuk melaporkan status bayi baru lahir dan respons terhadap resusitasi. Skor apgar telah digunakan secara tidak tepat pada bayi cukup bulan memprediksi hasil neurologis spesifik.

Pedoman program resusitasi neonatal (NRP) 3 menyatakan bahwa skor apgar tidak boleh digunakan untuk mendikte tindakan resusitasi yang sesuai, intervensi intervensi untuk bayi yang depresi tidak boleh ditunda hingga penilaian 1 menit. Namun, skor apgar yang tetap 0 di atas 10 menit mungkin berguna dalam menentukan apakah upaya resusitasi tambahan diindikasikan. Saat ini pedoman NRP3 menyatakan bahwa jika tidak ada denyut jantung setelah 10 menit selesai dan upaya resusitasi yang memadai, dan tidak ada bukti penyebab lain kompromi bayi baru lahir, penghentian upaya resusitasi mungkin tepat (IDAI, 2009).

Tabel 2.2 Kriteria *Apgar Score*

		Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2
Warna Kulit (Appearance)		Seluruh badan biru atau pucat	Warna kulit tubuh normal merah muda, tetapi tangan dan kaki kebiruan	Warna kulit tubuh, tangan dan kaki normal, tidak ada sianosis
Denyut Jantung (Pulse)		Tidak ada	<100 kali per menit	>100 kali per menit
Respon reflek (Grimace)		Tidak ada respons terhadap stimulasi	Meringis atau menangis lemah ketika distimulasi	Meringis atau bersin atau batuk saat stimulasi saluran napas
Tonus (Activity)	otot	Lemah atau tidak ada	Sedikit gerakan	Bergerak aktif
Pernapasan (Respiration)		Tidak ada	Lemah atau tidak teratur	Menangis kuat, pernapasan baik dan teratur

Adapun dilihat pada penilaian *Apgar score* yaitu:

1) *Pulse* (Denyut jantung)

Denyut jantung bayi normal ketika lahir berada pada kisaran 120 hingga 160 denyut per menit. Dimana, denyut yang menunjukkan 100 kali per menit akan menimbulkan asfiksia.

2) *Respiration* (Upaya pernapasan)

Ketika bayi berada dalam kondisi megap ketika lahir, maka pelayanan harus mengupayakan pernapasan selama 30 detik serta menimbulkan pernapasan yang sifatnya menetap pada denyutan 30 sampai 60 per denyut pada waktu dua sampai tiga menit. Pernapasan yang apnea dapat terjadi karena asfiksia, infeksi janin, pemberian obat pada ibu, kerusakan sistem saraf, dan asidosis berat.

3) *Activity*

Ketika lahir, bayi akan menggerakkan seluruh badannya. Tapi, bayi yang tidak dapat melakukannya biasanya merupakan bayi asfiksia.

4) Rangsangan refleksi

Ketika melakukan pengisapan dengan memasukkan kateter melalui lobang nasal masuk ke dalam faring dimana akan menimbulkan respon bersin dan batuk.

5) *Appearance*

Saat lahir bayi akan nampak berwarna biru dan akan mengalami perubahan warna (merah muda) setelah mendapatkan ventilasi yang cukup. Rata-rata bayi akan menunjukkan bibir merah muda, dan kebiruan pada tangan dan kaki (Rudolph, 2014).

Apgar score akan diukur pada menit pertama kelahiran dan juga menit kelima setelah persalinan. Pengukuran ini dapat menggambarkan keadaan bayi yang baru lahir setelah proses persalinan. *Apgar score* ini dapat menilai keadaan bayi termasuk yang membutuhkan bantuan nafas ataupun yang mengalami kelainan jantung bawaan (Prawirohardjo, 2010).

b. Klasifikasi Nilai *Apgar Score*

Penilaian dari *apgar score* dapat kita ketahui dengan melihat derajat dari vitalis bayi yaitu mempunyai kemampuan fungsi dari tubuh yang esensial serta lengkap dalam kelangsungan hidup bayi yang baru lahir seperti dalam bernafas, sirkulasi darah, denyut jantung, dan reflek-reflek primitif seperti mencari puting susu serta mengisap merupakan salah satu contoh dalam menetapkan derajat vitalis dengan menggunakan nilai *apgar score* (IDAI, 2009).

Table 2.3 Klasifikasi *Apgar Score*

Klasifikasi	Nilai Apgar	Derajat Vitalis
A Asfiksia ringan/tanpa Asfiksia	7-10	- Tangisan kuat disertai gerakan aktif
B Asfiksia Sedang	4-6	- Pernafasan tidak teratur, atau tidak adaPernafasan - Denyut jantung lebih dari 100 x/menit
C Asfiksia Berat	0-3	- Tidak ada pernafasan - Denyut jantung 100 x/menit ataururang
D FresStilBirth (bayi lahir mati)	0	- Tidak ada pernafasan - Tidak ada denyut jantung

Bayi baru lahir dievaluasi dengan nilai *apgar score*, tabel tersebut dapat menentukan tingkat atau derajat asfiksia, apakah ringan, sedang, atau asfiksia berat.

D. Hubungan Anemia dengan Antropometri dan Apgar score

1. Secara teori

Terjadi perubahan anatomi maupun fisiologis pada saat hamil. Perubahan ini merupakan respon terhadap rangsangan yang berasal dari janin serta plasenta. Perubahan tersebut merupakan perubahan darah yang termasuk disini adalah perubahan pada volume dari darah, perubahan dari konsentrasi hemoglobin serta hematokrit perubahan metabolisme dari zat besi, perubahan fungsi sistem imun, perubahan proses koagulasi serta fibrinolisis serta terjadi perubahan pada sistem limpa (Cunningham, 2017).

Ketika hamil akan terjadi peningkatan volume darah. Dimana hipervolemia, yang termasuk diantaranya yaitu konsentrasi hemoglobin serta hematokrit, yang sedikit berkurang pada saat kehamilan, merupakan efek dari peningkatan volume darah ataupun hipervolemia. Turunnya kadar konsentrasi hemoglobin dapat dikatakan anemia fisiologis yang dapat terjadi pada awal trimester kedua. Serta turunnya kadar hemoglobin terjadi sebanyak 1-2 g/dL yang terjadi pada akhir dari trimester kedua serta akan mulai mengalami stabil pada trimester ketiga dari kehamilan dimana saat volume plasma darah ibu hamil mulai berangsur berkurang. Disamping itu, kebutuhan zat besi pun makin bertambah akibat pembentukan eritrosit yang meningkat. Dimana dari 100 mg zat besi sekitar 300 mg besi akan diterima oleh janin dan plasenta (Cunningham, 2017).

Prinsip dasar biologi zat besi janin / neonatal adalah zat besi diprioritaskan ke sel darah merah dengan mengorbankan jaringan lain,

termasuk otak. Ketika suplai zat besi tidak memenuhi permintaan zat besi, otak janin mungkin berisiko bahkan jika bayi tidak anemia. Meskipun defisiensi makanan mungkin berkontribusi, etiologi dari sebagian besar kasus anemia defisiensi besi pada masa bayi dan anak-anak adalah anemia defisiensi besi ibu pada kehamilan. Anemia mempengaruhi kinerja kognitif, perilaku dan pertumbuhan fisik bayi, anak-anak prasekolah dan usia sekolah. Anemia menekan status kekebalan dan meningkatkan morbiditas dari infeksi pada semua kelompok umur (Talaulikar, 2019).

Anemia pada kehamilan dikaitkan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur dan bayi berat lahir rendah. Prematur dan BBLR masih merupakan penyebab utama kematian neonatal di negara berkembang seperti Tanzania dimana berkontribusi hingga 30% dari total kematian . Itu juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian intrauterin (IUFD), skor apgar rendah pada 5 menit, dan pembatasan pertumbuhan intrauterin (IUGR) yang merupakan risiko pengerdilan di antara anak-anak kurang dari dua tahun.

2. Secara statistik (penelitian)

Pada penelitian Ulfa Rosliana Putri dengan judul penelitian hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil pada trimester ketiga dengan antropometri bayi baru lahir, mengatakan bahwa ada hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan antropometri bayi baru lahir yang meliputi berat badan, panjang badan dan lingkar kepala secara bermkana yang dilakukan pada RSPAD Gatot Soebroto Dietkesad pada tahun 2014 (Putri, 2014).

Pada penelitian Neila Fawza Putri Sibarani tahun 2014 dengan judul hubungan kadar hemoglobin ibu hamil dengan nilai apgar bayi baru lahir di

RSU Artha Medica Binjai Tahun 2013 didapatkan rata-rata kadar Hb ibu hamil 10,2 g/dL. Ibu dengan kadar Hb normal 28,7%, anemia ringan 36%, anemia sedang 34,8%, dan anemia berat 0,4%. Sebanyak 77,3% bayi lahir dengan nilai apgar normal dan 22,7% bayi lahir dengan asfiksia sedang” (Sibarani, 2014).

E. Integrasi Keislaman

Dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma'idah/5: 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahannya :*“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”*.

Berdasarkan Surah Al-Ma'idah ayat 88 menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kita. Dan kata halal disini menurut tafsir al-misbah dijelaskan bahwa terdiri dari empat, yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan adalah halal lagi baik. (Shihab, 2016)

Adapun halal dan haram yang dimaksud dalam Q.S An-Nahl/16: 115

أَنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ۚ وَالدَّمَ ۚ وَلِحَى الْخِنزِيرِ ۚ وَمَا أَهْلَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ طَفَمَن
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya :“ *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”.

Pengertian makan dan minuman yang halal, yaitu :

1. Makanan yang halal secara zatnya

Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Terlalu banyak bahkan hampir semua jenis makanan adalah halal dan dapat dikonsumsi. Sebaliknya terlalu sedikit jenis makanan yang diharamkan yang tidak boleh dikonsumsi. Hikmah pelarangan tersebut jelas Allah yang Maha Mengetahui. Adapun kebaikan dari adanya larangan tersebut jelas untuk kepentingan dan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Di antaranya, sebagai penguji ketaatannya secara rohaniyah melalui makanan dan minumannya dan agar manusia tahu/mau bersyukur.

Bangkai, darah dan babi secara tegas diharamkan oleh Allah, sesuai dengan ayat diatas. Selanjutnya semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan hukumnya haram, disamakan dengan bangkai. Termasuk binatang yang mati dalam pengangkutan sekalipun baru sebentar, tidak boleh ikut disembelih dan dikonsumsi oleh manusia.

2. Makanan yang halal menurut cara prosesnya

Makanan yang halal tetapi bila diproses dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram. Memproses secara tidak halal itu bila dilakukan: penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang muslim, dengan tidak menyebut atas nama Allah dan menggunakan pisau

yang tajam. Penyembelihan hewan yang jelas-jelas diperuntukkan atau dipersembahkan kepada berhala (sesaji).

Karena darah itu diharamkan, maka dalam penyembelihan, darah hewan yang disembelih harus keluar secara tuntas, dan urat nadi leher dan saluran nafasnya harus putus dan harus dilakukan secara santun, menggunakan pisau yang tajam.

Daging hewan yang halal tercemar oleh zat haram atau tidak halal menjadi tidak halal. Pengertian tercemar disini bisa melalui tercampurnya dengan bahan tidak halal, berupa bahan baku, bumbu atau bahan penolong lainnya. Bisa juga karena tidak terpisahnya tempat dan alat yang digunakan memproses bahan tidak halal.

Adapun ikan baik yang hidup di air tawar maupun yang hidup di air laut semuanya halal, walaupun tanpa disembelih, termasuk semua jenis hewan yang hidup di dalam air.

Selain yang tersebut diatas, ada beberapa jenis binatang yang diharamkan oleh sementara pendapat ulama namun dasarnya masih mengundang perbedaan pendapat.

3. Halal cara memperolehnya

Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Islam memberikan tuntunan agar orang Islam hanya makan dan minum yang halal dan thoyyib, artinya makanan yang sehat secara spiritual dan higienis.

Mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal berarti tidak halal secara spiritual akan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi sangat sulit memperoleh ketenangan, hidupnya menjadi

beringas, tidak pernah mengenal puas, tidak pernah tahu bersyukur, ibadah dan doanya sulit diterima oleh Tuhan.

4. Minuman yang tidak halal

Semua jenis minuman yang memabukkan adalah haram. Termasuk minuman yang tercemar oleh zat yang memabukkan atau bahan yang tidak halal. Yang banyak beredar sekarang berupa minuman beralkohol. Kebiasaan mabuk dengan minum minuman keras itu rupanya sudah ada sejak lama dan menjadi kebiasaan oleh hampir semua bangsa didunia. Pada jaman nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab juga mempunyai kebiasaan ini. Nabi memberantas kebiasaan jelek ini secara bertahap. (LPPOM-MUI, 2010)

Khususnya untuk ibu hamil, asupan makanan sangatlah penting diperhatikan guna untuk mensuplai asupan ke janin nya agar janin dapat berkembang dengan baik karena dalam keadaan hamil, ibu mengalami banyak perubahan dalam tubuhnya, sehingga harus selalu menjaga kondisi tubuhnya dengan cara mengkomsumsi makanan yang memiliki kadar gizi yang cukup dan seimbang. Kekurangan asupan nutrisi pada masa kehamilan akan mempengaruhi proses perkembangan janin. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Mu'minun/23: 14 :

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَاقَةً فَخَلَقْنَا الْعَاقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا
العِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Terjemahannya : “ Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami meniadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik”.

Berdasarkan penjelasan Surah Al-Mu'minun ayat 14 bahwa Allah SWT menciptakan manusia melalui proses yang sempurna. Oleh karena itu, ibu hamil harus menjaga kehamilannya karena anak merupakan suatu nikmat dan anugerah

yang harus kita syukuri dan kita jaga. Dengan ibu melakukan ANC secara rutin, ibu hamil dapat mengetahui perkembangan janinnya dan komplikasi yang bisa terjadi pada kehamilannya, ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kehamilan. Namun, jika ibu hamil tidak menjaga perkembangan janinnya dan disertai kurang mengonsumsi asupan gizi atau nutrisi dapat menimbulkan gejala-gejala anemia yang akan berdampak pada kesehatan ibu dan juga pada janin yang dikandung.

Adapun sunnah saat bayi baru lahir menurut Islam yaitu adzan. Saat bayi lahir hal pertama yang biasa dilakukan oleh para kaum muslim adalah adzan. Namun, adzan yang dikumandangkan dengan suara kecil dan lebih baik tidak dikumandangkan terlalu keras atau teriak-teriak dan dikumandangkan dekat dengan kuping bayi.

Hikmah mengapa bayi pertama kali lahir di adzani adalah supaya yang pertama kali didengar oleh telinga anak itu adalah kalimat Allah. Seperti kata syahadat agar kelak besar bisa terbiasa dalam menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Dan bertumbuh menjadi anak yang baik bagi masyarakat. Karena sebenarnya ada doa dalam setiap ucapan adzan itu sendiri yang suatu saat bayi tersebut akan mengerti. (Al Manhaj)

Hadis sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa yang melahirkan seorang anak, lalu dikumandangkan adzan pada telinga kirinya, maka dia tidak akan dicelakakan oleh Ummu Shibyan”(HR. Ibnu Sinni)


Adapun hadits Al-Husain bin Ali adalah dari riwayat Yahya bin Al-Ala dari Marwan bin Salim dari Thalhah bin Ubaidillah dari Al-Husain bin Ali ia berkata : bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَدَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصَّبْيَانِ

“Siapa yang kelahiran anak lalu ia mengadzankannya pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri maka Ummu Shibyan (jin yang suka mengganggu anak kecil, -pent) tidak akan membahayakannya”. (Al Manhaj)



F. Kerangka Teori




Bagan 2.1 Kerangka Teori

Keterangan:


Variabel yang tidak diteliti

Variabel yang diteliti

G. Kerangka konsep



Bagan 2.2 Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan *cross sectional*. Dalam penggunaan pendekatan *cross sectional*, pengukuran variabel terikat (ibu hamil dengan anemia) dan variabel bebas (antropometri dan *apgar score*) dilakukan secara simultan, satu kali saja dalam waktu yang bersamaan dan tidak dilakukan *follow up*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar

B. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2020 di Bagian Rekam Medik Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar pada bulan Januari hingga Desember 2018 sebanyak 825 orang.

2. Sampel

Adapun yang akan menjadi sampel penelitian ini adalah keseluruhan ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar pada bulan Januari hingga Desember 2018 dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

a. Kriteria Inklusi

1. Ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar pada bulan Januari hingga Desember 2018.
2. Ibu yang melahirkan dengan cara persalinan pervaginam
3. Memiliki data rekam medik yang dapat dievaluasi, meliputi: identitas pasien berupa nama dan kadar hemoglobin ibu hamil, antropometri bayi baru lahir yaitu berat badan, panjang badan dan lingkaran kepala serta *apgar score* dari bayi baru lahir.

b. Kriteria Eksklusi

1. Kehamilan ganda (gemelli).
2. Ibu yang menderita penyakit kronis (diabetes, hipertensi, jantung, dan asma).
3. Riwayat persalinan: ketuban pecah dini, pasrtus lama, IUGR/ pertumbuhan janin terhambat

Rumus yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel ialah rumus *slovin* :

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan

$$n = \frac{825}{1 + 825(0,05)^2}$$

Jadi, jumlah sampel yaitu 269.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung atau data yang dikumpulkan oleh kantor/instansi dan sudah dalam bentuk informasi. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar dimana penelitian ini dilaksanakan. Data sekunder diperoleh melalui rekam medik subjek penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan setelah meminta perizinan dari pihak Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar dengan mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada Direktur Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar. Setelah itu, melakukan pencatatan nomor rekam medik pasien melahirkan dalam periode yang telah ditentukan. Setelah itu dilakukan pengamatan dan pencatatan langsung ke dalam tabel berdasarkan data dari rekam medik pasien.

F. Instrumen Penelitian


Alat pengumpul dan instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel-tabel tertentu untuk merekam atau mencatat data yang dibutuhkan dari rekam medik.

G. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan diagram disertai penjelasan serta disusun dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Pengolahan data dilakukan setelah pencatatan rekam medik dengan menggunakan program computer *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) Statistik 23. Pengujian hipotesis menggunakan uji hipotesis *Chi Square*.

H. Alur Penelitian



Bagan 3.1 Alur Penelitian

I. Etika Penelitian

Mengajukan permohonan persetujuan tentang etika penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor E.003/KEPK/FKIK/XII/2019. Etika yang diperhatikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian.
2. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang dilakukan.
3. Menyampaikan tujuan penelitian dengan ramah kepada subjek penelitian.
4. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar pada tanggal 20 – 29 Januari 2020. Dalam pengumpulan data, data sekunder diperoleh dari catatan rekam medik ibu hamil berupa kadar hemoglobin ibu hamil trimester III, riwayat persalinan yaitu antropometri bayi baru lahir meliputi berat badan, panjang badan, lingkar kepala serta *apgar score* bayi baru lahir. Pengumpulan data ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui hubungan anemia pada ibu hamil dengan antropometri (berat badan, panjang badan dan lingkar kepala) dan *apgar score* bayi baru lahir di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar.

Data yang diperoleh sebanyak 269 dari data rekam medik ibu hamil tahun 2018. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan program *software* IBM SPSS Statistik 23 dan di analisa menggunakan uji *Chi-Square* sesuai dengan tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel lengkap sebagai berikut.

Tabel. 4.1 Distribusi Data Berdasarkan Data Rekam Medik RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018

Karakteristik	n	%
Kadar Hemoglobin		
Anemia	105	39
Tidak Anemia	164	61
Berat Badan Bayi Baru Lahir		
<2500 gram	26	9,7
2500-4000 gram	240	89,2
>4000 gram	3	1,1
Panjang Badan Bayi Baru Lahir		
<48 cm	80	29,7
48-52 cm	189	70,3
Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir		
<32 cm	27	10
	242	90

32-37 cm		
Apgar Score Bayi Baru Lahir	5	1,9
Berat	8	3,0
Sedang	256	95,2
Normal		

Sumber : Data Sekunder, 2018

Tabel 4.1 menunjukkan data ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar pada tahun 2018 yang mengalami anemia sebanyak 105 orang (39%) dan yang tidak mengalami anemia adalah sebesar 164 orang (61%). Data bayi dengan berat badan lahir rendah (<2500 gram) sebanyak 26 orang (9,7%), bayi dengan berat lahir makrosomia (>4000 gram) sebanyak 3 orang (1,1%), sedangkan bayi dengan berat lahir normal (2500-4000 gram) sebanyak 240 orang (89,2%). Data bayi dengan panjang badan normal (48 – 52 cm) sebanyak 189 bayi (70,3%), sedangkan bayi dengan panjang badan <48 cm sebanyak 80 bayi (29,7%). Data bayi dengan lingkaran kepala normal (32 – 37 cm) sebanyak 242 bayi (90%), sedangkan bayi dengan lingkaran kepala <32 cm sebanyak 27 bayi (10%). Data bayi dengan *apgar score* berat (0-3) sebanyak 5 bayi (1,9%), bayi dengan *apgar score* sedang (4-6) sebanyak 8 bayi (3,0%), sedangkan bayi dengan *apgar score* normal (7-10) sebanyak 256 bayi (95,2%).

Tabel. 4.2 Analisis Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Berat Badan Lahir Bayi di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018

Anemia ibu hamil	Berat Badan Lahir Bayi (gram)		Total	p-value
	<2500	≥2500		
Anemia	17	88	105	0,004
(<11 gr/dL)	(65,38%)	(36,21%)	(39,03%)	
Tidak Anemia	9	155	164	
(≥ 11 gr/dL)	(34,62%)	(63,79%)	(60,97%)	
Total	26	243	269	
	(9,67%)	(90,33%)	(100,00%)	

Sumber : Data Sekunder, 2018

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar pada tahun 2018 yang mengalami anemia

sebanyak 105 orang, dimana yang melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (<2500 gram) sebanyak 17 orang (16,9%), dan yang melahirkan bayi dengan berat bayi ≥ 2500 gram sebanyak 88 orang (36,21%) . Sedangkan ibu hamil yang tidak anemia sebanyak 164 orang, yang melahirkan bayi dengan dengan berat lahir rendah (<2500 gram) sebanyak 9 orang (5,4%), dan yang melahirkan bayi dengan berat bayi ≥ 2500 gram sebanyak 155 orang (63,79%).

Pada tabel diatas menunjukkan hasil analisis uji *Chi Square*. Hasil uji *Chi Square* terlihat pada nilai *p-value* $0,004 < 0,05$. Selain itu nilai $\chi^2 - \text{hitung} = 8.398 > \chi^2 - \text{tabel} = 3.841$. Uji *Chi Square* didapatkan nilai *sig* χ^2 hitung ($p = 0,004$) $> (\alpha = 0,05)$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan ada hubungan signifikan antara kadar hemoglobin dengan berat badan bayi.

Tabel. 4.3 Analisis Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Panjang Badan Lahir Bayi di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018

Anemia ibu hamil	Panjang Badan Lahir Bayi (cm)		Total	<i>p-value</i>
	<48	48-52		
Anemia (<11 gr/dL)	41 (39,05%)	64 (60,95%)	105 (39,03%)	0,015
Tidak Anemia (≥ 11 gr/dL)	39 (23,78%)	125 (76,22%)	164 (60,97%)	
Total	80 (29,74%)	189 (70,26%)	269 (100,00%)	

Sumber : Data Sekunder, 2018

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit DR. Tadjuddin Chalid Kota Makassar pada tahun 2018 yang mengalami anemia sebanyak 105 orang, dimana yang melahirkan bayi dengan panjang badan <48 sebanyak 41 orang (39,05%) dan yang melahirkan bayi dengan panjang badan 48-52 cm sebanyak 64 orang (60,95%). Sedangkan ibu hamil yang tidak anemia sebanyak 164 orang, yang melahirkan bayi dengan dengan panjang badan <48 sebanyak 39 orang (23,78%) dan yang melahirkan bayi dengan panjang badan 48-52 cm sebanyak 125 orang (76,22%).

Pada tabel diatas menunjukkan hasil analisis uji *Chi Square*. Hasil uji *Chi Square* terlihat pada nilai *p-value* $0,008 < 0,05$. Selain itu nilai $\chi^2 - \text{hitung} = 8.398 > \chi^2 - \text{tabel} = 3.841$. Uji *Chi Square* didapatkan nilai *sig* χ^2 hitung ($\rho = 0,008$) $>$ ($\alpha = 0,05$), maka H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan ada hubungan signifikan antara kadar hemoglobin dengan panjang badan bayi.

Tabel. 4.4 Analisis Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Lingkar Kepala Lahir Bayi di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018

Anemia ibu hamil	Lingkar Kepala Lahir Bayi (cm)		Total	<i>p-value</i>
	<32	32-37		
Anemia (<11 gr/dL)	16 (15,24%)	89 (84,76%)	105 (39,03%)	0,023
Tidak Anemia (≥ 11 gr/dL)	11 (6,71%)	153 (93,29%)	164 (60,97%)	
Total	27 (10,04%)	242 (89,96%)	269 (100,00%)	

Sumber : Data Sekunder, 2018

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit DR. Tadjuddin Chalid Kota Makassar pada tahun 2018 yang mengalami anemia sebanyak 105 orang, dimana yang melahirkan bayi dengan lingkar kepala <32 cm sebanyak 16 orang (15,24%) dan yang melahirkan bayi dengan lingkar kepala 32-

37 cm sebanyak 89 orang (84,76%). Sedangkan ibu hamil yang tidak anemia sebanyak 164 orang, yang melahirkan bayi dengan lingkaran kepala <32 cm sebanyak 11 orang (6,71%) dan yang melahirkan bayi dengan lingkaran kepala 32-37 cm sebanyak 153 orang (93,29%).

Pada tabel di atas menunjukkan hasil analisis uji *Chi Square*. Hasil uji *Chi Square* terlihat pada nilai *p-value* $0,023 < 0,05$. Selain itu nilai $\chi^2 - \text{hitung} = 8,398 > \chi^2 - \text{tabel} = 3,841$. Uji *Chi Square* didapatkan nilai *sig* χ^2 hitung ($p = 0,023$) $> (\alpha = 0,05)$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan ada hubungan signifikan antara kadar hemoglobin dengan berat badan bayi.

Tabel. 4.5 Analisis Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan *Apgar Score* Lahir Bayi di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018

Anemia ibu hamil	Apgar Score Lahir Bayi		Total	p-value
	Asfiksia	Normal		
Anemia (< 11 gr/dL)	9 (8,57%)	96 (91,43%)	105 (39,03%)	0,047
Tidak Anemia (≥ 11 gr/dL)	5 (3,05%)	159 (96,95%)	164 (60,97%)	
Total	14 (5,20%)	255 (94,80%)	269 (100,00%)	

Sumber : Data Sekunder, 2018

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar pada tahun 2018 yang mengalami anemia sebanyak 105 orang, dimana yang melahirkan bayi dengan asfiksia sebanyak 9 orang (8,57%) dan yang melahirkan dengan *apgar score* normal sebanyak 96 orang (91,43%). Sedangkan ibu hamil yang tidak anemia sebanyak 164 orang, dimana yang melahirkan bayi dengan asfiksia sebanyak 5 orang (3,05%) dan yang melahirkan dengan *apgar score* normal sebanyak 159 orang (96,95%).

Pada tabel diatas menunjukkan hasil analisis uji *Chi Square*. Hasil uji *Chi Square* terlihat pada nilai *p-value* $0,047 > 0,05$. Uji *Chi Square* didapatkan nilai *sig* χ^2 hitung ($\rho = 0,047$) $>$ ($\alpha = 0,05$), maka H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan ada hubungan signifikan antara kadar hemoglobin dengan *apgar score* bayi.

B. Pembahasan

1. Hubungan Anemia pada Ibu Hamil Terhadap Berat Badan (BB) Bayi Baru Lahir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mengalami anemia pada saat masa kehamilan yang melahirkan bayi dengan berat badan lahir ≥ 2500 sebanyak 88 sampel dan BBLR (< 2500 gram) sebanyak 17 sampel. Sedangkan ibu yang tidak mengalami anemia pada masa kehamilan yang melahirkan bayi dengan berat badan lahir normal sebanyak 155 sampel, BBLR sebanyak 9 sampel.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi-square* diperoleh nilai *p* sebesar 0,004 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kadar Hemoglobin ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan.

Hasil ini didukung oleh penelitian oleh Wahyuni di Puskesmas Trauma Center Samarinda. Hasil yang didapatkan bahwa ada hubungan yang bermakna atau positif antara kadar hemoglobin ibu hamil trimester III dengan berat badan janin di Puskesmas Trauma Center dengan nilai *p value*=0,000. Dimana, karakteristik responden penelitian di Puskesmas Trauma Center yaitu sebagian besar responden memiliki kadar Hemoglobin normal sebanyak 24 orang (61.5%) dan sebagian besar

responden memiliki bayi dengan berat badan normal sebanyak 21 orang (53.8%). (Wahyuni, 2017)

Penelitian oleh Sekhavat di Iran meneliti tentang anemia pada maternal dikaitkan dengan peningkatan resiko berat lahir rendah secara signifikan. Ini menunjukkan ada hubungan yang positif antara kadar hemoglobin maternal dengan berat badan lahir bayi. (L Sekhavat, 2011)

Pada penelitian kami responden penelitian rata-rata memiliki kadar hemoglobin yang normal. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar ibu hamil trimester III telah memiliki asupan zat besi yang baik. Dimana sesuai dengan penelitian oleh Sari di wilayah kerja Puskesmas Pujer . Asupan Fe serta keterlibatan senyawa lain seperti asam amino yang adekuat membantu pembentukan hemoglobin dalam darah Kurang lebih 1 dari 4 orang ibu hamil trimester III di wilayah kerja Puskesmas Pujer mengalami anemia. Pada hasil penelitian ini mengemukakan bahwa ada hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil trimester III dengan berat badan bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas Pujer Kabupaten Bondowoso. (Sari, 2017)

Tidak hanya ditinjau dari asupan gizi, namun usia gestasi juga dapat mempengaruhi bayi lahir dengan berat lahir rendah. Dimana, dalam penelitian dari Denna Rahinda Yulia Fanni pada tahun 2017. Variabel usia gestasi dan kadar hemoglobin trimester 3 kehamilan memiliki hubungan dengan berat lahir bayi di wilayah kerja Puskesmas Tambak Wedi Surabaya. Usia gestasi yang tergolong tidak berisiko untuk melahirkan bayi BBLR adalah usia gestasi >38 minggu sedangkan kadar hemoglobin trimester 3 kehamilan yang tergolong berisiko untuk melahirkan bayi BBLR adalah < 11g/dl. (Denna, 2017)

Pada penelitian di India oleh Madaan menunjukkan bahwa ada hubungan antara derajat anemia ibu hamil dengan antropometri bayi secara signifikan. Dimana, secara statistik berat lahir bayi menunjukkan $p=0,000$. (G Madaan, 2013). Penelitian di Iran menunjukkan berat lahir rata-rata neonatus mempunyai korelasi yang signifikan dengan konsentrasi Hb selama trimester ketiga dengan nilai $p < 0,01$. (Alizadeh, 2014)

Pada penelitian kami didapatkan pada ibu hamil yang tidak anemia sebanyak 164 orang melahirkan bayi dengan berat lahir rendah sebanyak 9 orang dan melahirkan bayi dengan berat normal sebanyak 155 orang. Hasil penelitian dilapangan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di kota Pariaman. Hasil yang ditemukan rata-rata kadar hemoglobin ibu hamil trimester III adalah 11,16 gr/dl dan ditemukan ibu hamil yang mengalami anemia sebesar 31,25%. Rata-rata berat bayi lahir pada penelitian adalah 3.103 gram dan ditemukan bayi yang mempunyai berat lahir rendah sebesar 3,1%. Kesimpulan dari penelitian ini tidak ditemukan adanya hubungan kadar hemoglobin ibu hamil trimester III dengan berat bayi lahir di kota Pariaman ($p > 0,05$) (Setiawan, 2013)

Penelitian lain yang tidak signifikan dengan penelitian kami yaitu dari Azhari yang bahwa tidak ada perbedaan berat badan lahir, apgar skor menit pertama dan kelima, dan panjang badan lahir pada kehamilan aterm dengan anemia dan tidak anemia. (Azhari, 2016)

Penelitian di Mesir meneliti tentang pengaruh faktor ibu pada ukuran kelahiran neonatal. Dimana dari penelitian ini menunjukkan korelasi negative antara kadar hemoglobin ibu dengan ukuran kelahiran bayi yang meliputi berat badan bayi baru lahir. (Hassan, 2011)

Menurut peneliti anemia pada ibu hamil dapat mempengaruhi janin selama dalam kandungannya, tetapi belum tentu semua ibu hamil yang mengalami anemia selalu melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR), karena banyak faktor yang mempengaruhi kelahiran bayi seperti asupan gizi selama sebelum dan selama masa kehamilan, usia gestasi, faktor sosiodemografi. Melihat masih tingginya anemia pada ibu hamil maka penanggulangan anemia harus terus dilakukan, terutama untuk wanita hamil, wanita pekerja, maupun wanita prahamil. Selain itu penderita anemia perlu mengupayakan perbaikan menu makanan dengan meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi seperti telur, susu, hati, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau tua, dan membiasakan pula menambah substansi yang memudahkan penyerapan zat besi seperti vitamin C. (Sari, 2017)

2. Hubungan Anemia pada Ibu Hamil Terhadap Panjang Badan (PB) Bayi Baru Lahir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mengalami anemia pada saat masa kehamilan yang melahirkan bayi dengan panjang badan lahir <48 cm sebanyak 41 sampel dan bayi dengan panjang badan lahir 48-52 cm sebanyak 64 sampel. Sedangkan ibu yang tidak mengalami anemia pada masa kehamilan yang melahirkan bayi dengan panjang badan lahir <48 cm sebanyak 39 sampel dan bayi dengan panjang badan 48-52 cm sebanyak 125 sampel.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi-square* diperoleh nilai p sebesar 0,008 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin ibu dengan panjang badan bayi yang dilahirkan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya dari Ulfa Rosliana Putri dengan judul penelitian hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil pada trimester ketiga dengan antropometri bayi baru lahir, mengatakan bahwa ada hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan antropometri bayi baru lahir yang meliputi berat badan, panjang badan dan lingkaran kepala secara bermkna yang dilakukan pada RSPAD Gatot Soebroto Dietkesad pada tahun 2014. (Putri, 2014)

Penelitian lain yang memiliki hasil signifikan sesuai dengan penelitian kami oleh Kaur tahun 2015. Dimana, Wanita hamil yang anemia dan non-anemia berbeda secara signifikan dalam interval antara kehamilan sebelumnya, paritas, tekanan darah sistolik, maternal Hb. Pada penggunaan hemoglobin ibu sebagai variabel kontinu, hasil kelahiran antropometrik ini berkorelasi positif dengan hemoglobin ibu ($p < 0,05$) dan menunjukkan hubungan yang serupa antara hemoglobin ibu (g / dL) dan panjang ($p = 0,010$). (Kaur, 2015)

Di India, penelitian oleh Madaan menunjukkan bahwa ada hubungan antara derajat anemia ibu hamil dengan antropometri bayi secara signifikan. Dimana, secara statistik panjang lahir bayi menunjukkan $p=0,000$. (G Madaan, 2013)

Pada penelitian ini didapatkan pada ibu hamil yang tidak anemia sebanyak 164 orang melahirkan bayi dengan panjang badan yang kurang sebanyak 39 orang dan melahirkan bayi dengan panjang badan normal sebanyak 125 orang. Hasil penelitian dilapangan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Solange pada tahun 2015 dimana frekuensi anemia ibu adalah 53,7%, dan 32,6% pada bayi baru lahir. Setengah dari bayi yang baru lahir adalah anak-anak anemia dari

ibu-ibu yang anemia dan 79,3% wanita hamil yang mengalami anemia mengalami anemia ringan dan pada 20,7% sedang. Sehingga disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara hemoglobin ibu dengan antropometri bayi, yakni salah satunya panjang badan bayi. (Solange, 2015)

Penelitian lain yang bertentangan dengan penelitian kami yaitu penelitian dari Azhari yang mengemukakan bahwa hasil uji diperoleh rerata panjang badan lahir pada kelompok anemia adalah $48,58 \text{ cm} \pm 1,52 \text{ cm}$ hampir tidak memiliki perbedaan dibandingkan ibu hamil aterm tidak anemia $48,89 \text{ cm} \pm 1,56 \text{ cm}$ dengan nilai $p=0,310$ terhadap Panjang badan bayi baru lahir. Dan didapatkan hasil tidak ada perbedaan panjang badan lahir pada kehamilan aterm dengan anemia dan tidak anemia. (Azhari,2016)

Penelitian lain yang tidak sejalan dengan penelitian kami yaitu oleh Hassan di Mesir yang menunjukkan korelasi negative antara kadar hemoglobin ibu dengan ukuran kelahiran bayi yang meliputi panjang badan bayi baru lahir. (Hassan, 2011)

Menurut peneliti anemia pada ibu hamil dapat mempengaruhi janin selama dalam kandungannya, tetapi belum tentu semua ibu hamil yang mengalami anemia selalu melahirkan bayi panjang badan yang kurang, karena banyak faktor yang mempengaruhi kelahiran bayi. Banyak faktor lain yang mempengaruhi panjang badan lahir bayi.

3. Hubungan Anemia pada Ibu Hamil Terhadap Lingkar Kepala (LK) Bayi Baru Lahir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mengalami anemia pada saat masa kehamilan yang melahirkan bayi dengan lingkar kepala <32 cm sebanyak 16 sampel dan yang melahirkan dengan lingkar kepala 32-37 cm sebanyak 89 sampel. Sedangkan ibu yang tidak mengalami anemia pada masa kehamilan yang melahirkan bayi dengan lingkar kepala <32 cm sebanyak 11 sampel dan yang melahirkan dengan lingkar kepala 32-37 cm sebanyak 153 sampel.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi-square* diperoleh nilai p sebesar 0,023 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kadar Hemoglobin ibu dengan lingkar kepala bayi yang dilahirkan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Kaur tahun 2015 yang berkorelasi positif dimana wanita hamil yang anemia dan non-anemia berbeda secara signifikan dalam interval antara kehamilan sebelumnya, paritas, tekanan darah sistolik, maternal Hb. Pada penggunaan hemoglobin ibu sebagai variabel kontinu, hasil kelahiran antropometrik ini berkorelasi positif dengan hemoglobin ibu ($p < 0,05$) dan menunjukkan hubungan yang serupa antara hemoglobin ibu (g / dL) dan lingkar kepala ($p = 0,003$) (Kaur, 2015)

Penelitian lain yang menunjukkan korelasi positif oleh Madaan dimana ada hubungan antara derajat anemia ibu hamil dengan antropometri bayi secara signifikan. Dimana, secara statistik lingkar kepala lahir bayi menunjukkan $p=0,001$. (G Madaan, 2013)

Di mesir, penelitian oleh Hassan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kadar hemoglobin ibu dengan ukuran kelahiran bayi yang meliputi panjang badan bayi baru lahir. (Hassan, 2011)

Menurut peneliti anemia pada ibu hamil juga dapat mempengaruhi janin selama dalam kandungannya, tetapi belum tentu semua ibu hamil yang mengalami anemia selalu melahirkan bayi dengan lingkaran kepala yang kurang, karena banyak faktor yang mempengaruhi kelahiran bayi. Faktor yang dapat berhubungan yaitu adanya kelainan bayi selama masa kehamilan yang membuat lingkaran kepala bayi tidak normal. Adapun faktor lain seperti asupan gizi yang kurang sehingga perkembangan bayi juga tidak maksimal.

4. Hubungan Anemia pada Ibu Hamil Terhadap Apgar Score Bayi Baru Lahir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mengalami anemia pada saat masa kehamilan yang melahirkan bayi dengan apgar score berat (0-3) sebanyak 3 sampel, yang melahirkan dengan apgar score sedang (4-6) sebanyak 5 sampel dan apgar score normal (7-10) sebanyak 97 sampel. Sedangkan ibu yang tidak mengalami anemia pada masa kehamilan yang melahirkan bayi dengan dengan apgar score berat (0-3) sebanyak 2 sampel, yang melahirkan dengan apgar score sedang (4-6) sebanyak 3 sampel dan apgar score normal (7-10) sebanyak 159 sampel.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi-square* diperoleh nilai p sebesar 0,047 ($p > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin ibu dengan *apgar score* bayi yang dilahirkan.

Penelitian kami sesuai dengan penelitian oleh Fatmasari di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi-Blitar periode september 2012 mengenai kadar hemoglobin dengan skor apgar. Rendahnya kadar Hb saat kehamilan trimester III dapat menyebabkan skor apgar yang rendah pada bayi yang akan di lahirkan. Penelitian ini menunjukkan hasil analisis didapatkan uji Anova One-Way di dapatkan nilai Between dan Within = $001 < \alpha = 5\%$ yakni (0,05) yang berarti ada pengaruh antara kadar Hb yang rendah terhadap skor apgar bayi baru lahir di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi-Blitar dengan kekuatan hubungan 5,98. (Fatmasari, 2015).

Penelitian oleh Alizadeh di Iran mengemukakan bahwa 8% neonatus memiliki skor apgar kurang dari delapan dan skor apgar rendah ini mempunyai hubungan yang signifikan pada ibu yang anemia. (Alizadeh, 2014). Penelitian lain yang sesuai terjadi di Rumah Sakit Shahid Sadughi di Yazd, Iran menunjukkan risiko skor apgar rendah secara signifikan meningkat pada wanita dengan anemia. (L Sekhavat, 2011)

Penelitian lain yang signifikan dengan penelitian kami oleh Lokeshwar Bagian dari eritrosit janin dalam sirkulasi ibu terjadi umumnya selama kehamilan. Pada 50% kehamilan beberapa sel janin dilewatkan dalam sirkulasi ibu selama kehamilan atau selama proses kelahiran. Perawatan neonatus dengan anemia karena darah tergantung pada derajat hipovolemia atau anemia dan apakah kehilangan darah telah akut atau kronis. Bayi baru lahir dengan kulit pucat harus dibedakan dari bayi yang mengalami asfiksia. Perawatan neonatus dengan anemia karena darah tergantung pada derajat hipovolemia atau anemia dan apakah kehilangan

darah telah akut atau kronis. Bayi baru lahir dengan kulit pucat harus dibedakan dari bayi yang mengalami asfiksia. (Lokeshwar, 2013).

Penelitian lain yang tidak signifikan dengan hasil penelitian kami oleh penelitian Neila Fawza Putri Sibarani di RSUD Artha Medica Binjai Tahun 2013. Didapatkan rata-rata kadar Hb ibu hamil 10,2 g/dL. Ibu dengan kadar Hb normal 28,7%, anemia ringan 36%, anemia sedang 34,8%, dan anemia berat 0,4%. Sebanyak 77,3% bayi lahir dengan nilai apgar normal dan 22,7% bayi lahir dengan asfiksia sedang. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kadar Hb dengan *apgar score* bayi baru lahir (Sibarani, 2014).

Penelitian lain yang tidak sesuai dengan penelitian kami oleh Azhari yang mengemukakan bahwa hasil uji diperoleh rerata apgar skor pada menit pertama pada kelompok anemia adalah $7,04 \pm 1,39$, yang sedikit lebih rendah jika dibandingkan pada ibu hamil aterm tidak anemia $7,36 \pm 0,65$ dengan nilai $p = 0,480$. Rerata apgar skor pada menit kelima pada kelompok anemia $8,11 \pm 1,20$ sedikit lebih rendah dibandingkan ibu hamil aterm tidak anemia $8,40 \pm 0,62$ dengan nilai $p = 0,483$. Disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan apgar skor menit pertama dan kelima, pada kehamilan aterm dengan anemia dan tidak anemia. (Azhari, 2016)

Dari hasil penelitian antara kadar hemoglobin ibu hamil terhadap *apgar score* memiliki hasil yang tidak signifikan. Ini dikarenakan ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya *apgar score* bayi umur kehamilan dan konsumsi makanan yang buruk juga dapat menyebabkan kadar Hb rendah, selain dapat berpengaruh terhadap skor apgar juga dapat berpengaruh terhadap BBLR serta pertumbuhan dan perkembangan bayi terganggu. Adapun faktor yang terjadi selama persalinan yang membuat

apgar score bayi menjadi rendah hingga dapat menyebabkan kematian jika tidak tertangani dengan baik. mempengaruhi janin selama dalam kandungannya.

Di Indonesia, anemia umumnya disebabkan oleh kekurangan zat besi. Pada trimester pertama kehamilan, kebutuhan zat besi sedikit karena pertumbuhan janin masih lambat. Menginjak trimester kedua hingga ketiga, volume darah dalam tubuh wanita hamil meningkat. Sel darah merah harus mengangkut oksigen lebih banyak untuk janin. Pada banyak wanita hamil, anemia dapat disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak memenuhi syarat gizi, kehamilan berulang dalam waktu singkat, gangguan absorpsi Fe, atau gangguan produksi globin karena penyakit tertentu. Anemia dalam kehamilan dapat menyebabkan oksigen untuk janin berkurang, hingga mengakibatkan IUGR, gangguan jantung, maupun komplikasi lain selama persalinan (Bobak, 2012).

Hal ini sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma'idah/5: 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahannya :*“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”*.

Berdasarkan Surah Al-Ma'idah ayat 88 menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kita. Khususnya pada ibu hamil haruslah mengonsumsi asupan makanan yang baik lagi halal agar janin yang dikandungnya dapat memperoleh gizi yang

baik pula. Sehingga nantinya bayi lahir dengan sehat dan berat badan yang normal. (Shihab, 2016)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai hubungan anemia pada ibu hamil dengan antropometri dan *apgar score* bayi baru lahir di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan berat badan bayi baru lahir.
2. Terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin ibu hamil terhadap panjang badan bayi baru lahir.
3. Terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin ibu hamil terhadap lingkaran kepala bayi baru lahir.
4. Terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin ibu hamil terhadap *apgar score* bayi baru lahir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengukur langsung kadar hemoglobin serta pemeriksaan antropometri bayi baru lahir agar hasil yang didapatkan sama dalam suatu pengukuran.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar hemoglobin atau terjadinya anemia pada ibu hamil dengan lebih spesifik agar hasil yang didapatkan lebih akurat
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pemeriksaan kadar Hb tidak hanya pada trimester III saja tetapi dari awal kehamilan untuk mendapatkan skor *apgar* yang normal dan kesehatan bayi saat dilahirkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan juga mengkaji tentang penyakit atau kelainan selama masa kehamilan yang dapat mempengaruhi antropometri bayi baru lahir.
5. Bagi instansi terkait diharapkan untuk terus melakukan penanggulangan anemia pada ibu hamil dengan memberikan edukasi akan pentingnya mengonsumsi asupan makanan yang bergizi dan sehat serta mengonsumsi tablet Fe untuk menghindari terjadinya anemia.



DAFTAR PUSTAKA

Al Quranul Karim

- Alizadeh, L, et al. 2014. *Impact of Maternal Hemoglobin Concentration on Fetal Outcomes in Adolescent Pregnant Women*. Iran Red Crescent Med J. 16(8):e19670
- Al Manhaj. <https://almanhaj.or.id/3346-jangan-mudah-memutuskan-ini-halal-dan-itu-haram.html>
- Al Manhaj. <https://almanhaj.or.id/1553-apakah-disyariatkan-adzan-pada-telinga-bayi-yang-baru-lahir.html>
- Bakta, IM. 2016. *Hematologi Klinik Ringkas*. Jakarta: EGC;:hlm.11-6.
- Bidang Bina Kesehatan Masyarakat. Kota Makassar. 2016. *Profil Kesehatan Kota Makassar 2015 (Data Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil)*. Makassar
- Bobak, Lowdermilk, Jense. 2012. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Jakarta: EGC
- Cunningham. 2017. *Obstetri Williams. Edisi 23, volume 2*. Jakarta: EGC
- Departemen Kesehatan RI, 2003. *Program Penanggulangan Anemia Gizi pada Wanita usia Subur (WUS)*. Jakarta: Direktorat Gizi dan Binkesmas.
- Dinas Kesehatan Kota Makassar. 2016. *Profil Kesehatan Kota Makassar 2015*. Makassar
- Fatmasari, Septi Yasa Agus (2015) Hubungan Kadar Hb Ibu Hamil Dengan Apgar Skor Bayi Baru Lahir Di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi-Blitar. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.
- G Madaan, dkk. 2013. *Effects of Third Trimester Maternal Hemoglobin Upon Newborn Anthropometry*. J. Nepal Paediatr. Soc. Vol 33; Issue 3. doi: <http://dx.doi.org/10.3126/jnps.v33i3.8251>
- Gomella TL, Cunningham D, Eyal FG, Zenk KE. 2013. *Hyperbilirubinemia. Neonatology : management, procedures, on call problems, diseases and drugs. 8th ed*. New York : McGraw-Hill
- Hassan, dkk. 2011. *Relationship Between Maternal Characteristics And Neonatal Birth Size In Egypt*. Eastern Mediterranean Health Journal. Vol. 17 No. 4
- IDAI. 2009. *Pedoman Pelayanan Medis* . Jakarta: IDAI.

- Johnson, TS & Engstrom, JL. 2002, 'State of the Science in Measurement of infant Size at Birth', *Newborn and Infant Nursing Reviews*, vol. 2, no. 3, pp. 150-158
- Kemenag, Qur'an. 2019. <https://quran.kemenag.go.id/index.php>
- Labir, I Ketut, dkk. 2013. *Anemia ibu hamil trimester I dan II meningkatkan risiko kejadian berat bayi lahir rendah di RSUD Wangaya Denpasar*. Public Health and Preventive Medicine Archive, Volume 1, Nomor 1
- Lokeshwar, M. R, dkk. 2003. *Anemia in the newborn*. The Indian journal of pediatrics 70,893-902
- LPPOM-MUI Provinsi Bali. 2010. Pengertian Halal dan Haram Menurut Ajaran Islam (I). <https://www.halalmuibali.or.id/pengertian-halal-dan-haram-menurut-ajaran-islam-ii/>
- L Sekhavat. 2011. Relationship between maternal hemoglobin concentration and neonatal birth weight. Department of Obstetrics & Gynecology, Shahid Sedughi Hospital, Shahid Sedughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran. VOL. 16 NO. 6
- Mandang, Jenni. 2016. *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Bogor : IN MEDIA
- Novita & Franciska. 2011. *Promosi Kesehatan Dalam Pelayanan Kebidanan*. Salemba Medika; Jakarta
- Olus Api et al. 2015. *Diagnosis And Treatment Of Iron Deficiency Anemia During Pregnancy And The Postpartum Period: Iron Deficiency Anemia Working Group Consensus Report*. Turk J Obstet Gynecol;12:173-81
- Pereira-Da-Silva, L. (2012). Neonatal anthropometry: A tool to evaluate the nutritional status and predict early and late risks. In *Handbook of Anthropometry: Physical Measures of Human Form in Health and Disease* (pp. 1079–1104). https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1788-1_65
- Prawirohardjo, Sarwono. 2010. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Price, Sylvia. 2006. *Patofisiologi Konsep Klinis dan Proses-proses Penyakit Edisi 6*. Jakarta: EGC
- Putri, Ulfa Rosliana. 2014. *Hubungan antara Kadar Hemoglobin Ibu Hamil pada Trimester Ketiga dengan Antropometri Bayi Baru Lahir di RSPAD Gatot Soebroto Dietkesad*. Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Reece EA dan Robbins JC. 2007. *Clinical Obstetrics: The fetus and Mother 3rd edition*. Unites States of America: Blackwell Publishing
- Rudolph, A. M. 2014. *Buku Ajar Pediatri Rudolph Edisi 20 Volume 1*. Jakarta: ECG.
- Saifuddin. 2010. *Buku Acuan : Asuhan Persalinan Normal*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo
- Santrock, JW. 2011. *Perkembangan Masa Hidup Edisi, Ke-5*. Jakarta: Erlangga.
- Sari, Denia Vita. 2017. *Hubungan Kadar Hemoglobin dan Berat Badan Bayi Baru Lahir*. Journal Of Dharma Praja Vol. 04, No. 01
- Setiati S, dkk. 2014. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid II. Edisi VI*. Jakarta: Interna Publishing
- Shihab, Q. 2016. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Soetjiningsih. 2012. *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC
- Sohimah. 2006. *Anemia dalam Kehamilan dan Penanggulangannya*. Jakarta: Gramedia
- Solange Augusta de et al. 2015. *Anemia pada kehamilan : berdampak pada berat badan dan perkembangan anemia pada bayi baru lahir . Nutr. Hosp.* [on line]. vol.32, n.5, pp.2071-2079. ISSN 1699-5198. <http://dx.doi.org/10.3305/nh.2015.32.5.9186>.
- Sreeramareddy, CT et al. 2008, 'Anthropometric surrogates to identify low birth weight Nepalese newborns: a hospital based study', *Pediatrics*, vol. 8, pp. 16-22
- Supariasa. 2012. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: ECG.
- Talaulikar, Vikram Sinai. 2019. Anemia in pregnancy | GLOWM. (n.d.). Retrieved October 29, 2019, from https://www.glowm.com/Critical_current_issue/page/25

Lampiran 1 : Tabel Sampel Ibu Hamil yang Melahirkan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018

No	No.RM	Nama	Kadar Hb (gr/dL)			BB Bayi (gram)			PB Bayi (cm)			LK Bayi (cm)			Apgar Score		
			Kadar Hb	Anemia	Kode	BB	BB	Kode	PB	PB	Kode	LK	LK	LK	AS	AS	Kode
1	036776	A	10.4	Ya	1	3300	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
2	027664	S	12.5	Tidak	2	3535	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
3	050682	F	8.1	Ya	1	3348	Normal	2	48	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
4	050682	R	7.5	Ya	1	3040	Normal	2	47	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
5	049250	P	7.3	Ya	1	3120	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
6	039247	M	11.7	Tidak	2	3220	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
7	050547	NI	6.3	Ya	1	2295	BBLR	1	47	Tidak Normal	1	31	Tidak Normal	1	8	Normal	2
8	038434	RY	7.4	Ya	1	3315	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
9	039147	N	9.2	Ya	1	2700	Normal	2	47	Tidak Normal	1	32	Normal	2	7	Normal	2
10	036725	R	7.5	Ya	1	2675	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
11	037321	D	8.3	Ya	1	2450	BBLR	1	48	Normal	2	33	Normal	2	1	Asfiksia	1
12	010187	G	11.8	Tidak	2	3075	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
13	036568	NH	9.9	Ya	1	2750	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	7	Normal	2
14	036676	AQ	8.6	Ya	1	3325	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
15	039282	M	6.9	Ya	1	2300	BBLR	1	45	Tidak Normal	1	31	Tidak Normal	1	7	Normal	2
16	032981	RL	9.3	Ya	1	3200	Normal	2	46	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
17	039947	S	7.9	Ya	1	3040	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	6	Asfiksia	1
18	051018	NS	9.1	Ya	1	2820	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
19	049890	HS	7.2	Ya	1	3270	Normal	2	48	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
20	039190	S	12.2	Tidak	2	3590	Normal	2	50	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
21	047790	C	10.5	Ya	1	3155	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2

22	039190	S	12.2	Tidak	2	3590	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
23	046486	FY	10	Ya	1	3500	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
24	047388	D	11	Tidak	2	2690	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
25	035874	N	12	Tidak	2	3585	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
26	038685	AF	12	Tidak	2	2720	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
27	037269	RA	11.9	Tidak	2	2940	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
28	065488	ASA	10.8	Ya	1	3100	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
29	042586	ANS	12	Tidak	2	3500	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
30	037868	R	11.9	Tidak	2	3530	Normal	2	49	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
31	037969	H	11.2	Tidak	2	2910	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
32	050768	AN	12	Tidak	2	2600	Normal	2	51	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
33	050767	A	10.6	Ya	1	2705	Normal	2	45	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
34	037900	DS	12.2	Tidak	2	2500	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
35	050673	SC	12.3	Tidak	2	3245	Normal	2	48	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
36	048200	FR	11.1	Tidak	2	2780	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
37	049200	M	10.9	Ya	1	3040	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
38	052572	N	7	Ya	1	1735	BBLR	1	43	Tidak Normal	1	31	Tidak Normal	1	7	Normal	2
39	045501	PP	9.9	Ya	1	3490	Normal	2	51	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
40	035965	E	10.4	Ya	1	3370	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	7	Normal	2
41	022102	DR	12.3	Tidak	2	3350	Normal	2	51	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
42	036268	UPS	12.8	Tidak	2	3055	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
43	040367	S	12	Tidak	2	2685	Normal	2	48	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
44	050002	M	9.5	Ya	1	2830	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	9	Normal	2
45	047002	H	11	Tidak	2	3040	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
46	034709	F	11.5	Tidak	2	3010	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	6	Asfiksia	1
47	037710	IS	12.3	Tidak	2	3235	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2

48	035318	S	8.6	Ya	1	2890	Normal	2	47	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
49	036202	SF	10.4	Ya	1	2115	BBLR	1	43	Tidak Normal	1	31	Tidak Normal	1	8	Normal	2
50	038821	N	9.8	Ya	1	2360	BBLR	1	46	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
51	049222	H	9.3	Ya	1	2820	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
52	016622	IL	10.3	Ya	1	3290	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
53	050602	RA	10.8	Ya	1	3585	Normal	2	50	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
54	046609	H	12	Tidak	2	3620	Normal	2	52	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
55	037209	E	10.8	Ya	1	3095	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	7	Normal	2
56	044616	NR	11	Tidak	2	3200	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
57	039919	H	11.8	Tidak	2	2230	BBLR	1	44	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
58	026310	AS	11.3	Tidak	2	4055	Normal	2	51	Normal	2	35	Normal	2	8	Normal	2
59	047714	G	13.4	Tidak	2	3220	Normal	2	51	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
60	036502	R	12	Tidak	2	3215	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
61	047234	RL	11.7	Tidak	2	2900	Normal	2	46	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
62	048739	H	11.4	Tidak	2	2234	BBLR	1	49	Normal	2	31	Tidak Normal	1	8	Normal	2
63	038681	TSA	12.8	Tidak	2	3060	Normal	2	49	Normal	2	31	Tidak Normal	1	8	Normal	2
64	046652	R	13	Tidak	2	2720	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
65	049351	AR	11.2	Tidak	2	2820	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
66	046651	ARA	11.3	Tidak	2	2725	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
67	037853	JB	13.6	Tidak	2	3480	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
68	036960	A	9.4	Ya	1	3150	Normal	2	47	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
69	052362	CMS	13	Tidak	2	2235	BBLR	1	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
70	050062	N	11.8	Tidak	2	2940	Normal	2	50	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
71	050663	K	12	Tidak	2	2645	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
72	043954	R	10.8	Ya	1	3340	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
73	037157	S	13	Tidak	2	2500	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2

74	046554	I	12.2	Tidak	2	3840	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
75	039850	S	11.3	Tidak	2	2880	Normal	2	50	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
76	047457	AH	11	Tidak	2	2960	Normal	2	50	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
77	047562	SM	11	Tidak	2	3115	Normal	2	50	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
78	047549	D	11.5	Tidak	2	3725	Normal	2	50	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
79	036045	M	10.8	Ya	1	2635	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
80	044247	NE	10.4	Ya	1	2825	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
81	027252	IE	11.3	Tidak	2	2750	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
82	036353	S	9.4	Ya	1	3220	Normal	2	47	Tidak Normal	1	34	Normal	2	8	Normal	2
83	036759	I	12	Tidak	2	3080	Normal	2	51	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
84	036646	J	10.1	Ya	1	2980	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
85	017047	F	11.6	Tidak	2	2900	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
86	036756	J	11.5	Tidak	2	2795	Normal	2	48	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
87	044459	NI	11.5	Tidak	2	3100	Normal	2	50	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
88	036345	H	9.8	Ya	1	2440	BBLR	1	45	Tidak Normal	1	31	Tidak Normal	1	8	Normal	2
89	036363	MU	9	Ya	1	2900	Normal	2	45	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
90	051651	KT	11.6	Tidak	2	3000	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
91	052748	NS	13.1	Tidak	2	2825	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
92	052460	JE	12.8	Tidak	2	2885	Normal	2	50	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
93	052350	S	13	Tidak	2	3655	Normal	2	50	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
94	052448	VAT	11.2	Tidak	2	3175	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
95	037852	E	9	Ya	1	3175	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
96	050758	N	10.7	Ya	1	3070	Normal	2	50	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
97	049845	NN	10.7	Ya	1	3250	Normal	2	50	Normal	2	32	Normal	2	9	Normal	2
98	049253	K	11.1	Tidak	2	3610	Normal	2	50	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
99	045953	WM	7.8	Ya	1	2705	Normal	2	47	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2

100	043880	J	11.8	Tidak	2	3200	Normal	2	49	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
101	036894	M	8.8	Ya	1	3640	Normal	2	51	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
102	036792	M	10.9	Ya	1	3040	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
103	036794	SW	12.9	Tidak	2	2840	Normal	2	46	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
104	036578	MA	10.2	Ya	1	3340	Normal	2	51	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
105	036298	R	10.5	Ya	1	2360	BBLR	1	46	Tidak Normal	1	31	Tidak Normal	1	8	Normal	2
106	051578	N	9.4	Ya	1	3565	Normal	2	51	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
107	035896	S	11.5	Tidak	2	3380	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
108	043482	RR	10	Ya	1	3115	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
109	036196	M	10	Ya	1	2800	Normal	2	50	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
110	034181	SD	12.6	Tidak	2	3000	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
111	038581	VR	10.2	Ya	1	3460	Normal	2	51	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
112	047432	NA	14.4	Tidak	2	2900	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
113	044133	HS	11.7	Tidak	2	2760	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
114	049127	I	11.6	Tidak	2	2520	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
115	049736	I	12.3	Tidak	2	2510	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	9	Normal	2
116	048829	SD	12.6	Tidak	2	3110	Normal	2	47	Tidak Normal	1	34	Normal	2	8	Normal	2
117	050831	IAL	12.7	Tidak	2	2775	Normal	2	47	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
118	052443	R	10.2	Ya	1	2210	BBLR	1	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
119	047334	E	10.4	Ya	1	3215	Normal	2	47	Tidak Normal	1	34	Normal	2	8	Normal	2
120	042927	SR	12.1	Tidak	2	3260	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
121	049182	S	9.4	Ya	1	3300	Normal	2	51	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
122	049281	YN	12.5	Tidak	2	3340	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
123	049276	M	9.1	Ya	1	2890	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	6	Asfiksia	1
124	028477	M	11	Tidak	2	2610	Normal	2	46	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
125	049976	NA	11.8	Tidak	2	3280	Normal	2	48	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2

126	050178	E	8.7	Ya	1	2905	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
127	050084	F	9.5	Ya	1	3220	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
128	050677	WF	8.4	Ya	1	3290	Normal	2	50	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
129	038180	SNM	11.2	Tidak	2	3115	Normal	2	49	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
130	050880	S	12.2	Tidak	2	3810	Normal	2	53	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
131	043430	BS	12.5	Tidak	2	2990	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
132	038576	I	11.8	Tidak	2	2600	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
133	045076	S	8.6	Ya	1	2680	Normal	2	47	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
134	038783	HA	11.1	Tidak	2	3440	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
135	041179	N	11.7	Tidak	2	3700	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
136	039775	HM	10.6	Ya	1	3225	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
137	049083	K	13.1	Tidak	2	2405	BBLR	1	45	Tidak Normal	1	32	Normal	2	7	Normal	2
138	037275	MM	12.1	Tidak	2	3255	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
139	051381	IGP	8.9	Ya	1	3260	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
140	042880	AAS	10.8	Ya	1	3695	Normal	2	51	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
141	051479	HM	12.1	Tidak	2	2860	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
142	050798	SM	11.5	Tidak	2	3350	Normal	2	49	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
143	050680	I	10.3	Ya	1	3200	Normal	2	49	Normal	2	34	Normal	2	7	Normal	2
144	037899	FA	11.5	Tidak	2	3570	Normal	2	52	Normal	2	34	Normal	2	1	Asfiksia	1
145	037897	NA	8.5	Ya	1	3130	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
146	028297	NA	12.8	Tidak	2	3175	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
147	043693	PES	12.6	Tidak	2	2710	Normal	2	47	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
148	043496	S	10.7	Ya	1	2810	Normal	2	46	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
149	041998	SS	10	Ya	1	3660	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
150	031198	AM	9.3	Ya	1	4000	Normal	2	52	Normal	2	35	Normal	2	8	Normal	2
151	052394	H	11.5	Tidak	2	2434	BBLR	1	46	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2

152	050793	I	12.9	Tidak	2	2905	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
153	052391	E	8.9	Ya	1	2780	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
154	045417	N	11.2	Tidak	2	3200	Normal	2	49	Normal	2	34	Normal	2	6	Asfiksia	1
155	046617	E	11.8	Tidak	2	3400	Normal	2	50	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
156	039106	R	12.3	Tidak	2	2895	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
157	037215	TD	10.5	Ya	1	2855	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
158	034717	EW	11.4	Tidak	2	3170	Normal	2	46	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
159	044402	M	11.1	Tidak	2	3245	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
160	023215	N	11.5	Tidak	2	3200	Normal	2	49	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
161	029318	TA	10	Ya	1	3265	Normal	2	45	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
162	032215	N	12	Tidak	2	2900	Normal	2	45	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
163	035908	H	11.8	Tidak	2	2585	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	3	Asfiksia	1
164	028439	S	12.8	Tidak	2	3525	Normal	2	50	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
165	043942	A	10.8	Ya	1	2590	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
166	047025	R	13.4	Tidak	2	3610	Normal	2	52	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
167	037225	J	11	Tidak	2	3100	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
168	044739	SS	11.3	Tidak	2	3889	Normal	2	48	Normal	2	35	Normal	2	8	Normal	2
169	048331	M	10.8	Ya	1	2535	Normal	2	47	Tidak Normal	1	32	Normal	2	9	Normal	2
170	037937	S	12	Tidak	2	2920	Normal	2	46	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
171	046533	T	11.6	Tidak	2	2815	Normal	2	47	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
172	049223	NH	9.8	Ya	1	4100	Normal	2	51	Normal	2	36	Normal	2	8	Normal	2
173	035933	NS	10.2	Ya	1	2740	Normal	2	46	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
174	037234	R	12.8	Tidak	2	2175	BBLR	1	45	Tidak Normal	1	31	Tidak Normal	1	6	Asfiksia	1
175	022235	S	11.2	Tidak	2	3050	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
176	043835	SH	12.5	Tidak	2	2310	BBLR	1	46	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
177	038736	S	11	Tidak	2	2890	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2

178	039136	ME	9.1	Ya	1	1940	BBLR	1	43	Tidak Normal	1	30	Tidak Normal	1	8	Normal	2
179	039132	FH	10.7	Ya	1	2565	Normal	2	46	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
180	044732	I	12	Tidak	2	3120	Normal	2	51	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
181	023730	N	11.5	Tidak	2	3195	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
182	045611	N	12.2	Tidak	2	2905	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
183	039410	DY	12.5	Tidak	2	3402	Normal	2	50	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
184	030310	SH	11.1	Tidak	2	3615	Normal	2	51	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
185	031518	RAPK	10.5	Ya	1	2735	Normal	2	47	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
186	052703	A	13.3	Tidak	2	3550	Normal	2	52	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
187	022005	E	10.7	Ya	1	3520	Normal	2	53	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
188	052617	N	11.5	Tidak	2	2320	BBLR	1	47	Tidak Normal	1	31	Tidak Normal	1	8	Normal	2
189	049706	DK	9.6	Ya	1	2300	BBLR	1	46	Tidak Normal	1	30	Tidak Normal	1	8	Normal	2
190	039704	NS	12	Tidak	2	3500	Normal	2	48	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
191	019870	NK	11.5	Tidak	2	3230	Normal	2	48	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
192	038671	NF	11.6	Tidak	2	3700	Normal	2	51	Normal	2	35	Normal	2	8	Normal	2
193	047709	H	13.2	Tidak	2	3350	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
194	044704	I	9.8	Ya	1	1230	BBLR	1	35	Tidak Normal	1	30	Tidak Normal	1	5	Asfiksia	1
195	044814	H	11	Tidak	2	3340	Normal	2	50	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
196	044504	S	13	Tidak	2	2900	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
197	046507	H	10.8	Ya	1	3350	Normal	2	51	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
198	049217	F	8	Ya	1	3140	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
199	041220	D	10.1	Ya	1	3550	Normal	2	49	Normal	2	35	Normal	2	5	Asfiksia	1
200	050207	I	13	Tidak	2	2900	Normal	2	47	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
201	050712	P	10.8	Ya	1	2700	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
202	050768	L	11.7	Tidak	2	3900	Normal	2	48	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
203	050672	S	13	Tidak	2	2800	Normal	2	46	Tidak Normal	1	30	Tidak Normal	1	8	Normal	2

204	050682	AM	11	Tidak	2	3200	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
205	048404	N	12	Tidak	2	4200	Normal	2	51	Normal	2	35	Normal	2	9	Normal	2
206	045913	NL	8.8	Ya	1	3700	Normal	2	51	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
207	020101	NB	11.8	Tidak	2	3000	Normal	2	50	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
208	052425	S	9.8	Ya	1	2600	Normal	2	47	Tidak Normal	1	30	Tidak Normal	1	8	Normal	2
209	052371	IB	10.8	Ya	1	2350	BBLR	1	45	Tidak Normal	1	30	Tidak Normal	1	6	Asfiksia	1
210	052645	S	10.7	Ya	1	2500	Normal	2	46	Tidak Normal	1	30	Tidak Normal	1	8	Normal	2
211	052744	IW	11.2	Tidak	2	3200	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
212	052724	P	12	Tidak	2	3550	Normal	2	50	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
213	036634	S	13.2	Tidak	2	3800	Normal	2	50	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
214	036713	HJ	11	Tidak	2	2600	Normal	2	46	Tidak Normal	1	30	Tidak Normal	1	8	Normal	2
215	036824	D	8.6	Ya	1	2200	BBLR	1	46	Tidak Normal	1	30	Tidak Normal	1	5	Asfiksia	1
216	024412	H	11.8	Tidak	2	3000	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
217	036603	Y	14.3	Tidak	2	3400	Normal	2	51	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
218	045101	H	11	Tidak	2	2900	Normal	2	47	Tidak Normal	1	31	Tidak Normal	1	8	Normal	2
219	037203	M	12.7	Tidak	2	3500	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
220	037187	N	13.7	Tidak	2	2750	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
221	021644	AD	12.3	Tidak	2	3250	Normal	2	51	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
222	044865	AH	10	Ya	1	3200	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
223	037826	R	12.1	Tidak	2	2900	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
224	044473	IR	11.1	Tidak	2	2900	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
225	020147	A	11.5	Tidak	2	3200	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
226	037913	R	11.1	Tidak	2	3100	Normal	2	51	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
227	037873	K	9.8	Ya	1	2900	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
228	037882	S	12.2	Tidak	2	3300	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
229	044761	L	10.8	Ya	1	2750	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2

230	008072	H	11	Tidak	2	3000	Normal	2	47	Tidak Normal	1	31	Tidak Normal	1	8	Normal	2
231	026150	A	11.5	Tidak	2	3350	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
232	038526	E	11.6	Tidak	2	3400	Normal	2	50	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
233	044571	N	12	Tidak	2	2750	Normal	2	47	Tidak Normal	1	31	Tidak Normal	1	8	Normal	2
234	045907	NM	13.2	Tidak	2	3000	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
235	030678	EW	11.1	Tidak	2	3400	Normal	2	48	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
236	045627	YA	10	Ya	1	2700	Normal	2	49	Normal	2	31	Tidak Normal	1	8	Normal	2
237	038567	GL	13	Tidak	2	3350	Normal	2	48	Normal	2	31	Tidak Normal	1	8	Normal	2
238	034288	H	9.7	Ya	1	3100	Normal	2	50	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
239	045870	R	11.4	Tidak	2	3150	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
240	038758	A	13.6	Tidak	2	2950	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
241	036191	NF	12.5	Tidak	2	3200	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
242	039092	M	13.2	Tidak	2	3700	Normal	2	52	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
243	040961	D	10.8	Ya	1	3200	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
244	034168	SN	11.7	Tidak	2	3250	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
245	047334	S	9.5	Ya	1	3300	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
246	039157	H	12.8	Tidak	2	3400	Normal	2	50	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
247	047226	P	11.9	Tidak	2	3000	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
248	039250	SA	13.6	Tidak	2	3450	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
249	047357	W	9.1	Ya	1	2900	Normal	2	47	Tidak Normal	1	32	Normal	2	8	Normal	2
250	045744	M	10	Ya	1	3200	Normal	2	49	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
251	039748	S	11.3	Tidak	2	3000	Normal	2	49	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
252	042434	A	9.1	Ya	1	3300	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
253	047549	K	11	Tidak	2	2640	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
254	039781	E	13.1	Tidak	2	3400	Normal	2	48	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
255	047738	Y	11.9	Tidak	2	2700	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2

256	039940	RF	12.9	Tidak	2	2550	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
257	039941	S	10.9	Ya	1	1750	BBLR	1	45	Tidak Normal	1	30	Tidak Normal	1	3	Asfiksia	1
258	046039	L	10.7	Ya	1	2400	BBLR	1	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
259	015266	Z	14	Tidak	2	2900	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
260	046502	G	11.3	Tidak	2	3550	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
261	046572	W	13.2	Tidak	2	3700	Normal	2	49	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
262	046567	D	12.4	Tidak	2	3150	Normal	2	49	Normal	2	34	Normal	2	8	Normal	2
263	035638	SR	10	Ya	1	1300	BBLR	1	45	Tidak Normal	1	30	Tidak Normal	1	3	Asfiksia	1
264	046503	Y	9.1	Ya	1	2800	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
265	049140	N	13.1	Tidak	2	2900	Normal	2	48	Normal	2	32	Normal	2	8	Normal	2
266	049092	SA	11.1	Tidak	2	3400	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
267	049142	NC	7.8	Ya	1	2700	Normal	2	47	Tidak Normal	1	33	Normal	2	8	Normal	2
268	049145	H	11.7	Tidak	2	3650	Normal	2	50	Normal	2	33	Normal	2	8	Normal	2
269	049153	R	12.9	Tidak	2	2200	BBLR	1	45	Tidak Normal	1	30	Tidak Normal	1	8	Normal	2

Lampiran 2 : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Aplikasi SPSS 23

1. Kadar Hb Ibu Hamil dengan Berat Badan Bayi

Kadar_Hb * BB_Bayi Crosstabulation

Count		BB_Bayi		Total
		BBLR	Normal	
Kadar_Hb	Anemia	17	88	105
	Tidak Anemia	9	155	164
Total		26	243	269

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	8.398 ^a	1	.004		
Continuity Correction ^b	7.217	1	.007		
Likelihood Ratio	8.170	1	.004		
Fisher's Exact Test				.005	.004
Linear-by-Linear Association	8.367	1	.004		
N of Valid Cases	269				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.15.

b. Computed only for a 2x2 table

Hipotesis :

H0: Tidak ada hubungan signifikan antara Kadar Hb dengan berat badan bayi

H1: Ada hubungan signifikan antara Kadar Hb dengan berat badan bayi

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- Tolak H0 dan terima H1, jika nilai **p-value** lebih kecil dari $\alpha=0.05$. Sebaliknya terima H0 dan tolak H1, jika nilai **p-value** lebih besar dari $\alpha=0.05$.
- Tolak H0 dan terima H1, jika nilai $\chi^2 - \text{hitung}$ lebih besar $\chi^2 - \text{tabel}$. Sebaliknya terima H0 dan tolak H1, jika nilai $\chi^2 - \text{hitung}$ lebih kecil $\chi^2 - \text{tabel}$.

Kesimpulan Hasil Analisis (Chi Square)

Pada tabel diatas menunjukkan hasil analisis uji *Chi-Square*. Dengan taraf nyata/alfa (α) : 0.05 terlihat pada nilai **p-value 0.004<0.05**. Selain itu nilai $\chi^2 - \text{hitung}=8.398 > \chi^2 - \text{tabel}=3.841$. Kedua model pengambilan keputusan menunjukkan H0 ditolak / H1

diterima, sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan ada hubungan signifikan antara Kadar Hb dengan berat badan bayi.

2. Kadar Hb Ibu Hamil dengan Panjang Badan Bayi

Kadar_Hb * PB_Bayi Crosstabulation

Count		PB_Bayi		Total
		Tidak Normal	Normal	
Kadar_Hb	Anemia	41	64	105
	Tidak Anemia	39	125	164
Total		80	189	269

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.141 ^a	1	.008		
Continuity Correction ^b	6.429	1	.011		
Likelihood Ratio	7.048	1	.008		
Fisher's Exact Test				.009	.006
Linear-by-Linear Association	7.114	1	.008		
N of Valid Cases	269				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31.23.

b. Computed only for a 2x2 table

Hipotesis :

H0: Tidak ada hubungan signifikan antara Kadar Hb dengan panjang badan bayi

H1: Ada hubungan signifikan antara Kadar Hb dengan panjang badan bayi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- Tolak H0 dan terima H1, jika nilai **asymp** lebih kecil dari 0.05 tabel. Sebaliknya terima H0 dan tolak H1, jika nilai **asymp** lebih besar dari 0.05.

Kesimpulan Hasil Analisis (Chi Square)

Pada table diatas menunjukkan hasil analisis uji *Chi-Square*. Dengan taraf nyata/alfa : 0.05 terlihat pada nilai **asymp signifikan 0.008<0.05**. Kedua model pengambilan keputusan menunjukkan H0 ditolak / H1 diterima, sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan ada hubungan signifikan antara Kadar Hb dengan panjang badan bayi.

3. Kadar Hb Ibu Hamil dengan Lingkar Kepala Bayi

Kadar_Hb * LK_Bayi Crosstabulation

Count

		LK_Bayi		Total
		Tidak Normal	Normal	
Kadar_Hb	Anemia	16	89	105
	Tidak Anemia	11	153	164
Total		27	242	269

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.159 ^a	1	.023		
Continuity Correction ^b	4.258	1	.039		
Likelihood Ratio	5.014	1	.025		
Fisher's Exact Test				.036	.021
Linear-by-Linear Association	5.140	1	.023		
N of Valid Cases	269				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.54.

b. Computed only for a 2x2 table

Hipotesis :

H0: Tidak ada hubungan signifikan antara Kadar Hb dengan lingkar kepala bayi

H1: Ada hubungan signifikan antara Kadar Hb dengan lingkar kepala bayi

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- Tolak H0 dan terima H1, jika nilai **asymp** lebih kecil dari 0.05 tabel. Sebaliknya terima H0 dan tolak H1, jika nilai **asymp** lebih besar dari 0.05.

Kesimpulan Hasil Analisis (Chi Square)

Pada table diatas menunjukkan hasil analisis uji *Chi-Square*. Dengan taraf nyata/alfa : 0.05 terlihat pada nilai **asymp signifikan 0.023<0.05**. Kedua model pengambilan keputusan menunjukkan H0 ditolak / H1 diterima, sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan ada hubungan signifikan antara Kadar Hb dengan lingkaran kepala bayi.

4. Kadar Hb Ibu Hamil dengan Apgar Score Bayi

Kadar_Hb * Apgar_Score Crosstabulation

Count

		Apgar_Score		Total
		Asfiksia	Normal	
Kadar_Hb	Anemia	9	96	105
	Tidak Anemia	5	159	164
Total		14	255	269

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.957 ^a	1	.047		
Continuity Correction ^b	2.917	1	.088		
Likelihood Ratio	3.840	1	.050		
Fisher's Exact Test				.054	.045
Linear-by-Linear Association	3.943	1	.047		
N of Valid Cases	269				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.46.

b. Computed only for a 2x2 table

Hipotesis :

H0: Tidak ada hubungan signifikan antara Kadar Hb dengan apgar score


H1: Ada hubungan signifikan antara Kadar Hb dengan apgar score

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- Tolak H₀ dan terima H₁, jika nilai **asymp** lebih kecil dari 0.05 tabel. Sebaliknya terima H₀ dan tolak H₁, jika nilai **asymp** lebih besar dari 0.05.

Kesimpulan Hasil Analisis (Chi Square)

Pada tabel diatas menunjukkan hasil analisis uji *Chi-Square*. Dengan taraf nyata/alfa : 0.05 terlihat pada nilai **asymp signifikan 0.047<0.05**. Kedua model pengambilan keputusan menunjukkan H₁ ditolak / H₀ diterima, sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan tidak ada hubungan signifikan antara Kadar Hb dengan apgar score.



Lampiran 3 : Dokumentasi

DOKUMENTASI PENELITIAN





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 4 : Persuratan



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus 1 : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
 Kampus 2 : Jl. H.M. Yasin Ujung No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : E.003 /KEPK/FKIK/XII/2019
 Judul Penelitian : Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Antropometri dan Apgar Score Bayi Baru Lahir di Rumah Sakit dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar

Nama Peneliti : Sri Rahayu

No. Register

U	I	N	A	M	1	9	1	2	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu full board : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (Full Board) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Pemegangan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Makassar, 5 Desember 2019

Ketua



Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
 NIP. 19800701 200604 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 26702/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Direktur RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2677/FKIK/PP.00.9/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SRI RAHAYU
Nomor Pokok : 70600166040
Program Studi : Pend. Dokter
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" HUBUNGAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DENGAN ANTROPOMETRI DAN APGAR SCORE BAYI BARU LAHIR DI RUMAH SAKIT DR. TADJUDDIN CHALID KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 16 Desember 2019 s/d 31 Januari 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 Desember 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Fortinggal



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RS Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

Jalan Paccerakkang No. 67 / Jalan Pajjajayang Daya Makassar 90241
Telepon : (0411) 512902 Faksimile : (0411) 511011

Website : ww.rsk-tadjuddin-chalidmakassar.co.id E-mail : rs.tadjuddinchalid_makassar@yahoo.co.id



23 Januari 2020

Nomor : LB.02.01/XXXIII.2.2.3/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fak. Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar
Di,

T e m p a t

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan nomor: 26702/S.01/PTSP/2019 Tanggal 13 Desember 2019 perihal izin penelitian mahasiswa / peneliti di bawah ini :

N a m a : Sri Rahayu
NIM : 70600166040
Program Studi : Pendidikan Dokter
Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Judul Penelitian : Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Dengan Antropometri Dan Appar Score Bayi Baru Lahir Di RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2018
Waktu Penelitian : 23 Januari s/d 23 Februari 2020

Pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Direktur Utama RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar Cq. Diklit.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar.
4. Menyerahkan satu eksampul copy proposal dan hasil penelitian kepada Direktur Utama RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar Cq. Diklit.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat izin ini kami berikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RS Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

Jalan Paccorakkang No. 67 / Jalan Pajjajayang Daya Makassar 90241
Telepon : (0411) 512902 Faksimile : (0411) 511011

Website : ww-rsk-tadjuddin-chalidmakassar.co.id, E-mail : rs.tadjuddinchalid_makassar@yahoo.co.id



10 Oktober 2019

Nomor : LB.02.01/XXXIII.2.2.3/ 6882/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengambilan Data

Kepada Yth.
Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar
Di,

T e m p a t


Berdasarkan surat Saudara nomor: B.2486/FKIK/PP.00.9/09/2019 tanggal 25 September 2019 perihal izin pengambilan data awal Mahasiswa di bawah ini :

N a m a : Sri Rahayu
NIM : 70600116040
Program Studi : Pendidikan Dokter
Institusi : FKIK UIN Alauddin Makassar
Judul Penelitian : Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Dengan Antropometri dan APGAR Score Bayi Baru Lahir Tahun 2018
Waktu Penelitian : 10 Oktober s/d 10 November 2019

Pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Direktur Utama RS dr. Tadjuddin Chalid Makassar Cq. Diklit.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di RS dr. Tadjuddin Chalid Makassar.
4. Menyerahkan satu eksamplar copy proposal dan hasil penelitian kepada Direktur Utama RS dr. Tadjuddin Chalid Makassar Cq. Diklit.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat izin ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Plh. Direktur Utama,

dr. Andi Tenrisanna Devi Indira, Sp.M(K). MARS.
NIP 197407212002122007



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RS Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

Jalan Paccerrakkang No. 67 / Jalan Pajjalyang Daya Makassar 90241
Telepon : (0411) 512902 Faksimile : (0411) 511011

Website : www.rsk-tadjuddin-chalidmakassar.co.id, E-mail : rs.tadjuddinchalid_makassar@yahoo.co.id



SURAT KETERANGAN


Nomor : LB.02.01/XXXIII.2.2.3/0566 /2020

Berdasarkan surat Direktur Utama RS dr. Tadjuddin Chalid Makassar nomor : LB.02.01/XXXIII.2.2.3/0566/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal izin penelitian, maka yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : Sri Rahayu
NIM : 70600166040
Program Studi : Pendidikan Dokter
Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Judul Penelitian : Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Dengan Antropometri Dan Apgar Score Bayi Baru Lahir Di RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2018

Benar-benar telah melaksanakan penelitian tanggal 23 Januari s/d 23 Februari 2020 di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Tadjuddin Chalid Makassar. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

03 Februari 2020
A.n. Direktur Utama,
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia


Erni Amsi, S.Sos, M.Si.
NIP 196705291994032002

Lampiran 5: Riwayat Hidup Penulis

BIODATA LENGKAP PENELITI UTAMA

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Sri Rahayu
Nama Panggilan : Ayu
NIM : 70600116040
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkep, 27 Juni 1998
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Fakultas : Program Studi Pendidikan Dokter/
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



Nama Orangtua :
Ayah : H. Jamaluddin
Ibu : Hj. Haeriah
Anak Ke : 3 (Tiga)
Alamat : Jl. Matahari, Pangkep
Telepon : 085242412945
Email : rhy27698@gmail.com

Riwayat pendidikan :
SD : SDN 28 Tumampua II Pangkajene
SMP : SMPN 2 Pangkajene
SMA : SMAN 2 Labakkang Boarding School

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Kedokteran Divisi Pengembangan Minat dan Bakat Periode 2017-2018
- Sekretaris II Himpunan Mahasiswa Jurusan Kedokteran Periode 2018-2019
- Sekretaris Umum Tim Bantuan Medis An-Nafis Periode 2019-2020
- Pengurus Al-Zahrawi Medical Research Club Periode 2019-2020

Prestasi yang Pernah Diraih : Finalis Poster Public HOLISTIC di Universitas Haluoleo Kendari 2018