

**HUBUNGAN TINGKAT KEPATUHAN ANC DENGAN ONSET  
PERDARAHAN POSTPARTUM DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN  
GOWA TAHUN 2018**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**YUSRIL IHSANUL MUKARRAM**

NIM: 70600116047

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yusril Ihsanul Mukarram  
NIM : 70600116047  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 12 April 1999  
Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Pelita Tenggara  
Judul : Hubungan Tingkat Kepatahan ANC dengan Onset Perdarahan Postpartum di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2013

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Februari 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR  
Yusril Ihsanul Mukarram  
NIM: 70600116047

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC Dengan Onset Perdarahan Postpartum di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018", yang disusun oleh Yusril Ihsanul Mukarram , NIM: 70600116047, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 20 Februari 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 22 Februari 2020 M  
28 Jumadil Akhir 1441 H

#### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : dr. Darmawansyih, M.Kes (.....)

Pembimbing I : Dr. dr. Najamuddin, M.Kes (.....)

Pembimbing II: dr. Azizah Nurdin, Sp.OG., M.Kes (.....)

Penguji I : Dr. dr. Nadiyah Haruna, M.Kes (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Rahim Yunus, M.A (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Pendidikan Dokter Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw, Nabi sebagai *rahmatan lil'alam* beserta para sahabat dan pengikutnya.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta H. Saharuddin S,Pdi., M,Pd dan Hj. Basmiati S,Pd., M,M. yang tak henti-hentinya memberi doa dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan saudara penulis Latifah Irsyadiyah Sahar serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas doa, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada Bapak/ Ibu:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar,

2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes, Sp.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar,
3. Dr. Hj. Geny Nastity Handayani, S.SI, M.Si, Apt., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar,
4. Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM, MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar,
5. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar,
6. dr. Darmawansyih, M.Kes., selaku Ketua Prodi Program Studi Pendidikan Dokter Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar,
7. dr. Rini Fitriani, M.Kes., selaku Sekertaris Prodi Program Studi Pendidikan Dokter Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar,
8. Dr. dr. Najamuddin, M.Kes selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta selaku penasehat akademik penulis yang selalu memberikan arahan baik terhadap penulis,
9. dr. Azizah Nurdin, Sp.OG, M.Kes selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini,
10. Dr. dr. Nadyah Haruna, M.Kes.,selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini,
11. Prof. Dr. Rahim Yunus M.Ag, selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini,

12. dr. Rista Suryaningsih, M.Kes., selaku pelaksana kegiatan ujian akhir, yang telah banyak berusaha dan bekerja keras dalam membantu terselenggarakannya ujian akhir bagi peneliti,
13. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. serta seluruh staf jurusan Program Studi Pendidikan Dokter yang telah memberikan bantuan kepada penulis,
14. Kepada seluruh pegawai rekam medik RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
15. Kepada sahabat-sahabat NUCLE1, teman seperjuangan angkatan pertama PSPD UINAM yang telah banyak membantu dan menyemangati penelitian ini,
16. Kepada Novia Anggraeni yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang kedokteran dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, 10 Februari 2020

Penulis,

Yusril Ihsanul Mukarram

NIM : 70600116047

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB IPENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Hipotesis.....	4
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Antenatal Care (ANC).....	11
B. Perdarahan Postpartum.....	17
C. Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC Dengan Onset Perdarahan Postpartum di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018.....	24
D. Integrasi Keislaman Terkait Pengaruh ANC Terhadap Kejadian Perdarahan Postpartum.....	26
E. Kerangka Teori.....	30
F. Kerangka Konsep .....	31

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	32
D. Metode Pengumpulan Data .....	33
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	33
G. Alur Penelitian .....	35
H. Etika Penelitian .....	35

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil .....	36
B. Pembahasan.....	44

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	55
B. Pembahasan.....	56

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pelayanan ANC Yang Dilakukan .....	13
Tabel 4.1. Distribusi Sampel Berdasarkan Karakteristik Sampel.....	37
Tabel 4.2. Hubungan Usia Dengan Kepatuhan ANC .....	38
Tabel 4.3. Hubungan Lama Pendidikan Ibu Dengan Kepatuhan ANC .....	39
Tabel 4.4. Hubungan Pekerjaan Ibu Dengan Kepatuhan ANC.....	40
Tabel 4.9. Hubungan Jumlah Paritas Dengan Kepatuhan ANC .....	40
Tabel 4.10. Hubungan Kepatuhan ANC Dengan Kejadian Anemia.....	41
Tabel 4.11. Hubungan Kepatuhan ANC Dengan Kejadian Makrosomia .....	42
Tabel 4.12. Hubungan Kepatuhan ANC Dengan Kejadian Gemelli .....	42
Tabel 4.13. Hubungan Kepatuhan ANC Dengan Onset Perdarahan Postpartum .....	43



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1.Kerangka Teori .....	30
Bagan 2.2.Kerangka Konsep.....	31
Bagan 3.1. Alur Penelitian .....	35



## ABSTRAK

Nama : Yusril Ihsanul Mukarram  
NIM : 70600116047  
Pembimbing I : Dr. dr. Najamuddin, M.Kes  
Pembimbing II : dr. Azizah Nurdin, Sp.OG, M.Kes  
Judul Skripsi : Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC Dengan Onset Perdarahan Postpartum di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018

---

*Antenatal care(ANC)* merupakan suatu pelayanan ibu hamil yang dilakukan selama kehamilan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Perdarahan postpartum merupakan salah satu faktor resiko kematian ibu tertinggi di Indonesia. Ketidakpatuhan ANC merupakan salah satu faktor resiko secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya komplikasi kehamilan salah satunya adalah perdarahan postpartum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat kepatuhan ANC dengan onset perdarahan postpartum. Penelitian ini menggunakan design penelitian yaitu deskriptif retrospektif dengan pendekatan *Cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang mengalami perdarahan postpartum berdasarkan data rekam medik RSUD Syekh Yusuf Tahun 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling* dimana semua populasi pada penelitian ini dijadikan sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 53 sampel atau 64,3% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan mengalami pendarahan postpartum kurang dari 24 jam, terdapat 2 sampel atau 2,44% dari total sampel dengan ANC patuh dan mengalami pendarahan postpartum kurang dari 24 jam, terdapat 11 sampel atau 13,41% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan pendarahan postpartum lebih dari 24 jam, dan terdapat 16 sampel atau 19,51% dari total sampel dengan ANC patuh dan mengalami pendarahan postpartum lebih dari 24 jam. Dari hasil uji Chi-Square, diperoleh *p-value* sebesar 0,000. Karena *p-value* < alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara ANC dengan onset pendarahan postpartum.

**Kata kunci** : *Antenatal Care*, Perdarahan Postpartum

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Salah satu sasaran pokok dari kementerian kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan Indonesia adalah peningkatan atau perbaikan status kesehatan ibu dan anak. Perbaikan kesehatan ibu dan anak ini dapat ditinjau dari data morbiditas dan mortalitas ibu dan anak di Indonesia (Kemenkes RI, 2015).

Menurut WHO, pada tahun 2015 didapatkan angka kematian ibu (AKI) sebanyak 303.000 atau 239/100.000 kelahiran hidup baik selama maupun setelah kehamilan dan persalinan. Angka kejadian ini masih sangat jauh dari target WHO ditahun 2016 – 2030 turun menjadi 70/100.000 kelahiran hidup (WHO 2015). Di Indonesia, pada tahun 2015 didapatkan angka kematian ibu (AKI) sebanyak 305/100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2017).

Di Sulawesi Selatan angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2016 didapatkan sebanyak 153 orang atau 103/100.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 138 dan 149 orang (Dinkes Sulsel, 2017). Di Kabupaten Gowa angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 12 dan 14 orang (Dinkes Gowa, 2017).

Penyebab tingginya angka kematian ibu ini adalah perdarahan, infeksi, tekanan darah tinggi selama kehamilan, partus lama, dan abortus (Kemenkes RI, 2017). Penyebab terbanyak dari kematian ibu ini adalah perdarahan sebesar 30,3 %, dimana jenis perdarahan tersering menyebabkan kematian ibu di dunia adalah perdarahan post partum yaitu sebesar 35 % (Ramadhan, 2019).

Menurut WHO, setiap tahun terjadi perdarahan postpartum sebanyak 14 juta ibu diseluru dunia (WHO, 2015). Di negara berkembang, 60 % dari 100.000 kematian ibu disebabkan oleh perdarahan postpartum (Ramadhan, 2019). Di Indonesia, pada tahun 2011 didapatkan bahwa seluruh kematian ibu hamil di Indonesia 28 % disebabkan oleh perdarahan dan perdarahan terbanyak adalah perdarahan postpartum (Rifdiani, 2017). Di RSKDIA Pertiwi Makassar pada tahun 2013 di dapatkan sebanyak 318 komplikasi persalinan dan 41 diantaranya adalah perdarahan postpartum (Edy, 2015). Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa pada tahun 2018, didapatkan kasus perdarahan postpartum sebanyak 82 kasus. Dengan tingginya angka kejadian perdarahan postpartum maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hubungan tingkat kepatuhan ANC dengan kejadian perdarahan postpartum di RSUD Syekh Yusuf tahun 2018.

Faktor resiko dari terjadinya perdarahan postpartum adalah riwayat perdarahan postpartum, usia, anemia, preeklamsia, dan kunjungan ANC. Kunjungan ANC termasuk faktor resiko karena dengan ibu patuh melakukan kunjungan ANC maka penyakit-penyakit yang diderita ibu bisa ditangani sebelum melahirkan (Puspita, 2017).

Angka kepatuhan melakukan kunjungan ANC lengkap di Indonesia yaitu sebanyak 4 kali selama kehamilan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 2,13 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 85,35 % (Kemenkes RI, 2017). Di Provinsi Sulawesi Selatan angka kepatuhan kunjungan ANC sebesar 79,81 % (Dinkes Sulsel, 2017).

Pelayanan ANC yang lengkap dapat menghindari berbagai faktor resiko yang dapat mengancam keselamatan ibu dan neonatus seperti mencegah anemia saat hamil, mencegah tekanan darah tinggi, mendeteksi letak janin dan

dengan ANC juga dapat menentukan jenis persalinan yang aman. Selain itu, dengan ANC ibu hamil juga akan di berikan edukasi terkait gizi yang baik, pemantauan perkembangan berat badan ibu dan janin, dan juga mengajarkan ibu tentang tanda bahaya kehamilan sehingga ibu hamil bisa lebih siaga dengan keadaan yang terjadi (Kemenkes RI, 2017).

penjelasan diatas dapat dilihat bahwa ada begitu banyak bahaya yang bisa terjadi jika seorang ibu hamil tidak rutin untuk melakukan ANC karena dengan melakukan ANC dapat membuat dirinya terhindar dari masalah atau komplikasi selama kehamilannya. Allah berfirman di dalam QS Ar-Rad/13 : 11 sebagai berikut :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya : “ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Dari ayat di atas jelas bahwa sebagai seorang manusia hendaknya kita selalu melakukan yang terbaik baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Begitupula dengan ibu yang sedang mengandung. Ibu yang sedang mengandung mengalami banyak perubahan fisiologis tubuh yang sewaktu – waktu dapat menimbulkan masalah atau penyakit. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya masalah kehamilandalah dengan selalu berusaha untuk melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) yang rutin. Namun, masih banyak ibu hamil yang tidak patuh dalam melakukan ANC yang pada dasarnya program ini hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kepatuhan ANC ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah karena motivasi ibu yang

kurang untuk melakukan ANC. Allah berfirman dalam QS Az-zumar/39 : 53 sebagai berikut :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

Terjemahannya :

”Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa setiap manusia harus selalu bersemanaat dalam mencari ridha Allah termasuk salah satunya adalah ibu hamil yang seharusnya selalu bersemangat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan agar terhindar dari segala masalah atau komplikasi serta memperoleh kesehatan yang optimal.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara tingkat kepatuhan ANC dengan onset perdarahan postpartum di RSUD Syekh Yusuf tahun 2018 ?

### **C. Hipotesis**

#### 1. Hipotesis Nol (H0)

Tidak ada hubungan antara tingkat kepatuhan ANC dengan onset perdarahan postpartum.

#### 2. Hipotesis Alternatif (Ha)

Ada hubungan antara tingkat kepatuhan ANC dengan onset perdarahan postpartum.

## ***D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

### ***1. Definisi Operasional***

#### **a. Variabel Independen**

##### **1) ANC (*Antenatal Care*)**

a) Definisi : Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang profesional untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil beserta janin yang dikandungnya (Kemenkes RI, 2017)

b) Kriteria objektif :

(1) ANC patuh : 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2 dan 2 kali pada trimester 3

(2) ANC tidak patuh : kurang dari 4 kali kunjungan ANC

#### **b. Variabel Dependen**

##### **1) Perdarahan Postpartum**

a) Definisi : Perdarahan lebih dari 500cc yang terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1000 ml setelah persalinan abdominal (Leveno, 2015).

b) Kriteria Objektif :

(1) Perdarahan postpartum primer : perdarahan yang terjadi < 24 jam setelah persalinan.

(2) Perdarahan postpartum sekunder : perdarahan yang terjadi > 24 jam setelah persalinan.

#### **c. Variabel Penghambat**

##### **1) Lama Pendidikan Formal Ibu Hamil**

a) Definisi : Suatu proses pendidikan yang di tempuh secara terstruktur dan juga berjenjang (Fitriyana, 2015).

b) Kriteria objektif :

(1) Menempuh pendidikan formal  $\leq 9$  tahun

(2) Menempuh pendidikan formal  $> 9$  tahun

## 2) Usia Ibu Hamil

a) Definisi : Usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan) (Santika, 2015).

b) Kriteria objektif :

(1)  $< 20$  tahun

(2)  $20 - 35$  tahun

## 3) Paritas Ibu

a) Definisi : Jumlah anak yang pernah dilahirkan (Pinontoan, 2015).

b) Kriteria objektif :

(1) Primipara : Pernah melahirkan 1 orang anak

(2) Multipara : Pernah melahirkan anak  $2 - 5$  anak

## 4) Pekerjaan Ibu Hamil

a) Definisi : Segala bentuk aktivitas yang dilakukan ibu hamil yang dapat memberikan tambahan penghasilan untuk keluarganya (Susanto, 2016).

b) Kriteria objektif : Bekerja atau tidak bekerja.

## d. Variabel Pendukung

### 1) Anemia

a) Definisi : Suatu keadaan diaman tubuh memiliki jumlah sel darah merah atau eritrosit yang terlalu sedikit atau dibawah kadar normal (Proverawati, 2013).

b) Kriteria objektif :

(1) Anemia :  $< 11 \text{ gr/dl}$

(2) Tidak Anemia :  $\geq 11 \text{ gr/dl}$

## 2) Makrosomia

a) Definisi : Berat badan bayi yang lahir melebihi batas normal tanpa memandang usia gestasi (Budiastuti, 2012).

b) Kriteria objektif :

(1) Makrosomia : berat badan bayi baru lahir  $> 4000$  gram.

(2) Tidak makrosomia : Berat badan bayi baru lahir  $< 4000$

## 3) Gemelli

a) Definisi : Kehamilan dengan jumlah anak 2 atau lebih (Yusrawati, 2014).

b) Kriteria objektif : Jumlah anak  $\geq 2$  anak.

## 2. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini berdasar pada pengambilan data di RSUD Syekh Yusuf. data yang dimaksud adalah data rekam medik ibu hamil yang lengkap. Kemudian setelah itu, dari data yang didapatkan ini akan dihubungkan berdasarkan teori yang ada sebelumnya terkait hubungan tingkat kepatuhan ANC dengan onset perdarahan postpartum di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 2018.

## E. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Puspitasari, dkk. Pada tahun 2017 dengan judul penelitian yaitu “ *Risk Factor of Postpartum Hemorrhage in Bondowoso District, East Java* ”. Perbedaannya, pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Fixed Disease Sampling*. Selain itu penelitian ini memiliki banyak variabel

independen yaitu semua faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum. Sedangkan persamaannya adalah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik observasional. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna Puspitasari, dkk. Yaitu terdapat banyak faktor resiko yang berhubungan dengan terjadinya perdarahan postpartum diantaranya adalah jarak kehamilan, jenis persalinan yang digunakan, frekuensi ANC, dan jumlah skor KSPR.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jihan Wafda Ramadhan dkk. Pada tahun 2019 yang berjudul *Profil Pasien Hemorrhagic Postpartum di RSUP Dr. M. Djamil Padang*. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini mempunyai banyak variabel yang menjadi pengaruh terjadinya perdarahan post partum. Sedangkan untuk persamaannya adalah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif retrospektif dengan pendekatan *Cross Sectional*. Adapun hasil yang didapatkan oleh Jihan Wafda Ramadhan dkk, adalah pasien perdarahan postpartum terbanyak adalah perdarahan postpartum primer, yang ditemukan pada ibu dengan usia 21 – 34 tahun, ibu multipara, kehamilan dan persalinan buruk, kadar Hb < 11 gr%.

#### ***F. Tujuan Penelitian***

##### ***1. Tujuan Umum***

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepatuhan ANC dengan onset perdarahan postpartum di RSUD Syekh Yusuf tahun 2018.

##### ***2. Tujuan khusus***

- a. Untuk mengetahui jumlah ibu hamil yang patuhan melakukan ANC dan tidak, pada semua ibu yang mengalami perdarahan postpartum di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui jumlah kejadian perdarahan postpartum dan jenisnya di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2018.
- c. Untuk melihat distribusi kejadian anemia, gemely, dan makrosomia pada semua kasus perdarahan postpartum.
- d. Mengetahui pengaruh pendidikan formal, usia, jumlah paritas, dan pekerjaan terhadap kepatuhan ANC ibu hamil.
- e. Untuk mengetahui pengaruh kelengkapan ANC terhadap terjadinya anemia, gemely, dan makrosomia yang berhubungan dengan terjadinya perdarahan postpartum.

## **G. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian serta menerapkan ilmu yang telah didapat selama studi khususnya mengenai hubungan tingkat kepatuhan ANC dengan onset perdarahan postpartum di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

### **2. Bagi Pengetahuan**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang menambah pengetahuan dan merupakan salah satu bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang kesehatan ibu dan anak.

### **3. Bagi Instansi**

Sebagai bahan informasi bagi RSUD Syekh Yusuf dan instansi terkait lainnya dalam pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak, serta

dapat menjadi acuan atau informasi untuk menetapkan sebuah kebijakan-kebijakan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Antenatal Care**

##### **1. Definisi**

*Antenatal care (ANC)* adalah suatu pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan juga janin yang dikandung yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional dan telah memiliki surat izin dalam pelaksanaannya (Kemenkes RI, 2017). Tenaga kesehatan yang dapat melakukan asuhan antenatal adalah dokter spesialis obsetri dan ginekologi, dokter umum, bidan dan perawat (Fitrayeni, 2015).

##### **2. Tujuan Antenatal Care**

Antenatal care merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu cara untuk manajemen kehamilan. Adapun tujuan pelaksanaan ANC adalah sebagai berikut (Benson, 2013):

- a. Untuk memastikan sejauh mungkin tentang kehamilan tanpa adanya komplikasi dan persalinan bayi hidup yang sehat.
- b. Untuk menentukan dan memberikan perawatan pada kehamilan beresiko.
- c. Untuk mengetahui metode dan tingkat perawatan setiap ibu hamil yang melakukan ANC.
- d. Untuk membantu dan mengajari serta mengedukasi ibu dalam mempersiapkan persalinan, kelahiran dan membesarkan anak.
- e. Untuk melakukan pengecekan penyakit-penyakit lain pada ibu hamil yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anaknya.
- f. Untuk memberikan pengarahan untuk selalu hidup sehat bagi ibu hamil dan juga keluarganya.

Dari tujuan diatas jelas bahwa dengan melakukan ANC yang rutin sesuai yang disarankan kita akan terhindar dari segala hal atau masalah yang bisa terjadi saat hamil dan juga melahirkan. Sehingga, sepatutnya ibu hamil selalu bersemangat dalam melakukan ANC karena ada banyak kebaikan yang akan didapatkan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu :

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ اِحْرَصْ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُكَ  
وَأَسْتَعِنَ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ وَ اِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ اَنَّيَّ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ  
قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

Terjemahannya:

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpah suatu musibah, maka janganlah engkau katakan :’seandainya aku lakukan demikian dan demikian.’ Akan tetapi hendaklah kamu katakan :’ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah dia kehendaki pasti terjadi.’ Karena perkataan law (seandainya) dapat membuka pintu sayitan (HR. Muslim).”

### 3. Jadwal Pelayanan Antenatal Care

Setiap ibu hamil mempunyai kemungkinan resiko mengalami komplikasi yang dapat mengancam keselamatan dia dan anaknya. Oleh karena itu, WHO menganjurkan untuk setiap ibu hamil rutin memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan paling sedikit 4 kali selama proses kehamilannya (Kemenkes, 2013). Kunjungan minimal 4 kali ini dibagi berdasarkan waktu atau usia kehamilan yaitu (Aisyah, 2017):

- a. Satukali kunjungan dilakukan pada trimester pertama (< 14 minggu).
- b. Satu kali kunjungan dilakukan pada trimester kedua (14 – 28 minggu)
- c. Dua kali kunjungan dilakukan pada trimester ketiga (28 – 36 minggu dan sesudah minggu ke 36).

#### 4. Pelayanan Saat Melakukan ANC

Pelaksanaan ANC pada dasarnya merupakan pelayanan untuk pemeriksaan ibu hamil dari awal kehamilan hingga ibu hamil akan melahirkan. Didalam pelayanan ANC ini ada banyak pemeriksaan yang dilakukan. Dibawah ini adalah tabel terkait hal-hal yang dilakukan petugas kesehatan dalam melakukan ANC (Kemenkes, 2013) :

**Tabel 2.1** Pelayanan ANC Yang Dilakukan.

Pemeriksaan dan Tindakan	Trimester		
	I	II	III
<b>Anamnesis</b>			
riwayat medis lengkap	Ya		
pemeriksaan catatan pada kunjunga sebelumnya		Ya	Ya
keluhan yang mungkin dialami selama ini		Ya	Ya
<b>Pemeriksaan Fisik Umum</b>			
Pemeriksaan fisik umum lengkap	Ya		
Keadaan umum	Ya	Ya	Ya
Tekanan darah	Ya	Ya	Ya
Suhu tubuh	Ya	Ya	Ya
Tinggi badan	Ya		
Berat badan	Ya	Ya	Ya
LILA	Ya		
Gejala anemia (pucat, nadi cepat)	Ya	Ya	Ya
Edema	Ya	Ya	Ya
Tanda bahaya lainnya (sesak, perdarahan, dll)	Ya	Ya	Ya
Pemeriksaan terkait masalah yang ditemukan pada kunjungan sebelumnya		Ya	Ya

<b>Pemeriksaan Fisik Obstetri</b>			
Vulva/perineum	Ya		
Pemeriksaan inspekulo	Ya		
Tinggi fundus		Ya	Ya
Pemeriksaan obstetri dengan manuver leopold		Ya	Ya
Denyut jantung janin		Ya	Ya
<b>Pemeriksaan Penunjang</b>			
Golongan darah ABO dan rhesus	Ya		
Kadar glukosa darah	*	*	*
Kadar Hb	Ya	*	Ya
Kadar protein urine	*	*	*
Tes BTA	*	*	*
Tes HIV	Ya*	*	*
Tes malaria	Ya*	*	*
Tes sifilis	*	*	*
USG	*	*	*
<b>Imunisasi, Suplementasi, dan KIE</b>			
Skrining status TT dan vaksinasi sesuai status	Ya		
Zat besi dan asam folat	Ya	Ya	Ya
Aspirin	*	*	*
Kalsium	*	*	*
KIE (sesuai materi)	Ya	Ya	Ya

Keterangan :

- a. Tabel tersebut merupakan pedoman untuk setiap ibu yang menjalani asuhan antenatal sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

- b. Jika terdapat jadwal kunjungan yang terlewatkan, maka lengkapi tatalaksana yang terlewatkan dahulu pada kunjungan berikutnya.
- c. Lakukan rujukan sesuai indikasi jika menemukan kelainan pada pemeriksaan terutama jika kelainan tersebut tidak membaik pada kunjungan berikutnya.
- d. (Ya) = Rutin, (\*) = Sesuai indikasi, (Ya\*) = Rutin untuk daerah endemis.

##### **5. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan ANC**

Kepatuhan untuk melakukan pemeriksaan rutin saat kehamilan mempunyai beberapa faktor pendorong. Faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat pendidikan ibu hamil

Semakin tinggi tingkat pendidikan dari ibu yang sedang mengandung maka akan mempunyai banyak pengetahuan terkait suatu hal termasuk tentang kesehatan. Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki inilah sehingga ibu hamil tersebut akan rutin dalam memeriksakan kesehatan dan kehamilannya di fasilitas kesehatan (Junga, 2017).

- b. Penghasilan ibu hamil

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mira Kristiani dewi pada tahun 2014 didapatkan bahwa ibu hamil dengan penghasilan yang tinggi memiliki tingkat kepatuhan ANC yang baik dibandingkan dengan ibu hamil dengan penghasilan yang lebih rendah (Dewi, 2014).

- c. Letak geografis

Ibu hamil yang tinggal dipertanian dan dekat dengan pelayanan kesehatan akan lebih sering dan patuh untuk melakukan ANC dibandingkan dengan ibu hamil yang tinggal di pelosok desa. Hal ini

karena fasilitas kesehatan di pelosok desa masih sedikit sehingga butuh waktu dan tenaga serta transportasi untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang layak. Hal inilah yang membuat ibu hamil yang tinggal di pelosok desa tidak melakukan ANC (Rachmawati, 2017).

d. Dukungan keluarga

Seorang suami dalam keadaan istri sedang mengandung harus memberikan perhatian yang khusus dan dukungan berupa dukungan simpatik, empati, cinta, kepercayaan dan juga penghargaan sehingga ibu yang sedang hamil dapat selalu tenang dan bahagia. Dari keadaan tersebut maka ibu hamil akan rajin dan giat dalam melakukan pemeriksaan ANC agar dapat menjaga kesehatan diri dan anaknya (Mulyana, 2017).

e. Jumlah paritas ibu hamil

Seseorang dengan kehamilan pertama akan lebih giat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan saat dia hamil dibandingkan ibu hamil yang sudah memiliki banyak anak. Hal ini terjadi karena ibu dengan kehamilan pertama masih tidak mengetahui tentang hal-hal yang harus dilakukan selama hamil sehingga membuat dia akan datang ke tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan rutin. berbeda dengan ibu dengan jumlah anaknya sudah banyak, karena dia menganggap bahwa sudah tahu tentang segala sesuatu yang harusnya dilakukan selama kehamilannya sehingga cenderung akan lebih malas dalam melakukan pemeriksaan ANC (Junga, 2017).

f. Pekerjaan ibu hamil

Ibu hamil yang memiliki pekerjaan akan lebih berpotensi memiliki ANC yang lengkap dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Pada ibu yang bekerja akan memiliki penghasilan sehingga dapat digunakannya

untuk melakukan pemeriksaan kesehatan saat dia hamil. Selain itu, ibu hamil yang bekerja akan mendapatkan tentang informasi terkait pentingnya ANC sehingga ibu hamil akan lebih giat atau termotivasi untuk melakukan ANC (Dewi, 2014).

g. Usia ibu hamil

Semakin tua atau cukup umur tingkat kematangan seseorang akan lebih dipercaya dibandingkan orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya. Jika kematangan seorang ibu hamil cukup tinggi maka pola pikirnya juga akan lebih dewasa sehingga akan lebih memiliki kesadaran betapa pentingnya pemeriksaan kesehatan saat hamil (Dewi, 2014).

## **B. Perdarahan Postpartum**

### **1. Definisi dan klasifikasi perdarahan postpartum**

Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi pasca kelahiran dengan jumlah darah 500 mL atau lebih pada persalinan normal dan 1000 mL atau lebih pada persalinan abdominal (Leveno, 2015). Untuk klasifikasi dari perdarahan postpartum adalah sebagai berikut (Sundari, 2015):

a. Perdarahan postpartum primer

Perdarahan postpartum primer adalah perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah kala III.

b. Perdarahan postpartum sekunder

Perdarahan postpartum sekunder adalah perdarahan yang terjadi pada masa nifas (puerperium) atau terjadi setelah 24 jam pertama.

### **2. Epidemiologi**

Menurut WHO, setiap tahun terjadi perdarahan postpartum sebanyak 14 juta ibu diseluru dunia (WHO, 2015). Di negara berkembang, 60 % dari

100.000 kematian ibu disebabkan oleh perdarahan postpartum (Ramadhan, 2019). Di Indonesia, pada tahun 2011 didapatkan bahwa seluruh kematian ibu hamil di Indonesia 28 % disebabkan oleh perdarahan dan perdarahan terbanyak adalah perdarahan postpartum (Rifdiani, 2017). Di RSKDIA Pertiwi Makassar pada tahun 2013 di dapatkan sebanyak 318 komplikasi persalinan dan 41 diantaranya adalah perdarahan postpartum (Edy, 2015).

### **3. Etiologi dan Faktor Resiko Perdarahan Postpartum**

Pada kasus perdarahan postpartum memiliki banyak penyebab yaitu atonia uteri, retensio plasenta, laserasi jalan lahir, dan kelainan penyakit darah (Wardani, 2017). Sedangkan untuk faktor predisposisi dari perdarahan postpartum ini adalah jumlah anak, umur kehamilan, peregangan uterus berlebihan (makrosomial, gemeli, dan polihidramnion), jarak persalinan, riwayat seksio sesar, riwayat perdarahan postpartum, kala I dan II yang lama, anemia dan juga ANC (Ramadhan, 2019).

### **4. Patomekanisme perdarahan postpartum**

Terjadinya perdarahan postpartum ini memiliki banyak etiologi sehingga patomekanismenya juga akan berbeda-beda. Berikut ini adalah patomekanisme terjadinya perdarahan postpartum berdasarkan etiologinya.

#### **a. Atonia uteri**

Atonia uteri merupakan suatu keadaan dimana uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah dilakukan pijatan pada fundus uteri. Sehingga, pembuluh darah yang robek atau terbuka pada bekas implantasi plasenta tidak dapat tertutup karena tidak adanya kontraksi miometrium untuk menjepit pembuluh darah tersebut. Akibatnya terjadi perdarahan hebat dan jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan kematian pada ibu (Sundari, 2015).

b. Retensio plasenta dan rest plasenta

Terjadinya retensioplasenta disebabkan karena perlekatan plasenta yang sangat kuat. Ada beberapa jenis retensio plasenta yaitu (Prawirohardjo, 2008) :

- 1) Plasenta adhesiva, yaitu implantasi plasenta yang kuat dari jonjot korion plasenta
- 2) Plasenta akreta, yaitu implantasi ini menembus desidua basalis
- 3) Plasenta inkreta, yaitu implantasi plasenta telah menembus lapisan miometrium
- 4) Plasenta perkreta, yaitu implantasi plasenta menembus sampai ke lapisan perimetrium
- 5) Plasenta inkaserata, yaitu plasenta tertahan di dalam kavum uteri akibat berkontraksinya ostium uteri.

Sedangkan untuk sisa plasenta sendiri, ini sering disebabkan karena tertinggalnya 1 atau beberapa kotiledon setelah plasenta dilahirkan. Kejadian retensio plasenta ataupun sisa plasenta akan mengakibatkan kontraksi uterus tidak akan efektif dan baik sehingga pembuluh darah yang robek atau terbuka tidak akan terjepit atau tertutup secara baik sehingga akan mengakibatkan terjadinya perdarahan (Sundari, 2015).

c. Robekan jalan lahir

Robekan jalan lahir sering terjadi akibat persalinan dengan adanya trauma. Trauma yang terjadi ini bisa disebabkan secara sengaja oleh tenaga kesehatan ataupun terjadi karena trauma yang tidak disengaja. Untuk trauma karena sengaja sering dilakukan apabila terdapat indikasi seperti episiotomi. Ada beberapa robekan yang dapat terjadi bisa berupa laserasi, lecet, luka episiotomi, robekan perineum spontan derajat ringan

sampai totalis (sphinter ani terputus), robekan pada dinding vagina, forniks uteri, serviks, daerah sekitar clitoris, uretra, dan terparah adalah ruptur uteri. Terjadinya ruptur atau robekan jalan lahir yang terjadi pada saat proses persalinan ini biasanya akan terlihat pada saat proses persalinan telah selesai. Dimana, keadaan ini disebut kedalam kategori perdarahan postpartum (Nurhayati, 2019).

d. Gangguan pembekuan darah

Perdarahan postpartum akibat gangguan pembekuan darah biasanya dicurigai menjadi penyebab setelah penyebab lain tidak ditemukan seperti atonia uteri, rest plasenta, retensio plasenta, dan robekan jalan lahir. Pada seseorang dengan gangguan pembekuan darah, didapatkan trombositopenia dan hipofibrinogenemia dimana kedua faktor ini merupakan komponen faktor pembekuan darah sehingga jika terjadi perlukaan maka akan terjadi perdarahan yang lama dan susah untuk berhenti. Sama halnya pada saat orang ini hamil dan melahirkan maka akan terjadi perlukaan baik itu pada jalan lahir maupun uterus sehingga akan mengakibatkan perdarahan postpartum (Prawirohardjo, 2008).

**5. *Diagnosis***

Cara mendiagnosis terjadinya perdarahan postpartum adalah terjadi perdarahan masif dan banyak saat setelah persalinan baik pervaginam maupun operasi. Biasanya bila terjadi kasus perdarahn postpartum akan susah untuk dilakukan anamnesis karena jika kondisi perdarahan postpartum terlambat ditangani maka akan mengakibatkan kematian pada ibu hamil. Sehingga, untuk mengetahui penyebabnya maka biasanya dilakuakn pemeriksaan fisik dan jika didapatkan tinggi fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih dengan kontraksi yang lembek maka penyebab perdarahannya adalah atonia uteri. Jika didapatkan

plasenta belum lahir setelah 30 menit maka penyebab perdarahannya adalah retensio plasenta. Dan jika terdapat kotiledon yang hilang pada plasenta yang telah di lahirkan maka kemungkinan penyebab perdarahannya adalah rest plasenta atau sisa plasenta (Prawirohardjo, 2008). Serta jika plasenta, kotiledon dan kontaksi semua aman maka yang harus diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya robekan jalan lahir yang mengakibatkan terjadinya perdarahan postpartum (Sundari, 2015).

Jika berdasarkan waktu terjadinya perdarahan postpartum maka dapat dilihat jika perdarahan terjadi < 24 jam setelah kelahiran bayi maka didiagnosis sebagai perdarahan postpartum primer. Sedangkan jika perdarahan terjadi > 24 jam setelah bayi lahir maka didiagnosis sebagai perdarahan postpartum sekunder.

#### **6. Penanganan Perdarahan Postpartum**

Penanganan untuk kasus perdarahan postpartum ini dilakukan berdasarkan penyebab terjadinya yaitu sebagai berikut :

a. Atonia uteri

Jika pada saat plasenta telah lahir dan dilakukan masase pada fundus uteri namun tidak terjadi kontraksi dan terus terjadi perdarahan maka hal yang harus dilakukan adalah (Sundari, 2015):

- 1) Bersihkan bekuan darah atau selaput ketuban dari vagina dan lubang serviks, pastikan kandung kemei kosong. Segera lakukan kompresi bimanual interna (KBI) selama 5 menit.
- 2) Jika uterus masih tidak berkontraksi maka ajarkan dan suruh keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksterna (KBE). Kemudian keluarkan tangan perlahan lahan, dan berikan ergometrin

0,2 mg IM atau jika tidak ada bisa diganti dengan misoprostol 600 – 1000 mg perrektal.

- 3) Pasang infus menggunakan jarum berukuran 16 atau 18 kemudian berikan cairan RL sebanyak 500 cc ditambah dengan oksitosin 20 unit yang dihabiskan secepat mungkin kemudian mengulangi KBI.
- 4) Jika uterus masih tidak berkontraksi, segera rujuk dan dampingi ibu sampai ke tempat rujukan dengan memberikan cairan RL sebanyak 500 cc ditambah dengan oksitosin 20 unit dengan kecepatan pemberian 500 cc/jam hingga sampai ketempat tujuan.

b. Rest plasenta dan retensio plasenta

Untuk merangsang pelepasan plasenta setelah bayi lahir adalah dengan merangsang uterus untuk berkontraksi dengan cara masase dan juga pemberian oksitosin kemudian jika plasenta telah terlepas pada tempat perlekatannya, segera lakukan penegangan tali pusat terkendali sampai plasenta dilahirkan (Nora, 2012). Namun, jika plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit setelah bayi lahir maka dikatakan sebagai retensio plasenta. Sedangkan jika plasenta lahir namun masih terdapat bagian plasenta yang tertinggal disebut dengan rest plasenta. Penangana yang dilakukan adalah pertama pastikan penyebab terjadinya perdarahan, kemudian berikan atau lakukan pemberian cairan yaitu RL 500 cc ditambah dengan oksitosin 20 unit, setelah itu berikan antibiotik berupa ampicilin dengan dosis 1 gr IV dilanjutkan dengan 3 x 1 gram peroral dikombinasikan dengan metronidazole 1 gr. Setelah diberikan antibiotik, jika penyebabnya adalah retensio plasenta maka dilakukan manual plasenta dan jika penyebab perdarahannya adalah rest plasenta maka bisa

dikeluarkan dengan cara cunam ovum atau kuret besar (Mastiningsih, 2015).

c. Robekan jalan lahir

Jika setelah kelahiran bayi didapatkan perdarahan yang banyak akan tetapi uterus berkontraksi baik maka kemungkinan penyebabnya adalah robekan jalan lahir. Untuk memastikannya dapat dilakukan inspeksi pada daerah vagina, vulva dan juga serviks dengan menggunakan spekulum dengan tanda sumberperdarahannya adalah berwarna merah segar dan pulsatif sesuai dengan denyut nadi. Semua sumber perdarahan karena robekan di klem, kemudian dilakukan penjahitan sampai tidak terjadi lagi perdarahan (Sundari, 2015).

d. Gangguan bekuan darah

Pada kasus perdarahan postpartum akibat gangguan bekuan darah dapat ditangani dengan melakukan transfusi darah dan produknya seperti plasma beku segar, trombosit, fibrinogen, dan heparinisasi atau pemberian EACA (epsilon amino caproic acid) (Prawirohardjo, 2008).

## 7. Pencegahan

Pada proses persalinan, semua kehamilan mempunyai resiko untuk terjadi komplikasi persalinan, salah satunya adalah perdarahan postpartum. Antisipasi dari hal tersebut dapat dilakukan sebagai berikut (Prawirohardjo, 2008):

- a. Persiapan sebelum hamil untuk memperbaiki keadaan umum dan mengatasi setiap penyakit kronis, anemia, dan lain – lain sehingga pada saat hamil dan persalinan pasien tersebut dalam keadaan optimal.
- b. Mengenali sejak awal faktor – faktor yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum sehingga dapat dicegah.

- c. Persalinan harus dilaksanakan dalam waktu yang normal dan mencegah terjadinya partus lama.
- d. Jika terdapat atau memiliki resiko tinggi selama hamil maka harus melahirkan di fasilitas kesehatan yang lengkap.
- e. Untuk seorang tenaga kesehatan yang baik harus menguasai langkah-langkah pertolongan pertama pada kejadian perdarahan postpartum.

### ***C. Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC Dengan Onset Perdarahan Postpartum***

Antenatal care (ANC) merupakan suatu program pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak. Dalam melakukan ANC ibu hamil diharuskan datang minimal sebanyak 4 kali dalam masa kehamilannya. Pada proses pemeriksaan ANC, ada banyak yang dilakukan pada ibu hamil seperti melakukan anamnesis kepada ibu untuk menggali keluhan apa yang dialami saat hamil. Selain itu, riwayat medis dari ibu hamil sebelum hamil juga diperiksa. Selain pemeriksaan dengan anamnesis juga dilakukan pemeriksaan fisik terkait tinggi badan, LILA, IMT, berat badan untuk mengetahui status gizi dari ibu hamil. Selain itu, pemeriksaan tekanan darah dan juga anemia serta keluhan yang beresiko lainnya dilakukan pada saat melakukan ANC. Untuk pemeriksaan penunjang sendiri dilakukan pemeriksaan gula darah, golongan darah, kadar Hb, HIV, malaria, sifilis, dan juga USG. Selain pemeriksaan di atas juga dilakukan edukasi kepada ibu hamil terkait hal-hal penting yang harus diketahui selama kehamilan dan persalinan. Dengan dilakukannya semua pemeriksaan di atas maka resiko terjadinya komplikasi dalam kehamilan dan persalinan akan kecil. Namun jika ANC ibu hamil tidak lengkap (kurang dari 4 kali) atau tidak sama sekali maka kemungkinan terjadinya resiko kehamilan dan persalinan akan tinggi (Kemenkes RI, 2013).

Perdarahan postpartum dapat dibagi menjadi 2 jenis jika dilihat dari waktu terjadinya yaitu perdarahan postpartum primer dan perdarahan postpartum sekunder. Untuk perdarahan postpartum primer paling sering disebabkan oleh atoneia uteri, retensio plasenta, robekan jalan lahir, dan juga kelainan pembekuan darah. Untuk perdarahan postpartum sekunder paling sering disebabkan oleh rest plasenta (Satriyandari, 2017).

Salah satu komplikasi persalinan yang paling sering terjadi adalah perdarahan postpartum. Hubungan kepatuhan ANC dengan terjadinya perdarahan postpartum adalah pada saat seorang ibu hamil memiliki ANC tidak lengkap maka akan banyak masalah masalah yang mungkin timbul seperti anemia karena tidak adanya konsumsi tablet Fe yang didapat setiap kunjungan ANC. Apabila terjadi anemia maka O<sub>2</sub> yang dihantarkan dari paru – paru ke seluruh tubuh melalui jantung juga akan berkurang. Karena hampir semua O<sub>2</sub> yang berdifusi masuk kedalam pembuluh darah paru berikatan dengan Hb untuk di angkut atau ditrasport (Sherwood, 2014). Selain karena anemia, atonia juga bisa disebabkan oleh adanya kehamilan kembar (gemeli) atau faktor lain yang bisa menyebabkan uterus terlalu meregang. Keadaan ini jika terus terjadi hingga proses persalinan, maka pada saat setelah bayi dan plasenta lahir maka akan terjadi kondisi atonia uterus karena kekurangan energi oleh akibat kurangnya O<sub>2</sub> yang sampai ke uterus. Atonia atau lemahnya kontraksi ini akan mengakibatkan terjadinya perdarahan akibat dari tidak terjepitnya pembuluh darah pembuluh darah yang terputus atau robek saat plasenta terlepas (Sundari, 2015).

Selain atonia uterus, bisa juga terjadi rest ataupun retensio plasenta karena tidak teraturnya ibu hamil melakukan ANC Diketahui bahwa pada saat melakukan ANC, terdapat pemeriksaan USG (Kemenkes RI, 2013). sehingga dari pemeriksaan ini seorang dokter dapat melihat bagaimana letak plasenta dari ibu

hamil sehingga jika perlekatan plasentanya terlalu dalam maka dokter dapat mempersiapkan kemungkinan pertolongan untuk keadaan tersebut (Prawirohardjo, 2008).

Selain itu, untuk perdarahan postpartum akibat dari kurangnya atau tidak lengkapnya ANC adalah karena adanya robekan jalan lahir. Hal ini sering disebabkan oleh bayi yang besar sehingga dapat merobek jalan lahir. Namun, dengan melakukan ANC maka dapat mempersiapkan lebih awal cara dan tempat persalinan agar terhindar dari komplikasi tersebut (Prawirohardjo, 2008). Perdarahan post partum juga bisa disebabkan karena tidak tertanganinya hipertensi selama masa kehamilan dimana sebenarnya hal ini dapat ditangani jika ibu hamil rutin melakukan ANC. Preeklamsia akan mengakibatkan vasospasme siklik yang lebih lanjut akan menurunkan perfusi organ dengan sel - sel darah merah. Keadaan ini akan mengakibatkan terjadinya hipofibrinogen sehingga jika terjadi perdarahan saat persalinan akan susah untuk dihentikan karena kurangnya faktor pembekuan darah (Manik, 2017).

#### **D. Integrasi Keislaman Terkait Pengaruh ANC Terhadap Kejadian Perdarahan Postpartum**

Didalam ajaran agama Islam pegangan atau tempat acuan dalam melakukan suatu hal yaitu Al Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Sehingga, seorang muslim seharusnya dalam segala hal harus beracuh kepada Al Quran dan Hadits Rasulullah. Termasuk diantaranya adalah seorang dokter dalam melakukan pemeriksaan pasien. Seorang dokter laki – laki dalam melakukan pemeriksaan kepada pasien terkhusus pada pasien perempuan maka harus senantiasa berhati hati dan sesuai dengan hukum syariat islam. Salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh seorang dokter laki-laki adalah pemeriksaan ANC. Pada pemeriksaan ini seorang dokter melakukan pemeriksaan berupa anamnesis,

pemeriksaan fisik dan juga penunjang. Sehingga, seorang ibu hamil harus membuka auratnya guna untuk memeriksakan kehamilannya. Dalam syariat islam, menurut ijmak ulama jelas bahwa seorang laki-laki tidak boleh (haram) melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya (Hakim, 2008). Hal ini dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nur/24 : 31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya :

“Katakanlah kepada wanita yang beriman :’ hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (bisa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Dari ayat diatas mayoritas ulama mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh (haram) melihat aurat dari seorang perempuan begitupla sebaliknya termasuk di dalam dunia medis terkait dokter dengan pasien. Namun, dalam sebuah kondisi tertentu yang diluar batas kemampuan manusia atau pada tingkat kesulitan yang tinggi atau karena ssebuah kebutuhan, Allah memberi keringanan atau biasa disebut dengan *rukhsah* (keringanan), dan *rukhsah* ini dapat dapat di terapkan bila terjapat kondisi kondidi tertentu yaitu karena dibutuhkan atau kebutuhan (*Al hajah*) dan karena mendesak (*dharurah*). Untuk seorang dokter

dalam melihat aurat seorang lawan jenis pada dasarnya dibolehkan karena sebab kebutuhan (*hajah*). Ketentuan ini diterangkan didalam kitab *Hasyiyah al-Bajury* antara lain sebagai berikut :

فيجوز نظر الطبيب من الاجنبية الى المواضع التي يحتاج اليها في المداوة حتى مداوة الفرج

ويكون ذلك بحضور محرم اوسيد وأن لاتكون هناك امرأة تعاجلها

Artinya: “Hukumnya boleh, melihatnya dokter ke perempuan bukan mahram pada anggota badan yang dibutuhkan untuk pengobatan, bahkan di area farji. Namun demikian itu (harus) disertai kehadiran mahram, suami, atau sayid, [dengan catatan] jika tidak dijumpai adanya perempuan yang bisa mengobatinya.”

Selain pernyataan diatas, didalam al Quran juga dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah swt selalu memberikan keringanan atau kelonggaran kepada setiap hambanya. Ini sesuai dengan firman Allah swt di dalam Al Quran surah an Nisa/4: 28 sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya : “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”.

Seorang dokter sudah seharusnya selalu bersedia dan siap dalam membantu dalam penyembuhan pasien baik itu laki-laki maupun perempuan karena sesuai dengan penjelasan diatas hukum memeriksa seorang pasien lawan jenis adalah boleh karena adanya *Rukhsah* yang muncul karena adanya kebutuhan (*Hajah*). Namun harus diperhatakian bahwa dalam memeriksa pasien lawan jenis harus didampingi oleh seorang perawat atau mahram dari pasien. Hal ini ditegaskan didalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ra, Rasulullah SAW :

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

Terjemahannya :

“ Janganlah ber-khalwat laki-laki dan perempuan kecuali bersama mahramnya.” (H.R. Bukhari).


Dari hadis diatas, imam Nawawi mengatakan bahwa berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan juga bukan pasangan suami istri tanpa

ada orang ketiga itu diharamkan menurut ijma ulama. Sehingga sepatutnya seorang dokter harus didampingi oleh mahram pasien wanita yang diperiksanya namun jika tidak ada maka bisa pula didampingi oleh perawat yang sedang berjaga. (Lukman, 2008).




### E. Kerangka Teori

Bagan 2.1 Kerangka Teori



### F. Kerangka Konsep

Bagan 2.2 Kerangka Konsep



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini berlandaskan pada pengujian teori-teori yang telah ada dengan melakukan pengukuran variable-variabel dengan angka, kemudian melakukan analisis data dengan prosedur analitik.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, penelitian ini akan berlangsung selama satu bulan yakni di bulan Oktober 2019.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif retrospektif dengan pendekatan *cross sectional*. Dalam pendekatan *cross sectional*, pengukuran variable dependen yakni (perdarahan postpartum) dan variable independen yakni (tingkat kepatuhan ANC) dilakukan observasi simultan pada waktu yang sama dan dilakukan hanya satu kali.

#### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **1. Populasi**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin yang mengalami perdarahan postpartum di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada 01 Januari hingga 31 Desember 2018 sebanyak 82orang.

## **2. Sampel**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin yang mengalami perdarahan postpartum di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada 01 Januari hingga 31 Desember 2018 sebanyak 82 orang.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data sebagai kebutuhan utama dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengajuan surat permohonan kepada pihak RSUD Syekh Yusuf Gowa, kemudian setelah mendapatkan izin dan surat pengantar ke bagian rekam medik, ruang persalinan dan ruang pemeriksaan ANC. Setelah itu barulah dilakukan pengamatan dan pencatatan data ke dalam tabel observasi berdasarkan data dari rekam medik.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel- tabel tertentu untuk mencatat data yang dibutuhkan dari rekam medik.

### **F. Pengolahan dan Analisis Data**

#### **1. Pengolahan data**

Tahap pengolahan data yaitu :

##### **a. Pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data dari rekam medik.

##### **b. Pengeditan Data**

Pengeditan data dilakukan dengan mempertimbangkan, memilih dan memasukkan data yang penting dan benar-benar diperlukan.

##### **c. Pengkodean data**

Setelah melalui proses editing, data yang telah terkumpul dan dikoreksi ketepatan dan kelengkapannya kemudian diberi kode tertentu oleh peneliti secara manual.

d. Pemasukan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan SPSS.

e. Pembersihan data

Merupakan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan apakah ada kesalahan atau tidak.


f. Penyajian Data

Data yang telah diolah disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

**2. Analisis data**

Analisis data bivariat yang dilakukan untuk menganalisis hubungan dua variable. Kemudian, untuk pengujian hipotesis digunakan metode uji *Chi Square*. Dikatakan memiliki hubungan jika tingkat signifikansi  $(p) < 0,05$ .

### G. Alur Penelitian



Bagan 3.1 Alur Penelitian

### H. Etika Penelitian

Hal-hal yang terkait dengan etika penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Me
2. nyertakan surat pengajuan untuk pengambilan data yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian.
3. Menjaga kerahasiaan identitas pasien yang digunakan sebagai sampel sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang dilakukan.
4. Menyampaikan tujuan penelitian dengan ramah kepada subjek penelitian.
5. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengumpulan data.

6. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait sesuai dengan manfaat penelitian yang telah disebutkan sebelumnya.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil***

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di RSUD Syekh Yusuf Gowa untuk data pada periode Januari – Desember 2018, didapatkan jumlah persalinan dengan kejadian perdarahan postpartum yaitu sebanyak 82 kasus. Semua kasus perdarahan ini dijadikan sampel penelitian karena pada penelitian ini teknik pengambilan sampelnya adalah *total sampling* yaitu semua populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Selain itu, pada semua sampel penelitian memiliki data rekam medik yang lengkap, sehingga data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini dapat diperoleh.

Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS Statistik 23 yang sebelumnya data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi excel dan diuji sesuai dengan tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel lengkap. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

## 1. Analisis Univariat

### a. Karakteristik sampel

**Tabel 4.1** Distribusi sampel berdasarkan karakteristik sampel

Karakteristik	<i>N</i>	%
Usia Ibu		
< 20 Tahun	8	9,8
20 – 35 Tahun	74	90,2
Lama Pendidikan Ibu		
≤ 9 Tahun	14	17,1
> 9 Tahun	68	82,9
Pekerjaan Ibu		
Bekerja	35	57,32
Tidak Bekerja	47	42,68
Jumlah Paritas Ibu		
Primipara	35	42,68
Multipara	47	57,32
Anemia Saat Hamil		
Anemia	57	69,51
Tidak Anemia	25	30,49
Makrosomia		
Makrosomia	20	24,39
Tidak Makrosomia	62	75,61
Gemelli		
Gemelli	15	18,29
Tidak Gemelli	67	81,71
ANC ( <i>Antenatal Care</i> )		
Patuh	18	21,95
Tidak Patuh	64	78,05
Perdarahan Postpartum		
< 24 jam	55	67,07
> 24 jam	27	32,93

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa kebanyakan sampel pada penelitian ini mempunyai usia 20 – 35 Tahun, memiliki

riwayat pendidikan terakhir yaitu pendidikan dasar, tidak mempunyai pekerjaan, dan telah memiliki riwayat melahirkan sebelumnya (multipara).

Selain itu, pada tabel 4. 1 diatas juga dapat dilihat bahwa kebanyakan sampel memiliki riwayat anemia selama kehamilannya, serta mayoritas sampel mempunyai riwayat ANC yang tidak patuh.

## 2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara variabel bebas yaitu ANC dengan variabel terikat yaitu pendarahan Postpartum. Selain itu, pada penelitian ini juga ingin melihat hubungan pendidikan terakhir, usia, pekerjaan, dan jumlah paritas terhadap kepatuhan ANC. Dan juga pada penelitian ini akan melihat hubungan ANC terhadap kejadian Anemia, gemelli, dan juga makrosomia. Analisis statistik yang digunakan analisis crosstab dengan uji Chi-Square. Hasil analisisnya sebagai berikut :

### a. Hubungan Usia Dengan Kepatuhan ANC

Tabel 4.2 Hubungan usia dengan kepatuhan ANC

Usia (Tahun)	ANC				Total		P- Value
	Tidak Patuh		Patuh		n	%	
	n	%	n	%			
< 20 tahun	4	4.9	4	4.9	8	9.8	0.066
20-35 tahun	60	73.2	14	17.1	74	90.2	
Total	64	78.0	18	22.0	82	100.0	

Sumber : Data Diolah, 2020

Pada Tabel 4.2 di atas, ditunjukkan bahwa terdapat 4 sampel (4.9%) yang berusia kurang dari 20 tahun memiliki status ANC tidak patuh , selain itu terdapat 60 sampel (73.2%) yang memiliki usia antara 20 hingga 35 tahun memiliki status ANC tidak patuh. Sedangkan, terdapat 4

sampel (4.9%) sampel yang berusia kurang dari 20 tahun memiliki status ANC patuh, selain itu terdapat 14 sampel (17.1%) dengan usia 20 hingga 35 tahun memiliki status ANC patuh.

Berdasarkan hasil uji Chi-Square, diperoleh *p-value* sebesar 0,066. Karena *p-value* > alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara usia dengan ANC.

**b. Hubungan Lama Pendidikan Ibu Dengan Kepatuhan ANC**

**Tabel 4.3** Hubungan pendidikan ibu dengan kepatuhan ANC

Lama Pendidikan ibu	ANC				Total		P-Value
	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Patuh	n	%	
	n	%	n	%			
≤ 9 tahun	13	15.9	1	1.2	14	17.1	0.285
> 9 tahun	51	62.2	17	20.7	68	82.9	
Total	64	78.0	18	22.0	82	100.0	

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, diperoleh hasil bahwa terdapat 13 sampel (15.9%) yang memiliki latar belakang pendidikan kurang atau sama dengan 9 tahun dengan status ANC tidak lengkap, selain itu terdapat 1 sampel (1.2%) sampel yang memiliki latar belakang pendidikan kurang atau sama dengan 9 tahun dengan status ANC lengkap. Sedangkan, terdapat 51 sampel (62.2%) sampel yang memiliki latar belakang pendidikan lebih dari 9 tahun dengan status ANC tidak lengkap, selain itu terdapat 17 sampel (20.7%) memiliki latar belakang pendidikan lebih dari 9 tahun status ANC lengkap.

Berdasarkan hasil uji Chi-Square, diperoleh *p-value* sebesar 0,285. Karena *p-value* > alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara lamapendidikan ibu dengan ANC.

*c. Hubungan Pekerjaan Ibu Dengan Kepatuhan ANC*

**Tabel 4.4** Hubungan pekerjaan ibu dengan kepatuhan ANC

Pekerjaan	ANC				Total		P-Value
	Tidak Patuh		Patuh		n	%	
	n	%	n	%			
Tidak Bekerja	45	54,88	2	2,44	47	57,32	0,000
Bekerja	19	23,17	16	19,51	35	42,68	
Total	64	78,05	18	21,95	82	100,00	

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, diketahui terdapat 45 sampel atau 54,88% dari total sampel yang tidak bekerja dan memiliki riwayat ANC tidak patuh, terdapat 19 sampel atau 23,17% dari total sampel yang bekerja dan memiliki riwayat ANC tidak patuh, terdapat 2 sampel atau 2,44% dari total sampel yang tidak bekerja dan memiliki riwayat ANC patuh, dan terdapat 16 sampel atau 19,51% dari total sampel yang bekerja dan memiliki riwayat ANC patuh.

Dari hasil uji Chi-Square, diperoleh *p-value* sebesar 0,000. Karena  $p\text{-value} < \alpha (0,05)$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pekerjaan dan ANC.

*d. Hubungan Paritas Ibu Dengan Kepatuhan ANC*

**Tabel 4.5** Hubungan paritas dengan kepatuhan ANC

Paritas	ANC				Total		P-Value
	Tidak Patuh		Patuh		n	%	
	n	%	n	%			
Primipara	24	29,27	11	13,41	35	42,68	0,129
Multipara	40	48,78	7	8,54	47	57,32	
Total	64	78,05	18	21,95	82	100,00	

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diketahui terdapat 24 sampel atau 29,27% dari total sampel dengan paritas primipara dan memiliki riwayat ANC tidak patuh, terdapat 40 sampel atau 48,78% dari total sampel

dengan paritas multipara dan memiliki riwayat ANC tidak lengkap, terdapat 11 sampel atau 13,41% dari total sampel dengan paritas primipara dan memiliki riwayat ANC lengkap, dan terdapat 7 sampel atau 8,54% dari total sampel dengan paritas multipara dan memiliki riwayat ANC lengkap. Dari hasil uji Chi-Square, diperoleh *p-value* sebesar 0,129. Karena *p-value* > alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antarparitas dan ANC.

**e. Hubungan Kepatuhan ANC dengan Kejadian Anemia**

**Tabel 4.6** Hubungan kepatuhan ANC dengan kejadian Anemia

ANC	Anemia Saat Hamil				Total		P-Value
	Anemia		Tidak Anemia		n	%	
	n	%	n	%			
Tidak Patuh	50	60,98	14	17,07	64	78,05	0,004
Patuh	7	8,54	11	13,41	18	21,95	
Total	57	69,51	25	30,49	82	100,00	

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, diketahui terdapat 50 sampel atau 60,98% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan mengalami anemia saat hamil, terdapat 7 sampel atau 8,54% dari total sampel dengan ANC patuh dan mengalami anemia saat hamil, terdapat 14 sampel atau 17,07% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan tidak mengalami anemia saat hamil, dan terdapat 11 sampel atau 13,41% dari total sampel dengan ANC patuh dan tidak mengalami anemia saat hamil. Dari hasil uji Chi-Square, diperoleh *p-value* sebesar 0,004. Karena *p-value* < alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara ANC dan anemia saat hamil.

*f. Hubungan Kepatuhan ANC Dengan Kejadian Makrosomia*

**Tabel 4.7** Hubungan kepatuhan ANC dengan kejadian Makrosomia

ANC	Makrosomia				Total		P-Value
	Tidak		Ya		n	%	
	n	%	n	%			
Tidak Patuh	49	59,76	15	18,29	64	78,05	0,759
Patuh	13	15,85	5	6,10	18	21,95	
Total	62	75,61	20	24,39	82	100,00	

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, diketahui terdapat 49 sampel atau 59,76% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan tidak melahirkan anak makrosomia, terdapat 13 sampel atau 15,85% dari total sampel dengan ANC patuh dan tidak melahirkan anak makrosomia, terdapat 15 sampel atau 18,29% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan melahirkan anak makrosomia, dan terdapat 5 sampel atau 6,10% dari total sampel dengan ANC patuh dan melahirkan anak makrosomia. Dari hasil uji Chi-Square, diperoleh *p-value* sebesar 0,759. Karena *p-value* > alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara ANC dan macrosomia.

*g. Hubungan Kepatuhan ANC Dengan Kejadian Gemelli*

**Tabel 4.8** Hubungan kepatuhan ANC dengan kejadian Gemelli

ANC	Gemelli				Total		P-Value
	Tidak		Gemelli		n	%	
	n	%	n	%			
Tidak Patuh	55	67,07	9	10,98	64	78,05	0,085
Patuh	12	14,63	6	7,32	18	21,95	
Total	67	81,71	15	18,29	82	100,00	

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, diketahui terdapat 55 sampel atau 67,07% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan tidak mengalamigemelli, terdapat 12 sampel atau 14,63% dari total sampel

dengan ANC patuh dan tidak mengalami gemelli, terdapat 9 sampel atau 10,98% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan mengalami gemelli, dan terdapat 6 sampel atau 7,32% dari total sampel dengan ANC patuh dan mengalami gemelli. Dari hasil uji Chi-Square, diperoleh *p-value* sebesar 0,085. Karena *p-value* > alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara ANC dan gemelli.

#### ***h. Hubungan Kepatuhan ANC Dengan Onset Perdarahan Postpartum***

**Tabel 4.9** Hubungan tingkat kepatuhan ANC dengan onset perdarahan postpartum.

ANC	Perdarahan Postpartum				Total		<i>p-value</i>
	< 24 Jam		> 24 Jam		<i>n</i>	%	
	<i>n</i>	%	<i>N</i>	%			
Tidak Patuh	53	64.63	11	13.41	64	78.05	0.000
Patuh	2	2.44	16	19.51	18	21.95	
Total	55	67.07	27	32.93	82	100.00	

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, diketahui terdapat 53 sampel atau 64,3% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan mengalami pendarahan postpartum kurang dari 24 jam, terdapat 2 sampel atau 2,44% dari total sampel dengan ANC patuh dan mengalami pendarahan postpartum kurang dari 24 jam, terdapat 11 sampel atau 13,41% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan pendarahan postpartum lebih dari 24 jam, dan terdapat 16 sampel atau 19,51% dari total sampel dengan ANC patuh dan mengalami pendarahan postpartum lebih dari 24 jam. Dari hasil uji Chi-Square, diperoleh *p-value* sebesar 0,000. Karena *p-value* < alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara ANC dengan onset pendarahan postpartum.

## **B. Pembahasan**

Hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa didapatkan 82 ibu mengalami perdarahan postpartum dari 3494 ibu yang melahirkan selama periode Januari – Desember 2018. Semua kasus perdarahan yang terjadi pada periode tersebut dijadikan sebagai sampel penelitian dengan mengambil beberapa data yang dibutuhkan yaitu data ibu terkait riwayat ANC, pendidikan terakhir, usia, status pekerjaan, jumlah paritas, status anemia, gemely, riwayat SC, dan juga Makrosomia.

### **1. Hubungan Usia Ibu Hamil Dengan Kepatuhan ANC**

Pada Tabel 4.2 di atas, ditunjukkan bahwa terdapat 4 sampel yang berusia kurang dari 20 tahun memiliki status ANC tidak patuh, selain itu terdapat 60 sampel yang memiliki usia antara 20 hingga 30 tahun memiliki status ANC tidak patuh. Sedangkan, terdapat 4 sampel yang berusia kurang dari 20 tahun memiliki status ANC patuh, selain itu terdapat 14 sampel dengan usia 20 hingga 35 tahun memiliki status ANC patuh. Berdasarkan hasil uji Chi-Square, diperoleh *p-value* sebesar 0,066. Karena *p-value* > alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara usia dengan kepatuhan ANC.

hasil pada penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mira pada tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ada hubungan tentang usia ibu hamil dengan Kepatuhan ANC. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Indah Rachmawati pada tahun 2017 di mana hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat hubungan antara usia ibu hamil dengan kepatuhan ANC.

Kelengkapan seorang ibu dalam melakukan pemeriksaan pada dasarnya dapat disebabkan oleh usia. Semakin tua usia seorang ibu maka akan

semakin dewasa pula pemikirannya sehingga dengan kedewasaan pemikiran membuat dia lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan termasuk adalah untuk selalu memeriksakan kesehatan kandungannya. Dengan demikian, ibu dengan usia yang lebih dewasa akan lebih berpotensi memiliki ANC yang patuh dibandingkan usia yang lebih mudah (Rachmawati, 2017).

Tidak adanya hubungan antara usia dengan kepatuhan ANC ini bisa saja disebabkan karena jumlah sampel yang kurang. Namun, di beberapa kondisi seorang ibu < 20 tahun memiliki tingkat kepatuhan ANC yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu dengan usia reproduksi yang lebih dewasa. Hal ini disebabkan karena usia < 20 tahun ibu hamil biasanya lebih banyak mengalami keluhan dan masalah disebabkan oleh keadaan atau kondisi reproduksi yang belum siap dan matang untuk menerima kehamilan. Kondisi yang seperti ini biasanya akan mendapatkan banyak keluhan dan masalah saat hamil, hal ini yang membuat ibu untuk selalu datang memeriksakan kehamilannya pada layanan kesehatan (Ulaa, 2017).

## **2. Hubungan Lama Pendidikan Ibu Dengan Kepatuhan ANC**

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, diperoleh hasil bahwa terdapat 13 sampel yang memiliki latar belakang pendidikan kurang atau sama dengan 9 tahun dengan status ANC tidak lengkap, selain itu terdapat 1 sampel sampel yang memiliki latar belakang pendidikan kurang atau sama dengan 9 tahun dengan status ANC lengkap. Sedangkan, terdapat 51 sampel sampel yang memiliki latar belakang pendidikan lebih dari 9 tahun dengan status ANC tidak lengkap, selain itu terdapat 17 sampel memiliki latar belakang pendidikan lebih dari 9 tahun status ANC lengkap. Berdasarkan hasil uji Chi-Square, diperoleh *p-value* sebesar 0,285. Karena *p-value* > alpha (0,05), maka

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara lamapendidikan ibu dengan ANC.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mohdari, pada tahun 2014 di Puskesmas Pekauman Banjarmasin dimana di dalam penelitian yang dilakukan, didapatkan kebanyakan sampel memiliki riwayat pendidikan SMP yaitu sebanyak 18 orang. Dan setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil  $> 0,05$  yang menandakan tidak adanya hubungan antara pendidikan ibu dengan kepatuhan ANC.

Adapun penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Manisti Ratri Junga pada tahun 2017 didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara pendidikan terakhir ibu dengan keteraturan ANC (Junga, 2017). Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriyeni pada tahun 2015 di dapatkan hubungan yang sangat bermakna antara tingkat pendidikan dengan kelengkapan ANC (Fitriyeni, 2015).

Tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi akan lebih mempunyai pengetahuan dan kesadaran yang luas terkait segala hal termasuk kesehatan sehingga seorang ibu hamil dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih bersemangat dan antusias dibandingkan ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Yang termasuk didalam pendidikan formal adalah riwayat pendidikan yang dijalani seorang ibu secara terstruktur dan terorganisir. Pendidikan  $\leq 9$  tahun termasuk diantaranya adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sedangkan untuk pendidikan  $> 9$  tahun adalah SMA dan bangku perkuliahan. (Fitriyeni, 2015).

### ***3. Hubungan Pekerjaan Ibu Dengan Kepatuhan ANC***

Pada tabel 4.4 terdapat 45 sampel dari total sampel yang tidak bekerja dan memiliki riwayat ANC tidak patuh, terdapat 19 sampel dari total sampel

yang bekerja dan memiliki riwayat ANC tidak patuh, terdapat 2 sampel dari total sampel yang tidak bekerja dan memiliki riwayat ANC patuh, dan terdapat 16 sampel dari total sampel yang bekerja dan memiliki riwayat ANC patuh.

Setelah dilakukan pengujian menggunakan metode *Chi Square*, didapatkan hasil  $< 0,05$  yang berarti terdapat hubungan antara pekerjaan ibu hamil dengan kepatuhan ANC. Dari semua sampel dengan ANC tidak patuh didapatkan sebanyak 64 sampel dan 45 diantaranya adalah sample dengan status pekerjaan tidak bekerja sehingga bisa di simpulkan bahwa ibu hamil yang memiliki pekerjaan akan lebih patuh melakukan ANC di bandingkan ibu yang tidak memiliki pekerjaan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mira pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan anatar status pekerjaan ibu hamil dengan kelengkapan ANC. Pada penelitiannya juga menjelskan bahwa Ibu hamil yang memiliki pekerjaan akan lebih berpotensi memiliki ANC yang lengkap dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja.

Ibu yang memiliki pekerjaan biasanya akan lebih patuh melakukan ANC dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Hal ini disebabkan karena pada ibu yang memiliki pekerjaan, ibu tersebut akan mempunyai biaya untuk menjangkau dan melakukan pemeriksaan ANC. Sedangkan ibu yang tidak bekerja cenderung akan tidak mempunyai biaya dalam menjangkau fasilitas kesehatan. Selain itu, dengan bekerja seorang ibu hamil akan lebih banyak mendapatkan saran dan informasi terkait kesehatan kehamilan sehingga dapat lebih termotivasi dalam melakukan pemeriksaan ANC (Dewi, 2014).

#### **4. Hubungan Paritas Ibu Dengaan Kepatuhan ANC**

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa terdapat 24 sampel dari total sampel dengan paritas primipara dan memiliki riwayat ANC tidak patuh, terdapat 40

sampel dari total sampel dengan paritas multipara dan memiliki riwayat ANC tidak patuh, terdapat 11 sampel dari total sampel dengan paritas primipara dan memiliki riwayat ANC patuh, dan terdapat 7 sampel dari total sampel dengan paritas multipara dan memiliki riwayat ANC patuh.

Setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil  $> 0,05$  yang berarti tidak terdapat hubungan antara jumlah paritas ibu dengan kepatuhan ANC. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manisti pada tahun 2017 dimana hasil penelitiannya adalah terdapat hubungan antara jumlah paritas dengan kelengkapan ANC.

Seseorang dengan kehamilan pertama akan lebih giat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan saat dia hamil dibandingkan ibu hamil yang sudah memiliki banyak anak. Hal ini terjadi karena ibu dengan kehamilan pertama masih tidak mengetahui tentang hal hal yang harus dilakukan selama kehamil selain itu diaa juga masih belum tahu tentang bagaimna perubahan fisiologis yang dirasakannya sehingga cenderung akan selalu takut dengan hal – hal baru yang membuat dia akan datang ke tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan rutin. berbeda dengan ibu dengan jumlah anak yang sudah banyak, dia cenderung akan menganggap bahwa sudah tahu tentang segala sesuatu yang harusnya dilakukan selama kehamilannya selain itu dia juga sudah terbiasa mendapatkan keluhan keluhan kecil sehingga cenderung akan lebih malas dalam melakukan pemeriksaan ANC (Junga, 2017).

##### **5. Hubungan Kepatuhan ANC Dengan Kejadian Anemia**

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat 50 sampel dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan mengalami anemia saat hamil, terdapat 7 sampel dari total sampel dengan ANC patuh dan mengalami anemia saat hamil,

terdapat 14 sampel dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan tidak mengalami anemia saat hamil, dan terdapat 11 sampel dari total sampel dengan ANC patuh dan tidak mengalami anemia saat hamil.

Setelah di lakukan pengujian menggunakan *Chi Square* di dapatkan hasil  $< 0,05$  yang berarti terdapat hubungan antara kepatuhan ANC dengan terjadinya Anemia dalam kehamilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ibu hamil yang tidak melakukan ANC akan berpotensi terjadi anemia saat kehamilannya di bandingkan dengan ibu yang rutin melakukan pemeriksaan ANC. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyanto pada tahun 2012 yang mendapatkan hubungan anatar kelengkapan ANC dengan kejadian Anemia.

Anemia merupakan suatu kondisi dimana seorang ibu memiliki kadar Hb dibawah normal yaitu pada trimester 1 dan 3  $< 11$  gr/dl dan pada trimester 2  $< 10,5$  gr/dl. Pada ibu hamil anemia bukan hal yang tidak mungkin terjadi ini disebabkan karena darah selain terpakai untuk tubuhnya juga dialirkan kepada anaknya untuk metabolisme dan perkembangan anaknya, sehingga jika di barengi dengan konsumsi makanan yang kurang bergizi akan membuat tubuh kekurangan zat besi sebagai bahan pembentukan Hb. Keadaan ini pada dasarnya dapat dicegah dalam melakukan ANC karena pada saat seorang ibu hamil melakukan ANC akan mendapatkan tablet penambah darah (Fe) sehingga dapat mencegah terjadinya anemia saat hamil. Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ibu hamil yang tidak melakukan ANC akan lebih beresiko mengalami anemia dibandingkan dengan ibu yang patuh dalam melakukan ANC. (Riyanto, 2012).

#### **6. Hubungan Kepatuhan ANC Dengan Kejadian Makrosomia dan Gemelli**

Hubungan anatar kelengkapan ANC dengan gemely dan makrosomia dapat dilihat pada tabel 4.7 dan 4.8. hasil yang didapatkan dari keduanya setelah dilakukan pengujian dengan metode *Chi Square* adalah  $> 0,05$  yang berarti tidak terdapat hubungan antara kepatuhan ANC dengan kejadian gemelli dan juga makrosomia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susianti pada tahun 2016 yang menyebutkan bahwa makrosomia terjadi paling banyak disebabkan oleh berat badan ibu yang melebihi normal (obesitas) baik sebelum maupun saat hamil sehingga saat pertumbuhan dan perkembangan janinnya akan mendapatkan asupan gizi atau makanan yang berlebih sehingga berat badan bayi lahir juga akan melebihi batas normal. multiparitas dengan riwayat melahirkan bayi besar karena secara teori berat badan bayi yang dilahirkan akan selalu meningkat pada kelahiran berikutnya. Hal ini juga bisa disebabkan oleh penyakit diabetes yang diderita saat hamil, karena pada saat ibu mengalami diabetes kadar gula darah ibu pastinya tinggi dan semua darah secara normal akan mengalir kejanin sehingga dapat digunakan janin dalam perkembangan dan pertumbuhannya (Susianti, 2016). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyebab tersering terjadinya gemelli adalah karena faktor genetik (Rizka, 2019).

#### ***7. Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC Dengan Onset Perdarahan Postpartum***

Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa terdapat 53 sampel dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan mengalami pendarahan postpartum kurang dari 24 jam, terdapat 2 sampel dari total sampel dengan ANC patuh dan mengalami pendarahan postpartum kurang dari 24 jam, terdapat 11 sampel dari

total sampel dengan ANC tidak patuh dan mengalami pendarahan postpartum lebih dari 24 jam, dan terdapat 16 sampel dari total sampel dengan ANC patuh dan mengalami pendarahan postpartum lebih dari 24 jam. Jadi dari data diatas dapat di simpulkan bahwa dari semua kasus perdarahan postpartum terdapat sebanyak 64 sampel memiliki riwayat ANC yang tidak patuh.

Setelah dilakukan uji hubungan dengan menggunakan *Chi Square*, didapatkan hasil  $< 0,05$  yang berarti terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan ANC dengan onset perdarahan postpartum. Pada penelitian ini ibu dengan ANC tidak patuh lebih banyak mengalami perdarahan postpartum di bandingkan dengan ibu dengan ANC yang patuh. Selain itu dapat dilihat juga bahwa ibu hamil yang memiliki ANC tidak patuh terbanyak pada kasus perdarahan postpartum primer yaitu sebanyak 53 sampel.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Puspita Sari pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara frekuensi kunjungan ANC dengan kejadian perdarahan postpartum. Pada penelitiannya juga menyatakan bahwa ibu dengan ANC lengkap atau teratur dapat mengurangi terjadinya komplikasi terkhusus adalah perdarahan postpartum (Puspita, 2017).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Miftahus Saadah pada tahun 2016 di Bondowoso, Jawa Tengah menganalisis terkait faktor resiko terjadinya perdarahan postpartum dan salah satu variabel yang diteliti adalah pengaruh durasi ANC dan di dapat kan hasil bahwa pasien dengan ANC  $< 4$  lebih beresiko terjadi komplikasi kehamilan dibandingkan ibu dengan durasi ANC yang  $\geq 4$ . Hal ini dikarenakan dengan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan sering maka ibu akan lebih memahami kondisi kesehatan yang dialaminya (Saadah, 2014).

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Sadiq G. Uthman di Maiduguri, Nigeria pada tahun 2013 dari semua kasus perdarahan postpartum yang terjadi di beberapa layanan kesehatan didapatkan bahwa pada sampel dengan ANC tidak memadai akan lebih beresiko terkena perdarahan postpartum dibandingkan dengan ibu dengan ANC yang memadai atau lengkap. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan juga melihat bagaimana interval kelahiran dapat berpengaruh terhadap kejadian perdarahan postpartum (Uthman, 2013).

Adapun penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Jihan Wafdah Ramadhan pada tahun 2019 di RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan hasil penelitian didapatkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kepatuhan ANC dengan kejadian perdarahan postpartum. Hal ini dikarenakan semua sampel yang mengalami perdarahan postpartum memiliki riwayat kunjungan ANC yang lengkap atau  $\geq 4$  (Ramadhan, 2019).

Antenatal care (ANC) merupakan suatu program pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak. Dalam melakukan ANC ibu hamil diharuskan datang minimal sebanyak 4 kali dalam masa kehamilannya. Pada proses pemeriksaan ANC, ada banyak yang dilakukan pada ibu hamil seperti melakukan anamnesis kepada ibu untuk menggali keluhan apa yang dialami saat hamil. Selain itu, riwayat medis dari ibu hamil sebelum hamil juga diperiksa. Selain pemeriksaan dengan anamnesis juga dilakukan pemeriksaan fisik terkait tinggi badan, LILA, IMT, berat badan untuk mengetahui status gizi dari ibu hamil. Selain itu, pemeriksaan tekanan darah dan juga anemia serta keluhan yang beresiko lainnya dilakukan pada saat melakukan ANC. Untuk pemeriksaan penunjang

sendiri dilakukan pemeriksaan gula darah, golongan darah, kadar Hb, HIV, malaria, sifilis, dan juga USG. Selain pemeriksaan diatas juga dilakukan edukasi edukasi kepada ibu hamil terkait hal hal penting yang harus diketahui selama kehamilan dan persalinan (Kemenkes RI, 2013).

Kasus perdaraha postpartum disebabkan oleh banyak hal dan berbeda setiap jenis postpartumnya. Berdasarkan waktu terjadinya perdarahan postpartum dibagi menjadi dua yaitu perdarahan postpartum primer dan perdarahan postpartum sekunder. Untuk perdarahan postpartum primer tersering disebabkan oleh atonia uteri, retensio plasenta, robekan jalan lahir, dan kelainan pembekuan darah. Sedangkan untuk perdarahan postpartum sekunder paling sering disebabkan oleh rest palsenta (Satriyandari, 2017).

Semua penyebab terjadinya perdarahan postpartum pada dasarnya dapat di cegah dengan melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) karena dengan melakukan ANC faktor resiko dari terjadinya etiologi perdarahan postpartum.faktor resiko yang dimaksud seperti anemia selama kehamilan yang pada saat setelah persalinan dapat menyebabkan kurang energi rahim untuk berkontraksi dikarenakan Apabila terjadi anemia maka  $O_2$  yang dihantarkan dari paru – paru ke seluruh tubuh melalui jantung juga akan berkurang. Sehingga jika  $O_2$  yang dihantarkan ke seluruh tubuh berkurang maka akan mengakibatkan kelemahan termasuk diantaranya adalah kelemahan kontraksi otot rahim saat setelah persalinan yang (Sherwood, 2014).Pembuludarah yang robek ini tidak dapat tertutup yang lama kelamaan akan menyebabkan perdarahan postpartum. Namun, hal ini bisa di cegah dengan melakukan ANC karena pada saat ibu memeriksakan kehamilannya semua ibu akan diberi tablet Fe yang berfungsi untuk mencegah terjadinya anemia saat hamil (Sundari, 2015).selain anemia bisa juga disebabkan oleh

kelainan letak dan perlekatan plasenta sehingga pada saat kelahiran plasenta akan terjadi retensio ataupun rest plasenta yang selanjutnya akan mengalami perdarahan postpartum. namun, hal itu juga bisa dicegah dengan melakukan ANC yang rutin sehingga jika terdeteksi terjadi kelainan letak dan perlekatan plasenta dapat dilakukan persiapan pertolongan yang tepat untuk kasus tersebut (Prawirohardjo, 2008). Selain itu, faktor lain yang dapat mengakibatkan perdarahan postpartum adalah dengan tidak lengkapnya pemeriksaan ANC maka pemantauan berat janin juga akan terganggu sehingga jika janin dengan makrosomia lahir dapat mengakibatkan robekan jalan lahir sehingga dapat menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum (Prawirohardjo, 2008).

Untuk proses terjadinya perdarahan postpartum akibat rest plasenta sering disebabkan oleh kesalahan proses kelahiran plasenta dan manajemen kala III yang salah sehingga kotiledon tidak lahir lengkap yang dapat mengakibatkan perdarahan postpartum. Namun, perdarahan yang sering terjadi adalah perdarahan postpartum sekunder (Mastiningsih, 2015).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai hubungan tingkat kepatuhan ANC dengan onset perdarahan postpartum di RSUD Syekh Yusuf tahun 2018, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari semua sampel yang mengalami perdarahan postpartum didapatkan sampel dengan ANC patuh sebanyak 18 orang dan sampel dengan ANC tidak patuh sebanyak 64 orang.
2. Jumlah ibu yang mengalami perdarahan postpartum di RSUD Syekh Yusuf pada tahun 2018 adalah 82 orang dan yang mengalami perdarahan postpartum primer sebanyak 55 orang, dan yang mengalami perdarahan postpartum sekunder sebanyak 27 orang.
3. Dari semua sampel perdarahan postpartum didapatkan jumlah sampel yang mengalami anemia sebanyak 57 sampel, dan jumlah sampel yang memiliki anak yang gemely sebanyak 15 sampel, serta jumlah sampel yang memiliki anak makrosomia sebanyak 20 sampel.
4. Terdapat hubungan antara pekerjaan dengan kelengkapan ANC. Dan tidak ditemukan adanya hubungan antara usia, paritas, dan lama pendidikan ibu dengan kelengkapan ANC.
5. Terdapat hubungan anantara tingkat kepatuhan ANC dengan kejadian anemia dalam kehamilan. Dan tidak didapatkan hubungan antara kepatuhan ANC dengan kejadian makrosomia dan gemelli.

## **B. Saran**

### 1. Bagi RSUD Syekh Yusuf Gowa

- a. Perlu dilakukan pemantauan yang baik bagi ibu dengan riwayat ANC yang tidak patuh sehingga dapat meminimalkan terjadinya komplikasi saat dan setelah persalinan.
- b. Meningkatkan kinerja dalam penanganan perdarahan postpartum sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya komplikasi.
- c. Pada bagian rekam medik sebaiknya penyusunan status pasien lebih ditata dan dilengkapi agar dapat mempermudah pengambilan data pada saat dilakukan penelitian.

### 2. Bagi Peneliti

Diharapkan bagi peneliti agar segala ilmu yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung dapat dipahami dan diaplikasikan dalam melakukan penatalaksanaan saat mendampingi kasus.

### 3. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat menjadi pustaka yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lanjutan terkait hubungan kelengkapan ANC dengan kejadian perdarahan postpartum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Afriani, Anggy, dkk. *Kasus Persalinan dengan Bekas Seksio Sesarea Menurut Keadaan Waktu Masuk di Bagian Obsetri dan Ginekologi RSUP Dr. M. Djamil Padang*. *Jurnal Kesehatan Andalas* : 2 (3), 2013. <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/download/141/136> (26 November 2019).
- Aisyah, Risqi Dewi, dkk. *Frekuensi Kunjungan ANC (Antenatal Care) Pada Ibu Hamil Trimester III*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan* : 8 (2), 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/96887-ID-frekuensi-kunjungan-anc-antenatal-care-p.pdf> (24 juli 2019)
- Arzil, Rizka, dkk. *Kembar Siam (Dicephalus Paraphagus Dibracius)*. *Jurnal Kesehatan Andalas* : 8 (2), 2019. <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/download/1027/903> (6 Februari 2020).
- Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri, *Hâsyiyah al Bâjury 'alâ Sharhi al-Allaâmah Ibnî Qâsiim al-Ghâzi 'alâ Matni Abî Shujjâ'*, Beirut, Dâru al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999, Juz 2, halaman 99
- Bartini. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Normal*. Yogyakarta : Nuha Medika, 2012.
- Benson, Ralph C dan Martin L Pernoll. *Buku Saku Obsetri dan Ginekologi*. Jakarta : EGC, 2013.
- Budiastuti, Anggun, dkk. *Hubungan Makrosomia dengan Perdarahan Postpartum di Indonesia Tahun 2012 (Analisis Data SDKI 2012)*. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia* : 1 (1), 2016. <http://journal.fkm.ui.ac.id/epid/article/downloadSuppFile/1314/383> (26 November 2019)
- Dewi, Mira Cristiani. *Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi dan Dukungan Suami Dengan Kelengkapan Antenatal Care (ANC) di Puskesmas Denpasar Selatan III*. *Public health and Preventive Medicine Archive* : 2 (1), 2014. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/phpma/article/download/13801/9484/> (24 juli 2019)

Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. *Profil Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2016*. DinKes Kabupaten Gowa, 2017. [http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL\\_KAB\\_KOTA\\_2016/7306\\_Sulsel\\_Kab\\_Gowa\\_2016.pdf](http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2016/7306_Sulsel_Kab_Gowa_2016.pdf) (24 juli 2019)

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016*. Makassar, 2017. [http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL\\_KES\\_PROVINSI\\_2016/27\\_Sulsel\\_2016.pdf](http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2016/27_Sulsel_2016.pdf)(23 Juli 2019)

Edy, Erna, dkk. *Faktor Resiko Kejadian Perdarahan Postpartum di RSKDIA Pertiwi Makassar*. Riset Informasi Kesehatan : 5 (2), 2015. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/17156/perdarahan%20postpartum.pdf?sequence=1> (24 juli 2019)

Fitrayeni, dkk. *Penyebab Rendahnya Kelengkapan Kunjungan Antenatal Care Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Pegambiran*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas : 10 (1), 2015. <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/download/170/165> (24 juli 2019)

Fitriyana, Evi, dkk. *Hubungan Tingkat Pendidikan Formal Dengan Kepatuhan Ibu Dalam Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) di Wilayah Kerja Puskesmas Ampel I Boyolali*. Maternal : 12 (1), 2015. <https://ejournal.stikesmhk.ac.id/index.php/maternal/article/download/402/364> (12 Februari 2020).

Hakim, Lukman. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Dalam Menangani Ibu Hamil dan Melahirkan di PKU Muhammadiyah Yogyakarta*. Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Junga, Manisti Ratri, dkk. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keteraturan Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado*. e-Journal Keperawatan : 5 (1), 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/109332-ID-none.pdf> (24 juli 2019)

Kementerian Kesehatan RI. *Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*. Kementerian Kesehatan RI, 2013. <http://www.searo.who.int/indonesia/documents/976-602-235-265-5-buku-saku-pelayanan-kesehatan-ibu.pdf?ua=1> (24 juli 2019)

Kementerian Kesehatan RI. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019*. Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan RI, 2015.

<http://www.depkes.go.id/resources/download/info-publik/Renstra-2015.pdf>  
(23 juli 2019)

Kementerian Kesehatan RI. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016*. Kementerian Kesehatan RI, 2017.  
<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-2016.pdf> (24 juli 2019)

Kholifah, Siti. *Hubungan Jarak Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Puskesmas Gadingrejo*. Universitas Lampung, 2017.  
<http://digilib.unila.ac.id/29670/4/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> (26 November 2019).

Leveno, Kenneth J. *Manual Williams Komplikasi Kehamilan*. Edisi 23. Jakarta: EGC, 2015.

Manik, Ika Noverina, dkk. *Hubungan Status Preeklampsia Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Pada Ibu Bersalin di RSUD Dr H Abdul Moeloek Provinsi Lampung Periode 1 Juli 2014 – 30 Juni 2015*. Majority : 6 (3), 2017.  
<http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/download/1108/955> (26 juli 2019)

Mastiningsih, Putu. *Rest Placenta Pada Ibu Nifas PIA1 6 Jam Post Partum di Ruang Bersalin RSUD Wangaya*. *Jurnal Dunia Kesehatan* : 5 (2), 2015.  
<https://media.neliti.com/media/publications/76897-ID-none.pdf> (26 juli 2019)

Mulyana, Hilman. *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Keteraturan ANC Ibu Hamil Aterm Yang Mengalami Hipertensi*. *Jurnal Keperawatan BSI* : 5 (2), 2017.  
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jk/article/download/2630/1786>(24 juli 2019)

Nora, Hilwan. *Manajemen Aktif Persalinan Kala Tiga*. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala* : 12 (3), 2012.  
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JKS/article/download/3516/3268> (26 Juli 2019)

Nurhayati, Eka. *Patologi & Fisiologi Persalinan : Distosia dan Konsep Dasar Persalinan*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2010.

- Pinontoan, Veronica Magdalena, dkk. *Hubungan Umur dan Paritas Ibu Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir rendah*. Jidan : 3 (1), 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/90765-ID-hubungan-umur-dan-paritas-ibu-dengan-kej.pdf> (26 November 2019).
- Prawirohardjo, Sarwono. Ilmu Kebidanan. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2008.
- Proverawati, A. *Anemia dan Anemia Kehamilan*. Yogyakarta : Nuha Medika, 2013.
- Puspita, Ratna, dkk. *Risk Factors of Postpartum Hemorrhage in Bondowoso District, East Java*. Jouenal of Maternal and Child Health : 2 (2), 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/235283-risk-factors-of-postpartum-hemorrhage-in-7230d185.pdf> (24 juli 2019)
- Rachmawati, Ayu Indah, dkk. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Antenatal Care (ANC) Ibu Hamil*. Majority : 7 (1), 2017. <http://joke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/download/1748/1705> (26 juli 2019)
- Ramadhan, Jihan Wafda, dkk. *Profil Pasien Hemorrhagic Postpartum di RSUP Dr. M. Djamil Padang*. Jurnal Kesehatan Andalas : 8 (2), 2019. <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/download/958/835> (24 juli 2019.)
- Rifdiani, Izfa. *Pengaruh Paritas, BBL, Jarak Kehamilan dan Riwayat Perdarahan Terhadap Kejadian Perdarahan Postpartum*. Jurnal Berkala Epidemiologi : 4 (3), 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/76259-ID-none.pdf> (24 juli 2019)
- Riyanto, dkk. *Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Anemia Ibu Hamil di Kabupaten Lampung timur*. Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai : 5 (2). 2012. <http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKM/article/download/1426/929> (6 Februari 2020)
- Saadah, Miftahus, dkk. *Multilevel Analysis on the Risk Factors of Post Partum Hemorrhage in Bondowoso, Central Java*. Journal of Maternal and Child Health : 1 (4), 2016.
- Santika, Gusti. *Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Umur Terhadap Daya Tahan Umum (Kardiovaskular) Mahasiswa Putra Semester II Kelas A Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Bali Tahun 2014*.

Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi : 1 (2), 2015.  
<https://ojs.ikipgribali.ac.id/index.php/jpkr/article/download/6/4/> (26  
 November 2019).

Satriyandari, Yekti. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Perdarahan Postpartum*. *Journal of Health Studies* : 1 (1), 2017.  
<https://ejournal.unisayogya.ac.id/ejournal/index.php/JHeS/article/download/185/121> (10 Februari 2020).

Sherwood, Lauralee. *Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem Edisi 8*. Jakarta : EGC, 2014.

Sundari. *Pengaruh Mutu Asuhan Persalinan Normal Terhadap Komplikasi Persalinan di Ruang Bersalin RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang*. *Midwifery Medical Journal* : 1 (1), 2015.  
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jk/article/download/2630/1786>  
 (26 juli 2019)

Susanto, Jepri, dkk. *Faktor yang Berhubungan dengan Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Kunjungan 1-Kunjungan 4 (K1-K4) pada Ibu Hamil di Kota Kendari Tahun 2016*. Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2016.  
<https://media.neliti.com/media/publications/183918-ID-faktor-yang-berhubungan-dengan-pemeriksa.pdf> (26 November 2019).

Susianti. *Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Makrosomia di RSUD Sawerigading Palopo*. Susianti, 2016.

Ulaa, Mar'Atun. *Hubungan Usia dan Tingkat Pendidikan Dengan Kepatuhan Ibu Hamil Melakukan Kunjungan Antenatal Care*. Muhammadiyah Palembang, 2017

Usamah, Muhammad, dkk. *Al-Rukhshatul al-Syar'iyat, Ahkamuha wa Dhawabithiha*. (Iskandariah : Dar al-iman), 2002. hlm 114.

Uthama, Sadiq G, dkk. *How Birth Interval and Antenatal Care Affects Postpartum Haemorrhage Prevention in Maiduguri, Nigeria*. *Journal of Applied Pharmaceutical Science* : 3 (3), 2013.  
[https://www.japsonline.com/abstract.php?article\\_id=814](https://www.japsonline.com/abstract.php?article_id=814) (6 Februari 2020).

Wardani, Psiari Kusuma. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perdarahan Pasca Persalinan*. *Jurnal Ilmu Kesehatan* : 2 (1), 2017.  
<https://media.neliti.com/media/publications/195281-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-terjadi.pdf> (26 juli 2019)

WHO. *Maternal Moortality*. WHO, 2015. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/maternal-mortality> (24 juli 2019)

Yusrawati, dkk. *Twin to Twin Transfusion Syndrom*. *Jurnal Kesehatan Andalas* : 3 (2), 2014. <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/download/105/100> (26 November 2019).





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

*Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63. Telp (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar*  
*Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa*

## Lampiran 1: Output SPSS

### 1. Uji Univariate

#### Perdarahan Postpartum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 24 Jam	55	67.1	67.1	67.1
	> 24 Jam	27	32.9	32.9	100.0
Total		82	100.0	100.0	

#### ANC

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak patuh	64	78.0	78.0	78.0
	Patuh	18	22.0	22.0	100.0
Total		82	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

#### Anemia Saat Hamil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Anemia	57	69.5	69.5	69.5
	Tidak Anemia	25	30.5	30.5	100.0
Total		82	100.0	100.0	

#### Gemelli

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	67	81.7	81.7	81.7
	Gemelli	15	18.3	18.3	100.0
Total		82	100.0	100.0	

**Makrosomia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	62	75.6	75.6	75.6
	Bekerja	20	24.4	24.4	100.0
Total		82	100.0	100.0	

**Paritas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Primipara	35	42.7	42.7	42.7
	Multipara	47	57.3	57.3	100.0
Total		82	100.0	100.0	

**Usia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 20 tahun	8	9.8	9.8	9.8
	20-35 tahun	74	90.2	90.2	100.0
Total		82	100.0	100.0	

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ALAUDDIN**  
Pendidikan  
**MAKASSAR**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≤ 9 tahun	14	17.1	17.1	17.1
	> 9 tahun	68	82.9	82.9	100.0
Total		82	100.0	100.0	

**Pekerjaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Bekerja	47	57.3	57.3	57.3
	Bekerja	35	42.7	42.7	100.0
Total		82	100.0	100.0	

## 2. Analisis Bivariate

### Usia \* ANC Crosstabulation

			ANC		Total
			Tidak Lengkap	Lengkap	
Usia	< 20 tahun	Count	4	4	8
		% of Total	4.9%	4.9%	9.8%
	20-35 tahun	Count	60	14	74
		% of Total	73.2%	17.1%	90.2%
Total		Count	64	18	82
		% of Total	78.0%	22.0%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	4.071 <sup>a</sup>	1	.044		
Continuity Correction <sup>b</sup>	2.459	1	.117		
Likelihood Ratio	3.435	1	.064		
Fisher's Exact Test				.066	.066
Linear-by-Linear Association	4.021	1	.045		
N of Valid Cases	82				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.76.

b. Computed only for a 2x2 table

### Pendidikan \* ANC Crosstabulation

			ANC		Total
			Tidak Lengkap	Lengkap	
Lama Pendidikan	≤ 9	Count	13	1	14
		% of Total	15.9%	1.2%	17.1%
	> 9	Count	51	17	68
		% of Total	62.2%	20.7%	82.9%
Total		Count	64	18	82
		% of Total	78.0%	22.0%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	2.161 <sup>a</sup>	1	.142		
Continuity Correction <sup>b</sup>	1.244	1	.265		
Likelihood Ratio	2.629	1	.105		
Fisher's Exact Test				<b>.285</b>	<b>.129</b>
Linear-by-Linear Association	2.134	1	.144		
N of Valid Cases	82				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.07.

b. Computed only for a 2x2 table

### Pekerjaan \* ANC Crosstabulation

		ANC		Total
		Tidak Patuh	Patuh	
Pekerjaan	Tidak Bekerja	45	2	47
	Bekerja	19	16	35
Total		64	18	82

### Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	20.126 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	17.779	1	.000		
Likelihood Ratio	21.507	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	19.881	1	.000		
N of Valid Cases	82				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.68.

b. Computed only for a 2x2 table

### Paritas \* ANC Crosstabulation

Count

		ANC		Total
		Tidak Patuh	Patuh	
Jumlah Paritas	Primipara	24	11	35
	Multipara	40	7	47
Total		64	18	82

### Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	3.201 <sup>a</sup>	1	.074		
Continuity Correction <sup>b</sup>	2.309	1	.129		
Likelihood Ratio	3.177	1	.075		
Fisher's Exact Test				.106	.065
Linear-by-Linear Association	3.162	1	.075		
N of Valid Cases	82				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.68.

b. Computed only for a 2x2 table

### ANC \* Anemia Crosstabulation

Count

		Anemia Saat Hamil		Total
		Anemia	Tidak Anemia	
ANC	Tidak Patuh	50	14	64
	Patuh	7	11	18
Total		57	25	82

### Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	10.205 <sup>a</sup>	1	.001		
Continuity Correction <sup>b</sup>	8.438	1	.004		
Likelihood Ratio	9.552	1	.002		
Fisher's Exact Test				.003	.002

Linear-by-Linear Association	10.081	1	.001	
N of Valid Cases	82			

- a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.49.  
b. Computed only for a 2x2 table

### ANC \* Gemelli Crosstabulation

Count

		Gemely		Total
		Tidak	Gemelli	
ANC	Tidak Patuh	55	9	64
	Patuh	12	6	18
Total		67	15	82

### Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	3.491 <sup>a</sup>	1	.062		
Continuity Correction <sup>b</sup>	2.320	1	.128		
Likelihood Ratio	3.137	1	.077		
Fisher's Exact Test				.085	.069
Linear-by-Linear Association	3.448	1	.063		
N of Valid Cases	82				

- a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.29.  
b. Computed only for a 2x2 table

### ANC \* Makrosomia Crosstabulation

Count

		Makrosomia		Total
		Tidak	Bekerja	
ANC	Tidak Patuh	49	15	64
	Patuh	13	5	18
Total		62	20	82

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.144 <sup>a</sup>	1	.705		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.005	1	.946		
Likelihood Ratio	.141	1	.708		
Fisher's Exact Test				.759	.461
Linear-by-Linear Association	.142	1	.707		
N of Valid Cases	82				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.39.

b. Computed only for a 2x2 table

### ANC \* Perdarahan Postpartum Crosstabulation

		Perdarahan Postpartum		Total	
		< 24 Jam	> 24 Jam		
ANC	Tidak patuh	Count	53	11	64
		% of Total	64.6%	13.4%	78.0%
	Patuh	Count	2	16	18
		% of Total	2.4%	19.5%	22.0%
Total		55	27	82	
		% of Total	67.1%	32.9%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	32.704 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	29.538	1	.000		
Likelihood Ratio	32.630	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	32.305	1	.000		
N of Valid Cases	82				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.93.

b. Computed only for a 2x2 table

## Lampiran 2: Etik Penelitian


**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
 Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 53, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar  
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo. No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

---

**LEMBAR REKOMENDASI ETIK**

Nomor : E.011/KEPK/FKIK/XII/2019  
 Judul Penelitian : Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di RSUD Syech Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018

Nama Peneliti : Yusril Ihsanul Mukarram  
 No. Register : 

U	I	N	A	M	1	9	1	2	E	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya ( terus ke C) b. Tidak ( terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik ( <i>Full Board</i> ) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembar pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembar pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Diunda untuk beberapa alasan (lihat lembar pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembar pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A

18 Desember 2019

  
 Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
 NIP. 196007012006042002



## Lampiran 3: Balit Banda



  
 1 2 0 2 0 1 9 1 4 2 0 4 9 2

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

---

Nomor : 441/S.01/PTSP/2020  
 Lampiran :  
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
 Bupati Gowa

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2725/FKIK/PP.00.9/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

**N a m a** : YUSRIL IHSANUL MUKARRAM  
**Nomor Pokok** : 70600116047  
**Program Studi** : Pend. Dokter  
**Pekerjaan/Lembaga** : Mahasiswa (S4)  
**Alamat** : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :  
**" HUBUNGAN TINGKAT KEPATUHAN ANC DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POST PARTUM DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TAHUN 2018 "**


Yang akan dilaksanakan dari: Tgl. 23 Januari s/d 23 Februari 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 23 Januari 2020  
 A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar,  
 2. Peringatan.

SIMAP PTSP 23-01-2020

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231



### Lampiran 4: Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

---

Sungguminasa, 27 Januari 2020

Nomor : 070/WD /BKB.P/2020  
 Lamp : -  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
 Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa  
 Di- Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor:441/S.01/PTSP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : YUSRIL IHSANUL MUKARRAM  
 Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 12 April 1999  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (SI)  
 Alamat : Perumahan Villa Mandiri

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesisp di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"HUBUNGAN TINGKAT KEPATUHAN ANC DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POST PARTUM DI RSUD SYEKH YUSUF KAB. GOWA TAHUN 2018"**

Selama : 23 Januari 2020 s/d 23 Februari 2020  
 Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. KEPALA BADAN  
 SEKRETARIS



**DRS. ALWI ARIFIN, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 N I P : 19680808 19881 1 012

**ALAUDDIN MAKASSAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**TEMBUSAN :**

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa
3. Dekan Fak.Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal.-

CS Scanned with CamScanner

### Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF**  
 JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : 012/Diklat.RSUD-SY/II/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menerangkan bahwa :

Nama : Yusril Ihsanul Mukarram  
 Nim : 70600116047  
 Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Poliklinik KIA (ANC), Kamar Bersalin (INC) Dan Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul "*Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC Dengan Kejadian Perdarahan Post Partum Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018*" pada Tanggal 23 Januari 2020 S/D 13 Februari 2020.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

Sungguminasa, 14 Februari 2020

An. Ketua Diklat  
 Koordinator Bagian Penelitian



**Dr. H. Rengul Rauf, Bsc. MMRS**  
 Nip. 196307101987032019





