

**HUBUNGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DENGAN
HIPERBILIRUBINEMIA DI RUMAH SAKIT WILAYAH KOTA
MAKASSAR PERIODE JANUARI-DESEMBER TAHUN 2018**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

A MUH. AKBAR JAYA

NIM: 70600116031

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.Muh. Akbar Jaya

NIM : 70600116031

Tempat, Tanggal lahir : Belopa, 30 Oktober 1998

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Perum. Nusa Harapan permai Blok A11 No.19

Judul : Hubungan Berat Badan Lahir Rendah Dengan Hiperbilirubinemia di Rumah Sakit Wilayah Kota Makassar Periode Januari-Desember Tahun 2018

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Makassar, Februari 2020



Penyusun,

A.MUH.AKBAR JAYA
NIM : 70600116031

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Dengan Hiperbilirubinemia di Rumah Sakit Wilayah Kota Makassar Periode Januari – Desember Tahun 2018**" yang disusun oleh A.Muh.Akbar Jaya, NIM : 70600116031, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 25 Februari 2020 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Samata-Gowa, 25 Februari 2020

19 Rajab 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr Rini Fitriani, M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: dr Saharuddin, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: dr. Henny Fauziah, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr Andi Faradillah, Sp.GK., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Zulfahmi Alwi, PhD	(.....)



Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIA Alauddin Makassar

Dr. dr. syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes

NIP.19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang masih tercurah kepada penulis, sehingga skripsi ini yang berjudul "Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Dengan Hiperbilirubinemia di Beberapa Rumah Sakit di Kota Makassar Tahun 2018" dapat terselesaikan, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua ku yang tercinta, terkasih, tersayang serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai cita Ayahanda **Alm. Andi Sukiman Ahmad** & Ibunda **Hj. Muliati Aras** atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini. Untuk segenap keluarga besar khusus nya saudara kandung **Andi Fadel Muhammad, Andi Nabila Azzahrah** dan **Andi Muh Syahrul Ramadhan** yang telah memberikan kasih sayang, arahan, serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar **Prof Hamdan Juhannis MA PhD** beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin

Makassar **Dr. dr Syatirah Jalaluddin, Sp.A, M.Kes**, para wakil dekan, dan seluruh staf akademik yang memberikan bantuan kepada penyusun selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Ibunda **dr Darmawansyih, M.Kes** selaku Ketua Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ayahanda **dr. Saharuddin, M.Kes** selaku pembimbing I dan ibunda **dr Henny Fauziah, M.Kes** selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan serta arahan guna penyempurnaan penulisan proposal ini.
5. Ibu **dr Andi Faradillah, Sp.GK, M.Kes** selaku penguji bidang kompetensi keilmuan dan Bapak **Zulfahmi Alwi PhD** selaku penguji integrasi keislaman, yang bersedia memberikan waktu dan memberikan masukan kepada peneliti selama penyusunan proposal ini.
6. Kepada Direktur Rumah sakit terkait yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian serta membantu selama proses penelitian berlangsung.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membimbing dalam mendidik penulis selama pendidikan.

8. Para teman sejawatku **NUCLEI 2016** atas kebersamaannya bergandengan tangan saling merangkul satu sama lain, baik suka maupun duka dalam proses menggapai cita.
9. Kepada kakanda senior yang senantiasa selalu meluangkan waktunya membimbing dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada **Nurul Rahmadiani Ukfah** sahabat kesayanganku yang senantiasa memberi dukungan dan bantuan kepala penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada HMJ Kedokteran, TBM An-Nafis yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual dalam mencapai tujuan insan cita pencipta, pengabdian dan bernaafaskan islam.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon do'a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian dimasyarakat nantinya.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Hipotesis	5
1. Hipotesis Nol (H_0).....	5
2. Hipotesis Alternatif (H_a).....	5
D. Defenisi operasional dan kriteria objektif	6
1. BBLR	6
2. Hiperbilirubin.....	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Tujuan Penelitian	7
1. Tujuan umum	7
2. Tujuan khusus	7
G. Manfaat Penelitian	8
1. Kegunaan teoritis	8
2. Kegunaan praktisi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Berat Badan Lahir Rendah	9
1. Definisi.....	9
2. Klasifikasi BBLR.....	9
3. Epidemiologi BBLR	10
4. Etiologi dan Faktor Resiko BBLR.....	10

5. Patomekanisme BBLR.....	11
6. Diagnosis.....	11
7. Masalah atau Komplikasi BBLR	12
B. Hiperbilirubinemia	18
1. Defenisi	18
2. Metabolisme Bilirubin	18
3. Patofisiologi	22
4. Etiologi.....	24
5. Epidemiologi.....	25
6. Manifestasi Klinis	27
7. Pemeriksaan Fisik	27
8. Pemeriksaan Laboratorium	28
C. Hubungan BBLR dengan Kejadian Hiperbilirubinemia.....	29
D. BBLR dalam Prespektif Islam.....	30
E. Kerangka Teori	36
F. Kerangka konsep	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Desain Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel	38
1. Populasi.....	38
2. Sampel.....	38
C. Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi	38
1. Kriteria Inklusi	38
2. Kriteria Eksklusi	39
D. Lokasi dan Waktu penelitian.....	39
E. Variabel Penelitian	39
F. Pengumpulan data dan cara penelitian	40
1. Cara Pengumpulan Data	40
2. Cara Penelitian	40
G. Pengolahan Data	40
H. Analisis Data	40

1. Data Univarian	41
2. Data Bivarian	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK**Nama : A.Muh. Akbar Jaya****NIM : 70600116031****Judul : Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Dengan Hiperbilirubinemia di Rumah Sakit Wilayah Kota Makassar Periode Januari – Desember Tahun 2018**

Berat badan lahir rendah (BBLR) adalah berat badan lahir rendah kurang dari 2500 gram tanpa memandang usia kehamilan. Sedangkan hiperbilirubinemia merupakan kondisi yang ditandai dengan peningkatan kadar bilirubin (≥ 10 mg/dL) didalam jaringan *ekstravascular* sehingga tampak kuning pada konjungtiva, kulit dan mukosa.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan Berat badan lahir Rendah (BBLR) dengan kejadian hiperbilirubinemia di rumah sakit di Kota Makassar tahun 2018, jumlah sampel 400 bayi. Data penelitian diperoleh dari data rekam medik rumah sakit yang lengkap. Data tersebut dianalisis dengan metode person chi-square dengan bantuan komputerisasi.

Berdasarkan analisis person chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* $< 0,005$. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara berat badan lahir rendah dengan kejadian hiperbilirubinemia.

DAFTAR TABEL

Tabel Distribusi Data Berdasarkan Karakteristik Data Rekam Medik.....	43
Tabel Analisis Hubungan BBLR dengan Hiperbilirubinemia pada Bayi Baru Lahir.....	44



DAFTAR BAGAN

Bagan Kerangka teori.....	37
Bagan Kerangka Konsep.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka Kematian Balita (AKB) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 didapatkan sebesar 26,9/1000 kelahiran hidup, angka kejadian ini lebih rendah dibanding angka kejadian AKB pada tahun 2002-2003 sebesar 35/1000 kelahiran hidup dan Sustainable Development Goals (SDGs) menargetkan pada tahun 2025 angka kejadian AKB turun sebesar 18/1000 kelahiran hidup. Faktor penyebab kematian neonatus terbagi atas dua faktor yakni maternal dan neonatus itu sendiri, terkhusus pada faktor bayi dapat disebabkan antara lain BBLR, prematur, asfiksia, dan ikterus neonatorum (Ika Susilowati, 2010).

Penyebab langsung kematian bayi di Indonesia disebabkan oleh BBLR (15-20%), asfiksia (44-46 %), trauma persalinan (2-7%), infeksi (24-25%) dan cacat bawaan (1-3%). Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan suatu keadaan dimana bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram tanpa melihat usia gestasi, selain dari itu BBLR merupakan salah satu penyebab utama kematian periode awal sebelum lahir (Nursusila, 2017).

Prevalensi kejadian BBLR khususnya dinegara berkembang sebesar 96,5 %, kejadian BBLR di Indonesia pada tahun 2011 sebesar 11,1 % angka kejadian ini terbilang tinggi dibanding negara lain seperti Vietnam (5,3%) dan Thailand (6,6%) (Kemenkes, 2016), terkhusus dibeberapa provinsi di Indonesia angka kejadian BBLR tertinggi terdapat di provinsi Sulawesi Tengah (16,9 %) dan terendah di provinsi Sumatera Utara (7,2 %).

Prevalensi BBLR di Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat ke 7 (tujuh) dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi di indonesia dengan presentasi 12 %

(Dinkes, 2014), pada tahun 2015 kasus kejadian BBLR meningkat menjadi 4.697 bayi (Dinkes,2016). Berdasarkan kejadian BBLR menurut profil kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 149.929 bayi, yang terbagi atas wilayah dengan angka kejadian BBLR tertinggi yakni Kota Makassar (690 kasus), Kab. Gowa (342 kasus), Kab. Luwu (288 kasus) dan kasus terendah di Kab. Barru (27 kasus), Kab.Bantaeng (47 kasus) dan Kab. Tana Toraja (65 kasus) (Dinkes Sulsel,2016).

Kasus berat badan lahir rendah (BBLR) memiliki dampak jangka pendek dan jangka Panjang, hiperbilirubinemia merupakan salah satu dampak jangka pendek, hal ini terjadi karena pada bayi BBLR sistem organ dalam tubuhnya belum matang sehingga proses metabolisme bilirubin terhambat yang menyebabkan akumulasi bilirubin yang berlebih khususnya proses maturasi hepatosit dan pada kada bilirubin lebih dari 20 mg/dL dapat menembus sawar darah otak yang akan menyebabkan *kernikterus* yang akan merusak sel saraf pada otak secara permanen (Atika, 2010).

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa / 4 : 9

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

“ Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

M. Quraish Shihab (2016) dalam tafsir Al-Misbah bahwa “*dan hendaklah orang- orang yang memberi aneka nasihat kepada pemilik harta agar membagikan hartanya kepada anak-anak yang terbelengkalai, hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan dibelakang mereka, yakni setelah kematian mereka, anak-anak yang lemah masih kecil atau tidak memiliki harta, yang khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiyaan atas mereka, yakni anak-anak*

lemah itu. Oleh sebab itu, hendaklah mereka takut kepada Allah atau keadaan mereka dimasa depan. Terkait hal kejadian BBLR dan Hiperbilirubinemia, orang tua bertanggung jawab atas terpenuh kebutuhan dasar anak yakni asah, asih dan asuh terkhususnya ibu dimana pada masa kehamilan ibu diharapkan agar mengkonsumsi makanan yang bergizi, bersih dan halal serta mengaplikasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, dari ibu yang sehat akan melahirkan anak sehat dan cerdas yang dimana dimasa yang akan datang akan membawahkan perubahan bagi bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Bilirubin adalah pigmen kuning yang ada di dalam darah, urin, dan tinja manusia. Pigmen ini berasal dari sel darah merah yang sudah mati dan pecah. Bilirubin merupakan suatu senyawa tetrapirrol yang dapat larut dalam lemak maupun air yang berasal dari pemecahan enzimatis gugus heme dari berbagai heme protein seluruh tubuh. Sebagian besar (kira-kira 80%) terbentuk dari proses katabolik hemoglobin, dalam proses penghancuran eritrosit oleh sistem retikuloendotelial (RES) di limpa, dan sumsum tulang. Selain itu, sekitar 20% dari bilirubin berasal dari sumber lain yaitu non heme porfirin, prekursor pirol dan lisis eritrosit muda. Dalam keadaan fisiologis pada manusia dewasa, eritrosit dihancurkan setiap jam. Setiap penghancuran eritrosit akan menghasilkan hemoglobin dan bila hemoglobin dihancurkan dalam tubuh, bagian protein globin dapat dipakai kembali baik sebagai protein globin maupun dalam bentuk asam-asam amino. Dalam setiap 1 gr hemoglobin yang lisis akan membentuk 35 mg bilirubin. Pada orang dewasa dibentuk sekitar 3–4 mg bilirubin per hari, yang dapat berasal dari pemecahan haemoglobin sedangkan pada neonatus memproduksi bilirubin 8-10 mg per hari, proses eritropoetik yang tidak efektif dan pemecahan hemaprotein lainnya (Barrett, 2015 dan Wolkoff, 2019).

Metabolisme bilirubin dibagi menjadi 5 fase yaitu fase 1) pembentukan bilirubin, fase 2) transpor plasma, fase 3) *liver uptake*, 4) konjugasi dan fase 5) ekskresi biliar. Fase prahepatik terdiri atas fase 1 dan 2, fase intrahepatik terdiri atas fase 3 dan 4 serta fase posthepatik terdiri atas fase 5 (Murray 2015 dan Heirwegh 2018).

Hiperbilirubinemia merupakan keadaan meningkatnya kadar bilirubin dalam darah ≥ 10 mg/dL dan secara klinis ditandai dengan ikterus, adapun faktor penyebabnya dapat fisiologis maupun patologis (Stevry Mathindas, 2013).

Rully Annisa (2012) dalam penelitiannya berjudul Hubungan Berat Badan Lahir Rendah Dengan Kejadian Hiperbilirubin Pada Bayi Diruang Perinatologi RSUD Arjawinangu, penelitian ini terdiri atas 28 responden cara pengumpulannya melalui data rekam medik. Hasil penelitian didapatkan sebanyak 35,7% bayi dengan hiperbilirubinemia, uji *chi square* didapatkan ada hubungan yang sangat erat antara berat badan lahir rendah dengan kejadian hiperbilirubinemia”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kami selaku peneliti tertarik meneliti tentang hubungan BBLR dengan kejadian hiperbilirubinemia di beberapa rumah sakit di wilayah Kota Makassar mengingat bahwa masih kurangnya penelitian yang mengkaji angka kejadian BBLR dan hiperbilirubinemia pada neonatus serta hubungan BBLR dan kejadian hiperbilirubinemia khususnya di kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka kami selaku peneliti menetapkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan Bayi Lahir Berat Rendah (BBLR) dengan kejadian hiperbilirubinemia di rumah sakit wilayah Kota Makassar periode januari - desember tahun 2018 ?

Adapun sub masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Berapakah insidensi berat badan lahir normal (BBLN) dan berat badan lahir rendah (BBLR) di rumah sakit wilayah Kota Makassar periode januari – desember tahun 2018 ?
2. Berapakah insidensi ikterus fisiologis dan hiperbilirubinemia pada neonatus di rumah sakit wilayah Kota Makassar periode januari – desember tahun 2018 ?
3. Bagaimanakah hubungan berat badan lahir rendah (BBLR) dengan hiperbilirubinemia di rumah sakit wilayah kota makassar periode januari – desember tahun 2018 ?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)
Tidak ada hubungan hubungan berat badan lahir rendah dengan hiperbilirubinemia di rumah sakit wilayah kota makassar periode januari- desember tahun 2018
2. Hipotesis Alternatif (H_a)
Ada hubungan hubungan berat badan lahir rendah dengan hiperbilirubinemia di rumah sakit wilayah kota makassar periode januari- desember tahun 2018.

D. Defenisi operasional dan kriteria objektif

1. BBLR

a. Defenisi

Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan suatu keadaan dimana bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram tanpa melihat usia gestasi (Proverawati A. 2010).

b. Alat Ukur

Data rekam medik

c. Interpretasi

Bayi dengan berat badan <2500 gram dengan usia gestasi ≤ 37 minggu atau ≥ 37 minggu.

2. Hiperbilirubin

a. Defenisi

Hiperbilirubinemia merupakan keadaan meningkatnya kadar bilirubin dalam darah 24 jam pertama pasca persalinan dan secara klinis ditandai dengan perubahan warna pada kulit, sklera, mukosa maupun organ (Ely Susan, 2011).

b. Alat ukur

Data register atau rekam medik.

c. Interpretasi

Kadar bilirubin total ≥ 10 mg/dL.

E. Kajian Pustaka

1. "Rully Annisa (2018) dalam penelitiannya berjudul Hubungan Berat Badan Lahir Rendah Dengan Kejadian Hiperbilirubin Pada Bayi diruang Perinatologi RSUD Arjawinangu, penelitian ini terdiri atas 28 responden cara pengumpulannya melalui data rekam medik. Hasil penelitian

didapatkan sebanyak 35,7% bayi dengan hiperbilirubinemia, uji *chi square* didapatkan ada hubungan yang sangat erat antara berat badan lahir rendah dengan kejadian hiperbilirubinemia”.

2. “Alfi Hidayati (2017) dalam penelitiannya berjudul Hubungan Usia Gestasi Dengan Kejadian Hiperbilirubinemia Pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah di RSUD Wonosari, dengan jumlah sampel 70 responden dengan cara pengumpulannya melalui data rekam medik, hasil uji *chi square* didapatkan nilai ($p\text{-value} = 0.0016$) berarti terdapat hubungan bermakna kejadian berat badan lahir rendah dengan hiperbilirubinemia”.
3. “Riyanti Imron (2012) dalam penelitiannya berjudul Hubungan Berat Badan Lahir Rendah Dengan Kejadian Hiperbilirubinemia Pada Bayi Di Ruang Perinatologi di RSUD Abdul Moeloek, penelitian ini terdiri atas 315 bayi dimana 105 bayi dengan berat badan lahir rendah dan 111 bayi dengan hiperbilirubinemia hasil uji *chi square* ($p\text{-value}=0,000$) hal ini menandakan adanya korelasi berat badan lahir rendah dengan kejadian hiperbilirubinemia”

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum
Mengetahui hubungan Berat badan lahir Rendah (BBLR) dengan kejadian hiperbilirubinemia di beberapa rumah sakit di Kota Makassar periode januari - desember tahun 2018.
2. Tujuan khusus
 - a. Mengetahui angka kejadian Bayi Lahir Berat Rendah (BBLR) di beberapa rumah sakit di Kota Makassar tahun 2018 .

- b. Mengetahui angka kejadian hiperbilirubinemia neonatorum di beberapa rumah sakit di Kota Makassar periode januari - desember tahun 2018 .
- c. Mengetahui hubungan Berat badan lahir Rendah dengan kejadian hiperbilirubinemia di beberapa rumah sakit di Kota Makassar periode januari - desember 2018

G. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan kegunaan dalam penelitian ini dapat diambil beberapa poin yang mencakup hal pokok sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan memperkaya khasana ilmu yang berguna bagi pembaca yang ingin menambah wawasan keilmuan mengenai hubungan Berat badan lahir Rendah (BBLR) dengan kejadian hiperbilirubinemia di beberapa rumah sakit di Kota Makassar periode januari - desember tahun 2018 .

2. Kegunaan praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan bagi para pembaca dan peneliti lebih lanjut, terutama di lembaga-lembaga pendidikan dalam hal hubungan Berat badan lahir Rendah (BBLR) dengan kejadian hiperbilirubinemia di rumah sakit wilayah Kota Makassar periode januari- desember tahun 2018.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Berat Badan Lahir Rendah

1. Definisi

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah suatu kondisi di mana berat bayi yang baru lahir kurang dari 2500 gram (Mahayana S, 2015). Sementara dari referensi lain juga disebutkan definisi BBLR adalah berat badan lahir rendah kurang dari 2500 gram tanpa memandang usia kehamilan (Proverawati A, 2010).

2. Klasifikasi BBLR

BBLR diklasifikasikan atas dua bagian yakni berdasarkan berat badan bayi dan usia kehamilan yakni sebagai berikut :

- a. Berat badan lahir rendah (BBLR), yaitu bayi yang lahir dengan berat badan lahir 1.500 - 2.500 gram
- b. Berat Badan Lahir Sangat Rendah (BBLSR) adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 1.500 gram
- c. Berat Badan Lahir Amat Sangat Rendah (BBLASR) adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 1.000 gram (Arda, 2015).

Sedangkan klasifikasi berdasarkan usia kehamilan yaitu :

- a. Prematuritas murni yaitu bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu dengan berat badan sesuai dengan berat badan untuk usia kehamilan.
- b. Dismaturitas yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari berat badan untuk usia kehamilan, yang berada di bawah persentil berat pada kurva pertumbuhan intrauterin. Biasanya disebutkan dengan bayi kecil untuk kehamilan (Arda, 2015).

3. Epidemiologi BBLR

Berdasarkan data dari *World Health Rankings* tahun 2014 dari 172 negara di dunia, Indonesia berada di peringkat ke-70 (tujuh puluh) dengan persentase kematian tertinggi karena BBLR (10,69%). Tingkat kelahiran di Indonesia pada tahun 2010 adalah 4.371.800 bayi dengan kejadian BBLR 15.5 per 100 kelahiran hidup (Hartiningrum, 2018). Selain itu, WHO pada tahun 2010 menyatakan bahwa BBLR berkontribusi 60-80% dari semua kematian neonatal. Sedangkan pada tahun 2011, prevalensi kematian neonatal adalah 66.000 kelahiran atau 15 orang per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah neonatus yang meninggal disebabkan oleh berat badan lahir rendah sebesar 32.342 kelahiran (Arda, 2015).

4. Etiologi dan Faktor Resiko BBLR

Berat bayi lahir rendah dapat disebabkan oleh kelahiran premature dan bayi yang kecil masa kehamilannya (KMK) atau *Small for Gestational Age* (SGA) ataupun kombinasi dari keduanya. Untuk KMK atau SGA ini sendiri dapat disebabkan oleh hambatan pertumbuhan janin atau karena faktor konstitusional seperti genetik, ras, dan jenis kelamin. Semakin kecil usia atau umur kehamilan, maka berat bayi lahir juga akan semakin kecil karena secara fisiologis maupun anatomis organ organ yang ada di dalam tubuh janin belum berkembang secara sempurna sehingga inilah yang menyebabkan tingginya resiko morbiditas dan mortalitas pada kasus BBLR (Fajriana A, 2018).

BBLR yang terjadi akibat dari hambatan pertumbuhan dapat disebabkan oleh 3 faktor yaitu faktor janin, faktor plasenta, dan faktor maternal akan tetapi terjadinya hambatan pertumbuhan janin ini sering disebabkan oleh multifaktorial (Smitten J, 2011). Untuk faktor ibu ada banyak hal yang dapat berpengaruh

terhadap terjadinya BBLR yaitu penyakit ibu seperti mengalami anemia berat, infeksi selama kehamilan dan hipertensi. Selain penyakit ibu faktor lain yang berpengaruh adalah usia ibu saat hamil <20 tahun atau usia saat melahirkan lebih dari 35 tahun, Kehamilan ganda, jarak kehamilan yang terlalu dekat, perawatan antenatal yang kurang baik serta faktor keadaan sosial ekonomi rendah seperti ibu mengalami gizi kurang (Susilowati, E. 2016).

5. Patomekanisme BBLR

Kekurangan gizi ibu saat hamil baik itu gizi makro maupun mikro dapat menyebabkan terjadinya BBLR. Defisiensi zat gizi makro defisiensi karena kekurangan energi kronik, jika kekurangan energi kronik ini terjadi selama kehamilan akan menyebabkan janin kekurangan asupan nutrisi yang optimal, sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin akan terganggu (Anggraini, 2014). Selain kekurangan gizi makro, defisiensi gizi mikro misalnya kekurangan zat besi (anemia dalam kehamilan) juga dapat berhubungan dengan hambatan pertumbuhan janin karena asupan atau pasokan oksigen kejanin kurang (Fajriana A, 2018).

6. Diagnosis

Diagnosis pasti dari BBLR ini membutuhkan 2 pemeriksaan yaitu pemeriksaan haid pertama haid terakhir dan juga pemeriksaan berat badan bayi dimana jika didapatkan berat badan bayi kurang dari 2500 gram saat lahir dan usia gestasi baik preterm, aterm maupun posterm maka bayi tersebut dikategorikan ke dalam BBLR (Proverawati A, 2010). Adapun gejala - gejala yang sering muncul adalah berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram, kepala lebih besar dari tubuh, kulit tipis, lemak subkutan tipis, fontanella dan sutura melebar, dan APGAR skor biasanya rendah (Darmi A, 2015).

7. Masalah atau Komplikasi BBLR

Masalah yang dapat timbul pada kasus BBLR dapat di bagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

a. Masalah jangka pendek yang terjadi pada BBLR

Pada Berat Badan Lahir Rendah banyak resiko terjadinya permasalahan pada sistem tubuhnya dikarenakan kondisi tubuh yang tidak stabil. Semakin rendah berat badan bayi maka prognosinya juga akan semakin buruk sehingga perlu mengetahui masalah masalah yang dapat timbul dalam kasus BBLR ini (Proverawati A, 2010). Adapun masalah yang beresiko timbul dalam jangka pendek adalah sebagai berikut :

1) Gangguan metabolik

a) Hipotermi

Suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Untuk bayi suhu tubuh normalnya adalah 36,5-37,5°C. Dan untuk hipotermi sendiri di bagi atas tiga yaitu stres dingin, hipotermi sedang dan hipotermi berat. Untuk stres dingin suhu antara 35,5-36,4°C, sedangkan untuk hipotermia sedang suhu antara 32-35,4°C, dan hipotermia berat apabila suhu kurang dari 32°C (Prawirohardjo, S. 2008).

Hipotermi ini merupakan masalah yang paling sering terjadi pada Berat Badan Lahir Rendah dikarenakan lemak subkutan yang sangat tipis sehingga suhu tubuh bayi akan mudah untuk dipengaruhi oleh suhu lingkungannya (Pranoto H. 2018).

Proses kehilangan suhu tubuh bayi ini ada beberapa mekanisme. Pertama melalui proses radiasi yaitu proses kehilangan panas pada bayi melalui proses radiasi adalah kehilangan panas pada

bayi saat berdekatan dengan benda padat yang mempunyai temperatur lebih rendah dibandingkan temperatur bayi yang keduanya tidak berkontak secara langsung. Kedua melalui mekanisme konduksi yaitu proses kehilangan panas pada bayi melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan suatu benda yang dingin. Seperti saat diletakkan di timbangan yang dingin ataupun saat di letakan diatas meja. Ketiga adalah mekanisme konveksi yaitu proses kehilangan panas pada bayi yang terjadi saat terpapar dengan udara sekitar yang dingin. Dimana bayi yang ditempatkan pada ruangan yang dingin akan lebih mudah panas. Dan keempat evaporasi yaitu Proses kehilangan panas pada bayi melalui penguapan air pada kulit bayi yang basah, seperti saat bayi berkeringat ataupun saat setelah mandi (Prawirohardjo, S. 2008).

b) Hipoglikemia

Glukosa darah berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi otak sehingga jika asupan glukosa pada bayi ini kurang makan akan mengakibatkan sel saraf pada otak mati dan akan mempengaruhi kecerdasan bayi kelak. Hipoglikemi ini dapat terjadi akibat kurangnya glukosa tubuh akibat kekurangan cadangan glukosa. Selain itu pada kasus BBLR juga refleks untuk menelan belum sempurna sehingga cenderung akan malas menyusui sedangkan diketahui bahwa BBLR membutuhkan cairan atau asupan nutrisi yang lebih dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan yang normal dimana pada normalnya bayi hanya membutuhkan cairan sebesar 120-150 ml/kg/hari atau 1000-1200

kkal/kg/hari dan pada kasus BBLR akan membutuhkan asupan nutrisi lebih banyak yaitu kebutuhan nutrisi atau cairan normal di tambah dengan 90 – 100 kkal/kgBB/hari (Septa, W. 2011).

c) Masalah Pemberian ASI

Masalah pemberian ASI pada kasus BBLR terjadi karena ukuran tubuh bayi dengan BBLR kecil, kurang energi, lemah, lambungnya kecil, dan tidak dapat menghisap. Sehingga, bayi dengan BBLR cenderung akan mendapatkan ASI jika diberikan bantuan, dan cara pemberian ASInya pun harus sedikit dan dengan frekuensi yang sering (Proverawati, A. 2010).

d) Ikterus

Ikterus merupakan timbulnya gejala warna kuning pada kulit, selaput lendir, dan jaringan lain oleh akibat dari tingginya kadar bilirubin di dalam tubuh. Ikterus neonatal merupakan suatu gejala yang sering ditemukan pada bayi baru lahir dimana ikterus neonatal ini dibagi menjadi 2 golongan yaitu ikterus fisiologis (muncul setelah hari ke dua atau ke tiga setelah kelahiran) dan ikterus patologis (muncul dalam 24 jam pertama setelah lahir) (Proverawati A, 2010).

2) Gangguan Imunitas

a) Gangguan Imunologik

Daya tahan tubuh berkurang terhadap infeksi karena rendahnya kadar Immunoglobulin, maupun gamma globulin. Bayi dengan BBLR relatif masih belum sanggup membentuk antibodi dan daya fagositosis serta reaksi terhadap infeksi belum baik. Karena kekebalan tubuh bayi BBLR belum sempurna, bayi juga dapat terkena infeksi pada proses kelahiran (Proverawati, A. 2010).

b) Kejang Saat Lahir

Penyebab dari kejang ini biasanya adalah infeksi sebelum lahir (prenatal), perdarahan intra kranial, atau karena vitamin B6 yang dikonsumsi oleh ibu. Biasanya bayi yang kejang ini akan dipantau selama 1 x 24 jam dan selalu memantau jalan nafasnya agar tetap dalam kondisi bebas. (Proverawati, A. 2010).

3) Gangguan Pernafasan

Pada gangguan pernafasan ada banyak masalah yang dapat timbul pada kasus BBLR ini yaitu :

a) Sindrom Gangguan Pernafasan

Masalah ini disebabkan oleh perkembangan yang imatur pada sistem pernafasan atau tidak adekuatnya jumlah surfaktan pada paru – paru. Untuk masalah akibat dari kurangnya jumlah surfaktan ini sering dikenal dengan nama *Hyalin Membran Disease* (HMD) dimana ini sering terjadi pada kasus bayi yang lahir kurang bulan (Proverawati A, 2010).

b) Asfiksia

Bayi BBLR baik yang kurang, cukup atau lebih bulan dapat mengalami gangguan pernafasan dimana semuanya berdampak pada proses adaptasi pernafasan waktu lahir sehingga dapat mengalami asfiksia lahir (Proverawati, A.2010).

c) Apneu Periodik (henti nafas)

Masalah ini kerap terjadi pada bayi prematur karena organ paru – paru dan susunan saraf pusat yang belum sempurna mengakibatkan bayi henti nafas (Proverawati, 2010).

b. Masalah jangka panjang pada BBLR

Ada banyak masalah yang akan timbul dalam jangka panjang pada kasus BBLR. Hal ini bisa terjadi jika penanganan saat lahir pada kasus BBLR ini tidak ditangani dengan baik dan benar sesuai prosedur yang semestinya, dampak jangka panjang yang bisa terjadi adalah masalah pada fisik dan psikis pasien. Untuk masalah psikis pasien yang dapat terjadi adalah gangguan perkembangan dan pertumbuhan dimana pasti akan lebih lambat dari bayi yang lahir dengan berat badan lahir normal. Juga terjadi masalah gangguan bicara dan komunikasi, gangguan belajar atau masalah pendidikan, serta gangguan atensi dan hiperaktif. Sedangkan untuk masalah fisik yang dapat terjadi pada kasus BBLR jangka panjang adalah mudahnya orang tersebut terkena suatu penyakit seperti penyakit paru, gangguan pada mata (gangguan penglihatan) dan juga gangguan pada pendengarannya (Proverawati,2010).

8. Penanganan BBLR

Hal pertama saat Bayi lahir dengan berat badan lahir rendah adalah menjaga dan mempertahankan suhu bayi agar tetap dalam keadaan normal.

Adapun cara untuk mempertahankan suhu tubuh bayi adalah mengatur suhu ruangan agar tetap dalam keadaan normal dan tidak dingin, menghangatkan bayi dengan cara memberikan cahaya pada tubuh bayi, pengeringan langsung pada tubuh bayi yang basah, menjaga suhu bayi dengan metode kanguru (prinsip *skin to skin*) yaitu kulit bayi berkontak dengan kulit ibu, serta menjaga suhu tubuh bayi dengan memasukkan bayi ke dalam inkubator. Selain itu cara lain juga dapat digunakan yaitu dengan membungkus bayi dengan plastik (Pranato H, 2018).

Selain menangani suhu tubuh bayi agar tidak terjadi hipotermi hal lain yang harus diperhatikan adalah pemberian nutrisinya. Pengaturan dan pengawasan intake nutrisi dalam hal ini adalah menentukan pilihan susu, cara pemberian, dan jadwal pemberian yang sesuai dengan kebutuhan bayi BBLR. ASI (Air Susu Ibu) merupakan pilihan pertama jika bayi mampu menghisap atau tersedia ASI donor. ASI merupakan makanan yang paling utama sehingga ASI adalah pilihan nutrisi untuk bayi BBLR yang harus didahulukan. Bila refleks menghisap bayi masih lemah maka ASI dapat diperas dan diminumkan dengan sendok secara perlahan dan harus diberikan sedikit demi sedikit dan sering. Jika produksi ASI kurang atau sedikit maka bisa di beri ASI donor jika ada akan tetapi jika tidak ada maka bisa diberikan susu formula yang kandungannya hampir mirip dengan ASI atau susu formula khusus bayi BBLR (Proverawati,2010). Normalnya bayi hanya membutuhkan cairan sebesar 120-150 ml/kg/hari atau 1000-1200 kkal/kg/hari dan pada kasus BBLR akan membutuhkan asupan nutrisi lebih banyak yaitu kebutuhan nutrisi atau cairan normal di tambah dengan 90 – 100 kkal/kgBB/hari. perlu di ingat bahwa pemberian tambahan nutrisi ini hanya diberikan jika berat badannya kurang

dan jika berat badannya sudah sesuai dengan usianya maka tambahan jumlah nutrisi yang diberikan harus dihentikan (Septa W, 2011).

Selain kedua penanganan diatas, penanganan lain yang juga penting adalah selalu menjaga bayi agar tidak terkena infeksi. Bayi BBLR sangat mudah terkena infeksi dan infeksi tersering adalah infeksi nosokomial. Sehingga, bayi BBLR harus selalu dijaga untuk tidak berkontak dengan segala sesuatu yang dapat memberikan bibit infeksi (Proverawati A, 2010).

B. Hiperbilirubinemia

1. Defenisi

Hiperbilirubinemia merupakan kondisi yang ditandai dengan peningkatan kadar bilirubin didalam jaringan *ekstravascular* sehingga tampak kuning pada konjungtiva, kulit dan mukosa. Pada neonatus yang memiliki kadar bilirubin serum ≥ 10 mg pada minggu pertama akan memberikan gambaran ikterus yang bersifat patologis (Ely Susan, 2011).

2. Metabolisme Bilirubin

Hal-hal yang perlu dipahami dalam metabolisme bilirubin yaitu tentang pembentukan bilirubin, transportasi bilirubin, asupan bilirubin dan eksresi bilirubin.

a. Pembentukan bilirubin

Bilirubin adalah pigmen kristal berwarna jingga ikterus yang merupakan bentuk akhir dari pemecahan (katabolisme) heme melalui proses reaksi oksidasi reduksi. Langkah oksidasi yang pertama adalah biliverdin yang dibentuk dari heme dengan bantuan enzim yang sebagian besar terdapat dalam sel hati dan organ limfe. Pada reaksi tersebut juga terdapat besi yang digunakan kembali untuk pembentukan hemoglobin dan karbon monoksida yang diekskresikan ke dalam paru. Tahap awal proses

degradasi heme dikatalisis oleh enzim heme oksigenase di mikrosom dalam sel RE. Langkah pertama dalam produksi bilirubin adalah pembukaan cincin tetrapirolik di jembatan α -metena. Proses ini dikatalisis oleh enzim heme oksigenase, yang membentuk senyawa hijau yaitu biliverdin disertai pelepasan suatu atom besi dan molekul karbon monoksida (CO). Dengan adanya penambahan 3 molekul O_2 , enzim ini akan menambahkan gugus hidroksil ke jembatan metenil diantara dua cincin pirol, bersamaan dengan oksidasi ion Fe^{+2} (ferro) menjadi ion Fe^{+3} (ferri). Oksidasi selanjutnya oleh enzim yang menyebabkan pemecahan cincin porfirin. Ion ferri dan CO dilepaskan, sehingga menyebabkan pembentukan biliverdin yang berpigmen hijau dari pemecahan cincin tetrapireol dalam jumlah molar yang setara. Biliverdin kemudian direduksi dengan bantuan enzim larut yang dinamai biliverdin reduktase yang mereduksi jembatan metin antara pirol III dan pirol IV gugus metilen sehingga membentuk bilirubin berwarna merah jingga sebagaimana terlihat pada gambar 2. Bilirubin dan turunannya bersama-sama disebut pigmen empedu (Murray RK, 2014).

b. Transportasi Bilirubin

Pembentukan bilirubin yang terjadi di sistem retikuloendotelial, selanjutnya dilepaskan ke sirkulasi yang akan berikatan dengan albumin. Bayi yang baru lahir mempunyai kapasitas ikatan plasma yang rendah terhadap bilirubin karena konsentrasi albumin yang rendah dan kapasitas ikatan molar yang kurang. Bilirubin yang terikat pada albumin serum ini merupakan zat non polar dan tidak larut dalam air dan kemudian akan ditransportasi ke dalam sel hepar (Murray RK, 2014).

Bilirubin yang terikat dengan albumin tidak dapat memasuki susunan saraf pusat dan bersifat nontoksik. Selain itu albumin juga mempunyai afinitas yang tinggi terhadap obat-obatan yang bersifat asam seperti penisilin dan sulfonamid. Obat-obat tersebut akan menempati tempat utama perlekatan albumin dan bilirubin sehingga bersifat kompetitor serta dapat pula melepaskan ikatan bilirubin dengan albumin. Bilirubin hanya sedikit larut dalam air, tetapi kelarutannya dalam plasma meningkat oleh pembentukan ikatan nonkovalen dengan albumin. Setiap molekul albumin tampaknya memiliki satu sisi yang berafinitas tinggi dan satu sisi berafinitas rendah dengan bilirubin. Dalam 100 ml plasma, sekitar 25 mg bilirubin dapat terikat erat dengan albumin di tempat yang berafinitas tinggi. Bilirubin yang jumlahnya berlebih dapat terikat secara longgar sehingga mudah terlepas dan berdifusi ke dalam jaringan. Sejumlah senyawa, misalnya antibiotik dan obat lain, bersaing dengan bilirubin untuk menempati tempat pengikatan berafinitas tinggi di albumin. Jadi, senyawa-senyawa ini dapat menggeser bilirubin dari albumin dan menimbulkan dampak klinis yang signifikan (Murray RK, 2014).

Bilirubin melepaskan ikatan dengan albumin pada saat berada di hati, kemudian akan diserap pada permukaan sinusoid hepatosit oleh suatu sistem yang diperantarai oleh suatu sistem karier perantara yang jenuh. Sistem transpor terfasilitasi ini memiliki kapasitas yang sangat besar, bahkan pada kondisi patologis sekalipun, sistem ini masih dapat membatasi laju metabolisme bilirubin. Sistem transportasi terfasilitasi ini memungkinkan tercapainya keseimbangan antara kedua sisi membran hepatosit, penyerapan bilirubin bergantung pada pengeluaran bilirubin

melalui jalur-jalur metabolik berikutnya. Setelah masuk ke dalam hepatosit, bilirubin berikatan dengan protein sitosol tertentu yang membantu senyawa ini tetap larut sebelum dikonjugasi yaitu ligandin *glutathione S-transferase* dan protein Y (Murray RK, 2014).

c. Asupan Bilirubin

Pada saat kompleks bilirubin albumin mencapai membran plasma hepatosit, albumin terikat ke reseptor permukaan sel. Kemudian bilirubin ditransfer melalui sel membran yang berikatan dengan ligandin (protein y), mungkin juga dengan protein ikatan sistolik lainnya (Murray RK, 2014).

d. Konjugasi Bilirubin

Bilirubin tak terkonjugasi dikonversikan ke bentuk bilirubin konjugasi yang larut dalam air di retikulum endoplasma dengan bantuan enzim *uridine diphosphate glukuronosyl transferase* (UDPG-T). Katalisa oleh enzim ini akan mengubah formasi menjadi bilirubin monoglukoronida yang selanjutnya akan dikonjugasi menjadi bilirubin diglukoronida. Bilirubin ini kemudian akan dieksresikan ke dalam kalkanikus empedu, sedangkan satu molekul bilirubin tak terkonjugasi akan kembali ke retikulum endoplasma untuk rekonjugasi berikutnya. Eksresi bilirubin larut ke dalam saluran dan kandung empedu berlangsung dengan mekanisme transport aktif yang melawan gradien konsentrasi. Dalam keadaan fisiologis, seluruh bilirubin yang diekskresikan ke kandung empedu berada dalam bentuk terkonjugasi (Murray RK, 2014).

e. Eksresi bilirubin

Setelah mengalami proses konjugasi, bilirubin akan dieksresikan ke dalam kandung empedu, kemudian memasuki saluran cerna. Bilirubin terkonjugasi yang mencapai ileum terminal dan kolon dihidrolisa oleh enzim bakteri β glukoronidase dan pigmen yang bebas dari glukoronida direduksi oleh bakteri usus menjadi urobilinogen, suatu senyawa tetrapirrol tak berwarna. Sejumlah urobilinogen diabsorpsi kembali dari usus ke perdarahan portal dan dibawa ke ginjal kemudian dioksidasi menjadi urobilin yang memberi warna kuning pada urin. Sebagian besar urobilinogen berada pada feces akan dioksidasi oleh bakteri usus membentuk sterkobilin yang berwarna kuning kecoklatan. Bilirubin akan diresorpsi kembali dari saluran cerna dan menuju ke hati untuk dikonjugasi kembali yang mana proses ini disebut sirkulasi enterohepatik (Perlman JM 2017).

3. Patofisiologi

- a. Saat eritrosit hancur di akhir siklus neonatus, hemoglobin pecah menjadi fragmen globin (protein) dan heme (besi).
- b. Fragmen heme membentuk bilirubin tidak terkonjugasi (indirek), yang berikatan dengan albumin untuk dibawa ke sel hati agar dapat berkonjugasi dengan glukuronid, membentuk bilirubin direk.
- c. Karena bilirubin terkonjugasi dapat larut dalam lemak dan tidak dapat diekskresikan di dalam urine atau empedu, bilirubin ini dapat keluar menuju jaringan ekstrasvaskular, terutama jaringan lemak dan otak, mengakibatkan hiperbilirubinemia.

d. Hiperbilirubinemia dapat berkembang ketika :

- 1) Faktor tertentu-tertentu mengganggu konjugasi dan merebut sisi yang mengikat albumin, termasuk obat (seperti aspirin, penenang, dan sulfonamide) dan gangguan (seperti hipotermia, anoksia, hipoglikemia, dan hipoalbuminemia)
- 2) Peunurunan fungsi hati yang menyebabkan penurunan konjugasi bilirubin.
- 3) Peningkatan produksi atau inkompatibilitas Rh atau ABO.
- 4) Obstruksi bilier atau hepatitis mengakibatkan sumbatan pada aliran empedu yang normal.

Bilirubin adalah produk penguraian heme. Sebagian besar (85-90%) terjadi dari penguraian hemoglobin dan sebagian kecil (10-15%) dari senyawa lain seperti mioglobin. Sel retikuloendotel menyerap kompleks haptoglobin dengan hemoglobin yang telah dibebaskan dari sel darah merah. Sel-sel ini kemudian mengeluarkan besi dari heme sebagai cadangan untuk sintesis berikutnya dan memutuskan cincin heme untuk menghasilkan tertapirol bilirubin, yang disekresikan dalam bentuk yang tidak larut dalam air (bilirubin tak terkonjugasi, indirek). Karena ketidaklarutan ini, bilirubin dalam plasma terikat ke albumin untuk diangkut dalam medium air. Sewaktu zat ini beredar dalam tubuh dan melewati lobulus hati, hepatosit melepas bilirubin dari albumin dan menyebabkan larutnya air dengan mengikat bilirubin ke asam glukoronat (bilirubin terkonjugasi, direk).

Dalam bentuk glukoronida terkonjugasi, bilirubin yang larut tersebut masuk ke sistem empedu untuk diekskresikan. Saat masuk ke dalam usus, bilirubin diuraikan oleh bakteri kolon menjadi urobilinogen. Urobilinogen dapat diubah

menjadi sterkobilin dan diekskresikan sebagai feses. Sebagian urobilinogen direabsorpsi dari usus melalui jalur enterohepatik, dan darah porta membawanya kembali ke hati. Urobilinogen daur ulang ini umumnya diekskresikan ke dalam empedu untuk kembali dialirkan ke usus, tetapi sebagian dibawa oleh sirkulasi sistemik ke ginjal, tempat zat ini diekskresikan sebagai senyawa larut air bersama urin.

Hiperbilirubinemia dapat disebabkan oleh pembentukan bilirubin yang melebihi kemampuan hati normal untuk ekskresikannya atau disebabkan oleh kegagalan hati (karena rusak) untuk mengekskresikan bilirubin yang dihasilkan dalam jumlah normal. Tanpa adanya kerusakan hati, obstruksi saluran ekskresi hati juga akan menyebabkan hiperbilirubinemia. Pada semua keadaan ini, bilirubin tertimbun di dalam darah dan jika konsentrasinya mencapai nilai tertentu (sekitar 2- 2,5mg/dl), senyawa ini akan berdifusi ke dalam jaringan yang kemudian menjadi kuning. (Perlman JM 2017).

4. Etiologi

Penyebab dari hiperbilirubinemia terdapat beberapa faktor. Secara garis besar, penyebab dari hiperbilirubinemia adalah :

1. Produksi bilirubin yang berlebihan.

Hal ini melebihi kemampuan bayi untuk mengeluarkannya, misalnya pada emolisis yang meningkat pada inkompatibilitas Rh, ABO, golongan darah lain, defisiensi G6PD, piruvat kinase, perdarahan tertutup dan sepsis.

2. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar.

Gangguan ini dapat disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi bilirubin, gangguan fungsi hepar, akibat

asidosis, hipoksia dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim glukoronil transferase (Sindrom Criggler-Najjar). Penyebab lain adalah defisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam uptake bilirubin ke sel hepar.

3. Gangguan transportasi

Bilirubin dalam darah terikat pada albumin kemudian diangkut ke hepar. Ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat misalnya salisilat, sulfarazole. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang mudah melekat ke sel otak.

4. Gangguan dalam ekskresi

Gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau di luar hepar. Kelainan di luar hepar biasanya diakibatkan oleh kelainan bawaan. Obstruksi dalam hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh penyebab lain. (Perlman JM 2017).

5. Epidemiologi

Hiperbilirubinemia neonatal sangat umum karena hampir setiap bayi baru lahir mengalami tingkat serum bilirubin tak terkonjugasi lebih dari 30 mmol / L (1,8 mg / dL) selama minggu pertama kehidupan. Angka kejadian sulit untuk membandingkan karena banyak peneliti berbeda yang tidak menggunakan definisi yang sama untuk hiperbilirubinemia neonatal signifikan atau penyakit kuning. Selain itu, identifikasi bayi yang akan diuji tergantung pada pengakuan visual dari penyakit kuning oleh penyedia layanan kesehatan, yang sangat bervariasi dan tergantung baik pada perhatian pengamat dan pada karakteristik bayi seperti ras dan usia kehamilan (Ahmad Riyanto 2015).

Dalam sebuah studi tahun 2003 di Amerika Serikat, 4,3% dari 47.801 bayi memiliki total serum bilirubin. dalam rentang di mana fototerapi direkomendasikan oleh tahun 1994 American Academy of Pediatrics (AAP) pedoman, dan 2,9% memiliki nilai dalam rentang di mana tahun 1994 AAP pedoman menyarankan fototerapi mempertimbangkan (Ahmad Riyanto 2015)

Di dunia insiden bervariasi dengan etnisitas dan geografi. Insidensi lebih tinggi pada orang Asia Timur dan Indian Amerika dan lebih rendah pada orang kulit hitam. Yunani yang hidup di Yunani memiliki insiden yang lebih tinggi daripada yang keturunan Yunani yang tinggal di luar Yunani. Insidensi lebih tinggi pada penduduk yang tinggal di ketinggian. Pada tahun 1984, Moore dkk melaporkan 32,7% bayi dengan kadar bilirubin serum lebih dari 205 $\mu\text{mol} / \text{L}$ (12 mg / dL).

Kernikterus terjadi pada 1,5 dari 100.000 kelahiran di Amerika Serikat. Kematian dari neonatal jaundice fisiologis sebenarnya tidak harus terjadi. Kematian dari kernikterus dapat terjadi, terutama di negara-negara kurang berkembang sistem perawatan medis. Dalam sebuah penelitian kecil dari pedesaan Nigeria, 31% bayi dengan ikterus klinis diuji memiliki G-6-PD kurang, dan 36% bayi dengan G-6-PD kekurangan meninggal dengan kernikterus diduga dibandingkan dengan hanya 3% dari bayi dengan G-6-PD yang normal skrining hasil tes (Ahmad Riyanto 2015).

Insiden penyakit kuning neonatal meningkat pada bayi dari Asia Timur, Indian, Amerika, dan keturunan Yunani, meskipun yang terakhir tampaknya hanya berlaku untuk bayi yang lahir di Yunani dan dengan demikian mungkin lingkungan bukan etnis di asal. Bayi kulit hitam yang terpengaruh lebih sering dari pada bayi putih. Untuk alasan ini, penyakit kuning yang signifikan dalam

manfaat bayi hitam evaluasi lebih dekat dari kemungkinan penyebab, termasuk G-6-PD kekurangan.

Risiko pengembangan penyakit kuning neonatal signifikan lebih tinggi pada bayi laki-laki. Ini tidak muncul terkait dengan tingkat produksi bilirubin, yang mirip dengan yang ada di bayi perempuan. Risiko penyakit kuning neonatal signifikan berbanding terbalik dengan usia kehamilan (Ahmad Riyanto 2015).

6. Manifestasi Klinis

- a. Ikterus terjadi 24 jam.
- b. Peningkatan konsentrasi bilirubin 5 mg% atau lebih setiap 24 jam.
- c. Konsentrasi bilirubin serum sewaktu 10 mg% pada neonatus kurang bulan dan 12,5 mg% pada neonatus cukup bulan.
- d. Ikterus yang disertai proses hemolisis (inkompabilitas darah, defisiensi enzim G-6-PD (Glukosa 6 Phosphat Dehydrogenase))
- e. Ikterus yang disertai keadaan berikut :
 - 1) Berat lahir kurang dari 2000 gram
 - 2) Masa gestasi kurang dari 36 minggu
 - 3) Infeksi
 - 4) Gangguan pernafasan (Ahmad Riyanto 2015).

7. Pemeriksaan Fisik

Secara klinis, ikterus pada neonatus dapat dilihat segera setelah lahir atau setelah beberapa hari. Amati ikterus pada siang hari dengan lampu sinar yang

cukup. Ikterus akan terlihat lebih jelas dengan sinar lampu dan bisa tidak terlihat dengan penerangan yang kurang, terutama pada neonatus yang berkulit gelap. Penilaian ikterus akan lebih sulit lagi apabila penderita sedang mendapatkan terapi sinar.

Salah satu cara memeriksa derajat kuning pada neonatus secara klinis, mudah dan sederhana adalah dengan penilaian. Caranya dengan jari telunjuk ditekan pada tempat-tempat yang tulangnya menonjol seperti tulang hidung, dada, lutut, dan lain-lain. Tempat yang ditekan akan tampak pucat atau kuning. Waktu timbulnya ikterus mempunyai arti penting pula dalam diagnosis dan penatalaksanaan penderita karena saat timbulnya ikterus mempunyai kaitan erat dengan kemungkinan penyebab ikterus tersebut (Ahmad Riyanto 2015).

8. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan serumbilirubin (bilirubin total dan direk) harus dilakukan pada neonatus yang mengalami ikterus. Terutama pada bayi yang tampak sakit atau bayi-bayi yang tergolong risiko tinggi terserang hiperbilirubinemi berat. Namun pada bayi yang mengalami ikterus berat, lakukan terapi sinar sesegera mungkin, jangan menunda terapi sinar dengan menunggu hasil pemeriksaan kadar serum bilirubin.

‘Transcutaneous bilirubin (TcB)’ dapat digunakan untuk menentukan kadar serum bilirubin total, tanpa harus mengambil sampel darah. Namun alat ini hanya valid untuk kadar bilirubin total $< 1 \text{ mg/dL}$ ($< 257 \text{ } \mu\text{mol/L}$), dan tidak “*reliable*” pada kasus ikterus yang sedang mendapat terapi sinar (Ahmad Riyanto 2015).

Pemeriksaan tambahan yang sering dilakukan untuk evaluasi menentukan penyebab ikterus antara lain :

- a. Golongan darah dan “*Coombs test*”.
- b. Darah lengkap dan hapusan darah.
- c. Hitung retikulosit, skrining G-6-PD.
- d. Bilirubin direk.

Pemeriksaan serum bilirubin total harus diulang setiap 4-24 jam tergantung usia bayi dan tingginya kadar bilirubin. Kadar serum albumin juga perlu diukur untuk menentukan pilihan terapi sinar ataukah tranfusi tukar (Ahmad Riyanto 2015).

C. Hubungan BBLR dengan Kejadian Hiperbilirubinemia

Peningkatan kadar bilirubin tubuh dapat terjadi pada beberapa keadaan. Kejadian yang sering ditemukan adalah apabila terdapat penambahan beban bilirubin pada sel hepar yang terlalu berlebihan. Hal ini dapat ditemukan bila terdapat peningkatan penghancuran eritrosit polisitemia, memendeknya umur eritrosit janin/bayi, meningkatnya bilirubin dari sumber lain, atau terdapatnya peningkatan sirkulasi enterohepatik.

Gangguan ambilan bilirubin plasma juga dapat menimbulkan peningkatan kadar bilirubin tubuh. Hal ini dapat terjadi apabila kadar protein Y berkurang atau pada keadaan protein Y dan protein Z terikat oleh anion lain, misalnya pada bayi dengan asidosis atau dengan anoksia/hipoksia. Keadaan lain yang memperlihatkan peningkatan kadar bilirubin adalah apabila ditemukan gangguan konjugasi hepar (defisiensi enzim glukoronil transferase) atau bayi yang menderita gangguan ekskresi, misalnya penderita hepatitis neonatal atau sumbatan saluran empedu intra/ekstra hepatic. Pada derajat tertentu, bilirubin ini akan bersifat toksik dan merusak jaringan tubuh. Toksisitas ini terutama ditemukan pada bilirubin indirek yang bersifat sukar larut dalam air tapi mudah larut dalam lemak, sifat ini

memungkinkan terjadinya efek patologik pada sel otak apabila bilirubin tadi dapat menembus sawar darah otak. Kelainan yang terjadi pada otak ini disebut kernikterus atau *ensefalopati biliaris*. Pada umumnya dianggap bahwa kelainan pada susunan saraf pusat tersebut mungkin akan timbul apabila kadar bilirubin indirek lebih dari 20 mg/dl. Mudah tidaknya bilirubin melalui sawar darah otak ternyata tidak hanya tergantung dari tingginya kadar bilirubin tetapi tergantung pula pada keadaan neonatus sendiri. Bilirubin indirek akan mudah melalui sawar daerah otak apabila pada bayi terdapat keadaan imaturitas, berat lahir rendah, hipoksia, hiperkarbia, hipoglikemia, dan kelainan susunan saraf pusat yang terjadi karena trauma atau infeksi (Mutianingsih 2012).

D. BBLR dalam Prespektif Islam

BBLR yang terjadi akibat dari hambatan pertumbuhan dapat disebabkan oleh 3 faktor yaitu faktor janin, faktor plasenta, dan faktor maternal akan tetapi terjadinya hambatan pertumbuhan janin ini sering disebabkan oleh multifaktorial (Smitten J, 2011). Untuk faktor ibu ada banyak hal yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya BBLR yaitu penyakit ibu seperti mengalami anemia berat, infeksi selama kehamilan dan hipertensi. Selain penyakit ibu faktor lain yang berpengaruh adalah usia ibu saat hamil <20 tahun atau usia saat melahirkan lebih dari 35 tahun, Kehamilan ganda, jarak kehamilan yang terlalu dekat, perawatan antenatal yang kurang baik serta faktor keadaan sosial ekonomi rendah seperti ibu mengalami gizi kurang (Susilowati, E. 2016). Terpenuhinya kebutuhan gizi merupakan hal yang utama perlu diperhatikan oleh ibu hamil agar terpenuhinya nutrisi baik untuk ibu maupun untuk janin, Allah SWT telah banyak menjelaskan dalam Al-Quran mengenai tentang mengkonsumsi makanan yang baik dan halal sebagai mana dalam firman Allah dalam QS al-Baqarah / 2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”

Berdasarkan tafsir Jalalain (1990) maksud dari ayat diatas bahwa hai sekalian manusia makanlah yang halal apa-apa yang terdapat di muka bumi serta طَيِّبًا (lagi baik) sifat yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah) atau jalan-jalan الشَّيْطَانِ (setan) dan rayuannya إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu) artinya jelas dan permusuhanannya,

Berdasarkan tafsir al-Misbah (2016) maksud ayat tersebut ditujukan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman namun untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan oleh Allah SWT untuk seluruh manusia baik untuk orang yang mukmin maupun yang kafir dan tidak semua yang ada pada dunia otomatis halal untuk dimakan atau digunakan, Allah SWT menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat, adapun burung-burung yang diciptakannya untuk memakan serangga yang merusak tanaman, dengan demikian tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakan untuk dimakan oleh manusia, semua yang diciptakan oleh Allah SWT di permukaan bumi ini bertujuan untuk kepentingan manusia karena itu Allah SWT memerintahkan untuk makan makanan yang halal.

Makanan halal adalah makanan yang tidak dilarang oleh agama, makanan haram terbagi atas dua macam yakni haram karena zatnya seperti daging babi bangkai dan darah sedangkan haram karena sesuatu bukan dari zat nya adalah makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Dengan demikian tidak semua makanan yang halal otomatis baik, halal terbagi 4 macam yakni wajib, sunnah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian, ada

aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai oleh Allah seperti pemutusan hubungan. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal serta baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu dan ada juga yang kurang baik untuknya, tetapi baik buat yang lainnya. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan ayat diatas adalah memakan makanan yang halal lagi baik.

Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan mempunyai jejak langkah yang menjerumuskan manusia, langkah demi langkah, tahap demi tahap, langkah hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan tetapi bila tidak disadari langkah demi langkah tersebut dapat menjerumuskan ke dalam bahaya. Setan pada mulanya hanya mengajak manusia melangkah selangkah tetapi langkah itu disusul dengan langkah lainnya sampai akhirnya masuk ke dalam neraka, hal ini terjadi pada leluhur manusia yakni Nabi Adam as dan pasangannya terpedaya melalui pintu makanan, memang tidak lain ulah tipu daya setan kecuali hanya menyuruh kamu berbuat jahat, yakni perbuatan yang mengotori jiwa yang berdampak buruk, walau tanpa sanksi hukum duniawi seperti berbohong, dengki, angkuh dan juga menyuruh berbuat keji, yakni perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama Islam dan akal sehat.

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir bahwasanya tiada sembah yang hak kecuali Dia dan bahwasanya Dia sendiri yang menciptakan, Dia pun menjelaskan bahwa Dia Maha Pemberi Rezeki bagi seluruh makhluk Nya di dunia. Dia membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi ini yakni makanan yang halal baik dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan

akal pikirannya, dan Allah SWT juga melarang kita mengikuti langkah-langkah dari jalan setan dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya.

Berdasarkan ketiga dari ahli tafsir tersebut memiliki pemahaman yang sama mengenai makna halalan thoyyiban. Dimana kesimpulannya Allah SWT memerintahkan memakan makanan yang baik dan dapat menyehatkan jasmani maupun rohani pada diri manusia.

Allah SWT telah berfirman didalam QS al-Anam / 6:99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا
مُتَرَكِيًّا وَمِنَ النَّحْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

Berdasarkan tafsir al-Misbah (2016) ayat tersebut merupakan lanjutan bukti-bukti kemaha kuasa Allah SWT, agar manusia memandang sekelilingnya supaya dapat sampai pada kesimpulan bahwa Allah SWT merupakan maha kuasa, yang dipaparkan untuk diamati pada ayat ini, yakni hal tentang di bumi seperti pertumbuhan biji atau benih, yang berkaitan dengan langit seperti matahari dan bulan serta dampak peredarannya yang menghasilkan antara lain siang dan malam, selanjutnya dipaparkan juga tentang manusia, asal-usul dan keadilannya di bumi. Ayat ini menguraikan kumpulan hal-hal yang disebut pada ayat tersebut, dengan menegaskan bahwa Allah SWT juga yang telah menurunkan air dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu Allah SWT yang mengeluarkan yakni menumbuhkan tumbuhan disebabkan olehnya, yakni akibat turun air itu, segala macam tumbuhan-tumbuhan, maka kami keluarkan darinya, yakni tanaman yang menghijau.

Untuk menjelaskan kekuasaan-Nya ditegaskan lebih jauh bahwa, kami keluarkan darinya, yakni tanaman yang menghijau itu, butir yang saling bertumpuk, yakni banyak, padahal sebelumnya itu hanya satu biji atau atau benih.

Dalam ayat ini kitab *al-Muntakhab fi at-Tafsir* yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa ayat tentang tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase sampai pada fase kematangan buah, pada saat buah tersebut matang maka ia akan mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat dan tepung, terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada pohon berwarna hijau terus terutama pada daun dan itu ibarat pabrik pengolah komposisi zat-zat tadi untuk didistribusikan ke bagian-bagian pohon yang lainnya termasuk biji dan buah, lebih dari itu ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah, sedangkan matahari adalah sumber kehidupan tetapi hanya tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantara klorofil dan kemudian menyerahkan kepada manusia dan hewan dalam bentuk bahan makanan organik yang dibentuknya.

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir yakni sebagaimana Firman-Nya: *وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ* (“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit.”) maksudnya dengan kadarnya tertentu yang menjadi berkah dan rizki bagi makhluk, serta sebagai rahmat Allah bagi seluruh makhluk-Nya.

فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا (“Lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.”) Yaitu, tanaman-tanaman dan pepohonan yang hijau, dan setelah itu kami menciptakan di dalamnya biji-bijian dan buah-buahan.

Oleh karena itu Allah berfirman: *نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا* (“Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang tersusun”) maksudnya tersusun antara satu dengan yang lainnya, seperti bulir [misalnya pada padi], dan yang lainnya.

وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ (“Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai”) kata “*qinwaanun*” merupakan jamak dari kata “*قِنْوَانٌ*” yang berarti

tandan kurma, *دَانِيَّةٌ* (“yang menjulai”) maksudnya mudah dipetik bagi yang memetiknya.


Firmannya lebih lanjut: *وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ* (“Dan kebun-kebun anggur”) Maksudnya, Kami juga mengeluarkan darinya kebun-kebun anggur. Kedua jenis buah itu (anggur dan kurma) merupakan jenis yang paling berharga bagi penduduk Hijaz, bahkan mungkin merupakan dua jenis buah terbaik di dunia.

Firmannya lebih lanjut: *وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُنْتَابِغٍ* (“Dan kami keluarkan Pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa”) menurut para ulama lainnya mengatakan: “Yaitu kesamaan dalam daun dan bentuk, di mana masing-masing saling berdekatan, tetapi mempunyai perbedaan pada buahnya, baik bentuk, rasa, maupun sifatnya.”

Firmannya *انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ* (“Perhatikanlah buahnya pada waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pulalah kematangannya”) *al-Barra' bin 'Azib, Ibnu 'Abbas, adh-Dhahhak, 'Atha' al-Khurasani, al-Suddi* dan para ulama lainnya mengatakan: “Maksudnya, pikirkanlah kekuasaan Penciptanya, dari tidak ada menjadi ada, setelah sebelumnya berupa sebuah kayu (pohon), kemudian menjadi anggur dan kurma dan lain sebagainya, dari berbagai ciptaan Allah berupa berbagai warna, bentuk, rasa, dan aroma.”


Oleh karena itu, di sini Allah berfirman: *إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ* (“*Sesungguhnya pada yang demikian itu*”), hai sekalian umat manusia. *لَآيَاتٍ* (“ada tanda-tanda”) yaitu bukti-bukti kesempurnaan kekuasaan Penciptanya, hikmah, dan rahmatnya. *لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ* (“Bagi orang-orang yang beriman”) Maksudnya, mereka yang membenarkannya dan mengikuti para Rasulnya.

E. Kerangka Teori




F. Kerangka konsep

Kerangka kerja konseptual dalam suatu penelitian adalah kerangka kerja yang menghubungkan konsep-konsep yang akan diteliti atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2010).



Keterangan :



: Variabel Dependen



: Variabel Independen

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dimana peneliti hanya melakukan observasi terhadap objek yang diteliti tanpa melakukan perlakuan dengan pendekatan *cross sectional* dimana data yang diambil secara bersamaan baik untuk data variabel dependen maupun independent (Notoatmodjo, 2010).

B. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh neonatus dengan kasus BBLR dan hiperbilirubinemia yang dirawat di ruang perinatologi rumah sakit terkait (Notoatmodjo, 2010).

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yakni *Purposive sampling*, sampel yang diambil adalah sampel yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini (Notoatmodjo, 2010).

C. *Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi*

1. Kriteria Inklusi

- a. Bayi dengan berat badan normal (>2500 gram) atau berat badan lahir rendah (<2500 gram)
- b. Bayi dengan kadar bilirubin normal (<10 mg/dL) atau hiperbilirubinemia (≥ 10 mg/dL)
- c. Bayi usia gestasi <37 minggu atau > 37 minggu.
- d. Data rekam medik dan hasil laboratorium bilirubin yang lengkap.

2. Kriteria Eksklusi

- a. Bayi yang memiliki kelainan konginetal.
- b. Gemeli.
- c. Data rekam medik tidak lengkap sesuai komponen yang dibutuhkan.

D. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa rumah sakit di Kota Makassar sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Provinsi Haji Makassar
- b. Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar

2. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober 2019 – Januari 2020.

E. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan pada penelitian berjumlah 2 variabel yakni variabel dependen dan variabel independent sebagai berikut :

1. Variabel independent

Variabel independent merupakan variabel stimulus, dimana variabel ini mempengaruhi variabel lainnya (Notoatmodjo, 2010). Variabel independent dari penelitian ini adalah Berat Badan Lahir Rendah.

2. Variabel dependen

Variabel dependent merupakan variabel *output*, dimana variabel ini menjadi akibat dari variabel independent/stimulus (Notoatmodjo, 2010). Variabel independent dari penelitian ini adalah neonatus dengan hiperbilirubinemia.

F. Pengumpulan data dan cara penelitian

1. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data rekam medik (data sekunder) Januari – Desember 2018 pada kasus bayi berat lahir rendah, berat badan lahir normal dan ikterus neonatorum sebagai instrument penelitian ini yang pernah dirawat ruangan perinatologi rumah sakit terkait

2. Cara Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan etik penelitian dari fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan dengan nomor E.22/KEPK/FKIK/I/2020.

Peneliti mengumpulkan data rekam medik (data sekunder) dari rumah sakit terkait yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini lalu peneliti mengolah data sekunder tersebut.

G. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas :

- 1) *Editing*, memeriksa kembali formulir data dan memeriksa kembali data yang dikumpulkan apakah sudah lengkap, jelas dibaca, tidak diragukan, ada kesalahan atau tidak dan sebagainya.
- 2) *Coding*, menerjemahkan data yang dikumpulkan selama penelitian menjadi symbol yang cocok untuk tujuan analitis.
- 3) *Data Entry*, memasukkan data ke computer dan aplikasi SPSS
- 4) *Verivication*, inspeksi visual terhadap data yang telah dimasukkan ke komputer
- 5) *Output*, hasil analisis yang dilakukan oleh komputer kemudian dicetak.

H. Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan diagram disertai penjelasan serta disusun dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Pengolahan data dilakukan setelah pencatatan rekam medik dan datanya diolah menggunakan program computer *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Adapun data yang dianalisis sebagai berikut :

1. Data Univarian

Pada data univarian peneliti ingin mengetahui insidensi terjadi BBLR dan ikterus neonatorum di rumah sakit terkait.

2. Data Bivarian

Pada analisis ini peneliti menggunakan uji korelasi person *chi-square* dimana uji ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat korelasi antara variabel dikatakan terdapat korelasi jika didapatkan *p-value* ($<0,005$).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Haji Makassar dan RSIA Ananda Makassar pada bulan Oktober 2019 – Januari 2020. Pengumpulan data diperoleh dari catatan rekam medik ibu hamil berupa berat badan bayi baru lahir (berat badan normal maupun berat badan lahir rendah) dan kadar bilirubin neonatus yang diukur 24 jam pertama post partum.

Data diperoleh sebanyak 400 data rekam medik ibu hamil yang tiap rumah sakit menagmbil sampel sebesar 200 sampel. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan software IBM SPSS Statistik 23 sesuai dengan tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk table lengkap sebagai berikut.

Table 4.1 Distribusi Data Berdasarkan Karakteristik Data Rekam Medik RSUD Haji Makassar

Karakteristik	N	%
Berat Badan (gram)		
BBLR (< 2500)	90	45
BBLN (\geq 2500)	110	55
Kadar Bilirubin		
Fisiologis (<10 mg/dL)	141	70,5
Hiperbilirubinemia (\geq 10 mg/dL)	59	29,5

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel tersebut bahwa ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Haji Makassar pada Tahun 2018 didapatkan sebanyak 90 bayi (45%) dengan berat badan lahir rendah dan 110 bayi (55%) dengan berat badan lahir normal serta

dari hasil pemeriksaan kadar bilirubin neonatus didapatkan sebanyak 141 bayi (70,5%) dengan kadar bilirubin normal (<10mg/dL) dan 59 bayi (29,5%) mengalami hiperbilirubinemia.

Table 4.2 Distribusi Data Berdasarkan Karakteristik Data Rekam Medik Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar

Karakteristik	N	%
Berat Badan (gram)		
BBLR (< 2500)	97	48,5
BBLN (\geq 2500)	103	51,5
Kadar Bilirubin		
Fisiologis (<10 mg/dL)	163	81,5
Hiperbilirubinemia (\geq 10 mg/dL)	37	18,5

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel tersebut bahwa ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Haji Makassar pada Tahun 2018 didapatkan sebanyak 97 bayi (48,5%) dengan berat badan lahir rendah dan 103 bayi (51,5%) dengan berat badan lahir normal serta dari hasil pemeriksaan kadar bilirubin neonatus didapatkan sebanyak 163 bayi (81,5%) dengan kadar bilirubin normal (<10mg/dL) dan 37 bayi (18,5%) mengalami hiperbilirubinemia.

Tabel 4.3 Analisis Hubungan BBLR dengan Hiperbilirubinemia pada Bayi Baru Lahir di RSUD Haji Makassar

Variabel	Bilirubin				<i>p-value</i>
	Fisiologis (<10 mg/dL)		Hiperbilirubinemia (\geq 10 mg/dL)		
	N	%	N	%	
BBLR (<2500 gram)	40	20	50	25	0,000
BBLN (\geq 2500 gram)	101	50,5	9	4,5	

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabulasi tabel diatas didapatkan bahwa bayi yang memiliki kadar bilirubin berlebih (hiperbilirubinemia) pada bayi yang mengalami BBLR berjumlah 50 bayi (25%) dan bayi BBLN berjumlah 9 bayi (4,5%) sedangkan bayi yang memiliki kadar bilirubin fisiologis dengan BBLR berjumlah 101 bayi (50,5%) dan bayi BBLN berjumlah 9 bayi (4,5%).

Uji person chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika $p\text{-value} < 0,005$. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value} 0,000$ yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara berat badan lahir rendah dengan kejadian hiperbilirubinemia.

Tabel 4.4 Analisis Hubungan BBLR dengan Hiperbilirubinemia pada Bayi Baru Lahir RSIA Ananda Makassar

Variabel	Bilirubin				$p\text{-value}$
	Fisiologis (<10 mg/dL)		Hiperbilirubinemia (≥ 10 mg/dL)		
	N	%	N	%	
BBLR (<2500 gram)	66	33	31	15,5	0,000
BBLN (≥ 2500 gram)	163	81,5	6	3	

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabulasi tabel diatas didapatkan bahwa bayi yang memiliki kadar bilirubin berlebih (hiperbilirubinemia) pada bayi yang mengalami BBLR berjumlah 31 bayi (15,5%) dan bayi BBLN berjumlah 6 bayi (6%) sedangkan bayi yang memiliki kadar bilirubin fisiologis dengan BBLR berjumlah 66 bayi (33%) dan bayi BBLN berjumlah 163 bayi (81,5%).

Uji person chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika $p\text{-value} < 0,005$. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value} 0,000$ yang

berarti terdapat korelasi yang signifikan antara berat badan lahir rendah dengan kejadian hiperbilirubinemia.

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil dari kedua rumah sakit mengenai hubungan berat badan lahir rendah dengan kejadian hiperbilirubinemia terdapat korelasi yang signifikan, dimana dari uji person chi-square didapatkan *p-value* (0,000) dimana dikatakan signifikan apabila *p-value* ($<0,005$), dan penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Alfi Hidayati (2017) dalam penelitiannya berjudul” Hubungan Usia Gestasi Dengan Kejadian Hiperbilirubinemia Pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah di RSUD Wonosari” dengan jumlah sampel 70 responden dengan cara pengumpulannya melalui data rekam medik, hasil uji *chi square* didapatkan nilai (*p-value* = 0.016) berarti terdapat hubungan bermakna kejadian berat badan lahir rendah dengan hiperbilirubinemia. Insidensi BBLR dengan hiperbilirubinemia dapat terjadi akibat pada bayi dengan kondisi BBLR memiliki fungsional organ dan maturasi sel belum sempurna, khususnya hepatosit yang berfungsi dalam transpot bilirubin tak terkonjugasi menjadi bilirubin terkonjugasi sehingga bilirubin tak terkonjugasi menumpul dalam plasma dan beredar keseluruh tubuh. Kejadian hiperbilirubinemia bukan hanya disebabkan oleh satu faktor namun multifaktorial seperti faktor ibu meliputi usia gestasi, gravida ibu, golongan darah ibu dan jenis persalinan sedangkan faktor bayi seperti berat badan lahir, golongan darah bayi, lingkaran badan, lingkaran kepala dan lingkaran dada, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Faktor maternal

a) Usia ibu

Menurut The American Academy of Pediatrics (AAP), salah satu faktor risiko terjadinya hiperbilirubinemia adalah usia ibu ≥ 25

tahun. Begitu pula pada penelitian randomized controlled trial oleh Scrafford et al (2013) dengan analisis *poisson regression* didapatkan hasil p yang paling berpengaruh terhadap kejadian hiperbilirubinemia adalah usia ibu 25-29,9 tahun.⁷ Dan pada penelitian case control oleh Zhang et al (2016) dengan *polynomial regression* menunjukkan bahwa usia ibu berpengaruh terhadap kejadian hiperbilirubinemia dimana tertinggi pada usia 26 tahun.

b) Usia gestasi

Usia kehamilan preterm (<37 minggu) lebih berisiko menyebabkan hiperbilirubinemia dibandingkan usia aterm (>37 minggu), hal ini disebabkan karena pada usia gestasi preterm pertumbuhan organ tubuh bayi belum berfungsi secara sempurna, oleh karena itu bayi dengan usia preterm banyak mengalami kesulitan untuk hidup diluar Rahim ibu dan semakin mudah terjadinya komplikasi serta mortalitas, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2016) dengan jumlah responden sebanyak 125 responden didapatkan hasil uji chi-square antara usia gestasi dengan hiperbilirubinemia (0,001) yang berakna terdapat korelasi signifikan antara usia gestasi dengan hiperbilirubinemia.

c) Golongan darah ibu

Proses peningkatan bilirubin pada bayi dapat disebabkan karena perbedaan golongan darah antara bayi dengan ibunya. Dari sekian jenis golongan darah, perempuan bergolongan darah O paling beresiko melahirkan bayi dengan hiperbilirubinemia level akut. Jika golongan darah ibunya O, sementara anaknya non O, maka di dalam badan darah ibunya sudah membentuk anti O. Anti O itu

yang menghancurkan sel darah merah bayi. Kondisi ini yang mengakibatkan terjadinya hiperbilirubinemia. Hasil penelitian dilakukan oleh Hidayati (2016) menunjukkan bahwa kejadian hiperbilirubin sering terjadi pada bayi yang bergolongan darah O sebanyak 66 bayi (57,4 %), sedangkan yang bergolongan darah A, B dan AB sebesar 49 bayi (42,6 %). Uji statistik diperoleh nilai *p-value* 0,813 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara golongan darah bayi dengan kejadian hiperbilirubin dan dari hasil analisis diperoleh pula nilai $OR = 0.867$ (95% CI)=(0.340-2,207).

d) Jenis persalinan

Bayi yang dilahirkan secara ekstraksi *vacum* dan ekstraksi mempunyai kecenderungan terjadinya perdarahan tertutup dikepala, seperti *caput sudccdenaum* dan *cepalhematoma* yang merupakan faktor risiko terjadinya hiperbilirubinemia pada bayi. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2016) di RSUD Kota Bandung, Jawa Barat yang menemukan bahwa kejadian hiperbilirubin terbanyak di jenis persalinan ekstraksi *vacum* yaitu sebesar 13,0%. Uji statistik diperoleh nilai *p-value* 0,485 dengan $OR = 1.441$ (95% CI)=(0.552-3.763), artinya tidak ada hubungan antara jenis persalinan dengan kejadian hiperbilirubinemia.

2. Faktor bayi

a) Berat badan lahir

hiperbilirubin terjadi pada bayi berat badan lahir rendah karena fungsi hepar yang belum matang atau terdapat gangguan fungsi hepar seperti hipoksia, hipoglikemi, asidosis, dan lain-lain

sehingga mengakibatkan kadar bilirubin meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh menunjukkan BBLN (≥ 2500 gram) memiliki angka terbesar pada 89 bayi (77,4%), sedangkan BBLR (< 2500 gram) 26 bayi (22,6%) Hal ini sejalan dengan teori, Uji statistik diperoleh nilai p value 0.001 maka dapat disimpulkan ada hubungan antara Berat Badan Lahir dengan hipernilirubinemia.



b) Golongan darah bayi

Proses peningkatan bilirubin pada bayi dapat disebabkan karena perbedaan golongan darah antara bayi dengan ibunya. Dari sekian jenis golongan darah, perempuan bergolongan darah O paling beresiko melahirkan bayi dengan hiperbilirubinemia level akut. Jika golongan darah ibunya O, sementara anaknya non O, maka di dalam badan darah ibunya sudah membentuk anti O. Anti O itu yang menghancurkan sel darah merah bayi. Kondisi ini yang mengakibatkan terjadinya hiperbilirubinemia. Hasil penelitian dilakukan oleh Hidayati (2016) menunjukkan bahwa kejadian hiperbilirubin sering terjadi pada bayi yang bergolongan darah O sebanyak 66 bayi (57,4 %), sedangkan yang bergolongan darah A, B dan AB sebesar 49 bayi (42,6 %). Uji statistik diperoleh nilai p-value 0,813 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara golongan darah bayi dengan kejadian hiperbilirubin dan dari hasil analisis diperoleh pula nilai $OR = 0.867$ (95% CI)=(0.340-2,207).

c) Pemberian ASI

Menurut The American Academy of Pediatrics (AAP), salah satu faktor risiko terjadinya hiperbilirubinemia adalah ASI. Begitu pula pada teori lain yang mengatakan adanya ikterus yang berhubungan dengan pemberian ASI yaitu breast-feeding jaundice dan breast milk jaundice dimana pada penelitian ini tidak disertakan penyebab dari pengaruh ASI terhadap hiperbilirubinemia. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian cohort oleh Huang et al (2004) dengan regresi logistik menyatakan adanya pengaruh pemberian ASI terhadap hiperbilirubinemia dengan p sebesar $<0,001$. Berdasarkan

tabel distribusi faktor risiko air susu ibu didominasi oleh pemberian ASI pada kelompok kasus dan non ASI pada kelompok kontrol. Setelah di analisis secara bivariat, hasil p value faktor risiko ASI didapatkan sebesar 0,001 dengan odds ratio sebesar 5,25. Karena $p < 0,25$ maka dilakukan analisis multivariat dimana didapatkan hasil p value multivariat sebesar 0,000 dengan odds ratio 7,170 dan IK 2,427-21,181. Hasil *p value multivariat* dengan nilai $< 0,05$ ini menunjukkan adanya pengaruh faktor risiko ASI terhadap kejadian hiperbilirubinemia.

Allah dalam QS al-Baqarah / 2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”

Tafsir Jalalain (1990) maksud dari ayat diatas bahwa hai sekalian manusia makanlah yang halal apa-apa yang terdapat di muka bumi serta طَيِّبًا (lagi baik) sifat yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah) atau jalan-jalan الشَّيْطَانِ (setan) dan rayuannya إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu) artinya jelas dan permusuhannya, ayat diatas menjelaskan kepada kita agar memakan makanan yang ada pada permukaan bumi yang halal serta baik.

Berdasarkan tafsir Al Misbah (2016) maksud ayat tersebut ditujukan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman namun untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan oleh Allah SWT untuk seluruh manusia baik untuk orang yang mukmin maupun yang kafir dan tidak semua yang ada pada dunia otomatis halal untuk dimakan atau digunakan, Allah

SWT menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan tetapi antara lain untuk digunakan biasanya sebagai obat, adapun burung-burung yang diciptakannya untuk memakan serangga yang merusak tanaman, dengan demikian tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakan untuk dimakan oleh manusia, semua yang diciptakan oleh Allah SWT di permukaan bumi ini bertujuan untuk kepentingan manusia karena itu Allah SWT memerintahkan untuk makan makanan yang halal.

Makanan halal adalah makanan yang tidak dilarang oleh agama, makanan haram terbagi atas dua macam yakni haram karena zatnya seperti daging babi bangkai dan darah sedangkan haram karena sesuatu bukan dari zat nya adalah makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Dengan demikian tidak semua makanan yang halal otomatis baik, halal terbagi 4 macam yakni wajib, sunnah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian, ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai oleh Allah seperti pemutusan hubungan. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. ada yang halal serta baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu dan ada juga yang kurang baik untuknya, tetapi baik buat yang lainnya. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan ayat diatas adalah memakan makanan yang halal lagi baik.

Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan mempunyai jejak langkah yang menjerumuskan manusia, langkah demi langkah, tahap demi tahap, langkah hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan tetapi bila tidak disadari langkah demi langkah tersebut dapat menjerumuskan ke dalam bahaya. Setan pada mulanya

hanya mengajak manusia melangkah selangkah tetapi langkah itu disusul dengan langkah lainnya sampai akhirnya masuk ke dalam neraka, hal ini terjadi pada leluhur manusia yakni Nabi Adam as dan pasangannya terpedaya melalui pintu makanan, memang tidak lain ulah tipu daya setan kecuali hanya menyuruh kamu berbuat jahat, yakni perbuatan yang mengotori jiwa yang berdampak buruk, walau tanpa sanksi hukum duniawi seperti berbohong, dengki, angkuh dan juga menyuruh berbuat keji, yakni perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama Islam dan akal sehat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan berat badan lahir rendah (BBLR) dengan kejadian hiperbilirubinemia. Hal ini sesuai dengan firman Allah bahwa Allah memerintahkan manusia memakan makan yang baik serta halal sebagai bentuk pemenuhan gizi ibu dan bayi.

Hasil analisis dan pembahasana sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data dari RSUD Haji Makassar tahun 2018 didapatkan Kejadian berat badan lahir normal (>2500 gram) sebanyak 110 bayi (53%) sedangkan bayi dengan berat badan lahir rendah (<2500 gram) sebanyak 90 bayi (45%),
2. Berdasarkan data dari RSIA Ananda Makassar tahun 2018 didapatkan Kejadian berat badan lahir normal (>2500 gram) sebanyak 103 bayi (51,5%) sedangkan bayi dengan berat badan lahir rendah (<2500 gram) sebanyak 97 bayi (48,5%),
3. Berdasarkan data Hasil pemeriksaan kadar bilirubin di RSUD Haji Makassar tahun 2018 didapatkan bayi dengan kadar bilirubin normal (<10 mg/dL) sebanyak 141 bayi (70,5%) dan bayi dengan hiperbilirubinemia (≥ 10 mg/dL) sebanyak 59 bayi (29,5%).
4. Berdasarkan data Hasil pemeriksaan kadar bilirubin di RSIA Ananda Makassar tahun 2018 didapatkan bayi dengan kadar bilirubin normal (<10 mg/dL) sebanyak 163 bayi (81,5%) dan bayi dengan hiperbilirubinemia (≥ 10 mg/dL) sebanyak 37 bayi (18,5%).

5. Hasil uji chi square didapatkan p-value (0,000) yang berarti didapatkan hubungan signifikan berat badan lahir dengan hiperbilirubinemia di beberapa rumah sakit di kota makassar tahun 2018.

B. *Saran*

1. Bagi bidan

Hasil penelitian ini, bidan disarankan agar melakukan pemeriksaan kadar bilirubin segera setelah kelahiran khususnya pada bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah atau dengan bayi yang memiliki gejala klinis berwarna kekuningan pada kulit dan skelera bayi baru lahir.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan dapat mengukur secara langsung kadar bilirubin serta menimbang langsung bayi baru lahir agar didapatkan hasil yang lebih akurat.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi sumber data dan dapat melakukan penelitian ulang dengan lebih baik dari segi materi, teknis dan desain penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul karim, 2016. al-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta : PT Toha Putera.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin ishaq al-sheikh,Dr. 2005. *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsir*, Jakarta : Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo
- Alfi Hidayati, Dr.Yuni Kusmiyati,S.St.,M.Ph;Murni S.Sit.,S.Pd.,M.Sc, 2017, berjudul Hubungan Usia Gestasi Dengan Kejadian Hiperbilirubinemia Pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah di RSUD Wonosari, Yogyakarta : Universitas Gadjja Mada.
- Arda Darmi. 2015. Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Di Ruang PNC RSUD Kota Makassar. JIK.SH: 2(1). Diakses Pada 23 Juli 2019 (Hartiningrum, I. 2018).
- Barrett Ke, Barman Sm, Boitano S, Brooks H. Ganong's. 2015. Review Of Medical Physiology. 25th Edition. Jakarta: Mcgraw Hill Professional.
- Dinkes Kota Makassar. 2016 "Profil Kesehatan Kota Makassar", Jakarta : Kementrian Republik Indonesia
- Dinkes. 2014 "Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2014", Jakarta : Kementrian Republik Indonesia
- Dinkes. 2016 "Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2015" Jakarta : Kementrian Republik Indonesia
- Fajriana Amima, Annas Buanasita, 2018. Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Di Kecamatan Semampir Surabaya. Media Gizi Indonesia: 13(1). Diakses Pada 23 Juli 2019 (Smitten, J, 2011).

- Hartiningrum Indri, Nurul Fitriyah , 2018. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2016. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*: 7(2)
- Garosi E, Mohammadi F, Ranjkesh F. The Relationship between Neonatal Jaundice and Maternal and Neonatal Factors. *Iranian Journal of Neonatology*. 2016.
- Scrafford CG, Mullany LC, Katz J, Khatry SK, LeClerq SC, Darmstadt GL, et al. Incidence of and Risk Factors for Neonatal Jaundice among Newborns in Southern Nepal. *Topical Medicine and International Health*. 2013
- Heirwegh Kpm, Brown. 2018. "Bilirubin Metabolism."
- Ika Susilowati, Anjarwati. 2010. "Hubungan Berat Bayi Lahir Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Pada Bayi Baru Lahir Di RSUD Senopati Bantul"
- Imam jalalud-din Al-Mahalliy, 1990 "Tafsir Jalalain" Jakarta : Sinar Baru Bandung
- Kemenkes. 2016. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016, Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
- Latifah, Lulu. 2017. "Hubungan Antara Bayi Berat Lahir Rendah Dengan Kejadian Ikterus Di Rumah Sakit Umum Daerah Soreang"
- M Quraish Shihab, 2010. Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. 7, Jakarta : Lentera Hati Media
- Mahayana SAS, Chundrayett E, Yulistini. 2015. Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di RSUP Dr.M.Djamil Padang. *Jurnal Ke-sehatan Andalas* 4(3):664-673.
- Murray Rk, Granner Dk, Rodwell Vw. 2015. Biokimia Harper. 27th Edition. . London: Mcgraw Hill Company.

- Nursusila, Ruslan M., La Ode Ali I. A. 2017. Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016.
- Pranoto Heni Hirawati, Hapsari Hindayanti. 2018. Efektivitas Metode Kantong Plastik Dalam Pencegahan Hipotermi Pada BBLR Di Kabupaten Semarang. *Indonesian Journal Of Midwivery*: 1(1). Diakses Pada 14 April 2019 (Prawirohardjo, S. 2008).
- Prawirohardjo Sarwono. 2008. Ilmu Kebidanan. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Proverawati Atika Dan Cahyo Ismawati. 2010. Berat Badan Lahir Rendah. Yogyakarta: Nuha Media.
- Puspita, Ndaru. 2018. "Pengaruh Berat Badan Lahir Rendah Terhadap Kejadian Ikterus Neonatorum Di Sidoarjo"
- Rakhmi Rafie, Ambar Nopiyanti. 2016. "Pengaruh Berat Badan Lahir Rendah Terhadap Ikterusneonatorum Pada Neonatus Di Ruang Perinatologi Rsud Karawang Provinsi Jawa Barat"
- Reisa Maulidya Tazami, Mustarim, Shalahudden Syah. 2013. "Gambaran Faktor Risiko Ikterus Neonatorum Pada Neonatus Di Ruang Perinatologi Rsud Raden Mattaher Jambi"
- Annisa, R. (2018). Hubungan Berat Badan Lahir Rendah Dengan Kejadian Hiperbilirubin Pada Bayi Di Ruang Perinatologi RSUD Arjawinangun. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(2). Retrieved from <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JIK/article/view/280>Saputra,
- Perlman JM, Volpe JJ. Bilirubin. In. 2017. "Volpe's Neurology of the Newborn."

Reza Gusni. 2016. "Perbedaan Kejadian Ikterus Neonatorum Antara Bayi Prematur Dan Bayi Cukup Bulan Pada Bayi Dengan Berat Lahir Rendah Di Rs Pku Muhammadiyah Surakarta"

Septa Wira, Darmawan MTS. 2011. Faktor Resiko Bayi Berat Badan Lahir Rendah Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2010. Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia: 3(8). Diakses Pada 14 April 2019

Stevry Mathindas, Rocky Wilar, Audrey Wahani. 2013. "Hiperbilirubinemia Pada Neonatus"

Susilowati Enny, Dkk. 2016. Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah Pada Neonatus Yang Dirawat Di RSUP Prof. R. D. Kandous Periode Januari 2015 – Juli 2016. Jurnal E-Clinic: 4(2). Diakses Pada 23 Juli 2019 (Anggraini. 2014).

Wolkoff, Alan W. 2015. "Bilirubin Metabolism And Jaundice. In Gastrointestinal Anatomy And Physiology"

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat izin penelitian dari**
- 2. Surat izin penelitian dari UIN Alauddin Makassar.**
- 3. Surat izin penelitian dari instansi terkait.**
- 4. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari instansi terkait.**
- 5. Master Tabel.**
- 6. Hasil Output SPSS.**
- 7. Biodata Peneliti.1**





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 5. Master Tabel

Data RSUD Haji Makassar Tahun 2018 Hubungan Berat Badan Lahir Rendah Dengan Hiperbilirubinemia Di Rumah Sakit Wilayah Kota Makassar

No	No.RM	berat Badan	kode	kadar bilirubin	kode	keterangan
1	112.41.35	2000	1	7,1	1	kategori berat badan
2	112.42.03	1800	1	6	1	1 BBLR (<2500 gram)
3	112.42.15	2400	1	6,8	1	2 BBLN (>2500 gram)
4	112.42.25	1700	1	8	1	kategori Kadar Bilirubin
5	112.42. 50	2400	1	8,3	1	1 fisiologis (<10mg/dL)
6	112.42.79	2350	1	9,2	1	2 Hiperbilirubinemia (>10mg/dL)
7	112.43.04	1850	1	7,2	1	
8	112.43.27	2000	1	7,5	1	
9	112.43.29	2200	1	7,7	1	
10	112.43.77	2250	1	6,7	1	
11	112.44.29	1700	1	8,3	1	
12	112.44.25	2300	1	7,5	1	
13	112.44.30	2100	1	9,4	1	
14	112.44.31	1500	1	8,5	1	
15	112.44.32	2300	1	7,2	1	
16	112.44.35	2250	1	8,5	1	
17	112.44.96	1800	1	9,2	1	
18	112.45.21	1950	1	7,4	1	
19	112.45.24	2300	1	8	1	
20	112.45.37	2100	1	9,1	1	
21	112.45.45	1450	1	8,2	1	
22	112.46.03	1250	1	6,1	1	
23	112.46.35	2100	1	7,3	1	
24	112.46.36	1750	1	8,1	1	
25	112.80.05	2400	1	8,5	1	
26	112.80.10	2000	1	7,7	1	
27	112.80.12	1500	1	7,2	1	
28	112.81.10	2000	1	8,5	1	
29	112.81.12	1500	1	9,4	1	
30	112.81.45	2100	1	8,5	1	
31	112.81.50	2450	1	9	1	
32	112.81.52	1500	1	9,3	1	
33	112.82.41	2250	1	18	2	
34	112.82.28	2400	1	19,8	2	
35	112.82.70	1000	1	16,6	2	

36	112.84.38	1650	1	19,5	2	
37	112.84.50	1800	1	19,4	2	
38	112.84.53	2100	1	16,3	2	
39	112.84.59	2300	1	17,5	2	
40	112.85.60	1450	1	18	2	
41	112.86.45	1800	1	18,7	2	
42	112.86.93	1250	1	17,1	2	
43	112.86.95	1400	1	16,7	2	
44	112.91.02	1850	1	16,6	2	
45	112.91.10	2400	1	12,5	2	kategori berat badan
46	112.91.12	2400	1	12,2	2	1 BBLR (<2500 gram)
47	112.91.15	2300	1	18,9	2	2 BBLN (>2500 gram)
48	112.91.49	1400	1	16,3	2	kategori Kadar Bilirubin
49	112.93.30	1550	1	17,4	2	1 fisiologis (<10mg/dL)
50	112.93.31	2400	1	19	2	2 Hiperbilirubinemia (>10mg/dL)
51	112.93.27	2200	1	18,6	2	
52	112.93.28	2050	1	17,5	2	
53	112.93.12	1700	1	17,1	2	
54	112.93.10	2400	1	16,5	2	
55	112.95.06	2450	1	19,3	2	
56	112.95.09	2350	1	18	2	
57	112.95.12	2100	1	16,1	2	
58	112.95.14	2050	1	19,1	2	
59	112.95.15	1900	1	17,4	2	
60	112.98.40	1200	1	17,2	2	
61	112.98.43	1800	1	18,8	2	
62	112.98.48	1750	1	17,5	2	
63	112.98.55	2350	1	16,3	2	
64	112.99.80	2300	1	17,9	2	
65	112.99.89	2150	1	18	2	
66	112.99.90	2150	1	16,4	2	
67	112.99.92	2200	1	17,4	2	
68	112.99.99	2300	1	19	2	
69	113.00.01	2200	1	19,7	2	
70	113.00.07	1700	1	18,2	2	
71	113.00.43	1850	1	22,7	2	
72	113.00.45	2400	1	17	2	
73	113.00.85	2400	1	14	2	
74	113.00.87	2200	1	16,8	2	
75	113.01.88	1700	1	15	2	
76	113.01.19	2300	1	17,7	2	

77	113.01.21	2200	1	17,9	2	
78	113.01.39	2300	1	18,1	2	
79	113.01.60	1950	1	18,4	2	
80	113.03.18	2150	1	16	2	
81	113.03.82	2250	1	19,5	2	
82	113.03.13	1900	1	17,9	2	
83	113.03.89	2050	1	17,3	2	
84	113.02.60	2200	1	18,1	2	
85	113.02.27	1850	1	19,4	2	
86	113.02.47	2300	1	18,5	2	
87	113.02.90	2100	1	18,4	2	
88	113.04.01	1500	1	17,2	2	
89	113.04.22	2300	1	12,5	2	
90	113.04.07	2250	1	15,8	c	
91	113.04.53	3780	2	6,4	1	
92	113.05.38	3100	2	9,2	1	
93	113.05.39	3150	2	6,1	1	
94	113.05.62	3100	2	7,3	1	
95	113.05.58	3400	2	8,5	1	
96	113.06.39	3550	2	9,1	1	
97	113.06.02	3450	2	7,7	1	
98	113.06.68	3100	2	9,2	1	
99	113.06.98	3250	2	7,2	1	kategori berat badan
100	113.07.37	3250	2	6,2	1	1 BBLR (<2500 gram)
101	113.07.38	3300	2	6,5	1	2 BBLN (>2500 gram)
102	113.07.40	2700	2	8,2	1	kategori Kadar Bilirubin
103	113.07.64	2800	2	9,8	1	1 fisiologis (<10mg/dL)
104	113.09.99	2950	2	9,5	1	2 Hiperbilirubinemia (>10mg/dL)
105	113.09.85	3500	2	8,3	1	
106	113.09.20	3200	2	7,3	1	
107	113.09.83	3250	2	6,7	1	
108	113.09.22	3100	2	6,7	1	
109	113.10.78	2940	2	6,9	1	
110	113.10.61	2900	2	7,7	1	
111	113.10.43	3000	2	6,8	1	
112	113.10.93	3100	2	8,8	1	
113	113.10.99	3500	2	7,5	1	
114	113.11.54	3450	2	9,8	1	
115	113.11.53	2900	2	7,6	1	
116	113.11.54	3250	2	8,5	1	
117	113.11.55	2800	2	9,3	1	

118	113.11.56	3000	2	9	1	
119	113.11.57	3450	2	8,2	1	
120	113.11.58	3000	2	9,4	1	
121	113.11.59	3750	2	9,8	1	
122	113.11.60	3400	2	6,7	1	
123	113.11.61	3500	2	7,2	1	
124	113.11.62	3300	2	8,4	1	
125	113.11.80	3250	2	9,3	1	
126	113.48.53	2950	2	9,2	1	
127	113.49.01	3400	2	8	1	
128	113.49.02	3250	2	8,9	1	
129	113.49.98	3300	2	9,3	1	
130	113.50.77	3450	2	8	1	
131	113.50.88	3000	2	9,7	1	
132	113.50.99	3200	2	9	1	
133	113.51.02	3250	2	8,5	1	
134	113.51.20	3750	2	6	1	
135	113.51.29	3400	2	7,3	1	
136	113.52.40	3500	2	9,5	1	
137	113.52.49	3300	2	8,9	1	
138	113.53.50	3250	2	6,6	1	
139	113.53.51	2950	2	8,1	1	
140	113.53.53	3400	2	9	1	
141	113.54.29	3250	2	8,9	1	
142	113.54.30	3250	2	7,2	1	
143	113.54.43	3050	2	8,5	1	
144	113.54.53	2850	2	9,2	1	
145	113.55.01	3200	2	9,5	1	
146	113.55.09	3400	2	9,8	1	
147	113.55.10	3400	2	6,7	1	
148	113.57.30	3250	2	7,2	1	
149	113.57.79	2850	2	8,4	1	kategori berat badan
150	113.57.92	3333	2	9,3	1	1 BBLR (<2500 gram)
151	113.57.94	3350	2	8	1	2 BBLN (>2500 gram)
152	113.57.99	3500	2	9,7	1	kategori Kadar Bilirubin
153	113.57.57	3250	2	9	1	1 fisiologis (<10mg/dL)
154	113.58.38	3500	2	8,5	1	2 Hiperbilirubinemia (>10mg/dL)
155	113.58.39	3400	2	6	1	
156	113.58.62	3800	2	6,6	1	
157	113.58.58	3950	2	8,1	1	
158	113.59.75	3100	2	9	1	

159	113.59.76	2700	2	8,9	1	
160	113.60.82	2800	2	7,2	1	
161	113.60.59	2950	2	8,5	1	
162	113.60.60	3500	2	7,7	1	
163	113.60.77	2800	2	8,3	1	
164	113.60.87	2800	2	9,4	1	
165	113.60.92	3150	2	9	1	
166	113.60.88	3200	2	8,4	1	
167	113.61.19	3850	2	6	1	
168	113.61.21	3400	2	9,8	1	
169	113.80.39	2950	2	7,5	1	
170	113.80.60	2750	2	7,9	1	
171	113.90.18	2666	2	8,1	1	
172	113.90.82	3200	2	7,8	1	
173	113.91.13	2850	2	9,2	1	
174	113.91.89	3700	2	6,3	1	
175	113.92.60	3850	2	9,8	1	
176	114.20.01	3250	2	7,2	1	
177	114.20.62	2900	2	8,2	1	
178	114.20.39	2800	2	6,5	1	
179	114.20.62	3400	2	9,8	1	
180	114.25.62	3200	2	6	1	
181	114.25.68	2900	2	8,8	1	
182	114.25.98	3250	2	7,2	1	
183	114.25.17	2800	2	6,8	1	
184	114.25.48	3000	2	9,8	1	
185	114.26.30	3150	2	9,7	1	
186	114.26.21	3200	2	9,1	1	
187	114.26.34	3850	2	8,8	1	
188	114.26.91	3400	2	8,2	1	
189	114.26.97	3900	2	9,3	1	
190	114.30.56	4000	2	6,5	1	
191	114.30.58	3900	2	6	1	
192	114.30.90	3200	2	17	2	
193	114.45.50	3200	2	17,6	2	
194	114.45.65	3700	2	17,4	2	kategori berat badan
195	114.45.69	3400	2	18,9	2	1 BBLR (<2500 gram)
196	114.46.91	3300	2	19	2	2 BBLN (>2500 gram)
197	114.46.15	3800	2	19,2	2	kategori Kadar Bilirubin
198	114.46.30	3950	2	17,2	2	1 fisiologis (<10mg/dL)
199	114.46.27	3880	2	17,4	2	2 Hiperbilirubinemia

						(>10mg/dL)
200	114.46.20	3750	2	16,5	2	

Data RSIA Ananda Makassar Tahun 2018 Hubungan Berat Badan Lahir Rendah Dengan Hiperbilirubinemia Di Rumah Sakit Wilayah Kota Makassar

No	No.RM	berat Badan	kode	kadar bilirubin	kode	keterangan
1	112.41.35	2000	1	7,1	1	kategori berat badan
2	112.42.03	1800	1	6	1	1 BBLR (<2500 gram)
3	112.42.15	2400	1	6,8	1	2 BBLN (>2500 gram)
4	112.42.25	1700	1	8	1	kategori Kadar Bilirubin
5	112.42.50	2400	1	8,3	1	1 fisiologis (<10mg/dL)
6	112.42.79	2350	1	9,2	1	2 Hiperbilirubinemia (>10mg/dL)
7	112.43.04	1850	1	7,2	1	
8	112.43.27	2000	1	7,5	1	
9	112.43.29	2200	1	7,7	1	
10	112.43.77	2250	1	6,7	1	
11	112.44.29	1700	1	8,3	1	
12	112.44.25	2300	1	7,5	1	
13	112.44.30	2100	1	9,4	1	
14	112.44.31	1500	1	8,5	1	
15	112.44.32	2300	1	7,2	1	
16	112.44.35	2250	1	8,5	1	
17	112.44.96	1800	1	9,2	1	
18	112.45.21	1950	1	7,4	1	
19	112.45.24	2300	1	8	1	
20	112.45.37	2100	1	9,1	1	
21	112.45.45	1450	1	8,2	1	
22	112.46.03	1250	1	6,1	1	
23	112.46.35	2100	1	7,3	1	
24	112.46.36	1750	1	8,1	1	
25	112.80.05	2400	1	8,5	1	
26	112.80.10	2000	1	7,7	1	
27	112.80.12	1500	1	7,2	1	
28	112.81.10	2000	1	8,5	1	
29	112.81.12	1500	1	9,4	1	
30	112.81.45	2100	1	8,5	1	
31	112.81.50	2450	1	9	1	
32	112.81.52	1500	1	9,3	1	
33	112.82.41	2250	1	18	2	

34	112.82.28	2400	1	19,8	2	
35	112.82.70	1000	1	16,6	2	
36	112.84.38	1650	1	19,5	2	
37	112.84.50	1800	1	19,4	2	
38	112.84.53	2100	1	16,3	2	
39	112.84.59	2300	1	17,5	2	
40	112.85.60	1450	1	18	2	
41	112.86.45	1800	1	18,7	2	
42	112.86.93	1250	1	17,1	2	
43	112.86.95	1400	1	16,7	2	
44	112.91.02	1850	1	16,6	2	
45	112.91.10	2400	1	12,5	2	kategori berat badan
46	112.91.12	2400	1	12,2	2	1 BBLR (<2500 gram)
47	112.91.15	2300	1	18,9	2	2 BBLN (>2500 gram)
48	112.91.49	1400	1	16,3	2	kategori Kadar Bilirubin
49	112.93.30	1550	1	17,4	2	1 fisiologis (<10mg/dL)
50	112.93.31	2400	1	19	2	2 Hiperbilirubinemia (>10mg/dL)
51	112.93.27	2200	1	18,6	2	
52	112.93.28	2050	1	17,5	2	
53	112.93.12	1700	1	17,1	2	
54	112.93.10	2400	1	16,5	2	
55	112.95.06	2450	1	19,3	2	
56	112.95.09	2350	1	18	2	
57	112.95.12	2100	1	16,1	2	
58	112.95.14	2050	1	19,1	2	
59	112.95.15	1900	1	17,4	2	
60	112.98.40	1200	1	17,2	2	
61	112.98.43	1800	1	18,8	2	
62	112.98.48	1750	1	17,5	2	
63	112.98.55	2350	1	16,3	2	
64	112.99.80	2300	1	17,9	2	
65	112.99.89	2150	1	18	2	
66	112.99.90	2150	1	16,4	2	
67	112.99.92	2200	1	17,4	2	
68	112.99.99	2300	1	19	2	
69	113.00.01	2200	1	19,7	2	
70	113.00.07	1700	1	18,2	2	
71	113.00.43	1850	1	22,7	2	
72	113.00.45	2400	1	17	2	
73	113.00.85	2400	1	14	2	
74	113.00.87	2200	1	16,8	2	

75	113.01.88	1700	1	15	2	
76	113.01.19	2300	1	17,7	2	
77	113.01.21	2200	1	17,9	2	
78	113.01.39	2300	1	18,1	2	
79	113.01.60	1950	1	18,4	2	
80	113.03.18	2150	1	16	2	
81	113.03.82	2250	1	19,5	2	
82	113.03.13	1900	1	17,9	2	
83	113.03.89	2050	1	17,3	2	
84	113.02.60	2200	1	18,1	2	
85	113.02.27	1850	1	19,4	2	
86	113.02.47	2300	1	18,5	2	
87	113.02.90	2100	1	18,4	2	
88	113.04.01	1500	1	17,2	2	
89	113.04.22	2300	1	12,5	2	
90	113.04.07	2250	1	15,8	c	
91	113.04.53	3780	2	6,4	1	
92	113.05.38	3100	2	9,2	1	
93	113.05.39	3150	2	6,1	1	
94	113.05.62	3100	2	7,3	1	
95	113.05.58	3400	2	8,5	1	
96	113.06.39	3550	2	9,1	1	
97	113.06.02	3450	2	7,7	1	
98	113.06.68	3100	2	9,2	1	
99	113.06.98	3250	2	7,2	1	kategori berat badan
100	113.07.37	3250	2	6,2	1	1 BBLR (<2500 gram)
101	113.07.38	3300	2	6,5	1	2 BBLN (>2500 gram)
102	113.07.40	2700	2	8,2	1	kategori Kadar Bilirubin
103	113.07.64	2800	2	9,8	1	1 fisiologis (<10mg/dL)
104	113.09.99	2950	2	9,5	1	2 Hiperbilirubinemia (>10mg/dL)
105	113.09.85	3500	2	8,3	1	
106	113.09.20	3200	2	7,3	1	
107	113.09.83	3250	2	6,7	1	
108	113.09.22	3100	2	6,7	1	
109	113.10.78	2940	2	6,9	1	
110	113.10.61	2900	2	7,7	1	
111	113.10.43	3000	2	6,8	1	
112	113.10.93	3100	2	8,8	1	
113	113.10.99	3500	2	7,5	1	
114	113.11.54	3450	2	9,8	1	
115	113.11.53	2900	2	7,6	1	

116	113.11.54	3250	2	8,5	1	
117	113.11.55	2800	2	9,3	1	
118	113.11.56	3000	2	9	1	
119	113.11.57	3450	2	8,2	1	
120	113.11.58	3000	2	9,4	1	
121	113.11.59	3750	2	9,8	1	
122	113.11.60	3400	2	6,7	1	
123	113.11.61	3500	2	7,2	1	
124	113.11.62	3300	2	8,4	1	
125	113.11.80	3250	2	9,3	1	
126	113.48.53	2950	2	9,2	1	
127	113.49.01	3400	2	8	1	
128	113.49.02	3250	2	8,9	1	
129	113.49.98	3300	2	9,3	1	
130	113.50.77	3450	2	8	1	
131	113.50.88	3000	2	9,7	1	
132	113.50.99	3200	2	9	1	
133	113.51.02	3250	2	8,5	1	
134	113.51.20	3750	2	6	1	
135	113.51.29	3400	2	7,3	1	
136	113.52.40	3500	2	9,5	1	
137	113.52.49	3300	2	8,9	1	
138	113.53.50	3250	2	6,6	1	
139	113.53.51	2950	2	8,1	1	
140	113.53.53	3400	2	9	1	
141	113.54.29	3250	2	8,9	1	
142	113.54.30	3250	2	7,2	1	
143	113.54.43	3050	2	8,5	1	
144	113.54.53	2850	2	9,2	1	
145	113.55.01	3200	2	9,5	1	
146	113.55.09	3400	2	9,8	1	
147	113.55.10	3400	2	6,7	1	
148	113.57.30	3250	2	7,2	1	
149	113.57.79	2850	2	8,4	1	kategori berat badan
150	113.57.92	3333	2	9,3	1	1 BBLR (<2500 gram)
151	113.57.94	3350	2	8	1	2 BBLN (>2500 gram)
152	113.57.99	3500	2	9,7	1	kategori Kadar Bilirubin
153	113.57.57	3250	2	9	1	1 fisiologis (<10mg/dL)
154	113.58.38	3500	2	8,5	1	2 Hiperbilirubinemia (>10mg/dL)
155	113.58.39	3400	2	6	1	
156	113.58.62	3800	2	6,6	1	

157	113.58.58	3950	2	8,1	1	
158	113.59.75	3100	2	9	1	
159	113.59.76	2700	2	8,9	1	
160	113.60.82	2800	2	7,2	1	
161	113.60.59	2950	2	8,5	1	
162	113.60.60	3500	2	7,7	1	
163	113.60.77	2800	2	8,3	1	
164	113.60.87	2800	2	9,4	1	
165	113.60.92	3150	2	9	1	
166	113.60.88	3200	2	8,4	1	
167	113.61.19	3850	2	6	1	
168	113.61.21	3400	2	9,8	1	
169	113.80.39	2950	2	7,5	1	
170	113.80.60	2750	2	7,9	1	
171	113.90.18	2666	2	8,1	1	
172	113.90.82	3200	2	7,8	1	
173	113.91.13	2850	2	9,2	1	
174	113.91.89	3700	2	6,3	1	
175	113.92.60	3850	2	9,8	1	
176	114.20.01	3250	2	7,2	1	
177	114.20.62	2900	2	8,2	1	
178	114.20.39	2800	2	6,5	1	
179	114.20.62	3400	2	9,8	1	
180	114.25.62	3200	2	6	1	
181	114.25.68	2900	2	8,8	1	
182	114.25.98	3250	2	7,2	1	
183	114.25.17	2800	2	6,8	1	
184	114.25.48	3000	2	9,8	1	
185	114.26.30	3150	2	9,7	1	
186	114.26.21	3200	2	9,1	1	
187	114.26.34	3850	2	8,8	1	
188	114.26.91	3400	2	8,2	1	
189	114.26.97	3900	2	9,3	1	
190	114.30.56	4000	2	6,5	1	
191	114.30.58	3900	2	6	1	
192	114.30.90	3200	2	17	2	
193	114.45.50	3200	2	17,6	2	
194	114.45.65	3700	2	17,4	2	kategori berat badan
195	114.45.69	3400	2	18,9	2	1 BBLR (<2500 gram)
196	114.46.91	3300	2	19	2	2 BBLN (>2500 gram)
197	114.46.15	3800	2	19,2	2	kategori Kadar Bilirubin
198	114.46.30	3950	2	17,2	2	1 fisiologis

						(<10mg/dL)
199	114.46.27	3880	2	17,4	2	2 Hiperbilirubinemia (>10mg/dL)
200	114.46.20	3750	2	16,5	2	

Lampiran 6

RSUD HAJI MAKASSAR

Berat Badan * Kadar Bilirubin Crosstabulation

Count

		Kadar Bilirubin		Total
		<10	>10	
Berat Badan	<2500	40	50	90
	>2500	101	9	110
Total		141	59	200

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	53.416 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	51.162	1	.000		
Likelihood Ratio	56.673	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	53.149	1	.000		
N of Valid Cases	200				

Frequency Table

Berat Badan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <2500	90	45.0	45.0	45.0
>2500	110	55.0	55.0	100.0
Total	200	100.0	100.0	

Kadar Bilirubin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <10	141	70.5	70.5	70.5
>10	59	29.5	29.5	100.0
Total	200	100.0	100.0	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RSIA ANANDA MAKASSAR

Berat Badan * Bilirubin Crosstabulation

Count

		Bilirubin		Total
		<10	>10	
Berat Badan	<2500	66	31	97
	>2500	97	6	103
Total		163	37	200

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	22.628 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	20.928	1	.000		
Likelihood Ratio	24.245	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	22.515	1	.000		
N of Valid Cases	200				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,95.

b. Computed only for a 2x2 table

FREQUENCIES VARIABLES=x y

/ORDER=ANALYSIS.

Frequency Table

Berat Badan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<2500	97	48.5	48.5	48.5
	>2500	103	51.5	51.5	100.0
Total		200	100.0	100.0	

Bilirubin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<10	163	81.5	81.5	81.5
	>10	37	18.5	18.5	100.0
Total		200	100.0	100.0	

