

**PENGARUH PEMBERIAN BAKSO RUMPUT LAUT LAWI-LAWI
(*Caulerpa racemosa*) KOMBINASI IKAN LAYANG (*Decapterus ruselli*)
TERHADAP STATUS GIZI KURANG PADA ANAK SEKOLAH
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAYANG
KOTA MAKASSAR TAHUN 2018**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan
Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat Pada Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANDI JUMRIANI HUSNUL KHATIMAH

70200114072

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Pemberian Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi (*Caulerpa racemosa*) Kombinasi Ikan Layang (*Decapterus ruselli*) terhadap Status Gizi Kurang pada Anak Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018”, yang disusun oleh **Andi Jumriani Husnul Khatimah**, NIM: 70200114072, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 19 November 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 19 November 2018 M
11 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Azriful, SKM., M.Kes (.....)

Pembimbing I : Dwi Santy Damayati, SKM., M.Kes (.....)

Pembimbing II : Irviani Ibrahim, SKM., M.Kes (.....)

Penguji I : Syarifaini, SKM., M.Kes (.....)

Penguji II : Dr. H. M. Dahlan, M.Ag (.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

/ **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.**
NIP: 19550203 198312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Andi Jumriani Husnul Khatimah
NIM : 70200114072
Tempat/Tgl. Lahir : Sengkang/ 14 Agustus 1996
Jurusan/ Peminatan : Kesehatan Masyarakat/ Gizi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Yasin Limpo, Gowa
Judul : Pengaruh Pemberian Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi
(*Caulerpa racemosa*) Kombinasi Ikan Layang (*Decapterus
ruselli*) terhadap Status Gizi Kurang pada Anak Sekolah di
Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar
Tahun 2018

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 19 November 2018
Penulis,

Andi Jumriani Husnul Khatimah
NIM. 70200114072

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia ke zaman berperadaban dan berpengetahuan.

Dengan penuh rasa syukur dalam keterbatasan, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberian Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi (*Caulerpa racemosa*) Kombinasi Ikan Layang (*Decapterus ruselli*) terhadap Status Gizi Kurang pada Anak Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018”.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih dan ungkapan sayang kepada sang motivator sejati bagi penulis, ibunda tercinta Hj. A. Dianriani B, S.Pd. Kepada ayahanda tersayang H. Ramli Jum, S.Pd.,M.M., dengan segala pengorbanan yang tanpa henti dan tak ternilai harganya memberikan didikan dan dukungan moril serta materil dengan penuh kesabaran.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada ibu Hj. Dwi Santy Damayati, SKM.,M.Kes selaku pembimbing I dan ibu Irviani Ibrahim, SKM.,M.Kes selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan nasehat untuk membimbing penulis sejak dari awal rencana penelitian hingga terselesainya skripsi ini.

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis juga banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan niat suci dan hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi. Armyun Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Azriful, SKM., M.Kes, selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar, Ibu Emmy Bujawati, SKM. M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh staf dan dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah banyak memberi bantuan dan bimbingan selama peneliti mengikuti pendidikan.
4. Ibu Hj. Syarfaini, SKM. M.Kes selaku penguji I dan Bapak Dr. H. M. Dahlan, M.Ag selaku penguji II yang telah meluangkan waktu dan memberi saran serta kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah beserta guru MI As'Adiyah No. 170 Layang, MI Ath-Tanmiyatul Ilmiah dan MI MDIA Nurul Ikhsan.
6. Kepada keluarga besar dari ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu setia memberikan motivasi, doa serta menaruh harapan yang begitu besar kepada saya hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Kamisah yang telah membantu dalam penyediaan ikan layang sebagai bahan utama bakso.

8. Keluarga besar Peminatan Gizi Angkatan 2014 yang selalu mendukung dan membantu dalam melaksanakan penelitian ini. Terkhusus teman seperjuangan yang selalu turun tangan dalam membuat bakso dan memberi saran dalam penelitian (Widya Astuti Haris), yang telah membantu dalam penyediaan Rumpu Laut Lawi-Lawi (Nur Ainin Alfi), yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam penyelesaian penelitian (Mahirah Humaerah, Novi Laila Sulastri, Mahfud Noor Husaini, Hardiani, Taliyya Mabrukatulhayah, Ulfah Humaidah, Kartini Hsn, Dea Adinda Putri, Anni Safitri dan Muh. Nurhidayat) dan yang memberikan semangat (Rosdiani, Nur Asmi Noviani dan Yuliana).
9. Teman masa SMP “Pantis9sec” yang selalu mendukung dan membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Terkhusus kepada Ashar yang selalu memberi dukungan dan bantuan sejak awal rencana penelitian hingga selesai, Besse Aliyah Fadillah dan Andi Sri Hardiana yang telah membantu dalam pengolahan data, serta dukungan dari Raudatul Adawiah, Elfira Riani, Nurhidaya dan Muh. Yunus.
10. Teman-teman KKN Posko Jenefallasa Kab. Jeneponto terkhusus teman terbaik Syahrah Rugaya Hamsah dan Syuhrilaeni yang telah memberikan dukungan dan bantuan.
11. Teman-Teman PBL Posko 11 (Dirgahayu, Nur Wafiqah, Ria Fajriah, Septi Aulia Marini, Azizah Nursyahbani, Sri Hidayati dan Muh. Adnan Iqbal)
12. Teman-teman seperjuangan “HEFABIP” angkatan 2014 yang senantiasa memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.

13. Senior Peminatan Gizi yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini terkhusus Kakanda angkatan 2013 Nur Muslimah, Musdalipa dan Hamriani dan Kakanda angkatan 2012 Wahyuni Mansur.
14. Serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis memohon kepada Allah swt. atas bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak, kiranya mendapat imbalan yang setimpal dari-Nya. *Jazakumullah Khairan Katsiran*, semoga Allah memberikan yang lebih dari bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan agar dapat dijadikan masukan di waktu mendatang. Akhir kata penulis berharap kiranya tugas akhir ini dapat berguna bagi seluruh pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Aamiin ya rabbal alamin.....

Wassalamu Alaikum wr. wb.

Gowa, 5 Oktober 2018

Penulis

Andi Jumriani Husnul Khatimah
70200114072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis Penelitian	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum tentang Status Gizi	13
B. Tinjauan Umum tentang Anak Usia Sekolah	22
C. Tinjauan Umum tentang Rumput Laut Lawi-Lawi (<i>Caulerpa racemosa</i>)	31
D. Tinjauan Umum tentang Ikan Layang (<i>Decapterus ruselli</i>)	36

E. Tinjauan Umum tentang Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi (<i>Caulerpa racemosa</i>) Kombinasi Ikan Layang (<i>Decapterus ruselli</i>)	39
F. Kerangka Teori	43
G. Kerangka Konsep	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	48
D. Metode Pengumpulan Data	51
E. Instrumen Penelitian	52
F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen	54
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	58
B. Pembahasan	73
C. Keterbatasan Penelitian	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penilaian Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, BB/TB Standar Baku Antropometri WHO-2005	16
Tabel 2.2	Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Orang Indonesia.....	26
Tabel 2.3	Komposisi proksimat dari rumput laut <i>Culerpa Racemosa</i> (Berdasarkan Kering).....	35
Tabel 2.4	Kandungan Zat Gizi Ikan Layang.....	39
Tabel 2.5	Kandungan Gizi dalam 100 Gram Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi (<i>Caulerpa racemosa</i>) Kombinasi Ikan Layang (<i>Decapterus ruselli</i>) Dengan Berbagai Perbandingan	42
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018.....	61
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkatan Kelas di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018.....	61
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018.....	62
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018	63
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Orang Tua di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018	64
Tabel 4.6	Jumlah Konsumsi Produk Setelah Intervensi pada Anak Gizi Kurang di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018	65

Tabel 4.7	Rata-Rata Konsumsi Harian Setelah Intervensi pada Anak Gizi Kurang di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018	65
Tabel 4.8	Rata-Rata Konsumsi Jajanan Setelah Intervensi pada Anak Gizi Kurang di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018	66
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Responden yang Sakit Selama Penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018.....	66
Tabel 4.10	Distribusi Responden Berdasarkan Rata-Rata Asupan Energi, Asupan Protein, Berat Badan dan Status Gizi Responden Sebelum Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018.....	67
Tabel 4.11	Distribusi Responden Berdasarkan Rata-Rata Asupan Energi, Asupan Protein, Berat Badan dan Status Gizi Responden Setelah Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018.....	68
Tabel 4.12	Rata-rata Perubahan Asupan Energi Kelompok I (Kasus) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018.....	69
Tabel 4.13	Rata-rata Perubahan Asupan Protein Kelompok I (Kasus) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018.....	70
Tabel 4.14	Rata-rata Perubahan Berat Badan Kelompok I (Kasus) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018.....	71
Tabel 4.15	Rata-rata Perubahan Status Gizi Kelompok I (Kasus) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di	

Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota
Makassar Tahun 2018..... 72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rumput laut <i>Caulerpa racemosa</i>	32
Gambar 2.2 Ikan Layang (<i>Decapterus ruselli</i>).....	38



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Grafik Perubahan Asupan Energi Sebelum dan Setelah Intervensi	75
Grafik 4.2	Grafik Perubahan Asupan Protein Sebelum dan Setelah Intervensi	81
Grafik 4.3	Grafik Perubahan Berat Badan Sebelum dan Setelah Intervensi	84
Grafik 4.4	Grafik Perubahan Status Gizi Sebelum dan Setelah Intervensi ..	88



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden
- Lampiran 2 Kuesioner Identitas Responden
- Lampiran 3 Formulir *Food Recall* 24 Jam
- Lampiran 4 Form Data Pengukuran Antropometri
- Lampiran 5 Form Pemantauan Konsumsi Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi Kombinasi Ikan Layang
- Lampiran 6 Form Pemantauan Konsumsi Bakso Ikan Layang
- Lampiran 7 Cara Pembuatan Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi (*Caulerpa racemosa*) Kombinasi Ikan Layang (*Decapterus ruselli*)
- Lampiran 8 Hasil *Recall* 24 Jam dengan Menggunakan Aplikasi Nutrisurvey 2005
- Lampiran 9 Kandungan Gizi Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi (*Caulerpa racemosa*) Kombinasi Ikan Layang (*Decapterus ruselli*)
- Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 11 Hasil Pemantauan Konsumsi Produk
- Lampiran 12 Hasil *Recall* 24 Jam Anak Sekolah Gizi Kurang di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Pusesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018
- Lampiran 13 Data Berat Badan dan Status Gizi Anak Sekolah Gizi Kurang di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Pusesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018
- Lampiran 14 Hasil Analisis SPSS
- Lampiran 15 Surat Izin Komisi Etik Penelitian Kesehatan
- Lampiran 16 Surat Izin Penelitian Kementerian Agama Republik Indonesia
- Lampiran 17 Surat Keterangan Penelitian Madrasah Ibtidaiyah As'Adiyah No. 170 Layang
- Lampiran 18 Surat Keterangan Penelitian Madrasah Ibtidaiyah Ath-Tanmiyatul Ilmiah
- Lampiran 19 Surat Keterangan Penelitian Madrasah Ibtidaiyah MDIA 3 Nurul Ihsan

**PENGARUH PEMBERIAN BAKSO RUMPUT LAUT LAWI-LAWI
(*Caulerpa racemosa*) KOMBINASI IKAN LAYANG (*Decapterus ruselli*)
TERHADAP STATUS GIZI KURANG PADA ANAK SEKOLAH
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAYANG
KOTA MAKASSAR TAHUN 2018**

¹Andi Jumriani Husnul Khatimah,²Dwi Santy Damayati,³Irviani Ibrahim
^{1,2,3}Bagian Gizi, Jurusan Kesehatan Masyarakat, FKIK UIN Alauddin Makassar
(andijumrianihusnulkhatimah@gmail.com)

ABSTRAK

Konsumsi pangan yang diversifikasi merupakan bagian dari meningkatkan konsumsi pangan yang beranekaragam dan lebih baik gizinya untuk memperbaiki status gizi pada anak gizi kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian *kuantitatif lapangan* dengan desain *Non-Equivalent Kontrol Group* design melalui pendekatan *quasi eksperimen*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, jumlah sampel sebanyak 34 anak terbagi menjadi dua kelompok (kasus dan kontrol) yang diberikan intervensi selama 30 hari. Metode Analisis menggunakan *paired t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh asupan energi pada kelompok kasus ($p=0.118$) dan ada pengaruh asupan energi pada kelompok kontrol ($p=0.007$). Tidak ada pengaruh asupan protein pada kelompok kasus ($p=0.111$) dan ada pengaruh asupan protein pada kelompok kontrol ($p=0.000$). Tidak ada pengaruh berat badan pada kelompok kasus ($p=0.637$) dan ada pengaruh berat badan pada kelompok kontrol ($p=0.003$). Ada pengaruh status gizi pada kelompok kasus ($p=0.007$) dan tidak ada pengaruh pada kelompok kontrol ($p=0.104$). Pemberian intervensi bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) selama 30 hari belum mampu mengubah status gizi (BB/U) anak gizi kurang menjadi normal, ditandai dengan rata-rata nilai z-score masih berada pada angka <-2 SD menandakan responden masih berada pada kategori gizi kurang. Jadi, disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui durasi dan frekuensi yang efisien untuk pemberian intervensi guna mendapatkan hasil yang optimal.

**Kata Kunci: Gizi Kurang, Anak Sekolah, Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi
Kombinasi Ikan Layang, Bakso Ikan Layang**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status gizi merupakan kondisi tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi, yang dikategorikan antara status gizi lebih, baik, kurang dan status gizi buruk (Almatsier, 2010: 3) Status gizi kurang adalah gambaran ketidakseimbangan zat gizi yang dibutuhkan tubuh atau jumlah kebutuhan gizi lebih tinggi dibandingkan dengan asupan zat gizi.

Anak adalah salah satu aset sumber daya manusia sebagai generasi yang perlu mendapat perhatian khusus. Upaya yang penting bagi kelangsungan hidup bangsa diawali dengan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas hidup anak. Kualitas hidup anak terlihat dari aspek kesehatan melalui keadaan status gizi yang baik dan sebagai bagian dari indikator pembangunan (Yudesti & Prayitno, 2013: 1).

Pada usia anak sekolah, zat gizi dibutuhkan oleh tubuh tidak hanya untuk proses kehidupan, namun juga untuk pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Oleh sebab itu, anak membutuhkan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein dan lemak serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Defisiensi zat gizi pada anak dapat berdampak pada berbagai aspek fisik maupun mental (Briawan, 2017: 194). Malnutrisi yang terjadi pada anak usia sekolah yaitu kekurangan gizi dalam hal zat karbohidrat atau zat tenaga dan kekurangan protein atau zat pembangun yang identik dengan badan yang kurus atau berat badan lebih rendah dari standar usia

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2015 melaporkan status gizi anak di dunia dengan prevalensi kekurangan sekitar 14,3%, jumlah anak yang mengalami kekurangan sebanyak 95,2 juta orang (Unicef WHO, 2015). Berdasarkan data Riskesdas tahun 2010 adalah status gizi umur 6-12 tahun (IMT/U) di Indonesia, yaitu prevalensi kurus adalah 12,2%, terdiri dari 4,6 % sangat kurus, dan 7,6% kurus (Riskesdas, 2010). Sedangkan data Riskesdas 2013 didapatkan status gizi umur 5-12 tahun (menurut IMT/U) di Indonesia, yaitu prevalensi kurus adalah 11,2%, terdiri dari 4,0% sangat kurus dan 7,2% kurus (Riskesdas, 2013).

Berdasarkan data penjarangan kesehatan peserta didik Kota Makassar tahun 2017 mencakup 46 wilayah kerja puskesmas. Dari sepuluh urutan wilayah puskesmas yang memiliki masalah gizi kurus, yaitu Puskesmas Kapasa 66,80%, Puskesmas Rappokalling 45,68%, Puskesmas Makkasau 29,58%, Puskesmas Bira 26,15%, Puskesmas Bulurokeng 19,60%, Puskesmas Cendrawasih 18,81%, Puskesmas Layang 18,65%, Puskesmas Bara-Baraya 17,49%, Puskesmas Batua 16,59% dan Puskesmas Kodingareng 15,09%.

Berdasarkan data tersebut, peneliti kemudian turun ke lapangan melakukan observasi awal di tiga Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang merupakan wilayah kerja Puskesmas Layang. Dari hasil observasi awal dengan melakukan pengukuran antropometri didapatkan angka status gizi berdasarkan indeks berat badan menurut umur pada anak sekolah usia 7-9 tahun. Di MI As'Adiyah terdapat 2,33% gizi lebih, 69,77% gizi baik, 18,60% gizi kurang dan 9,30% gizi buruk. Di MI Ath-Tamiyatul terdapat 4,88% gizi lebih, 56,10% gizi baik, 34,15% gizi

kurang dan 4,88% gizi buruk. Dan MI Nurul Ikhsan terdapat 67,65% gizi baik, 17,65% gizi kurang dan 14,71% gizi buruk.

Dari data tersebut, diketahui masih banyak anak sekolah yang mengalami gizi kurang sehingga diperlukan upaya perbaikan gizi. Salah satu upaya perbaikan gizi dengan diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya dan budaya lokal.

Salah satu alternatif bahan pangan yang dapat difortifikasi adalah rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) dan ikan layang (*Decapterus ruselli*). Berdasarkan beberapa penelitian, *Caulerpa racemosa* menghasilkan metabolit sekunder sebagai antioksidan, kandungan asam folat, tiamin dan asam askorbat pada *Caulerpa racemosa* yang dapat menangkal radikal bebas (Chew, Y.L., Y.Y. Lim, M. Omar, K.S. Khoo., 2008 dalam Lely Okmawaty Anwar, Rita. L. Bubun, 2016: 111). Selain itu, rumput laut *Caulerpa racemosa* mengandung karbohidrat 39-50%, protein 17-27%, lemak 0,08-1,9%, serat 1,3-12,4% dan kadar abu 8,15%-16,9%, serta kadar air yang tinggi 80-90% (Verlaque *et al*, 2003 dalam Burhanuddin, 2014: 8). Selain kandungan gizi makro, rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) juga memiliki senyawa kimia lain seperti fenol. Senyawa fenol termasuk dalam kelompok antioksidan alam (Cahyadi, 2009). Dimana antioksidan berfungsi untuk membunuh bakteri dan melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel sehat di dalam tubuh, serta meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan.

Ikan layang merupakan bagian hasil perikanan pelagis sangat banyak diminati oleh masyarakat (Dian Desmawati, T. Efrizal, 2013). Tekstur daging ikan

yang kompak menimbulkan citarasa yang sesuai dengan selera orang-orang, sehingga dapat menjadi pemenuh kebutuhan protein hewani. Ikan layang (*Decapterus ruselli*) memiliki kandungan gizi yang tinggi dengan total kalori 109 kkal dalam 100 gr, jumlah protein yaitu 22 gr, lemak rendah yaitu 1,7 gr, kalsium 50 mg, fosfor 150 gr, besi sebanyak 2 mg dan Vitamin A 47 SI (Hardinsyah & Briawan, 1994 dalam Kholillah, 2002).

Proses pengolahan pangan yang semakin berkembang, menghasilkan berbagai produk olahan yang semakin beragam yang banyak beredar di pasaran. Salah satu olahan yang enak dan cara pengolahannya sederhana adalah bakso. Bakso merupakan produk olahan daging yang telah dikenal dan digemari oleh masyarakat, yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan yang cukup bergizi (Widati dkk, 2012 dalam Malini, 2016). Dari beberapa produk olahan daging di antaranya abon, dendeng, bakso/pentolan, korned, sosis dan gaga jumlah konsumsi bakso sendiri menempati peringkat teratas dengan total konsumsi 30,191 porsi di tahun 2015 dan terjadi peningkatan sebesar 14,45 % dari tahun 2011 (SUSENAS, 2015).

Pada umumnya, bakso diolah menggunakan bahan baku daging dan tepung. Daging yang biasa digunakan adalah daging sapi, ayam dan ikan. Sedangkan tepung yang biasa digunakan yaitu tepung tapioka (Kusnadi dkk, 2012 dalam Malini, 2016).

Pembuatan bakso berbahan dasar rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa Racemosa*) dan ikan layang (*Decapterus ruselli*) merupakan salah satu bentuk

pengolahan makanan tambahan atau jajanan yang diharapkan akan dapat memberi sumbangan zat gizi lainnya terutama bagi anak gizi kurang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu “Pengaruh Pemberian Bakso Rumput Laut Lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) Kombinasi Ikan Layang (*Decapterus ruselli*) terhadap Status Gizi Kurang pada Anak Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah?”

C. Hipotesis Penelitian

Untuk mengarahkan penelitian dan pembinaan pada pokok permasalahan, maka ditarik kesimpulan sementara yang akan diuji kebenarannya. Adapun hipotesis yang akan diajukan adalah:

1. Hipotesis alternatif (H_a) adalah “Ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) terhadap gizi kurang pada anak usia sekolah”.
2. Hipotesis nol (H_o) adalah “Tidak ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) terhadap gizi kurang pada anak usia sekolah”.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Kelompok Perlakuan

Definisi Operasional: Kelompok perlakuan adalah kelompok sampel yang akan diteliti yang terdiri dari kelompok kasus dan kelompok kontrol.

Ruang Lingkup: Dalam penelitian ini, kelompok yang diteliti, yaitu:

a. Kelompok Kasus

Kelompok anak sekolah yang diberi intervensi bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) dengan perbandingan 1:1.

b. Kelompok Kontrol

Kelompok anak sekolah yang diberi intervensi bakso ikan layang (*Decapterus ruselli*).

2. Status Gizi

Definisi Operasional: Status gizi adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dengan jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis yang dinilai dengan pengukuran antropometri.

Kriteria Objektif:

- a. Gizi lebih dengan nilai z -score $>+2$ SD
- b. Gizi baik dengan nilai z -score -2 s/d $+2$ SD
- c. Gizi kurang dengan nilai z -score -3 s/d <-2 SD
- d. Gizi buruk dengan nilai z -score <-3 SD.

Ruang Lingkup: Pada penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah status gizi kurang dengan nilai *z-score* -3 s/d <-2 SD yang dinyatakan berdasarkan Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U).

E. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan dan digunakan penulis sebagai referensi awal sebelum melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Responden	Hasil Penelitian
1	Syarfaini, dkk. 2014	Pengaruh Pemberian Nugget Tempe dengan Kombinasi Ikan Gabus terhadap Status Gizi Anak Sekolah Dasar di MIS DDI Ainus Syamsi Kel. Lette, Kota Makassar 2014	Anak sekolah dasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok kasus selisih rata-rata status gizi sebelum dan setelah pemberian nugget tempe dengan kombinasi ikan gabus adalah sebesar 0,39 sedangkan pada kelompok kontrol selisih rata-rata status gizi pada awal hingga akhir penelitian adalah sebesar 0,13. setelah dilakukan uji statistik Paired T-Test didapatkan nilai $p = 0,000$ yang lebih kecil daripada nilai alpha (0,05), maka dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi, ada pengaruh antara pemberian nugget tempe ikan gabus terhadap status gizi anak sekolah gizi kurang.
2	Enny Susilowati. 2013	Perbedaan Status Gizi Anak Sekolah Dasar Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di SDN	Anak sekolah dasar	Hasil uji korelasi status gizi sebelum dan sesudah PMT diperoleh hasil $p = 0,00$, yang berarti ada perbedaan status gizi sebelum dan sesudah PMT-AS. PMT-AS memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan status gizi anak Sekolah Dasar Negeri Plalan I Kota Surakarta.

		Plalan Kota Surakarta		
3	Wulan Agustina, dkk. 2015	Asupan Zat Gizi Makro dan Serat Menurut Status Gizi Anak Usia 6-12 Tahun di Pulau Sulawesi	Anak usia 6-12 tahun	Tidak terdapat perbedaan asupan zat gizi makro dan serat terhadap status gizi (IMT/U) di Pulau Sulawesi ($p>0,05$). Penelitian ini menemukan adanya keberagaman asupan dan status gizi anak usia sekolah.
4	Bahdar Supardi. 2013	Pengaruh Pemberian Suplemen Zink Intrauterin terhadap Tinggi Badan Anak di Kabupaten Takalar	Anak usia 9-10 tahun	Hasil penelitian menunjukkan laju pertumbuhan tinggi badan didapatkan nilai signifikasi (p value) sebesar 0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan yang sangat nyata antara pertumbuhan anak yang diberikan intervensi suplemen zink+PMT, PMT dan tidak diintervensi (kelompok kontrol). Berdasarkan kejadian sakit untuk kelompok suplementasi zink+PMT 23 orang (45,0%) yang menderita sakit satu bulan terakhir. Sedangkan untuk kelompok kontrol yaitu 29 anak (74,4%). Berdasarkan nilai rapor yang dirata-ratakan, kelompok suplementasi zink+PMT kategori nilai cukup 31 anak (62,0%), 13 anak (26,0%) nilai baik, kelompok PMT nilai cukup 12 anak (66,7%), 6 anak (33,3%) kategori nilai baik, sedangkan untuk kelompok kontrol anak yang kategori nilai kurang 1 anak (2,6%), nilai cukup 27 anak (69,2%), 8 anak (20,5%) nilai baik.
5	Yulni, dkk. 2013	Hubungan Asupan Zat Gizi Makro dengan Status Gizi pada Anak Sekolah Dasar di Wilayah Pesisir Kota Makassar	Anak sekolah dasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara asupan energi ($P=0,034$), karbohidrat ($P=0,011$) dengan status gizi menurut indikator IMT/U, tidak ada hubungan antara asupan protein ($P=0,349$), lemak ($P=0,548$) dengan status

		Tahun 2013		gizi berdasarkan IMT/U dan asupan energi ($P=0,353$), protein ($P=0,934$), lemak ($P=0,185$) dan karbohidrat ($P=0,293$) dengan status gizi berdasarkan TB/U.
6	Musdalipa. 2017	Pengaruh Pemberian Biskuit Ubi Jalar Ungu (<i>Ipomoea Batatas L. Poiret</i>) Terhadap Status Gizi Kurang Pada Anak Sekolah Usia 7-9 Tahun di SD Inpres Borong Jambu III Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2017	Anak sekolah usia 7-9 tahun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh asupan energi pada kelompok I (intervensi) ($p=0.000$) dan kelompok II (kontrol) ($p=0.000$). Tidak ada pengaruh asupan protein pada kelompok I (intervensi) ($p=0.501$) dan ($p=0.395$) pada kelompok II (kontrol). Tidak ada pengaruh vitamin C pada kelompok I (intervensi) ($p=0.855$) dan ($p=0.221$) pada kelompok II (kontrol). Ada pengaruh zat besi pada kelompok I (intervensi) ($p=0.035$) dan ($p=0.049$) pada kelompok II (kontrol). Ada pengaruh berat badan pada kelompok I (intervensi) ($p=0.002$) dan kelompok II (kontrol) ($p=0.052$). Ada pengaruh status gizi pada kelompok I (intervensi) ($p=0.020$) dan tidak ada pengaruh pada kelompok II (kontrol) ($p=0.111$). Pemberian intervensi biskuit ubi jalar ungu dan biskuit tepung terigu selama 30 hari belum mampu mengubah status gizi (BB/U) anak gizi kurang menjadi normal, ditandai dengan rata-rata nilai z-score masih berada pada angka <-2 SD menandakan responden masih berada pada kategori gizi kurang
7	Nisrina Nadhifah Arsyad. 2016	Pengaruh Pemberian Otak-otak Ikan Kembung (<i>Rastrelliger brachysoma</i>)	Anak sekolah usia 7-9 tahun	Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan asupan energi, asupan protein, berat badan dan status gizi pada kedua kelompok perlakuan. Asupan Energi pada kelompok kasus terjadi

		<p>Substitusi Buah Lamun (<i>Enhalus acoroides</i>) Terhadap Status Gizi Pada Siswa Gizi Kurang Di SDN Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 2016</p>	<p>peningkatan sebesar 131.52 kkal ($p=0.000$) dan pada kelompok kontrol 48.08 kkal ($p=0.000$). Asupan protein pada kelompok kasus 8.59 g ($p=0.000$) dan pada kelompok kontrol 8.47 g ($p=0.000$). Berat badan pada kelompok kasus 0.65 kg ($p=0.000$) dan pada kelompok kontrol 0.30 kg ($p=0.001$). Status gizi terjadi peningkatan secara bermakna pada kelompok kasus, yaitu -0.21 SD ($p=0.000$) dan -0.05 SD ($p=0.100$) menandakan bahwa tidak terjadi peningkatan status gizi pada kelompok kontrol ($p>0.05$). Pemberian intervensi otak-otak ikan kembung substitusi buah lamun dan otak-otak ikan kembung selama 30 hari belum mampu mengubah status gizi (BB/U) anak gizi kurang menjadi normal, ditandai dengan rata-rata nilai z-score masih berada pada angka <-2 SD menandakan responden masih berada pada kategori gizi kurang.</p>
--	--	---	--

Penelitian yang akan dilakukan kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini melakukan intervensi pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Kota Makassar.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar tahun 2018.

b. Tujuan Khusus

1) Untuk mengetahui pengaruh asupan energi sebelum dan setelah pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah.

2) Untuk mengetahui pengaruh asupan protein sebelum dan setelah pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah.

3) Untuk mengetahui perbedaan berat badan sebelum dan setelah pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah.

4) Untuk mengetahui pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) terhadap status gizi pada anak sekolah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk:

a. *Manfaat Ilmiah*

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan utamanya dibidang gizi dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang manfaat pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) bagi kesehatan sehingga dapat digunakan dimasyarakat.

b. *Manfaat bagi Masyarakat*

Bagi anak sekolah sebagai responden dan orang tua, diharapkan dapat memperluas pengetahuan terhadap pentingnya meningkatkan pengetahuan tentang gizi agar dapat meningkatkan derajat kesehatannya.

c. *Manfaat Institusi Terkait*

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai masukan pada institusi terkait yang berhubungan dengan penanganan masalah gizi dalam meningkatkan dejarat kesehatan masyarakat.

d. *Manfaat bagi Peneliti*

Sebagai pengalaman berharga bagi peneliti dalam menambah wawasan dan pengetahuan menuju cara berfikir ilmiah dan melakukan penelitian di bidang gizi masyarakat serta sebagai wadah dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama proses perkuliahan khususnya pada bidang gizi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Status Gizi

1. Definisi Status Gizi

Kata gizi berasal dari Bahasa Arab *ghidza* yang artinya makanan. Dalam dialek Mesir kata *ghidza* dibaca *ghizi*. Sementara itu, ada juga yang menerjemahkan kata *nutrition* menjadi nutrisi. Secara klasik, gizi dihubungkan dengan kesehatan tubuh yaitu menyediakan energi, membangun, memelihara jaringan tubuh serta mengatur proses yang terjadi dalam tubuh. Gizi (*nutrition*) merupakan proses dalam tubuh dengan mengkonsumsi makanan secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan, untuk pertumbuhan, menghasilkan energi, fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi serta mempertahankan kehidupan (Syarfaini, 2012).

Ilmu gizi adalah aplikasi ilmu dari berbagai bidang ilmu, seperti Ilmu Penyakit (Pathologi), Biokimia, Ilmu Hayat (Fisiologi), Biologi dan bidang ilmu lainnya. Tujuan akhir ilmu ini ialah mencapai, memperbaiki dan mempertahankan kesehatan tubuh melalui konsumsi makanan (Sediaoetama, 2010).

Definisi ilmu gizi yang digunakan sekarang adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan kesehatan tubuh. Definisi ini memungkinkan kajian dan ruang lingkup ilmu gizi menjadi lebih luas, tidak terbatas pada makanan yang dikonsumsi (Ibrahim, 2012).

Status gizi adalah kondisi tubuh akibat dari konsumsi pangan dan penggunaannya oleh tubuh (Almatsier, 2010: 3). Setiap pangan memiliki komponen gizi dan komponen non-gizi yang terdiri dari komponen utama, komponen penunjang, komponen bioaktif, dan komponen toksik atau antigizi. Menurut para pakar gizi di dunia sepakat mengatakan bahwa zat gizi dalam pangan dan/atau makanan terbagi enam komponen, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Empat di antaranya adalah komponen utama (karbohidrat, protein, lemak dan air) dan lainnya adalah komponen penunjang (vitamin dan mineral) (Kusfriyadi, 2017: 13-14).

Dalam kesehatan nutrisi, islam menganjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halalan thayyiban (halal dan baik). Halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan secara agama, sedangkan thayyib adalah sesuatu yang baik pada dasarnya, tidak termasuk fisik dan pikiran, dan harus memenuhi syarat dari segi kebersihan dan kesehatannya. Demikian yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah/ 2: 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Departemen Agama RI, 2010: 25).

Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan.

Allah menciptakan ular berbisa untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan

bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan-makanan yang halal (Shihab, 2002 Vol. 1 hal. 456).

Berdasarkan ayat diatas, Islam melarang manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal dan tidak baik seperti bangkai, daging babi, darah, minuman keras (khamar), binatang yang dicekik atau tercekik dan hewan ternak yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Islam begitu memperhatikan kesehatan nutrisi ini, karena kebersihan dan kebaikan adalah suatu hal yang fitrah, hal yang fitrah ini akan dapat bersinergi dalam tubuh manusia yang telah diciptakan oleh Allah dengan keadaan fitrah (Syarfaini, 2013).

2. Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penilaian secara langsung dan tidak langsung.

a. Penilaian status gizi secara langsung

Penilaian status gizi secara langsung, terbagi empat penilaian yaitu: antropometri, klinis, biokimia dan biofisik.

Antropometri dapat diartikan sebagai ukuran tubuh. Antropometri berhubungan dengan berbagai pengukuran bentuk tubuh dan pengukuran penyusun tubuh dengan memperhatikan tingkat gizi dan penyusun tubuh. Secara umum, antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan antara asupan energi dan protein dari pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti

otot, lemak dan jumlah air dalam tubuh (Dewa Nyoman Supariasa, Bachyar Bakri, 2002)

Tabel 2.1 Penilaian Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, BB/TB Standar Baku Antropometri WHO-2005

No	Indeks	Batas Pengelompokan	Status Gizi
1	BB/U	>+2 SD	Gizi Lebih
		-2 s/d +2 SD	Gizi Baik
		-3 s/d <-2 SD	Gizi Kurang
		<-3 SD	Gizi Buruk
2	TB/U	>+2 SD	Tinggi
		-2 s/d <+2 SD	Normal
		-3 s/d <-2 SD	Pendek
		<-3 SD	Sangat Pendek
3	BB/TB	>+2 SD	Gemuk
		-2 s/d <+2 SD	Normal
		-3 s/d <-2 SD	Kurus
		<-3 SD	Sangat Kurus

Sumber: Depkes RI, 2010

Pemeriksaan klinis adalah metode penilaian status gizi masyarakat. Penilaian ini berdasarkan terjadinya perubahan yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. (Dewa Nyoman Supariasa, Bachyar Bakri, 2002).

Pemeriksaan secara biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh dengan pengujian secara laboratoris. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain : urin, darah, tinja dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Metode ini sebagai peringatan akan adanya kemungkinan malnutrisi yang lebih parah (Dewa Nyoman Supariasa, Bachyar Bakri, 2002).

Penilaian biofisik adalah metode penilaian status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) serta melihat perubahan struktur dari jaringan. Metode ini umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta senja epidemik (Dewa Nyoman Supariasa, Bachyar Bakri, 2002).

b. Penilaian status gizi secara tidak langsung

Penilaian status gizi terdiri dari tiga yaitu survei konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi.

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi dengan melihat jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang maupun keluarga. Data yang diperoleh dapat berupa data kualitatif maupun kuantitatif (Dewa Nyoman Supariasa, Bachyar Bakri, 2002).

Statistik vital adalah metode penentuan status gizi melalui data-data statistik kesehatan yang berhubungan dengan gizi, seperti data angka penyebab kesakitan dan kematian, data mortalitas menurut umur tertentu dan data lain yang berhubungan dengan gizi (Dewa Nyoman Supariasa, Bachyar Bakri, 2002).

Penilaian status gizi dengan menggunakan faktor ekologi sebab masalah gizi dapat terjadi akibat adanya interaksi beberapa faktor ekologi, seperti faktor fisik, faktor biologis dan lingkungan budaya. Penilaian berdasarkan faktor ekologi digunakan untuk mengetahui penyebab kejadian gizi salah (*malnutrition*) di suatu masyarakat, yang selanjutnya dapat berguna dalam pelaksanaan intervensi gizi (Dewa Nyoman Supariasa, Bachyar Bakri, 2002).

Pada umumnya kekurangan gizi identik dengan konsumsi makanan yang tidak mencukupi kebutuhan atau anak sulit untuk makan. Namun, ada berbagai penyebab yang menyebabkan seorang anak dapat mengalami kekurangan gizi. Berikut ini penyebab kekurangan gizi yang biasa terjadi. (Widodo dalam Suparyanto, 2014)).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi pada Anak Usia Sekolah

a. Perkembangan Fisik dan Sosial

Anak sekolah adalah kelompok anak usia 7-12 tahun. Dengan usaha mengembangkan kebebasan dan membentuk nilai-nilai pribadi, kebutuhan gizi antar anak berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh ukuran dan komposisi tubuh, pola aktivitas dan kecepatan tumbuh. Pertumbuhan yang cepat pada waktu bayi diikuti penurunan laju pertumbuhan pada anak pra sekolah dan anak usia sekolah (Yenita, 2012).

Rata-rata kenaikan berat badan di usia ini sekitar 1,8-2,7 kg setahun, sedangkan penambahan tinggi badan kurang lebih 7,6 cm setahun pada anak antara satu tahun sampai tujuh tahun, kemudian meningkat sebanyak 5,1 cm setahun hingga awal pertumbuhan cepat pada usia remaja. Kelompok ini mempunyai laju pertumbuhan fisik yang lambat tetapi konsisten, terus menerus memperoleh pendewasaan dalam keterampilan motorik serta menunjukkan peningkatan yang berarti dalam keterampilan kognitif, sosial dan emosional (Yenita, 2012).

Kebiasaan makan dan jenis makanan yang disukai dan tidak disukai pada anak usia ini merupakan dasar bagi pola konsumsi makanan dan asupan gizi anak usia selanjutnya. Anak usia sekolah mempunyai banyak akses ke uang, warung, penjaja makanan di lingkungan sekolah, toko swalayan yang menyebabkan terbukanya gerbang terhadap makanan yang nilai gizinya tidak jelas (Yenita, 2012).


b. Selalu Aktif

Semakin tinggi tingkat aktivitas tubuh maka energi dan nutrisi juga akan semakin banyak diperlukan, anak usia sekolah dasar atau usia sekolah merupakan usia yang senang bermain, senang menghabiskan waktunya untuk belajar mengetahui lingkungan sekitar. Maka di usia sekolah perlu nutrisi dan asupan energi yang banyak untuk menunjang aktivitas fisiknya (Ayu, 2014: 24).

c. Pola Makan

Sarapan sangat penting agar anak lebih bisa konsentrasi dan tidak mengantuk waktu belajar. Namun, banyak anak yang tidak mau sarapan dengan berbagai alasan. Makan malam bersama keluarga memberi kesempatan kepada keluarga untuk berinteraksi dan bersosialisasi (Yenita, 2012).

Selain pola makan yang harus diperhatikan, pola pengasuhan orang tua juga harus diperhatikan. Karena anak usia sekolah perlu perhatian dalam pengaturan pola makannya. Hal ini berkaitan di dalam QS. Al-An'am/6: 151:



 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْتِقَانٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴿١٥١﴾

Terjemahnya :

”...Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang Memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka....”
 (Departemen Agama RI, 2010: 148).

Uraian ayat di atas membahas mengenai prinsip-prinsip ajaran Islam dan beberapa perinciannya. Dimana Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar mengajak manusia meninggalkan posisi yang rendah dan hina. Salah satunya yaitu, “Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan” dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul

beban tambahan. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi kamilah sumbernya. Kami akan memberi, yakni menyiapkan sarana rezeki kepada kamu sejak saat ini dan juga kami akan siapkan kepada mereka yang penting kamu berusaha mendapatkannya (Shihab, 2002).

Dari ayat diatas terdapat penggalan ayat yang mengatakan “Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan” dalam hal ini, Allah telah menganjurkan kita untuk merawat dan membimbing anak dengan cara yang baik. Salah satu caranya yaitu mengasuh anak dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memberikan makanan yang sehat dan bergizi agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga anak dapat terhindar dari segala macam penyakit. Dan dari penggalan ayat yang mengatakan “Kamilah yang Memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”, Allah telah menjamin rezeki semua orang dan kadar rezekinya bergantung bagaimana usaha setiap orang dalam mendapatkan rezeki. Dan bagi orang tua, jangan merasa khawatir akan kehadiran anak karena anak tidak akan membawa kesulitan.

d. Perubahan Sikap terhadap Makanan

Anak usia sekolah tidak dapat ditebak, apa selera makan yang saat ini sedang ia senangi, perubahan sikap terhadap makanan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengaruh dari luar. Pada masa inilah perhatian orang tua terhadap pengaruh pola konsumsi makanan pada anak sepertinya harus digalakkan (Ayu, 2014:24).

e. Tidak Suka Makanan Bergizi

Anak usia sekolah sangat sulit untuk bisa mengonsumsi makanan yang sedang ia perlukan untuk masa pertumbuhan. Kriteria makanan yang banyak disukai oleh anak usia ini adalah makanan yang manis dan mempunyai warna yang mencolok sehingga menarik anak untuk mengonsumsinya (Ayu, 2014:24).

4. Penanggulangan Gizi Kurang

Penanggulangan gizi kurang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memperbaiki pola makan. Pola makan menjadi kunci utama menjaga kesehatan tubuh. Masyarakat mengenal diet sebagai upaya menyeimbangkan asupan zat gizi dan vitamin ke dalam tubuh. Selain pola makan yang harus diperhatikan dalam penanggulangan gizi kurang, ada beberapa cara yang dilakukan dan diharapkan dapat mengurangi kejadian gizi kurang, yaitu :

a. Fortifikasi

Fortifikasi adalah penambahan kandungan mikronutrien seperti vitamin dan mineral (termasuk elemen) kedalam makanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas gizi makanan dan memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat dengan mengurangi risiko yang dapat memengaruhi kesehatan. Fortifikasi makanan mengarah pada penambahan mikronutrien pada makanan olahan.

Fortifikasi pangan dapat menjadi intervensi hemat biaya bagi kesehatan yang dapat memberi manfaat besar. Ketentuan dari makanan yang difortifikasi adalah perlu dikonsumsi dalam jumlah yang cukup oleh sebagian besar individu dari target populasi.

b. Edukasi Gizi

Edukasi gizi merupakan salah satu upaya ekstensif dan persuasif yang diperlukan untuk memberikan perubahan perilaku dalam masyarakat agar orang-orang dalam masyarakat tersebut lebih memperhatikan makanan yang dikonsumsinya.

c. Upaya pemenuhan persediaan pangan nasional terutama melalui peningkatan produksi beraneka ragam pangan.

d. Peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga.

e. Peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan dimulai dari tingkat Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), hingga Puskesmas dan Rumah Sakit

f. Peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

g. Peningkatan teknologi pangan untuk mengembangkan berbagai produk pangan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat luas.

B. Tinjauan Umum Anak Usia Sekolah

1. Pengertian Anak Usia Sekolah

Anak usia sekolah adalah anak yang berumur 7-12 tahun, memiliki fisik lebih kuat dibanding balita, mempunyai sifat individual serta aktif dan tidak bergantung pada orang tua. Pada dasarnya pertumbuhan anak putri lebih cepat dibanding anak putra. Kebutuhan gizi pada anak lebih banyak digunakan untuk aktivitas pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh (Alatas, 2011).

Pertumbuhan dan perkembangan yang normal dialami oleh anak yang sehat yaitu sesuai dengan standar fisik pada umumnya dan kemampuan anak sesuai dengan anak seusianya. Kesehatan bagi anak sekolah tidak terlepas dari pengertian kesehatan pada umumnya. Kesehatan di sini meliputi kesehatan badan, rohani, dan sosial, bukan hanya sekedar bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan (UU No.9 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Kesehatan).

Pertumbuhan yang cepat dan berangsur-angsur menurun terjadi di tahun ketiga pada anak sehingga periode prasekolah dan masa sekolah kurva percepatan pertumbuhan akan membentuk kurva yang hampir datar. Sedangkan masa remaja terjadi percepatan pertumbuhan kedua untuk kemudian berhenti sama sekali, yaitu bertepatan dengan mulainya kematangan sosial (Adriani, 2014).

2. Karakteristik Anak Sekolah Dasar

Aspek perkembangan meliputi perkembangan psikologis seperti perkembangan moral, perkembangan emosional dan perilaku lainnya. Adapun perubahan fungsi biologis meliputi aspek metabolisme tubuh, fisiologis tubuh, kemampuan fungsi organ, dan sistem tubuh (Alatas, 2011: 26). Adapun Karakteristik anak usia sekolah meliputi :

- a. Pertumbuhan tidak secepat bayi.
- b. Pertumbuhan lambat.
- c. Lebih aktif memilih makanan yang disukai.
- d. Gigi susu yang tidak permanen (tanggal).
- e. Kebutuhan energi tinggi karena aktivitas meningkat.
- f. Pertumbuhan meningkat lagi pada masa remaja.

3. Masalah Gizi Pada Anak Usia Sekolah

Masalah gizi anak usia sekolah adalah tidak terpenuhinya kebutuhan zat gizi yang diperoleh dari makanan sehingga menimbulkan gangguan pada beberapa segi kesejahteraan individu atau kelompok. Masalah pangan yang terjadi menyangkut ketersediaan pangan dan kerawanan konsumsi pangan yang dipengaruhi rendahnya pendidikan, kemiskinan, adat/kepercayaan yang terkait dengan tabu makanan.

Sementara, masalah gizi di Indonesia tidak hanya mengenai kekurangan gizi namun banyak juga kasus kelebihan gizi. Adapun masalah gizi yang terdapat pada kelompok anak usia sekolah yaitu,

a. Anemia

Keadaan yang dikarenakan terlalu sedikit kandungan zat besi dalam makanan yang dikonsumsi terutama pada anak yang sering jajan sehingga menurunkan keinginan untuk mengonsumsi makanan lain. Upaya mengatasi masalah ini yaitu memberikan suplemen-suplemen zat besi serta anak harus diberi dan dibiasakan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi (Adriana, 2014).

b. Kekurangan Yodium

Penyakit gondok atau nama ilmiahnya *struma simplex* adalah salah satu gambaran penyakit kekurangan yodium ditandai dengan terjadinya pembesaran kelenjar gondok. Kekurangan yodium juga mengakibatkan gambaran klinik lain selain *goiter endemis*, yang disebut *iodine deficiency diseases (IDD)* yaitu, gondok endemis, hambatan pertumbuhan fisik dan mental yang disebut *cretinism*,

hambatan neuromotor, kondisi tuli disertai bisu (*deaf mutism*). Pembesaran gondok terdapat lebih dari 30 % diantara anak sekolah (Adriana, 2014).

c. Karies Gigi

Karies gigi sering terjadi pada anak, karena terlalu sering makan makanan yang lengkes dan banyak mengandung gula. Gigi yang berlubang akan menyerang gigi permanen sebelum gigi tersebut berhasil menembus gusi. Makanan yang dapat dengan mudah menimbulkan karies yaitu, permen, keripik kentang, kue kering dan minuman manis. Namun pada prinsipnya ketika tidak rutin menggosok gigi setelah makan makanan apapun dapat menimbulkan karies pada gigi. Upaya mencegah karies yaitu, menggosok gigi dengan pasta gigi setelah makan (Adriana, 2014).

d. Berat Badan Lebih

Laju pertumbuhan berat selayaknya dihentikan atau diperlambat sampai proporsi berat terhadap tinggi badan kembali normal. Mengurangi makanan dan memperbanyak aktivitas merupakan cara memperlambat bertambahnya berat badan. Untuk mengatasi hal itu perlu adanya pendidikan gizi dan kesehatan bagi anak sekolah agar anak sekolah mengetahui tentang pentingnya gizi seimbang bagi tubuh dan kesehatannya (Adriana, 2014).

4. Kebutuhan Zat Gizi pada Anak Usia Sekolah

Anak dari golongan usia sekolah memerlukan makanan yang kurang lebih sama dengan makanan anak prasekolah terkecuali porsi harus lebih besar karena kebutuhannya yang lebih banyak, mengingat bertambahnya berat badan

dan aktivitasnya. Kebutuhan gizi pada anak usia sekolah sangat dipengaruhi oleh banyaknya aktivitas yang dilakukan.

Adanya aktivitas yang tinggi seperti mulai dari sekolah, kursus, mengerjakan pekerjaan rumah dan mempersiapkan pekerjaan untuk esok harinya. pemenuhan pangan dan gizi anak harus cukup dan berkualitas agar stamina anak tidak menurun.

Agar stamina anak tetap fit selama mengikuti kegiatan disekolah maupun kegiatan lainnya, maka saran utama dari segi gizi adalah membiasakan sarapan pagi setiap hari dan mengkonsumsi makanan selingan selama di sekolah agar kadar gula tetap terkontrol dengan baik, sehingga tetap dapat konsentrasi pada pelajaran dan aktivitas lainnya.

Kebutuhan energi golongan umur 10-12 tahun relatif lebih besar daripada golongan umur 7-9 tahun, karena pertumbuhan relatif cepat, terutama penambahan tinggi badan. Mulai dari umur 10-12 tahun, kebutuhan gizi anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Adapun jumlah energi dan protein yang dianjurkan oleh Widya Karya Nasional dan Gizi bagi anak umur 7-12 tahun tertera pada tabel :

Tabel 2.2
Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Orang Indonesia

Kelompok Umur	Energi (Kkal)	Karbohidrat (g)	Protein (g)	Lemak(g)			Besi (mg)
				Total	n-6	n-3	
Bayi/Anak							
0-6 bulan	550	58	12	34	4,4	0,5	-
7-11 bulan	725	82	18	36	4,4	0,5	7
1-3 tahun	1125	155	26	44	7,0	0,7	8
4-6 tahun	1600	220	35	62	10,0	0,9	9
7-9 tahun	1850	254	49	72	10,0	0,9	10
Laki-laki							
10-12 tahun	2100	389	56	70	12,0	1,2	13

Perempuan							
10-12 tahun	2000	275	60	67	10,0	1,0	20

Sumber: Kemenkes, 2013

Anak dari golongan usia sekolah memerlukan makanan yang kurang lebih sama dengan yang dianjurkan untuk anak prasekolah hanya saja memiliki perbedaan dari segi porsi yang lebih besar karena bertambahnya berat badan dan aktivitasnya. Menurut (Adriani, 2012) terdapat beberapa fungsi dan sumber zat gizi yang perlu diketahui agar kebutuhan zat gizi anak usia sekolah dapat tercukupi:

a. Energi

Aktivitas fisik memerlukan energi di luar kebutuhan untuk metabolisme basal. Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya. Selama aktivitas fisik, otot membutuhkan energi di luar metabolisme untuk bergerak, sedangkan jantung dan paru-paru memerlukan tambahan energi untuk mengantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh dan untuk mengeluarkan sisa-sisa dari tubuh. Penggunaan energi di luar AMB bagi bayi dan anak selama masa pertumbuhan adalah untuk bermain dan sebagainya. Besar kecilnya angka kecukupan energi sangat dipengaruhi oleh lama serta intensitas kegiatan jasmani tersebut.

Sumber energi berkonsentrasi tinggi adalah bahan makanan sumber lemak, seperti lemak dan minyak, kacang-kacangan dan biji-bijian. Setelah itu bahan makanan sumber karbohidrat, seperti padi-padian, umbi-umbian, dan gula murni. Semua makanan yang dibuat dari dan dengan bahan makanan tersebut merupakan sumber energi.

b. Karbohidrat

Di dalam tubuh, zat-zat makanan yang mengandung unsur karbon dapat digunakan sebagai bahan pembentuk energi yaitu karbohidrat, lemak dan protein. Energi yang terbentuk dapat digunakan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh baik yang disadari maupun yang tidak disadari misal, gerakan jantung, pernapasan (paru-paru), usus, dan organ-organ lain dalam tubuh.

Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan keperluan energi tubuh, selain itu karbohidrat juga mempunyai fungsi lain yaitu karbohidrat diperlukan bagi kelangsungan proses metabolisme lemak, diketahui juga karbohidrat mengadakan suatu aksi penghematan terhadap protein, sehingga keberadaan karbohidrat dapat menyelamatkan protein (asam amino) untuk fungsinya. Pangan sumber karbohidrat misalnya sereal, biji-bijian, gula, buah-buahan, umumnya menyumbang paling sedikit 50% separuh kebutuhan energi keseluruhan.

c. Protein

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Kebutuhan protein menurut FAO/WHO/UNU (1985) adalah konsumsi yang diperlukan untuk mencegah kehilangan protein yang diperlukan dalam masa pertumbuhan, kehamilan, dan menyusui. Angka kecukupan protein (AKP) anak usia sekolah umur 7-9 tahun: 400mg untuk laki-laki dan perempuan, umur 10-12 tahun laki-laki adalah 400 mg dan untuk perempuan adalah 350 mg. Disarankan untuk memberi protein 1,5-2 g/kg berat badan bagi anak sekolah.

Sumber protein terdapat di bahan makanan hewani yang merupakan sumber protein yang baik, dalam jumlah maupun mutu, seperti: telur, susu, daging, unggas, ikan dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang, kedelai dan hasilnya, seperti tempe dan tahu serta kacang-kacangan lain.

d. Lemak

Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh, Seperti halnya dengan karbohidrat dan protein. Fungsi utama lemak yaitu menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh, mempunyai fungsi pembentuk struktur tubuh, mengatur proses yang berlangsung dalam tubuh secara langsung dan tak langsung, pembawa (*Carrier*) vitamin larut dalam lemak.

Defisiensi lemak dalam tubuh akan mengurangi kesediaan energi dan mengakibatkan terjadinya katabolisme atau perombakan protein. Cadangan lemak akan semakin berkurang dan lambat laun akan terjadi penurunan berat badan. Defisiensi asam lemak akan mengganggu pertumbuhan dan menyebabkan terjadinya kelainan pada kulit. Sumber lemak diantaranya susu, minyak *olive*, minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak ikan, dan lain-lain.

e. Kalsium

Kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, yaitu 1,5-2% dari berat badan orang dewasa atau kurang lebih sebanyak 1 kg dan jumlah ini, 99% berada dalam jaringan keras (tulang dan gigi). Peningkatan kebutuhan terjadi pada masa pertumbuhan khususnya pada anak usia sekolah dan remaja, kehamilan, menyusui, defisiensi kalsium, dan tingkat aktivitas fisik yang meningkatkan densitas tulang. Angka kecukupan rata-rata sehari untuk kalsium

bagi orang Indonesia ditetapkan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi LIPI (1998) untuk anak-anak: 500 mg dan remaja: 600-700 mg.

Sumber kalsium utama adalah susu dan hasil susu, seperti keju. Ikan dimakan dengan tulang, termasuk ikan kering merupakan sumber kalsium yang baik. Serelia, kacang-kacangan dan hasil kacang-kacangan seperti tahu dan tempe, sayuran hijau juga merupakan sumber kalsium yang baik tetapi dan bahan makanan ini banyak mengandung zat yang menghambat penyerapan kalsium seperti serat, fitat, dan oksalat. Susu *nonfat* merupakan sumber terbaik kalsium karena ketersediaan biologisnya yang tinggi.

f. Besi

Besi berfungsi sebagai cadangan untuk memproduksi hemoglobin. Kekurangan besi dapat menurunkan kekebalan tubuh sehingga sangat peka terhadap serangan bibit penyakit. Hal ini, berhubungan erat dengan menurunnya fungsi enzim pembentuk *antibody* seperti mielo-peroksida. Senyawa-senyawa besi berperan dalam transportasi dan pendayagunaan oksigen.

Angka kecukupan besi untuk anak sekolah adalah 10 mg. Sumber besi yaitu makanan hewani seperti daging, ayam, dan ikan, sumber baik lainnya adalah telur, sereal tumbuk, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan beberapa jenis buah.

g. Yodium

Yodium berfungsi sebagai bagian dari tiroksin dan senyawa lain yang disintesis oleh kelenjar tiroid. Tubuh mengandung sekitar 25 mg yodium, dimana sepertiganya terdapat dalam kelenjar tiroid dan berfungsi untuk mengontrol transduksi energi selular.

Kebutuhan yodium sehari-hari sekitar 1-2 µg/kg berat badan. Widyakarya pangan dan gizi (1998) menganjurkan angka kecukupan gizi yodium untuk anak sekolah 70-120 µg. Sumber yodium yang utama yaitu makanan laut berupa ikan, udang, dan kerang serta ganggang laut. Di daerah pantai air dan tanah banyak mengandung yodium sehingga tanaman yang tumbuh di daerah pantai mengandung cukup banyak yodium.

C. Tinjauan Umum Rumput Laut Lawi-Lawi (*Caulerpa racemosa*)

Indonesia dikenal sebagai negara dengan luas lebih 70% wilayah laut. Hasil laut umumnya adalah ikan, alternatif hasil laut lainnya yang bisa diolah adalah rumput laut. Dalam dunia perdagangan, rumput laut merupakan salah satu hasil komoditi yang cukup terkenal, meskipun tidak semua jenis rumput laut memiliki nilai ekonomis. Rumput laut termasuk dalam golongan tanaman tingkat rendah dan anggota alga (tanaman yang memiliki klorofil atau zat hijau daun). Rumput laut diketahui kaya nutrisi esensial, seperti asam nukleat, asam amino, enzim, mineral, *trace elements*, vitamin A, B, C, D, E, dan K (Abumie, 2007 dalam Lely Okmawaty Anwar, Rita. L. Bubun, 2016).

Caulerpa merupakan salah satu genus alga laut dari Famili Caulerpaceae dan termasuk spesies dari Kelas Chlorophyceae (alga hijau) (Atmadja PS, Kadi A, Sulistijo, 1996). Hamel (1931) diacu dalam Raniello *et al.* (2004) menyatakan bahwa jenis *Caulerpa racemosa* pertama kali ditemukan di sepanjang pantai Tunisia perairan Mediterania pada tahun 1926. Makroalga laut jenis *Caulerpa racemosa* seperti tanaman rumput yang memiliki thalus berwarna hijau, terdiri dari banyak cabang tegak yang tingginya sekitar 2,5-6,0 cm. Batang pokok

berukuran antara 16-22 cm. Terdapat bulatan-bulatan seperti anggur pada puncak cabang, panjang setiap puncak cabang sekitar 2,5-10,0 cm (Trono dan Ganzofortes 1988 diacu dalam Yudasmara, 2014).

Caulerpa merupakan salah satu jenis rumput laut yang cukup potensial untuk dibudidayakan karena telah dikenal dan digemari oleh sebagian masyarakat. Selain di konsumsi sebagai makanan, *Caulerpa* ini juga telah dimanfaatkan sebagai bahan campuran untuk obat anti jamur (Suhartini, 2003 dalam Yudasmara, 2014). Di Indonesia *Caulerpa* dikenal dengan sebutan Lawi-Lawi (Sulawesi), Latoh (Jawa), Bulung Boni (Bali), sedangkan di Jepang disebut Umi Budo. *Caulerpa* ini bentuk dan rasanya menyerupai telur ikan Caviar, sehingga dikenal sebagai "green caviar". Selain itu juga karena bentuknya menyerupai anggur, sebagian orang menyebutnya sebagai "sea grape" atau anggur laut (Yudasmara, 2014).



Gambar 1. Rumput laut *Caulerpa racemosa*
(sumber: Seaweed Industry Association, 2014 dalam Khatimah, 2016)

Klasifikasi alga *Caulerpa racemosa* adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Phylum : Thallophyta

Class : Chlorophyceae
Order : Siphonales
Family : Caulerpaceae
Genus : Caulerpa
Species : *Caulerpa racemosa* (Khatimah, 2016).

Caulerpa racemosa adalah Chloro-phyta dari ordo Bryopsidales milik keluarga Caulerpaceae. Genus *Caulerpa* mencakup sekitar 85 species (Guiry dan Guiry, 2007 dalam Klein & Verlaque, 2008). Ciri khas *Caulerpa racemosa* diantaranya berwarna hijau, mempunyai thalus dengan stolon berukuran kurang lebih 5 cm, perakarannya (*holdfast*) relatif besar dan meruncing seperti paku dengan panjang ramuli mencapai 8 cm. Ramuli merupakan organ cabang atau percabangan dari stolon sebagai organ utama, substansinya agak lunak dan terkesan kosong (gembos). Ramuli ini berdiameter antara 2-4 mm. Ramuli timbul pada stolon yang bercabang dan memiliki bulatan-bulatan dengan ujung yang rata dan bertangkai serta tersusun di sekitar dan sepanjang ramuli. Pada masa reproduksi, *Caulerpa racemosa* akan mengeluarkan substansi berwarna putih seperti susu, namun kemudian akan mati dalam` satu atau dua hari. Awalnya *Caulerpa racemosa* akan kehilangan warnanya, kemudian hancur dan mengotori perairan. Spesies ini sering ditemukan tumbuh pada berbagai substrat dengan sebaran yang luas (Atmadja dkk, 1996 dalam (Yudasmara, 2014).

Distribusi rumput laut jenis *Caulerpa racemosa* ini tersebar luas di daerah subtropis dan tropis, seperti Cina, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam dan daerah barat perairan Pasifik (FAO 2007). Alga

jenis ini tumbuh pada perairan keruh dan permukaan substrat berlumpur lunak, tepi karang yang terbuka dan terkena ombak laut yang keras serta perairan tenang yang jernih dan bersubstrat pasir keras. Karena akarnya kokoh dan bercabang pendek jenis ini sangat kuat melekat pada substrat. Alga jenis ini pada beberapa daerah seperti Tapanuli dan Kepulauan Seribu dikonsumsi dalam keadaan mentah maupun matang walaupun memiliki tekstur yang kasar dengan rasa pedas seperti lada (Trono dan Ganzo-Fortes 1988 dalam Yudasmara, 2014).

Caulerpa racemosa tumbuh bergerombol atau berumpun oleh karena itu disebut sebagai anggur laut. Keberadaannya dapat ditemukan dipaparan terumbu karang dengan kedalaman hingga 200 m. Sebagai fitobentik, tumbuhan ini hidup menancap atau menempel di substrat dasar perairan laut seperti karang mati, fragmen karang, pasir dan lumpur. Pertumbuhannya bersifat epifitik atau saprofitik dan kadang-kadang berasosiasi dengan tumbuhan laut (Atmadja dkk, 1996 dalam Yudasmara, 2014).

Rumput laut pada umumnya menghasilkan senyawa hidrokoloid sebagai produk metabolisme (metabolit) primer. Metabolit primer ini banyak diolah menjadi agar, alginat, karaginan, dan lain-lain. Selain banyaknya manfaat dari produk metabolit primer, rumput laut juga mengandung produk metabolit sekunder. Sekitar 500 *natural products* (senyawa kimia) yang berasal dari rumput laut sudah diidentifikasi dan persentase terbesar berasal dari produk tersebut merupakan senyawa aktif (*bioactive substances*). Senyawa aktif tersebut adalah hasil metabolit sekunder dari berbagai jenis rumput laut (Anggadiredja JT, Zalnika A, Purwoto H, 2006).

Kelompok alga laut Genus *Caulerpa* mempunyai senyawa metabolit sekunder yang cukup banyak. Metabolit yang dihasilkan dari *Caulerpa* adalah *glycoglycerolipid* dan kelompok *enol*. Kandungan lainnya adalah α -1-gliceryl-Dmannoside-4-amonium yang digunakan sebagai *antihelminthic* (zat pembunuh cacing), juga alkaloid yang digunakan sebagai penurun tekanan darah (Suhartini 2003 dalam Sherly Ridhowati, 2016). Komponen bioaktif *Caulerpa* dilaporkan berupa senyawa diterpenoid, triterpenoid dan komponen nitrogen (Amico *et al.* 1978 dalam Sherly Ridhowati, 2016). Menurut Fenical (1978) dalam Sherly Ridhowati (2016) *Caulerpa* mengandung metabolit dari golongan diterpenoid asiklik yaitu trifarin dan senyawa diterpenoid monosiklik yaitu kaulerpol yang dikenal sebagai pro-vitamin A atau retinol. Senyawa metabolit sekunder inilah menjadikan genus *Caulerpa* sebagai pangan fungsional.

Tabel 2.3 Komposisi proksimat dari rumput laut *Caulerpa Racemosa* (Berdasarkan Kering)

Parameter	Kadar (%)
Kadar air*	92,375 \pm 0,027
Kadar protein	21,730 \pm 5,165
Kadar lemak	8,681 \pm 0,964
Kadar abu	20,910 \pm 1,290
Kadar karbohidrat	48,679 \pm 7,419
Serat kasar	8,429 \pm 2,380

Sumber: Farid, Ibrahim, Dewi, Susanto, & Amalia (2013)

Makroalga memiliki banyak kegunaan, seperti makanan untuk konsumsi manusia, bahan-bahan dalam pembuatan kosmetik dan pupuk, produk yang diolah

untuk mengekstrak agen gel atau aditif pakan hewan. Pada tahun 2012, diperkirakan bahwa sekitar 9 juta ton makroalga yang dibudidayakan ditujukan untuk konsumsi manusia langsung, terutama di Asia Timur (FAO, 2014 dalam Kumar, Gupta, Kumari, Reddy, & Jha, 2011). Konsumsi rumput laut sebagai sayuran laut dalam makanan manusia telah menjadi praktik umum di beberapa Negara Asia (Nisizawa, 2002 dalam Kumar, Gupta, Kumari, Reddy, & Jha, 2011).

Penjelasan mengenai mengonsumsi makanan yang berasal dari laut dijelaskan dalam QS. al-Maidah/ 5: 96:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ...

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan” (Departemen Agama RI, 2010: 124).

Maksud penggalan ayat tersebut, binatang laut itu halal diburu dan halal dimakan, baik bagi orang yang sedang ihram maupun yang tidak sedang ihram (Quthb, 2002).

Dari ayat diatas dijelaskan makanan yang berasal dari laut seperti ikan, udang, rumput laut ataupun sejenisnya yang hidup di laut halal untuk dikonsumsi, baik makanan yang telah diasingkan dan dikeringkan. Maka makanan yang dari laut boleh dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

D. Tinjauan Umum Ikan Layang (*Decapterus ruselli*)

Sumber daya ikan pelagis pada umumnya merupakan bagian dari sumberdaya perikanan yang hidup dilapisan permukaan dan terdiri dari banyak

spesies yang ukuran badannya relatif tetap kecil meskipun sudah dewasa (Dwiponggo, 1983 dalam Prihartini, 2006).

Sumberdaya ikan pelagis kecil di Laut Jawa dan sekitarnya terdiri dari komunitas ikan pelagis neritik dan oceanik (*Decapterus russelli*, *D.macrosona*, *Selar crumenophthalmus*, *Rastrelliger kanagurta*, *Amblygaster sirm*) ikan pelagis pantai (*Sardinella spp*, *Rastrelliger spp*, *Selar spp*, *Dusumieria acuta*) (Potier, dkk, 1988 dalam Prihartini, 2006).

Hasil tangkapan pukat cincin terdiri lima species utama yaitu ikan layang (*Decapterus ruselli* dan *Decapterus macrosona*), Banyar (*Rastrelliger kanagurta*), Selar (*Selar crumen ophthalmus*), siro (*Amblygaster sirm*). Dari seluruh hasil tangkapan ikan-ikan tersebut memberi kontribusi 90%, kecuali di zona penangkapan Utara Jawa Tengah sampai Karimunjawa (Suwarso, dkk, 2003 dalam Prihartini, 2006).

Sehubungan dengan itu, telah dijelaskan nikmat dari Allah yang ada di lautan dalam QS. an-Nahl/ 16: 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ...

Terjemahnya:

“Dan Dia-lah yang Menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya,” (Departemen Agama RI, 2010: 268).

Uraian ayat diatas membahas mengenai perhatian kita pada laut dan mengenai ikan. Ikan laut memiliki keistimewaan yaitu empuk, tidak pernah keras atau kejang atau liat (Hamka, 1999).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT banyak memberikan nikmat kepada manusia lewat adanya laut. Allah menundukkan laut untuk manusia agar manusia dapat mengambil manfaat dari laut tersebut. Didalam laut banyak sekali manfaat, yaitu banyak terkandung bahan makanan. Sebagai sumber bahan makanan seperti ikan. Ikan sebagai daging yang segar, maka daging ikan harus dimakan dengan segera. Karena daging ikan cepat rusak dan berubah sifatnya.

Ikan layang (*Decapterus ruselli*) merupakan pelagis kecil yang penting di Indonesia. Ikan yang tergolong suku *Carangidae* ini bisa hidup bergerombol. Ukurannya sekitar 15 cm meskipun ada pula yang bisa mencapai 25 cm. Ciri khas yang sering dijumpai pada ikan layang ialah terdapatnya sirip kecil (*finlet*) di belakang sirip punggung dan sirip dubur dan terdapat sisik berlingir yang tebal (*lateral scute*) pada bagian garis sisi (*lateral line*) (Nontji, 2002).



Gambar 2. Ikan Layang (*Decapterus ruselli*)
(Sumber: Isa, et al, 1998 dalam Prihartini, 2006)

Menurut Nelson (2006) klasifikasi ikan layang adalah sebagai berikut:

Phyllum : Chordata

Kelas : Actinopterygii

Ordo : Perciformes

Familia : Carangidae

Genus : Decapterus

Spesies : *Decapterus ruselli*

Tabel 2.4 Kandungan Zat Gizi Ikan Layang

Zat Gizi	Jumlah
Kalori/Energi (kkal)	109
Protein (g)	22
Lemak (g)	1,7
Karbohidrat (g)	0
Kalsium (mg)	50
Fosfor (mg)	150
Besi (mg)	2
Vitamin A (SI)	47
Air (g)	74

Sumber : Hardinsyah & Briawan (1994) dalam Kholillah (2002)

E. Tinjauan Umum Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi Kombinasi Ikan Layang

Bakso adalah makanan yang berupa daging dan berbahan utama daging baik sapi, ikan, udang maupun cumi yang sering dikonsumsi banyak orang. Di Indonesia, jajanan bakso banyak digemari oleh seluruh umur dan lapisan masyarakat karena bakso memiliki tekstur yang kenyal dan cita rasa yang khas. Berdasarkan SNI 01-3818-1995, bakso daging didefinisikan sebagai produk makanan berbentuk bulatan atau lain, yang diperoleh dari campuran daging ternak (kadar daging tidak kurang dari 50 persen) dan pati atau sereal dengan atau tanpa Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang diizinkan (Silfianti, 2011).

Dalam perkembangannya, bakso berasal dari Republik Rakyat Cina dan dijual di daerah pemukiman orang cina serta restoran-restoran cina. Bakso berasal dari bahasa Cina yaitu “Bak” dan “So”, “Bak” berarti daging babi, “Sop” berarti mie di tambah sup. Kemudian di Indonesia daging babi dirubah menjadi daging

sapi, walaupun tetap menggunakan kata “Bak”. Kini, bakso sudah sangat terkenal di Indonesia dan dapat dijumpai di pedagang kaki lima, pedagang keliling, warung makan sederhana, restoran mewah sampai hotel berbintang. Menurut Purnomo (1997) dan Astawan (1989) dalam Silfianti (2011) menyatakan bahwa Bakso merupakan makanan tradisional Indonesia yang telah menerima popularitas di antara setiap tingkatan kelas sosial masyarakat Indonesia.

Daging merupakan bahan utama dalam pembuatan bakso. Secara tradisional, pada dasarnya bakso dibuat dari daging giling, tepung tapioka, bawang putih dan garam. Semua bahan akan dicampur dan campuran atau adonan dibentuk menjadi bola kemudian dimasak dalam air mendidih (Triatmojo dalam Silfianti, 2011). Dalam pembuatan bakso, ada beberapa tahapan, yaitu tahap penghancuran daging, pembentukan adonan, pencetakan dan pemasakan.

Tahap penghancuran daging dapat dilakukan dengan mencacah, mencincang atau menggiling daging. Daging yang digunakan tergantung dari selera, yaitu daging ikan, daging sapi, daging ayam atau udang (Silfianti, 2011).

Bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) adalah produk olahan dengan bahan rumput laut lawi-lawi dan ikan layang. Bakso tersebut dibuat dengan cara pencampuran bahan-bahan menjadi adonan yang kemudian dimasak dalam air mendidih. Tujuan dari pembuatan bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang ini yaitu sebagai Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak sekolah yang mengalami gizi kurang.

Bakso terdiri dari lima sampel yang telah diuji di Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Laboratorium Uji dan Kalibrasi BBIHP Makassar, yang terdiri dari bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) dengan perbandingan (1:0) bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) dengan perbandingan berbeda-beda yaitu (3:1), (1:1), (1:3) dan bakso ikan layang (*Decapterus ruselli*) dengan perbandingan (0:1). Dari kelima perbandingan tersebut, peneliti mengambil bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) dengan perbandingan 1:1 untuk diintervensikan kepada anak usia sekolah gizi kurang pada kelompok kasus, serta bakso ikan layang (*Decapterus ruselli*) untuk diintervensikan kepada anak usia sekolah gizi kurang pada kelompok kontrol. Alasan peneliti memilih otak-otak perbandingan 1:1 untuk diintervensikan kepada anak usia sekolah gizi kurang pada kelompok kasus karena berdasarkan hasil uji bakso dengan perbandingan 1:1 memiliki kandungan zat gizi makro yang bagus dari sampel bakso lainnya (3:1, 1:3 dan bakso rumput laut lawi-lawi tanpa kombinasi) untuk nantinya dilihat apakah ada pengaruh pemberian terhadap perubahan status gizi. Sedangkan pemilihan bakso ikan layang (*Decapterus ruselli*) untuk diintervensikan kepada anak usia sekolah gizi kurang kelompok control. Pemberian yang berbeda kepada kedua kelompok kasus ini agar memudahkan peneliti melihat pengaruh pemberian bakso terhadap status gizi anak usia sekolah gizi kurang. Berikut daftar kandungan gizi dari bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) dengan berbagai perbandingan.


Tabel 2.5
Kandungan Gizi dalam 100 Gram Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi (*Caulerpa racemosa*) Kombinasi Ikan Layang (*Decapterus russelli*) Dengan Berbagai Perbandingan

Formula	Kandungan Zat Gizi dalam 100 Gram Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi (<i>Caulerpa Racemosa</i>) Kombinasi Ikan Layang			
	Karbohidrat (%)	Protein (%)	Lemak (%)	Zat Besi (mg/kg)
1:0	25.15	4.33	6.35	21.58
3:1	29.91	5.21	8.39	20.79
1:1	25.59	8.44	11.08	24.79
1:3	23.64	15.02	8.16	17.18
0:1	25.31	20.31	6.53	13.92

Sumber: Data Sekunder (2018) dalam Haris (2018)



F. Kerangka Teori




Sumber : Persagi. 1999. *Visi dan Misi Gizi dalam Mencapai Indonesia Sehat*

Tahun 2010. Jakarta.

G. Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep variabel yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:



Keterangan :

- : Variabel yang diteliti
- - - - - : Variabel yang tidak diteliti
- > : Hubungan Variabel ke variabe

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif lapangan, yaitu pengumpulan data dari sampel, baik distribusi karakter, hubungan antara variabel, atau variabel lain terkait masalah yang dapat dihitung berupa angka-angka mengenai pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap status gizi kurang pada anak sekolah umur 7-9 tahun di Madrasah Ibtidaiyah (MI) wilayah kerja Puskesmas Layang Kota Makassar.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2018 yang dilaksanakan di tiga sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) wilayah kerja Puskesmas Layang Kota Makassar, yaitu:

- a. MI As'Adiyah No. 170 Layang, Jl. Tinumbu Lr. 149 No. 23
- b. MI Ath-Tanmiyatul Ilmiah, Jl. Tinumbu Dalam No.144
- c. MI MDIA 3 Nurul Ikhsan, Jl. Sibula Dalam No. 35

B. Pendekatan Penelitian


Pendekatan yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu (*Quasi eksperimen design*), jenis penelitian ini menguji pengaruh antar variabel yang satu dengan variabel lainnya. Desain yang digunakan yaitu *Non-Equivalent Kontrol Group* dengan melakukan pengujian melalui intervensi pada

anak usia sekolah berstatus gizi kurang. Dalam rancangan ini pengelompokan anggota sampel pada kelompok kasus dan kelompok kontrol tidak dilakukan secara random atau acak tetapi ditentukan oleh peneliti (sering disebut *non randomized kontrol group pretest design*).

Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen (variabel bebas) adalah bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) sedangkan yang menjadi variabel dependen (variabel terikat) adalah status gizi kurang pada anak sekolah. Intervensi yang dilakukan pada anak sekolah dasar gizi kurang adalah pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) pada kelompok kasus dan bakso ikan layang (*Decapterus ruselli*) pada kelompok kontrol.

Penentuan kelompok perlakuan tidak diacak tetapi ditentukan oleh peneliti. Peneliti mengambil sampel anak sekolah gizi kurang sebanyak 36 orang yang terbagi 18 anak kelompok kasus dan 18 anak kelompok kontrol. Kemudian dari hasil pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) dan bakso ikan layang (*Decapterus ruselli*).

Gambar 3.1 Rancangan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Anak sekolah dasar gizi kurang yang diperoleh dari pengukuran antropometri (BB/U) serta sesuai dengan kriteria inklusi peneliti. Terlebih dahulu mensosialisasikan kepada siswa dan orangtua/wali siswa mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dilakukan dua kali *Recall 24 Hours* untuk mengetahui gambaran asupan makanan pada anak dan pemberian obat cacing (pada anak yang belum mengkonsumsi obat cacing selama 6 bulan terakhir). Hal tersebut dilakukan untuk menurunkan intensitas infeksi cacing pada anak, karena infeksi cacing dapat mempengaruhi penyerapan zat gizi (seperti karbohidrat, protein, vitamin A dan zat besi) pada anak, kemudian intervensi dilakukan setelah dua hari pemberian obat cacing.

Kelompok intervensi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Pada kelompok kasus dan kontrol diberi makanan tambahan 1 kali sehari selama 30 hari diluar makanan sehari-hari pada anak serta dilakukan pencatatan besaran jumlah bakso yang dikonsumsi. Setelah pemberian makanan tambahan tersebut, peneliti kembali melakukan dua kali *Recall 24 Hours* dan penimbangan berat badan, kemudian menganalisis dengan menggunakan indeks berat badan menurut umur (*z-score*), baik pada kelompok kasus maupun kelompok kontrol.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak sekolah usia 7-9 tahun yang gizi kurang yang berjumlah 40 orang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) wilayah kerja Puskesmas Layang Kota Makassar. Dari 40 jumlah anak usia sekolah yang gizi kurang terdiri 16 siswa di MI As'Adiyah No. 170 Layang, 14 siswa di MI Attamiyatul Ilmiah dan 10 siswa di MI MDIA 3 Nurul Ikhsan.

2. Sampel

Pada penelitian ini sampel diambil secara *purposive sampling* atau berdasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2012).

- a. Sampel penelitian harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

Kriteria inklusi:

- 1) Anak sekolah dasar dengan usia 7-9 tahun

- 2) Memiliki berat badan menurut umur dengan nilai *z-score* -3 SD s/d <-2 SD (gizi kurang)
- 3) Tidak menderita penyakit infeksi yang serius seperti diare, thypoid, ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan) dan DBD
- 4) Bersedia untuk diwawancarai dan menjadi subjek penelitian dengan menandatangani lembar persetujuan responden
- 5) Bersedia mengikuti prosedur subjek penelitian selama penelitian berlangsung
- 6) Menetap/tidak pindah daerah

Kriteria eksklusif:

- 1) Anak sekolah SD dengan usia <7 tahun dan ≥ 9 tahun.
- 2) Memiliki berat badan menurut umur dengan nilai *z-score* <-3 dan ≥ -2 (tidak gizi kurang)
- 3) Menderita penyakit infeksi yang serius seperti diare, thypoid, ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan) dan DBD
- 4) Tidak bersedia untuk diwawancarai dan menjadi subjek penelitian dengan menandatangani lembar persetujuan responden
- 5) Tidak bersedia mengikuti prosedur subjek penelitian selama penelitian berlangsung
- 6) Pindah daerah atau meninggal dunia

b. Besar Sampel

Perhitungan besar sampel dilakukan supaya memenuhi jumlah syarat analisis, dengan menggunakan rumus (Federer, 1963 dalam Notoatmodjo, 2012), sampel (n) dapat ditentukan berdasarkan total kelompok (t) yang digunakan dalam penelitian. Sehingga jika $t=2$ kelompok maka besar sampel yang digunakan:

$$(n-1)(t-1) \geq 15$$

$$(n-1)(2-1) \geq 15$$

$$(n-1)(1) \geq 15$$

$$n-1 \geq 15$$

$$n \geq 15 + 1 = 16$$

$$n \geq 16$$

Untuk jumlah cadangan sampel yang digunakan:

$$\text{Jumlah sampel minimal} \times 10\% = 16 \times 10\%$$

$$= 1,6 \text{ dibulatkan jadi } 2$$

Dengan demikian, setiap kelompok perlakuan terdapat minimal 16 sampel, yaitu 16 sampel untuk kelompok kasus dan 16 sampel untuk kelompok kontrol. Untuk mengantisipasi adanya *drop out* sampel, maka ditambah sebanyak 10% sampel cadangan dari jumlah sampel tiap kelompok yaitu 2 penambahan sampel pada kelompok kasus dan pada kelompok kontrol. Adapun sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 36 siswa gizi kurang yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol yang masing-masing kelompok terdiri dari 18 siswa. Selanjutnya diintervensi bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) dan bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*). Berdasarkan perhitungan sampel, maka jumlah sampel yang digunakan telah memenuhi jumlah sampel minimum.

Hal tersebut didasari teori dari beberapa ahli, menurut Baley, Roscoe dalam (Sugiyono, 2012) menyarankan tentang ukuran sampel untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 s/d 20. Selaras dengan pendapat Roscoe, pendapat Gay dalam (Mahmud, 2011) yang menyatakan bahwa ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode *experimentel* minimal 15 subjek per kelompok. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Baley dalam (Mahmud, 2011) menyatakan bahwa untuk penelitian yang menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel paling minimum adalah 30.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling. Sampling adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat atau meneliti sampelnya saja. Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung pada objek peneliti yaitu melalui observasi langsung yang meliputi identitas sampel dan pengukuran antropometri berat badan sebelum dan setelah intervensi dan wawancara dengan metode *recall 24 hours* untuk mengetahui asupan makanan pada sampel.

2. Data Sekunder

Diperoleh melalui penelusuran pustaka, jurnal-jurnal hasil penelitian, buku literatur yang relevan, laporan dan data instansi yang terkait.

E. Instrumen Penelitian

1. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) dan bakso ikan layang yang telah lulus uji mikroba dan uji organoleptik. Pemberian dosis intervensi sebanyak 100 gram perhari yang diberikan satu kali sehari berturut-turut selama 30 hari.
- b. Obat cacing, pemberian obat cacing sebelum intervensi bakso dilakukan untuk membunuh cacing dalam tubuh manusia dengan menggunakan obat yang aman dan efektif dalam memberantas berbagai jenis cacing usus sehingga dapat menurunkan intensitas kecacingan pada anak.

2. Alat

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Inform Consent*/ Form pernyataan kesediaan menjadi responden
- b. Form identitas responden, identitas sampel, dan
- c. Form data pengukuran antropometri
- d. Food recall 24 jam untuk mencatat makanan yang dikonsumsi responden dalam 24 jam
- e. Form pemantauan konsumsi bakso oleh anak sekolah dasar.
- f. Timbangan digital untuk mengukur berat badan
- g. Alat timbang makanan.
- h. Foto-foto makanan berdasarkan Ukuran Rumah Tangga (URT)
- i. Alat tulis menulis

3. Cara Kerja

a. Pengukuran berat badan

- 1) Timbangan diletakkan pada bidang datar.
- 2) Pastikan timbangan telah dikalibrasi dan dalam kondisi baik serta pastikan petunjuk angka tepat di angka 0.
- 3) Subjek melepaskan sepatu, tas, dan barang lainnya selain pakaian yang dikenakan dan pastikan subjek tidak menggunakan pakaian yang tebal agar mendapatkan berat badan anak seakurat mungkin.
- 4) Meminta subjek untuk naik keatas timbangan dengan posisi badan dalam keadaan berdiri tegak, tenang, mata, kepala lurus ke arah depan, kaki tidak menekuk.
- 5) Setelah posisi benar, dilakukan pencatatan berat badan.
- 6) Ulangi prosedur sebanyak 2 kali. Apabila terdapat selisih >0.4 kg maka dilakukan pengukuran ketiga.

b. Prosedur intervensi

- 1) Sampel diberikan bakso setiap hari selama 30 hari penuh.
- 2) Bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang atau bakso ikan layang diberikan bersamaan dengan makanan lainnya ketika responden sedang makan atau dapat diberikan secara terpisah. Namun bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang atau bakso ikan layang berfungsi sebagai makanan tambahan diluar makanan yang diberikan oleh orang tua responden.

c. Metode Recall 24 jam

Metode recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Biasanya dimulai sejak ia bangun sampai istirahat tidur malam harinya. Semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dikonversi dari URT kedalam ukuran berat (gram). Dalam manaksir/ memperkirakan kedalam ukuran berat (gram) menggunakan berbagai alat bantu seperti contoh ukuran rumah tangga (piring, gelas, sendok, dan lain-lain) atau model dari makanan (*food model*). Metode ini dilakukan sebanyak empat kali yaitu dua kali recall 24 sebelum intervensi dan dua kali recall 24 jam setelah intervensi.

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Validasi

Validasi merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang di uji validitas dan reliabilitasnya adalah instrument penelitiannya (Sugiyono, 2013).

Suatu skala atau instrument dapat dinyatakan memiliki validitas yang tinggi apabila instrument tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Validitas pengukuran berkaitan dengan tiga unsur yaitu: alat ukur, metode ukur, dan pengukur.

Dalam penelitian ini, keseluruhan unsur validitas termasuk alat ukur, metode pengukuran, dan pengukurannya sudah valid, artinya semua telah sesuai dengan standar operasional sehingga semua unsur dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

2. Reliabilitasi Instrumen

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian mempunyai kehandalan sebagai alat ukur. Instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Untuk menjaga tingkat konsistensi (reliabilitas) alat timbangan tersebut, maka peneliti melakukan pengulangan penimbangan sebanyak tiga kali agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan lebih akurat.

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer melalui tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Editing dilakukan untuk menilai kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian nilai *zscore* dalam lembar hasil pengukuran penelitian.

b. Coding

Setelah memperoleh hasil pengukuran berat badan, dilakukan identifikasi, klasifikasi kemudian diberi kode.

c. Entry data

Memasukkan data yang telah diberi kode pada lembar hasil pengukuran untuk diproses secara komputerisasi.

d. Cleaning

Pembersihan data dari kesalahan-kesalahan selama mengentri data.

e. Tabulasi

Setelah instrumen diisi dengan baik, maka data kemudian di tabulasi disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

f. Nutrisurvey

Nutrisurvey digunakan untuk mengetahui jumlah asupan zat gizi yang dikonsumsi.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan narasi distribusi frekuensi persentase variabel baik variabel independen maupun variabel dependen. Selain itu dilakukan tabulasi silang antara variabel independen dan variabel dependen.

3. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan program aplikasi SPSS yang disesuaikan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Uji Univariat

Uji yang dilakukan pada tiap variabel dari hasil penelitian. Analisis ini menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel yang diteliti.

b. Uji Bivariat

Uji dilakukan pada dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan uji-T berpasangan (*Paired T-Test*), uji ini adalah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas (berpasangan). Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu (objek penelitian) dikenai 2 buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh 2 macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Uji T berpasangan dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) dan bakso ikan layang (*Decapterus ruselli*) terhadap status gizi anak sekolah gizi kurang pada kelompok kasus dan kelompok kontrol dengan tingkat kepercayaan semua uji yaitu 95% atau $\alpha = 5\%$ (0.05). Data yang diuji dengan menggunakan uji-T berpasangan (*Paired T-Test*) harus berdistribusi normal. Bila data tidak berdistribusi normal, uji dilakukan secara nonparametrik dengan menggunakan uji Wilcoxon.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Lokasi Penelitian

1) MI As'Adiyah No. 170 Layang

Madrasah Ibtidaiyah As'Adiyah No. 170 Layang terletak di Jl. Tinumbu Lr. 149 No. 23 di Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Gedung yang dimiliki MI As'Adiyah No. 170 Layang terdiri dari 5 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang UKS, 1 ruang tata usaha dan 1 gudang sekolah. Jumlah siswa sampai saat peneliti melakukan penelitian sebanyak 120 orang, dengan perincian laki-laki sebanyak 113 orang dan perempuan sebanyak 87 orang.

Madrasah Ibtidaiyah As'Adiyah No. 170 Layang, didukung oleh tenaga pengajar yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 6 orang guru kelas, 3 orang guru bidang studi, 1 orang operator, 1 orang tata usaha dan 1 orang penjaga sekolah.

2) MI Ath-Tanmiyatul Ilmiah

Madrasah Ibtidaiyah Ath-Tanmiyatul Ilmiah terletak di Jl. Tinumbu Dalam No. 144 Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Gedung yang dimiliki MI Ath-Tanmiyatul Ilmiah terdiri dari 5 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah dan 1 ruang perpustakaan sekaligus ruang guru. Jumlah siswa sampai saat peneliti melakukan penelitian sebanyak 127

orang, dengan perincian laki-laki sebanyak 73 orang dan perempuan sebanyak 54 orang.

Madrasah Ibtidaiyah Ath-Tanmiyatul Ilmiah, didukung oleh tenaga pengajar yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 6 orang guru kelas, 1 guru Bidang Studi Fiqih dan Alquran Hadits, 1 operator sekolah dan 1 orang penjaga sekolah.

3) MI MDIA 3 Nurul Ikhsan

Madrasah Ibtidaiyah MDIA 3 Nurul Ikhsan terletak di Jl. Sibula Dalam No. 35 Kecamatan Bontoala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Gedung yang dimiliki MI MDIA 3 Nurul Ikhsan terdiri dari 5 ruang kelas, 1 ruang kantor, 1 ruang UKS dan 1 ruang perpustakaan. Jumlah siswa sampai saat peneliti melakukan penelitian sebanyak 115 orang, dengan perincian laki-laki sebanyak 65 orang dan perempuan sebanyak 50 orang.

Madrasah Ibtidaiyah MDIA 3 Nurul Ikhsan, didukung oleh tenaga pengajar yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 6 orang guru kelas, 2 guru Bidang Studi dan 1 orang penjaga sekolah.

b. Visi dan Misi Sekolah

1) MI As'Adiyah No. 170 Layang

a) Visi

Memposisikan madrasah sebagai sarana penyiapan dan pengembangan keunggulan sumber daya insan yang berkualitas dibidang IPTEK dan IMTAQ.

b) Misi

Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada mutu secara keilmuan, oral dan sosial sehingga daya insan yang memiliki kemampuan dibidang IPTEK dan IMTAQ.

2) MI Ath-Tanmiyatul Ilmiah

a) Visi

Mencetak anak bangsa yang cerdas berbudaya dengan berlandaskan nilai-nilai iman dan taqwa.

b) Misi

(1) Optimalisasi kegiatan belajar mengajar yang integratif dengan pendekatan input pengetahuan umum dan pengetahuan agama serta budaya lokal untuk menghasilkan output siswa yang cerdas, memahami budaya lokal dan mampu mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

(2) Mengembangkan dan meningkatkan produktivitas kerja seluruh personil madrasah dengan pendekatan manajemen sekolah yang partisipatif dan terbuka.

3) MI MDIA 3 Nurul Ikhsan

a) Visi

Melahirkan generasi bangsa yang memiliki potensi dasar yakni IMTEK dan IMTAK dalam mewujudkan akhlak mulia.

b) Misi

(1) Meningkatkan sinegritas antara guru, orang tua, siswa dan kepala sekolah

(2) Mampu mewujudkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat

(3) Berperan aktif dalam meningkatkan sumber daya manusia

c. *Karakteristik Responden*

1) Jenis Kelamin

Berikut hasil analisis univariat pada kelompok jenis kelamin pada anak sekolah dasar gizi kurang:

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018

Jenis Kelamin	Kelompok I (Kasus)		Kelompok II (Kontrol)	
	N	%	n	%
Laki-Laki	11	64.7	11	64.7
Perempuan	6	35.3	6	35.3
Jumlah	17	100	17	100

Sumber: Data Primer, 2018

Dari tabel 4.1, diatas menunjukkan bahwa dari 17 responden pada kelompok I (kasus), responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang (64.7%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang (35.3%). Sedangkan dari 17 responden pada kelompok II (kontrol), responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang (64.7%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang (35.3%).

2) Tingkatan Kelas

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkatan Kelas di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018

Tingkatan Kelas	Kelompok I (Kasus)		Kelompok II (Kontrol)	
	N	%	n	%
Kelas 1	-	-	1	5.9
Kelas 2	7	41.2	6	35.3
Kelas 3	3	17.6	6	35.3
Kelas 4	7	41.2	4	23.5
Jumlah	17	100	17	100

Sumber: Data Primer, 2018

Dari tabel 4.2, diatas menunjukkan bahwa dari 17 responden pada kelompok I (kasus), responden paling banyak pada kelas 4 dan kelas 2 dengan jumlah masing-masing 7 orang (41.2%), dan paling sedikit pada kelas 3 dengan jumlah 3 orang (17.6%). Sedangkan dari 17 responden pada kelompok II (kontrol), responden paling banyak pada kelas 2 dan 3 dengan jumlah masing-masing 6 orang (35.3%), dan paling sedikit pada kelas 1 dengan jumlah 1 orang (5.9%).

3) Umur

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di Madrasah Ibtidaiyah
Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar
Tahun 2018

Umur	Kelompok I (Kasus)		Kelompok II (Kontrol)	
	N	%	n	%
7 Tahun	6	35.3	7	41.2
8 Tahun	8	47.1	5	29.4
9 Tahun	3	17.6	5	29.4
Jumlah	17	100	17	100

Sumber: Data Primer, 2018

Dari tabel 4.3, diatas menunjukkan bahwa dari 17 responden pada kelompok I (kasus), terdapat 6 orang (35.3%) yang berusia 7 tahun, selanjutnya terdapat 8 orang (47.1%) yang berusia 8 tahun dan terdapat 3 orang (17.6%) yang berusia 9 tahun. Sedangkan dari 17 responden pada kelompok II (kontrol), terdapat 7 orang (41.2%) yang berusia 7 tahun dan masing-masing 5 orang (29.4%) yang berusia 8 dan 9 tahun.

4) Pekerjaan Orang Tua

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua
di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang
Kota Makassar Tahun 2018

Pekerjaan Orang Tua	Kelompok I (Kasus)				Kelompok II (Kontrol)			
	Ayah		Ibu		Ayah		Ibu	
	N	%	n	%	N	%	n	%
Buruh	11	64.7	-	-	9	52.9	-	-
Wiraswasta	3	17.6	1	5.9	2	11.8	-	-
Nelayan	1	5.9	-	-	-	-	-	-
Karyawan Swasta	2	11.8	-	-	1	5.9	1	5.9
Sopir	-	-	-	-	2	11.8	-	-
IRT	-	-	13	76.5	-	-	15	88.2
Guru	-	-	2	11.8	-	-	1	5.9
Tidak Bekerja	-	-	1	5.9	3	17.6	-	-
Jumlah	17	100	17	100	17	100	17	100

Sumber: Data Primer, 2018

Dari tabel 4.4, diatas menunjukkan bahwa pada kelompok I (kasus) kebanyakan orang tua responden khususnya ayah bekerja sebagai buruh sebanyak 11 orang (64.7%) dan bekerja sebagai nelayan 1 orang (5.9%), sedangkan ibu paling banyak bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 13 orang (76.5%) dan tidak bekerja dan bekerja sebagai wiraswasta masing-masing terdapat 1 orang (5.9%). Pada kelompok II (kontrol) ayah paling banyak bekerja sebagai buruh 9 orang (52.9%) dan karyawan swasta 1 orang (5.9%), ibu paling banyak bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 15 orang (88.2%) dan terdapat masing-masing 1 orang (5.9%) yang bekerja sebagai guru dan karyawan swasta.

5) Pendidikan Orang Tua

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Orang Tua
di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang
Kota Makassar Tahun 2018

Pendidikan Orang Tua	Kelompok I (Kasus)				Kelompok II (Kontrol)			
	Ayah		Ibu		Ayah		Ibu	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Tidak Sekolah	6	35.3	6	35.3	-	-	1	5.9
SD	3	17.6	4	23.5	5	29.4	5	29.4
SMP	-	-	2	11.8	3	17.6	7	41.2
SMA	5	29.4	3	17.6	7	41.2	3	17.6
S1	3	17.6	2	11.8	2	11.8	1	5.9
Jumlah	17	100	17	100	17	100	17	100

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.5, diatas menunjukkan bahwa pada kelompok I (kasus), orang tua responden khususnya pendidikan ayah dan ibu paling banyak tidak sekolah masing-masing sebanyak 6 orang (35.3%) dan paling sedikit pada pendidikan khususnya ayah yang SD dan S1 masing – masing 3 orang (17.6%), untuk pedidikan ibu paling sedikit tamat SMP dan S1 masing-masing 2 orang (11.8%). Sedangkan pada kelompok II (kontrol), pendidikan ayah paling banyak SMA sebanyak 7 orang (41.2%) dan paling sedikit S1 yaitu 2 orang (11.8%), untuk pendidikan ibu paling banyak SMP sebanyak 7 orang (41.2%) serta paling sedikit tidak sekolah dan S1 masing – masing 1 orang (5.9%).

6) Konsumsi Produk

Tabel 4.6
Jumlah Konsumsi Produk Setelah Intervensi pada Anak Gizi Kurang
di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang
Kota Makassar Tahun 2018

Kelompok	Total Harus di Konsumsi Selama 30 Hari (gr)	Jumlah Konsumsi Produk			
		Konsumsi Selama 30 Hari (gr)	%	Sisa (gr)	%
Kelompok I (Kasus)	3000	2764.82	92.16	235.18	7.84
Kelompok II (Kontrol)	3000	2772.71	92.42	227.29	7.58

Sumber : Data Primer, 2018

Pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa jumlah konsumsi produk selama 30 hari pada kelompok I (kasus) yang di konsumsi sebanyak 2764.82 gr (92.16%) dan yang tidak dihabiskan sebanyak 235.18 gr (7.84%). Sedangkan jumlah konsumsi produk pada kelompok kontrol sebanyak 2772.71 gr (92.42%) dan yang tidak dihabiskan sebanyak 227.29 gr (7.58%).

Tabel 4.7
Rata-Rata Konsumsi Harian Setelah Intervensi pada Anak Gizi Kurang di
Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang
Kota Makassar Tahun 2018

Kelompok	Harus di Konsumsi per Hari (gr)	Jumlah Konsumsi Harian			
		Yang di konsumsi per Hari (gr)	%	Sisa (gr)	%
Kelompok I (Kasus)	100	92.16	92.16	7.84	7.84
Kelompok II (Kontrol)	100	92.42	92.42	7.58	7.58

Sumber : Data Primer, 2018

Pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi produk selama 30 hari pada kelompok I (kasus) yang di konsumsi sebanyak 92.16 gr (92.16%) dan yang tidak dihabiskan sebanyak 7.84 gr (7.84%). Sedangkan jumlah

konsumsi produk pada kelompok II (kontrol) sebanyak 92.42 gr (92.42%) dan yang tidak dihabiskan sebanyak 7.58 gr (7.58%).

7) Konsumsi Jajanan

Tabel 4.8
Rata-Rata Konsumsi Jajanan Setelah Intervensi pada Anak Gizi Kurang di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018

Konsumsi	Kelompok I (kasus)		Kelompok II (kontrol)	
	Asupan Energi (kkal)	%	Asupan Energi (kkal)	%
Makanan Pokok	688.26	67.67	750.28	67.57
Jajanan	328.85	32.33	360.12	32.43
Total	1017.11	100	1110.40	100

Sumber : Data Primer, 2018

Pada tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi jajanan pada kelompok I (kasus) sebanyak 328.85 kkal (32.33%) dan konsumsi makanan pokok 688.26 kkal (67.67%). Sedangkan jumlah konsumsi jajanan pada kelompok II (kontrol) sebanyak 360.12 kkal (32.43%) dan konsumsi makanan pokok 750.28 kkal (67.57%).

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Responden yang Sakit Selama Penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018

Penyakit	Kelompok I (Kasus)					Kelompok II (Kontrol)				
	Lama Sakit (hari)									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Batuk	-	3	1	-	-	2	1	-	-	-
Demam	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	2	1	-	1	1	2	-	1	-
Batuk dan Influenza	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
Total	1	7	2	0	1	3	4	0	1	0

Sumber : Data Primer, 2018

Pada table 4.9 diatas menunjukkan penyakit yang diderita anak selama penelitian. Pada kelompok I (kasus) sebanyak 11 anak yang pernah jatuh sakit

dengan lama sakitnya sekitar 1-5 hari, yaitu 1 anak mengalami demam, 4 anak mengalami batuk, 4 anak mengalami influenza dan 2 anak mengalami batuk dan influenza . Sedangkan pada kelompok kontrol pun 8 anak pernah mengalami sakit dengan lama 1-4 hari, yaitu 3 anak mengalami batuk, 4 anak mengalami influenza dan 1 anak mengalami batuk dan influenza.

2. Hasil Analisis

a. Analisis Univariat

1) Perbedaan asupan energi, asupan protein, berat badan dan status gizi pada anak sekolah sebelum intervensi

Tabel 4.10
Distribusi Responden Berdasarkan Rata-Rata Asupan Energi, Asupan Protein, Berat Badan dan Status Gizi Responden Sebelum Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018

Variabel	Kelompok Perlakuan		Independent t- test
	Kelompok I (Kasus)	Kelompok II (Kontrol)	
Asupan Energi (kcal)	866.90	889.30	0.097
Asupan Protein (g)	32.08	31.69	0.132
Berat Badan (kg)	19.24	18.28	0.119
Status Gizi (SD)	-2.29	-2.65	0.284

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.10, diatas menunjukkan perbedaan rata-rata energi, protein, berat badan serta status gizi antara kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) sebelum intervensi. Untuk rata-rata asupan energi, asupan protein, berat badan dan status gizi diperoleh hasil uji *independent t-test* pada masing-masing variabel pada kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) sebelum intervensi pada kotak *t-test for quality means* untuk kolom *Sig. (2-tailed)* baris pertama terlihat angka 0.097 untuk rata-rata asupan energi, 0.132 untuk rata-rata asupan protein, 0.119 untuk rata-rata berat badan dan 0.284 untuk rata-rata status gizi.

Karena pada semua variabel nilainya lebih besar daripada nilai $\alpha = 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata asupan energi, asupan protein, berat badan dan status gizi antara kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) sebelum intervensi.

2) Perbedaan asupan energi, asupan protein, berat badan dan status gizi anak sekolah setelah intervensi.

Tabel 4.11
Distribusi Responden Berdasarkan Rata-Rata Asupan Energi, Asupan Protein, Berat Badan dan Status Gizi Responden Setelah Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018

Variabel	Kelompok Perlakuan		Independent t- test
	Kelompok I (Kasus)	Kelompok II (Kontrol)	
Asupan Energi (kcal)	1017.1	1120.8	0.899
Asupan Protein (g)	36.89	54.31	0.128
Berat Badan (kg)	19.22	18.54	0.098
Status Gizi (SD)	-2.37	-2.59	0.546

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.11, diatas menunjukkan perbedaan rata-rata energi, protein, berat badan serta status gizi antara kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) setelah intervensi. Untuk rata-rata asupan energi, asupan protein, berat badan dan status gizi diperoleh hasil uji *independent t-test* pada masing-masing variabel pada kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) setelah intervensi pada kotak *t-test for quality means* untuk kolom *Sig. (2-tailed)* baris pertama terlihat angka 0.899 untuk rata-rata asupan energi, 0.128 untuk rata-rata asupan protein, 0.098 untuk rata-rata berat badan dan 0.546 untuk rata-rata status gizi. Karena pada semua variabel nilainya lebih besar daripada nilai $\alpha = 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata asupan energi, asupan

protein, berat badan dan status gizi antara kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) setelah intervensi.

b. Analisis Bivariat

1) Pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap asupan energi pada anak sekolah gizi kurang

Tabel 4.12
Rata-rata Perubahan Asupan Energi Kelompok I (Kasus) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018

Asupan Energi	Mean Asupan Energi		Mean (selisih)	Paired t-test
	Sebelum	Setelah		
Kelompok kasus	866.90	1017.1	150.21	0.118
Kelompok kontrol	889.30	1120.8	231.47	0.007

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.12, pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap asupan energi pada kelompok I (kasus) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.118$ yang lebih besar dari nilai alpha (0.05), maka tidak ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap asupan energi pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang. Pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.007$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap asupan energi pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang.

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil tidak adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan asupan energi pada

kelompok I (kasus) dan ada pengaruh intervensi terhadap peningkatan asupan energi pada kelompok II (kontrol).

2) Pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap asupan protein pada anak sekolah gizi kurang

Tabel 4.13
Rata-rata Perubahan Asupan Protein Kelompok I (Kasus) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018

Asupan Protein	Mean Asupan Protein		Mean (selisih)	Paired t-test
	Sebelum	Setelah		
Kelompok kasus	32.08	36.89	4.81	0.111
Kelompok control	31.69	54.31	22.62	0.000

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.13, pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap asupan protein pada kelompok I (kasus) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.111$ yang lebih besar dari nilai alpha (0.05), maka tidak ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap asupan protein pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang. Pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.000$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap asupan protein pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang.

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil tidak adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan asupan protein pada

kelompok I (kasus) dan ada pengaruh intervensi terhadap peningkatan asupan protein pada kelompok II (kontrol).

3) Pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap berat badan pada anak sekolah gizi kurang

Tabel 4.14
Rata-rata Perubahan Berat Badan Kelompok I (Kasus) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018

Berat Badan	Mean Berat Badan		Mean (selisih)	Paired t-test
	Sebelum	Setelah		
Kelompok kasus	19.25	19.22	0.03	0.637
Kelompok kontrol	18.28	18.55	0.27	0.003

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.14, pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap berat badan pada kelompok I (kasus) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.637$ yang lebih besar dari nilai alpha (0.05), maka tidak ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap berat badan pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang. Pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.003$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap berat badan pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang.

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil tidak adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan berat badan pada

kelompok I (kasus) dan ada pengaruh intervensi terhadap peningkatan berat badan pada kelompok II (kontrol).

4) Pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap status gizi pada anak sekolah gizi kurang

Tabel 4.15
Rata-rata Perubahan Status Gizi Kelompok I (Kasus) dan Kelompok II (Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018

Status Gizi	Mean Status Gizi		Mean (selisih)	Paired t-test
	Sebelum	Setelah		
Kelompok kasus	-2.29	-2.37	0.08	0.007
Kelompok control	-2.65	-2.59	0.06	0.104

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.15, pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap berat badan pada kelompok I (kasus) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.007$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap status gizi pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang. Pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2 tailed)* didapatkan nilai $p = 0.104$ yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka tidak ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap status pada anak sekolah dasar yang mengalami gizi kurang.

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil adanya pengaruh intervensi terhadap status gizi pada kelompok I (kasus) dan tidak ada pengaruh intervensi terhadap status gizi pada kelompok II (kontrol).

B. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan selama sebulan terhitung mulai Juli hingga Agustus 2018 di tiga sekolah yaitu MI As'Adiyah No. 170 Layang, MI Ath-Tanmiyatul Ilmiah dan MI MDIA 3 Nurul Ikhsan wilayah kerja Puskesmas Layang Kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini adalah anak madrasah ibtidaiyah atau sederajat sekolah dasar kelas 1-4 dengan rentang umur 7-9 tahun yang berat badannya berada dalam kategori rendah atau gizi kurang dengan nilai z -score -3 s/d <-2 SD. Diperoleh 36 anak yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Selama penelitian ini berlangsung terdapat responden yang *drop out* sebanyak 2 orang yaitu 1 orang kelompok I (kasus) dan 1 orang kelompok II (kontrol). Jadi, jumlah sampel hingga penelitian selesai sebanyak 34 orang. Anak yang mengalami *drop out* pada kelompok I (kasus) karena mengalami alergi (gatal-gatal) setelah 10 hari dimulainya penelitian dan pada kelompok II (kontrol) anak mengalami *drop out* karena di hari ke 12 intervensi terjadi kebakaran rumah responden yang mengakibatkan anak tidak pernah hadir ke sekolah dan akan pindah sekolah.

Sebelum dilakukan intervensi terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tentang program intervensi kepada orang tua/ wali siswa yang menjadi responden serta pemberian obat cacing dengan tujuan meminimalisir kecacingan pada anak.

Dari 34 responden penelitian, kemudian dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok kasus dan kontrol. Kelompok kasus yang terdiri 18 anak mendapat intervensi setiap hari dengan kudapan sebanyak 100 gram bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang, sedangkan 18 anak lainnya yang termasuk

dalam kelompok kontrol mendapat intervensi setiap hari dengan kudapan sebanyak 100 gram bakso ikan layang.

Penelitian intervensi dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang digunakan formula 1:1 yaitu 50 gram rumput laut lawi-lawi dan 50 gram ikan layang yang dapat memberikan tambahan energi sebanyak 235.84 kkal dan protein sebanyak 8.44 gram pada anak sekolah yang mengalami gizi kurang. Hal ini didasarkan juga pada hasil penelitian (Haris, 2018) dengan judul penelitian “Analisis Kandungan Zat Gizi Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi (*Caulerpa racemosa*) Kombinasi Ikan Layang (*Decapterus ruselli*) Sebagai Alternatif Peningkatan Gizi di Masyarakat” yang direkomendasikan perbandingan 1:1 sebagai produk terbaik dalam hal kandungan zat gizi makro.

1. Asupan Energi


Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Energi berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, pengaturan suhu dan kegiatan fisik. Energi yang masuk melalui makanan harus seimbang dengan kebutuhan energi seseorang. Apabila hal tersebut tidak tercapai, akan terjadi pergeseran keseimbangan kearah negatif atau positif.

Kebutuhan energi untuk setiap orang berbeda-beda, berbagai faktor yang mempengaruhi kecukupan energi yaitu berat-badan, tinggi badan, pertumbuhan dan perkembangan (usia), dan jenis kelamin. Adapun kebutuhan energi pada anak sekolah dengan rentan usia 7-9 tahun yaitu sebesar 1850 kkal per hari. Asupan energi dapat diperoleh dengan melakukan survey konsumsi makanan yaitu recall

24 jam yang dilakukan beberapa kali, yaitu minimal 2 kali recall 24 jam tanpa berturut-turut (Sanjur,1997 dalam Supariasa, 2002).

Gambaran asupan zat gizi yang diperoleh dari hasil wawancara recall 24 jam, selanjutnya hasil wawancara recall 24 jam dimasukkan kedalam aplikasi nutrisurvey 2005 untuk menggambarkan akumulasi asupan energi pada responden. Perubahan asupan energi responden sebelum dan setelah intervensi dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 4.1
Grafik Perubahan Asupan Energi Sebelum dan Setelah Intervensi



Sumber: Data Primer, 2018

Pada Grafik 4.1 diatas, dapat dilihat perubahan asupan energi pada kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) sebelum dan setelah intervensi.

Pada uji *paired t-test* diperoleh hasil sebelum dan setelah intervensi terhadap perubahan asupan energi pada anak sekolah gizi kurang dilihat pada ($p=0.118$). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang secara statistik. Namun, secara kuantitas terlihat perbedaannya tetapi masih sedikit karena rata-rata asupan energi responden sebelum intervensi pada kelompok I (kasus) yaitu 866.90 kkal dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 1071.1 kkal.

Sedangkan pada kelompok II (kontrol) diperoleh hasil rata-rata asupan energi sebelum dilakukan intervensi yaitu 889.30 kkal dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 1120.8 kkal. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap perubahan asupan energi pada anak sekolah gizi kurang dilihat pada ($\rho = 0.007$).

Jika dilihat secara keseluruhan pada kedua kelompok rata-rata selisih asupan energi mengalami peningkatan, namun peningkatannya jauh lebih tinggi pada kelompok II (kontrol) yaitu sebesar 231.47 kkal sedangkan pada kelompok I (kasus) yaitu 150.21 kkal. Hal tersebut terjadi karena dilihat dari segi konsumsi selama intervensi 30 hari, pada kelompok II (kontrol) lebih banyak mengonsumsi produk yaitu sebesar 2772.71 gram (92.42%) dengan sisa 227.29 gram (7.58%) sedangkan pada kelompok I (kasus) mengonsumsi produk sebanyak 2764.82 gram (92.16%) dengan sisa 235.18 gram (7.84%).

Walaupun terjadi peningkatan asupan energi pada kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) namun jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan energi sesuai AKG (2013). Hal ini disebabkan karena kebanyakan siswa yang malas makan dan dari hasil recall 24 jam pada 34 anak sekolah gizi kurang yang menjadi responden menunjukkan semua anak setiap harinya mengonsumsi jajanan, baik hari sekolah maupun hari libur. Kontribusi makanan dan minuman jajanan pada anak untuk asupan energi yaitu pada kelompok I (kasus) jumlah konsumsinya sebanyak 328.85 kkal (32.33%) dan pada kelompok II (kontrol) sebanyak 360.12 kkal (32.43%). Seringnya mengonsumsi jajanan seperti jajanan kemasan dan jajanan yang dijual di lingkungan sekolah mengakibatkan belum maksimalnya

asupan makanan pokok sehari-hari dan asupan produk. Makanan dan minuman jajanan sering kali dikonsumsi anak sekolah untuk mengganti makanan pokoknya, namun kandungan energi yang didapat dari makanan dan minuman jajanan tergolong masih rendah sehingga sumbangan energi terhadap total konsumsi sehari masih rendah. Menurut Khonsam dalam (Mokoginta, Budiarmo, & Manampiring, 2016), tidak lengkapnya gizi dalam makanan jajanan menyebabkan makanan jajanan tidak dapat menggantikan sarapan/ makan siang. Banyaknya konsumsi makanan jajanan hanya akan memberikan rasa kenyang karena padatnya kalori yang masuk. Sementara gizi seperti protein, vitamin dan mineral masih sangat kurang.

Serta kurangnya pengetahuan orangtua tentang gizi berdasarkan data anak sekolah gizi kurang yang menjadi responden. Tingkat pendidikan orang tua khususnya ibu pada kelompok I (kasus) paling banyak tidak sekolah terdapat 6 orang (35.3%), SD 4 orang (23.5%), SMA 3 orang (17.6%), SMP dan S1 masing-masing 2 orang (11.8%). Sedangkan pada kelompok II (kontrol) paling banyak SMP sebanyak 7 orang (41.2%), SD 5 orang (29.4%), SMA 1 orang, tidak sekolah dan S1 masing-masing 1 orang (5.9%). Tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan seorang ibu mempengaruhi sikap dan perilaku dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi oleh anak karena ibu sebagai tombak dalam penyedia makanan untuk keluarga, dalam hal ini sejalan dengan penelitian (Puspasari & Andriani, 2017), pada penelitiannya yang menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan status gizi anak, dengan hasil uji statistik dengan nilai signifikan 0.001.

Keadaan gizi yang baik akan menentukan tingginya angka persentase status gizi secara nasional. Ketidaktahuan tentang makanan yang mempunyai gizi baik akan menyebabkan pemilihan makanan yang salah dan rendahnya gizi yang terkandung dalam makanan tersebut dan akan menyebabkan status gizi anak tersebut menjadi buruk atau kurang (Ode, Malik, Sirajuddin, & Najamuddin, 2012).

Selain faktor tersebut, pekerjaan orang tua juga dapat berpengaruh dalam konsumsi makanan pada anak. Berdasarkan data yang diperoleh, pada kelompok I (kasus) pekerjaan ayah sebagian besar bekerja sebagai buruh yaitu berjumlah 11 orang (64.7%) dan paling sedikit bekerja sebagai nelayan yaitu 1 orang (5.9%). Sedangkan, pada kelompok II (kontrol) pekerjaan ayah sebagian besar juga bekerja sebagai buruh berjumlah 9 orang (52.9%) dan paling sedikit bekerja sebagai karyawan swasta yaitu 1 orang (5.9%). Dengan memiliki pekerjaan, seseorang dapat memperoleh penghasilan, dimana berkaitan erat dengan kemampuan daya beli seseorang terhadap ragam pangan, maka asupan makanan yang diperoleh bernilai gizi yang kemudian berpengaruh pada pembentukan status gizinya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Kaunang, Malonda, & Kawengian, 2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan keluarga dengan status gizi dengan hasil analisis menggunakan uji korelasi Spearman menunjukkan angka koefisien $r=0.386$ dengan nilai $p=0,000$.

Penjelasan mengenai pengasuhan anak dijelaskan dalam QS. at-Taghabun/ 64: 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar” (Departemen Agama RI, 2010: 557).

Maksud dari penggalan ayat diatas, “Sesungguhnya semua harta-harta kamu dan semua anak-anak kamu adalah ujian, terhadap diri kamu dimana kamu memperoleh harta itu dan bagaimana kamu mendidik mereka. Hal tersebut membutuhkan perjuangan dan pengorbanan kamu dan ada ganjaran yang banyak lagi agung dan di sisi-Nya pula ada siksa yang pedih (Shihab, 2009).

Dari ayat diatas dijelaskan anak juga menjadi cobaan bagi orang tuanya. Sehingga orang tua diperingatkan untuk berhati-hati. Sebagai orang tua, tidak boleh melalaikan tugasnya yaitu mengasuh anak dengan baik karena itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah mengingatkan kembali bahwa orang tua memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat dengan memperhatikan makanan anak yang baik untuk dikonsumsi, dimana hal ini merupakan salah satu cobaan Allah untuk orang tua. Bagi orang tua yang lulus dari cobaan Allah akan mendapat pahala dari Allah SWT, termasuk menjaga pertumbuhan anak dengan suplai makanan yang bergizi.

2. Asupan Protein

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Seperlima bagian tubuh adalah protein, separuhnya ada didalam otot, seperlima berada didalam tulang dan tulang rawan, sepersepuluh didalam kulit, dan selebihnya didalam jaringan lain dan cairan tubuh.

Protein mempunyai fungsi yaitu pertumbuhan dan pemeliharaan, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, pembentukan antibodi, mengangkut zat-zat gizi dan sebagai sumber energi dimana protein menyumbang energi sebanyak 4 kkal/gram. Apabila tubuh mengalami kekurangan zat energi maka protein terlebih dahulu akan menghasilkan energi untuk membentuk glukosa (Almatsier, 2001).


Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pada asupan dan transportasi zat-zat gizi. Kekurangan protein yang terus menerus akan menimbulkan gejala yaitu pertumbuhan kurang baik, daya tahan tubuh menurun, rentan terhadap penyakit, daya kreatifitas dan daya kerja merosot, mental lemah dan lain-lain. Tingkat kecukupan asupan protein akan mempengaruhi status gizi (Almatsier, 2001).

Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu, seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya seperti tempe dan tahu, serta kacang-kacangan lain. Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati yang mempunyai mutu atau nilai biologi tertinggi (Almatsier, 2001).

Adapun angka kecukupan protein (AKP) pada anak sekolah dengan rentan usia 7-9 tahun yaitu sebanyak 49 gram (AKG 2013). Gambaran asupan protein dapat diperoleh dengan melakukan survey asupan makanan yaitu recall 24 jam yang dilakukan beberapa kali, yaitu minimal 2 kali recall 24 jam tanpa berturut-turut (Sanjur,1997 dalam Supariasa, 2002). Gambaran asupan zat gizi yang diperoleh dari hasil wawancara recall 24 jam, selanjutnya dimasukkan dalam

aplikasi nutrisurvey 2005 untuk menggambarkan akumulasi asupan protein pada responden. Perubahan asupan protein responden sebelum dan setelah intervensi dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 4.2
Grafik Perubahan Asupan Protein Sebelum dan Setelah Intervensi



Sumber: Data Primer, 2018

Pada Grafik 4.2 diatas, dapat dilihat perubahan asupan protein pada kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) sebelum dan setelah intervensi.

Pada uji *paired t-test* diperoleh hasil sebelum dan setelah intervensi terhadap perubahan asupan protein pada anak sekolah gizi kurang dilihat pada ($p=0.111$). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap perubahan asupan protein pada anak sekolah gizi kurang secara statistik. Namun, secara kuantitas terlihat perbedaannya tetapi masih sedikit karena rata-rata asupan protein responden pada kelompok I (kasus) yaitu 32.08 gram dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 36.89 gram. Sedangkan pada kelompok II (kontrol) diperoleh hasil rata-rata asupan protein sebelum dilakukan intervensi yaitu 31.69 gram dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 54.31

gram. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap perubahan asupan protein pada anak sekolah gizi kurang dilihat pada ($p=0.000$).

Jika dilihat secara keseluruhan pada kedua kelompok rata-rata selisih asupan protein mengalami peningkatan, namun peningkatannya jauh lebih tinggi pada kelompok II (kontrol) yaitu sebesar 22.62 gram sedangkan pada kelompok I (kasus) yaitu 4.81 gram. Hal tersebut dikarenakan protein yang dihasilkan pada bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang yang diberikan pada kelompok I (kasus) memiliki protein yang lebih rendah yaitu 8.44 gr per 100 gramnya, sedangkan pada bakso ikan layang yang diberikan pada kelompok II (kontrol) menghasilkan protein sebanyak 20.31 gr per 100 gramnya.

Pada rumput laut *Caulerpa racemosa* mengandung protein dan asam amino seperti L-Glutamik acid, L-Asparagine, L-Serine, LThreonin, L-Glycin, L-Alanine, L-Asparagine, L-Valinae, L-Leucine dan L-Lycine (Mukarramah, Wahyuni, Emilia, 2017). Sedangkan Ikan Layang *Decapterus ruselli* mengandung protein yang mempunyai nilai gizi tinggi, mudah dicerna serta lengkap jumlah dan jenis asam amino yang dikandungnya (Kholillah, 2002).

Walaupun rumput laut dan ikan layang sama mengandung protein namun kandungan asam amino serta struktur yang dimiliki protein hewani dengan protein nabati berbeda. Ketika protein dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh, protein tersebut akan langsung dipecah menjadi asam amino yaitu bentuk protein yang lebih sederhana. Asam amino yang ada didalam protein hewani merupakan asam amino esensial yang lengkap, dan strukturnya hamper mirip dengan asam amino

yang ada di tubuh. Oleh karena itu, sumber protein hewani merupakan sumber asam amino yang baik untuk tubuh. Sementara makanan protein nabati tidak memiliki asam amino esensial yang lengkap seperti protein hewani. Sehingga nilai penyerapan asam amino pada protein hewani lebih baik dari protein nabati.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Kusumawati, 2015) yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan secara bermakna ($p < 0.05$) asupan energi, karbohidrat, lemak dan protein sebelum dan setelah intervensi.

3. Berat Badan

Berat badan adalah ukuran yang lazim atau sering dipakai untuk menilai keadaan suatu gizi manusia. Berat badan adalah ukuran tubuh dalam sisi beratnya yang ditimbang dalam keadaan berpakaian minimal tanpa perlengkapan apapun. Berat badan diukur dengan alat ukur berat badan dengan suatu satuan kilogram (Mabella, 2000).


Pada keadaan normal, dimana kondisi kesehatan seseorang dan seimbang antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi tubuh terjamin, maka berat badan juga bertambah seiring bertambahnya umur. Sedangkan pada keadaan abnormal, pertambahan berat badan dapat terjadi lebih cepat atau lebih lambat dari keadaan normal.

Berat badan merupakan salah satu parameter penilaian status gizi yang sangat peka terhadap perubahan yang mendadak baik karena penyakit infeksi maupun konsumsi makanan yang menurun. Parameter berat badan ini dinyatakan dalam bentuk Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Mengingat karakteristik

berat badan yang labil, maka Indeks BB/U lebih dapat menggambarkan kondisi seseorang.

Berikut adalah grafik perubahan rata-rata berat badan pada kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) mulai dari sebelum dan setelah intervensi.

Grafik 4.3
Grafik Perubahan Berat Badan Sebelum dan Setelah Intervensi



Sumber: Data Primer, 2018

Pada grafik 4.3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan setelah pemberian bakso pada kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol).

Hal tersebut ditunjukkan pada uji *paired t-test* diperoleh hasil sebelum dilakukan intervensi rata-rata berat badan responden kelompok I (kasus) sebelum intervensi yaitu 19.25 kg menjadi 19.22 kg setelah intervensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap peningkatan berat badan pada anak sekolah yang mengalami gizi kurang dilihat pada ($\rho=0.637$). Sedangkan pada kelompok II (kontrol) sebelum intervensi yaitu 18.28 kg menjadi 18.55 kg setelah intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap peningkatan berat badan pada anak sekolah yang mengalami gizi kurang dilihat pada ($\rho=0.003$).

Pada kedua kelompok sama-sama terjadi perubahan berat badan, namun pada kelompok kasus terjadi penurunan berat badan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang mengalami peningkatan berat badan. Adapun selisih penurunan berat badan pada kelompok kasus sebelum dan setelah dilakukan pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang didapatkan nilai selisih berat badan sebesar 0.03 kg sedangkan pada kelompok kontrol pemberian bakso ikan layang didapat nilai selisih berat badan sebesar 0.27 kg.

Hal tersebut terjadi karena kesehatan sampel banyak yang jatuh sakit di pertengahan penelitian. Beberapa anak yang menjadi sampel jatuh sakit selama penelitian. Pada kelompok intervensi 11 anak yang pernah jatuh sakit dengan lama sakitnya sekitar 1-5 hari, yaitu 1 anak mengalami demam, 4 anak mengalami batuk, 4 anak mengalami influenza dan 2 anak mengalami batuk dan influenza. Sedangkan pada kelompok kontrol pun 8 anak pernah mengalami sakit dengan lama 1-4 hari, yaitu 3 anak mengalami batuk, 4 anak mengalami influenza dan 1 anak mengalami batuk dan influenza. Sehingga hal tersebut berdampak pada pola makan anak. Nafsu makan anak pun menurun sehingga secara otomatis berat badan anak banyak yang tidak bertambah. Sejalan dengan penelitian (Ryadinency, Hadju, & Syam, 2012) yang menyatakan bahwa penyakit infeksi yang diderita merupakan salah satu faktor penghambat dalam pertumbuhan anak-anak.

Hal di atas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berat badan anak hanya mengalami peningkatan yang sedikit. Meskipun hanya mengalami peningkatan yang sedikit, selama intervensi berlangsung orang tua

anak yang menjadi sampel dalam penelitian ini begitu antusias, memberikan komentar yang baik, dan begitu senang dan bersyukur dengan dilaksanakannya intervensi pada anak mereka.

Adanya perbedaan perubahan berat badan antara kelompok kasus yang mengalami penurunan sebanyak 0.03 dan kelompok kontrol yang mengalami kenaikan berat badan sebanyak 0.27 kg dikarenakan adanya peningkatan asupan energi dan asupan protein yang lebih signifikan pada kelompok kontrol. Sedangkan, pada kelompok kasus terjadi penurunan berat badan dikarenakan bahan dasar pada bakso yaitu terdapat rumput laut lawi-lawi yang mengandung serat tinggi.

Berdasarkan penelitian (Bhuiyan et al., 2016) menunjukkan bahwa kandungan serat pada rumput laut secara umum, yang tertinggi berturut-turut adalah *Gracilaria changgi* (24,7) , *Caulerpa racemosa* (11,51), *Sargassum vulgare* (7,73), *Sargassum filipendula* (6,57), *Gracilaria cervicornis* (5,65), *Gracilaria cornea* (5,21), *Ulva reticulata* (4,84), *Porphyra tenera* (4,80), dan *Caulerpa lentillifera* (3,17). Berdasarkan serat secara umum, rumput laut *Caulerpa racemosa* menempati peringkat tertinggi kedua kandungan seratnya setelah *Gracilaria changgi*. Sedangkan, untuk spesies alga hijau, *Caulerpa racemosa* menempati peringkat pertama yang mengandung tinggi serat.

Rumput laut *Caulerpa racemosa* merupakan tumbuhan yang mengandung serat pangan larut air. Serat pangan berdasarkan kelarutannya terhadap air terbagi dua, yakni serat pangan larut (*soluble dietary fiber/SDF*) yang terdiri dari pektin dan turunannya, gum, serta *mucilage* dan serat pangan tidak larut (*insoluble*

dietary fiber/IDF) yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Serat pangan tersusun atas polisakarida dengan ikatan β (1-4) yang tidak dapat dicerna oleh enzim amilase yang disekresikan oleh kelenjar saliva dan pankreas, namun dapat dimetabolisme oleh bakteri yang terdapat pada usus besar dan menghasilkan asam lemak rantai pendek atau *short chain fatty acid* (SCFA), diantaranya asam asetat, asam propionat dan asam butirat (Wildman dan Medeiros, 200 dalam Chrystiawan, 2015).

Serat makanan yang dikonsumsi dari makanan yang tinggi serat saat sampai di lambung maka akan memiliki waktu tinggal yang lebih lama dibanding dengan makanan yang halus. Waktu tinggal yang lama ini akan membuat pengosongan lambung menjadi lebih lama dan akibatnya seseorang akan lebih lama merasa kenyang. Pada usus halus, serat akan membuat peningkatan viskositas usus halus dan laju penyerapan menjadi lambat. Pada usus besar, sebagian besar serat akan dipecah oleh bakteri yang akan menghasilkan gas, asam lemak rantai pendek dan molekul kecil lainnya. Hal tersebut akan menahan air sehingga massa tinja akan semakin besar. Jika massa tinja semakin besar akibat kandungan air maka didalam kolon akan terjadi pengurangan waktu transit, penurunan tekanan intrakolon, dan peningkatan frekuensi defekasi (Kartono dan Kristiani, 2011 dalam Rahayuningtiyas, 2012). Jadi, serat sangat berperan dalam melancarkan pencernaan dan membuat seseorang merasa kenyang lebih lama akibat waktu transit yang lebih lama di lambung.

4. Status Gizi

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak berdasarkan indeks berat badan menurut umur. Oleh karena itu, makanan bagi tubuh mempunyai peranan yang sangat penting untuk pembentukan sel-sel yang rusak. Status gizi adalah suatu tanda-tanda atau penampilan fisik yang diakibatkan karena adanya keseimbangan antara gizi seseorang dipengaruhi oleh tingkat konsumsi atau asupan makanan dan status kesehatan. Adapun akibat dari tidak seimbangnya pemenuhan kebutuhan zat gizi yang diperoleh dari makanan akan mengakibatkan gangguan kesehatan seseorang atau masyarakat.

Berikut adalah grafik perubahan status gizi kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) sebelum dan setelah intervensi.

Grafik 4.4
Grafik Perubahan Status Gizi Sebelum dan Setelah Intervensi



Sumber: Data Primer, 2018

Dari grafik 4.4 terlihat adanya perubahan status gizi anak sekolah yang mengalami gizi kurang sebelum dan setelah intervensi. Hasil uji *paired t-test* pada variable status gizi kelompok I (kasus) sebelum dan setelah intervensi terdapat angka ($p=0.007$) karena nilai $p<0.05$ maka dianggap terdapat perbedaan pada nilai


rata-rata status gizi sebelum dan setelah intervensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap status gizi pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi kurang pada kelompok I (kasus)”. Namun, secara kuantitas terlihat penurunan nilai z-score pada standar deviasi dari -2.29 ke -2.37 yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan status gizi. Sedangkan pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji *paired t-test* pada variabel status gizi sebelum dan setelah intervensi terdapat angka ($\rho=0.104$) karena nilai $p>0.05$ maka dianggap tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata status gizi sebelum dan setelah intervensi. Maka dapat disimpulkan bahwa “tidak ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap status gizi siswa gizi kurang pada kelompok II (kontrol)”. Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang kecil rata-rata berat badan pada kelompok II (kontrol) sehingga kurang berpengaruh terhadap peningkatan status gizi pada anak gizi kurang walaupun konsumsi protein sudah melebihi kebutuhan. Karena asupan energi tiap hari belum cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, walaupun konsumsi protein sudah lebih dari kebutuhan. Suplai energi bagi pemeliharaan sel lebih diutamakan dari suplai protein untuk pertumbuhan, sehingga bila konsumsi energi dalam makanan sehari-hari tidak cukup, maka protein akan dipergunakan sebagai sumber energi (Marsaoly, Bahar, & Sirajuddin, 2011).

Pada kedua kelompok perlakuan tersebut masih terdapat dalam kategori gizi kurang hal ini terlihat dari nilai rata-rata status gizi pada kelompok I (kasus) setelah intervensi yaitu -2.37 dan pada kelompok II (kontrol) setelah intervensi yaitu -2.59. nilai rata-rata status gizi tersebut menunjukkan bahwa kedua

kelompok masih berada pada kisaran angka 3 - <-2 SD yang menunjukkan bahwa kedua kelompok masih dalam kategori gizi kurang.

Selain masih rendahnya konsumsi energi per hari pada anak gizi kurang, selama penelitian anak yang menjadi responden pernah jatuh sakit, pada kelompok I (kasus) sebanyak 11 anak dan kelompok II (kontrol) 8 anak, dimana anak yang mengalami gizi kurang daya tahan tubuhnya terhadap penyakit menjadi rendah, sehingga mudah terkena penyakit infeksi. Infeksi akan menyebabkan kurangnya nafsu makan dan toleransi terhadap makanan. Sehingga dalam perbaikan gizi pada anak gizi kurang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meningkatkan asupan konsumsi dan meningkatkan perubahan berat badan kearah status gizi baik.

Didalam al-Quran telah diperintahkan agar manusia merubah diri ke arah yang lebih baik, dalam hal ini yaitu mengubah asupan makanan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Rad/ 13:11:



 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Terjemahnya:

“....Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri....” (Departemen Agama RI, 2010).

Makna dari ayat tersebut yaitu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang terlebih dahulu mengubah nasibnya. Disinilah Allah akan melihat ikhtiar hambanya. Sebagai muslim kita tidak boleh menyerah saja kepada takdir, tetapi kita percaya akan adanya takdir (Hamka, 1983).

Adapun maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah swt tidak akan mengubah keadaan seseorang melainkan adanya kesadaran dari dirinya sendiri untuk berubah kearah yang lebih baik. Adapun kaitannya dengan penelitian ini yaitu, dengan mengetahui sumber daya alam yang ada dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Maka diharapkan kepada masyarakat agar memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai alternatif makanan tambahan sehingga perlahan-lahan akan memberikan dampak yang bagus bagi anak yaitu mengubah status gizi anak dari status gizi kurang ke status gizi yang baik. karena perubahan status gizi kearah yang lebih baik akan terjadi apabila adanya usaha dari diri sendiri untuk merubahnya kearah yang lebih baik.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu :

1. Frekuensi pemberian yang hanya dilakukan 1 kali/hari sehingga kurang tercapainya konsumsi produk yang maksimal pada anak.
2. Adanya keterbatasan peneliti untuk mengontrol faktor lain seperti kondisi fisik dan aktivitas harian yang dapat memengaruhi status gizi kurang pada anak sekolah.
3. Tidak dilakukannya pengukuran aktivitas pada responden.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar tentang pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap status gizi kurang pada anak sekolah usia 7-9 tahun, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Tidak ada pengaruh asupan energi sebelum dan setelah pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang pada anak gizi kurang dilihat pada nilai $\rho=0.118$ yang lebih besar dari $\alpha=0.05$.
2. Tidak ada pengaruh asupan protein sebelum dan setelah pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang pada anak gizi kurang dilihat pada nilai $\rho=0.111$ yang lebih besar dari $\alpha=0.05$.
3. Tidak ada pengaruh berat badan sebelum dan setelah pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang pada anak gizi kurang dilihat pada nilai $\rho=0.637$ yang lebih besar dari $\alpha=0.05$.
4. Ada pengaruh status gizi sebelum dan setelah pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang pada anak gizi kurang ditandai dengan penurunan nilai zscore pada standar deviasi dari -2.29 menjadi -2.37 yang menunjukkan terjadi penurunan berat badan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah wilayah kerja Puskesmas Layang Kota Makassar tentang pengaruh pemberian bakso rumput laut

lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap status gizi kurang pada anak sekolah, maka ada beberapa saran yang penting untuk dilakukan, yaitu:

1. Agar orang tua lebih memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi oleh anak mereka sehingga kualitas gizi pada anak menjadi lebih baik.
2. Diharapkan kepada pihak sekolah agar mengaktifkan kegiatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan adanya pengawasan dari institusi kesehatan setempat sehingga dapat dilakukan penilaian status gizi serta penyuluhan gizi secara berkala guna dilaksanakannya upaya-upaya preventif kejadian malnutrisi pada siswa.
3. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang durasi dan frekuensi yang efisien untuk pemberian intervensi bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang mendapat hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana. (2014). *Tumbuh Kembang dan Terapi Bermain pada Anak*. Jakarta: Salemba Medika.
- Adriani. (2014). *Peranan Gizi Dalam Siklus Kehidupan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Adriani, M. dan B. W. (2012). *Peranan Gizi dalam Siklus Kehidupan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Alatas. (2011). Status Gizi Anak Usia Sekolah (7-12 Tahun) dan Hubungannya dengan Tingkat Asupan Kalsium Harian di Yayasan Kampungkids Pejaten Jakarta Selatan Tahun 2009.
- Almatsier, S. (2001). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Almatsier, S. (2010). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi* (9th ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anggadiraredja JT, Zatnika A, Purwoto H, I. S. (2006). *Rumput Laut*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Atmadja PS, Kadi A, Sulistijo, S. R. (1996). *Pengenalan Jenis-Jenis Rumput Laut Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Oseanologi LIPI.
- Bhuiyan, K. A., Qureshi, S., Hena, A., Kamal, M., Aftabuddin, S., Abdul, M., & Siddique, M. (2016). Proximate Chemical Composition of Sea Grapes *Caulerpa racemosa* (J. Agardh, 1873) Collected from a Sub-Tropical Coast, 5(2), 1–6. <https://doi.org/10.4172/2161-0517.1000158>
- Briawan, D. (2017). *Ilmu Gizi: Teori dan Aplikasi*. (I. D. N. S. Hardinsyah, Ed.). Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Burhanuddin. (2014). Respon Warna Cahaya terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Karatenoid Anggur Laut (*Caulerpa racemosa*) pada Wadah Terkontrol, 5, 8–13.
- Cahyadi, W. (2009). *Bahan Tambahan Pangan* (Edisi Kedu). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Chrystiawan, R. (2015). Perubahan Komponen Serat Rumput Laut *Caulerpa* sp. (Dari Perairan Tual, Maluku) Akibat Proses Perebusan.

- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Dewa Nyoman Supriasa, Bachyar Bakri, I. F. (2002). *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: EGC.
- Dian Desmawati, T. Efrizal, A. zulfikar. (2013). Kajian Stok Ikan Layang (*Decapterus ruselli*) Berbasis Panjang Berat dari Perairan Mapur yang Didaratkan Ditempat Pendaratan Ikan Pelantar Kud Kota Tanjungpinang, 1–9.
- Farid, W., Ibrahim, R., Dewi, E. N., Susanto, E., & Amalia, U. (2013). Profil Rumput Laut *Caulerpa racemosa* dan *Gracilaria verrucosa* sebagai Edible Food, 9(1), 68–74.
- Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar Juz 13-14*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. (1999). *Tafsir Al-Azhar Juz 13 dan Juz 14*. Singapura: Pustaka Nasional PTE.
- Haris, W. A. (2018). Analisis Kandungan Gizi Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi (*Caulerpa racemosa*) Substitusi Ikan Layang (*Decapterus ruselli*) sebagai Alternatif Peningkatan Gizi di Masyarakat.
- Ibrahim, I. A. (2012). *Gizi dalam Daur Kehidupan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Kaunang, C., Malonda, N. S. H., & Kawengian, S. E. S. (2016). Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi Keluarga dengan Status Gizi Pada Siswa SMP Kristen Tateli Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, 5(1), 252–259.
- Kemenkes. (2013). Angka Kecukupan Gizi.
- Khatimah, K. (2016). Analisis Kandungan Logam Timbal (Pb) pada *Caulerpa racemosa* yang Dibudidayakan di Perairan Dusun Puntono Kabupaten Takalar.
- Kholillah, W. (2002). Daya Terima dan Nilai Gizi Biskuit dengan Penambahan Konsentrat Protein Ikan Layang (*Decapterus ruselli*), 7.
- Klein, J., & Verlaque, M. (2008). The *Caulerpa racemosa* invasion : A critical review, 56, 205–225. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2007.09.043>
- Kumar, M., Gupta, V., Kumari, P., Reddy, C. R. K., & Jha, B. (2011). Assessment

of Nutrient Composition and Antioxidant Potential of Caulerpaceae Seaweeds. *Journal of Food Composition and Analysis*, 24(2), 270–278. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2010.07.007>

Kusfriyadi, M. K. (2017). *Ilmu Gizi: Teori dan Aplikasi*. (I. D. N. S. Hardinsyah, Ed.). Jakarta: EGC.

Kusumawati, H. N. (2015). Perbedaan Asupan Zat Gizi Makro Sebelum dan Setelah Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Bubur Instan Berbasis Ikan Gabus dan Labu Kuning pada Balita Gizi Kurang.

Lely Okmawaty Anwar, Rita. L. Bubun, R. (2016). Manfaat Anggur Laut (*Caulerpa racemosa*) dan Penanganannya dengan Melibatkan Masyarakat Panai di Desa Rumba-Rumba, 110–116.

Mabella. (2000). *Berat Badan*. Jakarta: Pustaka Setia.

Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Malini, D. R. (2016). Pemanfaatan Tepung Biji Durian sebagai Bahan Pengisi Bakso Daging Sapi.

Marsaoly, M., Bahar, B., & Sirajuddin, S. (2011). Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan (Telur Rebus dan Bubur Kacang Hijau) terhadap Status Gizi Anak Usia Sekolah, 14–21.

Mokoginta, F. S., Budiarmo, F., & Manampiring, A. E. (2016). Gambaran Pola Asupan Makanan pada Remaja di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 4.

Mukarramah, Wahyuni, Emilia, M. (2017). Low Fat High Protein Sosis Berbahan Dasar lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) sebagai Inovasi Kuliner Sehat Khas Makassar dan Makanan Alternatif bagi Anak Penderita Obesitas, 1(1), 50–55.

Nelson, J. . (2006). *Fishes of the World Fourth Edition*. Alberta Canada: John Willey and & Sons Inc.


Nontji, A. (2002). *Laut Nusantara*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Citra.

Ode, L., Malik, A., Sirajuddin, S., & Najamuddin, U. (2012). Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan terhadap Status Gizi Siswa SD Inpres 2 Pannampu.

- Prihartini, A. (2006). Analisis Tampilan Biologis Ikan Layang (*Decapterus spp*) Hasil Tangkapan Purse Seine yang didaratkan di PPN Pekalongan.
- Puspasari, N., & Andriani, M. (2017). Association Mother ' s Nutrition Knowledge and Toddler ' s Nutrition Intake with Toddler ' s Nutritional Status (WAZ) at the Age 12 -24 Months, 369–378. <https://doi.org/10.20473/amnt.v1.i4.2017.369-378>
- Quthb, S. (2002). Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an (p. 332). Jakarta: Gema Insani.
- Rahayuningtiyas, F. (2012). Hubungan Antara Asupan Serat dan Faktor Lainnya dengan Status Gizi Lebih pada Siswa SMPN 115 Jakarta Selatan Tahun 2012.
- Riskesdas. (2010). Riset Kesehatan Dasar 2010.
- Riskesdas. (2013). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Ryadinency, R., Hadju, V., & Syam, A. (2012). Asupan Gizi Makro, Penyakit Infeksi dan Status Pertumbuhan Anak Usia 6-7 Tahun di Kawasan Pembuangan Akhir Makassar.
- Sediaoetama, A. D. (2010). *Ilmu Gizi* (1st ed.). Jakarta: Dian Rakyat.
- Sherly Ridhowati, A. (2016). Potensi Anggur Laut Kelompok *Caulerpa racemosa* sebagai Kandidat Sumber Pangan Fungsional Indonesia, *XLI*, 50–62.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Silfianti, D. (2011). Perilaku Konsumen dalam Proses Keputusan Pembelian Bakso Sehat Bakso Atom (Kasus Bakso Sehat Bakso Atom Cabang Bogor).
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supariasa, D. N. (2002). *Penilaian Status Gizi Revizi*. Jakarta: EGC.
- Suparyanto. (2014). *Balita Gizi Kurang dan Cara Pengukurannya*. Jakarta.

- Syarfaini. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Gizi*. Makassar: Alauddin University Press.
- Syarfaini. (2013). *Seputar Masalah Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Makassar: Alauddin University Press.
- Unicef WHO. (2015). the world bank joint child malnutrition estimates.
- Yenita. (2012). *Gizi Anak Sekolah dan Gizi Remaja*. Jakarta.
- Yudasmara, G. A. (2014). Budidaya Anggur Laut (*Caulerpa racemosa*) Melalui Media Tanam Rigid Quadrant Nets Berbahan Bambu, 3(2).
- Yudesti, I., & Prayitno, N. (2013). Perbedaan Status Gizi Anak SD Kelas IV Dan V Di SD Unggulan (06 Pagi Makasar) Dan SD Non Unggulan (09 Pagi Pinang Ranti) Kecamatan Makasar Jakarta Timur Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 5(1), 2001–2005.



L

A



M

P

I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

A

N

Lampiran 1

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

PENELITIAN MENGENAI PENGARUH PEMBERIAN BAKSO RUMPUT LAUT LAWI-LAWI (*Caulerpa racemosa*) KOMBINASI IKAN LAYANG (*decapterus ruselli*) TERHADAP STATUS GIZI KURANG PADA ANAK SEKOLAH DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAYANG KOTA MAKASSAR TAHUN 2018.

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama Orang Tua/ Wali Siswa

Nama Siswa :

Umur :

Tanggal Lahir :

Alamat :

Bersedia dan mau berpartisipasi menjadi responden yang akan dilakukan oleh Andi Jumriani Husnul Khatimah dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya dan apabila dalam penelitian ini ada perubahan/keberatan menjadi responden dapat mengajukan pengunduran diri.

Makassar, 2018

Mengetahui/menyetujui,

Orang tua/ wali anak

.....

Lampiran 2

KUESIONER IDENTITAS RESPONDEN

PENELITIAN MENGENAI PENGARUH PEMBERIAN BAKSO RUMPUT LAUT LAWI-LAWI (*Caulerpa racemosa*) KOMBINASI IKAN LAYANG (*decapterus ruselli*) TERHADAP STATUS GIZI KURANG PADA ANAK SEKOLAH DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAYANG KOTA MAKASSAR TAHUN 2018.

Tanggal Wawancara:

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Siswa :
2. Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Kelas :
5. Nama Orang Tua : Ayah..... Ibu
6. Pendidikan Orang Tua : Ayah..... Ibu
7. Pekerjaan Orang Tua : Ayah..... Ibu
8. Alamat :
9. No. HP :

B. DATA RESPONDEN

1. Riwayat Penyakit*
2. Riwayat Alergi :
3. Konsumsi Obat Cacing** : ***YA / TIDAK
4. Telah Menerima PMT : ***YA / TIDAK
5. Berat Badan : kg

*Selama 2 (dua) minggu terakhir

**Selama 6 (enam) bulan terakhir

***coret salah satu yang tidak sesuai

Lampiran 3

FORMULIR *FOOD RECALL* 24 JAM

PENELITIAN MENGENAI PENGARUH PEMBERIAN BAKSO RUMPUT LAUT LAWI-LAWI (*Caulerpa racemosa*) KOMBINASI IKAN LAYANG (*decapterus ruselli*) TERHADAP STATUS GIZI KURANG PADA ANAK SEKOLAH DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAYANG KOTA MAKASSAR TAHUN 2018.

No. Responden :

Nama :

Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Berat Badan :

Waktu	Jenis Makanan/ Bahan Makanan	Cara Pengolahan	Jumlah/ Ukuran	
			URT	Gram
Pagi				
Selingan				
Siang				
Selingan				
Malam				
Selingan				

Lampiran 4

FORM DATA PENGUKURAN ANTROPOMETRI
PENELITIAN MENGENAI PENGARUH PEMBERIAN BAKSO RUMPUT
LAUT LAWI-LAWI (*Caulerpa racemosa*) KOMBINASI IKAN LAYANG
(*Decapterus ruselli*) TERHADAP STATUS GIZI KURANG PADA ANAK
SEKOLAH DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAYANG
KOTA MAKASSAR TAHUN 2018.

Nama :

Pengukuran Ke	Hari/Tanggal Pengukuran	BB (kg)



Lampiran 5

**FORM PEMANTAUAN KONSUMSI
BAKSO RUMPUT LAUT LAWI-LAWI KOMBINASI IKAN LAYANG**

Hari/Tanggal:

No	Nama Responden	Total Yang Dikonsumsi (gram)	Keterangan Masalah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
Rata-tata			

Lampiran 6

**FORM PEMANTAUAN KONSUMSI
BAKSO IKAN LAYANG**

Hari/Tanggal:

No	Nama Responden	Total Yang Dikonsumsi (gram)	Keterangan Masalah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
Rata-tata			

Lampiran 7

CARA PEMBUATAN BAKSO RUMPUT LAUT LAWI-LAWI (*Caulerpa racemosa*) KOMBINASI IKAN LAYANG (*Decapterus ruselli*)

A. Alat dan Bahan:

1. Alat:

Blender

Baskom

Piring

Pisau

Kompor

Panci

Timbangan Makanan

Sendok

2. Bahan:

Bawang putih 6 gr

Daun bawang 2 gr

Seledri 2 gr

Merica 3 biji

Garam 5 gr

Tepung tapioka 25 gr

Tepung terigu 25 gr

Telur ayam 10 gr

Ikan Layang (*Decapterus ruselli*): 50 gr untuk formula 1:1 dan 100 gr untuk formula 0:1



Rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*): 50 gr untuk formula 1:1

B. Cara Membuat

1. Bumbu dan bahan dihaluskan
2. Kemudian bumbu dan bahan yang telah halus dicampur ke dalam wadah hingga adonan menjadi rata
3. Rebus air dalam panci sampai mendidih
4. Adonan dibentuk bulat dengan satu tangan ditekan hingga adonan keluar melalui jari telunjuk dan jempol
5. Adonan yang telah berbentuk dimasukkan kedalam air panas
6. Jika bakso telah mengapung maka bakso telah matang dan sudah dapat diangkat atau ditiriskan.



Lampiran 9

KANDUNGAN GIZI BAKSO RUMPUT LAUT LAWI-LAWI (*Caulerpa racemosa*) KOMBINASI IKAN LAYANG (*Decapterus ruselli*)

Formula	Kandungan Zat Gizi dalam 100 Gram			
	Karbohidrat (%)	Protein (%)	Lemak (%)	Zat Besi (mg/kg)
Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi Kombinasi Ikan Layang (1:1)	25.59	8.44	11.08	24.79
Bakso Ikan Layang (0:1)	25.31	20.31	6.53	13.92

Sumber: Data Sekunder, 2018 dalam (Haris, 2018)

1. Kandungan gizi bakso rumput laut lawi-lawi (*Caulerpa racemosa*) kombinasi ikan layang (*Decapterus ruselli*) dengan perbandingan 1:1 (50 gr rumput laut lawi-lawi : 50 gr ikan layang) dalam takaran 100 gram yang diintervensikan pada anak usia sekolah gizi kurang kelompok I (kasus) :

$$\text{Karbohidrat} : 25.59 \times 4 = 102.36$$

$$\text{Protein} : 8.44 \times 4 = 33.76$$

$$\text{Lemak} : 11.08 \times 9 = 99.72 +$$

$$235.84 \text{ kkal}$$

2. Kandungan gizi bakso ikan layang (*Decapterus ruselli*) dalam takaran 100 gram yang diintervensikan pada anak usia sekolah gizi kurang kelompok II (kontrol) :

$$\text{Karbohidrat} : 25.31 \times 4 = 101.24$$

$$\text{Protein} : 20.31 \times 4 = 81.24$$

$$\text{Lemak} : 6.53 \times 9 = 58.77 +$$

$$241.25 \text{ kkal}$$

Lampiran 10

DOKUMENTASI PENELITIAN

Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi Kombinasi Ikan Layang dan Bakso Ikan Layang yang diintervensikan pada Anak Sekolah Gizi Kurang



Penimbangan Berat Badan





Pemberian Obat Cacing



Wawancara Recall 24 Jam



Pemberian Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi Kombinasi Ikan Layang dan Bakso Ikan Layang yang diintervensikan pada Anak Sekolah Gizi Kurang





Lampiran 11

HASIL PEMANTAUAN KONSUMSI PRODUK

Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi (*Caulerpa racemosa*) Kombinasi Ikan Layang (*Decapterus ruselli*)

NO	NAMA	TANGGAL																					KONSUMSI											
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	TOTAL	RATA-RATA	
1	MNS	60	80	70	100	70	80	100	75	100	78	90	80	95	80	68	90	80	70	100	30	55	18	16	80	75	35	50	70	100	100	2195	73.17	
2	RND	67	50	80	100	100	100	100	65	80	100	100	100	100	100	100	100	60	100	51	45	100	95	80	100	100	70	90	100	100	100	2633	87.77	
3	NNL	50	50	70	40	90	80	100	60	90	100	100	60	90	100	80	70	80	90	90	80	100	100	80	80	90	80	65	100	100	100	2465	82.17	
4	FRD	45	40	75	80	60	80	100	100	100	100	75	100	60	100	100	100	100	100	60	60	100	90	70	75	70	100	70	100	100	100	2510	83.67	
5	IKZ	70	100	30	65	57	100	100	100	85	100	100	100	70	100	100	100	70	20	25	56	100	80	100	100	100	90	100	100	100	100	2518	83.93	
6	FDL	80	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	80	100	100	100	100	2920	97.33	
7	FJR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3000	100.00
9	YNS	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2950	98.33
10	RHM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3000	100.00
11	RSQ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3000	100.00
12	NNA	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	80	80	90	100	100	90	100	100	100	2900	96.67
13	NFS	80	100	100	100	100	70	80	100	80	100	100	80	80	100	100	90	90	80	80	100	80	100	100	40	100	70	70	60	100	100	2650	88.33	
14	DFN	30	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	80	100	24	81	100	80	100	100	100	100	100	100	2725	90.83
15	RZA	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	71	100	100	100	100	100	70	100	90	80	100	100	100	2901	96.70	
15	ARF	90	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2950	98.33
16	FKR	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	83	100	100	61	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2810	93.67
17	FRZ	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	50	100	100	100	60	100	100	100	100	100	100	100	2875	95.83
																	2764.82	92.16																

Bakso Ikan Layang (*Decapterus ruselli*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

NO	NAMA	TANGGAL																					KONSUMSI												
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	TOTAL	RATA-RATA		
1	ARN	85	100	100	100	80	80	100	90	70	100	100	100	90	100	80	90	80	90	100	100	100	100	100	100	100	80	90	100	100	100	100	2805	93.50	
2	ARD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	100	100	100	100	100	100	50	100	100	100	100	100	100	100	2940	98.00	
3	FDL	42	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70	100	100	100	100	100	100	70	100	100	75	100	100	100	100	100	100	100	100	2857	95.23	
4	RNG	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70	80	100	30	100	100	100	100	100	100	80	70	100	100	70	90	100	100	100	100	2740	91.33	
5	AIN	30	15	10	48	46	58	100	77	100	100	100	100	68	100	100	80	42	100	100	100	100	100	40	100	100	100	80	100	100	100	100	2394	79.80	
6	ALF	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3000	100.00	
7	RHN	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	17	100	20	100	100	100	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	2743	91.43	
8	AMR	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2963	98.77	
9	ARF	47	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2947	98.23	
10	ASY	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3000	100.00
11	FDI	80	85	70	100	50	100	100	100	80	100	100	100	70	100	100	100	80	70	100	100	80	80	90	70	100	100	100	100	100	100	100	2705	90.17	
12	MLN	70	50	90	75	100	100	100	100	80	100	100	42	100	100	60	50	80	100	100	100	100	100	100	80	100	90	100	100	100	100	100	2667	88.90	
13	FHR	40	70	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70	70	50	60	100	100	100	50	70	60	80	100	70	100	100	100	100	2540	84.67	
14	MSD	30	60	50	100	100	60	100	20	40	100	100	50	30	100	80	100	80	60	100	100	100	80	90	70	70	70	100	100	100	100	100	2340	78.00	
15	NRL	40	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	100	70	100	80	70	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	2805	93.50	
16	AWL	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	90	100	100	100	100	2960	98.67	
17	SYH	60	80	100	100	100	100	60	90	100	100	100	70	50	65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	75	100	100	100	2730	91.00	
																	2772.71	92.42																	

Lampiran 12

**HASIL RECALL 24 JAM ANAK SEKOLAH GIZI KURANG DI
MADRASAH IBTIDAIYAH WILAYAH KERJA
PUSKESMAS LAYANG KOTA MAKASSAR
TAHUN 2018**

KELOMPOK I (KASUS)							KELOMPOK II (KONTROL)						
NO	NAMA SISWA	JK	RECALL AWAL INTERVENSI		RECALL AKHIR INTERVENSI		NO	NAMA SISWA	JK	RECALL AWAL INTERVENSI		RECALL AKHIR INTERVENSI	
			ENERGI	PROTEIN	ENERGI	PROTEIN				ENERGI	PROTEIN	ENERGI	PROTEIN
1	MNS	L	614.55	17.8	788.55	34.7	1	ARN	P	1158.85	27.85	1437.65	52.05
2	RND	L	855.05	30.2	673.65	35.45	2	ARD	L	814.35	45.05	806.5	50.3
3	NNL	P	543.05	20.85	835.55	43.3	3	FDL	L	621.25	20.25	902.4	57.9
4	FRD	L	729.15	30.8	933.6	31.75	4	RNG	L	1293.80	48.35	1274.75	66.45
5	IKZ	L	1304.90	55.7	608.5	27.75	5	AIN	P	770.85	27.6	814.1	42.6
6	FDL	L	1089.30	39.05	1195.6	37.35	6	ALF	L	1128.25	54.5	1519.45	64.95
7	FJR	L	1274.55	43.05	1353.05	42.9	7	RHN	L	420.95	14.65	653.8	32.25
8	YNS	L	861.00	28.7	932.55	25.2	8	AMR	P	892.85	28.4	965.35	45.9
9	RHM	P	807.70	25.7	1020.05	35.5	9	ARF	L	858.75	35.85	817.75	44.55
10	RSQ	P	941.80	38.1	1201.5	43.3	10	ASY	P	1318.00	37.85	1441.15	58.25
11	NNA	P	893.25	37.95	1673.6	51.4	11	FDI	L	1209.25	33.7	923.9	36.2
12	NFS	P	650.65	26.75	1324.7	42.6	12	MLN	L	959.60	36.9	1427.5	75.6
13	DFN	P	843.80	27.5	1251.9	40.25	13	FHR	L	618.15	28.05	1075.15	52.95
14	RZA	L	435.20	23.8	994.6	39.65	14	MSD	P	383.85	16.1	866.4	40.1
15	ARF	L	1180.50	42.15	1324.1	38.2	15	NRL	P	1644.40	54.05	1537.15	82.7
16	FKR	L	728.95	29	705.8	26.05	16	AWL	L	385.80	10.7	1303.45	70.85
17	FRZ	L	983.90	28.2	473.5	32.35	17	SYH	L	639.10	18.85	1286.6	49.7
RATA-RATA			866.90	32.08	1017.11	36.89	RATA-RATA			904.93	32.49	1110.40	54.60

Lampiran 13

**DATA BERAT BADAN DAN STATUS GIZI ANAK SEKOLAH GIZI
KURANG DI MADRASAH IBTIDAIYAH WILAYAH KERJA
PUSKESMAS LAYANG KOTA MAKASSAR
TAHUN 2018**

KELOMPOK I (KASUS)								
NO	NAMA SISWA	JK	BERAT BADAN (Kg)		NILAI Z-SCORE BB/U		STATUS GIZI	
			AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
1	MNS	L	17.8	17.5	-2.16	-2.37	KURANG	KURANG
2	RND	L	18.1	18.3	-2.42	-2.39	KURANG	KURANG
3	NNL	P	17.2	17.4	-2.3	-2.3	KURANG	KURANG
4	FRD	L	18	17.6	-2.55	-2.8	KURANG	KURANG
5	IKZ	L	18.1	17.9	-2.25	-2.4	KURANG	KURANG
6	FDL	L	19	18.9	-2.38	-2.48	KURANG	KURANG
7	FJR	L	19.9	19.9	-2.27	-2.32	KURANG	KURANG
8	YNS	L	21.2	21	-2.29	-2.42	KURANG	KURANG
9	RHM	P	19.7	19.7	-2.28	-2.34	KURANG	KURANG
10	RSQ	P	21.2	21.4	-2.01	-2.01	KURANG	KURANG
11	NNA	P	20.5	20.7	-2.14	-2.13	KURANG	KURANG
12	NFS	P	18.6	18.8	-2.69	-2.67	KURANG	KURANG
13	DFN	P	19.6	19.6	-2.41	-2.48	KURANG	KURANG
14	RZA	L	19.3	19.1	-2.03	-2.17	KURANG	KURANG
15	ARF	L	19.5	20	-2.06	-1.91	KURANG	BAIK
16	FKR	L	19.3	18.9	-2.39	-2.62	KURANG	KURANG
17	FRZ	L	20.2	20	-2.25	-2.46	KURANG	KURANG
RATA-RATA			19.25	19.22	-2.29	-2.37		

KELOMPOK II (KONTROL)								
NO	NAMA SISWA	JK	BERAT BADAN (Kg)		NILAI Z-SCORE BB/U		STATUS GIZI	
			AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
1	ARN	P	15.7	15.7	-2.66	-2.72	KURANG	KURANG
2	ARD	L	16.4	16.8	-2.8	-2.67	KURANG	KURANG
3	FDL	L	16.2	16.6	-2.86	-2.72	KURANG	KURANG
4	RNG	L	17.9	18.1	-2.55	-2.52	KURANG	KURANG
5	AIN	P	16.1	16.4	-2.51	-2.43	KURANG	KURANG
6	ALF	L	17.6	17.5	-2.54	-2.65	KURANG	KURANG
7	RHN	L	18.8	19.1	-2.74	-2.67	KURANG	KURANG
8	AMR	P	18.6	19.3	-2.93	-2.71	KURANG	KURANG
9	ARF	L	20.3	20.4	-2.29	-2.3	KURANG	KURANG
10	ASY	P	19.7	19.9	-2.73	-2.72	KURANG	KURANG
11	FDI	L	18.4	18.8	-2.68	-2.55	KURANG	KURANG
12	MLN	L	19.3	20.4	-2.41	-2.01	KURANG	KURANG
13	FHR	L	19.1	19.1	-2.94	-2.99	KURANG	KURANG
14	MSD	P	20.7	20.7	-2.41	-2.47	KURANG	KURANG
15	NRL	P	19.1	19.2	-2.8	-2.82	KURANG	KURANG
16	AWL	L	20.2	20.7	-2.35	-2.2	KURANG	KURANG
17	SYH	L	16.7	16.6	-2.82	-2.93	KURANG	KURANG
RATA-RATA			18.28	18.55	-2.65	-2.59		

Lampiran 14

HASIL ANALISIS SPSS

A. Frekuensi

1. Kelompok Kasus

JENIS KELAMIN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	11	64.7	64.7	64.7
	PEREMPUAN	6	35.3	35.3	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

TINGKATAN KELAS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KELAS 2	7	41.2	41.2	41.2
	KELAS 3	3	17.6	17.6	58.8
	KELAS 4	7	41.2	41.2	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

UMUR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7 TAHUN	6	35.3	35.3	35.3
	8 TAHUN	8	47.1	47.1	82.4
	9 TAHUN	3	17.6	17.6	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

PEKERJAAN AYAH

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BURUH	11	64.7	64.7	64.7
	WIRASWASTA	3	17.6	17.6	82.4
	KARYAWAN SWASTA	2	11.8	11.8	94.1
	NELAYAN	1	5.9	5.9	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

PEKERJAAN IBU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	MENINGGAL	1	5.9	5.9	5.9
	IRT	13	76.5	76.5	82.4
	GURU	2	11.8	11.8	94.1
	WIRASWASTA	1	5.9	5.9	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PENDIDIKAN AYAH

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SEKOLAH	6	35.3	35.3	35.3
	SD	3	17.6	17.6	52.9
	SMA	5	29.4	29.4	82.4
	S1	3	17.6	17.6	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

PENDIDIKAN IBU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SEKOLAH	6	35.3	35.3	35.3
	SD	4	23.5	23.5	58.8
	SMP	2	11.8	11.8	70.6
	SMA	3	17.6	17.6	88.2
	S1	2	11.8	11.8	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

2. Kelompok Kontrol

JENIS KELAMIN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	11	64.7	64.7	64.7
	PEREMPUAN	6	35.3	35.3	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
TINGKATAN KELAS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KELAS 1	1	5.9	5.9	5.9
	KELAS 2	6	35.3	35.3	41.2
	KELAS 3	6	35.3	35.3	76.5
	KELAS 4	4	23.5	23.5	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

UMUR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7 TAHUN	7	41.2	41.2	41.2
	8 TAHUN	5	29.4	29.4	70.6
	9 TAHUN	5	29.4	29.4	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

PEKERJAAN AYAH

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK BEKERJA/ MENINGGAL	3	17.6	17.6	17.6
	BURUH	9	52.9	52.9	70.6
	WIRASWASTA	2	11.8	11.8	82.4
	SOPIR	2	11.8	11.8	94.1
	KARYAWAN SWASTA	1	5.9	5.9	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PEKERJAAN IBU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	15	88.2	88.2	88.2
	GURU	1	5.9	5.9	94.1
	KARYAWAN SWASTA	1	5.9	5.9	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

PENDIDIKAN AYAH

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	5	29.4	29.4	29.4
	SMP	3	17.6	17.6	47.1
	SMA	7	41.2	41.2	88.2
	S1	2	11.8	11.8	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

PENDIDIKAN IBU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SEKOLAH	1	5.9	5.9	5.9
	SD	5	29.4	29.4	35.3
	SMP	7	41.2	41.2	76.5
	SMA	3	17.6	17.6	94.1
	S1	1	5.9	5.9	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

B. Independen T Test

1. Uji Normalitas

a. Sebelum Intervensi

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
ASUPAN ENERGI	.098	34	.200*	.970	34	.465
ASUPAN PROTEIN	.129	34	.165	.966	34	.357
BERAT BADAN	.093	34	.200*	.967	34	.392
STATUS GIZI	.130	34	.153	.961	34	.257

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

b. Setelah Intervensi

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
ASUPAN ENERGI	.111	34	.200 [*]	.968	34	.402
ASUPAN PROTEIN	.148	34	.056	.938	34	.055
BERAT BADAN	.125	34	.198	.966	34	.356
STATUS GIZI	.093	34	.200 [*]	.981	34	.804

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Independen

a. Sebelum Intervensi

		Group Statistics			
	KELOMPOK	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
ASUPAN ENERGI	KELOMPOK KASUS	17	8.6690E2	246.18713	59.70915
	KELOMPOK KONTROL	17	8.8930E2	363.27976	88.10828
ASUPAN PROTEIN	KELOMPOK KASUS	17	32.0765	9.44969	2.29189
	KELOMPOK KONTROL	17	31.6882	13.43508	3.25849
BERAT BADAN	KELOMPOK KASUS	17	19.2471	1.16946	.28364
	KELOMPOK KONTROL	17	18.2824	1.59657	.38723
STATUS GIZI	KELOMPOK KASUS	17	-2.2871	.18010	.04368
	KELOMPOK KONTROL	17	-2.6482	.20501	.04972

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
ASUPAN ENERGI	Equal variances assumed	2.930	.097	-.210	32	.835	-22.39706	106.43426	-239.19656	194.40244
	Equal variances not assumed			-.210	28.136	.835	-22.39706	106.43426	-240.37019	195.57607
ASUPAN PROTEIN	Equal variances assumed	2.391	.132	.097	32	.923	.38824	3.98378	-7.72645	8.50292
	Equal variances not assumed			.097	28.718	.923	.38824	3.98378	-7.76298	8.53945
BERAT BADAN	Equal variances assumed	2.568	.119	2.010	32	.053	.96471	.47999	-.01301	1.94242
	Equal variances not assumed			2.010	29.331	.054	.96471	.47999	-.01651	1.94592
STATUS GIZI	Equal variances assumed	1.188	.284	5.457	32	.000	.36118	.06618	.22637	.49599
	Equal variances not assumed			5.457	31.478	.000	.36118	.06618	.22628	.49607

b. Setelah Intervensi

Group Statistics

	KELOMPOK	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
ASUPAN ENERGI	KELOMPOK KASUS	17	1.0171E3	319.26380	77.43285
	KELOMPOK KONTROL	17	1.1208E3	295.18185	71.59211
ASUPAN PROTEIN	KELOMPOK KASUS	17	36.8882	10.94263	2.65398
	KELOMPOK KONTROL	17	54.3118	14.11065	3.42234
BERAT BADAN	KELOMPOK KASUS	17	19.2176	1.22589	.29732
	KELOMPOK KONTROL	17	18.5471	1.66362	.40349
STATUS GIZI	KELOMPOK KASUS	17	-2.3688	.22646	.05493
	KELOMPOK KONTROL	17	-2.5929	.25359	.06151

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
ASUPAN ENERGI	Equal variances assumed	.016	.899	-.983	32	.333	-103.66176	105.45746	-318.47159	111.14806
	Equal variances not assumed			-.983	31.805	.333	-103.66176	105.45746	-318.52320	111.19967
ASUPAN PROTEIN	Equal variances assumed	2.440	.128	-4.023	32	.000	-17.42353	4.33082	-26.24511	-8.60194
	Equal variances not assumed			-4.023	30.133	.000	-17.42353	4.33082	-26.26660	-8.58046
BERAT BADAN	Equal variances assumed	2.914	.098	1.338	32	.190	.67059	.50120	-.35032	1.69150
	Equal variances not assumed			1.338	29.419	.191	.67059	.50120	-.35385	1.69503
STATUS GIZI	Equal variances assumed	.372	.546	2.718	32	.011	.22412	.08246	.05615	.39208
	Equal variances not assumed			2.718	31.599	.011	.22412	.08246	.05607	.39217

C. Paired T
1. Uji Normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
ASUPAN ENERGI KASUS SEBELUM	.104	17	.200 [†]	.974	17	.877
ASUPAN ENERGI KASUS SETELAH	.124	17	.200 [†]	.976	17	.909
ASUPAN ENERGI KONTROL SEBELUM	.107	17	.200 [†]	.959	17	.615
ASUPAN ENERGI KONTROL SETELAH	.171	17	.198	.903	17	.077
ASUPAN PROTEIN KASUS SEBELUM	.201	17	.067	.934	17	.258
ASUPAN PROTEIN KASUS SETELAH	.119	17	.200 [†]	.969	17	.795
ASUPAN PROTEIN KONTROL SEBELUM	.126	17	.200 [†]	.956	17	.559
ASUPAN PROTEIN KONTROL SETELAH	.127	17	.200 [†]	.973	17	.869
BERAT BADAN KASUS SEBELUM	.131	17	.200 [†]	.967	17	.759
BERAT BADAN KASUS SETELAH	.094	17	.200 [†]	.959	17	.608
BERAT BADAN KONTROL SEBELUM	.133	17	.200 [†]	.941	17	.326
BERAT BADAN KONTROL SETELAH	.160	17	.200 [†]	.917	17	.134
STATUS GIZI KASUS SEBELUM	.124	17	.200 [†]	.963	17	.688
STATUS GIZI KASUS SETELAH	.145	17	.200 [†]	.974	17	.885
STATUS GIZI KONTROL SEBELUM	.126	17	.200 [†]	.947	17	.406
STATUS GIZI KONTROL SETELAH	.177	17	.161	.949	17	.439

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
ASUPAN ENERGI KASUS SEBELUM	.104	17	.200 [*]	.974	17	.877
ASUPAN ENERGI KASUS SETELAH	.124	17	.200 [*]	.976	17	.909
ASUPAN ENERGI KONTROL SEBELUM	.107	17	.200 [*]	.959	17	.615
ASUPAN ENERGI KONTROL SETELAH	.171	17	.198	.903	17	.077
ASUPAN PROTEIN KASUS SEBELUM	.201	17	.067	.934	17	.258
ASUPAN PROTEIN KASUS SETELAH	.119	17	.200 [*]	.969	17	.795
ASUPAN PROTEIN KONTROL SEBELUM	.126	17	.200 [*]	.956	17	.559
ASUPAN PROTEIN KONTROL SETELAH	.127	17	.200 [*]	.973	17	.869
BERAT BADAN KASUS SEBELUM	.131	17	.200 [*]	.967	17	.759
BERAT BADAN KASUS SETELAH	.094	17	.200 [*]	.959	17	.608
BERAT BADAN KONTROL SEBELUM	.133	17	.200 [*]	.941	17	.326
BERAT BADAN KONTROL SETELAH	.160	17	.200 [*]	.917	17	.134
STATUS GIZI KASUS SEBELUM	.124	17	.200 [*]	.963	17	.688
STATUS GIZI KASUS SETELAH	.145	17	.200 [*]	.974	17	.885
STATUS GIZI KONTROL SEBELUM	.126	17	.200 [*]	.947	17	.406
STATUS GIZI KONTROL SETELAH	.177	17	.161	.949	17	.439

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Paired T

a. Asupan Energi

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	ASUPAN ENERGI KASUS SEBELUM	8.6690E2	17	246.18713	59.70915
	ASUPAN ENERGI KASUS SETELAH	1.0171E3	17	319.26380	77.43285
Pair 2	ASUPAN ENERGI KONTROL SEBELUM	8.8930E2	17	363.27976	88.10828
	ASUPAN ENERGI KONTROL SETELAH	1.1208E3	17	295.18185	71.59211

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	ASUPAN ENERGI KASUS SEBELUM - ASUPAN ENERGI KASUS SETELAH	-1.50206E2	375.12554	90.98131	-343.07764	42.66587	-1.651	16	.118
Pair 2	ASUPAN ENERGI KONTROL SEBELUM - ASUPAN ENERGI KONTROL SETELAH	-2.31471E2	305.41894	74.07497	-388.50252	-74.43866	-3.125	16	.007

b. Asupan Protein

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	ASUPAN PROTEIN KASUS SEBELUM	32.0765	17	9.44969	2.29189
	ASUPAN PROTEIN KASUS SETELAH	36.8882	17	6.95008	1.68564
Pair 2	ASUPAN PROTEIN KONTROL SEBELUM	31.6882	17	13.43508	3.25849
	ASUPAN PROTEIN KONTROL SETELAH	54.3118	17	14.11065	3.42234

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	ASUPAN PROTEIN KASUS SEBELUM - ASUPAN PROTEIN KASUS SETELAH	-4.81176	11.75983	2.85218	-10.85811	1.23458	-1.687	16	.111
Pair 2	ASUPAN PROTEIN KONTROL SEBELUM - ASUPAN PROTEIN KONTROL SETELAH	-2.26235E1	14.11981	3.42456	-29.88327	-15.36379	-6.606	16	.000

c. Berat Badan

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	BERAT BADAN KASUS SEBELUM	19.2471	17	1.16946	.28364
	BERAT BADAN KASUS SETELAH	19.2176	17	1.22589	.29732
Pair 2	BERAT BADAN KONTROL SEBELUM	18.2824	17	1.59657	.38723
	BERAT BADAN KONTROL SETELAH	18.5471	17	1.66362	.40349

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	BERAT BADAN KASUS SEBELUM - BERAT BADAN KASUS SETELAH	.02941	.25190	.06110	-.10011	.15893	.481	16	.637
Pair 2	BERAT BADAN KONTROL SEBELUM - BERAT BADAN KONTROL SETELAH	-.26471	.31012	.07522	-.42416	-.10526	-3.519	16	.003

d. Status Gizi

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	STATUS GIZI KASUS SEBELUM	-2.2871	17	.18010	.04368
	STATUS GIZI KASUS SETELAH	-2.3688	17	.22646	.05493
Pair 2	STATUS GIZI KONTROL SEBELUM	-2.6482	17	.20501	.04972
	STATUS GIZI KONTROL SETELAH	-2.5929	17	.25359	.06151

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	STATUS GIZI KASUS SEBELUM - STATUS GIZI KASUS SETELAH	.08176	.111007	.02670	.02517	.13836	3.063	16	.007
Pair 2	STATUS GIZI KONTROL SEBELUM - STATUS GIZI KONTROL SETELAH	-.05529	.13206	.03203	-.12319	.01260	-1.726	16	.104

Lampiran 15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
 Kampus II : J. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR KEPUTUSAN

Nomor : A.034/KPEPK/FKIK/X/2018
 Judul Penelitian : Pengaruh Pemberian Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi (*Caulerpa racemosa*)
 Substitusi Ikan Layang (*Decapterus russelli*) Terhadap Status Gizi Kurang Pada
 Anak Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota
 Makassar Tahun 2018

Nama Peneliti : **Andi Jumriani Husnul Khatimah**

No. Register

U	I	N	A	M	I	8	0	8	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh reviewer terlampir
B	Perlu full board : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (Full Board) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembar pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembar pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembar pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembar pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penegasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): <u>Dr.dr.H.Andi Armyan Nurdin,M.Sc.</u>

Makassar , 2 Oktober 2018



Ketua

Dr.dr.H.Andi Armyan Nurdin,M.Sc.
 NIP. 19550203 198312 1 001

Lampiran 16



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jln. Nuri No.53 Makassar 90125
Telp./ faksimili (0411) 872219, 873459
Website :www.sulsel.kemenag.go.id

Nomor : 6903/KW.21.4/5/TL.00/07/2018
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 06 September 2018

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar

Di
Tempat.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Berdasarkan Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Nomor : 2783/S.01/PTSP/2018 Tanggal 16 Juli 2018, perihal sebagaimana pokok surat diatas, maka dengan ini kami menyetujui dan memberikan izin kepada Saudara(i) :

Nama : Andi Jumriani Husnul Khatimah
Nomor Pokok : 70200114072
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa

Untuk melakukan penelitian dan pengambilan data pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"Pengaruh pemberian bakteri *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR* (*lactobacillus ramosose*) kombinasi ikan layang (*decapterus rusejii*) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah di wilayah kerja puskesmas layang kota Makassar Tahun 2018"

Yang akan dilaksanakan pada tanggal, 02 Juli s/d 11 September 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar fotokopi proposal penelitian Kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan cq. Bidang Pendidikan Madrasah
3. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,



Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Selatan

Drs. H. Yuspiani, M.Pd.
9710717 199403 2 003

Tembusan Yth:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Peringgal.

Lampiran 17



**MADRASAH IBTIDAIYAH
AS'ADIYAH NO. 170 LAYANG
KEC.BONTOALA KOTA MAKASSAR**

Alamat : Jl. Tinumbu Lr.149 No.23 Tlp. 085341976458 Makassar

SURAT KETERANGAN
NO. 016/AS/C/X/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala MI. As'adiyah No. 170 Layang Makassar menerangkan bahwa :

Nama	Andi Jamriani Husnul Khatimah
Tempat/Tanggal Lahir	Sengkang/ 14 Agustus 1996
Jenis Kelamin	Perempuan
Pekerjaan	Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Alamat	Jl. Yasin Limpo, Samata-Gowa

Yang tersebut namanya di atas benar telah mengadakan penelitian di MI As'adiyah No. 170 Layang Makassar dari Juli s/d Oktober 2018 dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**
" Pagaruh Pemberian Bakso Rumpat Laut Lasi-Lawi (*Caulerpa racemosa*) Kombinasi Ikan Layang (*Decapterus russello*) terhadap Status Gizi Kurang pada Anak Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar 2018"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 3 Oktober 2018

Kepala MI As'adiyah No. 170 Layang



Sultan, SE

Lampiran 18



**YAYAYASAN PERGURUAN ISLAM ATTANMIYATUL ILMIAH
MADRASAH IBTIDAIYAH ATTANMIYATUL ILMIAH
KECAMATAN BONTOALA MAKASSAR**

Alamat :Jl. TimumbuDalam No. 144 Makassar Phone : 081 343 554 568

SURAT KETERANGAN

No: 026/MI-AT/X/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala MI Attanmiyatul Ilmiah Makassar menerangkan bahwa :

Nama : **Andi Jumriani Husnul Khatimah**
Tempat/Tanggal Lahir : Sengkang, 14 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. Yasin Limpo, Samata-Gowa

Yang tersebut namanya di atas benar telah mengadakan penelitian di MI Attanmiyatul Ilmiah Makassar dari bulan Juli s/d Oktober 2018 dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

“ Pengaruh Pemberian Bakso Rumput Laut Lavi-Lavi (*Caulerpa racemosa*) Kombinasi Ikan Layang (*Decapterus russelli*) terhadap Status Gizi Kurang pada Anak Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar 2018 “

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 3 Oktober 2018

Kepala Madrasah



Herni S, Pd-I

Lampiran 19



معهدالدراسات الإسلامية والعربية

MADRASAH IBTIDAIYAH

MDIA 3 NURUL IHSAN

Alamat : Jl Tanumbu Lr 132 D No 2

SURAT KETERANGAN

No 05 SK/MI MDIA 3/EX/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala MI MDIA 3 NURUL IHSAN Makassar menerangkan bahwa :

Nama : **Andi Jumriani Husnul Khatimah**
Tempat/Tanggal Lahir : **Sengkang, 14 Agustus 1996**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan : **Mahasiswa UIN Alauddin Makassar**
Alamat : **Jl. Yasin Limpo, Samata-Gowa**

Yang tersebut namanya di atas benar telah mengadakan penelitian di MI MDIA 3 NURUL IHSAN Makassar dari bulan Juli s/d Oktober 2018 dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

*** Pengaruh Pemberian Bakso Rumput Laut Lawi-lawi (Caulerpa racemosa) Kombinasi Ikan Layang (Decapterus ruselli) terhadap Status Gizi Kurang pada Anak Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar 2018**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 3 Oktober 2018

Kepala Madrasah



Abd. Qaid Abdullah, S.Pd.I

RIWAYAT HIDUP



Andi Jumriani Husnul Khatimah, Lahir di Sengkang, 14 Agustus 1996, anak pertama dan terakhir dari pasangan H. Ramli Jum dan Hj. A. Dianriani B. Penulis menempuh pendidikan pertama pada tahun 2001 di TK Puangrimaggalutung Tae. Pada tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan di SDN 270 Wewangrewu kemudian pindah pada tahun 2005 ke SDN 214 Baru Tancung dan tamat tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tanasitolo dan tamat tahun 2012. Pendidikan selanjutnya di SMAN 2 Sengkang pada tahun 2012 dan tamat tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ketingkat perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat peminatan Gizi.

