

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN *CORONARY ARTERY DISEASE (CAD) POST CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT (CABG)*
DENGAN ANSIETAS MENGGUNAKAN INTERVENSI
*GREEN COLOR BREATHING THERAPY***



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FATIHA IZZA TUSLAMIA
NIM: 70900121005

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatiha Izza Tuslamia, S. Kep
NIM : 70900121005
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 30 Oktober 1999
Jurusan/Prodi/Konsentrasi: Keperawatan/Ners/Keperawatan Medikal Bedah
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Desa Kanrung Dusun Sabbang Kec. Sinjai Tengah
Kab. Sinjai
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan Ansietas menggunakan Intervensi *Green Color Breathing Therapy*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 25 Juni 2022

Penyusun,



Fatiha Izza Tuslamia
NIM: 70900121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara (i) Fatiha Izza Tuslamia NIM: 70900121005, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan Ansietas menggunakan Intervensi *Green Color Breathing Therapy*”, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 25 Juni 2022



Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep, Ns, M.Kep

Pembimbing I



Andi Budianto Adi Putra, S.Kep, Ns, M.Kep

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul, “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan Ansietas menggunakan Intervensi *Green Color Breathing Therapy*”, yang disusun oleh Fatiha Izza Tuslamia, NIM: 70900121005, mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, Senin tanggal 28 Juni 2022 M, bertepatan dengan 28 Zulqaidah 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 28 Juni 2022 M.
28 Zulqaidah 1443 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M. Kes

Sekretaris : Dr. Patima, S. Kep., Ns., M. Kep

Munaqisy I : Dr. Muh. Anwar Hafid, S. Kep., Ns., M. Kes

Munaqisy II : Dr. Rahmi Damis, M. Ag

Pembimbing I : Nurul Khusnul Khotimah, S. Kep., Ns., M. Kep

Pembimbing II: Andi Budianto Adi Putra, S. Kep., Ns., M. Kep

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,


Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M. Kes.

NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan berkat kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nyalah yang tercurah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners dengan judul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan Ansietas menggunakan Intervensi *Green Color Breathing Therapy*” yang diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan profesi Ners jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Tak lupa pula, selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Baginda Rasulullah, Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak, yang telah mengajarkan kita akan indahnya rasa cinta dan kasih, iman dan Islam.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, kata sempurna sangat jauh dari penyusunan tugas akhir ners ini. Banyak hambatan dan tantangan yang hadir dalam penyelesaiannya. Maka dari itu, berbagai saran dan kritikan yang dapat membangun demi penyempurnaan karya tulis ilmiah selanjutnya sangat penulis harapkan.

Dalam pembuatan karya tugas akhir ners ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, berupa bantuan moril, saran-saran, bimbingan dan dorongan serta arahan. Tidak ada kata lain selain terima kasih sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan untuk segala dukungan, perhatian, apresiasi, senyuman, kehangatan, persahabatan, obrolan-obrolan yang menyenangkan sekaligus menenangkan, pesan-pesan dan harapan dari orang-orang yang selama ini turut andil membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ners ini.

Terlebih karena atas izin Allah Swt dan kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Jayadi dan Ibu Muliati Halma, berkat doa, dukungan, semangat dan

bantuan moril maupun meterial dari mereka, penulis selalu yakin akan berhasil melakukan segala hal yang tidak mungkin sekalipun, sehingga mengantarkan penulis untuk dapat menyelesaikan amanah akademik dan dapat meraih gelar Ners jurusan Keperawatan.

Tak lupa pula penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin. Sp., A., M. Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan, serta seluruh Staf Akademik yang telah membantu dalam pembuatan dan pengurusan segala administrasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. Patima, S. Kep., Ns., M. Kep selaku Kepala Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan Ibu Dr. Hj. Syisnawati, S. Kep., Ns., M. Kep., Sp. Kep. J selaku Sekretaris Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Nurul Khusnul Khotimah, S. Kep., Ns., M. Kep selaku Pembimbing I dan Bapak Andi Budianto Adi Putra, S. Kep., Ns., M. Kep selaku Pembimbing II yang selalu ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis untuk mengarahkan, membimbing dan memberikan petunjuk dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penilaian tugas akhir ners, motivasi yang membangun sehingga bisa sampai pada tahap ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Anwar Hafid, S. Kep., Ns., M. Kes selaku Penguji I dan Ibu Dr. Rahmi Damis, M. Ag selaku Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran, kritik, arahan dan tanggapan yang membangun agar peneliti menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan bermanfaat, baik bagi pribadi penulis maupun orang lain.
5. Seluruh dosen pengajar Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan seluruh Staf Jurusan Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan.

6. Keluarga besar penulis, yakni kakek, nenek, om, tante dan sepupu yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta memanjatkan doa sehingga menjadikan jalan panjang penuh kerikil dan lubang yang penulis lalui terasa lebih lapang dan mudah. Saya sangat menyayangi kalian.
7. Teman-teman se-angkatan Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Angkatan 19 (Angkatan Selusin) atas kebersamaannya, saling merangkul satu sama lain dalam keadaan apapun mengingat proses menggapai cita tidaklah mudah, yang selalu menjadi *partner*, memberikan motivasi, menasehati, siap membantu penulis dalam keadaan apapun untuk penyelesaian penelitian.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah bersedia menjadi *support system*, menasihati dan menyemangati untuk menyelesaikan amanah pendidikan, memberi warna dalam setiap langkah dan tindakan yang dilalui serta senantiasa menebar kebermanfaatan.

Tugas Akhir Ners ini merupakan awal dari proses penyelesaian penulis dengan dunia akademik. Menyempurnakan sebuah karya tulis yang bersifat ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun guna meningkatkan ilmu penelitian dan karya tulis ilmiah terbaik sebagai langkah menuju kesempurnaan.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, baik lisan maupun tulisan saat menempuh pendidikan di kampus peradaban yang tercinta dan membanggakan ini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis berharap bahwa apa yang disajikan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya dan menjadi salah satu bentuk pengabdian di masyarakat nantinya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 25 Juni 2022



Penyusun


DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul	
Halaman Sampul	i
Halaman Pernyataan Keaslian Tugas Akhir Ners	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir Ners	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Halaman Abstrak (Indonesia)	xiii
Halaman Abstract (Inggris)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1-7
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8-54
2.1 Konsep Medis	8
2.2 Konsep Asuhan Keperawatan.....	16
2.3 Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan.....	38
2.4 <i>Evidence Based Practice in Nursing</i> (EBPN)	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55-58
3.1 Rancangan Studi Kasus	55
3.2 Subyek Studi Kasus	55
3.3 Fokus Studi Kasus	55
3.4 Instrumen Studi Kasus.....	56
3.5 Prosedur Pengambilan Data	56

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus.....	56
3.7 Analisis Data dan Penyajian Data	57
3.8 Etika Studi Kasus	57
BAB IV LAPORAN KASUS.....	59-103
4.1 Pengkajian	59
4.2 Analisis Data	87
4.3 Diagnosis Keperawatan.....	90
4.4 Intervensi Keperawatan.....	91
4.5 Implementasi Keperawatan	95
4.6 Evaluasi Keperawatan	101
BAB V PEMBAHASAN	104-116
5.1 Analisis Asuhan Keperawatan.....	104
5.2 Analisis <i>Evidance Based Practice in Nursing</i>	111
5.3 Keterbatasan	115
BAB VI PENUTUP	117-119
6.1 Kesimpulan.....	117
6.2 Saran.....	119
Daftar Pustaka.....	120-126
Lampiran	127-162
Lampiran 1: Penyimpangan KDM.....	128
Lampiran 2: Kuesioner HARS	131
Lampiran 3: Jurnal Rujukan Utama	134
Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup.....	135
Lampiran 5: Dokumentasi Pemberian Tindakan.....	136

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Kerja Konseptual pada Teori Kenyamanan.....	39
Gambar 2 Genogram Klien.....	62
Gambar 3 Grafik Skor Skala HARS	111
Gambar 4 Penyimpangan KDM	135
Gambar 5 Dokumentasi Pemberian Tindakan	136



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Batasan Karakteristik Pola Napas Tidak Efektif.....	18
Tabel 2 Batasan Karakteristik Nyeri Akut.....	19
Tabel 3 Batasan Karakteristik Perfusi Perifer Tidak Efektif	20
Tabel 4 Batasan Karakteristik Penurunan Curah Jantung.....	21
Tabel 5 Batasan Karakteristik Hipervolemia	23
Tabel 6 Batasan Karakteristik Intoleransi Aktivitas	23
Tabel 7 Batasan Karakteristik Ansietas	25
Tabel 8 Intervensi Keperawatan Pola Napas Tidak Efektif.....	26
Tabel 9 Intervensi Keperawatan Nyeri Akut	27
Tabel 10 Intervensi Keperawatan Perfusi Perifer Tidak Efektif.....	29
Tabel 11 Intervensi Keperawatan Penurunan Curah Jantung	31
Tabel 12 Intervensi Keperawatan Hipervolemia.....	33
Tabel 13 Intervensi Keperawatan Intoleransi Aktivitas.....	34
Tabel 14 Intervensi Keperawatan Ansietas.....	36
Tabel 15 Laboratorium Patologi Klinik.....	81
Tabel 16 Laboratorium Kimia Darah.....	82
Tabel 17 Terapi Obat	83
Tabel 18 Klasifikasi Data.....	84
Tabel 19 Kategorisasi Data	85
Tabel 20 Analisis Data.....	87
Tabel 21 Perumusan Prioritas Masalah Keperawatan.....	89

Tabel 22 Diagnosis Keperawatan.....	90
Tabel 23 Intervensi Keperawatan.....	91
Tabel 24 Implementasi Keperawatan.....	95
Tabel 25 Evaluasi Keperawatan.....	101
Tabel 26 Analisis Implementasi Keperawatan.....	109



ABSTRAK

Nama : Fatiha Izza Tuslamia

NIM : 70900121005

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan Ansietas menggunakan Intervensi *Green Color Breathing Therapy*

Latar Belakang: *Coronary Artery Disease (CAD)* atau penyakit jantung koroner merupakan penyakit kardiovaskular yang disebut sebagai penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. Salah satu penanganannya adalah *Coronary Artery Bypass Graft (CABG)*. Tindakan CABG dapat menimbulkan kecemasan di setiap tahapannya. Kecemasan dapat menjadi hambatan penyesuaian psikologis pada pasien jantung dan akan menghambat pemulihan fisik sehingga dapat berdampak pada kualitas hidup. Salah satu jenis terapi yang dapat menimbulkan relaksasi sehingga dapat mengurangi kecemasan dan belum banyak diterapkan di Indonesia adalah *Green Color Breathing Therapy*.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asuhan keperawatan pada klien yang mengalami *CAD Post CABG* dengan masalah ansietas di Pusat Jantung Terpadu RSUP Dr. Wahidin Soedirohusodo pada tahun 2021. **Metode** penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan metode studi kasus. Subyek yang digunakan adalah individu/klien yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen berupa format aspek, alat pemeriksaan TTV, kuesioner HARS serta kain berwarna hijau berukuran 1 meter. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, angket/kuesioner, wawancara dan pengukuran TTV. Analisis data disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan dalam bentuk teks dan dijelaskan secara naratif.

Hasil pemberian *green color breathing therapy* dilakukan selama 3 hari pada tanggal 6-8 Desember 2021 di Kamar 412 Lantai 4 Gedung Pusat Jantung Terpadu RSUP Dr. Wahidin Soedirohusodo Makassar dan didapatkan hasil klien sudah tidak merasa cemas, tidak lagi mengeluh khawatir dan takut pada luka operasinya serta tidak lagi merasa takut bergerak setelah operasi. **Kesimpulan** berdasarkan hasil evaluasi kasus dinyatakan bahwa *green color breathing therapy* efektif menurunkan ansietas pada pasien CAD post CABG.

Kata Kunci : Kecemasan, CAD, post CABG, green color breathing therapy

ABSTRACT

Name : Fatiha Izza Tuslamia
NIM : 70900121005
Title : *Analysis of Nursing Care in adult patient with Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG) with anxiety using Green Color Breathing Therapy Intervention*

Background: Coronary Artery Disease (CAD) or coronary heart disease is a cardiovascular disease which is said to be the biggest cause of death worldwide. One of the treatments is Coronary Artery Bypass Graft (CABG). CABG actions can cause anxiety at every stage. Anxiety can be a barrier to psychological adjustment in heart patients and will hinder physical recovery so that it can have an impact on quality of life. One type of therapy that can cause relaxation so as to reduce anxiety and has not been widely applied in Indonesia is Green Color Breathing Therapy.

The purpose: This study aims to analyze the description of nursing care for clients who experience CAD Post CABG with anxiety problems at the Integrated Heart Center RSUP Dr. Wahidin Soedirohusodo in 2021. **The method** of research used is a descriptive approach with a case study method. The subjects used are individuals/clients who have met the inclusion and exclusion criteria. Instruments in the form of Askep format, TTV examination tool, HARS questionnaire and 1 meter green cloth. Data was collected through observation methods, questionnaires/questionnaires, interviews and TTV measurements. Data analysis and data presentation are presented textually with facts made into text and explained in a narrative manner.

The results of green color breathing therapy was carried out for 3 days on December 6-8, 2021 in Room 412, 4th Floor of the Integrated Heart Center Building, RSUP Dr. Wahidin Soedirohusodo Makassar and the results obtained that the client no longer feels anxious, no longer complains of worry and fear of the surgical wound and no longer feels afraid to move after surgery. **The conclusion** based on the results of the case evaluation stated that green color breathing therapy are effective in reducing anxiety in post-CABG CAD patients.

Keywords : Anxiety, CAD, post CABG, green color breathing therapy

ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya gangguan kardiovaskular disebabkan karena kegagalan dalam mempertahankan pola kehidupan yang baik dan sehat, seperti tidak berolahraga secara teratur, banyak bekerja dalam posisi duduk yang lama serta tidak dibarengi dengan pola makan yang baik (Pahlawi & Sativani, 2021).

Prayogi et al. (2019) menyebutkan bahwa penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor satu di negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Diperkirakan lebih dari 36 juta kematian diakibatkan oleh penyakit tidak menular (PTM) tiap tahun, diperoleh 9 juta dari total kematian terjadi sebelum umur 60 tahun pada negara berkembang.

Penyebab utama kematian di benua Asia sendiri dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) dikutip dari Pratiwi & Saragi (2018) disebabkan oleh penyakit jantung. Survei yang dilakukan oleh Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan gejala di Indonesia ialah sebesar 1,5% atau diperkirakan sekitar 2.650.340 orang. Di wilayah Sulawesi Selatan diperoleh angka PJK mendekati prevalensi nasional yaitu mencapai 2,9%.

Mabruroh & Syarif (2020) menambahkan bahwa penyakit jantung koroner (PJK) atau *Coronary Artery Disease* (CAD) saat ini menjadi masalah kesehatan yang tinggi di masyarakat. Terdapat 18.2 juta (6.7%) orang dewasa usia lebih dari 19 tahun memiliki riwayat PJK serta menyebabkan 365.914 kematian pada tahun

2017. *American Heart Association* (AHA) menambahkan, di USA terdapat 15,5 juta orang dengan usia ≥ 20 tahun menderita PJK.

Coronary Artery Disease (CAD) atau yang lebih populer dikenal penyakit jantung koroner merupakan penyakit kardiovaskular penyebab kematian terbesar dan insidensinya pada saat ini cenderung meningkat. Hal ini berkaitan dengan peningkatan taraf hidup dan berubahnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri maupun perubahan pola makanan (Awaludin et al., 2018).

Dalam penelitian Pahlawi & Sativani (2021) WHO menyatakan bahwa *Cardio Vascular Disease (CVD)* mengalami peningkatan secara radikal dengan perkiraan 12 juta orang meninggal tiap tahunnya dan kebanyakan berasal dari negara berkembang. Penyakit jantung koroner (PJK) dianggap sebagai beban pertumbuhan CVD dan menjadi penyebab utama dilakukannya operasi jantung di seluruh dunia. PJK memengaruhi arteri koroner yang memasok darah ber-O₂ ke otot jantung karena menyebabkan timbulnya plak aterosklerotik di dalam arteri koroner sehingga terjadilah stenosis arteri. Stenosis dan penurunan suplai darah melalui salah satu segmen arteri ini memiliki efek berbahaya pada otot jantung.

Salah satu penanganan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan arteri pada penyakit jantung koroner ini adalah dengan dilakukannya *Coronary Artery Bypass Graft (CABG)*. CABG adalah operasi mayor yang digunakan untuk memperbaiki arteri yang tersumbat dan menyempit dengan memotong dan mengganti arteri yang tersumbat tersebut dari pembuluh sehat yang disebut "*graft*" yang diambil dari kaki, lengan, atau dada (Pahlawi & Sativani, 2021).

Menurut data dari *The World Bank* tahun 2015 dikutip dari Harahap et al (2021) sebanyak 4.511.101 per 100.000 populasi dengan posisi tertinggi yaitu benua Asia sebanyak 28.907 dari 100.000 populasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari WHO, tercatat di tahun 2011 terdapat 140 juta pasien di seluruh rumah sakit di dunia, sedangkan pada tahun 2012 data mengalami peningkatan sebesar 148 juta jiwa sedangkan untuk kawasan Asia pasien operasi mencapai angka 77 juta jiwa pada tahun 2012.

Tindakan CABG dapat menimbulkan kecemasan di setiap tahapannya. Kecemasan dapat menjadi hambatan penyesuaian psikologis pada pasien jantung dan akan menghambat pemulihan fisik sehingga dapat berdampak pada kualitas hidup pasiennya (Prayogi et al., 2019).

Hasil observasi data di ruang perawatan Pusat Jantung Terpadu di RSUP Dr. Wahidin Soedirohusodo pasien yang menjalani operasi *Coronary Artery Bypass Graft* (CABG) sekitar 119 pasien selama bulan April sampai dengan bulan Desember 2021.

Operasi mayor membawa respon psikologi yang biasanya terjadi pada pasien post operasi yaitu kecemasan. Kecemasan yang terjadi dihubungkan dengan rasa nyeri, kemungkinan cacat, menjadi bergantung dengan orang lain dan mungkin kematian (Harahap et al., 2021).

Kecemasan merupakan hal yang penting untuk dinilai dan ditangani pada pasien penyakit jantung, karena kecemasan seringkali disertai dengan gejala fisik seperti nyeri dada yang mengganggu pasien. Kecemasan dapat menyebabkan respon sistem kardiovaskuler antara lain palpitasi, jantung berdebar, rasa ingin

pingsan, peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut nadi dan dapat memperburuk kondisi jantung (Hastuti & Mulyani, 2019).

Gangguan ansietas merupakan salah satu gangguan mental yang paling banyak dijumpai. Berdasarkan laporan *The National Comorbidity* dikutip dari Mendra et al (2021) didapatkan 1 diantara 4 orang memiliki paling tidak satu kriteria dari gangguan ansietas dengan tingkat prevalensi sebesar 17,7%.

American Psychological Association (APA) dalam Harahap et al., 2021 menyebutkan bahwa kecemasan adalah emosi yang ditandai dengan perasaan tegang, pikiran khawatir dan perubahan fisik seperti peningkatan tekanan darah. Banyak ditemui fenomena pasien yang mengalami kecemasan dari cemas ringan sampai cemas berat setelah dilakukan tindakan operasi.

Hal tersebut didukung dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan didapatkan 2 pasien yang mengalami kecemasan setelah menjalani operasi CABG. Penatalaksanaan pra operasi dan post operasi Bedah Mayor di Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Wahidin Soedirohusodo Makassar belum berjalan secara efektif karena didominasi pada penanganan penyakit fisik pasien saja. Kurangnya informasi tentang *pre* dan *post* operasi akan mengakibatkan kecemasan pada pasien.

Untuk menghindari dampak dari kecemasan, diperlukan suatu pengelolaan kecemasan, baik dengan terapi farmakologi meliputi penggunaan obat cemas (*axiolytic*) dan anti depresi (*anti depressant*), serta terapi non farmakologi meliputi pendekatan perilaku, pendekatan kognitif dan relaksasi (Sari et al., 2018). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mawarti & Yuliana (2021) yang menyatakan bahwa individu yang mengalami ansietas dapat diatasi dengan teknik relaksasi.

Salah satu jenis terapi relaksasi dan belum banyak diterapkan di Indonesia adalah terapi pernapasan warna, merupakan terapi yang didasarkan pada pernyataan bahwa setiap warna tertentu mengandung energi-energi penyembuh, salah satunya ialah warna hijau. Warna hijau dapat menimbulkan rasa nyaman, menyeimbangkan dan menenangkan emosi (Sari et al., 2018).

Pernapasan warna adalah aktivitas mengurangi kecemasan yang dapat dipelajari dengan cepat karena dengan membayangkan atau merenungkan disertai penarikan napas dengan nyaman dan santai. Pada saat bernapas inilah terapi warna digunakan dengan memvisualisasikan warna tersebut. Penarikan napas yang dalam dengan memfokuskan pikiran membayangkan warna untuk menenangkan dan membuat rileks pikiran serta menyeimbangkan tubuh (Suwandi et al., 2018).

Penelitian Naja et al. (2021) menunjukkan bahwa terapi warna hijau mampu menurunkan tekanan darah pada kelompok eksperimen. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Mosse bahwa hijau memiliki kedekatan yang kuat dengan alam, membantu kita terhubung dengan empati kepada orang lain dan dunia alam. Secara naluriah, warna ini menciptakan perasaan nyaman, ketenangan, menyeimbangkan emosi dan mengurangi stres. Warna hijau berefek pada sistem saraf secara keseluruhan, terutama bermanfaat bagi sistem saraf pusat (Sari et al., 2018).

Beberapa hal yang dipaparkan di atas melatarbelakangi perlunya dilakukan penelitian mengenai disiplin ilmu Keperawatan Medikal Bedah yang berjudul **“Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien *Coronary Artery Disease (CAD)* *Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan Ansietas menggunakan Intervensi *Green Color Breathing Therapy*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah bagaimana pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan ansietas menggunakan intervensi *Green Color Breathing Therapy*.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Diketuainya asuhan keperawatan pada pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan masalah ansietas menggunakan intervensi *Green Color Breathing Therapy* di Pusat Jantung Terpadu RSUP Dr. Wahidin Soedirohusodo pada tahun 2021.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Diketuainya pengkajian keperawatan pada pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan masalah ansietas.
- b. Diketuainya diagnosis keperawatan pada pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan masalah ansietas.
- c. Diketuainya intervensi keperawatan pada pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan masalah ansietas.
- d. Diketuainya implementasi keperawatan pada pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)*

dengan masalah ansietas.

- e. Diketuahuinya evaluasi keperawatan pada pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan masalah ansietas.
- f. Diketuahuinya intervensi *Green Color Breath Therapy* berdasarkan *Evidance Based Practice in Nursing* pada asuhan keperawatan pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan masalah ansietas.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan praktik asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan masalah ansietas menggunakan intervensi *green color breath therapy* di Pusat Jantung Terpadu RSUP Dr. Wahidin Soedirohusodo.

1.4.2 Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi *Green Color Breath Therapy* pada pasien yang mengalami *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan masalah ansietas di Pusat Jantung Terpadu RSUP Dr. Wahidin Soedirohusodo serta berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Medis

2.1.1 Definisi *Coronary Artery Disease (CAD)*

Coronary Artery Disease (CAD) atau penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang mengacu pada perubahan patologis di dalam dinding arteri koroner (pembuluh darah arteri yang menyuplai darah ke otot jantung dengan membawa O₂ yang banyak) yang mengakibatkan berkurangnya aliran darah yang melalui pembuluh ini (Fikriana, 2018).

Coronary Artery Disease (CAD) adalah penyempitan atau penyumbatan arteri koroner yang menyalurkan darah ke otot jantung. Bila aliran darah melambat, jantung tak mendapat cukup O₂ dan zat nutrisi. Hal ini biasanya mengakibatkan nyeri dada yang disebut angina. Bila satu atau lebih dari arteri koroner tersumbat sama sekali, akibatnya adalah serangan jantung dan kerusakan pada otot jantung (Antara et al., 2019).

Hal ini terjadi karena terbentuk plak akibat dari terkumpulnya kolesterol dalam jangka waktu yang cukup lama. Proses ini disebut aterosklerosis. Kondisi tersebut menyebabkan otot jantung melemah dan menimbulkan komplikasi seperti gagal jantung dan gangguan irama jantung (Suyanti & Rahayu, 2020).

Arteri koroner sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yakni arteri koroner kanan (*Right Coronary Artery/RCA*) dan arteri koroner kiri (*Left Main/LM*). Arteri koroner kiri (LM) memiliki 2 cabang, yaitu arteri desendens anterior kiri

(*Left Anterior Desendens/LAD*) dan arteri sirkumfleksa kiri (*Left Circumflex/LCX*). LAD memperdarahi dinding anterior ventrikel kiri. LCX memperdarahi dinding lateral ventrikel. Sementara RCA memperdarahi ventrikel dan atrium kanan (Hastuti & Mulyani, 2019).

2.1.2 Etiologi *Coronary Artery Disease (CAD)*

Menurut Muthmainnah (2019) faktor risiko PJK dapat menjadi:

a. Faktor yang Tidak Dapat Diubah (*Non-modifiable*)

1) Usia

Pada laki-laki dan perempuan, kadar kolesterol mulai meningkat di usia 20 tahun.

2) Jenis Kelamin

Pada perempuan yang *menopause*, cenderung memiliki risiko lebih cepat terkena PJK dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena hormon estrogen dan endogen pada perempuan yang bersifat protektif membuat risiko tersering penyakit jantung lebih rendah. Laki-laki 2-3x berisiko lebih besar terkena PJK dibanding perempuan.

3) Riwayat Keluarga (Genetik)

Jika ayah terkena serangan jantung pada usia <60 tahun atau ibu terkena <65 tahun, maka keturunannya berisiko lebih besar terkena PJK.

b. Faktor yang Dapat Diubah (*Modifiable*)

1) Hipertensi

Hipertensi yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan

sistem pembuluh darah rusak dengan perlahan-lahan. Hipertensi menjadi penyebab utama PJK. Pada mulanya, terjadi hipertropi dari tunika media, lalu hialinisasi setempat serta penebalan fibrosis dari tunika intima, lalu berakhir dengan terjadinya penyempitan pembuluh darah.

2) Hiperlipidemia

Tingginya kadar kolesterol HDL, sementara kolesterol LDL meningkat sejalan dengan peningkatan risiko koronaria berperan sebagai faktor pelindung terhadap penyakit PJK.

3) Penyakit Diabetes Melitus

DM meningkatkan kadar lemak dalam darah, termasuk kolesterol tinggi. Ini terjadi karena resistensi insulin yang mengontrol penyebaran glukosa melalui aliran darah ke sel-sel di seluruh tubuh. Timbul proses penebalan membran kapiler dan arteri koroneria sehingga terjadi penyempitan aliran darah ke jantung.

4) Merokok

Menurunnya konsumsi O_2 akibat dari efek rokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan membuat platelet menjadi lengket. Akibatnya, terbentuk gumpalan yang menyebabkan beban miokard bertambah.

5) Obesitas

Risiko terkena PJK meningkat jika berat badan tidak ideal.

Kelebihan jumlah lemak pada tubuh >19% dan >21% pada perempuan dikategorikan obesitas. Obesitas dapat meningkatkan kadar kolesterol dan seringkali berbarengan dengan DM dan hipertensi.

6) Stres

Tekanan darah dan Katekolamin dapat meningkat jika seseorang mengalami stres berkepanjangan, sehingga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah arteri.

7) Kurang Aktivitas Fisik/Latihan

Latihan fisik dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesegaran jasmani, menurunkan berat badan sehingga lemak tubuh yang berlebihan berkurang.

2.1.3 Klasifikasi *Coronary Artery Disease (CAD)*

Penyakit jantung koroner menurut Chia et al., (2013) diklasifikasikan menjadi 3, antara lain sebagai berikut:

a. *Silent Ischaemia* (Asimtotik)

Penderita tidak merasakan adanya tanda penyakit.

b. Angina Pectoris

Seseorang merasakan nyeri pada bagian dada daerah sternum, substernal/dada sebelah kiri dan seringkali menjalar ke bagian lengan sebelah kiri, rahang, punggung, leher, bahkan sampai ke lengan kanan. Nyeri ini ditandai dengan adanya rasa tertekan benda berat dan terasa panas. Durasinya sekitar 1-5 menit dan nyeri akan muncul saat melakukan aktivitas dan berkurang dengan istirahat.

Gambaran EKG dan foto rontgen dada memperlihatkan bentuk jantung yang normal saat istirahat. Jika hasil EKG menunjukkan depresi segmen ST, maka perlu dilakukan *exercise test*.

c. Infark Miokard Akut

Disebabkan karena jaringan otot jantung mati dan kekurangan O₂ dalam darah dalam beberapa waktu, ditandai dengan nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke lengan kiri. Nyeri timbul terus-menerus dan berlangsung lama, tidak mudah sembuh dengan hanya beristirahat. Infark miokard akut berdasarkan EKG 12 sadapan dapat diklasifikasikan menjadi STEMI (ST-segmen Elevasi Miokard Infark) dan NSTEMI (Non ST-segmen Elevasi Miokard Infark).

2.1.4 Patofisiologi *Coronary Artery Disease (CAD)*

Menurut Lemone (2015), penyebab utama PJK adalah aterosklerosis. Pada aliran darah, lemak diangkut dengan menempel pada protein yang disebut apoprotein. Hiperlipidemia dapat merusak endotelium arteri dan kelebihan tekanan darah dalam sistem arteri. Rusaknya endotel dapat meningkatkan pelekatan dan agregasi trombosit, juga menarik leukosit ke area tersebut. Akibatnya, LDL (lemak jahat) ada dalam darah. Semakin banyak LDL yang menumpuk, maka akan mengalami proses oksidasi.

Plak dapat mengurangi ukuran lumen pada arteri mengganggu aliran darah, menyebabkan ulkus penyebab terbentuknya thrombus. Thrombus akan terbentuk pada permukaan plak dan penimbunan lipid terus-menerus. Hal tersebut dapat menyumbat pembuluh darah (Lemone, 2015).

Lesi yang kaya lipid biasanya tidak stabil, cenderung robek dan terbuka. Bila fibrosa pembungkus plak pecah, maka debris lipid akan terhanyut dalam aliran darah dan dapat menyumbat arteri, sehingga otot jantung pada area tersebut mengalami gangguan aliran darah dan dapat menimbulkan aliran O₂ ke otot jantung berkurang. Hal itu mengakibatkan sel miokardium menjadi iskemik, sehingga terjadi hipoksia. Akibatnya, proses pada miokardium berpindah ke metabolisme anaerobic yang menghasilkan asam laktat, sehingga merangsang ujung saraf otot merasakan nyeri (Lemone, 2015).

Jaringan menjadi iskemik dan akhirnya infark (mati) karena suplai darah ke area miokardium terganggu. Pada saat sel miokardium mati, sel hancur dan melepaskan beberapa isoenzim jantung ke dalam sirkulasi. Kenaikan kadar kreatinin kinase, serum dan troponin spesifik jantung adalah indikator infark miokardium.

2.1.5 Manifestasi Klinis *Coronary Artery Disease (CAD)*

Gejala-gejala penyakit jantung koroner menurut Soeharto (2015) manifestasi klinik yang biasa terjadi pada kasus *Coronary Artery Disease (CAD)* meliputi:

a. Nyeri dada

Nyeri muncul secara spontan, berlangsung terus-menerus, terletak di bagian bawah sternum dan perut atas, biasa menyebar ke bahu dan lengan, biasanya lengan kiri.

b. Perubahan Pola EKG

Bisa depresi pada segmen ST, normal pada istirahat. Gelombang T-inverted menunjukkan iskemia, gelombang Q menunjukkan nekrosis. Disritmia dan blok jantung disebabkan kondisi yang memengaruhi sensitivitas sel miokard ke impuls saraf seperti iskemia, ketidakseimbangan elektrolit dan stimulus saraf simpatis, dapat berupa takikardi, bradikardi, premature ventrikel, ventrikel fibrilasi.

c. Sesak Napas

Jantung mulai gagal dan tidak mampu memompa darah ke paru-paru, sehingga O_2 di paru-paru berkurang.

d. Diaphoresis

Terjadi pelepasan Katekolamin pada fase awal yang meningkatkan stimulasi simpatis, sehingga terjadi vasokonstriksi pembuluh darah perifer. Akibatnya, kulit lembab, dingin dan berkeringat.

e. Pusing

Suplai O_2 ke otak berkurang karena jantung tidak dapat memompa darah ke otak, sehingga timbullah rasa pusing.

f. Kelelahan

Terjadi karena penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan jantung kekurangan O_2 .

g. Mual dan Muntah

Nyeri yang menjalar dari dada ke area perut, bisa merangsang pusat muntah. Area yang infark, akan merangsang refleks vasofagal, sehingga timbul perasaan mual dan muntah.

2.1.6 Penatalaksanaan Medis *Coronary Artery Disease (CAD)*

Penatalaksanaan pada penyakit jantung koroner menurut Lemone (2015) yang perlu dilakukan, meliputi:

a. Pengobatan Farmakologi

1) Aspirin

Untuk mengurangi risiko agregasi trombosit dan pembentukan thrombus. Biasanya, dosis rendah (80-325 mg/hari).

2) Anti Kolesterol

Statins berperan sebagai anti trombotik, anti inflamasi dan dapat menurunkan risiko komplikasi aterosklerosis.

b. Revaskularisasi Miokardium

Operasi dilakukan untuk memperbaiki aliran darah yang menuju miokardium, mengalihkan aliran dan bagian yang tersumbat dengan suatu cangkok pintas, bernama *Coronary Artery Bypass Graft (CABG)*.

c. Non Farmakologi

1) Pola hidup yang sehat dengan berolahraga ringan.

2) Mengontrol pola makan.

3) Membatasi aktivitas yang memperberat aktivitas jantung.

4) Melakukan teknik distraksi dan relaksasi dengan cara napas dalam.

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang *Coronary Artery Disease (CAD)*

Menurut Black & Hawks (2014) pemeriksaan penunjang pada PJK, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Laboratorium
- b. Elektrokardiogram (EKG)
- c. Foto Rontgen Dada
- d. *Echocardiography*
- e. Katerisasi Jantung
- f. *Angiography*

2.1.8 Komplikasi *Coronary Artery Disease (CAD)*

- a. Gagal Jantung Kongestif
- b. Syok Kardiogenik
- c. Edema Paru (Wicaksono, 2019).

2.1.9 Penyimpangan KDM *Coronary Artery Disease (CAD)*

Terlampir

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan

2.2.1 Pengkajian Keperawatan

Menurut Wijaya (2015) pengkajian adalah langkah awal dari tahapan proses keperawatan, kemudian dalam mengkaji harus memperhatikan data dasar dari pasien, untuk informasi yang diharapkan dari pasien. Data yang akan dikaji pada pasien dengan penyakit jantung koroner adalah sebagai berikut.

- a. Biodata
- b. Keluhan Utama
- c. Riwayat Kesehatan Sekarang

- d. Riwayat Kesehatan Dahulu
- e. Riwayat Kesehatan Keluarga
- f. Riwayat Psiko-Sosio-Spiritual
- g. Pola Fungsional Gordon
- h. Pemeriksaan Fisik
 - 1) Kepala
 - 2) Mata
 - 3) Telinga
 - 4) Hidung
 - 5) Mulut
 - 6) Leher
 - 7) Paru-Paru
 - 8) Jantung
 - 9) Abdomen
 - 10) Pemeriksaan Neurologis

2.2.2 Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan kasus *Coronary Artery Disease (CAD)* menurut Brunner & Suddarth (2014) yang bersumber dari buku Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016) adalah:

a. Pola Napas Tidak Efektif (D.0005)

Definisi : Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat.

Penyebab :

- 1) Depresi pusat pernapasan
- 2) Hambatan upaya napas (mis. nyeri saat bernapas, kelemahan otot pernapasan)
- 3) Deformitas dinding dada
- 4) Deformitas tulang dada
- 5) Gangguan neuromuscular
- 6) Gangguan neurologis (mis elektroensefalogram [EEG] positif, cedera kepala gangguan kejang)
- 7) Imaturitas neurologis
- 8) Penurunan energi
- 9) Obesitas
- 10) Posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru
- 11) Sindrom hipoventilasi
- 12) Kerusakan inervasi diafragma (kerusakan saraf CS ke atas)
- 13) Cedera pada medula spinalis
- 14) Efek agen farmakologis
- 15) Ansietas

Tabel 1 Batasan Karakteristik Pola Napas Tidak Efektif

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
Dispnea	Penggunaan otot bantu pernapasan Fase ekspirasi memanjang Pola napas abnormal (mis. Takipnea, Bradipnea, Hiperventilasi Kussmaul Cheynestokes)
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif

Ortopnea	Pernapasan pursed-lip Pernapasan cuping hidung Diameter thoraks anterior-posterior meningkat Ventilasi semenit menurun Kapasitas vital menurun Tekanan ekspirasi menurun Tekanan inspirasi menurun Ekskursi dada berubah
----------	---

Sumber: Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016)

b. Nyeri Akut (D.0077)

Definisi : Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.

Penyebab :

- 1) Agen pencedera fisiologis (mis. infarmasi, lakemia, neoplasma)
- 2) Agen pencedera kimiawi (mis. terbakar, bahan kimia iritan)
- 3) Agen pencedera fisik (mis. abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan)

Tabel 2 Batasan Karakteristik Nyeri Akut

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
Mengeluh nyeri	Tampak meringis Bersikap protektif (mis. waspada, posisi menghindari nyeri) Gelisah Frekuensi nadi meningkat Sulit tidur
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
(tidak tersedia)	Tekanan darah meningkat Pola napas berubah

	Nafsu makan berubah Proes berfikir terganggu Menarik diri Berfokus pada diri sendiri diaforesis
--	---

Sumber: Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016)

c. Perfusi Perifer Tidak Efektif (D.0009)

Definisi : Penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh.

Penyebab :

- 1) Hiperglikemia
- 2) Penurunan konsentrasi hemoglobin
- 3) Peningkatan tekanan darah
- 4) Kekurangan volume cairan
- 5) Penurunan aliran arteri dan/atau vena
- 6) Kurang terpapar informasi tentang faktor pemberat (mis. merokok, gaya hidup monoton, trauma, obesitas, asupan garam, imobilitas)
- 7) Kurang terpapar informasi tentang proses penyakit (mis. diabetes melittus, hiperlipidemia)
- 8) Kurang aktivitas fisik

Tabel 3 Batasan Karakteristik Perfusi Perifer Tidak Efektif

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
(tidak tersedia)	Pengisian kapiler >3 detik Nadi perifer menurun atau tidak teraba Akral teraba dingin Warga kulit pucat Turgor kulit menurun
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif

Parastesia Nyeri ekstremitas (klaudikasi intermiten)	Edema Penyembuhan luka lambat Indeks ankle-brachial < 0,90 Bruit femoral
--	---

Sumber: Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016)

d. Penurunan Curah Jantung (D.0008)

Defenisi : Ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh.

Penyebab :

- 1) Perubahan irama jantung
- 2) Perubahan frekuensi jantung
- 3) Perubahan kontraktilitas
- 4) Perubahan *preload*
- 5) Perubahan *afterload*

Tabel 4 Batasan Karakteristik Penurunan Curah Jantung

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
1. Perubahan irama jantung a. Palpitasi 2. Perubahan <i>preload</i> a. Lelah 3. Perubahan <i>afterload</i> a. Dispnea 4. Perubahan kontraktilitas a. <i>Paroxymal Nocturnal Dyspnea</i> (PND) b. Ortopnea c. Batuk	1. Perubahan irama jantung a. Brakikardia/takikardia b. Gambaran EKG aritmia atau gangguan konduksi 2. Perubahan <i>preload</i> a. Edema b. Distensi vena jugularis c. <i>Central Venous Pressure</i> (CVP) meningkat/menurun d. Hepatomegali 3. Perubahan <i>afterload</i> a. Tekanan darah meningkat/menurun b. Nadi perifer teraba lemah c. <i>Capillary Refill Time</i> >3 detik d. Oliguria e. Warna kulit pucat dan/atau sianosis

	4. Perubahan kontraktilitas a. Terdengar suara jantung S3 dan/atau S4 b. <i>Ejection Traction</i> (EF)
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
1. Perubahan <i>preload</i> (tidak tersedia) 2. Perubahan <i>afterload</i> (tidak tersedia) 3. Perubahan kontraktilitas (tidak tersedia) 4. Perilaku/emosional a. Cemas b. Gelisah	1. Perubahan <i>preload</i> a. Murmur jantung b. Berat badan bertambah c. <i>Pulmonary Artery Wedge Pressure</i> (PAWP) menurun 2. Perubahan <i>afterload</i> a. <i>Pulmonary Vascular Resistance</i> (PVR) meningkat/menurun b. <i>Systemic Vascular Resistance</i> (SVR) meningkat/menurun 3. Perubahan kontraktilitas a. <i>Cardiac Index</i> (CI) menurun b. <i>Left Ventricular Stroke Work Index</i> (LVSWI) menurun c. <i>Stroke Volume Index</i> (SVI) menurun 4. Perilaku/emosional (tidak tersedia)

Sumber: Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016)

e. Hipervolemia (D.0022)

Definisi : Peningkatan volume cairan intravaskuler, interstisial, dan/atau intraseluler.

Penyebab :

- 1) Gangguan mekanisme regulasi
- 2) Kelebihan asupan cairan
- 3) Kelebihan asupan natrium
- 4) Gangguan aliran balik vena
- 5) Efek agen farmakologis (mis.kortikolesteroid, chlorpropamide, tolbutamide, vincristine, tryptilinescarbamazepine)

Tabel 5 Batasan Karakteristik Hipervolemia

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
Ortopnea Dispnea <i>Paraxysmal Nocturnal Dyspnea (PND)</i>	Edema anasarca/edema perifer Berat badan meningkat dalam waktu singkat <i>Jugular Venous Pressure (JVP)</i> dan/atau <i>Central Venous Pressure (CVP)</i> meningkat Refleks hepatojugular positif
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
(tidak tersedia)	Distensi vena jugularis Terdengar suara napas tambahan Hepatomegali Kadar Hb/Ht menurun Oliguria Intake lebih banyak dari output Kongesti paru

Sumber: Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016)

f. Intoleransi Aktivitas (D.0056)

Definisi : Ketidacukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Penyebab :

- 1) Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O₂
- 2) Tirah baring
- 3) Kelemahan
- 4) Imobilitas
- 5) Gaya hidup monoton

Tabel 6 Batasan Karakteristik Intoleransi Aktivitas

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
Mengeluh lelah	Frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat

Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
Dispnea saat/setelah aktivitas	Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat
Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas	Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/setelah aktivitas
Merasa lelah	Gambaran EKG menunjukkan iskemia
	Sianosis

Sumber: Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016)

g. Ansietas (D.0080)

Definisi : Kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi yang memungkinkan melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman.

Penyebab :

- 1) Krisis situasional
- 2) Kebutuhan tidak terpenuhi
- 3) Krisis maturasional
- 4) Ancaman terhadap konsep diri
- 5) Ancaman terhadap kematian
- 6) Kekhawatiran mengalami kegagalan
- 7) Disfungsi sistem keluarga
- 8) Hubungan orang tua—anak tidak memuaskan
- 9) Faktor keturunan (temperamen mudah teragitasi sejak lahir)
- 10) Penyalahgunaan zat
- 11) Terpapar bahaya lingkungan (mis. toksin, polutan dan lain-lain)
- 12) Kurang terpapar informasi

Tabel 7 Batasan Karakteristik Ansietas

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
Merasa bingung Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi Sulit berkonsentrasi	Tampak gelisah Tampak tegang Sulit tidur
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
Mengeluh pusing Anoreksia Palpitasi Merasa tidak berdaya	Frekuensi napas meningkat Frekuensi nadi meningkat Tekanan darah meningkat Diaforesis Tremor Muka tampak pucat Suara bergetar Kontak mata buruk Sering berkemih Berorientasi pada masa lalu

Sumber: Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016)

2.2.3 Intervensi Keperawatan

Menurut Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018) intervensi keperawatan adalah segala *treatment* yang dikerjakan perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran (*outcome*) atau kriteria hasil yang disusun Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) sesuai harapan.

a. Pola Napas Tidak Efektif

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan pola napas membaik dengan **Kriteria Hasil:**

- 1) Dispnea menurun
- 2) Penggunaan otot bantu napas menurun
- 3) Pemanjangan fase ekspirasi menurun
- 4) Frekuensi napas membaik
- 5) Kedalaman napas membaik

Tabel 8 Intervensi Keperawatan Pola Napas Tidak Efektif

Intervensi Keperawatan	Rasional
<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>• Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) - Monitor bunyi napas tambahan (mis. Gurgling, mengi, ronkhi kering) - Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan bunyi napas dapat menunjukkan atelectasis, ronkhi mengi menunjukkan akumulasi secret, ketidakmampuan membersihkan jalan napas menimbulkan penggunaan otot bantu dan peningkatan kerja napas - Mengetahui ada tidaknya suara napas tambahan yang menghalangi jalan napas - Untuk mengetahui seberapa parah kondisi pasien
<p>• Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertahankan kepatenan jalan napas dengan <i>head-tilt</i> dan <i>chin-lift</i> (<i>jaw-thrust</i> jika curiga trauma cervical) - Posisikan semi-Fowler atau Fowler - Berikan minum hangat - Lakukan fisioterapi dada, jika perlu - Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik - Lakukan hiperplasi sebelum penghisapan endotrakeal - Keluarkan sumbatan benda padat dengan forseps McGill - Berikan O₂, jika perlu 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mempertahankan dan memelihara kepatenan jalan napas - Untuk memudahkan pasien bernapas - Untuk mengencerkan secret dan memudahkan bernapas - Membantu membersihkan dan mengeluarkan secret, melonggarkan jalan napas - Mengurangi sesak, melonggarkan jalan napas dan mengencerkan secret - Menghindari hipoksemi akibat suction - Membebaskan sumbatan dari benda padat - Untuk mencegah kegagalan napas
<p>• Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, jika tidak kontraindikasi - Ajarkan teknik batuk efektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengganti cairan tubuh - Batuk efektif dapat mengeluarkan dahak

<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi - Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian obat bronkodilator untuk melebarkan jalan napas, ekspektoran obat untuk merangsang pengeluaran sputum, mukolitik membuat hancur formasi sputum atau tidak lagi bersifat kental
---	--

Sumber: Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018)

b. Nyeri Akut

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam,

diharapkan tingkat nyeri menurun dengan **Kriteria Hasil :**

- 1) Keluhan nyeri menurun
- 2) Meringis menurun
- 3) Sikap protektif menurun
- 4) Gelisah menurun
- 5) Frekuensi nadi membaik
- 6) Kesulitan tidur menurun
- 7) Tekanan darah membaik
- 8) Pola napas membaik
- 9) Nafsu makan membaik
- 10) Proses berfikir membaik
- 11) Menarik diri menurun
- 12) Berfokus pada diri sendiri menurun
- 13) Diaforesis menurun

Tabel 9 Intervensi Keperawatan Nyeri Akut

Intervensi Keperawatan	Rasional
Terapi Relaksasi <ul style="list-style-type: none"> • Observasi 	

<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif - Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan - Monitor respon terhadap terapi relaksasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika klien mengalami penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu, maka klien akan sulit melakukan teknik relaksasi tersebut - Untuk mengetahui apakah ada perubahan yang baik pada otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan - Untuk membandingkan perasaan sebelum dan setelah terapi
<ul style="list-style-type: none"> • Terapeutik - Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman - Gunakan pakaian longgar - Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memberikan perasaan yang tenang dan nyaman pada saat klien sedang latihan terapi relaksasi - Agar klien lebih mudah bergerak - Untuk memberikan perasaan tenang pada klien
<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi - Jelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi - Jelaskan secara rinci intervensi yang dipilih - Anjurkan mengambil posisi nyaman - Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi - Anjurkan sering mengulangi atau melatih tehnik yang dipilih - Demonstrasikan dan latih tehnik relaksasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memberikan informasi terkait tindakan jenis relaksasi - Agar klien memahami terkait intervensi yang akan dilakukan - Memberikan rasa nyaman pada saat diberikan intervensi - Sebagai penunjang agar bisa merasakan ketenangan - Untuk membuat pasien mudah mengingat dan menerapkan intervensi yang diberikan - Untuk memudahkan klien melakukan intervensi

Sumber: Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018)

c. Perfusi Perifer Tidak Efektif

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam,

diharapkan perfusi meningkat dengan **Kriteria Hasil** :

- 1) Denyut nadi perifer meningkat
- 2) Penyembuhan luka meningkat
- 3) Sensasi meningkat
- 4) Warna kulit pucat menurun
- 5) Edema menurun
- 6) Nyeri ekstremitas menurun
- 7) Parastesia menurun
- 8) Kelemahan otot menurun
- 9) Kram otot menurun
- 10) Bruit femoralis menurun
- 11) Nekrosis menurun
- 12) Pengisian kapiler membaik
- 13) Akral membaik
- 14) Turgor kulit membaik
- 15) Tekanan darah sistolik membaik
- 16) Tekanan darah diastolik membaik
- 17) Tekanan arteri rata-rata meembaik
- 18) Indeks ankle-bracial membaik

Tabel 10 Intervensi Keperawatan Perfusi Perifer Tidak Efektif

Intervensi Keperawatan	Rasional
Perawatan Sirkulasi • Observasi - Periksa sirkulasi perifer (mis. nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu, anklebrachialindex)	- Untuk mengetahui sirkulasi perifer

<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis. Diabetes Melitus Tipe II, perokok, orang tua, hipertensi dan kadar kolesterol tinggi) - Monitor panas, kemerahan, nyeri/ kesemutan, atau bengkak pada ekstremitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui faktor risiko gangguan sirkulasi - Untuk memantau tanda-tanda gangguan sirkulasi perifer
<p>• Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi - Hindari penekanan dan pemasangan <i>tourniquet</i> pada area yang cedera - Lakukan perawatan kaki dan kuku 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk menghindari masalah baru yang dapat muncul - Untuk menghindari sirkulasi menjadi tidak lancar - Mempertahankan kebersihan pasien
<p>• Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan berhenti merokok - Anjurkan olahraga rutin - Anjurkan mengecek air mandi untuk menghindari kulit terbakar - Anjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat (mis. melembabkan kulit kering pada kaki) - Informasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan (mis. rasa sakit yang tidak hilang saat istirahat, luka tidak sembuh, hilangnya rasa) 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memberikan pemahaman agar pasien berhenti merokok - Untuk memberikan pemahaman agar pasien melakukan aktivitas fisik - Untuk menghindari peningkatan kulit terbakar - Untuk mempertahankan kebersihan pasien - Pencegahan terhadap komplikasi

Sumber: Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018)

d. Penurunan Curah Jantung

Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam

diharapkan curah jantung meningkat dengan **Kriteria Hasil :**

- 1) Kekuatan nadi perifer meningkat
- 2) *Cardiac index* (CI) meningkat

- 3) *Left Ventricular Stroke Work Index (LVSWI)* meningkat
- 4) Bradikardi menurun
- 5) Takikardi menurun
- 6) Gambaran EKG aritmia menurun
- 7) Lelah menurun
- 8) Edema menurun
- 9) Dyspnea menurun
- 10) Pucat/sianosis menurun
- 11) *Paroximal Nocturnal Dyspnea (PND)* menurun
- 12) Suara jantung S3 menurun
- 13) Suara jantung S4 menurun
- 14) Murmur menurun
- 15) *Pulmonary Vascular Resistance (PVR)* menurun
- 16) *Systemic Vascular Resistance* menurun
- 17) Tekanan darah membaik
- 18) CRT membaik
- 19) *Pulmonary artery wedge pressure (PAWP)* membaik
- 20) *Central venous pressure* membaik

Tabel 11 Intervensi Keperawatan Penurunan Curah Jantung

Intervensi Keperawatan	Rasional
Pemantauan Tanda Vital • Observasi - Monitor tekanan darah - Monitor nadi (frekuensi, kekuatan, irama) - Monitor pernapasan	- Untuk mengetahui tekanan sistolik dan diastolik pasien - Untuk mengetahui frekuensi nadi, kekuatan nadi dan irama nadi - Untuk mengetahui frekuensi

(frekuensi, kedalaman) - Monitor suhu tubuh - Identifikasi penyebab perubahan tanda vital	pernapasan dan kedalaman pernapasan - Untuk mengetahui suhu tubuh - Untuk mengetahui penyebab perubahan yang terjadi dan memonitor perkembangan pasien
• Terapeutik - Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien - Dokumentasi hasil pemantauan	- Mengetahui keadaan pasien - Sebagai sarana melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan
• Edukasi - Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan - Informasikan hasil pemantauan, jika perlu	- Memberikan pemahaman mengenai manfaat tindakan yang dilakukan - Untuk menginformasikan hasil tindakan yang telah dilakukan

Sumber: Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018)

e. Hipervolemia

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3 x 24 jam, diharapkan keseimbangan cairan meningkat dengan **Kriteria Hasil :**

- 1) Asupan cairan meningkat
- 2) Haluaran urin meningkat
- 3) Kelembapan membran mukosa meningkat
- 4) Asupan makanan meningkat
- 5) Edema menurun
- 6) Dehidrasi menurun
- 7) Asites menurun
- 8) Tekanan darah membaik
- 9) Denyut nadi radial membaik
- 10) Tekanan arteri rata-rata membaik

- 11) Membran mukosa membaik
- 12) Mata cekung membaik
- 13) Turgor kulit membaik
- 14) Berat badan membaik

Tabel 12 Intervensi Keperawatan Hipervolemia

Intervensi Keperawatan	Rasional
Manajemen Hipervolemia • Observasi - Periksa tanda dan gejala hipervolemia (mis. ortopnea, dispnea, edema JVP/CVP meningkat, refleks hepatojugular positif, suara napas tambahan) - Identifikasi penyebab hipervolemia - Monitor intake dan output cairan	- Mengetahui tanda dan gejala hipervolemia - Mengetahui penyebab hipervolemia - Mengetahui intake dan output cairan
• Terapeutik - Timbang BB setiap hari pada waktu yang sama - Batasi asupan cairan & garam	- Mengetahui peningkatan BB - Membatasi cairan dalam tubuh
• Edukasi - Ajarkan cara mengukur, mencatat asupan dan haluaran cairan - Ajarkan cara membatasi cairan	- Mengetahui asupan dan haluaran cairan - Agar pasien mengerti cara membatasi cairannya
• Kolaborasi - Kolaborasi pemberian diuretik	- Untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin

Sumber: Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018)

f. Intoleransi Aktivitas

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan **Kriteria Hasil:**

- 1) Frekuensi nadi menurun

- 2) Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat
- 3) Kecepatan berjalan meningkat
- 4) Jarak berjalan meningkat
- 5) Kekuatan tubuh bagian atas meningkat
- 6) Kekuatan tubuh bagian bawah meningkat
- 7) Keluhan lelah menurun
- 8) Dispnea saat aktivitas menurun
- 9) Dispnea setelah aktivitas menurun
- 10) Perasaan lemah menurun
- 11) Aritmia saat aktivitas menurun
- 12) Aritmia setelah aktivitas menurun
- 13) Sianosis menurun
- 14) Tekanan darah membaik
- 15) Frekuensi napas membaik

Tabel 13 Intervensi Keperawatan Intoleransi Aktivitas

Intervensi Keperawatan	Rasional
Manajemen Energi • Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan - Monitor kelelahan fisik dan emosional - Monitor pola dan jam tidur - Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk dapat memecahkan masalah terkait kelelahan - Untuk mengetahui kelelahan fisik dan emosional pasien - Untuk mengetahui pola tidur pasien - Untuk mengetahui lokasi dan ketidaknyamanan pasien dalam melakukan aktivitas
• Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Sediakan lingkungan nyaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memfasilitasi

<p>dan rendah stimulus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan latihan rentang gerak pasif dan atau/aktif - Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan - Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah/berjalan 	<p>lingkungan yang mendukung dalam proses pengimplementasian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar gerakan tubuh tidak kaku - Untuk pengalihan yang dapat menenangkan pasien - Agar dapat mempermudah proses mobilisasi pasien
<p>• Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan tirah baring - Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memberikan posisi yang nyaman pada pasien - Agar energi dapat distimulus dengan baik
<p>• Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Agar nutrisi yang dikonsumsi pasien sesuai dengan SOP yang ada

Sumber: Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018)

g. **Ansietas**

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan **Kriteria Hasil:**

- 1) Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun
- 2) Perilaku gelisah menurun
- 3) Perilaku tegang menurun
- 4) Pola tidur membaik
- 5) Frekuensi pernapasan membaik
- 6) Frekuensi nadi membaik
- 7) Tekanan darah membaik
- 8) Kontak mata membaik

Tabel 14 Intervensi Keperawatan Ansietas

Intervensi Keperawatan	Rasional
<p>Terapi Relaksasi</p> <p>• Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif - Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan - Monitor respon terhadap terapi relaksasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika klien mengalami penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu, maka klien akan sulit melakukan teknik relaksasi tersebut - Untuk mengetahui apakah ada perubahan yang baik pada otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan - Untuk membandingkan perasaan sebelum dan setelah terapi
<p>• Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman - Gunakan pakaian longgar - Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memberikan perasaan yang tenang dan nyaman pada saat klien sedang latihan terapi relaksasi - Agar klien lebih mudah bergerak - Untuk memberikan perasaan tenang pada klien
<p>• Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi - Jelaskan secara rinci intervensi yang dipilih - Anjurkan mengambil posisi nyaman - Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi - Anjurkan sering mengulangi atau melatih tehnik yang dipilih 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memberikan informasi terkait tindakan jenis relaksasi - Agar klien memahami terkait intervensi yang akan dilakukan - Untuk memberikan rasa nyaman pada saat diberikan intervensi - Sebagai penunjang agar bisa merasakan ketenangan - Untuk membuat pasien mudah mengingat dan menerapkan intervensi yang

- Demonstrasikan dan latih teknik relaksasi	diberikan - Untuk memudahkan klien melakukan intervensi
---	--

Sumber: Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018)

2.2.4 Implementasi Keperawatan

Brunner & Suddarth (2014) menyebutkan bahwa pelaksanaan atau implementasi dalam keperawatan terdiri dari:

a. Validasi Rencana Keperawatan

Tujuan validasi data adalah menekan serendah mungkin terjadinya kesalahpahaman atau salah persepsi. Karena adanya potensi manusia berbuat salah dalam proses penilaian.

b. Dokumentasi Rencana Keperawatan

Agar rencana perawatan dapat berarti bagi semua pihak, maka harus mempunyai landasan kuat dan bermanfaat secara optimal. Perawat hendaknya mengadakan pertemuan dengan tim kesehatan lain untuk membahas data, masalah, tujuan serta rencana tindakan.

c. Tindakan Keperawatan

Meskipun perawat sudah mengembangkan suatu rencana keperawatan yang maksimal, kadang timbul situasi yang bertentangan dengan tindakan yang direncanakan, maka kemampuan perawat diuji untuk memodifikasi alat maupun situasi.

2.2.5 Evaluasi Keperawatan

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dengan melibatkan klien, perawat dan anggota tim kesehatan lainnya. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan kesehatan dan strategi evaluasi. Tujuan dari evaluasi adalah menilai apakah tujuan dari rencana keperawatan tercapai atau tidak (Brunner & Suddarth, 2014).

Evaluasi terdiri atas evaluasi struktur, proses dan hasil. Evaluasi struktur berisi tentang faktor lingkungan, kesediaan perlengkapan, fasilitas fisik, rasio perawat-klien, administrasi serta kompetensi perawat dalam area yang diinginkan. Evaluasi proses berfokus pada jenis informasi yang didapat

pada saat wawancara dan pemeriksaan fisik, validasi dari perumusan diagnosis keperawatan, dan kemampuan tehnikal perawat. Evaluasi hasil berfokus pada respons dan fungsi klien. Respons perilaku klien merupakan pengaruh dari intervensi keperawatan dan akan terlihat pada pencapaian tujuan dan kriteria hasil. Evaluasi hasil terdiri atas evaluasi subjektif, objektif, analisis dan *planning* (SOAP).

Evaluasi berdasarkan SOAP dimana perawat menilai hasil yang telah dicapai. Evaluasi bermanfaat untuk menentukan kemajuan status kesehatan klien, mengevaluasi eektivitas askep dan menentukan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Pada tahap ini perawat menetapkan apakah rencana diteruskan, dimodifikasi atau diakhiri (Lemone, 2015).

2.3 Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan

2.3.1 Konsep Teori Kenyamanan Kolcaba


Kolcaba dalam pendapatnya berasumsi bahwa kenyamanan adalah kebutuhan dasar tiap individu yang bersifat holistik. Bukan hanya tentang kenyamanan fisik, namun juga kenyamanan psikospiritual, sosiokultural dan lingkungan. Kenyamanan fisik berkaitan dengan mekanisme sensasi tubuh dan homeostasis, yakni meliputi penurunan kemampuan tubuh dalam merespon suatu penyakit ataupun prosedur invasif. Beberapa upaya dalam memenuhi kebutuhan fisik meliputi pemberian obat, perubahan posisi, pemberian kompres hangat atau dingin dan sentuhan terapeutik (Alligood, 2017).

Kenyamanan psikospiritual berhubungan dengan ketenangan jiwa dan keharmonisan hati. Beberapa upaya dalam pemenuhan kenyamanan psikospiritual yakni dengan memfasilitasi kebutuhan sosialisasi dan interaksi klien dengan orang-orang terdekat selama perawatan dan melibatkan keluarga secara aktif dalam proses pemulihan (Kolcaba & DiMarco, 2005).

Menciptakan hubungan terapeutik, menghargai hak-hak tanpa memandang status sosial dan budaya, mendorong klien untuk mengekspresikan perasaannya, serta memfasilitasi kerja tim untuk mengatasi kemungkinan adanya konflik antara proses penyembuhan dengan budaya klien merupakan cara memenuhi kebutuhan sosiokultural (Kolcaba & DiMarco, 2005).

Kebutuhan kenyamanan lingkungan berkaitan dengan kerapian dan kebersihan lingkungan, lingkungan yang aman bagi klien, membatasi pengunjung dan terapi saat klien beristirahat (Kolcaba & DiMarco, 2005).

Menurut Kolcaba & DiMarco (2005) hal tersebut dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Kerja Konseptual pada Teori Kenyamanan

Dari kerangka diatas dapat dilihat bahwa konsep teori kenyamanan meliputi kebutuhan kenyamanan, variabel kenyamanan, intervensi kenyamanan, perilaku pencari kesehatan, peningkatan kenyamanan dan integritas institusional.

Teori kenyamanan Kolcaba terdiri atas 3 fase, yaitu *relief*, *ease* dan *transcendence*. *Relief* yaitu kondisi resipien yang membutuhkan penanganan spesifik dan segera. *Ease* merupakan kondisi tenang atau kepuasan hati dari klien yang terjadi karena hilangnya ketidaknyamanan fisik yang dirasakan pada semua kebutuhan. *Transcendence* adalah keadaan mampu mengatasi masalah dari ketidaknyamanan yang terjadi (Kolcaba & DiMarco, 2005).

Pengaplikasian sebuah teori ke lahan praktik bukan hanya perlu bersifat sederhana, namun juga harus sesuai dengan visi misi suatu institusi dan mudah dipahami sebagai panduan praktik (Alligood & Tomey, 2014).

2.3.2 Konsep Teori Ansietas

a. Definisi

Ansietas merupakan kondisi emosi dengan adanya pengalaman yang samar-samar, rasa tidak nyaman dan tidak berdaya serta tidak menentu pada diri seseorang yang penyebabnya belum jelas. Kecemasan merupakan perasaan khawatir, tidak nyaman, perasaan samar namun penyebabnya tidak diketahui oleh individu; rasa takut yang diakibatkan oleh antisipasi terhadap bahaya, individu mempunyai isyarat terhadap adanya bahaya atau ancaman sehingga individu mampu bertindak untuk mengatasi ancaman (Sukandar & Mustikasari, 2021).

Kesehatan mental yang positif merupakan faktor kunci dalam mempertahankan status kesehatan yang baik. Kesehatan mental menggambarkan tingkat kesejahteraan kognitif dan emosional serta tidak adanya gangguan mental (Suryanto et al., 2021).

Cemas merupakan rasa khawatir yang tidak jelas dan menyebar, ini berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya (Sukandar & Mustikasari, 2021). Kecemasan ditandai dengan kondisi detak jantung cepat, berkeringat dan seringkali sesak napas (Habibah et al., 2021). Ansietas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan psikosomatis pada klien sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman. Selain itu, cemas juga diartikan sebagai perasaan berlebihan tentang sesuatu yang tidak jelas dan dianggap sebagai ancaman (Mawarti & Yuliana, 2021).

Rasa ketakutan dan kekhawatiran terhadap apa yang dialami, dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa, kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit takut, kata Al-Qur'an. Setiap individu akan ragu menghadapi kesulitan hidup akibat hal ini. Setiap individu pasti melalui kesulitan dan cobaan, sebagaimana Allah Swt nyatakan dalam salah satu surah Al-Qur'an:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ۝

Terjemahnya:

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang – orang yang sabar” (Q.S. Al-Baqarah: 155).

Menurut Muliantino et al. (2021) ansietas (*anxiety*) adalah ketidakmampuan menghadapi kenyataan di sekitarnya, pengalaman merasa terganggu, belum dewasa dan tidak berdaya. Hal ini sejalan dengan penegasan Muharyani et al. (2015) bahwa kecemasan itu adalah

jenis emosi yang tidak jelas dan memperhatikan hal-hal tertentu tanpa sebab yang spesifik untuk objek dan tidak memiliki objek tertentu.

Maka dari itu, ansietas merupakan hal yang fitrah sehingga setiap individu pasti akan mengalaminya, saat seseorang mengalami gejala yang berupa takut, gelisah, serta khawatir, maka perlu meningkatkan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Swt dengan mendirikan shalat dan berdoa, dan berdzikir kepada Allah Swt, sehingga dapat mengurangi dan menanggulangi rasa cemas. Seperti makna yang pada Q.S Ar-Ra'd: 28 yang berbunyi:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram” (Q.S. Ar- Ra'd: 28).

b. Aspek-Aspek Ansietas

Stuart (2016) mengemukakan bahwa, aspek-aspek pada ansietas (*anxiety*) dengan respon aspek kognitif, aspek afektif dan aspek perilaku, yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kognitif meliputi konsentrasi yang buruk, kurangnya perhatian, pelupa, kebingungan, kewaspadaan tinggi, takut kehilangan kendali, mimpi buruk, kreativitas dan produktivitas menurun.
- 2) Afektif meliputi ketidaksabaran, kegelisahan, ketidaknyamanan, kewaspadaan, ketakutan, mati rasa dan rasa bersalah.

- 3) Perilaku meliputi gelisah, menarik diri dari hubungan interpersonal, melarikan diri dari masalah dan menghindar.

c. Gejala Ansietas

Menurut Vye dalam Purnamarini et al. (2016), tiga komponen gejala ansietas yang dapat dikenali adalah:

- 1) Komponen kognitif: Melihat keadaan berfikir yang dapat memungkinkan adanya hal buruk yang mengintainya sehingga, timbulnya perasaan ragu, kekhawatiran, serta ketakutan yang berlebihan. Dengan menganggap situasi sebagai ancaman yang sulit dan tidak mampu mengatasinya.
- 2) Komponen fisik: Sensasi fisiologis, serta gejala perasaan seperti sesak napas, detak jantung meningkat, sakit perut, dan otot cepat, dapat langsung dialami dengan gejala fisik. Sensasi yang dialami individu merupakan keadaan respons alami yang muncul dalam tubuhnya ketika ia merasakan ancaman atau keadaan yang berisiko.
- 3) Komponen perilaku: Komponen yang terjadi pada perilaku adanya tindakan seseorang berupa *over controlling*.

d. Ciri-Ciri Ansietas

Menurut Jeffrey S. Nevid dalam Annisa & Ifdil (2016), mengungkapkan bahwa ansietas mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu:

- 1) Ciri Fisik dari ansietas, termasuk gelisah, gugup, merasa gemetar dengan anggota badan lainnya, sensasi pita mengikat di sekitar

dahi, banyak tekanan, atau pingsan, kesulitan berbicara, kesulitan bernapas, jari atau anggota badan kesemutan, kedinginan dan sebagainya.

- 2) Ciri Behavioral dari ansietas, meliputi perilaku menghindar, kemelekatan, dan ketergantungan, serta perilaku terganggu.
- 3) Ciri Kognitif dari ansietas, yaitu termasuk mengkhawatirkan sesuatu, khawatir tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, percaya bahwa sesuatu akan terjadi tanpa penjelasan, dan sebagainya. ansietas karena tidak mampu mengatasi, merasa terancam oleh orang atau peristiwa yang biasanya mendapat sedikit atau tanpa perhatian.

e. Jenis Ansietas

Menurut Spielberger dalam Annisa & Ifdil (2016) menjelaskan ansietas dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) *Trait Anxiety*, setiap orang menderita ansietas dengan intensitas tersendiri. Sifat ansietas adalah reaksi terhadap situasi yang meningkatkan tingkat ansietas. Individu dengan kualitas ansietas kuat akan memiliki skor lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memiliki ansietas rendah.
- 2) *State Anxiety*, setiap keadaan emosional dalam menanggapi suatu pengalaman adalah unik. Respons individu terhadap situasi yang dengan sengaja menimbulkan efek subjektif dari cemas dan kekhawatiran disebut sebagai *state anxiety*.

f. Bentuk Ansietas

Menurut Freud dalam Annisa & Ifdil (2016) mengemukakan bahwa ansietas mempunyai tiga bentuk yaitu:

- 1) Ansietas Neurosis, ialah ansietas yang dipengaruhi oleh ansietas yang berkembang sebagai akibat dari pertemuan dengan objek berbahaya, yang menghasilkan gambar yang membuatnya merasa terancam.
- 2) Ansietas Moral, disebabkan oleh ketidaksepakatan antara ego dan superego. Ansietas moral terjadi ketika seseorang merasa bersalah, seperti ketika dia melanggar norma moral atau tidak bertindak sesuai dengan prinsip moral yang berlaku, menyebabkan superego menghukumnya. Kecemasan ini dapat muncul karena kegagalan bersikap konsisten dengan apa yang mereka yakini benar secara moral. Kecemasan moral merupakan rasa takut terhadap suara hati. Kecemasan moral juga memiliki dasar dalam realitas, di masa lampau sang pribadi pernah mendapat hukuman karena melanggar norma moral dan dapat dihukum kembali.
- 3) Ansietas Realistik, merupakan ansietas ini disebut sebagai ansietas objektif, dan merupakan reaksi ego terhadap situasi yang menakutkan. Ketakutan akan bahaya nyata dari dunia luar dikenal sebagai ansietas realistik.

g. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ansietas

Menurut Blackburn & Davidson dalam Annisa & Ifdil (2016) mengungkapkan bahwa ada berbagai hal yang dapat memengaruhi ansietas, salah satunya adalah pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki ketika dihadapkan pada keadaan yang berpotensi berbahaya, sehingga memungkinkan orang untuk mengendalikan ansietasnya. Selain itu, ada dua alasan yang dapat menimbulkan ansietas:

1) Penyebab mendasar dari ansietas adalah peristiwa negatif di masa lalu, dimana pengalaman tersebut merupakan rasa trauma yang pernah terjadi sebelumnya. Ketika seorang individu menghadapi kejadian yang sama, ia akan memiliki rasa datang, yang akan mengubah masa depan yang akan terjadi dalam peristiwa tersebut. Misalnya, jika seorang individu telah gagal baik dalam menghadapi ujian maupun sebagai akibat dari ujian tersebut, ia akan mengalami ansietas.

2) Pikiran yang tidak rasional terbagi dalam empat bentuk, yaitu:

a) Kegagalan katastrofik, bahwa hal buruk individu yang terjadi buruk yang akan segera menimpa dirinya akan segera menimpa dirinya, sehingga individu tersebut tidak mampu mengatasi masalahnya.

b) Kesempurnaan dalam diri seseorang mengharuskan dia mencapai hal-hal tertentu atau hidup dengan standar tertentu,

oleh karena itu terus-menerus menuntut kesempurnaan dan tidak memiliki kesalahan dalam perilaku.

c) Persetujuan

d) Generalisasi yang tidak tepat adalah generalisasi yang berlebihan yang dapat berkembang pada mereka yang kurang pengalaman, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari berbagai sumber.

Iyus dalam Purnamarini et al. (2016) menambahkan bahwa ada berbagai faktor yang penyebab terhadap ansietas seseorang, antara lain:

- 1) Usia dan tahap perkembangan, serta adanya variabel usia dan tahap perkembangan individu, memainkan peran penting dalam setiap individu; setiap tahap dan tahap perkembangan adalah unik, dan faktor-faktor ini dapat memengaruhi ansietas pada individu.
- 2) Kondisi lingkungan tempat manusia hidup. Variabel lingkungan, baik internal maupun eksternal, merupakan salah satu aspek yang memengaruhi seseorang. Faktor risiko ansietas individu dapat dikurangi dengan menciptakan lingkungan yang bahagia dan tenang.
- 3) Informasi dan pengalaman individu, bersama dengan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri, dapat menyebabkan masalah psikologis diselesaikan dalam bentuk kekhawatiran.
- 4) Fungsi keluarga, keluarga memainkan peran kunci dalam ansietas individu, keuntungan yang diberikan kepada anak-anak yang

menuntut untuk sukses, dan ketika mereka tidak memperoleh pekerjaan, individu menjadi depresi, sehingga sulit bagi mereka untuk mencari pekerjaan.

h. Tingkat Ansietas

Untuk menilai tingkat ansietas bisa menggunakan kuesioner yang telah diadaptasi oleh Chrisnawati & Aldino (2019) yaitu *Hamilton Rating Scale For Anxiety* (HARS), dengan pembagian skala ansietas memiliki tiga tingkatan, yaitu:

1) Ansietas Ringan

Ansietas ringan adalah ansietas yang terjadi sebagai akibat dari kebutuhan hidup sehari-hari. Pada titik ini, semua orang lebih perhatian dan persepsi mereka telah ditingkatkan. Kemampuan seseorang untuk melihat, mendengar, dan merasakan lebih dari yang pernah mereka dapat sebelumnya. Individu mungkin menggunakan ansietas sederhana untuk memotivasi mereka untuk belajar dengan mendorong pertumbuhan dan inovasi.

2) Ansietas Sedang

Dengan ansietas sedang, setiap individu mempersempit medan persepsinya untuk hanya melihat, mendengar, dan menangkap hal-hal yang paling vital. Ketika orang tersebut cemas, dia akan memblokir area tertentu tetapi masih dapat mengikuti petunjuk jika diberikan.

3) Ansietas Berat

Penurunan yang cukup besar dalam bidang persepsi merupakan indikasi ansietas yang parah. Orang yang hanya tertarik pada detail dan tidak melihat apa pun di luarnya. Setiap perilaku yang dapat ditunjukkan untuk mengurangi ansietas sebagai arahan ketika hal-hal lain harus diprioritaskan.

i. Penanganan Ansietas

Menurut Brunner dan Suddarth dalam Muharyani et al. (2015), cara dalam mengatasi kecemasan dapat dilakukan dengan terapi non farmakologi yaitu distraksi (pengalihan pikiran), terapi kognitif perilaku dan relaksasi; ketiga terapi ini tujuannya sama, namun terapi relaksasi merupakan terapi yang lebih mudah dan efektif untuk dilakukan.

Salah satu jenis terapi yang dapat menimbulkan relaksasi sehingga dapat mengurangi kecemasan dan belum banyak diterapkan di Indonesia adalah terapi warna. Terapi warna atau *chromatherapy* merupakan terapi yang didasarkan pada pernyataan bahwa setiap warna tertentu mengandung energi-energi penyembuh. Salah satu warna yang dapat dimanfaatkan dan memiliki efek positif yaitu warna hijau. Warna hijau berefek pada sistem saraf secara keseluruhan, terutama bermanfaat bagi sistem saraf pusat (Sari et al., 2018) sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan intervensi non farmakologi yaitu teknik relaksasi napas dalam dikombinasikan dengan terapi warna hijau untuk mengurangi ansietas. Teknik ini disebut *green color breathing therapy*.

2.4 *Evidence Based Practice in Nursing (EBPN)*

2.4.1 *Green Color Breathing Therapy*

a. **Definisi**

Terapi warna atau sering disebut sebagai *chromatherapy* merupakan terapi relaksasi yang menjadi salah satu alternatif untuk menangani masalah yang berhubungan dengan kesehatan mental seperti stres. Teknik ini merupakan perpaduan antara teknik pernapasan dalam dengan membayangkan warna yang dapat dibantu menggunakan alat bantu seperti, kain, pakaian dan lain-lain (Lisnasari, 2020).

Warna hijau berhubungan dengan cakra jantung (cakra ke empat). Warna dan cakra ini berkaitan dengan kedamaian dan kemampuan penyembuhan individu, warna hijau memiliki efek dalam mengurangi ketegangan, menurunkan tekanan darah, melebarkan pembuluh kapiler, dan menekan aktivitas sistem saraf simpatis (Lisnasari, 2020).

Perubahan pada zat kimia saraf dan neurohormonnya sebagai respon terhadap cahaya berwarna. Warna hijau menyebabkan terjadinya peningkatan rata-rata kadar serotonin hingga 104%, oksitosin hingga 45,5%, dan beta endorfin hingga 33% serta penurunan kadar norepinefrin hingga 29%. Perubahan kadar zat kimia saraf dan neurohormon tersebut memiliki pengaruh dalam menurunkan tekanan darah, dengan cara menekan aktivitas saraf simpatis, yang dapat menurunkan kadar kortisol dan hormon adrenalin (Lisnasari, 2020).

Sehingga terapi relaksasi pernapasan warna hijau merupakan terapi warna yang menggunakan metode relaksasi napas dalam dengan memfokuskan diri untuk membayangkan udara di sekitar sewaktu menghirup dan menghembuskan napas dengan warna hijau.

b. Tujuan

Dalam mekanisme autoregulasi, relaksasi dapat merangsang hormon endorfin melalui penurunan denyut jantung dapat menurunkan tekanan darah. Warna hijau mampu menekan aktivitas sistem saraf simpatis, melebarkan pembuluh kapiler, mengurangi ketegangan, menurunkan tekanan darah (Naja et al., 2021).

Green color breath therapy ketika digunakan dengan benar, dapat membantu memanfaatkan energi dari cahaya itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan penyembuhan alami dari tubuh, tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit tetapi juga mencegah penyakit tersebut, termasuk penurunan tingkat ansietas pada pasien (Suli et al., 2019).

c. Indikasi

- 1) Pasien dengan *Coronary Artery Disease (CAD)* yang telah menjalani *Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan masalah ansietas
- 2) Usia 19-45 tahun
- 3) Bersedia menjadi responden
- 4) Warna kesukaannya adalah warna hijau
- 5) Mampu berkomunikasi dengan baik

- 6) Mengalami ansietas dengan skala ringan dan sedang berdasarkan penilaian dengan menggunakan kuesioner dari HARS (*Hamilton Anxiety Rating Scale*) untuk melihat tingkat kecemasan

d. Kontra Indikasi

- 1) Pasien lemah warna hijau atau buta warna hijau dites dengan mengintruksikan responden untuk membandingkan warna merah dan hijau (kain)
- 2) Memiliki komplikasi penyakit yang membahayakan

e. Prosedur Tindakan

Di bawah ini Suli et al.(2019) menjelaskan cara melakukan *green color breathing therapy* dilakukan 2 kali seminggu yaitu pada saat pasien menjalani terapi adalah lama terapi 15 menit, dengan langkah-langkah:

- 1) Posisikan responden nyaman mungkin dan ajarkan pasien untuk melakukan teknik relaksasi pernapasan dalam selama 3 kali.
- 2) Siapkan kain berwarna hijau di depan responden 1 meter.
- 3) Bimbing pasien untuk melihat kain sambil melakukan relaksasi pernapasan dalam selama 10 menit
- 4) Ulangi teknik relaksasi pernapasan dalam dan instruksikan kepada responden untuk membayangkan udara yang dihirup dan dikeluarkan berasal dari aura kain yang berwarna hijau tersebut lakukan selama 5 menit dengan menutup mata.

- 5) Beritahukan kepada responden untuk menarik napas perlahan-lahan dari hidung dan menghembuskannya melalui mulut dan menghayati pada setiap 1 kali siklus bernapas.
- 6) Beritahu pasien manfaat dari terapi relaksasi pernapasan warna hijau selama terapi dilakukan.

f. Kriteria Evaluasi

Penurunan skor skala ansietas pada klien (Suli et al., 2019).

g. Artikel Utama & Pendukung

1) Artikel Utama

Penulis: Didik Prasetyo Suli, Nur Aini, Yoyok Bekti Prasetyo

Tahun: 2019

Judul: Pengaruh *Green Color Breathing Therapy* Terhadap Penurunan Tingkat Stres Pada Pasien Hemodialisa

Sumber: Google Scholar

2) Artikel Pendukung 1

Penulis: Putri Widita Muharyani, Jaji, Ayu Kurniati Sijabat

Tahun: 2019

Judul: Pengaruh Terapi Warna Hijau Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Primigravida Trisemester III

Sumber: Google Scholar

3) Artikel Pendukung 2

Penulis: Galih Jatnika, Hikmat Rudyana, Fida U Br Simarmata

Tahun: 2019

Judul: Pengaruh Terapi Warna Hijau Terhadap Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di RW 3 Wilayah Kerja Puskesmas Cimahi Tengah

Sumber: Google Scholar

4) Artikel Pendukung 3

Penulis: Rara Dwi Vega Pustoro Suwandi, Trimawati, Yunita Galih Yudanari

Tahun: 2018

Judul: Pengaruh Terapi Warna dengan Teknik Pernapasan Warna Terhadap Penurunan Kecemasan pada Lansia yang Mengalami Sindrom Sarang Kosong di RW 03 Kelurahan Candirejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang

Sumber: Google Scholar

5) Artikel Pendukung 4

Penulis: Ina Lailatun Naja, Sri Wahyuni, Hernandia Distinarista, Tutik Rahayu

Tahun: 2021

Judul: Pengaruh Kombinasi Terapi Spiritual dan Warna Hijau terhadap Tekanan pada Kehamilan Di Wilayah Puskesmas Bandarharjo Semarang

Sumber: Google Scholar

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif, misalnya satu pasien, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi. Karakteristik studi kasus adalah subjek yang diteliti sedikit tetapi aspek-aspek yang diteliti banyak (Rinaldi & Mujiyanto, 2017).

3.2 Subyek Studi Kasus

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu atau klien yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu klien yang memiliki diagnosa medis *Coronary Artery Disease (CAD)*, rentang usia 19-45 tahun, warna kesukaan adalah warna hijau dan mengalami kecemasan berdasarkan data subyektif dan pengukuran menggunakan kuesioner *Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)* serta bersedia menjadi responden. Kriteria eksklusi yaitu klien yang tidak bersedia berpartisipasi, buta warna, tidak memiliki diagnosa medis *Coronary Artery Disease (CAD)* dan tidak kooperatif dalam berkomunikasi.

3.3 Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini adalah melakukan pemberian intervensi *green color breath therapy* terhadap pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* yang mengalami masalah ansietas.

3.4 Instrumen Studi Kasus

Instrumen studi kasus ini berupa format proses asuhan keperawatan, alat pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tensi digital, *stopwatch* dan termometer, kuesioner *Hamilton Rating Anxiety Scale* (HARS) serta kain berwarna hijau berukuran 1 meter.

3.5 Prosedur Pengambilan Data

Proses dalam melakukan studi kasus ini terdiri dari beberapa tahap, yakni:

3.5.1 Persiapan

Persiapan yang dilakukan meliputi pengajuan judul studi kasus.

3.5.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, angket/kuesioner HARS, wawancara dan pengukuran tanda-tanda vital.

3.5.3 Penyusunan Laporan

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah dengan berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Ners (Edisi Revisi tahun 2022) Program Studi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

3.6.1 Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Gedung Pusat Jantung Terpadu lantai 4 RSUP Dr. Wahidin Soedirohusodo, tepatnya di kamar perawatan 412.

3.6.2 Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6-8 Desember 2021.

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dan penyajian data pada studi kasus disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan dalam bentuk teks dan dijelaskan secara naratif.

3.8 Etika Studi Kasus

Bila ditinjau dari aspek etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ethos” yang diartikan sebagai peraturan perilaku yang berlaku. Etika penelitian adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam penelitian sekaligus pedoman untuk menghindari kegagalan dalam penelitian (Surahman et al., 2016).

Masalah etika harus dihindarkan selama melakukan riset keperawatan. Upaya menghindari masalah riset yaitu:

3.8.1 Informed Consent

Adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh subyek riset setelah mendapat informasi yang jelas dan benar tentang riset. Pemberian informasi harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh subyek riset. Bentuk persetujuan sebagai subyek riset, setelah mendapat informasi subyek riset diharuskan menandatangani persetujuan. Informed Consent dilakukan melalui instrumen penelitian (kuesioner) yang diberikan secara langsung dengan menjelaskan kepada responden maksud dan tujuan dari penelitian ini. Bila subjek tidak mengisi kuesioner atau tidak bersedia menjadi responden, maka peneliti akan menghargai pilihan responden dan tidak melakukan diskriminasi, meneror ataupun melakukan tindakan memaksa lainnya.

3.8.2 Confidentially

Merupakan suatu kegiatan merahasiakan identitas subyek riset pada saat pengumpulan data, pengolahan data, dan menulis laporan riset sampai dengan publikasi hasil riset. Sehingga periset hanya diperbolehkan menulis kode dan inisial sebagai pengganti subyek riset.

3.8.3 Potential Benefits

Adalah suatu manfaat yang diberikan subyek riset untuk pengembangan teori. Sehingga kegiatan periset menjelaskan bahwa subyek riset merupakan kontributor dalam pengembangan teori yang dapat digunakan orang lain pada masa mendatang.



BAB IV
LAPORAN KASUS

4.1 Pengkajian

HARI/TANGGAL : Senin, 6 Desember 2021
JAM PENGKAJIAN : 10.00 WITA
PENGKAJI : Fatiha Izza Tuslamia, S. Kep
RUANG : Kamar 412 PJT Lt. 4

4.1.1 Identitas

a. Klien

Nama : Tn. Y
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 45 tahun
Agama : Kristen Protestan
Status : Menikah
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : S1
Alamat : Morowali Utara
No. RM : 953292

Diagnosa Medis: *Coronary Artery Disease+Hypertension Heart Disease*

Tgl masuk RS : Jumat, 26 November 2021

b. Penanggung Jawab

Nama : Ny. E (istri klien)
Umur : 40 tahun

Pendidikan : SMP/Sederajat

Pekerjaan : IRT

Alamat : Morowali Utara

4.1.2 Riwayat Keperawatan

a. Riwayat Kesehatan Klien

1) Riwayat Penyakit Sekarang

a) Keluhan Utama

Klien merasa cemas sejak selesai dioperasi. Klien mengeluh khawatir dan takut jika ada masalah pada luka operasinya. Klien tampak tegang. Skor HARS 15.

b) Kronologi Penyakit Saat Ini

Klien mengatakan pada hari Kamis sore, tanggal 11 November 2021, klien merasa sakit tiba-tiba dan mendadak pada kedua dadanya. Klien kemudian segera dibawa ke RSUD Kondale. Pada saat dirawat di RSUD Kondale selama seminggu, klien menjalani

pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Hasil pemeriksaan radiologi menunjukkan adanya kelainan pada jantungnya. Karena ketidaklengkapan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui lebih jelas penyakit klien dan tidak tersedianya tenaga medis spesialis jantung, klien akhirnya dirujuk ke RSUP Wahidin Soedirohusodo oleh DPJP untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

c) Pengaruh Penyakit Terhadap Klien

Klien mengatakan sakit yang dialaminya sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari karena sebelum dirawat di RS, klien mengatakan bebas melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan.

d) Apa yang Diharapkan Klien dari Pelayanan Kesehatan?

Klien mengatakan ingin segera pulih dan kembali ke rumahnya.

2) Riwayat Penyakit Masa Lalu

a) Penyakit Masa Anak-Anak

Klien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit apapun ketika anak-anak.

b) Imunisasi

Klien mengatakan tidak mengetahui dengan pasti apakah imunisasinya ketika masa anak-anak lengkap atau tidak.

c) Alergi

Klien mengatakan tidak memiliki riwayat alergi apapun.

d) Pengalaman Sakit/Dirawat Sebelumnya


Keluarga klien mengatakan klien rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah karena mengalami hipertensi ± 30 tahun.

b. Riwayat Kesehatan Keluarga

1) Genogram (minimal 3 generasi)

a) Dengan siapa klien tinggal dan berapa jumlah keluarga?

Klien mengatakan tinggal bersama istri dan anak bungsunya.



Gambar 2 Genogram Klien

Keterangan :

- : Laki-laki ✕ : Meninggal | : Garis keturunan
- : Perempuan — : Garis pernikahan ? : Umur tidak diketahui
- ↗ : Klien - - - - - : Tinggal bersama

G1 : Kakek dan nenek klien telah meninggal dunia akibat faktor usia

G2 : Ayah klien telah meninggal dunia akibat penyakit Jantung. Ibu klien telah meninggal dunia akibat faktor usia. Ayah klien adalah anak ketiga dari empat bersaudara sedangkan ibu klien adalah anak pertama dari tiga bersaudara

G3 : Klien adalah anak tunggal dan tinggal bersama istri dan anak bungsunya

b) Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit serupa?

Klien mengatakan ayah klien mengalami penyakit jantung sebelum meninggal dunia. Kakek dan ayah klien memiliki riwayat penyakit hipertensi.

c) Apakah ada keluarga yang mempunyai penyakit menular atau menurun?

Klien mengatakan penyakit yang diderita oleh kakek dan ayahnya menurun kepadanya.

d) Bagaimana efek yang terjadi pada keluarga bila salah satu anggota keluarga sakit?

Keluarga klien mengatakan sangat sedih jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit dan akan segera membawanya berobat dan menjalani perawatan sampai sembuh di fasilitas pelayanan kesehatan.

c. Pengkajian Biologis (Dikaji sebelum dan sesudah sakit)

1) Rasa Aman dan Nyaman

a) Apakah ada rasa nyeri? Di bagian mana? Jelaskan secara rinci: PQRST.

Klien mengatakan beberapa hari yang lalu klien mengalami nyeri pada dadanya setelah dioperasi. Saat dikaji

P: Klien mengatakan tidak lagi merasa nyeri saat beraktivitas

Q: Klien mengatakan tidak merasa nyeri, baik yang bersifat menusuk/berdenyut

R: Klien mengatakan tidak merasa nyeri pada bagian dada

S: Skala nyeri 0 (tidak ada)

T: Klien mengatakan nyeri hanya dirasakan beberapa hari lalu

b) Apakah mengganggu aktivitas?

Klien mengatakan penyakit yang dialaminya mengganggu dalam aktivitasnya karena sebagian aktivitasnya dibantu keluarga klien.

c) Apakah yang dilakukan untuk mengurangi/menghilangkan nyeri?

Klien mengatakan mengonsumsi obat anti nyeri. Klien juga mengatakan pernah diajarkan teknik relaksasi napas dalam oleh perawat yang *shift*.

d) Apakah cara yang digunakan untuk mengurangi nyeri efektif?

Klien mengatakan nyerinya perlahan-lahan berkurang setelah melakukan teknik relaksasi napas dalam dan setelah teratur minum obat anti nyeri, nyeri pada dadanya menghilang.

e) Apakah ada riwayat pembedahan?

Klien mengatakan telah menjalani operasi CABG sejak 6 hari lalu.

2) Aktivitas Istirahat – Tidur

a) Aktivitas

(1)Apakah klien selalu berolahraga? Jenis OR?

Sebelum dirawat di RS, klien mengatakan rutin jalan pagi ke sawahnya setiap hari. Saat di RS, klien mengatakan aktivitasnya dibantu sebagian.

(2)Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktivitas?

Sebelum dirawat di RS, klien mengatakan tidak menggunakan alat bantu apapun dalam beraktivitas. Saat dirawat di RS, klien mengatakan menggunakan brankar.

(3)Apakah ada gangguan aktivitas?

Klien merasa lemas. Klien mengatakan agak sulit menggerakkan kedua ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya. Klien mengatakan gerakan kedua tangan dan kakinya terbatas.

(4)Berapa lama melakukan kegiatan per hari? Jam berapa mulai kerja?

Klien mengatakan setiap pagi berjalan kaki menuju sawahnya ±30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas menanam padi, membajak sawah, membersihkan sawah lalu mengurus kolam ikan mas di samping sawahnya pukul 08.00 pagi sampai pukul 12.00 siang. Klien makan siang pukul 13.00 siang dan beristirahat sejenak dari rutinitas pukul 14.00 siang. Pada malam hari, klien nonton TV dan tidur pukul 02.00 dini hari.

(5)Apakah klien mempunyai keterampilan khusus?

Keluarga klien mengatakan klien sangat hobi bersawah dan budidaya ikan mas. Klien mengatakan handal dalam mengurus padi dan sawah serta budidaya ikan mas.

(6)Bagaimana aktivitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu bantuan?Jelaskan secara rinci.

Klien mengatakan tidak mampu melaksanakan aktivitas secara mandiri.

b) Istirahat

(1)Kapan dan berapa lama klien beristirahat?

Klien tidur siang pukul 14.00 di dangau (rumah/gubuk sawah) dan tidur pada malam hari pukul 02.00 dini hari. Klien sebelum dirawat di RS selalu mengeluh sulit tidur jika tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan merokok sebanyak 2 bungkus per hari. Klien mengatakan merokok tiap hari dan minum alkohol tiap malam selama ±30 tahun. Saat di RS, beberapa hari yang lalu, pola tidur klien terganggu karena nyeri. Saat dikaji, klien mengatakan pola tidurnya kembali membaik karena nyerinya sudah hilang.

(2)Apa kegiatan untuk mengisi waktu luang?

Sebelum dirawat di RS, klien mengisi waktu luang pada malam hari diisi dengan menonton TV sambil merokok dan minum minuman beralkohol. Saat dirawat di RS, klien mengisi

waktu luang dengan beristirahat atau mengobrol bersama istrinya.

(3)Apakah klien menyediakan waktu khusus untuk istirahat?

Klien mengatakan sebelum dirawat di RS, klien menyediakan waktu beristirahat pukul 14.00 di siang hari dan 02.00 dini hari.

(4)Apakah pengisian waktu luang sesuai hobi?

Klien mengatakan hobi dalam bertani dan budidaya ikan mas.

(5)Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini?

Klien mengatakan saat dirawat di RS lebih banyak beristirahat dari biasanya.

3) Tidur

a) Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lama, nyenyak/tidak?)

Lama Tidur Siang : Sebelum dirawat di RS, klien mengatakan tidur pada siang hari \pm 1 jam. Saat dikaji, klien mengatakan lama tidur siangnya \pm 1-2 jam.

Lama Tidur Malam : Klien mengatakan tidurnya pada malam hari sebelum dirawat di RS \pm 7 jam. Klien tidur pukul 02.00 dini hari dan selalu terbangun pukul 06.00 pagi. Saat dikaji, klien tidur pukul 21.00 malam dan bangun pukul 05.30 subuh.

Klien mengatakan sering terbangun saat masih merasa nyeri. Saat dikaji, tidur klien nyenyak setelah nyerinya berkurang.

b) Apakah kondisi saat ini mengganggu klien?

Klien mengatakan kondisinya saat ini sangat mengganggu aktivitasnya karena tidak dapat melaksanakan aktivitasnya secara mandiri dan dibantu sebagian.

c) Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur?

Klien mengatakan tidak pernah menggunakan obat penenang sebelum tidur.

d) Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur?

Sebelum sakit, klien mengatakan rutin merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol sebelum tidur. Saat dirawat di RS, klien berdoa sebelum tidur.

e) Bagaimana kebiasaan tidur?

Kebiasaan tidur : Klien mengatakan kebiasaan menjelang tidur dan pola tidurnya tidak baik sebelum sakit.

f) Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya?

Lama Tidur Siang : Sebelum dirawat di RS, klien mengatakan tidur pada siang hari \pm 1 jam. Saat dikaji, klien mengatakan lama tidur siangnya \pm 1-2 jam.

Lama Tidur Malam : Klien mengatakan tidurnya pada malam hari sebelum dirawat di RS \pm 7 jam. Klien tidur pukul 02.00 dini hari dan selalu terbangun pukul 06.00 pagi. Saat dikaji, klien tidur pukul 21.00 malam dan bangun pukul 05.30 subuh.

Klien mengatakan sering terbangun saat masih merasa nyeri. Saat dikaji, tidur klien nyenyak setelah nyerinya berkurang.

g) Apakah klien sering terjaga saat tidur?

Klien mengatakan jarang terjaga saat tidur.

h) Pernahkah mengalami gangguan tidur? Jenisnya?

Klien mengatakan pernah mengalami gangguan beberapa hari yang lalu saat nyerinya masih terasa berat.

i) Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut?

Klien mengatakan pola tidurnya terganggu saat itu. Namun, saat dikaji, klien mengatakan tidak mengalami gangguan lagi pada pola tidurnya.

4) Cairan

a) Berapa banyak klien minum per hari?

Sebelum dirawat di RS, klien mengatakan minum air putih sebanyak \pm 8 botol aqua gelas tiap harinya. Saat dirawat di RS, klien minum 1 botol aqua berukuran 600 ml.

b) Minuman apa yang disukai klien dan yang biasa diminum klien?

Klien mengatakan rutin mengonsumsi minuman beralkohol sebelum sakit. Saat dirawat di RS, klien mengonsumsi air mineral.

c) Apakah ada minuman yang disukai/dipantang?

Klien mengatakan tidak mempunyai minuman kesukaan/pantangan.

d) Apakah klien terbiasa minum alkohol?

Klien mengatakan pernah mengonsumsi minuman beralkohol

selama 30 tahun.

e) Bagaimana pola pemenuhan cairan per hari?

Klien mengatakan rutin mengonsumsi air putih sebelum dirawat di RS. Saat dirawat di RS, klien mengatakan mengonsumsi air mineral.

f) Ada program pembatasan cairan?

Keluarga klien mengatakan klien dianjurkan dokter menghabiskan air mineral sebanyak 1 botol aqua berukuran sedang (600 ml/hari).

g) Bagaimana *balance* cairan klien?

Input :

Air minum 1 gelas aqua berukuran sedang = 600 ml

Cairan NaCl = 500 ml

Total = 600 + 500 = 1.100 ml

Output :

Urin sebanyak 440 ml

IWL = 70 x 10 = 700 ml

Balance cairan = CM-CK-IWL = 1.100 – 440 – 700 = -40

5) Nutrisi

a) Apa yang biasa dimakan klien tiap hari?

Keluarga klien mengatakan klien biasa makan nasi putih, ikan rebus, telur rebus, sayur rebus bervariasi, buah pisang.

b) Bagaimana pola pemenuhan nutrisi klien? Berapa kali per hari?

Klien mengatakan makan 3x/hari dan porsi makan selalu dihabiskan.

Saat dirawat di RS, klien makan nasi putih, lauk bervariasi, sayur

dan buah-buahan bervariasi, 3x/hari dengan porsi makan sedikit-sedikit dan dihabiskan.

c) Apakah ada makanan kesukaan, makanan yang dipantang?

Klien mengatakan sangat suka makan makanan yang direbus.

d) Apakah ada riwayat alergi terhadap makanan?

Keluarga klien mengatakan klien tidak ada riwayat alergi terhadap makanan apapun.

e) Apakah ada kesulitan menelan? Mengunyah?

Klien mengatakan tidak mengalami kesulitan dalam menelan maupun mengunyah.

f) Apakah ada alat bantu dalam makan? Sonde, infus?

Klien tidak menggunakan alat bantu dalam makan. Klien tidak terpasang NGT. Klien terpasang infus.

g) Apakah ada yang menyebabkan gangguan pencernaan?

Klien mengatakan tidak ada gangguan dalam pencernaan.

h) Bagaimana kondisi gigi geligi klien? Jumlah gigi? Gigi palsu?

Kekuatan gigi?

Gigi klien sudah ada yang tanggal pada bagian samping. Klien mengatakan tidak menggunakan gigi palsu. Gigi masih kuat mengunyah. Gigi klien tampak bersih.

i) Adakah riwayat pembedahan dan pengobatan yang berkaitan dengan sistem pencernaan?

Keluarga klien dan klien mengatakan tidak ada riwayat pembedahan

dan pengobatan yang berkaitan dengan sistem pencernaan.

j) Adakah program DIET bagi klien? Jenis? Jelaskan secara RINCI!

Keluarga klien mengatakan klien menjalani program diet jantung.

6) Eliminasi: Urine dan Feses

a) Eliminasi Feses:

(1) Bagaimana pola klien dalam defekasi? Kapan, pola dan karakteristik feses?

Klien mengatakan sebelum sakit, frekuensi BAB klien 1x/hari.

BAB klien padat, berwarna kuning, feses yang keluar banyak.

Saat dikaji, klien mengatakan BAB 1x/hari.

(2) Apakah terbiasa menggunakan obat pencahar?

Klien mengatakan tidak pernah menggunakan obat pencahar.

Klien mengatakan tidak pernah mengonsumsi minuman ataupun teh herbal pelancar BAB.

(3) Apakah ada kesulitan?

Klien mengatakan tidak ada kesulitan.

(4) Usaha yang dilakukan klien untuk mengatasi masalah?

Klien mengatakan tidak ada masalah dalam BAB.

(5) Apakah klien menggunakan alat bantu untuk defekasi?

Klien mengatakan tidak menggunakan alat bantu untuk defekasi.

b) Eliminasi Urin:

(1) Apakah BAK klien teratur?

Sebelum sakit, klien mengatakan buang air kecil $\pm 7x$ /hari. Saat dirawat di RS, klien mengatakan buang air kecil $\pm 3-4x$ /hari.

(2) Bagaimana pola, frekuensi, waktu, karakteristik serta perubahan yang terjadi dalam miksi?

Sebelum sakit, klien mengatakan BAK 2-3x pada pagi hari, biasanya pada saat bangun dan setelah sarapan. BAK 3x pada siang hari. BAK 2x pada malam hari setelah makan dan sebelum tidur. Urin berwarna kuning jernih, tidak ada darah, tidak berbusa dan bau khas urin.

(3) Bagaimana perubahan pola miksi klien?

Saat dikaji, klien mengatakan BAK 1x pada pagi hari, biasanya pada saat bangun. BAK 2x pada siang hari, biasanya sebelum dan setelah tidur siang. BAK 1x pada malam hari sebelum tidur. Urin berwarna kuning pekat, tidak ada darah, tidak berbusa dan bau khas urin.

(4) Apakah ada riwayat pembedahan, apakah menggunakan alat bantu dalam miksi?

Klien tidak terpasang kateter urin.

(5) Berapa volume air kemih?

Keluarga klien mengatakan banyaknya urin klien yang keluar sebanyak 440 ml per hari.

7) Kebutuhan Oksigenasi Dan Karbondioksida

a) Pernapasan

(1)Apakah ada kesulitan dalam bernapas? Bunyi napas?

Dyspneu?

Klien mengatakan tidak ada kesulitan dalam bernapas. Bunyi napas vesicular. Klien tidak mengalami Dyspneu. Irama pernapasan regular. Pengembangan dada simetris.

(2)Apakah klien menggunakan alat bantu pernapasan? (Ya, jelaskan apa jenisnya)

Klien tidak menggunakan alat bantu pernapasan.

(3)Apakah klien terbiasa merokok? Obat-obatan untuk melancarkan pernapasan?

Klien mengatakan terbiasa merokok sebanyak 2 bungkus/hari sejak 30 tahun yang lalu dan baru berhenti beberapa bulan lalu.

(4)Apakah ada alergi terhadap debu, obat-obatan dll?

Klien mengatakan tidak ada alergi.

(5)Apakah pernah dirawat dengan gangguan pernapasan?

Keluarga klien mengatakan klien pernah terpasang O₂ selama 2 hari setelah operasi.

(6)Apakah klien pernah punya riwayat gangguan pernapasan dan mendapat pengobatan?

Keluarga klien mengatakan klien pernah terpasang O₂ setelah operasi beberapa hari yang lalu.

b) Kardiovaskuler

(1)Apakah klien cepat lelah?

Klien merasa lemah.

(2)Apakah ada keluhan berdebar-debar? Nyeri dada yang menyebar?Pusing? Rasa berat di dada?

Klien mengatakan saat pertama kali masuk di RS, klien merasa nyeri dada menyebar ke tengkuk leher. Saat dikaji, klien mengatakan nyeri pada dada tidak terasa lagi.

(3)Apakah klien menggunakan alat pacu jantung?

Klien tidak pernah menggunakan alat pacu jantung.

8) Personal Hygiene

a) Bagaimana pola *personal hygiene*? Berapa kali mandi, gosok gigi dll?

Sebelum sakit, klien mengatakan mandi 2x sehari. Klien mengatakan klien mandi pagi dan mandi sore secara teratur tiap hari. Saat sakit, klien mengatakan dilap basah menggunakan tisu basah, sabun dan waslap. Keluarga klien mengatakan dimandikan tiap pagi oleh perawat. Keluarga klien menggosok gigi klien dan membersihkan area mulut klien tiap hari.

b) Berapa hari klien terbiasa cuci rambut?

Sebelum sakit, klien mengatakan mencuci rambut menggunakan sampo 1x/hari tiap mandi pagi. Saat sakit, klien mengatakan dicuci rambutnya oleh keluarga klien 1x/2 hari.

c) Apakah klien memerlukan bantuan dalam melakukan *personal hygiene*?

Keluarga klien mengatakan klien memerlukan bantuan dalam melakukan *personal hygiene*.

9) Sex

a) Apakah ada kesulitan dalam hubungan seksual?

Klien menolak untuk dikaji.

d. Pengkajian Psikososial Dan Spiritual

1) Psikologi

a) Status Emosi

(1) Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya?

Ya. Klien dapat mengekspresikan perasaannya, karena ketika klien bercerita kebahagiaan, klien tampak tersenyum dan ketika bercerita tentang penyakitnya, klien tampak sedih

(2) Bagaimana suasana hati klien?

Klien mengatakan memasrahkan semuanya pada Tuhan. Klien percaya bahwa petugas kesehatan akan melakukan yang terbaik.

(3) Bagaimana perasaan klien saat ini?

Klien merasa takut bergerak setelah operasi karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada luka operasinya.

(4) Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, gembira?

Klien mengatakan bila sedih ataupun gembira, klien akan menceritakan pada istrinya. Klien mengatakan bila suasana

hatinya marah, klien pergi meninggalkan penyebab marahnya.

b) Konsep diri:

(1) Bagaimana klien memandang dirinya?

Klien mengatakan sakit yang dialaminya sebagai akibat dari pola hidupnya yang tidak sehat selama ini.

(2) Hal-hal apa yang disukai klien?

Klien sangat suka dengan segala hal yang berkaitan dengan pertanian dan budidaya ikan mas.

(3) Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya?

Klien mengatakan keluarganya menjadi kekuatannya.

(4) Hal-hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini?

Klien mengatakan hanya bisa berbaring dan duduk di atas tempat tidur.

2) Hubungan Sosial

a) Apakah klien mempunyai teman dekat?

Klien mengatakan memiliki seorang sahabat.

b) Siapa yang dipercaya klien?

Klien mengatakan sangat percaya pada istrinya.

c) Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat?

Klien mengatakan sebelum dirawat di RS, klien aktif mengikuti kegiatan jumat bersih tiap hari di kampungnya.

d) Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai

kemampuan?

Klien mengatakan bekerja sebagai petani. Klien mengatakan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya karena klien merupakan pensiunan PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3) Spiritual

a) Apakah klien menganut satu agama?

Klien mengatakan hanya menganut satu agama, yaitu agama Kristen Protestan.

b) Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah?

Klien mengatakan mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah karena tidak bisa beribadah lagi di gereja.

c) Bagaimana hubungan antara manusia dan Tuhan dalam agama?

Sebelum sakit, klien mengatakan selalu beribadah di gereja.

Namun saat sakit, klien hanya bisa memanggil atau menelpon pendeta untuk melakukan ibadah bersama di ruangan tiap hari Jumat dan Sabtu.

e. Pemeriksaan Fisik

1) Keadaan Umum

a) Kesadaran: Compos Mentis GCS: E=4 M=6 V=5

b) Kondisi klien secara umum: Klien tampak lemah

c) Tanda-tanda vital

TD : 150/97 mmHg

P : 18x/menit

N : 90x/menit

S : 36,5°C

d) Pertumbuhan fisik

TB : 165 cm

BB sebelum sakit : 70 kg

BBS: belum bisa dikaji

e) Keadaan kulit: Kulit berwarna sawo matang, kulit tampak bersih, terdapat luka post OP.

2) Pemeriksaan Cepalo Kaudal

a) Kepala

(1) Bentuk kepala bulat dan simetris, tidak ada luka, tidak ada pembengkakan, keadaan kulit kepala bersih, rambut menyebar merata, rambut lurus dan tidak lepek, banyak uban

(2) Mata bersih, simetris, tidak ada secret, penglihatan baik, pupil isokor, refleks pupil (+), sklera putih, konjungtiva pink

(3) Telinga berbentuk normal dan simetris, tidak ada serumen/sekret, tidak ada perdarahan, tidak ada kelainan bentuk daun telinga, fungsi pendengaran baik dan tidak terdapat nyeri telinga

(4) Hidung masih berfungsi penciumannya dengan baik, tidak ada polip, tidak ada sekret, tidak ada nyeri

(5) Mulut tidak mengalami kelainan, kemampuan bicara kooperatif, keadaan bibir lembap, tidak terdapat bercak putih pada lidah

b) Leher

(1) Bentuk leher normal, tidak ada pembesaran thyroid, tidak ada peradangan ataupun pembengkakan pada tonsil, tidak ada pembesaran pada vena jugularis, tidak terdapat nyeri tekan

c) Dada

(1) Inspeksi: bentuk dada *normochest*, tidak terdapat kelainan bentuk, retraksi otot dada TAK, pergerakan selama pernapasan simetris, terdapat luka post OP pada dada bagian tengah

(2) Palpasi: simetris, tidak terdapat nyeri tekan dan massa, pernapasan tidak menggunakan otot bantu, tidak terdapat retraksi intercostal

(3) Perkusi: batas jantung dan paru ditandai dengan jantung saat dipercusi terdengar redup dan paru terdengar sonor

(4) Auskultasi: Suara pernapasan, bunyi jantung I ditemukan saat meletakkan stetoskop di area ICS 2 parasternal kanan (aorta) dan ICS 2 parasternal kiri (pulmonalis), tidak terdengar suara

abnormal

d) Abdomen

(1) Inspeksi: simetris, tidak tampak distensi abdomen

(2) Auskultasi: bunyi peristaltik 8x/menit

(3) Perkusi: tidak terdapat massa/tumor, timpani

(4) Palpasi: tidak terdapat massa/pembesaran, hepar & lien tidak teraba

e) Genitalia, Anus dan Rektum

(1)Inspeksi: warna kulit merata dengan warna kulit seluruh tubuh,
tidak ada kelainan genital

(2)Palpasi: tidak terdapat penumpukan urin

f) Ekstremitas:

(1)Atas: alat ekstremitas lengkap, akril teraba hangat, tidak terdapat kelainan pada jari, simetris, alat ekstremitas bergerak secara bebas, tidak ada edema, tidak terdapat luka, kuku tangan ditekan selama <2 detik dan warnanya cepat kembali

(2)Bawah: alat ekstremitas lengkap, tidak terdapat kelainan pada jari, simetris, alat ekstremitas bergerak secara bebas, tidak ada edema, terdapat luka post OP pada tungkai bagian kanan, bentuk kaki normal, tidak terdapat varices

(3)Kekuatan otot

5 | 5
5 | 5

4.1.3 Pemeriksaan Penunjang

Tabel 15 Laboratorium Patologi Klinik

Dilakukan pada tanggal 03-12-2021 di RSUP Wahidin Soedirohusodo

Nama Item	Hasil	Satuan	Nilai Rujukan
WBC	14.8	10 ³ /ul	4.00-10.00
RBC	2.94	10 ⁶ /uL	4.00-6.00
HGB	9.5	gr/dl	12.0-16.0
HCT	27.1	%	37.0-48.0
MCV	92.2	fL	80.0-97.0
MCH	32.3	pg	26.5-33.5
MCHC	35.1	gr/dl	31.5-35.0
PLT	152	10 ³ /uL	150-500
RDW-SD	43.0	fL	37-54
RDW-CV	13.0	fL	10.0-15.0

PDW	8.7	fL	11.0-18.0
MPV	9.0	fL	6.50-11.0
PCT	0.14	%	0.15-0.50
NEUT	11.33	%	52.0-75.0
LYMPH	2.13	%	20.0-40.0
MONO	1.32	10 ³ /ul	2.00-8.00
EO	0.01	10 ³ /ul	1.00-3.00
BASO	0.01	10 ³ /ul	0.00-0.10

Kesan: Anemia
Leukositosis

Tabel 16 Laboratorium Kimia Darah

Dilakukan pada tanggal 30-11-2021 di RSUP Wahidin Soedirohusodo

Nama Item	Hasil	Unit	Referensi
HEMATOLOGI			
Koagulasi			
PT	11.4	detik	10-14
INR	1.10		--
APTT	34.3	detik	22.0-30.0
KIMIA DARAH			
Fungsi Ginjal			
Ureum	35	mg/dl	10-50
Kreatinin	0.85	mg/dl	L (< 1.3) ; P (< 1.1)
Fungsi Hati			
Albumin	3.6	g/dl	3.5-5.0
Elektrolit			
Natrium	134	mmol/l	136-145
Kalium	4.2	mmol/l	3.5-5.1
Klorida	107	mmol/l	97-111

Kesan: Hiponatremia

Pemeriksaan Radiologi (Foto Thorax)

Dilakukan pada tanggal 11-11-2021 di RSUP Wahidin Soedirohusodo

Hasil: Atherosclerosis aortae

Laporan Tindakan Angiography Koroner

Dilakukan pada tanggal 16-11-2021 di RSUP Wahidin Soedirohusodo

Hasil: Coronary Artery Disease 1 Vessel Disease + Critical Left Main Disease

4.1.4 Terapi Yang Diberikan

Tabel 17 Terapi Obat

Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Rute	Indikasi
Natrium Chlorida	500 ml	24 jam	IV	Jenis cairan infus elektrolit yang memiliki fungsi mengontrol kadar air dalam tubuh, mencegah dan mengatasi kehilangan sodium dalam darah yang disebabkan oleh kekurangan cairan tubuh
Aspilet Chewable	80 mg	24 jam	Oral	Obat pengencer darah untuk penderita infark miokard
Clopidogrel	75 mg	24 jam	Oral	Untuk mencegah stroke dan serangan jantung
Atorvastatin	20 mg	24 jam	Oral	Mencegah penyakit kardiovaskuler pada orang-orang yang berisiko tinggi dan menurunkan kadar lipid abnormal, menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida
Lisinopril	10 mg	24 jam	Oral	Pengobatan lini pertama untuk tekanan darah tinggi, obat penghambat enzim pengubah angiotensin dan sebagai obat standar emas dalam pengobatan tekanan darah tinggi, juga digunakan untuk mengobati gagal jantung dan setelah serangan jantung
Isosorbid Dinitrate	5 mg	24 jam	Oral	Mencegah dan meredakan angina (nyeri dada) akibat penyakit jantung koroner
Nitrokaf Retard	2,5 mg	12 jam	Oral	Mengandung zat aktif Nitrogliserin untuk mencegah dan terapi jangka panjang untuk penderita angina pectoris
Bisoprolol	2,5 mg	24 jam	Oral	Obat yang digunakan terutama untuk penyakit jantung, secara khusus mencakup tekanan darah tinggi, angina pektoris dan gagal jantung

Tabel 18 Klasifikasi Data

DATA SUBJEKTIF	DATA OBJEKTIF
<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien merasa cemas sejak selesai dioperasi 2. Klien mengeluh khawatir dan takut jika ada masalah pada luka operasinya 3. Klien mengatakan sakit yang dialaminya sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari karena sebelum dirawat di RS, klien mengatakan bebas melakukan aktivitas sehari-hari tanpa perlu bantuan 4. Klien mengatakan aktivitasnya dibantu sebagian 5. Klien mengatakan menggunakan brankar 6. Klien merasa lemas 7. Klien mengatakan agak sulit menggerakkan kedua ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya 8. Klien mengatakan gerakan kedua tangan dan kakinya terbatas 9. Klien mengatakan tidak mampu melaksanakan aktivitas secara mandiri 10. Klien merasa lemah 11. Keluarga klien mengatakan klien memerlukan bantuan dalam melakukan <i>personal hygiene</i> 12. Klien merasa takut bergerak setelah operasi karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada luka operasinya 13. Klien mengatakan hanya bisa berbaring dan duduk di atas tempat tidur 14. Klien mengatakan telah menjalani operasi CABG sejak 6 hari lalu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak tegang 2. Skor HARS 15 3. Klien tampak lemah 4. TD : 150/97 mmHg 5. Terdapat luka post OP 6. Terdapat luka post OP pada dada bagian tengah 7. Terdapat luka post OP pada tungkai bagian kanan 8. Hasil Laboratorium Patologi Klinik: Anemia, Leukositosis 9. Hasil Laboratorium Kimia Darah: Hiponatremia 10. Hasil Pemeriksaan Radiologi (Foto Thorax): Atherosclerosis aortae 11. Laporan Tindakan Angiography Koroner: Coronary Artery Disease 1 Vessel Disease + Critical Left Main Disease

Tabel 19 Kategorisasi Data

KATEGORI	SUB KATEGORI	DATA OBJEKTIF	DATA SUBJEKTIF
FISIOLOGI	Respirasi	-	-
	Sirkulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. TD : 150/97 mmHg 2. Terdapat luka post OP 3. Hasil Laboratorium Patologi Klinik: Anemia, Leukositosis 4. Hasil Laboratorium Kimia Darah: Hiponatremia 5. Hasil Pemeriksaan Radiologi (Foto Thorax): Atherosclerosis aortae 6. Laporan Tindakan Angiography Koroner: Coronary Artery Disease 1 Vessel Disease + Critical Left Main Disease 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan telah menjalani operasi CABG sejak 6 hari lalu
	Nutrisi Dan Cairan	-	-
	Eliminasi	-	-
	Aktivitas & Istirahat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak lemah 2. Terdapat luka post OP pada dada bagian tengah 3. Terdapat luka post OP pada tungkai bagian kanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan sakit yang dialaminya sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari karena sebelum dirawat di RS, klien mengatakan bebas melakukan aktivitas sehari-hari tanpa perlu bantuan 2. Klien mengatakan aktivitasnya dibantu sebagian 3. Klien mengatakan menggunakan brankar 4. Klien merasa lemas 5. Klien mengatakan agak sulit menggerakkan kedua ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya 6. Klien mengatakan gerakan kedua tangan dan kakinya terbatas

			<p>7. Klien mengatakan tidak mampu melaksanakan aktivitas secara mandiri</p> <p>8. Klien merasa lemah</p> <p>9. Klien mengatakan hanya bisa berbaring dan duduk di atas tempat tidur</p>
	Neurosensory	-	-
	Reproduksi dan Seksualitas	-	-
PSIKOLOGIS	Nyeri dan Kenyamanan	-	-
	Integritas Ego	<p>1. Klien tampak tegang</p> <p>2. Skor HARS 15</p>	<p>1. Klien merasa cemas sejak selesai dioperasi</p> <p>2. Klien mengeluh khawatir dan takut jika ada masalah pada luka operasinya</p> <p>3. Klien merasa takut bergerak setelah operasi karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada luka operasinya</p>
	Pertumbuhan dan Perkembangan	-	-
PERILAKU	Kebersihan Diri	-	<p>1. Keluarga klien mengatakan klien memerlukan bantuan dalam melakukan <i>personal hygiene</i></p>
	Penyuluhan dan Pembelajaran	-	-
RELASIONAL	Interaksi Sosial	-	-
LINGKUNGAN	Keamanan/Proteksi	-	-

4.2 Analisis Data

Tabel 20 Analisis Data

DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN
<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien merasa cemas sejak selesai dioperasi Klien mengeluh khawatir dan takut jika ada masalah pada luka operasinya Klien merasa takut bergerak setelah operasi karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada luka operasinya <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien tampak tegang Skor HARS 15 TD : 150/97 mmHg Terdapat luka post OP Hasil Pemeriksaan Radiologi (Foto Thorax): Atherosclerosis aortae Laporan Tindakan Angiography Koroner: Coronary Artery Disease 1 Vessel Disease + Critical Left Main Disease 	<p>Post CABG</p> <p>↓</p> <p>Perubahan status kesehatan</p> <p>↓</p> <p>Telah dilakukan tindakan pembedahan</p> <p>↓</p> <p>Khawatir akibat dari tindakan</p> <p>↓</p> <p>Koping klien yang tidak efektif</p> <p>↓</p> <p>Ansietas</p>	<p>Ansietas b.d kekhawatiran mengalami kegagalan</p>
<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien mengatakan sakit yang dialaminya sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari karena sebelum dirawat di RS, klien mengatakan bebas melakukan aktivitas sehari-hari tanpa perlu bantuan Klien mengatakan aktivitasnya dibantu sebagian Klien mengatakan menggunakan brankar Klien merasa lemas Klien mengatakan agak sulit menggerakkan kedua 	<p>Post CABG menyebabkan terjadi penurunan aliran darah</p> <p>↓</p> <p>Penurunan kemampuan sintesa ATP secara aerob sehingga terjadi metabolisme anaerob mengakibatkan peningkatan asam laktat</p> <p>↓</p> <p>Penurunan kemampuan tubuh menyediakan energi</p> <p>↓</p> <p>Terjadi kelemahan</p> <p>↓</p>	<p>Intoleransi Aktivitas b.d kelemahan</p>

<p>ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya</p> <p>6. Klien mengatakan gerakan kedua tangan dan kakinya terbatas</p> <p>7. Klien mengatakan tidak mampu melaksanakan aktivitas secara mandiri</p> <p>8. Klien merasa lemah</p> <p>9. Keluarga klien mengatakan klien memerlukan bantuan dalam melakukan <i>personal hygiene</i></p> <p>10. Klien mengatakan hanya bisa berbaring dan duduk di atas tempat tidur</p> <p>DO:</p> <p>1. Klien tampak lemah</p>	<p>Intoleransi Aktivitas</p>	
<p>DS:</p> <p>1. Klien mengatakan telah menjalani operasi CABG sejak 6 hari lalu</p> <p>DO:</p> <p>1. Terdapat luka post OP pada dada bagian tengah</p> <p>2. Terdapat luka post OP pada tungkai bagian kanan</p> <p>3. Hasil Laboratorium Patologi Klinik: Anemia, Leukositosis</p> <p>4. Hasil Laboratorium Kimia Darah: Hiponatremia</p>	<p>Post CABG</p> <p>↓</p> <p>Luka <i>puncture</i></p> <p>↓</p> <p>Terputusnya kontinuitas jaringan</p> <p>↓</p> <p>Kerusakan jaringan</p> <p>↓</p> <p>Pajanan terhadap mikroorganisme</p> <p>↓</p> <p>Risiko Infeksi</p>	<p>Risiko Infeksi d.d efek prosedur invasif</p>



Tabel 21 Perumusan Prioritas Masalah Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan
1	Ansietas b.d kekhawatiran mengalami kegagalan
2	Intoleransi Aktivitas b.d kelemahan
3	Risiko Infeksi d.d efek prosedur invasif
<p>Penulis memprioritaskan diagnosis Ansietas b.d kekhawatiran mengalami kegagalan karena jika ansietas tidak segera ditangani maka dampak kecemasan pada klien post-operasi adalah peningkatan tekanan darah, denyut nadi dan sesak napas. Hal ini menyebabkan klien mengalami hipertensi yang dapat memperberat kerja jantung.</p> <p>Intoleransi Aktivitas b.d kelemahan menempati diagnosis prioritas kedua karena klien memerlukan kemudahan dalam beraktivitas untuk memelihara dan memulihkan fungsi tubuh selama menjalankan proses perawatan. Kemudahan dalam melakukan aktivitas merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga diagnosis ini menjadi prioritas kedua.</p> <p>Risiko Infeksi d.d efek prosedur invasif menjadi diagnosis prioritas ketiga karena hanya merupakan diagnosis risiko yang artinya tidak ditemukan tanda/gejala mayor dan minor pada klien, namun klien memiliki faktor risiko mengalami masalah kesehatan. Semua diagnosis keperawatan ini penting dilakukan karena jika dibiarkan, maka bisa memicu prognosis yang buruk.</p>	

4.3 Diagnosis Keperawatan

Tabel 22 Diagnosis Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan
1	<p>Ansietas b.d kekhawatiran mengalami kegagalan d.d:</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien merasa cemas sejak selesai dioperasi 2. Klien mengeluh khawatir dan takut jika ada masalah pada luka operasinya 3. Klien merasa takut bergerak setelah operasi karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada luka operasinya <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak tegang 2. Skor HARS 15 3. TD : 150/97 mmHg 4. Terdapat luka post OP 5. Hasil Pemeriksaan Radiologi (Foto Thorax): Atherosclerosis aortae 6. Laporan Tindakan Angiography Koroner: Coronary Artery Disease 1 Vessel Disease + Critical Left Main Disease
2	<p>Intoleransi Aktivitas b.d kelemahan d.d:</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan sakit yang dialaminya sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari karena sebelum dirawat di RS, klien mengatakan bebas melakukan aktivitas sehari-hari tanpa perlu bantuan 2. Klien mengatakan aktivitasnya dibantu sebagian 3. Klien mengatakan menggunakan brankar 4. Klien merasa lemas 5. Klien mengatakan agak sulit menggerakkan kedua ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya 6. Klien mengatakan gerakan kedua tangan dan kakinya terbatas 7. Klien mengatakan tidak mampu melaksanakan aktivitas secara mandiri 8. Klien merasa lemah 9. Keluarga klien mengatakan klien memerlukan bantuan dalam melakukan <i>personal hygiene</i> 10. Klien mengatakan hanya bisa berbaring dan duduk di atas tempat tidur <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak lemah
3	<p>Risiko Infeksi d.d efek prosedur invasif:</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan telah menjalani operasi CABG sejak 6 hari lalu <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat luka post OP pada dada bagian tengah 2. Terdapat luka post OP pada tungkai bagian kanan 3. Hasil Laboratorium Patologi Klinik: Anemia, Leukositosis 4. Hasil Laboratorium Kimia Darah: Hiponatremia

4.4 Intervensi Keperawatan

Tabel 23 Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Rencana Tindakan Keperawatan		
		Luaran Keperawatan	Intervensi	Rasional
1	<p>Ansietas b.d kekhawatiran mengalami kegagalan d.d:</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien merasa cemas sejak selesai dioperasi 2. Klien mengeluh khawatir dan takut jika ada masalah pada luka operasinya 3. Klien merasa takut bergerak setelah operasi karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada luka operasinya <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak tegang 2. Skor HARS 15 3. TD : 150/97 mmHg 4. Terdapat luka post OP 5. Hasil Pemeriksaan Radiologi (Foto Thorax): Atherosclerosis aortae 6. Laporan Tindakan Angiography Koroner: Coronary Artery Disease 1 Vessel Disease + Critical Left Main Disease 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada Tn. Y selama 3x24 jam, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun ▪ Tekanan darah membaik dari 150/97 mmHg ke 140/90 mmHg 	<p>Terapi Relaksasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif - Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan - Monitor respon terhadap terapi relaksasi • Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika klien mengalami penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu, maka klien akan sulit melakukan teknik relaksasi tersebut - Mengetahui apakah ada perubahan pada otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan - Membandingkan perasaan sebelum dan setelah terapi - Untuk memberikan perasaan yang tenang dan nyaman pada saat klien

			<ul style="list-style-type: none"> - Gunakan pakaian longgar - Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama <p>• Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi (<i>green color breathing therapy</i>) - Jelaskan secara rinci intervensi yang dipilih - Anjurkan mengambil posisi nyaman - Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi - Anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih - Demonstrasikan dan latih teknik relaksasi 	<p>sedang latihan terapi relaksasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar klien lebih mudah bergerak - Untuk memberikan perasaan tenang pada klien - Untuk memberikan informasi terkait tindakan jenis relaksasi - Agar klien memahami intervensi - Untuk memberikan rasa nyaman pada saat diberikan intervensi - Sebagai penunjang agar bisa merasakan ketenangan - Untuk membuat klien mudah mengingat dan menerapkan intervensi - Untuk memudahkan klien melakukan intervensi
2	<p>Intoleransi Aktivitas b.d kelemahan d.d:</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan sakit yang dialaminya sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari karena sebelum dirawat di RS, klien 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada Tn. Y selama 3x24 jam, diharapkan</p>	<p>Manajemen Energi</p> <p>• Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memecahkan masalah terkait kelelahan

<p>mengatakan bebas melakukan aktivitas sehari-hari tanpa perlu bantuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Klien mengatakan aktivitasnya dibantu sebagian 3. Klien mengatakan menggunakan brankar 4. Klien merasa lemas 5. Klien mengatakan agak sulit menggerakkan kedua ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya 6. Klien mengatakan gerakan kedua tangan dan kakinya terbatas 7. Klien mengatakan tidak mampu melaksanakan aktivitas secara mandiri 8. Klien merasa lemah 9. Keluarga klien mengatakan klien memerlukan bantuan dalam melakukan <i>personal hygiene</i> 10. Klien mengatakan hanya bisa berbaring dan duduk di atas tempat tidur <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak lemah 	<p>toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudahan melakukan aktivitas sehari-hari meningkat ▪ Keluhan lelah menurun 	<p>kelelahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor kelelahan fisik dan emosional - Monitor pola dan jam tidur - Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas <p>• Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus - Lakukan latihan rentang gerak pasif dan atau/aktif - Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan - Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan <p>• Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan tirah baring - Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap <p>• Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui kelelahan fisik dan emosional pasien - Mengetahui pola tidur - Untuk mengetahui lokasi dan ketidaknyamanan pasien dalam melakukan aktivitas - Memfasilitasi lingkungan yang mendukung dalam proses implementasi - Agar gerakan tubuh pasien tidak kaku - Untuk pengalihan yang dapat menenangkan pasien - Agar dapat mempermudah proses mobilisasi pasien - Memberikan posisi yang nyaman pada pasien - Agar energi dapat di stimulus dengan baik - Agar nutrisi yang dikonsumsi pasien sesuai dengan kebutuhan
--	---	--	---

<p>3 Risiko Infeksi d.d efek prosedur invasif: DS: 1. Klien mengatakan telah menjalani operasi CABG sejak 6 hari lalu</p> <p>DO: 1. Terdapat luka post OP pada dada bagian tengah 2. Terdapat luka post OP pada tungkai bagian kanan 3. Hasil Laboratorium Patologi Klinik: Anemia, Leukositosis 4. Hasil Laboratorium Kimia Darah: Hiponatremia</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada Tn. Y selama 3x24 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kadar sel darah putih membaik 	<p>Pencegahan Infeksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik • Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Batasi jumlah pengunjung - Berikan perawatan kulit pada area edema - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan klien dan lingkungan klien • Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Ajarkan cara mencuci tangan yang benar - Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi - Anjurkan meningkatkan asupan cairan 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui tindakan intervensi yang akan diberikan - Untuk menghindari adanya kontaminasi antara klien dan pengunjung - Untuk mengurangi edema pada area kulit - Untuk menghindari terjadinya penyebaran patogen - Mencegah potensi resistensi anti mikroba - Menurunkan risiko infeksi akibat mal nutrisi - Asupan cairan yang tepenuhi membuat permukaan kulit menjadi lembab sehingga menurunkan risiko infeksi
---	--	---	--

4.5 Implementasi Keperawatan

Tabel 24 Implementasi Keperawatan

No	No. DX. Kep	Waktu	Implementasi Tindakan Keperawatan	Nama Jelas
1	1	Senin, 6 Desember 2021 11.00 WITA	<p>Terapi Relaksasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi - Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif <p>Hasil: Klien mengatakan merasa lemas dan lemah Klien menjawab dengan baik setiap pertanyaan saat dikaji. Klien kooperatif - Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan <p>Hasil: Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot baik, frekuensi nadi 90x/menit, tekanan darah 150/97 mmHg dan suhu 36,5°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor respon terhadap terapi relaksasi <p>Hasil: Klien bersedia diberikan terapi relaksasi (<i>green color breathing therapy</i>)</p> </p>	Fatiha Izza Tuslamia
2	2	Senin, 6 Desember 2021 11.20 WITA	<p>Manajemen Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi - Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan <p>Hasil: Klien mengatakan sakit yang dialaminya sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari karena sebelum dirawat di RS, klien mengatakan bebas melakukan aktivitas sehari-hari tanpa perlu bantuan Klien mengatakan agak sulit menggerakkan kedua ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya Klien mengatakan gerakan kedua tangan dan kakinya terbatas Klien mengatakan tidak mampu melaksanakan aktivitas secara mandiri Keluarga klien mengatakan klien memerlukan bantuan dalam melakukan <i>personal hygiene</i> - Memonitor kelelahan fisik dan emosional <p>Hasil: Klien merasa lemah Klien mengatakan aktivitasnya dibantu sebagian</p> </p>	Fatiha Izza Tuslamia

			<p>Klien mengatakan menggunakan brankar Klien mengatakan hanya bisa berbaring dan duduk di atas tempat tidur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor pola dan jam tidur <p>Hasil: Lama Tidur Siang : Sebelum dirawat di RS, klien mengatakan tidur pada siang hari \pm 1 jam. Saat dikaji, klien mengatakan lama tidur siangnya \pm 1-2 jam Lama Tidur Malam : Klien mengatakan tidurnya pada malam hari sebelum dirawat di RS \pm 7 jam. Klien tidur pukul 02.00 dini hari dan selalu terbangun pukul 06.00 pagi. Saat dikaji, klien tidur pukul 21.00 malam dan bangun pukul 05.30 subuh</p>	
3	3	<p>Senin, 6 Desember 2021</p> <p>11.30 WITA</p>	<p>Pencegahan Infeksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Hasil: Terdapat luka post OP pada dada bagian tengah Terdapat luka post OP pada tungkai bagian kanan Hasil Laboratorium Patologi Klinik: Anemia, Leukositosis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Membatasi jumlah pengunjung <p>Hasil: Memberitahukan kepada pasien dan keluarga untuk membatasi jumlah pengunjung. Klien hanya dijaga istrinya di kamar perawatan <ul style="list-style-type: none"> - Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan klien dan lingkungan klien <p>Hasil: Perawat mencuci tangan dengan 6 langkah. Tangan perawat dalam keadaan bersih</p> </p>	<p>Fatiha Izza Tuslamia</p>
4	1	<p>Selasa, 7 Desember 2021</p> <p>07.30 WITA</p>	<p>Terapi Relaksasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan <p>Hasil: Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot baik, frekuensi nadi 87x/menit, tekanan darah 144/95 mmHg dan suhu 36,5°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor respon terhadap terapi relaksasi <p>Hasil: Klien bersedia diberikan terapi relaksasi (<i>green color breathing therapy</i>)</p>	<p>Fatiha Izza Tuslamia</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman Hasil: Suhu AC dalam kamar diatur sesuai dengan kebutuhan pasien, lingkungan tenang. Pencahayaan cukup - Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama Hasil: Klien memberi respon dengan baik dan mendengarkan arahan • Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi (<i>green color breathing therapy</i>) Hasil: Klien dan keluarga mengatakan paham mengenai jenis relaksasi (<i>green color breathing therapy</i>) - Menjelaskan secara rinci intervensi yang dipilih Hasil: Klien dan keluarga mengatakan mengetahui prosedur teknik relaksasi (<i>green color breathing therapy</i>) untuk menurunkan ansietas setelah diberikan penjelasan - Menganjurkan mengambil posisi nyaman Hasil: Klien dalam posisi semi-fowler - Menganjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi Hasil: Klien tampak memejamkan mata dan meletakkan tangan kanannya di dada sedangkan tangan kirinya di bagian perut sambil melakukan relaksasi napas dalam - Mendemonstrasikan dan latih teknik relaksasi Hasil: Klien mengikuti perawat melakukan relaksasi napas dalam sambil membayangkan dirinya berada di suatu tempat yang indah sembari melakukan <i>green color breathing therapy</i> 	
5	2	Selasa, 7 Desember 2021 07.40 WITA	Manajemen Energi <ul style="list-style-type: none"> • Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor pola dan jam tidur Hasil: Lama Tidur Siang : Sebelum dirawat di RS, klien mengatakan tidur pada siang hari \pm 1 jam. Saat dikaji, klien mengatakan lama tidur siangnya \pm 1-2 jam 	Fatiha Izza Tuslamia

			<p>Lama Tidur Malam : Klien mengatakan tidurnya pada malam hari sebelum dirawat di RS \pm 7 jam. Klien tidur pukul 02.00 dini hari dan selalu terbangun pukul 06.00 pagi. Saat dikaji, klien tidur pukul 21.00 malam dan bangun pukul 05.30 subuh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan latihan rentang gerak pasif dan atau/ aktif <p>Hasil: Klien melakukan ROM pasif pada anggota gerak bagian atas dan bagian bawah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur <p>Hasil: Klien dibantu ke sisi tempat tidur. Klien dalam keadaan duduk di sisi tempat tidur</p>	
6	3	<p>Selasa, 7 Desember 2021</p> <p>08.10 WITA</p>	<p>Pencegahan Infeksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Hasil: Terdapat luka post OP pada dada bagian tengah Terdapat luka post OP pada tungkai bagian kanan Hasil Laboratorium Patologi Klinik: Anemia, Leukositosis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Membatasi jumlah pengunjung <p>Hasil: Memberitahukan kepada pasien dan keluarga untuk membatasi jumlah pengunjung. Klien hanya dijaga istrinya di kamar perawatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan klien dan lingkungan klien <p>Hasil: Perawat mencuci tangan dengan 6 langkah. Tangan perawat dalam keadaan bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Ajarkan cara mencuci tangan yang benar <p>Hasil: Perawat mengajarkan cara mencuci tangan dengan 6 langkah. Klien dan keluarga klien mengikuti perawat</p>	<p>Fatiha Izza Tuslamia</p>
7	1	<p>Rabu, 8 Desember 2021</p>	<p>Terapi Relaksasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan 	<p>Fatiha Izza Tuslamia</p>

		08.30 WITA	<p>Hasil: Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot baik, frekuensi nadi 88x/menit, tekanan darah 139/98 mmHg dan suhu 36,3°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor respon terhadap terapi relaksasi <p>Hasil: Klien bersedia diberikan terapi relaksasi (<i>green color breathing therapy</i>)</p> <p>• Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman <p>Hasil: Suhu AC dalam kamar diatur sesuai dengan kebutuhan pasien, lingkungan tenang. Pencahayaan cukup <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama <p>Hasil: Klien memberi respon dengan baik dan mendengarkan arahan</p> <p>• Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan mengambil posisi nyaman <p>Hasil: Klien dalam posisi semi-fowler <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi <p>Hasil: Klien tampak memejamkan mata dan meletakkan tangan kanannya di dada sedangkan tangan kirinya di bagian perut sambil melakukan relaksasi napas dalam <ul style="list-style-type: none"> - Mendemonstrasikan dan latih teknik relaksasi <p>Hasil: Klien mengikuti perawat melakukan relaksasi napas dalam sambil membayangkan dirinya berada di suatu tempat yang indah sembari melakukan <i>green color breathing therapy</i></p> </p></p></p>	
8	2	Rabu, 8 Desember 2021 08.50 WITA	<p>Manajemen Energi</p> <p>• Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor pola dan jam tidur <p>Hasil: Lama Tidur Siang : Sebelum dirawat di RS, klien mengatakan tidur pada siang hari ± 1 jam. Saat dikaji, klien mengatakan lama tidur siangnya ± 1-2 jam Lama Tidur Malam : Klien mengatakan tidurnya pada malam hari sebelum dirawat di RS ± 7 jam. Klien tidur</p>	Fatiha Izza Tuslamia

			<p>pukul 02.00 dini hari dan selalu terbangun pukul 06.00 pagi. Saat dikaji, klien tidur pukul 21.00 malam dan bangun pukul 05.30 subuh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan latihan rentang gerak pasif dan atau/ aktif Hasil: Klien melakukan ROM aktif pada anggota gerak bagian atas dan bagian bawah - Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur Hasil: Klien tidak dibantu ke sisi tempat tidur. Klien dalam keadaan duduk di sisi tempat tidur • Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap Hasil: Klien mengatakan akan mengulangi latihan 2x sehari, pada pagi dan sore hari. Klien tampak menganggukkan kepala 	
9	3	<p>Rabu, 8 Desember 2021</p> <p>09.00 WITA</p>	<p>Pencegahan Infeksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil: Terdapat luka post OP pada dada bagian tengah Terdapat luka post OP pada tungkai bagian kanan Hasil Laboratorium Patologi Klinik: Anemia, Leukositosis • Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan klien dan lingkungan klien Hasil: Perawat mencuci tangan dengan 6 langkah. Tangan perawat dalam keadaan bersih • Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi Hasil: Klien dianjurkan untuk menghabiskan makanan yang diberikan oleh bagian gizi secara perlahan-lahan/sedikit-sedikit, namun dihabiskan 	<p>Fatiha Izza Tuslamia</p>

4.6 Evaluasi Keperawatan

Tabel 25 Evaluasi Keperawatan

No	No. DX. Kep	Waktu	Evaluasi (SOAP)	Nama Jelas
1	1	Senin, 6 Desember 2021 11.10 WITA	S: Klien merasa cemas sejak selesai dioperasi Klien mengeluh khawatir dan takut jika ada masalah pada luka operasinya Klien merasa takut bergerak setelah operasi karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada luka operasinya O: Klien tampak tegang Skor HARS 15 TD : 147/96 mmHg Terdapat luka post OP A: Ansietas belum teratasi P: Pertahankan intervensi 1, lanjutkan intervensi 2 dan 3	Fatiha Izza Tuslamia
2	2	Senin, 6 Desember 2021 11.30 WITA	S: Klien mengatakan aktivitasnya dibantu sebagian Klien mengatakan menggunakan brankar Klien merasa lemas Klien mengatakan agak sulit menggerakkan kedua ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya Klien mengatakan gerakan kedua tangan dan kakinya terbatas Klien mengatakan tidak mampu melaksanakan aktivitas secara mandiri Klien merasa lemah Klien mengatakan hanya bisa berbaring dan duduk di atas tempat tidur O: Klien tampak lemah A: Intoleransi Aktivitas belum teratasi P: Pertahankan intervensi 1, lanjutkan intervensi 2	Fatiha Izza Tuslamia
3	3	Senin, 6 Desember 2021 11.40 WITA	S: Klien mengatakan telah menjalani operasi CABG sejak 6 hari yang lalu O: Terdapat luka post OP pada dada bagian tengah Terdapat luka post OP pada tungkai bagian kanan Hasil Laboratorium Patologi Klinik: Leukositosis A: Risiko Infeksi belum teratasi P: Pertahankan intervensi 1 dan 2, lanjutkan intervensi 3	Fatiha Izza Tuslamia
4	1	Selasa, 7 Desember 2021	S: Klien masih merasa cemas sejak selesai dioperasi Klien masih merasa khawatir jika ada masalah pada luka operasinya Klien masih merasa takut bergerak setelah operasi	Fatiha Izza Tuslamia

		08.00 WITA	O: Klien masih tampak tegang Skor HARS 14 TD : 140/92 mmHg Terdapat luka post OP A: Ansietas teratasi sebagian P: Pertahankan intervensi 1, 2 dan 3	
5	2	Selasa, 7 Desember 2021 08.05 WITA	S: Klien mengatakan aktivitasnya masih dibantu sebagian Klien mengatakan sudah mampu BAB di WC Klien sudah tidak merasa lemas Klien mengatakan mulai aktif menggerakkan kedua ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya Klien mengatakan gerakan kedua tangan dan kakinya Terasa bebas Klien mengatakan mulai mampu melaksanakan aktivitas secara mandiri Klien sudah tidak merasa lemah O: Klien mulai mampu bergerak secara bebas A: Intoleransi Aktivitas teratasi sebagian P: Pertahankan intervensi 1 dan 2	Fatiha Izza Tuslamia
6	3	Selasa, 7 Desember 2021 08.30 WITA	S: Klien mengatakan telah menjalani operasi CABG sejak 7 hari yang lalu O: Terdapat luka post OP pada dada bagian tengah Terdapat luka post OP pada tungkai bagian kanan Hasil Laboratorium Patologi Klinik: Leukositosis A: Risiko Infeksi belum teratasi P: Pertahankan intervensi 1, 2 dan 3	Fatiha Izza Tuslamia
7	1	Rabu, 8 Desember 2021 08.40 WITA	S: Klien merasa sudah tidak terlalu cemas Klien mengatakan sudah tidak terlalu khawatir dan takut pada luka operasinya Klien mengatakan sudah tidak terlalu takut bergerak setelah operasi O: Klien tampak rileks Skor HARS 9 TD : 138/87 mmHg Terdapat luka post OP A: Ansietas teratasi P: Hentikan intervensi	Fatiha Izza Tuslamia
8	2	Rabu, 8 Desember 2021 08.55 WITA	S: Klien mengatakan aktivitasnya masih dibantu sebagian Klien mengatakan sudah mampu BAB di WC Klien sudah tidak merasa lemas Klien mengatakan aktif menggerakkan kedua ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya Klien mengatakan gerakan kedua tangan dan kakinya terasa bebas Klien mengatakan mampu melaksanakan sebagian aktivitas secara mandiri	Fatiha Izza Tuslamia

			<p>Klien sudah tidak merasa lemah</p> <p>O: Klien mampu menggerakkan kedua ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya secara bebas</p> <p>A: Intoleransi Aktivitas teratasi sebagian</p> <p>P: Pertahankan intervensi 1 dan 2</p>	
9	3	<p>Rabu, 8 Desember 2021</p> <p>09.10</p> <p>WITA</p>	<p>S: Klien mengatakan telah menjalani operasi CABG sejak 8 hari yang lalu</p> <p>O: Terdapat luka post OP pada dada bagian tengah Terdapat luka post OP pada tungkai bagian kanan</p> <p>Hasil Laboratorium Patologi Klinik: Leukositosis</p> <p>A: Risiko Infeksi belum teratasi</p> <p>P: Pertahankan intervensi 1, 2 dan 3</p>	<p>Fatiha Izza Tuslamia</p>



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan

Pada laporan akhir kasus ini pasien mengalami *Coronary Artery Disease (CAD)* disertai dengan ansietas (kecemasan) *Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)*. Terdapat luka post OP yakni pada dada bagian tengah dan pada tungkai bagian kanan.

Penelitian syntax berusaha memberikan bukti yang diperlukan untuk menentukan pilihan terapi terbaik dalam hal strategi revaskularisasi (CABG atau PCI) bagi pasien-pasien CAD. Salah satu kesimpulan dari studi ini adalah CABG masih merupakan pilihan terapi terbaik untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner *three-vessel* atau *left main* (Antara et al., 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan Awaludin et al. (2018) menjelaskan bahwa pasien post CABG mengalami perubahan dalam memandang kualitas hidupnya. Kecemasan dapat menjadi hambatan penyesuaian psikologis pada pasien jantung dan akan menghambat pemulihan fisik sehingga dapat berdampak pada kualitas hidup pasiennya.

Hasil pengkajian yang didapatkan pasien mengalami hipertensi dengan tekanan darah 150/97 mmHg, hasil laboratorium menunjukkan klien mengalami anemia, leukositosis, hyponatremia. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Muthmainnah (2019) bahwa salah satu faktor risiko PJK ialah faktor risiko yang dapat diubah (*modifiable*) yaitu hipertensi.

Setelah dilakukan tindakan Angiography Koroner didapatkan hasil bahwa klien mengalami *Coronary Artery Disease 1 Vessel Disease + Critical Left Main Disease*. Hastuti & Mulyani (2019) membagi arteri koroner menjadi dua bagian yaitu arteri koroner kiri atau *Left Main (LM)* dan arteri koroner kanan atau *Right Coronary Artery (RCA)*. Arteri koroner kiri atau LM memiliki dua cabang yaitu *Left Anterior Descendens (LAD)* untuk memperdarahi dinding anterior ventrikel kiri dan *Left Circumflex (LCX)* untuk memperdarahi dinding lateral ventrikel.

Keluhan utama yang disampaikan oleh pasien setelah menjalani operasi CABG sejak 6 hari lalu adalah merasa cemas sejak selesai dioperasi, mengeluh khawatir dan takut jika ada masalah pada luka operasinya. Klien merasa takut bergerak karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada luka operasinya. Klien tampak tegang dan lemah. Diperoleh skor HARS 15.

Pasien yang sakit post CABG memiliki kecemasan yang tinggi yang terkadang bisa berlanjut hingga ke depresi. Menurunnya kemampuan fisik dan sosial mampu memengaruhi kemampuan emosional juga secara tidak langsung. Fokus perawatan post CABG pada bulan pertama adalah masalah fisik dan emosi serta berfokus pada membangun toleransi untuk aktivitas sehari-hari (Awaludin et al., 2018).

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan utama pada kasus di atas adalah ansietas. Masalah ini didapatkan pada saat selesai pengkajian pada pasien saat dirawat di Kamar 412 PJT Lt. 4 RSUP Dr. Wahidin Soedirohusodo dengan data

terdapat luka post OP, klien tampak tegang, skor HARS 15, tekanan darah 150/97 mmHg, hasil Pemeriksaan Radiologi (Foto Thorax): Atherosclerosis aortae, laporan tindakan Angiography Koroner: Coronary Artery Disease 1 Vessel Disease + Critical Left Main Disease. Klien merasa cemas sejak selesai dioperasi, mengeluh khawatir dan takut jika ada masalah pada luka operasinya, merasa takut bergerak setelah operasi karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada luka operasinya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Brunner & Suddarth (2014) bahwa diagnosis keperawatan yang biasanya muncul pada pasien dengan kasus *CAD Post CABG* salah satunya adalah ansietas. Tanda dan gejalanya yang dialami oleh klien pun diperkuat oleh buku Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016) bahwa gejala dan tanda mayor subjektif ansietas salah satunya adalah merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi, gejala dan tanda mayor objektif seperti tampak tegang. Kemudian gejala dan tanda minor objektif salah satunya adalah tekanan darah meningkat.

Definisi ansietas bersumber dari buku Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016) adalah kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Penyebabnya meliputi krisis situasional, kebutuhan tidak terpenuhi, krisis maturasional, ancaman terhadap konsep diri, ancaman terhadap kematian, kekhawatiran mengalami kegagalan dan kurang terpapar informasi.

5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan

Pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani penyakit seperti kasus di atas yaitu teori *comfort* Kolcaba. Kolcaba berasumsi bahwa pada dasarnya semua manusia membutuhkan kenyamanan sebagai kebutuhan dasar. Bukan hanya tentang kenyamanan fisik, namun juga kenyamanan psikospiritual, sosiokultural dan lingkungan (Alligood, 2017).

Kenyamanan psikospiritual berhubungan dengan ketenangan jiwa dan keharmonisan hati. Kolcaba memandang bahwa teori kenyamanan menjadi salah satu pilihan teori keperawatan yang dapat diaplikasikan langsung di lapangan karena bersifat universal dan tidak terhalang budaya masyarakat (Kolcaba & DiMarco, 2005).

Sesuai dengan teori Kolcaba, kondisi pasien pada kasus di atas perlu dipenuhi kebutuhan akan kenyamanan psikospiritualnya dimana pasien berada dalam perasaan tidak nyaman, takut dan khawatir untuk melakukan aktivitas dalam rangka mobilisasi dini post CABG, sehingga perawat memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan akan kenyamanan psikospiritualnya.

Teori fisiologis penyebab kecemasan menurut Guyton dalam Stuart (2016) menyatakan bahwa respon emosional mengaktifasi amygdala yang merupakan bagian dari sistem limbik yang berhubungan dengan komponen emosional dari otak. Respon emosional yang timbul ditahan oleh input dari pusat yang lebih tinggi di forebrain. Respon neurologis dari amygdala ditransmisikan dan menstimulasi respon hormonal dari hipotalamus. Hipotalamus akan melepaskan hormon CRF (*Corticotropin-Releasing Factor*)

yang menstimulasi hipofisis untuk melepaskan hormon lain yaitu ACTH (*Adrenocorticotropic Hormone*) ke dalam darah. ACTH sebagai gantinya menstimulasi kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol, suatu kelenjar kecil yang berada di atas ginjal. Semakin berat kecemasan, kelenjar adrenal akan menghasilkan kortisol semakin banyak dan menekan sistem imun.

Menurut Ganong dalam Stuart (2016) reaksi takut dapat terjadi melalui perangsangan hipotalamus dan nuclei amygdaloid yang bekerja menekan memori-memori yang memutuskan rasa takut masuknya sensorik aferent yang memicu respon takut terkondisi berjalan langsung dengan peningkatan aliran darah bilateral ke berbagai bagian ujung anterior kedua sisi lobus temporalis. Sistem saraf otonom yang mengendalikan berbagai otot dan kelenjar tubuh. Pada saat pikiran dijangkiti rasa takut, sistem saraf otonom menyebabkan tubuh bereaksi secara mendalam, jantung berdetak lebih keras, nadi dan nafas bergerak meningkat, biji mata membesar, proses pencernaan dan yang berhubungan dengan usus berhenti, pembuluh darah mengerut, tekanan darah meningkat, kelenjar adrenal melepas adrenalin ke dalam darah. Akhirnya, darah dialirkan ke seluruh tubuh sehingga menjadi tegang.

Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi ansietas bersumber dari buku Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018) salah satunya adalah terapi relaksasi. Terapi relaksasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *green color breathing therapy* sesuai dengan penelitian Suli et al (2019).

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan

Pemberian *green color breathing therapy* dilakukan selama 3 hari pada tanggal 6-8 Desember 2021 di Kamar 412 Lantai 4 Gedung Pusat Jantung Terpadu RSUP Dr. Wahidin Soedirohusodo Makassar dan didapatkan hasil:


Tabel 26 Analisis Implementasi Keperawatan

Hari ke-1 tgl 6-12-2021/ pkl. 11.00 WITA	Sebelum dilakukan tindakan <i>green color breathing therapy</i> terlebih dahulu pasien diobservasi dengan mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif, memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan, memonitor respon terhadap terapi relaksasi. Didapatkan hasil: klien mengatakan merasa lemas dan lemah, klien menjawab dengan baik setiap pertanyaan saat dikaji. Klien merasa cemas sejak selesai dioperasi, klien mengeluh khawatir dan takut jika ada masalah pada luka operasinya, klien merasa takut bergerak setelah operasi karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada luka operasinya. Klien kooperatif, namun tampak tegang, skor HARS 15. Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot baik, frekuensi nadi 90x/menit, tekanan darah 150/97 mmHg dan suhu 36,5°C. Klien bersedia diberikan terapi relaksasi (<i>green color breathing therapy</i>).
Hari ke-2 tgl 7-12-2021/pkl. 07.30 WITA	Sebelum dilakukan <i>green color breathing therapy</i> terlebih dahulu pasien diobservasi dengan memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan serta memonitor respon terhadap terapi relaksasi. Didapatkan hasil: sebelum latihan didapatkan kekuatan otot baik, frekuensi nadi 87x/menit, tekanan darah 144/95 mmHg dan suhu 36,5°C. Klien bersedia diberikan terapi relaksasi (<i>green color breathing therapy</i>). Dilakukan tindakan terapeutik dengan mengatur suhu AC dalam kamar sesuai dengan kebutuhan pasien, menciptakan lingkungan tenang dan pencahayaan yang cukup. Diberikan pula edukasi kepada klien dan keluarga dengan menjelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi (<i>green color breathing therapy</i>) untuk menurunkan ansietas. Kemudian klien dianjurkan mengambil posisi nyaman, rileks dan merasakan sensasi relaksasi serta mendemonstrasikan dan melatih teknik relaksasi (<i>green color breathing therapy</i>). Didapatkan hasil: klien masih merasa cemas sejak selesai dioperasi dan masih merasa khawatir jika ada masalah pada luka operasinya. Klien masih merasa takut

	bergerak setelah operasi namun sudah tidak terlalu tegang, skor HARS 14 dan tekanan darah 140/92 mmHg.
Hari ke-3 tgl 8-12-2021/pkl. 08.30 WITA	Sebelum dilakukan <i>green color breathing therapy</i> terlebih dahulu pasien diobservasi dengan memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan serta memonitor respon terhadap terapi relaksasi. Didapatkan hasil: sebelum latihan didapatkan kekuatan otot baik, frekuensi nadi 88x/menit, tekanan darah 139/98 mmHg dan suhu 36,3°C. Klien bersedia diberikan terapi relaksasi (<i>green color breathing therapy</i>). Dilakukan tindakan terapeutik dengan mengatur suhu AC dalam kamar sesuai dengan kebutuhan pasien, menciptakan lingkungan tenang dan pencahayaan yang cukup. Diberikan pula edukasi kepada klien dan keluarga dengan menjelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi (<i>green color breathing therapy</i>) untuk menurunkan ansietas. Kemudian klien dianjurkan mengambil posisi nyaman, rileks dan merasakan sensasi relaksasi serta mendemonstrasikan dan melatih teknik relaksasi (<i>green color breathing therapy</i>). Didapatkan hasil: klien merasa sudah tidak terlalu cemas, klien mengatakan sudah tidak terlalu khawatir dan takut pada luka operasinya, klien mengatakan sudah tidak terlalu takut bergerak setelah operasi. Klien tampak rileks, skor HARS 9 dan tekanan darah 138/87 mmHg.

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan

Selama pemberian intervensi teknik relaksasi (*green color breathing therapy*) didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan tingkat ansietas yang dirasakan oleh pasien yang diukur menggunakan kuesioner HARS dari skor awal 15 di hari pertama, setelah diberikan intervensi di hari kedua menjadi skor 14 dan hari ketiga menjadi skor 9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik relaksasi (*green color breathing therapy*) efektif menurunkan ansietas pada pasien CAD post CABG.



Gambar 3 Grafik Skor Skala HARS

5.2 Analisis Evidence Based Practice in Nursing

Tindakan keperawatan utama yang diberikan pada ansietas adalah terapi relaksasi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) dengan melakukan *green color breathing therapy*. Selama pemberian intervensi teknik relaksasi (*green color breathing therapy*) didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan tingkat ansietas yang dirasakan oleh pasien yang diukur menggunakan kuesioner HARS dari skor awal 15 di hari pertama, setelah diberikan intervensi di hari kedua menjadi skor 14 dan hari ketiga menjadi skor 9.

Andriyani & Virahaju (2019) mengemukakan bahwa retina merupakan reseptor permukaan untuk informasi visual, merupakan bagian dari otak meskipun secara fisik terletak di perifer dari sistem saraf pusat (SSP).

Komponen utama retina adalah sel-sel reseptor sensoris atau fotoreseptor dan beberapa jenis neuron dari jaras penglihatan. Lapisan terdalam (neuron pertama) retina mengandung fotoreseptor (sel batang dan sel kerucut) dan dua lapisan yang lebih superfisia mengandung neuron bipolar (lapisan neuron kedua) serta sel-sel ganglion (lapisan neuron ketiga). Semua cahaya yang masuk ke mata direduksi menjadi 3 komponen RGB (*Red, Green, Blue*) selanjutnya ketiga warna

dikirim ke otak melalui 3 chanel yaitu *red-green channel*, *blue-yellow channel* dan *black-white channel*.

Muharyani et al. (2020) menambahkan bahwa jalur utama dari mekanisme transmisi warna menuju sistem limbik dan sistem endokrin adalah *Retinohypothalamic tract* yang merupakan salah satu jalur dimana hipotalamus menghubungkan sistem saraf dengan *Autonomic Nervous System (ANS)* dan sistem endokrin. Terapi warna hijau akan merangsang pelepasan serotonin. Serotonin disekresikan oleh nukleus yang berasal dari medial batang otak dan berproyeksi di sebagian besar daerah otak, khususnya yang menuju radiks dorsalis medula spinalis dan hipotalamus. Setelah dilepaskan, serotonin mampu mengaktifkan reseptor serotonin pre-sinaps maupun post-sinaps kemudian terjadi peningkatan kadar serotonin dalam tubuh yang akan dapat meningkatkan *mood* seseorang sehingga dapat menciptakan rasa bahagia dan menurunkan stres. Salah satu peran penting serotonin dalam kondisi normal adalah mengatur status mood dan serotonin merupakan hormon yang dapat membuat seseorang merasa senang.

Adapun hormon lain yang dirangsang oleh hipotalamus adalah oksitosin. Oksitosin dibuat di *magnocellular neurosecretory cells* di supraoptik dan nukleus paraventricular. Oksitosin dapat menginduksi anti stres serta memberikan efek dalam penurunan tekanan darah dan kadar kortisol. Tingkat oksitosin berhubungan dengan kecemasan dan stres secara dua arah, yaitu oksitosin memberikan efek ansiolitik dan juga dirilis dalam respon terhadap stres. Pemberian terapi warna hijau dapat meningkatkan kadar oksitosin dalam darah, sehingga efek ansiolitik yang dikeluarkan dapat menurunkan kecemasan. Perubahan kadar zat kimia saraf dan

neurohormon tersebut memiliki pengaruh ataupun peranan penting dalam menurunkan kecemasan seseorang (Muharyani et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Jatnika et al. (2019) menjelaskan bahwa mekanisme penggunaan terapi warna dalam menurunkan tekanan darah telah diketahui melalui perangsangan saraf parasimpatis yang lebih dominan sehingga enzim renin yang dihasilkan ginjal tidak akan diproduksi, terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah akan dapat dihindari, yang mana jika terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah ini dapat dicegah, maka tekanan darah dapat menurun.

Warna merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang mampu menciptakan sesuatu untuk manfaat kehidupan manusia. Ia juga merupakan rahasia kebesaran Allah bagi yang mau mengambil pelajaran. Tidak dinafikkan lagi, warna mampu memberi kesan kepada manusia seperti emosi dan peningkatan memori seseorang (Razali, 2019).

Warna hijau secara khususnya dikatakan warna yang mampu memberikan ketenangan kepada pandangan mata, seperti warna tumbuh-tumbuhan yang sudah disebutkan dalam surah al-A'am/6:99.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ
وَالزَّيْتُونِ وَالرَّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami

menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman” (Q.S. Al-An’am:99).

Selain itu, warna hijau juga menyentuh tentang kehidupan di akhirat seperti nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Swt untuk ahli surga seperti warna pakaian, bantal, serta pohon yang subur menghijau khusus untuk ahli surga, yang Allah Swt sampaikan dalam Q.S. al-Kahfi/19:31 dan Q.S. ar-Rahman/55:76.

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ
نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

Terjemahnya:

“Mereka itulah yang memperoleh surga ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Dalam surga itu) mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Mereka duduk-duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. (Itulah) sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah” (Q.S. Al-Kahfi:31).

مُتَّكِنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

Terjemahnya:

“Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah” (Q.S. Ar-Rahman:76).

Berdasarkan tafsir Kemenag RI yang dikutip dalam fitur *Qur’an Kemenag in Microsoft Word*, ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa warna hijau digunakan di dalam ayat al-Qur’an untuk memberikan gambaran mengenai nikmat-nikmat yang dikaruniakan buat manusia di dunia dan juga khusus buat ahli surga. Allah Swt menyifatkan pakaian, bantal dan pohon ahli surga dengan warna khusus

yaitu warna hijau kerana merupakan warna yang disukai oleh manusia disebabkan sifatnya yang memberikan kerehatan dan ketenangan bagi pandangan manusia.

Hidayat (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa para mufassir mengambil alasan surga memakai simbol dengan warna hijau dikarenakan hijau mempunyai ciri khas sebagai warna yang memberikan sebuah kesuburan, tenang dan kesucian. Alhasil ayat-ayat tersebut menggambarkan sebuah kenikmatan, kemegahan dan kebahagiaan bagi penghuni surga kelak.

Terungkap dalam sejumlah literatur bahwa Rasulullah SAW sangat menyukai warna hijau. Hal ini menunjukkan bahwa warna hijau termasuk warna istimewa sebagaimana filosofisnya yang penuh makna. Ibnu Hajar dalam *Tanbih al-Akhhbar* menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan agar berpakaian warna hijau pada hari raya karena warna ini adalah yang sangat afdal setelah warna putih. Dalam riwayat lainnya oleh an-Nasai disebutkan bahwa Rasulullah senang memakai dua pakaian (atas dan bawah) yang berwarna hijau (Hidayat, 2020).

Annas bin Malik menegaskan bahwa warna yang sangat diminati Rasulullah SAW adalah hijau. Selain itu, Kubah masjid Nabawi juga berwarna hijau. Simbol-simbol keislaman di seluruh dunia adalah berwarna hijau (Hidayat, 2020).

5.3 Keterbatasan

Pernapasan warna merupakan pengkombinasian antara teknik relaksasi nafas dalam, *guide imaginary* dan warna. Pernafasan yang lambat dan terfokus membantu mengubah udara menjadi energi positif (Suwandi et al., 2018).

Menciptakan lingkungan yang nyaman dilakukan pada pemberian tiap intervensi. Hal ini sesuai dengan pendapat Jatmiko (2016) yang menyatakan bahwa stimulus dari lingkungan akan dinilai oleh individu, dimana dalam penilaian ini akan memunculkan reaksi dan sebagai hasilnya jika individu dapat mengatasi stimulus yang datang dari lingkungan akan tercipta suatu kondisi, kondisi tersebut dapat berupa adaptasi (menoleransi lingkungan) atau *adjustment* (individu mengubah lingkungan agar sesuai dengannya). Sebaliknya, jika individu gagal dalam mengatasi stimulus yang datang akan terjadi kecemasan dan lain sebagainya.

Hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Kolcaba, dimana dikatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari manusia dan lingkungan. Individu berbeda dalam bagaimana mereka mengelola keberlangsungannya dengan lingkungan, hari perhari, jam perjam dan ada alasan untuk percaya bahwa perbedaan-perbedaan ini memiliki banyak hubungan dengan kualitas keseluruhan penyesuaian mereka, termasuk kesehatan mereka atau penyakit moral dan fungsi adaptif (Jatmiko, 2016).

Dengan melakukan napas dalam secara perlahan, tubuh menjadi rileks. Perasaan rileks akan diteruskan ke hipotalamus untuk menghasilkan *Corticotropin Releasing Factor (CRF)*. Selanjutnya CRF merangsang kelenjar pituitary yang menghasilkan endorfin sehingga menjadi rileks (Smeltzer & Bare, 2013).

Teknik relaksasi yang dilakukan dengan rutin akan meningkatkan produksi hormon 'kebahagiaan' (betaendorfin) sehingga pasien akan merasakan kondisi yang nyaman, perasaan tenang dan rileks yang pada akhirnya kecemasan pasien dapat berkurang (Safitri & Agustin, 2020).

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pemberian intervensi pada pasien CAD post CABG dengan masalah ansietas mulai teratasi dengan teknik non farmakologi yaitu pemberian *green color breath therapy* selama 3 hari, maka masalah yang terjadi dapat teratasi dengan hasil:

6.1.1 Keluhan ansietas menurun ditandai dengan:

- a. Hari ke-1 : tanggal 6 Desember 2021 jam 11.00 WITA, didapatkan hasil: klien mengatakan merasa lemas dan lemah, klien menjawab dengan baik setiap pertanyaan saat dikaji. Klien merasa cemas sejak selesai dioperasi, klien mengeluh khawatir dan takut jika ada masalah pada luka operasinya, klien merasa takut bergerak setelah operasi karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada luka operasinya. Klien kooperatif, namun tampak tegang, skor HARS 15. Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot baik, frekuensi nadi 90x/menit, tekanan darah 150/97 mmHg dan suhu 36,5°C. Klien bersedia diberikan terapi relaksasi (*green color breathing therapy*).
- b. Hari ke-2 : tanggal 7 Desember 2021 jam 07.30 WITA, didapatkan hasil: sebelum latihan didapatkan kekuatan otot baik, frekuensi nadi 87x/menit, tekanan darah 144/95 mmHg dan suhu 36,5°C. Klien bersedia diberikan terapi relaksasi (*green color breathing therapy*). Setelah diberikan teknik relaksasi (*green color breathing therapy*)

didapatkan hasil: klien masih merasa cemas sejak selesai dioperasi dan masih merasa khawatir jika ada masalah pada luka operasinya. Klien masih merasa takut bergerak setelah operasi namun sudah tidak terlalu tegang, skor HARS 14 dan tekanan darah 140/92 mmHg.

c. Hari ke-3 : tanggal 8 Desember 2021 jam 08.30 WITA, didapatkan hasil: sebelum latihan didapatkan kekuatan otot baik, frekuensi nadi 88x/menit, tekanan darah 139/98 mmHg dan suhu 36,3°C. Klien bersedia diberikan terapi relaksasi (*green color breathing therapy*). Setelah diberikan teknik relaksasi (*green color breathing therapy*) didapatkan hasil: klien merasa sudah tidak terlalu cemas, sudah tidak terlalu khawatir dan takut pada luka operasinya serta sudah tidak terlalu merasa takut bergerak setelah operasi. Klien tampak rileks, skor HARS 9 dan tekanan darah 138/87 mmHg.

6.1.2 Terdapat perbedaan tingkat ansietas yang dirasakan oleh pasien dari skor HARS 15, setelah diberikan intervensi di hari kedua skor HARS menjadi skala 14 dan hari ketiga menjadi 9.

6.1.3 Intervensi teknik relaksasi (*green color breathing therapy*) efektif dalam menurunkan kecemasan pada pasien CAD post CABG.

6.1.4 Intervensi ini sekaligus dapat mengatasi 2 masalah yang ada yaitu ansietas dan hipertensi yang diakibatkan ansietas yang dirasakan pasien.

Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan intervensi yang dilakukan berhasil memperbaiki keadaan pasien dan mengatasi masalah yang ada pada pasien.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Profesi Keperawatan

Penulisan karya akhir ini bisa dijadikan bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologi.

6.2.2 Bagi Pelayanan Rumah Sakit

Penulisan karya akhir ini menjadi masukan bagi bidang keperawatan dan para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien CAD post CABG dengan masalah ansietas dan melihat keefektifan pemberian *green color breathing therapy* dalam mengatasi ansietas. Rumah Sakit dapat memberikan nuansa hijau pada tembok ataupun gorden ruang perawatan.

6.2.3 Bagi Institusi Pendidikan

Penulisan karya akhir ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien CAD post CABG. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan kasus yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Alligood, M. R. (2017). *Pakar Teori Keperawatan dan Karya Mereka Edisi 8 Volume 1 (Penerjemah, Achir Yani dan Kusman Ibrahim)*. Singapore: Elsevier.
- Alligood, M. R., & Tomey, A. M. (2014). *Nursing Theorists and Their Work*. In *Contemporary Nurse (8th ed.)*. Missouri: Mosby.
- Amanda, T. . (2019). *Asuhan Keperawatan pada Klien Gagal Jantung Congestive dengan Masalah Keperawatan Intoleransi Aktivitas*. Jombang: Insan Cendekia Medika.
- Andriyani, A., & Virahaju, M. V. (2019). KOMBINASI TERAPI WARNA HIJAU, AROMATERAPI LAVENDER, DAN MUSIK UNTUK MENURUNKAN NYERI DAN KECEMASAN PERSALINAN. *Media Ilmu Kesehatan*, 8(1), 53–63.
- Annisa, D. F., & Ifdil. (2016). Konsep Kecemasan (Anxiety) pada Lanjut Usia (Lansia). *Konselor*, 5(2), 93. <https://doi.org/10.24036/02016526480-0-00>
- Antara, I. M. P. S., Yuniadi, Y., & Siswanto, B. B. (2019). Laporan Kasus Intervensi penyakit jantung koroner dengan Sindroma Gagal Jantung. *Jurnal Kardiologi Indonesia*, 30(1), 32–37.
- Awaludin, S., A, A. C. N., & Sekarwati, W. (2018). HUBUNGAN KECEMASAN DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN POST CORONARY ARTERY BAYPASS GRAFT (CABG) DI RUANG REHABILITASI JANTUNG RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 1(1), 243–247.
- Black, J., & Hawks, J. (2014). *Keperawatan Medikal Bedah: Manajemen Klinis untuk Hasil yang Diharapkan*. Dialihbahasakan oleh Nampira R. Jakarta: Salemba Emban Patria.

- Brunner & Suddarth. (2014). *Keperawatan Medikal-Bedah (12th Ed.; Eka Anisa Mardela, Ed.)*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Chia, C., Gray, S. Y. W., & Ching, S. M. (2013). Validation Of The Framingham General Cardiovascular Risk Score In A Multiethnic Asian Population: A Retrospective Cohort Study. *Bmj Open*, Pp.1-7.
- Chrisnawati, G., & Aldino, T. (2019). Aplikasi Pengukuran Tingkat Kecemasan Berdasarkan Skala Hars Berbasis Android. *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*, 5(2), 135–138. <https://doi.org/10.31294/jtk.v4i2>
- Fikriana, R. (2018). *Sistem Kardiovaskuler*. Surabaya: CV Budi Utama.
- Habibah, U., Syakurah, R. A., Ikhsan, D. S., Zulissetiana, E. F., & Aini, S. (2021). Depression , Anxiety , and Stress among Students of Sriwijaya University. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(3), 23–35.
- Harahap, M. A., Nurelilasari, & Ritonga, N. (2021). PENGARUH DZIKIR TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN POST OPERATIF BEDAH MAYOR DI RUANG RAWAT BEDAH J. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, 1(1), 45–52.
- Hastuti, Y. D., & Mulyani, E. D. (2019). KECEMASAN PASIEN DENGAN PENYAKIT JANTUNG KORONER PASKA PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION. *Jurnal Perawat Indonesia*, 3(3), 167–174.
- Hidayat, H. (2020). Symbolisasi Warna dalam Al- Qur'an. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 36–50. <https://doi.org/10.24090/maghza.v5i1>.
- Jatmiko, A. (2016). SENSE OF PLACE DAN SOCIAL ANXIETY BAGI MAHASISWA BARU PENDATANG. *Konseli: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 03(2), 217–228.
- Jatnika, G., Rudyana, H., & Simarmata, F. U. B. (2019). Pengaruh Terapi Warna Hijau terhadap Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di RW 3 Wilayah Kerja Puskesmas Cimahi Tengah. *Jurnal Kedokteran Dan*

Kesehatan, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.32539/jkk.v6i1.7232>

Kolcaba, K., & DiMarco, M. (2005). *Comfort Theory and Its Application to Pediatric Nursing*. *Pediatric Nursing*. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022 dari <http://www.pediatricnursing.net>.

Lemone, P. et al. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Gangguan Kardiovaskular Edisi 5*. Jakarta: EGC.

Lisnasari. (2020). Literature Review: Pengaruh Green Color Breathing Therapy terhadap Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi. In *Skripsi*. Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana.

Mabruroh, F., & Syarif, S. (2020). Risiko Stres terhadap Penyakit Jantung Koroner (Analisis Lanjut Studi Kohort Penyakit Tidak Menular): Nested-case control. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 19(3), 120–125. <http://journals.stikim.ac.id/index.php/jikes/article/view/660/503>

Majid, A. (2017). *Penyakit Jantung Koroner, Patofisiologi, Pencegahan, Dan Pengobatan Terkini*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

Mawarti, I., & Yuliana. (2021). Hipnotis Lima Jari pada Klien Ansietas. *JAMBI MEDICAL JOURNAL: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 9(3), 297–304.

Mendra, N. N. Y., Ikawati, Z., & Kristanto, C. S. (2021). Efektivitas dan Keamanan Terapi Benzodiazepin pada Pasien Gangguan Ansietas dengan Riwayat Penyalahgunaan Obat The Efficacy and Safety of Benzodiazepine in Anxiety Disorder Patient with Drug Abuse History. *Jurnal Klinik Farmasi Indonesia*, 10(3). <https://doi.org/10.15416/ijcp.2021.10.3.190>

Muharyani, P. W., Jaji, & Sijabat, A. K. (2020). Pengaruh Terapi Warna Hijau Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Primigravida Trisemester III. *JURNAL KEDOKTERAN DAN KESEHATAN*, 2(1), 105–114.

Muliantino, M. R., Emil, H., Krisdianto, B. F., Sarfika, R., Yesni, M., Sulistyowati, Endang Wahyuningtyas, K., Sucipto, U., Sukarna, R. A., & Prasetyo, E.

- (2021). Hubungan Stressor Dengan Ansietas, Stress Dan Depresi Perawat Terkait Pandemi COVID-19: Cross-Sectional Study. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 6(2), 319–327.
- Muthmainnah, Q. (2019). *Gambaran Faktor Resiko Kejadian Penyakit Jantung Koroner*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Naja, I. L., Wahyuni, S., Rahayu, T., Sultan, I., & Semarang, A. (2021). Pengaruh Kombinasi Terapi Spiritual dan Warna Hijau terhadap Tekanan pada Kehamilan Di Wilayah Puskesmas Bandarharjo Semarang. *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5*, 37–43.
- Pahlawi, R., & Sativani, Z. (2021). Active Cycle Breathing Technique Terhadap Fungsional Paru Pasien Post CABG (Laporan Kasus Berbasis Bukti). *Jurnal Keperawatan Profesional*, 2(1), 1–6.
- Pratiwi, F. W., & Saragi, J. S. (2018). PEMANTAUAN KATETERISASI JANTUNG PADA TINDAKAN PTCA TERHADAP PASIEN CAD. *Jurnal Arsip Kardiovaskular Indonesia (ARKAVI) |*, 03(01), 182–186.
- Prayogi, M. D., Hernawan, B., Herawati, E., & Romadhon, Y. A. (2019). Correlation between Number of Prayer and Anxiety with Cardiovascular Risk in Elderly. *Proceeding Book National Symposium and Workshop Continuing Medical Education XIV, December*, 911–918.
- Purnamarini, D. P. A., Setiawan, T. I., & Hidayat, D. R. (2016). PENGARUH TERAPI EXPRESSIVE WRITING TERHADAP PENURUNAN KECEMASAN SAAT UJIAN SEKOLAH (Studi Kuasi Eksperimen Terhadap Siswa Kelas XI di SMA Negeri 59 Jakarta). *Insight: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.21009/insight.051.06>
- Razali, N. M. (2019). WARNA HIJAU MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN: SATU ANALISISAWAL. *Journal of Ma'alim Al-Quran Wa Al-Sunnah*, 15(1), 14–28.

- Rinaldi, S. F., & Mujiyanto, B. (2017). *Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM): Metodologi Penelitian dan Statistik*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Safitri, W., & Agustin, W. R. (2020). TERAPI GUIDE IMAGERY TERHADAP PENURUNAN KECEMASAN PASIEN PREOPERASI SECTIO CAESAREA. *Jurnal Keperawatan 'Aisyiyah*, 7(1), 31–37.
- Sari, G. N., Aticeh, Hartaty, D., & Ichwan, E. Y. (2018). EFEKTIVITAS VCT DAN TERAPI WARNA DALAM PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN. *JURNAL ILMIAH BIDAN*, 3(2), 37–44.
- Smeltzer & Bare. (2013). *Buku Ajar Keperawatan Medical Bedah Brunner & Suddart (edisi 8)*. Jakarta: EGC.
- Soeharto. (2015). *Serangan Jantung dan Stroke Hubungannya dengan Lemak Dan Kolesterol, Edisi Keenam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Stuart, G. W. (2016). *Buku Saku Keperawatan Jiwa. Alih Bahasa: Ramona P. Kapoh & Egi Komara Yudha*. Jakarta: EGC.
- Suddarth, B. &. (2014). *Keperawatan Medikal-Bedah (12th Ed.; Eka Anisa Mardela, Ed.)*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Sukandar, D., & Mustikasari. (2021). Studi Kasus: Ansietas Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 4(3), 437–446.
- Suli, D. P., Aini, N., & Bektı Prasetyo, Y. (2019). Pengaruh Green Color Breathing Therapy terhadap Penurunan Tingkat Stres pada Pasien Hemodialisa. *Jurnal Keperawatan*, 10(2).
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/7787>
- Surahman, Rachmat, M., & Supardi, S. (2016). *Modul Bahan Ajar Cetak Farmasi: Metodologi Penelitian*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: Pusat

Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Suryanto, Liana, Y., Akhriansyah, M., & Ersita. (2021). Tingkat Stres, Ansietas dan Depresi Perawat dalam Memberikan Pelayanan Keperawatan pada Pasien Covid-19. *Jurnal Keperawatan Merdeka (JKM)*, 1(2), 283–292.

Suwandi, R. D. V. P., Trimawati, & Yudanari, Y. G. Y. (2018). *Pengaruh Terapi Warna dengan Teknik Pernapasan Warna terhadap Penurunan Kecemasan pada Lansia yang Mengalami Sindrom Sarang Kosong di RW 03 Kelurahan Candirejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. 1–8.

Suyanti, T., & Rahayu, S. (2020). Lama Post Operasi Coronary Artery Bypass Graft (CABG) dengan Kualitas Hidup Pasien Post Operasi CABG Di RSPAD Gatot Soebroto. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi (JABJ)*, 9(2), 166–173. <https://doi.org/10.36565/jab.v9i2.199>

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2016). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI.

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta: DPP PPNI.

Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta: DPP PPNI.

Wicaksono, S. M. (2019). *Asuhan Keperawatan Pasien Penyakit Jantung Kroner Dengan Ketidakefektifan Manajemen Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Sukoharjo Ponorogo*. Ponorogo: Kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Jurusan Keperawatan Prodi D III Keperawatan.

Wijaya, P. dkk. (2015). *Keperawatan Medikal Bedah Keperawatan Dewasa Teori dan Contoh Askep*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Wiyono, H., & Putra, P. P. (2021). PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN MELALUI BREATHING EXERCISE. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 4,

481–486.

Yahya, A. F. (2017). *Penaklukan No.1: Mencegah dan Mengatasi Penyakit Jantung Koroner*. Bandung: Qanita.



L

A

M

P

I

R


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALAUDDIN


M A K A S S A R

N

Lampiran 1 Penyimpangan KDM







Gambar 4 Penyimpangan KDM
Sumber: (Lemone, 2015)

Lampiran 2 Kuesioner *Hamilton Anxiety Rating Scales (HARS)*

Skor : 0 = tidak ada
 1 = ringan
 2 = sedang
 3 = berat
 4 = sangat berat

Total Skor : 0-13 = tidak ada kecemasan
 14-20 = kecemasan ringan
 21-27 = kecemasan sedang
 28-41 = kecemasan berat
 42-56 = kecemasan sangat berat

No	Pertanyaan	Hari ke-1					Hari ke-2					Hari ke-3				
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
1	Perasaan Ansietas - Cemas - Firasat Buruk - Takut akan Pikiran Sendiri - Mudah Tersinggung				√ √ √ √					√ √ √ √				√ √ √ √		
2	Ketegangan - Merasa Tegang - Lesu - Tidak Bisa Istirahat Tenang - Mudah Terkejut - Mudah Menangis - Gemetar - Gelisah			√					√				√			
3	Ketakutan - Pada Gelap - Pada Orang Asing - Ditinggal Sendiri - Pada Binatang Besar - Pada Keramaian Lalu Lintas - Pada Kerumunan Orang Banyak															
4	Gangguan Tidur - Sukar Tidur - Terbangun Malam Hari - Tidur Nyenyak - Bangun dengan Lesu - Banyak Mimpi-Mimpi - Mimpi Buruk - Mimpi Menakutkan															
5	Gangguan Kecerdasan - Sukar Konsentrasi - Daya Ingat Buruk															
6	Perasaan Depresi - Hilangnya Minat - Berkurangnya Kesenangan pada Hobi - Sedih - Bangun Dini Hari															

	- Perasaan Berubah-Ubah Sepanjang Hari																		
7	Gejala Somatik (Otot) - Sakit dan Nyeri di Otot - Kaku - Kedutan Otot - Gigi Gemerutuk - Suara Tidak Stabil																		
8	Gejala Somatik (Sensorik) - Tinitus - Penglihatan Kabur - Muka Merah atau Pucat - Merasa Lemah - Perasaan Ditusuk-Tusuk			√				√									√		
9	Gejala Kardiovaskular - Takikardia - Berdebar - Nyeri di Dada - Denyut Nadi Mengeras - Perasaan Lesu/Lemas Seperti Mau Pingsan - Detak Jantung Hilang/Berhenti Sekejap																		
10	Gejala Respiratori - Rasa Tertekan/Sempit di Dada - Perasaan Tercekik - Sering Menarik Napas - Napas Pendek/Sesak																		
11	Gejala Gastrointestinal - Sulit Menelan - Perut Melilit - Gangguan Pencernaan - Nyeri Sebelum & Sesudah Makan - Perasaan Terbakar di Perut - Rasa Penuh atau Kembang - Mual - Muntah - Buang Air Besar Lembek - Kehilangan Berat Badan - Sukar BAB (Konstipasi)																		
12	Gejala Urogenital - Sering BAK - Tidak Dapat Menahan Air Semi - Amenorrhea - Menorrhage - Menjadi Dingin																		

	- Ejakulasi Dini - Ereksi Hilang - Impotensi														
13	Gejala Otonom - Mulut Kering - Muka Merah - Mudah Berkeringat - Pusing/Sakit Kepala - Bulu-Bulu Berdiri														
14	Tingkah Laku Saat Wawancara - Gelisah - Tidak Tenang - Jari Gemetar - Kerut Kening - Muka Tegang - Tonus Otot Meningkatkan - Napas Cepat dan Pendek - Muka Merah			√			√				√				
Total Skor				15			14							9	

Lampiran 3 Jurnal Rujukan Utama

P- ISSN: 2086-3071, E-ISSN: 2443-0900
Jurnal Keperawatan. Vol. 10, No. 2, Juli 2019

Versi online:
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/7787>

PENGARUH GREEN COLOR BREATHING THERAPY TERHADAP PENURUNAN TINGKAT STRES PADA PASIEN HEMODIALISA

The Effect of Green Color Breathing Therapy Towards Reduction of Stress Levels In Hemodialized Patients

Didik Prasetyo Suli¹, Nur Aini², Yoyok Bekti Prasetyo³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Malang.
email: aini_anindya@yahoo.com

ABSTRAK

Terapi hemodialisa merupakan terapi seumur hidup bagi pasien. Salah satu terapi yang dapat digunakan dalam menurunkan tingkat stres dan belum banyak digunakan di Indonesia adalah terapi warna (*chromotherapy*). Desain penelitian adalah quasi eksperimental dengan pre-post test with control group design. Jumlah sampel 12 orang kelompok intervensi dan 13 orang kelompok kontrol yang diambil dengan teknik purposive sampling. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2017 di Rumkit Tk II Dr. Soepraoen Malang. Variabel yang diamati adalah penurunan tingkat stres dengan menggunakan kuisioner DASS. Data dianalisis dengan uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat pretest mayoritas kelompok intervensi berada pada tingkat stres sedang 5 orang (41,7%), sedangkan pada kelompok kontrol 8 orang (61,5%). Setelah posttest tingkat stres pada kelompok intervensi turun menjadi normal 8 orang (66,7%) sedangkan pada kelompok kontrol tetap. Hasil uji statistik didapatkan p value $0.001 < \alpha 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian *green color breathing therapy* terhadap penurunan tingkat stres. Warna hijau mempengaruhi sistem saraf pusat dengan menggunakan retinohypothalamic tract sebagai jalur utama dari mekanisme transmisi warna menuju sistem limbik dan sistem endokrin, sehingga akan memberikan efek penenang, menimbulkan rasa nyaman, serta mengurangi stres.

Kata Kunci: hemodialisa, *green color breathing therapy*, stres.

ABSTRACT

Hemodialysis therapy is a lifelong therapy for the patient. One therapy that can be used in lowering stress levels and not yet widely used in Indonesia is color therapy (chromotherapy). The research design was quasi experimental with a pre-post test with control group design. The total sample of 12 intervention groups and 13 control groups was taken by purposive sampling technique. The study was conducted in March 2017 at Dr. Soepraoen Malang Hospital. The variables observed were a decrease in stress levels using the DASS questionnaire. Data were analyzed by the Mann-Whitney test. The results showed that at pretest the majority of the intervention groups were at moderate stress levels of 5 people (41,7%), while in the control group 8 people (61,5%). After posttest the stress level in the intervention group fell to normal 8 people (66,7%) while in the control group it remained. The results of statistical tests obtained p value $0.001 < \alpha 0.05$ so it can be concluded that there is an effect of giving green color breathing therapy to decrease stress levels. Green color affects the central nervous system by using the retinohypothalamic tract as the main pathway of the color transmission mechanism to the limbic system and the endocrine system, so it will provide a calming effect, cause a sense of comfort, and reduce stress.

Keyword : *hemodialysis, green color breathing therapy, stress.*

Pengaruh green color breathing therapy terhadap penurunan tingkat stres pada pasien hemodialisa

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Fatiha Izza Tuslamia, lahir di Sinjai pada tanggal 30 Oktober 1999. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan bapak Jayadi dan ibu Muliati Halma. Penulis yang memiliki nama panggilan Ijja ini mulai mengikuti pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2005 di SDN 213 Sabbang dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sinjai Tengah dan selesai pada tahun 2014. Selanjutnya melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Sinjai Tengah pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur SPAN-PTKIN, tepatnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan Jurusan Keperawatan dan menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan pada tahun 2021. Pertengahan tahun 2022 bisa melewati perjuangan keras beserta doa dari kedua orang tua, keluarga dan rekan-rekan yang membantu sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun Karya Tugas Akhir (KTA) Ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien *Coronary Artery Disease (CAD) Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG)* dengan Ansietas menggunakan Intervensi *Green Color Breathing Therapy*”. Penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya, Forum *Awardee* Beasiswa Unggulan Kemendibud Indonesia Timur serta aktif menulis di beberapa media cetak dan media *online*. Tahun 2021 penulis berhasil menerbitkan buku yang berjudul “Manula Produktif: Tinjauan Kesehatan dan Religiusitas”.

Lampiran 5 Dokumentasi Pemberian Tindakan

