

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY “K”
GESTASI 41-42 MINGGU DENGAN KETUBAN PECAH DINI (KPD)
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2021**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan DIII Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas islam negeri Alauddin
Makassar**

OLEH:

MULYANTI

NIM : 70400118004

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDINMAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MULYANTI
Nim : 70400118004
Tempat/Tgl. Lahir : Oi Tui, 31 Desember 2000
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Oi Tui
Judul : Manajemen asuhan kebidanan intranatal pada
Ny”K” gestasi 41-42 minggu dengan ketuban
pecah dini (KPD) Di RSUD Syekh yusuf gowa
tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 10 Juli 2022

Penyusun



MULYANTI
NIM.70400118004


PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Mulyanti
Nim : 70400118004
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny''K'' Gestasi 41-42 Minggu Dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2021.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah di setujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Samata, 22 Juni 2022

Pembimbing I


Zelfa Yuni Andriyani, S.ST.,M.Keb
Nip. 19890328 201903 2 018

Pembimbing II


Ferawati Taherung, S.ST.,M.Keb
Nip. 19870924 201903 2 012

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "K" Dengan Ketuban Pecah Dini Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Pada Tanggal 06 September – 30 Oktober 2021". Yang disusun oleh Mulyanti Nim : 70400118004, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 Desember 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 20 Desember 2021
16 Jumadil Awal 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT, M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Zelna Yuni Andriyani, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb	(.....)
Penguji I	: dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG, M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Rahmi Damis, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

الرديم الرحمن الله ب سم

Alhamdulillah Robbil „Alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk hidayah-Nya, sehingga penulis dapat Meneyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “K” gestasi 41-42 minggu dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2021”** dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, karya ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di jurusan Kebidana D3 Di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari penulisan maupun dalam penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Sembah sujudku kepada kedua orang tuaku tercinta yang tiada hentinya selalu memberi do“a dan dukungan kepada saya, ayahanda A.Fadil dan ibunda Rostinah.
2. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.

3. Bapak Dr.dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A.,M.kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
4. Ibunda Firdayanti S.ST.,M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan
5. Ibu Zelna Yuni Andriani, S.ST.,M.Keb selaku pembimbing I yang senangtiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing dengan sabar dan ikhlas.
6. Ibu Ferawati Taherong, S.ST.,M.Keb selaku pembimbing II yang telah banyak menyempatkan waktu untuk membimbingku dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
7. dr, Dewi Setiawati, Sp.oG selaku penguji I yang telah banyak membagikan ilmu kepada saya, member kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Ibunda Dr, Rahmi Damis, M,Ag selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan KTI ini.
9. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar
10. Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
11. Kepada sahabatku tercinta Titi Triwulandari, Nurfadillah, Nurul Amalia, Fera Mirnawati, Ririn angriati, lila suryani, lili anggriani, Seruni Hidayah,

Fitri Ramdani, Jirnowati dan adik-adik serta teman-teman sesama rantauan yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

12. Kepada semua teman-teman kebidanan khususnya angkatan 2018 terutama kelas kebidanan A yang telah memberi dukungan, serta motivasinya dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua kerja keras dan perjuangan kita di catat sebagai amal ibadah disisi Allah SWT.

Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan khususnya di bidang kebidanan. Terima kasih banyak.

Samata gowa, September 2021

Penulis

UNIVERSITAS ISL
ALAU
M A K A S



MULYANTI
Nim: 70400118004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK I.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Ruang lingkup.....	5
C. Tujuan penulisan.....	5
D. Manfaat penulisan.....	6
E. Metode penulisan.....	7
F. Sistematika penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang persalinan.....	11
1. pengertian persalinan normal.....	12
2. tujuan asuhan persalinan.....	14
3. Jenis-jenis persalinan.....	16
4. Sebab-sebab terjadinya persalinan.....	16
5. Tanda-tandapersalinan.....	19
6. Factor-faktor terjadinya persalinan.....	20
7. Tahap-tahap persalinan.....	21
B. Tinjauan khusus tentang KPD.....	25
1. Fisiologis Air Ketuban.....	25
2. Pengertian ketuban pecah dini.....	30

3. Klasifikasi.....	31
4. Etiologi.....	32
5. Mekanisme ketuban pecah dini.....	34
6. Tanda dan gejala.....	36
7. Diagnosis.....	36
8. Komplikasi.....	37
9. Penatalaksanaan ketuban pecah dini.....	38
C. Teorimanajemenkebidanan.....	45
1. Pengertian manajemen kebidanan.....	45
 BAB III STUDI KASUS	
KALA I.....	52
Langkah I. Identifikasi data dasar.....	52
Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual.....	61
Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	67
Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi.....	69
Langkah V. Rencana tindakan.....	69
Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan.....	72
Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan.....	75
Soap kala I.....	76
Soap kala II.....	83
Soap kala III.....	89
Soap kala IV.....	90

BAB IV PEMBAHASAN	121
BAB V PENUTUP	152
A. Kesimpulan.....	152
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	134



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung janin dan his.....	81
Tabel 3.3: penilaian <i>apgar score</i>	88
Tabel 3: Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah.....	92
Table 3.4: Tanda-tanda vital pascapersalinan.....	92



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat permohonan izin pengambilan data awal kepada Pimpinan RSUD Syekh Yusuf Gowa
- Lampiran II : Surat permohonan pengajuan kode etik kepada komite etik penelitian kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar
- Lampiran III : Surat permohonan izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran IV : Surat Keterangan Layak Etik
- Lampiran V : Surat keterangan telah melakukan penelitian Di RSUD Syekh Yusuf Gowa
- Lampiran VI : Dokumentasi
- Lampiran VII : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, SEPTEMBER 2021

MULYANTI, 70400118004

Pembimbing I : Zelna Yuni Andriani

Pembimbing II : Ferawati Taherong

“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “K” Gestasi 41-42 Minggu dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2021”

Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm. Bila terjadi KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu, disebut KPD pada kehamilan prematur. Dalam keadaan normal, 8-10% perempuan hamil aterm akan mengalami KPD.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny “K” dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah menurut Helen Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP. Yaitu langkah I pengkajian data dasar, langkah II diagnose masalah actual, langkah III diagnosa masalah potensial, langkah IV tindakan segera/kolaborasi, langkah V menyusun rencana asuhan yang menyeluruh, langkah VI implementasi, langkah VII evaluasi.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny “K” dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) yakni tidak ditemukannya kendala dalam menangani masalah dengan Ketuban Pecah Dini (KPD). Dalam penatalaksanaan masalah Ketuban Pecah Dini pada Ny “K” dilakukan pemasangan infus Ringer Laktat per IV 28 tetes per menit untuk mengganti cairan yang hilang selama persalinan, pemasangan misoprostol pervaginam 1/8 tablet untuk membantu pematangan serviks dan pemberian injeksi cefotaxime 1 gram untuk mencegah terjadinya infeksi, serta dilakukannya pemantauan dan asuhan dari kala I sampai kala IV.

Kesimpulan dari studi kasus dengan manajemen asuhan 7 langkah varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yakni dari kala I hingga kala IV

semuanya berlangsung normal tanpa ada penyulit, tidak ditemukannya komplikasi atau masalah pada janin dan ibu, serta keadaan ibu dan bayi baik yang ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal. Dalam hal ini bidan sangat berperan penting dalam keberhasilan asuhan yang telah diberikan.

KATA KUNCI : Ketuban Pecah Dini (KPD), 7 langkah varney





ABSTRACT

MIDWIFERY PROGRAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, SPETEMBER 2021

MULYANTI, 70400118004

Pembimbing I : Zelna Yuni Andriani

Pembimbing II : Ferawati Taherong

“Management of Intranatal Midwifery Care for Mrs. "K" 41-42 Weeks Gestation with Premature Rupture of Membranes (PROM) at Shelkh Yusuf Hospital, Gowa Regency In 2021”

Premature rupture of membranes (PROM) is a rupture of the membranes before the baby delivery process, when the cervical dilatation in primiparas is less than 3 cm and in multiparas is less than 5 cm. If PROM occurs before 37 weeks of gestation, it is called PROM in preterm pregnancy. Under normal circumstances, 8-10% of pregnant women at that term will experience PROM.

This study aims to investigate midwifery care management for Mrs. "K" with Premature Rupture of Membranes (PROM) at Syekh Yusuf Hospital, Gowa Regency in 2021 by using Helen Varney's 7-step midwifery care management approach documented in the form of SOAP. This approach consists of seven steps as follows: step I basic data assessment, step II diagnosing actual problems, step III diagnosing potential problems, step IV immediate action/collaboration, step V compiling a comprehensive care plan, step VI implementation and step VII evaluation.

The result of this research shows that there is no significant issue found in the midwifery management care of Mrs, K's premature rupture of membranes (PROM). The management of premature rupture of membranes (PROM) on Mrs."K" consists of the following actions: setting IV Ringer Lactate infusion with 28 drops per minute to replace fluids lost during the baby delivery process, installing vaginal misoprostol with 1/8 tablet to assist cervical ripening, injecting a gram of cefotaxime to prevent infection as well as monitoring and care from stage I to stage IV.

It can be concluded through Varney's 7-steps approach and SOAP documentation Stage 1-4 that the care management runs normally without any obstacles. There is no complications or problems found in the fetus and mother. The good condition of the mother and baby could be observed from the vital signs which reach normal limits. In this case, the midwife plays an important role in the success of the care.

Keywords: Premature Ruptures of Membrane (PROM), Varney's 7-Step

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin atau uri) yang telah cukup bulan (37-42 minggu) atau hidup diluar kandungan atau melalui jalan lahir, dengan bantuan atau tanpa bantuan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Menurut Aprilia (2011), persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Eka Nurhayati 2019:86).

Sementara itu penyebab kematian langsung ibu akibat dari penyulit kehamilan, persalinan, dan nifas, misalnya infeksi, eklamsi pendarahan, emboli air ketuban, trauma anastesi, trauma operasi dan lain-lain, infeksi yang banyak dialami oleh ibu sebagian besar merupakan akibat dari adanya komplikasi/penyulit kehamilan, seperti febris, korioamnionitis, infeksi saluran kemih dan sebanyak 65% KPD kerana ketuban pecah dini dapat menimbulkan infeksi pada ibu dan bayi.

Sementara itu angka kejadian ketuban pecah dini pada tahun 2012 di indonesia yaitu sebanyak 35,70% - 55,30%. Sedangkan angka kematian di indonesia yaitu sebanyak 4.226 kasus. Pada tahun 2019 penyebab kematian ibu terbanyak adalah pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, dan ketuban pecah dini (profil kesehatan Indonesia 2019).

Ketuban pecah dini (KPD) adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan / pada inpartum sebelum pembukaan < 4 cm (fase laten). Dalam keadaan normal, selaput ketuban pecah dalam proses persalinan. Ketuban Pecah Dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Bila ketuban pecah dini terjadi sebelum sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut ketuban pecah dini pada kehamilan prematur. Dalam keadaan normal 8-10 % perempuan hamil aterm akan mengalami ketuban pecah dini (Prawirohardjo, 2018: 676-682)

Menurut WHO, kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) atau insiden PROM (*prelabour rupture of membrane*) berkisar antara 5-1% dari semua kelahiran. KPD preterm terjadi 1% dari kehamilan dan 70% kasus KPD terjadi pada kehamilan aterm. pada 30% kasus KPD merupakan penyebab kelahiran prematur (WHO, 2014). Kesakitan dan angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan perempuan. *World Health Organization (WHO)* memperkirakan 830 perempuan meninggal setiap harinya akibat komplikasi kehamilan dan proses kelahiran. Artinya setiap 2 menit ada satu perempuan yang meninggal (WHO, 2014).

Dampak yang paling sering terjadi pada KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu adalah *sindrom distress* pernapasan, yang terjadi pada 10-40% bayi baru lahir. Risiko infeksi meningkat pada kejadian KPD. Semua ibu hamil dengan KPD premature sebaiknya dievaluasi untuk kemungkinan terjadinya *korioamnionitis* (radang pada *korion* dan *amnion*). Selain itu kejadian *prolaps* atau keluarnya tali pusat dapat terjadi pada KPD. Hipoplasia paru merupakan komplikasi fatal yang terjadi pada KPD preterm. Kejadiannya mencapai hampir 100% apabila

KPDpreterm ini terjadi pada usia kehamilan kurang dari 23 minggu. Infeksi *intrauterin*, tali pusat menubung, prematuritas, dan distosia juga termasuk dalam komplikasi KPD (D dan DWI, 2013: 250).

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa yaitu angka kejadian ketuban pecah dini pada tahun 2019 sebanyak 120. Pada bulan 1 sebanyak 8 kasus, bulan 2 sebanyak 14 kasus, bulan 3 sebanyak 16 kasus, bulan 4 sebanyak 0 kasus, bulan 5 sebanyak 11 kasus, bulan 6 sebanyak 20 kasus, bulan 7 sebanyak 10 kasus, bulan 8 sebanyak 0 kasus, bulan 9 sebanyak 7 kasus, bulan 10 sebanyak 15 kasus, bulan 11 sebanyak 8 kasus, bulan 12 sebanyak 11 kasus (Dinkes, Kabupaten Gowa 2020).

Sementara itu, menurut penelitian Yaze dan Dewi (2016), insidensi KPD terjadi 10% pada semua kehamilan. Pada kehamilan aterm insidensinya bervariasi 6-19%, sedangkan pada kehamilan preterm insidensinya 2% dari semua kehamilan. Hampir semua KPD pada kehamilan preterm akan lahir sebelum aterm atau persalinan akan terjadi dalam satu minggu setelah selaput ketuban pecah. 70% kasus ketuban pecah dini terjadi pada kehamilan cukup bulan. Sekitar 85% morbiditas dan mortalitas perinatal disebabkan oleh prematuritas. Ketuban pecah dini berhubungan dengan penyebab kejadian prematuritas dengan insidensi 30-40% (Yaze dan Dewi, 2016: 76).

Menurut data yang diperoleh dari Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa menunjukkan jumlah Ketuban Pecah Dini dari tahun 2016 yaitu 11 kasus, pada tahun 2017 yaitu 22 kasus, sedangkan pada

tahun 2018 yaitu 34 kasus, 2019 yaitu 17 kasus dan pada tahun 2020 35 kasus (RekamMedik RSUD Syekh Yusuf, 2021).

Komplikasi KPD dapat menimbulkan beberapa masalah bagi ibu maupun janin, misalnya pada ibu dapat menyebabkan infeksi puerperalis/masa nifas, partus lama dapat pula menimbulkan pendarahan pascapersalinan. Penyebab angka kematian ibu dan angka kematian bayi menurut dinas kesehatan RI tahun 2019 yaitu pendarahan, infeksi dan abortus. Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum inpartu atau persalinan, yaitu apabila pembukaan pada primipra kurang dari 3 cm dan pada multi kurang dari 5 cm. dalam keadaan normal pecah pada saat persalinan. Bila periode laten panjang dan ketuban sudah pecah, maka akan menyebabkan infeksi yang bisa menyebabkan kematian ibu (dinas kes 2019)

KPD disebabkan berkurangnya kekuatan membran atau meningkatnya tekanan intrauterine oleh kedua faktor tersebut. Berkurangnya kekuatan membran disebabkan oleh adanya infeksi yang berasal dari vagina dan serviks. KPD merupakan suatu kejadian obstetric yang banyak ditemukan dengan insiden sekitar 10,7% dari seluruh persalinan dimana 94% diantaranya terjadi pada kehamilan cukup bulan. Ini terjadi pada sekitar 6-20% kehamilan.

Berdasarkan uraian dari data diatas, dapat kita ketahui bahwa Ketuban Pecah Dini di indonesia khususnya disulawesi selatan sehingga memerlukan pencegahan dan penanganan segera mungkin agar tidak menimbulkan peningkatan KPD secara signifikan yang berbahaya bagi kesehatan Ibu dan Anak.

atas dari pemikiran itulah, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care Pada Ibu Dengan ketuban pecah dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

B. Ruang lingkup

Ruang lingkup adalah pendekatan manajemen asuhan kebidan intranatal dengan care desngan kasus ketuban pecah dini (KPD).

C. Tujuan penulis

1. Tujuan umum

Dilaksanakan manajemen asuhan kebidanan intranatal dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan sesuai dengan kopetensi atau wewenang bidan.

2. Tujuan khusus

- a. Dilaksanakan pengkajian dan analisis data pada Ketuban Pecah Dini di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2020
- b. Dirumuskanya data diangnosa/masalah aktual pada ibu dengan Ketuban Pecah Dini Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2020
- c. Dirumuskanya diangnosa/masalah potensial pada ibu dengan Ketuban Pecah Dini Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2020
- d. Diidentifikasi tindakan segera dan kolaborasi pada ibu dengan Ketuban Pecah Dini Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2020

- e. Ditetapkan rencana tindakan asuhan pada ibu dengan Ketuban Pecah Dini Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2020
- f. Dilaksanakannya asuhan kebidanan sesuai rencana tindakan pada ibu dengan Ketuban Pecah Dini Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2020
- g. Dievaluasinya asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu dengan Ketuban Pecah Dini Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2020
- h. Dilakukannya pendokumentasian semua temuan dari tindakan yang telah diberikan pada ibu dengan Ketuban Pecah Dini Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2020
- i. Diintegrasikannya nilai keislaman pada pasien dengan Ketuban Pecah Dini

D. Manfaat penulis

Manfaat secara garis besar ada dua teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

a. Manfaat Ilmiah

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumber informasi, menambah pengetahuan serta sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

b. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman yang berharga bagi penulis karena dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan serta Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Diploma Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

c. Manfaat Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi parapembaca tentang Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Dengan Ketuban Pecah Dini.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Manfaat Institusi

Penulis berharap, penelitian ini bisa dijadikan sumber ilmutambahan bagi mahasiswa, khususnya jurusan kebidanan agar mampu memberikan asuhan kebidanan yang tepat pada ibu bersalin yang mengalami masalah ketuban pecah dini . Selain itu, dapat pula dijadikan sebagai tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya maupun sebagai bahan perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode pustaka

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media intrnet yang berhubungan dengan intranatal care khususnya pasa Asuhan persalinan dengan KPD

2. Studi kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Verney, dengan 7 langkah yang meliputi identifikasi data dasar, identifikasi

Diagnosa/masalah actual. Identifikasi Diagnosa/masalah potensial segera/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi data yang akurat, penulis menggunakan teknik:

a. Anamnesa

Penulis menggunakan teknik Tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan keluarga dan bidan yang memberikan informasi yang di butuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi

1. Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi di lakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
2. Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ
3. Perkusi, adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk
4. Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bayi usus serta untuk mengukur tekanan darah sedangkan lenek digunakan mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Studi dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan bidan, perawat, petugas laboratorium, dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dan penyelesaian proposal ini.

d. Diskusi

Penulis melakukan Tanya jawab dengan klien keluarga klien, dosen pembimbing baik dilahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika penulisan

Adapun sistematis penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu: pada bab I yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Pada bab II terdiri dari tinjauan teori, akan menguraikan tinjauan umum tentang persalinan normal, tinjauan khusus tentang KPD, menurut islam, proses manajemen asuhan kebidanan, serta pendokumentasian asuhan kebidanan.

Selanjutnya, pada bab III yaitu studi kasus yang akan menguraikan tentang 7 langkah Varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosis/masalah aktual, identifikasi diagnosis/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Pada bab IV terdiri dari pembahasan yang akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf Gowa dalam memberikan asuhan kebidanan ibu dengan KPD.

Terakhir yaitu bab V, yang akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, yang memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan

1. Pengertian Persalinan Normal

- a. Persalinan adalah akhir dari kehamilan dan dimulainya bayi baru lahir untuk memulai kehidupan diluar rahim. Persalinan merupakan proses yang dimulai dengan keluarnya janin/hasil konsepsi yang dapat hidup dari uterus melalui vagina ke dunia luar.(Dewi Setiawati 2020:28)
- b. persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Eka Nurhayati 2019:86)
- c. Persalinan adalah rangkaian peristiwa keluarnya bayi yang sudah cukup berada dalam rahim ibunya, dengan disusul oleh keluarnya plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Persalinan juga adalah proses membuka dan menipisnya serviks lalu janin turun ke jalan lahir. Kelahiran adalah proses dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir. Persalinan dan kelahiran adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi pada ibu dan janin (Endang dan Elisabeth 2015:101).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persalinan merupakan proses pembukaan dan menipisnya serviks dan janin turun dalam jalan lahir kemudian berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan di susul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau bukan jalan lahir, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). persalinan di anggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 minggu) kemudian berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. ibu belum masuk tahap inpartu jika kontraksi uterus tidak mengakibatkan perubahan serviks.

Proses persalinan di jelaskan di dalam QS. Maryam/19:22-23

﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِمْ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ﴿٢٣﴾

﴿ قَالَتْ بَلِيَّتِي مِثُّ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْسِيًّا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan".(Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2013).

ditafsirkan M. Quraish Shihab setelah Jibril menyampaikan firman Allah di surah Maryam ayat 19, Jibril langsung melakukan tiupan ke dalam baju kurung Maryam, lalu tiupan itu turun ke bagian bawah tubuhnya hingga masuk ke dalam farjinya, maka dengan serta-merta Maryam mengandung anak dengan seizin Allah swt.

Selain itu proses persalinan seorang wanita akan mengalami rasa sakit hal ini di gambarkan di dalam QS. al- Mu'minum/23:12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ﴿١٤﴾ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَدْخَلْنَاهُ خَلْقًا ء آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2013).

Keserasian al-Qur'an oleh M. Quraish Shihab. Dalam tafsir ini disebutkan bahwa Q.S. al-Mu'minun/ 23: 12-14 menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Uraian proses tersebut yang demikian mengagumkan membuktikan perlunya

beriman dan tunduk kepada Allah Sang Pencipta serta keharusan mengikuti jejak orang-orang mukmin yang disebut pada kelompok ayat-ayat sebelumnya.

Ada tujuh macam sifat orang-orang mukmin yang diuraikan melalui kelompok ayat sebelumnya. Di sini, dikemukakan juga tujuh tahap proses penciptaan manusia sehingga ia lahir di pentas bumi ini. Seakan-akan ayat ini menyatakan bahwa engkau berhasil keluar dan berada di pentas bumi ini setelah melalui tujuh fase dan engkau pun perlu menghiasi diri dengan tujuh hal agar berhasil dalam kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. (Shihab, 2002).

2. Tujuan asuhan persalinan

Tujuan asuhan persalinan normal adalah mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui berbagai upaya yang terintergrasi dan lengkap serta intervensi minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal.

Tujuan dari asuhan persalinan normal adalah sebagai berikut :

- a. Secara konsisten dan sistematis menggunakan praktik pencegahan infeksi misalnya mencuci tangan secara rutin, menggunakan sarung tangan sesuai dengan yang diharapkan, menjaga lingkungan yang bersih bagi proses persalinan dan kelahiran bayi, serta menerapkan standar poses peralatan.
- b. Memberikan asuhan rutin dan pemantauan selama persalinan dan setelah bayi lahir, termasuk penggunaan partograf. Partograf di

gunakan sebagai alat bantu untuk membuat suatu keputusan klinik, berkaitan pengenalan dini dan komplikasi yang mungkin terjadi dan memilih tindakan yang sesuai.

- c. Memberikan asuhan sayang ibu secara rutin selama persalinan, pascapersalinan, dan nifas, termaksud menjelaskan kepada ibu dan keluarganya mengenai proses kelahiran bayi dan meminta para suami dan kerapat untuk turut berpartisipasi dalam proses persalinan dan kelahiran bayinya.
- d. Menyiapkan rujukan bagi setiap ibu bersalin atau melahirkan bayi.
- e. Menghindari tindakan-tindakan berlebihan atau berbahaya, seperti episiotomi rutin, amniotomi, kateterisasi dan penghisapan lender secara rutin sebagai upaya untuk mencegah pendarahan pascapersalinan.
- f. Memberikan asuhan bayi baru lahir, termasuk mengeringkan dan menghangatkan tubuh bayi, member ASI secara dini, mengenal sejak dini komplikasi dan melakukan tindakan yang bermanfaat secara rutin.
- g. Memberikan suhan dan pemantauan ibu dan bayi baru lahir, termasuk dalam masa nifas nifas secara rutin. Asuhan ini memastikan ibu dan bayinya berada dalam kondisi aman dan nyaman, mengenal sejak dini komplikasipascapersalinan dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kebutuhan.
- h. Mengajarkan kepada ibu dan keluarganya untuk mengenali secara dini bahaya yang mungkin terjadi selama masa nifas dan pada bayi baru lahir.

- i. Mendokumentasikan semua asuhan yang telah diberikan (Sarwono 2016:335).

3. Jenis-jenis persalinan

- a. Persalinan spontan

Bila persalinan berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri atau melalui jalan lahir ibu tersebut.

- b. Persalinan buatan

Bila persalinan dibantu dengan tenaga dari luar, misalnya ekstraksi forceps atau dilakukan operasi section Caesar.

- c. Persalinan anjuran

Persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya, tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban karena pemberian prostaglandin (Annisa,Dkk, 2017).

4. Sebab-sebab terjadinya persalinan

- a. Teori kadar progesterone

progesteron yang berfungsi untuk mempertahankan kehamilan, yang semakin menurun dengan makin tuanya kehamilan, sehingga otot rahim mudah dirangsang oleh *oksitosin*.

b. Teori Oksitosin

Menjelang persalinan hormone *oksitosin* makin meningkat sehingga merangsang terjadinya persalinan

c. Teori renggang otot rahim

Merenggangnya otot rahim dalam batas tertentu menimbulkan kontraksi persalinan dengan sendirinya

d. Teori *prostaglandin*

Prostaglandin banyak dihasilkan oleh lapisan dalam rahim diduga dapat menyebabkan kontraksi rahim. Pemberian *prostaglandin* dari luar dapat merangsang kontraksi otot rahim dan terjadi persalinan (Dewi Setiawati 2020:37).

5. Tanda-tanda persalinan

a. Timbulnya His persalinan

- 1) Nyeri melingkar dipunggung memancar keperut bagian depan.
- 2) Makin lama makin pendek intervalnya dan makin kuat intensitasnya
- 3) Kalau dibawah perjalanan makin kuat
- 4) Mempunyai pengaruh pada pendataran dan atau pembukaan serviks.

b. Bloody Show

Bloody Show merupakan lender disertai darah dari jalan lahir dengan pendataan dan pembukaan, lender dari *canalis servicalis* keluar disertai dengan sedikit darah. Pendarahan yang sedikit ini disebabkan

karena lepasnya selaput janin pada bagian bawah segmen bawah rahim hingga beberapa capillary darah terputus.

c. Premature rupture of membrane

Premature rupture of membrane adalah keluarnya cairan banyak dengan sekonyong-konyong dari jalan lahir. Hal ini terjadi akibat ketuban pecah atau selaput janin robek. Ketuban biasanya pecah atau pembukaan lengkap atau hampir lengkap dan dalam hal ini keluarnya cairan merupakan tanda yang lambat sekali. Kadang-kadang ketuban pecah pada pembukaan kecil, malahan kadang-kadang selaput janin robek sebelum persalinan. Walau demikian persalinan diharapkan akan mulai dalam 24 jam setelah air ketuban keluar.

6. Factor-faktor terjadinya persalinan

Ada 6 hal yang dapat mempengaruhi persalinan yaitu :

a. Power

Power adalah tenaga atau kekuatan yang membantu atau mendorong penurunan dan keluarnya janin. Kekuatan tersebut terdiri dari His, kontraksi otot Rahim. Kontraksi diafragma, dan aksi dari ligament dengan kerja sama yang baik dan sempurna.

1) His

His adalah kontraksi uterus karena otot-otot polos Rahim bekerja. Sifat His yang baik yaitu kontraksi simetris, fundus dominan, terkoordinasi dan reksasi.

b. Passenger (faktor janin)

Passenger ini meliputi letak janin, presentasi, bagian bawah, dan posisi janin.

c. Passage (jalan lahir)

Jalan lahir terdiri dari tulang panggul (rangka panggul) dan bagian-bagian lunak dari panggul (otot-otot, jaringan-jaringan dan ligament-ligament).

d. Psikologi ibu

Keadaan psikologi ibu member pengaruh pada persalinan ibu, ibu yang bersalin di damping suami atau keluarga atau orang-orang yang di percayai ibu cenderung mengalami proses persalinan yang lancer karena adanya kepercayaan dan rasa nyaman yang dirasakan ibu. Disbanding dengan ibu bersalin yang tanpa pendampingan.

e. Faktor penolong

Kompetensi yang dimiliki penolong sangat bermanfaat untuk memperlancar persalinan dengan mencegah kematian dan neonatal (asrina dkk,2010:9-21).

f. Factor posisi ibu

Posisi ibu dapat mempengaruhi adaptasi anatomi ibu dan fisiologi persalinan. Perubahan posisi yang di berikan pada ibu bertujuan untuk menghilangkan rasa letih, member rasa nyaman, dan memperbaiki sirkulasi (sondakh,2013).

7. Tahap-tahap persalinan

a. Kala I

Kala I disebut juga dengan kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai dengan pembukaan lengkap (10 cm).pada permulaan His, kala pembukaan berlangsung tidak begitu kuat sehingga pasien masih dapat berjalan-jalan. Proses pembukaan serviks sebagai akibat his dibedakan menjadi dua fase, yaitu :

1) Fase laten

Berlangsung selama 8 jam.Pembukaan terjadi sangat lambat sampai dengan pembukaan mencapai ukuran diameter 3 cm.

2) Fase aktif

a) Fase Akselerasi

Dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm.

b) Fase Dilatasi Maksimal

Dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm sampai dengan 9 cm.

c) Fase Dilatasi

Pembukaan menjadi lambat sekali, dalam waktu 2 jam pembukaan berubah menjadi pembukaan lengkap.

Di dalam fase aktif ini, frekuensi dala kontraksi uterus akan meningkat secara bertahap, biasanya terjadi 3 kali atau lebih dalam waktu 10 menit, dan berlangsung selama 40 detik atau lebih. Biasanya dari pembukaan 4 cm, akan terjadi kecepatan rata-rata yaitu 1 cm per jam untuk primigravida dan 2 cm untuk multigravida.

Fase-fase tersebut dijumpai pada primigravida begitu pula pada multigravida, tetapi pada fase laten, fase aktif dan fase deselerasi terjadi lebih pendek. Mekanisme pembukaan serviks berbeda antara primi atau multigravida. Pada primigravida, OIU membuka lebih dulu sehingga serviks akan mendatar dan menipis, baru kemudia OUE membuka, pada multigravida OUI dan OUE

akan mengalami penipisan dan pendataran yang bersamaan. Kala I selesai apabila pembukaan serviks sudah lengkap, pada primigravida kala I berlangsung kira-kira 12 jam, sedangkan pada multigravida kira-kira 7 jam(Annisa Dkk,2017: 7:12).

b. Kala II

Kala II disebut juga dengan kala pengeluaran, kala ini dimulai dari pembukaan lengkap (10cm) sampai bayi lahir. Proses ini berlangsung 2 jam pada primigravida, gejala utama dari kala II adalah :

- 1) His semakin kuat, dengan interval 2 sampai 3 menit dengan durasi 50 sampai 100 detik.
- 2) Menjelang akhir kala I, ketuban pecah yang ditandai dengan pengeluaran cairan secara mendadak.
- 3) Ketuban pecah pada pembukaan merupakan pendeteksi lengkap diikuti keinginan mengejan karena fleksus frankenhauser tertekan.
- 4) Kedua kekuatan, His dan mengejan lebih mendorong kepala bayi sehingga kepala bayi membuka pintu, subocciput bertindak sebagai hipomoglion berturut-turut lahir dari dahi, muka, dagu yang melewati perineum.
- 5) Kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putaran paksi luar, yaitu penyesuaian kepala pada punggung.
- 6) Setelah putaran paksi luar berlangsung maka persalinan bayi ditolong dengan jalan :

- a) Kepala dipegang pada oksiput dan dibawa dagu, ditarik curam kebawah untuk melahirkan bahu belakang.
- b) Setelah kedua bahu lahir, ketika diikat untuk melahirkan sisa badan bayi.
- c) Bayi kemudian lahir diikuti oleh air ketuban.

c. Kala III

Setela kala II, kontraksi uterus berhenti sekitar 5 sampai 10 menit. Melalui kelahiran bayi, plasenta sudah mulai terlepas pada lapisan nitabisch karena sifat retraksi otot rahim. Dimulai segera setelah bayi lahir sampai plasenta lahir, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit, jika lebih maka harus diberi penanganan lebih atau dirujuk. Lepasnya plasenta dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda :

- a) Uterus menjadi budar.
- b) Uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas ke segmen bawah rahim.
- c) Terjadi pendarahan.

Melahirkan plasenta dilakukan dengan dorongan ringan secara *crede* pada fundus uteri. Biasanya plasenta lepas dalam 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir.

Lepasnya plasenta secara schultze, biasanya tidak ada pendarahan sebelum plasenta lahir dan banyak mengeluarkan darah setelah plasenta lahir, sedangkan cara Duncan yaitu

plasenta lepas dari pinggir, biasanya darah mengalir keluar antara selaput ketuban.

d. Kala IV

Kala IV dimaksudkan untuk melakukan observasi karena pendarahan postpartum paling sering terjadi pada 2 jam pertama. Observasi yang dilakukan adalah :

- a) Tingkat kesadaran penderita.
- b) Pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, dan pernapasan.
- c) Kontraksi uterus.
- d) Terjadi pendarahan

B. Tinjauan khusus tentang Ketuban Pecah Dini (KPD)

1. Fisiologis Air Ketuban

Air ketuban adalah cairan jernih agak kekuningan yang menyelimuti janin didalam rahim selama kehamilan yang memiliki berbagai fungsi yaitu melindungi pertumbuhan janin, menjadi bantalan untuk melindungi janin terhadap trauma dari luar, menstabilkan dari perubahan suhu, pertukaran cairan, sarana yang memungkinkan janin bergerak bebas, sampai mengatur tekanan dalam rahim. Ketuban yang mendorong serviks untuk membuka, juga meratakan tekanan intra-uterin dan membersihkan jalan lahir bila ketuban pecah (Mika, 2016:22-23)

Air ketuban berkemang dan mengisi kantong ketuban mulai 2 minggu sesudah pembuahan. Kantong ketuban terbentuk saat usia kehamilan 12 hari setelah pembuahan, dan segera terisi oleh air ketuban. Setelah 10 minggu, kemudian air ketuban mengandung protein, karbohidrat, lemak, *fosfolipid*, urea, dan elektrolit untuk membantu pertumbuhan janin, pada saat akhir kehamilan sebagian besar air ketuban dari urin janin.

Saat minggu-minggu awal air ketuban berisi air yang berasal dari ibu, setelah 20 minggu urin janin membentuk sebagian air ketuban yang mengandung *nutrient*, hormone dan anti bodi yang melindungi janin dari penyakit.

Air ketuban terus-menerus ditelan/dihirup dan diganti lewat proses eksresi seperti juga dikeluarkan lewat urin. Hal demikian merupakan hal yang penting bahwa air ketuban dihirup dalam paru janin untuk membantu janin mengembang sempurna. Air ketuban yang tertelan membantu pembentukan mekonium saat ketuban pecah. Apabila ketuban pecah terjadi selama proses persalinan disebut dengan ketuban pecah spontan, apabila terjadi sebelum disebut dengan KPD. Sebagian besar air ketuban akan berada dalam Rahim sampai neonatus lahir.

Yang perlu kita ketahui, bahwa air ketuban pastilah merupakan media ajaib yang dibuat khusus oleh tuhan untuk melindungi bayi tanpa

merusaknya (selama kehamilan normal). Inilah salah satu kebesaran kuasa tuhan.

Di jelaskan didalam Firman Allah swt QS. Fussilat/ 41 : 53

لَمَّا أَنَّهُ رَبُّكَ كَيْفَ أَوْلَمَ الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ يَتَّبِعِينَ حَتَّىٰ أَنفُسِهِمْ فِي الْأَفَاقِ فِيءِ أَيَّتِنَا سُنُّرِيهِمْ

شَهِدْتُ شَيْءَ كُلِّ

Terjemahnya:

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu”(Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2013).

Makna dari ayat di atas yaitu mengajak kepada pendurhaka yang mengingkari kebenaran Al-Qur’an sambil mengajak mereka berpikir dan merenungkan tentang Al-Qur’an. Ayat diatas menjanjikan bantuan bagi yang hendak berpikir secara objektif. Allah berfirman: *Kami akan memperlihatkan kepadamereka dalam waktu yang tidak terlalu lama ayat-ayat, yakni tanda-tanda kekuasaan serta kebenaran firman-firman, kami disegenap ufuk dan juga pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa ia, yakni Al-Qur’an itu adalah benar.*

Apakah mereka tidak menggunakan pikiran mereka untuk memahami bukti-bukti yang terdapat dalam Al-Qur’an sendiri *dan apakah belum cukup Tuhan pemeliharaan dan pembimbing-mu, wahai Nabi, Maha*

Menyaksikan segala sesuatu? ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan dan pengingkaran tentang pertemuan dengan Tuhan mereka karena tidak menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia, dengan ilmu dan kuasa-Nya, menyangkut segala sesuatu adalah Maha Meliputi.

Tidak sesuatu pun yang luput dari-Nya. Pada masa hidup Nabi Muhammad saw, “ayat-ayat” yang dijanjikan oleh ayat ini untuk diperlihatkan antara lain adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika itu, antara lain kemenangan yang diraih oleh Nabi saw. Dalam peperangan peperangan beliau disekian banyak daerah serta kematian tokoh-tokoh kaum musyrikin, sedang sesudah beliau wafat silih berganti peristiwa-peristiwa kemenangan yang diraih kaum muslimin. Selain itu *ayat-ayat di segenap ufuk dan diri mereka* yang diperlihatkan Allah itu adalah rahasia-rahasia alam serta keajaiban ciptaan-Nya pada diri manusia (Shihab, 2002 : 90-91).

Tatkala itu, Allah juga memperlihatkan kepada ummatnya yang berfikir bahwa janin yang ada didalam perut ibu dapat hidup dan berkembang dengan baik dimana dalam perut ibu merupakan tempat yang amat sangat sempit dan penuh dengan kegelapan sehingga janin tidak dapat berbuat apa-apa kecuali kehendaknya.

Dijelaskan dalam firman Allah swt QS. Az-Zumar/39 : 6

ن فِي مَخْلُقِكُمْ أَزْوَاجٍ ثَمَنِيَّةً أَلا نَعْمِ مِّن لَّكُمْ وَأَنْزَلَ زَوْجَهَا مِمَّا جَعَلَ ثُمَّ وَاحِدَةً نَّفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ

فَأَنى هُوَ إِلا إِلَهَ إِلا الْمَلِكُ لَهُ رُبُّكُمْ اللَّهُ ذَإلكُمْ تَلَسَّ ظَلَمْتِ فِي خَلْقٍ بَعْدِ مِّنْ خَلْقٍ أُمَّهَاتِكُمْ بِطُو

تُصَرِّفُونَ

Terjemahnya:

“Dia menciptakan kamu dari satu nafs kemudian Dia jadikan darinya pasangan dan Dia menurunkan untuk kamu delapan macam yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?” (Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2013).

Ayat di atas menyatakan bahwa: *Dia menciptakan kamu dari satu nafs* yakni Adam as. *Kemudian dia jadikan darinya*, yakni nafs itu, *pasangannya*, yakni istrinya Hawwa, *dan Dia menurunkan untuk kamu delapan macam yang berpasangan dari binatang ternak*, yaitu unta, sapi, domba, dan kambing. *Dia menjadikan kamu dalam perut*, yakni rahim, *ibu kamu kejadian demi kejadian* yang sangat mengagumkan, yakni tahap demi tahap. *Dalam tiga kegelapan*. Kegelapan perut, rahim, dan plasenta. *Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan pemelihara dan pembimbing kamu*. *Milik-Nya sendiri semua kerjaan*, kepemilikan yang sempurna dan menyeluruh.

Dia juga satu-satunya Tuhan, *tidak ada Tuhan* penguasa dan pengendali alam raya dan yang berhak disembah *selain Dia; maka bagaimana kamu*, wahai yang mempersekutukan-Nya, *dapat dipalingkan* oleh satudan lain hal? Sikap kamu itu sungguh merupakan sesuatu yang tidak masuk akal (Shihab, 2002 : 442-443).

2. Pengertian ketuban pecah dini

Ketuban pecah dini atau yang sering disingkat menjadi KPD merupakan suatu kondisi dimana air ketuban pecah sebelum waktunya, yaitu sebelum dimulainya tanda inpartu (Lidia dan Mudlika, 2019)

Dalam keadaan normal, selaput ketuban pecah dalam proses persalinan. Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Bila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut ketuban pecah dini pada kehamilan prematur. Dalam keadaan normal 8-10% perempuan hamil aterm akan mengalami ketuban pecah dini (Sarwono, 2018).

Adapun macam-macam batasan, dan didefinisi mengenai ketuban pecah dini (KPD). Beberapa penulis mendefinisikan KPD yaitu apabila ketuban pecah spontan tanpa diikuti tanda-tanda persalinan seperti adanya pembukaan serviks akibat dari kontraksi uterus, pengeluaran lendir bercampur bercampur darah (Medina dan Hill. 2006). menurut prawiharjo (2010) KPD atau (KPSW) didefinisikan sebagai pecahnya ketuban sebelum

waktunya melahirkan. Ada juga teori yang menghitung durasi waktu pecahnya selaput ketuban sebelum inpartu (Phupong.2003).

Ada juga yang menyatakan dalam ukuran pembukaan serviks kala I misalnya pada primigravida ketuban pecah sebelum pembukaan serviks 3 cm dan kurang dari 5 cm pada multigravida (Mohctar.1998) sedangkan menurut Sastrawinata (2004) KPD adalah pecahnya selaput ketuban yang dibuktikan dengan adanya kebocoran air keuban (amniorrhesis) sebelum onset persalinan yang terjadi setelah umur kehamilan 22 minggu. KPD dapat terjadi pada umur kehamilan preterm dan aterm.

3. Klasifikasi

Menurut POGI tahun 2014. KPD diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu KPD preterm dan KPD aterm.

a. KPD preterm

Ketuban pecah dini preterm adalah pecahnya ketuban yang terbukti dengan vagina pooling, ter nitrazin, dan *tes fern* pada usia kehamilan <37 minggu sebelum onset persalinan ibu di antara 24 minggu sampai kurang dari 34 minggu, sedangkan KPD preterm saat usia kehamilan ibu antara 34 minggu samapai 37 minggu.

b. KPD aterm

Ketuban pecah dini aterm adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya yang terbukti dengan *vaginal pooling*. Tes nitrazin dan tes *fern* pada usia kehamilan >37 minggu.

4. Etiologi

Walaupun banyak publikasi tentang KPD, namun penyebabnya masih belum diketahui dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Kemungkinan yang menjadi factor predisposisi adalah :

a. Infeksi

Infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban yang berasal dari vagina atau infeksi cairan ketuban yang menyebabkan ketuban pecah dini.

1) Amnionitis atau korioamnionitis

Korioamnionitis adalah keadaan pada perempuan hamil dimana korion, amnion dan cairan ketuban terkena infeksi bakteri. Korioamnionitis merupakan komplikasi paling serius bagi ibu dan janin, bahkan dapat berlanjut menjadi sepsis.

Membrane korioamnionitis terdiri dari jaringan viskoelastik. Apabila jaringan ini dipicu oleh persalinan atau

infeksi maka jaringan akan menipis dan sangat rentan untuk pecah disebabkan adanya aktivitas enzim kolagenolitik.

2) Infeksi genitalia

Infeksi diyakini merupakan salah satu penyebab terjadinya KPD dan persalinan preterm. Vaginosis bacterial merupakan flora normal vagina dengan bakteri anaerob dalam konsentrasi tinggi seperti *gardnerella vaginalis*akan menimbulkan infeksi. Keadaan ini telah lama dikaitkan dengan kejadian KPD, persalinan preterm dan infeksi amnion, terutama bila pada pemeriksaan pH vagina 7,1-7,3. Normalnya nilai Ph adalah antara 3,8 – 4,5 abnormalitas vagina dapat mengindikasikan adanya infeksi vagina

b. Serviks yang tidak lagi mengalami kontraksi (serviks inkompetensia)

Keadaan ini didasarkan pada adanya ketidakmampuan serviks uteri untuk mempertahankan kehamilan. Kelainan ini dapat berhubungan dengan kelainan uterus dan bikornis. Sebagian besar kasus merupakan akibat dari trauma bedah pada serviks, dilatasi berlebihan serviks pada terminasi kehamilan atau laserasi.

c. Trauma misalnya hubungan seksual saat hamil dengan frekuensi lebih dari 3 kali seminggu, pemeriksaan dalam dan amniosintesis.

Pemeriksaan dalam merupakan manipulasi dari jari tangan pemeriksaan yang dimasukan kedalam vagina. Hal ini dapat memicu terjadinya KPD karena terdapat resiko masuknya infeksi ke dalam vagina yang dapat merusak selaput ketuban sehingga membran selaput ketuban mudah rapuh dan akhirnya pecah spontan.

- d. Tekanan intra uterin yang meningkat secara berlebihan (overdistensi uterus), misalnya polihidramnion dan gamelli.

Hidramnion atau polihidramnion adalah keadaan dimana banyaknya air ketuban melebihi 2000cc. penambahan air ketuban ini bisa mendadak dalam beberapa hari disebut *hidramnion akut*, atau secara perlahan-lahan disebut *hidramnion kronis*. Insidennya berkisar antara 1:64 dan 1:754 persalinan, tetapi bentuk yang menyebabkan gangguan lebih jarang (1: 1000 persalinan). Hidramnion yang disertai kelainan kongenital, terutama dari susunan saraf sentral dan traktus gastrointestinal, cukup tinggi. Di samping itu sering ditemukan pada kehamilan ganda dan beberapa penyakit ibu seperti diabetes mellitus, preeklampsia (Rachimhari,2005).

5. Mekanisme ketuban pecah dini

Ketuban pecah dalam persalinan secara umum disebabkan oleh kontraksi uterus dan peregangan berulang. Selaput ketuban pecah karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh, bukan karena seluruh selaput ketuban rapuh.

Terdapat keseimbangan antara sintesis dan degradasi ekstraselular matriks. Perubahan struktur, jumlah sel, katabolisme kolagen menyebabkan aktivitas kolagen berubah dan menyebabkan selaput ketuban pecah.

Faktor resiko untuk terjadinya ketuban pecah dini adalah:

- a. Berkurangnya asam askorbik sebagai komponen kolagen;
- b. Kekurangan tembaga dan asam askorbik yang berakibat pertumbuhan struktur abnormal karena antara lain merokok.

Degradasi kolagen dimediasi oleh matriks metalloproteinase (MMP) yang dihambat oleh inhibitor jaringan spesifik dan inhibitor protease. Mendekati waktu persalinan, keseimbangan antara MMP dan TIMP-1 mengarah pada degradasi proteolitik dari matriks ekstraselular dan membran janin. Aktivitas degradasi proteolitik ini meningkat menjelang persalinan. Pada penyakit periodonitis dimana terdapat peningkatan MMP, cenderung terjadi ketuban pecah dini.

Selaput ketuban sangat kuat pada kehamilan muda. Pada trisemester ketiga selaput ketuban mudah pecah. Melemahnya kekuatan selaput ketuban ada hubungannya dengan pembesaran uterus, kontraksi rahim, dan gerakan janin. Pada trisemester terakhir terjadi perubahan biokimia pada selaput ketuban. Pecahnya ketuban pada kehamilan aterm merupakan hal fisiologis. Ketuban pecah dini pada kehamilan preterm disebabkan oleh adanya faktor-faktor eksternal, misalnya infeksi yang menjalar dari vagina.

Ketuban pecah dini prematur sering terjadi pada polihidramnion, inkompeten serviks, solusio plasenta (Sarwono.2018:678).

6. Tanda dan gejala

Tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. Aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes, dengan ciri pucat dan bergaris warna darah. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran.

- a. Keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina
- b. Aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak. Mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes dengan ciri pucat dan bergaris warna darah.
- c. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran.
- d. Demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut jantung janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi.

7. Diagnosis

Tentukan pecahnya selaput ketuban dengan adanya cairan ketuban di vagina. Jika tidak ada dapat dicoba dengan menggerakkan sedikit bagian bawah janin atau meminta pasien batuk atau mengedan. Penentuan cairan ketuban dapat dilakukan dengan tes lakmus (*nitrazin tes*) merah menjadi biru.

Tentukan usia kehamilan, bila perlu dengan pemeriksaan USG. Tentukan ada tidaknya infeksi.

Tanda-tanda infeksi adalah bila suhu ibu lebih dari 38 derajat °C serta air ketuban keruh dan berbau. Leukosit darah > 15.000/mm. janin yang mengalami takikardia, mungkin mengalami infeksi intrauterine. Tentukan tanda-tanda persalinan dan scoring pelvik. Tentukan adanya kontaksi yang teratur. Periksa dalam dilakukan bila akan dilakukan penanganan aktif (terminasi kehamilan).

8. Komplikasi

Komplikasi yang timbul akibat ketuban pecah dini tergantung pada usia kehamilan dapat terjadi infeksi maternal maupun neonatal, persalinan prematur, hipoksia karena kompresi tali pusat, deformitas janin, meningkatnya insiden seksio sesarea, atau gagalnya persalinan normal.

a. Persalinan premature

Setelah ketuban pecah biasanya segera disusul oleh persalinan. Periode laten tergantung umur kehamilan. Pada kehamilan aterm 90 % terjadi dalam 24 jam setelah ketuban pecah. Pada kehamilan antara 28-34 minggu 50 % persalinan dalam 24 jam. Pada kehamilan kurang dari 26 minggu persalinan terjadi dalam 1 minggu.

b. Infeksi

Resiko infeksi ibu dan anak meningkat pada ketuban pecah dini. Pada ibu terjadi korioamnionitis. Pada bayi dapat terjadi septikemia, pneumonia, omfalitis. Umumnya terjadi korioamnionitis sebelum janin terinfeksi. Pada Ketuban Pecah Dini prematur, infeksi lebih sering dari pada aterm. Secara umum insiden infeksi sekunder pada Ketuban Pecah Dini meningkat sebanding dengan lamanya periode laten.

c. Hipoksia dan Asfiksia

Dengan pecahnya ketuban terjadi oligohidramnion yang menekan tali pusat hingga terjadi asfiksia atau hipoksia. Terdapat hubungan antara terjadinya gawat janin dan derajat oligohidramnion, semakin sedikit air ketuban, janin semakin gawat.

d. Sindrom Deformitas Janin

Ketuban Pecah Dini yang terjadi terlalu dini menyebabkan pertumbuhan janin terhambat, kelainan disebabkan kompresi muka dan anggota badan janin, serta hipoplasi pulmonar (sarwono.2018).

9. Penatalaksanaan Ketuban Pecah Dini

- a. Pastikan diagnosis
- b. Tentukan umur kehamilan
- c. Evaluasi ada tidaknya infeksi maternal ataupun infeksi janin

d. Apakah dalam keadaan inpartu, terdapat gawat janin

Riwayat keluarnya air ketuban berupa cairan jernih keluar dari vagina yang kadang-kadang disertai tanda-tanda lain dari persalinan.

Diagnosis Ketuban Pecah Dini prematur dengan inspekulo dilihat adanya cairan ketuban keluar dari vakum uteri. Pemeriksaan Ph vagina perempuan hamil sekitar 4,5; bila ada cairan pHnya sekitar 7,1 – 7,3. Antiseptik yang alkalin akan menaikkan pH vagina.

Dengan pemeriksaan *ultrasound* adanya Ketuban Pecah Dini dapat dikonfirmasi dengan adanya oligohidramnion. Bila air ketuban normal agaknya ketuban pecah dapat diragukan serviks.

Penderita dengan kemungkinan Ketuban Pecah Dini harus masuk rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Jika pada perawatan air ketuban berhenti keluar, pasien dapat pulang atau rawat jalan. Bila terdapat persalinan dalam kala aktif, korioamnionitis, gawat janin, persalinan diterminasi. Bila ketuban pecah dini pada kehamilan prematur, diperlukan penatalaksanaa yang komprehensif. Secara umum penatalaksanaan pasien Ketuban Pecah Dini yang tidak dalam persalinan serta tidak ada infeksi dan gawat janin, penatalaksanaanya bergantung pada usia kehamilan.

Adapun penatalaksana Ketuban Pecah Dini diantaranya

1) Tatalaksana umum

- a) Berikan *eritmisin* 4x500 mg selama 10 hari.
- b) Rujuk kevasilitas yang memadai

2) Tatalaksana khusus

Di rumah sakit rujukan. Tatalaksana sesuai usia kehamilan

a) >34 minggu

Lakukan induksi persalinan dengan *oksitosin* bila tidak ada kontraindikasi.

b) 24-34 minggu

(1) Bila terdapat *amnionitis*, *abrupsiplasenta* dan kematian janin, lakukan persalinan segera.

(2) Berikan *deksometason* 6 mg IM tiap 12 jam selama 48 jam atau *betametason* 12 gm IM tiap 24 jam selama 48 jam.

(3) Lakukan pemeriksaan serial untuk menilai kondisi ibu dan janin. Bayi dilahirkan di usia kehamilan 34 minggu, atau di usia kehamilan 34-33 minggu, bila dapat dilakukan pemeriksaan pematangan paru dan hasil menunjukkan bahwa paru sudah matang (komunikasikan dan sesuaikan dengan fasilitas perawatan bayi preterm).

c) <24 minggu

(1) Pertimbangan dilakukan dengan melihat resiko ibu dan janin.

- (2) Lakukan konseling pada pasien. Terminasi kehamilan mungkin menjadi pilihan.
- (3) Jika terjadi infeksi (korioamnionitis), lakukan tatalaksana korioamnionitis.

Penatalaksanaan korioamnionitis, yaitu :

a. Tatalaksanaan umum

- 1) Rujuk pasien ke rumah sakit.
- 2) Beri antibiotik kombinasi : *ampisilin* 2 mg IV tiap 6 jam ditambah *gentamisin* 5 mg/kgBB IV setiap 24 jam
- 3) Terminasi kehamilan. Nilai serviks untuk menentukan cara persalinan : Jika serviks matang : lakukan induksi persalinan dengan oksitosin dan jika serviks belum matang : matangkan dengan prostaglandin dan infuse oksitosin atau lakukan seksio cesarea.
- 4) Jika persalinan dilakukan pervaginam, hentikan antibiotik setelah persalinan. Jika persalinan dilakukan dengan seksio cesarea, lanjutkan antibiotika dan tambahkan *metronidazole* 500 mg IV tiap 8 jam sampai bebas demam selama 48 jam.

b. Tatalaksana Khusus

- 1) Jika terdapat metritis demam, cairan vagina berbau, berikan antibiotika.
- 2) Jika bayi mengalami sepsis, lakukan pemeriksaan kultur darah dan beri antibiotika yang sesuai selama 7-10 hari.

Adapun penanganan yang dapat dilakukan adalah :


a. Konservatif

- 1) Rawat di rumah sakit, berikan antibiotik (*ampisilin* 4x500 mg atau *eritromisin* bila tidak tahan ampisilin dan metronidazole 2x500 mg selama 7 hari).
- 2) Jika umur kehamilan <32-34 minggu, dirawat selama air ketuban masih keluar, atau sampai air ketuban tidak lagi keluar.
- 3) Jika usia kehamilan 32-37 minggu, belum inpartu, tidak ada infeksi, tes busa negative berikan *deksametason*.
- 4) Observasi tanda-tanda infeksi dan kesejahteraan janin.
- 5) Jika usia kehamilan 32-37 minggu, sudah inpartu, tidak ada infeksi, berikan tokolitik (*salbutamol*), *deksametason*, dan induksi sesudah 24 jam.
- 6) Jika usia kehamilan 32-37 minggu, ada infeksi, beri antibiotic dan lakukan induksi, nilai tanda-tanda infeksi (suhu, leukosit, tanda-tanda infeksi intrauterine).
- 7) Pada usia kehamilan 32-37 minggu, berikan steroid untuk memacu kematangan paru janin, dan bila memungkinkan periksa kadar *lesitin* dan *spingomielin* tiap minggu. Dosis bertameson 12 mg sehari dosis tunggal selama 2 hari, *deksametason* 1.M 5 mg setiap 6 jam sebanyak 4 kali.

b. Aktif

Kehamilan >37 minggu, induksi dengan oksitosin. Bila gagal seksio cesarea. Dapat pula diberikan *misoprostol* 25 ug-50 ug intravaginal tiap 6 jam maksimal 4 kali. Apabila ada tanda-tanda infeksi berikan antibiotik dosis tinggi dan persalinan diakhiri. Bila skor pelvik >5, lakukan pematangan serviks, kemudian induksi. Jika tidak berhasil, akhiri persalinan dengan *seksio cesarea*. Apabila skor pelvic >5, induksi persalinan.





C. Teori Manajemen Kebidanan Berdasarkan Kasus Persalinan Dengan Ketuban Pecah Dini Disertai Infeksi Intrapartum

1. Pengertian manajemen kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Yulifah, 2014 : 125).

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian/ tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien (Heryani, 2011 : 111).

Tujuh langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varney (2002) menjelaskan proses manajemen merupakan proses pemecahan masalah yang ditemukan oleh perawat dan bidan pada awal tahun 1970 an.

a. Langkah I : Pengumpulan data dasar

Pada langkah ini, dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap. Pada kasus KPD, data yang perlu untuk dikumpulkan yaitu, data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk Rumah sakit, riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat nifas yang lalu, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat

penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu.

Selain itu, data objektif pun termasuk kedalam asuhan kebidanan pada ibudengan KPD yang terdiri pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (*head to toe*), pemeriksaan dalam, dan pemeriksaan inspekulo. Terakhir yaitu pemeriksaan penunjang yang sangat membantu dalam menegakkan diagnosis yaitu pemeriksaan laboratorium uji kertas nitrazin yang akan berubah warna menjadi biru gelap jika pelepasan yang keluar adalah cairan amnion, kemudian pemeriksaan *ultrasonografi*(USG) untuk melihat jumlah cairan amnion yang ada di dalam kavum uteri dan pemeriksaan darah untuk melihat tanda-tanda infeksi yang terjadi pada ibu.

b. Langkah II : Mengidentifikasi diagnosis atau masalah aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis ataumasalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan, diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahannya.

c. Langkah III : Identifikasi diagnosis atau masalah potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan dapat diharapkan bersiap-siap bila diagnosis/ masalah potensial ini benar-benar terjadi. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman (Yulifah, 2014 : 133).

Tujuan dari langkah ketiga ini adalah untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang dapat muncul. Pada langkah ini, bidan mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial berdasarkan diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi atau diagnosis dan masalah aktual.

Diagnosis potensial yang mungkin terjadi pada ibu yaitu infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/ masa nifas, *dry labour*/ partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal.

Sedangkan masalah potensial yang terjadi pada janin yaitu prematuritas (*respiratory distress syndrome, hypothermia, neonatal feeding problem, retinopathy of prematurity, intraventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis, brain disorder (and risk of cerebral palsy, hyperbilirubinemia, anemia, sepsis), prolaps funiculi*/

penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder (kompresi tali pusat, *prolaps uteri, dry labour/ partus lama, APGAR score rendah, ensefalopaty, cerebral palsy, perdarahan intracranial, renal failure, respiratory distress*), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marmi dkk, 2016 : 105-106).

Pada langkah ketiga ini, bidan dituntut untuk mampu mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosis potensial tidak terjadi. Dengan demikian, langkah ini benar merupakan langkah yang bersifat antisipasi yang rasional/ logis. Kaji ulang diagnosis atau masalah potensial yang diidentifikasi sudah tepat.

d. Langkah IV : Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera

Tindakan segera merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara menetapkan kebutuhan tentang perlunya tindakan segera oleh bidan/ dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah ke empat ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Pada kasus persalinan dengan KPD, tindakan antisipasi atau tindakan segera yang harus dilakukan yaitu memberikan infus

cairanlarutan garam fisiologis, larutan glukosa 5-10%, induksi uterotonika dan pemberian antibiotik.

e. Langkah V : Intervensi/ Perencanaan tindakan asuhan kebidanan.

Perencanaan merupakan rencana asuhan menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen untuk masalah atau diagnosis yang telah diidentifikasi atau diantisipasi.

Pada langkah ini informasi data tidak lengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi. Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Semua perencanaan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori yang terbaru, *evidence based care*, serta divalidasi dengan asumsi mengenai apa yang diinginkan dan apa perencanaan sebaiknya pasien dilibatkan, karena pada akhirnya pengambilan keputusan untuk suatu rencana asuhan harus disetujui oleh pasien.

f. Langkah VI : Implementasi/ pelaksanaan asuhan

Pelaksanaan merupakan rencana asuhan menyeluruh dan dilakukan dengan efisien dan aman. Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah sebelumnya dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dapat dilakukan

seluruhnya oleh bidan atau sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Dalam situasi ketika bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut.

Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan menghemat biaya serta meningkatkan mutu asuhan klien. Pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

g. Langkah VII : Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang kita berikan kepada pasien. Kita mengacu kepada beberapa pertimbangan yaitu tujuan asuhan kebidanan, efektivitas tindakan untuk mengatasi masalah, dan hasil asuhan. Hasil Yang diharapkan dari manajemen kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD adalah dapat dilakukan partus secara spontan, komplikasi akibat tindakan medik dapat diatasi serta ibu dan janin dalam keadaan baik dan sehat. Evaluasi dilakukan secara siklus dan dengan mengkaji ulang aspek asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui faktor mana yang menguntungkan atau menghambat keberhasilan asuhan yang diberikan (Varney dkk, 2002 : 31).

2. Pendokumentasian dalam bentuk SOAP

Menurut Helen Varney, alur berfikir bidan saat menghadapi klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain apa yang telah dilakukan seorang bidan melalui proses berfikir sistematis, maka dilakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yaitu:

- a. **S (Subjektif)** menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis (langkah I Varney).
 - b. **O (Objektif)** menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji diagnosis lain yang merumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan (langkah I Varney)
 - c. **A (Pengkajian/ Assesment)** menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi:
 - 1) Diagnosis/ masalah
 - 2) Antisipasi diagnosis/ masalah potensial
 - 3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter/ konsultasi/ kolaborasi dan atau rujukan (langkah II, III dan IV Varney)
 - d. **P (Planning)** menggambarkan pendokumentasian tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesment (langkah V, VI dan VII Varney)
- (Mangkuji, 2012 : 136)

BAB III
STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANA INTRANATAL PADA NY”K”
DENGAN GESTASI KETUBAN PECAH DINI (KPD)
DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2021**

KALA I

Nomor register : 48xxx

Tanggal masuk rumah sakit : 06 september 2021 jam : 10.05 wita

Tanggal pengkajian : 06 september 2021 jam : 10.05 wita

Tanggal partus : 06 september 2021 jam : 16.55 wita

Nama pengkaji : Mulyanti

A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas istri/suami

Nama : Ny “Kasma” / Tn “Firman”

Umur : 23 tahun / 29 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun

Suku : Bugis / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Bontorea

2. Anamnesa (data subjektif)

a. Alasan utama ibu masuk

Ibu masuk dengan keluhan terdapat pengeluaran air pervaginam

b. Riwayat keluhan utama

a. Air ketuban yang keluar dikit demi sedikit dan bertambah banyak hingga sarung basah

b. Air yang keluar berwarna jernih dan tidak berbau

c. Ibu merasakan ada pengeluaran air sejak tanggal 06 september 2021 (kurang lebih 2 jam sebelum sampai kerumah sakit)

d. Ibu merasa mules dan nyeri perut tembus kebelakang sejak tanggal 06 september 2021 pukul 08.00 Wita

e. Riwayat pemeriksaan di puskesmas yaitu his/kontraksi 2x dalam 10 menit durasi 20 detik, pembukaan 1 cm

f. dan riwayat pemeriksaan kertas lakmus di puskesmas positif yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru yang menandakan air ketuban.

c. Riwayat menstruasi

1. Menarche : 14 tahun

2. Siklus : 28-30 hari

3. Lamanya : 6-7 hari

4. Banyaknya : 2-3 kali ganti pembalut setiap hari

5. Teratur tidak teratur : teratur

6. Sifat darah : encer

7. Disminorhea : tidak ada

d. Riwayat perkawinan

Ibu menikah satu kali dengan tuan Tn "F" pada tahun 2020, saat Ny "K" berusia 23 tahun dan Tn "F" berusia 29 tahun

e. Riwayat kehamilan yang sekarang

1) Ibu mengatakan ini kehamilannya yang pertama dan tidak pernah keguguran

2) Hari pertama haid terakhir tanggal 10 november 2020

3) Hari tafsiran persalinan tanggal 07 agustus 2021

4) Menurut ibu kehamilannya 9 bulan

5) Ibu merasakan pergerakan janinya kuat dirasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang

6) Ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 7 kali di puskesmas

Trisemester I : 2 kali

Trisemester II : 2 kali

Trisemester III : 3 kali

7) Ibu mendapatkan suntikan imunisasi tetanus toxoid (TT) sebanyak 2 kali yaitu :

a. TT I pada tanggal 1 januari 2021

b. TT 2 pada tanggal 14 februari 2021

8) Keluhan-keluhan

Trisemester I : tidak ada keluhan

Trisemester II : tidak ada keluhan

Trisemester III : sering kencing dan nyeri perut
bagian bawah

9) Penyuluhan ibu tidak pernah mendapat penyuluhan apapun

f. Riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu

1) Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes militus, asma, dan hipertensi

2) Tidak ada riwayat penyakit menular tuberculosis, malaria, hipertensi, dan penyakit menular seksual

3) Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan

4) Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah di opname di rumah sakit maupun di puskesmas.

g. Riwayat penyakit keluarga

Di dalam keluarga tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes militus, asma, dan penyakit keturunan lainnya.

h. Riwayat sosial ekonomi, psikososial dan spiritual

1) Yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga adalah suami

2) Hubungan ibu dan suami, keluarga maupun tatangga baik.

3) Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami.

4) Ibu rajin beribadah dan berdo'a untuk kelancaran persalinannya

i. Riwayat kb

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB apapun

j. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1) Riwayat nutrisi

Kebiasaan :

- a) Pola makan : nasi, sayur, lauk
- b) Frekuensi : 3 kali sehari
- c) Kebutuhan minuman : 6-8 gelas per hari

Selama Inpartu :

- a) Ibu tetap makan tetapi hanya sedikit dan lebih banyak minum

2) Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan :

- a) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau amniok
- b) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu :

- a) BAK : Ibu BAK di tempat tidur karena telah terpasang popok
- b) Ibu belum BAB (ibu terakhir BAB jam 06.00 WITA)

3) Personal Hygine

Kebiasaan :

- a) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- b) Sikat gigi : 2 kali sehari (setelah makan dan sebelum tidur) dengan menggunakan pasta gigi

c) Keramas : 3 kali seminggu menggunakan shampoo

d) Ganti pakaian : 2 kali sehari

Selama inpartu :

a) Ibu belum mandi dan sikat gigi

4) Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan :

a) Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

Selama inpartu :

a) Ibu tidak pernah tidur

3. Pemeriksaan fisik (Data Objektif)

a) Pemeriksaan umum

1) Keadaan umum ibu baik

2) Kesadaran *composmentis*

3) Hari tafsiran persalinan tanggal 17 Oktober 2021

4) Usia gestasi 41 minggu 6 hari

5) Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmhg Suhu : 37°C

Nadin : 80x/I Pernapasan : 24x/i

6) Tinggi badan : 151 cm

7) Berat badan sebelum hamil: 44 kg

8) Berat badan sekarang : 57 kg

9) Lingkar lengan atas (lila) : 28 cm

b) Pemeriksaan fisik (*head to toe*)

1) Kepala

Inspeksi : Kepala bersih, tidak ada ketombe, rambut hitam dan lurus

Palpasi : tidak ada massa, tidak mudah rontok, dan tidak ada nyeri tekan

2) Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak oedema pada wajah, ekspresi wajah tampak meringis setiap kali bergerak

3) Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, kelopak mata tidak bengkak, konjungtiva merah muda, sklera putih (tidak ikterus)

4) Hidung

Inspeksi : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran secret

Palpasi : tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak tampak adanya polip

5) Mulut dan gigi

Inspeksi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada gigi yang lubang, tidak ada stomatitis dan gusi tidak berdarah

6) Telinga

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen dan peradangan

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

7) Leher

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tyroid, kelenjar limfen dan vena jugularis.

8) Payudara

Inspeksi : payudara simetriks kiri dan kanan, puting susu menonjol, tampak hypegmentasi areola mammae.

Palpasi : tidak teraba adanya massa, kolostrum ada saat di pencet, tidak ada nyeri tekan

9) Abdomen

Inspeksi : Nampak pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, Nampak sriae livide dan linea nigra, tidak ada bekas luka Operasi

Palpasi : Leopold I : 2 jrbpx 35 cm, bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP 5/5

Lingkar perut : 87 cm

Tafsiran berat janin : $87 \times 35 = 3045$ gram

Denyut jantung janin : Denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan Bawah perut ibu dengan frekuensi 130 kali permenit.

His : 1x 10 menit durasi 5-10 detik

10) Genitalia

Inspeksi : tidak ada kelainan, tidak ada varices, Nampak pelepasan lendir bercampur dengan air ktuban

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada oedema, dan tidak ada nyeri tekan

11) Anus

Inspeksi : tidak ada hemoroid

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

12) Ekstrimitas atas dan bawah

Inspeksi : pergerakan aktif, tidak ada varises

Palpasi : tidak ada oedema

c) Pemeriksaan dalam

Vagina toucher (VT) I tanggal 6 november 2020. Jam 10.05 Wita

- 1) Vulva Dan Vagina : Normal
- 2) Portio : tebal
- 3) Pembukaan : 1 cm
- 4) Air ketuban : Jernih
- 5) Presentase : Kepala

- 6) Penurunan : Hodge I
- 7) Penumbungan : Tidak Ada
- 8) Molase : Tidak Ada
- 9) Kesan panggul : Normal
- 10) Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban

d) Pemeriksaan valsava

Tanggal : 06 september 2021 jam: 10.10 WITA

Hasil pemeriksaan terdapat pengeluaran air ketuban dengan merembes.

e) Pemeriksaan laboratorium (sampel darah)

- 1) WBC : $9.4 \times 10^3/\mu L$
- 2) RBC : $4.43 \times 10^6/\mu L$
- 3) HGB : 11.09 g/dl
- 4) HCT : 34.7%
- 5) MTV : 78.3fl
- 6) MCH : 24.8 pg
- 7) MCHC : 31.7g/dl
- 8) Hbsag : Negatif

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

GIP0A0, gestasi 41 minggu 6 hari, intra uterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I fase laten dengan KPD

1. GPA : GIP0A0

Data Subjektif : ibu mengatakan ini adalah kehamilannya yang pertama dan sebelumnya ibu tidak pernah mengalami keguguran.

Data Objektif : nampak linea nigra dan striae livid, terdapat denyut jantung janin, dan pada saat palpasi teraba bagian-bagian janin.

Analisa dan interpretasi data :

Tanda-tanda pasti hamil

- a. Gerakan janin dapat dilihat atau diraba, juga bagian-bagian janin
- b. Denyut jantung janin.
 - a) Didengar dengan *stetoskop-monoral Laennec*
 - b) Dicatat dan didengar dengan alat *Doppler*
 - c) Dicatat dengan *feto-eloktro kardiogram*
 - d) Dilihat pada *ultrasonografi*.

c. Terlihat tulang-tulang janin dalam foto *rontgen*.(Dewi Setiawati 2020 :15-16)

2. Gestasi 41 minggu 6 hari

Data Subjektif : hari pertama haid terakhir tanggal 10 november 2020

Data Objektif : pemeriksaan Leopold I, tinggi fundus uteri 2 jari dibawah *proceccus xiphoideus*. Dan hari tafsiran persalinan tanggal: 17 agustus 2021 berdasarkan rumus Neagle.

Analisa dan interpretasi data

Dari hasil pemeriksaan dilihat dengan menggunakan rumus Neagle, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal 10 november 2020 sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan ..minggu..hari (prawihardjo. 2018:279)

3. Intrauterine

Data Subjektif : ibu merasakan janinya bergerak dengan kuat dan ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilan.

Data Objektif : ibu tidak merasakan nyeri ketika dipalpasi, TFU sesuai umur kehamilan, pada palpasi Leopold teraba bagian-bagian kecil pada janin.

Analisa dan interpretasi data

Pembesaran perut sesuai usia kehamilan, janin dapat teraba saat palpasi serta tidak ada nyeri perut yang hebat dan tidak ada nyeri tekan, hal ini menandakan kehamilan kehamilan ibu intrauterin (prawihardjo,2014).

4. Tunggal

Data Subjektif : ibu mengatakan pergerakan janinya lebih sering di sebelah kanan perut ibu

Data Objektif : palpasi abdomen :

Leopold I : 2 jrbpx, 35 cm, Bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP 5/5

DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 130 kali permenit

Analisa dan interpretasi data

Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu(Baety, 2012 :10-11)

5. Hidup

Data Subjektif : ibu merasakan pergerakan janinya..kali dalam sehari

Data Objektif : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 130 kali permenit.

Analisa dan interpretasi data

Adanya gerakan janin dan DJJ, merupakan tanda bahwa janin hidup, janin dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali permenit, selain itu tanda hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat satu kali per jam atau lebih dari 10 kali perhari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (prawihardjo,2014:285).

6. Keadaan ibu dan janin baik

Data Subjektif : tidak ada keluhan-keluhan lain dan kecemasan yang dirasakan ibu selama kehamilan, ibu merasakan pergerakan janin kuat dan biasanya bergerak 12 kali dalam sehari.

Dana Objektif : keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 130 kali permenit dan pemeriksaan *head to toe* kongjungtiva mera muda, wajah dan tungkai tidak oedema, hemoglobin 11,2 gr/dl menandakan ibu tidak anemia.

Analisa dan interpretasi data

Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal dan DJJ yang teratur dan berbeda dalam batas normal yang menandakan keadaan ibu dan janin baik, kongjungtiva merah muda hemoglobin normal. (pantiawati dan saryono, 2010).

7. Inpartu kala I fase laten dengan KPD

Data Subjektif : ibu mengatakan adanya pengeluaran air hingga satu sarung basah

Data Objektif : pengeluaran air pervaginam yang berwarna jernih, dan berbau amis, belum ada kontraksi. Selain itu, adapun hasil pemeriksaan lainnya, antara lain:

a. Hasil pemeriksaan dalam jam: 10.05 wita

1) Vulva Dan Vagina : Normal

2) Portio : Tebal

3) Pembukaan : 1 cm

4) Ketuban : Jernih

5) Presentase : Kepala

6) Penurunan : Hodge I

7) Molase : Tidak Ada

8) Penumbungan : Tidak Ada

9) Kesan panggul : Normal

10) Pelepasan : Lendir, Darah dan
Air Ketuban

- b. Hasil pemeriksaan *tes valsava* yaitu terdapat pengeluaran air ketuban dengan merembes.

Analisa dan interpretasi data

- a. Adanya pengeluaran cairan yang banyak secara tiba-tiba dari jalan lahir, cairan berbau khas yang menandakan telah terjadi pelepasan ketuban (Norma dan Dwi,2018:249)
- b. Pemeriksaan *tes valsava* membuktikan bahwa terdapat pengeluaran air ketuban (Norma dan Dwi,2018:249)
- c. KPD adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan atau sebelum inpartu, pada pembukaan < 4 cm (fase laten). Hal ini dapat terjadi pada akhir kehamilan atau jauh sebelum waktunya melahirkan (Nugroho.2012:150).
- d. Dilatasi serviks 1-3 cm merupakan fase laten (Nugroho.2012:247).

C. LANGKAH : III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Masalah potensial yang akan terjadi yaitu:

1. Pada ibu yaitu komplikasi yang bisa disebabkan oleh KPD yaitu *intrapartal* dalam persalinan, infeksi puerpralis/masa nifas, partus lama, pendarahan post partum, meningkatkan tindakan operatif obstetric (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal.

2. Pada janin yaitu prematuritas (*sindrom distress* pernafasan, *hipotermia*, masalah pemberian makan pada *neonatal*, pendarahan *intraventikuler*, gangguan otak dan resiko *cerebral palsy*, anemia, skor APGAR rendah, *ensefelopati*, *cerebra palsy*, pendarahan *intracranial*, gagal ginjal, *distress* pernafasan). Dan *oligohidramnion* (*sindrom deformitas* janin, *hipoplasia* paru, *deformitas* ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat) morbiditas dan mortalitas perinatal.

Data Subjektif : ibu mengatakan terdapat pengeluaran air pervaginam hingga satu sarung basah.

Data Objektif : tampak pengeluaran air dari pervaginam, warnah jernih, dan bau amis

Analisa dan interpretasi data

- a. Resiko meningkat pada KPD kemudian menyebabkan hubungan langsung antara luar dan dalam ruang rahim sehingga memudahkan terjaninya infeksi pada jalan lahir (Nugroho, 2012:154)
- b. KPD memberi pengaruh/komplikasi pada ibu dan janin yaitu pada ibu potensial terjadinya infeksi *intraparta*/dalam persalinan, infeksi *puerpalis*/masa nifas, *dry labour*/partus lama, pendarahan post partum, meningkatnya tindakan operatif obstetric (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas (marni dkk,2016:105-106).
- c. Masalah potensial yang terjadi Pada janin yaitu prematuritas (*sindrom distress* pernafasan, *hipotermia*, masalah pemberian

makan pada *neonatal*, pendarahan *intraventikuler*, gangguan otak dan resiko *cerebral palsy*, anemia, skor APGAR rendah, *ensefelopati*, *cerebra palsy*, pendarahan *intracranial*, gagal ginjal, *distress* pernafasan). Dan *oligohidramnion* (*sindrom defornits janin*, *hipoplasia* paru, *deformitas* ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat) borbiditas dan mortalitas perinatal. (marni dkk, 2016:105-106).

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

KOLABORASI

Kolaborasi dengan dokter.

1. Penanganan infus RL 28 tetes per menit

Rasional : membantu mengganti cairan ibu yang hilang selama proses persalinan

2. Pemasangan mioprostol 1/8 tab pervaginam

Rasional : untuk pematangan serviks dan membantu kontraksi uterus

3. Injeksi cefotaxime 1 gr/IV

Rasional : mencegah resiko terjaninya infeksi

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Masalah aktual : Ketuban Pecah Dini (KPD)

2. Tujuan :

- a. Persalinan dapat berlangsung normal, keadaan ibu dan janin baik.
- b. Tidak terjadi infeksi

3. Criteria

- a. Primipara tidak lebih dari 13 jam.
- b. DJJ dalam batas normal (120-160 kali per menit).
- c. Tanda-tanda vital batas normal
 - 1) Tekanan darah
 - a) Systole 100-200 mmHg
 - b) Diastole 60-90 mmHg
 - 2) Suhu normal $36,5^{\circ}\text{C} - 37,5^{\circ}\text{C}$
 - 3) Nadi normal 60-100x/menit
- d. Keadaan ibu dan janin baik.

4. Rencana tindakan

- a. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga

Rasional : agar ibu dan keluarga memahami tentang keadaan ibu memberi dukungan yang dapat mengurangi kecemasan dan siap menghadapi persalinan.

- b. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit)

Rasional : observasi tanda-tanda vital memantau keadaan ibu seperti memantau terjadinya demam yang merupakan tanda-tanda infeksi pada ibu sehingga mempermudah melakukan tindakan.

c. Observasi DJJ setiap 30 menit

Rasional : saat ada kontraksi, DJJ bisa berubah sesaat apabila ada perubahan dapat diketahui dengan cepat dan tepat bertindak secara cepat dan tepat.

d. Observasi *vagina toucher* (VT) control tiap 2 jam/4 jam, atau jika ada indikasi.

Rasional : untuk memantau kemajuan persalinan

e. Observasi his setiap 30 menit

Rasional : karena kekuatan kontraksi uterus dapat berubah setiap saat sehingga mempengaruhi penurunan kepala.

f. Ajarkan tehnik relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi mengajurkan ibu untuk menarik napas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut seperti sedang meniup-niup selama timbul kontraksi.

Rasional : untuk mengurangi rasa sakit akibat kontraksi

g. Ajurkan pengosongan kandung kemih sesering mungkin

Rasional :

- 1) Kandung kemih yang penuh dapat mengurangi kontraksi, mencegah penekanan pada vena cava inferior oleh uterus yang membesar.
- 2) Menghalangi penurunan kepala bayi dan memberi perasaan tidak nyaman pada ibu.

- h. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian infus RL 28 tetes per menit, misoprostol 1/8 tab pervaginam dan antibiotik cefotaxime 1 gram/IV sesuai instruksi dokter.

Rasional : pemberian infuse membantu untuk mengganti cairan ibu yang hilang selama proses persalinan, pemasangan misoprostol dapat membantu pematangan serviks/dilatasi serviks serta pemberian antibiotik dapat mencegah terjadinya infeksi.

- i. Memberi intake minum dan makan pada ibu

Rasional : agar ibu memiliki tenaga pada saat meneran

- j. Menganjurkan ibu untuk selalu berdoa untuk kelancaran persalinan dan juga untuk kesehatan dan keselamatan ibu dan janin.

Rasional : agar ibu senantiasa berserah diri dan bertawakkal kepada sang pencipta.

- k. Dokumentasikan hasil pemantauan kala I dalam partograf

Rasional : merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan memudahkan pengambilan keputusan Klinik.

F. LANGKAH VI : PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal: 06 september 2021. Jam 10.05 WITA

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga jam 10.05 wita
2. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap jam 10.05 Wita (kecuali nadin setiap 30 menit), DJJ dan histiap 1 jam pada kala 1 fase laten dan tiap

30 menit pada kala fase aktif, kecuali jika ada indikasi dilakukan tiap 30 menit.

waktu	Nadin	Suhu	Tekanan Darah	DJJ	His
10.05	80x/i			130x/i	1x10 menit durasi 10-15 detik
11.05	81x/i			135x/i	2x10 menit durasi 15-20 detik
12.05	80x/i			135x/i	2x10 menit durasi 20-25 detik
13.05	80x/i	36,7 °C	120/80mmHg	135x/i	2x10 menit durasi 20-25 detik

Sember Data : Sekunder

3. Mengobservasi vagina toucher (VT) II tanggal, 06 september 2021, jam 13.05 WITA
 - a. Vulva dan vagina : Normal
 - b. Portio : Tipis
 - c. Pembukaan : 5 cm
 - d. Ketuban : jernih (merembes)
 - e. Presentasi : ubun-ubunkecil kanan lintang
 - f. Penurunan :Hodge II
 - g. Molase : Tidak Ada
 - h. Penumbungan : Tidak Ada
 - i. Kesan panggul : Normal
 - j. Pelepasan : Lendir, darah dan air ketuban
4. Melanjutkan pemantauan tanda-tanda vital setiap jam 13.05 Wita (kecuali nadin setiap 30 menit), DJJ dan His

Waktu	Nadin	Suhu	Tekanan darah	DJJ	His
13.35	80x/i	37.5°C		130x/i	3x10 menit durasi 20-25 detik
14.05	80x/i			130x/i	4x10 menit durasi 25-30 detik
14.35	78x/i			130x/i	4x10 menit durasi 30-35 detik
15.05	80x/i			138/i	4x10 menit durasi 30-35 detik
15.35	80x/i			130x/I	4x10 menit durasi 35-40 detik
16.05	80x/i			135x/I	5x10 menit durasi 40-45 detik
16.35	80x/i	37.5°C	120/80 mmHg	135x/I	5x10 menit durasi 45-50 detik

Sumber data : sekunder

5. Mengobservasi vagina toucher (VT) III tanggal, 06 september 2021, jam 16.35 WITA
- Vulva dan vagina : Normal
 - Portio : melelap
 - Pembukaan : 10 cm (lengkap)
 - Ketuban : jernih (merembes)
 - Presentasi : ubun-ubun depan
 - Penurunan :Hodge IV
 - Molase : Tidak Ada
 - Penumbungan : Tidak Ada
 - Kesan panggul : Normal

- j. Pelepasan : Lendir, darah dan air ketuban
- 6. Mengajarkan kepada ibu tehnik relaksasi yaitu menarik napas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut seperti sedang meniup-niup
- 7. Mengajarkan kepada ibu untuk mengosongkan kandung kemih sesering mungkin
- 8. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian infuse RL 28 tetes per menit, misoprostol 1/8 tab pervaginam, dan antibiotic cevatoxime 1 gram/IV sesuai intruksi dokter.
- 9. Memberi makan dan minum jika tidak ada his
- 10. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga untuk berdoa untuk kelancaran persalinan dan kesehatan untuk ibu dan bayinya.
- 11. Mencatat dalam partograf

G. LANGKAH VII EVALIASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 06 september 2021 jam: 16.35 WITA

- 1. Keadaan ibu dan janin baik dan di tandai dengan :
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - a) Tekanan darah : 120/80mmHg
 - b) Suhu : 37,5^oC (axilla)
 - c) Nadin : 80 kali permenit
 - d) Pernapasan :24 Kali per menit
 - b. DJJ 130 kali per menit terdengar jelas kuat dan teratur

2. Kala I fase aktif di tandai dengan :
 - a. His yang adekuat 5x10 kali dalam 10 menit dengan durasi 45-50 detik
 - b. Pembukaan lengkap (10 cm) 6 jam setelah *vagina toucher*(VT) pertama dan penurunan kepala hodge IV
 - c. Tidak ada tanda-tanda infeksi
 - d. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL
PADA NY”K” DENGAN GESTASI KETUBAN PECAH DINI (KPD)
DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
TANGGAL 06 SEPTEMBER 2021**

Nomor register : 48xxx

Tanggal masuk : 06 september 2021 jam : 10.05 wita

Tanggal pengkajian : 06 september 2021 jam : 10.05 wita

Tanggal partus : 06 september 2021 jam : 16.55 wita

Nama pengkaji : Mulyanti

KALA I

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny “Kasma” / Tn “Firman”

Umur : 23 tahun / 29 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun

Suku : Bugis / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Bontorea

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan adanya pengeluaran air pervaginam sejak tanggal 06 september 2021, pukul 08.00 WITA.
2. Ibu merasa mules dan nyeri perut tembus kebelakang sejak tanggal 06 september 2021, pukul 08.00
3. Ibu mengatakan sifat nyeri hilang timbul

4. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan yang pertama
5. Ibu mengatakan haid terakhirnya tanggal 10 november 2020
6. Ibu mengatakan usia kehamilannya ± 9 bulan
7. Ibu mengatakan pergerakan janinya dominan terasa pada sebelah kanan perut ibu dan dirasakan sejak usia kehamilan ± 4 bulan tepatnya bulan february 2021 sampai sekarang
8. Ibu tidak pernah menderita penyakit asma, DM, hipertensi, jantung dan penyakit lainnya

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran *composmentis*
3. HTP : 17 Oktober 2021
4. Gestasi : 41 minggu 6 hari
5. Pemeriksaan antropometri

BB : sebelum hamil : 44 kg

Sekarang : 57,5 kg

TB : 151 cm

LILA : 26 cm

6. Tanda-tanda vital

a. TD : 120/80 mmHg

b. N : 80x/i

c. S : 37°C

d. P : 24x/i

7. Pemeriksaan fisik terfokus

1. Mata : simetris, kelopak mata tidak bengkak, konjungtiva merah mudah, sklera putih (tidak ikterus)
2. Payudara : simetriks, puting susu menonjol, tampak hypegmentasi areola mammae.

Palpasi : tidak teraba adanya massa, kolostrum ada saat di pencet, tidak ada nyeri tekan

3. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada luka bekas operasi linea nigra.

Palpasi : Leopold I : 2 rbp x 35 cm, bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP 5/5

LP : 87 cm

TBJ : TFU x LP

$87 \times 35 = 3045 \text{ gram}$

Auskultasi : (DJJ) terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan Bawah perut ibu dengan frekuensi 130 kali permenit.

His : 1 kali dalam 10 menit durasi 5-10 detik

4. Genitalia

Inspeksi : tidak ada oedema, tidak ada varices, tampak pengeluaran lendir, darah dan air ketiban

Palpasi: melakukan VT pertama pada tanggal 6 november 2020, pukul 10.05

1. Vulva Dan Vagina : Normal
 2. Portio : tebal
 3. Pembukaan : 1 cm
 4. Air ketuban : Jernih
 5. Presentase : Kepala
 6. Penurunan : Hodge I
 7. Penumbungan : Tidak Ada
 8. Molase : Tidak Ada
 9. Kesan panggul : Normal
 10. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban
5. Ekstermitas
- Inspeksi : simetris
- Palpasi : tidak ada oedema dan tidak ada varises

ASSESSMENT (A)

G1P0A0, gestasi 41 minggu 6 hari, situs memanjang, intrauterine, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala 1 fase laten, dengan ketuban ketuban pecah dini.

PLANNING (P)

Tanggal 06 september 2021, pukul 10.05 WITA

1. Menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan yaitu pembukaan sudah 1 cm, ketuban jernih keadaan ibu dan janin baik
2. Mengosongkan kandung kemih
3. Mengajarkan kepada ibu untuk menarik napas ketika terjadi kontraksi yaitu tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan lewat mulut seperti orang yang sedang meniup-niup dan istirahat apabila tidak ada his, beritahu keluarga untuk memberi ibu makan dan minum di sela-sela kontraksi.
4. Mengajarkan ibu untuk miring kiri dan tidak boleh berjalan karena ketuban sudah pecah
5. Mengajarkan ibu cara mengedan yang benar yaitu tarik napas dalam-dalam lalu berkuat seperti orang yang sedang BAB, mata melihat perut ibu dan jangan mengeluarkan suara, keluarga membantu mengangkat badan ibu apabila pembukaan sudah lengkap
6. Menanyakan kepada ibu siapa yang akan mendampingi pada saat persalinan
7. Memberikan dukungan emosional dan spiritual pada ibu dan keluarga agar tetap siap fisik dan mental selama persalinan
8. Mengajarkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa berdo'a dan berzikir agar persalinan ibu lancar
9. Melakukan pemasangan infuse RL 28 tetes/menit
10. Memberikan injeksi cefotaxime 1 gr IV/12 jam sesuai intruksi dokter

11. Memantau DJJ, Nadin dan his tiap 30 menit, tekanan darah, suhu setiap 4 jam dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam.

Tabel 3.1. pemantauan his, DJJ, nadin,tekanan darah, dan suhu

Waktu	His	DJJ	Nadin	Tekan darah	Suhu
10.05	1x10'(10"-15")	130x/i	80x/i		
11.05	2x10'(15"-20")	130x/i	81x/i		
12.05	2x10'(20"-25")	135x/I	80x/i		
13.05	2x10'(20"-25")	135x/I	80x/i	120/80mmHg	36,7 °C

Sumber data : sekunder

12. Melakukan VT II tanggal tanggal, 06 september 2021, jam 13.05 wita

Vulva dan vagina : Normal
 Portio : Tipis
 Pembukaan : 5 cm
 Ketuban : jernih (merembes)
 Presentasi : ubun-ubun kecil kanan lintang
 Penurunan :Hodge II
 Molase : Tidak Ada
 Penumbungan : Tidak Ada
 Kesan panggul : Normal
 Pelepasan : Lendir, darah dan air ketuban

13. Memantau DJJ, nadin dan his tiap 30 menit, tekan darah, suhu dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam.

Table 3.2 pemantauan his, DJJ, nadin, tekanan darah, dan suhu

Waktu	His	DJJ	Nadin	Tekanan darah	Suhu
13.35	3x10'(20''=25'')	130x/i	80x/I		37.5°C
14.04	4x10'(25''-30'')	130x/i	80x/I		
14.35	4x10'(30''-35'')	130x/i	78x/I		
15.05	4x10'(30''-35'')	138x/i	80x/I		
15.35	4x10'(35''-40'')	130x/	80x/I		
16.05	5x10'(40''-45'')	135x/	80x/I		
16.35	5x10'(45''-50'')	135x/	80x/I	120/80 mmHg	37.5°C

Sumber data :sekunder

14. VT III tanggal, 06 september 2021, jam 16.35 WITA

Vulva dan vagina : Normal

Portio : melesap

Pembukaan : 10 cm (lengkap)

Ketuban : jernih (merembes)

Presentasi : ubun-ubun depan

Penurunan :Hodge IV

Molase : Tidak Ada

Penumbungan : Tidak Ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah dan air ketuban

15. Memantau kemajuan persalinan dengan partograf

KALA II**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan sakitnya semakin kuat dan sering
2. Ibu mengatakan ada dorongan yang kuat untuk meneran
3. Ibu mengatakan ada tekanan pada anus dan rasa ingin meneran

DATA OBJEKTIF (O)

1. Perineum mononjol
2. Vulva dan anus membuka
3. VT tanggal 06 september 2021, pukul 16.35 wita

Vulva dan vagina : Normal

Portio : melesap

Pembukaan : 10 cm (lengkap)

Ketuban : jernih (merembes)

Presentasi : ubun-ubun depan

Penurunan : Hodge IV

Molase : Tidak Ada

Penumbungan : Tidak Ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah dan air ketuban

ASSESMEN (A)

Diagnosa : perlangsungan kala II

Masalah potensial : potensial terjadinya oligohidramnion

potensial terjadi asfiksia neonatorum

potensial terjadinya APGAR score rendah

potensial terjadinya hipotermi

PLANNING (P)

Tanggal 06 september 2021, pukul 10.05 WITA

1. Melihat adanya tanda dan gejala kala II
(dorongan kuat untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan anus membuka)
2. Menyiapkan alat dan bahan persalinan
 - a. Partus set
 - 1) Klem kocher
 - 2) ½ kocher
 - 3) Gunting tali pusat
 - 4) Gunting episiotomy
 - 5) Penjepit tali pusat
 - 6) Kateter
 - 7) Kasa
 - 8) Handscoon
 - b. Hecting set
 - 1). Naadle voerder
 - 2). Pinset anatomi
 - 3). Jarum

- 4). Catgut
 - 5). Gunting benang
 - 6). Kasa
 - c. Air DTT
 - d. Kapas DTT
 - e. Larutan clorin
 - f. Tempat sampah
 - g. Tensimeter
 - h. Stetoskop
 - i. Deele
 - j. Dopler
 - k. Underped
 - l. Obat
 - 1). Cairan infus
 - 2). Oksitosin
 - 3). Lidocain
 - 4). Salep mata
 - 5). Vit.k
 - 6). HbO
3. Memakai celemek
 4. Memastikan tangan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir

5. Memakai handscoon
6. Mempersiapkan oksitosin 1 ampul 10 IU dengan satu tangan
7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas savlon
8. Melakaukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap tanggal 06 september 2021, pukul 16.35 WITA

Vulva dan vagina : normal

Protio : melesap

Pembukaan : 10 cm (lengkap)

Ketuban : jernih (merembes)

Presentasi : ubun-ubun depan

Penurunan :Hodge IV

Molase : Tidak Ada

Penumbungan : Tidak Ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah dan air ketuban

9. Mencilupkan hanscoon secara terbalik ke dalam larutan clorin 0,5%
10. Mendengar DJJ jika tidak ada kontraksi
11. Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan ibu dan janin baik
12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu yang baik untuk meneran serta mengajurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa berdoa dan berzikir agar persalinanya dilancarkan

13. Melakukan pimpinan meneran jika ada kontraksi
14. Membantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman
15. Memasang handuk bersih diatas perut ibu jika terlihat kepala janin membuka vulva 5-6 cm
16. Meletakkan underpad di bawah bokong ibu
17. Membuka bak partus
18. Memakai hanscoon steril pada kedua tangan
19. Memimpin persalinan dengan melindungi perineum
20. Memeriksa adanya lilitan tali pusat
21. Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar
22. Meletakkan tangan secara biparietal dengan hati-hati, gerakan tangan kearah bawah untuk melahirkan bahu anterior dan gerakan tangan kearah atas untuk melahirkan bahu posterior
23. Melahirkan kepala leher dan bahu dengan sanggah susur
24. Malahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung kearah bokong sampai tungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk diantara kedua kaki.
Hasil : bayi lahir spontan tanggal 06 september 2021, pukul : 16.55 wita,
BB : 3000 gram, PB : 48 cm.
25. Meletakkan bayi diatas perut ibu lalu lakukan penilaian sepiantas dan menilai *apgar score* pada menit pertama dan menit kelima
Hasil : a. bayi menangis kuat, dan bernapas tanpa kesulitan
b. badan bayi kemerah-merahan dan bergerak aktif
penilaian *apgar score* yang dilakukan oleh bidan

Tabel 3.3 penilaian *apgar score*

Yang dinilai	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Menit 1	Menit 5
<i>Appearance</i> (warna kulit)	Bayibiru, pucat	Tubuh kemerahan, ekstermitas biru	Seluruh badan kemerahan	1	2
<i>Pulse</i> (denyut jantung)	Tidak ada	<100x/i	>100x/i	2	2
<i>Grimance</i> (refleks)	Tidak ada	Merintih	Batuk bersin	2	2
<i>Activity</i> (tonus otot)	Tidak ada	Refleks pada ekstermitas	Bergerak aktif	1	2
<i>Respiratory</i> (Pernapasan)	Tidak ada	Lambat, tidak teratur	Menangis kuat	2	2

Jumlah *APGAR score* :8/10

Sumber data sekunder

26. Mengeringkan seluruh badan bayi dengan kain bersih dan kering
27. Memeriksa fundus uteri untuk memastikan kehamilan tunggal
28. Meminta ijin ibu untuk disuntik oksitosin 10 IU

29. Menyuntikan oksitosin 10 UI di 1/3 lateral paha ibu secara IM
30. Menjepit tali pusat dengan umbilica cord 3 cm dari umbilicus perut bayi, urut kearah ibu lalu jepi klem kedua 2 cm dari penjepit tali pusat
31. Satu tangan memegang tali pusat bayi dan melindungi perut bayi sementara tangan yang satu memotong tali pusat secara perlahan
32. Meletakkan bayi diatas perut ibu untuk IMD dan kontak skin to skin dengan ibunya selama 1 jam
33. Beri topi pada bayi dan selimuti kain hangat.

KALA III

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan nyeri perut
2. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya
3. Ibu senantiasa berdoa dan berdzikir agar keadaannya dan bayi tetap sehat

DATA OBJEKTIF (O)

1. Bayi lahir spontan pada tanggal 06 september 2021, pukul 16.55 WITA dengan Berat badan 3000 gram, panjang badan 48 cm dan A/S : 8/10
2. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
3. TFU teraba setinggi pusat
4. Perdarahan \pm 200 cc
5. Plasenta belum terlepas
6. Tampak tali pusat di depan vulva

ASSESSMENT (A)

Perlangsungan kala III

PLANNING (P)

Tanggal 06 september 2021, pukul 16.55 WITA

34. Memindahkan klem tali pusat hingga 5-6 cm dari depan vulva
35. Meletakkan tangan kiri di atas symphysis menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem.
36. Meregangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso cranial
37. Meregangkan tali pusat ke arah atas dan ke bawah
38. Menjemput plasenta dengan kedua tangan jika plasenta sudah tampak di depan vulva
39. Melahirkan plasenta dengan memutar searah jarum jam
Hasil: plasenta lahir jam 17.00 WITA
40. Memeriksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap
41. Memeriksa adanya robekan jalan lahir
Hasil: tidak terdapat rupture

KALA IV**DATA SUBJEKTIF (S)**

Ibu mengatakan lelah setelah melahirkan

DATA OBJEKTIF (O)

1. Kala III berlangsung ± 5 menit
2. Plasenta lahir lengkap pukul 17.00 WITA
3. TFU setinggi pusat
4. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
5. Perdarahan ± 150 cc
6. Pemeriksaan TTV

TD : 110/80 mmHg

N : 80 x/i

S : 37°C

P : 24 x/i

7. Terdapat laserasi tingkat II

ASSESSMENT (A)

Perlangsungan kala IV

PLANNING (P)

Tanggal 06 september 2021, pukul 17.00 WITA

42. Memeriksa kontraksi uterus dan robekan jalan lahir
43. Membiarkan bayi tetap melakukan IMD selama 1 jam
44. Melakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi baru lahir, berikan salep mata dan vitamin K di 1/3 lateral paha kiri bayi secara IM

Hasil: BB : 3000 gram

PB : 48 cm

LK : 33 cm

LD : 34 cm

LP : 32 cm

Vit K telah diberikan di 1/3 lateral paha kiri bayi secara IM

45. Memberikan imunisasi hepatitis B di 1/3 lateral paha kanan bayi secara IM 1 jam setelah pemberian vitamin K

46. Melakukan pemantauan kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit pada 1 jam pertama, dan tiap 30 menit pada 1 jam kedua.

Tabel 3.4. Pemantauan kontraksi uterus dan kandung kemih

Waktu	Kontraksi uterus	Kandung kemih
17.15	Baik	kosong
17.30	Baik	kosong
17.45	Baik	kosong
18.00	Baik	kosong
18.30	Baik	kosong
19.00	Baik	kosong

Sumber Data : sekunder

47. Melakukan pemantauan tinggi fundus uteri dan perdarahan setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan tiap 30 menit pada 1 jam kedua

Tabel 3.5. Pemantauan tinggi fundus uteri dan perdarahan

waktu	Tinggi fundus uteri	Pendarahan
-------	---------------------	------------

17.15	Setinggi pusat	±50 cc
17.30	Setinggi pusat	±45 cc
17.45	Setinggi pusat	±30 cc
18.00	Setinggi pusat	±30 cc
18.30	Setinggi pusat	±30 cc
19.00	Setinggi pusat	±20 cc

Sumber data : sekunder

48. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan masase dan menilai kontraksi

49. Melakukan pemantauan tekanan darah dan nadi setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan tiap 30 menit pada 1 jam kedua, serta memantau suhu 1 kali pada jam pertama dan 1 kali pada jam kedua

Tabel 3.6. Pemantauan tekanan darah, nadi dan suhu

Waktu	Tekanan darah	Nadin	Suhu
17.15	110/80 mmHg	80x/i	37°C
17.30	110/80 mmHg	80x/i	
17.45	110/80 mmHg	80x/i	
18.00	110/80 mmHg	80x/i	
18.30	110/80 mmHg	80x/i	36,8°C
19.00	110/80 mmHg	80x/i	

sumber data : sekunder

50. Menilai pernapasan dan suhu tubuh bayi

Hasil : bayi bernapas baik yaitu 50 x/menit dan suhu 36,5 0C

51. Merendam alat dalam larutan clorin 0,5 % selama 10 menit
52. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi
53. Membersihkan badan ibu dari sisa darah, lendir dan air ketuabn dengan air DTT
54. Memastikan ibu merasa nyaman serta memberitahu keluarga untuk memberikan makan dan minum kepada ibu
55. Mendekontaminasi tempat tidur dengan larutan clorin 0,5 %
56. Membersihkan handscoon dengan larutan clorin 0,5 % secara terbalik
57. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
58. Melengkapi partograf.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANA BAYI
BARULAIR PADA NY”K“ DENGAN BCB/PBK/SMK DI RSUD SYEKH
YUSUF GOWA
TANGGAL 06 SEPTEMBER 2021**

Nomor register : 48xxx
 Tanggal lahir : 06 september 2021 jam : 16.55 wita
 Tanggal pengkajian : 06 september 2021 jam : 17.00 wita
 Nama pengkaji : Mulyanti

IDENTITAS BAYI

Nama : bayi Ny
 Tempat, tanggal lahir:Rsud Syekh Yusuf Gowa, 06 september 2021
 Umur : 0 hari
 Anak ke : 1 (pertama)
 Jenis kelamin : perempuan

IDENTITAS ORANG TUA

Nama : Ny “Kasma” / Tn “Firman”
 Umur : 23 tahun / 29 tahun
 Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun
 Suku : Bugis / Bugis
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SMP / SMP
 Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
 Alamat : Bontorea

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf pada tanggal 06 september 2021, jam 17:00 WITA
2. Hari pertama haid terakhir ibu tanggal 10 oktober 2020
3. Usia kehamilan pada saat melahirkan 9 bulan
4. Ibu pertama kali menyusui bayinya sejak dilahirkan yaitu IMD yang dibantu oleh Bidan
5. Persalinan spontan/tanpa alat dan tidak ada penyulit
6. Ini merupakan anak pertama

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum bayi baik
2. Gestasi kehamilan pada saat melahirkan yaitu 41 minggu 6 hari
3. Penilaian sepintas segera menangis, bernapas dalam baik, kulit kemerahan segera setelah lahir
4. Penilaian Apgar score

Tabel 3.7. Pemantauan tekanan darah, nadi dan suhu

Yang dinilai	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Menit 1	Menit 5
<i>Appearance</i> (warna kulit)	Bayibiru, pucat	Tubuh kemerahan, ekstermitas biru	Seluruh badan kemerahan	1	2
<i>Pulse</i> (denyut)	Tidak ada	<100x/i	>100x/i	2	2

jantung)					
<i>Grimance</i> (refleks)	Tidak ada	Merintih	Batuk bersin	2	2
<i>Activity</i> (tonus otot)	Tidak ada	Refleks pada ekstermitas	Bergerak aktif	1	2
<i>Respiratory</i> (Pernapasan)	Tidak ada	Lambat, tidak teratur	Menangis kuat	2	2

Jumlah APGAR score :8/10

Sumber Data : Sekunder

5. Pemeriksaan Antropometri

Berat badan : 3000 gram

Panjang badan :48 cm

Lingkar kepala : 33 cm

Lingkar dada : 34 cm

Lingkar perut : 32 cm

Lila : 11.5 cm

6. Pemeriksaan tanda-tanda vital

HR : 140x/i

Pernapasan : 44x/i

Suhu : 36,9°C

7. Pemeriksaan fisik

a. Kulit : warna kulit kemerahan dan tidak ikterus

b. Kepala : distribusi rambut di puncak kepala, tidak ada massa

- c. Wajah : mata segaris dengan telinga, mulut digaris tengah wajah dan simetris
 - d. Telinga : posisi telinga berada di garis lurus dengan mata, kulit tidak kendur, pembentukan tulang rawan terbentuk dengan baik dan kokoh
 - e. Hidung : posisi digaris telinga, bernapas melalui hidung
 - f. Mulut : bentuk dan ukuran proposional dengan wajah, bibir berwarna merah muda dan lembab, palatum utuh, lidah digaris tengah, refleks menghisap serta refleks *roothing* ada
 - g. Leher : simetris, tyroid digaris tengah, tidak ada pembesaran pada vena jugularis
 - h. Dada : gerakan dinding dada simetris, frekuensi napas 50x/i, suara napas jernih frekuensi jantung 142x/i
 - i. Payudara : jarak antara puting pada garis sejajar tanpa ada puting tambahan
 - j. Abdomen : abdomen bundar dan simetris, tampak tali pusat yang dijepit dengan penjepit tali pusat, abdomen lunak tidak ada massa dan bising usus ada
 - k. Genitalia : tampak lambia minora, lambia mayora dan clitoris
 - l. Anus : tampak lubang anus
 - m. Ekstermitas : simetris, jari kaki dan jari tangan lengkap
8. Pemeriksaan refleks
- a. Refleks *Morro* (+) : ada respon saat di kejutkan
 - b. Refleks *Roothing*(+) : ada respon mencari puting
 - c. Refleks *sucking*(+) : ada respon ingin menghisap
 - d. Refleks *Grafs/Plantar* : ada respon ingin menggenggam
 - e. Refleks *Plranta* (+) : ada respon ketika bagian bawah disentuh
 - f. Refleks *Babinski* (+) : ada respon ketika disentuh, menarik kedalam

9. Eliminasi

BAB : mekonium

BAK : positif

ASSESSMENT

Bayi Ny”K” dengan BCB/SMK/SPT, segera menangis

PLANNING

Tanggal 06 september 2021, jam 17.00 wita

1. Menjelaskan pada ibu bahwa keadaan bayi dalam keadaan baik
 Hasil : ibu mengerti
2. Mengeringkan bayi dan mengganti sarung basah dengan sarung yang kering
 Hasil : tindakan telah dilakukan
3. Membedong bayi dengan kain bersih dan kering agar bayi tidak kedinginan
 Hasil : tindakan telah dilakukan
4. Mengajarkan ibu untuk memberikan Asi eksklusif pada bayinya selama 6 bulan dan tidak memberikan makanan tambahan selain Asi.
 Hasil : ibu bersedia melakukannya
5. Menjelaskan manfaat Asi yaitu:
 - a. Asi kaya akan zat penting yang dibutuhkan oleh bayi seperti DHA,AA, omega 6, laktosa, protein, laktobasilus, vitamin A, colostrum, lemak yang semuanya dalam takaran dan komposisi yang pas untuk bayi

- b. Asi memberikan kekebalan tubuh yang optimal pada bayi
- c. Asi tidak basi dan selalu higienis serta segar
- d. Sebagai saran mendekatkan ibu dan bayi

Hasil : ibu mengerti

6. Mengajarkan kepada ibu cara perawatan tali pusat

- a. Membersihkan dengan kasa steril yang dibasahi air matang di mulai dari pangkal tali pusat dan biarkan terbuka, dan tidak boleh diberi salep, bedak, minyak dengan betadin
- b. Usahakan popok atau celana bayi tidak mengenai tali pusat agar tali pusat cepat kering dan tidak iritasi

Hasil : ibu mengerti

7. Menjelaskan pada ibu dan keluarga tentang tanda bahaya bayi baru lahir

- a. Pernapasan $<30x/i$ atau $>60x/i$
- b. Suhu tubuh bayi $<36,5^{\circ}C$ atau $>37,5^{\circ}C$
- c. Bayi, biru, pucat dan memar
- d. Rewel dan muntah
- e. Tali pusat merah, bengkak, serta keluar cairan busuk bernanah
- f. Tidak BAB selama 3 hari, tinja merah
- g. Kejang dan menggigil

Hasil : ibu dan keluarga mengerti

8. Meminta izin kepada ibu untuk memberikan salep mata, vit K di 1/3 lateral paha kiri bayi secara IM(90°)

Hasil : ibu memberi izin dan bayi telah diberikan salep mata dan vit K

9. Setelah 1 jam pemberian vit K beritahu ibu bahwa bayinya akan di imunisasi Hbo di 1/3 lateral paha kanan bayi secara IM(90°)

Hasil : ibu bersedia dan bayi telah mendapat imunisasi Hbo



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANA POST NATAL
CARE PADA NY"K" 1 JAM SETELAH MASA NIFAS DENGAN
NYERI ABDOMEN DI RSUD SYEKH YUSUF
TANGGAL 06 SEPTEMBER 2021**

Nomor register : 48xxx

Tanggal masuk rumah sakit : 06 september 2021 jam : 10.05 wita

Tanggal partus : 06 september 2021 jam : 16.55 wita

Tanggal pengkajian : 06 september 2021 jam : 19.00 wita

Nama pengkaji : Mulyanti

IDENTITAS ORANG TUA

Nama : Ny "Kasma" / Tn "Firman"

Umur : 23 tahun / 29 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun

Suku : Bugis / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Bontorea

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengeluh nyeri abdomen setelah melahirkan sejak 3 jam yang lalu
2. Ibu melahirkan di RSUD Syekh yusuf tanggal 06 september 2021 jam
16.55 WITA
3. Hari pertama haid terakhir tanggal 10 November 2020

4. Ibu mengatakan ini kehamilannya yang pertama dan tidak pernah keguguran
5. Ibu pertamakali menyusui bayinya saat IMD yang di bantu oleh bidan
6. Ibu belum BAB dan sudah BAK
7. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, DM, jantung dan penyakit serius lainnya.
8. Riwayat persalinan nifas yang lalu
Tidak ada

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan TTV

Tekanan darah	: 110/80 mmHg	suhu	: 36.8°C
Nadin	: 80x/I	pernapasan	: 22x/i
4. Pemeriksaan fisik
 - a. Wajah : tidak pucat tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan
 - b. Mata : simetris, selera putih dan kongjungtiva merah muda
 - c. Leher : tidak ada pembesaran veja jugularis, kelenjar tyroid dan limfe
 - d. Payudara : simetris, putting susu menonjol, hyperpigmentasi areola mammae, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, dan pengeluaran Asi saat putting di pencet
 - e. Abdomen : tidak ada bekas operasi, tinggi fundus uteri 1 jari di bawah

pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, kandung kemih ibu kosong

- f. Genitalia : tampak jahitan perineum, tampak pe0Engeluaran darah ± 100 cc, ibu masih memakai popok, tidak ada oedema, tidak ada varises, tidak ada tanda-tanda infeksi
- g. Anus : tidak ada hemoroid
- h. Ekstermitas: terpasang infuse di tangan sebelah kiri ibu, tidak ada oedema, tidak ada varises, tidak ada nyeri tekan.

ASSESSMENT

Ny K P1A0 postpartum hari pertama dengan nyeri abdomen

PLANNING

Tanggal : 06 september 2021, jam 19.10 WITA

1. Menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri abdomen, yaitu pada saat hamil Rahim membesar sesuai ukuran janin yang di kandung, saat bayi lahir maka perlahan-lahan rahim akan menyusut dan mengecil hingga sebesar buah pir kecil. Proses kembalinya kebentuk semula dari rahim ini, maka disertai dengan rasa kram di perut yang di sebut dengan kontraksi, uterus segera mengecil dan pembuluh darah yang terbuka saat plasenta terlepas akan segera menutup kembali sehingga tidak terjadi pendarahan. Nyeri perut seperti ini akan semakin terasa saat menyusui, ibu tidak perlu cemas karena adanya rangsangan hisapan bayi maka keluarlah hormone oksitosin yang membantu kontraksi uterus, menggunakangurita yang nyaman, lakukan relaksasi napas bila nyeri atau kram muncul

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan oleh bidan

2. Mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus yaitu dengan meletakkan satu tangan diatas perut ibu, lalu tekan dan putar secara terus menerus searah jarum jam sampai perit ibu teraba keras dan bundar

Hasil : ibu dan keluarga mengerti

3. Mengajarkan ibu untuk mobilisasi dini agar memperlancar pengeluaran loekia, mengurangi infeksi, mempercepat involusi uteri serta memperlancar peredaran darah.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Mengajarkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin agar produksi asi lancar dan bayi mendapatkan asupan nutrisi, maka bayi harus disusui selama 6 bulan tanpa makanan tambahan

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Memberikan konseling tentang

- a. Nutrisi

Gizi yang dibutuhkan ibu yaitu makanan sehat dan seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, kalsium seperti yang terkandung dalam nasi, daging, ikan, telur, tempe, tahu, buah-buahan, kacang-kacangan dan banyak mengkonsumsi air putih untuk memperbanyak produksi Asi

b. Personal hygiene

Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan diri seperti mandi, menggosok gigi, minimal 2 kali sehari, mengganti celana dalam setiap kali lembab atau basah dan rajin mengganti pembalut

c. Istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat cukup yaitu tidur siang 2 jam, dan malam 6-8 jam

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menjelaskan kepada ibu tentang kontrasepsi

a. Kondom merupakan selubung tipis dari karet yang berguna sebagai sarung penis yang sedang ereksi selama berhubungan dan menghalangi sperma masuk ke vagina yang membantu mencegah kehamilan, adapun kekurangannya yaitu dapat bocor yang dapat menyebabkan fungsi tidak efektif.

b. Implant yaitu alat kontrasepsi berbentuk batang kecil yang dipasang dilengan atas yang berfungsi untuk mencegah kehamilan dan aman bagi ibu yang menyusui, adapun kekurangannya menstruasi tidak teratur, tidak dapat digunakan penderita DM dan osteoporosis, dapat memicu iritasi serta rasa tidak nyaman di area lengan yang dipasang.

c. IUD/alat kontrasepsi dalam rahim adalah alat kontrasepsi yang pasang didalam rahim untuk menunda kehamilan dan menjaga jarak kehamilan dan menjamin perlindungan jangka panjang, terutama bagi

ibu yang menyusui, adapun kekurangannya yaitu aliran menstruasi, bercak berulang, kemungkinan mengalami sakit punggung.

- d. Suntik 3 bulan merupakan langkah pencegahan kehamilan dengan menyuntikan hormon progesteron pada bokong ibu atau pada lengan atas ibu setiap 3 bulan sekali, adapun kekurangannya penggunaan jangka panjang menurunkan kepadatan tulang
- e. Pil KB merupakan langkah pencegahan kehamilan dengan mengonsumsi rutin pil KB, adapun kekurangannya dapat menyebabkan bercak diantara menstruasi, mual, muntah, sakit kepala, dan tidak cocok dengan wanita pelupa.

Hasil : ibu mengerti dan belum menentukan kontrasepsi yang diinginkan dan ingin berdiskusi terlebih dahulu bersama suami.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANA POST NATAL
CARE PADA NY”K” 5 JAM SETELAH MASA NIFAS DENGAN
KELUHAN ADA RASA MULES DI RSUD SYEKH YUSUF
TANGGAL 06 SEPTEMBER 2021**

Nomor register : 48xxx

Tanggal masuk nifas : 06 september 2021 jam : 19.00 wita

Tanggal partus : 06 september 2021 jam : 16.55 wita

Tanggal pengkajian : 06 september 2021 jam : 23.30 wita

Nama pengkaji : Mulyanti

IDENTITAS ORANG TUA

Nama : Ny “Kasma” / Tn “Firman”

Umur : 23 tahun / 29 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun

Suku : Bugis / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Bontorea

DARA SUBJEKTIF (S)

1. ibu mengatakan melahirkan 1 hari yang lalu tanggal 03 juli 2018 jam 10.30 WITA.
2. Ibu belum BAB dan sudah BAK
3. Ibu mengatakan perut masih mule-mules
4. Ibu mengatakan ASI sudah lancar

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan TTV
 - a. TD : 120/70 mmHg
 - b. N : 80 x/menit
 - c. S : 36,8 0C
 - d. P : 20x/menit
4. Pemeriksaan fisik
 - a. Wajah : tidak pucat, tidak ada kloasma, tidak oedema, tidak nyeri tekan
 - b. Mata : simetris, sclera putih, conjungtiva merah muda
 - c. Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelejar tiroid dan limfe
 - d. Payudara : simetris, terdapat hyperpigmentasi pada areola mammae, puring susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ASI sudah keluar
 - e. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU 1 jrbpst, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.
 - f. Genetalia : tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran lochea rubra, masih memakai pembalut, perdarahan ± 70 cc dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi.

ASSESSMENT (A)

P1A0 postpartum hari pertama

PLANNING (P)

Tanggal 06 september 2021, jam 23.30 WITA.

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu baik-baik saja

Hasil : ibu mengerti

2. Memberitahu ibu penyebab keluhan yang dirasakan ibu adalah hal yang fisiologis pada ibu masa nifas. Rasa mulas diakibatkan dari kontraksi uterus untuk mencegah perdarahan selain itu selama masa nifas juga akan terjadi peningkatan suhu tubuh, sedikit pusing dan lemas yang diakibatkan karena kelelahan. Luka jahitan pada luka perineum akan sembuh dengan sendirinya selama 6-7 hari jika tidak ada tanda-tanda infeksi.

Hasil: ibu mengerti penyebab nyeri yang dirasakan

3. Mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus yaitu dengan meletakkan satu tangan di atas perut ibu, lalu tekan dan putar secara terus menerus searah jarum jam sampai perut ibu terasa keras dan bundar.

Hasil :Ibu dan keluarga mengerti serta bersedia melakukannya.

4. Mengajarkan ibu untuk istirahat yang cukup yaitu minimal 8 jam/hari dan menyarankan ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti nasi, sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, telur, tempe, tahu, daging, ikan laut.

Hasil : ibu bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu banyak minum 8 gelas/hari untuk membantumemperbanyak produksi ASI dan istirahat yang cukup untuk menambah energi ibu selama menyusui.

Hasil : ibu sudah mengerti

6. Memberikan ibu KIE tentang ASI eksklusif yaitu

- a. Memberikan ASI saja selama 6 bulan tanpa makanan tambahan.
- b. Sumber kekebalan bagi bayi untuk mencegah bibit-bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh bayi
- c. Untuk mencegah alergi pada bayi

Hasil : ibu sudah mengerti

7. Mengajarkan ibu untuk melakukan perawatan payudara yaitu:

- a. Sebelum melakukan perawatan payudara dibersihkan terlebih dahulu
- b. Gunakan baby oil atau minyak kelapa pada kapas, kemudian putting dibersihkan.
- c. Tempelkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara ibu.
- d. Pengurutan dimulai kearah atas, ke samping, lalu kearah bawah.
- e. Dalampengurutan posisi tangan kiri kearah sisi kiri, telapak tangan kearah sisi kanan, pengurutan diteruskan kearah bawah, kesamping selanjutnya melintang, lalu telapak tangan mengurut ke depan kemudian kedua tangan di lepaskan dari payudara. Ulangin gerakan 20-30 kali.
- f. Setelah itu bersihkan payudara tertama bekas minyak

- g. Anjurkan ibu untuk menggunakan bra yang dapat menyanggah payudara.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Memberitahu ibu tanda-tanda bahaya pada masa nifas

- a. Perdarahan postpartum
- b. Lochea berbau busuk
- c. Sub-involusi uterus
- d. Nyeri pada perut dan panggul
- e. Pusing dan lemas yang berlebihan
- f. Demam
- g. Penyulit dalam menyusui
- h. Infeksi pada luka perineum

Hasil : ibu sudah mengerti

9. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya yaitu dengan mengganti celana dalam atau pembalut jika penuh, gunakan air bersih tiap kali BAB/BAK untuk mencegah infeksi

Hasil : ibu bersedia melakukannya.

10. Mengajarkan ibu senam nifas yaitu siakp tubuh terlentang, kedua kaki lurus kedepan, angkat kedua tangan lurus ke atas samapi kedua telapak tangan bertemu, turunkan perlahan sampai keduatangan terbuka lebar hingga sejajar dengan bahu, lakukan gerakan dengan mantap sehingga tersa otot sekitar tangan dan bahu terasa kencang.

Hasil : ibu mengerti.

11. Meanjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa melaksanakan shalat lima waktu

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

12. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal 6 bulan tanpa makanan tambahan selain ASI dan menjelaskan bahwa Allah Swt telah memerintahkan seorang ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah :233

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANA POST NATAL
CARE HARI KE DUA PADA NY”K” DENGAN PERAWATAN TALI
PUSAT DI RSUD SYEKH YUSUF
TANGGAL 07 SEPTEMBER 2021**

Nomor register : 48xxx

Tanggal masuk nifas : 06 september 2021 jam : 19.00 wita

Tanggal partus : 06 september 2021 jam : 16.55 wita

Tanggal pengkajian : 07 september 2021 jam : 08.00 wita

Nama pengkaji : Mulyanti

IDENTITAS ORANG TUA

Nama : Ny “Kasma” / Tn “Firman”

Umur : 23 tahun / 29 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun

Suku : Bugis / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Bontorea

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan melahirkan 6 hari yang lalu tanggal 03 juli 2018 jam 10.30
WITA
2. Ibu mengatakan BAB 1 kali sehari dan BAK 4-5 kali sehari
3. ASI sudah lancar.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan TTV
 - a. TD : 110/80 mmHg
 - b. N : 80 x/menit
 - c. S : 36,6 0C
 - d. P : 20x/menit
4. Pemeriksaan Fisik terfokus
 - a. Wajah : tidak pucat, tidak oedema, tidak nyeri tekan
 - b. Mata : simetris, sclera putih, conjungtiva merah muda
 - c. Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar tiroid dan limfe
 - d. Payudara : simetris, terdapat hyperpigmentasi pada areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ASI lancar
 - e. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU pertengahan symphysis dan pusat, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik.
 - f. Genetalia : tidak terdapat jahitan pada perineum , tampak pengeluaran lochea sanguinolenta, masih memakai pembalut, dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi

ASSESSMENT (A)

P1A0 2 hari postpartum

PLANNING (P)

Tanggal 07 september 2021, jam 08.00 WITA

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu baik-baik saja

Hasil : ibu mengerti

2. Memberikan konseling kepada ibu tentang perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari, yakni :

- a. Biarkan tali pusat dalam keadaan terbuka dan tetap dijaga kebersihannya.
- b. Jangan membirakan bayi bersentuhan dengan benda dingin, dan tetap menjaga lingkungan sekitar bayi tetap hangat
- c. Mengganti popok bayi tiap kali basah (setelah BAB/BAK)

Hasil : ibu sudah mengerti

4. Menganjurkan ibu untuk minum setiap kali menyusui dan tetap meminum tablet zat besi untuk menambahkan zat gizi setidaknya 40 hari pasca postpartum.

Hasil : ibu bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya yaitu dengan mengganti celana dalam atau pembalut jika penuh, gunakan air bersih tiap kali BAB/BAK untuk mencegah infeksi

Hasil : ibu bersedia melakukannya.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANA POST NATAL
CARE KUNJUNGAN RUMAH SETELAH 6 HARI POST PARTUM
PADA NY”K” DI RUMAH IBU
12 SEPTEMBER 2021**

Nomor register : 48xxx

Tempat : Rumah Ibu jam : 10.00 wita

Tanggal partus : 06 september 2021 jam : 16.55 wita

Tanggal pengkajian : 06 september 2021 jam : 10.00 wita

Nama pengkaji : Mulyanti

IDENTITAS ORANG TUA

Nama : Ny “Kasma” / Tn “Firman”

Umur : 23 tahun / 29 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun

Suku : Bugis / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Bontorea

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan melahirkan 1 minggu yang lalu tanggal 06 september 2021, jam 10.30 WITA.
2. Ibu mengatan BAB 1 kali sehari dan BAK 5-6 kali sehari.

3. Ibu mengatakan tidak ada nyeri perut dan sekarang darah nifas ibu berwarna kuning keputihan.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan TTV
 - a. TD : 120/70 mmHg
 - b. N : 80x/menit
 - c. S : 36,5°C
 - d. P : 22 x/menit
4. Pemeriksaan fisik terfokus
 - a. Wajah : tidak pucat, tidak oedema, tidak nyeri tekan
 - b. Mata : simetris, sclera putih, conjungtiva merah muda
 - c. Payudara : simetris, terdapat hyperpigmentasi pada areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada benjolan tidak nyeri tekan, ada pengeluaran ASI
 - d. Abdomen : tidak ada luka bekas, TFU pertengahan symphysis dan pusat, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik.
 - e. Genitalia : tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran lochea serosa, tidak oedema, tidak ada varices
 - f. Ekstremitas : simetris, tidak oedema, tidak ada varices, tidak nyeri tekan

ASSESSMENT (A)

P1A0 postpartum hari ke 6

PLANNING (P)

Tanggal 12 september 2021, jam 10.00 WITA.

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu baik-baik saja

Hasil : ibu mengerti

2. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI sesering mungkin kepada bayinya

Hasil : ibu sudah mengerti

3. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk pemulihan rahim dan menjaga kualitas produksi ASI

Hasil : ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup

Hasil : ibu bersedia melakukannya

5. Memberikan konseling tentang :

1. Personal hygiene
2. Perawatan payudara
3. Posisi dan tehnik menyusui bayi yang benar
4. Posisi menyendawakan bayi setelah menyusui

Hasil : ibu sudah mengerti

6. Meanganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa melaksanakan shalat lima waktu

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

7. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal 6 bulan tanpa makanan tambahan selain ASI dan menjelaskan bahwa Allah

Swi telah memerintahkan seorang ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah :233

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.



BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesenjangan yang terjadi antara tinjauan pustaka dan studi kasus dalam penerapan proses asuhan kebidanan intranatal pada Ny K ketuban pecah dini (KPD) dengan paritas di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 06 september 2021 pembahasan ini disusun berdasarkan teori dari asuhan yang nyata dengan pendekatan manajemen asuhan kebidana yang terdiri dari 7 langkah.

Dalam bahasa ini akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan 7 langkah varney yakni, pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidana, dan mengevaluasi asuhan kebidanaan.

A. Langkah I Identifikasi Data Dasar

dalam pengakjian yang dimulai dari pengumpulan data anamnesa, dilakukan pemeriksaan fisik berupa inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi. Selain pemeriksaan fisik, juga dilakukan pemeriksaan dalam untuk memantau kemajuan persalinan, khususnya untuk memastikan pecahnya silaput ketuban dan juga dengan pemeriksaan tes *valsava*.

tes *valsava* dilakukan dengan cara melaakaukan ekspirasi paksa dengan menutup mulut dan hidung yang akan menambah tekanan pada telinga dan

tekanan bagian fundus, sehingga jika terjadinya KPD, maka air ketuban akan keluar (fadlun, 2011:114). Kemudian pemeriksaan laboratorium.

Dalam tahapan pengkajian, penulis tidak dapat hambatan. Hal ini karena respon kooperatif ibu yang dapat menerima kehadiran penulis saat pengumpulan data sampai tindakan yang diberikan. Ibu menunjukkan sifat terbuka dan menerima anjuran serta saran yang diberikan oleh penulis maupun tenaga medis lainnya dalam memberikan asuhan kebidanan lainnya.

Pada Ny K didapatkan riwayat keluhan masuk rumah sakit ibu dirujuk oleh bidan dari puskesmas berupa terdapat pengeluaran air ketuban dari jalan lahir pada tanggal 06 september 2021 pukul 10:05 WITA dengan kontraksi 1 kali 10 menit durasi 5-10 detik. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 1cm, air ketuban merembes dan berwarna jernih. Selain itu, data yang didapatkan dari seorang bidan yang merujuk pada riwayat pemeriksaan tes lakmus dipuskesmas yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru, yang menandakan pelepasan air yang keluar yaitu air ketuban ibu mengatakan ini kehamilannya yang pertama dan tidak pernah keguguran ibu mengatakan hari pertama haid terakhir 10 november 2020 dan usia kehamilan sekarang yaitu 9 bulan, ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 7 kali dipuskesmas Palangga dan telah mendapatkan suntikkan TT 1 kali pada tanggal 1 januari 2021 Ibu tidak pernah menderita penyakit asma, DM, jantung, hipertensi, dan lainnya. Serta ibu tidak memiliki menular dan menurun.

Tindakan yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa yakni mengumpulkan data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk rumah

sakit, riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan, riwayat nifas yang lalu, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, riwayat psikososial, dan spiritual, riwayat KB, riwayat kebutuhan dasar ibu. Sementara itu, dilakukan pula pengumpulan data subjektif yang terdiri dari pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (*head to toe*), pemeriksaan dalam dan pemeriksaan tes *valsava*. Terakhir yaitu pemeriksaan penunjang pemeriksaan laboratorium (sampel darah).

Meskipun terdapat perbedaan antara riwayat tindakan yang dilakukan di puskesmas dengan tindakan yang dilakukan di rumah sakit, yaitu pemeriksaan tes lakmus yang dilakukan di puskesmas dan pada umumnya pemeriksaan kertas lakmus di rumah sakit tidak dilakukan pada kasus KPD. Meskipun demikian, riwayat tindakan yang telah dilakukan di rumah sakit, hal tersebut dapat saling membantu untuk pengumpulan data dalam menegakkan diagnosis.

KPD merupakan pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan serviks pada primipra kurang dari 3 cm dan pada multipra kurang dari 5 cm. pada paritas, resiko KPD banyak terjadi pada multipra dan grandemultipra disebabkan multilitas uterus berlebih, kelenturan leher rahim yang berkurang sehingga dapat terjadi pembukaan dini pada servis sedangkan pada usia, bertambahnya usia wanita berhubungan dengan menurunnya fungsi dan kemampuan organ tubuh sehingga meningkatkan resiko timbulnya kelainan-kelainan (Maharani Dkk, 2017: 103) pada langkah pertama, penulis tidak mendapatkan kesenjangan antara teori dan kasus yang terjadi dilapangan

B. Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

dalam menegakkan diagnosa kebidanan, didukung dan ditunjang oleh beberapa data, dan dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang dikumpulkan, di interpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis atau masalah yang spesifik. Kemudian masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosis, tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang di identifikasikan oleh bidan sesuai dengan pengarahannya.

Pada kasus Ny K, telah dilakukan pengumpulan data subjektif yaitu Ny K mengatakan adanya pengeluaran air dari jalan lahir sedikit demi sedikit hingga sarung basah, data objektif didapatkan keadaan umum ibu bayi, kesadaran komposmentis, dari hasil pemeriksaan dalam jam 10:05 WITA didapatkan vulva dari vagina normal, portio tebal, pembukaan 1 cm, ketuban pecah, presentasi uuk kanan lintang, penurunan hodge 1 molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir, darah dan air ketuban. Adapun data penunjang yaitu pemeriksaan tes lakmus. Sehingga berdasarkan data yang didapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa diagnosa atau masalah aktual yang dirumuskan yaitu KPD oleh karena itu tidak terdapat kesenjangan antara teori dan data yang diperoleh.

C. Langkah III Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensia

pada perumusan diagnosa/masalah potensial akan di bahas tentang kemungkinan terjadi hal yang lebih fatal apabila apa yang menjadi masalah actual tidak segera di tangani. Pada tinjauan pustaka, masalah potensial yang dapat terjadi yaitu infeksi *intraparta*/dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/masa nifas, *drylabour*/partus lama, pendarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal. Sedangkan pada janin yaitu prematuritas (*respiratory distress syndrome, hypothermia, neonatal feeding problem, retinopathy of prematurity, intraventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis, brain disorder (and risk of cerebral palsy, hyperbilirubinemia, anemia, sepsis), prolaps funiculi*/penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder (kompresi tali pusat, prolaps uteri *dry labour*/partus lama, APGAR skor rendah, *ensefalopathy, cerebral palsy, pendarahan intracranial, renal failure, respiratory distress*), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marni Dkk, 2016:105-106).

Pada kasus ini, penulis tidak menemukan tanda-tanda infeksi atau komplikasi yang mungkin akan terjadi pada ibu maupun janin karena penanganan ibu bersalin atas indikasi KPD dengan tindakan pemasangan infuse, pemberian obat uterotonika dan pemberian obat antibiotik telah sesuai dengan teori, sehingga tidak ada diagnosa potensial terjadi dan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

D. Langkah IV Identifikasi Perlunya Tindakan Segera Atau Kolaborasi

Beberapa data yang memberikan indikasi adanya tindak segera yang harus dilakukan guna untuk menyelamatkan klien. Tindakan tersebut berupa kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih profesional (dokter obgyn). Pada tinjauan pustaka, tindakan segera/kolaborasi pada KPD adalah mengkolaborasikan dengan dokter untuk pemasangan infus, pemberian uterotonika dan pemberian antibiotic.

Pada studi Ny “K” tindakan segera yang dilakukan adalah kolaborasi dengan dokter dalam menangani persalinan dengan KPD yaitu pemasangan RL 28 tetes permenit pada jam 10:15 WITA, pemasangan misoprostol 1/8 tab pervagina pada jam 10:25 WITA, pemberian antibiotik cefotaxime 1 gr/IV pada jam 10:30 WITA, dilakukan pemeriksaan dalam jam 10:05 WITA yang didapatkan pembukaan 1 cm, ketubah pecah, presentasi uuk kanan lintang penurunan hodge I pelepasan lendir, darah dan air ketuban. Dilanjutkan pemantauan DJJ nadin his tiap 1 jam pada jam 10:05 WITA hingga 13:05 WITA. Dilanjutkan VT 2 pada jam 13:05 WITA didapatkan pembukaan 5 cm ketuban pecah presentase uuk kanan lintang penurunan hodge II pelepasan lendir, darah dan air ketuban. Pemantauan DJJ, nadin his tiap 30 menit pada jam 13:05 WITA hingga 16:35 WITA. Dilakukan VT III pada jam 16:35 WITA didapatkan pembukaan 10 cm (lengkap), ketuban pecah, presentase uuk depan, penurunan hodge IV, pelepasan lendir, darah dan air ketuban.

Persalinan berlangsung normal. Dalam kasus ini tidak ada perbedaan yang di temukan antara teori dan tindakan yang diberikan pada Ny “K” yang tetap mengacu pada tindakan sesuai kebutuhan klien.

E. Langkah V Rencana Tindakan

Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana, mengajurkan kepada ibu untuk berdoa untuk kelancaran persalinannya dengan membaca firman Allah swt QS. Maryam /19:22-23.

﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَحَآءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ ﴿٢٣﴾

﴿ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan".(Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2013).

Pada study kasus Ny K, penulis merencanakan tindakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnose/masalah actual dan masalah potensial yang akan terjadi, rencana tersebut yaitu pemasangan infus RL 28 tetes per menit, pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam, pemberian antibiotic cefotaxime 1 gr/IV dan memantau keadaan ibu dan janin sampai persalinan berlangsung normal. Dalam rencana tindakan asuhan kebidanan pada kasus Ny "K", tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus yang ada dilapangan.

F. Langkah VI Pelaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Semua rencana telah dilaksanakan seluruhnya dengan menyesuaikan kondisi, keadaan dan kebutuhan ibu, yang dilaksanakan pada tanggal 06 september 2021 di RSUD syekh yusuf gowa yaitu pada studi Ny “K” kolaborasi dengan dokter dalam menangani persalinan dengan KPD yaitu memasang infus RL 28 tetes per menit pada jam 10.15 WITA, pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam pada jam 10.25 WITA, pemberian antibiotik cefotaxime 1 gr/IV pada jam 10.30 WITA. Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan, penulis tidak menemukan hambatan, karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan asuhan dari pembimbing dilahan praktek.

G. Langkah VII Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Adapun evaluasi yang dimaksudkan yaitu untuk memperoleh atau memberi nilai terhadap intervensi yang dilakukan berdasarkan tujuan kriteria yang diberikan kepada Ny “K” di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 06 september 2021 yaitu pada kala I berlangsung tidak lebih dari 7 jam, keadaan ibu dan janin baik, dan tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayi.

Kemudian Selanjutnya yaitu kala II juga berlangsung normal tanpa ada penyulit, bayi lahir spontan tanggal 06 september 2021, jam 16.55 wita, menangis kuat, bernapas tanpa bantuan serta bergerak aktif. Pada kala III, tidak ada penyulit dan berlangsung normal, berlangsung \pm 5 menit, kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 06 september 2021, jam 17.00 wita, TFU setinggi pusat, perdarahan \pm 105 cc, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), serta

keadaan ibu dan bayi baik. Terakhir yaitu kala IV atau kala pengawasan, pada kala IV kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), jumlah perdarahan \pm 205 cc, kandung kemih kosong dan keadaan ibu dan bayi baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari kala I sampai dengan kala IV, semuanya berlangsung normal, tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu maupun janin. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.



BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny “K” dengan ketuban pecah dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 06 september 2021, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Ketuban pecah dini atau yang sering disingkat menjadi KPD merupakan suatu kondisi dimana air ketuban pecah sebelum waktunya, yaitu sebelum dimulainya tanda inpartu atau bila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm (Lidia dan Mudlika, 2019). Dalam keadaan normal, selaput ketuban pecah dalam proses persalinan. Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Bila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut ketuban pecah dini pada kehamilan prematur. Dalam keadaan normal 8-10% perempuan hamil aterm akan mengalami ketuban pecah dini (sarwono,2018).
2. Setelah dilakukan pengkajian pada tanggal 06 september 2021, maka ditemukan bahwa tidak ada penyulit bagi ibu maupun janin dan keadaan ibu dan janin baik yang dilihat bahwa tanda-tanda vital dalam batas normal, tekanan darah: 110/80 mmHg, nadi: 80x/ menit, pernapasan: 22x/ menit,

S: 36,8°C, denyut jantung janin dengan frekuensi 126x/ menit. Ibu melahirkan pada tanggal 06 september 2021 pukul 16.55 wita dengan berat bayilahir 3000 gram, panjang bayi lahir 48 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 34 cm, lingkar perut 32 cm

3. Pada pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny “K” mulai dari pengkajian sampai tahap akhir tidak ditemukan adanya hambatan karena adanya kerjasama antara klien dan petugas kesehatan sehingga semua tindakan dapat terlaksana dengan baik.
4. Pendokumentasian sangat penting dilaksanakan pada setiap tahap dari proses manajemen kebidanan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Saran untuk bidan

- a. Bidan dalam memberikan asuhan harus sesuai kewenangannya, untuk itu manajemen asuhan kebidanan perlu dikembangkan karena merupakan alat yang membantu seorang bidan dalam memecahkan masalah klien dalam berbagai situasi.
- b. Dalam melaksanakan asuhan kebidanan, bidan harus selalu menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi, guna mencegah terjadinya infeksi pada ibu, juga perlindungan bagi diri sendiri.

- c. Diharapkan seseorang bidan dalam melaksanakan tugasnya diperlukan adanya disiplin waktu dalam memberikan asuhan kepada klien.

2. Saran untuk Rumah sakit

Sebaiknya pihak RSUD Syekh Yusuf Gowa, lebih meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD secara optimal melalui penanganan yang cepat dan tepat.

3. Saran untuk institusi

Adapun saran untuk institusi yaitu:

- a. Menyediakan tenaga pengajar yang professional yang dapat membimbing mahasiswa dalam proses belajar mengajar.
- b. Perlu peningkatan pembelajaran di laboratorium khususnya penanganan KPD sehingga dapat melakukan suatu tindakan penanganan pada kasus tersebut karena praktek laboratorium sangatlah bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna untuk menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan professional

4. Saran untuk klien

Adapun saran untuk klien yaitu:

- a. Setiap ibu hamil harus segera datang ke petugas kesehatan bila didapati adanya pengeluaran air yang banyak dari jalan lahir dengan bau amis/ bau khas

- b. Diharapkan kepada ibu untuk segera ber KB
- c. Perlunya dukungan dan keterlibatan suami atau anggota keluarga dalam masa nifas merupakan interaksi terus-menerus yang bersifat saling mencintai, pemenuhan keutuhan emosional dan saling membutuhkan

saran untuk peneliti selanjutnya

Untuk kesempurnaan dan tercapainya luaran dari karya ini, penulis merekomendasikan beberapa saran di antaranya :

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana prasarana mengenai kasus dengan ketuban pecah dini maupun efektivitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A.T. (2017). Faktor–Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Di Rs Tk Ii Pelamonia Makassar Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia*, 1(2), 153–159.
- Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.(2017). Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia Tahun 2017.In *Sdki*.
- Budi Rahayu, Ayu Novita Sari ”Studi Deskriptif Penyebab Kejadian Ketuban Pecah Dini (Kpd) Pada Ibu Bersalin” *Journal Ners Dan Kebidanan Indonesia*. <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/jnki>.
- Dewi Setiawati. *Fisio-Patologi Kehamilan, Dan Kasih Sayang Universal*. Alauddin University Press:Upt Perpustakaan Uin Alauddin 2020.
- Demiarti, M., & Suharni. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketuban Pecah Dini Di Rsu Pku Muhammadiyah Bantul*.
- Dewi, Mustika Dan Nita Norma. 2018. *Asuhan Kebidanan Patologi Teori Dan Tinjauan Kasus*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Diana, S., Mail, E., &Rufaida, Z. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Percetakan Cv Oase Group.
- Dinkes.(2016). Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.*Media Kesehatan*, 1, 20.[file:///C:/Users/Master Com/Downloads/27_Sulsel_2016 \(1\).Pdf](file:///C:/Users/Master Com/Downloads/27_Sulsel_2016 (1).Pdf)
- Dinkes.(2020). Profil Kesehatan kabupaten gowa.*Media Kesehatan*, <http://gowakab.go.id> Gowa,2020 (1).pdf
- Eka Nurhayati,*Buku Ajar Patologi Dan Fisiologi Persalinan*.Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2019.
- Fitriana, Yuni Dan Widy Nurwiandani. 2018. *Asuhan Persalinan Konsep Persalinan Secara Komprehensif Dalam Asuhan Kebidanan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Fadlun, Feryanto. 2011. *Asuhan Kebidanan Patologis*. Jakarta: Selemba Medika.
- Hendriani Irwan, Agusalim, Hardiyanti Yusuf. ”Hubungan Antara Pekerjaan Dan Usia Kehamilan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar 2019” *Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia*. Volume 3, No.2, Desember (2019).
- Indira Ramadhita, Darmayanti Dan Rusmilawaty ”Fakto Yang Berhubungan Dengan Ketuban Pecah Dini Di Rsd Idaman Banjarbaru Tahun 2018”*Jurnal Kebidanan Bestar*, Volume 2 (1), Tahun (2020), <http://www.ejurnalbidanbestari-poltekkesbjm>. Com (26 Januari 2020)
- Igus Ulfa Yaze, Ratna Dewi “Penatalaksanaan Ketuban Pecah Dini Pada Perempuan Hamil Usia 37 Minggu Tahun 2016” *Jurnal Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung*. Volume 4, No. 2, Januari (2016)

- Legawati, Riyanti. "Determin Kejadian Ketuban Pecah Dini (Kpd) Diruang Campaka Rsud Dr Doris Sylvanus Palangkaraya" *Jurnal Surya Medika*, Volume 3 No.2 (2018).
- Rohmawati Nur, Arulita Ika Fibriana. "Ketuban Pecah Dini Dirumah Sakit Umum Daerah Ungaran 2018" *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, Volume 2 (1) (2018), <http://journal.unnes.id/sju/index.php/higeia>.
- Kementrian Agama RI. Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris dan terjemahan 2 Muka. Penerbit Walidan Mikraj Khazanah Ilmu, 2013
- Marni, DKK, *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar 2016
- Lina Darmayanti Bainua."Pencegahan Ketuban Pecah Dini (*Premature Rupture Of Membranes*) Dengan Suplemen Vitamin C Pada Kehamilan
- Nugroho, Taufan. 2012. *Patologi Kebidanan*, Jogjakarta: Nuha Medika
- Nur Rohmawati Dan Arulita Ika Fibriana "Ketuban Pecah Dini Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran " *Jurnal Higeia* 2 (1) (2018), <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia> (Diakses Tanggal 1 Januari 2018)
- Nurhayati, Eka. 2019. *Patologi Dan Fisiologi Persalinan: Distosia Dan Konsep Dasar Persalinan*. Jogjakarta: Pt.Pustaka Baru
- Purwastuti, Ending Dan Elisabeth S,W. 2015. *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*. Jogjakarta: Pt.Pustaka Baru
- Pudiasuti, Ratnadwi. *Asuhan kebidanan pada ibu bersalin patologi*. Yogyakarta :Nuhamedika, 2012
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : Bina pustaka sarwono Prawirohardjo, 2016
- Teuku I. Syarwani, Hermie, M.M. Tendean, Jhon J.E.Wantania. "Gambaran Kejadian Ketuban Pecah Dini (Kpd) Di Rsup Prof.Dr.R.D. Kandou Manado Tahun 2018" *Medical Scope Journal (MSJ)*. 2020;1(2):24-29, <https://doi.org/10.35790/msj.1.2.2020.27462>.
- Triana Indrayani, Hasanah." Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin Di Puskesmas Tanggeung Tahun 2017" *Journal Volume* 3, September (2017).
- WHO. 2014. *Health For The Wold's Adolescent: A Shance In The Second Decade*. Geneva, World Health Organization Departemen Of Noncommunicable Disease Surveillance. (2014)

LAMPIRAN I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong Gowa, (0411)841879 Fax 0411-8221400
Website : www.fkk.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 915/Un.06-FKIK/PP.00.9/02/2021 Gowa, 26 Februari 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Yth.
Direktur RSUD Labuang Baji
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam Rangka penyelesaian Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mulyanti
NIM : 70400118004
Jurusan : Kebidanan
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care Dengan Ketuban PecaDini.
Data : Ibu Bersalin Dengan Ketuban Pecah Dini

Maka kami mohon bantuan Bapak,Ibu agar mahasiswa tersebut dapat diberi izin untuk mengambil data awal .

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Wakil Dekan Bidang Akademik

Gamy Nastity Handayany

Tembusan:
Dekan FKIK (sebagai laporan)

LAMPIRAN II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
 Kampus II Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
 Website: fik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 2782 / Un.06-FKIK/PP.00.9/CB/ 2020 Gowa, 12 Agustus 2021
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Pengajuan Kode Etik

Kepada Yth :
Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar
 Di
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Mulyanti
 N I M : 70400118004
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
 Semester : VI (Enam)
 Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care Denga Ketuban Pecah Dini di RSUD Syekh Yusuf Gowa."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Zelna Yuni Andriani, S.ST., M.Keb.
 2. Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin/persetujuan kode etik .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Syatirah

LAMPIRAN III



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkk.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-3238 / Un.06-FKIK/PP.00.9/08/ 2021 Gowa, 27 Agustus 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Mulyanti
N I M : 70400118004
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care Dengan Ketuban Pecah Dini di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2021."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb.
2. Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di RSUD Syekh Yusuf Gowa terhitung mulai tanggal 6 September s/d 31 Oktober 2021 .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar

LAMPIRAN IV



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.031/KEPK/FKIK/VIII/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : MULIYANTI
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"MENAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE DENGAN KETUBAN
 PECAH DINI DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA"**

**"MANAGEMENT OF INTRANATAL CARE MIDWIFERY CARE WITH PREMATURE RUPTURE OF
 MEMBRANES AT SHEIKH YUSUF HOSPITAL GOWA"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022

This declaration of ethics applies during the period August 25, 2021 until August 25,2022

25, 2021
 and Chairperson,
 DR. Dr. Sytirah, Sp.A., M.Kes

LAMPIRAN V



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Sungguminasa, Telepon 0411 - 866536, Fax 0411 - 840892
 Website : rsudsvkhyusuf.gowakab.go.id, email : rsugowa_svkhvysuf@yahoo.com, Kode Pos : 92111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 019/Diklat. RSUD-SY/ XI /2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menerangkan bahwa :

N a m a : Mulyanti
 N i m : 70400118004
 Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang IGD Maternal Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul " *Manjemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care Dengan Ketuban Pecah Dini di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2021* " pada Tanggal 06 September 2021 S/D 30 Oktober 2021

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 01 November 2021

An. Ketua Diklat

Koordinator Bagian Penelitian



Hj. Eliati Patirungi, S. Kep. Ns. M. Kep
 NIP. 19690407 199103 2 008

LAMPIRAN VI

Observasi Ny"K" postpartum dengan KPD Di RSUD Syekh yusuf gowa



Melakukan kunjungan hari ke-2 di rumah sakit Syekh Yusuf Gowa



Melakukan kunjungan rumah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

Nama : Mulyanti
 NIM : 70400118004
 Tempat, Tanggal Lahir : Oi Tui, 31 Desember 2000
 Suku : Bima
 Asal Daerah : Bima
 Alamat : Dusun Bringin Jaya, Desa Oi Tui, Kec.
 Wera, Kab. Bima, Prov. Nusa Tenggara
 Barat (NTB).

 Nama Orang Tua
 Ayah : A. Fadil
 Ibu : Rostinah

B. Riwayat Pendidikan

SDN Inpres Oi Tui : 2006-2012
 SMPN 7 Satap Wera : 2012-2015
 SMKN 3 Bima : 2015-2018
 UIN Alauddin Makassar : 2018-2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R