

HUBUNGAN POLA TIDUR DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI
LITERATUR REVIEW



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M R

Oleh:

NURHAJRAWATI

NIM: 70300115032

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “HUBUNGAN POLA TIDUR DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI LITERATUR REVIEW” yang disusun oleh NURHAJRAWATI, NIM: 70300115032, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Februari 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 25 Februari 2022
*Kalender Hijriah

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hasnah, S.SiT.,S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Wahyuddin G, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: A. Budianto Adi Putra, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusun bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adaah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oeh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh sekiranya batal demi hukum.



Gowa, 1 Januari 2022

Penulis

Nurhajrawati

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt. Berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hubungan Pola Tidur Dengan Kejadian Hipertensi”. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Tujuan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu (S1) jurusan keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Segala kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua saya Bakri dan Hamila yang tercinta, terkasih, tersayang serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai cita atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis MA PhD selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta para wakil rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.

2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku Dekan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para wakil dekan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu, mengurus, dan mengatur administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns, M.Kes selaku Ketua Prodi Keperawatan dan Hasnah,S.IT., S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai Sekretaris Prodi Keperawatan, beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan.
4. Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Pembimbing I dan Bapak A. Budianto Adi Putra, S.Kep., Ns., M.Kep selaku Pembimbing II yang selama ini telah sabar, tulus, dan ikhlas membimbing saya dari awal pengurusan judul, memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Ibu Dr. Hasnah, S.SIT., S.Kep., Ns., M.Kes selaku Penguji I dan Bapak Wahyuddin G., M.Ag selaku Penguji II yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberi masukan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menghasilkan karya yang terbaik yang diharapkan dapat bermanfaat bagi orang lain.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas

kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih.

Samata, 1 Januari 2022

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

ABSTRAK v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang hipertensi 6

B. Tinjauan Umum tentang pola tidur 15

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 31

B. Teknik Pengumpulan Data 31

C. Pengolahan Data 32

D. Kriteria Inklusi dan Eklusi 32

E. Analisis dan Sintesis 33

F. Rekomendasi 34

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hasil 36

B. Pembahasan 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 55

B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Nama : Nurhajrawati

NIM : 70300115032

Judul : Hubungan Pola Tidur Dengan Kejadian Hipertensi :

A Literatur Review

Latar Belakang: Tidur merupakan kondisi tidak sadar yakni individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensoris yang sesuai, atau juga dapat dikatakan sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang relatif, bukan hanya keadaan penuh ketenangan tanpa kegiatan, tetapi lebih merupakan suatu urutan siklus yang berulang, dengan ciri adanya aktivitas yang minim, memiliki kesadaran yang bervariasi, terdapat perubahan fisiologis dan terjadi penurunan respons terhadap rangsangan dari luar. Hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Oleh karena itu, penulis melakukan telaah literatur review mengenai Hubungan Pola Tidur Dengan Kejadian Hipertensi

Tujuan : Untuk mengetahui apakah ada hubungan pola tidur dengan kejadian hipertensi.

Metode: Tulisan ini bersifat *library research* (penelitian pustaka) yang disajikan secara deskriptif melalui beberapa literatur yang relevan. Data diperoleh dari beberapa literatur buku dan jurnal yang membahas tentang hubungan pola tidur dengan kejadian hipertensi. Sumber data diperoleh dengan menggunakan tehnik pencarian jurnal *PICO Framework*. Pengumpulan data dan informasi diseleksi kerelevanannya dengan masalah yang dikaji dengan analisis deskriptif.

Hasil: Dari hasil analisis dari 20 jurnal yang sesuai dengan kriteria didapatkan hasil bahwa ada hubungan pola tidur dengan kejadian hipertensi.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan petugas kesehatan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat berperilaku hidup sehat dengan cara menghindari gangguan pola tidur untuk mengurangi jumlah penderita hipertensi.

Kata kunci: Literatur review, metode PICOS, Hipertensi, Pola Tidur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah diatas nilai normal. Menurut Nurarif A.H. & Kusuma H. (2016), hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik sekitar 140 mmHg atau tekanan diastolik sekitar 90 mmHg. Hipertensi merupakan masalah yang perlu diwaspadai, karena tidak ada tanda gejala khusus pada penyakit hipertensi dan beberapa orang masih merasa sehat untuk beraktivitas seperti biasanya. Hal ini yang membuat hipertensi sebagai *silent killer* (Kemenkes K. , 2018), orang-orang akan tersadar memiliki penyakit hipertensi ketika gejala yang dirasakan semakin parah dan memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan

Menurut *World Health Organization* (2017), hipertensi terjadi pada 1.13 miliar orang diseluruh dunia. Di Amerika Serikat, 103 juta orang dewasa memiliki hipertensi, meningkat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 38% kematian akibat hipertensi dan 45,6% dari mereka dengan tekanan darah tinggi tidak dikontrol. Angka hipertensi mencapai 74,5 juta jiwa pada penduduk Amerika yang berusia diatas 20 tahun dan hampir sekitar 90-95% kasus tidak diketahui penyebabnya. Orang dewasa Afrika-Amerika memiliki tingkat hipertensi sebanyak 44% (AHA, 2017)

Prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia ≥ 18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan (44,1%), sedangkan terendah di Papua sebesar (22,2%). Hipertensi terjadi pada

kelompok umur 31-44 tahun (31,6%), umur 45-54 tahun (45,3%), umur 55-64 tahun (55,2%). Dari prevalensi hipertensi sebesar 34,1% diketahui bahwa sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 13,3% orang yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat serta 32,3% tidak rutin minum obat ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi tidak mengetahui bahwa dirinya hipertensi sehingga tidak mendapatkan pengobatan (Riskesdas, 2018)

Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi hipertensi pada hasil pengukuran penduduk dengan usia ≥ 18 tahun sebesar 34,1%.⁴ di Sulawesi Utara (13,2%) tertinggi dan di Papua (4,4%) terendah, sedangkan Nusa Tenggara Barat melalui pengukuran pada umur ≥ 18 tahun sebesar 7,8%. Di Kota Makassar sendiri, prevalensi pada tahun 2016 mencapai 27,61% dan angka mortalitas yang mencapai 18,6%.⁵ Penyakit hipertensi merupakan penyakit tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 81.462 (Dinaskes, 2017) Dari hasil tersebut Kab. Bulukumba tertinggi kedua setelah Kab. Enrekang dengan jumlah kasus hipertensi sebanyak 30,8%.

Dan data dari dinas kesehatan Kab.Bulukumba menunjukkan bahwa jumlah kasus hipertensi di Kab.Bulukumba meningkat dari tahun ketahun yaitu pada tahun 2014 sebanyak 6.355 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 10.430 orang dan yang dilakukan pengukuran tekanan darah sebanyak 11.714 orang (Muriyati & Yahya S, 2018)

Hipertensi dan komplikasinya adalah salah satu penyebab kematian nomor satu secara global. Komplikasi pembuluh darah yang disebabkan oleh

hipertensi dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, stroke dan gagal ginjal. Komplikasi pada organ tubuh dapat menyebabkan angka kematian yang tinggi. Berdasarkan data dari (Riskesdas, 2018) prevalensi jantung koroner di Indonesia sebesar 1,5% atau sekitar 883.447 orang, prevalensi gagal ginjal sebanyak 3,8% dan prevalensi stroke sebesar 10,9%.

Kualitas tidur yang buruk dapat merusak memori dan kemampuan kognitif. Bila hal ini berlanjut hingga bertahun-tahun, akan berdampak pada tekanan darah tinggi, serangan jantung, stroke, hingga masalah psikologis seperti depresi dan gangguan perasaan lain. Apabila hal ini berlangsung dalam waktu yang lama, akan menyebabkan individu tersebut mengalami kurang tidur yang mengakibatkan peningkatan risiko penyakit yang dideritanya. (Nugroho, Putri, & T, 2016).

Gangguan pola tidur dapat mengakibatkan hormon angiotensin meningkat, hormon inilah yang bertanggung jawab dalam meningkatnya tekanan darah (Widyastuti & Yuni, 2015)

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti bermaksud melakukan telaah literatur review mengenai hubungan pola tidur dengan kejadian hipertensi dan akan menuangkannya ke dalam bentuk *literature review* sebagai tugas akhir dari perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan lebih khususnya jurusan Keperawatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara pola tidur dengan kejadian hipertensi ? “

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan Pola Tidur dengan Kejadian Hipertensi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi

Bagi institut pendidikan hasil penelitian ini dapat di jadikan data dasar dalam mengembangkan penelitian anak didik keperawatan selanjutnya sehingga semakin banyak peneliti terkait pola tidur.

2. Bagi Pelayanan Kesehatan

Bagi tenaga kesehatan dimana penelitian ini memberikan gambaran tentang hubungan pola tidur dengan kejadian hipertensi sehingga dapat di rencanakan asuhan keperawatan yang tepat dalam pemberian pelayanan kesehatan.

3. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai bahan penambah wawasan bahwa pola tidur yang buruk ternyata berhubungan dan dapat mempengaruhi tekanan darah.

4. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta kebijakan dalam melihat hubungan pola tidur dengan kejadian hipertensi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.

A. Tinjauan Umum Hipertensi

1. Definisi

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah diatas normal yang dapat mengakibatkan angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas). Hipertensi berarti tekanan darah di dalam pembuluh-pembuluh darah sangat tinggi yang merupakan pengangkut darah dari jantung yang memompa darah keseluruh jaringan dan organ-organ tubuh (Aryantiningasih & Jesika Br Silaen, 2018).

Hipertensi dapat mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan, sehingga memberi gejala berlanjut pada suatu target organ tubuh yang menimbulkan kerusakan lebih berat pada target organ bahkan kematian (Kayce Bell, June Twiggs, & B. R. O., 2018)

Menurut Price (Nurarif & Kusuma, 2016), Hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Hipertensi tidak hanya beresiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lain seperti penyakit saraf, ginjal, dan pembuluh darah dan makin tinggi tekanan darah, makin besar resikonya.

2. Etiologi

Hipertensi merupakan suatu penyakit dengan kondisi medis yang beragam. Bagi sebagian besar pasien dengan tekanan darah tinggi, penyebabnya tidak diketahui. Ini diklasifikasikan sebagai hipertensi primer atau esensial. Sebagian kecil pasien memiliki penyebab spesifik tekanan darah tinggi, yang diklasifikasikan sebagai hipertensi sekunder. Lebih dari 90% pasien dengan tekanan darah tinggi memiliki hipertensi primer.

Hipertensi primer tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol dengan terapi yang tepat (termasuk modifikasi gaya hidup dan obat-obatan). Faktor genetik dapat memainkan peran penting dalam pengembangan hipertensi primer. Dimana bentuk tekanan darah tinggi ini cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun (Kayce Bell, June Twiggs, & B. R. O., 2018)

Berdasarkan penyebabnya, hipertensi di bedakan menjadi yaitu:

- a. Hipertensi esensial atau primer yang tidak diketahui penyebabnya, tetapi dapat dikontrol dengan terapi yang tepat (termasuk modifikasi gaya hidup dan obat-obatan). Faktor genetik dapat memainkan peran penting dalam pengembangan hipertensi primer (Kayce Bell, June Twiggs, & B. R. O., 2018)
- b. Hipertensi sekunder terjadi akibat penyebab yang jelas salah satu contoh hipertensi sekunder adalah hipertensi vascular renal, yang terjadi akibat stenosis arteri renalis. Kelainan ini dapat bersifat

kongenital atau akibat aterosklerosis stenosis arteri renalis menurunkan aliran darah ke ginjal sehingga terjadi pengaktifan baroreseptor ginjal, perangsangan pelepasan renin, dan pembentukan angiotensin II. Angiotensin II secara langsung meningkatkan tekanan darah tekanan darah, dan secara tidak langsung meningkatkan sintesis andosteron dan reabsorpsi natrium.

3. Manifestasi Klinik

Menurut Tambayong (Nurarif & Kusuma, 2016) tanda dan gejala pada hipertensi dibedakan menjadi :

a. Tidak ada gejala

Tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah, selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan darah tidak teratur.

b. Gejala yang lazim

Sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataannya ini merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien yang mencari pertolongan medis.

Beberapa pasien yang menderita hipertensi yaitu :

- 1) Mengeluh sakit kepala, pusing
- 2) Lemas, kelelahan
- 3) Sesak nafas

- 4) Gelisah
- 5) Mual
- 6) Muntah
- 7) Epistaksis
- 8) Kesadaran menurun

4. Klasifikasi

Menurut World Health Organization (Noorhidayah, 2016) klasifikasi hipertensi adalah :

- a. Tekanan darah normal yaitu bila sistolik kurang atau sama dengan 140 mmHg dan diastolik kurang atau sama dengan 90 mmHg.
- b. Tekanan darah perbatasan (border line) yaitu bila sistolik 141-149 mmHg dan diastolik 91-94 mmHg.
- c. Tekanan darah tinggi (hipertensi) yaitu bila sistolik lebih besar atau sama dengan 160 mmHg dan diastolik lebih besar atau sama dengan 95 mmHg.

5. Faktor Resiko

Hipertensi dapat dipicu oleh berbagai faktor. yang memiliki potensi menimbulkan masalah atau kerugian kesehatan biasa disebut faktor risiko.

Faktor risiko kejadian hipertensi yang tidak dapat diubah terdiri dari usia, jenis kelamin, dan keturunan (Medika, 2017)

a. Usia

Berdasarkan (Riskesdas, 2018), Proporsi hipertensi juga meningkat seiring dengan peningkatan kelompok umur, yaitu di atas usia dewasa menengah. Pola ini terjadi pada dua Riskesdas terakhir di tahun 2013 dan 2018.

Pasien yang berumur di atas 60 tahun mempunyai tekanan darah di atas 140/90 mmHg akan menyebabkan perubahan alami pada jantung, pembuluh darah dan hormone. Berdasarkan jurnal epidemiologi hubungan karakteristik dan obesitas sentral dengan kejadian hipertensi bahwa kelompok hipertensi sebanyak (87,00%) berusia > 59 tahun., sementara usia \leq 59 tahun hanya (58,00%) yang hipertensi (Martini & Amanda, 2018)

b. Jenis Kelamin

Kelompok perempuan memiliki proporsi hipertensi lebih besar dibandingkan laki-laki. Pola ini terjadi pada hasil Riskesdas tahun 2013 dan tahun 2018, Pada perempuan risiko hipertensi menjadi lebih tinggi setelah memasuki menopause, hal ini merupakan faktor hormonal dimana hormone estrogen memiliki pengaruh yang bisa menjadi faktor predispose meningkatnya tekanan darah.

c. Keturunan

Risiko terjadinya hipertensi primer (esensial), bisa meningkat karena faktor riwayat atau seseorang yang memiliki keluarga seperti, ayah,

ibu, kakak kandung/saudara kandung, kakek dan nenek dengan hipertensi lebih berisiko untuk terkena hipertensi. (Aulia, 2018)

Faktor resiko yang dapat di ubah dari Kebiasaan gaya hidup tidak sehat dapat meningkatkan hipertensi antara lain yaitu :

a. Merokok

Kandungan dalam rokok terdapat nikotin yang dapat menyebabkan meningkatnya denyut jantung dan menyebabkan vasokonstriksi perifer yang akan meningkatkan tekanan darah arteri pada jangka waktu yang pendek, selama dan setelah merokok. Dengan menghentikan rokok, maka kemungkinan terjadinya hipertensi, serangan jantung, stroke, dan penyakit lainnya akan menurun (Rustiana, 2014)

b. Berat badan berlebih

Berat badan merupakan faktor determinan pada tekanan darah pada kebanyakan kelompok etnik disemua umur. Penurunan berat badan dianjurkan untuk mengurangi tekanan darah pada orang dewasa yang kelebihan berat badan atau obesitas. Direkomendasikan diet sehat jantung dan peningkatan aktivitas fisik melalui program olahraga terstruktur (Association, 2018)

c. Konsumsi natrium

Asupan natrium harus dikurangi, dan kalium harus ditambah kecuali dikontraindikasikan (Association, 2018)

d. Konsumsi alkohol

Alkohol bersifat meningkatkan aktivitas saraf simpatis karena dapat merangsang sekresi *corticotropin releasing hormone* (CRH) yang berujung pada peningkatan tekanan darah. Kafein juga merangsang kelenjar adrenal melepaskan lebih banyak kortisol dan adrenalin yang memicu tekanan darah meningkat (Rustiana, 2014)

e. Aktivitas Fisik

Orang-orang yang tidak aktif cenderung mempunyai detak jantung lebih cepat dan otot jantung mereka harus bekerja lebih keras pada setiap kontraksi, semakin keras dan sering jantung harus memompa semakin besar pula kekuatan yang mendesak arteri (Nuraini, 2015)

Contoh aktivitas fisik (olahraga) yang dapat dilakukan untuk menurunkan tekanan darah tinggi adalah jalan pagi, jalan kaki, sebam, bersepeda dan berenang. Kegiatan aktivitas ini disarankan agar dilakukan ≥ 30 menit per hari dan ≥ 3 hari per minggu (Kemenkes, 2015)

f. Kebiasaan konsumsi makanan lemak

Menurut Jauhari (Punuh, Manawan, & Rattu, 2016) lemak didalam makanan atau hidangan memberikan kecenderungan meningkatkan kolesterol darah, terutama lemak hewani yang mengandung lemak jenuh. Kolesterol yang tinggi bertalian dengan peningkatan prevalensi penyakit hipertensi.

g. Kebiasaan minum kopi

Kopi seringkali dikaitkan dengan penyakit jantung koroner, termasuk peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol darah karena kopi mempunyai kandungan polifenol, kalium, dan kafein. Salah satu zat yang dikatakan meningkatkan tekanan darah adalah kafein. Kafein didalam tubuh manusia bekerja dengan cara memicu produksi hormon adrenalin yang berasal dari reseptor adinosa didalam sel saraf yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah, pengaruh dari konsumsi kafein dapat dirasakan dalam 5-30 menit dan bertahan hingga 12 jam (Kartini & Bistara, 2018)

6. Komplikasi

Komplikasi dari hipertensi adalah :

a. Stroke

Stroke akibat dari pecahnya pembuluh yang ada di dalam otak atau akibat embolus yang terlepas dari pembuluh nonotak. Stroke bisa terjadi pada hipertensi kronis apabila arteri-arteri yang memperdarahi otak mengalami hipertrofi dan penebalan pembuluh darah sehingga aliran darah pada area tersebut berkurang. Arteri yang mengalami aterosklerosis dapat melemah dan meningkatkan terbentuknya aneurisma.

b. Infark Miokardium

Infark miokardium terjadi saat arteri koroner mengalami arterosklerotik tidak pada menyuplai cukup oksigen ke miokardium

apabila terbentuk thrombus yang dapat menghambat aliran darah melalui pembuluh tersebut. Karena terjadi hipertensi kronik dan hipertrofi ventrikel maka kebutuhan oksigen miokardium tidak dapat terpenuhi dan dapat terjadi iskemia jantung yang menyebabkan infark.

c. Gagal Ginjal

Kerusakan pada ginjal disebabkan oleh tingginya tekanan pada kapiler-kapiler glomerulus. Rusaknya glomerulus membuat darah mengalir ke unti fungsional ginjal, neuron terganggu, dan berlanjut menjadi hipoksik dan kematian. Rusaknya glomerulus menyebabkan protein keluar melalui urine dan terjadilah tekanan *osmotik koloid* plasma berkurang sehingga terjadi edema pada penderita hipertensi kronik.

d. Ensefalopati

Ensefalopati (kerusakan otak) terjadi pada hipertensi maligna (hipertensi yang mengalami kenaikan darah dengan cepat). Tekanan yang tinggi disebabkan oleh kelainan yang membuat peningkatan tekanan kapiler dan mendorong cairan ke dalam ruang interstisium diseluruh susunan saraf pusat. Akibatnya neuro-neuro disekitarnya terjadi koma dan kematian.

B. Tinjauan Umum Pola Tidur

1. Definisi

Tidur merupakan kondisi tidak sadar yakni individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensoris yang sesuai, atau juga dapat dikatakan sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang relatif, bukan hanya keadaan penuh ketenangan tanpa kegiatan, tetapi lebih merupakan suatu urutan siklus yang berulang, dengan ciri adanya aktivitas yang minim, memiliki kesadaran yang bervariasi, terdapat perubahan fisiologis dan terjadi penurunan respons terhadap rangsangan dari luar (Hidayat, 2015)

Dalam Islam, kesehatan adalah sebuah nikmat dan karunia Allah swt. berikan yang patut kita syukuri. Meski kesehatan merupakan kebutuhan firtah manusia dan sebuah nikmat Allah swt. tetapi banyak yang mengabaikan dan melupakan nikmat ini. Di dalam keseharian manusia, tidur adalah salah satu proses untuk beristirahat dan juga menjaga energi agar tetap sehat dan fit. Banyak permasalahan tubuh dan juga proses detoksifikasi terjadi saat tidur. Untuk itu, proses tidur menjadi bagian dari mekanisme biologis dalam tubuh manusia. Tidak hanya dalam sudut pandang biologis, ternyata jauh sebelum ilmu biologi banyak muncul di dunia, Islam sudah membahas mengenai tidur. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Untuk itu Islam dan Ilmu Pengetahuan selalu sejalan. (Tia Nurmaliah, 2017)

Setiap manusia diharuskan tidur dengan waktu yang cukup. Tapi terkadang ada manusia yang ingin tidurnya selama mungkin, padahal

tidak semua dalam keadaan tidur itu sehat dan menunjang metabolisme tubuh. (Alfi, 2016)

Maka dari itu, dalam melakukan tidur harus sesuai dengan sunnatullah dan harus dilakukan dengan waktu yang sudah ditetapkan. Jika hal ini dilanggar, maka yang akan terjadi dalam tubuh akan terserang berbagai penyakit yang berbahaya. Waktu tidur yang baik dilakukan pada malam hari, sedangkan pada siang hari tidak dilakukan untuk tidur. Mengapa dilakukan pada malam hari karena pada saat ini manusia cenderung tidak mempunyai aktivitas berlebih, dan juga pada malam hari memiliki keadaan yang sunyi senyap, hal ini yang menjadikan alasan bahwa malam sangat tepat untuk beristirahat. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an bahwa tidur dilakukan di malam hari untuk melepaskan rasa lelah yang sudah dilakukan di siang dan sore hari.

Sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS. Al-An'am ayat 60:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّنَا بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ
لِيُقَضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۗ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya :

Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur(mu) yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah-lah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan.

Hal ini merupakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt. kepada hamba-Nya. Tidak diragukan lagi bahwa alam tidur yang dirasakan selama ini adalah alam yang sangat menakjubkan dan penuh dengan misteri, karena manusia terbiasa menghadapinya, maka hilanglah rasa takjub tersebut. Sehingga tidak lagi menarik perhatian dan menakjubkan. (Salechah, 2016)

2. Fisiologi

Pusat pengaturan aktivitas kewaspadaan dan tidur terletak dalam mesensefalon dan pada bagian pons. Selain itu, *reticular activating system* (RAS) dapat memberikan rangsangan visual, pendengaran nyeri dan perabaan juga dapat menerima stimulasi dari korteks serebri termasuk rangsangan emosi dan proses pikir. Dalam keadaan sadar, neuron dalam RAS akan melepaskan katekolamin seperti norepinefrin. Pada saat tidur, kemungkinan disebabkan adanya pelepasan serum serotonin dari sel khusus yang berada di pons dan batang otak tengah, yaitu *bulbar synchronizing regional* (BSR), sedangkan bangun bergantung pada keseimbangan implus yang diterima di pusat otak dan sistem limbik (Hidayat, 2015)

3. Tahap Tidur

Ada dua tipe tidur yang telah diidentifikasi: tidur *NREM* (*non-REM*) dan tidur *REM* (*rapid eye movement* [pergerakan mata cepat]).

a. Tidur *NREM*

Tidur *NREM* disebut sebagai tidur gelombang lambat karena gelombang otak pada orang yang sedang tidur lebih lambat dibandingkan gelombang alfa dan beta orang yang sedang bangun atau sedang terjaga. Kebanyakan tidur di malam hari adalah *NREM*. Tidur *NREM* adalah tidur yang dalam dan tenang dan menurunkan beberapa fungsi fisiologis. Pada dasarnya, semua proses metabolik yang meliputi tanda-tanda vital, metabolisme dan kerja otot menjadi lambat. Bahkan menelan dan produksi saliva juga berkurang.

Tidur *NREM* dibagi menjadi empat tahap : Tahap I adalah tahap tidur ringan. Selama tahap ini, individu merasa mengantuk dan relaks, bola mata bergerak dari satu sisi ke sisi lain, dan denyut jantung serta frekuensi pernafasan sedikit menurun. Orang yang tidur dapat dibangunkan dengan cepat dan tahap ini hanya berlangsung selama beberapa menit.

Tahap II adalah tahap tidur ringan dan selama tahap ini proses tubuh terus menerus menurun. Mata secara umum tetap bergerak dari satu sisi ke sisi lain, denyut jantung dan frekuensi pernafasan sedikit menurun, dan suhu tubuh menurun. Tahap II hanya berlangsung sekitar 10-15 menit.

Tahap III denyut jantung dan frekuensi pernafasan, serta proses tubuh lain, terus menurun karena dominasi sistem saraf

parasimpatik. Orang yang tidur menjadi sulit bangun. Individu tidak terganggu dengan stimulus sensorik, otot kerangka menjadi sangat relaks, refleks menghilang, dan dapat terjadi dengkur.

Tahap IV menandai tidur yang dalam, disebut tidur *Delta*. Denyut jantung dan frekuensi pernafasan orang yang tidur menurun sebesar 20% sampai 30% dibandingkan denyut jantung dan frekuensi pernafasan selama jam terjaga. Orang yang tidur sangat relaks, jarang bergerak, dan sulit dibangunkan. Tahap IV diduga memulihkan tubuh secara fisik. Selama tahap ini, mata biasanya berputar dan terjadi mimpi.

b. Tidur REM

Tidur *REM* biasanya kembali terjadi sekitar setiap 90 menit dan berlangsung selama 5-30 menit. Tidur *REM* tidak setenang tidur *NREM* dan mimpi paling sering terjadi selama tidur *REM*. Lebih jauh, mimpi biasanya diingat: yaitu, mimpi dimasukkan ke dalam memori. Selama tidur *REM*, otak sangat aktif dan metabolisme otak dapat meningkat sebesar 20%. Tipe tidur ini juga disebut tidur *paradoksikal* karena tampaknya bertentangan (*Paradoks*) bahwa tidur dapat terjadi secara simultan dengan tipe aktifitas otak ini. Pada fase ini, individu yang sedang tidur dapat sulit dibangunkan atau dapat bangun secara spontan, tonus otot ditekan, sekresi lambung meningkat, dan denyut jantung serta frekuensi pernafasan seringkali tidak teratur. (Hidayat, 2015)

Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa tidur sebagian kecil dari kematian.

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
فِي مَسْكُ الْتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya :

Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; Maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.

Pada penelitian Nida Amalia (2021) Tantawi Jauhari, Kementerian Agama dan Quraish Shihab menafsirkan bahwa dalam QS. Az-Zumar ayat 42, Allah melepaskan ruh nya dari jasadnya dan memisahkan hubungan keduanya (ruh dan jasad) ketika tidur baik secara lahir maupun batin. Dalam QS. Az-Zumar ayat 42 ketika mufassir menafsirkan sama bahwa dalam ayat ini, Allah menggambarkan kekuasaan-Nya yang sempurna dan sifat-sifatnya yang menakjubkan. Dengan kata lain, Dialah yang memegang jiwa manusia ketika manusia meninggal, Dia memutuskan hubungan antara jiwa dan tubuh, dan mengendalikan jiwa orang yang lahirnya

saja sehingga membuatnya tidak dapat mengendalikan tubuhnya, tetapi hubungan di antara mereka tetap ada.

4. Faktor yang mempengaruhi tidur

Sejumlah faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur, kualitas tidur mengandung arti kemampuan individu untuk tetap tidur dan bangun dengan jumlah tidur REM dan NREM yang cukup. Sedangkan kuantitas tidur berarti total waktu tidur individu. Faktor psikologis, fisiologi dan lingkungan dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Usia Durasi dan kualitas tidur beragam diantara orang-orang dari semua kelompok usia . Variasi pola tidur menurut usia antara lain :

- 1) Remaja : tidur 8,5 jam/hari dan sekitar 20% adalah tidur REM (*Rapid Eye Movement*).
- 2) Dewasa muda : tidur 6-8 jam /hari tetapi waktunya bervariasi , 20-25% adalah tidur REM (*Rapid Eye Movement*).
- 3) Dewasa pertengahan : tidur 7 jam/hari, 20% adalah tidur REM (*Rapid Eye Movement*).
- 4) Dewasa tua : tidur sekitar 6 jam/hari, sekitar 20-25% tidur REM (*Rapid Eye Movement*).

b. Sakit

Setiap penyakit yang menyebabkan nyeri, ketidaknyamanan (seperti kesulitan bernafas), atau masalah hati seperti kecemasan atau depresi dapat menyebabkan masalah tidur .

c. Gaya Hidup

Rutinitas harian seseorang mempengaruhi pola tidur seseorang. Individu dengan waktu kerja tidak sama setiap harinya seringkali mempunyai kesulitan menyesuaikan perubahan pola tidur. Perubahan lain yang menggunakan pola tidur merupakan kerja berat yang tidak biasanya, terlihat dalam aktivitas sosial pada larut malam, perubahan waktu makan malam.

d. Lingkungan

Lingkungan fisik tempat seseorang tidur berpengaruh penting pada kemampuan untuk tertidur. Ventilasi yang baik adalah esensial untuk tidur yang tenang. Ukuran dan posisi tempat tidur mempengaruhi kualitas tidur.

Selain itu suara juga mempengaruhi tidur, tingkat suara yang dibutuhkan untuk membangunkan seseorang tergantung pada tahapan tidurnya. Suara yang lebih rendah cenderung dapat membangunkan orang yang tidur dalam tahap 1, sementara suara yang keras membangunkan seseorang dari tidur tahap 3 dan 4.

5. Gangguan Pola Tidur

Gangguan pola tidur dapat dikategorikan sebagai *parasomnia*, gangguan primer dan gangguan skunder.

a. *Parasomnia*

Parasomnia adalah perilaku yang dapat mengganggu tidur atau terjadi selama tidur. *Internasional classification of sleep disorder*

(*Amerikan sleep disorder association*) membagi *parasomnia* menjadi gangguan terjaga (misalnya, berjalan dalam tidur, terror tidur), gangguan transisi bangun tidur (misalnya, mengigau) *Parasomnia* yang terhubung dalam tidur *REM* (misalnya, mimpi buruk).

b. Gangguan tidur primer

Gangguan tidur primer adalah gangguan tidur yang masalah utamanya berupa masalah tidur seseorang. Gangguan ini meliputi;

1) *Insomnia*

Insomnia adalah kondisi yang menggambarkan dimana seseorang kesulitan untuk tidur. Kondisi ini bisa kesulitan tidur, masalah tidur, sering terbangun di malam hari, dan bangun terlalu pagi. Kondisi ini mengakibatkan perasaan tidak segar pada siang hari dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak tercukupinya kebutuhan tidur yang baik (Respir, 2014)

2) *Hipersomnia*

Hypersomnia, kebalikan dari *insomnia*, adalah tidur berlebihan, terutama disiang hari. Individu yang mengalami *hypersomnia* sering kali tidur sampai tengah hari dan banyak tidur siang selama siang hari. Penderita *Hypersomnia* biasanya tidur selama kurang lebih 20 jam per hari. *Hypersomnia* idiopatik primer adalah gangguan pola tidur di malam hari berupa lama tidur di

malam hari dalam jangka waktu yang lama. Namun, pada saat bangun orang tersebut tidak merasakan segar dan tubuh yang sehat sehingga biasanya orang tersebut juga tidur pada siang hari yang juga tidur pada siang hari yang juga dalam jangka waktu yang lama namun tetap tidak berkualitas. (Respir, 2014)

3) *Narkolepsi*

Merupakan gelombang rasa ngantuk yang berlebihan secara mendadak yang terjadi disiang hari sehingga, *narkolepsi* juga disebut sebagai serangan tidur. Penyebabnya tidak diketahui, walau diyakini bahwa *narkolepsi* terjadi karena kurangnya *hipokretin* kimia dalam sistem saraf pusat yang mengatur tidur. gejala cenderung terjadi antara usia 15 dan 30 tahun.

4) *Apnea* Tidur

Apnea tidur atau *Sleep apneu* merupakan gangguan tidur yang disebabkan adanya gangguan aliran darah udara dalam saluran pernafasan yang dapat mengakibatkan seseorang terbangun dari tidurnya. Penyebab *sleep aneua* antara lain adalah adanya penurunan kekuatan otot pada saluran nafas bagian atas yang ditandai dengan suara mendengkur disertai henti nafas selama 20-30 detik dan dapat terjadi sebanyak 20- 30 kali selama periode tidur. *Sleep apneua* menyebabkan udara yang mengalir kedalam paru-paru berkurang sehingga oksigen dalam darah

menurun akibatnya respon dari otak akan menyebabkan seseorang terbangun dari tidurnya.

5) *Deprivasi* Tidur

Gangguan berkepanjangan, dalam jumlah, kualitas, dan konsistensi tidur dapat memicu sebuah sindrom yang disebut *deprivasi* (kurang) tidur. Ini bukan merupakan gangguan tidur tetapi merupakan akibat dari gangguan tidur. *Deprivasi* tidur melibatkan penurunan kuantitas dan kualitas tidur serta ketidak konsistenan waktu tidur. Apabila tidur mengalami gangguan atau terputus-putus, dapat terjadi perubahan urutan siklus tidur normal.

c. Gangguan Tidur Skunder

Gangguan tidur skunder adalah gangguan tidur yang disebabkan oleh kondisi klinis lain gangguan ini mungkin dikaitkan kondisi mental, *neurologi*, atau kondisi lain. Contoh dari kondisi yang menyebabkan gangguan tidur skunder adalah *depresi*, *alkoholisme*, *demensia*, *parkinsonisme*, *disfungsi tiroid*, penyakit paru obstruktif menahun, dan penyakit tukak lambung (*Amerikansleep disorder association*).

6. Waktu dan Batasan Tidur

a. Waktu yang dianjurkan untuk tidur

1) Tidur di awal malam

Tidur yang dianjurkan adalah selepas waktu isya (kira-kira jam 20.00) dan disepanjang malam hingga waktu subuh kira-kira

jam 04.30). tidur siang hari disebut tidur qailullah. Diluar waktu itu, tidur tidak dianjurkan karena bisa menimbulkan efek yang tidak baik (negatif).

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya :

Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.

Tidur yang berkualitas dimalam hari merupakan upaya optimalisasi dalam detoksifikasi untuk menetralsir toksin yang mengontaminasi tubuh, detoksifikasi tubuh, terjadi terutama pada hati, tercapai optimal antioksidan saat tidur. Mekanisme (mesin pengangkat beban, cara menjalankan sesuatu) tersebut berkaitan erat dengan diproduksinya sebagai penetral toksin (zat beracun) pola tidur yang berkualitas detoksifikasi hati dapat berjalan optimal khususnya dalam pembentukan asam amino glutathione (zat penyusun protein) sebagai antioksidan⁴⁴ yang menetralsasi stress oksidatif dan radikal bebas.

QS. Al Isra ayat 79

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ۗ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مُّحَمَّدًا ﴿٧٩﴾

Terjemahnya :

Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.

2) Tidur Sejenak

Tidur siang lebih masyur disebut dengan *qoilu>lah* (waktu sejenak di tengah perjalanan kesibukan sehari-hari), tidur sejenak di siang hari menjadi sebuah ketenangan untuk mengistirahatkan tubuh sejenak, merenung, dan mengusir kepenatan setelah setengah hari bekerja, banyak hadis yang menyebutkan bahwa tidur di siang hari adalah salah satu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah dan juga digemari oleh para sahabat.

b. Waktu yang dilarang untuk tidur

1) Tidur sebelum melaksanakan shalat isya'

Anjuran ini bersifat antisipasif, karena apabila tidur sebelum melaksanakan shalat isya' dikhawatirkan akan kebablasan, sehingga tidak menjalankan kewajiban itu maka akan mendapatkan dosa besar. selain anjuran untuk tetap

melaksanakan shalat isya' terlebih dahulu sebaiknya jangan terbiasa tidur terlalu malam, karena hal itu akan mengganggu kesehatan, daya tahan tubuh menjadi lemah, dan mengganggu keseimbangan sel-sel tubuh. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdul Wahhab Ats Tsaqafi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid Al Hadza' dari Abu Al Minhal dari Abu Barzah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak suka tidur, sebelum shalat 'Isya dan berbincang-bincang setelahnya. "(HR.Bukhari).

2) Tidur sesudah subuh

Pagi hari adalah saat yang segar, dimana udara masih sejuk dan bersih, di pagi hari setelah shalat subuh badan masih merasa benar-benar bugar setelah tidur semalaman. Dipagi hari, setelah bangun tidur dan shalat subuh, jiwa, batin, dan pikiran teras lebih segar serta jernih otak dan hati juga sedemikian siap untuk

menunaikan tugas. Inilah saat yang tepat untuk memulai aktivitas yang baik, bermakna, bermanfaat, bekerja, berkreasi dan berkarya. Kesehatan yang dimaksud tidak hanya dari aspek fisik (raga), melainkan juga psikis (batin, jiwa).

QS. Al Falaq ayat 1

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾

Terjemahnya :

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh,

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah bersumpah demi waktu subuh karena dimana waktu subuh adalah masih gelap sehingga sulit dibangunkan.

Tidur di pagi buta sangat enak apalagi bagi orang-orang yang tidak memiliki kesibukan apapun. Bahkan bisa merasakan kenikmatan tersendiri sensasinya hingga sampai matahari terbit. Namun tidak semua sesuatu yang enak berdampak positif bagi tubuh, Rasulullah sangat menganjurkan agar tetap terjaga sesudah menjalankan shalat subuh bahkan beliau memberi penghargaan yang lebih bagi mereka yang mengindahkan anjuran ini.

3) Tidur disore hari

Tidur di sore hari hingga maghrib menjelang bukan membuat badan menjadi fit dan segar saat bangun, melainkan malah membuat badan menjadi penat, kepala pusing dan tidak enak badan dialami oleh (hampir) semua orang yang punya kebiasaan tidur sore, atau setidaknya terpaksa melakukan aktivitas tidur sore karena berbagai pertimbangan tentu pernah mengalaminya. Ternyata ada hubungan yang erat antara tidur sore hari dengan tingkat kesuksesan seseorang dalam menjalani hidup di dunia

Seseorang yang bangun tidur disenja hari menjelang maghrib menjadi bingung. Hal tersebut karena adanya perubahan suasana yang menyangkut persoalan pencayaan. Saat berangkat tidur setelah ashar, biasanya hari masih relatif terang karena sinar matahari masih memancar penuh. Namun, saat bangun tidur di senja hari hari telah gelap menjelang maghrib bisa berakibat tidak kondusif bagi siapa pun yang tidur.

7. Pengukuran Kualitas Tidur

Kualitas tidur dapat dilihat melalui tujuh komponen, yaitu :

- a. Kualitas tidur subjektif : yaitu penilaian subjektif diri sendiri terhadap kualitas tidur yang dimiliki, adanya perasaan terganggu dan tidak nyaman pada diri sendiri berperan terhadap penilaian kualitas tidur.

- b. Latensi tidur : yaitu berapa waktu yang dibutuhkan sehingga seseorang bisa tertidur, ini berhubungan dengan gelombang tidur seseorang.
- c. Efisiensi tidur : yaitu didapatkan melalui presentase kebutuhan tidur manusia, dengan menilai jam tidur seseorang dan durasi tidur seseorang dan durasi tidur sehingga dapat disimpulkan apakah sudah tercukupi atau tidak.
- d. Durasi tidur : yaitu dinilai dari waktu mulai tidur sampai waktu terbangun, waktu tidur yang tidak terpenuhi akan menyebabkan kualitas tidur yang buruk.
- e. Gangguan tidur : yaitu seperti adanya mengorok, gangguan pergerakan sering terbangun dan mimpi buruk dapat mempengaruhi proses tidur seseorang.
- f. Penggunaan obat tidur dapat menandakan seberapa berat gangguan tidur yang dialami, karena penggunaan obat tidur diindikasikan apabila orang tersebut sudah sangat terganggu pola tidurnya dan obat tidur dianggap perlu untuk membantu tidur.
- g. Gangguan tidur yang dialami pada siang hari atau adanya gangguan pada kegiatan sehari-hari diakibatkan oleh perasaan mengantuk.

8. Pengukuran Pola Tidur

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner *Pittsburgh Sleep Quality Index* (PSQI) adalah instrument efektif yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur dan pola tidur orang dewasa.

PSQI dikembangkan untuk mengukur dan membedakan individu dengan kualitas tidur yang baik dan kualitas tidur yang buruk. Kualitas tidur merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan beberapa dimensi yang seluruhnya dapat tercakup dalam PSQI. Dimensi tersebut antara lain kualitas tidur subjektif, sleep latensi, durasi tidur, gangguan tidur, efisiensi kebiasaan tidur, penggunaan obat tidur, dan disfungsi tidur pada siang hari. Dimensi tersebut dinilai dalam bentuk pertanyaan dan memiliki bobot penilaian masing-masing sesuai dengan standar baku. Kuesioner *Pittsburgh Sleep Quality Index* (PSQI) adalah ukuran subjektif tidur. Alat ukur *Pittsburgh Sleep Quality Index* (PSQI) ini sudah dibuktikan oleh *University of Pittsburgh*. Kuesioner *Pittsburgh Sleep Quality Index* (PSQI) ini terdiri dari 19 item pertanyaan. Terdapat 4 pilihan jawaban dalam bentuk checklist (\checkmark) untuk masing-masing pertanyaan yaitu 0 = tidak pernah, 1 = Sekali seminggu, 2 = dua kali seminggu, 3 = 3 kali atau lebih. Rentang skor dari kualitas tidur adalah 0-21 (buruk). Dengan interpretasi total, jika nilai < 5 = kualitas tidur baik dan jika nilai > 5 = kualitas tidur buruk (Sefti, Franly, & Indriani, 2016)

Dalam Islam, kesehatan adalah sebuah nikmat dan karunia Allah swt. berikan yang patut kita syukuri. Meski kesehatan merupakan kebutuhan firtah manusia dan sebuah nikmat Allah swt. tetapi banyak yang mengabaikan dan melupakan nikmat ini. Di dalam keseharian manusia, tidur adalah salah satu proses untuk beristirahat dan juga menjaga energi agar tetap sehat dan fit. Banyak permasalahan tubuh dan

juga proses detoksifikasi terjadi saat tidur. Untuk itu, proses tidur menjadi bagian dari mekanisme biologis dalam tubuh manusia. Tidak hanya dalam sudut pandang biologis, ternyata jauh sebelum ilmu biologi banyak muncul di dunia, Islam sudah membahas mengenai tidur. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Untuk itu Islam dan Ilmu Pengetahuan selalu sejalan. (Tia Nurmaliah, 2017)

Tidur yang cukup dan berkualitas dapat menjadi landasan bagaimana seseorang dapat hidup sehat. Rasulullah saw telah mengajak kepada umatnya cara tidur yang berkualitas dan sehat. Cara tidur Rasulullah saw adalah dengan memiringkan tubuh ke arah kanan, sambil berdzikir pada Allah hingga matanya terasa berat. Beliau memiringkan badannya ke sebelah kiri sebentar, untuk kembali ke sebelah kanan. Tidur seperti ini merupakan tidur paling efisien, yaitu makanan berada dalam posisi yang untuk lambung sehingga dapat mengendap sesuai dengan aturannya. Lalu beralih ke sebelah kiri sebentar agar proses pencernaan makanan lebih cepat karena lambung mengarah ke liver, kemudian berbalik lagi ke sebelah kanan hingga akhir tidur agar makanan lebih cepat terurai di lambung. Hikmah lainnya, tidur dengan miring ke kanan menyebabkan beliau lebih mudah bangun untuk sholat malam.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلًا لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ ذُشُورًا



Terjemahnya :

Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS.al-Furqan ayat 47 Agar istirahat pada malam hari. Mengatur pola tidur adalah salah satu kunci sehat Rasulullah yakni tidur cepat pada malam hari dan cepat bangun pada dini hari. Biasanya Rasulullah tidur selepas shalat isya' untuk kemudian bangun pada pertengahan malam untuk shalat malam. Beliau tidak pernah tidur melebihi kebutuhan, demikian juga pada saat ingin tidur tidak menahannya. (Ahmad, 2014)

Tantawi Jauhari, Kementerian Agama, dan Quraish Shihab menjelaskan bahwa QS. Al-Furqan ayat 47, mereka menafsirkan bahwa ayat ini berbicara tentang manfaat lain yang diperoleh manusia dari terbit dan tenggelamnya matahari. Seperti diantara bukti-bukti keesaan Allah dan kekuasaan-Nya adalah bahwa kegelapannya sebagai pakaian yang menutupi dari kamu, dan menjadikan tidur sebagai pemutus aneka kegiatan kamu sehingga kamu dapat beristirahat guna memulihkan tenaga, dan dia juga menjadikan siang untuk bertebaran antara lain berusaha

mencari rezeki. Tidur dan bangun itu silih berganti dalam kehidupan manusia, seperti silih bergantinya siang dan malam di alam semesta ini. Dengan keadaan yang silih berganti itu, manusia akan mengetahui nikmat Allah serta kebaikan-Nya. (M. Quraish, 2002)

Selanjutnya ketiga mufassir tersebut dalam menafsirkan QS. Al-Furqan bahwa siang digunakan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan apabila sudah terjadi malam dipergunakan untuk beristirahat karena sudah melakukan aktivitas dan mengeluarkan tenaga begitu banyak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan konsep *Deskriptif Kuantitatif* melalui literature-literatur yang signifikan dengan tema penelitian, kemudian disuguhkan menggunakan model *Literatur Review*, yang merupakan rangkuman dari beberapa studi penelitian berdasarkan tema yang ditentukan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data-data hasil penelitian ini didapatkan dari beberapa literature jurnal dan artikel yang membahas tentang hubungan pola tidur dengan kejadian hipertensi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, bukan dari pengamatan langsung. Sumber data yang diperoleh berupa artikel jurnal Nasional maupun Internasional dengan menggunakan tehnik pencarian jurnal PICO. PICO adalah metode elektronik pencarian informasi yang merupakan akronim dari P (patient, population, problem), I (intervention, prognostic factor, exposure), C (comparison, control), dan O (outcome). PICO dalam penelitian ini adalah:

P - Problem, yaitu Hipertensi

I - Intervention, yaitu tidak ada perlakuan

C - Control, yaitu ada perbandingan

O - Outcome, yaitu pola tidur

C. Pengolahan Data

Setelah semua data dan informasi dikumpulkan, peneliti menyeleksi kerelevanan data dan informasi tersebut sesuai dengan masalah yang ingin dibahas. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membahas masalah yang jadi topik penelitian.

D. Kriteria Inklusi dan Eklusi

Teknik pencarian artikel yang digunakan yakni teknik pencarian literatur PICO yang merupakan akronim dari:

- *Problem* yakni masalah yang akan dibahas sesuai dengan topik literatur review.
- *Intervention* yakni tindakan intervensi yang dalam hal ini intervensi keperawatan yang sesuai dengan topik literatur review.
- *Comparison* yakni intervensi pembanding dalam suatu penelitian atau jika tidak ada maka diganti dengan kelompok kontrol pada penelitian terpilih yang sesuai dengan topik literatur review.
- *Outcome* yakni hasil yang didapatkan dari penelitian terpilih yang sesuai dengan topik literatur review.

Tabel 3.1 Kriteria inklusi dan eksklusi dengan format PICOS

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Population / Problem	Jurnal internasional dengan nasional yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu hubungan pola tidur dengan kejadian hipertensi	Jurnal internasional dan nasional yang tidak ada hubungan dan pengaruhnya terhadap dengan topik yang akan mengeluarkan atau menghilangkan subjek yang sudah memenuhi kriteria inklusi
Intervention	Tindakan pola tidur dengan kejadian hipertensi	Tidak ada faktor yang mempengaruhi pola tidur dengan kejadian hipertensi
Comparison	Ada faktor pembanding	Tidak ada faktor pembanding
Outcome	Adanya hubungan faktor internal, faktor eksternal, agent terhadap pola tidur dengan kejadian hipertensi	Tidak ada suatu hubungan atau pengaruh dengan faktor yang mempengaruhi pola tidur dengan kejadian hipertensi
Study design	<i>Observasional, Non- experimeny, survey study, cross-sectional, analisis korelasi, komparatif, study kuantitatif</i>	<i>Systematic/litelature riview</i>
Tahun terbit	Artikel atau jurnal yang terbit setelah tahun 2016	Artikel atau jurnal yang terbit diluar tahun 2016
Bahasa	Bahasa ingris dan bahasa indonesia	Selain bahasa ingris dan bahasa indonesia

E. Analisis dan Sintesis


Menggunakan metode analisis deskripsi untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah diperoleh sehingga didapatkan gambaran jelas tentang keadaan sebenarnya pada obyek yang dikaji.

F. Rekomendasi

Setelah dilakukannya sebuah analisis, penulis memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai solusi permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini kemudian disusun menjadi suatu hasil pembahasan dan kesatuan suatu kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah rekomendasi hasil pemecahan masalah menjadi sebuah adopsi pengetahuan, sebagai landasan berpikir penengahan masalah yang telah dirumuskan.



<i>Google Scholar</i>	<i>Portal Garuda</i>	<i>Science Direct</i>
(n=71)	(n=)	(n=59)



Bagan 4.1 Pencarian Literatur

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan jumlah keseluruhan artikel yang telah diteliti sebanyak 130 artikel, Penelitian ini menetapkan 20 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.



No.	Author/Tahun	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil
1.	Santi Martini, Shofa Roshifanni, Fanni Marzela (2018)	Pola Tidur yang Buruk Meningkatkan Risiko Hipertensi	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan perilaku tidur yang buruk dapat meningkatkan risiko kejadian hipertensi	<p>Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang bersifat analitik dengan desain <i>case control</i>.</p> <p>Teknik pengambilan Sampel yang dilakukan menggunakan <i>simple random sampling</i></p>	<p>Untuk pola tidur sendiri jumlahnya hampir berimbang antara responden yang memiliki pola tidur baik dan buruk, yaitu masing-masing 37 dan 39 orang. Tabel 1 menunjukkan sebesar 76,3% responden yang mengalami hipertensi memiliki pola tidur yang buruk. Hal tersebut berbeda dengan kelompok yang tidak mengalami hipertensi, 3,7% memiliki pola tidur yang baik.</p> <p>Hasil perhitungan besar risiko diperoleh nilai $Exp(B)$ atau disebut juga nilai OR sebesar 9,022 artinya risiko menderita hipertensi pada orang yang mempunyai pola tidur buruk 9,022 kali lebih besar dibandingkan orang yang mempunyai pola tidur baik. Seseorang yang pola tidurnya buruk mengalami risiko kejadian hipertensi yang sangat besar.</p>

2.	Yenny Purwati, Probosuseno, Arinto Hadi (2018)	Hubungan Kualitas Tidur dengan Kejadian Hipertensi pada Lansia di Kabupaten Bantul	Tujuan penelitian: Mengetahui apakah ada Hubungan Kualitas Tidur dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Kabupaten Bantul	Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional .	Hasil Penelitian: Responden yang mengalami hipertensi dengan kualitas tidur buruk yaitu sebanyak 65 orang (57,7%), sedangkan responden yang mengalami hipertensi dengan kualitas tidur baik yaitu sebanyak 33 orang (40,3%). Frekuensi responden yang tidak hipertensi dengan kualitas tidur buruk yaitu sebanyak 31 orang (38,3%), sedangkan responden yang tidak hipertensi dengan kualitas tidur baik yaitu sebanyak 34 orang (26,7%).
3.	Devi Arissandi, Christina T.Setiawan, Rahaju Wiludjeng (2019)	Gangguan Pola Tidur Dengan Hipertensi Lansia Di Desa Sei Kapitan Kabupaten Kota Waringin Barat Hubungan (Studi Di Desa Sei Kapitan Kota Waringin Barat)	Bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara gangguan pola tidur hipertensi lansia di Desa Sei Kapitan Kabupaten Kota Waringin Barat	Metode penelitian: Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain <i>cross-sectional</i> . menggunakan teknik <i>total sampling</i> .	Gangguan pola tidur meningkat sebanyak 15 orang (50%) dan hipertensi sebanyak 17 orang (56,7%). Sedangkan responden di Desa Sei Kapitan Kotawaringin Barat pada gangguan pola tidur meningkat dan terjadinya hipertensi sebanyak 12 orang (40%) dan dengan hasil <i>rank spearman</i> 0,007 menunjukkan nilai $P < 0,05$

4.	Amirrudin Setiawan , Darmasta Maulana, Rahmah Widyaningrum (2018)	Hubungan kualitas Tidur Dengan Tekanan Darah Lanjut Usia Penderita Hipertensi Esensial di Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budi Dharma Yogyakarta	Bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada lanjut usia penderita hipertensi esensial di UPT Rumah Pelayanan sosial Lanjut Usia Budi Dharma Yogyakarta	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan <i>analitik observasional</i> korelasi dengan pendekatan <i>cross sectional</i> . Teknik sampling yang digunakan adalah <i>total sampling</i> ,	Didapatkan data bahwa Sebanyak 86,7% lansia memiliki kualitas tidur buruk dan 93,3% lansia yang mengalami hipertensi esensial stadium I. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara kualitas tidur dengan tekanan darah lanjut usia penderita hipertensi esensial di UPT Rumah Pelayanan Sosial Lut Usia Budi Dharma Yogyakarta.
5.	Santi Martini, Shofa Roshifanni, Fanni Marzela (2018)	Pola Tidur yang Buruk Meningkatkan Risiko Hipertensi	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan perilaku tidur yang buruk dapat meningkatkan risiko kejadian hipertensi	Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang bersifat analitik dengan desain <i>case control</i> Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan <i>simple random sampling</i>	Hasil penelitian menggunakan uji statistik regresi logistik menunjukkan ($p=0,000$; $OR=9,022$) artinya pola tidur memiliki pengaruh paling besar terhadap kejadian hipertensi dibandingkan dengan umur dan jenis kelamin. Kekuatan pengaruh pola tidur responden menunjukkan bahwa responden yang memiliki pola tidur yang buruk memiliki risiko 9,022 kali lebih besar terserang hipertensi dibandingkan dengan yang

					memiliki pola tidur baik.
6.	Ni. Nyoman Maryaningtyas Adinatha , Indah Wulaningsih , Hadi Suryanto (2018)	Hubungan Kualitas Tidur Dengan Peningkatan Tekanan Darah Pada Lansia Di Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pucang Gading Kota Semarang	Untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan peningkatan tekanan darah pada lansia di Unit pelayanan lanjut usia Pucang Gading Kota Semarang	Jenis penelitian ini kuantitatif desain cross sectional. Tehnik purposive sampling	Dalam penelitian ini kualitas tidur baik sebagian besar mempunyai tekanan darah pre hipertensi sebanyak 14 responden (63,6%) dan yang mempunyai kualitas tidur buruk sebagian besar mempunyai tekanan darah hipertensi sebanyak 19 responden (73,1%). Ada hubungan antara kualitas tidur dengan peningkatan tekanan darah di Unit pelayanan sosial lanjut usia Pucang Gading Kota Semarang, dengan p value $0,000 < 0,05$.
7.	Hilmi Wicaksono, Sylvie Puspita, Hany Puspita	Hubungan Kualitas Tidur Dengan Tekanan Darah Pada Lansia Di Posyandu Lansia	Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada Lansia di Posyandu Lansia Dusun Wersah Kelurahan Kepanjen Kabupaten Jombang	Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. Menggunakan teknik Accidental Sampling	Hasil penelitian menunjukkan Ada hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah sistolik (0,491 dan $p = 0,000$; $\alpha = < 0,05$), serta ada hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah diastolik (0,543 dan $p = 0,000$; $\alpha = < 0,05$), dimana hubungan tersebut memiliki kekuatan agak rendah.

8.	Rusdiana, Maria, Insana, Al Azhar, Hafiz (2018)	Hubungan Kualitas Tidur Dengan Peningkatan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Guntung Payung	Tujuan dari penelitian adalah mengetahui hubungan kualitas tidur dengan peningkatan tekanan darah pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Guntung Payung Tahun 2018.	Jenis penelitian yang digunakan adalah korelasi dengan pendekatan cross-sectional.	<p>Penelitian ini menyatakan kualitas tidur responden mayoritas adalah berkategori kualitas tidur baik sebanyak 50,6%, Peningkatan tekanan darah responden mayoritas adalah berkategori ringan sebanyak 53,2%.</p> <p>Ada hubungan kualitas tidur dengan peningkatan tekanan darah pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Guntung Payung Tahun 2019 dengan nilai $p\text{-value}=0,000$ ($\alpha < 0,005$).</p>
9.	Nety Ayuningtyas Maryono , Sutrisno , Wahyu Riniasih (2020)	Pengaruh Pola Tidur Terhadap Peningkatan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di Desa Jambon Kecamatan Pulokulon - Grobogan	Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pola tidur terhadap peningkatan tekanan darah pada penderita hipertensi di Desa Jambon Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan	Penelitian ini menggunakan desain <i>deskriptif komparatif</i> dengan pendekatan <i>cohort</i> . Teknik sampling yang digunakan adalah metode <i>Simple Random Sampling</i>	Berdasarkan analisis menggunakan komputerisasi dengan uji <i>Chi-square</i> pada pengaruh pola tidur terhadap peningkatan darah sistolik menunjukkan $p\text{ value } 0,000 < 0,005$. Dan pada pengaruh pola tidur terhadap peningkatan darah diastolik menunjukan $p\text{ value } 0,000 < 0,005$. Kekuatan hubungan RR (<i>Relative Risk</i>) hasil nilai 0,500 (Konfiden

					Interval 95% 0,329-0,769) dan 0,545 (Konfiden Interval 95% 0,72-0,799)
10	Harsismanto J, Juli Andri, Tirta Dwi Payana, Muhammad Bagus Andrianto, Andry Sartika (2020)	Kualitas Tidur Berhubungan Dengan Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Provinsi Bengkulu..	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berupa survey analitik dengan desain penelitian <i>cross sectional</i>	Hasil analisis univariat didapatkan tekanan darah pada lansia hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) yaitu 12 responden (54,5%) mengalami hipertensi ringan, 10 responden (45,5%) mengalami hipertensi sedang. Kualitas tidur yang dialami lansia hipertensi yaitu 11 responden (50%) mengalami kualitas tidur yang baik dan 11 responden (50%) lainnya mengalami kualitas tidur yang buruk.
11	Nova Maulana (2021)	Kualitas Tidur Berhubungan Dengan Tingkat Hipertensi Pada Lansia Penderita Hipertensi	Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kualitas tidur, tekanan darah dan menganalisis hubungan antara kualitas tidur dengan tingkat hipertensi lansia.	Penelitian ini non-eksperimen dengan metode menggunakan Pendekatan <i>cross sectional</i> . Menggunakan teknik purposive sampling	Hasil analisa data menggunakan uji <i>Spearman Rank</i> dapat dilihat pada tabel 5 yang menunjukkan bahwa korelasi antara tingkat hipertensi dengan kualitas tidur diperoleh nilai r hitung sebesar 0,528 dan p-value sebesar 0,001 maka p-value <0,005 sehingga Ho ditolak

					<p>atau H_a diterima artinya ada hubungan yang signifikan secara statistik ($p = 0,01$) antara tingkat hipertensi dengan kualitas tidur. Nilai r hitung 0,528 menunjukkan bahwa korelasi memiliki tingkat hubungan yang kuat.</p> <p>Dimana tingkat hipertensi yang tinggi dapat berpengaruh terhadap kualitas tidur yang buruk. Apabila kualitas tidur seseorang semakin buruk maka akan meningkat risiko terjadi peningkatan tekanan darah.</p>
12	Raden Taufiq Septiyo Noegroho, Suriadi, Arina Nurfianti (2021)	Hubungan Antara Pola Tidur Dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pola tidur dengan tekanan darah	Desain penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Korelasi. Rancangan penelitian yang digunakan adalah <i>cross sectional</i>	Hasil uji bivariat <i>Chi Square</i> antara pola tidur dengan tekanan darah didapatkan hasil nilai $p=0,384$ ($p>0,05$) yang berarti tidak terdapatnya hubungan antara pola tidur dengan tekanan darah.
				Sampel pada penelitian ini dipilih menggunakan <i>non-</i>	

				<i>probability sampling</i> yaitu <i>consecutive sampling</i>	
13	Siti Roziah Ria Famuji (2021)	Hubungan Kualitas Tidur Terhadap Nilai Tekanan Darah Lansia Di Kota Batu	Untuk membuktikan adanya hubungan antara kualitas tidur terhadap nilai tekanan darah lansia di Kota Batu	Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain penelitian <i>cross sectional</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan pada kualitas tidur terhadap nilai tekanan darah lansia di Kota Batu dengan uji <i>Chi Square</i> diperoleh nilai <i>P value</i> sebesar 0,000 (<i>p value</i> < 0,05). Hal tersebut berarti semakin baik kualitas tidur maka nilai tekanan darah juga semakin baik.
14	Muhammad Firdaus (2021)	Hubungan Antara Pola Hidup Dan Kualitas Tidur Terhadap Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Primer Di Rumah Sakit Umum Daerah Dompus Nusa Tenggara Barat	Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola hidup dan kualitas tidur terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi primer di Rumah Sakit Umum Daerah Dompus Nusa Tenggara Barat	Pada penelitian ini metode penelitian digunakan yaitu observasional analitik dan pendekatan <i>cross sectional</i> . Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>Accidental Sampling</i> .	Sebanyak 6 orang (18.75%) kualitas tidur baik dan kualitas tidur buruk 14 orang (43.75%) pada hipertensi stadium 1. Sedangkan 2 orang (6.25%) kualitas tidur baik dan 10 orang (31.25%) kualitas tidur buruk pada hipertensi stadium 2. Pada uji kolerasi nilai Sig.(2-tailed)=0,415 > 0,05, angka koefisien kolerasi (0,149), artinya ada hubungan tidak

					bermakna antara kualitas tidur dengan tekanan darah, dengan hubungan (kolerasi) sangat lemah dan arah kolerasi bernilai positif atau searah.
15	Nur Melizza, Nurul Hikmah, Anggraini Dwi Kurnia, Nur Lailatul Masruroh, Cici Indah Setiowati, Yoyok Bekti Prasetyo (2020)	Hubungan Kualitas Tidur Dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Ciptomulyo	Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Ciptomulyo.	Menggunakan metode korelasi observasional analitik dengan desain penelitian <i>cross sectional</i>	Berdasarkan uji <i>spearman</i> didapatkan hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan tekanan darah sistolik ($p < 0,040 < \alpha 0,05$) dengan kekuatan hubungan lemah (0,310), namun tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan tekanan darah diastolik ($p > 0,623 > \alpha 0,05$) dengan kekuatan hubungan yang sangat lemah (0,076). Dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan tekanan darah sistolik pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Ciptomulyo.
16	Baziduhu Lase, Skm, M.Mkes	Hubungan Kualitas Tidur Lansia Dengan	Tujuan penelitian ini adalah untuk	Jenis penelitian ini adalah <i>deskriptif</i>	Dapat diketahui bahwa frekuensi Responden kualitas tidur baik 11

	(2019)	Kekambuhan Hipertensi Di Poli Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias	mengidentifikasi hubungan kualitas tidur lansia dengan kekambuhan pada pasien hipertensi	<i>korelatif</i> yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, dengan menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i>	orang (27,5%) tidak mengalami Kekambuhan hipertensi, dan kambuh sebanyak 0 orang (0%). Berdasarkan kualitas tidur buruk 2 orang (5%) responden tidak Mengalami kekambuhan hipertensi dan 27 orang (67,5%) Mengalami kekambuhan. Berdasarkan hasil uji statistik <i>spearman</i>
17	Yuda Pradana, Wahyuningsih, Mutiara Dewi Listiyanawati (2016)	Hubungan Pola Tidur dengan Kejadian Hipertensi pada Dewasa Awal di Dusun Bendo Desa Trimurti Srandakan Kabupaten Bantul	Mengetahui hubungan pola tidur dengan kejadian hipertensi pada dewasa awal di Dusun Bendo Desa Trimurti Srandakan Kabupaten Bantul.	Jenis penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan <i>cross sectional</i> . Tehnik pengambilan sampel menggunakan <i>proportional random sampling</i>	Hasil analisa bivariat didapatkan hasil ada hubungan pola tidur dengan kejadian hipertensi pada dewasa awal di Dusun Bendo Desa Trimurti Srandakan Kabupaten Bantul dengan nilai $p < 0,05$
18	Made Adelia Pradnya Saraswati, Putu Ayu Sita Saraswati, I Putu Gede Adiatmika, Luh Putu Ratna Sundari (2016)	Hubungan Kualitas Tidur Terhadap Tekanan Darah Pada Wanita Lansia Di Denpasar Timur	Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada wanita lansia di Denpasar Timur	Rancangan penelitian menggunakan <i>cross sectional analitik</i> Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik	menunjukkan responden dengan kualitas tidur yang baik sebanyak 28 orang. Responden yang memiliki tekanan darah sistolik yang normal sejumlah 20 orang (71,4%), 6 responden (21,4%) yang mempunyai

				<i>purposive sampling.</i>	tekanan darah pre hipertensi, 1 orang (3,6%) yang memiliki tekanan darah hipertensi stadium I dan 1 orang (3,6%) yang memiliki tekanan darah hipertensi stadium II. Responden yang memiliki kualitas tidur yang buruk sebanyak 39 orang. Responden yang memiliki tekanan darah sistolik yang normal sejumlah 5 orang (12,8%), 6 orang (15,4%) yang mempunyai tekanan darah pre hipertensi, 19 orang (48,7%) yang memiliki tekanan darah hipertensi stadium I dan 9 orang (23,1%) yang memiliki tekanan darah hipertensi stadium II.
19	Wahid Nur Alfi, Roni Yuliwar (2016)	Hubungan Kualitas Tidur Dengan Tekanan Darah Pasien Hipertensi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pasien hipertensi di puskesmas Mojolangu Kota Malang	Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan desain penelitian <i>cross sectional.</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dengan tekanan darah tidak normal berjenis kelamin perempuan (53,30%), berada dalam kelompok umur 41-60 tahun (43,30%), kualitas tidur buruk (66,70%). Ada hubungan

					antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada pasien hipertensi dengan nilai kekuatan hubungan 0,65.
20	Rahelea Sambeka, Angela F. C. Kalesaran, Afnal Asrifuddin (2018)	Hubungan Kualitas Tidur Dengan Hipertensi Pada Lansia Di Desa Tambun Kecamatan Likupang Barat Tahun 2018	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tekanan darah dengan kualitas tidur pada lansia di Desa Tambun Kecamatan Likupang Barat Tahun 2018.	Penelitian ini adalah penelitian survey analitik dengan desain penelitian cross sectional.	Berdasarkan hasil uji statistik <i>chi square</i> antara kualitas tidur dengan hipertensi. Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden yang menderita hipertensi dengan memiliki kualitas tidur buruk berjumlah 40 (81,6%) responden dan responden yang tidak menderita hipertensi serta memiliki kualitas tidur baik berjumlah 12 (44,5) responden. Responden yang tidak menderita hipertensi dan memiliki kualitas tidur buruk berjumlah 9 (18,4%) responden sedangkan responden yang tidak menderita hipertensi serta memiliki kualitas tidur baik berjumlah 15 (55,5%) responden.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A. Daftar artikel hasil pencarian

Litelature review ini di sintesis menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan data-data hasil ekstrasi yang sejenis sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit, judul, metode dan hasil penelitian serta database.

Tabel 4.1 Karakteristik umum dalam penyelesaian studi (n=20)

No	Kategori	N	%
A Tahun Publikasi			
1.	2016	3	30
2.	2017	1	10
3.	2018	7	70
4.	2019	2	20
5.	2020	3	30
6.	2021	4	40
Total		20	200
B Desain Penelitian			
1.	<i>Observasional</i>	6	60
2.	<i>Kuantitatif</i>	5	50
3.	<i>Deskriptif Korelatif</i>	2	20
4.	<i>Deskriptif Komparatif</i>	1	10
5.	<i>Survei</i>	2	20
6.	<i>Non Eksperimen</i>	1	10
7.	<i>Korelasi</i>	3	30

	Total	20	200
<hr/>			
C	Sampling Penelitian		
<hr/>			
1.	<i>Purposive Sampling</i>	3	30
2.	<i>Total Sampling</i>	2	20
3.	<i>Simple Random Sampling</i>	3	30
4.	<i>Accidental Sampling</i>	2	20
5.	<i>Proportional Random Sampling</i>	1	10
6.	<i>Non Probability Sampling</i>	1	10
	Total	12	120
<hr/>			
D.	Instrumen Penelitian		
<hr/>			
1.	Lembar kuisisioner <i>Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)</i>	20	200
	Total	20	200
<hr/>			
E	Analisis statistic penelitian		
<hr/>			
1.	<i>Cross sectional</i>	18	180
2.	<i>Cohort</i>	1	10
3.	<i>Case Control</i>	1	10
	Total	20	200
<hr/>			

Penelitian yang dilakukan *literature review* sebagian besar (70%) dipublikasikan pada tahun 2018. Penelitian ini (60%) desain penelitiannya menggunakan *Observasional* dan (50%) desain penelitian menggunakan *Kuantitatif*. Teknik pengambilan sampling

dalam penelitian yang di gunakan pada jurnal tersebut menggunakan *total sampling* (20%), *purposive sampling* (30%), *Simple Random Sampling* (30%), sedangkan statistik penelitian menggunakan *Cross Sectional*, Instrument dalam penelitian ini sebagian besar (100%) menggunakan lembar kuisisioner *Pittsburgh Sleep Quality Index* (PSQI). Adapun tujuan penelitian dari 20 artikel tersebut semuanya memiliki tujuan penelitian yang sama yaitu untuk mengetahui hubungan terhadap pola tidur dengan kejadian hipertensi.

B. Pembahasan

Beberapa penelitian yang terdapat pada tabel 4.1 tentang hubungan pola tidur dengan kejadian hipertensi. Hal ini sesuai dengan hasil analisis dari 20 jurnal/artikel diatas bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola tidur dengan kejadian hipertensi.

Pola tidur merupakan susunan perubahan status kesadaran yang terjadi dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk mekanisme tubuh untuk beristirahat.

QS. An Naba Ayat 9-11

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُباتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

Terjemahnya :

9. dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat,

10. dan Kami jadikan malam sebagai pakaian[1546],

11. dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,

[1546] Malam itu disebut sebagai pakaian karena malam itu gelap menutupi jagat sebagai pakaian menutupi tubuh manusia.

Didalam penelitian Nur Alfi (2018) kepada responden dengan menggunakan kuesioner PSQI menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang memiliki kualitas tidur kurang dan buruk disebabkan karena responden sulit untuk memulai tidur, tidak bisa tertidur dalam waktu 30 menit bahkan lebih, sering terbangun karena harus ke kamar mandi, rasa pegal pada tubuh, nyeri dan pusing pada kepala. Keluhan ini menyebabkan responden tidur tidak nyenyak dan tidur terlalu larut malam, selain itu ada beberapa responden yang harus bangun terlalu cepat karena harus mempersiapkan keperluan untuk bekerja.

Hal tersebut juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Magfira (2016) yang menyebutkan ada perbedaan bermakna antara tekanan darah sistolik pada mahasiswi dengan kualitas tidur baik dan mahasiswi dengan kualitas tidur buruk. Selain itu, nilai median tekanan darah sistolik kelompok mahasiswi dengan kualitas tidur baik yaitu 105 yang berarti lebih rendah dibandingkan nilai median tekanan darah sistolik kelompok mahasiswi dengan kualitas tidur buruk yaitu 120. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai tekanan darah sistolik kelompok kualitas tidur buruk lebih tinggi

dibandingkan dengan nilai tekanan darah sistolik kelompok kualitas tidur baik.

Dalam kasus pola tidur, besarnya pengaruh terhadap tekanan darah tergantung kuatnya stress psikis dan fisik yang diarahkan kepada organ yang mempunyai pengaruh besar terhadap tekanan darah seperti ginjal khususnya pada bagian adrenal korteks yang mensekresikan glucocorticoid yang menghasilkan hormon kortisol yang dapat memicu kelenjar pituari bagian depan mensekresikan ACTH (adreno corticotropin hormone). ACTH sendiri juga ikut berperan membantu menghasilkan aldosteron yang menyebabkan peningkatan penyerapan ion natrium (Na⁺) dan air (H₂O) pada ginjal serta kalium (K⁺) dan (H⁺) sehingga dapat terjadi peningkatan tekanan darah.

QS.Ar-Rumm ayat 23

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Pada waktu tidur, tubuh merasa tenang dan rileks setelah otot atau saraf atau dua-duanya letih bekerja. Semua kegiatan tubuh menurun di waktu tidur, kecuali proses metabolisme, aliran air seni dari ginjal dan keringat. Proses-proses tersebut, jika berhenti, justru akan membahayakan manusia.

Sedangkan pernapasan agak berkurang intensitasnya, tapi lebih panjang dan lebih banyak keluar dari dada ketimbang dari perut. Jantung pun akan berdetak lebih lambat sehingga aliran darah menjadi lebih sedikit. Otot-otot yang kejang akan mengendur sehingga mengakibatkan kesulitan bagi seseorang yang tengah tidur untuk melakukan perlawanan. Semua hal itu menyebabkan tidur sebagai waktu istirahat yang paling baik bagi manusia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelusuran beberapa jurnal yang dijelaskan peneliti pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pola tidur dengan kejadian hipertensi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisa *literature jurnal* penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengubah variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut dan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar hasil penelitian *literature jurnal* lebih baik dan lebih lengkap lagi.
2. Bagi dosen institusi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terutama pada fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, Program studi keperawatan diharapkan dapat di jadikan data dasar dalam mengembangkan penelitian anak didik keperawatan selanjutnya sehingga semakin banyak meneliti terkait pola tidur.
3. Bagi masyarakat umum sebaiknya perlu memperhatikan kebutuhan fisiologis tubuh, utamanya tidur, karena melihat hasil penelitian yang menyimpulkan sebagian besar responden memiliki kualitas tidur yang buruk. Masyarakat umum ada baiknya lebih mengenal apa saja

gangguan-gangguan tidur yang dialami terkait dengan pola tidur. Perlu mengatur kembali pola tidur agar mendapatkan kualitas tidur yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2019). *Hipertensi Esensial : Diagnosa Dan Tatalaksana Terbaru Pada Dewasa*.
- AHA, A. (2017). *A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. American Heart Association*.
- Ahmad Mustafa, A.-M. (1992). *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Karya Toha Putra,.
- Alfi, N. (2016). *Tumbuh Kembang Manusia dalam Al-Qur'an*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Aryantiningsih, D., & Jesika Br Silaen. (2018). *Hipertensi Pada Masyarakat dan Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Raya Baru. Jurnal Iptek Terapan, 64-72*.
- Aspiani, & R Yuli. (2016). *Asuhan Keperawatan Klien Gangguan Kardiovaskular*.
- Association, A. H. (2018). *Practice Guidelines High Blood Pressure. American Family Physician, 413-415*.
- Aulia, R. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Pasien Hipertensi Di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr.Moewardi Surakarta. Journal of Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Dinaskes. (2017). *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016. Media Kesehatan,, 347*.
- Hidayat, A. (2015). *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Medika.
- Kartini, Y., & Bistara, D. (2018). *Hubungan Kebiasaan Mengonsumsi Kopi. Jurnal Kesehatan Vokasional Vol. 3 No. 1*.
- Kayce Bell, June Twiggs, & B. R. O. (2018). *Hypertension : The Silent Killer. JNC-8 Guideline Recommendations*.
- Kemenkes. (2015). *Profil Kesehatan Indonesia*.
- Kemenkes, K. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.

- Martini, S., & Amanda, D. (2018). The Relationship between Demographical Characteristic and Central Obesity with Hypertension. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 43.
- Medika, T. B. (2017). *Berdamai Dengan Hipertensi*. Jakarta: Bumi Medika.
- Muriyati, & Yahya S. (2018). Gaya Hidup Dengan Kejadian Hipertensi Di Wilayah Pegunungan Dan Pesisir Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Kesehatan Panrita Husada*, 35-51.
- Noorhidayah, S. (2016). *Hubungan Kepatuhan Minum Obat Antihipertensi Terhadap Tekanan Darah Pasien Hipertensi di Desa Salamrejo*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nugroho, Putri, T., & T. (2016). *Teori Asuhan Keperawatan Gawat Darurat*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Nuraini. (2015). Risk Factors of Hypertension. *J Majority*, 10-19.
- Nurarif, & Kusuma. (2016). Terapi Komplementer Akupresure. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Punuh, M., Manawan, A., & Rattu, A. (2016). Hubungan Antara Konsumsi Makanan Dengan Kejadian Hipertensi Di Desa Tandengan Satu Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa, vol 5. *Journal of PARMACON Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*.
- Respir, A. (2014). *Insomnia. American Thoracic Society*. Retrieved from <http://www.sleepeducation>.
- RI, K. K. (2018). *Riset Kesehatan Dasar*. Retrieved from http://www.depkes.go.id/resources/download/infoterkini/materi_rakorpop_2018/Hasil%20Risikesdas%202018.pdf
- Risikesdas, R. (2018). Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Rustiana. (2014). *Gambaran Faktor Risiko Pada Penderita Hipertensi Di Puskesmas Ciputat Timur Tahun 2014*. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25656/1/RUSTIANA - fkik.pdf>
- Salechah, M. (2016). Posisi Tidur Tinjauan Hadis (Kajian Ma'anil Hadis). *Jurnal Intellectualita* 5 No.2.

Sefti, R., Franly, O., & Indriani, L. (2016). UBUNGAN KUALITAS TIDUR DENGAN TEKANAN DARAH PADAREMAJA DI DESA TOMBASIAN ATAS KECAMATANKAWANGKOAN BARAT. *e-journal Keperawatan (e-Kp) Volume 4 Nomor 1*.

Sudarsono. (2017). Peningkatan Pengetahuan Terkait Hipertensi Guna Perbaikan Tekanan Darah pada Pemuda di Dusun Japanan, Margodadi, Seyegan, Sleman, Yogyakarta',. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 26-38.

Tia Nurmaliah, L. (2017). *Tidur Dalam AL-Qur'an (Tinjauan Ilmu Kesehatan)*. Riau: UIN Siska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurhajrawati, lahir di Ujung Pandang, 3 Oktober 1997. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Bakri dan Ibu Hamila. Penulis yang akrab dipanggil Acha ini mulai menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Biringkaloro tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2013, di tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah ke SMK Pratidina Makassar hingga 2015. Penulis memasuki bangku kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan pada tahun 2015-2022 Alhamdulillah berkat pertolongan Allah swt, do'a kedua orang tua dan orang-orang baik di sekitar, serta kerja keras, penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun Tugas Akhir yang berjudul “ Hubungan Pola Tidur Dengan Kejadian Hipertensi ”. Semasa kuliah, penulis aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan khususnya di Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan menjadi anggota di Divisi Dana Dan Usaha periode 2017-2018.

Alamat email: Nurhajrawati03@gmail.com